

**ASUHAN KEPERAWATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
AKTIVITAS DAN ISTIRAHAT PADA Tn. B DI RUANG SAWIT
RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**



TUGAS AKHIR NERS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ners
Pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SAKINAH AGOESTARINI LAHILOTE
NIM : 70900122013

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakinah Agoestarini Lahilote
NIM : 70900122013
Tempat/Tanggal Lahir : Huangobotu, 17 Agustus 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan / Ners / Keperawatan Dasar Profesi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Aktivitas dan Istirahat Pada Tn. B di Ruang
Perawatan Sawit RSUP DR Wahidin Sudirohusodo
Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 24 Mei 2023

Penyusun



Sakinah Agoestarini Lahilote


NIM 70900122013

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Sakinah Agoestarini Lahilote, S.Kep NIM: 70300122013, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat Pada Tn. B Di Ruang Sawit RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar", memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 14 Juni 2023



Dr. Risnah, SKM, S.Kep.Ns., M.Kes
Pembimbing I



Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns., M.Kes
Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Aktivitas dan Latihan Pada Tn. B Di Ruang Sawit RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar", yang disusun oleh Sakinah Agoestarini Lahilote, S.Kep, NIM: 70900122013, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Rabu 21 Juni 2023, bertepatan dengan 02 Dzulhijjah 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, Juni 2023 M
Dzulhijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	:	Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Patima S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy I	:	Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kes.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	:	Titi Mildawati, S.Pd.I.,M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Risnah, SKM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 00

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT. karena berkat izin dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan sebuah Karya Tulis Akhir yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Aktivitas dan Istirahat Pada Tn. B di Ruang Perawatan Sawit RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. kepada sahabat, keluarga dan Insya Allah percikan rahmat itu akan langsung turun kepada kita semua yang masih konsisten menjalankan sunnah dan ajaran beliau.

Tujuan penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada Program Profesi Ners Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa didalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dukungan dan semangat hingga karya tulis ini mampu diselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta sekaligus support system bagi penulis Nurdin Lahilote dan Linda Wartabone, atas kasih sayang, doa yang selalu terpanjatkan, dan dukungan semangat serta dukungan moril dan materilnya. Ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengelolah, serta mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Kementrian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) kepada penulis sehingga bisa melanjutkan pendidikan sampai pada tahap profesi ners.
4. Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Program Studi Profesi Ners dan Hj. Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Sekretaris Program Studi Profesi Ners beserta staf dan dosen pengajar yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.
5. Dr. Risnah, SKM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing I dan Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya dengan ikhlas untuk membimbing serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.
6. Musdalifah.,S.Kep.,Ns.,M.Kes.,M.Kep selaku Penguji I dan Dr. Hj. Aisyah Arsyad, M.Ag selaku Penguji agama yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
7. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

8. Sahabat seperjuangan penulis CSSMoRA angkatan 2018 dan keluarga besar CSSMoRA UINAM, teman-teman alumni Pondok Pesantren MA Al-Huda angkatan 35 Muthia, Fani, Difta, Jenab, Maya yang selalu memberikan semangat, motivasi serta selalu meluangkan waktu untuk sekedar berdiskusi dengan penulis.
9. Teman-teman seperjuangan profesi ners angkatan XXI, khususnya Andi Ika dan Miftah yang selalu membersamai penulis selama menjalani proses perkuliahan dan selalu memberikan semangat dalam menyusun karya tulis akhir ini.
10. Terkhusus untuk diri sendiri terima kasih selalu kuat dalam berjuang bersama hingga karya tulis akhir ini selesai.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang di sengaja maupun tidak di sengaja, yang lisan maupun tulisan selama penulis menimba ilmu di kampus peradaban yang saya banggakan dan cintai Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tidak menutup kemungkinan dalam penulisan karya tulis ini terdapat kesalahan yang tidak di sadari oleh penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun, untuk kemajuan karya tulis ini. Karena sejatinya manusia tidak luput dari salah dan khilaf, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sekian dan Terima kasih.

Gowa, 22 Mei 2023

Penulis,


Sakinah Agoestarini Lahilote

70900122013

DAFTAR ISI


SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Konsep Medis	6
2.2 Konsep Keperawatan.....	18
2.3 <i>Evidenced Based Practice In Nursing</i>	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Studi Kasus	35
3.2 Subjek Studi Kasus.....	35
3.3 Fokus Studi Kasus	36
3.4 Instrumen Studi Kasus.....	36
3.5 Prosedur Pengambilan Data	36
3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus.....	37
3.7 Analisis data dan Penyajian data	37
3.8 Etika Penelitian.....	37
BAB IV LAPORAN KASUS	41
4.1 Pengkajian	41
4.2 Diagnosis Keperawatan	52
4.3 Intervensi	53
4.4 Implementasi	56

4.5 Evaluasi	67
BAB V PEMBAHASAN	71
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan.....	71
5.2 Analisis Intervensi <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	80
BAB VI PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran-saran	85
Daftar Pustaka.....	86
Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup.....	




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat kekuatan otot.....	22
Table 2.2 Artikel utama dan artikel pendukung.....	33



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Penyimpangan KDM	17
----------------------------------	----



ABSTRAK

Nama : Sakinah Agoestarini Lahilote

NIM : 70900122012

Judul : Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat Pada Tn. B di Ruang Sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Latar belakang : Aktivitas dan istirahat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh individu yakni dengan bentuk latihan aktif pada seseorang, stroke merupakan salah satu penyakit yang menimbulkan dampak berupa kecacatan. Gangguan kesehatan yang terjadi apabila seseorang mengalami stroke yaitu imobilitas atau imobilisasi dimana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan baik terjadi pada salah satu sisi tubuh atau sebagainya. Latihan ROM (*Range of Motion*) merupakan salah satu teknik nonfarmakologi untuk mengembalikan sistem pergerakan, dan untuk memulihkan kekuatan otot. **Tujuan :** mengetahui asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang Sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Metode :** Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan latihan ROM selama 3 hari. **Hasil :** analisis studi kasus pada Tn. B terdapat beberapa masalah yaitu gangguan mobilitas fisik dan nyeri akut. Pemberian latihan ROM selama 3 hari menunjukkan adanya peningkatan kekuatan otot 1 tingkat. **Kesimpulan :** hasil evaluasi kasus menunjukkan bahwa pemberian latihan ROM selama 3 hari dapat meningkatkan kekuatan otot pada ekstremitas kanan dari 0 menjadi 1. Hal ini menunjukkan bahwa latihan ROM efektif diberikan pada pasien yang mengalami gangguan mobilitas fisik.

Kata kunci : Asuhan Keperawatan, Aktivitas dan istirahat, *Range Of Motion* (ROM)

ABSTRACT

Nama : Sakinah Agoestarini Lahilote

NIM : 70900122012

Judul : *Nursing Care Fulfillment of Activity and Rest Needs at Mr. B in the Sawit Room of RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*

Background: Activity and rest are one of the basic human needs needed by individuals, namely by being active in a person, stroke is a disease that has an impact in the form of disability. Health problems that occur when a person has a stroke, namely immobility or immobilization where a person cannot move freely because conditions that interfere with movement either occur on one side of the body or so on. ROM (Range of Motion) exercise is a non pharmacological technique to restore the movement system, and to restore muscle strength. **The goals:** to find out nursing care to meet the needs of activities and rest on Mr. B in the Sawit room of RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Method:** The type of research used is a case study with data collection techniques through interviews, observation, physical examination, management of ROM exercises for 3 days. **Results:** case study analysis on Tn. B there are several problems, namely impaired physical mobility, acute pain and impaired verbal communication. ROM training for 3 days showed an increase in muscle strength of 1 level. **Conclusion:** the results of the case evaluation show that giving ROM exercises for 3 days can increase muscle strength in the right extremity from 0 to 1. This shows that ROM exercises are effective given to patients who experience impaired physical mobility.

Keywords: Nursing care, activity and rest, range of motion (ROM)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas dan istirahat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh individu yakni dengan bentuk latihan aktif pada seseorang termasuk didalamnya adalah makan dan minum, mandi, toileting, berpakaian, mobilisasi tempat tidur, berpindah dan ambulasi. Pemenuhan terhadap aktivitas dan istirahat ini dapat meningkatkan harga diri serta gambaran diri seseorang (Rohayati, 2019).

Stroke adalah suatu kondisi dimana suplai darah ke suatu bagian otak terputus secara tiba-tiba akibat matinya sebagian sel otak akibat terhentinya aliran darah akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah di otak. Stroke merupakan salah satu penyakit yang menimbulkan dampak berupa kecacatan (Andriani et al., 2022). Defisit kemampuan jangka panjang yang paling umum terjadi pada stroke adalah hemiparesis atau kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh (Ayuningrum et al., 2021). Penyebab dibagi menjadi 2 faktor yaitu yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, ras, genetik, dan riwayat TIA dan faktor yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi (hiperkolesterolemia), perilaku merokok, obesitas, penyakit jantung, konsumsi alkohol berlebihan, aterosklerosis, penyalahgunaan obat dan gangguan pernapasan saat tidur (Tamburion et al., 2020). Dalam mengkonsumsi makanan kita dianjurkan untuk tidak berlebihan, seperti dalam firman Allah swt. QS. Al-‘Araf/7:31 yang berbunyi:

* يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (Kemenag RI, 2019).

Dalam penafsiran Ibu Katsir disampaikan wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sebagian ulama Salaf mengatakan bahwa Allah menghimpun semua kebaikan dalam separuh ayat ini, yaitu firman-Nya: makan dan minumlah kalian, dan janganlah berlebih-lebihan. (Al-A'raf:31) Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas berkata bahwa makna yang dimaksud ialah makanlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu selagi engkau hindari dua pekerti, yaitu berlebih-lebihan dan sombong (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Tsaur, dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Allah menghalalkan makan dan minum selagi dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak untuk kesombongan." Sanad atsar ini berpredikat shahih. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah kalian tanpa dengan kesombongan dan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah suka bila melihat nikmat-Nya digunakan oleh hamba-Nya. Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadits Qatadah, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi saw. yang telah bersabda: Makan, bersedekah, dan berpakaianlah kamu sekalian tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Mugirah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Salim Al-Kalbi, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Jabir At-Tai; ia telah mendengar Al-Miqdam ibnu Ma'di Kariba Al-Kindi bercerita bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tiada suatu wadah pun yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih jahat daripada perutnya. Cukuplah bagi anak

Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbinya. Dan jika ia terpaksa melakukannya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya. (Al-A'raf: 31) Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala: Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al-Miidah: 87); Yakni yang melampaui batasan Allah dalam masalah halal atau haram, yang berlebih-lebihan terhadap apa yang diharamkan-Nya, yaitu dengan menghalalkan yang diharamkan-Nya atau mengharamkan yang diharamkan-Nya. Tetapi Allah menyukai sikap yang menghalalkan apa yang diharamkan-Nya dan mengharamkan apa yang diharamkan-Nya, karena yang demikian itulah sifat pertengahan yang diperintahkan oleh-Nya" (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

World Health Organization (WHO) pada tahun 2018 menyatakan bahwa setiap tahun 15 juta orang di seluruh dunia menderita stroke, dimana 5 juta di antaranya meninggal dan 5 juta tetap cacat permanen. Stroke adalah penyebab utama kematian kedua di dunia pada orang berusia 60 tahun ke atas dan penyebab kematian kelima pada orang berusia 15 hingga 59 tahun. (Purba et al., 2022).

Berdasarkan data (Kemenkes RI, 2018) Riskesdas 2018 menyatakan bahwa insiden stroke di Indonesia meningkat seiring bertambahnya usia, dengan jumlah diagnosis stroke terbanyak pada usia 75 tahun ke atas (50,2%) dan terendah pada kelompok usia 15-24 tahun (0,6%). Jenis kelamin lebih cenderung laki-laki (11,0%) daripada perempuan (10,9%). Tergantung di mana Anda tinggal, kejadian stroke lebih tinggi di perkotaan (12,6%) dibandingkan di pedesaan (8,8%).

Gangguan kesehatan yang terjadi apabila seseorang mengalami stroke yaitu imobilitas atau imobilisasi dimana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan baik terjadi pada salah satu sisi tubuh atau sebagainya (Rohayati, 2019). Gejala stroke biasanya datang tiba-tiba, dengan hilangnya kekuatan di satu sisi tubuh, perubahan kesadaran, bicara cadel, penglihatan kabur, sulit berjalan, sakit kepala, dan kehilangan kesadaran. Hilangnya fungsi motorik dan sensorik terjadi pada

korban stroke yang mengakibatkan hemiparesis, hemiplegia, dan ataksia. Akibat gangguan gerak di otak, terjadi istirahat otot yang berujung pada pengecilan otot. Atrofi otot menyebabkan kekakuan otot, sehingga otot yang kaku pada korban stroke mungkin memiliki jangkauan gerak yang terbatas (Andriani et al., 2022).

Kelemahan otot pada penderita stroke akan mempengaruhi kontraksi otot. Kontraksi otot disebabkan oleh berkurangnya suplai darah ke otak, yang menghambat saraf penting di otak dan sumsum tulang belakang. Menghambat suplai oksigen dan nutrisi ke otak menyebabkan masalah kesehatan yang serius, karena dapat menyebabkan hemiparesis dan bahkan kematian. Gangguan derajat mobilisasi fisik penderita seringkali disebabkan oleh gerakan berupa masa istirahat di tempat tidur. Efek kelemahan otot yang terkait dengan aktivitas fisik biasanya muncul di malam hari. Kontrol otak untuk mengatur gerakan otot berkurang, sehingga terjadi pengurangan massa otot (Purba et al., 2022). Pada pasien stroke harus rajin melakukan aktivitas fisik karena selain meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan kemampuan berjalan latihan fisik juga memberikan dampak positif seperti memperbaiki fungsi kognitif pasca stroke. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal/8:60 yang berbunyi:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah

niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi” (Kemenag RI, 2019).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah). Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah). Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dilampi dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dianiaya (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

(Ali Imran:196-197) Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mempersiapkan peralatan senjata untuk berperang dengan orang-orang musyrik, sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kalian sanggupi. (Al-Anfal: 60) Yakni dengan segenap kemampuan yang kalian miliki. berupa kekuatan dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. (Al-Anfal: 60) Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Amr ibnul Haris, dari Abu Ali Sumamah ibnu Syafi (saudara lelaki Uqbah ibnu Amir) (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Ia pernah mendengar Uqbah ibnu Amir mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu terletak pada pasukan pemanah. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu terletak pada pasukan pemanah. Imam Muslim meriwayatkannya dari Harun ibnu Ma'ruf, Imam Abu Daud dari Sa'id ibnu Mansur, sedangkan Ibnu Majah dari Yunus ibnu Abdul A'la. Ketiga-tiganya (yakni Harun, Sa'id, dan Yunus) dari Abdullah ibnu Wahb dengan sanad yang sama (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Latihan ROM (*Range of Motion*) merupakan salah satu teknik nonfarmakologi untuk mengembalikan sistem pergerakan, dan untuk memulihkan kekuatan otot untuk bergerak kembali memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Latihan ROM merupakan salah satu bentuk rehabilitasi stroke paling awal untuk mencegah stroke atau kecacatan. Fungsinya untuk mengembalikan kekakuan atau kecacatan pada anggota tubuh. . Ada dua jenis ROM yaitu ROM Aktif dan ROM Pasif. Pada ROM aktif, sendi digerakkan menggunakan otot tanpa bantuan, sedangkan pada ROM pasif, perawat menggerakkan sendi pasien (Purba et al., 2022).

Menurut penelitian (Andriani et al., 2022) terbukti bahwa latihan (*Range Of Motion*) ROM berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot dengan nilai signifikan kekuatan otot sebelum dan sesudah diberikan intervensi ROM sebesar 0.000. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Purba et al., 2022) bahwa dari hasil analisis data menggunakan uji Wilcoxon didapat nilai p value 0,004 atau $< 0,05$ dengan nilai z tabel 2,887. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ada Efektivitas ROM (*Range Of Motion*) Terhadap Kekuatan Otot Pada Pasien Stroke di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan Tahun 2021.

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar merupakan rumah sakit tipe A dan sebagai pusat rujukan di Indonesia bagian timur, berdasarkan data SIRS RSWS (2021), jumlah pasien stroke dari tahun 2018- 2020 mencapai 851 pasien, stroke merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan gangguan dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat berdasarkan hasil dari wawancara dengan perawat juga merupakan kasus tertinggi di ruang Sawit.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan studi *Evidence Based Research* mengenai asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan Sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan karya tulis akhir ini adalah “bagaimana asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan Sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Diketuinya gambaran asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Diketuinya pengkajian keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- b. Diketuinya diagnosis keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- c. Diketuinya intervensi keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- d. Diketuinya implementasi keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- e. Diketuinya evaluasi keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

- f. Diketuinya intervensi ROM (*Range Of Motion*) berdasarkan *Evidence Based Practice in Nursing* pada asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Karya tulis akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta menjadi dasar praktik keperawatan dalam proses pemberian asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat pada Tn. B di ruang perawatan Sawit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Karya tulis akhir ini diharapkan mampu diaplikasikan dan sebagai rujukan intervensi dalam pemberian asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dan istirahat dengan masalah gangguan mobilitas fisik di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat

2.1.1 Definisi

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama, mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi jika ingin dalam keadaan sehat dan seimbang. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan (Nurwening & Herry, 2019). Salah satu individu yang sehat adalah adanya kemampuan melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan, misalnya berdiri, berjalan, dan bekerja.

Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Aktivitas adalah segala sesuatu yang dilakukan atau terjadi, baik fisik maupun non fisik. Aktivitas adalah suatu keadaan gerak dimana seseorang harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang memiliki pola atau ritme tersendiri dalam melakukan aktivitas. Salah satu tanda seseorang sehat adalah kemampuannya untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, makan dan minum, kebersihan diri, hobi, dll. Selain aktivitas tubuh yang sehat, juga dapat berdampak pada harga diri dan citra tubuh. (Nurwening & Herry, 2019).

Istirahat adalah keadaan tenang dan rileks, tanpa tekanan emosional atau kecemasan. Istirahat bukan berarti tidak beraktivitas sama sekali, tetapi juga keadaan yang membutuhkan istirahat. Kadang jalan-jalan di taman, nonton TV dan lain-lain bisa juga digambarkan

sebagai bentuk istirahat. Keadaan istirahat adalah berhenti sejenak untuk menghilangkan rasa lelah, rileks untuk memulihkan diri, atau keadaan melepaskan diri dari segala sesuatu yang membosankan, sulit, atau bahkan menjengkelkan. (Nurwening & Herry, 2019).

Narrow (1967), yang dikutip Perry dan Potter 1993 (dalam (Nurwening & Herry, 2019), mengemukakan ada enam karakteristik istirahat yaitu:

- a. Merasakan bahwa segala sesuatunya dapat diatasi;
- b. Merasa diterima;
- c. Mengetahui apa yang sedang terjadi;
- d. Bebas dari gangguan ketidaknyamanan;
- e. Mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan;
- f. Mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan.

2.1.2 Konsep Kebutuhan Aktivitas

- a. Pengertian Kebutuhan Aktivitas

Kemampuan bergerak (misalnya berdiri, bekerja, makan) merupakan kebutuhan dasar yang diharapkan setiap manusia. Tubuh menjadi sehat, sistem pernapasan dan peredaran darah tubuh berfungsi dengan baik, serta metabolisme tubuh dapat dioptimalkan melalui aktivitas. Dalam hal ini, kemampuan bergerak tidak terlepas dari berfungsinya sistem pernapasan dan muskuloskeletal dengan baik. (Zulaikha, 2021).

Aktivitas fisik adalah ritme sirkadian manusia. Setiap orang memiliki ritme atau polanya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan, rekreasi, makan,

istirahat, dan lain-lain. Aktivitas fisik pada dasarnya adalah penggunaan tubuh seseorang secara efisien, terkoordinasi dan aman untuk mempertahankan gerakan yang baik dan kesejahteraan selama aktivitas untuk mencapai keseimbangan. Kebutuhan aktivitas adalah kebutuhan mobilitas (pergerakan) dasar. Kebutuhan dasar ini diatur oleh berbagai sistem/organ dalam tubuh termasuk tulang, otot, tendon, ligamen, sistem saraf, dan persendian. (Zulaikha, 2021)

b. Koordinasi Sistem Aktivitas Fisik

Koordinasi aktivitas fisik melibatkan fungsi sistem muskuloskeletal dan sistem saraf.

1) Sistem muskuloskeletal

Sistem muskuloskeletal terdiri dari muskulus, tendon, ligament, tulang, kartilago, persendian, dan bursa. Semua struktur ini bekerja bersama-sama untuk menghasilkan gerakan. Ada tiga jenis otot utama pada manusia, yaitu : otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot rangka yang paling berpengaruh untuk aktivitas atau pergerakan (Mubarak, 2017).

2) Sistem Persarafan

Sistem persarafan secara spesifik memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Saraf eferen (reseptor), berfungsi menerima rangsangan dari luar kemudian meneruskannya ke susunan saraf pusat

- b) Sel saraf atau neuron, berfungsi membawa impuls dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh lainnya.
- c) Sistem saraf pusat (SPP), berfungsi memproses impuls dan kemudian memberikan respon melalui saraf eferen.
- d) Saraf eferen, berfungsi menerima respon dari SPP kemudian meneruskannya ke otot rangka (Zulaikha, 2021).

2.1.3 Etiologi

Penyebab gangguan aktivitas antara lain kelainan postur, gangguan perkembangan otot, kerusakan sistem saraf pusat, trauma langsung pada sistem muskuloskeletal dan neuromuscular, serta kekakuan otot (Hidayat, 2014). Menurut Mubarak dkk (Mubarak, 2017), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan istirahat, antara lain:

- a. Jenis kelamin, status nutrisi, kondisi psikologis.
- b. Gaya hidup

Perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi kemampuan aktivitas seseorang karena berdampak pada perilaku kebiasaan sehari-hari.

- c. Proses penyakit/cedera

Proses penyakit dapat mempengaruhi kemampuan aktivitas karena dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh.

- d. Tingkat energi

Energi diperlukan untuk melakukan aktivitas.

- e. Usia dan status perkembangan

Kemampuan atau kematangan fungsi motorik konsisten dengan perkembangan usia. Intoleransi aktivitas/penurunan kekuatan dan daya tahan, depresi, suasana hati dan kecemasan (Adha, 2017).

Menurut *British Heart Foundation* tahun 2014 (dalam (Sumarta, 2020), faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan istirahat yaitu:

a. Faktor Biologis

1) Usia

Semakin bertambahnya usia, maka semakin berkurang aktivitas fisik yang dapat dilakukan.

2) Jenis Kelamin

Laki-laki lebih aktif dalam beraktivitas fisik daripada perempuan.

b. Faktor Demografis

1) Sosial Ekonomi

Seseorang dengan sosial ekonomi yang tinggi lebih aktif daripada yang memiliki sosial ekonomi yang rendah.

2) Ras

Golongan kulit putih cenderung aktif daripada etnis lain.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap tingkat rendahnya melakukan aktivitas fisik

c. Faktor Sosial

Faktor pendukung mempengaruhi partisipasi dalam aktivitas fisik Dukungan sosial dan orang-orang terkasih seperti teman, guru, profesional kesehatan dan pelatih atau pelatih atletik profesional.

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dapat memberikan efek positif dalam aktivitas fisik, antara lain:

- 1) Akses ke program dan fasilitas tersedia seperti, lapangan, taman bermain dan area olahraga
- 2) Adanya zona pejalan kaki dan jalur bersepeda
- 3) Adanya waktu untuk bermain di luar rumah
- 4) Perbedaan tidak langsung dalam konstruksi bangunan karena dapat mempengaruhi pola aktivitas fisik di perkotaan dan pedesaan

2.1.4 Manifestasi Klinis

Dalam buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), beberapa gejala dan tanda gangguan mobilitas fisik antara lain:

a. Gejala dan Tanda Mayor

- 1) Subjektif, seperti engkeluh sulit menggerakkan ekstremitas
- 2) Objektif
 - a) Kekuatan otot menurun
 - b) Rentang gerak (ROM) menurun.

b. Gejala dan Tanda Minor

- 1) Subjektif
 - a) Nyeri saat bergerak
 - b) Enggan melakukan pergerakan
 - c) Merasa cemas saat bergerak
- 2) Objektif
 - a) Sendi kaku
 - b) Gerakan tidak terkoordinasi

c) Gerak terbatas

d) Fisik lemah (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

2.1.5 Perubahan Sistem Tubuh Akibat Gangguan Aktivitas

Hambatan mobilitas adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat bergerak bebas akibat kondisi yang menghambat pergerakan (aktivitas), misalnya cedera tulang belakang, cedera otak berat disertai patah tulang anggota gerak, dan faktor yang berhubungan dengan hambatan mobilitas. Hambatan mobilitas fisik adalah keterbatasan gerak fisik satu atau lebih anggota tubuh secara mandiri dan sengaja (Adha, 2017).

Dampak dari imobilitas dalam tubuh dapat memengaruhi sistem tubuh, seperti perubahan pada metabolisme tubuh, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan dalam kebutuhan nutrisi, gangguan fungsi gastrointestinal, perubahan sistem pernapasan, perubahan kardiovaskuler, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan kulit, perubahan eliminasi (buang air besar dan kecil), perubahan perilaku (Hidayat, 2009) dalam (Adha, 2017).

a. Perubahan Metabolisme

Perubahan metabolisme imobilitas dapat mengakibatkan proses anabolisme menurun dan katabolisme meningkat. Keadaan ini dapat berisiko meningkatkan gangguan metabolisme. Proses imobilitas dapat juga menyebabkan penurunan ekskresi urine dan peningkatan nitrogen. Hal tersebut dapat ditemukan pada pasien yang mengalami imobilitas pada hari kelima atau keenam. Beberapa dampak perubahan metabolisme, diantaranya adalah pengurangan jumlah metabolisme, atrofi kelenjar dan katabolisme protein, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, demineralisasi

tulang, gangguan dalam mengubah zat gizi, dan gangguan gastrointestinal.

b. Ketidakseimbangan Cairan dan Elektrolit

Terjadinya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit sebagai dampak dari imobilitas akan mengakibatkan persendian protein menurun dan konsentrasi protein serum berkurang sehingga dapat mengganggu kebutuhan cairan tubuh. Disamping itu, dapat menyebabkan edema sehingga terjadi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Imobilitas juga dapat menyebabkan demineralisasi tulang akibat menurunnya aktivitas otot, sedangkan meningkatnya demineralisasi tulang dapat mengakibatkan reabsorpsi kalium.

c. Gangguan Perubahan Zat Gizi

Terjadinya gangguan zat gizi yang disebabkan oleh menurunnya pemasukan protein dan kalori dapat mengakibatkan perubahan zat-zat makanan pada tingkat sel menurun, dimana sel tidak lagi menerima glukosa, asam amino, lemak, dan oksigen dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan aktivitas metabolisme.

d. Gangguan Fungsi Gastrointestinal

Imobilitas dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal. Hal ini dikarenakan imobilitas dapat mengurangi hasil makanan yang dicerna, sehingga mengurangi asupan makanan yang cukup dapat mengganggu proses eliminasi.

e. Perubahan Sistem Pernapasan

Imobilitas menyebabkan terjadinya perubahan sistem pernapasan. Akibat imobilitas, kadar haemoglobin menurun, ekspansi paru menurun, dan terjadinya lemah otot yang dapat menyebabkan

proses metabolisme terganggu. Terjadinya penurunan kadar haemoglobin dapat menyebabkan penurunan aliran oksigen dari alveoli ke jaringan, sehingga mengakibatkan anemia. Penurunan ekspansi paru dapat terjadi karena tekanan yang meningkat oleh permukaan paru.

f. Perubahan kardiovaskular

Perubahan sistem kardiovaskular akibat imobilitas antara lain dapat berupa hipotensi ortostatik, meningkatnya kerja jantung, dan terjadinya pembentukan trombus. Terjadinya hipotensi ortostatik dapat disebabkan oleh menurunnya kemampuan saraf otonom. Pada posisi yang tetap dan lama, refleks neurovaskular akan menurun dan menyebabkan vasokonstriksi, kemudian darah terkumpul pada vena bagian bawah sehingga aliran darah ke sistem sirkulasi pusat terhambat. Meningkatnya kerja jantung dapat disebabkan karena imobilitas dengan posisi horizontal.

g. Perubahan Sistem Muskuloskeletal

Perubahan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal sebagai akibat dari imobilitas adalah:

- 1) Gangguan muskular. Menurunnya massa otot merupakan akibat dari imobilitas dapat menyebabkan turunnya kekuatan otot secara langsung. Penurunan fungsi otot ditandai dengan stabilitas otot berkurang. Kondisi massa otot yang rendah bisa menyebabkan atrofi pada otot. Misalnya, pada individu yang dirawat selama lebih dari enam minggu maka, otot betisnya akan lebih kecil dan menunjukkan tanda kelemahan atau kelesuhan.

- 2) Gangguan skletal. Adanya imobilitas juga dapat menyebabkan gangguan pada tulang, seperti kontraktur sendi dan osteoporosis dengan mudah terjadi. Kontraktur adalah kondisi abnormal yang ditandai dengan fleksi dan fiksasi yang disebabkan oleh pengecilan atropi dan pemendekan otot. Terjadinya kontraktur dapat menyebabkan disfungsi sendi. Osteoporosis terjadi karena peningkatan reabsorpsi tulang, sehingga yang menyebabkan penurunan jumlah kalsium ke dalam darah dan peningkatan jumlah kalsium yang dikeluarkan melalui urine.
- h. Perubahan Sistem Integumen
- Perubahan sistem integumen yang terjadi berupa penurunan elastisitas kulit karena menurunnya sirkulasi darah akibat imobilitas dan terjadinya iskemia serta nekrosis jaringan superfisial dengan adanya luka dekubitus sebagai akibat tekanan kulit yang kuat dan sirkulasi yang menurun ke jaringan.
- i. Perubahan Eliminasi
- Perubahan dalam eliminasi misalnya penurunan jumlah urine yang mungkin disebabkan oleh kurangnya asupan dan penurunan curah jantung sehingga aliran darah renal dan urine berkurang.
- j. Perubahan Perilaku
- Perubahan perilaku sebagai akibat imobilitas, antara lain timbulnya rasa bermusuhan, bingung, cemas, emosional tinggi, depresi, perubahan siklus tidur, dan menurunnya mekanisme koping. Terjadinya perubahan perilaku tersebut merupakan dampak imobilitas karena selama proses imobilitas seseorang akan mengalami perubahan peran, konsep diri dan kecemasan.

2.1.6 Penatalaksanaan

Menurut (Lyndon, 2013), penatalaksanaan gangguan mobilisasi secara umum antara lain:

a. Pengaturan posisi tubuh sesuai kebutuhan pasien

Pengaturan posisi untuk mengatasi masalah kebutuhan mobilitas bisa disesuaikan tergantung tingkat kecacatan, seperti posisi fowler (setengah duduk), posisi sims (miring ke kanan atau ke kiri), trendelenburg (berbaring dengan kepala lebih rendah dari kaki), dorsal recumbent (berbaring terlentang dengan kedua lutut fleksi diatas tempat tidur), lithotomi (berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut), dan genu pectoral (mengangkat dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel ke alas tempat tidur).

b. Ambulasi Dini

Metode ini merupakan salah satu langkah yang dapat ditingkatkan kekuatan dan daya tahan otot serta meningkatkan fungsi sistem peredaran darah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berlatih duduk di tempat tidur, bangun, bergerak di atas kursi roda, dan lain-lain.

c. Melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri juga bisa dilakukan untuk melatih kekuatan, daya tahan, mobilitas sendi agar mudah bergerak, serta meningkatkan fungsi peredaran darah.


d. Latihan ROM pasif dan aktif

Latihan ini digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kekuatan otot serta memelihara mobilitas sendi.

e. Melakukan Komunikasi Terapeutik

Cara ini dilakukan untuk memperbaiki gangguan psikologis yaitu dengan cara berbagi perasaan dengan pasien, membantu pasien untuk mengekspresikan kecemasannya, serta memberikan dukungan moril.

2.1.7 Penyimpangan KDM



Bagan 2.1 Penyimpangan KDM

2.2 Konsep Keperawatan

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan

Konsep keperawatan merupakan ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model keperawatan. Teori keperawatan digunakan untuk menyusun suatu model konsep dalam keperawatan sehingga model keperawatan itu sendiri yang memungkinkan perawat untuk menerapkan cara mereka bekerja dalam batas kewenangan sebagai perawat. Salah satu ahli menanggapi terkait model konsep dan teori keperawatan dalam Teori Calista Roy (Nursalam, 2020).

Secara teoritis, Calista Roy berasumsi bahwa manusia adalah makhluk holistik yang senantiasa berinteraksi dengan perubahan lingkungan sebagai sistem yang adaptif dan memiliki proses input, kontrol, output dan umpan balik. Keempat unsur tersebut saling mempengaruhi karena membentuk suatu sistem, yaitu:

a. Manusia

Dalam teori Calista Roy, manusia yaitu sasaran utama dalam keperawatan, penerima asuhan keperawatan, sesuatu yang kompleks, sistem adaptif dengan proses internal (kognator dan regulator) yang penerapannya dibagi kedalam empat komponen adaptasi (fisiologi, konsep diri, peran, dan saling ketergantungan).

b. Lingkungan

Dalam teori Calista Roy, lingkungan merupakan semua kondisi, keadaan, dan pengaruh sekitarnya yang mempengaruhi perkembangan serta perilaku manusia sebagai individu atau kelompok, dengan suatu pertimbangan khusus dari mutualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mencakup

stimulus fokal, kontekstual, dan residual. Lingkungan merupakan masukan (input) bagi manusia sebagai sistem yang adaptif sama halnya lingkungan sebagai stimulus internal dan eksternal.

c. Kesehatan

Kesehatan dipandang sebagai keadaan dan proses menjadi manusia secara utuh dan integrasi secara menyeluruh. Sehat merupakan cermin dari adaptasi yaitu interaksi interpersonal dengan sekitarnya. Definisi kesehatan menurut Calista Roy melampaui tidak adanya penyakit tetapi menekankan harus dalam kondisi baik. Sehat bukan berarti tidak terhindarkan dari kematian, penyakit, ketidakbahagiaan, dan stress melainkan merupakan kemampuan untuk menghadapi masalah tersebut dengan baik.

d. Keperawatan

Teori Calista Roy (1983) secara spesifik menggambarkan keperawatan sebagai ilmu dan praktik dari peningkatan adaptasi untuk meningkatkan kesehatan sebagai tujuan untuk mempengaruhi kesehatan secara positif. Keperawatan dianggap sebagai ilmu dan praktik meningkatkan adaptasi agar individu dan kelompok dapat berfungsi secara holistik melalui aplikasi proses keperawatan untuk mempengaruhi kesehatan secara positif (Risnah & Irwan, 2021).

Hubungan teori adaptasi Roy dengan studi kasus adalah Roy memandang bahwa untuk mencapai suatu yang terintegrasi seseorang harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi kepada diri individu itu sendiri. Seseorang yang menderita stroke akan mengalami perubahan baik dalam segi penurunan kemampuan otot dan penurunan tidak dapat melakukan aktivitas,

untuk itu individu perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam memenuhi kebutuhannya.

2.2.2 Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan pendekatan sistematis untuk bisa mengumpulkan data dan menganalisanya sehingga dapat diketahui masalah dan kebutuhan perawatan seseorang. Tujuan pengkajian yaitu sebagai salah satu cara mengetahui tentang kesehatan pasien, sehingga dapat memungkinkan tim perawat merencanakan asuhan keperawatan kepada pasien secara holistik (Rohayati, 2019).

a. Riwayat Keperawatan

- 1) Riwayat aktivitas dan olahraga.
- 2) Toleransi aktivitas.
- 3) Jenis dan frekuensi olahraga.
- 4) Faktor yang mempengaruhi mobilitas.
- 5) Pengaruh imobilitas.

b. Pemeriksaan Fisik : Data Fokus

1) Kesejajaran tubuh

Mengidentifikasi perubahan postur tubuh akibat pertumbuhan dan perkembangan normal. Pemeriksaan dilakukan dengan cara inspeksi pasien dari lateral, anterior, dan posterior guna mengamati :

- a) Bahu dan pinggul sejajar
- b) Jari-jari kaki mengarah ke depan
- c) Tulang belakang lurus, tidak melengkung ke sisi yang lain

2) Cara berjalan

Dilakukan untuk mengidentifikasi mobilitas klien dan risiko cedera akibat jatuh.

- a) Kepala tegak, pandangan lurus, dan tulang belakang lurus.
- b) Tumit menyentuh tanah terlebih dahulu daripada jari kaki.
- c) Gaya berjalan halus, terkoordinasi.

3) Penampilan dan pergerakan sendi

Pemeriksaan ini meliputi inspeksi, palpasi, serta pengkajian rentang gerak aktif atau rentang gerak pasif. Hal-hal yang dikaji yaitu :

- a) Adanya kemerahan/pembengkakan sendi.
- b) Deformitas
- c) Adanya nyeri tekan
- d) Krepitasi
- e) Peningkatan temperatur di sekitar sendi.
- f) Perkembangan otot yang terkait dengan masing-masing sendi.
- g) Derajat gerak sendi.

4) Kemampuan dan keterbatasan gerak

Hal-hal yang perlu dikaji antara lain :

- a) Bagaimana penyakit klien mempengaruhi kemampuan klien untuk bergerak. Adanya hambatan dalam bergerak (terpasang infus, gips)
- b) Keseimbangan dan koordinasi klien
- c) Adanya hipotensi ortostatik
- d) Kenyamanan klien

e) Kekuatan dan massa otot

Mengkaji kekuatan dan kemampuan klien untuk bergerak, langkah ini diambil untuk menurunkan risiko tegang otot dan cedera tubuh baik pada klien maupun perawat.

Tabel 2.1 Tingkat kekuatan otot

Skala	Kekuatan (%)	Ciri-ciri
0	0	Paralisis total
1	10	Tidak ada gerakan, teraba/terlihat adanya kontraksi
2	25	Gerakan otot penuh menentang gravitasi, dengan sokongan
3	50	Gerakan normal menentang gravitasi
4	75	Gerakan normal penuh menentang gravitasi dengan sedikit tahanan
5	100	Gerakan normal penuh menentang gravitasi dengan tahanan penuh

c. Pemeriksaan penunjang :

1) Pemeriksaan Diagnostik

a) Foto rontgen

Untuk menggambarkan kepadatan tulang, tekstur, erosi, dan perubahan hubungan tulang.

b) CT scan tulang

Mengidentifikasi lokasi dan panjangnya patah tulang di daerah yang sulit untuk dievaluasi (misalnya : asetabulum)

c) MRI

Untuk melihat abnormalitas (tumor, penyempitan jalur jaringan lunak melalui tulang).

2) Pemeriksaan Laboratorium

- a) Pemeriksaan darah dan urin : memberikan informasi mengenai masalah musculoskeletal primer atau komplikasi yang terjadi (infeksi)
- b) Pemeriksaan HB : (biasanya lebih rendah bila terjadi perdarahan akibat trauma).

2.2.3 Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan yang menjelaskan status atau masalah kesehatan aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan berorientasi pada kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow, memperlihatkan respon individu terhadap penyakit dan kondisi yang dialaminya (Rohayati, 2019).

Masalah 1 : Gangguan Mobilitas Fisik

a. Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri.

b. Penyebab :

- 1) Kerusakan struktur tulang.
- 2) Perubahan metabolisme
- 3) Ketidakbugaran fisik
- 4) Penurunan kendali otot
- 5) Penurunan masa otot
- 6) Keterlambatan perkembangan
- 7) Kekakuan sendi
- 8) Kontraktur
- 9) Malnutrisi

- 10) Nyeri
 - 11) Kecemasan gangguan sensori persepsi
- c. Gejala dan tanda mayor
- 1) Subjektif : Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas
 - 2) Objektif :
 - a) Kekuatan otot menurun
 - b) Rentang gerak (ROM) menurun
- d. Gejala dan tanda minor
- 1) Subjektif :
 - a) Nyeri saat bergerak
 - b) Enggan melakukan pergerakan
 - c) Merasa cemas saat bergerak
 - 2) Objektif
 - a) Sendi kaku
 - b) Gerakan tidak terkoordinasi
 - c) Gerakan terbatas
 - d) Fisik lemah
- e. Kondisi klinis terkait
- 1) Stroke
 - 2) Cedera medulla spinalis
 - 3) Trauma
 - 4) Fraktur
 - 5) Osteoarthritis
 - 6) Ostemalasia
 - 7) Keganasan

Masalah 2 : Nyeri Akut

a. Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

b. Penyebab

- 1) Agen pencedera fisik
- 2) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
- 3) Tirah baring
- 4) Kelemahan
- 5) Imobilitas

c. Gejala dan tanda minor

1) Subjektif :

- a) Dispnea setelah beraktivitas
- b) Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas
- c) Merasa lemah

2) Objektif :

- a) Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat
- b) Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas
- c) Gambaran EKG menunjukkan iskemia
- d) Sianosis

d. Kondisi klinis terkait

- 1) Anemia

- 2) Gagal jantung kongestif
- 3) Penyakit jantung coroner
- 4) Penyakit katup jantung
- 5) Aritmia
- 6) PPOK
- 7) Gangguan metabolik
- 8) Gangguan muskuloskeletal (PPNI, 2017)

2.2.4 Intervensi Keperawatan

Setelah merumuskan diagnosis keperawatan maka perlu dibuat perencanaan intervensi keperawatan dan aktifitas keperawatan. Tujuan dari perencanaan yaitu untuk mengurangi, mencegah, bahkan menghilangkan masalah keperawatan yang dialami klien. Pada bagian intervensi/perencanaan perawat memutuskan strategi dan intervensi keperawatan yang akan dilakukan dilihat dari etiologi atau faktor pendukung/pengangkatan diagnosis keperawatan (Rohayati, 2019).

2.3 Evidence Based Practice in Nursing

2.3.1 Definisi

Range of Motion (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap (Listiyana, 2018).

ROM merupakan intervensi non farmakologi dan sebagai ikhtiar untuk membantu lansia proteksi dampak buruk dari imobilitas yang diharapkan memberikan efek yang positif bagi kesehatan dengan izin Allah swt. seperti firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syu'ara/26:80 yang berbunyi :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,”
(Kemenag RI, 2019)

Dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan sakit dinisbatkan (disandarkan) kepada diri Ibrahim, sekalipun pada kenyataannya berasal dari takdir Allah dan ketetapan-Nya, juga sebagai ciptaan-Nya, tetapi sengaja disandarkan kepada diri Ibrahim sebagai etika sopan santun terhadap Allah ﷻ Seperti pengertian yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ yang memerintahkan kepada orang salat agar mengucapkan: Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Al-Fatihah: 6), hingga akhir surat. Pemberian nikmat dan hidayah disandarkan kepada Allah, sedangkan murka dibuang fa'il-nya karena etika sopan santun, dan kesesatan disandarkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti apa yang dikatakan oleh jin yang disebutkan oleh firman-Nya: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan ini) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi atukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka (Al-Jin: 10) (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Hal yang sama dikatakan oleh Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya: dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. (Asy-Syu'ara': 80) Bila aku sakit, sesungguhnya tiada seorang pun selain-Nya yang dapat menyembuhkanku dengan berbagai macam sarana pengobatan apa pun yang menjadi penyebab kesembuhan. dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali) (Tafsir Ibnu Katsir, 2015).

Menurut (Andriani et al., 2022) *Range Of Motion* (ROM) merupakan latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kemampuan menggerakkan persendian dengan sempurna secara normal dan lengkap untuk meningkatkan kekuatan otot juga tonus otot. Dalam pemberian latihan ROM beberapa faktor perlu diperhatikan yaitu usia, jenis kelamin, dan frekuensi serangan. Latihan ROM adalah salah satu bentuk proses rehabilitasi yang dinilai cukup efektif untuk mencegah terjadinya kecacatan pada penderita stroke.

2.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari latihan ROM yaitu:

- a. Untuk mengurangi kekakuan pada sendi dan kelemahan pada otot yang dapat dilakukan secara aktif maupun pasif tergantung dengan keadaan pasien.
- b. Meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot
- c. Melancarkan sirkulasi darah

2.3.3 Indikasi

- a. Pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik
- b. Pasien yang mengalami keterbatasan rentang gerak

2.3.4 Kontraindikasi

- a. Trombus/emboli dan radang pada pembuluh darah
- b. Kelainan sendi atau tulang
- c. Klien fase imobilisasi karena kasus penyakit jantung
- d. Trauma baru dengan kemungkinan ada fraktur yang tersembunyi atau luka dalam

2.3.5 Standar Prosedur Operasional

Ada beberapa gerakan yang dilakukan saat latihan ROM yaitu :

- a. Fleksi, yaitu gerakan menekuk persendian
- b. Ekstensi, yaitu gerakan meluruskan persendian
- c. Abduksi, yaitu gerakan menjauhi sumbu tubuh
- d. Adduksi, yaitu gerakan mendekati sumbu tubuh
- e. Rotasi, yaitu gerakan memutar atau menggerakkan satu bagian melingkari aksis tubuh
- f. Pronasi, yaitu gerakan memutar ke bawah/ menelungkupkan tangan
- g. Supinasi, yaitu gerakan memutar ke atas/ menengadahkan tangan
- h. Inversi, yaitu gerakan ke dalam
- i. Eversi, yaitu gerakan ke luar

Prosedur latihan ROM

- a. Latihan sendi bahu
 - 1) Pasien dalam posisi terlentang
 - 2) Satu tangan perawat menopang dan memegang siku, tangan yang lainnya memegang pergelangan tangan
 - 3) Luruskan siku pasien, gerakan lengan pasien menjauhi diri tubuhnya ke arah perawat (abduksi)
 - 4) Kemudian lengan pasien mendekati tubuhnya (adduksi)
 - 5) Gerakkan lengan bawah ke bawah sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap kebawah (rotasi internal)
 - 6) Turunkan dan kembalikan ke posisi semula dengan siku tetap lurus
 - 7) Hindari penguluran yang berlebihan pada bahu
 - 8) Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali sesuai toleransi
- b. Latihan sendi siku
 - 1) Pasien dalam posisi terlentang

- 2) Perawat memegang pergelangan tangan pasien dengan satu tangan, tangan lainnya menahan engan bagian atas
 - 3) Posisi tangan pasien supinasi, kemudian lakukan gerakan menekuk (fleksi) dan meluruskan ekstensi siku
 - 4) Intruksi agar pasien tetap rileks
 - 5) Pastikan gerakan yang diberikan berada pada midline yang benar
 - 6) Perhatikan rentang gerak sendi yang dibentuk, apakah dalam jarak normal atau terbatas
 - 7) Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali
- c. Latihan lengan
- 1) Pasien dalam posisi terlentang
 - 2) Perawat memegang area siku pasien dengan satu lengan, tangan yang lain menggenggam tangan pasien ke arah luar (telentang/supinasi) dan ke arah dalam (telungkup/pronasi)
 - 3) Instruksikan agar pasien tetap rileks
 - 4) Lakukan sebanyak 10 kali
- d. Latihan sendi pergelangan tangan
- 1) Pasien dalam posisi terlentang
 - 2) Perawat memegang lengan bawah pasien dengan satu tangan, tangan lainnya meegang pergelangan tangan pasien, serta tekuk pergelangan tangan pasien ke atas dan kebawah
 - 3) Instruksikan agar pasien tetap rileks
 - 4) Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali
- e. Latihan sendi jari-jari tagan
- 1) Pasien dalam posisi terlentang

- 2) Perawat memegang pergelangan tangan pasien dengan satu lengan, tangan lainnya membantu pasien membuat gerakan mengepal/menekuk jari-jari tangan dan kemudian meluruskan jari-jari tangan pasien
 - 3) Perawat memegang telapak tangan dan keempat jari pasien dengan satu tangan, tangan lainnya memutar ibu jari tangan
 - 4) Tangan perawat membantu melebarkan jari-jari pasien kemudian merapatkan kembali
 - 5) Instruksikan agar pasien tetap rileks
 - 6) Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali
- f. Latihan sendi pangkal paha
- 1) Pasien dalam posisi terlentang
 - 2) Letakkan satu tangan perawat di bawah lutut pasien dan satu tangan pada tumit
 - 3) Jaga posisi pasien lurus, angkat kaki kurang lebih 8cm dari tempat tidur, gerakkan kaki menjauhi badan pasien
 - 4) Gerakkan kaki mendekati badan pasien
 - 5) Kembalikan seperti posisi semula
 - 6) Kemudian letakkan satu tangan perawat pada pergelangan kaki dan satu tangan lain di atas lutut
 - 7) Putar kaki menjauhi perawat
 - 8) Putar kaki ke arah perawat
 - 9) Kembalikan ke posisi semula
 - 10) Hindari pengangkatan yang berlebihan pada kaki
 - 11) Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali

g. Latihan sendi lutut

- 1) Pasien dalam posisi terlentang
- 2) Satu tangan perawat berada di bawah lutut pasien dan pegang tumit pasien dengan tangan yang lain
- 3) Angkat kaki, tekuk pada lutut dan pangkal paha
- 4) Lanjutkan menekuk lutut ke arah dada sejauh mungkin
- 5) Ke bawah kaki dan luruskan lutut dan mengangkant kaki ke atas
- 6) Instruksikan pasien tetap rileks
- 7) Pastikan gerakan yang diberikan berada pada midline yang benar
- 8) Perhatikan rentang gerak sendi yang dibentuk, apakah berada dalam jarak yang normal atau terbatas
- 9) Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali

h. Latihan sendi pergelangan kaki

- 1) Pasien dalam posisi terlentang
- 2) Perawat memegang separuh bagian atas kaki
- 3) pasien dengan satu jari dan pegang pergelangan kaki dengan tangan satunya
- 4) putar ke dalam hingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya (invers)
- 5) kembalikan keposisi semula
- 6) putar kaki keluar hingga telapak kaki menjauhi kaki yang lain (eversi)
- 7) kembalikan ke posisi semula

- 8) kemudian letakkan satu tangan perawat pada telapak kaki pasien dan satu tangan yang lain di atas pergelangan kaki. Jaga kaki lurus dan rileks
 - 9) tekuk pergelangan kaki, arahkan jari-jari kaki ke arah dada pasien (dorsofleksi)
 - 10) kembalikan ke posisi semula
 - 11) tekuk pergelangan kaki menjauhi dada pasien (plantar fleksi)
 - 12) kembalikan ke posisi semula
 - 13) instruksikan pasien tetap rileks
 - 14) lakukan pengulangan sebanyak 10 kali
- i. Latihan sendi jari-jari kaki
- 1) Pasien dalam posisi terlentang
 - 2) Perawat memegang pergelangan kaki pasien dengan satu tangan, tangan lainnya membantu pasien membuat gerakan menekuk jari-jari kaki pasien kemudian merapatkan kembali
 - 3) Instruksikan agar pasien kembali rileks
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali (Listiyana, 2018).

2.3.6 Rasionalisasi

Latihan *range of motion* (ROM) ini dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kemampuan menggerakkan persendian untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Latihan ini juga dapat mencegah terjadinya kontraktur, atropsi otot, meningkatkan peredaran darah ke ekstremitas. Latihan ini juga berupaya mencegah terjadinya cacat permanen terhadap penderita stroke dan dapat menurunkan tingkat ketergantungan pasien (Ayuningrum et al., 2021)

2.3.7 Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi dalam tindakan ROM adalah :

- a. Respon : responverbal klien mengatakan tidak kaku lagi. Respon non verbal: klien tidak terlihat sulit menggerakkan sisi tubuhnya yang kaku
- b. Beri informant concent positif
- c. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya
- d. Mengakhiri kegiatan dengan baik

2.3.8 Artikel Utama dan Pendukung

Tabel 2.2 Artikel utama dan artikel pendukung

No	Penulis	Tahun	Judul	Sumber
1.	Sry Desnayati Purba, Bagus Sidiq, Ingkai Krisdayanti Purba, ElfrideHutapea, Kristina L Silalahi, Dedek Sucahyo, Dian	2022	Efektivitas ROM (<i>Range of Motion</i>) terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke di Rumah Sakit Royal Prima Tahun 2021	JUMANTIK Volume 7 No. 1 Februari 2022 DOI: 10.30829/jumantik.v7i1.10952. Sinta 4
2.	Masliah, Muftadi, Aty Nurillawaty Rahayu	2022	Pengaruh <i>Range of Motion</i> (ROM) terhadap kekuatan Otot Pasien Stroke	Manuju: Malahayati Nursing Journal, ISSN Cetak: 2655-2728 ISSN Online: 2655-4712, Volume 4 Nomor 2 Februari 2022 DOI: https://doi.org/10.33024/mnj.v5i2.5914 . Sinta 4
3.	Fransisca Aprilliya Ayuningrum,	2022	Pengaruh <i>Range Of Motion</i> (Rom) Terhadap Kekuatan Otot Pasien	Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti; Volume 10 Nomor

	Dewi Rachmawati, Sri Mugianti		Stroke (Literatur Review)	02, Oktober 2022 ISSN 2302-4283 (print) ISSN 2580-9571 (online) DOI: 10.47794/jkhws. Sinta 5
4.	Dian Andriani, Annisa Fitria Nigusyanti, Ayu Nalaratih, Desty Yuliawati, Fani Afifah, Fauzanillah, Fidiyanti Amatilah, Andan Firmansyah, Dedi Supriadi	2021	Pengaruh <i>Range Of Motion</i> (ROM) Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Pasien Stroke	INDOGENIUS vil. 01 No.01 ISSN 2828-1365. Sinta 3
5.	Susanti, Difran Nobel Bistara	2019	Pengaruh <i>Range of Motion</i> terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke	Jurnal Kesehatan Vokasional, Vol. 4 No. 2 2019 ISSN 2599-3275. Sinta 2 DOI https://doi.org/10.22146/jkesvo.44497

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Metode studi kasus merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan telaah secara mendalam pada kasus tertentu, yang kesimpulannya terbatas atau berlaku pada kasus tertentu saja. Studi kasus adalah penelitian kualitatif yang memiliki makna sebuah penelitian yang dilakukan pada obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumennya, teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Hidayat, 2021).

Menurut (Hidayat, 2021) bahwa pada dasarnya penelitian jenis studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan pola hubungan yang sifatnya timbal balik atau saling berinteraksi, mendeskripsikan atau memperoleh gambaran realitas secara lengkap, mendapatkan pemahaman makna serta menemukan teori.

3.2. Subyek Studi Kasus

Subyek dalam studi kasus ini adalah pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi pelaksanaan ROM. Perawat juga perlu memperhatikan keadaan pasien yang akan diberikan terapi ROM tersebut. Kriteria inklusi dan eksklusi antara lain :

a. **Kriteria Inklusi**

- 1) Pasien dengan stroke
- 2) Pasien dengan masalah pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat
- 3) Pasien yang mengalami penurunan kekuatan otot

4) Pasien yang bersedia untuk dilakukan tindakan keperawatan

b. Kriteria Eksklusi

1) Pasien dan keluarga pasien tidak kooperatif

2) Pasien yang lama rawat kurang dari 3 hari (Tristan, 2022)

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus karya tugas akhir ners ini yaitu dengan melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara holistic yaitu asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar aktivitas dengan prioritas masalah gangguan mobilitas fisik dengan menerapkan terapi *Range Of Motion* (ROM).

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen penelitian ini adalah dengan cara mengukur kekuatan otot responden dari (0- 5) . Dengan sistem skor. nilai (0) Tidak bisa menggerakkan sama sekali, (1) Hanya menggerakkan ujung jari, (2) Mampu melakukan gerakan dua sendi atau lebih, tidak bisa melawan tahanan minimal, (3) Mampu melakukan gerakan mengangkat ekstremitas atas/badan, tapi tidak bisa melawan tahanan sedang, (4) Mampu melakukan gerakan normal, tapi tidak bisa melawan tahanan maksimal, (5) Pasien mampu bergerak dengan normal. Pemeriksaan kekuatan motorik ini dapat mengukur kekuatan otot sebelum dan sesudah intervensi (pre test – post test).

3.5 Prosedur Pengambilan Data

Proses dalam melakukan studi kasus ini terdiri dari beberapa tahap yaitu wawancara untuk mendapatkan data dari pasien maupun keluarga pasien, observasi dan pemeriksaan fisik kemudian penyusunan laporan studi kasus.

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Lokasi penelitian ini yaitu di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilakukan mulai tanggal 03 Oktober sampai 08 Oktober 2022.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus ini yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan yakni pengkajian, diagnosis, intervensi dan evaluasi keperawatan. Analisa data dilakukan dengan menyajikan hasil pengkajian yang dilakukan dengan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik. Selanjutnya hasil pengumpulan data pengkajian di analisis dengan membandingkan dengan teori yang telah disusun pada bab II untuk mendapatkan masalah keperawatan yang digunakan untuk menyusun tujuan dan intervensi. Selanjutnya intervensi dilaksanakan kepada pasien sesuai rencana yang telah disusun. Hasil implementasi dianalisis untuk mengevaluasi kondisi pasien apakah masalah sudah teratasi, teratasi sebagian, di modifikasi atau diganti dengan masalah keperawatan yang lebih relevan. Hasil pengkajian, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi di tuangkan dalam bentuk narasi pada bab pembahasan yang dibandingkan dengan teori-teori yang sudah disusun sebelumnya untuk menjawab tujuan penelitian.

3.8 Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian karena etika penelitian adalah norma moralitas yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab, oleh karena itu sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu meminta izin pada bidang keperawatan (Adiputra, 2021). Etika penelitian yang perlu diterapkan yaitu sebagai berikut:

a. Lembar persetujuan


Lembar persetujuan atau biasa disebut *informend consent* adalah lembar yang menyatakan subjek atau responden bersedia untuk diteliti. Dalam lembaran persetujuan ini harus dilengkapi dengan judul penelitian dan manfaat penelitian ini. Namun, jika responden menolak maka peneliti harus menghargai keputusan responden.

b. *Anonimity*

Anonimity adalah tindakan menjaga kerahasiaan responden dengan tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data atau pendokumentasian. Lembar tersebut hanya dituliskan inisial misalnya Tn. B.

c. *Confidentiality*

Confidentiality berarti peneliti menjamin kerahasiaan responden.



BAB IV

LAPORAN KASUS

FORMAT ASUHAN KEPERAWATAN

A. Identitas Klien

Nama Klien (Inisial): Tn. B

Umur : 39

Diagnosis Medis: ICH

Tanggal Pengkajian : 04-10-2022

REKAMAN ASUHAN KEPERAWATAN	PENGAJIAN AWAL
1. IDENTITAS Nama : Tn. B Umur : 39 Tahun Pendidikan : SMA Pekerjaan : Honorer Suku : Bugis Agama : Islam Status perkawinan : Menikah Alamat : Jl. Tamangapa Raya Sumber Informasi : Pasien & Istri	Ruang Rawat : Ruangan Sawit/Kelas II No. Rekam Medik : 684671 Tgl/Jam Masuk : 29 September 2022/05.47 Tgl/Jam Pengambilan Data : 04 Oktober 2022/ jam 08.05 Diagnosa Masuk : trauma capitis berat Cara masuk : () Berjalan () Kursi roda (✓) Brankar Kiriman dari poliklinik:- Pindahan dari : IGD Perawat/Tim Yang Bertanggung Jawab :
2. RIWAYAT KESEHATAN Keluhan Utama : Sulit menggerakkan ekstremitas kanan Keluhan saat ini : klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sesudah operasi, klien mengatakan bagian tubuh sebelah kanan tidak bisa digerakkan. () Tidak pernah opname (✓) Pernah Opname dengan sakit : operasi usus turun Di RS : Wahidin Pernah Mendapat Pengobatan : () Tidak (✓) Ya : BB Sebelum Sakit : 60 Kg Pernah Operasi : () Tidak (✓) Pasca Operasi Hari Ke : 5	
3. KEADAAN UMUM Keadaan umum : lemah Kesadaran : Samnolen E3V3M3 Pasien Mengerti Tentang Penyakitnya : () Tidak (✓) Ya Pasca Operasi : post op 5 hari	
4. KEBUTUHAN DASAR	

RASA NYAMAN NYERI

- Suhu : 36,5⁰C () Gelisah (✓) Nyeri
 - Gambaran nyeri :
- P: Nyeri dirasakan ketika bergerak
Q: tertusuk – tusuk

R: kepala

S: skala 3

T: ± 10 menit nyeri hilang timbul

Respon Emosional : klien nampak meringis

Cara Mengatasi Nyeri : relaksasi nafas dalam

Masalah Keperawatan : Nyeri akut

NUTRISI

- TB : 164 Cm BB : 63 kg
- IMT : 23,5
- Kebiasaan makan : 2 – 3 x/ hari
- Keluhan saat ini :-
 - (-) Tidak Nafsu Makan (-) Mual
 - (-) Muntah (-) Sulit/Sakit Menelan
 - (-) Sakit Gigi (-) Stomatitis (-) Nyeri ulu hati/salah cerna, yang berhubungan dengan
- Di sembuhkan dengan : tidak ada
- Pembesaran tiroid : tidak ada
- Hernia/Massa : tidak ada
- Holitosis : tidak ada
- Kondisi gigi/gusi : lengkap
- Penampilan lidah : bersih
- Bising Usus : 20 x/menit
- Porsi makan yang di habiskan : satu gelas
- Makanan yang di sukai :
- Diet : -
- Lain-lain : -

KEBERSIHAN PERORANGAN

- Kebiasaan mandi : istri klien mengatakan klien dimandikan di atas tempat tidur
- Cuci rambut : suami klien mengatakan bahwa klien belum pernah cuci rambut selama di rawat karena ada luka di kepala klien.
- Kebiasaan gosok gigi : x/hari
- Kebersihan badan : (✓) Bersih () Kotor
- Keadaan rambut : (✓) Bersih () Kotor
- Keadaan kulit kepala : (✓) Bersih () Kotor
- Keadaan kuku : () Pendek (✓) panjang (✓) Bersih () Kotor
- Keluhan saat ini: Nyeri pada bagian kepala
- Integritas kulit : tidak ada
- Luka Bakar : tidak ada

Masalah keperawatan :-

Masalah Keperawatan : -

CAIRAN

- Kebiasaan minum : 1 botol mineral sedang/hari .
- Jenis : air mineral
- Turgor kulit : () Kering () Tidak elastic() baik
- Punggung kuku : normal
- Warna : pink
- Pengisian kapiler : kurang dari 2 detik
- Mata cekung : (✓) Tidak () Ya : Ka/Ki
- Konjungtiva : anemis, Sklera : putih
- Edema : (✓) Tidak () Ya : Ka/Ki
- Distensi vena jugularis : tidak ada
- Asites : (✓) Tidak () Ya

AKTIVITAS & LATIHAN

- Aktivitas waktu luang : Berbaring
 - Kesulitan bergerak : () Tidak (✓) Ya
 - Kekuatan otot : menurun
- | | |
|-------|---|
| 5 | 0 |
| ----- | |
| 5 | 0 |
- Postur : baik Tremor : tidak ada
 - Rentang gerak : pasif
 - Keluhan saat ini : klien mengatakan tubuh bagian kanan sulit digerakkan
 - gerakan terbatas : () Tidak (✓) Ya
 - () Nyeri Otot () Kaku otot (✓) Lemah Otot

<p>Spider Neavi : <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya Minum per NGT : <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya Terpasang dekopresi (NGT): <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya Terpasang infuse : <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/> Ya</p>	<p><input type="checkbox"/> Nyeri sendi <input type="checkbox"/> bengkak sendi Inkooordinasi <input checked="" type="checkbox"/> Parise/paralise : dibagian : ekstremitas kanan <input type="checkbox"/> Kelelahan <input type="checkbox"/> Amputasi <input type="checkbox"/> Deformitas Kelainan bentuk ekstremitas : tidak ada bentuk kelainan tetapi sulit digerakkan - Penggunaan alat bantu : gips / Traksi / Kruk (tongkat) : tidak menggunakan alat bantu - Pelaksanaan aktivitas : <input type="checkbox"/> Mandiri Parsial <input checked="" type="checkbox"/> Total - Jenis aktifitas yang perlu dibantu: istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu</p>
<p>Masalah Keperawatan : -</p>	<p>Masalah Keperawatan : Gangguan mobilitas fisik</p>
<p>ELIMINASI</p>	<p>OKSIGENIASI</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Kebiasaan BAB x/hari BAK : X/hari - Menggunakan laxsan : <input checked="" type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> ya. - Menggunakan diuretic : <input checked="" type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> ya. - Keluhan BAB Saat ini : klien mengatakan belum BAB selama post op - Peristaltik usus : 20x/menit <input type="checkbox"/> kembung <input type="checkbox"/> tidak ada peristaltic <input type="checkbox"/> Hiperperistaltik - Abdomen : Nyeri Tekan : tidak ada nyeri tekan. - Terpasang kateter urine : <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/> ya - Pengguna alcohol : pasien mengatakan tidak mengonsumsi alkohol 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadi : 69 kali/menit - Pernafasan : 20 kali/menit - TD : 115/76 HmHg - SPO2: 98% - Bunyi Nafas: vesikular - Respirasi : <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> Dispnea <input type="checkbox"/> Ronchi <input type="checkbox"/> stridor <input type="checkbox"/> Wheezing <input type="checkbox"/> Batuk <input type="checkbox"/> hemoptisis <input type="checkbox"/> Sputum <input type="checkbox"/> Pernafasan Cuping hidung <input type="checkbox"/> Penggunaan otot-otor sensoris : - - Kedalaman : - Fremitus : tidak ada masalah - Sputum : tidak ada (-)kental (-)encer (merah ()putih ()hijau ()kuning - Sirkulasi oksigenasi : <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> Pusing <input type="checkbox"/> Sianosis <input type="checkbox"/> akral dingin <input type="checkbox"/> clubbing finger - Dada : <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> retraksi dada <input type="checkbox"/> nyeri dada <input type="checkbox"/> berdebar-debar <input type="checkbox"/> defisiensi trackhea <input type="checkbox"/> bunyi jantung Normal <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mur-mur <input type="checkbox"/> gallop - Oksegien : Tidak terpasang - WSD : tidak terpasang - Riwayat penyakit : pasien mengatakan tidak ada riwayat penyakit pernapasan <input type="checkbox"/> bronchitis <input type="checkbox"/> Asma <input type="checkbox"/> Tuberkulosis


	()Empisema ()pneumonia kambuhan () pemanjanaan terhadap udara berbahaya () hipertensi () demam rematik () flebitis ()kesemutan () kebas
Masalah keperawatan : -	Masalah keperawatan : -
TIDUR DAN ISTIRAHAT	PENCEGAHAN TERHADAP BAHAYA
<ul style="list-style-type: none"> - Kebiasaan tidur : (✓) Malam (✓) Siang - Lama Tidur : Malam: 3 Jam Siang : 4 jam - Kebiasaan tidur : (✓) tidak () Ya, dipengaruhi oleh faktor : tidak ada Cara mengatasi : tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Refleksi : (✓) tidak () kelumpuhan - Penglihatan : (✓) tidak () masalah - Pendengaran: (✓) tidak () masalah - Penciuman : (✓) tidak () masalah - Perabaan : (✓) tidak () masalah
Masalah Keperawatan : -	Masalah Keperawatan : -
NEUROSENSORIS	KEAMANAN
<ul style="list-style-type: none"> - Rasa Ingin Pingsan/Pusing : (✓) Tidak () Ya - Stroke (gejala sisa) : tidak - Kejang : (✓) Tidak () Ya Aura : tidak Frekuensi : tidak ada Status postika : tidak ada Cara Mengontrol : - - Status Mental : terorientasi - Kesadaran : () mengantuk () letargi () stupor () koma () kooperatif () menyerang () delusi () halusinasi afek (gambarkan) : - Kaca mata: tidak kontak lensa : tidak - Alat bantu dengar : (✓) tidak () ya - Ukuran/reaksi pupil : ka/ki : peka terhadap cahaya - Facial drop : (✓) tidak () kaku kuduk () tidak () ya - Genggaman tangan/lepas : ka/ki : kuat postur : baik - Koordinasi : reflex patella ka/ki : normal - Reflex tendon dalam bisep/trisep : normal - Kernig sign : (✓)Tidak () Ya - Babinsky : (✓)tidak () ya - Chaddock : (✓) tidak () ya 	<p>Alergi/sensitivitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perubahan system imun sebelumnya: tidak ada Riwayat penyakit hubungan seksual (tanggal/tipe) : tidak ada Perilaku resiko tinggi : tidak ada Transfuse darah/jumlah : tidak ada Gambaran reaksi : tidak ada Riwayat cedera kecelakaan : tidak ada Fraktur/dislokasi : tidak ada Arthritis/sendai tak stabil : tidak ada Masalah punggung : tidak ada Perubahan pada tahi lalat : tidak ada Pembesaran nodus : tidak ada Cara berjalan : sulit dikaji Rom : pasif Hasil kultur, pemeriksaan system imun : tidak ada masalah
- Brudinsky : (✓) tidak () ya	
Masalah Keperawatan : -	Masalah Keperawatan : -
SEKSUALITAS	

<ul style="list-style-type: none"> - Aktif melakukan hubungan seksual : (✓) tidak () ya - Penggunaan kondom : tidak dikaji - Masalah-masalah/kesulitan seksual : tidak dikaji - Perubahan terakhir dalam frekuensi /minat : tidak dikaji <p>Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usia menarke : Thn, lamanya siklus : hari - Durasi : - Periode menstruasi terakhir : menopause: - Rabas vagina : Perdarahan antar periode : 	<p>Pria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rabes Penis : tidak dikaji gangguan Prostat : tidak dikaji - Sirkumsisi : () tidak () ya - Vasektomi : () Tidak () Ya - Melakukan pemeriksaan sendiri - Payudara/testis : - Prostoskopi/pemeriksaan Prostat terakhir : <p>Tanda (Obyektif)</p> <p>Pemeriksaan: payudara/Penis/Testis: Kulit genetalia/Lest :</p>
<p>Masala Keperawatan : -</p>	
<p>KESEIMBANGAN & PENINGKATAN HUBUNGAN RESIKO SERTA INTERAKSI SOSIAL</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Lama perkawinan : 19 tahun, hidup dengan : istri dan anak - Masalah-masalah kesehatan/stress : tidak ada - Cara mengatasi stress : tidak ada - Orang Pendukung Lain : keluarga - Peran Dalam Struktur Keluarga : sebagai suami dan seorang ayah - Masalah-masalah Yang berhubungan Dengan Penyakit/Kondisi : tidak ada - Psikologis : (✓) Tak () gelisah () Takut() Sedih()Rendah diri ()Hiperaktif ()acu tak acuh ()marah ()Mudah Tersinggung () merasa Kurang sempurna () Eurofik () tidak Sabar <p>Keputusan asaan : tidak ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Sosiologis : (✓) tidak () menarik diri () komunikasi lancar (✓) komunikasi tidak lancar () afasia () isolasi diri () amuk -Perubahan bicara : penggunaan alat bantu komunikasi : tidak ada - Adanya laringektomi : tidak ada - Komunikasi verbal/nonverbal dengan keluarga/orang terdekat lain : pasien tidak mengalami kesulitan -Spiritual : (✓) tak () dibantu dalam beribadah () spiritual distress - Kegiatan keagamaan : tidak dikaji - Gaya hidup : baik - Perubahan terakhir : tidak ada
<p>Masalah keperawatan : -</p>	
<p>5. PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa dominan (khusus) : pasien menggunakan bahasa makassar 2. Informasi yang telah disampaikan : <ul style="list-style-type: none"> Ô pengaturan jam besuk Ô hak dan kewajiban klien Ô tim / petugas yang merawat Ô lain-lain 3. Masalah yang telah dijelaskan : <ul style="list-style-type: none"> Ô perawatan diri dirumah sakit Ô obat-obatan yang diberikan : 	

Obat yang diresepkan :

Obat	Dosis	Waktu	Diminum secara teratur	Tujuan
Cefraxone	1 gr	12 jam	Ya	Untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri. Selain itu obat ini juga digunakan untuk mencegah infeksi pada saat operasi
Metronidazole	500 ml	8 jam	Ya	Antibiotik untuk menangani penyakit infeksi bakteri pada tubuh
Ranitidine	150 ml	12 jam	Ya	Untuk menangani gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produksi asam berlebih di lambung
Manitol	180 cc	8 jam	Ya	Cairan infus yang digunakan untuk mengurangi tekanan dalam otak

6. DATA GENOGRAM



Keterangan:

G1: bapak dari klien sudah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup, ayah dan ibu dari istri klien masih hidup

G2: klien merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, istri klien anak ke empat dari 7 bersaudara.

G3: klien memiliki 4 anak.

P : Pasien

| : Garis keturunan

: Laki-laki

— : Garis Pernikahan

: Perempuan

X : Meninggal

7. DATA PEMERIKSAAN PENUNJANG


Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Tanggal pemeriksaan : 30 September 2022

Test	Hasil	Nilai normal
RBC	4.50 10 ⁶ /mm ³	4.50 - 6.50
HGB	14.5 g/dL	13.0 - 17.0
HTC	40.0 %	40.0 - 54.0
MCV	94 um ³	80 - 100
MCH	30.6 pg	27.0 - 32.0
MCHC	33.9 g/dL	32.0 - 36.0
RDW _{ev}	12.0 %	11.0 - 16.0
RDW _{sd}	43 um ³	39 - 52
PLT	355 10 ³ /mm ³	150 - 500
MPV	8.3 um ³	6.0 - 11.0
PCT	0.286%	0.150 - 0.500
PDW	10.3%	6.0 - 11.0
WBC	8.7% 10 ³ /mm ³	4.0 - 10.0
NEU	56.0%	52.0 - 75.0
LYM	36.1%	20.0 - 40.0
MON	5.1%	2.0 - 8.0
EOS	4.4%	1.0 - 3.0
BAS	0.4%	0.0 - 1.5
ALY	1.7%	0.0 - 2.5
LIC	0.3%	0.0 - 3.0
KIMIA DARAH		
Fungsi hati		
Albumin	3.6 gr/dl	3.5-5.0
Elektrolit		
Natrium	142 mmol/l	136-145
Kalium	4.4 mmol/l	3.5-5.1
Klorida	99 mmol/l	97-111

8. PENYIMPANGAN KDM

Kondisi fisik stroke hemoragik (perjalanan penyakit)



B. Klasifikasi Data

Data Subjektif	Data Objektif				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan nyeri dibagian kepala 2. Klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sesudah operasi 3. klien mengatakan sulit menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan 4. istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu 5. istri klien mengatakan bahwa klien belum pernah cuci rambut selama di rawat karena terdapat luka dibagian kepala. 6. Klien mengatakan sulit menggerakkan kakinya dan badannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak meringis 2. Gambaran nyeri <ul style="list-style-type: none"> - P: Nyeri dirasakan ketika bergerak - Q: tertusuk – tusuk - R: kepala dan bokong - S: skala 3 - T: ± 10 menit, nyeri hilang timbul 3. Kekuatan otot menurun <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> 4. Pelaksanaan aktivitas total 5. Nadi : 98 kali/menit 6. Pernafasan : 20 kali/menit 7. TD : 120/80 HmHg 8. SPO2: 98% 9. Suhu : 36⁰C 10. Kuku nampak panjang 	5	0	5	0
5	0				
5	0				

C. Kategorisasi Data

Kategori dan Sub Kategori	Data Subjektif dan Data Objektif
Respirasi	-
Sirkulasi	Data objektif: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadi : 98 kali/menit 2. Pernafasan : 20 kali/menit 3. TD : 120/80 HmHg 4. Suhu : 36,0^c
Nutrisi dan cairan	-
Eliminasi	-
Aktivitas dan istirahat	Data subjektif: Klien Klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sesudah operasi, klien mengatakan tubuh bagian kanan sulit digerakkan <ol style="list-style-type: none"> 1. istri klien mengatakan bahwa segala
Fisiologi	

		<p>aktivitas suaminya harus dibantu</p> <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gerakan terbatas 3. Kesulitan bergerak 4. Kekuatan otot menurun $\begin{array}{r l} 5 & 0 \\ \hline 5 & 0 \end{array}$ <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan aktivitas dibantu total
	Neurosensori	-
	Reproduksi dan seksualitas	-
Psikologis	Nyeri dan kenyamanan	<p>Data subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan nyeri di bagian kepala. 2. Klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sesudah operasi, nyeri dibagian bokong dan sulit digerakkan badannya. <p>Data objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak meringis 2. Gambaran nyeri <p>P: Nyeri dirasakan ketika bergerak Q: tertusuk – tusuk R: kepala dan bokong S: skala 3 T: ± 10 menit, nyeri hilang timbul</p>
	Integritas dan ego	-
	Pertumbuhan dan perkembangan	-
Perilaku	Kebersihan diri	<p>Data subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istri klien mengatakan bahwa klien belum pernah mandi, hanya di lap-lap saja setiap hari 2. Istri klien mengatakan bahwa klien belum pernah cuci rambut selama di rawat karena ada luka di kepala. <p>Data objektif</p>

		3. Kuku tampak panjang
	Penyuluhan dan pembelajaran	-
Relasional	Interaksi sosial	-
Lingkungan	Keamanan dan proteksi	-

D. Analisa Data

No	Sign/Simptom/Data	Etiologi/Penyebab	Problem/Masalah Keperawatan
1.	<p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan susah menggerakkan kakinya. istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu. <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gerakan terbatas Kesulitan bergerak Kekuatan otot menurun $\begin{array}{r} 5 \mid 0 \\ \hline 5 \mid 0 \end{array}$ <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan aktivitas dibantu total 	<p>Gangguan neuromuskular</p> <p>↓</p> <p>Penurunan kendali otot</p> <p>↓</p> <p>Kelemahan fisik</p> <p>↓</p> <p>Gangguan mobilitas fisik</p>	<p>Gangguan mobilitas fisik</p>
2.	<p>Data subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan nyeri di bagian kepala. Klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sudah operasi, tubuh sebelah kanan dan sulit digerakkan badannya. <p>Data objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien tampak meringis Gambaran nyeri P: Nyeri dirasakan ketika bergerak Q: tertusuk – tusuk 	<p>Trauma kepala</p> <p>↓</p> <p>Jaringan otak rusak</p> <p>↓</p> <p>Terputusnya kontinuitas jaringan</p> <p>↓</p> <p>Nyeri akut</p>	<p>Nyeri akut</p>

	R: kepala S: skala 3 T: ± 10 menit, nyeri hilang timbul		
--	---	--	--

E. Diagnosis keperawatan

No	DIAGNOSIS				
1.	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan: Data subjektif: 2. Klien mengatakan susah menggerakkan kakinya. 2. istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu. Data objektif: 1. Gerakan terbatas 2. Kesulitan bergerak 3. Kekuatan otot menurun <div style="text-align: center;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</td> <td style="padding: 0 5px;">0</td> </tr> </table> </div> 4. Pelaksanaan aktivitas dibantu total	5	0	5	0
5	0				
5	0				
2.	Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (trauma kepala) dibuktikan dengan: Data subjektif 1. Klien mengatakan nyeri di bagian kepala. 2. Klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sesudah operasi, tubuh sebelah kanan dan sulit digerakkan badannya. Data objektif 1. Klien tampak meringis 2. Gambaran nyeri P: Nyeri dirasakan ketika bergerak Q: tertusuk – tusuk R: kepala S: skala 3 T: ± 10 menit, nyeri hilang timbul				

F. Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan:</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan susah menggerakkan kakinya. istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu. <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gerakan terbatas Kesulitan bergerak Kekuatan otot menurun 0 Pelaksanaan aktivitas dibantu total 	<p>Mobilitas fisik</p> <p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam maka mobilitas fisiki meningkat.</p> <p>Dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekuatan otot meningkat Rentang gerak meningkat Gerakan terbatas menurun 	<p>Latihan Rentang Gerak</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi indikasi dilakukan latihan Identifikasi keterbatasan pergerakan sendi Monitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Cegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan Fasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tujuan dan prosedur latihan Anjurkan melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis Ajarkan rentang gerak pasif sesuai program. 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> nyeri dapat menghambat aktivitas yang akan dilakukan. Mengetahui toleransi fisik melakukan pergerakan. Memantau keadaan rasa nyaman atau nyeri pada klien. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Agar pasien tidak mengalami cedera selama latihan berlangsung. Agar gerakan sendi yang dilakukan sesuai dengan program. <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien dan keluarga paham dengan latihan yang akan dilakukan. klien mampu mengikuti gerakan secara sistematis agar tujuan dari latihan rentang gerak bisa tercapai. Klien mampu secara mandiri melakukan latihan rentang gerak.

<p>2.</p>	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (trauma) dibuktikan dengan: Data subjektif 1. Klien mengatakan nyeri di bagian kepala. 2. Klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sesudah operasi, tubuh sebelah kanan dan sulit digerakkan badannya. Data objektif 1. Klien tampak meringis 2. Gambaran nyeri P: Nyeri dirasakan ketika bergerak Q: tertusuk – tusuk R: kepala S: skala 3 T: ± 10 menit, nyeri hilang timbul</p>	<p>Tingkat nyeri Setelah dilakukan intervensi selama 1x24 jam maka nyeri berkurang, kenyamanan meningkat. Kriteria Hasil: - Keluhan nyeri menurun - Meringis dapat menurun - Sikap protektif dalat menurun</p>	<p>Manajemen nyeri Observasi a. Identifikasilokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri Terapeutik a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hipnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal) b. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri c. Fasilitasi istirahat dan tidur Edukasi a. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. b. Jelaskan strategi mengatasi nyeri</p>	<p>Observasi a. Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien b. Mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien c. Mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien Terapeutik a. Mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya b. Mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri c. Mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur pasien Edukasi a. Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien b. Membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul c. Pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul d. Memudahkan pasien untuk mengotrol nyeri dengan cara sederhana Kolaborasi</p>
-----------	---	---	---	--

			<p>c. Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>d. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.</p>	<p>a. Mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien</p>
--	--	--	--	--



G. Implementasi Keperawatan

No	Diagnosis	Hari/tgl/jam	Implementasi	Nama Jelas
1.	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan: Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien mengatakan susah menggerakkan kakinya. Istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu. <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gerakan terbatas Kesulitan bergerak Kekuatan otot menurun 0 Pelaksanaan aktivitas dibantu total 	<p>Selasa, 04 Oktober 2022</p> <p>10.00</p> <p>10.15</p> <p>10.30</p>	<p>Latihan Rentang Gerak</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi indikasi dilakukan latihan Hasil: klien mengatakan susah menggerakkan kakinya, gerakan terbatas, kesulitan bergerak, kekuatan otot menurun 0 Mengidentifikasi keterbatasan pergerakan sendi Hasil: istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu Memonitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak Hasil: tampak kesulitan bergerak diekstremis bawah <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan Hasil: tidak terjadi cedera selama latihan rentang gerak dilakukan Memfasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif Hasil: klien menjalani proses latihan pergerakan dengan ROM pasif <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tujuan dan prosedur latihan Hasil: klien dan keluarga memahami tujuan dan prosedur latihan Menganjurkan melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis 	<p>Sakinah Agoestarini Lahilote</p>

			<p>Hasil: klien dan keluarga rutin melakukan latihan rentang gerak dibantu oleh petugas</p> <p>c. Mengajarkan rentang gerak pasif sesuai program</p> <p>Hasil: klien dan keluarga memahami teknik rentang gerak pasif yang diajarkan</p>	
		<p>Rabu, 05 Oktober 2022</p> <p>10.00</p> <p>10.15</p> <p>10.30</p>	<p>Latihan Rentang Gerak</p> <p>Observasi</p> <p>a. Mengidentifikasi indikasi dilakukan latihan</p> <p>Hasil: klien mengatakan susah mampu menggerakkan kakinya perlahan, gerakannya masih terbatas, kekuatan otot 1</p> <p>b. Mengidentifikasi keterbatasan pergerakan sendi</p> <p>Hasil: istri klien mengatakan bahwa sebagian aktivitas suaminya harus dibantu, kekuatan otot 1</p> <p>c. Memonitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak</p> <p>Hasil: tampak kesulitan bergerak diekstremis bawah</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Mencegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan</p> <p>Hasil: tidak terjadi cedera selama latihan rentang gerak dilakukan</p> <p>b. Memfasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif</p> <p>Hasil: klien menjalani proses latihan pergerakan dan klien sudah mampu menggerakkan kakinya perlahan</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Menjelaskan tujuan dan prosedur latihan</p> <p>Hasil: klien dan keluarga memahami tujuan dan</p>	<p>Sakinah Agoestarini Lahilote</p>

		<p>prosedur latihan</p> <p>b. Mengajarkan melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis Hasil: klien dan keluarga rutin melakukan latihan rentang gerak dibantu oleh petugas</p> <p>c. Mengajarkan rentang gerak pasif sesuai program Hasil: klien dan keluarga memahami teknik rentang gerak pasif yang diajarkan</p>	
	<p>Kamis, 06 oktober 2022</p> <p>12.00</p> <p>12.15</p>	<p>Latihan Rentang Gerak Observasi</p> <p>a. Mengidentifikasi indikasi dilakukan latihan Hasil: klien mengatakan sudah mampu menggerakkan kakinya tanpa bantuan meskipun pergerakannya masih terbatas, kekuatan otot 1</p> <p>b. Mengidentifikasi keterbatasan pergerakan sendi Hasil: tampak gerakan klien masih terbatas namun klien sudah mampu melakukan pergerakan tanpa bantuan, kekuatan otot 1</p> <p>c. Memonitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak Hasil: terdapat masalah pergerakan di ekstremitas bawah</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Mencegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan Hasil: tidak terjadi cedera selama latihan rentang gerak dilakukan</p> <p>b. Memfasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif Hasil: klien menjalani proses latihan pergerakan dan klien</p>	<p>Sakinah Agoestarini Lahilote</p>


		12.30	<p>sudah mampu mengangkat kakinya perlahan dan menggerakannya</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Menjelaskan tujuan dan prosedur latihan Hasil: klien dan keluarga memahami tujuan dan prosedur latihan</p> <p>b. Mengajarkan melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis Hasil: klien dan keluarga rutin melakukan latihan rentang gerak dibantu oleh petugas</p> <p>c. Mengajarkan rentang gerak pasif sesuai program Hasil: klien dan keluarga memahami teknik rentang gerak pasif yang diajarkan</p>	
2.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (trauma kepala) dibuktikan dengan :</p> <p>Data subjektif</p> <p>1. Klien mengatakan nyeri di bagian kepala.</p> <p>2. Klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sesudah operasi, tubuh sebelah kanan dan sulit digerakkan badannya.</p> <p>Data objektif</p> <p>1. Klien tampak meringis</p> <p>2. Gambaran nyeri P: Nyeri</p>	<p>Selasa, 04 Oktober 2022</p> <p>10.00</p> <p>10.15</p>	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>a. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri Hasil: klien mengatakan nyeri dibagian kepala dan bokong seperti tertusuk-tusuk dan hilang timbul, tampak meringis</p> <p>b. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil: skala nyeri 3</p> <p>c. Mengidentifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil: klien mengatakan jika bergerak nyeri akan bertambah, nyerinya akan jarang muncul saat pergerakan tidak ada</p> <p>Terapeutik</p>	<p>Sakinah Agoestarini Lahilote</p>

	<p>dirasakan ketika bergerak Q: tertusuk – tusuk R: kepala S: skala 3 T: ± 10 menit, nyeri hilang timbul</p>	<p>10.30</p>	<p>a. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri yaitu terapi relaksasi napas dalam Hasil: terapi relaksasi napas dalam</p> <p>b. Mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri Hasil: klien mengatakan kadang mematikan lampu agar tidak terlalu mengganggu</p> <p>c. Fasilitasi istirahat dan tidur Hasil: klien mengatakan nyerinya sudah jarang muncul karena klien tertidur</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. Hasil: klien memahami penyebab, periode dan apa yang menyebabkan nyerinya muncul</p> <p>b. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri Hasil: klien mengatakan saat nyerinya muncul langsung melakukan relaksasi nafas dalam dan berusaha mengontrol dirinya</p> <p>c. Menganjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri Hasil: klien mampu menjelaskan secara detail kepada tenaga kesehatan perihal nyerinya</p> <p>d. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p>	
--	--	--------------	--	--

		10.40	<p>Hasil: klien mengatakan setiap nyerinya muncul selalu melakukan relaksasi nafas dalam dan berusaha mengontrol dirinya</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian analgetik, analgetik yang diberikan yaitu ketorolac</p> <p>Hasil: klien mengonsumsi antibiotik pereda nyeri</p>	
	Rabu, 05 Oktober 2022	10.00	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>a. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri</p> <p>Hasil: klien mengatakan nyerinya dibagian kepala dan bokong sudah hampir tidak pernah muncul</p> <p>b. Mengidentifikasi skala nyeri</p> <p>Hasil: skala nyeri 0</p> <p>c. Mengidentifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>Hasil: klien mengatakan meskipun bergerak sudah jarang nyeri dan cara meringankan nyeri klien menerapkan relaksasi nafas dalam</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri yaitu terapi relaksasi napas dalam</p> <p>Hasil: terapi relaksasi napas</p>	Sakinah Agoestarini Lahilote
		10.15		

		10.30	<p>dalam</p> <p>b. Mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri Hasil: klien mengatakan kadang mematikan lampu agar tidak terlalu mengganggu</p> <p>c. Fasilitasi istirahat dan tidur Hasil: klien mengatakan nyerinya sudah jarang muncul karena klien tertidur</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. Hasil: klien memahami penyebab dan periode nyerinya muncul</p> <p>b. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri Hasil: klien mengatakan saat nyerinya muncul langsung melakukan relaksasi nafas dalam dan berusaha mengontrol dirinya</p> <p>c. Menganjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri Hasil: klien mampu menjelaskan secara detail kepada tenaga kesehatan perihal nyerinya</p> <p>d. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil: klien mengatakan setiap nyerinya muncul selalu melakukan relaksasi nafas dalam dan berusaha mengontrol dirinya</p>	
--	--	-------	--	--

		10.40	<p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian analgetik, analgetik yang diberikan yaitu ketorolac Hasil: klien mengonsumsi antibiotik pereda nyeri</p>	
--	--	-------	---	--



H. Evaluasi Keperawatan

NO	DIAGNOSIS	HARI/TGL/JAM	EVALUASI (SOAP)	NAMA JELAS
1.	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan:</p> <p>Data subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Klien mengatakan susah menggerakkan kakinya. 2. istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu. <p>Data objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Gerakan terbatas 6. Kesulitan bergerak 7. Kekuatan otot menurun 1 4. Pelaksanaan aktivitas dibantu total 	<p>Selasa, 04 oktober 2022</p> <p>14.30 WITA</p>	<p>S : klien mengatakan susah menggerakkan kakinya, istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu</p> <p>O: Gerakan terbatas (√), kesulitan bergerak (√)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan terbatas - Kesulitan bergerak - Kekuatan otot menurun 0 <p>A: masalah mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <p>Latihan Rentang Gerak</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi indikasi dilakukan latihan b. Identifikasi keterbatasan pergerakan sendi c. Monitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan b. Fasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jelaskan tujuan dan prosedur latihan b. Anjurkan melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis 	<p>Sakinah Agoestarini</p> <p>Lahilote</p>

			c. Ajarkan rentang gerak pasif sesuai program.	
		Rabu, 05 oktober 2022 14.30	<p>S : klien mengatakan susah mampu menggerakkan kakinya perlahan, istri klien mengatakan bahwa sebagian aktivitas suaminya harus dibantu</p> <p>O: Gerakan terbatas (√), kesulitan bergerak (√)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakannya masih terbatas - Kekuatan otot 1 <p>A: masalah mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <p>Latihan Rentang Gerak</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi indikasi dilakukan latihan b. Identifikasi keterbatasan pergerakan sendi c. Monitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan b. Fasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jelaskan tujuan dan prosedur latihan b. Anjurkan melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis c. Ajarkan rentang gerak pasif sesuai program. 	Sakinah Agoestarini Lahilote
		Kamis, 06 Oktober 2022	<p>S : klien mengatakan sudah mampu menggerakkan kakinya tanpa bantuan meskipun pergerakannya masih</p>	Sakinah Agoestarini

		14. 30	<p>terbatas</p> <p>O: Gerakan terbatas (√), kesulitan bergerak (√)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakannya masih terbatas - Kekuatan otot 1 - Tampak gerakan klien masih terbatas namun klien sudah mampu melakukan pergerakan tanpa bantuan - Melakukan ROM pasif <p>A: masalah mobilitas fisik teratasi</p> <p>P: Intervensi dioptimalkan</p> <p>Latihan Rentang Gerak</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi indikasi dilakukan latihan b. Identifikasi keterbatasan pergerakan sendi c. Monitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan b. Fasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jelaskan tujuan dan prosedur latihan b. Anjurkan melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis c. Ajarkan rentang gerak pasif sesuai program. 	Lahilote
2.	Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (trauma kepala) dibuktikan dengan:	Selasa, 04 oktober 2022 14.00 WITA	<p>S : klien mengatakan nyeri dibagian kepala dan bokong</p> <p>O: Klien nampak meringis</p> <p>P: Nyeri bertambah ketika bergerak</p>	Sakinah Agoestarini

<p>Data subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengatakan nyeri di bagian kepala. 2. Klien mengatakan nyeri pada bagian kepala sesudah operasi, tubuh sebelah kanan dan sulit digerakkan badannya. <p>Data objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tampak meringis 2. Gambaran nyeri <ul style="list-style-type: none"> P: Nyeri dirasakan ketika bergerak Q: tertusuk – tusuk R: kepala S: skala 3 <p>T: ± 10 menit, nyeri hilang timbul</p>		<p>Q: tertusuk – tusuk R: perut S: skala 3 T: ± 10 menit, nyeri hilang timbul A: masalah nyeri akut belum teratasi P: Intervensi dilanjutkan Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasilokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal) b. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri c. Fasilitasi istirahat dan tidur <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. b. Jelaskan strategi mengatasi nyeri c. Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri d. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 	<p>Lahilote</p>
---	--	---	-----------------

			<p>Kolaborasi Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.</p>	
		<p>Rabu, 05 Oktoberber 2022</p> <p>14.00</p>	<p>S : klien mengatakan nyerinya dibagian kepala dan bokong sudah hampir tidak pernah muncul O: tampak tidak meringis P: Nyeri bertambah ketika bergerak Q: tertusuk – tusuk R: perut S: skala 0 T: hampir tidak pernah muncul A: masalah nyeri akut teratasi P: Intervensi dioptimalkan Manajemen nyeri Observasi a. Identifikasilokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri Terapeutik a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal) b. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri c. Fasilitasi istirahat dan tidur</p>	<p>Sakinah Agoestarini Lahilote</p>

			<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi mengatasi nyeri Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.</p>	
--	--	--	--	--



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan, untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengenai masalah-masalah klien sehingga dapat menentukan tindakan keperawatan yang tepat (Muttaqin A. dan Kumala S., 2009). Pengkajian yang lengkap dan sistematis sesuai dengan fakta atau kondisi yang ada pada pasien sangat penting untuk merumuskan suatu diagnosis keperawatan dan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan respons individu (Rini, 2021).

Kasus pada asuhan keperawatan ini pasien mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu aktivitas dan istirahat dimana pasien dengan diagnosis medis spontaneous intracerebral hemorage temporal dextra mengalami hemiparese dextra atau kelemahan pada sisi tubuh bagian kanan. Hemiparese merupakan istilah medis untuk menggambarkan suatu kondisi adanya kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau ketidak mampuan untuk menggerakkan anggota tubuh pada satu sisi. Hemiparese merupakan salah satu komplikasi yang akan dialami penderita stroke, dimana penderita stroke tidak mampu melakukan aktivitas mandiri, oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya proses penyembuhan yang lama perlu dilakukan latihan agar dapat mengurangi gejala sisa stroke (Rini, 2021).

Setelah dilakukan pengkajian pada Tn. B usia 39 tahun, diperoleh data subyektif yakni keluarga pasien mengatakan pasien tidak ada

aktivitas selama sakit, keluarga pasien mengatakan pasien tidak mampu menggerakkan anggota badan sebelah kanan, keluarga pasien mengatakan pasien tidak mampu merubah posisi saat berbaring. Data obyektif yang diperoleh adalah pasien nampak dibantu oleh keluarga dalam aktivitas, nampak pasien tidak mampu menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan, kekuatan otot menurun (skala =0) tidak bisa digerakkan, nampak gerakan terbatas, nampak fisik lemah.

Menurut (Rahmadani & Rustandi, 2019) stroke hemoragik adalah stroke karena pecahnya pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes kedalam suatu daerah otak dan merusaknya (Smeltzer & Bare, 2013). Etiologi Stroke adalah Perdarahan intraserebral, Perdarahan Subarakhnoid, Perdarahan Serebral. Faktor risiko stroke beberapa faktor penyebab stroke antara lain Hipertensi, merupakan faktor risiko utama, Penyakit kardiovaskular-embolisme serebral berasal dari jantung, kolesterol darah tinggi. Obesitas atau kegemukan. Peningkatan hematokrit meningkatkan risiko infark serebral. Diabetes mellitus terkait dengan aterogenesis terakselerasi. Kontrasepsi oral (khususnya dengan hipertensi, merokok, dan kadar estrogen tinggi). Manifestasi klinis stroke tergantung dari sisi atau bagian mana yang terkena, rata-rata serangan, ukuran lesi dan adanya sirkulasi kolateral. Pada stroke akut gejala klinis meliputi kelumpuhan wajah atau anggota badan sebelah (hemiparesis) yang timbul secara mendadak, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan penurunan kesadaran (konfusi, delirium, letargi, stupor, atau koma), afasia (kesulitan dalam bicara), disatria

(bicara cadel atau pelo), gangguan penglihatan, diploopia, Ataksia Vertigo, mual, muntah, dan nyeri kepala.

Dapat dilihat bahwa teori yang dikemukakan memberikan gambaran kemungkinan yang akan dialami oleh pasien dengan hemiparese, dan data yang diperoleh dari pengkajian yang dilakukan sudah sesuai dengan penjabaran dalam teori. Berdasarkan hasil pengkajian dan membandingkan dengan teori peneliti tidak menemukan kesenjangan antara teori dan praktik yang didapatkan dilapangan.

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis terkait respon pasien terhadap proses kehidupan yang dialami pasien maupun masalah kesehatan baik bersifat aktual ataupun potensial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) masalah keperawatan yang muncul pada klien gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas antara lain yaitu gangguan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas, kelelahan dan risiko intoleransi aktivitas. Hasil analisa data pengkajian yang penulis lakukan pada Tn. B dengan kasus spontanous ICH temporal dekstra dengan Hemiparese dekstra berdasarkan panduan SDKI adalah Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekutan otot (D.0054).

Berdasarkan teori di atas dan hasil pengkajian pada kasus nyata tidak didapatkan adanya kesenjangan antara teori dan kasus dimana pada klien Tn. B dimana masalah keperawatan yang muncul sesuai dengan konsep teori yang telah diuraikan sebelumnya, namun karena fokus studi kasus adalah pemenuhan kebutuhan aktivitas maka secara teori dibatasi diagnosa yang mungkin muncul yang berkaitan dengan

pemenuhan aktivitas fisik, sementara kasus yang didapatkan masalah keperawatan yang muncul selain berkaitan dengan pemenuhan aktivitas fisik juga ditemukan masalah keperawatan nyeri akut.

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan adalah berbagai perawatan yang berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan hasil klien/pasien (NANDA, 2015). Dalam teori intervensi dituliskan sesuai dengan rencana dan kriteria hasil berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) terbitan PPNI. Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk mencegah, menurunkan atau mengurangi masalah-masalah pasien. Dalam menentukan tahap perencanaan bagi perawat diperlukan berbagai pengetahuan dan keterampilan diantaranya pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan klien, nilai dan kepercayaan klien, batasan praktek keperawatan, peran dari tenaga kesehatan lainnya, kemampuan dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, menulis tujuan, serta memilih dan membuat strategi keperawatan yang aman dalam memenuhi tujuan, menulis instruksi keperawatan serta kemampuan dalam melaksanakan kerjasama dengan tingkat kesehatan lain. Kegiatan perencanaan ini meliputi memprioritaskan masalah, merumuskan tujuan, kriteria hasil serta tindakan (Alimul,2009) dalam (Adha, 2017).

Diagnosis yang ditetapkan oleh penulis adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri (D.0054). Standar luaran yang

ditetapkan dalam studi kasus ini adalah Mobilitas fisik (L.05042) dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak (ROM) meningkat. Perencanaan tindakan yang dibuat untuk diagnosa keperawatan ini adalah Dukungan mobilisasi dengan tindakan keperawatannya adalah identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, fasilitas aktivitas mobilitas dengan alat bantu, fasilitas melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Tindakan berikutnya adalah perawatan tirah baring dengan rincian tindakan adalah monitor kondisi kulit, monitor komplikasi tirah baring (misalnya kehilangan massa otot), posisikan senyaman mungkin, pertahankan seprei tetap kering, bersih dan tidak kusut, pasang sideralis, jika perlu, berikan latihan gerak aktif dan pasif, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, jelaskan tujuan dilakukan tirah baring.

Penulis merencanakan Latihan *Range Of Motion* (ROM) pada pasien Tn. B karena latihan ROM digunakan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kemampuan untuk menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot (Yurida Olviani et al., 2017). Pemberian latihan ROM dilakukan 2 kali sehari setiap pagi dan sore dengan waktu 15-35 menit dan dilakukan 4 kali pengulangan setiap gerakan (Syahrim, et al., 2019) dalam (Tristan, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian (Andriani et al., 2022) bahwa latihan ROM dapat mempengaruhi peningkatan kekuatan otot pada pasien

stroke. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai signifikan kekuatan otot sebelum dan sesudah ROM adalah 0,000. Hal ini membuktikan bahwa ROM berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot. Penelitian (Purba et al., 2022) bahwa dalam pelaksanaan latihan *range of motion* pada pasien stroke hemoragik mampu meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke yang mengalami kelemahan otot dengan hasil uji wilcoxon diperoleh nilai p value $0,004 < \text{nilai alpha } 0,05$. Menurut penulis latihan ROM (*range of motion*) berguna dalam meningkatkan kekuatan pada otot, dan mempertahankan fungsi pada jantung dan melatih pernafasan, sehingga dapat menghindari munculnya kontraktur serta kaku sendi.

Dalam perencanaan keperawatan tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus dalam memprioritaskan masalah, merumuskan masalah, merumuskan tujuan, kriteria hasil serta tindakan. Hal ini karena dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan, penulis menggunakan SDKI, SLKI dan SIKI sebagai pedoman dalam menyusun asuhan keperawatan pada Tn. B.

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan yang dilakukan pada masalah gangguan mobilitas fisik meliputi mengidentifikasi indikasi dilakukan latihan, mengidentifikasi keterbatasan pergerakan sendi, memonitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak, mencegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan, memfasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif, menjelaskan tujuan dan prosedur latihan, menganjurkan

melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis, mengajarkan rentang gerak pasif sesuai program (Tristan, 2022).

Penulis melakukan latihan range of motion (ROM) pada pasien Tn. B karena ROM merupakan bagian dari proses rehabilitasi untuk mencapai tujuan mempertahankan atau memelihara fleksibilitas dan kekuatan otot, memelihara mobilitas persendian dan mencegah kelainan bentuk, kekakuan dan kontraktur. Manfaat ROM yaitu memperbaiki tonus otot, meningkatkan mobilisasi sendi, dan memperbaiki toleransi otot untuk latihan (Syahrim et al., 2019). Selain itu, pada masalah nyeri akut pasien Tn. B dilakukan terapi relaksasi napas dalam sehingga pasien mengalami keadaan relaksasi, disaat ini pula terjadilah peningkatan hormon endorpine dan terjadi pengurangan pada hormon kortisol didalam darah dimana hormon kortisol ini berperan dalam pengendalian stress, berpengaruh terhadap fungsi pengaturan sirkulasi darah didalam tubuh sehingga membuat tubuh lebih cepat lelah dan output lebih mudah tertidur (Tristan, 2022)

Dalam melakukan tindakan keperawatan, penulis agak mengalami kesulitan karena pasien tidak begitu komunikatif karena bicaranya tidak jelas akan tetapi keluarga sangat kooperatif selama tindakan dan aktif selama kegiatan ROM diberikan, kerjasama terjalin dengan baik atas bantuan keluarga pasien sehingga pelaksanaan keperawatan sedikit berjalan dengan lancar. Semua tindakan dilaksanakan sesuai rencana yang disusun, namun pada implementasi teknik latihan penguatan otot yaitu tindakan latihan ROM hari ke satu dilakukan dengan waktu 15 menit, hari ke dua dan ke tiga dilakukan dengan waktu 20 menit. Jadi untuk pasien Tn. B lebih efektif melakukan latihan ROM dengan durasi

15 menit karena pasien masih bisa kooperatif untuk mengikuti arahan dari peneliti.

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah proses keperawatan yang mengukur respon pasien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan kearah pencapaian tujuan dengan menggunakan dua jenis evaluasi yaitu evaluasi proses atau formatif yang dilakukan setiap kali selesai melakukan tindakan dan evaluasi.

Evaluasi keperawatan pada hari pertama tanggal 04 oktober 2022 dengan masalah gangguan mobilitas fisik pasien belum menunjukkan perubahan kondisi seperti klien mengatakan susah menggerakkan kakinya, istri klien mengatakan bahwa segala aktivitas suaminya harus dibantu, gerakan terbatas, kekuatan otot 0. Lalu untuk masalah kedua yakni nyeri akut klien mengatakan nyeri dibagian kepala dan bokong, klien nampak meringis, nyeri bertambah ketika bergerak, klien mengatakan nyerinya seperti tertusuk-tusuk dibagian perut dengan skala nyeri 3. Klien mengatakan nyerinya biasanya hanya +- 10 menit dan nyerinya hilang timbul. Pada hari kedua tanggal 05 Oktober 2022 dengan masalah gangguan mobilitas fisik klien mengatakan sudah mampu menggerakkan kakinya perlahan, istri klien mengatakan bahwa sebagian aktivitas suaminya harus dibantu, gerakannya masih terbatas, ekuatan otot 1. Untuk masalah nyeri akut pada pasien sudah menunjukkan adanya perubahan kondisi seperti klien mengatakan nyerinya dibagian kepala dan bokong sudah hampir tidak pernah muncul, klien tampak tidak meringis, nyeri bertambah ketika bergerak seperti tertusuk-tusuk dibagian perut, skala nyeri 0 sehingga untuk

masalah nyeri sudah teratasi pada hari kedua. Pada evaluasi hari ketiga tanggal 06 Oktober 2022 dengan masalah gangguan mobilitas fisik klien mengatakan sudah mampu menggerakkan kakinya tanpa bantuan meskipun pergerakannya masih terbatas, kekuatan otot kaki kanan 1 dan kaki kiri 1, tampak gerakan klien masih terbatas namun klien sudah mampu melakukan pergerakan tanpa bantuan, melakukan ROM pasif.

Hasil penelitian pada diagnosis gangguan mobilitas fisik dilakukan latihan *range of motion* (ROM) pasif 2 x sehari selama 3 hari intervensi dengan hasil pengukuran tingkat kekuatan otot sebelum dilakukan latihan nilai kekuatan otot kaki kanan pasien 0, setelah dilakukan ROM meningkat menjadi nilai kekuatan otot kaki kanan pasien 1.

Hal ini sesuai dengan hasil Penelitian oleh (Tristan, 2022) didapatkan kesimpulan bahwa terdapat peningkatan kekuatan otot setelah dilakukan latihan ROM pada pasien stroke. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh (Andriani et al., 2022) bahwa dapat disimpulkan bahwa latihan ROM dapat berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot pada penderita stroke. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa nilai signifikan kekuatan otot sebelum dan sesudah pemberian intervensi *Range Of Motion* (ROM) dengan nilai 0.000. dari uraian di atas membuktikan bahwa ROM berpengaruh dalam meningkatkan kekuatan otot.

5.2 Analisis Evidence Based Practice in Nursing

Masalah utama yang ditemukan pada kasus Tn. B yaitu gangguan mobilitas fisik dan intervensi utama yang diberikan oleh peneliti adalah ROM pasif. Untuk meningkatkan kekuatan otot pasien berdasarkan *evidence based practice in nursing*. Menurut pengamatan peneliti, latihan Range of Motion

(ROM) dapat meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke karena latihan ROM dapat menimbulkan rangsangan sehingga meningkatkan aktivasi dari kimiawi neuromuskuler dan muskuler. Menurut (Ayuningrum et al., 2021) kekuatan otot sangat berhubungan dengan sistem neuromuskuler yaitu seberapa besar kemampuan sistem saraf mengaktivasi otot untuk melakukan kontraksi. Dengan demikian semakin banyak serabut otot teraktivasi, maka semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan oleh otot tersebut.

Latihan ROM merupakan latihan gerakan sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, dimana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai dengan gerakan normal baik secara aktif maupun pasif. Pemberian terapi latihan berupa gerakan pasif sangat bermanfaat dalam menjaga sifat fisiologi dari jaringan otot. Gerakan-gerakan dalam ROM diantaranya fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, adduksi, rotasi, eversi, inversi, pronasi, supinasi, oposisi. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan SOP, sehingga tindakan ini aman untuk dilakukan pada pasien. ROM pasif dapat memperbaiki tingkat kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Rentang gerak pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian. Latihan ini dapat diberikan sedini mungkin untuk menghindari adanya komplikasi akibat kurang gerak, seperti adanya kontraktur, kekakuan sendi, dan lainlain (Selawati et al., 2022).

Pada kasus Tn. B ini diberikan tindakan berupa latihan ROM pasif, dimana ROM pasif atau latihan pada tulang dan sendi dilakukan pada pasien yang mengalami penurunan kekuatan otot lengan ataupun kaki kaki disebabkan pasien tidak dapat melakukannya secara mandiri sehingga perawat ataupun keluarga perlu memberikan bantuan.

Tindakan latihan ROM ini diberikan pada Tn. B dikarenakan sesuai teori (Purba et al., 2022), yang menyatakan bahwa memberikan latihan ROM secara dini dapat meningkatkan kekuatan otot karena dapat menstimulasi motor unit sehingga semakin banyak motor unit yang terlibat maka akan terjadi peningkatan kekuatan otot, kerugian pasien hemiparese bila tidak segera ditangani maka akan terjadi kecacatan yang permanen. Range of Motion (ROM) jika dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan benar dan secara terus-menerus akan memberikan dampak pada kekuatan otot. pengaruh ROM pada pasien stroke terhadap peningkatan kekuatan otot dapat membuat pasien mengerti dan tahu cara berlatih dalam memberikan pergerakan baik otot, persendian yang sesuai dengan gerakan normal maupun secara aktif dan pasif saat melakukan kontraksi pergerakan.

Berdasarkan penelitian (Purba et al., 2022) pemberian latihan *Range of Motion* selama 2 minggu dan dilakukan 2 kali sehari dapat mempengaruhi luas derajat rentang gerak sendi ekstremitas atas. Latihan *Range of Motion* ini dapat dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Intervensi ROM pasief yang diberikan oleh peneliti yaitu sebanyak 1 kali dalam sehari selama 4 hari karena pada hari keempat setelah implementasi pasien direncanakan pulang oleh dokter sehingga dalam 4 hari pemberian ada peningkatan kekuatan otot pada pasien dan intervensi latihan ROM tetap dipertahankan dan bisa dilakukan oleh keluarga secara mandiri dirumah.

Berdasarkan Teori Roy juga mengungkapkan bahwa setiap individu akan berespon terhadap kebutuhan fisiologis, tingkat kemandirian, konsep diri yang positif serta kemampuan secara optimal dalam melakukan peran ataupun fungsi dalam memelihara integritas diri (Risnah & Irwan, 2021). Sehingga latihan ROM ini dapat dikaitkan dengan teori Roy karena menyangkut

kebutuhan fisiologis dan tingkat kemandirian pasien dalam mengaplikasikan terapi latihan ROM ini.

Beradaptasi dengan lingkungan baik sehat maupun sakit serta melakukan latihan ROM dapat menjadi usaha bagi pasien dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Hal ini akan mempermudah dalam menjalani pengobatan, baik secara medis maupun non medis seperti latihan ROM ini tidak lupa juga segala usaha harus diiringi dengan doa karena kesembuhan datangnya dari Allah Swt. seperti Al Kisah nabi Ayyub a.s dalam berikhtiar dan bersabar ketika diberikan ujian berupa sakit oleh Allah SWT. yang mana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya'/21:83 yang berbunyi :

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾

Terjemahnya :

“(Ingatlah) Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya Tuhanku,) sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.” (Kemenag RI, 2019)

Ayat ini dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (Dan) ingatlah kisah (Ayub,) kemudian dijelaskan oleh Badalnya, yaitu (ketika ia menyeru Rabbnya) pada saat itu dia mendapat cobaan dari-Nya; semua harta bendanya lenyap dan semua anak-anaknya mati serta badannya sendiri tercabik-cabik oleh penyakit, semua orang menjauhinya kecuali istrinya. Hal ini dialaminya selama tiga belas tahun, ada yang mengatakan tujuh belas tahun dan ada pula yang mengatakan delapan belas tahun. Selama itu penghidupan Nabi Ayub sangat sulit dan sengsara ("Sesungguhnya aku) asal kata Annii adalah Bi-ann

(telah ditimpa kemudharatan) yakni hidup sengsara (dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang").

Dalam tafsir oleh (Kemenag RI, 2019) bahwa Dan ingatlah kisah Ayub, seorang nabi dan rasul yang mendapat cobaan berat dalam hidupnya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan berserah dan bertawakal kepada-Nya. 'Ya Tuhanku, sungguh, aku telah ditimpa penyakit yang terasa sangat berat; tetapi aku yakin bahwa Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang, sehingga cobaan ini merupakan bentuk kasih sayang-Mu kepadaku. Karena sikap Nabi Ayyub a. s yang sabar, berserah dan bertawakal kepada Allah dalam menyikapi penyakit yang menimpa dirinya, maka Kami mengabulkan doa-nya, lalu Kami melenyapkan berbagai penyakit yang ada padanya sehingga penyakitnya sembuh lahir batin; dan Kami pun mengembalikan keluarganya kepadanya untuk lebih menyempurnakan kebahagiaannya. Dan Kami pun melipat gandakan jumlah keturunan Nabi Ayub sebagai suatu rahmat dari Kami kepada hamba-Nya yang sabar, dan sekaligus kisah Nabi Ayub ini untuk menjadi peringatan bagi semua orang beriman yang menyembah Kami agar bersabar, bertawakal dan berserah kepada Allah dalam menghadapi berbagai cobaan yang menimpa dirinya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Analisis Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian Keperawatan

Pada kasus Tn. B ditemukan beberapa data seperti pasien mengeluh nyeri pada bagian kepala post op craniotomi dan pasien mengeluh sulit menggerakkan sisi tubuh bagian kanan dan segala aktivitas dibantu oleh keluarga

b. Diagnosis Keperawatan

Pada kasus Tn. B ditemukan masalah keperawatan yaitu gangguan mobilitas fisik dan nyeri akut.

c. Intervensi Keperawatan

Pada kasus Tn. B intervensi keperawatan yang diberikan pada masalah gangguan mobilitas fisik yaitu dukungan mobilisasi dan pada masalah nyeri akut intervensi yang diberikan berupa manajemen nyeri.

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan yang diberikan pada Tn. B sesuai dengan rencana yang telah disusun, adapun untuk masalah utama berupa gangguan mobilitas fisik berdasarkan *evidence based practice in nursing* yaitu diberikan latihan ROM pasif

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan yang diperoleh pada kasus Tn. B adalah masalah gangguan mobilitas fisik dan nyeri akut teratasi.

6.1.2 Analisis Intervensi *Evidence Based Practive in Nursing*

Pada kasus Tn. B diberikan latihan ROM pasif selama 3 hari menunjukkan adanya peningkatan kekuatan otot anggota tubuh sebelah kanan.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa keperawatan maupun profesi ners dalam menambah pengetahuan mengenai asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat khususnya dalam memberikan intervensi *Range of Motion* (ROM).

6.2.2 Bagi Pelayanan Kesehatan

Latihan *Range of Motion* (ROM) dapat menjadi *evidence based* bagi perawat yang dapat dilakukan di ruang perawatan selama memberikan pelayanan dalam proses asuhan keperawatan, perawat juga bisa melatih pasien dan keluarga mengenai intervensi latihan ROM agar pasien dan keluarga mampu menerapkan secara mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S. A. (2017). Asuhan Keperawatan Gangguan Mobilitas Fisik Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Di Irna C Rssn Bukit Tinggi. *Asuhan Keperawatan Gangguan Mobilitas Fisik Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Di Irna C Rssn Bukit Tinggi*, 167.
- Adiputra, I. made S. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Andriani, D., Fitria Nigusyanti, A., Nalaratih, A., Yuliawati, D., Afifah, F., Fauzanillah, F., Amatilah, F., Supriadi, D., & Firmansyah, A. (2022). Pengaruh Range of Motion (ROM) Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Pasien Stroke. *Indogenius*, 1(1), 34–41.
<https://doi.org/10.56359/igj.v1i1.59>
- Ayuningrum, F. A., Rachmawati, D., & Mugianti, S. (2021). PENGARUH RANGE OF MOTION (ROM) TERHADAP KEKUATAN OTOT PASIEN STROKE (LITERATUR REVIEW) Program Studi Keperawatan Blitar , Jurusan Keperawatan , Poltekkes Kemenkes Malang , Blitar 66133 , Indonesia THE EFFECT OF RANGE OF MOTION (ROM) ON MUSCLE STRENG. *JKHWS*, 10, 123–132. <https://doi.org/10.47794/jkhws>
- Hidayat, A. A. (2021). *Studi Kasus Keperawatan; Pendekatan Kualitatif* (1st ed.). Health Books Publishing.
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Listiyana, B. (2018). *Penerapan ROM (Rome Of Motion) Pada Asuhan*

Keperawatan Pasien Stroke dengan Gangguan Mobilitas Fisik di RSUD

Wates Kulon Progo. Politeknik Kesehatan ementrian Kesehatan Yogyakarta.

Lyndon, S. (2013). *Kebutuhan Dasar Manusia*. Binapura Aksara.

Mubarak, W. I. (2017). *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia : Teori & Aplikasi dalam Praktek*. EGC.

Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan* (P. P. Lestari (ed.); 5th ed.). Salemba Medika.

Nurwening, & Herry. (2019). Modul 1 Kebutuhan Dasar Manusia. In *Poltekkes Palangka Raya*. Kementerian Kesehatan R.

PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Edisi 1*. DPP PPNI.

Purba, S. D., Sidiq, B., Purba, I. K., Hutapea, E., Silalahi, K. L., Sucahyo, D., & Dian, D. (2022). Efektivitas ROM (Range of Motion) terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke di Rumah Sakit Royal Prima Tahun 2021. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 7(1), 79.
<https://doi.org/10.30829/jumantik.v7i1.10952>

Rahmadani, E., & Rustandi, H. (2019). Peningkatan Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragik dengan Hemiparese melalui Latihan Range of Motion (ROM) Pasif. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(2), 354–363.

<https://doi.org/10.31539/joting.v1i2.985>

RI, K. (2018). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)*.

Rini, K. (2021). Asuhan keperawatan pada tn. k dengan hemiparese dextra dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas di ruang raha mongkilo rs bahteramas. *Karya Tulis Ilmiah*, 8–10.

- Risnah, & Irwan, M. (2021). *Falsafah dan Teori Keperawatan dalam Integrasi Keilmuan* (Musdalifah (ed.); I, Januari). Alauddin University Press.
- Rohayati, E. (2019). *Keperawatan Dasar I* (A. Rahmawati (ed.); 1st ed.). LovRinz Publishing.
- Selawati, A., Nurlaily, A. P., & Sahuri Teguh Kurniawan. (2022). *ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN STROKE NON HEMORAGIK Associate 's Degree in Nursing Study Program Faculty of Health Sciences Kusuma Husada University of Surakarta NURSING CARE IN NON-HEMORRHAGIC STROKE PATIENTS IN ABSTRACT The number of stroke sufferers. 1–13.*
- Sumarta, N. H. (2020). Hubungan Aktivitas Fisik Sehari-Hari Dengan Derajat Hipertensi Pada Lansia Di Kota Batu. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–104.
- Tafsir Ibnu Katsir. (2015). *Tafsir Surat*. 13 Mei 2015.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-31.html>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia; Definisi dan Indikator Diagnostik*. DPP PPNI.
- Tristan, E. (2022). *Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas Dan Istirahat Pada Pasien Tn.S Dengan Stroke Non Hemoragik Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.YUNUS Kota Bengkulu Rahun 2022* (pp. 1–23).
- Zulaikha, S. (2021). *Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Mobilitas Fisik Pada Bapak R Dengan Stroke Iskemik Di Desa Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Poltekkes Tanjungkarang.*

Lampiran 1: Jurnal Utama



Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi pemberian latihan *Range Of Motion* (ROM)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup



Penulis bernama **Sakinah Agoestarini Lahilote, S.Kep**, lahir di Huangobotu pada tanggal 17 Agustus 2000, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Nurdin Lahilote dan Ibu Linda Wartabone. Penulis tinggal di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Penulis memulai pendidikan di SDN 1 Kabila Bone pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 9 Kota Gorontalo pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Pondok Pesantren MA Al-Huda Kota Gorontalo pada tahun 2015-2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi melalui jalur Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Keperawatan pada tahun 2018-2022. Dan sekarang menempuh pendidikan profesi ners di UIN Alauddin Makassar. Selama menempuh studi di kampus penulis aktif di beberapa organisasi baik internal maupun eksternal. Untuk organisasi internal penulis aktif di HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2020/2021. Untuk organisasi eksternal, penulis menjabat sebagai Sekretaris Umum CSSMoRA UIN Alauddin Makassar periode 2020/2021 dan pengurus PMII Rayon Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Komisariat UIN Alauddin Makassar Cabang Makassar periode 2021/2022.