

**PENETAPAN KADAR TOTAL FENOLIK, FLAVONOID, KAROTENOID
DAN KAPASITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK BEBERAPA BAGIAN
TUMBUHAN TENGAR (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob.**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SITI NURHALIZA
70100118029

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR


2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurhaliza
Nim : 70100118029
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 10 November 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perm. Mutiara Indah Village
Judul : Penetapan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, Karotenoid
dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Beberapa Bagian
Tumbuhan Tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri.
Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau
dibuat oleh orang lain baik itu Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar
yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata, 2022

Penyusun,





Siti Nurhaliza
70100118029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penetapan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, Karotenoid dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Beberapa Bagian Tumbuhan Tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob." yang disusun oleh Siti Nurhaliza NIM: 70100118029, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 24 Februari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 24 Februari 2023
3 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI:

- | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|--|
| Ketua | : | Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. | ( |
| Sekertaris | : | apt. Surya Ninggi, S.Si., M.Si. | ( |
| Munaqisy I | : | Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si. | ( |
| Munaqisy II | : | Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA. | ( |
| Pembimbing I | : | Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si. | ( |
| Pembimbing II | : | apt. Muh. Ikhlas Arsul, S.Si., M.Si. | ( |

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, Karotenoid dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Beberapa Bagian Tumbuhan Tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob."** Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rahmatan Lil'alamin.

Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang yang sangat berharga dan berjasa dalam hidup peneliti yakni sosok luar biasa kedua orang tua peneliti ayah tercinta Sirajuddin dan ibu tersayang Darna, yang tak pernah merasa jenuh dalam mendo'akan, memotivasi, dan menasehati penulis dengan tulus. Tidak lupa pula penulis ucapan banyak terima kasih kepada saudara (i) Syahratul Aeni, Rakhmat Hidayat, dan Taofiq Hidayat yang selalu memberikan motivasi dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis sangat menyadari bahwa sampai detik ini tanpa adanya doa-doa dari beliau, penulis tidak akan bisa


berada pada tahap penyelesaian skripsi ini. Begitu juga keluarga besar penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga dengan sepenuh hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M. Kes.,Sp. A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S. KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

10. Ibu apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. apt. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi selaku Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Ibu Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si. selaku Pembimbing Pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing dan mengarahkan peneliti dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak apt. Muh. Ikhlas Arsul, S. Farm., M. Si. selaku Pembimbing Kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya memberikan masukan dan mengoreksi peneliti dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Bapak apt. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si. selaku pendamping penelitian yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan mengawasi jalannya peneliti ini dengan tulus dan ikhlas.
15. Ibu Dr.apt. Mukhriani, S.Si., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan kritikan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi.
16. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan yang baik dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
17. Ibu Dr. apt. Karlina Amir Tahir,S.Si, M.Si. selaku penasihat akademik yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran serta senantiasa memberikan solusi terkait segala permasalahan dan keluhan akademik.

18. Bapak dan Ibu dosen yang tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membala jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
19. Kepada Laboran Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Kimia Analisis, dan Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang senantiasa mengarahkan peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	3
C. <i>Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	3
D. <i>Kajian Pustaka</i>	5
E. <i>Tujuan Penelitian</i>	11
F. <i>Manfaat Penelitian</i>	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. <i>Uraian Tumbuhan Tengar</i>	12
B. <i>Ekstraksi</i>	14
C. <i>Metabolit Sekunder</i>	17
D. <i>Radikal Bebas</i>	23
E. <i>Antioksidan</i>	24
F. <i>Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tumbuh – tumbuhan sebagai Obat</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. <i>Jenis dan Pendekatan Penelitian</i>	36
1.Jenis Penelitian.....	36
2.Pendekatan Penelitian.....	36
B. <i>Lokasi dan Waktu Penelitian</i>	36
1.Lokasi Penelitian	36
2.Waktu Penelitian	36
C. <i>Populasi dan Sampel</i>	36
1.Populasi Penelitian	36

2.Sampel Penelitian.....	37
<i>D. Prosedur Kerja</i>	37
1.Alat Penelitian	37
2.Bahan Penelitian.....	37
3.Penyiapan Sampel	37
4.Skrining Fitokimia.....	38
5.Penetapan Kadar Fenolik Total	41
6.Penetapan Kadar Flavonoid Total	42
7.Penetapan Kadar Karotenoid Total.....	43
8.Uji Kapasitas antioksidan	43
<i>E. Analisis Data.....</i>	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
<i>A. Hasil Penelitian.....</i>	50
1.Hasil Ekstraksi	50
2.Hasil Penapisan Fitokimia.....	50
3.Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid	51
4.Kapasitas Antioksidan Ekstrak Tengar.....	51
<i>B. Pembahasan</i>	52
BAB V PENUTUP	67
<i>A. Kesimpulan.....</i>	67
<i>B. Saran</i>	68
DAFTAR PUSTAKA	69
RIWAYAT HIDUP.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil ekstraksi beberapa bagian tumbuhan tengar (<i>Ceriops tagal</i>) (Perr.) <i>C.B.Rob.</i>	50
Tabel 2. Hasil penapisan fitokimia beberapa bagian tumbuhan tengar (<i>Ceriops tagal</i>) (Perr.) <i>C.B.Rob.</i>	50
Tabel 3. Kadar total fenolik, flavonoid, dan karotenoid ekstrak tengar (<i>Ceriops tagal</i>) (Perr.) <i>C.B.Rob.</i>	51
Tabel 4. Kesetaraan antioksdian ekstrak tengar (<i>Ceriops tagal</i>) (Perr.) <i>C.B.Rob.</i> terhadap asam askorbat	51
Tabel 5. Kesetaraan antioksdian ekstrak tengar (<i>Ceriops tagal</i>) (Perr.) <i>C.B.Rob.</i> terhadap trolox	52
Tabel 6. Hasil pengukuran kurva baku sam galat.....	92
Tabel 7. Hasil pengukuran kurva baku kuersetin	93
Tabel 8. Hasil pengukur absorbansi karotenoid	94
Tabel 9. Hasil serapan pembanding vitamin C dengan metode FRAP	95
Tabel 10. Hasil serapan pembanding trolox dengan metode FRAP.....	96
Tabel 11. Hasil serapan pembanding vitamin C dengan metode CUPRAC	97
Tabel 12. Hasil serapan pembanding trolox dengan metode CUPRAC.....	98
Tabel 13. Hasil serapan pembanding vitamin C dengan metode DPPH	99
Tabel 14. Hasil serapan pembanding trolox dengan metode DPPH	100
Tabel 15. Hasil serapan pembanding asam askorbat dengan metode TOAC.....	101
Tabel 16. Hasil serapan pembanding trolox dengan metode TOAC.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tengar (<i>Ceriops tagal</i>) (Perr.) C.B.Rob.....	12
Gambar 2. Reaksi Senyawa Fenolik dengan Reagen <i>Folin-Ciocalteu</i>	56
Gambar 3. Diagram Kadar Fenolik Total.....	57
Gambar 4. Pembentukan Senyawa Kompleks Kuersetin-aluminium klorida	58
Gambar 5. Diagram Kadar Flavonoid Total.....	58
Gambar 6. Diagram Kadar Karotenoid Total	60
Gambar 7. Diagram Kapasitas Antioksidan TOAC	61
Gambar 8. Reaksi Antioksidan dan Radikal Bebas DPPH.....	62
Gambar 9. Diagram Kapasitas Antioksidan DPPH	62
Gambar 10. Reaksi Metode FRAP	63
Gambar 11. Diagram kapasitas Antioksidan FRAP	64
Gambar 12. Reaksi Metode CUPRAC	65
Gambar 13. Diagram Kapasitas Antioksdian CUPRAC	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur penelitian	73
Lampiran 2. Skema kerja.....	74
Lampiran 3. Perhitungan rendamen ekstrak.....	87
Lampiran 4. Peta lokasi pengambilan sampel	89
Lampiran 5. Perhitungan pembuatan reagen uji Penelitian.....	90
Lampiran 6. Kadar total Fenolik	92
Lampiran 7. Kadar total flavonoid	93
Lampiran 8. Kadar total karotenoid	94
Lampiran 9. Kapasitas total antioksidan metode FRAP	95
Lampiran 10. Kapasitas total antioksidan metode CUPRAC	97
Lampiran 11. Kapasitas total antioksidan metode DPPH	99
Lampiran 12. Kapasitas total antioksidan metode TOAC.....	101
Lampiran 13. Perhitungan kadar total dan kapasitas antioksidan	103
Lampiran 14. Uji One-Way ANOVA yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Duncan pada masing-masing perlakuan.....	110
Lampiran 15. Gambar Penelitian.....	143



ABSTRAK

Nama	: Siti Nurhaliza
Nim	: 70100118029
Jurusan	: Farmasi
Judul Skripsi	: Penetapan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, Karotenoid dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Beberapa Bagian Tumbuhan Tengar (<i>Ceriops tagal</i>) (Perr.) C.B.Rob.

Tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, hal ini dikarenakan adanya metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pengalaman empiris tumbuhan ini digunakan sebagai obat antidiabetes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan kadar total fenolik, flavonoid, karotenoid dan kapasitas antioksidan yang disari dengan pelarut metanol terhadap kesetaraan asam askorbat dan trolox dengan menggunakan metode DPPH, FRAP, CUPRAC, dan TOAC. Ekstraksi tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. dilakukan menggunakan metode refluks pada suhu 70°C selama 3 jam dengan pelarut metanol. Hasil filtrat kemudian dipekatkan menggunakan *Rotary Evaporator* pada suhu 60 °C hingga diperoleh ekstrak kental untuk dilakukan pengujian. Hasil penapisan fitokimia Ekstrak metanol tumbuhan tengar positif mengandung tanin, steroid, terpenoid, saponin, dan glikosida. Hasil menunjukkan bahwa perlakuan bagian tumbuhan dan jenis pelarut berpengaruh sangat nyata terhadap total fenolik, total flavonoid, total karotenoid, dan kapasitas antioksidan yang berbeda bermakna ($\alpha<0.05$). Hasil pengukuran kadar total fenolik tertinggi pada ekstrak metanol buah sebesar 278.67 mg GAE/g ekstrak. Hal yang sama ditunjukkan bahwa kapasitas antioksidan tertinggi pada ekstrak buah pada metode TOAC sebesar 23.51 mg AAE/g ekstrak dan 46.24 mg TEAC/g ekstrak yang berbeda bermakna ($\alpha<0.05$). kadar total flavonoid tertinggi pada ekstrak metanol daun sebesar 125.07 mg QE/g ekstrak, dan pada kadar total karotenoid tertinggi pada ekstrak metanol kulit batang 7.94 μ g CE/g ekstrak. Hal yang sama ditunjukkan bahwa kapasitas antioksidan tertinggi pada ekstrak kulit batang pada metode DPPH dan FRAP berturut-turut sebesar 367.01 mg AAE/g ekstrak dan 9.47 mg TEAC/g ekstrak; 125.43 mg AAE/g ekstrak dan 148.25 mg TEAC/g eskrak yang berbeda bermakna ($\alpha<0.05$). Dan untuk kapasitas antioksidan tertinggi pada metode CUPRAC pada ekstrak metanol akar sebesar 221.97 mg AAE/g ekstrak dan 392.69 mg TEAC/g ekstrak yang berbeda bermakna ($\alpha<0.05$).

Kata kunci : *Ceriops tagal*, fenolik, flavonoid, karotenoid, kapasitas antioksidan

ABSTRACT

Name	: Siti Nurhaliza
NIM	: 70100118029
Department	: Farmasi
Title	: <i>Determination Total Phenolic Content, Flavonoid, Carotenoid and Antioxidant Capacity of Extracts Several Parts Tengar Plants (<i>Ceriops tagal</i>) (Perr.) C.B.Rob.</i>

*Tengar plant (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. is one of the plants that has high antioxidant activity due to the presence of secondary metabolites contained in it. Based on empirical experience, this plant is used as an anti-diabetic drug. This study aims to determine the deposition of total levels of phenolics, flavonoids, carotenoids, and antioxidant capacity irradiated with methanol solvents against the equivalence of ascorbic acids and trolox using the DPPH, FRAP, CUPRAC, and TOAC methods. The extraction of tengar plants (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. was carried out using the reflux method at a temperature of 70°C for 3 hours with methanol as a solvent. The filtrate results are then concentrated using a rotary evaporator at a temperature of 60 °C until a viscous extract is obtained for testing. Phytochemical screening results The positive methanol extract of tengar plants contains tannins, steroids, terpenoids, saponins, and glycosides. The results showed that the treatment of plant parts and types of solvents had a very noticeable effect on total phenolics, total flavonoids, and total carotenoids, as well as significantly different antioxidant capacities ($\alpha < 0.05$). The results of measuring the highest total phenolic levels in fruit methanol extract were 278.67 mg GAE/g extract. The same was shown: the highest antioxidant capacity in fruit extracts in the TOAC method was 23.51 mg AAE/g extracts, and 46.24 mg TEAC/g different extracts were meaningful ($\alpha < 0.05$). the highest total flavonoid levels in leaf methanol extracts were 125.07 mg QE/g extracts, and the highest total carotenoid levels were in stem bark methanol extracts at 7.94 µg CE/g extract. The same was shown that the highest antioxidant capacity in stem bark extract in the DPPH and FRAP methods was 1417.04 mg AAE/g extract and 46.24 mg TEAC/g extract, respectively; 125.43 mg AAE/g extract and 148. 25 mg of teac/g differently meaningful ($\alpha < 0.05$). And for the highest antioxidant capacity in the CUPRAC method, in a root methanol extract of 221.97 mg of AAE/g and 392.69 mg of TEAC/g of different meaningful extracts ($\alpha < 0.05$).*

Keywords: *Ceriops tagal, phenolics, flavonoids, carotenoids, antioxidant capacity.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai keterbatasan dalam penanggulangan masalah kesehatan, dimana penyakit infeksi masih tinggi dan prevalensi penyakit degeneratif makin meningkat. Menurut *World Health Organization* (WHO), hingga akhir tahun 2014, penyakit degeneratif menjadi penyebab kematian hampir 15 juta orang di seluruh dunia. Ada sekitar 50 penyakit degeneratif, termasuk diantaranya yaitu penyakit kanker, diabetes, stroke, penyakit jantung koroner, penyakit kardiovaskular, obesitas, dan dislipidemia. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa munculnya penyakit degeneratif sangat erat kaitannya dengan meningkatnya proses penuaan manusia, meskipun faktor genetika juga memainkan peran besar (Hamdin & Muliasari, 2019). Penyakit degeneratif juga dapat disebabkan oleh aktivitas radikal bebas yang terlalu banyak di dalam tubuh, sehingga menyebabkan kerusakan molekul atau jaringan dalam tubuh (Manongko, 2020).

Radikal bebas adalah molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan dalam orbital terluarnya sehingga sangat reaktif. Apabila molekul non radikal bertemu dengan radikal bebas maka akan terbentuk suatu molekul radikal yang baru. Radikal bebas bersifat tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul disekitarnya, sehingga radikal bebas bersifat toksik terhadap molekul biologi atau sel dan dapat berpotensi menonaktifkan berbagai enzim, mengoksidasi lemak dan mengganggu DNA tubuh sehingga terjadi mutasi sel. Perilaku radikal bebas pada tubuh dapat dicegah dengan senyawa antioksidan (Manongko, 2020).

Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat mengurangi radikal bebas sehingga dapat melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi yang berlebihan (Purwati & Marsella, 2020). Antioksidan berfungsi menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron dan radikal bebas sehingga menghambat terjadinya reaksi berantai (Manongko, 2020). Antioksidan dapat diperoleh secara alami dari tumbuhan yang memiliki senyawa bioaktif seperti fenol, alkaloid, steroid, flavonoid dan pigmen tertentu (Purwati & Marsella, 2020).

Tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. merupakan salah satu tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini merupakan tumbuhan tropis dari Famili *Rhizophoraceae*. Secara empiris tumbuhan ini digunakan sebagai obat antidiabetes oleh masyarakat di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurut (Canusa, *et al.*, 2021) kulit kayu tengar telah digunakan di Filipina untuk pengobatan tradisional penyakit diabetes mellitus (DM). Bagian daun, bunga, dan buah digunakan sebagai obat setelah melahirkan untuk melancarkan nifas (Riziki & Leilani, 2017), sementara ekstrak kulit kayu tengar bermanfaat untuk persalinan (Noor, M. Khazali, & N, 1999).

Ekstrak kulit batang tengar teridentifikasi mengandung senyawa tanin sebesar 22,44 ppm (Paryanto, *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Shamsuzzaman & Kalaiselvi, 2021) menyatakan bahwa *Ceriops tagal*, mengandung fenolik dan flavonoid dan menunjukkan adanya sifat antioksidan terhadap 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), oksida nitrat, dan radikal bebas hidrogen peroksida. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Fitriansyah, *et al.*, 2018) menyatakan bahwa ekstrak etanol buah, daun, dan kulit batang limpasu mengandung senyawa golongan alkaloid, fenol, flavonoid, tanin, dan saponin. Namun demikian, meskipun memiliki kandungan kimia yang sama, tetapi memiliki kadar senyawa yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Bakar, Ahmad,

Karim, & Saib, 2014) menyatakan bahwa ekstrak metanol 80% buah limpasu memiliki kadar total fenol dan flavonoid tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk menetapkan kadar total fenolik, flavonoid, karotenoid, dan menganalisis kapasitas antioksidan pada tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kadar total fenolik, flavonoid, dan karotenoid ekstrak metanol dari akar, batang, kulit batang, daun dan buah tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. ?
2. Bagaimana perbandingan kapasitas antioksidan ekstrak metanol dari akar, batang, kulit batang, daun, dan buah pada tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a) Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa fenol, flavonoid, dan karotenoid dari tumbuhan tengar dengan menggunakan pelarut metanol.

- b) Tengar

Tengar adalah tumbuhan dengan nama latin *Ceriops tagal* yang berasal dari daerah Bulukumba yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

- c) Kapasitas antioksidan

Kapasitas antioksidan yaitu kesetaraan bobot ekstrak bagian tumbuhan tengar dengan pembanding (vitamin C dan Trolox) dalam menangkap sejumlah radikal bebas yang sama banyak menggunakan metode DPPH, CUPRAC, FRAP, dan TOAC.

d) Kadar fenolik total

Kadar fenolik total merupakan kadar senyawa fenolik dalam tumbuhan tengar yang dinyatakan sebagai ekivalen dengan asam galat. Kadar fenolik dapat diukur absorbansinya dengan panjang gelombang 425nm dengan penambahan reagen Folin-Ciocalteu sehingga larutan uji berwarna biru. Kandungan fenolik total dinyatakan dengan massa ekivalen asam galat dinyatakan dengan mg.

e) Kadar total flavonoid

Kadar total flavonoid adalah kadar senyawa flavonoid dalam tumbuhan tengar yang dinyatakan sebagai ekivalen dengan kuersetin. Kadar flavonoid total diukur absorbansinya pada panjang gelombang 415nm dengan penambahan reagen Aluminium klorida (AlCl_3). Kandungan flavonoid total dinyatakan dengan massa ekivalen kuersetin dinyatakan dengan mg.

f) Kadar total karotenoid

Kadar total karotenoid adalah kadar senyawa karotenoid dalam tumbuhan tengar yang dinyatakan sebagai ekivalen dengan karoten. Kadar karotenoid total diukur absorbansinya pada panjang gelombang 661,6; 664,8; dan 470 nm dengan penambahan aseton (CH_3COCH_3). Kandungan karotenoid total dinyatakan dengan massa ekivalen karoten dinyatakan dengan μg .

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penetapan kadar total senyawa fenolik, flavonoid dan karotenoid dan analisis kapasitas antioksidan pada ekstrak metanol akar, batang, kulit batang, daun, dan buah tumbuhan tengar.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian (Shamsuzzaman, 2021) berjudul “*Evaluation of Antioxidant and Anticorrosive Activities of Ceriops tagal Plant Extract*”. Penelitian ini menganalisis sifat antioksidan tanaman bakau tropis dan subtropis dari Famili *Rhizophoraceae*. Kandungan total fenolik (TPC) dan kandungan flavonoid total (TFC) ditemukan masing-masing 101,52 dan 35,71 mg/g ekstrak. Ekstrak metanol daun *Ceriops tagal* (100 g/mL) menunjukkan sifat antioksidan terhadap 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), oksida nitrat, dan radikal bebas hidrogen peroksid berturut-turut sebesar 83,88%, 85%, dan 87% (Shamsuzzaman & Kalaiselvi, 2021).

Penelitian ini mengadopsi metode dan sampel yang sama yaitu melakukan uji fenolik dan flavonoid ekstrak metanol daun tengar serta pengujian penangkapan radikal bebas dengan metode DPPH. Tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan semua bagian tumbuhan yaitu akar, kulit batang, batang, daun, dan buah serta pengukuran kapasitas antioksidan dengan pembanding senyawa antioksidan sintetik.

2. Penelitian (Basco,2016) yang berjudul ”*Evaluation of The Phytochemical, antioxidant and Cytoxic Properties of Tungog (Ceriops tagal) (Perr.) C.B.Rob., A Philippine Mangrove Species*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kandungan fitokimia, antioksidan dan aktivitas sitotoksik ekstrak kasar kulit batang *Ceriops tagal*. Analisis fitokimia dilakukan dengan menggunakan protokol standar dan aktivitas antioksidan dilakukan

dengan menggunakan uji penangkal radikal DPPH menggunakan absorbansi antioksidan standar 98%. Tanin, flavonoid, dan glikosida jantung ditemukan dalam kulit kayu *Ceriops tagal*, sedangkan absorbansi 93% terdeteksi terhadap standar 98% untuk uji aktivitas antioksidan yang dilakukan (Basco, Mallare, Ruiz, Jacob, & Divina, 2016).

Penelitian ini mengadopsi metode yang sama yaitu analisis fitokimia dan uji penangkal radikal bebas DPPH dan menggunakan sampel yang sama yaitu bagian kulit batang *Ceriops tagal*.

3. Penelitian (Indra, 2019) berjudul “Fenolik Total, Kandungan Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Mareme (*Glochidion arborescens blume*)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan fenolik total, flavonoid total, dan aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun mareme. Penetapan kadar fenolik total menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu dengan pembanding asam galat. Hasil penapisan fitokimia menunjukkan bahwa daun mareme mengandung senyawa flavonoid, tanin, polifenol, monoterpenoid-seskuiterpen, saponin dan kuinon. Kadar fenolik total ekstrak daun mareme sebesar $33,32 \pm 0,25$ mg *Gallic Acid Equivalent* (GAE)/g ekstrak, sedangkan kadar flavonoid total sebesar $3,02 \pm 0,003$ mg *Quercetin Equivalent* (QE)/g ekstrak. Hasil uji kapasitas antioksidan dengan metode DPPH diperoleh nilai IC_{50} ekstrak etanol daun mareme pada konsentrasi ekstrak $5,5 \mu\text{g/mL}$, dan nilai IC_{50} pembanding vitamin C sebesar $3,34 \mu\text{g/mL}$. Berdasarkan hasil ini daun mareme memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tanaman obat untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh stress oksidatif (Indra, NurmalaSari, & Kusmiati, 2019).

Penelitian ini mengadopsi metode yang sama yaitu penetapan kadar total fenolik dengan *Gallic Acid Equivalent* (GAE), flavonoid dengan *Quercetin Equivalent* (QE) dan pengujian kapasitas antioksidan metode DPPH dengan pembanding vitamin C. Sampel dan pelarut yang digunakan berbeda dengan penelitian tersebut yaitu ekstrak metanol beberapa bagian tumbuhan tengar.

4. Penelitian (Ngibad & Lestari, 2019) berjudul “Uji Fitokimia dan Aktivitas antioksidan Ekstrak Metanol Daun Zodia (*Evodia Suaveolens*)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak metanol daun zodia dan golongan senyawa dari metabolit sekunder ekstrak metanol daun zodia. Proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol selama 3 hari kemudian filtrat dipekatkan menggunakan *Rotary evaporator*. Potensi antioksidan dari ekstrak metanol daun zodia diuji menggunakan metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) dengan spektrofotometer UV-Vis sedangkan penentuan senyawa metabolit sekunder dari ekstrak metanol daun zodia dilakukan secara kualitatif menggunakan reagen. Hasil dari uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun tanaman zodia mengandung senyawa golongan alkaloid, flavonoid, dan tanin sedangkan uji kapasitas antioksidan ekstrak metanol zodia menggunakan metode DPPH menunjukkan nilai IC₅₀ sebesar 55,69 ppm. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun zodia memiliki aktivitas antioksidan kategori kuat (Ngibad & Lestari, 2019).
Penelitian ini mengadopsi metode yang sama pada pengujian penangkapan radikal bebas dengan metode DPPH dengan menggunakan pelarut metanol tetapi dengan sampel yang berbeda.
5. Penelitian (M.Rusdi dkk, 2018) berjudul “Perbandingan Metode Ekstraksi Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Batang *Boehmeria*

virgata". Penelitian ini menggunakan dua metode ekstraksi dan dilakukan perbandingan antar metode yaitu refluks dan maserasi terhadap kandungan etanol flavonoid dan aktivitas antioksidan batang *Boehmeria virgata*. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan dengan metode DPPH ekstrak parang romang yang didapatkan dengan metode refluks lebih baik dibandingkan metode maserasi karena kandungan flavonoid yang didapatkan lebih banyak (Rusdi, hasan, Ardillah, & Evianti, 2018).

Penelitian ini mengadopsi metode yang sama yaitu metode refluks.

6. Penelitian (Supriatna dkk, 2019) berjudul "Aktivitas Antioksidan, Kadar Total Flavonoid dan Fenol Ekstrak metanol Kulit Batang Mangrove Berdasarkan Stadia Pertumbuhannya". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil metabolit sekunder, aktivitas antioksidan, kadar total flavonoid dan total fenol dari ekstrak kulit batang dan kulit ari mangrove *Rhizophora mucronata* berdasarkan stadia pertumbuhannya. Hasil uji profil metabolit sekunder ekstrak kulit batang pada pohon mangrove *Rhizophora mucronata* dari Perairan Karangsong ditemukan senyawa golongan alkaloid, flavonoid, fenol hidrokuinon, tanin dan saponin, sedangkan profil metabolit sekunder yang didapat dari sampel kulit batang pada pancang dari Leuweung Sancang yaitu alkaloid, flavonoid, fenol hidrokuinon, triterpenoid, tanin, dan saponin. Hasil uji antioksidan pada sampel kulit batang pada pancang mangrove *Rhizophora mucronata* menunjukkan bahwa nilai IC₅₀ dari sampel Leuweung Sancang sebesar 65,59 µg/mL sedangkan untuk nilai IC₅₀ dari sampel kulit batang pada pohon mangrove *Rhizophora mucronata* dari Perairan Karangsong sebesar 84,80 µg/mL dan kadar total flavonoid kulit ari pada pancang mangrove *Rhizophora mucronata* dari Leuweung Sancang sebesar 269±0,05 mg QE/g ekstrak dan pada sampel

kulit batang pada pohon mangrove *R. mucronata* di Perairan Karangsong sebesar $20\pm0,16$ mg QE/g ekstrak sedangkan untuk kadar total fenol dari ekstrak kulit batang pancang dari Leuweung Sancang sebesar $148,14\pm0,3$ mg GAE/g ekstrak dan pada sampel kulit batang pada pohon mangrove *R. mucronata* di Perairan Karangsong Sebesar $164,13\pm0,15$ mg GAE/g ekstrak (Supriatna, Mulyani, Rostini, & Agung, 2019).

Penelitian ini mengadopsi metode yang sama yaitu menggunakan ekstrak metanol dan bagian tumbuhan yang sama yaitu kulit batang tetapi sampel yang berbeda. Peneliti juga melakukan perhitungan kadar total dengan menggunakan kesetaraan dengan asam galat untuk kadar total fenolik dan kesetaraan dengan quersetin untuk kadar total flavonoid.

7. Penelitian (Engin Celep, Mohammad Charehsaz, Selin Akyüz, Ebru Türköz Acar, Erdem Yesilada, 2015) berjudul “*Effect Of In Vitro Gastrointestinal Digestion On The Bioavailability Of Phenolic Components And The Antioxidant Potentials Of Some Turkish Fruit Wines*”. Pada penelitian ini dilakukan penilaian terhadap potensi antioksidan yang dilakukan secara *in vitro* dan melakukan penentuan kandungan total fenolik. Dalam penilaian terhadap potensi antioksidan yang dilakukan secara *in vitro* menggunakan beberapa metode yaitu aktivitas penangkap radikal DPPH, aktivitas penangkap H₂O₂, aktivitas antioksidan pereduksi tembaga (CUPRAC), dan aktivitas antioksidan total (TOAC). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah saat pengujian antioksidan menggunakan metode DPPH mendapatkan hasil nilai DPPH anggur murbei hitam lebih tinggi daripada anggur ceri. Untuk pengujian antioksidan dengan metode CUPRAC menunjukkan terjadinya aktivitas antioksidan terhadap sampel yang digunakannya yaitu pada anggur, untuk pengujian menggunakan metode

TOAC mendapatkan hasil yaitu terdapatnya aktivitas antioksidan terhadap sampel anggur (Celep, Charehsaz, Axkyuz, Acar, & Yesilada, 2015).

Peneliti mengadopsi metode yang sama yaitu pengujian penangkapan radikal bebas (metode DPPH, CUPRAC, dan TOAC).


8. Penelitian (Erum Iqbal, Kamariah Abu Salim, Linda B.L. Lim, 2015) berjudul “*Phytochemical Screening, Total Phenolics and Antioxidant Activities of Bark and Leaf Extracts of Goniothalamus velutinus (Airy Shaw) From Brunei Darussalam*”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melakukan pendahuluan skrining fitokimia dan menentukan total fenolik, flavonoid, kandungan flavonol dan aktivitas antioksidan dengan memakai metode DPPH, ABTS dan FRAP) dari ekstrak *G. Velutinus* yang dikumpulkan dari hutan Brunei Darussalam. Hasil yang didapatkannya memperlihatkan adanya beberapa fitokimia yang terkandung misalnya alakaloid, steroid, tanin dan glicosides pada ekstrak metanol kulit kayu dan daun *G. Velutinus*. Pada hasil antioksidan dengan sampel tersebut memperlihatkan kapasitas penanganan radikal atau kandungan antioksidan yang lebih besar dengan menggunakan metode DPPH dan menunjukkan nilai aktivitas antioksidan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tanaman obat lainnya (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).
Peneliti mengadopsi metode yang sama yaitu melakukan uji fitokimia pada sampel dan menentukan total fenolik dan flavonoid pada sampel yang digunakan serta pengujian penangkapan radikal bebas metode FRAP dan DPPH.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan kadar total fenolik, flavonoid, dan karotenoid ekstrak metanol dari akar, batang, kulit batang, daun dan buah tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob.
2. Untuk mengetahui perbandingan kapasitas antioksidan ekstrak metanol dari akar, batang, kulit batang, daun, dan buah pada tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi sumber informasi secara ilmiah dan wawasan masyarakat luas terkait khasiat tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. bagi kesehatan khususnya sebagai asupan antioksidan alami yang kapasitasnya setara dengan antioksidan sintetik sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tumbuhan Tengar (Ceriops tagal) (Perr.) C.B.Rob. (Perr.)*

C.B.Rob.

1. **Klasifikasi Tanaman** (Noor, M. Khazali, & N, 1999)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malpighiales
Famili	: Rhizophoraceae
Genus	: Ceriops
Spesies	: <i>Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.</i>



Gambar 1. Tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. (Perr.) C.B.Rob.
(Noor, M. Khazali, & N, 1999)

2. Nama Daerah

Tengar (Indonesia), bakau sakau (Sumatera Barat), bakau cokke (Selawesi Selatan).

3. Morfologi Tanaman

Tengar adalah nama tumbuhan dari marga *Ceriops*, suku Rhizophoraceae. Dari segi penampilan, tengar mirip dengan bakau, meski umumnya lebih kecil. Deskripsi umum dari *C. tagal* yaitu pohon kecil atau semak dengan ketinggian mencapai 25 m. Kulit kayu berwarna abu-abu, kadang-kadang coklat, halus dan pangkalnya menggelembung (Noor, M. Khazali, & N, 1999).

Akar banir dari bentukan seperti akar tunjang, kadang membentuk akar lutut atau akar nafas yang menonjol. Batang berkayu, warna coklat agak jingga. Bagian bawah batang terdapat banyak akar tunjang dengan panjang ± 50 cm. Percabangannya banyak dan tidak teratur. Hipokotil berbintil, berkulit halus, agak menggelembung dan seringkali agak pendek. Leher kotiledon menjadi kuning jika sudah matang/dewasa. Ukuran hipokotil silindris panjang 4-25 cm dan diameter 8-12 mm. Daun hijau mengkilap dan sering memiliki pinggiran yang melingkar ke dalam, ukuran daunnya 1-10 x 2-3,5 cm (Noor, M. Khazali, & N, 1999). Hasil penelitian menyatakan bahwa tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. mengandung metabolit sekunder berupa senyawa tanin (Nurmasitah, 2022). Daun tengar memiliki kandungan fenolik dan flavonoid dan menunjukkan sifat antioksidan terhadap 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), oksida nitrat, dan radikal bebas hidrogen peroksida (Shamsuzzaman & Kalaiselvi, 2021).

4. Kandungan Kimia

Hasil penelitian menyatakan bahwa tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* mengandung metabolit sekunder berupa senyawa tanin (Nurmasitah, 2022). Daun tengar memiliki kandungan fenolik dan flavonoid dan menunjukkan sifat antioksidan terhadap 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), oksida nitrat, dan radikal bebas hidrogen peroksida (Shamsuzzaman & Kalaiselvi, 2021).

Menurut (Qadri & Jamil, 1993) buah mengandung air (55,57%), protein (3,25% lipid (0,33%), serat (15,64%), dan karbohidrat (36,5%) dan *Hypocotyl* mengandung (63,17) air, protein (93,85%), serat (15,02) dan karbohidrat (30,66%). Selain itu buah dan *Hypocotyl* juga mengandung elemen seperti sodium, potassium, Na/K, magnesium, kalsium, sulfur dan alumunium. Komponen kimia yang terdapat pada tumbuhan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan nutrisi dalam tubuh dan meningkatkan imun.

5. Kegunaan

Tengar merupakan tumbuhan yang digunakan sebagai pengobatan tradisional. Bagian daun, bunga, dan buah digunakan sebagai obat setelah melahirkan untuk melancarkan nifas (Riziki & Leilani, 2017). Menurut (Noor, M. Khazali, & N, 1999). ekstrak kulit kayu tengar bermanfaat untuk persalinan. Sedangkan menurut (Canusa B. S., *et al.*, 2021). Kulit kayu tengar telah digunakan di Filipina untuk pengobatan tradisional diabetes mellitus (DM).

B. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak

dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain – lain (Departemen Kesehatan RI, 2000). Ekstraksi dengan pelarut didasarkan pada sifat kepolaran zat dalam pelarut saat ekstraksi. Senyawa polar hanya akan larut pada pelarut polar, seperti etanol, metanol, butanol dan air. Senyawa non-polar juga hanya akan larut pada pelarut non-polar, seperti eter, kloroform dan n-heksana (Gritter, Bobbitt, & Schwarting, 1991). Pelarut non polar (n-heksana, aseton) dapat mengekstrak likopen, triterpenoid dan sebagian kecil karotenoid, sedangkan senyawa xanthin dan senyawa polar lainnya akan terekstrak ke dalam pelarut polar (metanol, etanol) (Arifulloh, 2013). Sedangkan pelarut semi polar mampu menarik senyawa termasuk likopen, β-karoten, vitamin C, padatan terlarut dan total fenol. Pelarut yang digunakan harus dapat melarutkan zat yang diinginkannya, mempunyai titik didih yang rendah, murah, tidak toksik dan mudah terbakar (Harborne, 1987).

Pemilihan pelarut yang sesuai merupakan faktor penting dalam proses ekstraksi. Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang dapat menyari sebagian besar metabolit sekunder yang diinginkan dalam simplisia. Metanol merupakan pelarut yang bersifat universal sehingga dapat melarutkan analit yang bersifat polar dan nonpolar. Metanol dapat menarik alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari tanaman (Dapartemen Kesehatan RI, 2009).

Penggunaan pelarut metanol pada ekstrak dipilih karena metanol merupakan pelarut universal yang bersifat mampu melarutkan hampir semua komponen baik yang bersifat nonpolar, semi polar, dan polar (Supriatna, Mulyani, Rostini, & Agung, 2019).

Metode yang diterapkan dalam penelitian obat tradisional adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode yang diterapkan berdasarkan sifat dan senyawa yang terkandung di dalamnya. Target tindakan perlu dilakukan sebelum memilih metode, berikut beberapa tindakan (Mukhriani, 2014) :

1. Senyawa yang termasuk bioaktif yang tidak diketahui sumbernya
2. Senyawa yang bersumber pada suatu organisme tertentu
3. SeSampel senyawa di dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.

Jenis – jenis metode ekstraksi antara lain (Departemen Kesehatan RI, 2000) :

1. Metode Dingin

Pada metode ini tidak dilakukan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung dengan tujuan agar senyawa yang diinginkan tidak menjadi rusak. Beberapa metode ekstraksi suhu dingin, sebagai berikut :

a. Maserasi

Maserasi merupakan metode ekstraksi sederhana, Sering digunakan. Prinsip kerjanya dengan merendam serbuk simplisia dan pelarut dalam satu wadah inert dengan kondisi tertutup rapat dan suhu ruangan.

b. Perkolasi

Perkolasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (lengkap), biasanya dalam Suhu kamar. Prosesnya meliputi tahapan perkembangan bahan, tahap maserasi menengah, tahap perkolasii sebenarnya (ekstrak penyimpanan), berturut-turut sampai jumlah ekstrak yang diperoleh adalah 1-5 kali bahan.

2. Metode Panas

Pada metode ini dilakukan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan cara dingin. Beberapa metode ekstraksi suhu panas, sebagai berikut :

a. Refluks

Refluks merupakan metode ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik didih, waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Umumnya selesai proses tersebut hingga 3-5 kali untuk residu pertama agar termasuk proses ekstraksi sempurna.

b. Soxhlet

Soxhlet merupakan metode ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat spesifik sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif dengan adanya pendinginan balik.

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40 - 50°C.

d. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C) selama waktu tertentu (15 - 20 menit).

e. Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (~30°C) dan temperatur sampai titik didih air.

C. Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder merupakan sebagian kecil karbon, nitrogen, dan energi juga digunakan untuk mensintesis molekul organik yang tidak memiliki peran secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan. Metabolit sekunder pada tumbuhan umumnya bersifat sangat spesifik dalam hal fungsi dan tidak terlalu penting karena jika tidak diproduksi, dalam jangka pendek tidak menyebabkan

kematian. Biosintesis metabolit sekunder dapat terjadi pada semua organ tumbuhan, termasuk di akar, pucuk, daun, bunga, buah, dan biji (Anggrafto, *et al.*, 2018).

Metabolit sekunder pada tanaman diketahui memberikan efek farmakologis, termasuk antioksidan, sitotoksik, antimikroba dan antivirus. Salah satu metabolit sekunder yang penting pada tumbuhan adalah flavonoid (Alfaridz & Amalia, 2018).

Metode yang umumnya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa yang terdapat dalam tanaman yaitu penapisan fitokimia. Penapisan fitokimia adalah uji pendahuluan untuk memperoleh adanya gambaran kandungan senyawa pada tumbuhan. Hasil penapisan fitokimia digambarkan dengan terjadinya perubahan warna visual (Dewatisari, 2020).

1. Klasifikasi Metabolit Sekunder pada Tumbuhan:

a. Flavonoid

Flavonoid adalah metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada banyak tanaman. Sumber utama flavonoid adalah produk buah (misalnya buah jeruk, aprikot, ceri, anggur, kismis hitam, apel), dan sayuran (misalnya bawang merah, brokoli, tomat, bayam), minuman (anggur merah, kopi, teh), biji kakao, produk kedelai dan herbal. Flavonoid mempunyai struktur kimia C₆-C₃-C₆, dua cincin aromatik diikat melalui penghubung tiga rantai karbon. Flavonoid dapat berupa aglikon, glikon, dan turunan dari metilat (Anggrafto, *et al.*, 2018).

Pada dasarnya struktur flavonoid adalah aglikon. Analisis flavonoid yang terdapat pada tanaman dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya senyawa kimia alami, struktur yang kompleks, fisikokimia, dan konsentrasi dari flavonoid yang berubah tergantung matriks. Flavonoid banyak digunakan dalam dunia kesehatan bukan karena tanpa alasan melainkan karena aktivitas biologis yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Aktivitas biologis dari flavonoid diantaranya sebagai

antioksidan, hepatoprotektor, antibakteri, antiinflamasi, antikanker, dan aktivitas antivirus. Aktivitas yang dimiliki oleh flavonoid ini berhubungan dengan struktur dari flavonoid (Anggraito, *et al.*, 2018).

b. Alkaloid

Alkaloid merupakan famili besar, terdiri dari >15.000 MS yang mengandung nitrogen. Persenjawaan ini ditemukan pada hampir 20% spesies tumbuhan berpembuluh. Alkaloid paling dikenal karena efek farmakologisnya yang langsung terhadap vertebrata. Alkaloid biasanya disintesis dari salah satu asam amino tertentu, yaitu lisin, tirosin, dan triptofan (Anggraito, *et al.*, 2018).

Senyawa alkaloid mengandung satu atau lebih senyawa nitrogen pada bagian cincin heterosiklik. Alkaloid memiliki efek antioksidan. Sebagai antioksidan, alkaloid mampu melindungi sel dari toksisitas dan kerusakan genetik akibat oksidan H₂O₂ (Anggraito, *et al.*, 2018).

c. Saponin

Saponin adalah golongan senyawa glikosida, dapat membentuk larutan koloidal dalam air dan membuih bila dikocok. Saponin memberikan rasa pahit menusuk. Saponin merupakan antioksidan sekunder, mampu menghambat peroksidasi lipid dengan cara membentuk hidroperoksida (Anggraito, *et al.*, 2018).

d. Fenol

Tumbuhan memproduksi berbagai jenis metabolit sekunder yang mengandung gugus fenol, suatu hidroksil fungsional pada cincin aromatik. Senyawa ini diklasifikasikan sebagai senyawa fenolik atau fenolik. Senyawa fenolik biasanya dikaitkan dengan respon pertahanan pada tumbuhan. Meskipun demikian senyawa fenolik juga berperan penting dalam proses-proses lain, misalnya atraktan zat untuk mempercepat polinasi, warna untuk kamuflase dan

pertahanan terhadap herbivor, dan aktivitas antibakteri dan antifungi (*Anggraito, et al.*, 2018).

2. Metode Identifikasi Metabolit Sekunder (Julianto, 2019)

Penentuan struktur molekul tertentu menggunakan data dari berbagai teknik spektroskopi seperti UV-Vis, *Infrared* (IR), *Nuclear Magnetic Resonance* (NMR), dan spektroskopi massa. Prinsip dasar spektroskopi adalah melewatkannya radiasi elektromagnetik melalui molekul organik yang menyerap sebagian radiasi, tetapi tidak semuanya. Dengan mengukur jumlah penyerapan radiasi elektromagnetik, spektrum dapat diproduksi. Spektrum spesifik untuk ikatan tertentu dalam suatu molekul. Tergantung pada spektrum ini, struktur molekul organik dapat diidentifikasi. Para ilmuwan terutama menggunakan spektrum yang dihasilkan dari tiga atau empat wilayah — Ultraviolet (UV), Tampak (Visible), Inframerah (IR), gelombang radio, dan berkas elektron—untuk klarifikasi struktural.

- a. Spektroskopi UV-tampak dapat dilakukan untuk analisis kualitatif dan untuk identifikasi kelas tertentu dari senyawa dalam campuran murni dan biologis. Lebih disukai, spektroskopi UV-tampak dapat digunakan untuk analisis kuantitatif karena molekul-molekul aromatik adalah kromofor kuat dalam rentang UV. Senyawa alami dapat ditentukan dengan menggunakan spektroskopi UV-tampak. Senyawa fenolik termasuk anthocyanin, tanin, pewarna polimer, dan fenol membentuk kompleks dengan besi yang telah terdeteksi oleh spektroskopi ultraviolet-tampak (UV-Vis). Selain itu, teknik spektroskopi UV-Vis diketahui menjadi kurang selektif dalam memberikan informasi tentang komposisi kandungan polifenol total. Spektroskopi UV-Vis dapat digunakan untuk menentukan total fenolik ekstrak (280 nm), flavones (320 nm), asam fenolik (360 nm), dan total anthosianid (520 nm). Teknik ini

tidak memakan waktu, dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan teknik lain.

b. Spektroskopi inframerah

Beberapa frekuensi akan diserap ketika cahaya inframerah melewati sampel senyawa organik; Namun, beberapa frekuensi akan ditularkan melalui sampel tanpa terjadi penyerapan. Penyerapan inframerah terkait dengan perubahan vibrasi yang terjadi di dalam molekul ketika terkena radiasi inframerah. Oleh karena itu, spektroskopi inframerah pada dasarnya dapat digambarkan sebagai spektroskopi vibrasi. Obligasi yang berbeda (C-C, C=C, C-C, C-O, C=O, O-H, dan N-H) memiliki frekuensi vibrasi yang beragam. Jika jenis-jenis ikatan ini ada dalam suatu molekul organik, mereka dapat diidentifikasi dengan mendekripsi pita penyerapan frekuensi karakteristik dalam spektrum inframerah.

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) adalah alat analisis resolusi tinggi untuk mengidentifikasi kandungan kimia dan menguraikan senyawa struktural. FTIR menawarkan investigasi yang cepat dan tidak rusak untuk ekstrak atau bubuk herbal sidik jari.

c. Spektroskopi resonansi magnetik Inti – *Nuclear Magnetic Resonance* (NMR)

Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti (NMR) terkait dengan sifat-sifat magnetik dari inti atom tertentu; terutama inti atom hidrogen, proton, karbon, dan isotop karbon. Spektroskopi NMR telah memungkinkan banyak peneliti untuk mempelajari molekul dengan merekam perbedaan antara berbagai inti magnetik, dan dengan demikian memberikan gambaran yang jelas tentang apa posisi inti-inti ini dalam molekul. Selain itu, ia akan menunjukkan atom-atom mana yang ada di Sampel tetangga. Pada akhirnya, itu dapat menyimpulkan berapa banyak atom yang hadir di masing-masing lingkungan. Beberapa upaya

telah dilakukan di masa lalu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif atau semi preparatif, kromatografi cair, dan kromatografi kolom untuk mengisolasi masing-masing fenol, struktur yang ditentukan selanjutnya oleh NMR secara *off-line*.

d. Spektrometri massa untuk identifikasi senyawa kimia

Molekul organik dibombardir dengan elektron atau laser dalam spektrometri massa dan dengan demikian diubah menjadi ion bermuatan, yang sangat energik. Spektrum massa adalah plot dari kelimpahan relatif ion terfragmentasi terhadap rasio massa / muatan ion-ion ini. Menggunakan spektrometri massa, massa molekul relatif (berat molekul) dapat ditentukan dengan akurasi tinggi dan rumus molekul yang tepat dapat ditentukan dengan pengetahuan tentang tempat-tempat di mana molekul telah terfragmentasi. Dalam karya sebelumnya, molekul bioaktif dari empular diisolasi dan dimurnikan dengan ekstraksi pelarut bioaktivitas yang dipandu, kromatografi kolom, dan HPLC. Teknik UV-Vis, IR, NMR, dan spektroskopi massa digunakan untuk mengkarakterisasi struktur molekul bioaktif. Selanjutnya, molekul dapat dihidrolisis dan turunannya dicirikan.

Spektrometri massa memberikan informasi yang melimpah untuk elusidasi struktural senyawa ketika tandem mass spectrometry (MS) diterapkan. Oleh karena itu, kombinasi HPLC dan MS memfasilitasi identifikasi senyawa kimia yang cepat dan akurat dalam ramuan obat, terutama ketika standar murni tidak tersedia. Baru-baru ini, LC/MS telah banyak digunakan untuk analisis senyawa fenolik. Ionisasi elektrospray (ESI) adalah sumber yang disukai karena efisiensi ionisasi yang tinggi untuk senyawa fenolik.

D. Radikal Bebas

Radikal bebas adalah molekul yang terdiri dari elektron yang tidak berpasangan pada orbit luarnya. Sifat radikal bebas tidak stabil dan cenderung reaktif dimana akan bereaksi dengan molekul di dalam tubuh hingga mencapai keadaan stabil. Sifat reaktif ini akan menghasilkan rantai reaksi pada tiap pembentukannya. Oleh karena itu, akan membentuk senyawa yang tidak normal dengan pengaruh yang buruk yang selanjutnya akan memulai reaksi berantai lainnya sehingga dapat menyebabkan *cell damage* penting yang terdapat dalam tubuh. Radikal bebas diatasi dengan melakukan peredaman menggunakan antioksidan (Tristantini, 2016).

Sumber radikal bebas berasal dari faktor eksogen dan endogen. Radikal endogen diperoleh dari proses metabolisme normal yang terjadi dalam tubuh. Sementara pada radikal eksogen bersumber dari bahan pencemaran lingkungan yang masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, pencernaan dan kulit. Banyaknya radikal bebas dapat terjadinya peningkatan yang disebabkan oleh faktor stress, radiasi, asap rokok dan populasi lingkungan yang menyebabkan sistem pertahanan tubuh tidak memadai sehingga tubuh membutuhkan antioksidan tambahan dari luar yang dapat melindungi dari serangan radikal bebas (Afrizal, Perdana, & Suryati, 2022).

Radikal bebas dalam sistem tubuh sebagian besar berasal dari radikal turunan oksigen yaitu ROS (*reactive oxygen species*). Adapun jenis turunan nitrogen yaitu RNS (*reactive nitrogen species*). Senyawa radikal bebas seperti radikal hidroksil ($\bullet\text{OH}$), peroksil ($\bullet\text{OOH}$) dan superoksida ($\text{O}_2 - \bullet$) sedangkan senyawa non radikal bebas seperti oksigen singlet ($^1\text{O}_2$) dan hidrogen peroksid (H_2O_2), radikal bebas berbahaya akan tetapi, lebih berbahaya dengan adanya faktor lingkungan. ROS merupakan senyawa yang berasal dari oksigen yang dibutuhkan oleh semua organisme yang bersifat aerobik. Manusia membutuhkan oksigen untuk

menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi makhluk hidup melalui oksidatif fosforilasi yang terjadi pada mitokondria (Zulaikhah, 2017).

Radikal bebas memiliki reaktifitas yang tinggi, yaitu sifatnya yang sangat menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di sekitarnya. Senyawa radikal bebas juga dapat mengubah suatu molekul menjadi radikal bebas. Senyawa radikal bebas di dalam tubuh dapat merusak asam lemak tak jenuh ganda pada membran sel yang mengakibatkan dinding sel menjadi rapuh. Senyawa radikal bebas ini berpotensi merusak DNA sehingga mengacaukan sistem genetika, dan berlanjut pada pembentukan sel kanker. Jaringan lipid juga akan dirusak oleh senyawa radikal bebas sehingga terbentuk peroksida yang memicu munculnya penyakit degeneratif (Winarsi, 2013). Reaksi oksidatif tidak hanya menyerang komponen lipid, tetapi juga komponen penyusun sel lainnya, seperti protein, lipoprotein, maupun DNA. Radikal bebas dapat merusak 3 senyawa penting yang berperan untuk mempertahankan integritas (Lampe, 2010), yaitu :

- a. Asam lemak, terutama asam lemak tak jenuh yang merupakan komponen penting fosfolipid penyusun membran sel.
- b. DNA, merupakan perangkat genetik sel.
- c. Protein, berperan sebagai enzim, reseptör, antibodi dan penyusun matriks serta sitoskeleton.

E. Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang menunda, memperlambat, atau menghambat reaksi oksidasi (Ngibad & Lestari, 2019). Klasifikasi antioksidan meliputi antioksidan enzimatik dan nonenzimatik. Antioksidan enzimatik juga dikenal sebagai antioksidan endogen oleh enzim superokksida dismutase (SOD), glutation reduktase (GR), katalase (CAT), glutation peroksidase (GPX), dan enzim – enzim yang memiliki pelindung jaringan atau sel dari kerusakan oksidatif radikal

bebas seperti hidroksil, peroksid, peroksil, dan hidrogen peroksid. Sedangkan antioksidan non-enzimatik atau antioksidan eksogen terdapat dalam Sayuran dan buah-buahan, karena mengandung senyawa vitamin C, Glutathione (GSH), beta-karoten, isoflavon, flavonoid, katekin, antosianin dan asam lemak Asam Alfa Lipoat. Dengan bantuan senyawa ini untuk melindungi sel-sel dalam tubuh terhadap radikal bebas (Zulaikhah, 2017).

Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, antioksidan dibagi menjadi 3, yaitu antioksidan primer, sekunder dan tersier (Sayuti & Yenrina, 2015) :

a. Antioksidan primer

Antioksidan primer adalah antioksidan yang sifatnya sebagai pemutus reaksi berantai (*chain-breaking antioxidant*) yang bisa bereaksi dengan radikal-radikal lipid dan mengubahnya menjadi produk-produk yang lebih stabil. Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal baru, yaitu mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang kurang dampak negatifnya sebelum senyawa radikal bebas bereaksi. Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal, produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk awal.

b. Antioksidan sekunder

Antioksidan sekunder bekerja dengan cara pengkelatan logam yang bertindak sebagai prooksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Antioksidan sekunder berperan sebagai pengikat ion-ion logam, penangkap oksigen, pengurai hidroperoksid menjadi senyawa non radikal, penyerap radiasi UV atau deaktivasi singlet oksigen.

c. Antioksidan primer

Antioksidan tersier bekerja memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan radikal bebas. Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua Sampel, yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia) dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). Beberapa contoh antioksidan sintetik yang diizinkan penggunaannya secara luas di seluruh dunia untuk digunakan dalam makanan adalah *Butylated Hydroxyanisole* (BHA), *Butylated Hydroxytoluene* (BHT), *Tert-Butylated Hydroquinone* (TBHQ) dan tokoferol. Antioksidan tersebut merupakan antioksidan yang telah diproduksi secara sintetis untuk tujuan komersial.

Metode penentuan aktivitas antioksidan dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan reaksi kimia yang mungkin terlibat: *Hydrogen Atom Transfer* (HAT) dan *Single Electron Transfer* (SET). Hasil akhir yang diperoleh sama, terlepas menurut prosedur reaksi yang terlibat, meskipun kinetika dan tahapan reaksinya berbeda. Reaksi SET dan HAT ditambah menggunakan reaksi pertukaran proton bisa terjadi secara paralel menggunakan reaksi utama, dan pada hal ini prosedur mayoritas pada sistem eksklusif bergantung dalam antioksidan struktur dan sifat, kelarutan dan koefisien partisi, dan sistem pelarut (Munteanu & Apetrei, 2021).

1. Pengujian Berdasarkan Transfer Atom Hidrogen (HAT)

Tes berdasarkan transfer atom hidrogen mengukur kemampuan antioksidan untuk menghilangkan radikal bebas dengan menyumbangkan atom hidrogen (Munteanu & Apetrei, 2021).

- a. Tes ORAC (*Oxygen Radical Absorption Capacity*) mengukur kemampuan pemecahan reaksi berantai radikal oleh antioksidan melalui pemantauan penghambatan oksidasi radikal peroksil. Peroksil radikal dicirikan sebagai radikal bebas yang mendominasi oksidasi lipid pada sistem biologis dan

pula pada bahan makanan, dalam syarat fisiologis. Akibatnya, ORAC nilai-nilai dihargai oleh peneliti spesifik menjadi relevan secara biologis, tolok ukur buat efisiensi antioksidan.

- b. Tes HORAC (*Hydroxyl Radical Antioxidant Capacity*) metode ini mengevaluasi kemampuan proteksi terhadap pembentukan gugus hidroksil radikal melalui kompleks Co(II). Fluorescein diinkubasi menggunakan sampel buat dianalisis, lalu campuran Fenton (generator radikal hidroksil) ditambahkan. Fluoresensi orisinil diukur, lalu pembacaan dilakukan setiap menit sehabis pengadukan. asam galat larutan standar menggunakan konsentrasi yang berbeda dipakai untuk membuat kurva kalibrasi. Uji kapasitas antioksidan radikal hidroksil (HORAC) memberikan pengukuran langsung kapasitas antioksidan melawan radikal hidroksil dengan mengganggu reaksi radikal.
- c. Tes TRAP (*Total Peroxyl Radical Trapping Antioxidant Parameter*) uji TRAP berdasarkan pada kapasitas antioksidan untuk menghambat reaksi antara radikal peroksil dan molekul target, yang awalnya mewakili konsumsi O₂ (sebagai sampel) pada proses peroksidasi yang dipicu oleh dekomposisi termal dari 2,2' azobis (2-amidinopropana) dihidroklorida (ABAP). Waktu keterbelakangan O₂ penyerapan, yaitu, periode induksi, bisa diukur secara kuantitatif dan dipakai untuk menyatakan kapasitas antioksidan total sampel menjadi nilai TRAP. Dari dulu, metode ini sudah dimodifikasi beberapa kali memakai rentang sampel yang lebih luas, inisiator dan pengukuran titik akhir, contohnya enzim AAPH dan peroksidase adalah digunakan menjadi inisiator, dan fluorescein, dihydrofluorescein diacetate (DCFH-DA) dan luminol sebagai pengukuran titik akhir reaksi.

- d. Tes TOSC (*Total Oxyradical Scavenging Capacity*) didasarkan pada penghambatan pembentukan etilen (reaksi kontrol dipantau dengan kromatografi gas) dengan adanya senyawa antioksidan yang bersaing dengan asam -keto- γ -bethiolbutiric (KMBA) untuk ROS. Tes ini menggunakan area di bawah kurva konsentrasi etilen dibandingkan dengan waktu reaksi (hingga 300 menit).

2. Pengujian Berdasarkan Single Electron Transfer (SET)

Tes berdasarkan *Single Electron Transfer* untuk mendeteksi kemampuan antioksidan untuk mentransfer elektron untuk mengurangi ion logam, gugus karbonil dan radikal bebas.

- a. Tes CUPRAC telah diterapkan pada berbagai matriks yang mengandung antioksidan lipofilik dan hidrofilik. Metode ini dapat digunakan untuk penentuan kapasitas antioksidan makanan konstituen oleh reagen Cu²⁺-*neocuproine* sebagai agen pengoksidasi kromogenik. Reduksi Cu²⁺ dengan adanya *neocuproine* oleh zat pereduksi menghasilkan kompleks Cu⁺ dengan puncak absorpsi maksimum pada 450 nm. Reagen oksidan kromogenik dari uji CUPRAC, Cu²⁺-Nc, bereaksi dengan zat antioksidan pereduksi n-elektron (AOX).
- b. Tes FRAP adalah metode berbasis SET tipikal yang mengukur pengurangan kompleks ion besi (Fe³⁺)-ligan ke kompleks besi yang sangat biru (Fe²⁺) melalui antioksidan dalam lingkungan asam. Aktivitas antioksidan ditentukan sebagai peningkatan absorbansi pada 593 nm, dan hasilnya dinyatakan sebagai ekivalen mikromolar Fe²⁺ atau dalam kaitannya dengan antioksidan standar. Tidak seperti metode berbasis SET lainnya, tes FRAP adalah dilakukan dalam kondisi pH asam (pH = 3,6) untuk menjaga kelarutan besi. Reaksi rendah pH menurunkan potensial ionisasi yang

mendorong transfer elektron dan meningkatkan redoks potensial, menyebabkan pergeseran mekanisme reaksi dominan.

- c. Metode Folin–Ciocalteu adalah metode terkenal yang bertujuan untuk menentukan total kandungan fenolik (TPC). Tes Folin-Ciocalteu banyak digunakan dalam studi klinis dan nutrisi untuk mengukur kandungan polifenol total dalam makanan yang berasal dari tumbuhan dan sampel biologis. Metode ini awalnya dirancang untuk menganalisis protein, tetapi kemudian diadopsi oleh Singleton, Orthofer dan Lamuela-Raventos (1999) untuk menganalisis komponen fenolik dalam anggur, setelah itu menjadi tes rutin untuk evaluasi antioksidan makanan dan tanaman ekstrak.
- d. Tes Mode Campuran (HAT/SET) ini umumnya didasarkan pada eliminasi stabil kromofor (like 2,2'-azinobis-3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonic acid) (ABTS) dan 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH)), di mana mekanisme HAT, ET, dan transfer elektron berpasangan proton (PCET) mungkin memainkan peran yang berbeda. peran dalam proporsi yang bervariasi, tergantung pada kondisi reaksi yang sesuai (seperti pH dan pelarut). Uji mode campuran (HAT/SET) terutama mencakup uji kapasitas antioksidan setara ABTS/Trolox (TEAC), uji neutralisasi radikal DPPH, dan uji neutralisasi radikal N,N-dimetil-p-fenilendiamin dihidroklorida (DMPD).
- e. Tes ABTS (TEAC) (*Trolox Equivalent Antioxidant Capacity*) pertama kali dikembangkan oleh Miller dan timnya (1993) sebagai metode sederhana dan mudah digunakan untuk mengukur kapasitas antioksidan total (TAC). tes mengukur kapasitas antioksidan untuk menetralkan 2,2'-azinobis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonic acid) (ABTS^{•+}) kation radikal stabil, kromofor biru-hijau dengan serapan maksimum pada 734 nm, yang intensitasnya menurun dengan adanya antioksidan. ABTS^{•+} dapat

dihasilkan dari ABTS dengan adanya agen antioksidan kuat. Derajat perubahan warna dari warna biru-hijau, diukur sebagai penurunan mendadak dalam absorbansi ke 734 nm, tergantung pada durasi reaksi, aktivitas antioksidan intrinsik, dan konsentrasi sampel.

- f. Uji DPPH (*2,2-di(4-tert-oktilfenil)-1-pikrilhidrazil*) netralisasi didasarkan pada pendonoran elektron dari antioksidan untuk menetralkan radikal DPPH. Reaksi disertai dengan perubahan warna DPPH diukur pada 517 nm, dan perubahan warna bertindak sebagai indikator aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan dengan metode netralisasi DPPH sering dilaporkan sebagai EC₅₀, yang didefinisikan sebagai konsentrasi efisien antioksidan yang diperlukan untuk mengurangi konsentrasi DPPH awal sebesar 50%. Selain itu, TEC₅₀ dapat digunakan, yang merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan setimbang dengan EC₅₀.

Antioksidan memiliki manfaat bagi kesehatan dalam mencegah proses penuaan dan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan lain - lain. Antioksidan memiliki potensi untuk meredam radikal bebas dalam tubuh dari hasil metabolisme tubuh, asap rokok, sinar matahari dan lain - lain. Antioksidan dapat diperoleh secara alami dari berbagai tanaman di Indonesia. Antioksidan juga dapat diperoleh dari obat-obatan sintetis seperti vitamin C atau asam askorbat, N-asetil sistein, dan sebagainya (Werdhasari, 2014).

F. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tumbuh – tumbuhan sebagai Obat

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu, baik ilmu hukum sampai ilmu alam terkandung dalam Al-Qur'an. Selain memuat disiplin ilmu fungsi Al-Qur'an adalah sebagai

petunjuk baik bagi orang yang bertaqwa maupun bagi orang yang berakal yang mau menggunakan akal pikirannya untuk mempelajari segala sesuatu yang telah Allah ciptakan diseluruh jagad raya. Hal ini dijelaskan Allah Swt dalam QS. Ali-‘Imran/3:190-191 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَئِكَ الْأَلْيَابِ^{١٩٠}
 ◇ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ^{١٩١}

Terjemahnya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.” (Q.S Ali-‘Imran:190-191).

Firman Allah Swt dalam Ali-‘Imran ayat 190 dan 191 tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt mewajibkan kepada umatNya (manusia) supaya mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang kejadian langit dan bumi serta rahasia-rahasianya dan manfaat-manfaat yang terkandung didalamnya yang menunjukkan pada ilmu yang sempurna. Sebagaimana kata “*Ulul albab*” yang artinya orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah darinya, hidayah darinya, dan menggambarkan keagungan Allah Swt dalam setiap keadaan (Shihab, 2009). Manusia dianjurkan untuk selalu memikirkan tentang kejadian di langit dan di bumi, dalam hal ini dapat melalui pengadaan penelitian, sehingga mereka dapat mengetahui kekuasaan Allah Swt serta manfaat-manfaat dari sesuatu yang diciptakan Allah Swt baik yang berada di langit maupun di bumi.

Berdasarkan surah Ali-'Imran ayat 190 dan 191, Allah Swt juga memerintahkan umat Islam untuk melihat, merenungkan tanda-tanda bahwa Allah Swt Maha Agung yang tampak dari ciptaanNya. Selain melihat dan merenungkan juga memikirkan hikmah yang dapat diambil dari ciptaan Allah Swt tersebut salah satunya yaitu berupa tumbuhan yang baik dan beranekaragam serta memiliki manfaat yang sangat banyak. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Thaha/20:53, Allah Swt berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَبَاتٍ شَتِّي

Terjemahnya:

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kementrian Agama RI, 2019).

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kuasa, pengetahuan dan penciptaan Allah Swt. yang sempurna telah memberikan suatu kenikmatan dalam kehidupan begitupula Dia telah sangat memelihara setiap hamba-Nya. Bumi dijadikan sebagai hamparan untuk manusia, membentangkan jalan-jalan yang dapat dilalui serta diturunkannya hujan di muka bumi ini hingga akhirnya tercipta sungai dan danau. Dengan turunnya air dengan perantaraan hujan maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang beragam dengan perbedaan jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya (pengobatan). Ada tumbuhan dengan warna bermacam-macam seperti hitam dan putih, dan memiliki variasi rasa seperti manis dan pahit (Shihab, 2009).

Ayat di atas menjelaskan tentang kebesaran-Nya dengan keberagaman tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt. Salah satu bukti keberagaman tumbuhan adalah dengan diciptakannya tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* yang memiliki manfaat bagi manusia.

Salah satu ciptaan Allah Swt di bumi yang memiliki banyak manfaat adalah tumbuh-tumbuhan. Diantara manfaat tumbuhan yang beranekaragam, salah satunya digunakan sebagai obat untuk penyembuhan penyakit. Dalam hadits shohih, terdapat banyak riwayat yang menganjurkan manusia untuk berobat, bahkan menganjurkan kaum muslimin untuk menjalani beberapa metode pengobatan guna mengatasi berbagai masalah penyakit. Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah dia berkata bahwa Nabi bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Swt.” (HR.Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa disamping tawakkal setiap orang harus berikhtiar untuk mencari obat Ketika orang tersebut ditimpa suatu penyakit. Hal ini dikarenakan Allah Swt tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Swt telah menurunkan pula obatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits tersebut.

Berdasarkan QS. Thaha/20:53, Allah Swt juga memerintahkan umat Islam untuk merasakan kenikmatan, kesenangan dan juga manfaat pada tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Allah swt untuk manusia serta hewan ternaknya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Abasa/80: 27-32, Allah Swt berfirman:

فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبَّاً وَعَنَبَا وَقَضْبَا لَوْزَيْتُونَا وَنَخْلًا وَحَدَّاقَ غُلْبَا وَفَاكِهَةَ وَأَبَا
مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَمِكُمْ

Terjemahnya:

“Lalu, Kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun (yang) rindang, buah-buahan, dan rerumputan. (Semua itu disediakan) untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu” (Kementerian Agama RI, 2019).

Firman Allah Swt dalam surah Abasa ayat 27-32 tersebut Yang dimaksud kenikmatan oleh Allah menurut Ibnu Katsir adalah Seperti halnya anggur, al-Qadb yang berarti sejenis sayuran yang dimakan oleh ternak dengan mentah-mentah. Seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Qatadah, Ad-Dahhak dan As-Saddi, dan Hasan al-Basri mengatakan al-Qadb adalah makanan ternak. Buah zaitun dapat dijadikan lauk, begitu pula dengan minyaknya yang dapat digunakan untuk meminyaki tubuh dan sebagai bahan bakar penerangan. Sedangkan buah kurma dapat dimakan dalam keadaan gemading atau sudah masak, dapat dijadikan sale, dan perasannya dapat diminum serta dijadikan cuka. Kata Ghulban diartikan kebun-kebun yang rindang. Menurut al-Hasan al-Basri dan Qatadah Qhulban adalah pohon kurma yang besar lagi rindang. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid adalah pepohonan yang lebat dan dapat dijadikan naungan. Kata Fakihah diartikan sebagai semua jenis buah-buahan yang dimakan untuk bersenang-senang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Fakihah adalah buah yang dimakan dalam keadaan segar, sedangkan al-abb diartikan sebagai tetumbuhan yang hanya dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan manusia. Dalam ayat ini dan selanjutnya Allah menyebutkan beberapa macam tumbuh-tumbuhan: pertama, Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian seperti gandum, padi, dan lain-lainnya yang menjadi makanan pokok. Kedua dan ketiga, Allah menumbuhkan pula buah anggur dan bermacam sayuran yang dapat dimakan secara langsung. Keempat dan kelima, buah zaitun dan pohon kurma. Keenam, kebun-kebun yang besar, tinggi, dan lebat buahnya. Tidak hanya buahnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi pohnnya pun dapat dijadikan bahan bangunan dan alat-alat perumahan. Ketujuh, bermacam-macam buah-buahan yang lain, seperti buah

pir, apel, mangga, dan sebagainya. Kedelapan, berbagai macam rumput-rumputan (E.M G, M, & A,I, 2004).

Salah satu tumbuhan Allah Swt di bumi adalah tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. yang memiliki manfaat bagi manusia yaitu dalam dunia kesehatan yang dapat digunakan sebagai pengobatan atau biasa disebut dengan tanaman obat (herbal).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif berupa penetapan kadar fenolik, flavonoid dan karotenoid total dan analisis kapasitas antioksidan pada tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. dengan metode DPPH, FRAP, CUPRAC dan TOAC.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan eksperimental laboratorium.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Kimia Analisis, dan Laboratorium Kimia Instrumen Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Agustus 2022.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah tanaman tengar yang diperoleh dari Desa Manjalling, Kec Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan adalah akar, batang, kulit batang, daun, dan buah tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob..

D. Prosedur Kerja

1. Alat Penelitian

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat gelas, oven (Memmert), seperangkat alat refluks, spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis), timbangan analitik (AND GR-200), vakum *rotary evaporator*, vortex mixer (GEMMY VM-300), dan waterbath (Memmert).

2. Bahan Penelitian

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain air suling, aluminium klorida (Merck), amonium asetat (Merck), amonium molibdat (Pudak), asam galat (Merck), asam sulfat (Merck), aseton (Merck)), tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob., besi (III) klorida (Merck), *folin-ciocalteu* (Merck), kalium dihidrogen fosfat (Pudak), kuersetin ($C_{15}H_{10}O_7$), metanol (Merck), natrium hidroksida (Pudak), natrium asetat (Merck), *neocuproine* (Sigma aldrich), tembaga (II) klorida (Pudak), vitamin C (asam askorbat), *1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl* (DPPH), *2,4,6-Tri-(2-Pyridyl)-5-Triazine* (TPTZ) (Sigma).

3. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar, batang, kulit batang, daun, dan buah tengar. Sampel tersebut diambil di Desa Manjalling, Kec Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

b. Pengolahan sampel

Sampel yang telah diambil dicuci dengan air yang mengalir untuk memisahkan sampel dari kotoran, kemudian dicacah dan dikeringkan di lemari pengering dan diserbukkan, disimpan pada suhu kamar untuk pengolahan selanjutnya.

c. Ekstraksi sampel

Sampel akar, batang, kulit batang, daun, dan buah tengar yang telah dirajang dan dikeringkan di lemari pengering dengan suhu 50 °C masing-masing ditimbang sebanyak 100 g lalu di ekstraksi menggunakan masing – masing 500 mL pelarut metanol dengan metode refluks pada suhu 70°C selama 3 jam kemudian disaring. Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan kemudian diuapkan dengan *rotary evaporator* sehingga menghasilkan ekstrak metanol kental, lalu ekstrak dikeringkan pada suhu ruang. Rendemen ekstrak dihitung menggunakan rumus:

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{bobot ekstrak (g)}}{\text{bobot simplisia (g)}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

4. Skrining Fitokimia

a. Uji Alkaloid

Sekitar 5 mg masing-masing ekstrak metanol diaduk secara terpisah dengan 6 mL HCl 1% di atas penangas air selama 5 menit kemudian disaring. Filtratnya digunakan untuk pengujian golongan senyawa, sebagai berikut:

- 1) Tes Dragendorff (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).

Bagian pertama filtrat, ditambahkan pereaksi Dragendorff sebanyak 1-2 mL pada filtrat, jika terdapat endapan merah jingga berarti menunjukkan adanya alkaloid.

2) Tes Mayer (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).

Bagian kedua filtrat, ditambahkan pereaksi Mayer sebanyak 1-2 mL pada filtrat, jika terdapat endapan warna krem berarti menunjukkan adanya alkaloid.

3) Tes Wagner (Iqbal, Salim, & Lim, 2015)

Bagian ketiga filtrat, ditambahkan pereaksi Wagner sebanyak 1-2 mL pada filtrat, jika terdapat endapan berwarna coklat berarti menunjukkan adanya alkaloid.

b. Uji Steroid dan Terpenoid

1) Tes Salkowski (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).

Sekitar 5 mg ekstrak metanol, ditambahkan 2 mL kloroform dikocok secara terpisah, ditambahkan 2 mL H_2SO_4 pekat disepanjang sisi tabung uji, adanya warna coklat kemerahuan pada antarmuka menunjukkan adanya terpenoid.

2) Tes Liebermann-Burchard (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).

Sekitar 5 mg masing-masing ekstrak metanol, lalu dikocok dengan 2 mL kloroform, ditambahkan beberapa tetes asam asetat anhidrat dan dididihkan didalam penangas air dan didinginkan dengan cepat dalam air es. Kemudian ditambahkan 2 mL H_2SO_4 pekat. Terbentuknya cincin coklat pada pertemuan dua lapisan dan lapisan atas berubah menjadi hijau menunjukkan adanya steroid sedangkan terbentuknya warna merah tua menunjukkan adanya triterpenoid.

c. Uji Tanin (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).

Sekitar 5 mg masing-masing ekstrak metanol dan diaduk dengan 5 mL air suling dan disaring. Ditambahkan beberapa tetes $FeCl_3$ 5% ke dalam filtrat. Adanya warna hitam atau biru-hijau atau endapan menunjukkan adanya tanin.

d. Uji Saponin (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).

Sekitar 5 mg masing-masing ekstrak metanol ditambahkan 10 mL air suling lalu dikocok hingga terbentuk buih. Apabila buih tersebut bertahan selama 5 menit di penangas air menunjukkan adanya saponin.

e. Uji Glikosida

1) Tes Borntrager (glikosida antrakuinon)

Sekitar 5 mg ekstrak metanol dimasukkan kedalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 5 mL H_2SO_4 5%, campuran tersebut disimpan di penangas air selama 1-2 menit kemudian disaring. Filtratnya dikocok dengan kloroform dengan volume yang sama dan didiamkan selama 5 menit. Kemudian lapisan bagian bawah kloroform dikocok dengan setengah volumenya dengan amonia NH_3 encer. Adanya warna merah muda sampai merah pada lapisan amonia memberikan indikasi glikosida antarkuinon (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).

2) Tes Keller-Killaini (glikosida jantung)

Sekitar 5 mg masing-masing ekstrak metanol dimasukkan kedalam tabung reaksi, lalu dikocok dengan 5 mL air suling. Ditambahkan 2 mL asam asetat glasial, Ditambahkan beberapa tetes $FeCl_3$ 5% dan diikuti 1-2 mL H_2SO_4 pekat disepanjang sisi tabung uji. Terbentuknya cincin coklat pada antarmuka dan cincin ungu yang mungkin muncul di bawah cincin coklat menunjukkan adanya glikosida jantung (Iqbal, Salim, & Lim, 2015).

5. Penetapan Kadar Fenolik Total (Celep, Charehsaz, Axkyuz, Acar, & Yesilada, 2015)

a. Pembuatan larutan uji

Sebanyak 25,0 mg ekstrak ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 2500 μl metanol, divorteks hingga larut dan menghasilkan konsentrasi 10.000 ppm.

b. Pembuatan reagen

1. Reagen *Folin-Ciocalteu* 7,5%

Folin-Ciocalteu sebanyak 15 mL ditambahkan air suling hingga volumenya 200 mL

2. Reagen natrium hidrosida 1%

Natrium hidroksida 1% sebanyak 2,0 gram dilarutkan dengan air suling hingga volumenya 200 mL

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding

Asam galat 12,5 mg dimasukkan ke dalam labu tentukur dan dicukupkan dengan metanol sebanyak 25 mL. Kemudian dibuat seri konsentrasi yaitu 30 μL , 50 μL , 75 μL , 100 μL , dan 125 μL . Masing-masing konsentrasi dicukupkan 250 μl metanol. Selanjutnya ditambahkan reagen *Folin-Ciocalteu* sebanyak 1.250 μL inkubasi selama 8 menit, lalu ditambahkan 1.000 μL pereaksi natrium hidroksidan. Terakhir didiamkan kembali selama 1 jam dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 425 nm.

d. Prosedur penetapan kadar fenolik total dalam sampel

Larutan sampel uji 50 μL dimasukkan ke dalam labu tentukur, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 200 μL . Selanjutnya melakukan penambahan reagen *Folin-Ciocalteu* dan pereaksi natrium hidroksida (NaOH) dengan perlakuan yang sama seperti prosedur pengukuran larutan pembanding. Terakhir didiamkan

kembali selama 1 jam dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 425 nm. Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali replikasi.

6. Penetapan Kadar Flavonoid Total (Celep, Charehsaz, Axkyuz, Acar, & Yesilada, 2015).

a. Pembuatan larutan uji

Sebanyak 100,0 mg ekstrak di timbang, lalu dimasukkan ke dalam labu tentukur dilarutkan dengan 10 mL metanol, divorteks hingga larut dan menghasilkan konsentrasi 10.000 ppm.

b. Pembuatan reagen

1. Reagen aluminum klorida (AlCl_3) 10%

Aluminum klorida sebanyak 2,0 gram dicukupkan 20 mL air suling

2. Reagen natrium asetat (CH_3COONa) 0,1 %

Natrium asetat sebanyak 1,640 mg dicukupkan 20 mL air suling

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding

Kuersetin 12,5 mg dimasukkan ke dalam labu tentukur dan dicukupkan dengan metanol sebanyak 25 mL. Seri konsentrasi dibuat dengan mencampur berturut-turut 10 μL , 15 μL , 25 μL , 35 μL , 50 μL , 75 μL kemudian dicukupkan dengan air suling hingga 3.300 μL . Selanjutnya pereaksi AlCl_3 dan pereaksi natrium asetat ditambahkan sebanyak 100 μL . Selanjutkan, diinkubasi selama 30 menit dan diukur absorban dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 415 nm.

d. Prosedur penetapan kadar flavonoid total dalam sampel

Semua larutan sampel uji 250 μL dimasukkan ke dalam labu tentukur, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 3.050 μL . Selanjutnya ditambahkan pereaksi AlCl_3 dan pereaksi natrium asetat sebanyak 100 μL kemudian di vorteks.

Terakhir, didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 415 nm. Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali replikasi.

7. Penetapan Kadar Karotenoid Total (*Lichtenthaler, 1987 : 366-373*).

a. Pembuatan larutan sampel karotenoid

Sebanyak 10 mg ekstrak ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam labu tentukur dilarutkan dengan aseton 10 mL, divortex dan dipanaskan apabila terdapat ekstrak yang belum larut. Setelah itu, sampel yang sudah dipanaskan dibiarkan hingga dingin dan disentrifius apabila masih terdapat sampel yang belum larut.

b. Penetapan kadar karotenoid total dalam sampel

Larutan sampel diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 661,6; 664,8; dan 470 nm. Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali replikasi. Kandungan total karotenoid dihitung dengan rumus:

$$\text{Aseton, 100\% (pelarut murni)}: \dots\dots\dots (2)$$

$$C_a = 11.24A_{661.6} - 2.04A_{664.8}$$

$$C_b = 20.13A_{664.8} - 4.19A_{661.6}$$

$$C_{x+c} = \frac{1000A_{470} - 1.90C_a - 63.14C_b}{214}$$

8. Uji Kapasitas antioksidan

a. FRAP (*Ferric reducing antioxidant power*)

1. Pembuatan larutan $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 2.0×10^{-2} M

FeCl_3 750 mg ditambahkan 200 μl HCl 5M dicukupkan dengan 50 mL air suling

2. Pembuatan larutan TPTZ 1.0×10^{-2} M

TPTZ 167,5 mg dicukupkan dengan etanol absolut 50 mL.

3. Pembuatan larutan bupper natrium asetat pH 3,6

Natrium asetat 1,55 gram lalu ditambahkan 8 mL asam asetat pekat dan dicukupkan hingga 500 mL air suling

4. Pembuatan ekstrak 10.000 ppm

Sebanyak 50,0 mg ekstrak ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 mL metanol, divorteks hingga larut.

5. Pembuatan reagen FRAP

Buffer : TPTZ : FeCl₃.6H₂O (60 : 6 : 6)

6. Pengujian antioksidan sampel dengan FRAP

Larutan sampel uji 50 µl, ditambahkan 950 µl air suling dan ditambahkan 3000 µl reagen FRAP. Diinkubasi selama 30 menit kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 595 nm.

7. Pengujian antioksidan vitamin C

Vitamin C 5,0 mg dilarutkan dalam 10 mL metanol, lalu dibuat dalam beberapa seri konsentrasi berturut-turut 30µl, 40µl, 50µl, 60µl, 70µl. Masing-masing konsentrasi dicukupkan dengan metanol 1000 µL. Reagen Frap ditambahkan sebanyak 3000 µL. Terakhir, diinkubasi selama 30 menit kemudian diamati absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 595 nm.

8. Trolox

Ditimbang trolox 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi berturut-turut 30 µl, 40 µl, 50 µl, 60 µl, dan dicukupkan dengan metanol hingga 1.000µl. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 3000µl reagen FRAP. Diinkubasi selama 30 menit

dan diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 595 nm.
(Ozyurek, 2008).

b. CUPRAC (*Cupric ion reducing antioxidant capacity*)

1. Pembuatan larutan CuCl₂.1H₂O 10×10^{-2} M

CuCl₂ 425,0 mg dicukupkan dengan 250 mL air suling.

2. Pembuatan larutan neocuproine 7.5×10^{-2} M

Neocuproine 390,0 mg dicukupkan dengan 250 mL etanol absolut.

3. Pembuatan larutan buffer amonium asetat pH 7.0

Amonium asetat 19,27 gram amonium asetat dicukupkan dengan 250 mL air suling.

4. Pembuatan ekstrak 10.000 ppm

Sebanyak 50,0 mg ekstrak ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 mL metanol, divorteks hingga larut.

5. Pengujian antioksidan sampel dengan CUPRAC

Sampel sebanyak 50 μ l ditambahkan air suling 950 μ l dan reagen CUPRAC dengan perlakuan yang sama seperti prosedur pengujian antioksidan vitamin C. Terakhir, absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 450 nm.

6. Pengujian antioksidan vitamin C

Vitamin C 5,0 mg dan dilarutkan dalam 25 mL metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi berturut-turut 50 μ l, 70 μ l, 100 μ l, 150 μ l, dan 200 μ l. Masing-masing seri konsentrasi dicukupkan 1000 μ l metanol. Ditambahkan 3000 μ l reagen CUPRAC. Diinkubasi selama 30 menit dan diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 450 nm.

7. Trolox

Ditimbang trolox 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi berturut-turut 50 μ l, 70 μ l, 100 μ l, 150 μ l, dan 200 μ l. Dari masing-masing konsentrasi dicukupkan 1.000 μ l metanol. Kemudian ditambahkan reagen CUPRAC 3.000 μ l lalu dihomogenkan dengan vortex dan diinkubasi selama 30 menit. Selanjutnya absorbansinya diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 450 nm. (Ozyurek, 2008).

c. TOAC (*Total antioxidant capacity*)

1. Pembuatan larutan TOAC

Amonium molibdat $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ Ditimbang 1.977,0 mg, dan 380,2 mg potassium dihidrogen fosfat (KH_2PO_4) , ditambahkan 48 mL asam sulfat (H_2SO_4) dan dicukupkan dengan 60 mL air suling.

2. Pembuatan ekstrak 10.000 ppm

Sebanyak 100,0 mg ekstrak ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 mL metanol, divortex hingga larut.

3. Pengujian kapasitas antioksidan

Larutan sampel uji 100 μ L ditambahkan air suling sebanyak 400 μ L ke dalam tabung reaksi tutup ulir. Kemudian, ditambahkan 3.000 μ l reagen TOAC. Setelah itu, divortex hingga larut, diinkubasi selama 90 menit pada suhu 95°C. Diukur absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 695 nm dan dilakukan sebanyak 3 kali replikasi.

4. Pengujian antioksidan vitamin C

Vitamin C 50,0 mg dilarutkan dalam 25 mL metanol. Dari larutan tersebut dibuat seri konsentrasi berturut-turut 50 μ L, 100 μ L, 150 μ L, 200 μ L, dan 250 μ L. Dari masing-masing seri konsentrasi tersebut dicukupkan 500 μ L metanol. Kemudian ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3.000 μ L dan diinkubasi selama 90 menit pada suhu 95°C. Setelah itu, absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 695 nm.

5. Trolox

Ditimbang 10 mg trolox dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari larutan tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 50 μ L, 100 μ L, 150 μ L, 200 μ L, dan 250 μ L lalu masing-masing seri konsentrasi dicukupkan 1.000 μ L metanol. Ditambahkan reagen TOAC sebanyak 3000 μ L dan diinkubasi selama 90 kmenit pada suhu 95°C. Diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 695 nm (Celep, Charehsaz, Axkyuz, Acar, & Yesilada, 2015).

d. DPPH (*2,2-difenil-1-pikrilhidrazil*)

1. Pembuatan larutan DPPH (BM 394) konsentrasi 0,1 mM

DPPH 2,0 mg dilarutkan dengan 50 mL metanol.

2. Pembuatan ekstrak 10.000 ppm

Sebanyak 100,0 mg ekstrak ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 mL metanol, divorteks hingga larut.

3. Pengujian kapasitas antioksidan sampel

Larutan sampel uji 25 μ L ditambahkan metanol 1.475 μ L. Selanjutnya ditambahkan larutan DPPH seperti pada prosedur kapasitas antioksidan

vitamin C. Kemudian dilakukan pengukuran seperti pengujian kapasitas antioksidan vitamin C sebanyak 3 kali replikasi.

4. Pengujian kapasitas antioksidan vitamin C

Larutan ekstrak sampel dibuat seri konsentrasi dengan cara mencampur secara berturut-turut 100 μ L, 200 μ L, 300 μ L, 400 μ L, 500 μ L, 600 μ L, 700 μ L dan dicukupkan dengan metanol hingga 1.500 μ L. Selanjutnya ditambahkan larutan DPPH sebanyak 2000 μ L. Kemudian larutan tersebut di vortex hingga homogen, didiamkan selama 30 menit diruangan yang tertutup dan gelap, lalu absorbansinya diukur pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 517 nm.

5. Trolox

Ditimbang 10 mg vitamin C kemudian dilarutkan kedalam metanol sebanyak 50 ml. Dari larutan tersebut dibuat beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 10 μ l, 20 μ l, 30 μ l, 50 μ l, 75 μ l, dan 100 μ l dan ditambahkan metanol sebanyak 1.490 μ l, 1.480 μ l, 1.470 μ l, 1.450 μ l, 1.425 μ l, dan 1.400 μ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan larutan DPPH sebanyak 2000 μ l divortex hingga homogen dan didiamkan selama 30 menit diruangan tertutup dan gelap. Diukur absorbansinya menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 517 nm.

6. Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ inhibisi untuk uji DPPH} = \left[\frac{(AB-AA)}{AB} \right] \times 100 \dots\dots\dots (3)$$

AB adalah serapan sampel blangko, AA adalah serapan sampel/ekstrak standar. Kurva kalibrasi diperoleh dengan memplot % inhibisi terhadap konsentrasi standar vitamin C.

(Celep, Charehsaz, Axkyuz, Acar, & Yesilada, 2015).

E. Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis statistic, ANOVA, dan uji beda nyata DUNCAN.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi

Tabel 1. Hasil ekstraksi beberapa bagian tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*)
(Perr.)C.B.Rob.

No.	Sampel	Bobot Simplisia (gram)	Bobot Ekstrak (gram)	Rendemen (%)
1	Akar tengar	130.10	19.66	15.11
2	Batang tengar	200.10	16.53	8.26
3	Kulit batang tengar	107.10	13.08	12.21
4	Daun tengar	300.20	47.63	15.86
5	Buah tengar	250.10	53.81	21.51

2. Hasil Penapisan Fitokimia

Tabel 2. Hasil penapisan fitokimia beberapa bagian tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob.

No	Sampel	Uji				
		Alkaloid	Tanin	Steroid /terpenoid	Saponin	Glikosida
1	Akar tengar	(-)	(+)	(+)	(-)	(+)
2	Batang tengar	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)
3	Kulit batang tengar	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)
4	Daun tengar	(-)	(+)	(+)	(-)	(+)
5	Buah tengar	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)

Ket: (-) = Tidak terdeteksi

(+) = Terdeteksi

3. Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid

Tabel 3. Kadar total fenolik, flavonoid, dan karotenoid ekstrak tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob.

No.	Sampel	Kadar Total Fenolik (mg GAE/gr ekstrak)	Kadar Total Flavonoid (mg QE/gr ekstrak)	Kadar Total Karotenoid (µg/g)
1	Akar tengar	140.75 ± 0.39 ^a	27.52 ± 0.96 ^a	2.43 ± 0,47 ^a
2	Batang tengar	149.67 ± 4.55 ^b	33.81 ± 0.13 ^b	0,61 ± 0,82 ^a
3	Kulit batang tengar	142.45 ± 5.74 ^a	34.98 ± 1.14 ^b	7.94 ± 1.50 ^a
4	Daun tengar	172.11 ± 2.95 ^c	125.07 ± 6.24 ^c	0 ± 1.18 ^a
5	Buah tengar	278.67 ± 2.62 ^d	21.02 ± 0.25 ^d	0 ± 0,65 ^a

Ket: a,b,c,d = kode yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada <0,05

4. Kapasitas Antioksidan Ekstrak Tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob.

Tabel 4. Kesetaraan antioksidan ekstrak tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. terhadap asam askorbat

No	Sampel	Metode			
		DPPH (mg AAE/gram)	FRAP (mg AAE/gram)	CUPRAC (mg AAE/gram)	TOAC (mg AAE/gram)
1	Akar tengar	291.25 ± 2.34 ^a	101.01 ± 1.59 ^a	221.97 ± 2.47 ^a	13.95 ± 0.26 ^a
2	Batang tengar	181.55 ± 5.33 ^b	116.10 ± 1.38 ^b	200.24 ± 4.45 ^b	14.81 ± 0.04 ^b
3	Kulit batang tengar	367.01 ± 9.47 ^c	125.43 ± 1.39 ^c	199.84 ± 3.63 ^b	22.52 ± 0.43 ^c
4	Daun tengar	218.08 ± 0.31 ^d	27.28 ± 0.49 ^d	214.98 ± 13.12 ^a	19.05 ± 0.14 ^d
5	Buah tengar	78.83 ± 2.57 ^e	114.84 ± 2.91 ^b	209.81 ± 2.59 ^{a,b}	23.51 ± 0.21 ^e

Ket: a,b,c,d,e = kode yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada <0,05

Tabel 5. Kesetaraan antioksidan ekstrak tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) *C.B.Rob.* terhadap Trolox

No.	Sampel	Metode			
		DPPH (mg TEAC/gram)	FRAP (mg TEAC/gram)	CUPRAC (mg TEAC/gram)	TOAC (mg TEAC/gram)
1	Akar tengar	189.72 ± 0.99 ^a	119.17 ± 1.90 ^a	392.69 ± 3.22 ^a	26.90 ± 0.53 ^a
2	Batang tengar	197.44 ± 4.92 ^b	137.14 ± 1.64 ^b	364.68 ± 5.81 ^b	28.62 ± 0.07 ^b
3	Kulit batang tengar	207.69 ± 0.14 ^b	148.25 ± 1.65 ^c	363.96 ± 4.74 ^b	44.25 ± 0.86 ^c
4	Daun tengar	103.19 ± 1.13 ^c	32.21 ± 0.59 ^d	383.55 ± 17.16 ^a	37.22 ± 0.28 ^d
5	Buah tengar	206.70 ± 1.00 ^d	135.63 ± 3.46 ^b	377.60 ± 3.38 ^{a,b}	46.24 ± 0.44 ^e

Ket: *a,b,c,d,e* = kode yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada $<0,05$

B. Pembahasan

Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat mengurangi radikal bebas sehingga dapat melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi yang berlebihan (Purwati & Marsella, 2020). Antioksidan berfungsi menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron dan radikal bebas sehingga menghambat terjadinya reaksi berantai (Manongko, 2020).

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa bagian tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) *C.B.Rob.* yaitu akar, batang, kulit batang, daun, dan buah yang secara empiris telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai antioksidan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui senyawa antioksidan yang tertinggi pada setiap bagian tumbuhan dengan menggunakan metode TOAC, DPPH, FRAP, dan CUPRAC dengan menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis.

Ekstraksi pada tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. menggunakan ekstraksi metode refluks. Adapun metode refluks yaitu metode ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik didih, waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas relatif konstan adanya pendinginan balik. Umumnya penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3-5 kali setiap 3-4 jam, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi dalam mengikat senyawa yang terkadung dalam sampel (Departemen Kesehatan RI, 2000). Ekstraksi metode refluks lebih efisien daripada perkolasai atau maserasi dan membutuhkan waktu ekstraksi dan pelarut yang lebih sedikit. Ekstrak metanol tengar menggunakan ekstraksi metode refluks pada suhu 70°C selama 3 jam kemudian disaring. Pelarut yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam labu alas datar, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Pada ekstrak metanol daun dan buah dilakukan sebanyak 3 kali sedangkan sampel lainnya yaitu akar, batang, dan kulit batang dilakukan sebanyak 2 kali, hal ini berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna. Pada tahap ini digunakan 130 gram akar tengar, 200 gram batang tengar, 107 gram kulit batang tengar, 300 gram daun tengar, dan 250 gram buah tengar yang disari menggunakan pelarut metanol.

Pelarut yang digunakan yaitu metanol, Penggunaan pelarut metanol pada ekstrak dipilih karena metanol merupakan pelarut universal yang bersifat mampu melarutkan hampir semua komponen baik yang bersifat nonpolar, semi polar, dan polar (Supriatna, Mulyani, Rostini, & Agung, 2019). Metanol dapat menarik alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari tanaman (Dapartemen Kesehatan RI, 2009).

Rendemen ekstrak merupakan rasio bobot akhir ekstrak dengan berat awal ekstrak dalam persen (Sani, Nisa, Andriani, & Maligan, 2014). Pada tabel 1

menunjukkan hasil ekstraksi pada tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* dengan persen rendemen tertinggi yaitu pada bagian buah sebesar 21.51%. Nilai tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuran partikel simplisia, dan lamanya waktu ekstraksi. Keberhasilan pemisahan bergantung pada perbedaan kelarutan komponen yang akan dipisahkan dalam pelarut (Suryanto & Edi, 2012). Senyawa polar akan larut dalam pelarut polar, begitu pula sebaliknya. Selain jenis pelarut, ukuran sampel juga mempengaruhi jumlah rendemen. Semakin kecil luas permukaan sampel akan semakin memperluas kontak dan meningkatkan interaksi dengan pelarut (Sinake, Surayanto, & Sudewi, 2016).


Penapisan fitokimia bertujuan untuk mengidentifikasi golongan senyawa pada tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob..* Dari data yang dihasilkan dalam pengujian fitokimia Pada tabel 1 mengindikasikan bahwa ada senyawa metabolit sekunder yaitu tanin, steroid, terpenoid, saponin, dan glikosida pada sampel tumbuhan tengar. Hasil skrining fitokimia bahwa tanin menunjukkan hasil positif dengan terjadinya perubahan warna menjadi coklat kehijauan pada ekstrak metanol yang menandakan terbentuk senyawa kompleks (tanin dan ion Fe^{3+}). Hal ini dikarenakan dalam sampel terdapat senyawa fenol salah satunya adalah tanin yang merupakan senyawa polifenol (Oktavia & Sutoyo, 2021). Pada pengujian senyawa saponin menunjukkan hasil positif pada bagian batang, kulit batang, dan buah Tengar dalam pengujian ini timbul buih yang stabil dengan tinggi 2 cm dalam waktu ± 10 menit. Timbul buih yang stabil disebabkan karena glikosida memiliki kemampuan memperoleh buih pada air lalu mengalami hidrolisis menjadi glukosa serta senyawa lainnya. Salkowski menunjukkan hasil positif dengan adanya warna coklat kemerahan pada antarmuka pada ekstrak metanol tumbuhan tengar, hal ini menunjukkan adanya terpenoid. Glikosida killer-killaini menunjukkan hasil positif

dengan terbentuknya cincin coklat pada antarmuka memberikan indikasi positif untuk glikosida jantung. Pada penelitian yang dilakukan (Basco, Mallare, Ruiz, Jacob, & Divina, 2016) bahwa hasil yang diperoleh pada analisis fitokimia kulit batang Tengar ditunjukkan pada bahwa di antara delapan (8) fitokimia yang diuji, flavonoid, glikosida jantung dan tanin terdeteksi dalam jumlah yang dapat dilacak dan cukup banyak di kulitnya.


Tumbuhan merupakan sumber antioksidan eksogen yang bersifat alami. Antioksidan alami yang terkandung pada tumbuhan yaitu senyawa polifenol, karotenoid, dan vitamin. Antioksidan ini memiliki berbagai efek farmakologis seperti antiinflamasi, antikanker, antibakteri, dan antivirus. Aktivitas antioksidan dari komponen fenol dan flavonoid dengan cara mereduksi radikal bebas tegantung pada jumlah gugus hidroksi pada struktur molekulernya. Adanya keterkaitan antara struktur senyawa flavonoid dan fenol dengan aktivitasnya sebagai antioksidan, hal ini menjadi dasar dilakukannya penelitian ini (Zuraida, Sulistiyani, Sajuthi, & Suparto, 2017).

Penetapan kadar fenolik total pada tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. dilakukan dengan penambahan reagen *Folin-Ciocalteu* yang diukur dengan spektrofotometer UV-Vis (425 nm). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan fenolik total yang ada pada sampel tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. dan untuk mengetahui kemampuan dari sampel terhadap antioksidan yang jumlahnya tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh.

Asam galat adalah senyawa antioksidan yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan banyak digunakan sebagai standar pengukuran untuk penentuan senyawa fenolik (Maesorah, Kurnia, & Anshori, 2018). Adapun reaksi yang terbentuk antara senyawa fenolik dan *Folin-Ciocalteu* yaitu reaksi reduksi-oksidasi. Senyawa fenolik mereduksi asam heteropolii (*Fosfotmolibdat-fosfotungstat*) menjadi suatu kompleks *molybdenum-tungsten* yang berwarna biru. Besarnya konsentrasi senyawa fenolik menentukan banyaknya ion fenolat yang akan mereduksi asam heteropolii (*Fosfotmolibdat-fosfotungstat*) menjadi senyawa kompleks *molybdenum-tungsten* sehingga warna biru pekat menunjukkan kadar fenolik yang tinggi (Noviyanty, Hepiyansoro, & Agustian, 2020).



Gambar 2. Reaksi senyawa fenolik dengan reagen *Folin-Ciocalteu* (Noviyanty, Hepiyansoro, & Agustian, 2020).




Gambar 3. Diagram kadar fenolik total


Berdasarkan hasil penetapan kadar fenolik total pada gambar 3 didapatkan hasil kadar fenolik total pada tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. memiliki kadar tertinggi yaitu buah secara bermakna ($\alpha<0.05$) sebesar 278.67 ± 2.62 mg GAE/g ekstrak artinya pada setiap gram ekstrak setara dengan 2.62 mg pembanding asam galat. Hasil positif juga diperoleh dengan adanya perubahan warna larutan menjadi biru. Sesuai dengan pengujian kualitatif positif tannin dan saponin.

Penetapan kadar flavonoid total pada tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. dilakukan dengan penambahan reagen aluminium klorida (AlCl_3) yang diukur dengan spektrofotometer UV-Vis (415 nm). Metode penetapan kadar flavonoid berdasarkan prinsip kolorimetri menggunakan reaksi AlCl_3 . Prinsip penetapan kadar flavonoid dengan aluminium klorida yaitu adanya pembentukan kompleks antara aluminium klorida dengan gugus keto pada atom C-4 dan gugus hidroksi pada atom C-3 atau C-5 yang bertetangga dari golongan flavon dan flavonol (Riwanti, Izazih, & Amaliyah, 2020).

Pada penelitian ini senyawa yang digunakan sebagai standar pada penetapan kadar flavonoid total adalah kuersetin, karena kuersetin merupakan flavonoid golongan flavonol yang memiliki gugus keto pada atom C-4 dan gugus hidroksi pada atom C-3 dan C-5 yang bertetangga sehingga dengan adanya gugus tersebut akan menyebabkan pembentukan senyawa kompleks AlCl_3 dan kuersetin yang nantinya akan memberikan efek batokromik, yaitu pergeseran kearah panjang gelombang yang lebih panjang sehingga mengubah panjang gelombang kuersetin untuk masuk ke dalam range panjang gelombang UV-Vis (Riwanti, Izazih, & Amaliyah, 2020).




Gambar 4. Pembentukan senyawa kompleks kuersetin-aluminium klorida



Gambar 5. Diagram kadar flavonoid total

Berdasarkan hasil penetapan kadar flavonoid total pada gambar 5 didapatkan hasil kadar flavonoid total pada tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* memiliki kadar tertinggi yaitu daun secara bermakna ($\alpha<0.05$) daun sebesar 125.07 ± 6.24 mg QE/g ekstrak artinya pada setiap gram ekstrak setara dengan 6.24 mg pembanding kuarsetin.

Penetapan kadar karotenoid total pada tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* diukur dengan spektrofotometer UV-Vis (661,6; 664,8; dan 470 nm). Karotenoid sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Karotenoid dikenal sebagai prekusor vitamin A (β -karoten) yang merupakan antioksidan alami dan berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang berlangsung dalam fotosintesis tumbuhan (Sari & Hidayati, 2020). Penetapan kadar karotenoid total pada sampel tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* menggunakan pelarut aseton murni (aseton murni 100%) karena karotenoid bersifat tidak larut terhadap air, metanol, etanol dingin, dan larut dalam pelarut-pelarut organic seperti karbon disulfide, benzene, kloroform, aseton, eter dan petroleum eter dan berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelarut aseton dengan konsentrasi tinggi menghasilkan tingkat pemekatan β -karoten yang lebih tinggi (Juniarti, 2016).




Gambar 6. Diagram kadar karotenoid total

Berdasarkan hasil penetapan kadar karotenoid total pada gambar 6 didapatkan hasil kadar karotenoid total pada tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. memiliki kadar tertinggi yaitu kulit batang secara bermakna ($\alpha<0.05$) sebesar $7.94\pm1.50 \mu\text{g CE/g ekstrak}$.

Pengujian kapasitas antioksidan merupakan pengujian untuk mengetahui kemampuan senyawa pada sampel tengar (*Ceriops tagal*) (Perr.) C.B.Rob. dengan pembanding (vitamin C dan Trolox) dalam menangkap sejumlah radikal bebas yang sama banyak menggunakan metode TOAC, DPPH, FRAP, CUPRAC yang diukur dengan spektrofotometri UV-Vis pada gelombang maksimum dari masing-masing metode.

Pengujian kapasitas antioksidan dengan metode TOAC (*Total Antioxidant Capacity*) dengan mengukur aktivitas antioksidan total yang dinyatakan sebagai jumlah yang setara dengan pembanding yang digunakan. Metode ini memiliki mekanisme kerja pada sampel yang mengandung senyawa yang memiliki daya reduksi. Proses reduksi tersebut nantinya akan mengubah molibdenum (VI)

menjadi molibdenum (V) sehingga akan menghasilkan senyawa kompleks fosfomolibdenum yang berwarna hijau kebiruan. Terjadinya perubahan warna karena hasil dari reduksi amonium molibdat pada kondisi asam dan dengan adanya antioksidan (Celep, Charehsaz, Axkyuz, Acar, & Yesilada, 2015).




Gambar 7. Diagram Kapasitas Antioksidan TOAC


Berdasarkan hasil pengujian kapasitas antioksidan metode TOAC pada gambar 7 didapatkan hasil kadar TOAC total pada tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* memiliki kadar tertinggi yaitu buah dengan pembanding Asam askorbat dan trolox secara bermakna ($\alpha<0.05$) sebesar 23.51 ± 0.21 mg/g Asam askorbat, dan pada pembanding dengan trolox didapatkan kadar sebesar 46.24 ± 0.44 mg/g trolox.

Pengujian kapasitas antioksidan metode DPPH (*2,2-diphenyl picrylhydrazyl*) dengan menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis. Prinsip kerja dari metode DPPH ialah terdapat atom hidrogen dari senyawa antioksidan yang berikatan dengan elektron bebas pada senyawa radikal bebas (*diphenylpicrylhydrazyl*) menjadi senyawa non-radikal (*diphenylpicrylhydrazine*) yang ditandai dengan adanya perubahan warna dari ungu menjadi kuning pucat yang stabil yang artinya terjadi radikal bebas yang tereduksi oleh adanya antioksidan (Setiawan *et al.*, 2018 : 85). Pada radikal bebas untuk efektifitas suatu

sampel untuk menangkal radikal bebas disebut IC₅₀. Dimana, IC₅₀ merupakan konsentrasi yang dapat meredam 50% radikal bebas DPPH. Semakin kecil nilai IC₅₀ maka semakin besar aktivitas antioksidannya. Reaksi yang terjadi pada saat pengujian DPPH bisa diliat pada gambar dibawah.



Gambar 8. Reaksi Antioksidan dan Radikal Bebas DPPH. AH adalah molekul donor Antioksidan, dan A adalah Radikal Bebas yang dihasilkan




Gambar 9. Diagram Kapasitas Antioksidan DPPH


Berdasarkan hasil pengujian kapasitas antioksidan metode DPPH pada gambar 9 didapatkan hasil kadar DPPH total pada tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* memiliki kadar tertinggi yaitu kulit batang dengan pembanding Asam

askorbat dan trolox secara bermakna ($\alpha<0.05$) sebesar 1417.04 ± 0.95 mg /g ekstrak pada pembanding Asam askorbat, dan kadar sebesar 207.69 ± 0.14 mg/g pada pembanding trolox.

Pengujian kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode FRAP (*Ferric Reducing Antioxidant Power*). Metode FRAP dapat menentukan kandungan antioksidan total yang terdapat pada suatu bahan yang digunakan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan untuk mereduksi ion Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} sehingga kemampuan antioksidan suatu senyawa dapat dianalogikan dengan kemampuan mereduksi dari senyawa tersebut, antioksidan dalam sampel nantinya akan mereduksi Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} dengan memberikan sebuah elektron yang ditandai dengan perubahan menjadi warna biru dengan menggunakan panjang gelombang 595 nm (Ozyurek, 2008). Pengujian ini menggunakan 2 larutan pembanding yaitu asam askorbat (Asam askorbat) dan trolox. Nilai pengujian FRAP dinyatakan dalam mg asam askorbat/trolox equivalen/gr ekstrak.



Gambar 10. Reaksi metode FRAP




Gambar 11. Grafik kapasitas antioksidan FRAP


Berdasarkan hasil pengujian kapasitas antioksidan metode FRAP pada gambar 11 didapatkan hasil kadar FRAP total pada tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* memiliki kadar tertinggi yaitu kulit batang dengan pembanding Asam askorbat dan trolox secara bermakna ($\alpha<0.05$) sebesar 125.4 ± 1.39 mg/g ekstrak, sedangkan dengan pembanding trolox memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi menggunakan metode FRAP yang kadarnya sebesar 148.25 ± 1.65 mg/g ekstrak.

Metode terakhir yang dilakukan ialah CUPRAC (*Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity*) adalah metode kapasitas antioksidan untuk mengukur sampel terhadap radikal bebas yang diukur menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 450 nm. Prinsip metode CUPRAC yaitu berdasarkan pada kemampuan sampel agen antioksidan dalam mereduksi kompleks Cu²⁺ menjadi kompleks Cu⁺ yang ditandai dengan perubahan warna biru menjadi kuning pada spot senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Hafiz Ramadhan *et al.*, 2020). Pengujian CUPRAC juga menggunakan 2 larutan

pembanding yaitu asam askorbat (Asam askorbat) dan trolox. Nilai pengujian CUPRAC dinyatakan dalam mg asam askorbat/trolox equivalen/gr ekstrak.



Gambar 12. Reaksi metode CUPRAC



Gambar 13. Diagram kapasitas antioksidan CUPRAC

Berdasarkan hasil pengujian kapasitas antioksidan mentode CUPRAC pada gambar 13 didapatkan hasil kadar CUPRAC total pada tengar (*Ceriops tagal* (Perr.) *C.B.Rob.* memiliki kadar tertinggi yaitu akar dengan pembanding Asam askorbat dan trolox secara bermakna ($\alpha<0.05$) sebesar 221.97 ± 2.47 mg/g ekstrak, sedangkan kapasitas antioksidan pada pembanding trolox dengan kadar sebesar 392.69 ± 3.22 mg/g ekstrak.

Penelitian ini mengingatkan kita betapa besar kekuasaan Allah Swt dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an banyak yang menyebutkan bahwa tumbuhan memiliki potensi yang

dapat digunakan sebagai obat bagi manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan disana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” (Kementerian Agama RI, 2019).

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. mengajak kita agar belajar dari seluruh alam bahwa hanya Allah Swt. semata yang berhak untuk disembah. Mereka yang mempertahankan kekufuran dan kedustaan sehingga enggan percaya atas kebesaran-Nya. Jika mereka ingin merenungi adanya Kuasa-Nya di bumi ini maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah Swt. telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang baik sehingga mendatangkan manfaat membuktikan bahwa Allah Swt. merupakan dzat yang Maha Kuasa dalam menghidupkan atau membangkitkan yang telah mati (Shihab, 2009). Dengan segala kebesaran dan kekuasan-Nya, Allah Swt. telah menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh setiap makhluk-Nya. Salah satu manfaat dari tumbuhan yaitu dalam dunia kesehatan. Tumbuhan dapat digunakan sebagai pengobatan atau biasa disebut sebagai tanaman obat (herbal). Bagi hamba-Nya yang senantiasa ingin berfikir dan mengkaji adanya kekuasaan Allah Swt. tersebut, maka niscaya Allah Swt. akan memberikan petunjuk. Salah satu tanda-tanda kebesaran-Nya adalah ditumbuhkannya tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Adapun dalam penelitian ini telah dikaji tentang manfaat tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kadar fenolik, flavonoid, dan karotenoid total ekstrak metanol dari akar, batang, kulit batang, daun, dan buah tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* memiliki perbedaan bermakna ($\alpha<0.05$), dimana kadar total fenolik tertinggi diperoleh dari ekstrak metanol buah sebesar 278.67 mg GAE/g ekstrak, kadar total flavonoid diperoleh dari ekstrak metanol daun sebesar 125.07 mg QE/g ekstrak, dan kadar total karotenoid diperoleh dari ekstrak kulit batang tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* sebesar 125.07 mg QE/g ekstrak.
2. Kapasitas antioksidan ekstrak metanol dari akar, batang, kulit batang, daun, dan buah tumbuhan tengar (*Ceriops tagal*) (*Perr.*) *C.B.Rob.* terhadap asam askorbat dan trolox memiliki perbedaan bermakna ($\alpha<0.05$) pada metode TOAC bagian buah terdistribusi memiliki kadar antioksidan yang tinggi sebesar 23.51mg AAE/g ekstrak dan 46.24mg TEAC/g ekstrak, metode DPPH dan FRAP bagian kulit batang terdistribusi memiliki kadar antioksidan yang tinggi berturut-turut sebesar 367.01 mg AAE /g ekstrak dan 9.47 mg TEAC/g ekstrak; 125.43 mg AAE/g ekstrak dan 148.25 mg TEAC/g eskrak, dan metode CUPRAC pada bagian akar terdistribusi memiliki kadar antioksidan yang tinggi sebesar 221.97 mg AAE/g ekstrak dan 392.69 mg TEAC/g ekstrak.

B. Saran

Diharapkan dilakukan penelitian selanjutnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan nilai absorban dalam penetapan kadar total fenolik, flavonoid, karotenoid, dan kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH, FRAP, CUPRAC dan TOAC dengan menggunakan rentang panjang gelombang yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA


- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an*.
- Afrizal, Perdana, A., & Suryati. (2022). Penentuan Profil Metabolit Sekunder, Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri dari. *Jurnal Riset Kimia*, 76-88.
- Alfaridz, F., & Amalia, R. (2018). Klasifikasi dan Aktivitas Farmakologi dari Senyawa Aktif Flavonoid. *Farmaka*, 16(3).
- Anggraito, Y., Susanti, R., Iswari, R., Yuniautti, A., Lisdiana, & Nugrahaningsih. (2018). *Metabolit Sekunder Dari Tanaman*. Semarang.
- Bakar, M., Ahmad, N., Karim, F., & Saib, S. (2014). Phytochemicals and Antioxidative Properties of Borneo Indigenous Liposu (*Baccaurea lanceolata*) and Tampoi (*Baccaurea macrocarpa*) Fruits. *antioxidants*, 3, 516-525.
- Basco, M., Mallare, J., Ruiz, S., Jacob, J., & Divina, C. (2016). Evaluation of The Phytochemical, antioxidant and Cyotoxic Properties of Tungog (*Ceriops tagal*), A Philippine Mangrove Species. *International Journal of Agricultural technology*, 12(17.1).
- Canusa, B. S., Lawag, I. L., Villaflores, O. B., Villaflores, O. B., Korinek, M., Tsai, Y.-H., . . . Aguinaldo, M. A. (2021). α -Glucosidase Inhibitor from the Bark Extract of Ethno-Antidiabetic Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob. *Philippine Journal of Science*, 151(S1).
- Canusa, B., Lawag, I., Villaflores, O., Wagh, V., Korinek, M., & Tsai, Y. (2021). α -Glucosidase Inhibitors from the Bark Extract of Ethno-Antidiabetic Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. *Philippine Journal of Science*.
- Celep, E., Charehsaz, M., Axkyuz, S., Acar, E., & Yesilada, E. (2015). Effect in vitro Gastrointestinal Digestion On The Bioavailability of Phenolic Components and The Antioxidant Potentials of Some Turkish Fruit Wines. *Elsevier*, 209-215.
- Dapartemen Kesehatan RI. (2009). *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. (2000). *Parameter Standar umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta.
- E.M G, M., M, A., & A,I, A. (2004). *Lubaabut tafsir min Ibnu Katsiir*. Bogor.
- Fitriansyah, S., Putri, Y., Haris, M., Ferdiansyah, R., Nurhayati, R., & Sari, Y. (2018). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah, Daun, dan Kulit Batang

- Limpasu (*Baccaurea lanceolata* (Miq.) Mull.Arg.) dari Kalimantan Selatan. *Jurnal farmasi Indonesia*, 15(02).
- Gritter, R., Bobbitt, J., & Schwarting, A. (1991). *Pengantar Kromatografi, diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata, Edisi II*. Bandung: Penerbit ITB Press .
- Hamdin, C., & Muliasari, H. (2019). Gerakan Self Kontrol Penyakit Degeneratif di Desa Gondang Lombok Utara. *Jurnal Warta Desa*, 1(3).
- Harborne, J. (1987). *Metode Fitokimia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Indra, NurmalaSari, N., & Kusmiati, M. (2019). Fenolik Total, Kandungan Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Mareme (*Glochidion arborescens* Blume.). *Jurnal Sa in s Farmasi & Klinis*, 206–212.
- Iqbal, E., Salim, K., & Lim, L. (2015). Phytochemical screening, total phenolics and antioxidant activities of bark and leaf extracts of *Goniothalamus velutinus* (Airy Shaw) from Brunei Darussalam. *Journal of King Saud University - Science*, 224-232. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jksus.2015.02.003>
- Julianto, T. (2019). *Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining Fitokimia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Juniarti, M. (2016). Kajian Konsentrasi Pelarut Aseton dan Lama Waktu Maserasi Terhadap Karakteristik Pigmen Karotenoid Buah Campolay (*Pouteria campechiana*) Sebagai Zat Warna Alami. *artikel*.
- Kasmudjiastuti, E. e. (2015). Utilization f Tingi (*Ceriops Tegal*) Bark's extract As Vegetable Tanning material : the Influence Of Alum and Mimosa Addition.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an*.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Kemenag*. Kementrian Agama RI.
- Lampe, J. (2010). Health Effects of Vegetables and Fruit ; Assessing Mechanisme of Action in Human Experimental Studies. *American Society Clinical Nutrition*.
- Maesorah, K., Kurnia, D., & Anshori, J. (2018). Metode Uji Aktivitas Antioksidan DPPH, FRAP dan FIC terhadap Asam Askorbat, Asam Galat dan Kuersetin. *Chimica et Natura Acta*, 6(2), 93-100.
- Manongko, P. (2020). Uji Senyawa Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Tanaman Patah Tulang (*Euphorbia tirucalli* L.). *Jurnal MIPA*, 9(2).
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, VII(2).

- Munteanu, I., & Apetrei, C. (2021). Analytical Methods Used in Determining Antioxidant Activity : A Review. *International journal of Molecular Sciences*.
- Noor, R. Y., M. Khazali, N. I., & N. S. (1999). *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. Bogor: PHKA/WI-IP.
- Noviyanty, Y., Hepiyansoro, & Agustian, Y. (2020). Identifikasi dan Penetapan Kadar Senyawa Tanin Pada Ekstrak Daun Biduri (*Calotropis gigantea*) Metode Spektrofotometri UV-Vis. *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 6(1), 57-64.
- Nurmasitah, S. e. (2022). The Impact of different Types of Mordant on The Eco-print Dyeing Using Tingi (*Ceriops tagal*). *IOP*.
- Oktavia, F., & Sutoyo, S. (2021). Skirining Fitokimia, Kandungan Flavanoid Total, dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Tumbuhan. *Kimia Riset*, 6(2), 141-153.
- Ozyurek, M. B. (2008). Simulation Total Antioxidant Capacity Assay of Lipophilic and Hydrophilic Antioxidants In The Same Acetone-water Solution Containing 2% Methyl- B-Cyclodextrin Using The Cupric Reducing Antioxidant capacity (CUPRAC) Method. *Elsevier*, 28-39.
- Paryanto, Pranolo, S., Susanti, A., Putrikatam, B., Qatrunga, I., & Wibowo, A. (2021). Tannins Compound in Soga Tingi Bark (*Ceriops tagal*) as Natural Dyes. 5(1).
- Purwati, & Marsella, Y. (2020). Fitokimia dan Potensi Antioksidan Daun Jembelu (*Embelia* sp.) tanaman Obat dari Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal AGRIFOR*, XIXI(1).
- Qadri, N., & Jamil, K. (1993). Chemical Constituents of The fruit and Hypocotyl of Mangrove, *Ceriops tagal*. *Pakistan Journal of Marine Sciences*, 2(2), 119-122.
- Riwanti, P., Izazih, F., & Amaliyah. (2020). Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Etanol pada Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 50,70 dan 96% *Surgussum polycystum* dari Madura. *Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika*, 2(2), 2654-8364.
- Riziki, & Leilani, I. (2017). Etnofarmakologi Tumbuhan Familia Rhizophoraceae oleh Masyarakat di Indonesia. *BioConcetta*, III(1).
- Rizki, & Leilani, I. (t.thn.). Rusdi, M., hasan, T., Ardillah, & Evanti. (2018). Perbandingan Metode Ekstraksi terhadap kadar flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Batang *Boehmeria virgata*. *ad-Dawwa'Jour.Pharm.Sci*, 1(1).

- Sani, R., Nisa, F., Andriani, R., & Maligan, J. (2014). Analisis Rendemen dan Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Mikroalga Laut Tetraselms chuii. *Pangan dan Agroindustri*, 2(2), 121-126.
- Sari, E., & Hidayati, S. (2020). Penetapan Kadar Klorofil dan Karotenoid Daun Sawi (*Brassica*) Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-Vis. *Fullerene Journal of Chemistry*, 5(1), 49-52.
- Sayuti, K., & Yenrina, R. (2015). *Antioksidan, Alami dan Sintetik*. Padang: Andalas University Press.
- Shamsuzzaman, M., & Kalaiselvi, K. a. (2021). Evaluation of Antioxidant and Anticorrosive Activities of Ceriops tagal Plant Extract. *Applied Sciences*.
- Shihab, M. (2009). *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 8). Jakarta: Lentera Hati.
- Sinake, F., Surayanto, E., & Sudewi, S. (2016). Penentuan Kandungan Fenolik dan Sun Protection Factor (SPF) dari Ekstrak Etanol dari Beberapa Bagian Tongkol Jagung (*Zea mays L.*). *Ilmiah Farmasi*, 5(1).
- Supriyatna, D., Mulyani, Y., Rostini, I., & Agung, M. (2019). Aktivitas Antioksidan, Kadar Total Flavonoid dan Fenol Ekstrak Metanol Kulit Batang Mangrove Berdasarkan Stadia Pertumbuhannya. *Perikanan dan Kelautan*, X(2), 35-42.
- Suryanto, & Edi. (2012). Fitokimi Antioksidan. *Putra Media Nusantara*.
- Tristantini, D. d. (2016). Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH pada Daun Tanjung (*Mimusops elengi L*).
- wardhani, R., Akhyar, O., & Prasiska, E. (2018). Skrining Fitokimia, Aktivitas Antioksidan, dan Kadar Total Fenol-Flavonoid Ekstrak Daun dan Buah Tanaman Galam Rawa Gambut (*IMelaleuca cajuputi ROXB*). *Inovasi Pendidikan Sains*, 9(2), 133-143.
- Werdhasari, A. (2014). Peran Antioksidan Bagi Kesehatan. *Pusat Biomedis dan teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes, Kemenkes RI*.
- Winarsi, H. (2013). *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zulaikhah, T. (2017). The Role of Antioxidant to Prevent Free Radicals in The Body. *Jurnal Sains Medika*, 8(1), 39-45.
- Zuraida, Sulistiyan, Sajuthi, D., & Suparto, I. (2017). Fenol, Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Kulit Batang Pulai (*Alstonia scholaris R.Br*). *Penelitian Hasil Hutan*, 35(3), 211-219.

Lampiran 1. Alur penelitian



Lampiran 2. Skema kerja

Skrining Fitokimia

Uji Alkaloid

Ekstrak beberapa mg dilarutkan dengan HCl 1%

Selama 5 menit dipanaskan di atas penangas air dan disaring

Pereaksi dragendorf ditambahkan sebanyak 1-2 mL. + adanya endapan merah jingga

Pereaksi mayer ditambahkan sebanyak 1-2 mL. + adanya endapan berwarna krem

Pereaksi wagner ditambahkan sebanyak 1-2 mL. + adanya endapan berwarna coklat

Uji Steroid dan Terpenoid

Ekstrak beberapa mg dilarutkan dengan kloroform 2 mL

Larutan H_2SO_4 pekat ditambahkan disepanjang sisi tabung reaksi

+ warna coklat pada antarmuka menunjukkan adanya terpenoid

Ekstrak beberapa mg dilarutkan dengan kloroform 2 mL. Asam asetat anhidrat ditambahkan beberapa tetes

Larutan tersebut disimpan di penangas air + ditambahkan 2 mL H_2SO_4 pekat.

(+) adanya cincin coklat menunjukkan steroid, dan adanya warna merah menunjukkan adanya triterpenoid.

Uji Tanin

Ekstrak beberapa mg dilarutkan dengan air suling 5 mL dan disaring

+ $FeCl_3$ 5% ke dalam filtrat

(+) adanya warna hitam atau biru-hijau atau adanya endapan

Uji Saponin

Ekstrak beberapa mg dilarutkan dengan air suling 5-10 mL dan dikocok hingga berbuih

(+) menunjukkan apabila buih bertahan selama 5 menit di penangas air

Uji Glikosida

Tes Borntrager (*Anthraquinone Glycoside*)

Ekstrak beberapa mg dilarutkan dengan 5 mL H₂SO₄ 5% dan disimpan di penangas air selama 1-2 menit dan disaring

Filtrat + kloroform dengan volume sama dan didiamkan selama 5 menit. + amonia setengah dari larutan tersebut

(+) adanya warna merah muda sampai merah pada lapisan amonia

Tes Keller-Killaini (*Cardiac Glycoside*)


Ekstrak beberapa mg dilarutkan dengan 5 mL H₂SO₄ 5%

+ asam asetat glasial 2 mL, FeCl₃ 5% beberapa tetes. + H₂SO₄ pekat 1-2 mL disepanjang sisi tabung uji


(+) adanya cincin coklat pada antarmuka dan cincin ungu yang mungkin muncul di bawah cincin coklat

Kadar Fenolik Total


Uji Fenolik total pada sampel




Uji Fenolik Larutan Pembanding




Kadar Flavonoid Total





Kadar Karotenoid Total




KAPASITAS ANTIOKSIDAN FRAP







CUPRAC


Uji Troloks Cuprac




DPPH



TOAC






Lampiran 3. Perhitungan rendamen ekstrak

A. KB TR

Bobot cawan kosong	=	147.2235	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	160.3074	gram
Bobot ekstrak	=	13.0839	gram
Bobot simplisia	=	107.10	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	12.21	%

B. DAUN TR

Bobot cawan kosong	=	146.6849	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	196.3222	gram
Bobot ekstrak	=	47.6373	gram
Bobot simplisia	=	300.20	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	15.86	%



C. BUAH TR

Bobot cawan kosong	=	147.1899	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	254.8101	gram
Bobot ekstrak	=	53.8101	gram
Bobot simplisia	=	250.10	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	21.51	%

D. AKAR TR

Bobot cawan kosong	=	144.7831	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	1644525.0000	gram
Bobot ekstrak	=	19.6694	gram
Bobot simplisia	=	130.10	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	15.11	%

E. BATANG TR

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot cawan kosong} &= 147.1584 \text{ gram} \\
 \text{Bobot cawan kosong + ekstrak} &= 163.6935 \text{ gram} \\
 \text{Bobot ekstrak} &= 16.5351 \text{ gram} \\
 \text{Bobot simplisia} &= 200.10 \text{ gram} \\
 \% \text{ Rendemen} &= \frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\% \\
 &= 8.26 \%
 \end{aligned}$$



Lampiran 4. Peta lokasi pengambilan sampel



Gambar 14. Peta Lokasi Penelitian

Ket:

○ Lokasi pengambilan sampel

Lampiran 5. Perhitungan pembuatan reagen uji Penelitian

1. Reagen Fenolik

- a. Pereaksi *Follin-Ciocalteu* 7,5%

Ketentuan larutan *Follin-Ciocalteu* 7,5% dalam 100 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 200 mL. jadi, $7,5 \times 2 = 15$ mL *Follin-Ciocalteu* ad 200 mL (185 mL) air suling.

- b. Pereaksi Natrium hidroksida (NaOH) 1%

NaOH 1% dalam 100 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 200 mL. Jadi, 2 g NaOH ad 200 mL (198 mL) air suling.

2. Reagen Flavonoid

- a. Pereaksi Aluminium klorida (AlCl_3) 10%

AlCl_3 10% dalam 10 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 20 mL. Jadi, 2 gram AlCl_3 10% ad 20 mL (18 mL) air suling.

- b. Pereaksi Natrium asetat (CH_3COONa) 0,1%

CH_3COONa ditimbang 1,640 mg ad 20 mL (18,5 mL) air suling.

3. Reagen FRAP

- a. $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 2.0×10^{-2} M

$$0,02 \times 270 \times 50 \text{ mL} = 750 \text{ mg}$$

Jadi, FeCl_3 yang ditimbang 750 mg + 200 μL HCl 5 M ad 50 mL air suling.

- b. TPTZ 1.0×10^{-2} M

$$0,01 \times 335 \times 50 \text{ mL} = 167,5 \text{ mg}$$

Jadi, TPTZ yang ditimbang 167,5 mg ad 50 mL etanol absolut.

- c. Natrium asetat pH 3,6

$$1,55 \times 8 \text{ mL asam asetat pekat ad 500 mL air suling.}$$

4. Reagen CUPRAC

- a. $\text{CuCl}_2 \cdot 1\text{H}_2\text{O}$ 10×10^{-2} M

$$425 \text{ mg} + 250 \text{ mL air suling.}$$

- b. neocuproine 7.5×10^{-2} M

$$390 \text{ mg} + \text{etanol absolut 250 mL.}$$

- c. amonium asetat pH 7,0

$$19,27 \text{ gram} + 250 \text{ mL air suling.}$$

5. Reagen DPPH

Larutan DPPH yang dibutuhkan sebanyak 100 mL

Reagen DPPH konsentrasi 0,1 mM

BM DPPH = 394

0,1 mM = 0,0001 M

mg DPPH = $M \times BM \times Vol (\text{mL})$

$$= 0,0001 \text{ M} \times 394 \times 100 \text{ mL}$$

$$= 3,94 \text{ mg / 100 mL metanol}$$

6. Reagen TOAC

Larutan yang mau dibuat 400 mL

$$\begin{aligned} \text{a. Amonium molibdat } (\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O } 4 \text{ mM} \\ = 0,004 \times 1236 \times 3 \\ = 14,832 \end{aligned}$$

$$\frac{400}{3} \times 14,832 = 1,977 \text{ mg}$$

Jadi, amonium molibdat yang ditimbang sebanyak 14,832 mg

$$\begin{aligned} \text{b. Kalium dihidrogen fosfat } (\text{KH}_2\text{PO}_4) 28 \text{ mM} \\ = 0,028 \times 136 \times 3 \\ = 11,424 \end{aligned}$$

$$\frac{400}{3} \times 11,424 = 152,32 \text{ mg}$$

Jadi, kalium dihidrogen fosfat ditimbang sebanyak 152,32 mg

$$\begin{aligned} \text{c. Asam sulfat } (\text{H}_2\text{SO}_4) 0,6 \text{ M} \\ \text{N1 . V1} = \text{N2 . V2} \\ 5 . X = 0,6 . 3 \\ X = \frac{1,8}{3} \\ X = 0,36 \text{ mL} \\ = 360 \mu\text{L} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \frac{400}{3} \times 360 \mu\text{L} &= 48.000 \mu\text{L} \\ &= 48 \text{ mL} \end{aligned}$$



Lampiran 6. Kadar total Fenolik

Tabel 6. Hasil pengukuran kurva baku asam galat

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi (A)				Persamaan Garis Linear
	A1	A2	A3	Rata-rata	
30	0,236	0,219	0,209	0,221	$y = 0,0127x + 0,0625$
50	0,406	0,438	0,400	0,415	
75	0,541	0,548	0,564	0,551	
100	0,772	0,686	0,623	0,694	
125	0,829	0,861	0,854	0,848	




Gambar 15. Kurva baku asam galat

Lampiran 7. Kadar total flavonoid

Tabel 7. Hasil pengukuran kurva baku kuersetin

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi (A)				Persamaan Garis Linear
	A1	A2	A3	Rata-rata	
15	0,153	0,152	0,153	0,153	
25	0,260	0,255	0,262	0,259	
35	0,375	0,369	0,372	0,372	
50	0,542	0,541	0,549	0,544	
75	0,833	0,831	0,838	0,834	$y = 0,0228x - 0,0235$



Gambar 16. Kurva baku kuersetin

Lampiran 8. Kadar total karotenoid

Tabel 8. Hasil pengukur absorbansi karotenoid


Kelompok	Panjang Gelombang	Absorbansi		
Akar tengar	661,6	0.031	0.029	0.032
	644,8	0.031	0.029	0.031
	470	0.037	0.034	0.036
Batang tengar	661,6	0.160	0.017	0.223
	644,8	0.024	0.160	0.222
	470	0.028	0.226	0.303
Kulit batang tengar	661,6	0.063	0.056	0.043
	644,8	0.064	0.056	0.044
	470	0.096	0.090	0.065
Daun tengar	661,6	0.257	0.260	0.277
	644,8	0.276	0.260	0.281
	470	0.090	0.095	0.103
Buah tengar	661,6	0.061	0.061	0.084
	644,8	0.061	0.060	0.083
	470	0.065	0.057	0.093



Lampiran 9. Kapasitas total antioksidan metode FRAP

Tabel 9. Hasil serapan pembanding vitamin C dengan metode FRAP

Seri Volume	Absorbansi		
30	0,281	0,263	0,272
40	0,413	0,407	0,407
50	0,540	0,540	0,501
60	0,642	0,637	0,620
70	0,707	0,754	0,754




Gambar 17. Kurva baku asam askorbat metode FRAP

ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel 10. Hasil serapan pembanding trolox dengan metode FRAP


Seri Volume	Absorbansi		
20	0,148	0,146	0,173
30	0,285	0,230	0,232
40	0,317	0,349	0,349
50	0,416	0,405	0,419
60	0,510	0,528	0,527
70	0,566	0,703	0,555
80	0,74	0,715	0,72

**Gambar 18.** Kurva baku trolox metode FRAP
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 10. Kapasitas total antioksidan metode CUPRAC

Tabel 11. Hasil serapan pembanding vitamin C dengan metode CUPRAC

Seri Volume	Absorbansi		
50	0,199	0,211	0,212
70	0,296	0,295	0,295
100	0,427	0,413	0,449
150	0,631	0,632	0,626
200	0,796	0,873	0,866




Gambar 19. Kurva baku asam askorbat metode CUPRAC



Tabel 12. Hasil serapan pembanding trolox dengan metode CUPRAC


Seri Volume	Absorbansi		
100	0,281	0,230	0,234
150	0,372	0,412	0,376
200	0,509	0,502	0,502
250	0,655	0,681	0,681
300	0,723	0,734	0,724

**Gambar 20.** Kurva baku trolox metode CUPRAC

Lampiran 11. Kapasitas total antioksidan metode DPPH

Tabel 13. Hasil serapan pembanding vitamin C dengan metode DPPH


Seri Volume	Absorbansi		
Blangko	0,799	0,812	0,824
100	0,715	0,719	0,724
200	0,672	0,674	0,672
300	0,598	0,586	0,591
400	0,515	0,534	0,51
500	0,471	0,499	0,423
600	0,529	0,129	0,536
700	0,333	0,342	0,31



Gambar 21. Kurva baku asam askorbat metode DPPH

Tabel 14. Hasil serapan pembanding trolox dengan metode DPPH

Seri Volume	Absorbansi		
Blangko 0	0,799	0,812	0,824
10	0,74	0,706	0,748
25	0,647	0,649	0,64
50	0,551	0,554	0,557
100	0,343	0,345	0,35
150	0,143	0,126	0,119


**Gambar 22.** Kurva baku trolox metode DPPH

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 12. Kapasitas total antioksidan metode TOAC

Tabel 15. Hasil serapan pembanding asam askorbat dengan metode TOAC

Seri Volumen	Absorbansi		
50	0,330	0,309	0,309
100	0,678	0,617	0,649
150	0,961	0,958	0,959
200	1,274	1,275	1,268
250	1,565	1,744	1,516




Gambar 23. Kurva baku asam askorbat metode TOAC



Tabel 16. Hasil serapan pembanding trolox dengan metode TOAC

Seri Volume	Absorbansi		
50	0,130	0,129	0,145
100	0,297	0,289	0,292
150	0,427	0,419	0,441
200	0,586	0,64	0,616
250	0,784	0,731	0,787

**Gambar 24.** Kurva baku trolox metode TOAC

Lampiran 13. Perhitungan kadar total dan kapasitas antioksidan

1. Kadar total fenolik (digunakan juga untuk flavonoid, CUPRAC, FRAP, dan TOAC).


As.galat 5 mg → 10.0 mL (500 ppm) disebut larutan stok baku as.galat

Volume larutan stok	Mg as.galat (x)	Volume metanol	Volume total	Konsentrasi (ppm)
30	15	220 ml	250 ml	120
50	25	200 ml		200
75	37.5	175 ml		300
100	50	180 ml		400
125	62.5	150 ml		500

Tabel untuk grafik kurva baku

X	Y (serapan)			Y (rata-rata)
	1	2	3	
15	0.236	0.219	0.209	0.2213
25	0.406	0.438	0.400	0.4147
37.5	0.541	0.548	0.564	0.5510
50	0.772	0.686	0.623	0.6937
62.5	0.829	0.861	0.854	0.8480

Grafik



Bobot ekstrak

Bobot sampel	Volume metanol (ml)	Konsentrasi ppm	Jumlah sampel
10 mg	10	1000	0.2
10 mg	10	1000	0.2
10 mg	10	1000	0.2
10 mg	10	1000	0.2
10 mg	10	1000	0.2

Didapat dari perhitungan y :ax+b x : bobot setara as.galat

Sampel	Bobot ekstrak (mg)	Setara asam galat		
		1	2	3
Akar tengar	10	28.23	28.15	28.07
Batang tengar	10	30.98	29.41	29.41
Kulit batang tengar	10	27.99	27.68	29.80
Daun tengar	10	34.45	35.00	33.82
Buah tengar	10	55.39	56.34	55.47

Kadar total fenolik

Sampel	Jumlah Sampel (mg)	Kadar total (mg/g ekstrak)			Rata-rata	SD
		1	2	3		
Akar tengar	0.2	141.1417	140.748	140.3543	140.75	0.39
Batang tengar	0.2	154.9213	147.0472	147.0472	149.67	4.55
Kulit batang tengar	0.2	139.9606	138.3858	149.0157	142.45	5.74
Daun tengar	0.2	172.2441	175.000	169.0945	172.11	2.95
Buah tengar	0.2	276.9685	281.6929	277.3622	278.67	2.62

2. Perhitungan DPPH

Pembuatan larutan vit c

5.2 mg dilarutkan hingga 25 mL (208 ppm)

Volume larutan stok	μg vit c (μg)*	Volume metanol (μL)	Volume total (μL)	Konsentrasi (ppm)
0	0	1.500	1.500	0
100	20.8	1.400		13.86
200	41.6	1.300		27.73
300	62.4	1.200		41.6
400	83.2	1.100		55.46
500	104	1.000		69.33
600	124.8	900		83.2
700	145.6	800		97.06

Perhitungan %inhibisi

volume	Serapan			Rata-rata
	1	2	3	
Blanko 0	0.799	0.812	0.824	0.811
100	0.715	0.719	0.724	0.719
200	0.672	0.674	0.672	0.672
300	0.598	0.586	0.591	0.591
400	0.515	0.534	0.51	0.519
500	0.471	0.516	0.499	0.495
600	0.529	0.423	0.536	0.496
700	0.333	0.342	0.310	0.328

%inhibisi


Vol. sampel (x)	Serapan			Blanko (A)	Inhibisi% ***			Y Rata-rata
100	0.715	0.719	0.724	0.811	11.910	11.417	10.801	11.376
200	0.672	0.674	0.672		17.207	16.961	17.207	17.125
300	0.598	0.586	0.591		26.324	27.803	27.187	27.064
400	0.515	0.534	0.510		36.550	34.209	37.166	35.975
500	0.471	0.516	0.499		41.971	36.427	38.522	38.973
600	0.529	0.423	0.536		34.825	47.885	33.963	38.891
700	0.333	0.342	0.310		58.973	57.864	61.807	58.419

Keterangan:

$$***: \left[\frac{(AB-AA)}{AB} \right] \times 100$$

Grafik

$$Y = ax + b$$



Larutan sampel : 5.2 mg dilarutkan hingga 5 mL (1040 ppm)

Sampel	Bobot sampel (mg)	Volume metanol (μL)	Volume yang dipipet	Jumlah sampel
Buah tengar	50.2	5000	100	1.004
Kulit tengar	50	5000	50	0.5
Akar tengar	50.4	5000	50	0.504
Batang tengar	50	5000	50	0.5
Daun tengar	50.6	5000	50	0.506

Perhitungan kapasitas antioksidan

Bobot ekstrak (mg)	Kapasitas antioksidan			Rata-rata	SD
	1	2	3		
Buah (50.2)	78.55641	81.52119	76.4002	78.83	2.57
kulit (50)	376.3893	367.1887	357.447	367.01	9.47

Akar (50.4)	290.1806	293.939	289.6437	291.25	2.34
Batang (50)	183.178	185.8841	175.6011	181.55	5.33
Daun (50.6)	217.9065	217.9065	218.4413	218.08	0.31

Pembuatan larutan trolox

5.1 mg dilarutkan hingga 25 mL (204 ppm)

Volume larutan stok	µg trolox (µg)*	Volume metanol (µL)	Volume total (µL)	Konsentrasi (ppm)
0	0	1.500	1.500	0
10	2.04	1.490		1.36
25	5.1	1.475		3.45
50	10.2	1.450		7.03
100	20.4	1.400		14.57
150	30.6	1.350		22.66

Perhitungan %inhibisi

volume	Serapan			Rata-rata
	1	2	3	
Blanko 0	0.799	0.812	0.824	0.811
10	0.783	0.755	0.740	0.759
25	0.647	0.649	0.640	0.645
50	0.554	0.557	0.561	0.557
100	0.343	0.345	0.354	0.347
150	0.143	0.126	0.153	0.140

%inhibisi


Vol. sampel (x)	Serapan			Blanko (A)	Inhibisi%***			Y Rata-rata
10	0.783	0.755	0.740	0.811	6.98	8.83	7.84	7.885
25	0.647	0.649	0.640		20.29	20.04	21.15	20.492
50	0.554	0.557	0.561		32.11	31.38	30.88	31.457
100	0.343	0.345	0.354		57.74	57.49	56.88	57.371
150	0.143	0.126	0.153		82.38	84.48	85.34	84.065

Keterangan

$$***: \left[\frac{(AB-AA)}{AB} \right] \times 100$$

Grafik

$$Y = ax + b$$



Larutan sampel : 5.1 mg dilarutkan hingga 5 mL (1040 ppm)

Sampel	Bobot sampel (mg)	Volume metanol (µL)	Volume yang dipipet	Jumlah sampel
Buah tengar	75	5000	10	0.15
Kulit tengar	75	5000	10	0.15
Akar tengar	75.9	5000	10	0.1518
Batang tengar	75.6	5000	10	0.1512
Daun tengar	50.2	5000	25	0.251

Perhitungan kapasitas antioksidan

Bobot ekstrak (mg)	Kapasitas antioksidan			Rata-rata	SD
	1	2	3		
Buah (50.2)	73.21863	76.21279	71.04105	73.49	2.60
kulit (50)	183.1862	178.5588	173.6593	178.47	4.76
Akar (50.4)	139.3238	139.0548	132.5996	136.99	3.81

Batang (50)	73.1776	76.68808	81.54874	77.14	4.20
Daun (50.6)	62.62558	62.62558	62.46291	62.57	0.09



Lampiran 14. Uji One-Way ANOVA yang dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Duncan pada masing-masing perlakuan

1. HASIL UJI STATISTIK (KADAR FENOLIK)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	31.95080291
	Absolute	.207
Most Extreme Differences	Positive	.207
	Negative	-.167
Kolmogorov-Smirnov Z		.802
Asymp. Sig. (2-tailed)		.540

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

KADAR

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.735	4	10	.041

Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

KADAR

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	40847.078	4	10211.770	736.386	.000
Within Groups	138.674	10	13.867		
Total	40985.752	14			

Data signifikan jika $P<0.05$, kesimpulan: ada data yg berbeda (signifikan)

Multiple Comparisons

Dependent Variable: KADAR

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LS	AKAR_FENOLIK	BATANG_FENOLIK	-8.92390*	3.0405	.01	-15.6987	-2.1491
		KULIT	5	5			
		BATANG_FENOLIK	-1.70603	3.0405	.58	-8.4808	5.0687
		K	5	7			
		DAUN_FENOLIK	-31.36487*	3.0405	.00	-38.1396	-24.5901
	D	BUAH_FENOLIK	137.92653	3.0405	.00	144.701	131.151
		*	5	0		3	8
		AKAR_FENOLIK	8.92390*	3.0405	.01	2.1491	15.6987
		KULIT	5	5			
		BATANG_FENOLIK	7.21787*	3.0405	.03	.4431	13.9926
KULIT	K	K	5	9			
		DAUN_FENOLIK	-22.44097*	3.0405	.00	-29.2157	-15.6662
		*	5	0			
		BUAH_FENOLIK	129.00263	3.0405	.00	135.777	122.227
		*	5	0		4	9
BATANG_FENOLIK	K	AKAR_FENOLIK	1.70603	3.0405	.58	-5.0687	8.4808
		BATANG_FENOLIK	-7.21787*	3.0405	.03	-13.9926	-.4431
		K	5	9			
		DAUN_FENOLIK	-29.65883*	3.0405	.00	-36.4336	-22.8841
		*	5	0			
BUAH_FENOLIK	K	BUAH_FENOLIK	136.22050	3.0405	.00	142.995	129.445
		*	5	0		3	7

	AKAR_FENOLIK	31.36487*	3.0405 5	.00 0	24.5901	38.1396
	BATANG_FENOLIK	22.44097*	3.0405 5	.00 0	15.6662	29.2157
	KULIT					
DAUN_FENOLIK	BATANG_FENOLIK	29.65883*	3.0405 5	.00 0	22.8841	36.4336
	K					
	BUAH_FENOLIK	106.56167	3.0405 *	.00 5	113.336 4	-99.7869
	AKAR_FENOLIK	137.92653	3.0405 *	.00 5	131.151 8	144.701 3
	BATANG_FENOLIK	129.00263	3.0405 *	.00 5	122.227 9	135.777 4
BUAH_FENOLIK	KULIT	136.22050	3.0405 *	.00 5	129.445 7	142.995 3
	BATANG_FENOLIK					
	DAUN_FENOLIK	106.56167	3.0405 *	.00 5	99.7869 0	113.336 4

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

	PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	AKAR_FENOLIK	3	140.7480			
	KULIT BATANG_FENOLIK	3	142.4540			
	BATANG_FENOLIK	3		149.6719		
	DAUN_FENOLIK	3			172.1129	
	BUAH_FENOLIK	3				278.6745
	Sig.		.587	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

2. HASIL UJI STATISTIK (KADAR FLAVANOID)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	38.37600679
	Absolute	.344
Most Extreme Differences	Positive	.344
	Negative	-.156
Kolmogorov-Smirnov Z		1.331
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi tidak normal

Test of Homogeneity of Variances

FLAVONOID			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
11.492	4	10	.001

Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data tidak homogen

ANOVA

FLAVONOID	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	22372.680	4	5593.170	678.543	.000
Within Groups	82.429	10	8.243		
Total	22455.109	14			

Data signifikan jika $P<0.05$, kesimpulan: ada data yg berbeda (signifikan)

Multiple Comparisons

Dependent Variable: FLAVONOID

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LS	AKAR_FLAVONOID	BATANG_FLAVONO	-6.28660*	2.3442	.02	-	-1.0634
		ID	0	0	3	11.5098	
		KULIT					
		BATANG_FLAVONO	-7.45620*	2.3442	.01	-	-2.2330
		ID	0	0	0	12.6794	
	BATANG_FLAVONO	DAUN_FLAVONOID	-	2.3442	.00	102.774	
			97.55117*	0	0	4	92.3280
		BUAH_FLAVONOID	6.50580*	2.3442	.02	1.2826	11.7290
		AKAR_FLAVONOID	6.28660*	2.3442	.02	1.0634	11.5098
		KULIT					
D	ID	BATANG_FLAVONO	-1.16960	2.3442	.62	-6.3928	4.0536
		ID	0	0	9		
		DAUN_FLAVONOID	-	2.3442	.00	-	-
			91.26457*	0	0	96.4878	86.0414
		BUAH_FLAVONOID	12.79240*	2.3442	.00	7.5692	18.0156
KULIT	BATANG_FLAVONO	AKAR_FLAVONOID	7.45620*	2.3442	.01	2.2330	12.6794
		BATANG_FLAVONO					
		ID	1.16960	2.3442	.62	-4.0536	6.3928
		DAUN_FLAVONOID	-	2.3442	.00	-	-
			90.09497*	0	0	95.3182	84.8718
DAUN_FLAVONOID	AKAR_FLAVONOID	BUAH_FLAVONOID	13.96200*	2.3442	.00	8.7388	19.1852
			0	0	0		

	BATANG_FLAVONO	91.26457*	2.3442	.00	86.0414	96.4878
	ID		0	0		
	KULIT		2.3442	.00		
	BATANG_FLAVONO	90.09497*	2.3442	.00	84.8718	95.3182
	ID		0	0		
	BUAH_FLAVONOID	104.0569	2.3442	.00	98.8338	109.280
		7*	0	0		2
	AKAR_FLAVONOID	-6.50580*	2.3442	.02	-	-1.2826
	BATANG_FLAVONO	-	2.3442	.00	-	-7.5692
	ID	12.79240*	0	0	18.0156	
	KULIT	-	2.3442	.00	-	
	BATANG_FLAVONO	13.96200*	0	0	19.1852	-8.7388
	ID	-	2.3442	.00	-	
	DAUN_FLAVONOID	104.0569	2.3442	.00	109.280	-
		7*	0	0	2	98.8338

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)



FLAVONOID						
	PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	BUAH_FLAVONOID	3	21.0161			
	AKAR_FLAVONOID	3		27.5219		
	BATANG_FLAVONOID	3			33.8085	
	KULIT	3				34.9781
	BATANG_FLAVONOID	3				
	DAUN_FLAVONOID	3				125.0731
	Sig.		1.000	1.000	.629	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

3. HASIL UJI STATISTIK (KADAR KAROTENOID)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-16.0265487
	Std. Deviation	14.30549739
	Absolute	.153
Most Extreme Differences	Positive	.153
	Negative	-.153
Kolmogorov-Smirnov Z		.592
Asymp. Sig. (2-tailed)		.875

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

KAROTENOID

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.245	4	10	.353

Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

KAROTENOID

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	20638.704	4	5159.676	5213.204	.000
Within Groups	9.897	10	.990		
Total	20648.601	14			

Data signifikan jika $P<0.05$, kesimpulan: terdapat perbedaan (signifikan)

Multiple Comparisons

Dependent Variable: KAROTENOID

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LS D	AKAR_KAROTENOID	BATANG_KAROTENO ID	1.81635*	.8122 9	.04 9	.0064	3.6263
		KULIT BATANG _KAROTENOID	- 5.51649*	.8122 9	.00 0	-	-
		DAUN _KAROTENOID	92.38833	.8122 *	.00 9	7.3264	3.7066
		BUAH _KAROTENOID	3.57659*	.8122 9	.00 1	90.578	94.198
		AKAR_KAROTENOID	- 1.81635*	.8122 9	.04 9	4	2
	ID	BATANG_KAROTENO _KAROTENOID	7.33285*	.8122 9	.00 0	1.7667	5.3865
		DAUN _KAROTENOID	90.57197	.8122 *	.00 9	3.6263	-.0064
		BUAH _KAROTENOID	1.76024	.8122 9	.05 5	-	-
		AKAR_KAROTENOID	5.51649*	.8122 9	.00 0	-	-
		BATANG_KAROTENO ID	7.33285*	.8122 9	.00 0	5.5229	9.1427
DAUN_KAROTENOID	KULIT BATANG _KAROTENOID	DAUN _KAROTENOID	97.90482	.8122 *	.00 9	88.762	92.381
		BUAH _KAROTENOID	9.09308*	.8122 9	.00 0	92.381	88.762
		AKAR_KAROTENOID	92.38833	.8122 *	.00 9	99.714	7
		DAUN _KAROTENOID	- 9.09308*	.8122 9	.00 0	94.198	10.903
		BATANG_KAROTENO ID	90.57197	.8122 *	.00 9	90.578	-
	BATANG_KAROTENO ID	AKAR_KAROTENOID	92.38833	.8122 *	.00 9	2	4
		DAUN _KAROTENOID	- 92.38833	.8122 *	.00 9	-	-
		BATANG_KAROTENO ID	90.57197	.8122 *	.00 9	88.762	9
		AKAR_KAROTENOID	- 90.57197	.8122 *	.00 9	1	-
		DAUN _KAROTENOID	90.57197	.8122 *	.00 9	-	-

	KULIT BATANG _KAROTENOID	97.90482*	.8122 9	.00 0	- 7	- 9
	BUAH _KAROTENOID	88.81174*	.8122 9	.00 0	90.621 6	87.001 8
	AKAR_KAROTENOID	3.57659*	.8122 9	.00 1	5.3865 -	1.7667 -
	BATANG_KAROTENO ID	-1.76024	.8122 9	.05 5	- 3.5701	.0497 -
BUAH _KAROTENOID	KULIT BATANG _KAROTENOID	9.09308*	.8122 9	.00 0	10.903 0	7.2832 -
	DAUN _KAROTENOID	88.81174*	.8122 9	.00 0	87.001 8	90.621 6

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

KAROTENOID						
	PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	DAUN _KAROTENOID	3	-89.9619			
	BUAH _KAROTENOID	3		-1.1502		
	BATANG_KAROTENOID	3		.6101		
	AKAR_KAROTENOID	3			2.4264	
	KULIT BATANG _KAROTENOID	3				7.9429
	Sig.		1.000	.055	1.000	1.000

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang sama/tidak berbeda nyata

4. HASIL UJI STATISTIK (KADAR TOAC ASAM ASKORBAT)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.13033405
	Absolute	.242
Most Extreme Differences	Positive	.242
	Negative	-.157
Kolmogorov-Smirnov Z		.937
Asymp. Sig. (2-tailed)		.344

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

TOAC (VITAMIN C)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.302	4	10	.130

Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

TOAC (VITAMIN C)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	226.519	4	56.630	896.232	.000
Within Groups	.632	10	.063		
Total	227.151	14			

Data signifikan jika $P<0.05$, kesimpulan: ada data yg berbeda (signifikan)

Multiple Comparisons

Dependent Variable: TOAC (VITAMIN C)

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
AKAR_TOAC (VITAMIN C)	BATANG_TOAC (VITAMIN C)		-.85239*	.20524	.002	-1.3097	-.3951
	KULIT						
	BATANG_TOAC (VITAMIN C)		-8.56697*	.20524	.000	-9.0243	-8.1097
	DAUN_TOAC (VITAMIN C)		-5.09671*	.20524	.000	-5.5540	-4.6394
	BUAH_TOAC (VITAMIN C)		-9.55454*	.20524	.000	-10.0119	-9.0972
	AKAR_TOAC (VITAMIN C)		.85239*	.20524	.002	.3951	1.3097
LSD (VITAMIN C)	KULIT						
	BATANG_TOAC (VITAMIN C)		-7.71458*	.20524	.000	-8.1719	-7.2573
	DAUN_TOAC (VITAMIN C)		-4.24433*	.20524	.000	-4.7016	-3.7870
	BUAH_TOAC (VITAMIN C)		-8.70216*	.20524	.000	-9.1595	-8.2448
	AKAR_TOAC (VITAMIN C)		8.56697*	.20524	.000	8.1097	9.0243
	BATANG_TOAC (VITAMIN C)		7.71458*	.20524	.000	7.2573	8.1719
KULIT	DAUN_TOAC (VITAMIN C)		3.47025*	.20524	.000	3.0129	3.9276
	BUAH_TOAC (VITAMIN C)		-.98758*	.20524	.001	-1.4449	-.5303
	AKAR_TOAC (VITAMIN C)		5.09671*	.20524	.000	4.6394	5.5540
	DAUN_TOAC (VITAMIN C)						

	BATANG_TOAC (VITAMIN C)	4.24433*	.20524	.000	3.7870	4.7016
	KULIT					
	BATANG_TOAC (VITAMIN C)	-3.47025*	.20524	.000	-3.9276	-3.0129
	BUAH_TOAC (VITAMIN C)	-4.45783*	.20524	.000	-4.9151	-4.0005
	AKAR_TOAC (VITAMIN C)	9.55454*	.20524	.000	9.0972	10.0119
	BATANG_TOAC (VITAMIN C)	8.70216*	.20524	.000	8.2448	9.1595
	KULIT					
BUAH_TOAC (VITAMIN C)	BATANG_TOAC (VITAMIN C)	.98758*	.20524	.001	.5303	1.4449
	DAUN_TOAC (VITAMIN C)	4.45783*	.20524	.000	4.0005	4.9151

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

TOAC (VITAMIN C)						
	PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	AKAR_TOAC (VITAMIN C)	3	13.9533			
	BATANG_TOAC (VITAMIN C)	3		14.8057		
	DAUN_TOAC (VITAMIN C)	3			19.0500	
	KULIT	3				22.5203
	BATANG_TOAC (VITAMIN C)	3				
	BUAH_TOAC (VITAMIN C)	3				23.5078
	Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang berbeda nyata

HASIL UJI STATISTIK (KADAR TOAC TROLOX)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.31508260
	Absolute	.242
Most Extreme Differences	Positive	.242
	Negative	-.157
Kolmogorov-Smirnov Z		.938
Asymp. Sig. (2-tailed)		.343

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

TOAC (TROLOX)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.302	4	10	.130

Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

TOAC (TROLOX)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	928.969	4	232.242	895.760	.000
Within Groups	2.593	10	.259		
Total	931.561	14			

Data signifikan jika $P<0.05$, kesimpulan: ada data yg berbeda (signifikan)

Multiple Comparisons

Dependent Variable: TOAC (TROLOX)

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	AKAR_TOAC (TROLOX)	BATANG_TOAC (TROLOX)	-1.72120*	.41575	.002	-2.6475	-.7949
		KULIT BATANG_TOAC (TROLOX)	17.35089*	.41575	.000	-18.2772	-16.4245
		DAUN_TOAC (TROLOX)	10.32411*	.41575	.000	-11.2505	-9.3978
		BUAH_TOAC (TROLOX)	19.34318*	.41575	.000	-20.2695	-18.4168
		AKAR_TOAC (TROLOX)	1.72120*	.41575	.002	.7949	2.6475
	BATANG_TOAC (TROLOX)	KULIT BATANG_TOAC (TROLOX)	15.62969*	.41575	.000	-16.5560	-14.7033
		DAUN_TOAC (TROLOX)	-8.60291*	.41575	.000	-9.5292	-7.6766
		BUAH_TOAC (TROLOX)	17.62198*	.41575	.000	-18.5483	-16.6956
		AKAR_TOAC (TROLOX)	17.35089*	.41575	.000	16.4245	18.2772
		BATANG_TOAC (TROLOX)	15.62969*	.41575	.000	14.7033	16.5560
DAUN_TOAC (TROLOX)	KULIT BATANG_TOAC (TROLOX)	DAUN_TOAC (TROLOX)	7.02678*	.41575	.000	6.1004	7.9531
		BUAH_TOAC (TROLOX)	-1.99229*	.41575	.001	-2.9186	-1.0659
		AKAR_TOAC (TROLOX)	10.32411*	.41575	.000	9.3978	11.2505
		BATANG_TOAC (TROLOX)	8.60291*	.41575	.000	7.6766	9.5292
		KULIT BATANG_TOAC (TROLOX)	-7.02678*	.41575	.000	-7.9531	-6.1004

	BUAH_TOAC (TROLOX)	-9.01907*	.41575	.000	-9.9454	-8.0927
	AKAR_TOAC (TROLOX)	19.34318*	.41575	.000	18.4168	20.2695
	BATANG_TOAC (TROLOX)	17.62198*	.41575	.000	16.6956	18.5483
BUAH_TOAC (TROLOX)	KULIT BATANG_ TOAC (TROLOX)	1.99229*	.41575	.001	1.0659	2.9186
	DAUN_TOAC (TROLOX)	9.01907*	.41575	.000	8.0927	9.9454

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

	PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05				
			1	2	3	4	5
	AKAR_TOAC (TROLOX)	3	26.8998				
	BATANG_TOAC (TROLOX)	3		28.6210			
Duncan ^a	DAUN_TOAC (TROLOX)	3			37.2239		
	KULIT BATANG_ TOAC (TROLOX)	3				44.2507	
	BUAH_TOAC (TROLOX)	3					46.2430
	Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang berbeda nyata

5. HASIL UJI STATISTIK (KADAR FRAP ASAM ASKORBAT)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	35.86901990
	Absolute	.228
Most Extreme Differences	Positive	.176
	Negative	-.228
Kolmogorov-Smirnov Z		.881
Asymp. Sig. (2-tailed)		.419

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.




Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

FRAP (VITAMIN C)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.453	4	10	.114



Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

FRAP (VITAMIN C)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	19104.470	4	4776.117	1584.062	.000
Within Groups	30.151	10	3.015		
Total	19134.621	14			

Data signifikan jika $P<0.05$, kesimpulan: ada data yg berbeda (signifikan)

B. Beda nyata (Duncan)

		N	Subset for alpha = 0.05			
	PERLAKUAN		1	2	3	4
Duncan ^a	DAUN_FRAP (VITAMIN C)	3	27.2800			
	AKAR_FRAP (VITAMIN C)	3		101.0100		
	BUAH_FRAP (VITAMIN C)	3			114.8367	
	BATANG_FRAP (VITAMIN C)	3				116.1000
	KULIT BATANG_FRAP (VITAMIN C)	3				125.4300
	Sig.		1.000	1.000	.394	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang berbeda nyata

HASIL UJI STATISTIK (KADAR FRAP TROLOX)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	114.4800000
	Std. Deviation	10.54313644
	Absolute	.153
Most Extreme Differences	Positive	.153
	Negative	-.153
Kolmogorov-Smirnov Z		.592
Asymp. Sig. (2-tailed)		.875

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

FRAP (TROLOX)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.471	4	10	.112

Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

FRAP (TROLOX)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	26674.351	4	6668.588	1559.366	.000
Within Groups	42.765	10	4.276		
Total	26717.116	14			

Data signifikan jika $P<0.05$, kesimpulan: ada data yg berbeda (signifikan)



Multiple Comparisons

Dependent Variable: FRAP (TROLOX)

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LS D X)	KULIT	-	-	-	-	-	-
		BATANG_FRAP(TROLOX)	17.96667	1.688	.00	21.728	14.204
		*	49	0		8	5
	AKAR_FRAP(TROLOX)	-	1.688	.00		-	-
		29.07667	1.688	.00		32.838	25.314
		*	49	0		8	5
D X)	DAUN_FRAP(TROLOX)	86.96333	1.688	.00		83.201	90.725
		*	49	0		2	5
		-	1.688	.00		-	-
D X)	BUAH_FRAP(TROLOX)	16.45333	1.688	.00		20.215	12.691
		*	49	0		5	2

	AKAR_FRAP(TROLO X)	17.96667 *	1.688 49	.00 0	14.204 5	21.728 8
KULIT	BATANG_FRAP(TRO LOX)	- 11.11000	1.688 49	.00 0	- 14.872	-7.3478
BATANG_FRAP(TRO LOX)	DAUN_FRAP(TROLO X)	104.9300 0*	1.688 49	.00 0	101.16 78	108.69 22
	BUAH_FRAP(TROLO X)	1.51333	1.688 49	.39 1	-2.2488	5.2755
	AKAR_FRAP(TROLO X)	29.07667 *	1.688 49	.00 0	25.314 5	32.838 8
BATANG_FRAP(TRO LOX)	KULIT BATANG_FRAP(TRO LOX)	11.11000 *	1.688 49	.00 0	7.3478	14.872 2
	DAUN_FRAP(TROLO X)	116.0400 0*	1.688 49	.00 0	112.27 78	119.80 22
	BUAH_FRAP(TROLO X)	12.62333 *	1.688 49	.00 0	8.8612	16.385 5
	AKAR_FRAP(TROLO X)	- 86.96333	1.688 49	.00 0	- 90.725	- 83.201
DAUN_FRAP(TROLO X)	KULIT BATANG_FRAP(TRO LOX)	- 104.9300	1.688 49	.00 0	- 108.69	- 101.16
	BATANG_FRAP(TRO LOX)	116.0400 0*	1.688 49	.00 0	119.80 22	112.27 78
	BUAH_FRAP(TROLO X)	- 103.4166	1.688 49	.00 0	- 107.17	- 99.654
BUAH_FRAP(TROLO X)	AKAR_FRAP(TROLO X)	16.45333 *	1.688 49	.00 0	12.691 2	20.215 5
	KULIT BATANG_FRAP(TRO LOX)	-1.51333	1.688 49	.39 1	-5.2755	2.2488

	BATANG_FRAP(TROLOX)	-	1.688	.00	-	-
		12.62333	49	0	16.385	-8.8612
	DAUN_FRAP(TROLOX)	103.4166	1.688	.00	99.654	107.17
	X)	7*	49	0	5	88

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

FRAP (TROLOX)						
	PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	DAUN_FRAP(TROLOX)	3	32.2100			
	AKAR_FRAP(TROLOX)	3		119.1733		
	BUAH_FRAP(TROLOX)	3			135.6267	
	KULIT	3				137.1400
	BATANG_FRAP(TROLOX)	3				148.2500
	Sig.		1.000	1.000	.391	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang berbeda nyata



6. HASIL UJI STATISTIK (KADAR CUPRAC ASAM ASKORBAT)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.45060077
	Absolute	.174
Most Extreme Differences	Positive	.174
	Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z		.673
Asymp. Sig. (2-tailed)		.756

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

CUPRAC (VITAMIN C)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
5.052	4	10	.017

Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

CUPRAC (VITAMIN C)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1093.339	4	273.335	6.274	.009
Within Groups	435.676	10	43.568		
Total	1529.015	14			

Data signifikan jika $P<0.05$, kesimpulan: data tidak berbeda (tidak signifikan)

Multiple Comparisons

Dependent Variable: CUPRAC (VITAMIN C)

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	KULIT BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	21.72686*	5.38935	.002	9.7187	33.7351
	AKAR_CUPRAC (VITAMIN C)	CUPRAC (VITAMIN C)	22.12417*	5.38935	.002	10.1160	34.1324
	DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	6.98893	5.38935	.224	-5.0193	18.9971
	BUAH_CUPRAC (VITAMIN C)	AKAR_CUPRAC (VITAMIN C)	12.16071*	5.38935	.048	.1525	24.1689
	BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	21.72686*	5.38935	.002	-33.7351	-9.7187
	DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	CUPRAC (VITAMIN C)	.39730	5.38935	.943	-11.6109	12.4055
	BUAH_CUPRAC (VITAMIN C)	DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	14.73793*	5.38935	.021	-26.7461	-2.7297
	AKAR_CUPRAC (VITAMIN C)	BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	-9.56615	5.38935	.106	-21.5744	2.4421
	BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	KULIT BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	22.12417*	5.38935	.002	-34.1324	-10.1160
	DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	-.39730	5.38935	.943	-12.4055	11.6109
DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	BUAH_CUPRAC (VITAMIN C)	DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	15.13523*	5.38935	.019	-27.1434	-3.1270
	AKAR_CUPRAC (VITAMIN C)	BUAH_CUPRAC (VITAMIN C)	-9.96345	5.38935	.094	-21.9717	2.0448
	AKAR_CUPRAC (VITAMIN C)	AKAR_CUPRAC (VITAMIN C)	-6.98893	5.38935	.224	-18.9971	5.0193

BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	14.73793*	5.38935	.021	2.7297	26.7461
KULIT BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	15.13523*	5.38935	.019	3.1270	27.1434
BUAH_CUPRAC (VITAMIN C)	5.17178	5.38935	.360	-6.8364	17.1800
AKAR_CUPRAC (VITAMIN C)	-12.16071*	5.38935	.048	-24.1689	-.1525
BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	9.56615	5.38935	.106	-2.4421	21.5744
BUAH_CUPRAC (VITAMIN C)	9.96345	5.38935	.094	-2.0448	21.9717
KULIT BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	-5.17178	5.38935	.360	-17.1800	6.8364

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

CUPRAC (VITAMIN C)

Duncan ^a	PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
	KULIT BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	3	199.8444	
	BATANG_CUPRAC (VITAMIN C)	3	200.2417	
	BUAH_CUPRAC (VITAMIN C)	3	209.8078	209.8078
	DAUN_CUPRAC (VITAMIN C)	3		214.9796
	AKAR_CUPRAC (VITAMIN C)	3		221.9685
	Sig.		.108	.056

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang sama nyata

HASIL UJI STATISTIK (KADAR CUPRAC TROLOX)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	13.45958532
	Absolute	.171
Most Extreme Differences	Positive	.171
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		.663
Asymp. Sig. (2-tailed)		.772

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

CUPRAC (TROLOX)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
5.052	4	10	.017

Data homogen jika $p>0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

CUPRAC (TROLOX)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1829.549	4	457.387	6.139	.009
Within Groups	745.031	10	74.503		
Total	2574.580	14			

Data signifikan jika $P < 0.05$, kesimpulan: data tidak berbeda (tidak signifikan)**Multiple Comparisons**

Dependent Variable: CUPRAC (TROLOX)

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	BATANG_ CUPRAC (TROLOX)	KULIT BATANG_					
		CUPRAC	28.00481*	7.04761	.003	12.3018	43.7079
		(TROLOX)					
		AKAR_CUPRAC	28.72839*	7.04761	.002	13.0253	44.4314
		(TROLOX)					
	DAUN_CUPRAC (TROLOX)	DAUN_CUPRAC	9.13938	7.04761	.224	-6.5637	24.8424
		(TROLOX)					
		BUAH_CUPRAC	15.08473	7.04761	.058	-.6183	30.7878
		(TROLOX)					
		KULIT BATANG_					
BATANG_ CUPRAC (TROLOX)	AKAR_CUPRAC (TROLOX)	AKAR_CUPRAC					
		(TROLOX)	28.00481*	7.04761	.003	-43.7079	-12.3018
		KULIT BATANG_					
	DAUN_CUPRAC (TROLOX)	CUPRAC	.72358	7.04761	.920	-14.9795	16.4266
		(TROLOX)					
		DAUN_CUPRAC					
AKAR_CUPRAC (TROLOX)	BUAH_CUPRAC (TROLOX)	(TROLOX)	18.86543*	7.04761	.023	-34.5685	-3.1624
		AKAR_CUPRAC	-12.92007	7.04761	.097	-28.6231	2.7830
		(TROLOX)					
		AKAR_CUPRAC					

	BATANG_					
	CUPRAC	-.72358	7.04761	.920	-16.4266	14.9795
KULIT BATANG_	(TROLOX)					
CUPRAC	DAUN_CUPRAC	-	7.04761	.019	-35.2921	-3.8860
(TROLOX)	(TROLOX)	19.58901*				
	BUAH_CUPRAC					
	(TROLOX)	-13.64365	7.04761	.082	-29.3467	2.0594
	AKAR_CUPRAC					
	(TROLOX)	-9.13938	7.04761	.224	-24.8424	6.5637
	BATANG_					
	CUPRAC	18.86543*	7.04761	.023	3.1624	34.5685
DAUN_CUPRAC	(TROLOX)					
(TROLOX)	KULIT BATANG_					
	CUPRAC	19.58901*	7.04761	.019	3.8860	35.2921
	(TROLOX)					
	BUAH_CUPRAC					
	(TROLOX)	5.94536	7.04761	.419	-9.7577	21.6484
	AKAR_CUPRAC					
	(TROLOX)	-15.08473	7.04761	.058	-30.7878	.6183
	BATANG_					
	CUPRAC	12.92007	7.04761	.097	-2.7830	28.6231
BUAH_CUPRAC	(TROLOX)					
(TROLOX)	KULIT BATANG_					
	CUPRAC	13.64365	7.04761	.082	-2.0594	29.3467
	(TROLOX)					
	DAUN_CUPRAC					
	(TROLOX)	-5.94536	7.04761	.419	-21.6484	9.7577

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

		N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
Duncan ^a	KULIT BATANG_ CUPRAC (TROLOX)	3	363.9601	
	BATANG_ CUPRAC (TROLOX)	3	364.6837	
	BUAH_ CUPRAC (TROLOX)	3	377.6038	377.6038
	DAUN_ CUPRAC (TROLOX)	3		383.5491
	AKAR_ CUPRAC (TROLOX)	3		392.6885
	Sig.		.094	.068

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang sama nyata

7. HASIL UJI STATISTIK (KADAR DPPH ASAM ASKORBAT)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	227.3455768
	Std. Deviation	56.84519759
	Absolute	.153
Most Extreme Differences	Positive	.153
	Negative	-.153
Kolmogorov-Smirnov Z		.592
Asymp. Sig. (2-tailed)		.875

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

DPPH (VITAMIN C)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.366	4	10	.123

Data homogen jika $p > 0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

DPPH (VITAMIN C)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	143492.118	4	35873.029	1376.323	.000
Within Groups	260.644	10	26.064		
Total	143752.762	14			

Data signifikan jika $P < 0.05$, kesimpulan: ada data yg berbeda (signifikan)



Multiple Comparisons

Dependent Variable: DPPH (VITAMIN C)

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	AKAR_DPPH (VITAMIN C)	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	109.70001*	4.16848	.000	100.4120	118.9880
		KULIT					
		BATANG_DPPH (VITAMIN C)	-75.75391*	4.16848	.000	-85.0419	-66.4660
		DAUN_DPPH (VITAMIN C)	73.16965*	4.16848	.000	63.8817	82.4576
	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	BUAH_DPPH (VITAMIN C)	212.42849*	4.16848	.000	203.1405	221.7165
		AKAR_DPPH (VITAMIN C)	-	4.16848	.000	-	-
		BATANG_DPPH (VITAMIN C)	109.70001*	4.16848	.000	118.9880	100.4120
		KULIT	-			-	-
		BATANG_DPPH (VITAMIN C)	185.45393*	4.16848	.000	194.7419	176.1660

	DAUN_DPPH (VITAMIN C)	-36.53036*	4.16848	.000	-45.8183	-27.2424
	BUAH_DPPH (VITAMIN C)	102.72848*	4.16848	.000	93.4405	112.0164
	AKAR_DPPH (VITAMIN C)	75.75391*	4.16848	.000	66.4660	85.0419
KULIT	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	185.45393*	4.16848	.000	176.1660	194.7419
BATANG_DPPH (VITAMIN C)	DAUN_DPPH (VITAMIN C)	148.92357*	4.16848	.000	139.6356	158.2115
	BUAH_DPPH (VITAMIN C)	288.18241*	4.16848	.000	278.8944	297.4704
	AKAR_DPPH (VITAMIN C)	-73.16965*	4.16848	.000	-82.4576	-63.8817
DAUN_DPPH (VITAMIN C)	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	36.53036*	4.16848	.000	27.2424	45.8183
	KULIT	-	-	-	-	-
	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	148.92357*	4.16848	.000	158.2115	139.6356
	BUAH_DPPH (VITAMIN C)	139.25884*	4.16848	.000	129.9709	148.5468
	AKAR_DPPH (VITAMIN C)	-	4.16848	.000	-	-
	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	212.42849*	4.16848	.000	221.7165	203.1405
BUAH_DPPH (VITAMIN C)		-	4.16848	.000	-	-93.4405
	KULIT	-	-	-	-	-
	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	288.18241*	4.16848	.000	297.4704	278.8944
	DAUN_DPPH (VITAMIN C)	-	4.16848	.000	-	-
		139.25884*	4.16848	.000	148.5468	129.9709

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

DPPH (VITAMIN C)							
	PERLAKUAN	N	Subset for alpha = 0.05				
			1	2	3	4	5
Duncan ^a	BUAH_DPPH (VITAMIN C)	3	78.8259				
	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	3		181.5544			
	DAUN_DPPH (VITAMIN C)	3			218.0848		
	AKAR_DPPH (VITAMIN C)	3				291.2544	
	KULIT	3					
	BATANG_DPPH (VITAMIN C)	3					367.0083
	Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang berbeda nyata

HASIL UJI STATISTIK (KADAR DPPH TROLOX)

A. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	15
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	0E-7
Std. Deviation	27.65909373
Absolute	.232
Most Extreme Differences	
Positive	.161
Negative	-.232
Kolmogorov-Smirnov Z	.897
Asymp. Sig. (2-tailed)	.396

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data terdistribusi normal jika $p>0.05$, kesimpulan: data terdistribusi normal

Test of Homogeneity of Variances

DPPH (TROLOX)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.897	4	10	.079


Data homogen jika $p > 0.05$, kesimpulan: data homogen

ANOVA

DPPH (TROLOX)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	23322.834	4	5830.708	1060.697	.000
Within Groups	54.971	10	5.497		
Total	23377.804	14			

Data signifikan jika $P < 0.05$, kesimpulan: ada data yg berbeda (signifikan)



Multiple Comparisons

Dependent Variable: DPPH (TROLOX)

	(I) PERLAKUAN	(J) PERLAKUAN	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	AKAR_DPPH (TROLOX)	BATANG_DPPH (TROLOX)	-9.26263*	1.91434	.001	-13.5281	-4.9972
		KULIT					
		BATANG_DPPH (TROLOX)	-10.25401*	1.91434	.000	-14.5194	-5.9886
		DAUN_DPPH (TROLOX)	7.71934*	1.91434	.002	3.4539	11.9848
	BATANG_DPPH (TROLOX)	BUAH_DPPH (TROLOX)	94.25242*	1.91434	.000	89.9870	98.5178
		AKAR_DPPH (TROLOX)	9.26263*	1.91434	.001	4.9972	13.5281

	KULIT					
	BATANG_DPPH (TROLOX)	-.99137	1.91434	.616	-5.2568	3.2740
	DAUN_DPPH (TROLOX)	16.98197*	1.91434	.000	12.7166	21.2474
	BUAH_DPPH (TROLOX)	103.51505*	1.91434	.000	99.2496	107.7805
	AKAR_DPPH (TROLOX)	10.25401*	1.91434	.000	5.9886	14.5194
	BATANG_DPPH (TROLOX)	.99137	1.91434	.616	-3.2740	5.2568
	DAUN_DPPH (TROLOX)	17.97334*	1.91434	.000	13.7079	22.2388
	BUAH_DPPH (TROLOX)	104.50642*	1.91434	.000	100.2410	108.7718
	AKAR_DPPH (TROLOX)	-7.71934*	1.91434	.002	-11.9848	-3.4539
	BATANG_DPPH (TROLOX)	-16.98197*	1.91434	.000	-21.2474	-12.7166
	KULIT					
	BATANG_DPPH (TROLOX)	-17.97334*	1.91434	.000	-22.2388	-13.7079
	BUAH_DPPH (TROLOX)	86.53308*	1.91434	.000	82.2677	90.7985
	AKAR_DPPH (TROLOX)	-94.25242*	1.91434	.000	-98.5178	-89.9870
	BATANG_DPPH (TROLOX)	-	1.91434	.000	-	-99.2496
	BUAH_DPPH (TROLOX)	103.51505*	1.91434	.000	107.7805	-
	KULIT	-	1.91434	.000	-	-
	BATANG_DPPH (TROLOX)	104.50642*	1.91434	.000	108.7718	100.2410
	DAUN_DPPH (TROLOX)	-86.53308*	1.91434	.000	-90.7985	-82.2677

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

B. Beda nyata (Duncan)

		N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Duncan ^a	BUAH_DPPH (TROLOX)	3	103.1851			
	DAUN_DPPH (TROLOX)	3		189.7181		
	AKAR_DPPH (TROLOX)	3			197.4375	
	BATANG_DPPH (TROLOX)	3				206.7001
	KULIT BATANG_DPPH (TROLOX)	3				207.6915
	Sig.		1.000	1.000	1.000	.616

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Kesimpulan: Sampel perlakuan tersebut memiliki efek yang berbeda nyata



Lampiran 15. Gambar Penelitian

	
Gambar 1 : Simplisia akar tengar	Gambar 2 : Simplisia batang tengar
	
Gambar 3 : Simplisia kulit batang tengar	Gambar 4 : Simplisia daun tengar

	
<p>Gambar 5 : Simplisia buah tengar</p>	<p>Gambar 6 : proses ekstraksi metode refluks</p>
	
<p>Gambar 7 : proses penyaringan vakum</p>	<p>Gambar 8 : proses <i>Rotary evaporator</i></p>

	
Gambar 9 : Hasil uji flavonoid	Gambar 10 : Hasil uji fenolik
	
Gambar 11 : Hasil uji karotenoid	Gambar 12 : Hasil uji FRAP

	
Gambar 13 : Hasil uji DPPH	Gambar 14 : Hasil uji CUPRAC
	
Gambar 15 : Hasil uji TOAC	

RIWAYAT HIDUP



Lahir di Bulukumba, 10 November 2000. Anak bungsu dari 4 bersaudara, anak dari pasangan ayah Sirajuddin dan ibu Darna. Penulis memiliki hobi Traveling. Penulis menempuh Pendidikan Taman Kanak-Kanak pada tahun 2006 di TK Terpadu. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 199 Tanah Kongkong dan tamat pada 2012, dan pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Bulukumba dan tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di SMAN 8 Bulukumba. Pada tahun 2018 penulis memasuki jenjang perguruan tinggi di *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Penulis merasa bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah Swt dan motivasi serta limpahan doa yang ikhlas dan usaha kerja keras orang tua dan keluarga membuat penulis selalu bersemangat untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk orang-orang sekitar terutama orang tua.

