

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN  
*RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN* DENGAN  
POLA NAFAS TIDAK EFEKTIF MENGGUNAKAN  
INTERVENSI POSISI *QUARTER PRONE* DI  
RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**Tugas Akhir Ners**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh :

SITTI AISYAH A  
70900121031

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2023**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN  
*RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN* DENGAN  
POLA NAFAS TIDAK EFEKTIF MENGGUNAKAN  
INTERVENSI POSISI *QUARTER PRONE* DI  
RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Memperoleh gelar Ners Jurusan Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Oleh :

SITTI AISYAH A  
70900121031

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sitti Aisyah A, S.Kep  
NIM : 70900121031  
Tempat/Tgl. lahir : Kalosi, 18 November 1999  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan/Ners/Departemen Anak  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Samata  
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan *Respiratory Distress Syndrom* dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Quarter Prone* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Gowa, 2 Januari 2023

Penyusun,


Sitti Aisyah A  
70900121031

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara (i) Sitti Aisyah A NIM: 70900121031, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pasien *Respiratory Distress Syndrom* dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Quarter Prone* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 2 Januari 2023



Muthahharah, S.Kep., Ns., M.Kep

Pembimbing 1



Eka Hadrayani, S.Kep., Ns., M.Kep

Pembimbing 2

## LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Respiratory Distress Syndrom* dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Quarter Prone* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo", yang disusun oleh Sitti Aisyah A, NIM: 70300121031, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2020 M, bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, Rabu 4 Januari 2023  
13 Jumadil Akhir 1444

Ketua	:	Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	:	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	:	Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	:	Muthahharah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	:	Eka Hadrayani, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui oleh  
Dekan fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya lah penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Respiratory Distress Syndrom* dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Quarter Prone* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo”. Dan tak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan bagi seluruh umat muslim, khususnya generasi muda yang kelak akan menjadi generasi penerus muslim yang cerdas dan berkompeten.

Penyusunan tugas akhir ners ini dibuat sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Ners pada program studi Profesi Ners di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin makassar.

Bersamaan dengan ini, perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Wakil Dekan I Dr. Hj. Gemy Nastiny Handayany., S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., Wakil Dekan III Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kes dan Hj. Sysnawati, S.kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep. J selaku ketua dan sekretaris program studi profesi ners yang telah

banyak meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi selama penulis menempuh pendidikan baik itu berupa ilmu, nasehat serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan profesi ners ini.

4. Muthahharah, S.Kep., Ns., M.Kep dan Eka hadrayani, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing 1 dan 2 yang telah dengan sabar meluangkan begitu banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga mampu sampai pada tahap ini.
5. Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kep., dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I selaku Munaqisy I dan II yang tanpa lelah memberikan saran, arahan serta masukan dalam penyusunan karya tulis ini ini.
6. Seluruh dosen program studi Keperawatan dan Profesi Ners, bagian Tata Usaha dan Akademik beserta para staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu dalam kelengkapan berkas, memberikan ilmu, arahan, motivasi dan nasehat selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan keperawatan.
7. Kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda H. Muh. Adam dan Ibunda Hj. Kasmawati yang telah membesarkan dengan penuh cinta tanpa pernah mengenal lelah untuk selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Ners angkatan XX, yang senantiasa kebersamai perjalanan singkat namun penuh cerita selama program profesi ini dan tak lupa untuk saling merangkul satu sama lain dalam segala keadaan.

Penulis berharap semoga apa yang tertoreh dalam karya tulis ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masihlah sebuah karya tulis sederhana yang

jauh dari kata sempurna. Mengingat penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan karya tulis dimasa mendatang.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samata, 19 Desember 2022

Penulis



**Sitti Aisyah A**  
**70900121031**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## ABSTRAK

Nama : Sitti Aisyah A

NIM : 70900121031

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Respiratory Distress Syndrom* dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Quarter Prone* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

---

**Latar belakang:** Setiap keluarga menantikan kelahiran bayi yang sehat. Namun berdasarkan data Rakernas (2019) angka mortalitas neonatus pada tahun 2017 sebanyak 72.000 kasus, dimana (35,9%) penyebab dari fenomena tersebut karena adanya gangguan sistem pernapasan yang disertai penurunan saturasi oksigen. Gangguan sistem pernapasan pada bayi ini dikenal dengan *Respiratory Distress of Newborn* (RDN). RDN ini terjadi akibat immature sistem pernapasan. Terapi non farmakologis yang dapat diberikan pada bayi dengan RDN ini salah satunya dengan pengaturan posisi *quarter prone*. Posisi *quarter prone* adalah posisi setengah tengkurap dengan lutut bayi ditekuk ke arah perut dan di tipang dengan bantal atau selimut. **Tujuan :** Melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan RDN di ruang perawatan NICU RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan menggunakan posisi *quarter prone*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Instrument yang digunakan format pengkajian asuhan keperawatan neonates dan lembar observasi penilaian *respiratory rate* selama pemberian intervensi. Penelitian ini dilakukan selama 3 hari di ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 5-7 Juni 2022. **Hasil:** Setelah pasien diatur dalam posisi *quarter prone* tampak adanya penurunan frekuensi pernapasan dan pasien tampak lebih nyaman dengan posisi tersebut. **Kesimpulan dan saran:** Dari hasil evaluasi kasus yang telah dilakukan, pengaturan posisi *quarter prone* pada bayi yang mengalami RDN dapat mengurangi sesak pada bayi yang dapat dilihat pada penurunan frekuensi pernapasan dan juga membuat pasien tampak lebih nyaman. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan posisi *quarter prone* ini efektif dalam menurunkan sesak pada pasien dengan RDN. Saran bagi peneliti selanjutnya agar menerapkan pengaturan posisi *quarter prone* dan posisi lainnya untuk melihat keefektifan posisi lainnya terhadap status oksigenasi pasien.

**Keyword:** *Quarter prone, respiratory distress syndrome, newborn, bayi baru lahir*

## **ABSTRACT**

*Name* : Sitti Aisyah A

*NIM* : 70900121031

*Title* : *Nursing Care Analysis of Respiratory Distress Syndrome Patients with Ineffective Breathing Pattern Problems Using Intervention in Quarter Prone Position ar RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo*

---

*Every family looks forward to the birth of a healthy baby. However, based on Rakernas data (2019) the neonatal mortality rate in 2017 was 72,000 cases, of which (35.9%) the cause of this phenomenon was due to respiratory system disorders accompanied by decreased oxygen saturation. Respiratory system disorders in infants are known as Respiratory Distress of Newborn (RDN). This RDN occurs due to immature respiratory system. One of the non-pharmacological therapies that can be given to babies with RDN is by setting the quarter prone position. The quarter prone position is a half prone position with the baby's knees bent towards the stomach and propped up with a pillow or blanket. This study aims to provide nursing care to patients with RDN in the NICU of RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar using the quarter prone position. This study used the case study method with data collection techniques through interviews, observation, physical examination and documentation. The instrument used was the neonatal nursing care assessment format and the respiratory rate assessment observation sheet during the intervention. This research was conducted for 3 days in the NICU of RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar on June 5-7 2022. After the patient was placed in the quarter prone position, there was a decrease in respiratory rate and the patient seemed more comfortable in that position. From the results of case evaluations that have been carried out, setting the quarter-prone position in infants who experience RDN can reduce shortness in infants which can be seen in a decrease in respiratory rate and also make the patient appear more comfortable. This indicates that the quarter-prone position is effective in reducing shortness of breath in patients with RDN. Suggestions for future researchers to apply the quarter prone position and other positions to see the effectiveness of other positions on the patient's oxygenation status.*

**Keyword:** *Quarter prone, respiratory distress syndrom, newborn*

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1. Konsep Medis.....	5
2.2. Konsep Keperawatan .....	14
2.3. <i>Evidence Based Practice</i> .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1. Rancangan Studi Kasus.....	31
3.2. Subyek Studi Kasus .....	31
3.3. Fokus Studi Kasus .....	32
3.4. Instrumen Studi Kasus .....	32
3.5. Prosedur Pengambilan Data .....	32
3.6. Tempat & Waktu Pengambilan Data .....	32
3.7. Analisis Data dan Penyajian Data .....	32
3.8. Etika Studi Kasus.....	33
<b>BAB IV LAPORAN KASUS</b> .....	<b>35</b>
4.1. Pengkajian Keperawatan.....	35
4.2. Diagnosis Keperawatan .....	40
4.3. Intervensi Keperawatan .....	41
4.4. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan .....	45

<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
5.1. Analisis Asuhan Keperawatan.....	54
5.2. Analisis Intervensi EBPN .....	63
5.3. Keterbatasan .....	66
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
6.1. Kesimpulan .....	68
6.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi RDN .....	8
Tabel 2.2 Batasan Karakteristik Gangguan Pertukaran Gas .....	18
Tabel 2.3 Batasan Karakteristik Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif .....	19
Tabel 2.4 Batasan Karakteristik Pola Napas Tidak Efektif.....	20
Tabel 2.5 Batasan Karakteristik Hipotermi.....	21
Tabel 2.6 Intervensi Gangguan Pertukaran Gas .....	22
Tabel 2.7 Intervensi Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif.....	23
Tabel 2.8 Intervensi Pola Napas Tidak Efektif .....	23
Tabel 2.9 Intervensi Hipotermi.....	25
Tabel 2.10 Intervensi Risiko Infeksi.....	26
Tabel 4.1 Pengkajian Umum NICU.....	35
Tabel 4.2 Pengkajian Fisik NICU.....	35
Tabel 4.3 Riwayat Prenatal .....	37
Tabel 4.4 Riwayat Intranatal .....	37
Tabel 4.5 Riwayat Post Natal.....	37
Tabel 4.6 Pemeriksaan Diagnostik .....	38
Tabel 4.7 Terapi dan Pengobatan .....	38
Tabel 4.8 Analisa Data.....	39
Tabel 4.9 Diagnosa Keperawatan.....	40
Tabel 4.10 Intervensi Keperawatan .....	41
Tabel 4.11 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan.....	45
Tabel 4.12 Evaluasi pemberian posisi <i>quarter prone</i> .....	47

## DAFTAR SINGKATAN

WHO	: <i>World Health Organization</i>
BBLR	: Berat Bayi Lahir rendah
RDS	: <i>Respiratory Distress Syndrome</i>
RDN	: <i>Respiratory Distress of Newborn</i>
ARDS	: <i>Accute Respiratory Distress Syndrome</i>
NICU	: <i>Neonatal Intensive Care Unit</i>
CPAP	: <i>Continius Positive Airway Pressure</i>
SC	: <i>Sectio Caesaria</i>
KPD	: Ketuban Pecah Dini
BPD	: <i>Bronkopulmober Dysplasia</i>
AGD	: Analisa Gas Darah
IV	: Intravena
EBP	: <i>Evidance Based Practice</i>
AAP	: <i>The American Academy of Pediatrics</i>
ANC	: <i>Ante Natal Care</i>
INC	: <i>Intra Natal Care</i>
PNC	: <i>Post natal Care</i>
OGT	: <i>Oral Gastric Tube</i>
CRT	: <i>Capillary Refill Time</i>
BBL	: Berat Badan Lahir
BBS	: Berat Badan Sekarang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga menantikan kelahiran bayi yang sehat. Ini merupakan waktu yang sangat dinikmati meskipun tidak menutup kemungkinan adanya tantangan dan kesulitan yang tak terduga terjadi (Badwan, 2021). Namun tidak menutup mata adanya bayi yang mengalami masalah kesehatan sejak lahir, salah satunya bayi baru lahir yang mengalami masalah pernapasan. Fenomena ini turut berpengaruh terhadap angka mortalitas dan morbiditas pada bayi baru lahir (Apriliawaty, 2019).

Kematian bayi baru lahir berdasarkan *World Health Organization* (WHO) menyumbang 47% kematian di antara anak-anak di bawah usia 5 tahun secara global, mengakibatkan 2,4 juta nyawa hilang setiap tahun. Sekitar sepertiga dari kematian bayi baru lahir terjadi pada hari kelahiran dan hampir tiga perempatnya terjadi dalam minggu pertama kehidupan (WHO).

Data (Rakernas, 2019) menyebutkan angka mortalitas neonatus pada tahun 2017 sebanyak 72.000 kasus, dimana mortalitas ini disebabkan paling banyak akibat kejadian BBLR (berat bayi lahir rendah) dan 19% disebabkan oleh kelahiran yang premature. Diketahui penyebab dari fenomena tersebut karena adanya gangguan sistem pernapasan (35,9%) yang disertai penurunan saturasi oksigen sebanyak 30% pada bayi dengan kelahiran premature.

Persentase kejadian menurut usia kehamilan adalah 60 sampai 80% terjadi pada bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 28 minggu, 12 sampai 30% pada bayi antara 32 sampai 36 Minggu dan jarang sekali ditemukan pada bayi cukup bulan (Idayanti *et, al* 2022).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2016 angka kematian neonatus sebanyak 838 kasus dengan kejadian di Kota Makassar terdapat 37 kasus. Dimana angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017, yakni sebanyak 817 kasus dengan kejadian di Kota Makassar 22 kasus (Atika, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat yang bertugas di ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, diperoleh data bahwa pasien yang dirawat di ruang NICU mayoritas pasien yang mengalami *Respiratory Distress of Newborn* (RDN) dan BBLR.

*Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) adalah masalah yang menantang dan mencerminkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang signifikan. Banyak komplikasi ARDS dapat dicegah, tetapi memerlukan pengenalan dini dan penanganan segera. Meskipun dilakukan intervensi pengobatan suportif, angka kematian ARDS tetap tinggi, berkisar antara 30% hingga 40% (Babaei *et, al* 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa posisi tubuh merupakan faktor penting dalam ventilasi dan oksigenasi jaringan pada bayi yang mendapat bantuan pernapasan, oleh karena itu, perubahan posisi bayi yang sering diperlukan setiap 2-3 jam. Pengaturan posisi pada neonatus tidak hanya memiliki efek signifikan pada perkembangan neurologis mereka, tetapi juga dapat meminimalkan komplikasi prematuritas jangka panjang (Rad *et, al*. 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sara *et, al* (2022) menunjukkan pemberian posisi *quarter prone* membuat frekuensi pernafasan menjadi lebih satbil dan dalam rentang normal. Penelitian yang dilakukan oleh Montgomery *et al* (2014) menunjukkan bahwa posisi *quarter prone* memiliki efektivitas



yang sama dengan posisi *prone* dalam meningkatkan pernapasan dan oksigenasi. Namun posisi *quarter prone* lebih nyaman untuk bayi karena adanya bantal yang diletakkan untuk menopang tubuh.

Berdasarkan beberapa statement yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut dan hasil observasi pada hari senin tanggal 4 Juli 2022 terdapat 4 bayi yang dirawat di ruang NICU level II B RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yaitu bayi Ny. M, dan bayi Ny. R dengan RDN, bayi Ny. D dengan BBLR dan Bayi Ny. S dengan post operasi stoma. Saat dilakukan observasi, nampak bayi Ny. M terpasang masih terpasang ventilator. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang posisi *prone*, peneliti tertarik memberikan intervensi pengaturan posisi *quarter prone* pada bayi Ny. M yang mengalami RDN.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang muncul pada karya ilmiah ini adalah "Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif dengan menggunakan intervensi posisi *quarter prone* di ruang perawatan NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo?"

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Melalui penerapan posisi *quarter prone* ini sebagai intervensi di ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif menggunakan pemberian posisi *quarter prone*

## **1.4. Manfaat**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif dengan intervensi pemberian posisi tengkurap di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar diharapkan tugas akhir ners ini dapat menjadi bahan pendalaman ilmu dan menjadi dasar pembelajaran praktik keperawatan.

### **1.4.2. Manfaat Aplikatif**

Diharapkan proyek tugas akhir ners ini dapat menjadi sumber untuk penelitian lebih lanjut tentang terapi *quarter-prone* untuk bayi dengan RDN yang memiliki pola pernapasan yang buruk.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Konsep Teoritis

##### 2.1.1. Definisi

ARDS singkatan dari "*Acute Respiratory Distress Syndrome*", adalah penyakit paru-paru yang paling umum pada bayi prematur dan terjadi karena paru-paru bayi belum sepenuhnya berkembang. Semakin prematur bayi, semakin besar kemungkinan bayi menderita ARDS Sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) terjadi ketika bayi paru-paru tidak berkembang sempurna dan tidak dapat menyediakan oksigen yang cukup sehingga menyebabkan kesulitan bernapas. Biasanya menyerang bayi prematur. Ini juga dikenal sebagai Sindrom Gangguan Pernafasan Akut, penyakit membran hialin atau penyakit paru defisiensi surfaktan. paru-paru janin mulai membuat surfaktan selama trimester ketiga kehamilan, atau minggu ke-26 melalui proses persalinan (Badwan, 2021).

Namun disamping itu, Allah sudah menciptakan tubuh manusia sebaik baik bentuk dan fungsinya dengan sistem yang sangat sempurna, untuk itu kita diwajibkan untuk mampu meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah SWT yang sudah menciptakan tubuh manusia dengan sebaik baik bentuk dan sesempurna mungkin, sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Attin Ayat 4 yaitu,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya :

*“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya”*. (QS. Attin: 4)

Allah SWT sudah menyempurnakan fungsi tubuh manusia dengan proses metabolisme tubuh yang seimbang. Untuk kondisi ARDS ini

merupakan kondisi khusus dimana sistem pernapasan bayi belum matang dengan sempurna sehingga bayi belum mampu mencukupi kebutuhan oksigen dalam tubuhnya.

### **2.1.2. Etiologi**

Menurut (Rogayyah, 2016), penyebab lainnya dari penyakit RDS atau penyakit gagal nafas pada neonatus adalah:

#### **2.1.2.1. Neonatus preterm atau premature**

Neonatus dengan kelahiran yang premature menjadi faktor penyebab utama kejadian RDS dikarenakan fungsi organ bayi baru lahir masih belum sempurna atau matur sehingga alveoli kecil dan sulit mengembang karena dinding dada masih sangat lemah, produksi surfaktan belum sempurna sehingga menyebabkan kapasitas paru kurang mencukupi kebutuhan oksigen didalam tubuh.

#### **2.1.2.2. Neonatus yang dilahirkan dengan cara Sectio Caesaria**

Neonatus yang dilahirkan secara SC (Sectio Caesaria) meningkatkan resiko terjadinya gangguan pernafasan karena saat neonatus dilahirkan dengan SC maka akan memiliki volume residu paru yang lebih besar dibandingkan dengan cairan paru sehingga paru-paru bayi dengan SC kurang mengeluarkan surfaktan pada permukaan alveolar dimana hal ini menyebabkan resiko tinggi menderita RDS.

#### **2.1.2.3. Ibu yang melahirkan neonatus dalam keadaan hipertensi**

Neonatus yang lahir dari ibu dengan riwayat hipertensi dapat menyebabkan vasospasme pada pembuluh darah ibu sehingga sirkulasi airan darah yang masuk keplasenta janin tidak efektif dan ketika neonatus dilahirkan akan mengalaih penurunan kadar oksigen.

#### **2.1.2.4. Asfiksia Neonatorum**

Gangguan ini dikarenakan adanya gangguan perfusi neonatus, hipoksia, dan kegagalan nafas secara spontan saat neonatus dilahirkan. Hal ini berkaitan dengan kondisi ibu saat melahirkan, jeratan tali pusat, maupun keadaan bayi baik saat dilahirkan maupun sebelum dilahirkan.

#### 2.1.2.5. KPD (Ketuban Pecah Dini)

Air ketuban ibu berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan janin agar tidak terbentur lingkungan sekitarnya baik didalam rahim ibu maupun lingkungan luar dan air ketuban dapat membuat janin dapat bergerak bebas. KPD dapat menyebabkan adanya interaksi antara intrauterine dan ekstrauterine Hal ini dapat menyebabkan infeksi pada saat intrapartum bahkan peritonitis pada ibu.

#### 2.1.2.6. Infeksi Perinatal

Pneumonia primer menyebabkan RDS pada pasien sekitar 10% sehingga berkembang menjadi sepsis dan kegagalan multiorgan. Neonatus saat lahir dapat terinfeksi bakteri patogen dari ibu seperti bakteri Streptococcus dan Staphylococcus. Hal ini terjadi karena infeksi intrauterine atau selama persalinan.

### 2.1.3. Klasifikasi

Down score dapat digunakan untuk mendiagnosis cepat dari gawat nafas yang dialami oleh bayi baru lahir dalam menilai tingkat keparahannya. Down score dapat dijadikan sebagai pengakajian klinis awal dalam memantau derajat gawat nafas pada bayi RDN tanpa melalui uji yang kompleks di unit perawatan (Atika, 2019).

Tabel 2.1 Klasifikasi RDN berdasarkan nilai *Down Score*

Pemeriksaan	Skor		
	0	1	2
Frekuensi	<60x/menit	60-80x/menit	>80x/menit
Retraksi	Tidak ada retraksi	Retraksi ringan	Retraksi berat

Sianosis	Tidak ada sianosis	Sianosis hilang dengan oksigen	Sianosis menetap walaupun diberi oksigen
<i>Air entry</i>	Udara masuk	Penurunan ringan udara masuk	Tidak ada udara masuk
Merintih	Tidak merintih	Dapat didengar dengan stetoskop	Dapat didengar tanpa alat bantu
Evaluasi	<4 : gawat nafas ringan 4-7 : gawat nafas sedang >7 gawat nafas berat		

Menurut (Dwiristyan, 2015), RDS jika diklasifikasikan dari gambaran foto dadanya dibagi menjadi:

- a. Stadium I : terdapat sedikit bercak yang berbentuk retikulo granular dan sedikit bronkogram udara atau adanya udara dalam bronkus.
- b. Stadium II: adanya bercak yang homogen retikulo granular pada semua lapang paru kanan dan kiri dan terdapat gambaran cairan area bronkus sehingga penumpukan udara terlihat lebih jelas dan meluas di area tepian alveolus sehingga menyebabkan bayangan pada jantung dan adanya penurunan aerasi organ paru-paru.
- c. Stadium III: sel-sel alveolus pada paru-paru terlihat kolaps yang ditandai dengan penyusutan pengembangan alveolus paru dan bercak menutupi jantung dan bronkogram udara lebih luas sehingga batas ruang jantung tidak terlihat.
- d. Stadium IV: paru-paru nampak putih dan tidak dapat dilihat secara jelas karena udara sudah menumpuk diseluruh lapang paru.

#### 2.1.4. Patofisiologi

Permasalahan dasar pada RDN adalah ketidakmampuan paru yang immature atau belum matang untuk mensintesis surfaktan. Surfaktan adalah suatu kompleks fosfolipid yang diproduksi, disimpan, dan didaur ulang oleh pneumosit tipe II dan dapat dideteksi sejak usia kehamilan sekitar 24 minggu. Ini adalah campuran fosfolipid, lipid netral dan protein dan disebarkan

sebagai film di atas permukaan alveolar untuk menurunkan tegangan permukaan dan untuk mencegah kolaps alveolar.

Pada pernapasan pertama neonatus yang sehat dengan cepat melapisi permukaan alveolus, mengurangi tegangan permukaan, sehingga mengurangi tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan alveolus terbuka. Pada paru-paru dengan defisiensi surfaktan, alveolus cenderung kolaps dan diperlukan adanya pernapasan yang relatif lebih besar pada setiap pernapasan untuk membuka alveolus. Bayi cepat lelah bernafas dan diikuti atelektasis umum. Hipoksia yang dihasilkan memicu urutan kejadian yang menyebabkan kerusakan epitel dan endoterm dan selanjutnya terjadi pembentukan membran hialin (Ham & Meilania, 2020).

#### **2.1.5. Manifestasi Klinik**

RDS pada bayi baru lahir dimulai segera setelah lahir dan dimanifestasikan dengan pernapasan cepat (lebih dari 60 napas per menit), detak jantung yang cepat, retraksi dinding dada, rintihan ekspirasi, hidung melebar dan perubahan warna kulit menjadi biru selama upaya pernapasan, pneumotoraks. Seiring perkembangan penyakit, bayi dapat mengalami kegagalan ventilator (peningkatan konsentrasi karbon dioksida dalam darah) dan penghentian pernapasan ("apnea") yang berkepanjangan (Badwan 2021).

Awalnya, ARDS mirip dengan edema hemodinamik paru yang parah. Fase akut ARDS ditandai dengan serangan sesak napas berat yang tiba-tiba, biasanya muncul setelah 1 hingga 48 jam sejak kejadian terjadi. Hipoksemia arteri memiliki karakteristik yang tidak menyebabkan oksigen tambahan. Temuan rontgen dada mirip dengan yang terlihat dengan edema paru kardiogenik dan terlihat sebagai infiltrat bilateral yang memburuk dengan cepat. Cedera paru akut kemudian berkembang menjadi alveolitis fibrosa

dengan hipoksemia berat yang persisten Ruang mati alveolar (ventilasi ke alveoli, tetapi perfusi buruk) meningkat pada pasien, dan juga penurunan komplians paru (paru-paru kaku yang sulit untuk ventilasi) (Badwan, 2021).

Tanda dan gejala sindrom gangguan pernapasan sering disertai riwayat gawat janin pada akhir kehamilan Adapun tanda dan gejalanya adalah:

- a. Timbul setelah 6-8 jam Setelah lahir
- b. Pernapasan cepat atau dispnea dengan frekuensi pernapasan lebih dari 60 kali/ menit
- c. Retraksi interkostal, epigastrium atau suprasternal pada inspirasi
- d. Sianosis
- e. Grunting (terdengar seperti suara rintihan) pada saat ekspirasi
- f. Takikardi yaitu nadi 170 kali per menit (Idayanti *et.a*, 2022).

#### **2.1.6. Komplikasi**

Sebagian besar bayi dengan NRDS dapat diobati dengan sukses, meskipun mereka memiliki risiko tinggi untuk mengalami masalah lebih lanjut di kemudian hari.

##### **2.1.6.1. Kebocoran Udara**

Udara terkadang bisa bocor keluar dari paru-paru bayi dan terperangkap di rongga dadanya. Ini dikenal sebagai pneumotoraks. Kantung udara memberi tekanan ekstra pada paru-paru, menyebabkannya kolaps dan menyebabkan masalah pernapasan tambahan. Kebocoran udara dapat ditangani dengan memasukkan tabung ke dalam dada agar udara yang terperangkap dapat keluar.

##### **2.1.6.2. Perdarahan di Dalam**

Bayi dengan RDS mungkin mengalami perdarahan di dalam paru-paru (perdarahan paru) dan otak (perdarahan otak). Perdarahan ke



paru-paru diobati dengan tekanan udara dari ventilator untuk menghentikan pendarahan dan transfusi darah. Pendarahan ke otak cukup umum terjadi pada bayi prematur, tetapi kebanyakan pendarahan ringan dan tidak menyebabkan masalah jangka panjang.

#### 2.1.6.3. Paru-paru parut

Terkadang ventilasi (dimulai dalam 24 jam setelah lahir) atau surfaktan yang digunakan untuk mengobati RDN menyebabkan jaringan parut pada paru-paru bayi, yang memengaruhi perkembangannya. Jaringan parut paru-paru ini disebut displasia bronkopulmoner (BPD). Gejala BPD termasuk pernapasan cepat, dangkal, dan sesak napas. Bayi dengan BPD parah biasanya membutuhkan oksigen tambahan dari selang ke hidungnya untuk membantu pernapasannya. Ini biasanya dihentikan setelah beberapa bulan, saat paru-paru sudah sembuh. Tetapi anak-anak dengan BPD mungkin memerlukan obat-obatan biasa, seperti bronkodilator, untuk membantu memperlebar saluran udara dan mempermudah pernapasan.

#### 2.1.6.4. Gangguan perkembangan

Jika otak bayi rusak selama NRDS, baik karena pendarahan atau kekurangan oksigen, dapat menyebabkan cacat perkembangan jangka panjang, seperti kesulitan belajar, masalah gerakan, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Tapi masalah perkembangan ini biasanya tidak parah. Misalnya, 1 survei memperkirakan bahwa 3 dari 4 anak dengan masalah perkembangan hanya memiliki kecacatan ringan, yang seharusnya tidak menghentikan mereka menjalani kehidupan dewasa yang normal (NHS, 2018).

### 2.1.7. Pemeriksaan Penunjang

Diagnosa RDN dapat ditegakkan melalui pemeriksaan foto thoraks, AGD, hitung darah lengkap, perubahan elektrolit dan biopsi paru (Atika, 2019).

#### 2.1.7.1. Foto Thoraks

- a. Selama pemeriksaan radiologis, awalnya tidak ada kelainan yang terlihat pada gambar dada. Namun, dalam 12 hingga 24 jam, infiltrat alveolar akan muncul di seluruh paru tanpa batas yang terlihat.
- b. Pola bronkogram udara yang tumpang tindih dengan pola retikulo granular difus
- c. Inflasi paru yang buruk, batas jantung yang sulit dilihat, dan gejala paru sentral
- d. Jika sistem lain juga terganggu (seperti pada neonatus diabetes, pasien jantung hipoksia, dan gagal jantung kongestif), kardiomegali dapat terjadi.
- e. Bayangan timus besar
- f. Jika terlihat dalam beberapa jam pertama, granula homogen pada air bronchogram menunjukkan penyakit serius.

2.1.7.2. AGD menunjukkan asidosis respiratorik dan metabolik, yang dibuktikan dengan penurunan pH, peningkatan PaCO<sub>2</sub>, peningkatan PaO<sub>2</sub>, dan penurunan HCO<sub>3</sub>.

2.1.7.3. Hitung darah lengkap

2.1.7.4. Perubahan elektrolit biasanya menunjukkan kadar kalsium, natrium, dan glukosa serum yang lebih rendah

2.1.7.5. Biopsi paru, terdapat adanya pengumpulan granulosit secara

abnormal dalam parenkim paru

### **2.1.8. Penatalaksanaan**

#### 2.1.8.1. Pemberian Oksigen

Bayi dengan ARDS membutuhkan oksigen ekstra agar tetap merah muda. Itu dapat diberikan dalam beberapa cara:

- a. Kanula hidung. Sebuah tabung kecil dengan garpu ditempatkan di lubang hidung
- b. CPAP (Tekanan Saluran Udara Positif Berkelanjutan). Ini adalah mesin yang dengan lembut mendorong udara atau oksigen ke dalam paru-paru agar kantung udara tetap terbuka
- c. Ventilator untuk ARDS parah. Ini adalah mesin yang membantu bayi bernafas ketika dia tidak dapat bernapas dengan cukup baik tanpa bantuan. Ini disebut intubasi (di terlalu BAY shun). Bayi itu kemudian ditempatkan di ventilator untuk membantunya bernapas

#### 2.1.8.2. Surfaktan

Surfaktan dapat diberikan ke paru-paru bayi untuk menggantikan apa yang tidak dimilikinya. Ini diberikan langsung ke tabung pernapasan yang ditempatkan di tenggorokan.

#### 2.1.8.3. Perawatan kateter IV (intravena)

Sebuah tabung yang sangat kecil yang disebut kateter ditempatkan ke dalam satu atau dua pembuluh darah di tali pusat. Inilah cara bayi mendapatkan cairan IV, nutrisi dan obat-obatan. Ini juga digunakan untuk mengambil sampel darah (Badwan, 2021).

## **2.2. Konsep Asuhan Keperawatan**

### **2.2.1. Konsep Teori Keperawatan Terkait**

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Konsep teori kebutuhan dasar manusia yang diperkenalkan oleh Virginia Henderson atau yang lebih dikenal dengan teori Henderson membahas empat konsep utama yaitu individu, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan (Map, 2021).

Teori keperawatan Virginia Henderson ini berfokus pada bagaimana perawat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia pasien sehingga pengobatan mereka dapat berkembang secara optimal. Teori keperawatan Henderson dikenal sebagai 14 kebutuhan dasar manusia, dimana salah satunya adalah bernapas dengan normal. Kebutuhan akan bernapas dengan normal merupakan kebutuhan paling dasar menurut Henderson karena bernapas dengan normal menunjang seseorang untuk terus bertahan hidup. (DeNisco, 2021).

Pasien yang mengalami RDS, khususnya pada bayi, pasti akan mengalami gangguan pada pernapasan. Adanya masalah pada sistem pernapasan, berdasarkan dari teori 14 kebutuhan Henderson, sudah tentu menjadi tanggung jawab bagi seorang perawat untuk merawat dan memperbaiki kondisi pasien yang mengalami RDS sehingga kebutuhan akan bernapas dengan normal dapat terpenuhi kembali.

### **2.2.2. Pengkajian**

#### **2.2.2.1. Anamnesa**

- a. Data demografi : berisi identitas bayi, jenis kelamin, usia, agama, identitas keluarga, alamat, suku, pekerjaan

- b. Keluhan utama : pada RDN keluhan utama yang sering ditemukan adalah adanya sesak, adanya pernapasan cuping hidung, penurunan bunyi napas, kondisi umum lemah, bayi cenderung pasif.
- c. Riwayat penyakit sekarang : biasanya diawali dengan tanda dan gejala dispnea, sianosis, mudah letih, retraksi intercosta, bradikardi, hipotermi, hipotensi, tonus otot menurun, edema, pernapasan grunting. Namun perlu pula ditanyakan kapan keluhan tersebut mulai muncul.
- d. Riwayat penyakit dahulu : tanyakan apakah bayi lahir cukup bulan dan tidak premature (gestasi dibawah 32 minggu), gangguan surfaktan, penurunan suplai oksigen pada saat proses kelahiran, atelektasis, DM, hipoksia dan asidosis.
- e. Riwayat maternal : riwayat menderita penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, apakah ada komplikasi saat melahirkan seperti perdarahan, placenta previa, stress fetal dan makrosomia.
- f. Riwayat penyakit keluarga : kaji apakah ada anggota keluarga yang pernah menderita penyakit yang diduga menyebabkan kelahiran prematur
- g. Riwayat psikososial : dikaji bagaimana perasaan keluarga terhadap penyakit yang diderita, bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi dan bagaimana keluarga merespon terhadap tindakan yang dilakukan pada bayinya.
- h. Status infant saat lahir
- 1) Prematur, umur kehamilan
  - 2) Apgar score, apakah terjadi asfiksia
  - 3) Bayi premature yang lahir melalui operasi Caesar

#### 2.2.2.2. Pengkajian Fisik

Pada pemeriksaan fisik akan didapatkan bayi mengalami takipnea ( $>60x$ /menit), pernafasan grunting, pernafasan cuping hidung, retraksi intercosta, pucat atau sianosis, apnea, sulit bernapas dan sentakan dagu. Pada awalnya suara nafas akan terdengar normal, seiring menurunnya pasokan oksigen, napas akan menjadi lemah dan dalam. pengkajian fisik pada anak dan bayi dengan masalah kegawatan pernapasan dapat dilihat dari fungsi respirasi dan penilaian kardiovaskuler, meliputi :

##### a. Frekuensi nafas

Takhipnea atau pernapasan cepat merupakan manifeastasi awal gangguan pernapasan pada bayi. Tanpa gejala lain yang serupa, takipnea adalah upaya untuk menebus asidosis metabolik, yang dapat terjadi pada kondisi termasuk syok, diare, ketoasidosis, dehidrasi, keracunan salisilat, diabetes, dan insufisiensi ginjal kronis. Hipotermia, kelelahan, dan depresi sistem saraf pusat adalah keadaan yang sering mengakibatkan laju pernapasan yang sangat lambat dan tidak teratur.

##### b. Mekanika usaha pernafasan

Peningkatan usaha napas dapat dilihat dengan adanya pernapasan cuping hidung, retraksi interkosta, yang umumnya dijumpai pada obstruksi jalan napas dan penyakit alveolar.

##### c. Warna kulit/membran mukosa

Pada kondisi hipoksemia, permukaan kulit tubuh tampak berbintik-bintik, jari tangan dan kaki pucat dan dingin, dan terjadi sianosis, yang berkorelasi dengan derajat desaturasi hemoglobin.

d. Kardiovaskuler

- 1) Reaksi umum seperti stres, nyeri, demam, kecemasan, hiperkapnia, dan/atau malfungsi jantung, biasanya diindikasikan oleh adanya sinus takikardi.
- 2) Kekuatan denyut jantung sangat penting untuk menentukan volume dan aliran sirkulasi perifer. Jika denyut nadi lemah atau tidak terdeteksi di satu sisi, berarti aliran darah ke lokasi tersebut terhambat atau tersumbat.

e. Pengisian ulang kapiler dapat diperiksa dengan :

- 1) *Nailing Bed Pressure* (tekan pada kuku)
- 2) *Blanching skin test*, dilakukan dengan sedikit mengangkat ekstremitas di atas jantung dan menekan tangan atau kaki selama lima detik; biasanya, mereka akan tampak pucat. Setelah tekanan dilepaskan, pucat akan hilang dalam dua hingga tiga detik.
- 3) Respirasi dan aliran darah ke otak Tanda-tanda awal gangguan fungsi otak adalah agitasi dan kelesuan diselingi dengan suara gelisah. Seiring dengan hilangnya kesadaran, iskemia serebral akut juga menyebabkan kelemahan otot, kejang, dan pupil melebar.

### 2.2.3. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan yang sering muncul berdasarkan SDKI (2016)

#### 1. Gangguan pertukaran gas

- a. Definisi : Kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler.

b. Batasan Karakteristik

Tabel 2.2 Batasan karakteristik gangguan pertukaran gas

<b>Gejala dan Tanda Mayor</b>	
<b>Subjektif</b>	<b>Objektif</b>
Dispnea	PCO <sub>2</sub> meningkat/menurun PO <sub>2</sub> menurun Takikardia pH arteri meningkat/menurun Bunyi napas tambahan
<b>Gejala dan Tanda Minor</b>	
<b>Subjektif</b>	<b>Objektif</b>
Pusing Penglihatan kabur	Sianosis Diaforesis Gelisah Napas cuping hidung Pola napas abnormal (cepat/lambat, regular/iregular, dalam/dangkal) Warna kulit abnormal (mis. pucat, kebiruan) Kesadaran menurun

c. Faktor yang Berhubungan

- 1) Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi
- 2) Perubahan membran alveolus-kapiler

**2. Pola nafas tidak efektif**

a. Definisi : Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat

b. Batasan Karakteristik

Table 2.3 Batasan karakteristik pola nafas tidak efektif

<b>Gejala dan Tanda Mayor</b>	
<b>Subjektif</b>	<b>Objektif</b>
Dispnea	Penggunaan otot bantu pernapasan Fase ekspirasi memanjang Pola napas abnormal (mis. takipnea, bradipnea, hiperventilasi kussmaul cheyne-stokes)
<b>Gejala dan Tanda Minor</b>	
<b>Subjektif</b>	<b>Objektif</b>
Ortopnea	Pernapasan pursed-lip Pernapasan cuping hidung Diameter thoraks anterior-posterior meningkat Ventilasi semenit menurun Kapasitas vital menurun Tekanan ekspirasi menurun Tekanan inspirasi menurun Ekskursi dada berubah



c. Faktor yang Berhubungan

- 1) Depresi pusat pernapasan
- 2) Hambatan upaya napas
- 3) Deformitas dinding dada
- 4) Deformitas tulang dada
- 5) Gangguan neuromuscular
- 6) Gangguan neurologis (mis elektroensefalogram [EEG] positif, cedera kepala gangguan kejang)
- 7) Imaturitas neurologis

**3. Bersihan jalan napas tidak efektif**

- a. Definisi :Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten.
- b. Batasan Karakteristik

Table 2.4 Batasan karakteristik bersihan jalan napas tidak efektif

<b>Gejala dan Tanda Mayor</b>	
<b>Subjektif</b>	<b>Objektif</b>
<i>tidak tersedia</i>	Batuk tidak efektif Tidak mampu batuk Sputum berlebih Mengi, wheezing dan/atau ronkhikering Mekonium di jalan nafas (pada neonatus)
<b>Gejala dan Tanda Minor</b>	
<b>Subjektif</b>	<b>Objektif</b>
Dispnea Sulit bicara Ortopnea	Gelisah Sianosis Bunyi napas menurun Frekuensi napas berubah Pola napas berubah

c. Faktor yang Berhubungan

- 1) Spasme jalan napas
- 2) Hipersekresi jalan napas
- 3) Disfungsi neuromuskuler
- 4) Benda asing dalam jalan napas

- 5) Adanya jalan napas buatan
- 6) Sekresi yang tertahan
- 7) Hiperplasia dinding jalan napas
- 8) Proses infeksi
- 9) Respon alergi
- 10) Efek agen farmakologis (mis. anastesi)

#### 4. Risiko infeksi

- a. Definisi : beresiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik
- b. Faktor Risiko :
  - 1) Penyakit kronis
  - 2) Efek prosedur invasif
  - 3) Malnutrisi
  - 4) Peningkatan paparan organisme pathogen
  - 5) Ketidak adekuatan pertahanan tubuh
- c. Kondisi klinis terkait :
  - 1) Tindakan invasif
  - 2) Kondisi penggunaan steroid
  - 3) Kanker
  - 4) Gagal ginjal

#### 5. Hipotermia

- a. Definisi : suhu tubuh dibawah rentang normal tubuh
- b. Batasan karakteristik

Table 2.5 Batasan karakteristik hipotermia

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
<i>tidak tersedia</i>	Kulit teraba dingin, menggigil, suhu tubuh dibawah nilai norml
Gejala dan Tanda Minor	

Subjektif	Objektif
<i>tidak tersedia</i>	Dasar kuku sianotik Konsumsi oksigen meningkat Ventilasi menurun Takikardia

#### 2.2.4. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan merupakan tahap ketiga dalam proses keperawatan .intervensi disusun berdasarkan SIKI.

##### 1. Diagnosis 1 : Gangguan Pertukaran Gas

a. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam,diharapkan Pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil:

- 1) Dispnea menurun
- 2) Bunyi napas tambahan menurun
- 3) Takikardia menurun
- 4) PCO<sub>2</sub> membaik
- 5) PO<sub>2</sub> membaik
- 6) PH arteri membaik

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional

Table 2.6 Intervensi gangguan pertukaran gas

Intervensi Keperawatan	Rasional
<b>Terapi Oksigen</b>	
<b>Observasi</b>	
Monitor kecepatan aliran oksigen	Untuk melihat ada tidaknya aliran oksigen yang masuk
Monitor posisi alat terapi oksigen	Untuk mengetahui apakah alat yang digunakan pasien sudah tepat
Monitor aliran oksigen secara periodic dan pastikan fraksi yang diberikan cukup	Memaksimalkan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan pasien
Monitor kemampuan melepaskan oksigen saat makan	Melihat kemandirian pasien dalam pemasangan oksigen
Monitor tanda-tanda hipoventilasi	Untuk mengetahui terjadinya gangguan hipoventilasi
Monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen dan atelectasis	Untuk mengetahui kelainan toksikasi oksigen dan atelektasis
Monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen	Untuk mengetahui tingkat kecemasan saat terapi oksigen
Monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen	Untuk mengetahui adanya kelainan akibat pemasangan oksigen

<b>Teraupetik</b>	
Bersihkan sekret pada mulut, hidung dan trachea, jika perlu	Mencegah obstruksi respirasi
Pertahankan kepatenan jalan napas	Pasien dapat bernapas dengan mudah
Berikan oksigen tambahan, jika perlu	Memaksimalkan bernapas dan menurunkan kerja napas
<b>Edukasi</b>	
Ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen dirumah	Untuk memudahkan menggunakan oksigen perawatan di rumah
<b>Kolaborasi</b>	
Kolaborasi penentuan dosis oksigen	Untuk menentukan berapa dosis oksigen yang diberikan
Kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan/atau tidur	Untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien

## 2. Diagnosis 2 :Pola Napas Tidak Efektif

- a. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan Pola napas membaik dengan Kriteria Hasil:
- 1) Dispnea menurun
  - 2) Penggunaan otot bantu napas menurun
  - 3) Pemanjangan fase ekspirasi menurun
  - 4) Frekuensi napas membaik
  - 5) Kedalaman napas membaik
- b. Intervensi Keperawatan dan Rasional

Table 2.7 Intervensi pola napas tidak efektif

Intervensi Keperawatan	Rasional
<b>Manajemen Jalan Napas</b>	
<b>Observasi</b>	
Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)	Penurunan bunyi napas dapat menunjukkan atelectasis, ronkhi mengi menunjukkan akumulasi secret, ketidakmampuan membersihkan jalan napas menimbulkan penggunaan otot bantu dan peningkatan kerja napas
Monitor bunyi napas tambahan (mis. Gurgling, mengi, ronkhi kering)	Mengetahui ada tidaknya suara napas tambahan yang menghalangi jalan napas
Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)	Untuk mengetahui seberapa parah kondisi pasien
<b>Teraupetik</b>	
Pertahankan kepatenan jalan napas dengan <i>head-tilt</i> dan <i>chin-lift</i> ( <i>jaw-thrust</i> jika curiga trauma cervical)	Untuk mempertahankan dan memelihara kepatenan jalan napas
Posisikan semi-Fowler atau Fowler	Untuk memudahkan pasien dalam bernapas

Berikan minum hangat	Untuk mengencerkan secret dan memudahkan dalam bernapas
Lakukan fisioterapi dada, jika perlu	Membantu membersihkan dan mengeluarkan sekret serta melonggarkan jalan napas
Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik	Mengurangi sesak, melonggarkan jalan napas dan mengencerkan sekret
Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal	Menghindari hipoksemi akibat suction
Keluarkan sumbatan benda padat dengan forsepMcGill	Membebaskan sumbatan dari benda padat
Berikan oksigen, jika perlu	Untuk mencegah kegagalan napas
<b>Edukasi</b>	
Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontraindikasi	Untuk mengganti cairan tubuh
Ajarkan teknik batuk efektif	Batuk efektif dapat mengeluarkan dahak
<b>Kolaborasi</b>	
Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu	Pemberian obat bronkodilator untuk melebarkan jalan napas, ekspektoran obat untuk merangsang pengeluaran sputum, mukolitik membuat hancur formasi sputum atau tidak lagi bersifat kental

### 3. Diagnosis 3 : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

- a. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan Bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria Hasil:
- 1) Batuk efektif meningkat
  - 2) Sputum berlebih menurun
  - 3) Mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering menurun
- b. Intervensi Keperawatan dan Rasional

Table 2.8 Intervensi bersihan jalan napas tidak efektif

Intervensi Keperawatan	Rasional
<b>Pemantauan Respirasi</b>	
<b>Observasi</b> Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas	Penurunan bunyi napas dapat menunjukkan atelectasis, ronkhi mengi menunjukkan akumulasi secret, ketidakmampuan untuk membersihkan jalan napas menimbulkan penggunaan otot bantu pernapasan dan peningkatan kerja napas
Monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea, hiperventilasi, Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot, ataksik)	Untuk mengetahui perkembangan status kesehatan pasien

Monitor kemampuan batuk efektif	Batuk efektif dapat mengeluarkan dahak (bila ada)
Monitor adanya produksi sputum	Untuk memastikan adanya sputum di saluran napas dan mengetahui seberapa parah kondisi pasien
Monitor adanya sumbatan jalan napas	Mengetahui adanya suara napas tambahan dan keefektifan jalan napas
Palpasi kesimetrisan ekspansi paru	Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru
Auskultasi bunyi nafas	Mengetahui adanya suara napas tambahan
Monitor saturasi oksigen	Mengetahui adanya perubahan nilai SpO <sub>2</sub>
Monitor nilai AGD	Untuk mengukur jumlah oksigen dan karbondioksida dalam darah dan menentukan tingkat keasaman atau pH darah
Monitor hasil X-ray toraks	Mengetahui keadaan paru pasien
<b>Teraupetik</b>	
Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien	Mengetahui keadaan napas pasien apakah teratur atau tidak
Dokumentasi hasil pemantauan	Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan
<b>Edukasi</b>	
Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan	Memberikan pemahaman mengenai manfaat tindakan yang dilakukan
Informasikan hasil pemantauan, jika perlu	Untuk menginformasikan hasil tindakan yang telah dilakukan

#### 4. Diagnosis 4 : Risiko infeksi

- a. Tujuan : setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam maka, tingkat infeksi menurun. Dengan kriteria hasil
- 1) Nyeri menurun
  - 2) Bengkak menurun
  - 3) Kemerahan menurun
- b. Intervensi Keperawatan dan Rasional

Tabel 2.9 Intervensi risiko infeksi

<b>Intervensi Keperawatan</b>	<b>Rasional</b>
<b>Pencegahan infeksi</b>	
<b>Observasi</b> Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik	Agar mengetahui tanda dan gejala infeksi
<b>Teraupetik</b>	
Batasi jumlah pengunjung	Untuk menghindari penyebaran virus
Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien	Untuk menghindari transmisi virus akibat kontak langsung

<b>Edukasi</b>	
Jelaskan tanda dan gejala infeksi	Untuk menjelaskan bagaimana tanda dan gejala dari infeksi
Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar	Untuk mengedukasi pasien bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar
<b>Kolaborasi</b>	
Kolaborasi pemberian imunisasi	Untuk mencegah masuknya virus di dalam tubuh

## 5. Diagnosis 5: Hipotermia

- a. Tujuan : setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam maka, termoregulasi membaik. Dengan kriteria hasil
- 1) Suhu tubuh membaik
  - 2) Pucat menurun
  - 3) Menggigil menurun
- b. Intervensi Keperawatan dan Rasional

Tabel 2.10 Intervensi hipotermia

<b>Intervensi Keperawatan</b>	<b>Rasional</b>
<b>Manajemen hipotermia</b>	
<b>Observasi</b>	
Identifikasi penyebab hipotermia	Untuk mengetahui penyebab hipotermia
Monitor suhu tubuh	Untuk mengetahui suhu tubuh klien
Monitor tanda dan gejala hipotermia	Untuk mengetahui tanda dan gejala hipotermia
<b>Teraupetik</b>	
Sediakan lingkungan yang hangat	untuk memberi kehangatan pada pasien
Ganti pakaian dan/atau linen yang basah	Untuk membantu memberikan kehangatan
Lakukan penghangatan pasif dan aktif	Untuk membantu memberikan kehangatan serta mengembalikan suhu tubuh kearah normal
<b>Edukasi</b>	
Anjurkan makan/minum hangat	Untuk memberikan rasa nyaman pada klien

## 2.3. Evidence Based Practice (EBP)

### 2.3.1. Pengertian

Posisi *quarter prone*, juga dikenal sebagai posisi setengah tengkurap, adalah posisi saat tubuh dimiringkan ke satu sisi, lutut ditekuk di bawah perut, dan badan menghadap ke bawah (Maharani, 2019). Ketika diposisikan

setengah tengkurap, dahi bayi akan ditopang oleh handuk yang digulung untuk memastikan cabang hidung di wajah tidak menyentuh tempat tidur dan pipa bergelombang tidak menghalangi jalan napas yang optimal. Selain itu, posisi ini memungkinkan lengan bawah untuk beristirahat rata di permukaan tempat tidur, memastikan ekstensi dan fleksi leher sedekat mungkin dengan keselarasan netral dengan kontur otot fleksor yang tepat (semifleksi/adduksi di pinggul dan semifleksi di lutut). (Yin *et. al*, 2016).



**Gambar 2.1** Posisi *quarter prone*

Posisi ini hanya boleh digunakan dengan bayi berventilasi atau CPAP. Alternatif tengkurap dengan *quarter prone* segera setelah bayi stabil. Pertama lenturkan lengan dan kaki paling atas di atas gulungan yang menopang tubuh dari bahu ke panggul, lalu posisikan lengan dan kaki lainnya dalam posisi ekstensi atau setengah fleksi seperti dalam posisi 'pemulihan', kemudian lutut di bawah harus menghadap ke arah yang sama atau dalam posisi netral. Jika di ranjang terbuka beri pembatas dengan bedong (Cahs. Health, 2020).

Posisi *quarter prone* bermanfaat untuk menstabilkan laju pernapasan dan meningkatkan saturasi oksigen. Untuk mengatur bayi pada posisi ini yang



harus dilakukan adalah menempatkan gulungan leher kecil di bawah bayi untuk mencegah fleksi leher dan sumbatan jalan napas, lalu buat *nesting* bayi dengan menyangga pinggul, lengan paling atas dan badan dengan gulungan dan terakhir posisikan lutut dan kaki sejajar netral dengan pinggul (Queensland, 2020).

### **2.3.2. Patofisiologi EBP**

Bayi yang terlahir premature atau bayi dengan berat badan lahir rendah pada umumnya akan mendapatkan alat bantu pernapasan berupa ventilator mekanik. Bayi yang terlahir premature atau BBLR ini mengalami kegagalan atau tidak mampu untuk bernapas secara mandiri, dengan adanya alat bantu ini dapat menjadi pengganti fungsi pompa dada sehingga kebutuhan oksigen pada bayi dapat terpenuhi (Alfiyah *et al*, 2022).

Pada dasarnya, posisi *quarter prone* merupakan bentuk dari posisi *prone* sehingga kedua posisi ini memiliki fisiologis yang serupa dalam memperbaiki status oksigenasi pasien. Posisi *quarter prone* secara fisiologis mengurangi masalah pernapasan pada bayi prematur seperti tekanan pleura yang tidak seimbang, inflasi alveolar, dan gerakan thoracoabdomin yang tidak sinkron. Selain itu posisi ini juga meningkatkan volume paru-paru dan sebaliknya menghambat atelektasis (Lestari *et al*, 2018).

Posis *quarter prone* ini terbukti mampu meningkatkan kepatenan jalan napas. Posisi ini mampu meningkatkan gerakan sinkron rongga dada dan perut yang meningkatkan kapasitas residu fungsional (FRC) yang mencegah kolaps alveolar. Posisi ini memberikan lebih banyak ruang untuk dorsal yang merupakan area non dependen, sehingga meningkatkan ventilasi dan komplians paru. Pada saat yang sama, tekanan hidrostatik ke ventral membuat lebih banyak aliran darah sehingga mampu meningkatkan oksigenasi ke area

ini (Montgomery *et al*, 2014). Kebutuhan oksigenasi dalam kehidupan dijelaskan dalam Al Quran Surah Al An'am ayat 125 :

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

*"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman". (Q.S Al-An'am:125)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keberadaan oksigen berpengaruh terhadap proses pernapasan, selain ketersediaan oksigen, tekanan udara di suatu kawasan juga sangat berpengaruh terhadap proses pertukaran gas dari atmosfer ke dalam tubuh. Al Qur'an memberikan kiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah seakan dada mereka sesak lagi sempit. Mengapa Allah mengibaratkan mereka dengan orang yang mendaki ke langit? Karena, semakin tinggi suatu tempat maka kadar oksigen juga semakin kurang. Mereka tidak mampu bernapas dengan baik sehingga dada mereka menjadi sesak. Semakin kita bergerak ke atas maka semakin susah kita untuk bernapas. Bukan karena oksigen semakin tipis, namun karena tekanan udara semakin kurang. Pada ketinggian, seperti di gunung misalnya, tekanan udaranya 30% lebih rendah dari permukaan laut. Hal ini membuat oksigen susah masuk ke dalam pernapasan kita karena pergerakan molekulnya lebih lambat (Nur & Muammar, 2020).

### 2.3.3. Tujuan

- a. Menstabilkan laju pernafasan pada bayi
- b. Meningkatkan saturasi oksigen
- c. Mengoptimalkan ekspansi paru

- d. Mencegah regurgitasi

#### **2.3.4. Indikasi**

- a. Bayi dengan RDN/RDS
- b. Bayi sesak dengan pneumonia
- c. Bayi prematur

#### **2.3.5. Kontraindikasi**

Menurut beberapa penelitian, tidak disarankan untuk menempatkan bayi dalam posisi setengah tengkurap karena dapat menekan dada mereka jika memiliki masalah jantung bawaan (Ginting & Nurhaeni, 2021).

#### **2.3.6. Prosedur Pemberian dan Rasional**

- a. Persiapan alat dan bahan
  - 1) Selimut
  - 2) Nesting
- b. Fase orientasi
  - 1) Mengucap salam
  - 2) Memperhatikan keadaan pasien
- c. Fase kerja
  - 1) Mencuci tangan
  - 2) Menjaga privasi dan menjunjung tinggi standar lingkungan
  - 3) Membaca Basmalah sebelum melakukan tindakan
  - 4) Tempatkan bayi pada incubator dengan suhu yang hangat
  - 5) Badan bayi dimiringkan ke satu sisi, lutut ditekuk di bawah perut dan badan bayi menghadap ke bawah
  - 6) Selanjutnya, gulungan selimut berbentuk guling dimasukkan ke dada dan perut bayi
  - 7) Tempatkan bayi sehingga bayi memeluk guling

- 8) Selanjutnya, sediakan blanket *nesting*, yang berfungsi sebagai fiksasi bagi bayi.
- 9) Memastikan bayi nyaman dengan posisi yang diberikan
- 10) Mengucapkan hamdalah

d. Fase terminasi

Dokumentasikan tindakan dan nilai pada 10 menit, 20 menit, 30 menit, satu jam, dan dua jam setelah pemberian (Rad et al., 2016)

e. Dosis Intervensi

Durasi pemberian dan waktu pemantauan posisi *quarter prone* sangatlah bervariasi, seperti penelitian yang dilakukan Rad et al (2020), bayi diatur dalam posisi *quarter prone* selama dua jam yang dipantau setiap 10 menit selama 2 jam dan kemudian dilakukan reposisi. Dalam penelitian yang dilakukan Utario et al. (2017) dengan pengaturan posisi *quarter prone* selama tiga jam dengan pengukuran saturasi oksigen, *respiratory rate*, dan *heart rate* dilakukan pada menit ke 30, 45, 60, 75 dan 90. Penelitian lain oleh Yin et al. (2016) dan Montgomery et al (2014) yang mengatur bayi pada posisi *quarter prone* dengan masing-masing durasi 4 dan 1 jam dengan waktu pemantauan setiap 30 menit.

Berdasarkan beberapa referensi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan posisi *quarter prone* pada bayi dan melakukan pengukuran *respiratory rate* pada menit ke 10, menit ke 20, menit ke 30, menit ke 60 dan menit ke 120.

### 2.3.7. Kriteria Evaluasi

- a. Respon : Sesak napas berkurang, saturasi dalam rentang normal, , retraksi dada berkurang, bayi tidak gelisah dan bayi tampak nyaman.
- b. Membantu memberikan penguatan
- c. Menyelesaikan tugas dengan baik



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Studi Kasus**

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode pendekatan asuhan keperawatan. Studi kasus, sebagaimana didefinisikan oleh Nursalam (2016), adalah penelitian yang terdiri dari evaluasi dengan tujuan memberikan gambaran lengkap tentang sejarah, sifat, dan karakteristik suatu kasus. Dengan kata lain, studi kasus secara intens dan menyeluruh berkonsentrasi pada satu kasus. Pendekatan studi kasus ini melakukan penelitian yang sistematis dan mendalam terhadap suatu kondisi atau perasaan yang dialami oleh seorang pasien.

#### **3.2. Subyek Studi Kasus**

Subjek dalam penelitian ini adalah Bayi "M" yang berusia 7 hari dengan diagnosis medis RDN dengan jenis kelamin laki-laki. Subjek yang digunakan dalam karya tulis ini adalah pasien yang sudah bersedia untuk dijadikan sebagai responden atas izin dari orang tua. Subyek juga tidak memiliki penyakit jantung bawaan atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi hasil dari pemberian intervensi yang akan dilakukan.

#### **3.3. Fokus Studi Kasus**

Studi kasus ini berfokus pada pemberian asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola pernapasan yang tidak efektif dengan menggunakan posisi *quarter prone* sebagai intervensi.

#### **3.4. Instrument Studi Kasus**

Formulir asuhan keperawatan neonatus, lembar observasi penilaian laju pernapasan, dan alat pencatat waktu/jam tangan merupakan instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini.

### **3.5. Prosedur Pengambilan Data**

- 3.5.1. Penelusuran *literature* dan pengajuan tema judul penelitian
- 3.5.2. Mengumpulkan data dilakukan dengan observasi pada bayi M dan wawancara dengan perawat di ruang NICU RSUP Wahidin
- 3.5.3. Penyusunan laporan berdasarkan panduan penulisan karya tulis ilmiah

### **3.6. Tempat & Waktu Pengambilan Data**

- 3.6.1. Tempat : Ruang perawatan NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 3.6.2. Waktu : Pengambilan data pada hari Senin 4 Juli 2022 dan pemberian intervensi dilakukan pada tanggal 5-7 Juli 2022

### **3.7. Analisa Data dan Penyajian Data**

Bayi. Ny. M lahir di rumah sakit pada tanggal 28 juni 2022 dengan cara section ceasar dengan berat badan lahir 1500 gram, pasien dipindahkan ke ruang NICU karena sesak. Pada saat pengkajian bayi tampak lemah, tampak adanya pernapasan cuping hidung, mukosa bibir tampak kering, tampak terpasang OGT dan CPAP, nampak adanya retraksi dada, CRT <3 detik. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu nadi 170x/menit, pernapasan 62x/menit, SpO2 93%, suhu 37,9°C dan berat badan saat ini 1500 gram.

### **3.8. Etika Studi Kasus**

Masalah etika untuk pasien yang harus dipertimbangkan saat melakukan studi kasus tentang asuhan keperawatan diantaranya sebagai berikut :

#### **3.8.1. Confidentiality (Kerahasiaan)**


Informasi yang diperoleh peneliti hanya digunakan untuk penelitian dan tidak dibagikan kepada orang lain. Nama pasien tidak diungkapkan oleh peneliti; sebagai gantinya, gunakan inisial sebagai pengganti nama pasien.

### 3.8.2. *Justice* (Keadilan)

Peneliti harus menjunjung tinggi nilai transparansi dan keadilan dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk menjunjung tinggi keterbukaan, peneliti memberikan penjelasan singkat tentang proses penelitian kepada orang tua pasien. Sementara itu, peneliti memastikan bahwa subjek penelitian diperlakukan sama sesuai dengan konsep *fairness*.

### 3.8.3. *Non Malefeciencia*

Prinsip ini merupakan tugas perawat untuk tidak membahayakan pasien. Pasien dan keluarga memiliki pilihan untuk secara sukarela berpartisipasi dalam intervensi yang akan diberikan (posisi *quarter prone*) dengan tidak menimbulkan kerugian atau bahaya.





## BAB IV

### LAPORAN KASUS

#### 4.1. Asuhan Keperawatan

##### 4.4.1. Pengkajian Keperawatan

Table 4.1 Pengkajian umum NICU

Pengkajian	Bayi M
<b>Data Umum</b>	Data Bayi - Inisial : By. Ny. M - BB/PB : BBL 1500 gr BBS 1500 gr / PB 39,5 cm - Jenis kelamin : Laki-laki - Apgar score : - Tanggal lahir : 28-06-2022 Data Orangtua - Nama Ibu : Ny. M - Umur : 32 tahun - Pendidikan : S1 - Nama Ayah : Tn. R - Umur : 33 tahun - Pendidikan : S1

Tabel 4.2 Pengkajian fisik NICU

Pengkajian	Bayi M
<b>Pengkajian Nyeri</b>	Neonatal/Infant Pain Score (NIPS) - Ekspresi wajah : 0 - Cry : 0 - Pola nafas : 1 - Lengan : 0 - Kaki : 0 - Score : 1 - Interpretasi : Skala nyeri ringan (1-3)
<b>Ballard's Score</b>	- Penilaian maturitas neuromus kular : 9 - Penilaian maturitas fisik : 10 - Interpretasi : 19 artinya usia gestasi 32 minggu
<b>Refleks</b>	- Sucking refleks : Ada - Grasping refleks : Ada - Rooting refleks : Ada - Swallowing refleks : Ada - Babinski refleks : Ada - Refleks moro : Ada - Breathing refleks : Ada - Eyeblink refleks : Ada - Pupillary refleks : - Refleks crawling : - - Refleks tonic neck : - - Refleks tonic labirin : -
<b>Tonus Aktifitas</b>	<b>Obyektif :</b> - Bayi tampak letargis

	- Bayi tampak menangis lemah
<b>Kepala/ Leher</b>	<b>Objektif:</b> - Frontal anterior : Lunak, datar - Sutura sagitalis : Tepat - Gambaran wajah : Simetris - Molding caput succedaneum & chepalohematoma : tidak ada
<b>Mata</b>	<b>Obyektif :</b> - Mata tampak bersih - Dapat membuka secara spontan
<b>THT</b>	<b>Objektif :</b> - Telinga : Normal - Hidung : tampak pernapasan cuping hidung, terpasang alat bantu pernapasan CPAP
<b>Abdomen</b>	<b>Objektif :</b> - Lunak, kembung - Lingkar perut : 52 cm - Liver : tidak teraba
<b>Thoraks</b>	<b>Obyektif :</b> - Simetris : simetris - Retraksi dada : ada
<b>Paru-paru</b>	<b>Obyektif</b> - Suara napas sama kiri kanan - Bunyi napas di semua lapang paru terdengar - Suara napas vesikuler, 62x/menit - Spo2 93% - Respirasi dibantu dengan CPAP
<b>Jantung</b>	<b>Obyektif</b> - Bunyi normal sinus rythm (NSR) dengan frekuensi 170x/menit - Waktu pengisian kapiler <3 detik
<b>Ekstremitas</b>	<b>Obyektif:</b> - Gerakan terbatas - Nadi perifer : keras - Brachial kanan : keras - Brachial kiri : keras - Femoral kanan : keras - Femoral kiri : keras
<b>Umbilikus</b>	<b>Obyektif:</b> - Umbilikus normal, mulai mengering
<b>Genitalia</b>	<b>Obyektif:</b> - Laki-laki, normal
<b>Anus</b>	<b>Obyektif:</b> - Paten
<b>Spina</b>	<b>Obyektif:</b> - Normal
<b>Kulit</b>	<b>Obyektif:</b> - Warna kulit : pucat - Kulit teraba dingin - Tanda lahir :
<b>Suhu</b>	<b>Obyektif:</b> - Lingkungan (inkubator) : 32,2°C - Kulit : 37,9°C

Table 4.3 Riwayat Prenatal (ANC)

<b>Bayi M</b>
- Jumlah kunjungan : 6 kali
- Bidan/dokter : dokter
- Pend. Kesehatan yang didapat : gizi pada ibu hamil
- HPHT :
- Kenaikan BB selama hamil : belum ada kenaikan BB
- Komplikasi obat : tidak ada
- Obat-obatan yang didapat : Tablet penambah darah
- Pengobatan yang didapat : tidak ada
- Riwayat hospitalisasi : Tidak pernah selama hamil
- Golongan darah ibu hamil: A

Tabel 4.4 Riwayat Persalinan (Intranatal)

<b>Bayi M</b>
- Awal persalinan :nyeri perut sampai belakang
- Lama persalinan : ± 1 jam
- Cara melahirkan : Secti Cesaria
- Komplikasi persalinan : Perdarahan
- Terapi yang diberikan : Ibu mengatakan tidak tahu
• Jenis dan jumlah :
• Lama pemberian :
- Jumlah cairan ketuban : Ibu mengatakan tidak tahu
- Anastesi yang diberikan :Anastesi lokal
- Ada/tidak mekonium : Ibu mengatakan tidak tahu

Tabel 4.5 Riwayat Post Natal

<b>Bayi M</b>
- Penilaian <i>score down</i> pada bayi
• Frekuensi napas :
• Retraksi : Tidak ada retraksi
• Sianosis : Tidak ada sianosis
• Air entry : Udara masuk bilateral baik
• Merintih : Tidak merintih
• Interpretasi :
- Usaha nafas :
- Apgar score menit pertama :
- Kebutuhan resusitasi : Tidak
- Kebutuhan nutrisi : ASI
- Ada trauma lahir :
- Keluaran urin : Ya
- BAB pertama : Mekonium

Table 4.6 Pemeriksaan diagnostic

<b>Lab</b>	<b>Bayi M</b>		
<b>Tanggal Pemeriksaan</b>	<b>Test</b>	<b>Hasil</b>	<b>Hasil Normal</b>
1/12/2021	WBC	9.0	4.0- 10.0 10 <sup>3</sup> /uL
Hematologi	RBC	4.05	4.0-6.0 10 <sup>6</sup> /uL

HGB	14.0	112.0-16.0 gr/dL
HCT	41	37.0-48.0%
PLT	200	150-400 10 <sup>3</sup> /uL
PCT	0.10	0.150-0.500

Tabel 4.7 Terapi dan pengobatan

Terapi & Pengobatan	Bayi M
	Amikon : 27 mg/36 jam (IV) Ampicilin : 50 mg/12 jam (IV) Gentamycin : 7 mg/36 jam (IV) Coftazidine : 30 mg/KgBB (IV)



**Table 4.8** Analisa Data

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
<b>PASIEN 1</b>			
1.	<b>Data Subjektif :</b> a. BBL : 1500 gr <b>Data Objektif :</b> b. BBS 1500 gr c. PB : 39,5 cm d. Refleks isap : bayi kuat mengisap tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama e. Refleks menelan : bayi menelan baik tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama f. Terpasang OGT	BBLR ↓ Pencernaan ↓ Enzim cerna kurang ↓ Pelvis ↓ Intake tidak adekuat ↓ Defisit nutrisi	<b>Defisit Nutrisi</b>
2.	<b>Data Subjektif:</b> a. Pasien mengatakan nyeri saat berhubungan intim b. Pasien mengatakan aktivitas seksual berubah <b>Data Objektif :</b> c. FiO2 : 25% d. Pasien bernafas dibantu CPAP e. Tampak pernapasan cuping hidung f. Tampak retraksi dada g. Bunyi nafas vesikuler, frekuensi 62x/menit h. Spo2 : 93%	BBLR ↓ Alveolus kolaps ↓ Peningkatan usaha napas ↓ Ventilasi berkurang ↓ Takipnea ↓ Pola nafas tidak efektif	<b>Pola Nafas Tidak Efektif</b>
3.	<b>Data Subjektif :</b> a. BBL : 1500gr <b>Data Objektif:</b> b. Pasien terinkubator c. BBS : 1500 gr d. Suhu kulit : 37,9°C e. Suhu inkubator : 32,2°C	BBLR ↓ Termoregulasi ↓ Peningkatan kehilangan panas tubuh ↓ Resiko termoregulasi tidak efektif	<b>Resiko termoregulasi tidak efektif</b>

#### 4.4.2. Diagnosa Keperawatan

**Table 4.9** Diagnosa Keperawatan

1	<p>Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dibuktikan dengan:</p> <p><b>Data Subjektif:</b></p> <p><b>Data Objektif :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. FiO2 : 25%</li><li>b. Pasien bernafas dibantu CPAP</li><li>c. Tampak pernapasan cuping hidung</li><li>d. Tampak retraksi dada</li><li>e. Bunyi nafas vesikuler, frekuensi 62x/menit</li><li>f. Spo2 : 93%</li></ul>
2	<p>Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dibuktikan dengan :</p> <p><b>Data Subjektif :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BBL : 1500 gr</li></ul> <p><b>Data Objektif :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. BBS 1500 gr</li><li>c. PB : 39,5 cm</li><li>d. Refleks isap : bayi kuat mengisap tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama</li><li>e. Refleks menelan : bayi menelan baik tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama</li><li>f. Terpasang OGT</li></ul>
3	<p>Risiko termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan faktor risiko berat badan ekstrim dibuktikan dengan :</p> <p><b>Data Objektif:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasien terinkubator</li><li>b. BBS : 1500 gr</li><li>c. Suhu kulit : 37,9°C</li><li>d. Suhu inkubator : 32,2°C</li></ul>

### 4.4.3. Intervensi Keperawatan

Tabel 4.10 Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran	Intervensi	
			Intervensi Keperawatan	Rasional
1.	<p>Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dibuktikan dengan:</p> <p><b>Data Subjektif:</b>  <b>Data Objektif :</b>            FiO2 : 25%            Pasien bernafas dibantu CPAP            Tampak pernapasan cuping hidung            Tampak retraksi dada            Bunyi nafas vesikuler, frekuensi 62x/menit            Spo2 : 93%</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan pola nafas membaik dengan Kriteria hasil:</p> <p>a. Frekuensi nafas membaik dari kriteria 1 (memburuk) ke kriteria 5 (membaik)            b. Penggunaan otot bantu napas menurun dari kriteria 1 (meningkat( ke kriteria 5 (menurun)            c. Pernapasan cuping hidung menurun dari kriteria 1 (meningkat) ke kriteria 5 (menurun)</p>	<p><b>Pemantauan Respirasi</b>  <b>Observasi</b>            a. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas            b. Monitor saturasi oksigen  <b>Teraupetik</b>            c. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kebutuhan            d. Atur posisi quarter prone (EBP)            e. Dokumentasikan hasil pemantauan  <b>Edukasi</b>            f. Jelaskan tujuan dan prosedur pemberian posisi quarter prone            g. Informasikan hasil pemantauan</p>	<p><b>Observasi</b>            a. Mengetahui perubahan pola pernafasan pasien            b. Mengetahui adanya sumbatan pada jalan nafas  <b>Teraupetik</b>            c. Menilai kondisi pasien yang membutuhkan pemantauan lebih sering            d. Mengurangi sesak dan memberi kenyamanan            e. Mengevaluasi hasil perawatan dan sebagai tanggung gugat perawat.  <b>Edukasi</b>            f. Edukasi kepada keluarga atas tindakan yang akan dilakukan pada bayinya.            g. Memfasilitasi keluarga tentang kondisi bayinya</p>
2.	<p>Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dibuktikan dengan :</p> <p><b>Data Subjektif :</b>            BBL : 1500 gr  <b>Data Objektif :</b>            BBS 1500 gr            PB : 39,5 cm            Refleks isap : bayi kuat</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan termoregulasi neonates membaik dengan kriteria hasil:</p> <p>a. Suhu tubuh menurun            b. Suhu kulit menu run            c. Frekuensi nadi membaik</p>	<p><b>Regulasi Temperatur</b>  <b>Observasi</b>            a. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,4-37,5°C)            b. Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan nadi  <b>Teraupetik</b>            c. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat            d. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan</p>	<p><b>Observasi</b>            a. Mengetahui perubahan suhu tubuh bayi            b. Mengetahui perubahan tanda vital selama periode hipertermi  <b>Teraupetik</b>            c. Mencegah terjadinya dehidrasi dan mencegah memperburuk kondisi bayi            d. Pengaturan suhu lingkungan dapat membantu mempertahankan regulasi</p>

<p>mengisap tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama Refleks menelan : bayi menelan baik tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama Terpasang OGT</p>		<p><b>Kolaborasi</b> e. Kolaborasi pemberian antipiretik bila perlu.</p>	<p>temperatur bayi <b>Edukasi</b> e. Membantu menurunkan demam bayi</p>
<p>3. Risiko termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan faktor risiko berat badan ekstrim dibuktikan dengan : <b>Data Objektif:</b> Pasien terinkubator BBS : 1500 gr Suhu kulit : 37,9°C Suhu inkubator : 32,2°C</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil: a. Porsi yang dihabiskan meningkat (volume susu 50 cc) b. Berat badan membaik dengan kenaikan 10-20 gram/hari c. Frekuensi minum membaik</p>	<p><b>Manajemen Nutrisi</b> <b>Observasi</b> a. Identifikasi status nutrisi b. Monitor asupan makanan c. Monitor berat badan <b>Terapeutik</b> d. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu e. Sajikan makanan secara menarik dan sushu yang sesuai f. Berikan suplemen makanan, jika perlu</p>	<p><b>Observasi</b> a. Untuk mengetahui status nutrisi bayi b. Mengetahui asupan minuman bayi c. Mengetahui berat badan normal bayi <b>Terapeutik</b> d. Mulut lebih bersih dan nyaman sebelum makan e. Bayi lebih nyaman dan lahap minum susu f. Bayi memiliki kemauan untuk minum susu</p>



#### 4.4.4. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

**Tabel 4.11** Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

Hari/ Tanggal	DIAGNOSIS	IMPLEMENTASI	EVALUASI
Selasa, 5 Juli 2022	1 (Pola nafas tidak efektif)	<p><b>Pemantauan Respirasi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya nafas Hasil: Frekuensi 64x/menit, irama teratur upaya nafas masih dibantu ventilator</li> <li>2. Memonitor saturasi oksigen Hasil: Saturasi oksigen 94%</li> </ol> <p><b>Teraupetik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengatur posisi <i>quarter prone</i> (EBP) Hasil : Bayi tampak nyaman dengan posisi <i>quarter prone</i></li> <li>4. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kebutuhan Hasil: observasi dilakukan per 30 menit</li> <li>5. Mendokumentasikan hasil pemantauan Hasil: Hasil pemantauan ditulis dalam flow sheet monitoring 24</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menginformasikan hasil pemantauan Hasil: Hasil pemantauan diinformasikan pada keluarga</li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kolaborasi pemberian oksigen tambahan Hasil: Terpasang CPAP 7 liter/menit</li> </ol>	<p><b>S:</b> -</p> <p><b>O:</b> Keadaan umum lemah, pernapasan bayi tampak cepat, masih ada napas cuping hidung, terpasang CPAP 7 liter/menit, pernafasan 53x/menit, nadi 150x/menit, Spo2 97%</p> <p><b>A:</b> Masalah pola nafas tidak efektif belum teratasi</p> <p><b>P:</b> Intervensi dilanjutkan</p> <p>Pemantauan respirasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor frekuensi, irama, upaya nafas</li> <li>2. Monitor saturasi oksigen</li> <li>3. Atur posisi <i>quarter prone</i></li> <li>4. Atur interval pemantauan</li> <li>5. Dokumentasikan hasil pemantauan</li> <li>6. Informasikan hasil pemantauan</li> </ol>
Selasa, 5 Juli 2022	2 (Termoregulasi tidak efektif)	<p><b>Regulasi Temperatur</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,4-37,5°C) Hasil: Suhu kulit 37,0°C</li> <li>2. Memonitor tekanan darah, frekuensi pernapasan &amp; nadi Hasil: Nadi 167x/menit, pernapasan 54x/menit</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p>	<p><b>S:</b> -</p> <p><b>O:</b> Tubuh bayi teraba hangat, suhu inkubator 32,2°C, suhu kulit 37,1°C, nadi 150x/menit</p> <p><b>A:</b> Masalah risiko termoregulasi tidak efektif belum teratasi</p> <p><b>P:</b> Intervensi dilanjutkan</p> <p>Regulasi Temperatur</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat Hasil: Bayi terpasang cairan asering dan pemberian ASI 12 x 4 cc/hari</li> <li>Mengatur suhu inkubator sesuai kebutuhan Hasil: Suhu inkubator 32,2°C</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitor suhu tubuh bayi</li> <li>Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan nadi</li> <li>Tingkatkan asupan nutrisi adekuat</li> <li>Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan</li> <li>Kolaborasi pemberian antipiretik</li> </ol>
Selasa, 5 Juli 2022	3 (Defisit nutrisi)	<p><b>Manajemen Nutrisi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi status nutrisi Hasil: Nutrisi bayi kurang baik</li> <li>Memonitor asupan makanan Hasil: Bayi minum ASI</li> <li>Memonitor berat badan Hasil: BBS 1500 gr</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan makanan kepada bayi Hasil: Bayi diberikan ASI melalui OGT 12 x 4 cc</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengubah posisi bayi Hasil: Bayi diatur posisi supine dan quarter peone</li> </ol>	<p><b>S :-</b></p> <p><b>O:</b> Bayi terpasang OGT, BBS : 1500 gr, nadi : 150x/menit, suhu 37,1°C</p> <p><b>A :</b> Masalah defisit nutrisi belum teratasi</p> <p><b>P :</b> Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi status nutrisi</li> <li>Monitor asupan makanan</li> <li>Monitor berat badan</li> <li>Berikan makanan</li> </ol>
Rabu, 6 Juli 2022	1 (Pola nafas tidak efektif)	<p><b>Pemantauan Respirasi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memonitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya nafas Hasil: Frekuensi 59x/menit, irama teratur upaya nafas masih dibantu ventilator</li> <li>Memonitor saturasi oksigen Hasil: Saturasi oksigen 93%</li> </ol> <p><b>Teraupetik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengatur posisi <i>quarter prone</i> (EBP) Hasil : Bayi tampak nyaman setelah diatur posisi <i>quarter prone</i></li> <li>Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kebutuhan Hasil: observasi dilakukan per 30 menit</li> <li>Mendokumentasikan hasil pemantauan Hasil: Hasil pemantauan ditulis dalam flow sheet monitoring 24 j</li> </ol>	<p><b>S: -</b></p> <p><b>O:</b> Keadaan umum lemah, napas bayi tampak cepat, napas cuping hidung masih ada, terpasang CPAP 7 liter/menit, pernafasan : 50x/menit, nadi : 141x/menit, Spo2 : 95%</p> <p><b>A:</b> Masalah pola nafas tidak efektif belum teratasi</p> <p><b>P:</b> Intervensi dilanjutkan</p> <p>Pemantauan respirasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitor frekuensi, irama, upaya nafas</li> <li>Monitor saturasi oksigen</li> <li>Atur posisi <i>quarter prone</i></li> <li>Atur interval pemantauan</li> <li>Dokumentasikan hasil pemantau an</li> <li>Informasikan hasil pemantauan</li> </ol>

		<p><b>Edukasi</b></p> <p>6. Menginformasikan hasil pemantauan Hasil: Hasil pemantauan diinformasikan pada keluarga</p> <p><b>Kolaborasi</b></p> <p>7. Kolaborasi pemberian oksigen tambahan Hasil: Terpasang CPAP 7 liter/menit</p>	
Rabu, 6 Juli 2022	2 (Termoregulasi tidak efektif)	<p><b>Regulasi Temperatur</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <p>1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,4-37,5°C) Hasil: Suhu kulit 37,1°C</p> <p>2. Memonitor tekanan darah, frekuensi pernapasan &amp; nadi Hasil: Nadi 158x/menit, pernapasan 59x/menit</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>3. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat Hasil: Bayi terpasang cairan Nacl 3% dan pemberian ASI 12 x 4 cc/hari</p> <p>4. Mengatur suhu inkubator sesuai kebutuhan Hasil: Suhu inkubator 32,2°C</p>	<p><b>S</b> :-</p> <p><b>O</b>: Tubuh bayi terasa hangat, suhu inkubator 32,2°C, suhu kulit 36,8°C, nadi 141x/menit</p> <p><b>A</b>: Masalah risiko termoregulasi tidak efektif belum teratasi</p> <p><b>P</b>: Intervensi dilanjutkan</p> <p>Regulasi Temperatur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor suhu tubuh bayi</li> <li>2. Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan nadi</li> <li>3. Tingkatkan asupan nutrisi adekuat</li> <li>4. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan</li> <li>5. Kolaborasi pemberian antipiretik</li> </ol>
Rabu, 6 Juli 2022	3 (Defisit nutrisi)	<p><b>Manajemen Nutrisi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <p>1. Mengidentifikasi status nutrisi Hasil: Nutrisi bayi kurang baik</p> <p>2. Memonitor asupan makanan Hasil: Bayi minum ASI</p> <p>3. Memonitor berat badan Hasil: BBS 1500 gr</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>4. Memberikan makanan kepada bayi Hasil: Bayi diberikan ASI melalui OGT 12 x 4 cc</p> <p><b>Edukasi</b></p> <p>5. Mengubah posisi bayi Hasil: Bayi diatur posisi supine dan quarter prone</p>	<p><b>S</b> :-</p> <p><b>O</b>: Bayi terpasang OGT, BBS : 1500 gr, nadi : 141x/menit, suhu 36,8°C</p> <p><b>A</b> : Masalah defisit nutrisi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi status nutrisi</li> <li>2. Monitor asupan makanan</li> <li>3. Monitor berat badan</li> <li>4. Berikan makanan</li> </ol>
Kamis, 7 Juli	1 (Pola nafas)	<b>Pemantauan Respirasi</b>	<b>S</b> :-

2022	tidak efektif)	<p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya nafas Hasil: Frekuensi 51x/menit, irama teratur upaya nafas masih dibantu ventilator</li> <li>2. Memonitor saturasi oksigen Hasil: Saturasi oksigen 95%</li> </ol> <p><b>Teraupetik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengatur posisi <i>quarter prone</i> (EBP) Hasil : Bayi tampak nyaman setelah diatur posisi <i>quarter prone</i></li> <li>4. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kebutuhan Hasil: observasi dilakukan per 30 menit</li> <li>5. Mendokumentasikan hasil pemantauan Hasil: Hasil pemantauan ditulis dalam flow sheet monitoring 24</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menginformasikan hasil pemantauan Hasil: Hasil pemantauan diinformasikan pada keluarga</li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kolaborasi pemberian oksigen tambahan Hasil: Terpasang CPAP 7 liter/menit</li> </ol>	<p><b>O:</b> Keadaan umum lemah, pernapasan bayi tampak teratur, pernapasan cuping hidung sudah berkurang, terpasang CPAP 7 liter/menit, nadi : 156x/menit, pernafasan : 44x/menit, Spo2 : 96%</p> <p><b>A:</b> Masalah pola nafas tidak efektif belum teratasi</p> <p><b>P:</b> Intervensi dilanjutkan</p> <p>Pemantauan respirasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor frekuensi, irama, upaya nafas</li> <li>2. Monitor saturasi oksigen</li> <li>3. Atur posisi <i>quarter prone</i></li> <li>4. Atur interval pemantauan</li> <li>5. Dokumentasikan hasil pemantauan</li> <li>6. Informasikan hasil pemantauan</li> </ol>
Kamis, 7 Juli 2022	2 (Termoregulasi tidak efektif)	<p><b>Regulasi Temperatur</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,4-37,5°C) Hasil: Suhu kulit 36,2 °C</li> <li>2. Memonitor tekanan darah, frekuensi pernapasan &amp; nadi Hasil: Nadi 173x/menit, pernapasan 51x/menit</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat Hasil: Bayi terpasang cairan asering dan pemberian ASI 12 x 4 cc/hari</li> <li>4. Mengatur suhu inkubator sesuai kebutuhan Hasil: Suhu inkubator 32,2°C</li> </ol>	<p><b>S:</b> -</p> <p><b>O:</b> Tubuh bayi teraba hangat, suhu inkubator 32,2°C, suhu kulit 36,7°C, nadi 156x/menit</p> <p><b>A:</b> Masalah risiko termoregulasi tidak efektif teratasi</p> <p><b>P:</b> Intervensi dipertahankan</p> <p>Regulasi Temperatur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor suhu tubuh bayi</li> <li>2. Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan nadi</li> <li>3. Tingkatkan asupan nutrisi adekuat</li> <li>4. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan</li> <li>5. Kolaborasi pemberian antipiretik</li> </ol>
Kamis, 7 Juli 2022	3 (Defisit nutrisi)	<p><b>Manajemen Nutrisi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi status nutrisi</li> </ol>	<p><b>S :-</b></p> <p><b>O:</b> Bayi terpasang OGT, BBS : 1500 gr, nadi : 156x/menit, suhu 36,7°C</p>

<p>Hasil: Nutrisi bayi kurang baik</p> <p>2. Memonitor asupan makanan Hasil: Bayi minum ASI</p> <p>3. Memonitor berat badan Hasil: BBS 1500 gr</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>4. Memberikan makanan kepada bayi Hasil: Bayi diberikan ASI melalui OGT 12 x 4 cc</p> <p><b>Edukasi</b></p> <p>5. Mengubah posisi bayi Hasil: Bayi diatur posisi supine dan quarter prone</p>	<p><b>A</b> : Masalah defisit nutrisi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi status nutrisi</li> <li>2. Monitor asupan makanan</li> <li>3. Monitor berat badan</li> <li>4. Berikan makanan</li> </ol>
--	---

**Table 4.12** Evaluasi pemberian posisi *quarter prone*

Waktu pelaksanaan intervensi	Selasa, 5/7/2022	Rabu, 6/7/2022	Kamis, 7/7/2022
Sebelum pemberian posisi <i>quarter prone</i>	64x/menit	59x/menit	51x/menit
10 menit setelah pemberian posisi <i>quarter prone</i>	61x/menit	55x/menit	50x/menit
20 menit setelah pemberian posisi <i>quarter prone</i>	58x/menit	54x/menit	47x/menit
30 menit setelah pemberian posisi <i>quarter prone</i>	55x/menit	50x/menit	46x/menit
60 menit setelah pemberian posisi <i>quarter prone</i>	52x/menit	49x/menit	44x/menit
90 menit setelah pemberian posisi <i>quarter prone</i>	51x/menit	47x/menit	42x/menit
120 menit setelah pemberian posisi <i>quarter prone</i>	50x/menit	46x/menit	43x/menit

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **1.1. Analisis Asuhan Keperawatan**

##### **1.1.1. Analisis Pengkajian Keperawatan**

Asesmen adalah proses pengumpulan data dan informasi baik subyektif maupun obyektif, seperti wawancara dengan pasien dan keluarga, pemeriksaan tanda vital dan fisik, serta penelaahan informasi riwayat pasien dalam buku rekam medis. Selain mengumpulkan data aktual, perawat juga mengumpulkan kekuatan yaitu mengidentifikasi peluang dan risiko promosi kesehatan yaitu mencegah penyakit atau potensi masalah yang dapat ditunda (Nurarif, 2015). Evaluasi keperawatan individu dilakukan dengan penekanan pada pemeriksaan fisik dan keluhan pasien. Keluhan pasien dinilai melalui wawancara, sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi (Teli, 2018).

Pengkajian dilakukan pada tanggal 4 Juli 2022, pada bayi M ditemukan bayi tampak lemah, tampak adanya pernapasan cuping hidung, mukosa bibir tampak kering, tampak terpasang OGT dan CPAP dengan flow 8 liter per menit, nampak adanya retraksi dada, CRT <3 detik dan tampak terpasang terapi Asering di ekstremitas kanan atas. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu nadi 170x/menit, pernapasan 62x/menit, SpO<sub>2</sub> 93%, suhu 37,9°C dan berat badan saat ini 1500 gram.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap hasil pengkajian, tanda dan gejala yang ada pada bayi M telah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Idayanti *et al* (2022) yang menyebutkan manifestasi klinik dari RDN adalah pernapasan cepat atau dispnea, frekuensi pernapasan lebih dari 60x/menit, adanya retraksi interkosta, terdapat sianosis, terdapat suara napas tambahan

dan terjadi takikardi dengan nadi lebih dari 160x/menit. Menurut analisis peneliti, salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab pasien mengalami RDN adalah pasien lahir dengan berat badan rendah, dimana pasien lahir dengan berat badan 1500 gram hal tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam buku Idayanti *et,al* (2022) bahwa bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gr seringkali cenderung berisiko mengalami RDN dikarenakan kondisi paru-paru yang tidak mampu memproduksi surfaktan untuk memenuhi kebutuhan.

Selanjutnya pada pengkajian sistem integument, ditemukan bahwa pada bayi M tubuhnya teraba hangat dan memiliki suhu tubuh di atas normal, yaitu 37,9°C dan. Menurut pendapat peneliti kondisi pasien sesuai dengan teori Surasmi dalam Setiyawan *et,al* (2019) bahwa ketidakstabilan suhu pada BBLR terjadi karena cadangan lemak di bawah kulit tipis, pusat pengatur panas di otak belum matang, rasio luas permukaan terhadap berat badan yang besar dan produksi panas berkurang akibat lemak coklat yang tidak memadai serta ketidakmampuan untuk menggigil.

Pada pengkajian nutrisi sendiri, ditemukan data BBL 1500 gram dan BBS 1500 gram, pasien terpasang OGT, refleks isap bayi ada namun tidak bertahan lama, reflex menelan bayi ada namun tidak lama juga. Menurut peneliti, kondisi tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Santoso (2022) bahwa bayi dengan BBLR atau BBLSR belum mampu menyerap nutrisi dengan baik, metabolisme yang belum matang dan jalur penyerapan yang belum sempurna.

Sehingga menurut beberapa penelitian, kesimpulan peneliti mengenai keluhan subyektif dan obyektif yang terjadi pada pasien RDN sesuai dengan

teori dan fakta. Kesimpulan yang didapat dari data pengkajian pada pasien hampir keseluruhan sesuai dengan teori.

### **1.1.2. Analisis Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon klien terhadap proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung maupun masalah kesehatan aktual maupun potensial (PPNI, 2017).

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 3 diagnosis keperawatan yang ditegakkan pada pasien, yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, defscit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dan resiko termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan peningkatan kebutuhan oksigen

#### **1. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas**

Kedua pasien mengalami distress pernapasan dengan masalah utama pola nafas tidak efektif. Pada pasien dengan RDN sesak nafas merupakan penciri utama. Hal ini terjadi karena kondisi paru-paru yang belum matang khususnya sistem sintesis surfaktan. Surfaktan ini berfungsi melapisi permukaan alveolar untuk menurunkan tegangan permukaan dan untuk mencegah kolaps alveolar.

Diagnosis keperawatan yang ditegakkan oleh peneliti adalah pola nafas tidak. Hal ini sejalan dengan pendapat Alfiah *et.al* (2022) bahwa masalah yang sering timbul pada pasien dengan RDN adalah gangguan pernafasan, gejalanya berupa sesak nafas dengan frekuensi pernafasan lebih dari 60 kali permenit, adanya sianosis, sering kali terdengar suara rintihan dan pada saat inspirasi ditemukan kelainan otot-otot pernapasan. Menurut analisis peneliti terdapat kesesuaian antara teori dan studi kasus, dimana diagnosis keperawatan pada



pasien adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas.

2. Risiko termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan peningkatan kebutuhan oksigen

Dalam buku SDKI (2017) pada diagnosis keperawatan termoregulasi tidak efektif, tanda dan gejala dari data objektif yaitu kulit teraba dingin/hangat, menggigil, suhu tubuh fluktuatif, piloereksi, pengisian kapiler >3 detik, pucat, frekuensi napas meningkat, takikardi, kejang, kulit kemerahan dan dasar kuku sianotik. Berdasarkan data pengkajian ditemukan tubuh pasien teraba hangat, suhu tubuh diatas rentang nilai normal (36,5°C-37,5°C) dan tidak teratur.

Menurut analisis peneliti, penegakan masalah pada studi kasus dan teori telah sesuai.

3. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme

Defisit nutrisi yang terjadi pada pasien disebabkan berat badan bayi saat lahir 1500 gr dan termasuk berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi dengan BBLR mempunyai kemampuan penyediaan nutrisi yang terbatas, metabolisme yang belum matang, jalur penyerapan yang belum sempurna dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan belum matangnya proses perkembangan fungsi oromotor sehingga berisiko terjadinya kekurangan gizi (Santoso, 2022)

Menurut analisis peneliti terdapat kesesuaian antara teori dan kondisi pasien studi kasus ini, dimana pasien masih berusia 7 hari lahir dengan dengan 1500 gr dan BBS 1500 gr.

### **1.1.3. Analisis Intervensi Keperawatan**

Perencanaan keperawatan pada pasien disusun menggunakan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia dimana perencanaan ini baru dapat disusun apabila data yang telah terkumpul sudah dianalisis dan diprioritaskan. Perencanaan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan pasien dengan tahap tindakan dimulai dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.

Berdasarkan buku SIKI (2018) intervensi yang dapat dilakukan pada pasien dengan diagnosis keperawatan pola nafas tidak efektif yaitu pemantauan respirasi. Tujuan pemberian asuhan keperawatan berdasarkan SLKI (2018) diharapkan masalah pola nafas tidak efektif dapat teratasi dengan kriteria hasil ventilasi semenit meningkat, tekanan inspirasi meningkat, tekanan ekspirasi meningkat, penggunaan oto bantu pernapasan menurun dan frekuensi pernapasan membaik.

Selanjutnya, untuk intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosis keperawatan termoregulasi tidak efektif berdasarkan buku SIKI (2018) adalah manajemen termoregulasi. Tujuan pemberian asuhan keperawatan berdasarkan SLKI (2018) yaitu diharapkan masalah termoregulasi tidak efektif teratasi dan termoregulasi neonates menurun dengan kriteria hasil suhu tubuh menurun, suhu kulit menurun dan frekuensi nadi menurun.

Diagnosis defisit nutrisi yang terjadi pada pasien dapat diberikan intervensi (SIKI, 2018) dengan manajemen nutrisi. Tujuan pemberian intervensi manajemen nutrisi ini (SLKI, 2018) diharapkan status nutrisi bayi dapat membaik dengan kriteria hasil porsi yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik dan frekuensi minum membaik.

#### 1.1.4. Analisis Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan selama tiga hari perawatan, tanggal 5-7 Juli 2022 diruang perawatan NICU RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan sesuai dengan masalah keperawatan yang ditemukan pada saat pengkajian.

Mengikut dari perencanaan yang telah dibuat, peneliti melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah pola napas tidak efektif berupa pemantauan respirasi dengan penambahan intervensi EBP, yaitu pengaturan posisi *quarter prone*. Implementasi dilakukan dengan memonitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas, memonitor saturasi oksigen, mengatur posisi *quarter prone*, mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kebutuhan, mendokumentasikan dan menginformasikan hasil pemantauan, serta melakukan kolaborasi pemberian oksigen tambahan.

Observasi pada hari pertama nampak penggunaan otot bantu napas, terdapat retraksi dinding, frekuensi pernapasan 64x/menit dan saturasi oksigen 94%. Pasien kemudian diatur dalam posisi *quarter prone* selama dua jam dan dilakukan perhitungan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pasien dihitung pada menit ke 10, menit ke 20, menit ke 30, menit ke 60 dan menit ke 120 setelah pemberian posisi *quarter prone*.

Durasi pemberian dan waktu pemantauan posisi *quarter prone* sangatlah bervariasi, seperti penelitian yang dilakukan Rad *et al* (2020), bayi diatur dalam posisi *quarter prone* selama dua jam yang dipantau setiap 10 menit selama dan kemudian dilakukan reposisi. Dalam penelitian yang dilakukan Utario *et al*. (2017) dengan pengaturan posisi *quarter prone* selama

tiga jam dengan pengukuran saturasi oksigen, *respiratory rate*, dan *heart rate* dilakukan pada menit ke 30, 45, 60, 75 dan 90. Penelitian lain oleh Yin *et al.* (2016) dan Montgomery *et al* (2014) yang mengatur bayi pada posisi *quarter prone* dengan masing-masing durasi 4 dan 1 jam dengan waktu pemantauan setiap 30 menit.

Pada hari kedua, frekuensi pernapasan bayi M sebelum diberikan intervensi 59x/menit, lalu pasien diatur dalam posisi *quarter prone*. 10 menit setelah diberikan intervensi frekuensi napas 55x/ menit, 20 menit setelah intervensi frekuensi napas 54x/ menit, 30 menit setelah intervensi frekuensi napas 50x/ menit, 1 jam setelah pemberian intervensi frekuensi napas 49/ menit dan 2 jam setelah pemberian frekuensi menurun menjadi 46x/menit.

Pada hari ketiga, frekuensi pernapasan bayi M sebelum diberikan intervensi 51x/menit, lalu pasien diatur dalam posisi *quarter prone*. 10 menit setelah diberikan intervensi frekuensi napas 50x/ menit, 20 menit setelah intervensi frekuensi napas 48x/ menit, 30 menit setelah intervensi frekuensi napas 47x/ menit, 1 jam setelah pemberian intervensi frekuensi napas 45x/ menit dan 2 jam setelah pemberian frekuensi menurun menjadi 43x/menit.

Untuk diagnosis termoregulasi tidak efektif diberikan intervensi manajemen termoregulasi sesuai buku SIKI selama 3x24 jam mulai dari memonitor suhu bayi sampai stabil, memonitor tekanan darah, frekuensi pernapasan & nadi, meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, mengatur suhu inkubator sesuai kebutuhan dan melakukan kolaborasi pemberian antipiretik bila perlu.

Pemberian intervensi selama 3 hari menunjukkan adanya perubahan pada suhu tubuh pasien namun masih bersifat fluktuatif. Bayi mempunyai mekanisme sendiri dalam merespon ketidakstabilan suhu tubuh, yaitu

jaringan lemak baik lemak putih ataupun lemak coklat. Kedua lemak ini berfungsi untuk membantu mengatur suhu tubuh bayi baik dengan kondisi hipotermi ataupun hipertermi (Maisyaroh, 2021).

Kemudian tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan deficit nutrisi yaitu mengidentifikasi status nutrisi, memonitor asupan makanan, memonitor berat badan, memberikan makanan kepada bayi dan mengubah posisi bayi. Asupan yang diberikan pada pasien berupa ASI 12 x 4 cc/ hari.

#### **1.1.5. Analisis Evaluasi Keperawatan**

Memberi pasien posisi tengkurap selama 3x24 jam terbukti dapat mengurangi frekuensi pernapasan, sesak, meningkatkan saturasi oksigen, memberikan efek nyaman pada bayi, membuat pola pernapasan tampak lebih stabil, dan membantu bayi tidur nyenyak. Berdasarkan temuan analisis peneliti evaluasi intervensi selama tiga hari, terjadi penurunan frekuensi pernafasan pada bayi RDN yang mengalami sesak nafas saat diletakkan pada posisi *quarter prone*.

#### **1.2. Analisis Intervensi EBP**

Dalam kasus pasien RDS dengan masalah pola nafas tidak efektif tindakan utama yang diberikan untuk menunjang kelangsungan hidup bayi adalah dengan pemberian terapi oksigen (NHS, 2018). Pemberian terapi oksigen dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satu metode pemberian terapi oksigen adalah dengan menggunakan *continuous positive airway pressure* (CPAP). Penggunaan CPAP dapat meningkatkan kepatenan paru-paru dan menstabilkan dinding dada, juga dapat meningkatkan sinkronisasi thoracoabdominal, mengurangi resistensi saluran pernapasan, meningkatkan

fungsi diafragma, menjaga suplai surfaktan, mencegah atelektasis, dan menurunkan risiko displasia bronkopulmonalis (Queensland, 2020).

Selain pemberian terapi oksigen, dilakukan pula beberapa tindakan keperawatan lainnya salah satunya dengan pengaturan posisi. Pengaturan posisi bayi adalah manuver terapeutik yang sederhana dan aman untuk diterapkan dengan manfaat yang cepat terlihat (Jagadeeswari & Sonita, 2020). Pengaturan posisi yang dilakukan adalah *quarter prone* atau posisi seperempat pronasi. Beberapa penelitian kini menunjukkan bahwa pengaturan posisi ini dapat digunakan untuk membantu mengurangi sesak pada bayi. Dalam mengatasi masalah pola nafas tidak efektif pada kasus, diberikan intervensi pengaturan posisi *quarter prone* pada pasien untuk melihat pengaruh dari *quarter prone* terhadap frekuensi pernapasan pasien.

Pelaksanaan intervensi yang dilakukan selama 3x24 jam menunjukkan adanya perbedaan pengaruh posisi *quarter prone* terhadap frekuensi pernafasan. Setelah pengaturan posisi *quarter prone* menunjukkan adanya pengurangan sesak dengan kriteria hasil frekuensi napas membaik, penggunaan otot bantu menurun, saturasi oksigen meningkat. Posisi ini menurunkan kompresi paru oleh jantung sehingga meningkatkan ventilasi pada lapang paru dan mengurangi risiko terjadinya apnea.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yin *et al.* (2016) yang melihat pengaruh posisi supinasi, lateral dan semi prone terhadap frekuensi pernapasan bayi, yang menunjukkan bayi yang tidur dalam posisi semi prone memiliki frekuensi pernafasan lebih stabil daripada posisi lateral. Selain itu frekuensi nafas yang stabil menjadi salah satu indikator dasar dalam peningkatan ventilasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Utario *et al.* (2017) menunjukkan posisi *quarter prone* efektif untuk meningkatkan status oksigenasi bayi dengan menggunakan CPAP. Dan hasil penelitian Lestari *et al.* (2018) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu adanya peningkatan saturasi oksigen setelah diberikan posisi *quarter turn from prone* pada bayi premature dengan RDN.

Pemberian posisi *quarter prone* ini menjadi tanggung jawab perawat untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi pasien. Seperti yang dijelaskan Henderson dalam teorinya bahwa manusia memiliki 14 kebutuhan dasar dimana kebutuhan fisiologi yang paling pertama adalah bernafas dengan normal (DeNisco, 2021). Pengaturan posisi ini membuat frekuensi pernafasan bayi lebih stabil yang kemudian akan melatih kemampuan bayi bernafas secara mandiri tanpa adanya alat bantu pernapasan. Dengan begitu, perawat sudah membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien akan bernafas dengan normal.

Bayi yang tidur dalam posisi *quarter prone* memiliki pengaruh gravitasi terbesar. Posisi ini mengubah efek gravitasi pada ventilasi dan perfusi dari atas ke bawah paru-paru. Karena area paru posterior memiliki distribusi ventilasi yang lebih besar daripada area paru anterior, dengan pemberian posisi *quarter prone* dapat memaksimalkan transfer ventilasi.

Posisi *quarter prone* mendukung prinsip konservasi energi, sehingga bayi dapat menghemat energi melalui posisi tidur fleksi, seperti dalam kandungan. Selain itu, posisi *quarter prone* dapat memberikan kenyamanan pada bayi (Utario *et al.* (2017)). Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 23 :

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ؕ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Terjemahnya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan". (Q.S. Ar Rum : 23)

Berdasarkan ayat diatas, kekuasaan dan kebesaran Allah telah dijelaskan secara rinci. Manusia tidur agar tubuh mereka beristirahat. Posisi *quarter prone* adalah posisi yang bisa dilakukan bayi saat tidur. Posisi *quarter prone* ini bermanfaat bagi bayi yang mengalami gangguan pernapasan, selain memberikan ketenangan dan kenyamanan saat tidur.

Didukung pula oleh penelitian Ginting & Nurhaeni (2021) yang mengukur efektivitas posisi semi tengkurap untuk kenyamanan pada anak dengan pneumonia, yang menunjukkan bahwa terapi dengan pemberian posisi semi prone memberikan efek kenyamanan pada anak dan juga dapat menurunkan frekuensi pernapasan pada anak dengan CPAP terpasang, selain itu anak tidak rewel dan tidur nyenyak jika diberikan posisi semi prone.

Penelitian lain dengan posisi *prone* yang dilakukan oleh Jagadeeswari & Soniya (2020) untuk melihat pola pernapasan pada bayi baru lahir mengatakan posisi *prone* juga membantu menjaga pola pernapasan, terutama saturasi oksigen dan membantu proses pemulihan neonatus dari penyakit pernapasan. Begitu pula penelitian yang dilakukan Rad *et al* (2020) yang membandingkan posisi *prone*, *lateral* dan *supine* meunjukkan bahwa pada bayi baru lahir premature, posisi *prone* ventilasi dan frekuensi pernapasan lebih stabil dibandingkan posisi telentang dan posisi lateral kiri.

Intervensi terapeutik untuk memberikan posisi *quarter prone* tidak bekerja sendirian; namun ada kerjasama dengan tenaga kesehatan lain, seperti



pemberian terapi oksigen melalui alat bantu pernapasan dan pemberian obat-obatan farmakologis untuk mengurangi sesak pada bayi.

### 1.3. Keterbatasan

Intervensi pemberian posisi *quarter prone* tidak dapat diberikan pada bayi dengan komplikasi kelainan jantung bawaan, hidrosefalus karena intervensi ini mengharuskan reposisi. Pemberian intervensi pada posisi *quarter prone* selanjutnya hanya dilakukan pada jadwal praktikum peneliti, sehingga tidak ada pemantauan lebih lanjut setelah shift peneliti selesai. Selain itu, intervensi pemberian posisi *quarter prone* bukanlah satu-satunya intervensi yang diberikan dalam kasus ini; intervensi lain yang diberikan, seperti bantuan pernapasan menggunakan ventilator, yang juga dibantu dengan pemberian obat-obatan farmakologis, sehingga pemberian posisi tengkurap bukan satu-satunya intervensi yang diberikan..



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

##### **6.1.1. Pengkajian Keperawatan**

Pada pengkajian ditemukan bahwa pasien mengalami sesak nafas dan suhu tubuh yang tidak stabil. Pengkajian pada kebutuhan nutrisi juga ditemukan bahwa pasien berisiko mengalami deficit nutrisi dengan BBL dan BBS masih sama.

##### **6.1.2. Diagnosis Keperawatan**

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 3 diagnosis keperawatan yang dapat ditegakkan, yaitu pola napas tidak efektif, deficit nutrisi dan risiko termoregulasi tidak efektif.

##### **6.1.3. Intervensi Keperawatan**

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan 3 diagnosis yang telah ditegakkan. Intervensi yang diberikan adalah pemantauan respirasi untuk masalah pola napas tidak efektif, manajemen termoregulasi untuk masalah terkait termoregulasi dan manajemen nutrisi untuk masalah deficit nutrisi.

##### **6.1.4. Implementasi Keperawatan**

Pelaksanaan implementasi dilakukan secara bersamaan pada kedua pasien selama tiga hari perawatan pada tanggal 5-7 Juli 2022 sesuai masalah dan intervensi yang telah disusun sebelumnya.

##### **6.1.5. Evaluasi keperawatan**

Setelah implementasi selama tiga hari, evaluasi pada pasien menunjukkan bahwa terjadi penurunan frekuensi pernapasan dan peningkatan pada saturasi oksigen.

#### **6.1.6. Intervensi EBPB**

Asuhan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang mengalami RDN dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi posisi *quarter prone* menunjukkan bahwa pemberian posisi ini mampu membuat frekuensi pernapasan jadi lebih stabil, meningkatkan saturasi oksigen dan memberikan kenyamanan pada bayi.

#### **6.2. Saran**

- 6.2.1.** Bagi institusi, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh posisi *quarter prone* terhadap status oksigenasi neonates.
- 6.2.2.** Bagi pelayanan keperawatan, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dapat diterapkan di ruang perawatan guna memperbaiki status oksigenasi pasien.




## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, K. U., Romadoni, S., & Rahmania, A. (2022). Pengaruh Posisi Pronasi Terhadap Saturasi Oksigen Pada Bayi Prematur: Literature Review. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 6(1), 8-16.
- Akbarian Rad, Z., Haghshenas Mojaveri, M., Hajiahmadi, M., Ghanbarpour, A., & Mirshahi, S. (2016). The effect of position on oxygen saturation and heart rate in very low birth weight neonates. *Caspian Journal of Pediatrics*, 2(2), 153-157.
- Apriliawaty, A. (2019). *The Effect Of Prone Position To Oxygen Aturations"Level And Respiratory Rate Among Infants Who Being Installed Mechanical Ventilation In NICU Koja Hospital*. 541–546.
- Atika, A. (2019). *Faktor Risiko Kejadian Respiratory Distress Newborn Di Neonatal Intensive Care Unit RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Badwan. A. & Eman. S. (2021). *Effectiveness of the Prone Position on Cardio-Respiratory Clinical Outcomes for the Neonates with Acute Respiratory Distress Syndrome* (Doctoral dissertation, جامعة النجاح الوطنية).
- Babaei, H., Pirkashani, L. M., & Soleimani, B. (2019). Comparison of the effect of supine and prone positions on physiological parameters of preterm infants under nasal continuous positive airway pressure (N-CPAP): a cross over clinical trial. *Cukurova Medical Journal*, 44(4), 1250-1255.
- Carey, S. (2021). *Date of Ratification: September 2021 Review due: September 2024 Registration No: NEO-ODN-2021-3 Approved by. NHS:East of England Neonatal Units*.
- deNisco, Susan M. (2021). *Advanced Practice Nursing: Essential Knowledge for Profession*. Burlington:Jones & Bartlet Learning.
- Dwiristyan. (2015). *Hubungan Usia Kehamilan dengan Kejadian RDS pada Neonatus di Ruang Perinatologi[Skripsi]*. Poltekkes Denpasar
- Ginting, N. B., & Nurhaeni, N. (2021). Posisi Semi Prone Dapat Memberikan Kenyamanan pada Anak dengan Pneumonia. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 3(1), 347-353.
- Ham, Maria F. & Meilania Saraswati. (2020). *Buku Ajar Patologi Dasar Robbins*. Singapore:Elsevier
- Idayanti, Titiek., Siti F.U., Widya A., Vera V. (2022). *Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia
- Jagadeeswari, J., & Soniya, R. (2020). Effectiveness of prone and supine position on respiratory pattern among neonates. *Drug Invention Today*, 13(7), 983-985.
- Lestari, P., Susmarini, D., & Awaludin, S. (2018). The Effect of Quarter Turn from Prone on Oxygen Saturation among Premature Babies with Respiratory Distress Syndrome. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 13(1), 38-43.
- Maharani, Deni Kartika. (2019). *Perbedaan Pengaruh Pemberian Posisi Supine dan Quarter Prone Terhadap Status Oksigenasi pada Bayi Prematur di*

- Ruang Neonatologi Rsud Dr Saiful Anwar Malang [Skripsi]*. Universitas Brawijaya Malang
- Maisyaroh, U. (2021). *Identifikasi Perubahan Suhu Tubuh Neonatus Dengan Perlakuan Imd Dan Perawatan Dalam Inkubator: Literatur Review* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Map, N.L. (2021). *Introduction to Nursing Theory*. Diakses dari <https://nursinglicensemap.com/resources/nursing-theories/>
- NHS. (2018). *Newborn Respiratory Distress Syndrome*. Diakses dari National Health Service (NHS). <https://www.nhs.uk/conditions/neonatal-respiratory-distress-syndrome/>
- Nur, F. M., & Muamar, M. R. (2020). Sistem Pernafasan.
- Queensland. (2020). *Guideline Respiratory Distress and CPAP*. Diakses dari [https://www.health.qld.gov.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0012/141150/g-cpap.pdf](https://www.health.qld.gov.au/_data/assets/pdf_file/0012/141150/g-cpap.pdf)
- Rakerkesnas. 2019 .[www.kesmas.kemkes.go.id](http://www.kesmas.kemkes.go.id)
- Rogayyah. (2016). *Faktor-FaktoR Yang Berhubungan Dengan Kejadian Respiratory Distress Syndrome Pada Neonatus Di Rumah Sakit Umum Daerah H Palembang Bar I Period E 2013-2014 [Skripsi]*. Universitas Muhammadiyah Palembang. \
- Santoso, H. (2022). *Asuhan Keperawatan Pada Bayi Ny. Mn. Bblr Dengan Hipotermi Dengan Penerapan Perawatan Metode Kanguru [Skripsi]*. Universitas Aufo Royhan
- Sara, S., Nizami, N. H., & Harahap, I. M. (2022). Penerapan Posisi Quarter Prone Pada Bayi dengan Respiratory Distress Syndrome: Suatu Studi Kasus. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan, 1*(1).
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta : PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2019. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta : PPNI
- Utario, Y., Rustina, Y., & Waluyanti, F. T. (2017). The quarter prone position increases oxygen saturation in premature infants using continuous positive airway pressure. *Comprehensive Child and Adolescent Nursing, 40*(sup1), 95-101.
- WHO. (2015). *Newborn Health*. Diakses dari World Health Organization: <https://www.who.int/health-topics/newborn-health>
- Yin, T., Yuh, Y. S., Liaw, J. J., Chen, Y. Y., & Wang, K. W. K. (2016). Semi-prone position can influence variability in respiratory rate of premature infants using nasal CPAP. *Journal of Pediatric Nursing, 31*(2), e167-e174.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pathway



## Lampiran 2 : Jurnal Rujukan Utama

*Jurnal Keperawatan Soedirman, Volume 13, No.1, March 2018*

### **QUARTER TURN FROM PRONE POSITION INCREASES OXYGEN SATURATION IN PREMATURE BABIES WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME**

**Puji Lestari<sup>1</sup>, Dian Susmarini<sup>2</sup>, Sidik Awaludin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Student of Nursing School, Health Sciences Faculty of Jenderal Soedirman University,  
Purwokerto, Indonesia

<sup>2</sup>Lecturer of Nursing School, Health Sciences Faculty of Jenderal Soedirman University,  
Purwokerto, Indonesia.

Corresponding author email address: susmarini@yahoo.com

#### **ABSTRACT**

The rate of death and illnesses on premature babies is mostly respiratory distress syndrome (RDS). Desaturated-period frequently occurs on premature babies with RDS. One intervention to prevent it is a quarter turn from prone position. The research design was pre-experimental study with one group pre- and post-test design. This study involved 20 respondents that were selected with consecutive sampling technique. The setting of the research was in Perinatology ward at Prof. Dr. Margono Soekarjo. The oxygen saturation was examined before and after 2 hours of intervention. Data was then analyzed with *Wilcoxon test*. The results showed that median value of SpO<sub>2</sub> before quarter turn from prone position was 94%, and its value after two hours of intervention was 96.5%. It was found that there was a significant effect in giving quarter turn from prone position to oxygen saturation on premature babies with RDS. Quarter turn from prone position was able to increase oxygen saturation on premature babies with RDS and is possible to be implemented in perinatology room.

*Keywords:* premature babies, RDS, oxygen saturation, quarter turn from prone position

#### **ABSTRAK**

*Penyebab terbesar kematian neonatus adalah kelahiran prematur yaitu mencapai angka 35,2%. Angka kematian dan kesakitan pada bayi prematur paling banyak disebabkan oleh respiratory distress syndrome (RDS). Periode desaturasi sering terjadi pada bayi prematur dengan RDS, salah satu penatalaksanaannya yaitu pemberian posisi quarter turn from prone. Desain penelitian menggunakan pra eksperimen, one group pre and post test design. Penelitian ini melibatkan 20 responden yang diambil menggunakan teknik*

### Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



Penulis karya tulis ilmiah yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Respiratory Distress Syndrom* dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Posisi *Quarter Prone* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo" bernama Sitti Aisyah A, NIM 70900121031, yang merupakan putri ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Ayah H. Muh. Adam dan Ibu H. Kasmawati.

Penulis memulai pendidikan formal pada Sekolah Dasar negeri 5 Tanru Tedong di Kecamatan Duapitue, Sidrap pada tahun 2005-2011. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI 1 Tamalate Makassar pada tahun 2011-2014, kemudian berlanjut ke Sekolah Menengah Kejuruan Gunung Sari 2 Makassar dengan Jurusan Keperawatan pada tahun 2014-2017. Penulis kemudian melangkah ke jenjang perguruan tinggi dan memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan kembali memilih Jurusan Keperawatan yang, Alhamdulillah, menyelesaikan studi selama 4 tahun pada tahun 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



## Lampiran 4 : Hasil Uji Turnitin

Aisyah 2/1/23

---

ORIGINALITY REPORT

---

<b>24%</b>	<b>21%</b>	<b>2%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>15%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<b>5%</b>
<b>3</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repository.poltekkes-kaltim.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.unimugo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>jim.unsyiah.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>perawatqonaah.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Pakuan</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>journal.umpo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

---

**Lampiran 5 : Dokumentasi**



Pemberian posisi *quarter prone* pada Bayi M