

**PEMANTAUAN INTERVENSI PEMERIKSAAN KADAR GLUKOSA DARAH
SEWAKTU (GDS) DENGAN MASALAH KETIDAKSTABILANKADAR
GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS DI RUANG
ICU RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Oleh


SRI ASTUTI, S.Kep

NIM: 70900121018

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN
ALUDDIN MAKASSAR**

2023

**PEMANTAUAN INTERVENSI PEMERIKSAAN KADAR GLUKOSA DARAH
SEWAKTU (GDS) DENGAN MASALAH KETIDAKSTABILAN KADAR
GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS DI RUANG
ICU RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

SRI ASTUTI, S.Kep

NIM: 70900121018

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN
ALUDDIN MAKASSAR**

2023

KATA PENGANTAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Astuti, S.Kep
NIM : 70900121018
Tempat/Tgl. Lahir : Bima 07 Juli 1998
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Keperawatan/Profesi Ners/KMB
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Raya, Kel. Nitu, Kec Raba, Kota Bima
Judul : Pemantauan Intervensi Pemeriksaan kadar glukosa Darah Sewaktu (GDS) dengan masalah Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang Icu Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 02 Desember 2022

Penyusun

Sri Astuti, S.Kep

NIM: 70900121018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara (i) Sri Astuti, S.Kep NIM: 70900121018, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Pemantauan Intervensi Pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu (GDS) dengan masalah Ketidakstabilan Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang ICU Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar." memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 2 Desember 2022



Ahmad J, S.Kep, Ns, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Pembimbing I



Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep, NS., M.Ke







Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Pemantauan Intervensi Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) dengan Masalah Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Di Runag ICU RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar”, yang disusun oleh Sri Astuti, NIM: 70900121018, mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar keperawatan yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 06 Januari 2023, bertepatan dengan 30 Jumadil Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ners dalam Program Studi Profesi Ners.


Gowa, 6 Januari 2023 M
30 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	()
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	()
Munaqisy I	: Wahdaniah, S.Kep., Ns., M.Kes	()
Munaqisy II	: DR. Wahyudin G, M.Ag	()
Pembimbing I	: Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.MB	()
Pembimbing II	: Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep	()

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar




Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 00

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, hidayat serta inayah-nya sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul “Pemantauan Intervensi Pemeriksaan kadar glukosa Darah Sewaktu (GDS) dengan masalah Ketidakstabilan Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang Icu Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar” dapat diselesaikan. Tak lupa kita kirimkan shalawan serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw sebagai sosok teladan bagi seluruh umat.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022/2023 Tujuan hasil karya tulis ilmiah ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program profesi (Ners) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan terselesaikannya hasil karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda tercinta Usman dan Ibundaku Halimah atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini untuk meraih gelar profesi keperawatan. Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-

tingginya. semoga Allah swt. Memberikan pahala yang setimpal atas bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih peneliti kepada:.

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar, serta Prof. Dr. H Mardan M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Dr.H Wahyudin, M.Hum. sebagai Wakil Rektor bidang II dan Prof. Dr. Darussalam, M.Ag sebagai Wakil Rektor III, dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, sebagai Wakil Rektor IV.
2. Dr. dr.Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany., S.Si M.Si.,Apt. sebagai Wakil Dekan I, dan Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS sebagai Wakil Dekan II dan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M,Pd sebagai Wakil Dekan III.
3. Dr.Patima,S.Kep.,M.Kep sebagai Ketua Prodi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, serta seluruh staf prodi keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan karya tulis ini.
4. Ahmad J, ,S.Kep.,Ns., M.Kep, Sp.Kep MB sebagai Pembimbing I, dan Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep, NS., M.Kep sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan serta membimbing penulis dengan setulus hati sehingga KTI ini dapat terselesaikan.

5. Wahdaniah.,S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Penguji I, dan Dr. Wahyuddin G, M.Ag sebagai Penguji II, yang bersedia meluangkan waktu mengarahkan, memberikan masukan serta membimbing penulis.
6. Untuk teman-teman keperawatan angkatan 2017 (LEUKOS17), serta Ners 20 terimakasih telah berjuang bersama. Semoga keluar menjadi perawat yang berguna bagi agama nusa dan bangsa.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan penulis sadar bahwa KTI ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi perbaikan KTI ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis semoga dengan bantuan kalian berikan ini bernilai pahala di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Gowa, 13 September 2022

Penyusun

Sri Astuti, S.Kep

NIM: 70900121018

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	I
Halaman Sampul	I
Halaman Pernyataan Keaslian	II
Halaman Persetujuan	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VII
Halaman Abstrak (Indonesia)	IX
Halaman Abstrak (Inggris)	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Medis	11
2.2 Konsep Asuhan Keperawatan	23
2.3 <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1 Rancangan Studi Kasus	47
3.2 Subyek Studi Kasus.....	47
3.3 Fokus Studi Kasus	48
3.4 Instrumen Studi Kasus	48
3.5 Prosedur Pengambilan Data	48
3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi	49
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data	49

3.8 Etika Studi kasus	49
BAB IV LAPORAN KASUS	51
4.1 Asuhan Keperawatan.....	51
BAB V PEMBAHASAN	126
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan	132
5.2 Analisis Intervensi EBPN	155
BAB VI PENUTUP	164
6.1 Kesimpulan	164
6.2 Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN.....	170
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	175



ABSTRAK

Nama : Sri Astuti, S.Kep

NIM : 70900121018

Judul : Pemantauan Intervensi Pemeriksaan kadar glukosa Darah Sewaktu (GDS) Dengan Masalah Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang ICU Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Latar Belakang: Diabetes adalah penyakit menahun (kronis) yang merupakan gangguan metabolik ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi batas normal. Pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) merupakan parameter pemeriksaan kadar glukosa darah yang dapat diukur setiap saat tanpa memperhatikan waktu pasien terakhir kali makan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemantauan Intervensi Pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) dengan Masalah Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang ICU Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Metode** penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus merupakan satu pasien yang dalam keadaan Coma/tidak sadar diri yang mengalami kadar glukosa darah naik/turun dari rentang normal di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan intervensi manajemen hiperglikemia dengan melakukan pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS), lembar observasi dan dokumentasi prosedur tindakan pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) pada pasien. **Hasil** Pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) pada pasien dengan tehnik tanpa ditekan mampu mempertahankan kadar glukosa pada pasien ditandai dengan setelah diberikan intervensi pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu kadar glukosa pasien membaik, rasa haus yang keseringan, mulut kering, dan berkeringat menurun. **Kesimpulan** Pemberian Intervensi pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) pada pasien dengan tehnik tanpa ditekan/tanpa pemijatan efektif untuk mempertahankan Kadar glukosa darah.

Kata Kunci: Pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS), Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah dan Tehnik Tanpa ditekan/tanpa pemijatan.

ABSTRACT

Name : Sri Astuti, S.Kep

NIM : 70900121018

Title : Intervention Monitoring of Timed Blood Glucose Levels (GDS) with Blood Glucose Level Instability Problems in Diabetes Mellitus Patients in the ICU Room of Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Background: Diabetes is a chronic disease that is a metabolic disorder characterized by blood glucose levels that exceed normal limits. Timed blood glucose (GDS) examination is a blood glucose level examination parameter that can be measured at any time, regardless of when the patient last ate. **Objective:** The purpose of this study is to determine the efficacy of intervention monitoring of timely blood glucose examination (GDS) in diabetes mellitus patients with blood glucose level instability in RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar's ICU room. A case study of one patient at Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar who is in a coma or unconscious state and has blood glucose levels that are higher or lower than normal was used in this study. **The instruments** of this case study are in the form of a nursing care process format, Standard Operating Procedures (SOP), for carrying out hyperglycemia management interventions by checking blood glucose levels, observation sheets, and documentation of procedures for checking blood glucose levels in patients. **The results** of the examination of real-time blood glucose levels (GDS) in patients with techniques without being pressed are able to maintain glucose levels in patients characterized by after being given the intervention of real-time blood glucose examination the patient's glucose levels improved, frequent thirst, dry mouth, and sweating decreased. **Conclusion** Providing Interventions for checking blood glucose levels at the time (GDS) in patients with techniques without pressure or massage is effective for maintaining blood glucose levels.

Keywords: *Timely Blood Glucose Level Check (GDS), Blood Glucose Level Instability, and No Pressure/No Massaging Technique.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes adalah penyakit menahun (kronis) yang merupakan gangguan metabolik ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi batas normal (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu penyakit kronis kompleks yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula (glukosa) secara terus-menerus karena defisiensi insulin yang melibatkan metabolisme karbohidrat, protein dan lipid (Parliani, Wahyuni dan Ramadhaniyati, 2021). Hal ini disebabkan karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Insulin berfungsi sebagai alat yang membantu gula berpindah ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi (Elisa Oktaviana, et al., 2022). Diabetes melitus dapat diklasifikasikan menjadi tiga, salah satunya yaitu diabetes mellitus tipe 2 (Soelistijo, 2021). Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan glukosa darah (Suryati, 2021).

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa diabetes mellitus menyebabkan 1 juta kematian dengan kadar glukosa darah yang lebih tinggi dari batas maksimum mengakibatkan tambahan 2,2 juta kematian dengan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler dan lainnya. Penyakit tidak menular telah membunuh 41 juta orang setiap tahunnya yang setara dengan 71% kematian secara global (Khairani, 2019). Badan kesehatan Dunia (WHO) menyatakan setiap tahunnya lebih dari 15 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular pada rentang usia 30-69 tahun di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penyakit tidak menular seperti kardiovaskular juga menyumbang

kematian terbesar pertama di dunia mencapai 17.9 juta orang setiap tahunnya, diikuti kanker (9.3 juta orang), penyakit pernafasan (4,1 juta orang) dan diabetes (1,5 juta orang) (World Health Organization, 2021).

Saat ini Indonesia sedang melawan beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular (Kementerian Kesehatan RI, 2019b). Data Kementerian Kesehatan RI (2015-2019) menyatakan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia meningkat seperti kanker dari 1,4 per mil menjadi 1,8 per mil, Stroke pada penduduk umur ≥ 15 meningkat dari 7 per mil menjadi 10,9 per mil, ginjal kronis pada penduduk umur ≥ 15 meningkat dari 2,0 per mil menjadi 3,8 per mil, diabetes melitus pada penduduk umur ≥ 15 meningkat dari 6,9% menjadi 10,9%. Meningkatnya penyakit tidak menular pada masyarakat disebabkan karena proses urbanisasi diperkotaan yang tidak direncanakan secara cepat, gaya hidup yang tidak sehat (penggunaan tembakau, alkohol dan diet yang tepat) dan proses penua pada masyarakat (*World Health Organization, 2021*).

Salah satu jenis penyakit tidak menular dengan angka prevalensi yang tinggi adalah Diabetes Melitus (DM). Yang merupakan penyakit kronis akibat gangguan metabolisme menyebabkan tubuh tidak mampu mengendalikan peningkatan kadar glukosa darah sehingga kadarnya dalam tubuh melebihi normal. Klasifikasi DM terbagi menjadi 2 yakni DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 disebabkan oleh kelainan autoimun, sedangkan DM tipe 2 disebabkan oleh kurang responnya insulin terhadap kadar glukosa darah. Sekitar 90-95% dari pasien DM adalah DM tipe 2 dengan manifestasi klinis seperti peningkatan frekuensi urin (*polyuria*), peningkatan rasa haus (*polydipsia*), dan peningkatan masukan makanan dengan penurunan berat badan (*polyphagia*) (Irma, et al.,2020).

Diabetes mellitus tipe II merupakan Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien DM yang mengakibatkan tingginya kadar gula yang tidak terkontrol dapat

merusak beberapa sistem tubuh, seperti pembuluh darah jantung, ginjal, mata yang dapat mengakibatkan kebutaan, gagal ginjal, kerusakan saraf (stroke) hingga kematian, bahkan kematian penderita' DM berisiko dua kali lipat dibandingkan bukan penderita DM. (Nursyamsiah, 2017). Adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah merupakan gejala umum yang terjadi pada penderita diabetes mellitus. Karena itu, mengakibatkan berbagai komplikasi dalam tubuh, terutama pada pembuluh darah ke otak, jantung, perifer, sel saraf, mata, dan ginjal. (Black, J. M., & Hawks, J. H. 2014). Jika dibiarkan dapat menyebabkan berbagai komplikasi baik akut maupun kronis (Winardi, 2019).

Menurut International Diabetes Federation (IDF) Pada tahun 2015 diperkirakan bahwa angka kejadian DM di dunia estimasi kejadian DM sebesar 415 juta jiwa. Angka prevalensi di tiap Negara menunjukkan variasi yang berbeda dimana Pasifik Barat sebesar 153,2 juta jiwa menduduki peringkat tertinggi, disusul oleh Negara Eropa sebesar 59,8 juta jiwa, Amerika Utara dan Karibia 44,3 juta jiwa, Amerika Selatan dan Tengah 29,6 juta jiwa, Afrika 14,2 juta jiwa, Timur Tengah dan Afrika Utara 35,4 juta jiwa, dan 78,3 juta jiwa di Asia Tenggara (Irma et al., 2020).

Di Indonesia jumlah pasien diabetes mellitus di tahun 2019 menduduki peringkat ke-6 dalam 10 negara dengan jumlah pasien diabetes mellitus tertinggi dengan jumlah 10,7 juta kasus (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Pada tahun 2021 jumlah pasien diabetes mellitus mengalami kenaikan jumlah yaitu menjadi 19,46 juta pasien dengan diabetes mellitus dan diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah kasus di tahun 2030 dan 2045 (International Diabetes Federation (IDF), 2021). Jumlah pasien dengan diabetes di Indonesia mengalami peningkatan jumlah, di tahun 2013 berjumlah 1,3% dan mengalami peningkatan menjadi 1,74% di tahun 2018 (Riskesdas, 2019). Adanya

peningkatan kasus diabetes di Indonesia dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 sebanyak 2,1% jauh lebih besar dibandingkan tahun 2013 (1,1%) dari keseluruhan penduduk 250 juta jiwa yang menyebabkan Indonesia menduduki posisi ke tujuh dengan prevalensi tertinggi di dunia. Diabetes melitus di Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 sebanyak 6,9% dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 8,5% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memberitahukan prevalensi untuk penyakit tidak menular terjadi peningkatan dibandingkan Riskesdas 2013. Berdasarkan pemeriksaan GDS, prevalensi Diabetes Melitus diperoleh kenaikan dari 6,9% menjadi 8,5%. Angka kejadian penderita diabetes di Indonesia memiliki angka kejadian yang cukup tinggi dengan persentase sebesar 6,7% setelah stroke (21,1%) dan penyakit jantung koroner (12,9%). Ini merupakan penyebab kematian terbesar urutan ke 3 tertinggi (Dinas Kesehatan Sulsel, 2018).

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 8.690.294 orang (Kemenkes RI, 2017). Berdasarkan data Surveilans Penyakit tidak menular Bidang P2PL (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 terdapat Diabetes Melitus 27.470 kasus baru, 66.780 kasus lama dengan 747 kematian. Prevalensi diabetes di Sulawesi Selatan yang didiagnosis dokter sebesar 1,6 persen. Prevelensi gejala diabetes yang terdiagnosis dokter, tertinggi terdapat di Sulawesi tengah (3,7 %), Sulawesi Utara (3,6%), Sulawesi Selatan (3,4%) dan Nusa Tenggara Timur (3,3%) (Riskesdas, 2013). Kejadian diabetes melitus di Sulawesi Selatan masih menempati urutan kedua penyakit tidak menular setelah penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD) pada tahun 2017 yaitu 15,79. (Dinkes Sulsel 2018). Diabetes Melitus yang didiagnosis dokter atau berdasarkan gejala sebesar 3,4 persen. Prevalensi diabetes yang

didiagnosis dokter tertinggi terdapat di Kabupaten Pinrang (2,8%), Kota Makassar (2,5%), Kabupaten Toraja Utara (2,3%) dan Kota Palopo (2,1%). Prevalensi diabetes yang didiagnosis dokter atau berdasarkan gejala, tertinggi di Kabupaten Tana Toraja (6,1%), Kota Makassar (5,3%), Kabupaten Luwu (5,2%) dan Kabupaten Luwu Utara (4,0%) (Saenab Dasong, et al., 2020).

Diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu penyakit kronik yang ditandai adanya hiperglikemi sebagai akibat berkurangnya produksi insulin, ataupun gangguan aktivitas dari insulin ataupun keduanya (ADA, 2018). Hiperglikemia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah yang melebihi batas normal dan gangguan utilisasi glukosa di perifer. Hiperglikemia kronis menimbulkan mikroangiopati yang menyebabkan penebalan dan kekakuan pada pembuluh arteri, yang nantinya merusak endotelium vaskuler. Fungsi sel endotelium dapat menjadi berkurang misalnya produksi nitrit oksida (NO) yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas sel otot polos menjadi menurun dan menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi (Sundaru & Sukanto, 2014).

Hasil observasi dan wawancara secara langsung selama departemen keperawatan medikal bedah yang dilakukan selama praktek di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar terhadap peningkatan jumlah penyakit Diabetes melitus dengan glukosa dalam darah meningkat memasuki urutan Yang ke 5 besar dari penyakit lain dikarenakan setiap tahun Klien dengan penyakit Diambtes melitus selalu meningkat. Salah satu intervensi yang berdasarkan Evidence Based Nursing (EBN) yang telah diterapkan di ruangan ICU ialah pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu (GDS)

dengan tehnik tidak ditekan pada pasien diabetes mellitus sejalan dengan (Irma, et al., 2020) pasien yang dirawat dengan Tujuan utama pengendalian DM adalah kontrol gula darah dan salah satunya dengan pemeriksaan gula darah sewaktu yang tepat, baik berdasarkan keluhan maupun hasil pemeriksaan lanjutan sehingga diharapkan dapat menekan morbiditas dan mortalitas (RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar).

Pemeriksaan kadar glukosa darah merupakan salah satu pemeriksaan dalam labotarium klinik. (Wulandari, 2016). Kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) merupakan parameter pemeriksaan kadar gula darah yang dapat diukur setiap saat tanpa memperhatikan waktu pasien terakhir kali makan (Febby Valencia, et al., 2018). Gangguan kerja insulin (resistensi insulin) pada diabetes mellitus tipe 2 terjadi pada organ target terutama hati dan otot sefta terjadi kegagalan sel beta pankreas. Pada keadaan tersebut insülin tidak dapat bekeija secara optimal di sel otot, lemak dan hati sehingga memaksa pankreas mengkompensasi untuk memproduksi insülin lebih banyak. Ketika produksi insülin oleh sel beta pankreas tidak adekuat guna mengkompensasi peningkatan resistensi insülin, maka kadar glukosa darah akan meningkat, pada saatnya terjadilah hiperglikemia (Suryati, 2021b). Hiperglikemia merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika glukosa tidak dapat dikirimkan ke sel-sel karena kurangnya insülin. Penegakan diagnosis diabetes mellitus yang mengalami kenaikan kadar glukosa darah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah, dikatakan mengalami gula darah yang tinggi bila hasil pemeriksaan glukosa darah puasa yaitu dalam nilai 126 mg/dL, dua jam setelah makan ≥ 200 mg/dl dan glukosa darah sewaktu didapatkan hasil 200 mg/dL (Soelistijo, 2021).

Menurut penelitian (Amir, 2015). Dengan tujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah sewaktu pada pasien DMT2 di Puskesmas Bahu Kota Manado.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 22 responden, 11 (50%) memiliki rerata kadar glukosa darah yang buruk yaitu 267,8 mg/dL, 4 (18,2%) memiliki kadar glukosa darah yang sedang dengan rerata 153,2 mg/dL, dan 7 (31,8%) memiliki kadar glukosa darah yang baik dengan rerata 123 mg/dL. Serta Menurut penelitian (Selano et al., 2020) dengan melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) kepada masyarakat di Semarang. Hasil penelitian yang telah teridentifikasi 18 orang (13,84 %) memiliki gula darah sewaktu (GDS) > 180 mg/dl. Peningkatan kadar glukosa secara mendadak disebabkan karena beberapa hal yaitu dipengaruhi oleh stress, adanya infeksi, dan efek obat-obatan. Apabila hiperglikemia terjadi secara kontinyu, maka dapat mengakibatkan infeksi (PERKENI, 2019).

Menurut PPNI (2018) dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, tindakan yang dapat dilakukan pada pasien diabetes mellitus dengan ketidakstabilan glukosa darah adalah manajemen hiperglikemia. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan monitor kadar glukosa darah, monitor tanda dan gejala hiperglikemia (mis. poliuria, polydipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, sakit kepala), kolaborasi pemberian insulin. Penegakkan diagnosis diabetes mellitus (DM) memiliki gejala seperti bertambahnya berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, polifagia, poliuria, dan polydipsia. Keberhasilan suatu terapi tidak hanya ditentukan oleh pemilihan dan pemberian obat yang tepat, namun ketepatan diagnosa juga menjadi penentu keberhasilan serta pemeriksaan GDS (gula darah sewaktu) tidak menggunakan teknik ditekan (Irma, et al., 2020).

Menurut Pedoman Praktek Laboratorium yang Benar (*Good Laboratory Practice*), SOP pengambilan darah kapiler harus dilakukan dengan tusukan yang cukup dalam agar darah mudah keluar dan didapatkan darah yang cukup untuk pemeriksaan. Jari yang ditekan untuk mendapatkan cukup darah akan

mempengaruhi hasil pemeriksaan, karena darah yang dipaksakan keluar telah bercampur dengan cairan jaringan sehingga menjadi encer dan menyebabkan kesalahan dalam pemeriksaan (Nazhofatunnisa, et al., 2019).

Berdasarkan dari berbagai data yang dipaparkan tersebut dan permasalahan yang terkait maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus pemantuan intervensi pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu (GDS) dengan masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Intervensi Pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) dengan masalah Ketidakstabilan Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang Icu Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum :

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Intervensi Pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) dengan masalah Ketidakstabilan Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang Icu Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

1.3.2 Tujuan khusus:

Penelitian ini bertujuan untuk Penerapan Intervensi Pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) dengan masalah Ketidakstabilan Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang Icu Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

- 1.3.2.1 Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan Ketidakstabilan Glukosa Darah
- 1.3.2.2 Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan Ketidakstabilan Glukosa Darah
- 1.3.2.3 Untuk menganalisis intervensi keperawatan' pada pasien diabetes mellitus dengan Ketidakstabilan Glukosa Darah
- 1.3.2.4 Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan Ketidakstabilan Glukosa Darah
- 1.3.2.5 Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan Ketidakstabilan Glukosa Darah
- 1.3.2.6 Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan Ketidakstabilan Glukosa Darah

1.3.3 Manfaat Penelitian

1.3.3.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien diabetes melitus dengan Ketidakstabilan Glukosa Darah menggunakan intervensi pemerisaan gula darah sewaktu (GDS).

1.3.3.2 Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) tidak ditekan diarea jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Dan berfokus pada diagnosis pada pasien diabetes mellitus dengan masalah Ketidakstabilan Glukosa Darah menggunakan intervensi pemerisaan

Gula darah Sewaktu (GDS) pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Medis Diabetes Mellitus

2.1.1 Definisi

Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi baik ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Insulin adalah hormon yang mengatur gula darah. Hiperglikemia, atau peningkatan gula darah, adalah efek umum dari diabetes yang tidak terkontrol dan seiring waktu menyebabkan kerusakan serius pada banyak sistem tubuh, terutama saraf dan pembuluh darah (WHO, 2021).

Diabetes adalah penyakit yang menahun (kronis) berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal (kementerian republik Indonesia, 2020). Diabetes mellitus merupakan suatu kumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah (hiperglikemia) mengakibatkan rusaknya pada sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya (brunner & suddarth, 2018).

Diabetes mellitus adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar gula dalam darah. Diabetes mellitus terjadi karena adanya masalah dengan produksi hormone insulin oleh pancreas, baik hormone, itu tidak diproduksi dalam jumlah yang benar,

maupun tubuh tidak bisa menggunakan hormone insulin yang benar (Manurung, 2018).

Diabetes Melitus merupakan penyakit kronis yang umum terjadi pada usia dewasa yang membutuhkan supervisi medis berkelanjutan dan edukasi perawatan mandiri pada pasien (Dewi, 2021). Diabetes Melitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan Peningkatan gula darah dan disebabkan karena menurunnya jumlah insulin yang diproduksi pancreas (Isnaini, 2018).

Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolic yang ditandai dengan kenaikan gula darah (Suryati, 2021). Diabetes mellitus tipe II ini terjadi karena tubuh tidak memproduksi hormone insulin yang mencukupi atau karena insulin tidak dapat digunakan dengan baik (resistensi insulin). Resistensi insulin yang terjadi pada diabetes tipe 2 ditingkatkan oleh kemungkinan mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus dalam keluarga dan tidak beraktivitas (Manurung, 2018).

Hiperglikemi merupakan suatu kondisi medis berupa terjadinya peningkatan kadar glukosa darah melebihi batas kadar glukosa darah normal yang menjadi karakteristik beberapa penyakit terutama diabetes mellitus disamping kondisi medis lainnya (PPKENI, 2021).

Hiperglikemia merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika glukosa tidak dapat dikirimkan ke sel-sel karena kurangnya insulin. Seseorang yang mengalami hiperglikemia akan menunjukkan kondisi seperti pandangan kabur, merasa haus, muntah, berat badan yang menurun, kulit kering mengantuk

sampai kesadaran menurun disertai kekurangan cairan. Hiperglikemia merupakan kondisi yang terjadi apabila kadar glukosa dalam darah mengalami peningkatan, dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme berbahaya antara lain ketoasidosis diabetik dan koma hiperosmoler non ketokik (KHNK). (Ferawati, 2020).

2.1.2 Etiologi

Etiologi Menurut Tandra (2018) terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan Diabetes Melitus antara lain:

2.1.2.1 Keturunan

Riwayat keluarga dengan Diabetes Melitus tipe 2, akan mempunyai peluang menderita Diabetes Melitus sebesar 15 % dan resiko mengalami intoleransi glukosa yaitu ketidak mampuan dalam metabolisme karbohidrat secara normal sebesar 30 %. Faktor genetik dapat langsung mempengaruhi sel beta dan mengubah kemampuannya untuk mengenali dan menyebarkan rangsang sekretoris insulin.

2.1.2.2 Obesitas

Obesitas atau kegemukan yaitu kelebihan berat badan ≥ 20 % dari berat badan ideal atau BMI (Body Mass Index) ≥ 27 kg/m² kegemukan menyebabkan berkurangnya jumlah reseptor insulin yang dapat bekerja di dalam sel pada otot skeletal dan jaringan lemak

2.1.2.3 Usia

Faktor usia yang risiko menderita Diabetes Melitus tipe 2 adalah usia diatas 30 tahun, hal ini karena adanya perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia.

2.1.2.4 Tekanan darah

Seseorang memiliki tekanan hipertensi yaitu tekanan darah \geq 140/90 mmHg beresiko menderita Diabetes Melitus. Hipertensi yang tidak dikelola dengan baik akan mempercepat kerusakan pada ginjal dan kelainan kardiovaskuler.

2.1.2.5 Aktivitas fisik

Aktivitas fisik mengakibatkan kadar insulin semakin meningkat sehingga kadar gula dalam darah akan semakin berkurang. Pada orang yang jarang berolahraga, zat makanan yang masuk kedalam tubuh tidak dibakar tetapi ditimbun didalam tubuh sebagai lemak dan gula. Jika insulin tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi maka akan menimbulkan diabetes.

2.1.3 Klasifikasi

Klasifikasi Diabetes Melitus menurut Tandra (2018) sebagai berikut :

2.1.3.1 Diabetes Tipe 1

DM tipe 1 ditandai oleh destruksi sel beta pankreas, terbagi dalam dua sub tipe yaitu tipe 1A adalah diabetes yang diakibatkan oleh proses imunologi (immune-mediated diabetes) dan tipe 1B yaitu diabetes idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya. Diabetes 1A ditandai oleh destruksi autoimun sel beta. Diabetes tipe 1 merupakan gangguan katabolisme yang ditandai oleh

kekurangan insulin absolut, peningkatan glukosa darah, pemecahan lemak dan protein tubuh.

2.1.3.2 Diabetes Tipe 2

Dalam Diabetes Melitus tipe 2, jumlah insulin yang diproduksi oleh pankreas biasanya cukup untuk mencegah ketoasidosis tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh total. Sel beta pankreas masih dapat melakukan kompensasi bahkan sampai overkompensasi, insulin disekresi secara berlebihan sehingga terjadi kondisi hiperinsulinemia dengan tujuan normalisasi kadar glukosa darah. Mekanisme kompensasi yang terus menerus menyebabkan kelelahan sel beta pankreas, mengakibatkan produksi insulin yang menurun secara absolut. Kondisi retensi insulin diperberat oleh produksi insulin yang menurun akibatnya kadar glukosa darah semakin meningkat.

2.1.3.3 Diabetes Kehamilan

Diabetes kehamilan terjadi pada intoleransi glukosa yang diketahui selama kehamilan pertama. Gestational Diabetes merupakan keadaan pada wanita yang sebelumnya belum pernah didiagnosis diabetes kemudian menunjukkan kadar glukosa tinggi selama kehamilan.

2.1.3.4 Diabetes yang lain

Merupakan gangguan endokrin yang menimbulkan hiperglikemia akibat peningkatan produksi glukosa hati atau penurunan penggunaan glukosa oleh sel.

2.1.4 Patofisiologi

Diabetes Melitus tipe 2 adalah resistensi terhadap aktivitas insulin biologis, baik di hati maupun jaringan perifer. Keadaan ini disebut dengan resistensi insulin. Pasien Diabetes Melitus tipe 2 memiliki penurunan sensitivitas insulin terhadap kadar glukosa, yang mengakibatkan produksi glukosa darah tinggi. Hal itu sama dengan ketidakmampuan otot dan jaringan lemak untuk meningkatkan ambilan glukosa. Diabetes tipe II disebabkan oleh gabungan dari resistensi perifer terhadap kerja insulin dan respons sekresi insulin yang tidak adekuat oleh sel beta pankreas (defisiensi insulin relatif). Beberapa faktor diantaranya genetik, gaya hidup, dan diet yang mengarah pada obesitas merupakan faktor terjadinya kondisi tersebut. Resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin akan menyebabkan toleransi glukosa terganggu yang akan mengawali kondisi Diabetes Melitus tipe II dengan manifestasi hiperglikemia (Dewi, 2021).

2.1.5 Manifestasi klinis

Manifestasi Klinis Gejala Diabetes Melitus menurut Kemenkes RI (2019) sebagai berikut:

2.1.5.1 Meningkatkan buang air kecil (Poliuria)

Karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penyandang jadi lebih sering kencing dari pada orang normal.

2.1.5.2 Rasa haus berlebih (Polidipsi)

Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penyandang merasa haus dan membutuhkan banyak air untuk mengganti cairan yang hilang.

2.1.5.3 Penurunan berat badan.

Pada penyandang diabetes, hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel yang digunakan sebagai energi, sebagai gantinya tubuh mencari protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar.

2.1.5.4 Sering lapar

Rasa lapar berlebihan merupakan tanda diabetes lainnya. Ketika kadar gula darah menurun drastis, tubuh mengira belum mendapatkan makanan dan membutuhkan glukosa untuk sel

2.1.5.5 Masalah pada kulit

Kulit gatal, mungkin akibat kulit kering seringkali menjadi tanda peringatan diabetes, seperti itu juga kondisi kulit lainnya, misalnya kulit menjadi gelap di sekitar daerah leher atau ketiak.

2.1.5.6 Penyembuhan luka lambat

Lambatnya penyembuhan luka terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri.

2.1.5.7 Infeksi jamur.

Diabetes meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi, Jamur dan bakteri dapat tumbuh subur di lingkungan yang kaya akan gula.

2.1.5.8 Iritasi genitalia

Kandungan glukosa yang tinggi dalam urine membuat daerah genital jadi seperti sariawan dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan gatal.

2.1.5.9 Pandangan kabur

Pembuluh darah di retina menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia dan mikro-aneurisma, yang melepaskan protein berlemak yang disebut eksudat.

2.1.5.10 Kesemutan atau mati rasa

Kesemutan dan mati rasa ditangan dan kaki, bersamaan dengan rasa sakit yang membakar atau bengkak adalah tanda bahwa syaraf mengalami kerusakan karena diabetes

2.1.6 Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan Diabetes Melitus dapat dikelompokkan dalam lima pilar, yaitu edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani, intervensi farmakologis dan pemeriksaan gula darah (Suciana, 2019) :

2.1.6.1 Edukasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta motivasi bagi penyandang Diabetes Melitus, hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan DM secara holistic

2.1.6.2 Terapi Nutrisi, faktor yang berpengaruh pada respon glikemik makanan adalah cara memasak, proses penyiapan makanan dan bentuk makanan serta komposisi makanan (karbohidrat, lemak dan protein), yang dimaksud dengan karbohidrat adalah gula, tepung dan serat.

2.1.6.3 Latihan jasmani, latihan jasmani dapat dilakukan 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit secara teratur, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebugaran serta meningkatkan sensitivitas insulin

2.1.6.4 Terapi Farmakologis, terapi farmakologis ini diberikan ketika latihan jasmani dan pengaturan makan tidak menurunkan kadar gula darah.

2.1.6.5 Pemeriksaan gula darah, pemeriksaan laboratorium bagi penyandang DM diperlukan untuk menegakkan diagnosis serta memonitor terapi dan timbulnya komplikasi. Perkembangan penyakit bisa dimonitor dan dapat mencegah komplikasi

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang

Adapun pemeriksaan penunjang (padila, 2012) meliputi:

2.1.7.1 Glukosa darah sewaktu

2.1.7.2 Kadar glukosa darah puasa

2.1.7.3 Tes toleransi glukosa

Kadar darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring diagnosis DM

(mg/dl)

Kadar glukosa darah	Bukan DM	Belum pasti DM	DM
1. Plasma vena		100-200	
2. Darah kapiler	<100	80-200	
kadar glukosa darah	<80		>200

puasa			>200
3. Plasma vena	<110	110-120	
4. Darah kapiler	<90	90-110	>126 >110

Kriteria diagnostik WHO untuk diabetes militus sedikitnya 2 kali pemeriksaan:

- a. Glukosa plama sewaktu >200 mg/dl (11,1 mmol/L)
- b. Glukosa plama puasa >140 mg/dl (7,8 mmol/L)
- c. Glukosa plasma dari sampel yang di ambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gr karbohidrat (2 jam post prandial(pp))>200 mg/L

2.1.8 Komplikasi

Kompiliasi yang muncul akibat Diabetes Melitus antara lain (Yasmara, 2016):

- 2.1.8.1 Komplikasi akut, meliputi koma hipoglikemia, ketoasidosis dan koma Hiperglikemik Hiperosmolar Nonketotik (HHNK). Koma hipoglikemia terjadi akibat terapi insulin secara terus menerus, ketoasidosis terjadi akibat proses pemecahan lemak secara terus menerus yang menghasilkan produk sampingan berupa benda keton yang bersifat toksik bagi otak, sedangkan koma HHNK terjadi akibat hiperosmolaritas dan hiperglikemia yang menyebabkan hilangnya cairan dan elektrolit sehingga terjadi perubahan tingkat kesadaran.
- 2.1.8.2 Komplikasi kronik, ada dua meliputi makrovaskuler dan mikrovaskuler (mengenai pembuluh darah besar seperti pembuluh darah jantung, pembuluh darah tepi, dan pembuluh darah otak), mikrovaskuler (mengenai pembuluh darah kecil : retinopati

diabetik, nefropati diabetik, neuropati diabetik, rentan infeksi, dan kaki diabetik)

Dan sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:168 yang berbunyi sebagai berikut:


يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Menurut M. Quraish Shihab, Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Dan yang haram karena sesuatu yang bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. Sekali lagi perlu digaris bawahi, bahwa perintah ini ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman: Wahai orang-orang kafir, makanlah yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamakan halal dari empat macam: wajib, sunah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik (Shihab, 2016).

2.1.9 penyimpanan KDM



2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan Terkait

Dari kasus yang ditemukan maka terdapat penurunan kesadaran pada pasien yang mengalami diabetes mellitus sehingga pasien membutuhkan pemberian asuhan keperawatan secara total yang bertujuan meningkatkan kesehatan pasien, oleh karena itu kasus ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Watson mengenai teori *human care* atau sikap peduli yang di terapkan pada pasien yang membutuhkan kepedulian lebih karena tidak dapat menjalankan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan dirinya.

Dijelaskan dari teori Watson (2011) dalam *Theory of Human Care*, bahwa *caring* sebagai hubungan dan transaksi yang terbentuk antara pemberi dan juga penerima asuhan yang bertujuan agar meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia (*human being*). Proses realisasi *caring* terdiri atas komitmen dalam melindungi, meningkatkan dalam melindungi, meningkatkan dan memulihkan nilai humanitas dengan proses pengembalian martabat, keselarasan batin dan memfasilitasi penyembuhan. *Caring* sebagai pemberian perhatian, penghargaan kepada manusia. Di sisi lain, *caring* juga dapat diartikan sebagai pemberian bantuan kepada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Nursalam, 2017).

Teori *caring* yang dikemukakan oleh Jean Watson, mengatakan bahwa *caring* adalah suatu proses dalam pendekatan mengenai cara dan proses berfikir atau berperilaku. *Caring* bertujuan untuk memberikan asuhan keperawatan fisik, memperhatikan emosional dan meningkatkan rasa aman dan nyaman dari pasien (Watson, 2011). Keterkaitan antara teori *caring* dan kasus diabetes mellitus yang diteliti oleh penulis ialah pasien yang mengalami diabetes mellitus yang dirawat di ruang ICU, berapa dalam keadaan koma dan

tidak bisa memenuhi kebutuhannya, serta termasuk ke dalam pasien yang ketergantungan penuh kepada perawat (total care). Hal ini menyebabkan 'pentingnya dari teori *caring* untuk terus diaplikasikan kepada pasien ICU sebagai pemberian asuhan keperawatan professional agar pasien yang mengalami penurunan kesadaran tetap menjaga system imun dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan melakukan pemantauan pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS)

2.2.2 Pengkajian Keperawatan

2.2.2.1 Identitas pasien

Pada tahap ini perawat perlu mengetahui tentang nama, umur, jenis kelamin, alamat rumah, agama atau kepercayaan, suku bangsa, bahasa yang dipakai, status pendidikan dan pekerjaan pasien.

2.2.2.3 Keluhan utama

Keluhan utama merupakan faktor utama yang mendorong pasien mencari pertolongan atau berobat ke rumah sakit. Biasanya pada pasien dengan pneumothoraks didapatkan keluhan berupa sesak nafas, nyeri dada, Napas pendek dan cepat, Denyut jantung cepat, dan Batuk.

2.2.2.4 Riwayat penyakit sekarang

Pasien dengan pneumothoraks biasanya akan diawali dengan adanya tanda-tanda seperti sesak nafas, nyeri dada, Napas pendek dan cepat, Denyut jantung cepat, Batuk, Kelelahan, dan Sianosis. Perlu juga ditanyakan mulai kapan keluhan itu muncul. Apa tindakan yang telah dilakukan untuk menurunkan atau menghilangkan keluhan-keluhannya tersebut.

2.2.2.5 Riwayat penyakit dahulu

Tanyakan kepada pasien apakah pasien pernah menderita penyakit seperti TBC paru, pneumoni, gagal jantung, trauma, asites dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor predisposisi.

2.2.2.6 Riwayat penyakit keluarga

Perlu ditanyakan apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit-penyakit yang disinyalir sebagai penyebab pneumothoraks.

2.2.2.7 Pemeriksaan Fisik

1) Breathing (B1)

Pada pemeriksaan ini, hal yang sering ditemukan ialah : Adanya sesak napas, batuk, nyeri dada, terdapat retraksi dada, pengembangan paru yang tidak simetris, fremitus menurun dibandingkan dengan sisi yang lain, pada perkusi ditemukannya suara sonor/hipersonor/timpani, hemathorak"s redup. Pemeriksaan auskultasi ditemukan suara napas menurun, bising napas menghilang/berkurang, pekak dengan batas miring/tidak jelas, dyspnea pada saat aktivitas maupun istirahat, gerakan dada pada saat pernapasan tidak sama, takipnea, pergeseran edia sternum kea rah normal, terdapat ronkhi atau rales,suara napas menurun.

2) Blood (B2)

Pada pemeriksaan ini, ditemukan data berupa nyeri dada yang meningkat akibat pernapasan ataupun batuk, takikardi, lemah, pucat, Hb menurun/normal, hipotensi.

3) Brain (B3)

Pada pemeriksaan ini ditemukan, nyeri dada meningkat.

4) Bladder (B4)

Pada pemeriksaan ini, hal yang perlu diperhatikan ialah pengukuran volume output urine yang berhubungan dengan intake cairan, perawat harus memonitor tanda oliguria yang merupakan tanda awal dari syok.

5) Bowel (B5)

Pada pemeriksaan ini ditemukan data, pasien biasanya mengalami mual muntah, nafsu makan menurun, berat badan menurun.

6) Bone (B6)

Pada pemeriksaan ini, ditemuka data berupa terdapat trauma pada rusuk dada, terdapat kerusakan otot dan jaringan lunak pada dada sehingga meningkatkan risiko infeksi, pasien sering mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan sehari-ahri akibat adanya sesak napas, kelemahan, maupun kelelahan fisik secara umum.

1) Tingkat kesadaran penilaian Glasgow Coma Scale

Pengukuran	Respon	Skor
Eye (Respon membuka mata)	Spontan Membuka mata	4
	Membuka mata dengan perintah (suara, sentuhan)	3
	Membuka mata dengan rangsang nyeri.	2
	Tidak membuka mata dengan rangsang apapun	1
Verbal (Respon bicara)	Berorientasi baik	5
	Bingung , berbicara mengacau, disorientasi tempat dan waktu)	4
	Bisa membentuk kata tetapi tidak bisa membentuk Kalimat	3
	Bisa mengeluarkan suara tanpa arti (mengerang)	2
	Tidak bersuara	1
Motor (respon motorik)	Mengikuti perintah	6
	Melokalisir nyeri (menjangkau & menjauhkan stimulus saat diberi rangsang nyeri)	5

Withdraw (menghindar / menarik extremitas atau tubuh menjauhkan stimulus saat diberi rangsang nyeri)	4
Menjauhi rangsang nyeri	3
Extensi spontan	2
Tidak ada gerakan	1
Nilai Normal GCS	15

Tabel 1.1 Penilaian GCS

Tingkat kesadaran dapat dibedakan beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Composmentis (14-15), yaitu kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik.
- b. Apatis (12-13), yaitu kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya.
- c. Delirium (10-11), yaitu kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu dan tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi serta merontaronta.
- d. Somnolen (7-9) yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsang berhenti akan tertidur kembali.
- e. Sopor (5-6), yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam, namun masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang kuat, misalnya rangsang nyeri, tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik.
- f. Semi-coma (4) yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respons terhadap pertanyaan, tidak dapat dibangunkan sama sekali, respons terhadap rangsang nyeri hanya sedikit, tetapi refleks kornea dan pupil masih baik.

g. Coma (3), yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, memberikan respons terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan, dan tidak ada respons terhadap rangsang nyeri.

2) Fungsi motorik

Setiap ekstermitas diperiksa dan dinilai menggunakan skala berikut ini yang digunakan secara internasional:

Kekuatan otot

Respon	Skala
Kekuatan otot normal	5
Mampu melakukan gerakan normal tapi tidak dapat melawan tahanan maksimal pemeriksa.	4
Mampu melakukan gerakan mengangkat ekstremitas/badan tapi tidak bisa melawan tahanan sedang.	3
Mampu melakukan gerakan dua sendi atau lebih, dan tidak bisa melawan tahanan minimal.	2
Hanya dapat menggerakkan ujung jari.	1
Tidak mampu menggerakkan sama sekali.	0

Tabel 1.2 Penilaian Kekuatan Otot

Biasanya klien yang mengalami cedera kepala kekuatan ototnya berkisar antara 0 hingga 4 tergantung tingkat keparahan cedera kepala yang dialami klien.

h. Aspek neurologis

- 1) Kaji GCS
- 2) Disorientasi tempat/waktu
- 3) Reflek patologis dan fisiologis
- 4) Perubahan dari status mental
- 5) Nervus Cranial XII (sensasi, pola bicara yang abnormal).
- 6) Perubahan pupil/penglihatan kabur, diplopia, kehilangan dari sebagian lapang pandang

- 7) Perubahan dari tanda vital.
- 8) Gangguan pengecap dan penciuman
- 9) Penurunan kesadaran
 - a) Penurunan kesadaran
 - b) Gelisah letargi
 - c) Sakit kepala
 - d) Muntah proyektil
 - e) Pupil edema
 - f) Pelambatan nadi
 - g) Pelebaran tekanan dari nadi
 - h) Peningkatan tekanan darah sistole
- i. Aspek kardiovaskuler
 - 1) Perubahan tekanan darah.
 - 2) Denyut nadi
 - 3) TD yang naik, TIK yang naik
- j. Pemeriksaan fisik *head to toe*
 - 1) Kulit, perhatikan apakah warna kulit normal, adanya sianosis atau pucat, terdapat lesi, kelembaban dan turgor kulit.
 - 2) Kepala, perhatikan apakah terdapat benjolan, luka perdarahan, ataupun nyeri tekan
 - 3) Wajah, perhatikan kesimetrisan wajah
 - 4) Mata, perhatikan kondisi pupil apakah isokor atau tidak, diameter pupil, reflex cahaya

- 5) Telinga, telinga perhatikan bentuk, ukuran, kesimetrisan, warna, adanya serumen, tanda-tanda infeksi, palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak
- 6) Hidung, perhatikan bentuk, posisi, terdapat lendir, adanya sumbatan, lesi, perdarahan, pernapasan cuping hidung, dan nyeri tekan
- 7) Mulut, perhatikan warna bibir, mukosa, apakah ada stomatitis, kondisi palatum durum, tenggorokan, adanya secret, kesimetrisan bibir, serta tanda-tanda sianosis.
- 8) Dada, perhatikan kesimetrisan dada, apakah ada retraksi dada, bunyi napas tambahan, bunyi jantung tambahan seperti mur-mur, takipnea, dyspnea, peningkatan frekuensi pernapasan, kedalaman pernapasan., pada saat palpasi biasanya ditemukan fremitus menurun disbanding sisi yang lain, pada perkusi ditemukan suara redup atau pekak.
- 9) Abdomen, pada inspeksi ditemukan perut apakah tampak membesar atau tidak, pada palpasi apakah ada nyeri tekan, distensi, massa, auskultasi bising usus, perkusi seluruh kuadran abdomen apakah timpani.
- 10) Genetalia dan rectum, perhatikan apakah lubang anus ada atau tidak. pada laki-laki, inspeksi apakah ada edema skrotum atau hernia, serta perhatikan kebersihan preputium. Pada wanita, inspeksi kondisi labia dan klitoris apakah ada massa atau edema.
- 11) Ekstremitas, perhatikan kekuatan otot dan massa otot (Wilkinson, 2012).

2.2.3 Diagnosis Keperawatan

2.2.3.1 Ketidakstabilan glukosa darah b.d hiperglikemia

2.2.3.2.Obesitas b.d kurang aktivitas fisik harian

2.2.3.3 Gangguan integritas kulit/jaringan b.d berubahannya sirkulasi

2.2.3.4 Deficit perawatan diri b.d gangguan neuromuskuler

2.2.3.5 Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot

2.2.3.6 Deficit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi

2.2.3.7 Risiko infeksi b.d peningkatan paparan organisme patogen lingkungan.

2.2.3.8 Risiko jatuh b.d penurunan tingkat kesadaran



2.2.4 Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		
		Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1	Ketidakstabilan glukosa darah	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan kepada Tn. P selama 3X24 jam maka, perfusi perifer meningkat. Dengkriteria hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi kesadaran dari 5 turun 4 Berkeringat dari 2 ke 3 Mulut kering 2 ke 3 Kadar glukosa dalam darah dari 264 mg/dl menurun ke 144 mg/dl Kadar glukosa dalam urine dari cukup memburuk 2 menjadi sedang ke 3 	<p>Manajemen hiperglikemia (D. 1.03115)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia Identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin memingkat (misalnya, penyakit kekambuhasn) Monitor kadar glukosa darah, jika perlu Monitor tanda dan gejala hiperglikemia polyuria, polydipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, dan sakit kepala) Monitor intoke dan output cairan Monitor keton urin, kadat analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik dan frekuensi nadi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> Berikan cairan asupan oral Konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk Fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi 	<p>Manajemen hiperglikemia</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui penyebab hiperglikemia Untuk mengetahui situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin memingkat (misalnya, penyakit kekambuhasn) Untuk mengetahui cara memonitor kadar glukosa darah, jika perlu Untuk mengetahui Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia polyuria, polydipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, dan sakit kepala) Untuk mengetahui Memonitor intoke dan output cairan Untuk mengetahui Memonitor keton urin, kadat analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik dan frekuensi nadi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui cairan asupan oral yang diberikan Untuk mengetahui cara konsultasi dengan

			<p>oetostatik</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan menghindari olahraga jika kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl - anjurkan kadar glukosa darah secara mandiri - Anjurkan kepatuhan dalam diet dan olahraga - Ajarkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urine, jika perlu - Ajarkan pengelolaan diabetes (misalnya penggunaan imsuln, obat oral, monitor "....." asupan cairan pentingnya karbohidrat dan bantuan professional kesehatan) <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian insulin - Kolaborasi pemberian cairan IV - Kolaborasi pemberian kalium 	<p>medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui Fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi oetostatik <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui cara menghindari olahraga jika kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl - Untuk mengetahui kadar glukosa darah secara mandiri - Untuk mengetahui kepatuhan dalam diet dan olahraga - Untuk mengetahui indikasi dan pentingnya pengujian keton urine, jika perlu - Untuk mengetahui pengelolaan diabetes (misalnya penggunaan imsuln, obat oral, monitor asupan cairan pentingnya karbohidrat dan bantuan professional kesehatan) <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui pemberian insulin - Untuk mengetahui pemberian cairan IV - Untuk mengetahui pemberian kalium
--	--	--	---	--

2	<p>Perfusi perifer tidak efektif b.d hiperglikemia</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Tn. P selama 3x24 jam, diharapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edema perifer dari cukup meningkat ke 2 menjadi sedang ke 3 dan menurun menjadi 5 - kelmahan otot dari dari 1 ke 2 - turgo kulit dari cukup memburuk 2 menjadi sedang ke 3 - tekanan distolik sedang 3 menjadi cukup membaik ke 4 - tekanan darah diastolik dari sedang 3 menjadi cukup membaik ke 4 	<p>Perawatan sirkulasi (D. 1.02079)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edama, pengisian kapiler, warna, suhu ankie-brachial indek) - Indentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi) - Monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermitas <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi - Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi - Hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area cedera - Lakukan pencegahan infeksi - Lakukan perawatan kaki dan kuku - Lakukan hidrasi <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan berhenti merokok - Anjurkan berolahraga rutin 	<p>Perawatan sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui hasil pemeriksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edama, pengisian kapiler, warna, suhu ankie-brachial indek) - Mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi) - meMonitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermitas <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk mengetahui cara Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi - untuk mengetahui cara Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi - untuk mengetahui cara Hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area cedera - melakukan pencegahan infeksi - meLakukan perawatan kaki dan kuku - meLakukan hidrasi <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - menganjurkan berhenti merokok - menganjurkan berolahraga rutin
---	---	--	--	---

3	Obesitas b.d kurang aktivitas fisik harian	Setelah dilakukan intervensi keperawatan kepada Tn. P selama 3X24 jam maka, perfusi perifer meningkat. Dengankriteria hasil <ul style="list-style-type: none"> a. Berat badan dari 70 kg menjadi membaik ke 67 b. Tebal lipatan kulit membaik c. Infeks massa tubuh dari 18,36 menjadi membaik 17,36 	Manajemen berat badan (D. 1.03097) Obsevasi <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kondisi kesehatan pasien yang dapat mempengaruhi berat badan Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Hitung berat badan ideal - Hitung persentase lemak dan otot pasien - Fasilitasi menentukan target berat badan yang realistis Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan hubungan antara asupan makanan, aktivitas fisik, penambahan berat badan dan penurunan berat badan - Jelaskan faktor risiko berat badan lebih dan berat badan kurang - Anjurkan mencatat berat badan setiap minggu, jika perlu - Anjurkan melakukan pencatatan asupan makanan, aktivitas fisik, dan perubahan berat badan. 	Manajemen berat badan Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien yang dapat memepengaruhi berat badan Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui berat badan ideal - Untuk mengetahui persentase lemak dan otot pasien - Untuk mengetahui menentukan target berat badan yang realistis Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui cara asupan makanan yang baik, aktivitas fisik, penambahan berat badab dan penurunan berat badan - Untuk mengetahui faktor risiko berat badan dan berat badan yang kurang - Untuk mengetahui cara mencatat berat badan setiap minggu, jika perlu - Untuk mengatahui cara mencatatn asupan makanan, aktivitas fisik, dan perubahan berat badan
4	Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot	Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Tn.P selama 3x24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan Kriteria hasil : <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan ekstremitas dari 1 	Pengaturan posisi (D. 1.01019) Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi Trapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Atur posisi untuk mengurangi sesak 	Pengaturan Posisi Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui status oksigenasi dengan mengukur frekuesnsi pernapasan sebelum dansesudah mengubah posisi

		<p>ke 2 meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan otot 1 ke 2 meningkat - Rentang gerak (ROM) dari 1 ke 2 meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tinggikan tempat tidur bagian kepala - Berikan topangan pada area edema - Motivasi terlibat dalam perubahan posisi - Ubah posisi setiap 2 jam - Ubah posisi dengan teknik log roll <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasikan saat akan dilakukan perubahan posisi 	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mencegah sesak pada pasien - Posisi dapat membantu mengurangi sesak pada pasien - Untuk membantu menurunkan edema pada area yang mengalami edema - Untuk memberikan dukungan kepada pasien terlibat dalam gerakan - Untuk mencegah terjadinya ulkus pada tubuh bagian belakang pasien - Agar pasien mudah untuk dipindahkan <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan pasien agar mengetahui tindakan yang akan diberikan
5	Defisit perawatan diri b.d kesadaran menurun	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam pada Tn.P diharapkan perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan kebersihan diri cukup menurun ke 2 menjadi sedang ke 3 - Mempertahankan kebersihan mulut dari cukup menurun menjadi sedang ke 3 	<p>Dukungan perawatan diri (D. 1.11348)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tingkat kemandirian pasien - Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan yang terapeutik - Siapkan keperluan pribadi pasien - Dampingi dalam melakukan perawatan diri pasien - Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri - Jadwal rutin perawatan diri 	<p>Dukungan perawatan diri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui tingkat kemandirian pasien dalam melakukan perawatan diri - Untuk mengetahui kebutuhan alat bantu kebersihan diri <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menjaga privacy pasien - Untuk membantu menyiapkan kebutuhan pasien - Membantu pasien dalam melakukan perawatan diri - Untuk menjaga pasien agar tetap bersih

			<p>Perawatan Mulut (D. 11356)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kondisi umum (kesadaran, alat bantu napas, hemodinamik) - Identifikasi kondisi oral - Monitor kebersihan mulut, lidah dan gusi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilih sikat gigi sesuai dengan kondisi pasien - Dekatkan alat-alat dalam jangkauan untuk melakukan perawatan secara mandiri - Sikat gigi dari arah gusi kemasing-masing gigi atas dan bawah - Gunakan <i>suction</i> untuk menghisap cairan saliva dimulut pada pasien penurunan kesadaran - Gunakan cairan clorhixidine atau sesuai kebijakan - Gunakan benang untuk mengangkat plak yang tidak dapat di jangkau sikat gigi 	
6	gangguan integritas kulit/jaringan	Setelah dilakukan tindakan keperawatan yang dilakukan pada Tn.P selama 3x24 jam di harapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil : - Kerusakan jaringan menurun (dari 2 menurun ke 3)	<p>Perawatan luka tekan (D. 1.14566)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor kondisi luka <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersihkan kulit disekitar luka dengan sabun dan air - Bersihkan luka bagian dalam 	<p>Perawatan luka tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui kondisi luka <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui Bersihkannya kulit disekitar luka dengan sabun dan air - Untuk mengetahui Bersihkannya luka

		<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan lapisan kulit menurun - Kemerahan menurun - Suhu tubuh membaik 	<p>menggunakan Nacl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan pembalutan pada luka - Oleskan salep - Gunakan tempat tidur khusus - Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam 	<p>bagian dalam menggunakan Nacl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui cara melakukan pembalutan pada luka - Untuk mengetahui cara Oleskan salep - Untuk mengetahui Gunakannya tempat tidur khusus - Untuk mengetahui Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam
7	<p>Risiko ketidakseimbangan elektrolit b.d gangguan mekanisme regulasi (mis.diabetes)</p>	<p>setelah dilakukan intervensi keperawatan kepada Tn. P selama 3X24 jam maka, perfusi perifer meningkat. Dengan kriteria hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Serum matrium b. Serum kasiium c. klorida d. serum magnesius 	<p>Pemantauan elektrolit (D.1.03122) Obsevasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit - Monitor kadar elektrolit - Monitor tanda dan gejala hypokalemia (mis. Kelemahan) - Monitor tanda dan gejala hyperkalemia (mis. Peka rangsa, gelisah, takikardia, mengarah ke bradikardia) - Monitor tanda dan gejala hiponatremia (mis. Membra mukosa kering, penurunan kesadaran) <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atur interval waktu pemantauan sesuai dengasn kondisi pasien <p>Dokumentasi hasil pemantau Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 	<p>Pemantauan elektrolit Obsevasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengntahui penyebab ketidakseimbangan elektrolit - Untuk mengetahui cara memonitor kadar elektrolit - Untuk memngtahui cara Monitor tanda dan gejala hypokalemia (mis. Kelemahan) - Untuk mengetahui cara Monitor tanda dan gejala hyperkalemia (mis. Peka rangsa, gelisah, takikardia, mengarah ke bradikardia) - Untuk mengetahui cara Monitor tanda dan gejala hiponatremia (mis. Membra mukosa kering, penurunan kesadaran) <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui Atur interval waktu pemantauan sesuai dengasn kondisi pasien <p>Untuk mengetahui Dokumentasi hasil pemantau Edukasi</p>

			- Informasikan hasil pemantauam. jika perlu	- Untuk mengetahui tujuan dan prosedur pemantauan - Untuk mengetahui Informasikan hasil pemantauam. jika perlu
8	Risiko infeksi b.d efek prosedur invasif	Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Ny.N selama 3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil : - kebersihan tangan sedang ke 3 menjadi cukup meningkat ke 4 - kebersihan badan dari sedang ke 3 menjadi cukup meningkat ke 4 - bengkak dari cukup meningkat ke 2 menjadi sedang ke 3 - kemerahan dari cukup meningkat ke 2 menjadi sedang ke 3	Pencegahan Infeksi (D.1.14539) Observasi - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Terapeutik - Batasi jumlah pengunjung - Berikan perawatan kulit pada area edema - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien Edukasi - Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi	Observasi - Untuk mengetahui tanda dan gejala infeksi pada luka pasien Terapeutik - Untuk menghindari transmisi kuman dan bakteri - Untuk membersihkan dan merawat kulit sekitar luka - Untuk mencegah penularan infeksi Edukasi - Untuk mempercepat proses penyembuh luka
9	Risiko jatuh b.d penurunan tingkat kesadaran	setelah dilakukan intervensi keperawatan kepada Tn. P selama 3X24 jam maka, perfusi perifer meningkat. Dengan kriteria hasil Jatuh dari tempat tidur dari cukup meningkat ke 2 menjadi menurun kesedang 3	Pencegahan jatuh (D.1.14540) Obsevasi - Identifikasi faktor risiko Terapeutik - Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci - Pasang hendrall tempat tidur	Pencegahan jatuh Obsevasi - Untuk mengetahui faktor risiko jatuh Terapeutik - Untuk mengetahui roda tempat tidur selalu daalam kondisi yang aman - Untuk mengetahui cara pasang hendrall tempat tidur

2.1.10 Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan ialah proses pelaksanaan dari rencana atau intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan ini dimulai setelah rencana intervensi disusun dan menjadi tujuan pada *nursing order* untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan proses keperawatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, implementasi sebagai manifestasi pelaksanaan intervensi yang spesifik, dilakukan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan (Nursalam, 2017).

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Proses pelaksanaan implementasi keperawatan harus berpusat kepada kebutuhan pasien, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan keperawatan, strategi implementasi keperawatan dan kegiatan komunikasi (Dinarti, 2017).

2.1.11 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan. Dalam konteks ini, evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah ketika pasien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan pasien menuju pencapaian tujuan/hasil, dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan pada rencana keperawatan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan

mempengaruhi pencapaian tujuan, dan mengambil keputusan apakah rencana keperawatan diteruskan, modifikasi atau dihentikan.

Menurut Hidayat (2021), evaluasi keperawatan dapat dibagi menjadi:

2.1.1.1 Evaluasi formatif: hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon segera pada saat dan setelah dilakukannya tindakan keperawatan.

2.1.1.2 Evaluasi sumatif: rekapitulasi dan kesimpulan dari observasi dan analisa status kesehatan sesuai waktu pada tujuan ditulis pada catatan perkembangan

Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada pasien, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain (Nursalam, 2017).

Dalam mengevaluasi, perawat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami respon terhadap intervensi keperawatan, kemampuan menggambarkan kesimpulan tentang tujuan yang dicapai, serta kemampuan dalam menghubungkan tindakan keperawatan pada kriteria hasil.

Evaluasi keperawatan pada asuhan keperawatan diabetes melitus yaitu :

2.1.1 Ketidakstabilan glukosa darah

2.1.2 Perfusi perifer tidak efektif

2.1.3 Obesitas

2.1.4 Gangguan integritas kulit

2.1.5 Deficit perawatan diri

2.1.6 Gangguan mobilitas fisik

2.1.7 Risiko ketidakseimbangan elektrolit

2.1.8 Risiko infeksi

2.2 Evidence Based Practice In Nursing

2.3.1 Pengertian

Kadar glukosa darah sewaktu merupakan pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan setiap hari tanpa memperhatikan makan yang dimakan dan kondisi tubuh orang tersebut. Pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu adalah pemeriksaan gula darah yang dilakukan setiap waktu, tanpa ada syarat puasa atau makan. (Andreassen, 2017)

Pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu (GDS) atau *Blood sugar sometimes* (BSS) adalah pemeriksaan kadar glukosa pada darah pasien yang tidak puasa dan dapat dilakukan kapan saja. Pemeriksaan GDS sering dilakukan karena selain digunakan sebagai pemeriksaan penyaring (*screening*) diabetes, juga dilakukan rutin untuk memantau kadar glukosa darah pada pasien diabetes.

2.3.2 Tujuan

1. Untuk melihat kadar glukosa darah sesaat tanpa pertimbangan waktu setelah makan
2. Untuk mengetahui gula darah puasa, gula darah 2 jam PP.

2.3.3 Indikasi pasien yang dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS)

2.3.3.1 DM tipe I

2.3.3.2 DM tipe II

2.3.4 Kontraindikasi

2.3.4.1 Tidak terdapat luka pada jari-jari tangan dan kaki pada saat pemeriksaan Gula Darah sewaktu.

2.3.4.2 Menghindari dibagian tangan dan kaki yang bengkak.

2.3.5 Prosedur pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu (GDS)

a. Persiapan

1) Persiapan pasien

1) Pastikan identitas pasien

2) Kaji kondisi klien dan gula darah terakhir

3) Jelaskan pada klien atau keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan

4) Jaga privasi klien

b. Alat

1) Alat pemeriksaa gula darah digital

2) Gluko test strip

3) Lanset atau alat pendorong (lancing device)

4) Alkohol swab

5) Handscoen

6) Bengkok/tempat sampah

7) Lembar hasil pemeriksaan dan alat tulis

c. Prosedur

1) Tahap orientasi

- a) Berikan salam. Panggil klien dengan namanya.
- b) Jelaskan tujuan, prosedur dan lamanya tindakan pada klien/keluarga.

2) Tahap kerja

- Mengucapkan salam bassamalah dan membaca doa sebelum melakukan tindakan
- Berikan kesempatan klien bertanya atau melakukan sesuatu sebelum kegiatan dilakukan.
- Menanyakan keluhan utama klien
- Jaga privacy klien
- Atur posisi yang nyaman bagi klien
- Gunakan handcoen bersih
- Siapkan alat yang akan digunakan didekat perawat
- Pasang atau masukan reagen strip kedalam.
- Pilih jari yang akan ditusuk
- Ujung jari tangan yang akan ditusuk dan diambil darahnya dibersihkan dengan kapas alkohol dan dibiarkan sampai kering sendiri
- Tusuk dengan lancet steril ± 3 mm, darah dibiarkan keluar sendiri tanpa diperas

- Tetesan darah yang keluar disentuhkan pada Stick test reduksi persis pada garis merah yang telah disediakan
- Selanjutnya *stick test* reduksi dipasang secara tepat pada Glukometer dan tunggu beberapa saat sampai menunjukkan angka dari hasil pemeriksaan pada layar Glukometer
- Catat hasil pemeriksaan pada lembar dokumentasi

2.3.6 Artikel Utama Dan Pendukung

1) Artikel Utama

No	Judul	Population	Intervensi	Comparison	Outcome
1	Uji Sensitifitas dan Spesifisitas Keluhan Penderita Diabetes Melitus Berdasarkan Keluhan dan Hasil Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)	semua warga masyarakat yang ada di RW I Kelurahan Jagir yang berumur di atas 30 tahun dengan jumlah sampel sebanyak 74 orang yang diambil dengan non random	pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS)	ada pembanding	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi DM 9,5% dan nilai spesifitas dan sensitifitas keakuratan penegakkan diagnosis berdasarkan keluhan responden adalah 85,71% dengan keluhan yang paling sering dialami dan dirasakan adalah polidipsia dan poliuria. Simpulan penelitian adalah seseorang dengan DM akan cenderung memiliki keluhan berupa yang berupa polidipsia, polifagia, dan poliuria.

2) Artikel Pendukung :

NO	Judul	Population	intervensi	comparison	outcome
1	Pemeriksaan kadar glukosa Darah Untuk Mencegah Peningkatan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes	penderita Diabetes Mellitus, pengaturan tekanan darah dan pengukuran kadar gula darah.	pemeriksaan gula darah sewaktu dan pengukuran TTV	ada pembanding	pemeriksaan GDS sangat efektif dilakukan pada masyarakat yang menderita DM serta melakukan pemeriksaan tekanan darah dan Sebaiknya pemeriksaan kadar gula darah sewaktu dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah sedini mungkin penyakit tidak menular terutama

	Mellitus				bagi masyarakat yang berpotensi mengalami penyakit tersebut dan pada masyarakat yang telah menyandang Diabetes Mellitus dapat mengontrol kadar gula darahnya agar tetap dalam batas yang wajar agar tidak terjadi keluhan tanda dan gejala yang tidak diinginkan.
2	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) dan Tekanan Darah kepada Masyarakat	Diabetes melitus dan hipertensi	pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) dan tekanan darah kepada masyarakat	ada perbandingan	valuasi telah teridentifikasi 18 orang (13,84 %) memiliki gula darah sewaktu (GDS) > 180 mg/dl, sedangkan hasil pemeriksaan tekanan darah didapatkan 20 orang (15,38 %) memiliki tekanan darah > 120/80 MmHg
3	Pemeriksaan Glukosa DraH Pada Penderita Diabetes Melitus (Studi Fenomenologi)	penderita DM	pemeriksaan gula daraah sewaktu	tidak ada perbandingan	Hasil penelitian didapatkan sepuluh sub tema yang muncul yaitu: frekuensi, tempat, cara, waktu, jenis, prosedur, peralatan, hasil, interpretasi hasil, serta penjelasan hasil. Kategori tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan untuk pemantauan dan evaluasi <i>self-management</i> yang dilakukan oleh penderita DM.
4	Pengaruh Cara Pengambilan Darah Kapiler Terhadap Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Penderita Diabetes Melitus	Penderita DM	pemeriksaan GDS dengan tehnik tanpa pemijatan	tidak ada perbandingan	Hasil penelitian menunjukkan rerata kadar glukosa darah sewaktu tanpa pemijatan jari tangan kanan pada penderita diabetes melitus yaitu sebesar 303,1 mg/dL. Sedangkan rerata kadar glukosa darah sewaktu setelah pemijatan jari tangan kiri pada penderita diabetes melitus yaitu sebesar 284,4 mg/dL. Hasil uji <i>Mann Whitney</i> menunjukkan nilai $p = 0,290 > \alpha = 0,05$. Tidak ada pengaruh cara pengambilan darahkapiler terhadap kadar glukosa darah sewaktu pada penderita diabetes melitus.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan memberikan suatu gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dalam suatu kasus, atau dengan kata lain, studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci. Penelitian pada metode ini, dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis (Nursalam, 2016).

3.2 Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini ialah individu atau klien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

3.2.1 Kriteria inklusi

- a. pasien dengan diagnose medis diabetes mellitus
- b. usia 20-70 tahun, pasien yang mengalami kondisi penurunan kesadaran
- c. keluarganya bersedia menjadi responden .

3.2.2 kriteria eksklusinya

- a. pasien yang memiliki hemodinamik stabil (sistolik 90-130 MmHg)
- b. pasien yang mengalami kesadaran komposmentis.

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini ialah melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus yang mengalami Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah dengan melakukan pemeriksaan kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS).

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini ialah format proses asuhan keperawatan, SOP tindakan intervensi pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu (GDS), observasi serta dokumentasi pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu (GDS).

3.5 Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengambilan data pada penelitian ini meliputi :

3.5.1 Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus.

3.5.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode observasi dan wawancara langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana, data primer meliputi data yang diperoleh sendiri oleh peneliti melalui hasil pengukuran, pengamatan, survey dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini ialah data yang diperoleh melalui pihak lain yang secara rutin mengumpulkan data, seperti hasil lab, dan lain-lain.

3.5.3 Penyusunan laporan

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan buku panduan tugas akhir ners UIN Alauddin Makassar 2022.

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data

Tempat dilakukannya penelitian ini ialah ruang ICU RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 09.00 hingga 27 Agustus 2022. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 hari.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus ini disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta yang dituangkan dalam teks dan bersifat naratif.

3.8 Etika Studi Kasus

Prinsip umum etika yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah :

3.8.1 Informed Consent

Informed consent ialah suatu bentuk persetujuan antara peneliti dengan pasien. Informed consent yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pemberian tindakan, menjelaskan standar prosedur pelaksanaan tindakan, serta meminta persetujuan pasien untuk dijadikan responden pada penelitian.

3.8.2 Kerahasiaan (confidentiality)

Pada penelitian ini, peneliti memberikan jaminan kepada pasien untuk tetap menjaga privasi pasien dengan tidak mencantumkan nama melainkan hanya mencantumkan inisial dan rekam medik pasien.

3.8.3 Keadilan (Justice)

Pada penelitian ini, peneliti bersikap adil dalam memperlakukan pasien dan menjamin bahwa subjek yang dilakukan oleh peneliti juga memberikan keuntungan yang sama terhadap pasien.

3.8.4 Tidak merugikan (Non malaficience)

Pada penelitian ini, peneliti menjamin tidak melakukan intervensi yang justru akan memperburuk kondisi pasien.



BAB IV

HASIL LAPORAN KASUS

4.1 Asuhan Keperawatan

HARI/TANGGAL : Kamis, 25 agustus 2022

JAM PENGKAJIAN : 09: 00

PENGAJI : Sri Astuti

RUANG : ICU RSWS

I. IDENTITAS

A. PASIEN

Nama : Tn. P

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 70 tahun

Agama : Agama Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : PPNS/PENSIUNAN

Pendidikan terakhir : SLTA

Alamat : jln. Komp perumahan peg UNHAS NO. C1/15

No. CM : 990318

Diagnostik Medis : Diabetes Melitus

Tgl masuk RS : 18 agustus 2022

B. PENANGGUNG JAWAB

Nama : Tn. E

Umur : 44 tahun
Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS
Alamat : jln. Komp perumahan peg UNHAS NO. C1/15

II. RIWAYAT KEPERAWATAN

A. RIWAYAT KESEHATAN PASIEN

1. Riwayat Penyakit Sekarang

a. Keluhan utama

Kesadaran menurun

b. Kronologi penyakit saat ini

Keluarga klien mengatakan bahwa klien tiba-tiba mengalami kesadaran menurun pada saat istirahat dirumahnya bahwa klien awalnya memiliki penyakit jantung, keluarga klien mengatakan bahwa klien sudah 2 tahun terakhir mengalami penyakit diabetes mellitus dengan melakukan pengobatan Di RSUD wahidin Makassar. Keluarga lien juga mengatakan klien sering pusing, sering merasa lelah dan mengatuk 1 minggu terakhir, keluarga klien mengatakan klien sering merasa lapar dan haus.

c. Pengaruh penyakit terhadap pasien

Keluarga Klien mengatakan penyakit yang dialaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena pasien sudah tidak dapat melakukan apapun dan hanya di tempat tidur

d. Apa yang diharapkan pasien dari pelayanan kesehatan

Keluarga Keluarga berharap setelah menjalani perawatan disini semoga bisa sembuh dan beraktifitas kembali.

2. Riwayat Penyakit Masa Lalu

a. Penyakit masa anak – anak.

Keluarga Klien mengatakan tidak ada riwayat penyakit pada masa anak-anak.

b. Imunisasi

Keluarga Klien mengatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah imunisasinya ketika masa anak-anak lengkap atau tidak

c. Alergi

Keluarga klien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi apapun

d. Pengalaman sakit / dirawat sebelumnya

Keluarga klien mengatakan sebelumnya pernah di rawat di Rumah Sakit ini

e. Pengobatan terakhir.

Keluarga klien mengatakan selama dirawat di RSUP Wahidin Sudirohusodo banyak diberikan obat-obatan diantaranya, pemberian insulin

B. RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA

1. Genogram (minimal 3 generasi)

a. Dengan siapa klien tinggal dan berapa jumlah keluarga?


Tinggal bersama anak dengan istri dengan jumlah keluarga dalam rumah 4

b. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa?

Keluarga klien mengatakan hanya klien yang mengalami penyakit ini di keluarganya

c. Apakah ada keluarga yang mempunyai penyakit menular atau menurun?

Keluarga mengatakan tidak memiliki penyakit penular.



Keterangan :

<input type="checkbox"/>	: Laki-laki	<input checked="" type="checkbox"/>	: Meninggal	_____	: Garis keturunan
<input type="radio"/>	: Perempuan	_____	: Garis pernikahan	?	: Umur tidak diketahui
↗	: Klien	-----	: Tinggal bersama		

G1: Kakek dan nenek klien telah meninggal akibat faktor usia

G2: Ayah dan ibu klien sudah meninggal akibat faktor usia

G3: klien anak ke tiga dari 4 bersaudara, tinggal serumah dengan istrinya dan anak yang ke 3 dan saat ini pasien dirawat RSWS di ruang ICU dengan diagnose Diabetes mellitus.

C. PENGKAJIAN BIOLOGIS**1. RASA AMAN DAN NYAMAN**

a. **Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana ? jelaskan secara rinci:**

No	Parameter	Skor
1	Fase (wajah) <ul style="list-style-type: none"> • Tenang/rileks • Mengerutkan alis • Kelopak mata tertutup • Meringis 	1 2 3 4
2	Anggota badan sebelah atas <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pergerakan • Sebagian di tekuk • Sepenuhnya ditekuk dengan refleks jari-jari • Refleks permanen 	1 2 3 4
3	Ventilasi <ul style="list-style-type: none"> • Pergerakan dapat ditoleransi • Batuk dengan pergerakan • Melawan ventilator • Tidak dapat mengontrol dengan ventilator 	1 2 3 4

Total skor skala nyeri menggunakan pengukuran BPS yaitu 4 (skala ringan)

b. Apakah mengganggu aktifitas?

Keluarga klien mengatakan sangat terganggu karena karena pasien secara tiba-tiba tidak dapat melakukan aktifitas

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi / menghilangkan nyeri?

Tampak klien tidur terus

d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif?

Tampak klien tidak dapat melakukan apa-apa

e. Apakah ada riwayat pembedahan?

Perawat mengatakan bahwa pasien post operasi tracheostomi hari pertama

2. AKTIFITAS ISTIRAHAT – TIDUR

a. AKTIFITAS

1) Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR?

Sebelum dirawat di RS, keluarga klien mengatakan sering berjalan kaki di sekitar rumah usai menunaikan salat subuh pada pagi hari dan setelah salat asar pada sore hari sekitar 20 menit dan dilakukan setiap hari. Keluarga klien juga mengatakan sering berjalan kaki ke lapangan unhas yang dekat dari rumahnya untuk mengisi waktu kekosongan di pagi hari. Saat ini klien di rawat di RS dengan beberapa diagnose medis yaitu diabetes melitus yang menjadi kendala klien belum bisa menjalani aktivitas seperti biasanya.

2) Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas?

Keluarga klien mengatakan klien tidak pernah menggunakan alat bantu

3) Apakah ada gangguan aktifitas?

Keluarga klien mengatakan sebelum sakit klien tidak ada gangguan aktifitas.

4) Berapa lama melakukan kegiatan sehari? Jam berapa mulai kerja?

Keluarga klien mengatakan klien mengisi waktu kekosong dengan menggunakan waktu dengan menanam tanaman didepan rumah dan merawat. Keluarga klien juga mengatakan untuk mengisi waktu luang dengan menonton TV, mendengarkan musik, mengobrol bersama keluarga ataupun tetangga dan mengaji.

5) Apakah klien mempunyai ketrampilan khusus?

Keluarga klien mengatakan klien suka berkebun

6) Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara Rinci.

Tampak aktivitas pasien dibantu secara total, karena pasien mengalami kesadaran menurun dan tidak bisa melakukan apa-apa secara mandiri.

1	1
1	1

b. ISTIRAHAT

1. Kapan dan berapa lama klien beristirahat?

Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit pasien sering tidur siang sekitar jam 13:00 – 14:15 dan malam hari pasien tidur sekitar pukul 21:35-05:00. Namun sekarang,tampak pasien cenderung tidur

2. Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang?

Keluarga klien mengatakan klien sering Mendengarkan murottal atau ceramah agama di hpnya.

3. Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat?

Keluarga klien mengatakan klien menyiapkan waktu khusus untuk beristirahat

4. Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby?

Keluarga klien mengatakan klien hobby memancing

5. Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini?

Keluarga pasien mengatakan saat dirawat di RS lebih banyak beristirahat dari biasanya. Aktivitas klien kebanyakan di tempat tidur.

c. TIDUR**1) Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lam, nyenyak/tidak?)**

Lama Tidur Siang: Keluarga klien mengatakan tidurnya pada siang hari ± 2 jam setelah menunaikan salat zuhur.

Lama Tidur Malam: Keluarga klien mengatakan tidurnya pada malam hari ± 6-7 jam. Klien tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 4 subuh sebelum dirawat di RS. Saat dirawat di RS, keluarga klien mengatakan lebih banyak tidur.

2) Apakah kondisi saat ini mengganggu klien?

Keluarga pasien mengatakan kondisi saat ini sangat mengganggu, karena sakit yang dialami oleh pasien

3) **Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur?**

Keluarga klien mengatakan tidak pernah.

4) **Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur?**

Keluarga klien mengatakan membaca do'a sebelum tidur dan mendengarkan ayat-ayat suci al-quran

5) **Bagaimana kebiasaan tidur?**

Kebiasaan tidur: Keluarga klien mengatakan kebiasaan tidurnya baik dan teratur selama ini.

6) **Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya?**

Istirahat dilakukan pada siang hari setelah zuhur selama 2 jam. Tidur dilakukan di malam hari setelah nonton TV mulai jam 9 malam sampai jam 5 subuh.

7) **Apakah klien sering terjaga saat tidur?**

Keluarga klien mengatakan tidak pernah.

8) **Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya?**

Keluarga klien mengatakan tidak pernah mengalami gangguan tidur

9) **Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut?**

Tidak ada gangguan

3. CAIRAN

a. Berapa banyak klien minum perhari? Gelas?

Keluarga klien mengatakan Sebelumsakiti klien mengatakan menghabiskan 2 sampai 3 botol besar air dalam sehari (1800 ml/ hari) dan setelah di RS, namun pada saat sekarang pasien untuk minum pasien hanya dibantu via NGT

b. Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum klien?

Klien mengatakan tidak mempunyai minuman kesukaan. Klien mengatakan rutin mengonsumsi air mineral dan kopi.

c. Apakah ada minuman yang disukai/ dipantang?

Keluarga pasien mengatakan suka minum air putih dan tidak mengonsumsi kopi.

d. Apakah klien terbiasa minum alkohol?

Keluarga klien mengatakan tidak pernah minum alcohol.

e. Bagaimana pola pemenuhan cairan perhari?

Keluarga pasien mengatakan pasien mendapatkan minuman dan makanan via NGT di tambah juga dari infus.

f. Ada program pembatasan cairan?

Tidak ada

g. Bagaimana balance cairan klien?

$$BC = \text{Input} - (\text{Output} + \text{IWL})$$

Intake

Parenteral : Ka En 3b : 1500 cc/24 jam

Enteral : susu 4x200 cc = 800 cc/24 jam

Bubur sari :3x200 cc= 600 cc/24 jam

Obat-Obatan : 335 cc/24 jam

Jumlah input : 1500 + 1400 + 335 = 3.235 cc/24 jam

IWL : $15 \times \text{BBX } 24 / 24 = 15 \times 75 \times 24 / 24 = 1.080$

Output : urine yang di tampung selama 24 jam = 2400 cc

BC = Input – (Output + IWL)

= 3.235 – (1.080+2400)

= 3.235- 3.480

= -245cc

3. NUTRISI

a. Apa yang biasa di makan klien tiap hari?

Keluarga pasien mengatakan selama di rawat di RS pasien hanya memakan apa yang diberikan dari bagian gizi rumah sakit yaitu susu dan bubur saring

b. Bagaimana pola pemenuhan nutrisi klien? Berapa kali perhari?

Keluarga klien mengatakan pola pemenuhan nutrisi klien sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Keluarga klien makan 3x/hari dan porsi makan selalu dihabiskan. Tampak pola pemenuhan nutrisi pada pasien sudah sangat baik selama dirawat di ruang ICU, karena pasien terpasang NGT dan diberikan makanan 3x/hari

c. Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang?

Klien mengatakan suka semua jenis makanan. Dan pantang minumm bersoda

d. Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan?

Tidak ada Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien tidak mengalami riwayat alergi terhadap makanan.

e. Apakah ada kesulitan menelan? Mengunyah?

Keluarga pasien mengatakan pasien sebelum sakit tidak ada kesulitan menelan.

f. Apakah ada alat bantu dalam makan? Sonde, infus.

Klien menggunakan alat bantu dalam makan via NGT . Pasien terpasang infus, terpasang ETT, terpasang CVP, terpasang ventilator

g. Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan?

Klien mengatakan belum pernah mengalami gangguan pencernaan selama ini.

h. Bagaimana kondisi gigi geligi klien? Jumlah gigi? Gigi palsu? Kekuatan gigi?

Keluarga klien mengatakan tidak menggunakan gigi palsu dan giginya sudah ompong.

i. Adakah riwayat pembedahan dan pengobatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan?

Keluarga klien dan klien mengatakan tidak ada riwayat pembedahan dan pengobatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan.

j. Adakah program DIET bagi klien? Jenis? Bila ada, jelaskan secara RINCI!

Tampak pasien hanya mengonsumsi makanan yang dianjurkan dari pihak gizi yang di berikan via NGT

4. ELIMINASI: URINE DAN FESES

a. Eliminasi feses:

1. Bagaimana pola klien dalam defekasi? Kapan, pola dan karakteristik feses?

Tampak pasien BAB menggunakan pampers, dengan karakteristik encer.

2. Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar?

Keluarga klien dan perawat mengatakan tidak pernah menggunakan obat pencahar

3. Apakah ada kesulitan?

Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit tidak mengalami kesulitan pada saat BAB, namun sekarang pasien tampak menggunakan Pampers

4. Usaha yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah?

Tidak ada usaha

5. Apakah klien menggunakan alat bantu untuk defeksi?

Keluarga pasien mengatakan tidak ada

b. eliminasi Urine:

1. Apakah BAK klien teratur?

Tampak pasien BAK menggunakan kateter

2. Bagaimana pola, frekuensi, waktu, karakteristik serta perubahan yang terjadi dalam miksi?

Keluarga pasien mengatakan BAK nya lancar tidak ada hambatan, kadang sampai 3 kali dalam sehari melakukan takar urine

3. Bagaimana perubahan pola miksi klien?

Keluarga pasien mengatakan miksi seperti biasa cuman, sekarang menggunakan kateter

4. Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan alat bantu dalam miksi?

Tampak pasien terpasang kateter

5. Berapa volume air kemih?

Tampak pasien menggunakan chateter urine, dan ditampung, dengan jumlah urine selama 24 jam yaitu 2400 cc

6. Bila menggunakan alat bantu sudah berapa lama?

Keluarga klien mengatakan 1 minggu menggunakan kateter urine

D. KEBUTUHAN OKSIGENASI DAN KARBONDIOKSIDA

1. PERNAFASAN.

a) Apakah ada kesulitan dalam bernafas? Bunyi nafas? Dydspnue?

Tampak pasien tidak mampu batuk, punyi napas rochi dan terdapat sputup dengan jumlah banyak, kosebtrasi encer.

b) Apakah yang dilakukan klien untu mengatasi masala?

Klien tampak terpasang alat bantu ETT

c) Apakah klien mengguanakan alat bantu pernafasan? (Ya, jelaskan apa jenisnya)

Tampak klien menggunakan alat bantu dengan alat yang terpasang
ETT

d) Posisi yang nyaman bagi klien?

Posisi semi fowler dan fowler

e) Apakah klien terbiasa merokok? Obat – obatan untuk melancarkan pernafasan?

Keluarga klien mengatakan pernah merokok dan tidak pernah mengonsumsi obat-obatan untuk melancarkan pernafasan

f) Apakah ada alergi terhadap debu, obat- obatan dll?

Keluarga klien mengatakan tidak ada riwayat alergi debu

g) Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan pernafasan?

Keluarga klien mengatakan klien tidak pernah dirawat dengan gangguan pernafasan

h) Apakah klien pernah punya riwayat gangguan pernafasan dan mendapat pengobatan? (Ya, apa jenis obat, berapa lama pemberiannya? Kapan?)

Keluarga klien mengatakan tidak pernah mengalami gangguan pernafasan ataupun mendapatkan pengobatan.

E. KARDIVASKULER

1. Apakah klien cepat lelah?

Keluarga klien mengatakan cepat lelah selama berada di rumah sebelum di bawa ke RS WAHIDIN

2. Apakah ada keluhan berdebar – debar? Nyeri dada yang menyebar? Pusing? Rasa berat didada?

Keluarga pasien mengatakan sebelum pasien mengalami penurunan kesadaran pasien tidak pernah merasakan nyeri dada

3. Apakah klien menggunakan alat pacu jantung?

Keluarga klien mengatakan tidak pernah menggunakan alat pacu jantung

4. Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler?

Keluarga klien mengatakan tidak pernah mendapatkan obat untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler

C. PERSONAL HYGIENE

1. Bagaimana pola personal hygiene? Berapa kali mandi, gosok gigi dll?

Sebelum masuk di RS keluarga klien mengatakan mandi pagi dan mandi sore secara teratur tiap hari setelah pulang kerja. Keluarga klien mengatakan setelah masuk di RS dan mengalami coma klien belum pernah mandi. Hanya di bersihkan dengan tissue basah dan waslap. Keluarga klien mengatakan klien tidak lagi menggosok gigi, hanya menggunakan tisu untuk melap-lap gusi.

2. Berapa hari klien terbiasa cuci rambut?

Keluarga klien mengatakan mencuci rambut menggunakan sampo 1x/2 hari tiap mandi pagi. Tapi selama di ruang ICU dengan

keadaan coma klien tidak lagi bisa melakukan hanya 1 kali seminggu di lakukan perawat untuk melakukan keramat

3. Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personal hygiene?

4. Pada saat sekarang pasien tampak di bantu ssecara total untuk personal hygiennya

F. SEX

1. Apakah ada kesulitan dalam hubungan seksual?

Keluarfa klien mengatakan sudah tidak pernah melakukan nya lagi

2. Apakah penyakit sekarang mempengaruhi / mengganggu fungsi seksual?

Keluarga klien mengakatan tidak ada

G. PENGKAJIAN PSIKOSOSIAL DAN SPIRITUAL

1. Psikologi.

a. Status Emosi.

1. Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya?

Tampak pasien tidak mampu mengekspresikan perasaannya, hanya terkadang air matanya yang keluar.

2. Bagaimana suasana hati klien?

Nampak pasien lemas dan pasrah pada tempat tidurnya

3. Bagaimana perasaan klien saat ini?

Tampak pasien lemah seluruh badannya

4. Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira?

Tampak pasien mengekspresikan perasaannya dengan mengeluarkan sedikit air matanya.

b. Konsep diri:

1) Bagaimana klien memandang dirinya?

Keluarga pasien mengatakan pasrah dengan kondisinya sekarang.

2) Hal-hal apa yang disukai klien?

Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien menyukai masak dan membantu suaminya di sawah

3) Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya?

Kekuatannya ada pada suami beserta kedua anaknya, kelemahannya sekarang pasien sedang di rawat dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarganya.

4) Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini?

Keluarga pasien mengatakan pasien lebih cenderung tidur .

2. Hubungan Sosial:

a. Apakah klien mempunyai teman dekat?

Keluarga klien mengatakan semua tetangga di sekitaran rumahnya dianggap teman dekat.

b. Siapa yang dipercaya klien?

Keluarga klien mengatakan sangat percaya pada istrinya, anak dan kerluarganya

c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat?

Keluarga klien mengatakan sebelum dirawat di RS, klien aktif mengikuti kegiatan di masyarakat ketika tidak pergi kekontor.

d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan?

Keluarga klien berkerja sebagai PNS/pensiunan.

3. Spiritual.**a. Apakah klien menganut satu agama?**

Keluarga klien mengatakan hanya menganut satu agama, yaitu agama Islam.

b. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah?

Keluarga klien mengatakan tidak mengalami gangguan apapun dalam menjalankan ibadah.selama masih sehat

c. Bagaimana mana hubungan natara manusia dan Tuhan dalam agama

Keluarga klien mengatakan klien menunaikan salat 5 waktu tiap hari, menyempatkan untuk selalu berdoa setelah menunaikan salat wajib maupun salat sunah.

anemis

- c. Telinga berbentuk normal dan simetris, tidak ada serumen/sekret, tidak ada perdarahan, tidak ada kelainan bentuk daun telinga, fungsi telinga masih baik dan tidak terdapat nyeri telinga
- d. Hidung masih berfungsi penciumannya dengan baik, tidak ada polip, ada sekret, tampak terpasang NGT
- e. Mulut tidak mengalami kelainan, nampak pasien tidak mampu untuk berbicara, kemampuan bicara kooperatif, banyak sekret yang luar di mulut klien dan ETT. Mukosa bibir agak kering, terdapat luka gores. Gigi putih.

2. Leher

Bentuk leher tampak ada luka post tracheostomi, tidak ada peradangan ataupun pembengkakan pada tonsil, vena jugularis teraba dan tidak ada pembesaran, tidak terdapat nyeri tekan.

3. Dada

- a. Inspeksi: Dada tampak simetris, tidak ada luka pada dada.
- b. Palpasi: tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- c. Perkusi: sonor seluruh lapang paru
- d. Auskultasi: Bunyi napas ronchi

4. Abdomen

- a. Inspeksi: simetris, warna kulit merata dengan warna kulit seluruh tubuh
- b. Auskultasi: bunyi peristaltik \
- c. Perkusi: tidak terdapat massa/tumor, timpani

- d. Palpasi: tidak terdapat massa, tidak ada hernia, hepar dan lien teraba, tidak ada pembesaran

5. Genetalia, Anus dan rektum

- a. Inspeksi: warna kulit merata dengan warna kulit seluruh tubuh, terpasang kateter urine, tidak ada kelainan rektum,
- b. Palpasi : tidak teraba penumpukan urine

6. Ekstremitas:

- a. Atas: alat ekstremitas lengkap, tidak terdapat kelainan pada jari, simetris, klien tidak mampu mengerjakan tanganya karena penurunan kesadaran. ada gangguan dalam pergerakan, alat ekstremitas bergerak secara tidak bebas, ada edema, terdapat luka pada bokong, kuku tangan ditekan selama < 3 detik dan warnanya cepat kembali,
- b. Bawah: alat ekstremitas lengkap, tidak terdapat kelainan pada jari, simetris, ada gangguan dalam pergerakan, alat ekstremitas bergerak secara tidak bebas, tidak ada edema, tidak terdapat luka, bentuk kaki normal, tidak terdapat varices

1	1
1	1

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Hasil kimia klinik

Nama Pasien: Tn.P

Tgl. Registrasi': 24-08-2022 06:15:00

Tgl. Hasil: 23-08-2022 20:02:58

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
PH	7.531	7.35-7.45	
PCO2	106.9	80.0-100.0	mmHg
HCO3	27.1	22-26	mmol/l
BE	4.2	-2 s/d +2	mmol/l

Hasil Pemeriksaan Hematologi

Hasil kimia klinik

Nama Pasien: Tn.P

Tgl. Registrasi: 23-08-2022 19:03:18

Tgl. Hasil: 23-08-2022 20:02:58

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
HEMATOLOGI			
Hematologi Rutin			
WBC	22.2	4.00-10.00	10 ³ /uL
RBC	2.48	4.00-16.00	10 ⁶ /uL
HGB	7.2	12.0-16.0	gr/dl
HCT	23	37.0-48.0	%
MCV	94	80.0-97.0	fL
MCH	29	26.5-33.5	pg
MCHC	31	31.5-35.0	gr/dl
PLT	69	150-400	10 ³ /uL
RDW-SD		37.0-54.0	fL
RDW-CV	11.5	10.0-15.0	
PDW	13.8	10.0-18.0	fL
MPV	8.6	6.50-11.0	fL
P-LCR		13.0-43.0	%
PCT	0.06	0.15-0.50	%
NEUT	69.80	52.0-75.0	%
LYMPH	12.5	20.0-40.0	%
MONO	14.0	2.00-8.00	%
EO	3.4	1.00-3.00	10 ³ /uL
BASO	0.01	0.00-0.10	10 ³ /uL
RET	0.4	0.00-0.10	10 ³ /uL
LED I		(L < 10, P < 20)	10 ³ /uL
LED II Jam II			mm
Koagulasi			
PT	11.2	10-14	detik
INR	1.05	-	
APTT	30.8	22.0-30.0	detik
KIMIA DARAH			
Glukosa			
GDS	264	140	mg/dl
Fungsi Ginjal			
Ureum	91	10-50	mg/dl
Kreatinin	2.10	L 9< 1.3);P (<1.1)	mg/dl

Fungsi Hati			
SGOT	120	<38	U/L
SGPT	10	<41	U/L

Pemeriksaan CT-SCAN Kepala(Tanpa Kontras) :

Hasil kimia klinik

Nama Pasien: Tn.P

Tgl. : 25-08-2022 14:08:36

Kesan:

- 1) Tidak Nampak lesi hipodens/hiperdens patologik intracranial
- 2) Brain atrophy
- 3) Pansinussitis
- 4) Deviasi septum nasi tipe VII (klafikasi miadina)
- 5) Terpasang gastric tube

Foto Thoraks:

Kesan

- Terpasang tracheostomy tube dengan tip +/- 5.42 cm diatas carina
- Terpasang DLC pada hemithorax kanan melalui subclavia kanan dengan ti setinggi CV T8 kesan pada vena cava superior
- Terpasang CVC pada hemithorax kiri melalui subcalvia kiri yang melewati midline dengan tip setinggi CV T7 kesan pada vena cava superior
- TB paru lama aktif lesi luas

III. TERAPI YANG DIBERIKAN

Nama obat	Dosis	Rute	Manfaat
Fentanyl	30 mg/jam	Intravena	Untuk meredakan nyeri
Omeprazole	40 mg/24 jam	Intravena	Untuk mencegah terjadinya peningkatan asam lambung
Citicolin	50 mg/12 jam	NGT	Untuk meningkatkan kesadaran atau daya ingat
Fujimin	20 cup/8 jam	NGT	Untuk pemulihan luka
Zinc	20mg/24jam	NGT	Meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan
C.Camp	40mg/8jam	NGT	Membantu mencegah kurang zat besi
Furosemide	20mg/12jam	Intravena	Mengatasi penumpukan cairan didalam tubuh atau edema
Norepinefrin	200 g/8jam	Intravena	Mengatasi tekanan darah renda
HumanAlbumin	100cc/24jam	Intavens	Untuk pengobatan hipoproteinemia (kadar protein dalam darah dibawah kasiran normal)
Fentanyl	30gr/12 jam	Intravena	Meredakan nyeri hebat
Meropenem	1 gr		Menangani berbagai penyakit infeksi bakteri
Midazolam	20 gr		Menghilangkan rasa cemas berlebihan
Omeprazole	40 mg		Untuk mengatasi asam lambung
Biroprolol	2,5 gr		Mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi, angina pectoris, aritmia dan gagal jantung
Novorapid	4'u/8jam	Subkutan	Pengobatan pada diabetes melitus
Lantus	0-01014	Subkutan	Mengontrol kadar gula darah
Deksmedecomidin	0,2/jam	Intravena	Menangani peradangan, reaksi alergi, radang sendi, dan autoimun
Levofloxacin	759 mg/24 jam	Intravena	Untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri
As.Tranexamat	500 mg/12 jam	Intravena	Untuk menghentikan perdarahan
Phenitoin	100 mg/24 jam	Intravena	Untuk mengontrol kejang
Mecobalamina	500 mg/24 jam	NGT	Untuk membantu mengatasi masalah kejang

VI. Discharge Planning

- Tidak ada masalah
 - Pengobatan Lingkungan rumah
 - Kurang dukungan keluarga
- Yang harus dilakukan klien:

Tanda tangan preceptor klinik

Tanggal pengkajian terlengkap

VII. KLASIFIKASI DATA

DATA OBJEKTIF	DATA SUBJEKTIF
<ul style="list-style-type: none"> - Terdengar suara napas tambahan ronchi pada pasien - Tampak pasien susah untuk mengeluarkan batuknya - Tampak ada luka post tracheostomi pada pasien - Tampak pasien susah untuk berbicara - Glukosa GDS 264 mg/dl - Tampak mulut pasien kering - Tampak kapiler >3 detik - Akral teraba dingin - Kulit tampak pucat - Konjuktiva tampak anemis - Hasil lab: RBC: 3.84 (NN 4.00-6.00) - WBC : 22.2 (NN: 4.00-10.00) - HB: 11.0 (NN:12.00-6.00) - HCT: 34 (NN:37.00-48.00) - Tampak ada luka dikubitus pada bokong pasien derajat 2 dengan diameter 10 cm kedalaman 1 cm - Tampak luka kemerahan - Hematom - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan - Tampak klien lemas - Tampak klien cenderung tidur - Tampak klien enggang untuk melakukan pergerakan - Kekuatan otot <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> $\begin{array}{c} \uparrow \quad 1 \\ \hline \downarrow \quad 1 \end{array}$ </div> - Tampak klien mengalami kesadaran menurun - Skor barthel indeks 0 (bantuan total) - Tampak klien tidak mampu merawat diri nya - Nilai GCS: 4 (coma) - Pasien terpasang EET - Pasien terpasang NGT - Pasien Terpasang tracheostomy - Terpasang gastric tube - Terpasang cvc - Usian >65 tahun - Penurunan tingkat kesadaran - Perubahan kadar glikosa darah - Kekuatan otot menurun 	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan bahwa klien sudah 2 tahun terakhir mengalami penyakit diabetes mellitus - Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu - Keluarga klien mengatakan sebelum masuk di Rs klien sudah ada luka pada bokong 2 minggu yang lalu

VIII. KATEGORISASI DATA

Kategorisasi dan Sub Kategorisasi		Data Subjektif dan Objektif
Fisiologis	Respirasi	
	Sirkulasi	<p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada sputum di mulut dan di selang ETT pasien - Terdengar suara napas tambahan ronchi pada pasien - Tampak pasien susah untuk mengeluarkan batuknya - Tampak ada luka post tracheostomi pada pasien - Tampak pasien susah untuk berbicara - Tampak kapiler >3 detik - Akral teraba dingin - Kulit tampak pucat - Konjunktiva tampak anemis - Hasil lab: RBC: 3.84 (NN 4.00-6.00) - HB: 11.0 (NN:12.00-6.00) - HCT: 34 (NN:37.00-48.00)
	Nutrisi dan Cairan	<p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan bahwa klien sudah 2 tahun terakhir mengalami penyakit diabetes mellitus - Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu - Keluarga klien mengatakan klien sering merasa lapar <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak glukosa dalam darah tinggi - Tampak mulut pasien kering
	Eliminasi	
	Aktivitas dan Istirahat	<p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan - Tampak klien lemas - Tampak klien cenderung tidur - Tampak klien enggang untuk melakukan

		<p>pergerakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerkuatan otot <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> </tr> </table>	1	1	1	1
1	1					
1	1					
	Neurosensory					
	Reproduksi dan Seksualitas					
Psikologis	Nyeri dan Kenyamanan					
	Integritas Ego					
	Pertumbuhan dan Perkembangan					
Perilaku	Kebersihan Diri	<p>DS</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak klien mengalami kesadaran menurun - Skor barthel indeks 0 (bantuan total) - Tampak klien tidak mampu merawat dirinya - Nilai GCS: 4 (coma) 				
	Penyuluhan dan Pembelajaran					
Relasional	Interaksi Sosial					
Lingkungan	Keamanan dan Proteksi	<p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan sebelum masuk di Rs klien sudah ada luka pada bokong 2 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada luka dikubitus pada bokong pasien derajat 2 dengan diameter 10 cm kedalaman 1 cm - Tampak luka kemerahan - Hematom - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan - Pasien terpasang EET - Pasien terpasang NGT - Pasien Terpasang tracheostomy - Terpasang gastric tube - Terpasang cvc - Usia >65 tahun - Riwayat jatuh - Penurunan tingkat kesadaran - Perubahan kadar glikosa darah 				

		<ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan otot menurun - Skala morsew 50 (risiko jatuh tinggi) - WBC: 22.2 (NN:4.00-10.00)
--	--	---

IX. ANALISA DATA

NO.	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1	DS: - DO : <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada sputum di mulut dan di selang ETT pasien - Terdengar suara napas tambahan ronchi pada pasien - Tampak pasien susah untuk mengeluarkan batuknya - Tampak ada luka post tracheostomi pada pasien - Tampak pasien susah untuk berbicara 	Diabetes mellitus ↓ Sistem pertahanan tubuh terganggu ↓ Organisme ↓ Stafilokokus ↓ Trombus ↓ Permukaan lapisan pleura tertutup tebal ↓ eksudat trombus di vena pulmonalis ↓ Nekrosis hemoragik ↓ Produksi sputum meningkat ↓ Bersihan jalan napas tidak efektif	Bersihan jalan napas tidak efektif
2	DS <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan bahwa klien sudah 2 tahun terakhir mengalami penyakit diabetes mellitus - Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu DO <ul style="list-style-type: none"> - Glukosa GDS 264 mg/dl - Tampak mulut pasien kering 	Hiperglikemia ↓ Disfungsi pancreas ↓ Resistensi insulin ↓ Gangguan toleransi glikosa darah ↓ Gangguan glukosa puasa ↓ Ketidakstabilan glukosa darah	Ketidakstabilan kadar glukosa darah

3	<p>DS</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kapiler >3 detik - Akral teraba dingin - Kulit tampak pucat - Konjuktiva tampak anemis - Hasil lab: RBC: 3.84 (NN: 4.00-6.00) - HB: 11.0 (NN:12.00-6.00) - HCT: 34 (NN:37.00-48.00) - GDS ; 264 mg/dl 	<p>hiperglikemia</p> <p>↓</p> <p>Penurunan hemoglobin</p> <p>↓</p> <p>peningkatan tekanan darah</p> <p>↓</p> <p>Suplao oksigen ke jaringan inadequate</p> <p>kurang aktivitas fisik</p> <p>↓</p> <p>Perfusi perifer tidak efektif</p>	<p>Perfusi perifer tidak efektif</p>						
4	<p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan - Tampak klien lemas - Tampak klien cenderung tidur - Tampak klien enggang untuk melakukan pergerakan - Kerkuatan otot <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none; padding: 0 5px;">1</td> <td style="border: none; padding: 0 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: none; padding: 0 5px;">—</td> <td style="border: none; padding: 0 5px;">—</td> </tr> <tr> <td style="border: none; padding: 0 5px;">1</td> <td style="border: none; padding: 0 5px;">1</td> </tr> </table>	1	1	—	—	1	1	<p>Gangguan motorik</p> <p>↓</p> <p>koordinasi pergerakan tubuh terganggu</p> <p>↓</p> <p>kelemahan</p> <p>↓</p> <p>indek masa tubuh diatas persentil ke 75 sesuai usia</p> <p>↓</p> <p>Gangguan mobilitas fisik</p>	<p>Gangguan mobilitas fisik</p>
1	1								
—	—								
1	1								
5	<p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan sebelum masuk di Rs klien sudah ada luka pada bokong 2 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada luka dikubitus pada bokong 	<p>Glukosa dalam darah tinggi</p> <p>↓</p> <p>hiperglikemia</p> <p>↓</p> <p>arteros klerosis</p> <p>↓</p> <p>mikroangiopati</p> <p>↓</p>	<p>Gangguan integritas kulit</p>						

	<p>pasien derajat 2 dengan diameter 10 cm kedalaman 1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak luka kemerahan - Hematom - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan 	<p>Terjadi peradangan/inflamasi</p> <p>↓</p> <p>Neuropati</p> <p>↓</p> <p>Mudah terluka</p> <p>↓</p> <p>Gangguan integritas kulit</p>	
6	<p>DS: tidak dikaji</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak klien mengalami kesadaran menurun - Skor barthel indeks 0 (bantuan total) - Tampak klien tidak mampu merawat dirinya - Nilai GCS: 4 (coma) 	<p>Penurunan fungsi neuromotorik</p> <p>↓</p> <p>Kelemahan otot</p> <p>↓</p> <p>Immobilitas</p> <p>↓</p> <p>Deficit perawatan diri</p> <p>↓</p>	Deficit perawatan diri
7	<p>FAKTOR RISIKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien terpasang EET - Pasien terpasang NGT - Pasien Terpasang tracheostomy - Terpasang gastric tube - Terpasang cvc - WBC: 22.2 (NN:4.00-10.00) 	<p>DM</p> <p>↓</p> <p>Prosedur invasive</p> <p>↓</p> <p>Kerusakan integritas kulit</p> <p>↓</p> <p>Penurunan hemoglobin</p> <p>↓</p> <p>Resiko Infeksi</p>	Resiko infeksi

XI. PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH KEPERAWATAN

No	Diagnosis keperawatan
1	<p>Bersihan jalan napas tidak efektif b.d hipersekresi jalan napas</p> <p>DS: -</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada sputum di mulut dan di selang ETT pasien - Terdengar suara napas tambahan ronchi pada pasien - Tampak pasien susah untuk mengeluarkan batuknya - Tampak ada luka post tracheostomi pada pasien - Tampak pasien susah untuk berbicara.

2	<p>Ketidakstabilan glukosa darah b.d hiperglikemia</p> <p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan bahwa klien sudah 2 tahun terakhir mengalami penyakit diabetes mellitus - Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - glukosa GDS 264 mg/dl - Tampak mulut pasien kering
3	<p>Perfusi perifer tidak efektif b.d hiperglikemia</p> <p>DS</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kapiler >3 detik - Akral teraba dingin - Kulit tampak pucat - Konjunktiva tampak anemis - Hasil lab: RBC: 3.84 (NN 4.00-6.00) - HB: 11.0 (NN:12.00-6.00) - HCT: 34 (NN:37.00-48.00) - GDS ; 264 mg/dl
4	<p>Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot</p> <p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan - Tampak klien lemas - Tampak klien cenderung tidur - Tampak klien enggang untuk melakukan pergerakan - Kekuatan otot - $\begin{array}{c c} 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$
5	<p>Kerusakan integritas kulit/jaringan b.d perubahan sirkulasi</p> <p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan sebelum masuk di Rs klien sudah ada luka pada bokong 2 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada luka dikubitus pada bokong pasien derajat 2 dengan diameter 10 cm kedalaman 1 cm - Tampak luka kemerahan - Hematom

	<ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan
6	<p>Defisit perawatan diri b.d DS: tidak dikaji</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak klien mengalami kesadaran menurun - Skor barthel indeks 0 (bantuan total) - Tampak klien tidak mampu merawat diri nya - Nilai GCS: 4 (coma)
7	<p>Risiko infeksi b.d penyakit kronis (diabetes mellitus)</p> <p>FAKTOR RISIKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien terpasang EET - Pasien terpasang NGT - Pasien Terpasang tracheostomy - Terpasang gastric tube - Terpasang cvc - WBC: 22.2 (NN:4.00-10.00)

4.1.2 DIAGNOSIS KEPERAWATAN

Nama / umur : Tn. P / 70 Tahun

Ruang / kamar : ICU

No	Diagnosis keperawatan	Tanggal ditemukan	Tanggal Teratasi
1	Bersihan jalan napas tidak efektif	Pada tanggal 25 Agustus 2022	Pada tanggal 27 Agustus 2022 masalah belum teratasi
2	Ketidakstabilan kadar glukosa darah	Pada tanggal 25 Agustus 2022	Pada tanggal 27 Agustus 2022 Masalah belum teratasi
3	Perfusi perifer tidak efektif	Pada tanggal 25 Agustus 2022	Pada tanggal 27 Agustus 2022 Masalah belum teratasi
4	Gangguan mobilitas fisik	Pada tanggal 25 Agustus 2022	Pada tanggal 27 Agustus 2022 Masalah belum teratasi
5	Gangguan integritas kulit	Pada tanggal 25 Agustus 2022	Pada tanggal 27 Agustus 2022 Masalah belum teratasi
6	Deficit perawatan diri	Pada tanggal 25 Agustus 2022	Pada tanggal 27 Agustus 2022 Masalah belum teratasi
7	Risiko infeksi	Pada tanggal 25 Agustus 2022	Pada tanggal 27 Agustus 2022 Masalah belum teratasi

RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN

No	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		
		Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1	<p>Bersihan jalan napas tidak efektif b.d hipersekresi jalan napas</p> <p>DS: -</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada sputum di mulut dan di selang ETT pasien - Terdengar suara napas tambahan ronchi pada pasien - Tampak pasien susah untuk mengeluarkan batuknya - Tampak ada luka post tracheostomi pada pasien - Tampak pasien susah untuk berbicara 	<p>Setelah dilakukan intervensi pada Tn. P selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi sputum menurun b. Frekuensi napas membaik dari 24x/m menjadi 22x/m. 	<p>Manajemen Jalan Napas (D.1.01011)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor bunyi napas tambahan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian obat jika perlu 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui adanya suara napas tambahan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mempertahankan jalan napas klien dan posisi sebelum melakukan suction - Membantu mengeluarkan lendir menggunakan suction - Menambah oksigen yang masuk ke dalam tubuh <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengencerkan lendir klien agar tidak susah keluar
2	<p>Ketidakstabilan glukosa darah b.d hiperglikemia</p> <p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan bahwa klien sudah 2 tahun terakhir mengalami penyakit diabetes mellitus - Keluarga klien mengatakan 	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan kepada Tn. P selama 3X24 jam maka, perfusi perifer meningkat. Dengan kriteria</p>	<p>Manajemen hiperglikemia (D.1.03115)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia - Identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin memingkat (misalnya, penyakit kekambuhasn) 	<p>Manajemen hiperglikemia</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui penyebab hiperglikemia - Untuk mengetahui situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin memingkat (misalnya, penyakit kekambuhasn)

	<p>klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak glukosa dalam darah tingg - Tampak mulut pasien kering 	<p>hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi kesadaran dari 5 turun 4 - Berkeringat dari dari 2 ke 3 - Mulut kering 2 ke 3 - Kadar glukosa dalam darah dari 264 mg/dl menurun ke 144 mg/dl - Kadar glukosa dalam urine dari cukup memburuk 2 menjadi sedang ke 3 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitor kadar glukosa darah, jika perlu - Monitor tanda dan gejala hiperglikemia polyuria, polydipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, dan sakit kepala) - Monitor intoke dan output cairan - Monitor keton urin, kadat analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik dan frekuensi nadi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan cairan asupan oral - Konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk - Fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi oetostatik <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan menghindari olahraga jika kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl - anjurkan kadar glukosa darah secara mandiri - Anjurkan kepatuhan dalam diet dan olahraga - Ajarkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urine, jika perlu - Ajarkan pengelolaan diabetes (misalnya penggunaan imsulini, obat oral, monitor asupan cairan 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui cara memonitor kadar glukosa darah, jika perlu - Untuk mengetahui Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia polyuria, polydipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, dan sakit kepala) - Untuk mengetahui Memonitor intoke dan output cairan - Untuk mengetahui Memonitor keton urin, kadat analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik dan frekuensi nadi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui cairan asupan oral yang diberikan - Untuk mengetahui cara konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk - Untuk mengetahui Fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi oetostatik <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui cara menghindari olahraga jika kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl - Untuk mengetahui kadar glukosa darah secara mandiri - Untuk mengetahui kepatuhan dalam diet dan olahraga - Untuk mengetahui indikasi dan pentingnya pengujian keton urine, jika perlu - Untuk mengetahui pengelolaan
--	--	---	--	--

			<p>pentingnya karbohidrat dan bantuan professional kesehatan)</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian insulin - Kolaborasi pemberian cairan IV - Kolaborasi pemberian kalium 	<p>diabetes(misalnya penggunaan imsuln, obat oral, monitor asupan cairan pentingnya karbohidrat dan bantuan professional kesehatan)</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui pemberian insulin - Untuk mengetahui pemberian cairan IV - Untuk mengetahui pemberian kalium
3	<p>Perfusi perifer tidak efektif b.d penurunan kosentrasi hemoglobin</p> <p>DS</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kapiler >3 detik - Akral teraba dingin - Kulit tampak pucat - Konjuktiva tampak anemis - Hasil lab: RBC: 3.84 (NN 4.00-6.00) - HB: 11.0 (NN:12.00-6.00) - HCT: 34 (NN:37.00-48.00) 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Tn. p selama 3x24 jam, diharapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edema perifer dari cukup meningkat ke 2 menjadi sedang ke 3 dan menurun menjadi 5 - kelmahan otot dari dari 1 ke 2 - turgo kulit dari cukup memburuk 2 menjadi sedang ke 3 - tekanan distolik sedannng 3 	<p>Perawatan sirkulasi (D.1.02079)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edama, pengisian kapiler, warna, suhu ankie-brachial indek) - Indentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tingg) - Monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermintas <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi - Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi - Hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area cedera - Lakukan pencegahan infeksi 	<p>Perawatan sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui hasil pemeriksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edama, pengisian kapiler, warna, suhu ankie-brachial indek) - mengIdentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tingg) - meMonitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermintas <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk mengetahui cara Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi - untuk mengetahui cara Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi - untuk mengetahui cara Hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area cedera

		menjadi cukup membaik ke 4 tekanan darah diastolik dari sedang 3 menjadi cukup membaik ke 4	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan perawatan kaki dan kuku - Lakukan hidrasi Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan berhenti merokok - Anjurkan berolahraga rutin 	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan pencegahan infeksi - meLakukan perawatan kaki dan kuku - meLakukan hidrasi Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - menganjurkan berhenti merokok - menganjurkan berolahraga rutin
4	<p>Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan - Tampak klien lemas - Tampak klien cenderung tidur - Tampak klien enggang untuk melakukan pergerakan - Kerkuatan otot $\begin{array}{c c} 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Tn. P selama 3x24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan</p> <p>Kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan ekstremitas dari 1 ke 2 meningkat - Kekuatan otot 1 ke 2 meningkat - Rentang gerak (ROM) dari 1 ke 2 meningkat 	<p>Pengaturan posisi (D.1.01019)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi <p>Trapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atur posisi untuk mengurangi sesak - Tinggikan tempat tidur bagian kepala - Berikan topangan pada area edema - Motivasi terlibat dalam perubahan posisi - Ubah posisi setiap 2 jam - Ubah posisi dengan teknik log roll <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasikan saat akan dilakukan perubahan posisi 	<p>Pengaturan Posisi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui status oksigenasi dengan mengukur frekuesnsi pernapasan sebelum dan sesudah mengubah posisi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mencegah sesak pada pasien - Posisi dapat membantu mengurangi sesak pada pasien - Untuk membantu menurunkan edema pada area yang mengalami edema - Untuk memberikan dukungan kepada pasien terlibat dalam gerakan - Untuk mencegah terjadinya ulkus pada tubuh bagian belakang pasien - Agar pasien mudah untuk dipindahkan <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan pasien agar mengetahui tindakan yang akan diberikan

5	<p>Defisit perawatan diri b.d DS: tidak dikaji</p> <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak klien mengalami kesadaran menurun - Skor barthel indeks 0 (bantuan total) - Tampak klien tidak mampu merawat diri nya - Nilai GCS: 4 (coma) 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam pada Tn.P diharapkan perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan kebersihan diri cukup menuru ke 2 menjadi sedang ke 3 - Mempertahankan kebersihan mulut dari cukup menurun menjadi sedang ke 3 	<p>Dukungan perawatan diri (D.1.11348)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tingkat kemandirian pasien - Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan yang terapeutik - Siapkan keperluan pribadi pasien - Dampingi dalam melakukan perawatan diri pasien - Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri - Jadwal rutin perawatan diri <p>Perawatan Mulut (D.111356)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kondisi umum (kesadaran,alat bantu napas, hemodinamik) - Identifikasi kondisi oral - Monitor keberihan mulut,lidah dan gusi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilih sikat gigi sesuai dengan kondisi pasien 	<p>Dukungan perawatan diri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui tingkat kemandirian pasien dalam melakukan perawatan diri - Untuk mengetahui kebutuhan alat bantu kebersihan diri <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menjaga privacy pasien - Untuk membantu menyiapkan kebutuhan pasien - Membantu pasien dalam melakukan perawatan diri - Untuk menjaga pasien agar tetap bersih
---	--	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Dekatkan alat-alat dalam jangkauan untuk melakukan perawatan secara mandiri - Sikat gigi dari arah gusi kemasing-masing gigi atas dan bawah - Gunakan <i>suction</i> untuk menghisap cairan saliva dimulut pada pasien penurunan kesadaran - Gunakan cairan clorhixidine atau sesuai kebijakan - Gunakan benang untuk mengangkat plak yang tidak dapat di jangkau sikat gigi 	
6	<p>Gangguan integritas kulit/jaringan b.d perubahan sirkulasi</p> <p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga klien mengatakan sebelum masuk di Rs klien sudah ada luka pada bokong 2 minggu yang lalu <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada luka dikubitus pada bokong pasien derajat 2 dengan diameter 10 cm kedalaman 1 cm - Tampak luka kemerahan - Hematom 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan yang dilakukan pada Tn.P selama 3x24 jam di harapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan jaringan menurun (dari 2 menurun ke 3) - Kerusakan 	<p>Perawatan luka tekan (D.1.14566)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor kondisi luka <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersihkan kulit disekitar luka dengan sabun dan air - Bersihkan luka bagian dalam menggunakan Nacl - Lakukan pembalutan pada luka - Oleskan salep - Gunakan tempat tidur khusus - Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam 	<p>Perawatan luka tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui kondisi luka <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui Bersihkannya kulit disekitar luka dengan sabun dan air - Untuk mengetahui Bersihkannya luka bagian dalam menggunakan Nacl - Untuk mengetahui cara melakukan pembalutan pada luka - Untuk mengetahui cara Oleskan salep - Untuk mengetahui Gunakannya tempat tidur khusus - Untuk mengetahui Jadwalkan

	<ul style="list-style-type: none"> - Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan 	lapisan kulit menurun <ul style="list-style-type: none"> - Kemerahan menurun - Suhu tubuh membaik 		perubahan posisi setiap 2 jam
7	Risiko infeksi b.d penyakit kronis (diabetes mellitus) FAKTOR RISIKO <ul style="list-style-type: none"> - Pasien terpasang EET - Pasien terpasang NGT - Pasien Terpasang tracheostomy - Terpasang gastric tube - Terpasang cvc - WBC: 22.2 (NN:4.00-10.00) 	Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Ny.N selama 3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil : <ul style="list-style-type: none"> - kebersihan tangan sedang ke 3menjadi cukup meningkat ke 4 - kebersihan badan dari sedang ke 3menjadi cukup meningkat ke 4 - bengkak dari cukup meningkat ke 2 menjadi sedang ke 3 	Pencegahan Infeksi (1.14539) Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung - Berikan perawatan kulit pada area edema - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 	Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui tanda dan gejala infeksi pada luka pasien Terapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghindari transmisi kuman dan bakteri - Untuk membersihkan dan merawat kulit sekitar luka - Untuk mencegah penularan infeksi Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mempercepat proses penyembuhan luka

		- kemerahan dari cukup meningkat ke 2 menjadi sedang ke 3	
--	--	---	--

4.1.4 IMPLEMENTASI KEPERAWATAN HARI PERTAMA

Inisial klien : Tn. P

Ruangan : ICU

No. RM : 968410

Dx.Medis : DM (Diabetes Melitus)

No	DX. Kep	Waktu	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1	Bersihkan jalan napas tidak efektif	Kamis, 25 agustus 2022 04:40	Manajemen Jalan Napas Observasi - Memonitor bunyi napas Hasil: Ada suara nafas tamabahan bunyi ronchi Terapeutik	SRI ASTUTI

			<ul style="list-style-type: none"> - Memposisikan pasien dalam posisi supinasi Hasil: Pasien dalam posisi siap untuk dilakukan suction - Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil: Jalan napas pasien jadi bersih setelah mengeluarkan secret yang tertahan - Memberikan oksigen, jika perlu Hasil: Pasien tampak bernapas dengan bantuan alat trakeostomi dan tampak lebih nyaman <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tindakan nebu NaCl 0,5 untuk mengencerkan dahak Hasil: Setelah 1 jam pemberian nebu, dahak pasien jadi encer 	
2	Ketidakstabilan glukosa dalam darah	<p>Kamis, 25 agustus 2022</p> <p>05: 00</p>	<p>Manajemen hiperglikemia</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia Hasil: mengontrol dietnya, makanan yang perlu disiapkan nunur saring - Mengidentifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin memingkat (misalnya, penyakit kekambuhan) Hasil: CKD (Chronic Kidney Disease) - Memonitor kadar glukosa darah, Hasil: 273 mg/dl. - Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia polyuria, polydipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, dan sakit kepala) Hasil: tampak klien buang air kecil lebih sering dan tampak pasien terbaring lemah ditempat tidur - Memonitor intoke dan output cairan 	SRI ASTUTI

			<p>Hasil: $BC = Input - (Output + IWL)$ $= 3.235 - (1.080 + 2400)$ $= 3.235 - 3.480$ $= -245cc$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor keton urin, kadar analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik dan frekuensi nadi <p>Hasil: TTV. TD:161/105 mmHg N:95X/menit P: 24X/menit S:36,5 derajat selsius</p> <p>06:30</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meberikan cairan asupan oral <p>Hasil: perawat tampak memberikan asupan cairan air minum melalui selang NGT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkonsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk <p>Hasil: perawat melakukan konsultasi dengan medis, tampak glukosa dalam darah masih tinggi.</p> <p>06:40</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan menghindari olahraga jika kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl <p>Hasil: tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan kepatuhan dalam diet dan olahraga <p>Hasil: perawat mematuhi program diet yang anjurkan untuk klien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urine, jika perlu - Menganjurkan pengelolaan diabetes (misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan pentingnya karbohidrat dan bantuan professional kesehatan) <p>Hasil: keluarga klien mengatakan bisa melakukan</p>	
--	--	--	--	--

		07:00	<p>penggunaan pemebrian insulin, memonitor asupan cairan</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkolaborasi pemberian insulin Hasil: pemberiaan insulin novorapid 4 iu - Mengkolaborasi pemberian cairan IV Hasil: kurang lebih 4 gelas air minum dalam sehari - Mengkolaborasi pemberian kalium Hasil: zink 20 mg/12jam, B.Comp 2 tab/8jam 	
3	Perfusi perifer tidak efektif	<p>Kamis, 25 Agustus 2022</p> <p>07:10 WITA</p> <p>07:20 WITA</p>	<p>Perawatan sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edama, pengisian kapiler, warna, suhu ankle-brachial indek) Hasil: perawat melakukan cara mengukur nadi perifer: 95X/menit tanpak ada edama pada kaki dan tangan, pengisian kapiler <3 detik. - Mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tingg) Hasil: keluarga klien mengetahui faktor risiko sirkulasi - Memonitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermintas Hasil: keluarga klien mampu memahami ketika panas, kemerahan dan rasa nyeri ketika merasakan. <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - menghindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi Hasil: keluarga klien dapat mengenal dan menghindari ketika ketika pada saat perawatan mengambil darah didaerah 	SRI ASTUTI

		<p>07:30 WITA</p>	<p>keterbatasan perfusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi <p>Hasil: perawat dapat menghindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan infeksi - Hasil; perawat dapat mengetahui cara mencegah infeksi - melakukan perawatan kaki dan kuku <p>Kelurga klien dapat melakukan perawatan kuku dan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan hidrasi <p>Hasil: keluarga klien dapat menengerti ketika merasa dehidrasi</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan berhenti merokok <p>Hasil: klien berhenti merokok</p>	
4	Gangguan mobilitas fisik	<p>Kamis, 25 Agustus 2022 07:40 WITA</p>	<p>Pengaturan posisi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi <p>Hasil : Sebelum Rr: 24x/i, HR:95X/i, SPO2 97 % Setelah perubahan posisi: 20 x/i, HR : 100 x/i, SPO2 99 %</p> <p>Trapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meninggikan tempat tidur bagian kepala <p>Hasil : perawat mengatur tempat tidur dibagian kepala pasien 30°-45°</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan topangan pada area edema <p>Hasil : perawat memberikan bantal pada bagian bawah lengan klien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah posisi setiap 2 jam 	SRI ASTUTI

		07:50 WITA	<p>Hasil : perawat melakukan perubahan pasien setiap 2 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah posisi dengan teknik log roll <p>Hasil : perawat mengubah posisi pasien dengan teknik log roll</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan saat akan dilakukan perubahan posisi <p>Hasil : perawat menyampaikan kepada pasien walaupun dalam keadaan tidur kegiatan yang di lakukan.</p>	
5	Deficit perawatan diri	<p>Kmis, 25 Agustus 2022</p> <p>08:00 WITA</p> <p>08:20 WITA</p>	<p>Dukungan perawatan diri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tingkat kemandirian pasien <p>Hasil : Pasien tidak dapat melakukan apapun secara mandiri, dan dibantu secara total oleh perawat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri <p>Hasil : pasien dibantu dalam menyediakan alat mandi dan alat untuk oral hygiene</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan yang terapeutik <p>Hasil : pada saat dibantu untuk perawatan diri pada pasien, perawat menjaga privacy pasien dengan menutup sampiran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan keperluan pribadi pasien <p>Hasil : perawat membantu menyediakan sabun, tissue basah dan kering, sikat gigi serta pasta gigi yang mengandung clorhixidine 0,5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi dalam melakukan perawatan diri pasien <p>Hasil : perawat membantu mulai dari awal sampai akhir perawatan diri pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan rutin perawatan diri pasien <p>Hasil : perawatan diri pasien dilakukan setiap hari</p>	SRI ASTUTI

6	Gangguan integritas kulit/jaringan	Kamis, 25 Agustus 2022 08:30 WITA	<p>Perawatan luka tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kondisi luka <p>Hasil : luka dekubitus sebesar koin, luka derajat II, warna dasar luka merah, terdapat eksudat, tepi luka berwarna hitam</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan kulit disekitar luka dengan sabun dan air <p>Hasil : perawat mebersihkan area disekitar luka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan luka bagian dalam menggunakan Nacl <p>Hasil : pada saat membersihkan luka bagian dalam, perawat menggunakan Nacl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoleskan salep <p>Hasil: perawat mengoleskan salep serta pasien di berikan kapsul fujimin untuk membantu mengeringkan luka, serta mempercepat proses penyembuhan luka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembalutan pada luka <p>Hasil : setelah dibersihkan dan diberi salep, perawat membalut luka menggunakan kasa dan hypafix</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan tempat tidur khusus <p>Hasil : pasien menggunakan kasur khusus dekubitus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam <p>Hasil : perawat mengubah posisi pasien setiap 2 jam</p>	SRI ASTUTI
7	Risiko infeksi	Kamis 25 Agustus 2022 09:00 WITA	<p>Mencegah Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Hasil : perawat mengetahui tanda dan gejala infeksi yang terjadi pada klien</p> <p>Terapeutik</p>	SRI ASTUTI

		09:20 WITA	<ul style="list-style-type: none">- Membatasi jumlah pengunjung Hasil : perawat membattasi jumlah keluarga yang menjenguk klien- Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien Hasil : perawat mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan klien untuk menghindari transmisi kuman dan virus Edukasi <ul style="list-style-type: none">- Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi Hasil : perawat memberikan motivasi kepada klien untuk meningkatkan asupan nutrisi	
--	--	-----------------------	---	--

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN HARI KEDUA

Inisial klien : Tn. P

Ruangan : ICU

No. RM : 968410

Dx.Medis : DM (Diabetes Melitus)

No	DX. Kep	Waktu	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1	Bersihkan jalan napas tidak efektif	Jumat, 26 Agustus 2022 08: 50 WITA	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor bunyi napas Hasil: Ada suara nafas tamabahan bunyi ronchi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memposisikan pasien dalam posisi supinasi Hasil: Pasien dalam posisi siap untuk dilakukan suction - Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil: Jalan napas pasien jadi bersih setelah mengeluarkan secret yang tertahan - Memberikan oksigen, jika perlu Hasil: Pasien tampak bernapas dengan bantuan alat trakeostomi dan tampak lebih nyaman <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tindakan nebu NaCl 0,5 untuk mengencerkan dahak Hasil: Setelah 1 jam pemberian nebu, dahak pasien jadi encer 	SRI ASTUTI
2	Ketidakstabilan glukosa dalam darah	Jumat, 26 Agustus 2022 09: 00	<p>Manajemen hiperglikemia</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia Hasil; mengontrol dietnya, makanan yang perlu disiapkan 	SRI ASTUTI

		<p>WITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin memingkat (misalnya, penyakit kekambuhan) Hasil: CKD (Chronic Kidney Disease) - Memonitor kadar glukosa darah, Hasil: 201 mg/dl/ 8jam, 197 mg/dl/8 jam. - Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia polyuria, polydipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, dan sakit kepala) Hasil: tampak klien buang air kecil lebih sering dan tampak pasien terbaring lemah ditempat tidur - Memonitor intoke dan output cairan <p style="text-align: center;"> Hasil: $BC = Input - (Output + IWL)$ $= 1441 - (1.080 + 1.200)$ $= 1441 - 2280$ $= -839cc$ </p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor keton urin, kadar analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik dan frekuensi nadi Hasil: TTV. TD:140/100 mmHg N:95X/menit P: 25X/menit S:36,5 derajat selsius <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meberikan cairan asupan oral Hasil: perawat tampak memberikan asupan cairan air minum melalui selang NGT. - Mengkonsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia membaik atau memburuk 	
		<p>09:15 WITA</p>		

		<p>09:25 WITA</p>	<p>Hasil: tampak glukosa dalam darah masih tinggi.</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan menghindari olahraga jika kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl <p>Hasil: tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan kepatuhan dalam diet dan olahraga <p>Hasil: perawat mematuhi program diet yang anjurkan untuk klien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urine, jika perlu - Mengajarkan pengelolaan diabetes(misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan pentingnya karbohidrat dan bantuan professional kesehatan) <p>Hasil: keluarga klien mengatakan bisa melakukan penggunaan pemberian insulin, memonitor asupan cairan</p>	
		<p>09:30 WITA</p>	<p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkolaborasi pemberian insulin <p>Hasil: pemberian insulin novorapid 4 iu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkolaborasi pemberian cairan IV <p>Hasil: kurang lebih 4 gelas air minum dalam sehari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkolaborasi pemberian kalium <p>Hasil: zink 20 mg/12jam, B.Comp 2 tab/8jam</p>	
3	Perfusi perifer tidak efektif	<p>Jumat, 26 Agustus</p> <p>09:40 WITA</p>	<p>Perawatan sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu ankle-brachial indek) <p>Hasil: N:95X/menit, tampak ada edema pada kaki dan tangan,</p>	SRI ASTUTI

		<p>09:50 WITA</p>	<p>kapiler <3 detik, suhu: 36.5 derajat selsius</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi) Hasil: keluarga klien mengetahui faktor risiko sirkulasi - Memonitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermitas Hasil: keluarga klien mampu memahami ketika panas, kemerahan dan rasa nyeri ketika merasakan. <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - menghindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi Hasil: keluarga klien dapat mengenal dan menghindari ketika ketika pada saat perawatan mengambil darah didaerah keterbatasan perfusi - Mengindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi Hasil: perawat dapat menghindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi - Melakukan pencegahan infeksi - Hasil; perawat mencuci tangan sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan - melakukan perawatan kaki dan kuku hasil; perawat dapat melakukan perawatan kuku dan kaki pada klien - melakukan hidrasi Hasil: perawat dapat menengerti ketika merasa dehidrasi 	
--	--	------------------------------	--	--

		10:00 WITA	Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan berhenti merokok Hasil: klien berhenti merokok	
4	Gangguan mobilitas fisik	Jumat, 26 Agustus 2022 10:05 WITA 10;10 WITA 10:20 WITA	Pengaturan posisi Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi Hasil : Sebelum Rr: 25x/i, HR:95X/i, SPO2 98 % Setelah perubahan posisi: Rr:23 x/i, HR : 100 x/i, SPO2 99 % Trapeutik <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan tempat tidur bagian kepala Hasil : perawat mengatur tempat tidur dibagian kepala pasien 30°-45° <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan topangan pada area edema Hasil : perawat memberikan bantal pada bagian bawah lengan klien <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah posisi setiap 2 jam Hasil : perawat melakukan perubahan pasien setiap 2 jam <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah posisi dengan teknik log roll Hasil : perawat mengubah posisi pasien dengan teknik log roll Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan saat akan dilakukan perubahan posisi Hasil : perawat menyampaikan kepada pasien walaupun dalam keadaan tidur kegiatan yang di lakukan.	SRI ASTUTI

5	Deficit perawatan diri	<p>Jumat 26 Agustus 2022</p> <p>10:25 WITA</p> <p>10:30 WITA</p>	<p>Dukungan perawatan diri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tingkat kemandirian pasien Hasil : Pasien tidak dapat melakukan apapun secara mandiri, dan dibantu secara total oleh perawat - Mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri Hasil : pasien dibantu dalam menyediakan alat mandi dan alat untuk oral hygiene <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan yang terapeutik Hasil : pada saat dibantu untuk perawatan diri pada pasien, perawat menjaga privacy pasien dengan menutup sampiran - Menyiapkan keperluan pribadi pasien Hasil : perawat membantu menyediakan sabun, tissue basah dan kering, sikat gigi serta pasta gigi yang mengandung clorhixidine 0,5 % - Mendampingi dalam melakukan perawatan diri pasien Hasil : perawat membantu mulai dari awal sampai akhir perawatan diri pasien - Menjadwalkan rutin perawatan diri pasien Hasil : perawatan diri pasien dilakukan setiap hari 	SRI ASTUTI
---	------------------------	---	--	------------

6	Gangguan integritas kulit/jaringan	<p>Jumat 26 Agustus 2022 WITA</p> <p>10:35 WITA</p>	<p>Perawatan luka tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kondisi luka <p>Hasil : luka dekubitus sebesar koin, luka derajat II, warna dasar luka merah, terdapat eksudat, tepi luka berwarna hitam</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan kulit disekitar luka dengan sabun dan air <p>Hasil : perawat mebersihkan area disekitar luka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan luka bagian dalam menggunakan Nacl <p>Hasil : pada saat membersihkan luka bagian dalam, perawat menggunakan Nacl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoleskan salep <p>Hasil: perawat mengoleskan salep serta pasien di berikan kapsul fujimin untuk membantu mengeringkan luka, serta mempercepat proses penyembuhan luka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembalutan pada luka <p>Hasil : setelah dibersihkan dan diberi salep, perawat membalut luka menggunakan kasa dan hypafix</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan tempat tidur khusus <p>Hasil : pasien menggunakan kasur khusus dekubitus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam <p>Hasil : perawat mengubah posisi pasien setiap 2 jam</p>	SRI ASTUTI
7	Risiko infeksi	<p>Jumat 26 Agustus 2022 WITA</p> <p>10: 50 WITA</p>	<p>Mencegah Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Hasil : perawat mengetahui tanda dan gejala infeksi yang terjadi pada klien</p> <p>Terapeutik</p>	SRI ASTUTI

		<p>11: 00 WITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membatasi jumlah pengunjung Hasil : perawat membattasi jumlah keluarga yang menjenguk klien - Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien Hasil : perawat mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan klien untuk menghindari transmisi kuman dan virus <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi Hasil : perawat memberikan motivasi kepada klien untuk meningkatkan asupan nutrisi 	
--	--	--------------------------------------	---	--

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN HARI KETIGA

Inisial klien : Tn. P

Ruangan : ICU

No. RM : 968410

Dx.Medis : DM (Diabetes Melitus)

No	DX. Kep	Waktu	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1	Bersihkan jalan napas tidak efektif	Sabtu, 27 Agustus 2022 14:00 WITA	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor bunyi napas Hasil: Ada suara nafas tambahan bunyi ronchi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memposisikan pasien dalam posisi supinasi Hasil: Pasien dalam posisi siap untuk dilakukan suction - Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil: Jalan napas pasien jadi bersih setelah mengeluarkan secret yang tertahan - Memberikan oksigen, jika perlu Hasil: Pasien tampak bernapas dengan bantuan alat trakeostomi dan tampak lebih nyaman <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tindakan nebu NaCl 0,5 untuk mengencerkan dahak Hasil: Setelah 1 jam pemberian nebu, dahak pasien jadi encer 	SRI ASTUTI
2	Ketidakstabilan glukosa dalam darah	Sabtu, 22 Agustus 2022 14: 20 WITA	<p>Manajemen hiperglikemia</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia Hasil; mengontrol dietnya, makanan yang perlu disiapkan 	SRI ASTUTI

			<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin memingkat (misalnya, penyakit kekambuhan) Hasil: CKD (Chronic Kidney Disease) - Memonitor kadar glukosa darah, Hasil: 95 mg/dl/ 8jam, 144mg/dl/8 jam. - Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia polyuria, polydipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, dan sakit kepala) Hasil: tampak klien buang air kecil lebih sering dan tampak pasien terbaring lemah ditempat tidur - Memonitor intoke dan output cairan Hasil: BC = Input – (Output + IWL) = 1557 – (1.080+1.200) = 1557- 2280 = -723cc - Memonitor keton urin, kadar analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik dan frekuensi nadi Hasil: TTV. TD:130/90 mmHg N:91X/menit P: 23X/menit S:36,5 derajat selsius <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meberikan cairan asupan oral Hasil: perawat tampak memberikan asupan cairan air minum melalu selang NGT. - Mengkonsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia membaik atau memburuk Hasil:, tampak glukosa dalam darah masih tinggi. <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan menghindari olahraga jika kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl 	
		14: 40 WITA		
		14: 45 WITA		

		14: 55 WITA	<p>Hasil: tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan kepatuhan dalam diet dan olahraga <p>Hasil: perawat mematuhi program diet yang anjurkan untuk klien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urine, jika perlu - Menganjurkan pengelolaan diabetes(misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan pentingnya karbohidrat dan bantuan professional kesehatan) <p>Hasil: keluarga klien mengatakan bisa melakukan penggunaan pemebrian insulin, memonitor asupan cairan</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkolaborasi pemberian insulin <p>Hasil: pemberiaan insulin novorapid 4 iu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkolaborasi pemberian cairan IV <p>Hasil: kurang lebih 4 gelas air minum dalam sehari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkolaborasi pemberian kalium <p>Hasil: zink 20 mg/12jam, B.Comp 2 tab/8jam</p>	
3	Perfusi perifer tidak efektif	sabtu, 27 Agustus 15: 00 WITA	<p>Perawatan sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edama, pengisian kapiler, warna, suhu ankle-brachial indek) <p>Hasil: N:91X/menit, tampak ada edama pada kaki dan tangan, kapiler <3 detik, suhu: 36.5 derajat selsius</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tingg) <p>Hasil: kelurga klien mengetahui faktor risiko sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada 	SRI ASTUTI

		<p>15: 10 WITA</p> <p>ekstermintas Hasil: keluarga klien mampu memahami ketika panas, kemerahan dan rasa nyeri ketika merasakan.</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi Hasil: keluarga klien dapat mengenal dan menghindari ketika ketika pada saat perawatan mengambil darah didaerah keterbatasan perfusi - Menghindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi Hasil: perawat dapat menghindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi - Melakukan pencegahan infeksi - Hasil; perawat mencuci tangan sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan - melakukan perawatan kaki dan kuku hasil; perawat dapat melakukan perawatan kuku dan kaki pada klien - melakukan hidrasi Hasil: perawat dapat menengerti ketika merasa dehidrasi <p>15: 30 WITA</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan berhenti merokok Hasil: klien berhenti merokok 	
4	Gangguan mobilitas fisik	<p>sabtu, 26 Agustus 2022 15: 35 WITA</p> <p>Pengaturan posisi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi Hasil : Sebelum Rr: 24x/i, HR:91X/i, SPO2 99 % 	SRI ASTUTI

		<p>15:40 WITA</p>	<p>Setelah perubahan posisi: Rr:23 x/i, HR : 100 x/i, SPO2 100 %</p> <p>Trapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meninggikan tempat tidur bagian kepala Hasil : perawat mengatur tempat tidur dibagian kepala pasien 30°-45° - Memberikan topangan pada area edema Hasil : perawat memberikan bantal pada bagian bawah lengan klien - Mengubah posisi setiap 2 jam Hasil : perawat melakukan perubahan pasien setiap 2 jam - Mengubah posisi dengan teknik log roll Hasil : perawat mengubah posisi pasien dengan teknik log roll <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan saat akan dilakukan perubahan posisi Hasil : perawat menyampaikan kepada pasien walaupun dalam keadaan tidur kegiatan yang di lakukan. 	
5	Deficit perawatan diri	<p>Jumat 26 Agustus 2022</p> <p>16:10 WITA</p> <p>16:20</p>	<p>Dukungan perawatan diri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tingkat kemandirian pasien Hasil : Pasien tidak dapat melakukan apapun secara mandiri, dan dibantu secara total oleh perawat - Mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri Hasil : pasien dibantu dalam menyediakan alat mandi dan alat untuk oral hygiene <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lingkungan yang terapeutik Hasil : pada saat dibantu untuk perawatan diri pada 	SRI ASTUTI

		WITA	<p>pasien, perawat menjaga privacy pasien dengan menutup sampiran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan keperluan pribadi pasien <p>Hasil : perawat membantu menyediakan sabun, tissue basah dan kering, sikat gigi serta pasta gigi yang mengandung clorhixidine 0,5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi dalam melakukan perawatan diri pasien <p>Hasil : perawat membantu mulai dari awal sampai akhir perawatan diri pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan rutin perawatan diri pasien <p>Hasil : perawatan diri pasien dilakukan setiap hari</p>	
6	Gangguan integritas kulit/jaringan	<p>sabtu 27 Agustus 2022 WITA 17:00 WITA</p>	<p>Perawatan luka tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kondisi luka <p>Hasil : luka dekubitus sebesar koin, luka derajat II, warna dasar luka merah, terdapat eksudat, tepi luka berwarna hitam</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan kulit disekitar luka dengan sabun dan air <p>Hasil : perawat mebersihkan area disekitar luka <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan luka bagian dalam menggunakan Nacl <p>Hasil : pada saat membersihkan luka bagian dalam, perawat menggunakan Nacl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoleskan salep <p>Hasil: perawat mengoleskan salep serta pasien di berikan kapsul fujimin untuk membantu mengeringkan luka, serta mempercepat proses penyembuhan luka</p> </p>	SRI ASTUTI

			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembalutan pada luka Hasil : setelah dibersihkan dan diberi salep, perawat membalut luka menggunakan kasa dan hypafix - Menggunakan tempat tidur khusus Hasil : pasien menggunakan kasur khusus dekubitus - Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam Hasil : perawat mengubah posisi pasien setiap 2 jam 	
7	Risiko infeksi	<p>sabtu 27 Agustus 2022 17: 40 WITA</p> <p>18: 00 WITA</p>	<p>Mencegah Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil : perawat mengetahui tanda dan gejala infeksi yang terjadi pada klien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membatasi jumlah pengunjung Hasil : perawat membattasi jumlah keluarga yang menjenguk klien - Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien Hasil : perawat mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan klien untuk menghindari transmisi kuman dan virus <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi Hasil : perawat memberikan motivasi kepada klien untuk meningkatkan asupan nutrisi 	SRI ASTUTI

4.1.5 EVALUASI KEPERAWATAN

No	No. DX. Kep	Waktu	Evaluasi (SOAP)	Nama Jelas
1	1	Kamis, 25 agustus 2022 10:40 WITA	S: Tidak dapat dikaji O: - Terdapat suara napas tambahan ronchi - Frekuensi pernapasan 24 x/menit - Terdapat sekret - Pasien tidak mampu batuk efektif A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif P: Intervensi dilanjutkan - Monitor bunyi napas - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu - Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak	SRI ASTUTI

2	2	Kamis, 25 agustus 2022 11:00 WITA	<p>Manajemen hiperglikemia</p> <p>S:-</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak makanan diberikan bubur saring - Tampak hasil pemeriksaan kadar glukosa darah masih tinggi, 273 mg/dl/ jam, 189 mg/dl/jam, 246 mg/dl - tampak klien buang air kecil lebih sering - tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma) - Tampak Hasil: TTV. TD:161/105 mmHg N:95X/menit P: 24X/menit S:36,5 derajat selsius - Tampak klien diberikan suntikan insulin 4 iu <p>A: manajemen hiperglikemia</p> <p>P: intervensi dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pemeriksaan kadar glukosa darah - Monitor pemberian insulin - Monitor pemantauan pemberian asupan makan 	SRI ASTUTI
3	3	Kamis, 25 Agustus 2022 11:30 WITA	<p>Perawatan sirkulasi</p> <p>S:</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak nadi perifer: 95X/menit, - Tampak ada edema pada kaki dan tangan, - Tampak pengisian kapiler <3 detik. - Tampak ada pembekakan pada tangan dan kaki 	SRI ASTUTI

			<ul style="list-style-type: none"> - Tampak klien dehidrasi - tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma) - hb: 11.0 (NN:12.00-16.00) <p>A: perawatan sirkulasi</p> <p>P: intervensi dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemeriksaan sirkulasi perifer - identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi misalnya diabetes mellitus - identifikasi penurunan tingkat energy - ciptakan lingkungan yang tenang 	
4	4	<p>Kamis, 25 Agustus 2022</p> <p>11:40 WITA</p>	<p>Gangguan mobilitas fisik</p> <p>S: -</p> <p>O: tampak pasien lemah, kekuatan otot menurun, dengan ekstremitas atas dan bawah tampak bengkak</p> <p>A: Gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dipertahankan</p> <p>Pengaturan posisi setiap 2 jam</p>	SRI ASTUTI
5	5	<p>Kamis, 25 Agustus 2022</p> <p>11:50 WITA</p>	<p>Defisit perawatan diri</p> <p>S : -</p> <p>O: Tampak klien tidak mampu untuk melakukan perawatan diri secara mandiri, semua di bantu oleh perawat</p> <p>A: Defisit perawatan diri belum teratasi</p>	SRI ASTUTI

			<p>P : Intervensi di pertahankan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan lingkungan yang terapeutik 2. Dampingi dalam perawatan diri 	
6	6	<p>Kamis, 25 Agustus 2022</p> <p>12:00 WITA</p>	<p>Gangguan integritas kulit/jaringan</p> <p>S : -</p> <p>O: tampak ada luka dekubitus, tampak ada luka post tracheostomy H+1</p> <p>A: Gangguan integritas kulit/jaringan belum teratasi</p> <p>P : Intervensi di lanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat luka dekubitus Atur posisi setiap 2 jam 	SRI ASTUTI
7	7	<p>Kamis, 25 Agustus 2022</p> <p>12:10 WITA</p>	<p>Risiko infeksi</p> <p>O: tampak ada luka post tracheostomi H+1 (tracheo life), terpasang infus, NGT, CVT, ETT, Chateter, dan tampak ada luka dekubitus</p> <p>A : Risiko infeksi belum terasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pencegahan infeksi 2. reposisi setiap 2 jam 	SRI ASTUTI

8	2	<p>Jumat, 26 Agustus 2022</p> <p>11:00 WITA</p>	<p>Manajemen hiperglikemia</p> <p>S:-</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak makanan diberikan bubur saring - Tampak hasil pemeriksaan kadar glukosa darah masih tinggi, 201 mg/dl/ jam, 197 mg/dl/jam, 246 mg/dl - Tampak klien buang air kecil lebih sering - Tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma) - Tampak Hasil: TTV. TD:140/100 mmHg N:95X/menit P: 24X/menit S:36,5 derajat selsius - Tampak klien diberikan suntikan insulin 4 iu <p>A: Manajemen hiperglikemia</p> <p>P: Intervensi dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pemeriksaan kadar glukosa darah - Monitor pemberian insulin - Monitor pemantuan pemberian asupan makan 	SRI ASTUTI
9	3	<p>Jumat, 26 agustus 2022</p> <p>11:10 WITA</p>	<p>Perawatan sirkulasi</p> <p>S:</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak nadi perifer: 95X/menit, - Tampak ada edema pada kaki dan tangan, - Tampak pengisian kapiler <3 detik. - Tampak ada pembekakang pada tangan dan kaki 	SRI ASTUTI

			<ul style="list-style-type: none"> - Tampak klien dehidrasi - tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma) - hb: 11.0 (NN:12.00-16.00) <p>A: Perawatan sirkulasi</p> <p>P: Intervensi dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan sirkulasi perifer - Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi misalnya diabetes mellitus - Identifikasi penurunan tingkat energy - Ciptakan lingkungan yang tenang 	
10	4	<p>Jumat, 26 Agustus 2022</p> <p>11:20 WITA</p>	<p>Gangguan mobilitas fisik</p> <p>S: -</p> <p>O: Tampak pasien lemah, kekuatan otot menurun, dengan ekstremitas atas dan bawah tampak bengkak</p> <p>A: Gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dipertahankan</p> <p>Pengaturan posisi setiap 2 jam</p>	SRI ASTUTI
11	5	<p>Jumat, 26 agustus 2022</p> <p>11:30 WITA</p>	<p>Defisit perawatan diri</p> <p>S : -</p> <p>O: Tampak klien tidak mampu untuk melakukan perawatan diri secara mandiri, semua di bantu oleh perawat</p> <p>A: Defisit perawatan diri belum teratasi</p>	SRI ASTUTI

			<p>P : Intervensi di pertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan lingkungan yang terapeutik - Melakukan perawatan Oral hygiene 	
12	6	<p>Jumat, 26 agustus 2022</p> <p>11:40 WITA</p>	<p>Gangguan integritas kulit/jaringan</p> <p>S : -</p> <p>O: Tampak ada luka dekubitus, tampak ada luka post tracheostomy H+2</p> <p>A: Gangguan integritas kulit/jaringan belum teratasi</p> <p>P : Intervensi di lanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rawat luka dekubitus - Atur posisi setiap 2 jam 	SRI ASTUTI
13	7	<p>Jumat, 26 agustus 2022</p> <p>13:00 WITA</p>	<p>Risiko infeksi</p> <p>O: tampak ada luka post tracheostomi H+1 (tracheo life), terpasang infus, NGT, CVT, ETT, Chateter, dan tampak ada luka dekubitus</p> <p>A : Risiko infeksi belum terasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <p>1. Pencegahan infeksi</p>	SRI ASTUTI

			2. Reposisi setiap 2 jam	
14	1	Sabtu, 27 agustus 2022 14:50 WITA	<p>S: Tidak dapat dikaji</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suara napas tambahan ronchi - Frekuensi pernapasan 22 x/menit - Terdapat sekret - Pasien tidak mampu batuk efektif <p>A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor bunyi napas - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu <p>Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak</p>	SRI ASTUTI

15	2	Sabtu, 27 agustus 2022 15:00 WITA	<p>Manajemen Hiperglikemia</p> <p>S:-</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak makanan diberikan bubur saring - Tampak hasil pemeriksaan kadar glukosa darah masih tinggi, 95 mg/dl/ jam, 144 mg/dl - Tampak klien buang air kecil lebih sering - tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma) - Tampak Hasil: TTV. TD:130/90 mmHg N:100X/menit P: 23X/menit S:36,5 derajat selsius - Tampak klien diberikan suntikan insulin 4 iu <p>A: Manajemen hiperglikemia</p> <p>P: Intervensi dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pemeriksaan kadar glukosa darah - Monitor pemberian insulin - Monitor pemantuan pemberian asupan makan 	SRI ASTUTI
16	3	Sabtu, 27 agustus 2022 15:20 WITA	<p>Perawatan Sirkulasi</p> <p>S:</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak nadi perifer: 100X/menit, - Tampak ada edema pada kaki dan tangan, - Tampak pengisian kapiler <3 detik. - Tampak ada pembekakang pada tangan dan kaki 	SRI ASTUTI

			<ul style="list-style-type: none"> - Tampak klien dehidrasi - tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma) - hb: 11.0 (NN:12.00-16.00) <p>A: perawatan sirkulasi</p> <p>P: intervensi dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemeriksaan sirkulasi perifer - identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi misalnya diabetes mellitus - identifikasi penurunan tingkat energy - ciptakan lingkungan yang tenang 	
17	5	<p>Sabtu, 27 agustus 2022</p> <p>15:30 WITA</p>	<p>Defisit perawatan diri</p> <p>S : -</p> <p>O: tampak klien tidak mampu untuk melakukan perawatan diri secara mandiri, semua di bantu oleh perawat, tampak mulut pasien bersih, bibir klien tidak kering dan plak yang menempel di gigi klien sudah berkurang</p> <p>A: defisit perawatan diri belum teratasi</p> <p>P : intervensi di pertahankan</p> <p>1. Dukungan perawatan diri</p>	SRI ASTUTI
18	4	<p>Sabtu, 27 agustus 2022</p>	<p>Gangguan mobilitas fisik</p> <p>S: -</p> <p>O: tampak pasien lemah, kekuatan otot menurun, dengan ekstremitas atas dan bawah bengkak sudah menurun dan sudah mulai digerakkan</p>	SRI ASTUTI

		14:00 WITA	A: Gangguan mobilitas fisik belum teratasi P : Intervensi dipertahankan 1. Pengaturan posisi setiap 2 jam	
19	6	Sabtu, 27 agustus 2022 17:00 WITA	Gangguan integritas kulit/jaringan S : - O: tampak ada luka dekubitus, tampak ada luka post tracheostomy H+3 A: Gangguan integritas kulit/jaringan belum teratasi P : intervensi di lanjutkan 2. Rawat luka dekubitus 3. Atur posisi setiap 2 jam	SRI ASTUTI
20	7	Sabtu, 27 agustus 2022 19:00 WITA	Risiko infeksi O: tampak ada luka post tracheostomi H+3 (tracheo life), terpasang infus, NGT, CVT, ETT, Chateter, dan tampak ada luka dekubitus A : Risiko infeksi belum terasi P : Intervensi dilanjutkan 1. pencegahan infeksi 2. reposisi setiap 2 jam	SRI ASTUTI

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pasien atas nama Tn. P usia 70 tahun asal Selayar merupakan pasien dengan kasus Diabetes mellitus mengakibatkan hiperglikemia. Diabetes mellitus yang dialami oleh Tn. P dimana glukosa dalam darah tinggi. Maka Tn. P harus dipantau glukosa dalam darah dengan memeriksa kadar glukosa darah sewaktu. Tn.P sebelumnya pernah dirawat di salah satu rumah sakit Swasta Hermina, dan kemudian di rujuk ke Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan sekarang berada di ruang ICU selama 7 hari. Pengkajian di lakukan di ruang ICU, alasan pasien di rujuk karena pasien mengalami kesadaran menurun, saat ini pasien terpasang ventilator, terpasang ETT,infus, NGT,serta chateter urine. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien memiliki riwayat penyakit keturunan yaitu hipertensi.

Penyakit diabetes melitus (DM) yang di alami Tn. P merupakan sebuah penyakit, di mana kondisi kadar glukosa di dalam darah melebihi batas normal. Hal ini disebabkan karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas dan merupakan zat utama yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kadar gula darah dalam tubuh agar tetap dalam kondisi seimbang. Insulin berfungsi sebagai alat yang membantu gula

berpindah ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi (Elisa Oktaviana, Dkk. 2022).

Diabetes Melitus (DM) merupakan sekelompok kelainan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia yang diakibatkan dari kurangnya sekresi insulin, gangguan metabolisme insulin, atau keduanya. Definisi yang lain menyebutkan bahwa Diabetes mellitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolisme yang bersifat kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein (Rizana Fajrunni'mah, et al., 2021).

Diabetes mellitus tipe 2 adalah suatu penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar glukosa darah (Suryati, 2021). Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin yang mencukupi atau karena insulin tidak dapat digunakan dengan baik (resistensi insulin). Resistensi insulin yang terjadi pada diabetes tipe 2 ditingkatkan oleh kegemukan mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus dalam keluarga dan tidak beraktivitas (Manurung, 2018). Sepanjang hari kadar glukosa dalam darah akan berfluktuasi dan meningkat setelah mengkonsumsi makanan. Kadar glukosa berada pada level terendah pada pagi hari sebelum makan atau sebelum makan pertama pada hari itu. Pada saat itu, pankreas akan terus menskresi insulin dalam jumlah sedikit, sementara glukagon dilepaskan ketika kadar glukosa darah menurun dan menstimulasi untuk melepaskan cadangan glukosanya sehingga insulin dan glukagon

berpesan untuk mempertahankan kadar gula darah bersama-sama. (Rizana Fajrunni'mah, et al., 2021)

Terjadinya ketidakstabilan kadar glukosa darah pada Tn.P adalah kadar glukosa darah meningkat. diabetes mellitus diawali dengan terjadinya resistensi insulin kemudian terjadilah peningkatan sekresi insulin untuk mengkompensasi terjadinya resistensi insulin tersebut agar kadar glukosa darah tetap dalam rentang normal. Lama kelamaan sel beta ini akan tidak sanggup lagi untuk terus mengkompensasi resistensi insulin ini sehingga kadar glukosa darah menjadi meningkat dan fungsi sel beta semakin menurun (Suyono et al., 2015). Terjadinya resistensi insulin yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam darah dengan diabetes mellitus dapat disebabkan karena kegemukan, sering konsumsi makanan mengandung lemak dan juga kurangnya aktivitas fisik.

Kondisi ini telah disampaikan dalam Al-Qur'an Asy-Syura/42:30 yang berbunyi:

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)

Terjemahnya:

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”.

Makna ayat di atas ialah, bahwasanya musibah yang akan menimpa umat manusia di muka bumi kapan dan dimanapun akan terjadi, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan, paling tidak disebabkan oleh kecerobohan

atau ketidak hati-hatianmu. Musibah yang dialami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahanmu karena Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak mengakibatkan musibah atas diri kamu. seandainya pemaafan itu tidak dilakukan-Nya, pastilah kamu semua binasa bahkan tidak akan ada satu binatang melatapun di pentas bumi ini (Shihab, 2012). Keterkaitan antara ayat di atas dengan kasus yang diangkat ialah menunjukkan bahwa setiap kejadian di muka bumi ini pasti ada penyebabnya yang bisa jadi merupakan akibat dari perbuatan tangan sendiri. Misalnya mengambil sesuatu atau memakan yang bukan haknya dengan berlebihan dapat menyebabkan terjadinya obesitas yang mempengaruhi sel beta dan mengubah kemampuannya untuk mengenal dan menyebarkan rangsangan jaringan senyawa insulin kedalam tubuh.

Seperti firman Allah dalam (SQ. Al-Baqarah ayat 195) yang berbunyi:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Al-Sa'`di menafsirkan kata al-tahlukah dalam surat al-Baqarah ayat 195 yaitu tindakan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan itu erpulang pada dua perkara; meninggalakan perkara pertama, yang diperintahkan kepada hamba apabila tindakan meninggalkannya itu mengharuskan atau mendekatkan kepada

rusaknya tubuh atau jiwa, Kedua, melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh, maka perkara ini meliputi banyak sekali hal-hal lainnya. Di antaranya adalah meninggalkan jihad di jalan Allah swt. atau berinfak padanya, yang menyebabkan penguasaan musuh, termasuk juga seorang yang menjatuhkan dirinya dalam peperangan atau perjalanan yang menakutkan atau ditempat binatang buas atau ular, atau yang memanjat pohon atau bangunan.

Dilihat dari penjelasan al-Sa'di tentang penafsiran kata al-tahlukah dalam surat al-Baqarah ayat 195 di atas maka dapat diketahui bahwa al tahlukah dapat diartikan pertama kebinasaan tersebut terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. sehingga mengakibatkan hilangnya jiwa dan ruh, seperti meninggalkan jihad. Ketika seseorang meninggalkan jihad pada waktu yang dibutuhkannya jihad maka itu akan membuat hilangnya ruh atau jiwa dalam artian hilangnya kebebasan atau kemerdekaan dalam diri seseorang atau hal lainnya yang merugikan. Kedua yang dimaksud disini adalah melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya jiwa seseorang seperti berjalan di tempat yang terdapat padanya ada kejahatan. Dewasa ini berbagai macam cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan jiwa atau mengakhiri hidupnya dengan hal-hal yang menggerikan seperti bunuh diri terjun dari gedung yang tinggi. Maka perbuatan seperti inilah yang dilarang Allah swt.. Karena ia mencampakan pelakunya ke dalam kebinasaan. (Tafsir as-Sa'di, 2016). Makna ayat dengan kasus ini adalah apapun perbuatan yang Allah larang maka jangan lakukan yang akan mengakibatkan terjadinya musibah yang menimpamu baik berupa penyakit maupun hilangnya jiwa. Apa pun yang Allah larang untuk kebaikan manusia dan menghindarkan dari kebinasaan dirinya sendiri.

Pada saat Pengkajian dilakukan pada tgl 25 Agustus 2022 di ruang ICU Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, pengkajian dilakukan pada Tn.P

dengan diagnosis Diabetes mellitus dan terdapat beberapa penyakit penyerta yaitu *Chronic Kidney Disease*, dan Hipertensi. Pasien masuk rumah sakit dengan ditemukan keluhan utama berupa pasien mengalami penurunan kesadaran, sesak napas dan glukosa dalam darah tinggi. Keluarga pasien mengatakan pasien memiliki riwayat penyakit CKD, TB paru, hipertensi dan diabetes. Berdasarkan hasil pengkajian ditemukan data kadar glukosa dalam darah tinggi, tampak mulut kering, tidak mampu batuk efektif dan Tampak terpasang *tracheostomy tube*, Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer dan pasien terpasang trakeostomi, dan terdapat suara napas tambahan ronchi di kedua lapang paru. Adapun tanda-tanda vital nya yaitu TD:160/82 mmHg, HR : 105 x/menit, RR : 24 x/menit, SUHU: 37.2⁰c, SPO2 : 96 %. Dan Nilai GCS:4 (Semi-Coma), Kulit tampak pucat, pasien Tampak kapiler <3 detik. Akral teraba dingin, konjungtiva tampak anemis, HB: 11.0 gr/dl, tidak mampu merawat dirinya, Terdapat luka decubitus, Skor Barthel Index: 0 (ketergantungan total), pasien terpasang kateter urine dan NGT serta ETT.

Pada kaitannya dengan praktik keperawatan, jika melihat defenisi ilmu keperawatan Henderson bahwa pemberi asuhan keperawatan langsung pada pasien merupakan tugas utama perawat. Manfaat dari asuhan keperawatan ini nampak dari kemajuan dari kondisi pasien, yang pada awalnya bergantung pada orang lain hingga akhirnya menjadi mandiri. Perawat dapat membantu pasien dalam hal ini dengan mengkaji, merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 14 komponen penanganan perawatan dasar (Risna & Irwan, 2021).

Sehingga Berdasarkan hasil pengkajian peneliti mengangkat 7 diagnosis keperawatan yaitu ketidakstabilan glukosa darah dibuktikan dengan keluarga klien mengatakan klien sudah 2 tahun mengalami penyakit

diabetes mellitus, tampak glukosa darah tinggi, tampak mulut kering. Bersihan jalan napas tidak efektif dibuktikan dengan Pasien tampak tidak mampu batuk efektif dan Tampak terpasang *tracheostomy tube*, Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer dan pasien terpasang *tracheostomy*, dan terdapat suara napas tambahan ronchi di kedua lapang paru, Perfusi perifer tidak efektif dibuktikan dengan tanda-tanda vital nya yaitu TD :160/82 mmHg, HR : 105 x/menit, RR : 24 x/menit, SUHU: 36.5⁰c, SPO2 : 96 %. Dan Nilai GCS :4 (Semi-Coma), Kongjungtiva tampak anemis, Kulit tampak pucat. gangguan mobilitas fisik dibuktikan dengan keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu, dengan data objektif tampak klien lemas, tampak klien cenderung tidur, tampak klien enggang untuk melakukan pergerakan, tampak atvitas dibantu total dan kekuatan otot menurun 1 1 1 1. gangguan integritas kulit/jaringan dibuktikan tampak ada luka dikubitus dibokong pasien derajat 2 dengan diameter 10 cm kedalaman 1 cm, dan tampak luka kemerahan serta tampak ada edama pada kedua kaki dan tangan. Defisit perawatan diri dibuktikan dengan pasien Tampak tidak mampu merawat dirinya, Terdapat luka decubitus, Terdapat lesi gangrene, dan risiko infeksi dibuktikan dengan pasien terpasang ETT, terpasang NGT, terpasang *tracheostomy*, dan terpasang gastrik tube.

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respons manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau kerentangan respons dari seorang individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Diagnosis keperawatan biasanya berisi dua bagian yaitu

pengubah, fokus diagnosis, atau konsep kunci dari diagnosis (Hermand dkk 2015).

Diagnosis pertama yang di temukan pada kasus ini Bersihan jalan napas tidak efektif b.d hipersekresi jalan napas, dimana data yang menunjang penegakkan diagnosis ini adalah Tampak ada sputum di mulut dan di selang ETT pasien, Terdengar suara napas tambahan ronchi pada pasien, Tampak pasien susah untuk mengeluarkan batuknya, Tampak ada luka post tracheostomi pada pasien, Tampak pasien susah untuk berbicara. Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan memiliki definisi yaitu Ketidak mampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Gejala dan tanda mayor yang dapat ditemukan yaitu data objektif batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk, sputum berlebih/obstruksi dijalan nafas, mengi, wheezing, dan/atau ronchi kering. Sedangkan gejala dan tanda minor yang dapat ditemukan yaitu data subjektif dispnea, sulit bicara, ortopnea. dan pada data objektif dapat ditemukan yaitu gelisah, sianosis, bunyi nafas menurun, frekuensi nafas berubah, dan pola nafas berubah. Bersihan jalan nafas tidak efektif diakibatkan karena adanya infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah sehingga mengakibatkan peroduksi sputum meningkat dan mengakibatkan konsolidasi cairan sputum dijalan nafas. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Smeltzer dan Bare, 2013) bahwa bersihan jalan nafas tidak efektif karena adanya reaksi inflamasi yang dapat terjadi di alveoli, menghasilkan eksudat yang dapat mengganggu jalan nafas. Menurut penulis

diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan pada pasien 1, gejala dan tanda mayor yang didapatkan sudah memenuhi validasi untuk menegakkan diagnosis sesuai dengan buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) yaitu 80% hingga 100% data mayor.

Diagnosa kedua ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemia dengan adanya keluhan dari keluarga klien yang mengatakan bahwa selama 2 tahun terakhir gula darah klien tidak stabil, tampak mulut klien kering dan tampak glukosa darah tidak stabil. Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017), ketidakstabilan kadar glukosa darah dapat didefinisikan bahwa kadar glukosa darah naik/turun dan rentang normal yang dapat menyebabkan hiperglikemia dan hipoglikemia dengan gejala dan tanda mayor hiperglikemia data subjektif seperti lelah dan lelu sedangkan data objektif kadar glukosa dalam darah /urin tinggi. Gejala dan tanda minor dengan data subjektif seperti mulut kering, haus meningkat dan data objektif jumlah urin meningkat. Ketidakstabilan kadar glukosa darah menyebabkan defuse pancreas, resistensi insulin, gangguan toleransi glukosa darah dan gangguan glukosa darah puasa.

menurut (Elisa Oktaviana 2022), didapatkan bahwa responden yang memiliki Kadar Gula Darah Sewaktu < 200 mg/dL sebanyak 3 orang (10%) dan ≥ 200 mg/dL 27 orang (90%), sehingga dalam pelaksanaan ini dapat dinyatakan memiliki hasil mayoritas Kadar Gula Darah Sewaktu penderita Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Gunungsari relative tinggi

dan sebagian besar responden berada pada kelompok usia 51-60 tahun yakni sebanyak 20 orang (66,7%). Sepanjang hari kadar glukosa dalam darah akan berfluktuasi dan meningkat setelah mengkonsumsi makanan. Kadar glukosa berada pada level terendah pada pagi hari sebelum makan atau sebelum makan pertama pada hari itu. Pada saat itu, pancreas akan terus menskresi insulin dalam jumlah sedikit, sementara glucagon dilepaskan ketika kadar glukosa darah menurun dan menstimulasi untuk melepaskan cadangan glukosanya sehingga insulin dan glucagon berpesan untuk mempertahankan kadar gula darah bersama-sama.

Menurut (Irma & La Ode Alifariki 2020), penderita DM 100% memiliki keluhan terkait dengan penyakit DM dengan keluhan yang paling sering dialami oleh penderita DM yaitu polidipsia dan poliuria yaitu sebesar 85,71%. Hasil uji *Sensitifitas* dan *Spesifisitas* menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki keluhan banyak minum atau merasa haus yang berlebihan dan sering buang air kecil dapat dikatakan bahwa 86% adalah merupakan gejala dari DM. Pada hasil skrining ini tidak ada gejala atau keluhan utama dengan hasil uji spesifisitas yang menunjukkan angka 100%, ini dapat dipahami bahwa pada tahap awal penyakit DM belum menunjukkan adanya gejala atau keluhan yang khas. Selain itu penyakit DM juga dapat disebabkan oleh kumulatif dari berbagai faktor. Sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pada penyakit DM merupakan golongan penyakit yang susah dideteksi pada tahap-tahap awal dan sering tidak disadari oleh penderita (putri, 2015). Penelitian terdahulu yang sesuai dengan

penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Perdana yang menemukan bahwa sebanyak 75,5% responden yang mengalami DM menunjukkan keluhan polidipsia, polifagia dan poliuria. Seseorang memiliki risiko yang cukup tinggi apabila ia memiliki riwayat penderita DM dalam keluarganya, terutama dengan riwayat DM tipe 2 (putri, 2015).

Diagnosis ketiga perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan Penurunan konsentrasi hemoglobin dengan data penunjang yang menegakkan data Tampak kapiler >3 detik, Akral teraba dingin, Kulit tampak pucat, Konjuktiva tampak anemis, Hasil lab: RBC: 3.84 (NN 4.00-6.00), HB: 11.0 (NN:12.00-6.00), HCT: 34 (NN:37.00-48.00). Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017), perfusi perifer tidak efektif dapat didefinisikan penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh dengan gejala dan tanda mayor objektif seperti, pengisian kapiler <3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgo kulit menurun sedangkan gejala dan tanda minor subjektif seperti, parastesia, nyeri ekstremitas (klaudikasi intermiten). Data objektif seperti, edema, penyembuhan luka lama indeks ankle-bracheal <0,90, brut femoral. Perfusi perifer tidak efektif dapat menyebabkan hiperglikemia, penurunan konsentrasi hemoglobin, peningkatan tekanan darah, kekurangan volume cairan, penurunan aliran arteri/vena, kurang terpaparnya informasi tentang proses penyakit, dan kurang aktivitas fisik. Kondisi terkait dengan perfusi perifer tidak efektif

adalah diabetes mellitus, anemia, gagal jantung kongnitif, trombotis arteri dan tromboflebitis.

Diagnosa keempat Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan data penunjang Keluarga klien mengatakan klien merasa cepat lelah pada saat beraktivitas 1 minggu yang lalu, Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan, Tampak klien lemas, Tampak klien cenderung tidur, Tampak klien enggang untuk melakukan pergerakan dengan Kerkuatan otot 1,1,1,1. Gangguan mobilitas fisisk adalah keterbatasan dalam mengerakan fisik satu dari sati lebih ekstramitas secara manndiri. Hal ini sesuai dengan buku (SDKI, 2016) yang menjelaskan bahwa gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ektremitas secara mandiri. Tanda dan gejalanya yang dialami oleh Tn. P sesuai dengan buku (SDKI, 2016) bahwa gejala dan tanda mayor subjektif adalah mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, sedangkan gejala dan tanda mayor objektif adalah kekuatan otot menurun dan rentang gerak (ROM) menurun. Gejala dan tanda minor subjektif adalah sulit menggerakkan kaki, sedangkan gejala dan tanda minor objektif adalah sendi kaku.

Imobilisasi menyebabkan aktivitas dan tonus otot menjadi berkurang. Rangka pendukung tubuh yang terdiri dari empat tipe tulang, seperti panjang, pendek, pipih, dan irreguler disebut skeletal. Sistem skeletal berfungsi dalam pergerakan, melindungi organ vital, membantu mengatur keseimbangan kalsium, berperan dalam pembentukan sel darah merah.

Pengaruh imobilisasi yang cukup lama akan terjadi respon fisiologis pada sistem otot rangka. Respon fisiologis tersebut berupa gangguan mobilisasi permanen yang menjadikan keterbatasan mobilisasi. Keterbatasan mobilisasi akan mempengaruhi daya tahan otot sebagai akibat dari penurunan masa otot, atrofi dan stabilitas. Pengaruh otot akibat pemecahan protein akan mengalami kehilangan masa tubuh yang terbentuk oleh sebagian otot. Oleh karena itu, penurunan masa otot tidak mampu mempertahankan aktivitas tanpa peningkatan kelelahan. Selain itu juga terjadi gangguan pada metabolisme kalsium dan mobilisasi sendi. Gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri (Mansjoer & Suriadi dan Rita Y, 2016).

Selanjutnya untuk diagnosis kelima yaitu defisit perawatan diri, didapatkan hasil pengkajian Tampak pasien mengalami kesadaran menurun, Tampak klien tidak mampu untuk melakukan perawatan dirinya secara mandiri, Tampak pasien dibantu secara total oleh perawat untuk mandi, Oral Hygiene juga di bantu oleh perawat. Defisit perawatan diri adalah tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Data objektif ditemukan tidak mampu mandi, mengenakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri, minat melakukan perawatan diri kurang (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Menurut (Puspa, Rahmadhani, 2018), defisit perawatan diri disebabkan karena proses peradangan sehingga suplai O₂ ke otak menurun yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan sehingga penegakkan diagnosis defisit perawatan diri karena klien

tidak mampu untuk melakukan pemenuhan kebutuhan personal secara mandiri, sehingga dibutuhkan bantuan tenaga keperawatan untuk membantu melakukan perawatan diri. Menurut penulis diagnosis Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan pada pasien, gejala dan tanda mayor yang didapatkan sudah memenuhi validasi untuk menegakkan diagnosis sesuai dengan buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) yaitu 80% hingga 100% data mayor.

Berikutnya diagnosis keenam gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi dengan data penunjang Keluarga klien mengatakan sebelum masuk di Rs klien sudah ada luka pada bokong 2 minggu yang lalu, Tampak ada luka dikubitus pada bokong pasien derajat 2 dengan diameter 10 cm kedalaman 1 cm, Tampak luka kemerahan, Hematom, Tampak ada edema pada kedua kaki dan tangan. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017), gangguan integritas kulit/ jaringan adalah kerisakan kulit (dermis atau epidermis) sedangkan jaringan (membra mukosa, kornea, fasia, otot, tulang, tandong, kartilago dan kapsul sendi atau ligamen). Dapat penyebab perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, kurang/kelebihan volume cairan, penurunan mobilitas fisik, kelembapan dan perubahan hormonal. Gejala dan tanda mayor, kerusakan jaringan atau lapisan kulit dan tanda minor, nyeri, perdarahan, kemerahan, hematoma. Dengan kondisi terkait imobilit, gagal jantung kognitif, gagal ginjal dan diabetes mellitus.

Diagnosis terakhir adalah Resiko infeksi ialah beresiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik (PPNI, 2017). Menurut hasil penelitian, peneliti menegakkan diagnosa resiko infeksi pada klien 1 belum menggunakan buku SDKI. Berdasarkan buku SDKI, diagnosa keperawatan resiko infeksi, faktor resikonya yaitu efek prosedur invasif. Pada klien dibuktikan dengan terpasangnya infus, terpasang ventilator, terpasang ETT,NGT, dan baru di lakukan tracheostomy . Alasan peneliti menegakkan diagnosa tersebut yaitu kasus ini sesuai dengan teori bahwa sebanyak 70% pasien yang dilakukan rawat inap mendapatkan terapi cairan infus. Tetapi karena terapi ini diberikan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama tentunya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi dari pemasangan infus, salah satunya adalah infeksi (Herlina et al 2018).

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang di kerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang di harapkan (SIKI, 2018). Perencanaan keperawatan pada pasien dilakukan menggunakan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Perencanaan dilakukan setelah semua data yang terkumpul selesai dianalisa dan diprioritaskan. Perencanaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Perencanaan itulah yang nantinya akan dilakukan kepada klien untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Beberapa

tindakan yang dapat dilakukan kepada klien meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah manajemen jalan napas. Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil Produksi sputum menurun dan Frekuensi napas membaik. Menurut (Nursalam 2018). Intervensi Manajemen jalan napas yang diberikan tidakan suction atau penghisapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan napas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan secret pada klien yang tidak mampu mengeluarkan sendiri. Sebagai pasien mempunyai masalah di pernafasan yang memerlukan bantuan ventilator mekanik dan pemasangan ETT (Endon Trakeal Tube) dimana pemasangan ETT masuk sampai percabangan Bronkus pada saluran nafas. Pasien yang terpasang ETT dan ventilator maka respon tubuh pasien untuk mengeluarkan benda asing adalah mengeluarkan secret yang mana perlu dilakukan tindakan section. Section adalah suatu tindakan untuk membersihkan jalan napas dengan memakai kateter penghisap melalui nsotrakeal tube (NTT) orotracheal tube (OTT), tracheostomy (TT) pada saluran pernafasan bagian atas. Bertujuan untuk membebaskan jalan naps, mengurangi retensi sputum, merangsang batuk, mencegah terjadinya infeksi paru. Prosedur ini dikontraindikasikan pada klien yang mengalami kelainan yang dapat menimbulkan spasme laring

terutama sebagai akibat penghisapan melalui trakea gangguan perdarahan, edema laring, varises esophagus, perdarahan gaster, infark miokard (Basse Baessy Bulia Aziz, 2020)

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis ketidakstabilan kadar glukosa darah salah satunya adalah manajemen hiperglikemia. Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah Koordinasi kesadaran membaik. Berkeringat membaik, Mulut kering membaik, Kadar glukosa dalam darah membaik, Kadar glukosa dalam urine membaik. Menurut (qurotul aini nur ramadhani, 2019), pemeriksaan glukosa darah sewaktu adalah pemeriksaan glukosa pada pasien yang tidak puasa dan dapat dilakukan kapan saja. Pemeriksaan GDS sering dilakukan sebagai pemeriksaan penyaringan (screening) diabetes juga dilakukan rutin untuk pemantauan kadar glukosa darah pada pasien diabetes. Pemeriksaan glukosa darah dapat menggunakan specimen darah utuh, serum, dan plasma.

Menurut (Elisa Oktaviana, Dkk. 2022). Sepanjang hari kadar glukosa dalam darah akan berfluktuasi dan meningkat setelah mengkonsumsi makanan. Kadar glukosa berada pada level terendah pada pagi hari sebelum makan atau sebelum makan pertama pada hari itu. Pada saat itu, pancreas akan terus menskresi insulin dalam jumlah sedikit, sementara glucagon dilepaskan ketika kadar glukosa darah menurun dan menstimulasi untuk melepaskan cadangan glukosanya sehingga insulin dan glucagon berpesan untuk mempertahankan kadar gula darah bersama-sama. Pemeriksaan kadar

glukosa darah dapat dijadikan patokan untuk menegakkan status diabetes pada seseorang. Selain itu, pemeriksaan kadar glukosa darah juga digunakan sebagai monitoring kadar glukosa darah. Pemeriksaan kadar glukosa darah yang dianjurkan ialah dengan bahan plasma darah vena. Namun pemeriksaan kadar glukosa darah dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan alat glucometer. Pemeriksaan glukosa darah kapiler dapat dilakukan apabila tidak memungkinkan dan tidak tersedianya fasilitas untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah plasma vena.

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis perfusi perifer tidak efektif adalah perawatan sirkulasi. Menurut SLKI (2018) tujuan dari asuhan keperawatan adalah mengaharapkan masalah perfusi perifer tidak efektif membaik dengan krtiteri hasil Kulit pucat menuru, Edema perifer menurun sesuai dengan intervensi perawatan sirkulasi dengan berbagai Periksa sirkulasi perifer (mis. Nadi perifer, edama, pengisian kapiler, warna, suhu ankie-brachial indek), Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tingg), Monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermintas, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi, hindari pengukiran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi, hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area cedera, lakukan pencegahan infeksi, lakukan perawatan kaki dan kuku dan lakukan hidras serta anjurkan berhenti merokok, anjurkan berolahraga rutin

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis gangguan mobilitas fisik adalah pengaturan posisi. Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik meningkat. Menurut Hendra dkk (2011) mobilisasi didefinisikan menjadi penggantian posisi klien setiap dua jam yaitu miring kiri, telentang head up 30 derajat dan miring kanan). Untuk mencegah terjadinya kolonisasi orofaring dan kolonisasi lambung maka diperlukan tindakan pencegahan diantaranya *Head elevation of bed* dengan tujuan mengurangi terjadinya aspirasi aerodigesif (oroparingeal dan gastrointestinal), meningkatkan volume dan ventilasi paru pasien, serta memberikan keamanan pada saat pemberian makan melalui NGT. Merawat pasien dengan ventilasi mekanik dalam posisi semi telentang bertujuan untuk mencegah aspirasi lambung. Dalam sebuah penelitian observasional dimana pasien dengan posisi telentang mengalami aspirasi dari pada pasien dengan semi telentang (45°) (Thomas *et al*, 2016). Berdasarkan 19 studi yang ditinjau, kejadian VAP, biaya rumah sakit, tingkat kematian, dan durasi penggunaan ventilator mekanik pada pasien yang tempat tidurnya cenderung pada 45° atau 30-45° secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang berbaring dalam posisi terlentang (Najafi Ghezalje, T & Kalhor, L. 2016).

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis defisit perawatan diri adalah dukungan perawatan diri dan

perawatan mulut (oral hygiene). Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil mempertahankan kebersihan diri meningkat, mempertahankan kebersihan mulut meningkat. *Oral hygiene* merupakan tindakan mandiri keperawatan yang memiliki dampak besar dalam keberhasilan pencegahan VAP pada pasien dengan ventilator mekanik. Pada pasien di ICU, plak gigi terbentuk lebih cepat dari pada pasien lain (Kaya *et al*, 2017). Hasil beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa bakteri yang ada dalam plak gigi adalah penyebab pneumonia terkait ventilator (VAP) (Hillier *et al*, 2013). Bathia *et al* (2015) mengatakan tingkat pneumonia terkait ventilator (VAP) berkurang hingga 50% dan angka kematian berkurang dari 20% menjadi 13,9% dengan mengikuti pedoman perawatan mulut. Perawatan mulut atau *Oral Hygiene* harus dilakukan sesuai prosedur dengan tepat untuk mencegah mikroba mengkolonisasi dalam rongga mulut pasien kritis dengan ventilator mekanik di ICU (Purnama & Fikri, 2020). Kurang bersihnya *oral hygiene* dapat mengakibatkan kolonisasi mikroba di area orofaring dan trakhea, serta meningkatkan risiko aspirasi bila terjadi peningkatan sekret pada saluran pernapasan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya VAP pada pasien yang terintubasi.

Menurut SIKI (2018) intervensi yang diberikan pada masalah gangguan integritas kulit diberikan dua intervensi yaitu perawatan integritas kulit dan perawatan luka tekan berupa observasi: identifikasi penyebab gangguan integritas kulit (misal perubahan sirkulasi, perubahan status

nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan ekstrem, penurunan mobilitas), terapeutik: ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring, lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering, edukasi: anjurkan menggunakan pelembap, anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya dan intervensi perawatan luka tekan berupa observasi: monitor kondisi luka, monitor tanda dan gejala infeksi, terapeutik: bersihkan kulit di sekitar luka dengan sabun, oleskan salep jika perlu, jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien, selanjutnya risiko infeksi diberikan intervensi, observasi: monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, terapeutik: batasi jumlah pengunjung, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi, kolaborasi: kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien pertama dan kedua dengan masalah keperawatan risiko infeksi yaitu pencegahan infeksi. Menurut SIKI (2018) intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan risiko infeksi adalah monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, jelaskan tanda dan gejala infeksi, jelaskan cara mencuci tangan dengan benar, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, berikan antibiotik. Berdasarkan studi kasus pada pasien satu dan dua semua intervensi pada diagnosa keperawatan risiko infeksi dapat dilakukan pada pasien dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Menurut SLKI (2018),

tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil kadar sel darah putih membaik.

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan Implementasi adalah tindakan dari rencana keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan pengetahuan keperawatan, perawat melakukan dua intervensi yaitu mandiri/independen dan kolaborasi/interdisipliner (NANDA, 2015).

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari perawatan pada tanggal 25-27 Agustus 2022 diruang ICU RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan pada pasien. Berdasarkan perencanaan yang dibuat peneliti melakukan tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pada masalah bersihan jalan napas tidak efektif adalah melakukan manajemen jalan napas dengan memberikan *section*. Adapun beberapa tindakan yang diberikan berupa: pengaturan posisi heatup, tindakan saction/melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik: memberikan posisi semi fowler, mengganti fiksasi ETT setiap 24jam, melakukan perawatan mulut dengan oral hygiene dan melakukan perawatan

stoma trakeostomi: untuk masalah bersihan jalan napas *Intensive Care Unit* (ICU) adalah suatu ruangan untuk merawat pasien dirumah sakit yang mempunyai staf dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk pengelolaan pasien yang mengalami komplikasi yang mengancam jiwa, penyakit, atau trauma.

Perlengkapan peralatan di *Intensive Care Unit* (ICU) mempunyai standar meliputi alat untuk membantu usaha bernafas melalui Endotracheal Tube (ETT) yang tersambung dengan ventilasi mekanik. Indikasi dari pemasangan alat ventilasi mekanik salah satunya adalah gagal nafas (Musliha, 2010). Dikatakan gagal nafas bilamana pertukaran oksigen atau O₂ terhadap karbondioksida atau CO₂ didalam organ paru-paru tidak dapat memelihara laju O₂ dan CO₂ didalam sel-sel tubuh manusia. Sehingga peningkatan tekanan CO₂ lebih besar dari 45 mmHg atau hiperkapnia dan tekanan O₂ arteri kurang dari 50 mmHg atau hipoksemia kurang dari 50 mmHg atau hipoksemia.

Endotracheal Tube (ETT) merupakan konektor yang digunakan untuk ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik yang digunakan adalah ventilasi mekanik invasif. ETT yang telah terpasang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga kebersihan dari akumulasi sekret, sehingga patensi jalan nafas menjadi tetap terjaga. Untuk menjaga kepatenan jalan nafas akibat penumpukan sekresi tersebut, tindakan yang dilakukan adalah penghisapan lendir (suctioning). Melakukan tindakan suction yaitu dengan cara selang kateter suction dimasukkan melalui hidung, mulut pada ETT (Nurachmah

& Sudarsono, 2010). Tindakan suction dilakukan untuk membersihkan jalan nafas dari sekret atau sputum dan juga untuk menghindari dari infeksi jalan nafas (Price & Wilson, 2012).

Tindakan keperawatan masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah adalah 1). Memonitor kadar glukosa darah, 2). Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia (lelah/lesu sedang, pusing menurun, kurang berkeringat, kadar gula dalam darah mulai menurun), 3). Memonitor intake dan output cairan: hasil yang di temukan pasien minum 500 cc/hari, cairan parentar 1500 ml, haluan urin 2100 cc/hari. 4). memonitor tekanan darah: 130/80 x/menit, RR: 24x/menit, Nadi: 90x/menit, suhu 36,7°C, 5). Mengajukan monitoring kadar glukosa secara mandiri, 6) Mengajukan kepatuhan terhadap diet dan olahraga, menginjeksikan obat Novarapid 14 unit secara subcutan pada lengan kanan atas pada pasien. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa usia mempengaruhi kadar glukosa seseorang, semakin tua seseorang maka semakin berisiko mengalami peningkatan kadar gula darah (Boku, 2019; Rudi & Kwureh, 2017; Trisnawati, 2013). Sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan kadar gula darah sewaktu tertinggi terjadi pada kategori umur 69-83 tahun mencapai 212,00 mg/dL (tinggi). Hal tersebut dapat terjadi karena fungsi pankreas akan menurun sejalan dengan penambahan umur yang meyebabkan produktifitas insulin sehingga mempengaruhi glukosa darah pada tubuh (Masruroh, 2018). Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) adalah pemeriksaan kadar gula

darah yang dapat diukur setiap waktu tanpa memperhatikan kapan terakhir seseorang makan (Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Tindakan keperawatan perfusi perifer tidak efektif adalah memeriksa sirkulasi perifer (misalnya. Nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu ankle-brachial indek), mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis. Diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi), Memonitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstermitas, menghindari pemasangan infus atau pengambilan darah didaerah keterbatasan perfusi, Mengindari pengukiran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi, Melakukan pencegahan infeksi, melakukan perawatan kaki dan kuku, melakukan hidrasi dan menganjurkan berhenti merokok (SIKI, 2018).

Tindakan keperawatan pada masalah gangguan mobilitas fisik pasien adalah mengatur posisi, yaitu dengan memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi, mengatur posisi untuk mengurangi sesak, meninggikan tempat tidur bagian kepala, memberikan bantal yang tepat pada leher, memberikan topangan pada area edema, memotivasi terlibat dalam perubahan posisi, mengubah posisi setiap 2 jam, mengubah posisi dengan teknik log roll, serta menginformasikan saat akan dilakukan perubahan posisi. (SIKI, 2018).

Tindakan keperawatan pada masalah defisit perawatan diri adalah dengan melakukan Oral Hygiene, serta melakukan dukungan perawatan diri, dengan memonitor tingkat kemandirian pasien, mengidentifikasi alat bantu

kebersihan diri, menyediakan lingkungan yang terapeutik, menyiapkan keperluan pribadi klien, mendampingi dalam melakukan perawatan diri, memfasilitasi kemandirian, membantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri, serta menjadwalkan secara rutin perawatan diri (SIKI, 2018).

Masalah gangguan integritas jaringan diberikan implementasi berupa Tindakan terapeutik perawatan luka yang salah satunya dengan mencuci luka menggunakan NaCl mengganti verban, NaCl penting dalam proses penyembuhan luka, dikarenakan cairan ini bisa sebagai antiseptic dan merupakan cairan yang hampir sama dengan fisiologis tubuh (Nursanty dan Fitri, 2020). Perawatan trakeostomi adalah penghisapan lendir atau suction. Suction dibutuhkan jika pasien koma atau keadaan imobilisasi dan tidak dapat membersihkan jalan napas sendiri. Penghisapan pada trakhea yang lebih dalam harus dilakukan dengan hati-hati karena hal tersebut dapat menyebabkan atau meningkatkan hipoksia yang dapat menimbulkan vasokonstriksi sehingga suplai oksigen ke serebral akan mengalami gangguan (Smletzer & Bare, 2005).

Tindakan keperawatan pada masalah risiko infeksi adalah melakukan pencegahan infeksi, yaitu dengan memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, membatasi jumlah pengunjung, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungannya. Berdasarkan studi kasus pada pasien semua intervensi terapi yang telah disusun dilakukan pada pasien. Peneliti mengimplementasikan dengan cara memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, membatasi jumlah pengunjung, mencuci


tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien dan mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Alvadri, 2016) yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara cuci tangan perawat dengan kejadian infeksi di rumah sakit.

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi pada kasus Tn. P pada hari Kamis 25 Agustus 2022 dari pemberian manajemen jalan napas dengan tindakan memberikan *section* perupa pengaturan posisi heatup untuk masalah bersihan jalan napas tidak efektif padap memperoleh hasil terdapat suara tambahan roncki, terdapat sekret, tampak Tn.P tidak dapat melakukan batuk efektif, dan frekuensi napas yang pada awal meningkat 24x/menit menjadi frekuensi napas 22x/menit , sehingga dapat disimpulkan masalah bersihan jalana napas tidak efektif belum teratasi dan intervensi dilanjutkan.

Dari pemberian manejemn hiperglikemia untuk masalah ketidakstabilan glukosa dalam darah didapat kan hasil dari pemeriksaan perjam yaitu 273 mg/dl, 189 mg/dl dan 246, 201 mg/dlmg/dl dan 197 mg/dl, tampak makan yang diberikan bubur saring, tampak klien dalam kondisi baring (coma), TTV: TD: 161/105 MmHg, N: 95x/menit. P: 24X/M, dan tampak klien diberikan suntikan insulin. Dan dilakukan evaluasi pada jadwal akhir dinas 95 mg/dl, 144 mg/dl. Pasien dilakukan pemeriksaan GDS per/8 jam dengan melakukan kolaborasi pemberian nutrisi. Sehingga

masalah glukosa dalam darah belum teratasi dan masih melakukan pemantauan.



Berdasarkan grafik di atas didapatkan bahwa terjadi peningkatan dalam mempertahankan Ketidakstabilan glukosa dalam darah maka dilakukan pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) selama 3 hari melakukan implemetasi sebagaimana pemeriksaan Gula Darah Sewaktu merupakan pemeriksaan kadar glukosa pada darah pasien yang tidak puasa dan dapat dilakukan kapan saja. Pemeriksaan GDS sering dilakukan karena selain digunakan sebagai pemeriksaan penyaring (*screening*) diabetes, juga dilakukan rutin untuk memantau kadar glukosa darah pada pasien diabetes. Dalam pemeriksaan ini melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tehnik tidak ditekan pada daerah jari tangan dan jari kaki ketika melakukan pemeriksaan Gula Darah Karena terdapat hasil bahwa dengan melakukan tehnik tersebut dapat mengurnagi terjadinya infeksi apalagi pada pasien diaberes melitus. (Irma, La Ode Alifariki, Adius Kusnan 2021)

Dari pemberian perawatan sirkulasi untuk masalah perfusi perifer tidak efektif diperoleh hasil data objketif tampak nadi perifer 95x/menit,

tampak ada edema pada kaki dan tangan, tampak pengisian kapiler tampak pengisian kapiler <3 detik. Tampak ada pembekakang pada tangan dan kaki, Tampak klien dehidrasi, tampak klien dalam kondisi terbaring lemah (Coma) hb: 11.0 (NN:12.00-16.00) sehingga masalah perfusi perifer tidak efektif belum teratasi dan masih dilanjutkan intervensi

Dari pemberian pengaturan posisi untuk masalah gangguan mobilitas fisik diperoleh data tekanan darah setelah pengaturan posisi: 130/90 mmHg, Frekuensi Jantung: 90, kekuatan otot menurun (1) untuk kedua tungkai bawah,ekstremitas atas tampak mulai digerakkan, masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi sehingga intervensi dilanjutkan. Selanjutnya dari pemberian oral hygiene dan dukungan perawatan diri untuk masalah didapatkan hasil bahwa masih membutuhkan bantuan dalam perawatan diri, tampak bibir pasien lembab, tampak plak gigi pasien berkurang. Sehingga masalah defisit perawatan diri belum tertasi, dan pertahankan intervensi.

Dari pemberian perawatan luka tekan dengan masalah gangguan integritas kulit/jaringan didapatkan data objekif tampak ada luka dekubitus, tampak ada luka post tracheostomy H+3. Sehingga gangguan integritas kulit belum teratasi dan dilanjutkan intervensi. Dan untuk pencegahan infeksi pada masalah risiko infeksi, didapatkan data objektif bahwa pasien masih terpasang infus, terpasang NGT,terpasang ventilator dan Chateter urine, pengunjung yang menjenguk pasien di batasi hanya satu orang, WBC: 10, sehingga masalah risiko infeksi belum teratasip pertahankan intervensi.

5.2 Analisis Intervensi EBPN (*Evidence Based Practice In Nursing*)

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien diabetes melitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah menggunakan intervensi manajemen hiperglikemia dengan melakukan pemeriksaan Gula darah sewaktu (GDS). Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah penyakit tidak menular yang bersifat degeneratif dengan faktor predisposisi utamanya adalah gaya hidup dan faktor lingkungan serta perilaku. *Life style* yang kurang sehat seperti kurangnya aktivitas, tidak berolahraga secara teratur, kebiasaan merokok, obesitas dan konsumsi lemak atau kolesterol yang tinggi dan tidak terkontrol. Glukosa darah sewaktu merupakan pemeriksaan kadar darah yang dilakukan setiap hari tanpa memperhatikan makan yang dimakan dan kondisi tubuh orang tersebut. Pemeriksaan gula darah sewaktu adalah pemeriksaan gula darah yang dilakukan setiap waktu, tanpa ada syarat puasa atau makan. (Andreassen, 2017).

Prosedur kerja penelitian dilakukan dengan mengukur kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan cara pengambilan darah kapiler. Dimana sebagai kontrol dilakukan pada jari tangan kanan dengan cara pengambilan darah kapiler tanpa pemijatan. Untuk jari tangan kiri diberikan perlakuan yaitu pemijatan jari sebelum dilakukan penusukan dengan lanset. Darah kapiler yang didapat diperiksa menggunakan alat glukometer *strat strip* metode tehnik tanpa pemijatan (Nazhofatunnisa, et., al, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan pada pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu tanpa pemijatan atau sebagai kontrol, didapatkan rerata kadar

glukosa darah sewaktu sebesar 303,1 mg/dL dengan nilai tertinggi sebesar 496 mg/dL dan nilai terendah sebesar 227 mg/dL. sesuai dengan teori yang dijabarkan pada Pedoman Praktek Laboratorium yang Benar (Good Laboratory Practice), mengenai Standard Operating Procedure (SOP) pada pengambilan darah kapiler dengan jari yang ditekan untuk mendapatkan cukup darah akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, karena darah yang dipaksakan keluar telah bercampur dengan cairan jaringan sehingga menjadi encer dan menyebabkan kesalahan dalam pemeriksaan (Nazhofatunnisa, et., al, 2019).

Penelitian Laisouw dkk (2017) juga menyatakan bahwa cairan jaringan membentuk sekitar 30% dari cairan tubuh, dimana air menjadi medium yang berada ditengah-tengah sel tubuh. Pertukaran air dan zat terlarut bergantung dari beberapa daya tekanan seperti tekanan osmotik koloid darah yang dibentuk oleh protein plasma. Selanjutnya, tekanan osmotik koloid darah akan bekerja sama dengan tekanan jaringan untuk menarik sisa cairan jaringan yang ada dalam sel menuju ke dalam darah kapiler. Selain itu, jari tanpa ditekan atau tanpa dipijat juga menyebabkan hemodilusi atau peningkatan kandungan cairan darah yang menyebabkan terjadinya penurunan konsentrasi darah, sehingga menyebabkan kadar glukosa darah lebih rendah. Menurut Emancipator (1999) dan Decroli (2019), kadar glukosa darah sewaktu yang termasuk kedalam kategori DM adalah >200 mg/dL. Berdasarkan hal tersebut, adanya penurunan kadar glukosa darah sewaktu setelah dilakukan tanpa pemijatan tidak

mengeluarkan hasil yang didapat dari kategori DM. Sehingga berdasarkan aspek klinisnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh cara pengambilan darah kapiler terhadap kadar glukosa darah sewaktu pada penderita diabetes melitus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi DM 9,5% dan nilai spesifitas dan sensitifitas dengan pemeriksaan GDS dan keakuratan penegakkan diagnosis berdasarkan keluhan responden adalah 85,71% dengan keluhan yang paling sering dialami dan dirasakan adalah polidipsia dan poliuria. Simpulan penelitian adalah seseorang dengan DM akan cenderung memiliki keluhan berupa yang berupa polidipsia, polifagia, dan polyuria. Sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pada penyakit DM merupakan golongan penyakit yang susah dideteksi pada tahap - tahap awal dan sering tidak disadari oleh penderita. Penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Perdana yang menemukan bahwa sebanyak 75,5% responden yang mengalami DM menunjukkan keluhan polidipsia, polifagia dan poliuria. Seseorang memiliki risiko yang cukup tinggi apabila ia memiliki riwayat penderita DM dalam keluarganya, terutama dengan riwayat DM tipe 2 (Isnaini N, et al., 2018).

Pada penelitian Maola dkk (2019) menunjukkan bahwa ada perbedaan antara darah kapiler dan darah vena terhadap pemeriksaan Lekosit menggunakan pengenceran dalam tabung dimana pada darah kapiler jumlah lekosit lebih rendah daripada darah vena yang diakibatkan pada pengambilan darah kapiler terjadi pengenceran darah oleh cairan jaringan

sehingga jumlah leukosit lebih sedikit. Penelitian Khasanah (2016) juga menunjukkan rerata jumlah trombosit pada darah kapiler lebih rendah (236.000/mm³) dari rerata jumlah trombosit pada darah vena (266.000/mm³). Dimana, penurunan jumlah trombosit pada darah kapiler kemungkinan besar terjadi akibat pengenceran darah oleh cairan jaringan sehingga hasil yang diperoleh lebih rendah. Hasil penelitian diatas sesuai dengan Purwanto (2009) yang menyatakan bahwa pembuluh darah kapiler memiliki struktur sederhana dan sangat kecil, sehingga jumlah sel yang terdapat di dalamnya sedikit. Pembuluh kapiler umumnya meliputi sel-sel jaringan, oleh karena itu pembuluh kapiler secara langsung berhubungan dengan sel. Karena dinding pembuluh kapiler yang sangat tipis menyebabkan penekanan pada pembuluh darah kapiler akan memaksa cairan untuk keluar dari jaringan sehingga akan mempengaruhi sel-sel yang terdapat pada pembuluh darah tersebut. Sementara itu, pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan pada kadar glukosa darah dimana glukosa darah terdapat pada plasma darah sehingga penekanan pada jari yang menyebabkan keluarnya cairan jaringan tidak berpengaruh terhadap kadar glukosa didalam darah (Nazhofatunnisa, et al., 2019)

Hasil penelitian diatas sesuai dengan Purwanto (2019) yang menyatakan bahwa pembuluh darah kapiler memiliki struktur sederhana dan sangat kecil, sehingga jumlah sel yang terdapat di dalamnya sedikit. Pembuluh kapiler umumnya meliputi sel-sel jaringan, oleh karena itu pembuluh kapiler secara langsung berhubungan dengan sel. Karena dinding

pembuluh kapiler yang sangat tipis menyebabkan penekanan pada pembuluh darah kapiler akan memaksa cairan untuk keluar dari jaringan sehingga akan mempengaruhi sel-sel yang terdapat pada pembuluh darah tersebut. Sementara itu, pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan pada kadar glukosa darah dimana glukosa darah terdapat pada plasma darah sehingga penekanan pada jari yang menyebabkan keluarnya cairan jaringan tidak berpengaruh terhadap kadar glukosa didalam darah

Kesalahan yang mungkin terjadi sehingga mempengaruhi hasil pada penelitian ini adalah penggunaan baterai yang tidak diganti secara berkala. Hal ini berkaitan dengan prinsip pemeriksaan dengan POCT menurut Kemenkes RI (2011) bahwa alat POCT menggunakan teknologi biosensor yang menghasilkan muatan listrik dari interaksi kimia antara zat tertentu dalam darah (misalnya glukosa darah) dan elektroda strip. Perubahan potensial listrik yang terjadi akibat reaksi kedua zat tersebut akan diukur dan dikonversi menjadi angka yang sesuai dengan jumlah muatan listrik yang dihasilkan. Angka yang dihasilkan dalam pemeriksaan dianggap setara dengan kadar zat yang diukur didalam darah, sehingga apabila daya listrik didalam alat berkurang maka akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan POCT sehingga membutuhkan penggantian baterai secara berkala (Nazhofatunnisa, et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian setelah diberikan tanpa ditekan dan ditekan bahwa rerata kadar glukosa darah sewaktu pada penderita diabetes melitus tanpa ditekan/pemijatan jari adalah 303,1 mg/dL. Rerata kadar

glukosa darah sewaktu pada penderita diabetes melitus setelah pemijatan jari adalah 284,4 mg/dL. Serta tidak ada pengaruh cara pengambilan darah kapiler terhadap kadar glukosa darah sewaktu pada penderita diabetes melitus. Hasil yang didapat sesuai dengan teori yang dijabarkan pada PedomanPraktek Laboratorium yang Benar (*Good Laboratory Practice*), mengenai *Standard Operating Procedure* (SOP) pada pengambilan darah kapiler dengan jari yang ditekan untuk mendapatkan cukup darah akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, karena darah yang dipaksakankeluar telah bercampur dengan cairan jaringan sehingga menjadi encer dan menyebabkan kesalahan dalam pemeriksaan(Nazhofatunnisa, et al., 2019)

Pemeriksaan gula darah sewaktu dengan tehnik tidak menekan jari tangan dan kaki harus dilakukan sesuai prosedur dengan tepat untuk mencegah terjadi komplikasi penyakit pasien kritis di ICU. Dapat menegakkan diagnosis dari berbagai hasil yang didapat yaitu Poliuria, Polidipsia dan Poluria Sehingga Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien DM tipe II akibat tingginya kadar gula yang tidak terkontrol dapat merusak beberapa sistem tubuh, seperti pembuluh darah jantung, ginjal, mata yang dapat mengakibatkan kebutaan, gagal ginjal, kerusakan saraf (stroke) hingga kematian, bahkan kematian penderita DM berisiko dua kali lipat dibandingkan bukan penderita Diabetes Melitus.

Dari hasil yang dilakukan peneliti selama 3 hari memberikan intervensi didapatkan kelebihan yaitu:

- a. Mengurangi rasa sakit tanpa ditekan

- b. Caranya mudah dan simple untuk mengaplikasikan
- c. Hasil mudah diketahui
- d. , ringan dan yaman untuk menjadi terapi janga pendek

Sedangkan kekurang setelah diberikan intervensi pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) yaitu:

- a. Memerlukan penusukan lebih dalam
- b. Mengunaan batrei untuk alat glucometer

Kesalahan yang mungkin terjadi sehingga mempengaruhi hasil pada penelitian ini adalah penggunaan baterai yang tidak diganti secara berkala. Hal ini berkaitan dengan prinsip pemeriksaan dengan POCT menurut Kemenkes RI (2011) bahwa alat POCT menggunakan teknologi biosensor yang menghasilkan muatan listrik dari interaksi kimia antara zat tertentu dalam darah (misalnya glukosa darah) dan elektroda strip. Perubahan potensial listrik yang terjadi akibat reaksi kedua zat tersebut akan diukur dan dikonversi menjadi angka yang sesuai dengan jumlah muatan listrik yang dihasilkan. Angka yang dihasilkan dalam pemeriksaan dianggap setara dengan kadar zat yang diukur didalam darah, sehingga apabila daya listrik didalam alat berkurang maka akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan POCT sehingga membutuhkan penggantian baterai secara berkala.

Teori caring yang dikemukakan oleh Jean Watson, mengatakan bahwa caring adalah suatu proses dalam pendekatan mengenai cara dan proses berfikir dan berperilaku. Caring bertujuan untuk memberikan asuhan keperawatan fisik, memperhatikan emosional dan menungktkan rasa aman

dan nyaman dari pasien (Watson, 2011). Keterkaitan antara teori caring dan kasus diabetes mellitus yang diteliti oleh penulis ialah pasien yang mengalami diabetes mellitus yang dirawat di ruang ICU, berapa dalam keadaan koma dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, serta termasuk ke dalam pasien yang ketergantungan penuh kepada perawat (total care).

Oleh karena itu pemberian intervensi pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) pasien ini semata untuk mencegah komplikasi sehingga pasien bisa segera pulih dan sembuh atas izin Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam QS Asy-Syu'ara'/26:80 yang berbunyi :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ اللَّهُ يَتَذَكَّرُ لِي
وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”.

Tafsir Al-Misbah menyatakan sakit merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan bahwa Yang melakukannya adalah Allah Ta'ala. Perlu dicatat bahwa penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah datangnya dari Allah (Shihab, 2009). Keterkaitan dalil ini adalah apapun penyakit yang menyerang seorang individu, maka yang hanya bisa mengangkat penyakit tersebut adalah Allah. Oleh karena itu, pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga harus selalu meyakini dan mencari sebab bahwasannya untuk kesembuhan dari penyakit, semuanya adalah berasal dari Allah.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini ialah karena keterbatasan waktu, implementasi hanya dilakukan selama 3x24 jam, sehingga hanya bisa diberikan dipagi hari dan tidak ada yang melanjutkan implementasi di malam hari sehingga proses evaluasi dianggap kurang maksimal.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan kasus di atas dan setelah melakukan asuhan keperawatan pada pasien dapat disimpulkan :

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian pada kasus Tn.p didapatkan berupa data subjektif dan data objektif dimana klien di rawat di ruang ICU ini sudah 1 minggu, klien tampak cenderung tidur, tampak banyak sputum di mulut dan di selang ETT pasien, S:36,8°C, SPO₂:99%, hasil AGD menunjukkan alkalosis respiratorik dan metabolik, tampak pasien terpasang infus, ventilator mekanik, NGT, ETT, post tracheostomy, dan chateter urine. hiperglikemia untuk masalah ketidakstabilan glukosa dalam darah didapat kan hasil dari pemeriksaan perjam yaitu 273 mg/dl, 189 mg/dl dan 246, 201 mg/dlmg/dl dan 197 mg/dl, tampak makan yang diberikan bubur saring, tampak klien dalam kondisi baring (coma), , N: 95x/menit. P: 24X/M, dan tampak klien diberikan suntikan insulin. Dan dilakukan evaluasi pada jadwal akhir dinas 95 mg/dl, 144 mg/dl.

2. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 7 diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada pasien yaitu bersihan jalan napas berhubungan dengan adanya jalan napas buatan, ketidakstabilan glukosa dalam darah berhubungan dengan hiperglikemia, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, defisit

perawatan diri berhubungan dengan kelemahan, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi, dan risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan untuk diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah manajemen napas buatan, ketidakstabilan kadar glukosa darah adalah manajemen hiperglikemia, perfusi perifer tidak efektif adalah perawatan sirkulasi, defisit perawatan diri yaitu personal hygiene dan dukungan perawatan diri: mandi, gangguan mobilitas fisik adalah manajemen energi, gangguan integritas kulit /jaringan adalah perawatan luka tekan dan risiko infeksi yaitu pencegahan infeksi

4. Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari perawatan pada tanggal 25-27 Agustus 2022 di ruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan pada pasien.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi pasien masalah keperawatan teratasi sebagian sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan oleh peneliti, sehingga perawat mampu mempertahankan kebersihan diri pasien.

6. Intervensi EBP

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien *diabetes melitus* dengan masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah menggunakan intervensi

pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) dengan tehnik tidak ditekan. Kegiatan pemeriksaan gula darah sewaktu merupakan bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula darah. Berbagai manfaat yang dirasakan dari kegiatan pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) yaitu Untuk melihat kadar gula darah sesaat tanpa pertimbangan waktu setelah makan, untuk mengetahui gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, dan mengurangi potensi infeksi terutama infeksi aliran darah yang didapat di rumah sakit akibat seringnya organisme masuk ke kulit menuju aliran darah di sepanjang pembuluh darah (2020) dengan pemberian intervensi pemeriksaan gula darah sewaktu dengan tehnik tidak menekan dapat mempertahankan tidak terjadi indikasi ataupun kontra indikasi, infeksi dan tidak menyakitin pasien di rawat diruang icu.

6.2 Saran

1. Bagi Mahasiswa

Sebelum melakukan intervensi pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) baiknya, perhatikan indikasi dan kontraindikasi sebelum dilakukan, kemudian lingkungan sekitar klien di perhatikan agar ketika intervensi tersebut dilakukan privacy pasien tetap terjaga.

2. Bagi Perawat

Metode pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) dengan tehnik tidak ditekan yang dapat dilakukan secara terus menerus pada pasien yang mengalami bedrest dalam kondisi tidak mampu melakukan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqih, Anugrah, A. dan Khayudin, B. A. (2022) Manajemen Penatalaksanaan Diabetes Mellitus. Diedit oleh Guepedia. Bojonegoro: Guepedia Publisher
- Ariyani, N. (2019) *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Diabetes Melitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Sempaja Samarinda. Skripsi, D-III Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kaltim*
- Basse maessy aulia aziz (2020). *Literatur Review Efektifitas Manajemen Jalan Npas Pada Pasien Stroke*.STIKERS Penakukkang Makasar.
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis untuk Hasil yang Diharapkan*. (A. Susila & P.P. Iestari, Eds.) (8th ed.). Singapura : Elsevier Pte Ltd
- Boku, A. (2019). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
- Brunner Dan Suddarth. (2018). *Keperawatan Medikal Bedah 12th, edn*. Diedit oleh E. A. Mardella. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Dewi, A. K. (2021). *Asuhan Keperawatan Pada Tn. K Dengan Diabetes Melitus Di RSUD Panembahan Senopati Bantul* (Doctoral Dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
- Decroli, E. (2019). *Diabetes Melitus Tipe 2*. (A. Kam, yanne pradwi Efendi, garri prima Decroli, & A. Rahmadi, Eds.) (1st ed.). Padang: Pusat Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- DR. Risna & Irwan, M. 2021. *Filsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integritas Keilmuan*.Samata, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press
- Elisa Oktaviana. Dkk. 2022. *Pemeriksaan Gula Darah Untuk Mencegah Peningkatan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus*. Stikes yarsi mataram. Lentera (Jurnal Pengabdian ISSN 2774-812X; ISSN 2774-9274. Vol. 2 No. 2 Juli Tahun 2022 Pp. 232-237.
- Hanif A SI dan PD. 2016. Hubungan Senam Diabetes Terhadap Kadar Gula Darah Puasa dan 2 Jam Post Prandial Pasien DM Type 2. *Jurnal Saintika Medika*. Vol.12 No.1;43-48
- Irma, La Ode Alifariki, & Adius Kusnan. *Uji Sensitifitas dan Spesifisitas Keluhan Penderita Diabetes Melitus Berdasarkan Keluhan dan Hasil Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)*. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 16, No. 1, Januari 2020 ISSN: 0216 – 3942 Website: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>
- Isnaini N, Ratnasari R. Faktor risiko mempengaruhi kejadian Diabetes mellitus tipe dua. *J Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah*. 2018;14(1):59–68.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Yuk, mengenal apa itu penyakit Diabetes Melitus (DM) - Direktorat P2PTM*.<http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-diabetesmelitus/page/5/yuk-mengenal-apa-itu-penyakit-diabetes-melitus-dm>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Yuk, mengenal apa itu penyakit Diabetes Melitus*

- Kementrian RI (2019) infodatin 2019 Diabetes Melitus Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Litbangkes; 2018.
- Laisouw, A. J., Anggaraini, H., & Ariyadi, T. (2017). *Perbedaan Kadar Glukosa Darah Tanpa dan Dengan Hapusan Kapas Kering Metode POCT*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang, (September), 661–665.
- Masruroh, E. (2018). Hubungan Umur dan Status Gizi dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Melitus Tipe II. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(2).
- Nofi Susanti¹, Ikhwan¹, Deteksi Dini Kadar Gula Darah Sewaktu, Kolesterol Total dan Asam Urat pada Masyarakat Kecamatan Deli Tua. 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Jl. Lapangan Golf, Kp. Tengah, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara 20353. Vol. 2, No. 1, Bulan Juni, 2022, Hal 12 – 22.
- Nuraeni. , Arjita, I. P .T. (2019). Pengaruh Senam Kaki Diabet Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2
- Nursalam, (2018). *Manajemen Keperawatan Aplikasi Dalam Praktek Keperawatan Professional*. Jakarta. salemba Medika.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis* (4th Ed.). Salemba Medika.
- Nursalam. (2017). *Konsep Dan Penerapan Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medik
- Nursyamsiah. *Berdamai Dengan Diabetes*. Jakarta: Bumi Medika; 2017
- Padila. (2012). *Buku ajar medikal bedah.cetakan 1*. Nuha medika: Yogyakarta
- Perry., P. &. (2013). Buku Ajar Fundamental Keperawatan (Konsep, Proses Dan Praktik). In *Buku Ajar Fundamental Keperawatan (Konsep, Proses Dan Praktik)*.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (Definisi Dan Kriteria Hasil Keperawatan)* (1st Ed.). PPNI.
- Purnama, A., & Fikri, R. (2020). Perbandingan Efektifitas Oral Hygiene Menggunakan Enzym Lactoperoxidase Dengan Chlorhexidine Dalam Pencegahan Vap Di Icu Rs X. *Jurnal Surya Muda*, 2(1), 54–64. <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i1.57>
- Putri. Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Nefropati Diabetik Pada Penderita Diabetes Mellitus di RSUD DR. M. Soewandhie Surabaya. *J Berk Epidemiol*. 2015;3(1):109–21.
- Saenab Dasong, dkk. (2020). *Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Ulkus Diabetik Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa*. Jurnal Media Keperawatan: Politeknik Kesehatan Makassar Vol. 11 No. 01. 2087-0035
- Suciana, F. , Arifianto, D. (2019). Penatalaksanaan 5 Pilar Pengendalian DM Terhadap Kualitas Hidup Pasien Dm Tipe 2. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9(4). 311-318.
- Tandra, H. (2018). *Segala Sesuatu yang Harus Anda Ketahui Tentang Diabetes*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2019. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: PPNI
- Toruan, Karim D W. Hubungan Motivasi Diri Dengan Kepatuhan Diet Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. *JOM FKp*. 2018;5(2). 137-145
- Wahyuni A dan Arisfa N. Senam Kaki Diabetik Efektif Meningkatkan Ankle Brachial Index Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *J IPTEKS Terap*. 2016;9:155–64.
- Winardi. (2019). *Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Penderita Diabetes Mellitus (DM) di Rumah Sakit Umum Daerah Oku Timur*. Palembang: Jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Palembang.
- World Health Organization. (2021). *Noncommunicable Diseases (NCDs)*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
- Yasmara, D, Nursiswati, N. , Rosyidah, A. (2016). *Rencana Asuhan Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta : EGC.
- Zai, Y. C., Juwita, I.Y. , Monica, C. S. (2019). Pengaruh Program Diabetes Self Management Education Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pasien DM Tipe 2 Di RSU Royal Prima Medan. *Jurnal Keperawatan Vol.9*.(2).

LAMPIRAN 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEMANDIKAN PASIEN DI TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

a. Pengertian

Gula darah sewaktu merupakan pemeriksaan kadar darah yang dilakukan setiap hari tanpa memperhatikan makan yang dimakan dan kondisi tubuh orang tersebut. Pemeriksaan kadar darah sewaktu adalah pemeriksaan gula darah yang dilakukan setiap waktu, tanpa ada syarat puasa atau makan. (Andreassen, 2017)

Pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) atau *Blood sugar sometimes* (BSS) adalah pemeriksaan kadar glukosa pada darah pasien yang tidak puasa dan dapat dilakukan kapan saja. Pemeriksaan GDS sering dilakukan karena selain digunakan sebagai pemeriksaan penyaring (*screening*) diabetes, juga dilakukan rutin untuk memantau kadar glukosa darah pada pasien diabetes.

b. Tujuan

1. Untuk melihat kadar gula darah sesaat tanpa pertimbangan waktu setelah makan
2. Untuk mengetahui gula darah puasa, gula darah 2 jam PP.

c. Indikasi pasien yang dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS)

1. DM tipe I
2. DM tipe II

d. Kontraindikasi

1. Tidak terdapat luka pada jari-jari tangan dan kaki pada saat pemeriksaan Gula Darah sewaktu.
2. Menghindari dibagian tangan dan kaki yang bengkak.

e. Prosedur pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS)

1. Persiapan
 - a) Persiapan pasien
 - 1) Pastikan identitas pasien
 - 2) Kaji kondisi klien dan gula darah terakhir
 - 3) Jelaskan pada klien atau keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan
 - 4) Jaga privasi klien
2. Alat
 - 1) Alat pemeriksaa gula darah digital
 - 2) Gluko test strip
 - 3) Lanset atau alat pendorong (lancing device)
 - 4) Swab alchol 70 %
 - 5) Handscoen
 - 6) Bengkok/tempat sampah
 - 7) Lembar hasil pemeriksaan dan alat tulis
3. Prosedur
 - a. Tahap orientasi

- b. Berikan salam. Panggil klien dengan namanya.
 - c. Jelaskan tujuan, prosedur dan lamanya tindakan pada klien/keluarga.
4. Tahap kerja
- Mengucapkan salam bassamah dan membaca doa sebelum melakukan tindakan
 - Berikan kesempatan klien bertanya atau melakukan sesuatu sebelum kegiatan dilakukan.
 - Menanyakan keluhan utama klien
 - Jaga privacy klien
 - Atur posisi yang nyaman bagi klien
 - Gunakan handcoen bersih
 - Siapkan alat yang akan digunakan didekat perawat
 - Pasang atau masukan reagen strip kedalam.
 - Pilih jari yang akan ditusuk
 - Ujung jari tangan yang akan ditusuk dan diambil darahnya dibersihkan dengan kapas alkohol dan dibiarkan sampai kering sendiri
 - Tusuk dengan lancet steril ± 3 mm, darah dibiarkan keluar sendiri tanpa diperas
 - Tetesan darah yang keluar disentuhkan pada Stick test reduksi persis pada garis merah yang telah disediakan
 - Selanjutnya *stick test* reduksi dipasang secara tepat pada Glukometer dan tunggu beberapa saat sampai menunjukkan angka dari hasil pemeriksaan pada layar Glukometer
 - Catat hasil pemeriksaan pada lembar dokumentasi

Lampiran 2



Uji Sensitifitas dan Spesifisitas Keluhan Penderita Diabetes Melitus Berdasarkan Keluhan dan Hasil Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)

¹Irma, ²La Ode Alifariki, ³Adius Kusnan

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Kendari

²Departemen Epidemiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Halu Oleo Kendari

³Departemen Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Halu Oleo Kendari

^{1,2,3} Kampus Hijau Bumi Tridharma, Asoadonobu, Kec. Kairatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

Email : irmankedtrp15@gmail.com, mera_riki@yahoo.co.id, adiuskusnan.fubho@gmail.com

ABSTRAK

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah penyakit tidak menular yang bersifat degeneratif dengan faktor predisposisi utamanya adalah gaya hidup dan faktor lingkungan serta perilaku. Life style yang kurang sehat seperti kurangnya aktivitas, tidak berolahraga secara teratur, kebiasaan merokok, obesitas dan konsumsi lemak atau kolesterol yang tinggi dan tidak terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi DM dan mengukur tingkat keakuratan diagnosa DM berdasarkan keluhan utama dan khas yang dialami responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan observasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua warga masyarakat yang ada di RW 1 Kelurahan Jagir yang berumur di atas 30 tahun dengan jumlah sampel sebanyak 74 orang yang diambil dengan non random sampling yaitu dengan teknik accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi DM 9,5% dan nilai spesifitas dan sensitifitas keakuratan penegakkan diagnosis berdasarkan keluhan responden adalah 85,71% dengan keluhan yang paling sering dialami dan dirasakan adalah polidipsia dan poliuria. Simpulan penelitian adalah seseorang dengan DM akan cenderung memiliki keluhan berupa yang berupa polidipsia, polifagia, dan poliuria.

Kata Kunci : Diabetes Mellitus, Polidipsia, Polifagia, Poliuria

ABSTRACT

Diabetes Mellitus (DM) is a non-communicable disease that is degenerative with the main predisposing factors are life style and environmental and behavioral factors. Unhealthy life style such as lack of activity, not exercising regularly, smoking habits, obesity and consumption of fat or cholesterol that is high and uncontrolled. This study aims to determine the prevalence of DM and measure the level of accuracy of DM diagnoses based on the main and typical complaints experienced by respondents. This type of research is descriptive research with an observational approach. The population in this study were all residents in RW 1, Jagir Village, aged over 30 years with a total sample of 74 people taken by non-random sampling, namely the accidental sampling technique. The results showed that the prevalence of DM was 9.5% and the specificity and sensitivity value of accuracy of diagnosis based on respondents' complaints was 85.71% with the most frequently experienced and felt complaints were polydipsia and polyuria. Conclusion: the conclusion of the study is that someone with DM will tend to have a lot of complaints during screening.

Keywords: Diabetes Mellitus, Polydipsia, Polifagia, Poliuria

Indonesian Journal of Community Services

Volume 2, No. 1, May 2020

<http://ejournal.unsasula.ac.id/index.php/ijcs>

DOI: <https://dx.doi.org/10.30659/ijcs.v2i1.38-48>

Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) dan Tekanan Darah kepada Masyarakat

Maria Karolina Selama¹, Veronika Ririn Marwaningsih, Nilen Setyaningrum

¹Program Studi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author

Jl. Kawi No.11 Semarang, Telp/Fax 024842729/0248506185

E-mail: marciaslama100284@gmail.com

Received:
25 April 2020

Revised:
8 May 2020

Accepted:
17 May 2020

Published:
31 May 2020

Abstrak

Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis yang paling banyak dialami oleh penduduk di dunia. Penyakit DM menempati urutan ke-4 penyebab kematian dinegara berkembang. Salah satu jenis penyakit DM yang paling banyak dialami oleh penduduk di dunia adalah DM tipe 2 (85-95%), yaitu penyakit DM yang disebabkan oleh terganggunya sekresi insulin dan resistensi insulin. Peningkatan jumlah kasus DM tipe 2 tersebut berdampak pada peningkatan komplikasi yang dialami pasien DM tipe 2. Komplikasi terberat yang dialami pasien DM tipe 2 adalah neuropati perifer (10-60%) yang akan menyebabkan ulkus diabetic. Menurut American Diabetes Association (ADA) bahwa salah satu faktor risiko terjadinya diabetes mellitus adalah faktor risiko yang dapat diubah meliputi obesitas berdasarkan IMT ≥ 25 kg/m² atau lingkar perut ≥ 80 cm pada wanita dan ≥ 90 cm pada laki-laki, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi dan diet tidak sehat. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan skrining awal penderita hipertensi dan penderita diabetes mellitus serta sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait deteksi dini penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Metode yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS) dan tekanan darah kepada masyarakat. Hasil evaluasi telah teridentifikasi 18 orang (13,84 %) memiliki gula darah sewaktu (GDS) ≥ 160 mg/dl sedangkan hasil pemeriksaan tekanan darah didapatkan 20 orang (15,38 %) memiliki tekanan darah $> 120/80$ mmHg.

Kata kunci : Diabetes Mellitus; Hipertensi; Pemeriksaan GDS; Pemeriksaan Tekanan Darah

PEMERIKSAAN GULA DARAH UNTUK MENCEGAH PENINGKATAN KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELLITUS

Elisa Oktaviana¹, Sahjaton Nadrati², Lalu Dedy Supriyatna³, Zuliardi⁴,
Syamdarwati⁵
¹⁻⁵STIKES YARSI MATARAM
Email: elisaoktaviana04@gmail.com

ABSTRAK

Penyakit diabetes mellitus (DM) merupakan sebuah penyakit, di mana kondisi kadar glukosa di dalam darah melebihi batas normal. Hal ini disebabkan karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas dan merupakan zat utama yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kadar gula darah dalam tubuh agar tetap dalam kondisi seimbang. Adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah merupakan gejala umum yang terjadi pada penderita diabetes mellitus. Jika dibiarkan dapat menyebabkan berbagai komplikasi baik akut maupun kronis. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui kadar gula penderita Diabetes Mellitus. Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pemeriksaan kadar gula dalam darah masyarakat dengan mengambil spesimen darah. Hasil yang didapatkan dari 30 penderita Diabetes mellitus bahwa sebagian besar responden memiliki Kadar Gula Darah Sewaktu ≤ 200 mg/dL sebanyak 3 orang (10%) dan ≥ 200 mg/dL 27 orang (90%). Penderita Diabetes Mellitus sangat antusias ikut kegiatan melakukan pemeriksaan kadar darah sewaktu yang gratis, dan kader posyandu sangat aktif selama kegiatan berlangsung terutama saat melakukan persiapan pelaksanaan sehingga kegiatan pengukuran berjalan lancar. Sebaliknya pemeriksaan kadar gula darah sewaktu dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah sedini mungkin penyakit tidak menular terutama bagi masyarakat yang berpotensi mengalami penyakit tersebut dan pada masyarakat yang telah mnyandang Diabetes Mellitus dapat mengontrol kadar gula darahnya agar tetap dalam batas yang wajar agar tidak terjadi keluhan tanda dan gejala yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Diabetes Mellitus, Kadar Gula Darah

PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS (STUDI FENOMENOLOGI)

Blood Glucose Examination in Diabetes Mellitus Patients (Phenomenology Study)

Rizana Fajranni¹mah¹, Angki Purwanti²

¹ Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Jakarta III,
Email: rie.ners@gmail.com

² Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Jakarta III,
Email: angki.purwanti.110564@gmail.com

ABSTRACT

Diabetes Mellitus (DM) is a group of metabolic disorders characterized by elevated blood glucose levels or hyperglycemia resulting from a lack of insulin secretion, impaired insulin metabolism, or both. Things that might cause Diabetes Mellitus Self Management (SMDM) in the aspect of blood sugar monitoring is the lack of awareness of DM patients themselves. The purpose of this study was to obtain an in-depth understanding of the experiences of DM patients during blood glucose checks. The research design used in this study is a qualitative research using a phenomenological approach. The participants in this study were people with diabetes mellitus who visited the Jatiharna Bekasi Health Center using purposive sampling technique. The researcher visited the patient's house based on the address listed at the puskesmas until the data was saturated, so that there were 6 participants consisting of three men and three women. The results showed that ten sub themes emerged, namely: frequency, place, method, time, type, procedure, equipment, results, interpretation of results, and explanation of results. This category should be a concern for health workers for monitoring and evaluation of self-management carried out by DM patients.

Keywords: diabetes mellitus, examination, blood glucose, experience

ABSTRAK

Diabetes Mellitus (DM) merupakan sekelompok kelainan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia yang disebabkan dari kurangnya sekresi insulin, gangguan metabolisme insulin, atau keduanya. Hal yang mungkin menyebabkan Self Management Diabetes Mellitus (SMDM) pada aspek pemantauan gula darah yaitu kurangnya kesadaran dari pasien DM sendiri. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh suatu pemahaman yang mendalam dari pengalaman penderita DM selama melakukan pemeriksaan glukosa darah. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Partisipan dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus yang melakukan kunjungan di Puskesmas Jatiharna Bekasi dengan teknik purposive sampling. Peneliti mendatangi rumah pasien berdasarkan alamat yang tercantum di puskesmas sampai data jenuh, sehingga didapatkan partisipan sebanyak 6 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak tiga orang, dan perempuan sebanyak tiga orang. Hasil penelitian didapatkan sepuluh sub tema yang muncul yaitu: frekuensi, tempat, cara, waktu, jenis, prosedur, peralatan, hasil, interpretasi hasil, serta penjelasan hasil. Kategori tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan untuk pemantauan dan evaluasi self-management yang dilakukan oleh penderita DM.

Kata kunci: diabetes mellitus, pemeriksaan, glukosa darah, pengalaman

Lampiran 4



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Penulis

Nama : Sri Astuti, S.Kep.
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bima, 07 Juli 1998
 Suku/ Bangsa : Mbojo/ Indonesia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Raya, Kel. Nitu Kec. Raba, Kota Bima, NTB
 Email : sriastutii768@gmail.com
 No. Hp : 085337439501
 Nama Orang tua :
 1. Ayah : Usman
 2. Ibu : Halimah

Riwayat Pendidikan

1. SDN 30 Kota Bima (2006 - 2011)
2. SMPN 15 Kota Bima (2011 - 2015)
3. MAN 02 Kota Bima (2015 - 2017)
4. S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar (2017 – 2021)