

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI *DERMAL PATCH* EKSTRAK
METANOL RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber zerumbet L.*)
TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus* SECARA *IN VITRO* DAN
*IN VIVO***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

SRI WAHYUNI

Nim : 70100119060

JURUSAN FARMASI

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Uji Aktivitas Antibakteri *Dermal Patch* Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro* dan *In Vivo*" yang disusun oleh **Sri Wahyuni, NIM: 70100119060**, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 30 Agustus 2023 M** yang bertepatan dengan **13 Safar 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 30 Agustus 2023
13 Safar 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nurul Muhlisa Maddepungeng, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Indah, S.Si, M. Si.	(.....)
Penguji II	: Dra. Audah Mannan, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP. 198007012006042002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 70100119060
Tempat/Tgl. Lahir : Bonto-bonto, 06 Oktober 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri *Dermal Patch* Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro* dan *In Vivo*

Menyatakan bahwa sesungguhnya dengan penuh kesadaran skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 30 Agustus 2023

Peneliti,

Sri Wahyuni

NIM: 70100119060

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang karena cahaya ilmu.

Skripsi yang disusun dengan judul **“Uji Aktivitas Antibakteri Dermal Patch Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* secara *In Vitro* dan *In Vivo*”** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peneliti menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, baik itu yang bersifat teknis maupun non-teknis. Namun berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih yang sebesarnya peneliti sampaikan kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Zainal Abidin, dan Ibunda Sahria, serta saudara saya Sukmawati Ningsi S.Pd, Sulfina Safitri Nur S.S, Ahmad Firdaus, dan Nurfadilah Jannatul

Munira yang telah memberikan restu dan doanya, kasih sayang, nasehat, motivasi, dan juga memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada peneliti selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Untuk itu peneliti juga menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof . H. Hamdan Juhannis , MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang diberikan selama menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Andi Aderus Lc M.Ag selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof Muhammad Khalifa Mustami M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof Muhammad Amry Lc M.Ag selaku Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr.dr Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si selaku ketua jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
8. Ibu Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si, M.Si selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
9. Ibu Apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng., S.Si., M.Si selaku pembimbing kedua yang juga senantiasa memberi masukan, arahan, dan motivasi serta

meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing peneliti hingga selesainya skripsi ini.

10. Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M. Farm selaku pembimbing akademik yang banyak membantu dan memberi arahan serta motivasi dalam proses perkuliahan dan penelitian.
11. Ibu Apt. Indah, S.Si., M.Si selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Dra. Audah Mannan, M.Ag selaku penguji keislaman yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti sejak menempuh pendidikan farmasi hingga selesainya skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat terbaik Dwi Ariqoh Ridwan, Isna, Hijratul Jannah, dan Nislah Cahyani Nurdin selaku menemani dalam proses penelitian, serta teman – teman kelas yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu selaku memberikan semangat dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat Dizzy Sarada, Odha, Ulfa, Tangsil, Iin, Ima, Hera, Ila, dan Silma selaku memberikan semangat, motivasi dan dukungan.
16. Saudara-saudaraku Interferon angkatan 2019 yang tidak sempat disebutkan satu persatu, pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya.


Besar harapan peneliti kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Samata-Gowa, Agustus 2023

Peneliti,

Sri Wahyuni

Nim : 70100119060



DAFTAR ISI


PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional.....	4
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> L.).....	11
1. Klasifikasi.....	11
2. Nama Lokal.....	12
3. Morfologi.....	12
4. Ciri - Ciri Umum.....	13
5. Kandungan Kimia.....	13
6. Manfaat.....	14
B. Kulit.....	14
1. Struktur Kulit.....	15
2. Fungsi Kulit.....	19
3. Mekanisme Penyembuhan Luka.....	20
C. Bakteri.....	21
1. Ciri- Ciri Bakteri.....	22
2. Struktur Tubuh Bakteri.....	24
D. <i>Staphylococcus aureus</i>	27

E. Kelinci.....	29
1. Morfologi.....	30
2. Pakan.....	30
3. Kebutuhan Nutrisi Kelinci.....	31
4. Kebiasaan Hidup	31
F. Antibakteri.....	32
1. Metode Difusi.....	33
2. Metode Dilusi.....	34
G. Antibiotik	35
1. Defenisi Antibiotik	35
2. Klasifikasi Antibiotik.....	35
H. Sediaan <i>Patch</i>	42
I. Tinjauan Islam	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Sampel Penelitian.....	48
D. Instrumental Penelitian.....	49
1. Alat	49
2. Bahan	49
E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Uji <i>In Vitro</i>	55
2. Uji <i>In Vivo</i>	56
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	77
RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Kajian Pustaka	6
2. Komposisi patch.....	51
3. Kriteria hewan uji.....	52
4. Hasil pengukuran uji <i>in vitro</i> (mm)	55
5. Rata - rata pengukuran panjang luka infeksi pada kelinci (cm)	56
6. Perubahan panjang luka sayat (cm)	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Rimpang lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> L.)	11
2. Struktur kulit	15
3. Struktur tubuh bakteri	24
4. Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	27
5. Kelinci	29
6. Kebutuhan nutrisi	31
7. Situs target antibiotik	37
8. Diagram hasil pengukuran uji <i>in vitro</i>	55
9. Diagram penyembuhan luka	56
10. Formula <i>patch</i>	95
11. Sterilisasi alat	95
12. Penimbangan media	95
13. Larutkan media	96
14. Kultur bakteri dan inkubasi	96
15. Bakteri hasil inkubasi divorteks	96
16. Hasil centrifugasi	97
17. Pembuatan suspensi bakteri dan penghitungan jumlah bakteri	97
18. Penempelan <i>patch</i>	97
19. Hasil uji antibakteri	98
20. Adaptasi hewan kelinci	98
21. Pencukuran dan pembuatan luka	98
22. Penginfeksi bakteri dan penempelan <i>patch</i>	99
23. Hari pertama dan hari kedua	99
24. Hari kedua	99
25. Hari ketiga terjadi fase inflamasi dan pembengkakan	100
26. Hari keempat mulai terbentuk keropeng pada luka sayat	100
27. Hari kelima mulai tertutup luka	100
28. Hari keenam keropeng terbuka dan mulai tertutup luka	101
29. Hari ketujuh	101
30. Hari kedelapan	101
31. Hari kesembilan dan kesepuluh	101
32. Hari kesepuluh	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Skema Pembuatan Media TSB.....	77
2. Skema Pembuatan Media TSA.....	78
3. Skema Pembuatan Larutan Standar Mc Farland.....	79
4. Skema Kultur dan Suspensi Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	80
5. Skema Uji <i>In Vitro</i>	81
6. Skema Pembuatan Suspensi Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	82
7. Skema Pembuatan Luka	83
8. Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat	84
9. Analisis Pengolahan data SPSS Uji <i>In Vitro</i>	85
10. Analisis Pengolahan data SPSS Uji <i>In vivo</i>	88
11. Analisis Data HPMC.....	90
12. Analisis Data NaCMC.....	91
13. Analisis Data Kitosan.....	92
14. Analisis Data Karbopol	93
15. Analisis Data Kontrol Negatif	94
16. Dokumentasi Penelitian <i>In Vitro</i> dan <i>In vivo</i>	95
17. Kode Etik Hewan Coba	103

ABSTRAK

Nama Penyusun : Sri Wahyuni
Nim : 70100119060
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antibakteri *Dermal Patch* Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro* dan *In Vivo*

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) adalah salah satu genus zingiber yang telah lama dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional salah satunya sebagai antibakteri. Rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) mengandung senyawa-senyawa terpenoid, flavonoid, tanin, dan fenolik. Senyawa-senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan terpenoid diketahui memiliki aktivitas antibakteri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dan *in vivo*. Uji *in vitro* dilakukan dengan metode difusi agar dengan penanaman bakteri teknik metode cawan tebar dengan jumlah bakteri $1,5 \times 10^8$ CFU/ML, sedangkan uji *in vivo* dilakukan pada kelinci dengan melukai sepanjang 1,5 cm disertai penginfeksi bakteri *Staphylococcus aureus*. Penelitian ini dilakukan pengujian dari 4 formula dengan polimer yaitu HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol. Hasil uji *in vitro* menunjukkan bahwa formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan hasil diameter zona hambat pada formula HPMC sebesar 24,36 mm, NaCMC sebesar 16,56 mm, kitosan sebesar 14,62 mm, dan karbopol sebesar 22,20 mm. Untuk hasil uji *in vivo* menunjukkan penyembuhan luka infeksi sembuh pada hari ke 7 pada formula HPMC, sedangkan untuk formula NaCMC, kitosan, dan karbopol mengalami kesembuhan pada hari ke 10. Dari keempat formula tersebut formula HPMC memiliki daya hambat bakteri terkuat dan penyembuhan luka tercepat.

Kata kunci: Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*), *Patch*, *Staphylococcus aureus*, Uji *in vitro*, Uji *in vivo*

ABSTRACT

Nama Penyusun : Sri Wahyuni
Nim : 70100119060
Judul Skripsi : Antibacterial Activity Test of *Dermal Patch* Methanol Extract of Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.) Rhizome Extract Against *Staphylococcus aureus* Bacteria *In Vitro* and *In Vivo*

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) is a zingiber genus that has been used for a long time and is widely used by Indonesian people as traditional medicine, one of which is as an antibacterial. The rhizome of lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) contains terpenoids, flavonoids, tannins and phenolic compounds. Phenolic compounds, flavonoids, tannins and terpenoids are known to have antibacterial activity. This study was conducted to determine the antibacterial activity of dermal patch formula methanol extract of lempuyang rhizome (*Zingiber zerumbet* L.) against *Staphylococcus aureus* bacteria *in vitro* and *in vivo*. The *in vitro* test was carried out using the agar diffusion method by planting bacteria using the scattering dish technique with a bacterial count of 1.5×10^8 CFU/ML, while the *in vivo* test was carried out on rabbits with 1.5 cm long wounds accompanied by *Staphylococcus aureus* infection. This research tested 4 formulas with polymers, namely HPMC, NaCMC, chitosan, and carbopol. *In vitro* test results showed that the dermal patch formula of methanol extract of lempuyang rhizome (*Zingiber zerumbet* L.) had antibacterial activity against *Staphylococcus aureus* bacteria with the result that the diameter of the inhibition zone in the HPMC formula was 24.36 mm, NaCMC was 16.56 mm, chitosan was 14.62 mm, and a carbopol of 22.20 mm. The results of the *in vivo* test showed that wound infection healed on day 7 for the HPMC formula, while the NaCMC, chitosan, and carbopol formulas recovered on day 10. Of the four formulas, the HPMC formula had the strongest bacterial inhibition and the fastest wound healing.

Keywords: Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.), Patch, *Staphylococcus aureus*, *In vitro* test, *In vivo* test.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu organ tubuh yang dapat melindungi tubuh terhadap berbagai ancaman dari luar seperti kuman, virus dan bakteri yakni kulit (Fitri Handayani, dkk, 2015). Indonesia yang merupakan negara tropis, dimana penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen berada pada peringkat yang cukup tinggi dan banyak dialami dalam urutan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Salah satu gangguan penyakit yang sering timbul pada bagian kulit yakni infeksi luka (Made Swastika, 2016). Bakteri, jamur, dan virus merupakan penyebab utama luka kulit yang terjadi di Indonesia (Dini Agustina, dkk, 2016).

Agen antibakteri merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme senyawa antibakteri dapat merusak dinding sel bakteri, mengubah permeabilitas membran, mengganggu pembentukan sintesis protein dan asam nukleat, serta menghambat aktivitas kerja enzim. Fenol, flavonoid, alkaloid, dan terpenoid merupakan beberapa senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan dinding sel. Senyawa ini berpotensi sebagai antibakteri alami terhadap bakteri patogen berbahaya seperti bakteri *Staphylococcus aureus* (Septiani, dkk, 2017).

Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis bakteri gram positif yang bersifat patogen dan cukup berbahaya pada manusia dan dapat menyebabkan infeksi pada kulit. (Nikmatul Hidayah & Aisha Khoirotun, 2016). *Staphylococcus aureus* sebagai flora umum yang terdapat di dalam tubuh manusia yang ditemukan pada kulit, sistem saluran pernafasan dan sistem saluran pencernaan, namun bila populasi bakteri tersebut melampaui tingkat aman dan keberadaannya di luar

habitat aslinya maka akan menyebabkan terjadinya infeksi (Putri Margaretha & Cristhalia, 2022). Menurut data dari Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri patogen yang paling umum penyebab infeksi dengan tingkat prevalensi 18-30% (Tong SYC & et al, 2015). *Staphylococcus aureus* salah satu penyebab terjadinya infeksi bakteri yang dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Namun, penyalahgunaan pengobatan yang tidak tepat dapat mengakibatkan munculnya resistensi. Oleh karena itu, terdapat pilihan lain yang bisa dibuat dengan cara menggunakan komponen bahan herbal sebagai komponen dasar terapi pengobatan.

Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki efek terapeutik, termasuk anggota tumbuhan dari famili Zingiberaceae. Secara tradisional masyarakat Indonesia telah memanfaatkan lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, antara lain antiradang, antivirus, antibakteri dan penyakit lainnya.

Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa ekstrak rimpang lempuyang gajah memiliki berbagai aktivitas efek biologis sebagai antioksidan dan antibakteri (Hartiwi Diastuti, dkk, 2022). Menurut penelitian sebelumnya telah dibahas tentang aktivitas antibakteri lempuyang gajah yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol lempuyang gajah secara kandungan fitokimia memiliki aktivitas antibakteri dan antijamur yaitu pada konsentrasi >400 $\mu\text{g}/\text{disc}$ (Jamilatur Rohmah & Chylen Setiyo Rini, 2022).

Rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) mengandung senyawa-senyawa terpenoid, flavonoid, tanin, fenolik, dan mengandung minyak atsiri sekitar 0,82% yang terdiri dari zerumbon, pinen, α -caryophyllene, camphene dan cineole. (Mursito, 2007). Senyawa-senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan terpenoid

diketahui memiliki sifat aktivitas antibakteri. Senyawa terpenoid diketahui memiliki aktivitas antibakteri utama dalam rempah-rempah. Mekanisme terpenoid sebagai agen antibakteri dengan cara bereaksi bagian fraksi lipid membran plasma bakteri yang mempengaruhi permeabilitas membran sel yang mengakibatkan kebocoran bahan intraseluler sehingga fungsi membran sel menjadi terganggu dan pertumbuhan sel menjadi terhambat (Via Pujiah, 2021). Senyawa tanin dan flavonoid merupakan senyawa polifenol yang bersifat sebagai agen antibakteri dengan cara membentuk ikatan kompleks dengan dinding sel bakteri sehingga menurunkan atau mengurangi permeabilitas dinding sel dan merusak membran sel bakteri akibat sifat zat lipofiliknya (Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017).

Patch adalah sediaan *dermal* yang menggunakan polimer untuk mengontrol pelepasan suatu obat (Hartesi & Sagita, 2021). Polimer, lapisan perekat, lapisan pendukung, *plasticizer*, penambah penetrasi, dan zat aktif membentuk komposisi tambalan yang tersedia saat ini sebagai pembentuk *patch* (Arya Baharudin, 2020). Polimer merupakan komponen utama dalam pembuatan *patch* adalah polimer, dimana polimer tersebut memastikan bahwa obat didistribusikan dengan kecepatan pelepasan obat yang terkendali (Nur Azizah Syahrana & Surya Ningsi, 2021). Sehingga dalam penelitian ini menggunakan tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri yaitu lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dengan memanfaatkan senyawa yang terkandung dalam rimpangnya yang diformulasikan dalam bentuk sediaan tambalan *patch*. Berbagai uji aktivitas antibakteri ekstrak rimpang lempuyang gajah telah dilakukan penelitian sebelumnya, tetapi belum ada penelitian yang melakukan penelitian tentang aktivitas antibakteri dalam bentuk sediaan *patch* yang mengandung ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L). bentuk sediaan *patch* sebagai terobosan terbaru dalam produksi obat yang dapat menutupi infeksi sehingga mencegah kontaminasi bakteri

dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan ketika digunakan (Trista Yulianti, 2021).

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Antibakteri *Dermal Patch* Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro* dan *In vivo*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi *in vitro* aktivitas antibakteri formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan menggunakan metode difusi agar?
2. Bagaimana evaluasi *in vivo* aktivitas antibakteri formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*?

C. Defenisi Operasional

1. Kulit adalah organ yang menutupi permukaan tubuh dan berfungsi sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar.
2. Bakteri adalah sekelompok organisme mikroskopis yang biasanya uniseluler dan tidak memiliki membran inti sel.
3. Antibakteri adalah zat yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan dapat membunuh bakteri penyebab infeksi.
4. Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) adalah salah satu tumbuhan empon dari famili Zingiberaceae yang biasa dikenal sebagai bahan obat tradisional dan bahan industri farmasi karena rimpangnya mengandung senyawa kimia yang dapat berkhasiat sebagai obat.
5. *Staphylococcus aureus* adalah salah satu bakteri yang berbentuk kokus dan bersifat gram positif, tersebar luas di alam dan ada beberapa yang hidup sebagai

flora normal pada manusia yang terdapat di bagian aksila, daerah inguinal dan perineal, dan bagian lubang hidung bagian anterior.

6. Kelinci (*Oryctogalus cuniculus*) adalah salah satu jenis ternak pseudoruminansia yang sering digunakan dalam penelitian biomedik sebagai hewan coba dimana pada penelitian ini dibuat luka sayatan pada punggung kelinci serta diinfeksi bakteri *Staphylococcus aureus*.
7. *Patch* adalah sediaan dermal yang menggunakan beberapa polimer seperti HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol yang berfungsi untuk mengontrol pelepasan suatu obat.
8. *In vitro* adalah pengujian di luar tubuh makhluk hidup yang dilakukan pada kultur bakteri, sel terisolasi, atau organ terisolasi dengan menggunakan cawan petri.
9. *In vivo* adalah pengujian pada makhluk hidup dimana pada penelitian ini menggunakan hewan coba kelinci.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratorium murni dimana dilakukan Uji Aktivitas Antibakteri *Dermal Patch* Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro* dan *In Vivo*.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya dimana ini bertujuan untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian, lalu dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya

Tabel 1. Kajian Pustaka

No	Judul	Peneliti	Hasil	Perbedaan/Persamaan
1.	Komponen dan Anti Bakteri dari Fraksi Kristal Minyak <i>Zingiber zerumbet</i> .	Sri Mulyani,2010	Lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> L.) mampu menghambat bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> pada kadar 25% .	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah metode yang digunakan menggunakan metode GC-MS dengan pelarut n – heksan dan pengujian dalam bentuk ekstrak. Persamaannya menggunakan bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> .
2.	Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe – Jahean (Zingiberaceae) Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Eschericia</i>	Kartika Indah Permata Sari, 2013	Estrak segar lempuyang gajah memiliki diameter daerah bebas mikroba terhadap <i>Staphylococcus aureus</i> dengan diameter 9,13 mm.	Perbedaan pengujian dalam bentuk ekstrak. Persamaan menggunakan metode difusi cakram dan bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> .

	<i>coli</i> , dan <i>Candida albicans</i> .			
3.	In Vitro Antibakteri Etanol Puni (<i>Zingiber zerumbet</i>) Asal Pulau Timur.	Origenes Boys Kapitan,2017	Ekstrak etanol <i>Zingiber zerumbet</i> lebih menghambat bakteri gram positif (<i>S. aureus</i> dan <i>B.subtilis</i>) dibandingkan dengan bakteri gram negatif (<i>E.coli</i> dan <i>B subtilis</i>).	Perbedaanya menggunakan metode difusi agar sumuran dan dalam bentuk ekstrak. Persamaanya menggunakan bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> .
4.	Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i>) Terhadap Bakteri <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Jamilatur Rohma, 2022	Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah memiliki daya hambat bakteri yang kuat (konsentrasi 20 dan 40%) dan sangat kuat (konsentrasi 60, 80, 100%).	Perbedaan pengujian dalam bentuk ekstrak. Persamaannya menggunakan metode difusi cakram.

5.	Perbandingan Efektifitas Antibakteri Ekstrak Rimpang <i>Zingiber zerumbet</i> Terhadap <i>Shigella dysenteriae</i> dan <i>Vibrio cholera</i> Secara <i>In Vitro</i> Dengan Metode Difusi.	Retno Kaharseno, 2015	Rimpang <i>Zingiber zerumbet</i> mempunyai efek antibakteri terhadap <i>Shigella dysenteriae</i> dan <i>Vibrio cholera</i> .	Perbedaanya menggunakan <i>Shigella dysenteriae</i> dan <i>Vibrio cholera</i> , dan pengujian dalam bentuk ekstrak. Persamaanya menggunakan metode difusi.
6.	<i>Zingiber zerumbet</i> Ekstrak Rimpang Menunjukkan Penyembuhan Luka	Asmah Hamid, 2018	Ekstrak etil asetat dari rimpang <i>Zingiber zerumbet</i> efektif sebagai gel pada penyembuhan luka.	Perbedaanya menggunakan hewan coba tikus dan dalam bentuk ekstrak. Persamaanya menggunakan rimpang <i>Zingiber zerumbet</i> .

	Terbuka Lebih Cepat.			
7.	Phytochemicals and Antibacterial Activity of Zingiber zerumbet Growing in Negeri Sembilan Malaysia.	Nur Atielia Preshandin, 2023	Minyak rimpang memiliki aktivitas antibakteri yang kuat terhadap <i>Escherichia coli</i> dan <i>Salmonella thyp</i> , ekstrak metanol menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Bacillus aureus</i> .	Perbedaannya menggunakan metode difusi cakram. Persamaanya menggunakan <i>Staphylococcus aureus</i> .

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi *in vitro* aktivitas antibakteri formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.
2. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi *in vivo* aktivitas antibakteri formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

G. Manfaat Penelitian

1. Untuk institut pendidikan

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh UIN Alauddin Makassar sebagai rujukan studi lanjutan, tambahan pengetahuan dan wawasan tentang aktivitas antibakteri formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dan *in vivo*.

2. Untuk Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah serta wawasan tentang aktivitas antibakteri formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dan *in vivo*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Lempuyang gajah merupakan tumbuhan dengan berbentuk semu yang memiliki tinggi sekitar 1 m. Daun lempuyang gajah berwarna hijau, berbiji-biji, sedangkan pucuk dan batang lempuyang gajah berbulu. Bunga lempuyang gajah muncul dari dalam tanah, bunga majemuk berupa tandan buah anggur yang dilengkapi dengan daun pelindung berwarna jingga-kuning, sedangkan buahnya berbentuk telur berwarna merah.

Tanaman lempuyang gajah ini dapat tumbuh dimana saja mulai dari daerah dataran rendah hingga di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 1200 mdpl (Mursito, 2007). Setiap rumpun bisa menghasilkan sekitar 14 anakan untuk daerah dataran rendah, tetapi hanya bisa menghasilkan 5 anakan untuk daerah dataran tinggi. Rimpang muda maupun rimpang tua berwarna kuning muda dengan warna daging kuning. Rimpang lempuyang gajah memiliki rasa yang keras dan pahit dan berbau wangi (Ulung, 2014).

1. Klasifikasi



Gambar 1. Rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) (Silalahi, 2018)

Regnum : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub Divisi : Angiospermae
Class : Monocotyledonae
Ordo : Zingiberales
Famili : Zingiberaceae
Genus : *Zingiber*
Spesies : *Zingiber zerumbet* L. *Roscoe ex sm* (Lianah, 2019).

2. Nama lokal

Lempuyang gajah, lempuyang kapur (sumatera), lempuyang badak, lempuyang kebo, lempuyang paek (jawa) (Mursito, 2007).

3. Morfologi

Lempuyang gajah merupakan salah satu tanaman terna tahunan (*perennial*) yang hidupnya berumpun atau bergerombol. Batang lempuyang gajah semu dengan tinggi maksimal mencapai 1-2 meter dpl, berwarna hijau, batang tersusun atas kumpulan pelepah daun. Daun tunggal dan berseling pada kanan dan kiri batangnya. Daunnya bangun, berbentuk lanset, dan memanjang. Ujung daunnya meruncing (*acuminatus*), pangkal daun runcing dengan tepi ujung yang rata. Panjang daun 25 - 40 cm dan lebar daun 10-15 cm. Jumlah helai daun 3-7 terlihat di setiap batang. Daunnya berbetuk menyirip, dengan tangkai daun pendek dan berbuku halus serta berwarna hijau tua. Bunganya berbentuk *pinecone* atau biji pinus dan berwarna merah dengan panjang tangkai bunga \pm 12 cm. Bentuk rimpang besar dan kuat serta bercabang kokoh dengan daging rimpang berwarna kuning kecoklatan (Lianah, 2019).

4. Ciri - Ciri Umum

Lempuyang gajah merupakan salah satu tanaman perdu herba yang dapat tumbuh tinggi, batang asli berupa rimpang di bawah tanah, yang tingginya mencapai lebih dari 1 m. Batang semu merupakan kumpulan pelepah daun yang berseling, beberapa dari batangnya berkoloni dan berwarna hijau, serta rimpangnya tumbuh menjalar dan harum. Batang semu dibentuk oleh daun tunggal, pelepah, selingan, dan pelepah, serta permukaan atas tertutupi untaian rambut halus lanset sempit di permukaannya. Majemuk, bulat atau memanjang, menjulang di atas tanah, berambut halus, tipis, dengan ujung agak melebar dan melindungi daun dengan ujung rata yang merupakan ciri - ciri rangkain bunga. Bunga kuning cerah, hijau tua, atau putih tersusun dalam mahkotanya. Putik bercabang bebas dan benang sari berwarna kuning cerah. Buahnya berwarna merah tua berbentuk bulat seperti telur di sisinya. Benih pada bunganya memiliki bentuk bulat memanjang dan membulat (Prapti Utami, 2008).

5. Kandungan Kimia

Rimpang lempuyang gajah mengandung minyak atsiri kurang lebih 0,82% yang terdiri dari komponen pendukung antara lain zerumbon, pinen, a-kariofilen, kamfen, sineol, limonen, eucalyptol, linanool, camphor, borneol, cycloheptane, norethynodrel, 3-carene, carveol, humulen epoksida, dan sinamaldehyd (Marina Silalahi, 2018). Selain itu rimpang lempuyang gajah juga mengandung flavonoid, saponin, terpenoid, dan polifenol (Mursito, 2007).

Kandungan kimia dari lempuyang gajah yaitu kurkumin, diasetilafzelin, sineol, dipenten, limonen, arkurkumen, kadinen, kariofilenoks id, humulenepoks id, humulenol, heksahidrohumulenol, kamfen, dan zerumbon (Prapti Utami, 2008).

6. Manfaat

Lempuyang gajah sejak lama digunakan sebagai obat tradisional maupun dan sebagai obat herbal bahan jamu. Rimpang lempuyang gajah dimanfaatkan dalam produk pelangsing, penghangat badan, obat anti pusing dan obat disentri. Dan juga membantu perut kembung dengan mengeluarkan gas (karminatif) (Mursito, 2007).

Selain itu rimpang lempuyang gajah juga memiliki khasiat dalam mengobati batu ginjal, disentri, kejang pada anak-anak, mencret, dapat meningkatkan nafsu makan, sebagai penyegar, mampu mengatasi sakit kuning, sakit kulit (obat luar), dan sesesma (Prapti Utami, 2008).

Hasil senyawa bioessay lempuyang gajah menunjukkan sebagai antiinflamasi, antimikroba dan antianalgesik (Marina Silalahi, 2018). Komponen senyawa-senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan terpenoid yang terkandung di dalam rimpangnya diketahui memiliki sifat aktivitas antibakteri. Minyak atsiri yang terkandung merupakan senyawa antimikroba dan sangat efektif dan ampuh sebagai antibiotik alami (Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017).


B. Kulit

Kulit merupakan lapisan atau jaringan yang menutupi setiap bagian tubuh dan dapat melindungi tubuh dari berbagai bahaya yang datang dari luar. Ketebalan kulit manusia bervariasi dari kisaran ketebalan 0,5 mm hingga 5 mm, luas permukaan kulit sekitar 2 m², dan berat kulit sekitar 4 kg.

Lapisan kulit sendiri terdiri dari dermis yang terletak pada bagian dalam dan lapisan epidermis yang terletak pada bagian luar. Lapisan kulit terluar dibentuk oleh keratin pada lapisan tanduk yang dibentuk oleh sel-sel kulit yang sudah tua. Pada beberapa organ, kulit memberikan gambaran yang mirip dengan sisik tipis. Lapisan paling dalam dari epidermis disebut lapisan basal atau stratum germinativum.

Karena lapisan kulit memiliki pigmen melanin, yaitu warna kulit, yang berada di lapisan permukaan kulit, dimana sel ini bertahan sekitar 5-6 minggu, jadi dapat dikatakan seseorang mengalami pergantian kulit setiap 5 minggu (Wibowo, 2005).

1. Struktur Kulit



Gambar 2. Struktur Kulit (Sonny J. R. Kalangi , 2013)

a) Epidermis

Epidermis terdiri dari banyak lapisan terpisah dari epitel skuamosa berlapis. Jenis sel utama dari lapisan ini disebut keratinosit. Keratinosit merupakan hasil pembelahan sel pada lapisan terdalam epidermis, yaitu lapisan basal (stratum basal), terus lapisan ini tumbuh ke arah permukaan kulit, dan bergerak ke atas, keratinosit mengalami proses diferensiasi terminal, untuk membentuk sel-sel pada lapisan permukaan (stratum korneum). Keratinosit, yang berkumpul sebagai respons terhadap *fillagrin*, menutupi komponen kerangka dari masing - masing sel ini dengan filamen keratin. Proses agregasi juga disebut sebagai keratinisasi, dan komponen filamen membuat jaringan intraseluler canggih yang terkandung dalam matriks protein amorf yang dihasilkan dari butiran keratophyaline yang ditemukan di granulosum (lapisan granula).

Epidermis terdiri atas beberapa lapisan yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan stratum korneum.

1) Stratum basal

Stratum basal disebut dengan lapisan basal atau lapisan benih. Lapisan ini terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang tersusun di atas membran basal dan melekat pada lapisan dermis yang ada di bawahnya. Pada lapisan ini terdapat gambaran sel mitosis, proliferasi sel yang terlihat pada lapisan ini berfungsi sebagai regenerasi epitel. Lapisan ini menggambarkan sel mitosis. Saat lapisan ini bergerak lebih dekat ke permukaan, sel - sel yang ada di lapisan ini memunculkan sel - sel di lapisan yang lebih dalam.

2) Stratum spinosum

Stratum spinosum disebut sebagai lapisan sensorik dimana lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel yang memiliki bentuk besar seperti berbentuk poligonal dengan inti yang berbentuk oval. Sitoplasmanya berwarna kebiruan. Pada lapisan ini mengandung desmosom yang berfungsi sebagai tempat melekatnya sel-sel satu sama lain pada lapisan ini. Lapisan ini semakin tinggi maka akan semakin rata berbentuk pipih.

3) Stratum granulosum

Lapisan stratum granulosum disebut juga sebagai lapisan berbutir. Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapisan epitel skuamosa yang lapisan selnya banyak mengandung butiran *keratohyalin*.

4) Stratum lusidum

Stratum lusidum disebut juga sebagai lapisan bening. Dimana lapisan ini terdiri atas 2-3 lapisan sel yang berbentuk pipih yang dapat menembus cahaya, dan sedikit *eosinophilic*.

5) Stratum korneum

Stratum korneum disebut juga sebagai lapisan tanduk. Dimana pada lapisan ini terdiri dari beberapa lapisan sel-sel mati, sel pipih, dan sel tanpa inti. Serta lapisan ini memiliki sitoplasma yang digantikan oleh keratin.

Terdapat empat jenis sel epidermis yaitu keratinosit, melanosit, sel langerhans, dan sel merkel.

1) Keratinosit

Sel-sel ini merupakan sel yang paling banyak ditemukan pada lapisan epidermis, dimana sekitar 85-95% berasal dari *ektoderm* yang terletak pada permukaan. Keratinosit adalah sel epitel yang berkeratin, sel yang dapat membentuk lapisan kedap air dan perisai pelindung bagi tubuh. Pada sel - sel ini, proses keratinisasi memakan waktu 2-3 minggu, dimulai dengan proliferasi mitosis, diferensiasi, kematian sel, dan deskuamasi (pengelupasan).

2) Melanosit

Sekitar 7 – 10% dari lapisan epidermis terdiri dari melanosit. Stratum basale dan stratum spinosum merupakan bagian dari cabang dendritik sel kecil yang panjang dan tipis, yang akan berakhir di keratinosit.

3) Sel langerhans

Sel ini merupakan sel dendritik yang berbentuk ireguler yang terdapat di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Sel langerhans ini berperan dalam aktivitas respon imun kulit.

4) Sel markel

Sel ini merupakan sel yang paling sedikit diantara sel lainnya. Sel - sel ini berasal dari kista neuralis yang ditemukan pada lapisan basal kulit tebal, folikel rambut, dan membran mukosa mulut (Sonny J. R. Kalangi, 2013).

b) Dermis

Dermis yang merupakan bagian dari kulit yang merupakan lapisan jaringan ikat yang terletak di lapisan dasar epidermis, dan merupakan pembentuk terbesar dari kulit. Dermis dan epidermis saling mengikat satu sama lain melalui penonjolan-penonjolan epidermis ke bawah (*rete ridge*) dan penonjolan-penonjolan dermis ke atas (*dermal papillae*). Dermis umumnya berupa anyaman serat-serat yang saling mengikat yang sebagian besar merupakan serat kolagen, tetapi beberapa serat merupakan serat elastin. Serat-serat inilah yang membuat kulit sangat kuat dan elastis. Serat-serat kolagen dan elastin yang merupakan protein bahan penyusun yang terbentuk dari mukopolisakarida (*glikosaminoglikan*).

Dermis terdiri atas 2 lapisan yaitu stratum papilaris dan stratum retikularis.

1) Stratum papilaris

Lapisan ini memiliki struktur yang lebih longgar yang ditandai dengan adanya papilla dermal, jumlahnya bervariasi antara 50 hingga 250/mm². Jumlahnya terbesar dan terbanyak yang lebih dalam pada

daerah dengan tekanan paling besar, seperti pada telapak kaki. Kebanyakan papilla mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang memelihara nutrisi pada epitel di atasnya.

2) Stratum retikularis

Lapisan pada bagian ini memiliki strata lebih tebal dan dalam. Bagian ini terdiri dari rongga jaringan lemak, kelenjar keringat, kelenjar sebaceous dan folikel rambut (Sonny J. R. Kalangi, 2013).

Lapisan dermis terutama terdiri dari fibroblas, sel mast, dan makrofag. Fibroblas ini, yang biasanya ditemukan di sebelah serat kolagen dan elastin, membantu menciptakan matriks jaringan ikat di dalam dermis. Sel mast yang merupakan komponen lapisan dermis dan berfungsi sebagai penghasil sekresi tertentu. Namun, arteri darah dan dermis adalah tempat sel mast mengandung mediator seperti histamin, prostaglandin, leukotrien, dan faktor kemotaktik eosinofil dan neutrofil, selain itu zat lain.

Makrofag merupakan sel fagosit yang berasal dari sumsum tulang dan dapat berperan sebagai pengumpul debris sel kotor dan bahan ekstraseluler. Pada lapisan dermis juga banyak mengandung pembuluh darah, kelenjar getah bening, saraf, dan reseptor sensori. Pada bagian bawah lapisan dermis terdapat sebuah lapisan lemak subkutan yang memisahkan kulit dari *fascia* dan otot yang ada di bawahnya (Robin Graham & Brown Tony Burns, 2005)

2. Fungsi Kulit

- a) Kulit mampu mencegah terjadinya kehilangan cairan tubuh yang esensial
- b) Kulit mampu melindungi dari masuknya zat-zat kimia beracun dari lingkungan dan mikroorganisme

- c) Kulit sebagai fungsi-fungsi imunologi
- d) Kulit mampu melindungi dari kerusakan akibat radiasi UV
- e) Kulit sebagai pengatur suhu tubuh
- f) Kulit sebagai tempat terjadinya sintesis vitamin D (Robin Graham & Brown Tony Burns, 2005).

3. Mekanisme Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka merupakan proses yang kompleks karena terjadinya kegiatan bioseluler dan biokimia yang terjadi secara berkesinambungan dari koordinasi serial termasuk pendarahan, koagulasi, inisiasi respon inflamasi akut, regenerasi, migrasi, dan proliferasi jaringan ikat dan sel parenkim, serta sintesis protein matriks ekstraseluler, remodeling parenkim dan jaringan ikat serta deposisi kolagen (Nova Primadina & Ahmad Basori, 2019). Secara umum penyembuhan luka dibagi dalam 3 fase

1. Fase inflamasi awal (fase hemostasis)

Fase inflamasi awal, juga dikenal sebagai fase hemostasis, dan fase inflamasi akhir adalah dua bagian dari fase inflamasi. Respons awal tubuh terhadap perdarahan yang disebabkan oleh jaringan yang rusak adalah mencoba menghentikannya dengan mengaktifkan faktor koagulasi intrinsik dan ekstrinsik, yang menyebabkan agregasi platelet dan pembentukan gumpalan. termasuk respon hemostatik (retraksi) dan reaksi hemostasis (Nova Primadina & Ahmad Basori, 2019).

2. Fase Proliferasi

Fase proliferasi, yang berlangsung dari hari ke-3 hingga hari ke-14 pasca-cedera, ditandai dengan penggantian matriks sementara secara bertahap, yang sebagian besar terdiri dari trombosit dan makrofag, dengan migrasi sel fibroblas dan pengendapan produksi matriks ekstraseluler. Pada

level makroskopis ditandai dengan adanya jaringan granulasi yang kaya akan jaringan pembuluh darah baru, fibroblas, dan makrofag, granulosit, sel endotel dan kolagen yang membentuk matriks ekstraseluler dan neovaskular yang mengisi celah luka dan memberikan *scaffold adhesi*, migrasi, pertumbuhan dan diferensiasi sel (Nova Primadina & Ahmad Basori, 2019).

3. Fase maturasi (*remodeling*)

Fase maturasi berlangsung mulai hari ke-21 hingga sekitar 1 tahun yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan integritas struktural jaringan baru pengisi luka, pertumbuhan epitel, dan pembentukan jaringan parut. Pada fase ini terjadi kontraksi dari luka dan *remodeling* kolagen. Kontraksi luka terjadi akibat aktivitas fibroblas yang berdiferensiasi akibat pengaruh sitokin TGF-beta menjadi *myofibroblas*, yakni fibroblas yang mengandung komponen mikrofila men aktin intraseluler. *Myofibroblas* akan mengekspresikan alfa SMA (alfa-*Smooth Muscle Action*) yang akan membuat luka berkontraksi matriks intraseluler akan mengalami maturasi dan asam hyaluronat dan fibronektin akan di degradasi (Nova Primadina & Ahmad Basori, 2019).

C. Bakteri

Kata bakteri berasal dari bahasa latin yaitu "*bacterium*" yang merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri adalah kelompok organisme mikroskopis yang pada umumnya bersel tunggal, dan tidak memiliki membran inti sel (Moch. Aditya, 2021). Bakteri biasanya berukuran beberapa mikrometer panjangnya dan mungkin berbentuk bulat, berbentuk batang, atau berbentuk spiral. Bakteri tersebut dapat tumbuh subur di tanah, air, mata air panas yang bersifat asam, limbah radioaktif, dan biosfer kerak bumi. Selain itu, bakteri dapat hidup berdampingan secara parasit dan bersimbiosis dengan

tumbuhan dan hewan. Hanya sekitar 27 persen spesies bakteri yang memiliki spesies yang dapat diproduksi di laboratorium, sedangkan sebagian besar bakteri belum dikarakterisasi.

Struktur sel bakteri sangat sederhana, artinya tidak memiliki inti sel atau nukleus, badan sel, dan organel-organel lainnya seperti mitokondria dan kloroplas. Kita dapat menemukan bakteri hampir di semua tempat seperti air, udara, tanah, dan dalam simbiosis dengan organisme lainnya serta sebagai agen patogen atau parasit, bahkan bakteri juga dapat kita temukan di dalam tubuh manusia. Pada umumnya ukuran bakteri adalah 0,5-5 μm . Namun ada beberapa bakteri tertentu yang dapat mencapai ukuran hingga 700 μm yakni *Thiomargarita* yang secara normal bakteri jenis ini mempunyai dinding sel, seperti sel pada tumbuhan dan jamur akan tetapi bahan pembentuknya berbeda atau peptidoglikan. Beberapa jenis bakteri mampu bergerak atau motil pergerakannya ini karena bakteri memiliki flagel (Effendi, 2020).


1. Ciri- Ciri Bakteri

- a) Uniseluler (bersel tunggal), prokariotik (tidak mempunyai membran inti)
- b) Ukurannya sangat kecil, lebar 0,5 – 1,0 milimikron, tetapi ada bakteri yang berukuran 100 mikron
- c) Hidupnya ada yang soliter (hidup secara sendiri-sendiri) dan ada juga bakteri yang hidup secara koloni (berkelompok) serta ada juga bakteri yang bersimbiosis, parasit, dan saprofit.
- d) Bakteri pada umumnya tidak mempunyai kloroplas, kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurin.
- e) Bakteri berkembang biak secara vegetatif dengan pembelahan *biner* dan generatif dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi.

f) Bakteri hidupnya kosmopolit, artinya bakteri dapat hidup dan ditemukan dimana saja. Akan tetapi dalam kondisi ekstrim bakteri dapat membentuk endospora. Pembentukan endospora dimulai ketika sel mulai mereplikasi DNA dan satu salinan DNANYa dikelilingi oleh dinding sel yang tebal dan kuat. Akhirnya, dinding sebelah luar rusak, tetapi endospora bakteri dapat bertahan hidup melewati segala jenis yang meliputi kekurangan makanan dan air. Panas atau dingin yang ekstrim, dan kebanyakan racun. Ketika lingkungan telah berubah menjadi normal maka endosporanya akan kembali mengalami hidrasi dan hidup kembali secara vegetatif untuk membentuk koloni (R.Gunawan Susilowarno & R.Sapto Hartono, 2007).



2. Struktur Tubuh Bakteri



Gambar 3. Struktur tubuh bakteri (Fifendy, 2017)

Setiap bagian tubuh pada bakteri memiliki fungsi masing-masing tiap bagian.

a) *Flagela* atau bulu cambuk

Flagela bakteri tersusun atas protein kontraktil sehingga dapat berkontraksi menyebabkan pergerakan ke kiri dan ke kanan sehingga bakteri dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 50 mm /detik atau sekitar seratus kali panjang tubuh perdetik. *Flagella* pada bakteri berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri.

b) Pilus atau *fimbria*

Bagian menonjol dari bakteri, yang muncul sebagai benang-benang kecil yang muncul dari dinding sel yang terbuat dari protein kontraktil, berfungsi sebagai mekanisme perlekatan pada bakteri lain dan juga pada organisme lain (sel inang).

c) Kapsula

Lapisan lendir yang mengelilingi sel dan merupakan kapsul, yang merupakan komponen dari bakteri, dibuat sebagai hasil dari sekresi metabolik. Bakteri ini memiliki kapsul yang berfungsi untuk terhubung ke substrat dan dapat memberikan perlindungan ekstra, termasuk meningkatkan ketahanan terhadap mekanisme pertahanan inang. Kapsul juga berfungsi sebagai pendiri koloni.

d) Dinding sel

Lapisan tubuh dinding sel terdiri dari peptidoglikan, juga dikenal sebagai murein, protein yang melekat pada rantai polimer polisakarida. Untuk bertindak sebagai bentuk sel pelindung, memberikan keamanan mekanis, dan mencegah sel pecah di lingkungan hipertonik yang lebih kental, dinding selnya tebal dan kaku.

e) Membran plasma

Molekul lipoprotein, yang terdiri dari molekul lipid (lemak) dan protein, membentuk membran plasma bakteri, yang merupakan membran tipis. Dinding sel bakteri mengandung membran plasma. Membran plasma mengontrol pertukaran zat antara sel dan lingkungannya dan berfungsi sebagai organ pelindung sel terhadap dunia luar.

f) Mesosom

Mesosom merupakan struktur seperti membran yang membentuk lipatan yang ada di sitoplasma. Mesosom berfungsi sebagai tempat segregasi (pemisahan) DNA dan pembentukan dinding sel baru serta transpor intraseluler.

g) Sitoplasma

Cairan yang membentuk sel bakteri disebut sitoplasma. Komponen utama sel, sitoplasma, terdiri dari air dan zat organik dan anorganik. Pada bakteri, sitoplasma berfungsi baik sebagai lingkungan organel dan penghalang terhadap benturan.

h) Ribosom

Di dalam sitoplasma bakteri terdapat organel terapung yang disebut ribosom. Molekul protein dan RNA membentuk ribosom. Sintesis protein terjadi pada ribosom. Protein terstruktur, seperti membran sel, dan protein fungsional, seperti enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme, keduanya dapat diproduksi oleh ribosom.

i) Region nukleoid

Meskipun bakteri tidak memiliki nukleus sel asli, mereka memiliki area yang mirip: area nukleoid. Sitoplasma lebih padat berwarna daripada area nukleoid. Molekul DNA beruntai ganda dengan bentuk seperti cincin (melingkar) dapat ditemukan di daerah nukleoid. DNA sel prokariotik biasanya seperseribu ukuran bakteri. Struktur seperti kromosom dari DNA beruntai ganda ini terlihat pada sel eukariotik. Untuk mengontrol aktivitas seluler agar sel bakteri bereproduksi, DNA bakteri melakukan peran ini.

j) DNA sirkuler

Meskipun bakteri tidak memiliki inti sel, mereka mengandung komponen yang disebut nukleoid. Hanya ada satu molekul DNA sirkular di dalam nukleoid.


k) Lembar fotosintetik

Lembaran fotosintetik adalah lipatan membran yang terjadi pada bakteri fotosintetik yang menghadap sitoplasma. Lembar fotosintesis bertindak sebagai katalis untuk fotosintesis.

l) Endospora

Beberapa bakteri ada yang mampu membentuk endospora. Pembentukan endospora adalah kemampuan beberapa bakteri. Bakteri dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dengan memproduksi endospora. Endospora tidak akan rusak oleh pemanasan karena tahan panas. Ketika suhu naik di atas 120 °C, spora dapat mati. Namun, endospora dapat berkembang menjadi bakteri seperti sebelumnya jika keadaan atau habitat telah membaik (R.Gunawan Susilowarno & R.Sapto Hartono, 2007).

D. *Staphylococcus aureus*



Gambar 4. Bakteri *Staphylococcus aureus* (Hastuti, 2020)

Klasifikasi *Staphylococcus aureus* sebagai berikut :

Domain : Bacteria
Kingdom : Eubacteria
Divisi : Firmicutes
Class : Bacilli
Ordo : Bacilales
Family : Staphylococcaceae
Genus : *Staphylococcus*
Species : *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus berasal dari kata *staphylos* yang berarti kelompok buah anggur dan *coccus* yang berarti bulat. *Staphylococcus aureus* merupakan nama spesies dari genus *Staphylococcus*. Nama genus diberikan karena pada pengamatan mikroskopis bakteri ini berbentuk seperti setengah buah anggur sedangkan spesies *aureus* diberikan karena bakteri ini berwarna kuning keemasan pada biakan murni. *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi pada luka.

Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri gram positif yang bersifat aerob fakultatif, tidak menghasilkan flora, dan tidak pula bergerak, umumnya bakteri ini akan tumbuh berpasangan maupun berkelompok, dengan diameter sekitar 0,8-1,0 μm . Bakteri dapat tumbuh pada suhu optimal 37 °C dengan waktu pembelahan 0,47 jam. Bakteri ini merupakan mikroflora normal manusia. Bakteri ini biasanya terdapat pada saluran pernapasan atas dan pada bagian kulit.

Pada manusia, *Staphylococcus aureus* dapat ditemukan pada flora normal saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan kulit. Selain itu, bakteri ini ada di lingkungan dan di udara. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan enterotoksin yang merupakan salah satu agen penyebab keracunan.

Enterotoksin yang dihasilkan oleh strain bakteri *Staphylococcus aureus* dapat mentolerir pemanasan pada suhu 100 °C selama 20 menit saat tumbuh dalam suatu produk. Bakteri ini bertanggung jawab atas sejumlah penyakit menular, termasuk bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. (Hastuti, 2020).

E. *Kelinci*



Gambar 5. Kelinci (Rinanto, dkk, 2018)

Klasifikasi kelinci (*Oryctogalus cuniculus*)

- Kingdom : Animalia
- Phylum : Chordata Sub
- Sub phylum : Vertebrata
- Clasis : Mammalia
- Ordo : Legomorpha
- Familia : Leporidae
- Subfamilia : Leporine
- Genus : *Oryctogalus*
- Spesies : *Oryctogalus cuniculus* (Rinanto, dkk, 2018).

Kelinci salah satu jenis ternak pseudoruminansia, yakni herbivora yang tidak dapat mencerna serat secara baik. Fermentasi hanya terjadi di *Caecum* yang merupakan 50% dari seluruh kapasitas saluran pencernaan. Kelinci juga diketahui

mampu melakukan *caecotrophy* atau *coprophage*, yaitu proses memakan kembali *faeces* di pagi atau malam hari (Rinanto, dkk, 2018).

1. Morfologi

Kepala, leher, badan, dan ekor, secara kolektif dikenal sebagai kaput, leher rahim, dan belalai, membentuk tubuh morfologi kelinci. Kelinci memiliki ukuran tubuh yang kecil, berukuran panjang 20 hingga 50 cm dan berat antara 0,4 hingga 2 kg. Mereka juga memiliki telinga panjang yang menghadap ke depan dan panjangnya bisa 10 cm atau lebih, hidung silindris, rambut halus menutupi seluruh tubuh, termasuk kaki dan ekor, empat kaki lebih pendek dari kaki belakang, lima jari di setiap kaki, dan gigi seri. Kelinci dulunya termasuk dalam ordo Rodentia (hewan pengerat) yang memiliki empat gigi seri. Namun, karena memiliki enam gigi seri, mereka kemudian dipindahkan ke ordo Logomoha (Yedraliza, dkk, 2017).

2. Pakan

Hijauan dan konsentrat adalah dua sumber utama pakan kelinci. Hijauan yang akan diberikan pada kelinci tidak segar; sebaliknya, ia harus layu. Mengetahui konsumsi harian per ekor, kebutuhan protein, kandungan kalori, kandungan serat kasar, dan kandungan lemak kasar pakan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan saat memberi makan kelinci (Marhaenyanto dan Susanti, 2017). Pelet merupakan ransum yang dibuat dengan cara Bahan baku digiling menjadi pelet, yang selanjutnya dikompres menggunakan cetakan dengan berbagai bentuk, diameter, panjang, dan kekerasan (Rinanto, dkk, 2018).

3. Kebutuhan Nutrisi Kelinci

Menurut NRC 1997 dalam Rinanto 2018 kelinci pada masa pertumbuhan membutuhkan Digestible Energy (DE) 2500 kkal/kg, TDN 65%, serat kasar 10-12%, protein kasar 16% dan lemak 2%. Pemberian pakan terhadap kelinci berdasarkan pada bobot kelinci dan status fisiologis. Kebutuhan bahan kering untuk kelinci adalah 3-3,5% bobot kelinci. Sedangkan menunjukkan bahwa kebutuhan pakan kelinci yaitu 60g/kg bobot/hari (Rinanto, dkk, 2018).

Nutrient	Kebutuhan Nutrisi Kelinci			
	Pertumbuhan	Hidup Pokok	Bunting	Laktasi
Digestible Energy (kcal/kg)	2500	2100	2500	2500
TDN (%)	65	55	58	70
Serat Kasar (%)		14		
Protein Kasar (%)	16	12	15	17
Lemak (%)	2	2	2	2
Ca (%)	0,45	-	0,4	1,75
P (%)	0,55	-	-	5
Metionin + Cystine	0,6	-	-	0,6
Lysin	0,65	-	-	0,75

Gambar 6. Kebutuhan Nutrisi (Yedraliza, dkk, 2017)

4. Kebiasaan Hidup

Meskipun aktif di malam hari, atau aktif di malam hari, kelinci dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan melakukan tugas pemeliharaan sepanjang hari. Kelinci dapat ditempatkan pada suhu 21°C, yang merupakan suhu ideal, meskipun dapat menjadi stres pada suhu antara 25 dan 30°C. Seekor kelinci akan mengalami tekanan jika ia dikeluarkan dari habitatnya yang nyaman dan ditempatkan di habitat yang tidak nyaman karena komponen sosial yang penting dalam hidupnya.

- a) *Coprophagy* yang artinya memakan kembali feses yang telah dikeluarkan, sifat coprophagy biasanya terjadi pada malam atau pagi hari berikutnya

- b) *Grooming* yang artinya kelinci menjilati rambut tubuh untuk menjaga kebersihan
- c) *Stereotypes*, yang disebut sebagai tindakan yang berulang dan tidak memiliki tujuan seperti mengais-ngais, menggigiti kawat, menggigiti tempat pakan, menekan tempat minum, kepala gemetar, mengunyah semu, mengigit pagar kandang dan menggosokkan badan pada dinding kandang
- d) Menandai wilayah kekuasaan pada kelinci jantan dengan melakukan urinasi (Yedraliza, dkk, 2017).

F. Antibakteri

Antibakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu Anti yang berarti “melawan” dan Bacteria yang berarti tongkat. Karena bakteri pertama kali ditemukan berbentuk seperti batang (Aulia Deby Pelu, 2022).

Zat antibakteri digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Antibakteri adalah metabolit sekunder yang terdapat pada makhluk hidup. Zat antibakteri seringkali bekerja dengan cara mengganggu dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mencegah sintesis protein, dan berpotensi menghambat aktivitas enzim. Alkaloid, flavonoid, dan fenol adalah beberapa zat yang berkontribusi terhadap kerusakan dinding sel bakteri atau penghambatan bakteri. Zat ini dapat berfungsi sebagai agen antibakteri organik melawan mikroorganisme berbahaya seperti *Staphylococcus aureus* (Septiani, dkk, 2017).

Alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid fenolik, dan tanin merupakan salah satu zat metabolisme sekunder yang terdapat pada ekstrak etanol rimpang gajah lempuyang. Karena senyawa fenolik memiliki kemampuan bakteriosidal dan bakteriostatik, maka senyawa fenolik dan turunannya yang terdapat pada ekstrak lempuyang Gajah memiliki aktivitas antibakteri. Sementara bakteriostatik adalah mekanisme fungsi antibakteri yang hanya memperlambat

pertumbuhan sel bakteri dan tidak dapat membunuh sel bakteri, bakteriosidal adalah mekanisme kerja antibakteri yang dapat menghancurkan sel bakteri.

Senyawa Tanin dalam ekstrak rimpang gajah lempuyang bekerja sebagai agen antibakteri dengan memicu enzim, adhesi sel mikroba, dan gangguan metabolisme transpor protein lapisan dalam sel (Jamilatur Rohmah & Chylen Setiyo Rini, 2022).

Pada dasarnya banyak metode yang dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas antibakteri suatu senyawa obat.

1. Metode Difusi

Metode ini merupakan salah satu metode dari uji aktivitas antibakteri yang sering digunakan. Dibandingkan dengan pendekatan lain, metode ini merupakan salah satu yang paling sering digunakan untuk menguji aktivitas antibakteri. Dengan menempatkan piring yang mengandung agen antimikroba di atas media agar yang telah diisi dengan bakteri, pendekatan ini memungkinkan agen antimikroba meresap ke dalam media agar. Daerah bening dapat digunakan sebagai indikator bahwa perlakuan antimikroba telah menghambat perkembangan bakteri pada permukaan media agar. Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri akibat difusi obat pada titik awal pemberian ke daerah difusi merupakan metode difusi observasi.

a) Metode Difusi Cakram

Piringan yang berisi agen antibakteri kemudian diletakkan pada media agar yang sebelumnya telah ditanami bakteri sehingga antibakteri dapat berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan bakteri oleh agen antibakteri pada permukaan media agar tersebut. Metode difusi ini dilakukan dengan cara menanam bakteri pada media agar padat tertentu kemudian diletakkan

kertas samir (cakram) atau disk lalu dilihat hasil diameter hambatnya. Diameter zona jernih inhibisi di sekitar cakram diukur sebagai kekuatan inhibisi obat melawan bakteri yang diuji.

b) Metode E-Test (*Epsilometer test*)

Metode ini merupakan metode gabungan antara metode difusi dan metode dilusi. Metode ini digunakan untuk mengestimasi Kadar Hambat Minimum (KHM) yang merupakan konsentrasi minimal suatu agen antibakteri untuk dapat menjadi penghambat pertumbuhan bakteri. Metode ini menggunakan strip plastik yang mengandung agen antibakteri dari kadar terendah sampai dengan kadar tertinggi dan diletakkan pada permukaan media agar yang telah ditanami bakteri sebelumnya.

c) *Ditch-Plate Technique*

Metode ini menggunakan sampel uji berupa agen antibakteri. Dalam teknik ini, sampel uji berupa agen antibakteri digunakan. Itu ditempatkan di parit yang dibuat dengan mengiris media agar secara longitudinal dalam cawan petri, dan bakteri uji (menggunakan maksimal 6 jenis bakteri uji) digoreskan ke arah parit yang mengandung agen antibakteri.

d) *Cup-Plate Technique*

Metode ini sama dengan metode disk diffusion dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami oleh mikroorganisme dan pada media agar tersebut diberi agen antibakteri yang akan dilakukan pengujiannya.

2. Metode Dilusi

Metode dilusi adalah salah satu metode aktivitas antibakteri yang digunakan untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas antimikroba dengan menentukan Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM) (Fatisa, 2013).

Metode dilusi menggunakan prinsip pengenceran antibakteri sehingga dapat diperoleh beberapa konsentrasi yang ditambah suspensi bakteri dalam media. Metode pengenceran memanfaatkan prinsip pengenceran antibakteri untuk menghasilkan beberapa konsentrasi yang ditambahkan pada media yang mengandung suspensi bakteri. Ada atau tidak adanya pertumbuhan bakteri adalah pendekatan yang diamati; jika ada pertumbuhan bakteri, tingkat kesuburan pertumbuhan itu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah koloni. Menghitung jumlah koloni yang diperlukan untuk menghentikan pertumbuhan atau membasmi bakteri yang diuji adalah tujuannya (Indra Lesmana & Afidatul Muadifah, 2020).

G. Antibiotik

1. Defenisi Antibiotik

Antibiotika (*anti* = lawan, *bios* = hidup) merupakan zat – zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman tetapi memiliki toksisitas yang relatif rendah terhadap manusia (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). Antibiotik bersifat bakterisidal yang membunuh bakteri sedangkan antibiotik bersifat bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan bakteri (Etebu & Arikekpar, 2016).


2. Klasifikasi Antibiotik

Ada beberapa klasifikasi antibiotik yakni berdasarkan mekanisme aksi, spektrum kerja, dan struktur molekul (Etebu & Arikekpar, 2016).

a) Berdasarkan mekanisme aksi

Antibiotik dalam menghambat bakteri dan membunuh bakteri berdasarkan mekanisme aksi terdiri dari :

- 1) Antibiotik menghambat sintesis peptidoglikan pada dinding sel bakteri sehingga dinding sel bakteri menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmotik dari plasma akibat pecah, contohnya pada kelompok penisilin, sefalosporin, dan vankomisin (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).
- 2) Antibiotik yang merusak sintesis molekul lipoprotein di membran sel sehingga meningkatkan permeabilitas dan zat-zat yang terdapat di dalam sel dapat merembes keluar dari sel, contohnya polimiksin dan daptomycin (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).
- 3) Antibiotik yang menghambat sintesis protein dengan merusak fungsi subunit 50S ribosom seperti kloramfenikol, makrolida, klindamisin, linezolid dan streptogramin serta antibiotik yang bekerja dengan berikatan pada subunit 30S ribosom seperti aminoglikosida dan tetrasiklin sehingga terjadi penghambatan pertumbuhan bakteri (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).
- 4) Antibiotik yang mempengaruhi metabolisme asam nukleat dengan menghambat polimerisasi RNA dan menghambat topoisomerase seperti quinolon dan rifampisin (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).
- 5) Antibiotik antimetabolik yang bekerja dengan memblok enzim dalam proses sulfonamid asam folat seperti kombinasi sulfonamide dan trimethoprim



Gambar 7. Situs target antibiotik (Etebu & Ariekpar, 2016)

b) Berdasarkan Spektrum Kerja

Antibiotik berdasarkan luas spektrum kerjanya dibagi menjadi 2 yakni :

- 1) Antibiotik *narrow-spectrum* (aktivitas sempit). Obat-obat ini terutama aktif terhadap beberapa jenis bakteri saja, seperti penisilin-G dan penisilin-V, eritromisin, klindamisin, kanamisin, dan asam fusidat hanya bekerja terhadap kuman gram - positif. Sedangkan streptomisin, gentamisin, polimiksin-B dan asam nalidiksat khusus aktif terhadap bakteri gram-negatif. (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).
- 2) Antibiotik *broad - spectrum* (aktivitas luas) bekerja terhadap lebih banyak bakteri baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, seperti sulfonamida, ampicilin, sefalosporin, kloramfenikol, tetrasiklin dan rifampisin (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).

c) Berdasarkan Struktur Molekul

Pengelompokkan antibiotik berdasarkan struktur molekul yaitu golongan β lactam, makrolida, kloramfenikol, oxazolidinones, tetrasiklin, aminoglikosida, quinolon, dan sulfonamid.

1) β lactam

Antibiotik golongan ini bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel dengan mengikat *penicilin binding protein* pada bakteri dan mengganggu ikatan silang struktur peptidoglikan yang mencegah transpeptidasi terminal di dinding sel bakteri (Van Hoek, dkk, 2011). Golongan antibiotik ini terdiri dari penisilin, sefalosporin, monobactam, dan carbapenen.

(a) Penisilin

Penisilin merupakan salah satu kelas antibiotik yang paling luas dan pertama dilaporkan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929 (Katzung, 2018). Penisilin digolongkan dengan beberapa kelompok sebagai berikut :

(1) Penisilin Natural (Penisilin G dan Penisilin V)

Penisilin G adalah obat pilihan untuk infeksi yang disebabkan oleh streptokokus, meningokokus, beberapa enterokokus, rentan terhadap penisilin, pneumococci, staphylococci dikonfirmasi sebagai non- β -lactamase producing, treponema pallidum dan spirochetes tertentu lainnya (Katzung, 2018).

Benzathine dan Procaine Penicillin G digunakan secara injeksi intramuscular dengan penggunaan jangka panjang. Injeksi Benzathine penicillin intramuscular adalah pengobatan efektif untuk faringitis yang disebabkan oleh streptococcus dan infeksi lain oleh Treponema pallidum (Katzung, 2018).

(2) Penisilin Resisten β -Lactamase (Methicillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin, Nafcillin)

Penisilin semisintetik ini diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan oleh *Staphylococcus* penghasil β -Lactamase. Molekul dari antibiotik ini mengandung gugusan yang mengelilingi dan melindungi cincin β Lactam sehingga β -Lactamase tidak dapat mendekati molekul untuk menguraikannya (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).

(3) *Extended-Spectrum* Penisilin (Amino Aminopenicilin, Carboxy penicilin, Ureidopenicilin)

Obat-obat ini memiliki aktivitas yang besar dalam menembus membran luar bakteri gram negatif (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). Aminopenicillin dan antipseudomonal umumnya digunakan kombinasi dengan β -Lactamase inhibitor seperti klavulanat, sulbactam atau tazobactam sehingga mampu memperluas aktivitasnya terhadap *S. aureus* dan beberapa bakteri gram negatif penghasil β Lactamase (Katzung, 2018).

(b) Sefalosporin

Inti dari sefalosporin adalah asam 7- aminocephalosporanic yang memiliki kemiripan yang dekat dengan asam 6- aminopenicillanic. Sefalosporin diklasifikasikan menjadi 4 generasi dengan spektrum aktifitas antianaerob lebih luas, aktivitas antipseudomonal, dan peningkatan stabilitas pada β -Lactamase (Katzung, 2018).

(c) Carbapenem

Carbapenem termasuk golongan antibiotik β -lactam yang mampu menahan hidrolisis enzim β -Lactamase sehingga aktifitas antibiotik tetap bekerja. Carbapenem diantara ratusan antibiotik β -

lactam yang diketahui, memiliki spektrum aktivitas terluas dan potensi terbesar melawan bakteri gram positif dan gram negatif sehingga sering disebut “antibiotik pilihan terakhir” yang diberikan ketika pasien dengan infeksi parah atau diduga memiliki bakteri resisten. Imipenem, meropenem dan ertapenem termasuk kelompok carbapenem yang memiliki broad spectrum (Etebu & Ariekpar, 2016).

(d) Monobactam

Struktur cincin β -lactam dari monobactam berdiri dan tidak menyatu dengan cincin lain. Aztreonam merupakan satu-satunya antibiotik yang tersedia secara komersial dengan spektrum sempit. Aztreonam hanya aktif terhadap bakteri gram negatif aerob seperti neisseria dan pseudomonas untuk mengobati pneumonia, sepsis, dan infeksi saluran kemih yang disebabkan kelompok bakteri tersebut. Monobactam tidak efektif terhadap bakteri gram positif maupun anaerob. Pemberian monobactam dengan cara injeksi dan inhalas (Katzung, 2018).

2) Makrolida

Antibiotik makrolida memiliki struktur utama cincin lakton yaitu amino dan gula netral dilekatkan oleh ikatan glikosidik (Van Hoek, dkk, 2011). Mekanisme kerja golongan antibiotik makrolida yaitu menghambat pertumbuhan bakteri (*bacteriostatic*), tetapi dalam konsentrasi yang tinggi dapat mematikan bakteri (*bacterisidal*) (Van Hoek, dkk, 2011).

3) Kloramfenikol

Mekanisme kerja kloramfenikol menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat secara terbalik ke subunit 50S ribosom sehingga menghambat pembentukan ikatan peptida. Kloramfenikol merupakan antibiotik *broad-spectrum* yang berkhasiat bakteristatik terhadap gram positif aerob maupun anaerob dan bakteri gram negatif (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).

4) Oxazolidinones

Oxazolidinone menghambat sintesis protein dengan mencegah pembentukan kompleks ribosom yang menginisiasi sintesis protein. Situs pengikatannya yang unik yaitu terletak di RNA ribosom 23S dari subunit 50S yang menghambat sintesis protein pada taraf dini sekali, menghasilkan tidak ada resistensi silang dengan kelas obat yang lain (Katzung, 2018).

5) Tetrasiklin

Tetrasiklin merupakan antibiotik *broad-spectrum* bersifat bakteristatik yang menghambat sintesis protein. Tetrasiklin menembus bakteri melalui difusi pasif dan proses transport aktif bergantung pada energi. Saat sudah memasuki sel, tetrasiklin mengikat subunit 30S ribosom bakteri secara reversible sehingga menghambat pertumbuhan bakteri (Katzung, 2018).

6) Aminoglisida

Aminoglikosida merupakan antibiotik yang menghambat sintesis protein secara irreversible dengan mengikat subunit 30S ribosom. Aminoglikosida menghambat sintesis protein dengan mengganggu inisiasi kompleks dalam pembentukan peptida, kesalahan

dalam translasi mRNA, dan memecah polisom menjadi monosom nonfungsional (Tjay T.H & Rahardja K, 2015).

7) Quinolon

Quinolon bekerja langsung terhadap sintesis DNA bakteri. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat topoisomerase II (DNA gyrase) untuk mencegah transkripsi dan replikasi normal oleh DNA superkoil, dan menghambat topoisomerase IV untuk mengganggu pemisahan DNA kromosom yang direplikasi ke sel anak selama pembelahan sel. Antibiotik yang termasuk quinolon yaitu siprofloksasin, levofloksasin, lomefloksasin, floksasin, ofloksasin, dan lain-lain. Quinolon memiliki aktivitas yang sangat baik terhadap bakteri gram negatif dan aktivitas sedang hingga baik terhadap bakteri gram positif (Katzung, 2018).

8) Sulfonamid

Mekanisme kerja Sulfonamid yaitu menghambat dihidropteroat sintase dan produksi folat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Sulfonamida mampu menghambat bakteri gram positif, seperti *Staphylococcus sp* dan bakteri gram negatif enteric seperti *E coli*, *Klebsiella pneumonia*, *Salmonella*, *Shigella*, dan *Enterobacter sp*. Aktivitas kurang baik terhadap anaerob (Katzung, 2018).

H. Sediaan Patch

Rute penghantaran suatu obat secara dermal merupakan salah satu alternatif untuk beberapa obat. *Dermal patch* merupakan bentuk sediaan yang menghantarkan obat melalui perantara kulit untuk dapat menghasilkan efek sistemik dengan kecepatan yang dapat dikontrol. Keuntungan dari bentuk sediaan *patch* ini antara lain penggunaannya yang mudah, dapat mengurangi frekuensi pemberian obat, menghindari terjadinya *first pass effect* dengan dimetabolisme

secara cepat sehingga obat yang telah mencapai sirkulasi sistemik menjadi jauh berkurang, dan menjaga bioavailabilitas (Viqi Kurnia Wardani & Dwi Saryanti, 2021). Hampir semua desain *patch dermal*, obat disimpan dalam reservoir yang tertutup pada salah satu sisinya dengan suatu penyokong impermeable dan mempunyai perekat yang bersentuhan langsung dengan kulit pada sisi lainnya (Nur Intan Widya, 2016).

I. Tinjauan Islam Lempuyang gajah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta yang diciptakan Allah swt. Tumbuhan yang merupakan makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil dalam proses fotosintesis. Begitu pentingnya peranan tumbuhan bagi kelangsungan hidup di bumi ini. Karena tumbuhan merupakan produsen pertama dalam rantai makanan selain sebagai penghasil oksigen (O_2) terbesar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena tumbuhan sebagai bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahkan bahan obat-obatan.

Rasulullah saw bersabda bahwa barangsiapa yang menghidupkan lahan yang mati maka itu menjadi haknya dengan kata lain seseorang tersebut berhak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang dia tanam di tempat tersebut (Gita Anggraini, 2016). Tumbuhan yang baik yakni tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai obat. Banyak manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. Salah satunya tumbuhan dari famili zingiberaceae yakni lempuyang gajah (*Zingiber*

zerumbet L.) yang merupakan salah satu genus dari *Zingiber* yang telah lama dan banyak digunakan sebagai obat tradisional. Keberadaan tumbuh – tumbuhan ini merupakan berkah, rezeki dan nikmat dari Allah swt yang diberikan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini, dimana Allah swt berfirman dalam QS. Al Insan/76:17-18 yang berbunyi :

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا

Terjemahnya :

“Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe (yang didatangkan dari), sebuah mata air (di surga) yang dinamakan salsabil” (Kementrian Agama, 2019).

Menurut quraish shihab dalam tafsir al-misbah maksud dari ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang baik itu didalam surga, mereka akan disuguhi segelas minuman yang campurannya adalah jahe tapi bukan seperti jahe duniawi. Jahe itu dari sebuah mata air surga yang dinamai atau ciri sifatnya adalah salsabil (M.Qurais Shihab, 2012).

Menurut tafsir ibnu katsir “ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ” Di dalam surga mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe” maksudnya yaitu orang-orang yang berbuat baik, juga akan diberi minum dengan gelas – gelas ini. كَأْسًا yakni, segelas minuman : كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا yang campurannya adalah jahe” terkadang mereka diberikan minuman yang dicampur dengan kafur yang dingin, dan pada saat lain diberi minuman yang bercampur dengan jahe yang hangat, agar ada keseimbangan bagi mereka. Terkadang minuman dingin dan panas. Dia berfirman, عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا “sebuah mata air sungai dinamakan salsabil” yaitu *zanjabil* (jahe) ini merupakan sebuah mata air di surga yang bernama salsabila. Ikrimah mengatakan: “ia merupakan nama sumber air di surga” sedangkan mujahid mengatakan “disebut demikian karena alirannya yang lembut dan tajam” (Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, 2007). Jahe atau yang disebut Al-Quran sebagai *zanjabil* ini jika di dunia sering dikonsumsi

manusia. Jahe dimanfaatkan sebagai minuman sehari-hari, dan umumnya karena dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan suatu penyakit. Pemanfaatan inilah yang merupakan salah satu upaya konservasi yang dilakukan manusia melalui tumbuhan (Amanda putri & Astin Diassari, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka wajib atas kita sebagai manusia untuk melakukan upaya konservasi terhadap tumbuhan. Dengan cara mencari tahu, mengelolah, dan meneliti manfaat yang dimiliki dari setiap tumbuhan yang ada di bumi ini yang dapat digunakan sebagai obat. Di dalam al-quran memang tidak dijelaskan secara tersurat mengenai tumbuhan sebagai obat, tetapi ada beberapa surah yang menjelaskan secara tersirat menggambarkan tentang perintah untuk mencari tahu cara memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit. Yang terdapat di dalam QS. asy- Syu'ara/26:80 yang berbunyi:

وَإِذَا مَرَّضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

“ Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan ku”

(Kementrian Agama, 2019).

Menurut tafsir Ibnu Katsir maksud ayat tersebut disandarkan penyakit kepada dirinya, sekalipun itu merupakan suatu qadar, qadha dan ciptaan Allah swt. Akan tetapi, ia sandarkan hal itu kepada dirinya sebagai sikap beradab. Makna ayat tersebut bila aku sakit, sesungguhnya tiada seorang pun selain Allah swt yang dapat menyembuhkanku dengan berbagai macam sarana pengobatan yang menjadi penyebab kesembuhan sesuai takdirnya (Ibnu Katsir, 2003).

Dimana penyembuhan yang langsung dari Allah swt ataupun melalui perantara misalnya obat atau segala sesuatu yang berasal dari bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai obat misalnya tumbuhan. Setelah berobat ada yang langsung sembuh ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Dimana kesembuhan tergantung dari ridha Allah swt. Dan kita sebagai manusia sudah

sepatutnya untuk memanfaatkan akal pikiran kita dan berusaha untuk mencari tahu cara memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit dengan berbagai macam sarana pengobatan yang telah Allah swt limpahkan di muka bumi ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat muslim yang berbunyi :

حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ
 سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ
 عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim no.4084) .

Dalam bahasa arab, usaha untuk mendapatkan suatu kesembuhan biasa disebut dengan istilah At-Tadawi yang artinya menggunakan obat, diambil dari akar kata dawa (mufrad) yang bentuk jamaknya adalah adwiyah. Kalimat dawa yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti obat, adalah segala yang digunakan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit yang mereka derita. Sementara penyakit yang akan diobati, dalam bahasa arab biasa disebut dengan istilah Daa-un, bentuk masdar dari kata Daa-un. Bentuk jamak dari kalimat “Aada-u” adalah “Adwaa-u”. Pengertian kalimat Tadawi dalam sisi bahasa tidak jauh berbeda dengan makna tadawi yang dipahami oleh para ahli fikih (pakar hukum Islam). kalimat Tadawi diartikan oleh para pakar hukum Islam dengan makna; menggunakan sesuatu untuk penyembuhan penyakit dengan izin Allah swt, baik pengobatan tersebut bersifat jasmani ataupun alternatif (Syabir, 2005).

Para ahli fikih dari berbagai mazhab; yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan ulama mazhab Hambali sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati

penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Hadis di atas mengisyaratkan diizinkan seorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah swt penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan (Syabir, 2005).

Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa setiap penyakit yang diberikan Allah swt ada anti penawarnya. Maka setiap penyakit ada obatnya yang menjadi anti penawarnya kita sebagai manusia hanya perlu berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mencari tahu segala cara untuk memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit dengan cara mengelolah atau memanfaatkan segala jenis kekayaan hayati yang ada di bumi seperti tumbuhan untuk dijadikan sebagai obat. Sehingga kita sebagai manusia dapat melakukan berbagai penelitian tentang manfaat dari setiap tumbuhan yang telah Allah swt limpahkan di muka bumi ini.

Dimana pada penelitian ini menggunakan tumbuhan dari famili zingiberacea yakni lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dengan memanfaatkan senyawa yang terkandung di dalam rimpangnya dimana diketahui lempuyang gajah mengandung senyawa yang dapat digunakan sebagai antibakteri untuk menyembuhkan infeksi luka pada kulit yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi penelitian eksperimental yang dilakukan di laboratorium untuk mengevaluasi uji aktivitas antibakteri formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dan *in vivo*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Mikrobiologi dan Farmakologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian eksperimental kuantitatif.

C. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) yang telah diformulasikan pada penelitian sebelumnya.

D. Instrumental Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain autoklaf (*hirayama*[®]), oven (*memmert*[®]), inkubator (*memmert*[®]), laminar air flow (*esco*[®]), erlenmeyer (*pyrex*[®]), lampu spiritus, timbangan analitik (*kern*[®]), *surgicale blade sterile* (pisau bedah) (*onemed*[®]), beker glass (*pyrex*[®]), cawan petri, alat sentrifugasi (*hettich*[®]), tabung reaksi (*pyrex*[®]), hot plate (*nesco*[®]), alat spektrofotometer UV-Vis (*genesys 10s uv-vis*[®]), mikropipet (*memmert*[®]), jangka sorong (*kenmaster*[®]), alat pencukur (*kemei*[®]), vorteks (*heidolph*[®]).

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.), kelinci (*Oryctogalus cuniculus*), *Tryptic Soy Broth* (TSB), *Tryptic Soy Agar* (TSA), biakan bakteri *Staphylococcus aureus*, alkohol 70%, aquades, NaCl 0,9%, H₂SO₄ 1%, BaCl₂ 1 %, *ethyl Ochloride spray* (*walter ritter*[®])

E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan

1. Sterilisasi alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini disterilkan terlebih dahulu dengan cara dicuci bersih, dikeringkan, dan dibungkus dengan kertas koran lalu dilakukan sterilisasi menggunakan oven pada suhu 170 °C selama 2 jam untuk alat yang terbuat dari kaca, kemudian untuk jarum ose disterilkan dengan cara pemijaran menggunakan lampu spiritus, dan media yang digunakan dalam penelitian ini disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

2. Persiapan uji aktivitas antibakteri secara *in vitro*

a) Pembuatan TSB

Dilakukan dengan cara menimbang 7,5 g *Trypticase Soy Broth* (TSB) lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan 250 ml aquades. Kemudian dipanaskan hingga mendidih di atas hot plate sambil dihomogenkan. Setelah homogen medium di sterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit (Nera Umilia Purwanti & Ressi Susanti, 2016).

b) Pembuatan TSA

Dilakukan dengan cara menimbang 10 g *Trypticase Soy Agar* (TSA) lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Kemudian dilarutkan dengan 250 ml aquades. Kemudian dipanaskan hingga mendidih di atas hot plate sambil dihomogenkan. Setelah homogen medium di sterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit (Nera Umilia Purwanti & Ressi Susanti, 2016).

c) Pembuatan larutan standar Mc Farland

Pembuatan larutan standar kekeruhan 0,5 unit Mc Farland dibuat dari campuran larutan H₂SO₄ 1% sebanyak 9,95 ml dan larutan BaCl₂ 1% sebanyak 0,05 ml dalam tabung reaksi kemudian dihomogenkan hingga terbentuk larutan yang keruh (Pancawati Arami,dkk, 2017).

d) Kultur bakteri *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus dikultur dalam medium *Trypticase Soy Broth* (TSB) pada suhu 37 °C selama 24 jam. Kemudian media dishaker dengan alat sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 30 menit. Pelat endapan yang telah diperoleh kemudian dibuat suspensi bakteri dengan menggunakan NaCl 0,9% dengan kesetaraan 1,5 x 10⁸ CFU/mL atau setara

dengan larutan standar Mc Farland dari suspensi bakteri yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode analisis spektrofotometer UV–Vis untuk menghitung kepadatan bakteri (Latifah Rahman & Reni Sriyani Lembang, 2021).

e) Aktivitas antibakteri secara *in vitro*

Tabel 2. Komposisi *patch*

Komposisi	Ekstrak (%)	PVP (%)	PPG (%)	HPMC (%)	NaCMC (%)	Kitosan (%)	Karbopol (%)
1	5	10	0,5	2	-	-	-
2	5	10	0,5	-	2	-	-
3	5	10	0,5	-	-	2	-
4	5	10	0,5	-	-	-	0,3
K(-)	-	10	0,5	2	-	-	-

Keterangan :

K(-) : Kontrol negatif

Aktivitas antibakteri dilakukan dengan cara metode difusi agar dengan teknik penanaman bakteri metode cawan tebar (*Spread Plate Method*). Dimasukkan media TSA ke dalam plate dan ditunggu hingga media mengeras atau memadat. Dilakukan penanaman bakteri dengan cara menyebarkan secara merata bakteri yang telah di kultur diatas media agar TSA menggunakan mikropipet 100 mikroliter. Disediakan sediaan *patch* dari 4 formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*), dan *patch* yang tidak mengandung ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) sebagai kontrol negatif lalu dicetak dengan cetakan sesuai dengan disk 6 mm dan diletakkan tiap formula *patch* lempuyang gajah, dan kontrol negatif pada media agar. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam di dalam inkubator. Kemudian diamati dan diukur diameter zona hambat secara visual sediaan *patch* masing-masing formula terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan jangka sorong (Amitia Nice Tiensi, dkk, 2018).

f) Analisis data

Data dari hasil uji aktivitas antibakteri *dermal patch* lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dianalisis menggunakan SPSS ver. 26 untuk melihat ada atau tidaknya aktivitas antibakteri dari masing-masing formula *patch* lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*), dan kontrol negatif. Data diameter hambat dianalisis normalitasnya secara statistik menggunakan Metode *Shapiro Wilk*. Hasil yang diperoleh jika terdistribusi normal ($p > 0.05$) dan dilanjutkan dengan metode analysis of varian *One Way Anova* dengan taraf kepercayaan 95% (Tristina Yulianti, dkk, 2021).

3. Persiapan aktivitas antibakteri secara *in vivo*a) Pembuatan suspensi *Staphylococcus aureus*

Pembuatan suspensi bakteri dilakukan dengan cara mengambil 1 ose bakteri *Staphylococcus aureus* yang telah dikultur. Kemudian suspensi dibuat dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml NaCl 0,9%. Kemudian kekeruhan hasil suspensi bakteri disesuaikan dengan standar kekeruhan Mc Farland atau setara dengan $1,5 \times 10^8$ CFU/mL (Nurhayati, dkk, 2020).

b) Penyiapan hewan uji dan pembuatan luka

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini ialah kelinci dengan jenis kelinci lokal sebanyak 5 ekor berumur 4 – 5 bulan dengan rata-rata berat badan 1,4 - 1,5 kg. Sebelum dilakukan perlakuan kelinci di aklimatisasi dengan lingkungan tempat penelitian selama 10 hari.

Tabel 3. Kriteria hewan uji

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Sehat	Sakit
Umur 3 - 5 bulan	Mati dalam jangka waktu penelitian
Berat 1,4 – 1,5 kg	

Sehari sebelum pembuatan luka sayat, kelinci dicukur bulunya di daerah punggung sampai licin. Pada saat pembuatan luka terlebih dahulu punggung kelinci dibersihkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya dibuat luka sayatan dengan ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 2 mm menembus lapisan subkutan pada bagian punggung kelinci menggunakan *surgicale blade sterile* (pisau bedah) sebanyak 5 luka tiap kelompok yang sebelumnya telah dianestesi lokal menggunakan *ethyl*. Dibuat infeksi luka dengan cara suspensi bakteri *Staphylococcus aureus* diberikan sebanyak 0,1 ml pada masing-masing lokasi luka sayatan. Kulit kelinci yang telah terinfeksi bakteri *Staphylococcus aureus* diberikan perlakuan dengan menempelkan sediaan formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*), dan *patch* yang tidak mengandung ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) sebagai kontrol negatif ke kulit kelinci yang terinfeksi dengan 5 kelompok.

Kelompok 1 : luka infeksi ditempelkan 4 formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) dan *patch* yang tidak mengandung ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) pada kelinci pertama.

Kelompok 2 : luka infeksi ditempelkan 4 formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*), dan *patch* yang tidak mengandung ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) pada kelinci kedua.

Kelompok 3 : luka infeksi ditempelkan 4 formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*), dan dan *patch* yang tidak mengandung ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) pada kelinci ketiga.

Kelompok 4 : luka infeksi ditempelkan 4 formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.), dan *patch* yang tidak mengandung ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) pada kelinci keempat.

Kelompok 5 : luka infeksi ditempelkan 4 formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.), dan *patch* yang tidak mengandung ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) pada kelinci keenam.

Kemudian dilakukan pengamatan setiap hari pada luka sebelum dan sesudah perlakuan sampai menunjukkan adanya tanda-tanda kesembuhan dengan cara mengukur panjang luka dengan menggunakan jangka sorong skala 0,1 cm (Jeanly, 2014).

c) Analisis data

Untuk mengetahui adanya perbedaan efek pemberian formula *patch* ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap luka yang terinfeksi bakteri *Staphylococcus aureus* data dianalisis menggunakan SPSS ver. 26 dengan metode *Annova* (*Analysis of Variant*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji *In Vitro*


Hasil uji *in vitro* aktivitas antibakteri *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* yaitu :

Tabel 14. Hasil pengukuran uji *in vitro* (mm)

Formula	Replika 1	Replika 2	Replika 3	Rata - Rata	Range
HPMC	25,09	24,95	23,03	24,36	Sangat kuat
NaCMC	16,85	19,08	13,75	16,56	Kuat
Kitosan	15,2	13,94	14,71	14,62	Kuat
Karbopol	24,23	22,01	20,37	22,20	Sangat kuat
KN	0	0	0	0	-

Keterangan :

KN : Kontrol negatif



Gambar 8. Diagram hasil pengukuran uji *in vitro*

2. Uji *In Vivo*


Hasil uji *in vivo* aktivitas antibakteri *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* pada luka sayat kelinci yaitu:

Tabel 5. Rata - rata pengukuran panjang luka infeksi pada kelinci (cm)

Hari ke-	HPMC	NaCMC	Kitosan	Karbopol	KN
1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	1,08	1,3	1,3	1,08	1,38
3	0,96	1,2	1,08	0,92	1,24
4	0,92	1,1	1,06	0,84	1,14
5	0,64	1	0,94	0,74	1,04
6	0,56	0,88	0,84	0,72	0,96
7	0,46	0,76	0,8	0,72	0,86
8	0,36	0,7	0,72	0,68	0,8
9	0,18	0,6	0,64	0,56	0,74
10	0	0,12	0,1	0	0,54
11	0	0	0	0	0

Keterangan :

KN : Kontrol negatif



Gambar 9. Grafik uji *in vivo*

B. Pembahasan

Luka merupakan salah satu kerusakan fisik yang disebabkan karena terbukanya atau hancurnya kulit yang menyebabkan ketidakseimbangan antara fungsi dan anatomi kulit normal. Terbukanya kulit yang terluka menyebabkan mudahnya serangan mikroorganisme pada jaringan kulit yang menyebabkan luka mengalami infeksi. Infeksi lokal yang terjadi pada kulit menyebabkan luka kronis sehingga membutuhkan waktu penyembuhan yang lebih lama. Salah satu organisme penginfeksi luka yang teridentifikasi adalah *Staphylococcus aureus* (Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017).

Berdasarkan tinjauan islam tumbuhan memiliki berbagai macam manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan cara mengelola tumbuhan untuk dijadikan sebagai obat. Dimana pada penelitian ini memanfaatkan tumbuhan lempuyang gajah sebagai obat agar menghindari terjadi kontaminasi bakteri pada luka. Yang telah dijelaskan dalam al quran dan hadis mengenai pemanfaatan tumbuhan. Dengan mengaitkan penelitian ini dengan q.s al insan tentang zanjabil yang berarti jahe dimana lempuyang gaja masuk dalam rumpun jahe – jahean.

Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai antibakteri yakni lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang telah lama digunakan sebagai obat tradisional. Uji fitokimia menggambarkan akan golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Hasil uji fitokimia rimpang tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) mengandung senyawa-senyawa terpenoid, flavonoid, tanin, dan fenolik. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antibakteri. Dimana senyawa terpen merupakan senyawa antibakteri utama dalam rempah-rempah. Mekanisme terpenoid sebagai antibakteri yakni bereaksi dengan fraksi lipid membran plasma bakteri yang mengakibatkan perubahan permeabilitas membran. Analisis massa molekul ion puncak menggunakan data base dari *The Human*

Metabolome Database (THMD) menunjukkan bahwa senyawa dengan massa ion terbesar adalah zerumbon. Dimana zerumbon merupakan konstituen terbesar pada rimpang dengan kelimpahan berkisar 12,6 - 73,1% (Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017). Senyawa tanin dan flavonoid merupakan senyawa polifenol bersifat antibakteri dengan cara membentuk ikatan kompleks dengan dinding sel bakteri sehingga menurunkan permeabilitas dinding sel dan merusak membran sel bakteri (Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017). Dimana ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) pada penelitian ini diformulasi dalam bentuk sediaan *patch* dengan polimer yang berbeda yakni HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol. Polimer merupakan komponen utama dalam sediaan *patch*. Polimer menentukan dan mengontrol kecepatan pelepasan obat dari suatu bentuk sediaan (Dian E. Ermawati & Heni Utami, 2019).

Pada penelitian ini uji aktivitas antibakteri secara *in vitro* dilakukan dengan metode difusi agar dengan teknik penanaman bakteri metode cawan tebar (*Spread Plate Method*) menggunakan media TSA (*Trypticase Soy Agar*) sebagai media padat dan media TSB (*Trypticase Soy Broth*) sebagai media cair. Uji aktivitas antibakteri dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi kultur dan peremajaan bakteri uji, pembuatan suspensi bakteri uji, serta penghitungan jumlah bakteri uji. Bakteri dari kultur murni koleksi laboratorium mikrobiologi jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar diremajakan dengan menggunakan media TSB (*Trypticase Soy Broth*). Proses peremajaan bakteri ini sangat erat kaitannya dengan siklus pertumbuhan bakteri, karena bakteri yang digunakan dalam pengujian sebaiknya adalah bakteri yang berada pada fase logaritmik dengan jumlah bakteri yang meningkat terjadi secara eksponensial. Fase ini berlangsung 18-24 jam. Pada pertengahan fase ini pertumbuhan bakteri sangat ideal, dimana pembelahan terjadi secara maksimal (Jamilatur Rohmah & Chylen Setiyo Rini, 2022). Dimana pada

penelitian ini dilakukan perhitungan jumlah bakteri $1,5 \times 10^8$ CFU/mL dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 625 dengan nilai absorbansi 0,08- 0,1 (Rosmaniah & Fitri, 2020).

Pengujian aktivitas antibakteri ini dilakukan pada masing-masing formula *patch* yang telah diformulasikan pada penelitian sebelumnya dengan polimer *patch* yang berbeda yakni HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol. Kemudian digunakan *patch* yang tidak mengandung ekstrak dengan polimer HPMC sebagai kontrol negatif dengan tujuan sebagai pembanding bahwa *patch* yang tidak mengandung ekstrak tidak mempengaruhi hasil uji antibakteri. Alasan menggunakan polimer HPMC dikarenakan HPMC salah satu polimer hidrofilik yang dapat meningkatkan permeabilitas matriks. HPMC juga diketahui mampu mengembang lebih baik dibandingkan dengan polimer lain sehingga mampu melepaskan obat dari matriks relatif lebih cepat (Dian E. Ermawati & Heni Utami, 2019)

Pada pengujian aktivitas antibakteri secara *in vitro* dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Dimana hasil penelitian dapat dilihat pada (**tabel 3.**) menunjukkan bahwa kontrol negatif yang tidak mengandung ekstrak tidak memberikan zona hambat di sekitar *patch*. Hal ini menunjukkan bahwa polimer yang digunakan tidak memberikan pengaruh terhadap penghambatan bakteri uji. Adapun kriteria kekuatan daya antibakteri menurut Davis dan Stout dalam Suryadi Budi 2018 menunjukkan bahwa diameter zona hambat ≤ 5 (lemah), 5-10 (sedang), 10-20 (kuat), ≥ 20 (sangat kuat) (Suryadi Budi Utomo, dkk, 2018).

Hasil pengamatan terhadap aktivitas antibakteri *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan variasi formula polimer HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan adanya daerah zona hambat yang terbentuk di sekitar *patch*. Untuk formula

1 dengan polimer HPMC membentuk daerah zona hambat dengan rata - rata sebesar 24,36 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri sangat kuat. Untuk formula 2 dengan polimer NaCMC membentuk daerah zona hambat dengan rata-rata sebesar 16,80 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri kuat. Untuk formula 3 dengan polimer kitosan membentuk daerah zona hambat dengan rata-rata sebesar 14,61 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri kuat. Sedangkan untuk formula 4 dengan polimer karbopol membentuk daerah zona hambat dengan rata-rata 22,20 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri sangat kuat.

Hasil diameter zona hambat terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* yang didapatkan dari masing-masing formula *patch* kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS ver. 26 untuk menentukan normalitas dan homogenitas data penelitian. Uji normalitas mendapatkan nilai signifikansi 0,116 ($p > 0,05$) pada kelompok HPMC, 0,821 ($p > 0,05$) pada kelompok NaCMC, 0,756 ($p > 0,05$) pada kelompok kitosan, 0,835 ($p > 0,05$) pada kelompok karbopol, kontrol negatif tidak dimasukkan dalam pengolahan data ini karena hasil statistiknya 0 sehingga dihilangkan secara otomatis oleh sistem. Nilai signifikan dapat dikatakan normal apabila $p > 0,05$ dan sebaliknya (Hendy & Wahyu, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada (**tabel 3.**) telah terdistribusi normal.

Uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji homogenitas variansi yang dapat dilihat pada (lampiran 9.) terlihat nilai signifikan (p) = 0,111 dimana nilai $p > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada (**tabel 3.**) yang didapat memiliki variansi yang sama atau homogen. Karena data sudah dinyatakan normal dan homogen sehingga dilakukan pengujian data dengan menggunakan uji *One Way Anova* dengan taraf kepercayaan 95% .

Uji *One Way Anova* dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas antibakteri pada formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Hasil uji dapat dilihat pada (lampiran 9.). Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil dimana nilai signifikan (p) = 0,000 atau nilai (p) < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki pengaruh aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

Uji LSD dilakukan untuk melihat secara detail dan membandingkan perbedaan yang signifikan antara formula 1 dengan formula lainnya. Berdasarkan uji LSD pada (lampiran 9.) menunjukkan bahwa masing-masing formula mempunyai perbedaan daya hambat yang signifikan dengan nilai signifikan (p) < 0,05 kecuali pada formula HPMC terhadap formula karbopol dengan nilai signifikan 0,128 begitupun sebaliknya, formula kitosan dengan NaCMC dengan nilai signifikan 0,165 begitupun sebaliknya. Dapat dilihat pada grafik dan uji tukey formula yang memiliki diameter zona hambat terkuat.

Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antibakteri *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* yang dilakukan secara *in vivo* pada punggung kelinci. Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini yakni kelinci sebanyak 5 ekor dimana diadaptasi pada lingkungan penelitian. Kemudian sebelum dibuat luka sayatan kelinci dianestesi menggunakan *ethyl chloride spray* dikarenakan *ethyl chloride spray* dapat meredakan nyeri dengan membuat area menjadi mati rasa, memperlambat aliran impuls nyeri dan efek dingin yang ditimbulkan dapat mengakibatkan vaso konstriksi mikro vaskuler, jaringan kulit dan sel neuron terabsorpsi secara perlahan dan dalam jangka waktu beberapa menit mendapatkan efek anestesi lokal mati rasa sementara pada kulit (Desak Putu & I Putu, 2021).

Dibuat luka sayatan dengan ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 2 mm sampai pada bagian subkutan. Selanjutnya dilakukan penginfeksi bakteri *Staphylococcus aureus* secara sengaja dengan pemberian suspensi bakteri yang telah dibuat dan dihitung jumlah bakterinya pada masing-masing luka sayatan sebanyak 100 mikroliter.

Proses penyembuhan luka dibagi dalam tiga langkah berurutan yakni fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling. Fase inflamasi meliputi inflamasi neurogenik kulit dan hemostatis. Hemostatis terjadi dalam tiga langkah yakni vasokonstriksi, hemostatis primer, dan hemostatis sekunder. Saat kulit terluka terjadi vasokonstriksi dinding pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, hemostatis primer terjadi agregasi platelet yang diakibatkan oleh paparan kolagen dalam matriks subendote. Fase inflamasi teraktifasi saat sedang terjadi fase hemostatis. Tujuan fase ini yakni untuk melawan potensi kontaminasi bakteri pada luka dan mengaktifkan sekresi sitokin. Fase selanjutnya dalam penyembuhan luka adalah fase proliferasi yang umumnya berlangsung 3 - 24 hari. Selama fase tersebut jaringan baru diregenerasi oleh fibroblas, sel yang berperan dalam perkembangan pembuluh darah baru, kolagen, dan jaringan ikat lain. Fase terakhir dalam penyembuhan luka adalah fase remodeling. Pada fase ini terjadi penurunan jaringan granulasi, substitusi matriks ekstraseluler (Eka & Helmi, 2023).

Pada pengujian *in vivo* dilakukan dengan cara mengamati proses penyembuhan luka sayat yang telah terinfeksi bakteri *Staphylococcus aureus* dengan pemberian formula *patch* yang mengandung ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dengan polimer yang berbeda yakni HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol. Tanda- tanda kulit terinfeksi menurut potter dan perry tahun 2005 ditunjukkan dengan terjadinya *calor* (panas), *dolor* (rasa sakit), rubor

(kemerahan), tumor (pembengkakan), dan *functiolaesa* (Potter P.A & Perry , 2005).

Penyembuhan luka terinfeksi akibat bakteri *Staphylococcus aureus* dapat dilihat dari terbentuknya keropeng (*scab*) hingga terjadi penutupan luka untuk masing-masing kelompok perlakuan. Pengamatan berdasarkan rata-rata waktu penyembuhan luka dapat dilihat pada **(tabel 4.)** dan **(tabel 6.)** dimana berdasarkan pengamatan diperoleh hasil bahwa pada hari ke 1 hingga hari ke 11 terdapat perubahan panjang luka sayatan yang terinfeksi bakteri. Dimana pada hari pertama luka infeksi untuk semua kelompok perlakuan masih terbuka, hari ketiga luka mengalami kemerahan pada tepi luka dan tubuh kelinci sedikit panas, dan pada hari ke 4 tepi luka mulai menyempit dengan munculnya keropeng pada bagian tepi luka, hari ke 5 dan 6 luka mulai menyempit dengan terbukanya keropeng, hari ke 7 hingga 11 luka mulai tertutup dan sembuh. Pada perlakuan formula HPMC sudah sembuh total pada hari ke 7 untuk kelompok 5, kelompok 4 sembuh pada hari ke 8, kelompok 3 sembuh pada hari 9, dan kelompok 1 dan 2 sembuh pada hari ke 10. Pada perlakuan formula NaCMC kelompok 1,3,4,5 sembuh pada hari ke 10 sedangkan kelompok 2 sembuh pada hari ke 11. Pada perlakuan formula kitosan kelompok 1,3,4,5 sembuh pada hari ke 10, dan kelompok 2 sembuh pada hari ke 11. Pada perlakuan formula karbopol sembuh pada hari ke 10. Pada perlakuan kontrol negatif sembuh pada hari ke 11.

Pada luka infeksi, kolonisasi bakteri dapat terjadi pada luka tanpa mengganggu proses penyembuhan luka. Apabila jumlah bakteri meningkat menjadi kolonisasi kritis, sehingga menyebabkan penyembuhan luka dapat terganggu. $10^5 - 10^6$ jumlah organisme di bed luka dapat mengganggu penyembuhan luka. Infeksi dapat menyebar menuju jaringan di sekitar luka, sehingga dapat mengakibatkan infeksi yang dalam, yang dapat berkembang menjadi infeksi

sistemik. Infeksi dapat muncul dengan penyembuhan luka yang tertunda, peningkatan eksudat, pengeluaran bau busuk, rusaknya batas luka, rapuhnya jaringan, bertambahnya ukuran luka, dan peningkatan nyeri. Kontrol antibakteri digunakan untuk mencegah peningkatan koloni bakteri sehingga menurunkan eksudat dan resiko infeksi yang mengganggu penyembuhan luka (Risal Wintoko & Adilla Dwi, 2020).

Menurut Steven John luka normal yang dibuat dengan model kelinci sembuh dalam waktu sekitar 7 – 10 hari (Bornomo & John, 2000). Sedangkan luka yang terinfeksi bakteri membutuhkan waktu penyembuhan yang lebih lama dimana penelitian yang dilakukan oleh Ian Goedert menunjukkan luka infeksi yang dibuat pada kelinci sembuh pada hari ke 14 hingga 21 hari (Goedert & Ivana, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *patch* yang mengandung ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* yang ditunjukkan dengan adanya penyembuhan luka sayat yang telah terinfeksi bakteri pada punggung kelinci pada hari 7, 9, dan 10.

Hasil pengamatan panjang luka sayat kelinci dengan pemberian formula *patch* dengan polimer yang berbeda dianalisis menggunakan uji statistik SPSS versi 26 uji *one way annova*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan (pengaruh) pemberian *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) dengan polimer yang berbeda terhadap luka sayat yang telah terinfeksi bakteri *Staphylococcus aureus* pada punggung kelinci. Dimana hasil uji *annova* taraf kepercayaan 95% dapat dilihat pada (lampiran 10.) menunjukkan bahwa nilai F hitung $6,737 > F \text{ table } 2,87$ dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan (pengaruh) pemberian *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) dengan

polimer yang berbeda terhadap luka infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus*. Kemudian untuk mengetahui formula mana yang memiliki perbedaan dalam penyembuhan luka sayat pada punggung kelinci dilakukan uji LSD.

Uji LSD pada (lampiran 10.) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan penyembuhan luka pada masing – masing formula *patch* dengan nilai signifikan $< 0,05$, kecuali pada formula NaCMC terhadap kitosan dan karbopol tidak memiliki perbedaan signifikan dalam memberikan efek penyembuhan luka dengan nilai signifikan $>0,05$ (tidak ada perbedaan yang signifikan). Dan dapat dilihat pada grafik dan uji tukey formula yang memiliki efek penyembuhan tercepat.

Kemudian dilakukan uji *annova* pada setiap formula *patch* untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan penyembuhan luka dari 5 kelinci yang dapat dilihat pada (lampiran 11 – 16) menunjukkan bahwa setiap formula *patch* untuk kelima kelinci tidak memiliki perbedaan dalam pemberian efek *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap luka infeksi bakteri *Staphylococcus aureus* yang ditandai dengan nilai signifikan $> 0,05$. Dan dapat dilihat juga pada masing-masing grafik dan uji tukey kelompok kelinci mana yang memiliki efek penyembuhan tercepat dalam pemberian formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Pengaruh formulasi *patch* terhadap hasil pengujian *in vitro* dan *in vivo* dipengaruhi oleh polimer yang digunakan. Polimer merupakan komponen utama dalam sediaan *patch*. Polimer mampu menentukan dan mengontrol kecepatan pelepasan obat dari suatu bentuk sediaan (Dian E. Ermawati & Heni Utami, 2019). Keempat polimer yang digunakan dalam formulasi merupakan polimer hidrofilik.

Dimana polimer hidrofilik dapat meningkatkan permeabilitas matriks, sehingga difusi obat melalui matriks lebih cepat dibandingkan dengan polimer hidrofobik (Dian E. Ermawati & Heni Utami, 2019).

Pada formula 1 menggunakan polimer HPMC dimana HPMC memiliki pH 5,5 – 8.0 yang sesuai dengan pH kulit dimana jika pH polimer terlalu asam atau basa maka luka akan terasa perih (Zahran & Mursyid, 2022). HPMC salah satu polimer hidrofilik yang dapat meningkatkan permeabilitas matriks. HPMC juga diketahui mampu mengembang lebih baik dibandingkan dengan polimer lain sehingga mampu melepas obat dari matriks relatif lebih cepat (Dian E. Ermawati & Heni Utami, 2019). HPMC sebagai polimer juga menghasilkan *patch* dengan bentuk fisik yang baik dengan tidak adanya aerasi dan keriput serta bertekstur halus (Ita Mustika & Dwi Saryanti, 2022).

Formula 2 menggunakan NaCMC dimana NaCMC memiliki kekuatan mukoadhesif yang tinggi yang juga dapat menjadi pelindung sediaan *patch* dalam menjaga kemampuan pelekatan produk. NaCMC juga mampu meningkatkan viskositas sediaan *patch*. Penggunaan NaCMC dengan penambahan PVP dapat meningkatkan pengembangan polimer dan meningkatkan elastisitas dan pembentukan *film patch* (Gita Silviani & Melani, 2022). NaCMC signifikan dalam meningkatkan bobot *matriks patch* karena sifatnya yang mampu meretensi air dan menjebak air dalam struktur polimer yang mengembang sehingga menyebabkan NaCMC mampu meningkatkan bobot *matriks patch* (Ita Mustika & Dwi Saryanti, 2022).


Formula 3 menggunakan polimer kitosan yang merupakan polisakarida polikationik alami yang digunakan dalam sistem penghantaran obat karena sifatnya yang menguntungkan seperti biokompatibilitas, bioadhesif, biodegradabilitas, tidak beracun, memiliki elastisitas, dan kerapuhan yang baik. Sifat bioadhesif kitosan

memiliki pengaruh besar mengenai aplikasi dermal dan transdermal (Erdal, 2013). Kitosan merupakan polimer yang dapat membentuk matriks dan dapat dimodifikasi dengan polimer lain untuk meningkatkan sifat fisikokimianya. Kitosan juga memiliki pH 4 - 6 (Fajra dinda & Sriwidodo, 2021).

Formula 4 menggunakan polimer karbopol dimana karbopol memiliki mempunyai kekuatan mengembang yang tinggi sehingga akan membentuk suatu pori yang dapat membantu pelepasan dari basisnya (Kristine & Dwi nurahmanto, 2016). Karbopol memiliki sifat yang mudah terdispersikan dalam air dan dengan konsentrasi kecil (0,05 - 2,00 %) mempunyai kekentalan yang cukup sebagai polimer (Sukma Budi & Nana Supriyatna, 2013).

Kandungan ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap penyembuhan luka masih minim sehingga diperlukan studi lanjutan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wayne Young dan Thong Fong tahun 2017 menunjukkan zerumbon sebagai senyawa sesquiterpen monosiklik yang merupakan senyawa bioaktif dominan pada rimpang *Zingiber zerumbet*. Zerumbon mempunyai kapasitas penyembuhan luka yang kuat berdasarkan pemeriksaan histopatologi dari bagian luka yang sembuh menunjukkan jaringan regenerasi yang lebih besar, fibroblas dan angiogenesis yang lebih banyak. Zerumbon juga memiliki antioksidan yang kuat dengan meningkatkan superoksida, katalase, glutathione, dan penurunan benoksidasi lipid. Efek sinergis dari antibakteri dan antioksidan dalam zerumbon telah mempercepat penyembuhan luka sehingga zerumbon memiliki potensi penyembuhan luka yang kuat dan mempercepat penyembuhan luka infeksi (Wayne Young & Thing Fong, 2017). Aktivitas antibakteri dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti konsentrasi ekstrak, kandungan senyawa antibakteri, daya difusi ekstrak, dan jenis bakteri yang dihambat (Brooks & Geo F, 2008)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yakni uji aktivitas antibakteri *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dan *in vivo* menunjukkan bahwa keempat formula *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) dengan polimer yang berbeda memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Diantara keempat formula tersebut formula dengan polimer HPMC memiliki daya hambat bakteri terkuat dan penyembuhan luka infeksi tercepat..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dengan metode difusi agar. Sediaan *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) pada formula HPMC memiliki daya hambat bakteri terkuat dengan daerah zona hambat 24,36 mm.
2. Formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara *in vivo* pada luka sayat kelinci (*Oryctogalus cuniculus*). Sediaan *patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) pada formula HPMC memiliki efek penyembuhan luka infeksi tercepat pada hari ke-7.

B. Saran

Disarankan untuk penelitian lebih lanjut agar melakukan identifikasi senyawa terlebih dahulu untuk mengetahui senyawa bioaktif yang terlibat dalam memberikan aktivitas antibakteri dan mengembangkan penelitian ini sebagai agen penyembuhan luka serta melakukan pengujian terhadap senyawa bioaktif dan mekanisme yang terlibat dalam fase penyembuhan luka dari ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.).

DAFTAR PUSTAKA

- Allamah Kamal Faqih Imani. (2005). *Tafsir Nurul Quran*. Jakarta: Al-Huda.
- Ahmad Buldani, Retno Yulianti, & Pertiwi Soedomo. (2017). Uji Efektifitas Ekstrak Rimpang Bangle (*Zingiber Cassumunar Roxb*) sebagai antibakteri terhadap *Vibrio Cholerae* dan *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dengan metode difusi cakram. *Seminar Nasional IPTEK*, 15-17.
- Amanda putri, & Astin Diassari. (2021). Konservasi Keanekaragaman Hayati Tanaman Obat Dalam Pandangan Islam. *Annual Virtual Conference of Education and Sciences 2021*, 1, 310-311.
- Amitia Nice Tiensi, dkk. (2018). Formulasi Patch Bukal Minyak Atsiri Daun Siri (*Piper Betle L.*) dengan Variasi Kadar CMC-Na dan Karbopol sebagai Polimer Mukoadhesif. *Majalah Farmaseutik*, 14(1), 20-28.
- Amri Aji, Syamsul Bakhri, & Tantalia. (Mei 2017). Pengaruh Waktu Ekstraksi dan Konsentrasi HCL untuk Pembuatan Pektin Dari Kulit Jeruk Bali (*Citrus Maxima*). *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 6 :1, 36.
- Arya Baharudin, I. M. (2020). Formulasi Sediaan Patch Transdermal Dari Ekstrak Bonggol Pohon Pisang Ambon (*Musa paradisiaca var.sapientum*) Untuk Penyembuhan Luka Sayat. *Journal of Herbs and Farmakological*, 2(2), 55 - 62.
- Asmah Hamid, & Chong Pek Lian. (2018). Zingiber zerumbet Ekstrak Rimpang Menunjukkan Penyembuhan Luka Terbuka Lebih Cepat Pada Tikus. *Farmakogni*, 10(4), 354-360.
- Aulia Deby Pelu. (2022). *Mikrobiologi Aktivitas Antibakteri* (Vol. I). (Wiwi rumaolat, Annuha Zarkasyi, & Syafri Imanda, Red.) Malang, Indonesia: CV.Literasi Nusantara Abadi.
- Bornomo, S. R., & J. D. (2000). Enhancement Of Wound Healing by Hyperbaric Oxygen and Transforming Growth Factor B3 In a New Chronic Wound Model In Aged Rabbits. *American Medical Association*, 135, 1148 - 1153.
- Brooks, & Geo F. (2008). *Mikrobiologi Kedokteran Jawets, Melnick & adelberg*. Jakarta: EGC.
- Darusalam, L. K. (2016). *Domestikasi Buah Merah*. Bogor: IPB Press.
- Desak Putu, & I Putu. (2021). Perbedaan Emila Cream Dan Ethyl Chloride Spray Untuk Menurunkan Nyeri Dalam Pemasangan Infus. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 8(2), 27-38.
- Dian E. Ermawati, & Heni Utami. (2019). Pengaruh Kombinasi Polimer Hidroksipolimetilselulosa dan Natrium Karboksimetilselulosa Terhadap Sifat Fisik Sediaan Matrix - based Patch Ibuprofen. *JPSCR: Journal Of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 02, 109 - 119.

- Dini Agustina, dkk. (2016). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit Akibat Infeksi Jamur. *Juita*, IV(2), 67-77.
- Effendi, I. (2020). *Metode Identifikasi dan Klasifikasi Bakteri* (Vol. I). Pekanbaru, Riau: Oceanum Press.
- Eka, Y., & H. I. (2023). Potensi Daun Binahong (*Androdera cordifolia* (Ten) Steen Terhadap Penyembuhan Luka Insisi. *Agromedicine*, 10(1), 31-34.
- Erdal. (2013). Optimization and Characterization of Chitosan Films For Transdermal Delivery of Ondansetron. *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review*, 5455-5471.
- Etebu, & Arikekpar. (2016). Antibiotics : Classification and Mechanisms of Action with Emphasis On Molecular Perspectives. *Internasional Jurnal of Applied Microbiology and Biotechnology Research*, 4, 90 -101.
- Fajra dinda, & Sriwidodo. (2021). Sistem Penghantaran Obat Berbasis Biopolimer Kitosan pada Formulasi Film Forming System. *Majalah Farmasetika*, 6(1), 38-55.
- Fatisa. (2013). Daya Antibakteri Ekstrak Kulit dan Biji Buah Pulasan (*Nephelium mutabile*) Terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia Coli* Secara In vitro. *Jurnal Peternakan*, 33.
- Fifendy, M. (2017). *Mikrobiologi Edisi Pertama*. Depok: Kencana.
- Fitri Handayani, dkk. (2015). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Gambir (*Uncaria Gambir Roxb.*) Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Pada Kulit Punggung Mencit Putih Jantan (*Mus Musculus*). *Junal Ilmiah Manuntung*, 133.
- Gita Anggraini. (2016). *Islam dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Pres.
- Gita Silviani, & Melani. (2022). Perbandingan Berbagai Polimer dan Pengaruhnya Terhadap Penghantaran Sediaan Patch Bukal. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 120056-12065.
- Goedert, I., & I. D. (2014). Amniotic Membrane as a Biological Dressing In Infected Wound Healing In Rabbits. *Acta Cirurgica Brasileira*, 29(4), 334 - 339.
- Hafsan. (2011). *Mikrobiologi Umum*. (M. Mustami, Red.) Makassar: Alauddin University Press.
- Hartesi, B., & Sagita, D. (Juni 2021). Patch Transdermal Dari Fraksi N-Heksan Ekstrak Ruku-Ruku (*Ocimum Tenuiflorum* L. sebagai Antiinflamasi. *Jurnal Endurance*, 6(2), 251.
- Hartiwi Diastuti, dkk. (2022). Toxity and Antimicrobial Activity of Zerumbon from Zingiber zerumbet Rhizome. *Molekul*, 17(3), 328-334.

- Hastuti. (2020). *Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Melalui Pengujian Staphylococcus aureus*. (Guepedia/La, Red.) Indonesia: Guepedia. Hämtat Desember 2020
- Hendy, & Wahyu. (2015). Pengamatan Waktu Pelayanan Operator Pintu Tol Dengan Uji Hipotesis Analysis Of ariance (ANNOVA). *Journal Of Industrial Engineering & Management Systems*, 8(1), 26 - 54.
- Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. (A. M, Övers.) Bogor: Puataka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibnu Katsir. (2007). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. (A. M, Övers.) Bogor: Pustaka Imam Asy - Syafi'i.
- Indra Lesmana, & Afidatul Muadifah. (2020). *Senyawa Antibakteri Bahan Alam*. (I. Lesmana, Red.) Malang: Media Nusa Creative.
- Ita Mustika, & Dwi Saryanti. (2022). Optimasi Penggunaan HPMC dan NaCMC Pada Formula Transdermal Patch Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea L.*) Dengan Metode Simplex Lattice Design. *Jurnal Riset Kefarmasiaan Indonesia*, 4(3), 289-305.
- Jamilatur Rohmah, & Chylen Setiyo Rini . (2022). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*) Roscoeex Sm.) Terhadap *Staphylococcus pneumoniae*. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 1008.
- Jeanly, d. (2014). Uji Efektifitas Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium guajava Linn*) Terhadap Penyembuhan Luka Yang terinfeksi Bakteri *Staphylococcus Aureus* Pada Kelinci (*Orytolagus cuniculus*). *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 3(3), 279-286.
- Jessica Deviyanti. (2021). *Teknologi Tepat Guna* (I uppl.). Yogyakarta: LILY Publisher.
- Kadek, & Artha . (2020). Pengaruh Pemakaian Ethyl Chloride Spray Terhadap Tingkat Nyeri Pada Pasien Hemodialisis Dengan Insersi Fistula Arterio Venous Di Klinik Utama Bali Husada Cipta Chanti. *Jurnal Keperawatan Terapan*, 06(01), 74 - 83.
- Kartika Indah Permata Sari . (2013). Uji AntImikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (*Zingiberaceae*) terhadap *Staphylococcus aureus*, *Eschericia coli*, dan *Candida albicans*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 20-24.
- Katzung. (2018). *Basic & Clinical Pharmacology* (14 uppl.). Nort America: Mc Graw Hill Education.
- Kementrian Agama. (2019). Mushaf Al Quran Tajwid dan Terjemah.
- Kristine, & Dwi nurahmanto. (2016). Optimasi Hidroksipofil Metilselulosa dan Carbopol terhadap Moisture Content dan Laju Pelepasan Patch Ibuprofen In Vitro. *Pustaka Kesehatan*, 4(2), 229-234.

- Latifah Rahman, & Reni Sriyani Lembang. (2021). Bioadhesive Dermal Patch as Promising Approach For Improved Antibacterial Activity Of Bioactive Compound Of Zingiber cassumunar Roxb In Ex Vivo Staphylococcus aureus Skin Infection Model. *Journal Of Drug Delivery Science and Technology*, 1-8.
- Lay,B.W. (1992). *Mikrobiologi* . Bogor : IPB.
- Lianah. (2019). *Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Hämtat Agustus 2019
- Luh Kadek, & Nyoman. (2017). Perbedaan Zona Hambat Pertumbuhan Staphylococcus aureus Pada Berbagai Konsentrasi Rebusan Daun Salam (Sysgium polyanthum) Secara In Vitro. *Meditory*, 5(2), 92-100.
- M.Qurais Shihab. (2012). *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Made Swastika. (2016). *National Symposium of Tropical Skin Infection*. Denpasar-Bali: Mulya print.
- Marhaeniyanto dan Susanti. (2017). Penggunaan Konsentrasi Hijau Untuk Meningkatkan Produksi Ternak Kekinci New Zealand White. *Jurnal Imu - Ilmu Peternakan*, 27(1), 28 - 39.
- Marina Silalahi. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet (L.)Smith.). *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 49-62.
- Masanto R, & Agus, A;. (2010). *Beternak Kelinci Potong*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Moch.Aditya. (2021). Penerapan Air Dalam Media Pembelajaran Klasifikasi Bakteri. *Jurnal Program Studi Pendidikan Biologi*, 11(1), 11.
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi,Pemisahan Senyawa,dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, VII(2), 362.
- Mursito, B. (2007). *Ramuan Tradisional Untuk Pelangsing Tubuh* (Vol. IV). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Nera Umilia Purwanti, & Ressi Susanti. (2016). Uji Aktivitas Antibakteri dan Antifungal Ekstrak Etanol Rimpang Acorus sp. *Jurnal Kesehatan Khatulistiwa*, 2(1), 256-268.
- Nikmatul Hidayah , & Aisha Khoirotnun. (2016). Uji Aktivitas Ekstrak Sargassum muticum Sebagai Alternatif Obat Bisul Akibat Aktivitas Staphylococcus aureus. *Journal of Creativity Students*, 2.
- Nova Primadina, & Ahmad Basori. (2019). Proses Penyembuhan Luka Ditinjau Dari Aspek Mekanisme Seluler Dan Molekuler. *Qanun Medika*, 3(1), 31 - 43.


- Nur Atielia , & Nor Akmalazura. (2023). Phytochemicals and Antibacterial Activity of Zingiber zerumbet Growing in Negeri Sembilan Malaysia. *Journal of Science and Mathematics Letters*, 11(1), 20-29.
- Nur Azizah Syahrana, & Surya Ningsi. (2021). Pengaruh Perbandingan Konsentrasi Polimer Terhadap Karakteristik dan Laju Pelepasan Patch Transdermal Nifedipin. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 3(1), 34-39.
- Nur Intan Widya. (2016). Formulasi dan Evaluasi Matriks Patch Transdermal Glibenklamid Menggunakan Hydroxyl Propyl Methyl cellulose (HPMC) K15M Sebagai Polimer. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 11.
- Nurhayati, dkk. (2020). Perbandingan Pengujian Aktivitas Antibakteri Starter Yogurt Dengan Metode Difusi Sumuran dan Metode Difusi Cakram. *Jurnal Teknologi Hasil Peternakan*, 1(2), 41-46.
- Origenes Boy Kapitan, dkk. (2017). In Vitro Antibakteri Ekstrak Etanol Puni (Zingiber zerumbet) Asal Pulau Timor. *Jurnal Pertanian Konservasi Lahan Kering*, 2(2), 29-32.
- Pancawati Arami, dkk. (2017). Efektifitas Teh Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L) Sebagai Antimikroba Terhadap Pertumbuhan Bakteri Methicilin Resistent Staphylococcus aureus (MRSA). *Jurnal Teknologi Laboratorium*, 3(1), 1-6.
- Potter P.A, & Perry . (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Proses dan Praktik* (4 upl., Vol. 2). (d. Renata komalasari, Red.) Jakarta: EGC.
- Praпти Utami. (2008). *Buku Pintar Tanaman Obat*. (D. Damayanti, Red.) Jakarta Selatan: PT Agromedia Pustaka.
- Putri Margaretha, & Cristhalia . (Mei 2022). Formulasi dan Uji Efektifitas Antibakteri Krim Ekstrak Etanol Daun Ara (Ficus carica L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus Penyebab Infeksi Kulit. *Pharmakon*, 11(2), 1439.
- R.Gunawan Susilowarno, & R.Sapto Hartono. (2007). *Biologi*. Indonesia: Grasindo.
- Retno Kaharseno, & Pertiwi Sudomo. (2015). Perbandingan Efektivitas Antibakteri Ekstrak Rimpang Zingiber zerumbet Terhadap Shigella dysenteriae dan Vibrio cholera Secara In Vitro Dengan Metode Difusi. *BINA WIDYA*, 26(1), 28-34.
- Rinanto, dkk. (2018). Pengaruh Penggunaan Tepung Daun Belimbing Manis (Averrhoa carambola L.) Sebagai Substitusi Pakan Kelinci Terhadap Performa Kelinci Hyla Hycle. *Jurnal Aves : Ilmu Peternakan*, 12(1), 9-20.
- Risal Wintoko, & Adilla Dwi. (2020). Manajemen Terkini Perawatan Luka. *JK Unila*, 4(2), 183 - 189.
- Robin Graham, & Brown Tony Burns. (2005). *Lecture Notes Dermatologi*. Jakarta: Erlangga.


- Rosmaniah, & F. Y. (2020). Perhitungan Jumlah Bakteri di Laboratorium Mikrobiologi Menggunakan Pengembangan Metode Spektrofotometri. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2), 76-86.
- Septiani, dkk. (Agustus 2017). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Lamun (*Cymodocea rotundata*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Journal of Fisheries Sciences and Tecnologi (IJFST)*, 13(1), 1-2.
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (*Zingiber zerumbet* L. Smith. *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 53.
- Sonny J. R. Kalangi . (2013). Histologi Kulit. *Jurnal Biomedik*, 5(3), 12-20.
- Sri Mulyani . (2010). Komponen dan Antibakteri dari Fraksi Kristal Minyak *Zingiber zerumbet* . *Majalah Farnasi Indonesia* , 178-184.
- Sukma Budi , & Nana Supriyatna. (2013). Perbandingan Karbopol dan Karboksimetil Selulose Sebagai Pengental Pada Pembuatan Bioetanol Gel. *Biopropal Industri*, 4(2), 59-64.
- Suryadi Budi Utomo, dkk. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa C- 4 Metoksifenilka liks[4]resorsinarena Termodifikasi Hexadecyltrimium-bromide Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *JKPK(Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia)*, 3(3), 201 - 209.
- Syabir, M. U. (2005). *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo.
- Tjay T.H , & Rahardja K. (2015). *Obat- Obat Penting,Khasiat,Penggunaan dan Efek - Efek Sampingnya* (Vol. 8). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tong SYC, & et all. (2015). *Staphylococcus aureus infection ,Epidemiology,Patophysiology,Clinical Manifestations,and management.* *Clinical Microbiolog, Reviews*, 28(3), 603-661.
- Trista Yulianti. (2021). Optimasi Formula dan Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Biji Pepaya (*Carica papaya* L.) Dengan Kombinasi Matriks HPMC DAN PEG 400 Terhadap *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 4(2), 256-265.
- Tristina Yulianti, dkk. (2021). Optimasi Formula Patch dan Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Biji Pepaya (*Carica papaya* L) dengan Kombinasi Matriks HPMC dan PEG 400 Terhadap *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 256-265.
- Ulung, G. (2014). *Sehat Alami dengan Herbal*. (I. Hardiman, Red.) Jakarta, Indonesia: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Van Hoek, dkk. (2011). Acquired Antibiotic Resistance genes: an overview. *Frontiers In Microbiologi*, 2, 2-3.
- Via Pujiah. (2021). Penuluruhan Pustaka Perbandingan Empat Jenis Tanaman Suku Piperaceae Yang Berpotensi Sebagai Antibakteri Terhadap Bakteri *Escherichia Coli* & *Staphylococcus aureus* Serta Kandungan kKmia Yang

- Aktif Sebagai Antibakteri. *Bandung Conference Series:Pharmacy*, 1(1), 1-7.
- Viqi Kurnia Wardani , & Dwi Saryanti . (2021). Formulasi Transdermal Patch Ekstrak Etanol Biji Pepaya (*Carica Papaya L.*) Dengan Basis Hydroxypropil Metilcellulose (HPMC). *Smart Media Journal*, 4(1), 39.
- Wayne Young, & Thing Fong. (2017). Healing Potential of Zerumbon Ointment on Experimental Full- Thickness ExcisionCutaneous Wounds in Rat. *Joutnal of Tissue Viability*, 1-16.
- Wibowo, D. S. (2005). *Anatomi Tubuh Manusia*. Indonesia: Grasindo.
- Widiyani, T., & Shanti. (2022). *Handbook Penggunaan Hewan Laboratorium dalam Uji in Vivo*. (Risaldi salam, & Muh taufik , Red.) Makassar: PT.Nas Media Indonesia.
- Yedraliza, dkk. (2017). *Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zahran, I., & Mursyid, M. (2022). Uji Efek Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Menggunakan Getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas L.*) Dala Bentuk Sediaan Gel. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 8(3), 81-85.
- Zuresh, & Dharma. (2020). Sensitivitas Antibiotik Paten dan Generik Terhadap Bebeapa Bakteri Penyebab Konjuktivitas. *Yarsi Journal of Pharmacology*, 1(2), 69 -77.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Pembuatan Media TSB




Lampiran 2. Skema Pembuatan Media TSA


Lampiran 3. Skema Pembuatan Larutan Standar Mc Farland


Dicampurkan H_2SO_4 1% sebanyak 9,95 ml dengan larutan BaCl_2 1% sebanyak 0,05 ml ke dalam tabung reaksi




Dihomogenkan hingga terbentuk larutan yang keruh

Lampiran 4. Skema Kultur dan Suspensi Bakteri *Staphylococcus aureus*

Lampiran 5. Skema Uji *In Vitro*

Lampiran 6. Skema Pembuatan Suspensi Bakteri *Staphylococcus aureus*

Lampiran 7. Skema Pembuatan Luka

Lampiran 8. Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat

Tabel 6. Perubahan panjang luka sayat (cm)

Hari ke	HPMC					NaCMC					Kitosan					Karbopol					Kontrol Negatif				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	0,9	1,3	1,1	1,2	0,9	1,2	1,4	1,2	1,3	1,4	1,1	1,5	1,2	1,3	1,4	1	1,1	1,1	1,2	1	1,3	1,4	1,4	1,5	1,3
3	0,6	1,1	1	1,1	1	0,9	1,4	1,2	1,2	1,3	0,7	1,2	1	1,2	1,3	0,8	0,9	0,9	1,1	0,9	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2
4	0,6	1,1	0,9	0,9	1	0,8	1,4	1,1	1,1	1,1	0,7	1,2	0,9	1,2	1,3	0,7	0,9	0,8	1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,3	1,1
5	0,5	1	0,9	0,6	0,4	0,7	1,3	1	1	1	0,5	1,2	0,8	1,1	1,1	0,6	0,7	0,7	0,9	0,8	1	1	1	1,2	1
6	0,4	1	0,7	0,4	0,3	0,7	1,3	0,9	0,6	0,9	0,5	1,1	0,7	0,9	1	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,9	1	0,8	1,2	0,9
7	0,4	0,9	0,6	0,3	0	0,5	1,2	0,8	0,5	0,8	0,5	1	0,7	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8	0,9	0,8	1,1	0,7
8	0,4	0,9	0,5	0	0	0,5	1,1	0,6	0,5	0,8	0,5	0,9	0,6	0,8	0,8	0,5	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9	0,8	1	0,5
9	0	0,5	0	0	0	0,4	0,9	0,5	0,4	0,7	0,4	0,8	0,5	0,8	0,7	0,4	0,7	0,6	0,7	0,4	0,8	0,9	0,7	0,9	0,4
10	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,7	0,5	0,6	0,4
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 9. Analisis Pengolahan data SPSS Uji *In Vitro*

		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Diameter_Zona_Hambat	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Data	HPMC	,364	3	.	,801	3	,116
	NaCMC	,210	3	.	,991	3	,821
	Kitosan	,225	3	.	,984	3	,756
	Karbopol	,206	3	.	,993	3	,835
	Kontrol Negatif	.	3	.	.	3	.


a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Data	Based on Mean	2,561	4	10	,104
	Based on Median	1,435	4	10	,292
	Based on Median and with adjusted df	1,435	4	5,573	,336
	Based on trimmed mean	2,486	4	10	,111

ANOVA

Data	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1096,554	4	274,138	108,384	,000
Within Groups	25,293	10	2,529		
Total	1121,847	14			



Multiple Comparisons

Dependent Variable: Data

LSD

(I) Diameter_Zona_Hambat	(J) Diameter_Zona_Hambat	Mean Difference	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
		(I-J)			Lower Bound	Upper Bound
HPMC	NaCMC	7,79667*	1,29854	,000	4,9033	10,6900
	Kitosan	9,74000*	1,29854	,000	6,8467	12,6333
	Karbopol	2,15333	1,29854	,128	-,7400	5,0467
	Kontrol Negatif	24,35667*	1,29854	,000	21,4633	27,2500
NaCMC	HPMC	-7,79667*	1,29854	,000	-10,6900	-4,9033
	Kitosan	1,94333	1,29854	,165	-,9500	4,8367
	Karbopol	-5,64333*	1,29854	,001	-8,5367	-2,7500
	Kontrol Negatif	16,56000*	1,29854	,000	13,6667	19,4533
Kitosan	HPMC	-9,74000*	1,29854	,000	-12,6333	-6,8467
	NaCMC	-1,94333	1,29854	,165	-4,8367	,9500
	Karbopol	-7,58667*	1,29854	,000	-10,4800	-4,6933
	Kontrol Negatif	14,61667*	1,29854	,000	11,7233	17,5100
Karbopol	HPMC	-2,15333	1,29854	,128	-5,0467	,7400
	NaCMC	5,64333*	1,29854	,001	2,7500	8,5367
	Kitosan	7,58667*	1,29854	,000	4,6933	10,4800
	Kontrol Negatif	22,20333*	1,29854	,000	19,3100	25,0967
Kontrol Negatif	HPMC	-24,35667*	1,29854	,000	-27,2500	-21,4633

NaCMC	-16,56000*	1,29854	,000	-19,4533	-13,6667
Kitosan	-14,61667*	1,29854	,000	-17,5100	-11,7233
Karbopol	-22,20333*	1,29854	,000	-25,0967	-19,3100

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Keterangan : sig < 0,05 ada perbedaan signifikan

Sig > 0,05 tidak ada perbedaan yang signifikan

		Data				
			Subset for alpha = 0.05			
		Diameter_Zona_Hambat	N	1	2	3
Tukey HSD ^a	Kontrol Negatif		3	,0000		
	Kitosan		3		14,6167	
	NaCMC		3		16,5600	
	Karbopol		3			22,2033
	HPMC		3			24,3567
	Sig.				1,000	,587

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Lampiran 10. Analisa Pengolaha data SPSS Uji *In vivo*

ANOVA

Hari_Penyembuhan


	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	10,240	4	2,560	6,737	,001
Within Groups	7,600	20	,380		
Total	17,840	24			

Hari_Penyembuhan

		Subset for alpha = 0.05			
		Patch	N	1	2
Tukey HSD ^a	HPMC		5	9,00	
	Karbopol		5	10,00	10,00
	NaCMC		5		10,20
	Kitosan		5		10,20
	Kontrol negatif		5		11,00
	Sig.				,116

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hari_Penyembuhan

LSD

(I) Patch	(J) Patch	Mean Difference	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
		(I-J)			Lower Bound	Upper Bound
HPMC	NaCMC	-1,200*	,390	,006	-2,01	-,39
	Kitosan	-1,200*	,390	,006	-2,01	-,39
	Karbopol	-1,000*	,390	,018	-1,81	-,19
	Kontrol negatif	-2,000*	,390	,000	-2,81	-1,19
NaCMC	HPMC	1,200*	,390	,006	,39	2,01
	Kitosan	,000	,390	1,000	-,81	,81
	Karbopol	,200	,390	,614	-,61	1,01
	Kontrol negatif	-,800	,390	,053	-1,61	,01
Kitosan	HPMC	1,200*	,390	,006	,39	2,01
	NaCMC	,000	,390	1,000	-,81	,81
	Karbopol	,200	,390	,614	-,61	1,01
	Kontrol negatif	-,800	,390	,053	-1,61	,01
Karbopol	HPMC	1,000*	,390	,018	,19	1,81
	NaCMC	-,200	,390	,614	-1,01	,61
	Kitosan	-,200	,390	,614	-1,01	,61
	Kontrol negatif	-1,000*	,390	,018	-1,81	-,19
Kontrol negatif	HPMC	2,000*	,390	,000	1,19	2,81
	NaCMC	,800	,390	,053	-,01	1,61
	Kitosan	,800	,390	,053	-,01	1,61
	Karbopol	1,000*	,390	,018	,19	1,81

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.


Keterangan : sig < 0,05 ada perbedaan signifikan

sig > 0,05 tidak ada perbedaan yang signifikan

Lampiran 11. Analisis Data HPMC**ANNOVA**

PANJANG_LUKA


	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1,365	4	,341	1,337	,269
Within Groups	12,764	50	,255		
Total	14,128	54			



Lampiran 12. Analisis Data NaCMC**ANNOVA**

PANJANG_LUKA


	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1,314	4	,328	1,422	,240
Within Groups	11,547	50	,231		
Total	12,861	54			



Lampiran 13. Analisis Data Kitosan**ANNOVA**

PANJANG_LUKA


	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1,188	4	,297	1,364	,260
Within Groups	10,887	50	,218		
Total	12,075	54			



Lampiran 14. Analisis Data Karbopol**ANNOVA**

PANJANG_LUKA


	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,304	4	,076	,403	,805
Within Groups	9,433	50	,189		
Total	9,737	54			



Lampiran 15. Analisis Data Kontrol Negatif**ANNOVA**

PANJANG_LUKA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,373	4	,093	,513	,726
Within Groups	9,076	50	,182		
Total	9,449	54			



Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian *In Vitro* dan *In vivo*



Gambar 10. Formula *patch*



Gambar 12. Penimbangan media



Gambar 11. Sterilisasi alat



Gambar 13. Larutkan media




Gambar 14. Kultur bakteri dan inkubasi




Gambar 15. Bakteri hasil inkubasi divorteks



Gambar 16. Hasil centrifugasi



Gambar 17. Pembuatan suspensi bakteri dan penghitungan jumlah bakteri



Gambar 18. Penempelan *patch*



Gambar 19. Hasil uji antibakteri




Gambar 20. Adaptasi hewan kelinci




Gambar 21. Pencukuran dan pembuatan luka




Gambar 22. Penginfeksi bakteri dan penempelan *patch*




Gambar 23. Hari pertama (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif




Gambar 24. Hari kedua (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif




Gambar 25. Hari ketiga terjadi fase inflamasi dan pembengkakan (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e)kontrol negatif




Gambar 26. Hari keempat mulai terbentuk keropeng pada luka sayat (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif



Gambar 27. Hari kelima mulai tertutup luka sayat (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif




Gambar 28. Hari keenam keropeng terbuka dan mulai tertutup luka sayat
(a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif




Gambar 29. Hari ketujuh (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol,
(e) kontrol negatif



Gambar 30. Hari kedelapan (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol,
(e) kontrol negatif



Gambar 31. Hari kesembilan (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif



Gambar 32. Hari Kesepuluh (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif

Lampiran 15. Kode Etik Hewan Coba



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
"ETHICAL EXEMPTION"

No A.0111/KEPK/FKIK/III/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : SRI WAHYUNI
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Uji Aktivitas Antibakteri Dermal Patch Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara In Vitro dan In Vivo"

*"Antibacterial Activity Test of Dermal Patch Methanol Extract of Lempuyang Gajah Rhizome (*Zingiber zerumbet* L.) Against *Staphylococcus aureus* Bacteria in Vitro and In Vivo"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

This declaration of ethics applies during the period March 31, 2023 until March 31, 2024

March 31, 2023

Professor and Chairperson,

Dr. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

RIWAYAT HIDUP



Sri Wahyuni dilahirkan di Bonto-bonto, Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pada tanggal 06 Oktober 2000. Anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri Zaenal Abidin dan Sahria.. Pendidikan formal peneliti dimulai dari SDN 14 Bonto-bonto dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Ma'rang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di MAN Pangkep dan lulus pada tahun 2019. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, untuk jenjang S1 pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sampai saat biografi ini ditulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR