

**HUBUNGAN PEMBERIAN SUPLEMENTASI SUSU FORMULA DENGAN
STATUS NUTRISI BAYI RIWAYAT BERAT BADAN LAHIR
RENDAH PADA USIA 0-6 BULAN DI PUSKESMAS
KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2022.**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:
SYAMSURIANI
NIM: 70600119004

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuriani
NIM : 70600119004
Tempat/Tgl Lahir : Lompoe, 18 November 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Manuruki 2 lorong 4a
Judul : Hubungan Pemberian Suplementasi Susu
Formula dengan Status Nutrisi Bayi Riwayat
Berat Badan Lahir Rendah Pada Usia 0-6
Bulan Di Puskesmas Kota Makassar Tahun
2020-2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 24 Februari 2023
Penyusun,

Syamsuriani
NIM: 70600119004

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi Riwayat BBLR pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022*" yang disusun oleh Syamsuriani, NIM: 70600119004, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 24 Februari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Jurusan Pendidikan Dokter.

Makassar, 24 Februari 2023
3 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: dr. Destya Maulani, M.Kes., Sp.A	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: dr. Darmawansyih, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi Riwayat Berat Badan Lahir Rendah pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022”**. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw. beserta para keluarga dan sahabat, semoga dihari kebangkitan kelak kita memperoleh syafaat dan petunjuknya yang telah dijanjikan. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berbagai tantangan yang dilalui penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dan semuanya dapat dilalui berkat dukungan kedua orang tua terkasih, Syahrir dan Samiah berupa doa dan cinta kasih tanpa batas yang telah diberikan, serta terimakasih kepada seluruh keluarga besar penullis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih, rasa hormat dan penghargaan kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.


2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan administrasi selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes, MARS, Sp.JP. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan dan berlembaga di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar serta staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
4. dr. Darmawansyih, M.Kes. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed. selaku pembimbing II, yang terus bersabar dan ikhlas meluangkan waktunya dalam rangka perbaikan penulisan, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang tepat.
6. dr. Destya Maulani, M.Kes., Sp.A. selaku penguji kompetensi dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I. selaku dosen penguji integrasi keislaman yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan memberi saran terbaik kepada penulis.

7. Staf akademik Program Studi Pendidikan Dokter yang telah membantu mengatur dan mengurus administrasi selama perkuliahan.
8. Teman saudara se-PA saya, yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini kelak bisa bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah swt. senantiasa melindungi kita semua. Aamiin.

Makassar, 23 Agustus 2022
Penulis

Syamsuriani
70600119004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-18
A. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Hipotesis.....	9
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Tujuan Penelitian.....	17
G. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19-54
A. Susu Formula.....	19
B. Berat Bayi Lahir Rendah.....	33
C. Tumbuh Kembang BBLR	44
D. Nutrisi untuk BBLR	45
E. Pertumbuhan Pada BBLR	47
F. Kerangka Teori.....	53
G. Kerangka Konsep	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	55-63
A. Desain Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Waktu Penelitian	56
D. Variabel Penelitian	56

E. Populasi dan Sampel	56
F. Metode Pengumpulan Data	59
G. Instrumen Penelitian.....	60
H. Pengolahan Data.....	60
I. Analisis Data	61
J. Alur Penelitian.....	62
K. Etika Penelitian	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64-81
A. Hasil Penelitian	64
B. Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP.....	82-84
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
KEPUSTAKAAN	85
LAMPIRAN	91




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional	10
Tabel 1. 2 Kajian Pustaka.....	14
Tabel 3. 1 Kriteria Penelitian	58
Tabel 4. 1 Distribusi Data Karakter Ibu dan Bayi dengan Riwayat BBLR Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar.....	65
Tabel 4. 2 Distribusi Status Nutrisi (BB/U) Bayi dengan Riwayat BBLR di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2021-2022.....	67
Tabel 4. 3 Distribusi Status Nutrisi (PB/U) Bayi dengan Riwayat BBLR di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.....	67
Tabel 4. 4 Distribusi Status Nutrisi (BB/PB) Bayi dengan Riwayat BBLR di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.....	68
Tabel 4. 5 Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi (BB/U) dengan Riwayat BBLR pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.....	69
Tabel 4. 6 Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi (PB/U) dengan Riwayat BBLR Pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.....	70
Tabel 4. 7 Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi (BB/PB) dengan Riwayat BBLR Pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Berat Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Laki-Laki.....	49
Gambar 2. 2 Berat Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Perempuan.....	50
Gambar 2. 3 Panjang Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Laki-Laki.....	50
Gambar 2. 4 Panjang Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Perempuan.....	51
Gambar 2. 5 Lingkar Kepala Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Laki-laki	51
Gambar 2. 6 Lingkar Kepala Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Perempuan.....	52
Gambar 2. 7 Kerangka Teori.....	53
Gambar 2. 8 Kerangka Konsep.....	54



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ...أَيَّ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ع---) maka ia ditranslasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘ali (bukan ‘aliyy atau aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arab *ī* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasai huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasayah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh:

Contoh:

Fi-Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf Hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh*

ذُنُّنُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem huruf Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal, kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalaam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓ ī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓ ī unzila fih al-Qur'ān

Naṣ īr al-D īn al-Ṭūs ī

Abū Naṣr al-Farāb ī

Al-Gazāl ī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat
WHO	=	<i>World Health Organization</i>

UNIVERSITAS KALAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Syamsuriani

NIM : 70600119004

Judul : Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi Riwayat BBLR pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau disebut juga dengan *low birth weight infants* (LBWI). Terdapat beberapa masalah yang dapat ditimbulkan pada bayi dengan berat badan lahir rendah (<2.500 gr) ialah hipotermi, gangguan alat pencernaan, gangguan perkembangan paru-paru, gangguan imunologi, immatur hati, immatur ginjal, dan hipoglikemia. Kematangan fungsi saluran pencernaan pada bayi yang lahir dengan berat badan normal tentu berbeda dengan bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah, sehingga pemberian nutrisi pada bayi yang lahir dengan berat badan normal juga akan berbeda dengan pemberian nutrisi pada bayi BBLR. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Metode pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling sebanyak 160 sampel. Hasil penelitian menunjukkan *chi-square* didapatkan nilai p-value ialah 0,001 ($p < 0,05$) pada BB/U dan PB/U, pada BB/PB, dengan nilai *chi-square* didapatkan 0.080. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu

formula dengan status nutrisi BB/U dan PB/U, namun tidak terdapat hubungan pada BB/PB bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.

Kata Kunci: BBLR, Status Nutrisi, Suplementasi Susu Formula



ABSTRAK

Nama : Syamsuriani

NIM : 70600119004

Judul : The Relationship between Formula Milk Supplementation and the Nutritional Status of Low Birth Weight Infants at the Age of 0-6 Months at the Makassar City Health Center in 2020-2022

Low birth weight (LBW) are babies born weighing less than 2,500 grams or also known as low birth weight infants (LBWI). There are several problems that can be caused to babies with low birth weight (<2,500 grams), namely hypothermia, digestive disorders, lung development disorders, immunological disorders, immature liver, immature kidneys, and hypoglycemia. The maturity of the function of the digestive tract in babies born with normal weight is certainly different from babies born with low birth weight, so that the provision of nutrition to babies born with normal weight will also be different from the provision of nutrition to LBW babies. The purpose of this study was to determine the relationship between giving formula milk supplementation and the nutritional status of babies with a history of LBW at the age of 0-6 months at the Makassar City Health Center in 2020-2022.

This type of research is quantitative analytic research with the research approach used is cross sectional. The sampling method is a purposive sampling technique of 160 samples. The research results show chi square found the p-value is 0.001 ($p < 0.05$) on BB/U and PB/U, on BB/PB, with a value chi square got 0.080. The conclusion in this study is that there is a relationship between giving formula milk supplementation and the nutritional status of BB/U and PB/U, but there is no

relationship between BB/PB of low birth weight babies at the age of 0-6 months at the Makassar City Health Center in 2020-2022.

Keywords: *LBW, Nutritional Status, Formula Milk Supplementation*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut *World Health Organization* (WHO), Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan < 2500 gr (WHO, 2018). Masalah BBLR memerlukan perhatian di berbagai negara terutama di negara yang memiliki sosial ekonomi yang rendah atau di negara berkembang (Thomas dkk., 2017). BBLR bersiko lebih besar mengalami kesakitan dan kematian dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan yang normal (WHO, 2017).

Berdasarkan WHO, BBLR menyumbang sebesar 60-80% dari Angka Kematian Bayi (AKB) (WHO, 2017). Tingginya angka kematian bayi ini penting untuk diperhatikan sebab angka kematian bayi menjadi salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara yang menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan negara tersebut (Kemenkes RI, 2012). Berdasarkan data dari Kemenkes RI 2020, pada tahun 2019 penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kejadian BBLR dengan kasus sebanyak 35.5%. Penyebab lainnya disebabkan oleh asfiksia sebanyak 27.0%, kelainan bawaan 12.5%, sepsis 3.5%, tetanus neonatorum 0.3% dan lainnya 21.4% (Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020). Pada tahun 2020, penyebab kematian neonatal terbanyak di Indonesia adalah BBLR sebanyak 35.2%, kemudian asfiksia 27.4%, kelainan kongenital 11.4%, infeksi sebanyak 3.4%, tetanus neonatorum 0.3%, dan lainnya 22.5% (Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021).

WHO menuliskan bahwa prevalensi kejadian BBLR di seluruh dunia sebesar 15% atau sekitar 20 juta kelahiran per tahun, dan 96% terjadi di negara berkembang, sekitar 72% di Asia dan 22% di Afrika (WHO, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prevalensi kejadian BBLR cukup tinggi, WHO mencatat Indonesia masuk dalam 10 besar kasus BBLR, yaitu berada pada peringkat ke-9 dunia dengan persentase lebih dari 15.5% dari kelahiran bayi di setiap tahunnya (Ismayanah dkk., 2020). Prevalensi BBLR di tujuh negara Asia Tenggara, yakni Filipina 21%, Laos 15%, Kamboja 11%, Timor Leste 10%, Burma 9%, Indonesia 7%, dan Vietnam 5%, yang menunjukkan prevalensi BBLR di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, tetapi lebih rendah dari Filipina, Laos, Kamboja, Timor Leste, dan Burma (Nations & Unicef, 2013).

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, kasus BBLR sebesar 111.827 bayi. Prevalensi tertinggi terdapat di provinsi Jawa Timur dengan persentase 7.1% sebanyak 39.739 kasus, Jawa Barat 2.1% atau sekitar 18.656 kasus, Sumatera Utara 2.0% sebanyak 6.511 kasus, Sulawesi Selatan 4.4% sekitar 6.478 kasus, kemudian menyusul Nusa Tenggara Timur dengan prevalensi 5.5% atau sekitar 4.954 kasus (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020). Pada tahun 2020 kasus BBLR sebesar 129.815 kasus. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2020, kasus BBLR mengalami peningkatan sebanyak 17.988 kasus dari tahun 2019. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan kasus BBLR tertinggi ke-5 di Indonesia sebanyak 6.353 kasus dengan persentase 4.2 % (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, kota Makassar merupakan wilayah yang memiliki prevalensi tertinggi kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kasus sebanyak 682 (Riskesdas, 2018). Pada tahun 2019, kejadian tertinggi BBLR berada di Bulukumba (88%), Makassar (78%), dan Bone (41%), yang menunjukkan kota Makassar sebagai wilayah tertinggi ke-2 kejadian BBLR setelah Bulukumba (Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2020). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2019, terdapat tiga puskesmas yang memiliki prevalensi tertinggi kejadian BBLR di Kota Makassar yaitu Puskesmas Tamangapa (12.63%), Puskesmas Daya (11.19%), dan Puskesmas Jongaya (7.92%) (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2020). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2022, jumlah BBLR tertinggi berada di Puskesmas Tamangapa yaitu (11.43%), Toddopuli (10.41%), Antang (9.63%), Bira (8.86%), Antara (8.58%), Jongaya (7.94%), Kapasa (7.34%) (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2022).

Terdapat beberapa komplikasi yang dapat ditimbulkan pada bayi dengan BBLR ialah hipotermi, gangguan alat pencernaan, gangguan perkembangan paru-paru, gangguan imunologi, immatur hati, immatur ginjal, dan hipoglikemia (Afifah, 2020). Salah satu masalah yang menjadi perhatian pada bayi BBLR adalah gangguan pencernaan, sebab hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan anak. Pada bayi BBLR memiliki alat pencernaan yang belum matang seperti refleks hisap dan menelan yang masih belum baik, motilitas usus menurun, pencernaan serta absorpsi vitamin yang larut dalam lemak kurang, sehingga ketika makanan selain ASI masuk ke dalam saluran pencernaan, maka akan menimbulkan gangguan pada

pencernaannya yang tentu berdampak pada pertumbuhan bayi (Kosim dkk., 2009). Data dari Kemenkes RI bahwa Bayi dengan BBLR berisiko mengalami stunting (Kemenkes RI, 2020). Oleh karena itu WHO menyarankan pemberian ASI eksklusif untuk bayi BBLR.

WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sebagai salah satu cara efektif dalam pemenuhan nutrisi bayi dengan berat badan lahir rendah. ASI diberikan secara eksklusif sekurangnya selama 6 bulan pertama, kemudian ASI dilanjutkan selama 2 tahun yang dikombinasikan dengan makanan pendamping ASI (Ramadhan & Rahmawati, 2019). Sebagaimana yang tercantum dalam potongan QS al-Baqarah/2: 233, yang berbunyi.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ ... (٢٣٣)

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan potongan ayat diatas, dijelaskan mengenai waktu penyempurnaan penyusuan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan *Tafsir al-Mishbah* Jilid 01, terkait QS al-Baqarah ayat 233 tersebut dikatakan bahwa Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun, oleh karena itu para ibu diperintahkan untuk menyusukan anaknya sejak lahir hingga dua tahun penuh (batas maksimal dalam penyempurnaan penyusuan) (Shihab, 2002). Berdasarkan ayat diatas, arahan untuk memberikan ASI pada bayi oleh Allah swt. telah tercantum dalam Al-Qur'an, hal ini bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya manfaat yang bisa anak dapatkan dari ASI tersebut.

Berdasarkan Pohan (2019), dikatakan bahwa keterangan dari para ahli kesehatan dan gizi, ASI merupakan nutrisi yang paling ideal diberikan kepada bayi (Pohan, 2019), namun jika ibu kandung tidak mampu memberikan nutrisi tersebut kepada bayinya maka bayi dapat diberikan ASI donor atau ASI dari wanita lain, sebagaimana telah disebutkan dalam potongan QS al-Baqarah/2: 233 dan QS ath-Thalaq/65: 6, yang berbunyi.

Potongan QS al-Baqarah/2: 233.

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... (٢٣٣)

Terjemahnya:

... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut... (Kementerian Agama RI, 2019).

Potongan QS ath-Thalaq/65: 6.

... وَإِنْ تَعَسَّرْتَ فَمَا سُرْعًا لَهُ أُخْرَى (٧)

Terjemahnya:

... dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya...(Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan *Tafsir al-Mishbah* Jilid 01 dan Jilid 14: Bagi ibu yang tidak memiliki ASI yang cukup untuk bayinya dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka ayah dapat mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya dan dapat diberikan bayaran berupa upah atau hadiah menurut yang patut. Meskipun demikian, air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Menurut penelitian ilmunan, anak akan merasa lebih nyaman ketika disusui oleh ibu kandungnya sebab sudah mengenal detak jantung ibunya saat masih di dalam kandungan (Shihab, 2002, 2006). Berdasarkan kedua potongan ayat diatas, oleh karena pentingnya pemberian

ASI kepada bayi, maka dibolehkan pemberian ASI donor atau menyusukan anak kepada wanita lain jika ibu kandungnya tidak dapat memenuhi pemberian ASI ini dan juga dapat diberi upah kepada ibu yang memberikan ASI donor kepada bayinya.

Penyusuan selama dua tahun ini, walaupun diperintahkan tetapi bukan kewajiban, namun ialah sebuah anjuran yang ditekankan, sebagaimana dalam penggalan QS al-Baqarah/2: 233 yang mengatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Jika ingin mengurangi masa penyapihan, maka tidak mengapa, tetapi hendaknya jangan melebihi dari dua tahun (Shihab, 2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 15, disebutkan bahwa pemberian ASI eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan dalam Pasal 7 (indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi), bayi dapat diberikan susu formula. ASI memiliki banyak kandungan zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan dan pertumbuhan bayi, meskipun demikian, masih banyak ibu yang mengkombinasikan pemberian ASI dengan susu formula sebagai asupan nutrisi bayinya dengan alasan produksi ASI kurang, bahkan ada pula yang mengesampingkan pemberian ASI pada bayinya, karena kurangnya kemampuan dalam manajemen laktasi dan dukungan dari keluarga (Bakri dkk., 2022). Namun, pada bayi BBLSR (berat lahir < 1500 gram), jika ASI ataupun ASI donor telah diberikan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kecukupan BBLSR yang sedang kejar tumbuh, maka dapat ditambahkan Human Milk Fortifikasi (HMF). Jika ASI yang difortifikasi HMF tidak cukup untuk mencapai kejar tumbuhnya atau jika ASI ataupun ASI donor tidak tersedia untuk

bayi BBLR maka bayi dapat diberikan susu formula prematur (Sulistijono dkk., 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2013 pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa susu formula adalah susu hewan ternak yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai usia 6 bulan (Permenkes, 2013).

Secara umum, susu hewan yang diketahui oleh semua orang hanya diketahui sedikit manfaatnya, namun sesungguhnya air susu hewan memiliki manfaat yang banyak dari segi kesehatan, sehingga diperlukan oleh tubuh sejak kecil (Salwa Zakiyyah, 2021), sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS an-Nahl/16: 66 yang berbunyi.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْتَفِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya (Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan *Tafsir al-Mishbah* terkait QS an-Nahl/16: 66 tersebut dituliskan bahwa susu hewan ternak ini merupakan makanan yang mudah masuk ke dalam kerongkongan, bukan karena susu ini adalah cairan, melainkan juga karena susu hewan ternak ini lezat, bergizi, dan bebas dari aneka bakteri. Susu mirip dengan sisa makanan, tetapi bukan juga sisa makanan, karena susu adalah sesuatu yang suci, bergizi dan bermanfaat (Shihab, 2002). QS an-Nahl/16: 66 diatas menjelaskan terkait manfaat dari susu hewan. Susu hewan ternak ini merupakan salah satu susu yang memiliki sumber protein hewani yang bermanfaat dan kaya

akan berbagai zat gizi, sehingga zat gizi inilah yang berkhasiat bagi tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Enamberea dkk (2020) tentang pemberian ASI eksklusif, susu formula dan kombinasi keduanya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-11 bulan, memberikan hasil bahwa terdapat 28 responden yang mengonsumsi ASI dan kombinasi susu formula memiliki pertumbuhan yang normal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lukman dkk (2020) tentang perbedaan pemberian ASI eksklusif dengan PASI terhadap tumbuh kembang pada anak usia 0-12 bulan, ditemukan hasil bahwa pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-12 bulan memiliki kontribusi yang besar terhadap tumbuh kembang bayi jika dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan tambahan susu formula (PASI).

Kematangan fungsi saluran pencernaan pada bayi yang lahir dengan berat badan normal tentu berbeda dengan bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah, sehingga pemberian nutrisi pada bayi yang lahir dengan berat badan normal juga akan berbeda dengan pemberian nutrisi pada bayi BBLR. Hal ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada bayi BBLR terkait “*Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi Riwayat BBLR pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait:

1. Apakah terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022?
2. Apakah terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (PB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022?
3. Apakah terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/PB) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022
- b. Tidak terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (PB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022
- c. Tidak terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/PB) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022
- b. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022
- c. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (PB/BB) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Suplementasi susu formula	Suplementasi susu formula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian susu yang secara khusus diformulasikan sebagai nutrisi tambahan ASI untuk bayi sampai berusia 6 bulan.	Wawancara /Kuesioner	1= Diberikan suplementasi susu formula 2= Tidak diberikan suplementasi susu formula (hanya menggunakan ASI)	Nominal

Tabel 1. 1 Definisi Operasional (lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Dependen					
2.	Status Nutrisi	Status nutrisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan berdasarkan usia (BB/U), panjang badan berdasarkan usia (PB/U), dan berat badan berdasarkan panjang badan (BB/PB).	-	-	Nominal
		Berat badan (BB) yang dimaksud adalah berat badan bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang dinyatakan dalam gram.	Berat badan bayi usia 0-6 bulan diukur dengan timbangan bayi dan kurva pertumbuhan WHO, sedangkan bayi usia 7-36 bulan menggunakan BB pada usia 0-6 bulan yang terdapat dalam rekam medik.	1= berat badan sangat kurang 2= berat badan kurang 3= berat badan normal 4= risiko berat badan lebih	
		Panjang badan yang dimaksud adalah panjang badan bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang dinyatakan dalam centimeter.	Panjang badan bayi usia 0-6 bulan diukur dengan timbangan bayi dan kurva pertumbuhan	1= sangat pendek 2= pendek 3= normal 4= tinggi	

Tabel 1. 1 Definisi Operasional (lanjutan)

Variabel Dependen					
No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
	Status Nutrisi		WHO, sedangkan bayi usia 7-36 bulan menggunakan PB pada usia 0-6 bulan yang terdapat dalam rekam medik.		Nominal
		Berat badan menurut panjang badan yang dimaksud adalah berat badan berdasarkan panjang badan bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang dinyatakan dalam gram dan centimeter	Berat badan dan panjang badan bayi usia 0-6 bulan diukur dengan timbangan bayi dan kurva pertumbuhan WHO, sedangkan bayi usia 7-36 bulan menggunakan BB dan PB pada usia 0-6 bulan yang terdapat dalam rekam medik.	1= gizi buruk 2= gizi kurang 3= gizi baik 4= berisiko gizi lebih 5= gizi lebih 6= obesitas	Nominal
		Usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usia pada saat data anak (BB dan PB) diambil.			
	Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	BBLR adalah adalah bayi yang lahir dengan berat badan < 2500 gr.	Data berat badan lahir rendah diperoleh dari catatan medik.	-	-

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota Makassar Tahun 2020-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Variabel independen dilakukan dengan cara wawancara atau kuesioner, sedangkan variabel dependen menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara mengukur langsung berat badan dan panjang badan bayi, sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara melihat buku Kesehatan Ibu dan Anak.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

No.	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Yolanda Damaris, 2018	Hubungan Pemberian Susu Formula dengan Berat Badan Bayi 1-6 Bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.	Variabel Independen (bebas)= susu formula. Variabel Dependen (terikat)= berat badan bayi.	Penelitian analitik <i>observasional</i> dengan desain <i>cross sectional</i> .	Mayoritas responden (24 orang) yang diberikan susu formula memiliki berat badan normal.	Variabel independen yang berbeda yakni pemberian susu formula, tanpa pemberian ASI.

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan)

No.	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Perbedaan
2.	Imelda Fitri, 2020	Pengaruh Kenaikan Berat Badan Bayi Berat Lahir Rendah yang Mendapat Kombinasi ASI-Pasi	Variabel Independen= pemberian ASI-Pasi. Variabel dependen= berat badan BBLR.	Penelitian deskriptif analitik yang bersifat kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional	Terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan lahir dengan berat badan setelah 14 hari pertama perawatan. Rata-rata berat badan responden sebelum mendapat kombinasi ASI-PASI adalah 1885.4 gram. Setelah mendapat kombinasi ASI-PASI selama 14 hari pertama perawatan diperoleh rata-rata berat badan responden 2023.5 gram.	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti hanya meneliti berat badan BBLR - Jenis penelitian deskriptif analitik

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan)

No.	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Perbedaan
3.	Rosita Rahel Enambere, Maria Dyah Kurniasari, Dary, Kukuh Pambuka Putra. 2020	Pemberian ASI Eksklusif, Susu Formula dan Kombinasi Keduanya terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 6-11 Bulan di Puskesmas Cebongan Salatiga.	Variabel independen= ASI eksklusif, susu formula dan ASI-susu formula. Variabel dependen= pertumbuhan dan perkembangan anak.	Penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross sectional.	Mayoritas anak usia 6-11 bulan yang mengonsumsi ASI eksklusif memiliki pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal. Anak yang diberi susu formula dan kombinasi keduanya menunjukkan bahwa semua anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang normal.	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki variabel dependen tambahan yakni perkembangan anak. - Meneliti usia bayi yang beda, yakni 6-11 bulan.
4.	Sartika Lukman, Sri Wahyuningsih, Rahmawati, Sakriawati M. 2020	Perbedaan Pemberian ASI Eksklusif dengan PASI terhadap Tumbuh Kembang pada Anak Usia 0-12 Bulan.	Variabel independen= ASI eksklusif, PASI. Variabel dependen= tumbuh kembang bayi	Study komparatif dengan uji <i>mann whitney test</i>	Pemberian ASI eksklusif pada anak usia 0-12 bulan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak jika dibandingkan dengan anak yang mendapat tambahan susu formula (PASI)	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti perkembangan bayi - Meneliti usia bayi yang berbeda, yakni 0-12 bulan.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi pada bayi (BB/U, PB/U, BB/PB) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota Makassar Tahun 2020-2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran jumlah bayi usia 0-6 bulan dengan Riwayat BBLR yang mendapat suplementasi susu formula di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Antang, Puskesmas Jongaya dan Puskesmas Bira Tahun 2020-2022.
- b. Untuk mengetahui gambaran jumlah bayi usia 0-6 bulan dengan Riwayat BBLR yang mendapat ASI di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Antang, Puskesmas Jongaya dan Puskesmas Bira Tahun 2020-2022.
- c. Untuk mengetahui gambaran status nutrisi berat badan berdasarkan usia pada bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu formula di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.
- d. Untuk mengetahui gambaran status nutrisi panjang badan berdasarkan usia bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu formula di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022.
- e. Untuk mengetahui gambaran status nutrisi berat badan berdasarkan panjang badan bayi usia 0-6 bulan dengan Riwayat BBLR yang mendapat suplementasi susu formula dan ASI di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Antang, Puskesmas Jongaya dan Puskesmas Bira Tahun 2020-2022.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang kedokteran dan kesehatan khususnya mengenai hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan suatu kebijakan dan dapat digunakan sebagai strategi promosi kesehatan bagi masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan guna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terutama mengenai status nutrisi bayi riwayat BBLR dan pentingnya pemberian gizi pada bayi riwayat BBLR.

c. Bagi peneliti

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Susu Formula

1. Definisi Susu Formula

Susu formula merupakan produk olahan susu yang dibuat khusus untuk bayi dan memiliki kandungan menyerupai kandungan yang dimiliki ASI, tetapi tidak seluruh zat gizi yang terkandung di dalamnya dapat diserap oleh bayi (Suryani, 2021). Berdasarkan Permenkes No 39 tahun 2013 pasal 1 angka 4, disebutkan susu formula adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai 6 bulan (Permenkes, 2013).

Susu formula merupakan makanan pendamping ASI jika diberikan kepada bayi setelah berusia 6 bulan dan dapat dikatakan sebagai makanan pendamping ASI dini jika diberikan kepada bayi sebelum usia yang dianjurkan, yaitu kurang dari 6 bulan (Suryani, 2021). Susu formula boleh diberikan pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan jika terdapat indikasi medis, ibu meninggal dunia, dan ibu terpisah dari bayi (Permenkes RI, 2013). Jika ASI yang diperoleh bayi dari ibunya sudah terbukti tidak cukup untuk tumbuh kembangnya, yaitu bayi yang lahir dengan usia gestasi kurang dari 32 minggu, berat badan kurang dari 1500 gram, atau bayi yang berisiko mengalami hipoglikemia, maka dapat diberikan tambahan susu formula untuk sementara waktu (Sjarif dkk., 2011).

2. Jenis – jenis Susu Formula

Formula untuk bayi cukup bulan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Berdasarkan usia

- 1) Formula pertama (starter formula), merupakan formula yang berbahan dasar protein susu sapi, dan digunakan sejak lahir hingga berusia 12 bulan. Formula ini ada juga yang berbahan dasar soya dan susu kambing (Sjarif dkk., 2011).
- 2) Formula lanjutan (follow-on formula), merupakan susu formula yang diberikan pada bayi usia 6 bulan ke atas. Perbedaan kandungan starter formula dan follow-on formula adalah dari kandungan mineral (zat besi dan kalsium) (Sjarif dkk., 2011).

b. Berdasarkan Kandungan Proteinnya

Menurut Fitriati & Fahrudin (2019) dan Sjarif dkk (2011), jenis–jenis susu formula berdasarkan kandungan proteinnya dibagi berdasarkan pembagian berikut.

1) Susu Formula Berbahan Dasar Protein Susu Sapi

Susu formula susu sapi merupakan susu formula yang terbuat dari susu sapi. Susu formula yang dibuat dari susu sapi ini telah diproses dan diubah kandungan komposisinya sebaik mungkin agar dapat menyamai komposisi ASI, namun susu formula tetap tidak dapat menyerupai ASI 100% (Sjarif dkk., 2011) Dalam proses ini, kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan mineral dari susu sapi telah diubah serta diperkaya dengan vitamin dan mineral, sehingga mengikuti komposisi yang dibutuhkan dan sesuai untuk bayi berdasarkan usia (Fitriati & Fahrudin, 2019).

Formula ini merupakan pilihan standar untuk bayi cukup bulan tanpa riwayat alergi, asma, eksim di dalam keluarga (Sjarif dkk., 2011).

2) Formula Berbahan Dasar Protein Susu Kambing

Susu formula susu kambing lebih mudah dicerna dibandingkan susu formula susu sapi, namun tingginya protein yang terdapat dalam susu kambing, dapat mengalami asidosis. Susu ini juga memiliki asam lemak esensial (linoleat, arakidonat) yang lebih banyak daripada susu sapi. Susu formula susu kambing memiliki kalsium 13% lebih banyak, vitamin B6 25% lebih banyak, vitamin A 47% lebih banyak, kalium 134% lebih banyak, niasin tiga kali lebih banyak, kuprum empat kali lebih banyak, selenium 27% lebih banyak dari susu formula susu sapi. Jika dibandingkan dengan susu kambing, susu sapi memiliki beberapa kelebihan, yakni vitamin B12 lima kali lebih banyak, dan asam folat sepuluh kali lebih banyak (Sjarif dkk., 2011). Pada beberapa negara yang masih mengikuti aturan adat, susu kambing sering diberikan pada bayi penderita alergi susu sapi, tetapi susu kambing bukan jenis susu yang susunan nutrisinya lengkap untuk bayi (Fitriati & Fahrudin, 2019).

3) Susu Formula Berbahan Dasar Kedelai atau Soya

Susu formula khusus ini merupakan formula khusus yang diberikan pada bayi yang mengalami alergi susu sapi, bayi dengan intoleransi laktosa, bayi dengan masalah pencernaan, misalnya diare ataupun kolik. Penggunaan susu kedelai hanya bersifat sementara (Fitriati & Fahrudin, 2019).

4) Susu Formula Ekstensif Hidrolisa

Susu formula ekstensif hidrolisa merupakan susu pengganti pada bayi yang alergi terhadap susu sapi, susu ini mengandung protein susu sapi hidrolisa (melalui pemrosesan khusus). Susu formula ini tidak terlalu enak dan relatif mahal, karena protein *whey* lebih mudah didenaturasi (dirusak) oleh panas, dibandingkan pada protein kasein yang lebih tahan terhadap panas. Oleh karena itu, proses denaturasi *whey* dapat diterima oleh penderita alergi susu sapi (Fitriati & Fahrudin, 2019).

5) Susu Formula Hidrolisis Parsial

Susu hidrolisa parsial masih mengandung peptida dalam jumlah besar sehingga masih berpotensi untuk menyebabkan alergi terhadap susu sapi. Jenis dalam susu formula hidrolisa parsial yang banyak digunakan yaitu susu hipoalergenik. Susu ini direkomendasikan untuk penderita yang beresiko tinggi terhadap alergi. Penelitian menunjukkan pemberian susu formula ini dapat mengurangi onset gejala alergi yang ditimbulkan (Fitriati & Fahrudin, 2019).

6) Susu Formula Sintesis Asam Amino

Susu formula sintesis asam amino merupakan susu yang berbahan dasar asam amino 100% yang hipoalergenik. Rasa dari susu formula ini relatif lebih enak dan rasanya lebih diterima oleh bayi pada umumnya, akan tetapi harganya yang relatif mahal. Kegunaan neocate untuk mengatasi gejala alergi makanan persisten dan berat, seperti *multiple food protein*, intolerance, alergi terhadap *extensively hidrolysed formulae* (Fitriati & Fahrudin, 2019).

3. Kandungan Gizi Susu Formula

Kandungan gizi susu yang terdapat pada susu formula adalah *arachidonic acid*, *docosahexaenoic acid*, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan prebiotik (Fitriati & Fahrudin, 2019; Sjarif et dkk., 2011).

a. *Arachidonic Acid*

Arachidonic acid (AA) sering disebut juga dengan AHA atau ARA, ini merupakan unsur penting yang berperan penting dalam pembentukan jaringan otak, sehingga sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak (Fitriati & Fahrudin, 2019).

b. *Docosahexaenoic Acid*

Docosahexaenoic acid (DHA) mempunyai fungsi yang sama dengan AA, AHA, atau ARA sebagai pendukung perkembangan otak dan indera penglihatan (Fitriati & Fahrudin, 2019).

c. Protein

Kualitas protein yang terdapat dalam makanan tergantung pada susunan asam amino dan mutu cernanya. Berdasarkan hasil penelitian, protein susu, telur, daging, dan ikan memiliki nilai gizi yang paling tinggi. Protein susu dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu kasein (casein) dan *whey* (laktalbumin, laktoglobulin, dan lain-lain). Kandungan protein kasein pada susu formula lebih banyak dibandingkan dengan protein *whey*, berbeda dengan kandungan protein pada ASI, walaupun telah dimodifikasi semirip mungkin. *Whey* susu formula mengandung laktoglobulin beta yang bersifat sangat antigenik diantara protein susu sapi lainnya (Fitriati & Fahrudin, 2019). Anjuran kandungan protein susu formula sebesar 1.8-2 g/100kkal atau tidak melebihi 3 g/100kkal, sedangkan susu formula berbahan

dasar *isolate* protein kedelai harus memiliki kandungan protein minimal 2.25 g/100kkal dan maksimum 3.0 g/100kkal (Sjarif dkk., 2011).

d. Lemak

Kandungan lemak total yang disarankan pada susu formula adalah 4.4-6.0g/100kkal atau seimbang dengan 40-54% kandungan energi ASI (Sjarif dkk., 2011). Susu sapi lebih tinggi mengandung asam lemak rantai pendek dan asam lemak jenuh. Alat pencernaan anak lebih cepat menyerap asam lemak jenuh. Lemak bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan belajar dan memori anak (Fitriati & Fahrudin, 2019).

e. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi yang penting bagi pertumbuhan bayi. Jumlah minimum karbohidrat total yang disarankan dalam susu formula adalah 9 g/100kkal, dan kandungan karbohidrat maksimal yang disarankan sebesar 14 g/100kkal atau sekitar 56% dari kebutuhan energi (Sjarif dkk., 2011).

f. Vitamin

Vitamin merupakan zat gizi yang esensial. Apabila kekurangan vitamin tertentu dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan dan dapat menimbulkan penyakit tertentu (Fitriati & Fahrudin, 2019). Kandungan vitamin D3 yang disarankan adalah 1-2.5 μ g/100kkal, kandungan vitamin E yang dianjurkan dalam susu formula adalah 0.5-5 mg α -TE/100kkal dan tidak kurang dari 0.5 mg/g asam linoleat, kandungan vitamin K yang dianjurkan dalam susu formula yaitu 4-25 μ g/100kkal (Sjarif dkk., 2011).

g. Mineral dan *elemen trace*

Kandungan besi minimum sebesar 1 mg/100kkal. Kandungan besi pada formula dengan bahan dasar protein susu sapi dan hidrolisatnya berkisar 0.3-1.3 mg/100 kkal, sedangkan yang berbahan dasar protein kedelai harus mengandung besi sebesar 0.45-20 mg/100kkal, kandungan kalsium susu formula disarankan sebesar 50-140 mg/100kkal, natrium 20-60 mg/100kkal, kalium 60-160 mg/100kkal, dan klorida 50-160mg/100kkal (Sjarif dkk., 2011).

h. Prebiotik

Unsur penting dalam susu formula adalah zat prebiotik. Prebiotik pada susu formula berperan sebagai nutrisi yang dapat membantu menyempurnakan sistem pencernaan bayi, agar terhindar dari sembelit (Fitriati & Fahrudin, 2019).

4. Faktor yang Memengaruhi Pemberian Susu Formula

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pemberian susu formula sebagai berikut. (Azzahra & Kusumaningsih, 2020; Ipsan & Dewanto, 2021; Yulendasari & Firdaus, 2019)

a. Pengetahuan Ibu

Rendahnya tingkat pengetahuan tentang ASI selama 6 bulan dan tidak boleh melakukan pemberian susu formula usia bayi ≤ 6 bulan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan ibu mengenai nutrisi dan manfaat yang terkandung dalam ASI juga resiko pemberian susu formula dini. Selain itu, kebanyakan ibu hanya sekedar tahu tanpa memahami serta menerapkan ASI secara eksklusif pada bayinya (Azzahra & Kusumaningsih, 2020).

Ibu memberikan susu formula kepada bayinya karena berpikir bahwa pemberian ASI tidak dapat dilakukan apabila dalam keadaan sakit dan meminum obat over the counter (OTC) yang sebenarnya tidak membahayakan bayinya. Persepsi ini dapat berasal dari banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan ibu terkait masalah menyusui atau pemberian edukasi yang kurang lengkap oleh tenaga medis (Ipsan & Dewanto, 2021).

Kurangnya pemahaman ibu dan tenaga medis dalam pemberian nutrisi pada bayi terutama pada bayi dengan kondisi prematur atau BBLR sehingga timbul persepsi yang salah terkait pemberian susu formula. Persepsi yang salah menyebabkan besarnya lama durasi dan penggunaan berlebih dari susu formula yang tidak sesuai indikasi. Seharusnya pemberian ASI atau ASI donor lebih dimaksimalkan dalam kondisi seperti ini (Ipsan & Dewanto, 2021).

Ibu beranggapan bayi yang diberikan susu formula cenderung lebih cepat mengalami peningkatan berat badan dibandingkan bayi yang hanya diberikan ASI eksklusif. Ibu tidak mengetahui efek samping dari pemberian berlebih dari susu formula tersebut. Susu formula cenderung akan lebih cepat mengalami peningkatan berat badan dari pada pemberian ASI. Hal ini dikarenakan susu formula sulit dicerna oleh usus bayi yang menyebabkan penimbunan lemak. Bayi yang mengonsumsi susu formula dan memiliki berat badan yang lebih diperkirakan karena kelebihan air dan komposisi lemak yang berbeda dibandingkan bayi yang diberikan ASI eksklusif (Enamberea dkk., 2020).

b. Pendidikan Ibu

Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka kemampuannya untuk menyerap informasi semakin baik, sehingga pengetahuannya semakin baik pula. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Seseorang yang berpendidikan dan berpengetahuan luas lebih bisa menerima alasan untuk memberikan ASI, karena pola pikirnya yang lebih realistis dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah (Azzahra & Kusumaningsih, 2020; Ipsan & Dewanto, 2021; Yulendasari & Firdaus, 2019).

c. Faktor Promosi Susu Formula

Faktor promosi susu formula adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap pemberian susu formula pada bayi. Promosi susu formula tersedia dalam berbagai media, seperti media cetak, iklan di tv, penawaran sampel susu formula, agen-agen susu formula, dan lain-lain. Selain melalui media yang sudah disebutkan dapat pula melalui badan-badan kesehatan yang berinteraksi dengan ibu menyusui. Mayoritas sumber informasi mengenai susu formula berasal dari tenaga nonmedis. Tingginya promosi susu formula dapat menimbulkan persepsi-persepsi, seperti susu formula memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi bayi, susu formula dibutuhkan oleh bayi sebagai asupan selain ASI, dan susu formula adalah pilihan yang praktis dan efisien. Persepsi-persepsi tersebut mempengaruhi pemberian asupan pada bayi terutama saat dihadapkan pada masalah menyusui, sehingga ibu kemudian memutuskan untuk memberikan susu formula sebagai asupan nutrisi bayinya (Azzahra & Kusumaningsih, 2020; Ipsan & Dewanto, 2021).

d. Pekerjaan Ibu

Faktor ibu bekerja mengakibatkan kurangnya waktu untuk berinteraksi dengan anak, dan terpaksa tidak menyusui anaknya karena alasan disibukkan oleh pekerjaan. Ketidaklengkapan sarana dan prasarana di tempat kerja yang dialami oleh ibu memperlihatkan kurangnya dukungan menyusui di tempat kerja yang berujung pada kegagalan dalam program ASI eksklusif (Azzahra & Kusumaningsih, 2020; Ipsan & Dewanto, 2021; Yulendasari & Firdaus, 2019).

e. Kondisi Kesehatan Ibu

Faktor kesehatan ibu juga berpengaruh pada pemberian susu formula pada bayi. Ibu terinfeksi HIV, HTLV-1/2 (Human T-cell lymphotropic virus type I atau type II), menggunakan obat terlarang seperti PCP (Phencyclidine) atau *cocaine* merupakan kontraindikasi mutlak pemberian ASI pada bayi. Terdapat juga kondisi sementara ibu tidak boleh menyusui atau memberikan ASI perah jika ibu terinfeksi *brucellosis* yang tidak diobati, sedang minum obat tertentu, dan sedang menjalani pencitraan diagnostik dengan radiofarmasi. Kondisi ibu tidak boleh menyusui sementara, tetapi boleh memberikan ASI perah jika ibu menderita TBC aktif yang tidak diobati dan ibu memiliki infeksi varicella aktif (cacar air) (Ipsan & Dewanto, 2021).

f. Produksi ASI

Produksi ASI dapat meningkat atau menurun tergantung dari stimulasi pada kelenjar payudara. Ibu yang memiliki aktifitas di luar rumah lebih dari enam jam sehari mengakibatkan ibu mengalami kesulitan dalam menyusui bayinya, sehingga

stimulasi pada kelenjar payudara menurun dan ibu akhirnya memilih memberikan susu formula pada bayinya (Azzahra & Kusumaningsih, 2020).

g. Kondisi Kesehatan Bayi

Bayi yang menderita galaktosemia menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemberian susu formula pada bayi (Ipsan & Dewanto, 2021). Galaktosemia adalah keadaan tidak adanya enzim galacto-1-P-uridyl transferase, sehingga menyebabkan kadar galactose-1-phosphate meningkat tajam hingga mencapai kadar toksik di ginjal, hati, dan otak. Bayi yang menderita galaktosemia tidak boleh mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung laktosa seumur hidupnya, sehingga diberikan susu formula nonlaktosa (Irwan, 2021).

5. Kelemahan Susu Formula

Susu formula mengandung dua macam protein utama, yaitu *whey* dan kasein. *Whey* adalah protein halus, lembut, dan mudah dicerna. Kasein adalah protein yang bentuknya kasar, bergumpal, dan sukar dicerna oleh usus bayi. Protein pada susu formula lebih banyak terdiri dari protein kasein dari protein *whey*, dibandingkan dengan ASI yang memiliki protein *whey* yang lebih banyak (Astuti dkk., 2020). Terdapat dua resiko yang sering terjadi pada penggunaan susu formula yakni pencampuran yang tidak tepat dan kontaminasi formula oleh bakteri. Susu formula dengan pelarutan yang tidak tepat seperti penambahan air yang berlebih akan menimbulkan malnutrisi, dan susu formula yang dibuat terlalu kental dapat menimbulkan kegemukan, dehidrasi dan masalah ginjal pada bayi (Sjarif dkk., 2011). Jumlah protein kasein yang terdapat dalam ASI hanya 30% dibanding susu sapi yang mengandung protein kasein dalam jumlah tinggi (80%), sehingga lebih

sulit dicerna oleh usus bayi. Hal ini dapat mengakibatkan penimbunan lemak, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kegemukan pada bayi (Astuti dkk., 2020).

Susu formula merupakan produk yang tidak steril, sehingga dapat menimbulkan masalah pada bayi terutama pada bayi prematur atau anak dengan gangguan sistem imun, hingga menyebabkan kematian yang disebabkan oleh *Enterobacter sakazakii* (*cronobacter spp*) yang berasal dari bubuk susu formula, juga dapat disebabkan oleh kuman Salmonella (Sjarif dkk., 2011).

6. Peraturan Pemberian Susu Formula

Terdapat beberapa aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 pasal 6, tentang pemberian susu formula untuk bayi jika terindikasi medis, ibu tidak ada atau meninggal, ibu terpisah dari bayi.

- a. Pemberian Susu Formula Bayi berdasarkan Indikasi Medis
 - 1) Kelainan metabolisme bawaan
 - a) Bayi galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
 - b) Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*) memerlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin*, dan *valin*;
 - c) Bayi dengan *fenilketonuria*, memerlukan formula khusus bebas *fenilalanin*.
Bayi dengan *fenilketonuria* masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang berkompeten.
 - 2) Indikasi medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu

- a) Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
 - b) Bayi lahir kurang dari 32 minggu dari usia kehamilan;
 - c) Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa, seperti pada bayi prematur, kecil untuk usia kehamilan atau yang mengalami stress iskemik atau intrapartum hipoksia yang signifikan. Bayi yang sakit dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kemungkinan dapat menggunakan donor ASI atau susu formula bayi
 - 4) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu
- a) Ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti *sepsis* atau demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
 - b) Ibu yang menderita infeksi *Virus Herpes Simplex* tipe 1 (HSV-1) dan HSV-2 di payudara;
 - c) Ibu dalam pengobatan psikoterapi, anti epilepsi, opioid, radioaktif iodine 132, penggunaan yodium atau *yodoform topical*, dan/atau *sitotoksik kemoterapi*.
- b. Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi
 - 1) Ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
 - 2) Ibu tidak diketahui keberadaannya;

3) Ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya, sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Penggunaan susu formula bayi harus memenuhi syarat *AFASS*, meliputi dapat diterima (*acceptable*), layak (*feasible*), terjangkau (*affordable*), berkelanjutan (*sustainable*) dan aman (*safe*).

c. Aturan pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya

1) Pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus disesuaikan dengan usia, kondisi bayi dan sesuai dengan takaran saji yang dianjurkan dan/atau standar yang ditetapkan;

2) Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi.

Namun demikian, pemberian susu formula sesuai aturan atau takaran sangat jarang dilakukan. Ibu kadang memberikan susu formula sesuai keinginan anak.

Keterbiasaan orang tua memberikan susu formula sesuai keinginan anak sangat berpengaruh dalam penambahan berat badan anak. Susu dengan takaran yang tidak sesuai kebutuhan anak akan menyebabkan terjadinya obesitas pada anak.

Kebanyakan ibu masa bodoh terhadap label, ibu sering menyiapkan susu formula lebih pekat dari pada petunjuk yang ada pada label, atau sebaliknya ibu tidak mengerti membaca label (Raudhotun Nisak, 2018).

B. Berat Bayi Lahir Rendah

1. Definisi Bayi dan Bayi BBLR

Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 bulan dan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan (Ramadhan & Rahmawati, 2019). Bayi harus melakukan penyesuaian yang cepat agar dapat bertahan hidup. Terdapat empat penyesuaian utama yang harus dilakukan bayi menurut Aprilia (2020) yakni penyesuaian terhadap perubahan temperatur, bernafas, pembuangan kotoran, dan penyesuaian terhadap makanan. Refleks menghisap dan menelan bayi seringkali tidak berkembang dengan baik pada saat lahir, sehingga menyebabkan bayi sulit untuk mendapatkan makanan yang dibutuhkan, hal ini dapat menyebabkan bayi sering mengalami kehilangan berat badan (Aprilia, 2020).

Menurut WHO, BBLR adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau disebut juga dengan *low birth weight infants* (LBWI) (WHO, 2018). BBLR juga didefinisikan sebagai bayi yang dilahirkan dengan berat lahir berat kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi (Kosim dkk., 2009).

Secara umum, bayi berat lahir rendah memiliki resiko yang lebih besar mengalami masalah (Kosim dkk., 2009). Bayi dengan berat lahir rendah dapat menyebabkan timbulnya gangguan perkembangan dan pertumbuhan, dibandingkan dengan bayi dengan berat badan lahir normal (Hartiningrum & Fitriyah, 2019).

2. Epidemiologi BBLR

Prevalensi BBLR sebesar 15% atau sekitar sebanyak 20 juta kelahiran pertahun di seluruh dunia dan 96.5% di antaranya terjadi di negara-negara

berkembang (WHO, 2018). Pada tahun 2019, prevalensi BBLR di Indonesia sebesar 111.827 kasus (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020), prevalensi ini meningkat pada tahun 2020 dengan kasus sebanyak 129.815 (Kemenkes RI, 2021). Pada tahun 2018 Sulawesi Selatan menempati urutan ke-7 tertinggi kasus BBLR (Risikesdas, 2018). Pada tahun 2019, Sulawesi Selatan menempati urutan ke-4 tertinggi se-Indonesia dengan kasus BBLR sebanyak 4.4% atau sekitar 6.478 kasus (Kemenkes RI, 2020). Pada tahun 2020, Sulawesi Selatan menempati urutan ke-5 dengan kasus BBLRS sebanyak 6.353 dengan persentase 4.2% (Kemenkes RI, 2021).

3. Klasifikasi BBLR

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dapat diklasifikasikan menurut harapan hidupnya (Arvin, 2015)

- a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan berat lahir 1500-2500 gr. Hanya sekitar 20% dari bayi BBLR yang bertahan hidup di antaranya bayi yang memiliki berat badan 500-600 gr, dan 85-90% dari mereka yang dapat bertahan hidup di antaranya 1250-1500 gr.
- b. Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR) adalah bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1500 gr dan kebanyakan bayi BBLSR ini adalah prematur. Bayi BBLSR mencakup lebih dari 50% kematian neonatus dan 50% bayi yang cacat.
- c. Bayi Berat Lahir Ekstrim Rendah (BBLER) dengan berat lahir kurang dari 1000 gr.

4. Etiologi dan Faktor Resiko Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Menurut Ismayayanah, dkk (2020) etiologi yang memengaruhi kejadian BBLR adalah penyakit yang diderita oleh ibu pada saat mengandung, seperti malaria, anemia, sifilis, infeksi TORCH, dan lain-lain. Berat badan lahir rendah disebabkan oleh usia kehamilan yang pendek (prematurn) dan BBLR karena *intra uterine growth restriction* (IUGR) (Arvin, 2015)., atau pertumbuhan janin terhambat (PJT) atau keduanya. Penyebab BBLR ini dipengaruhi oleh beberapa faktor (Maemunisah dkk., 2021).

Adapun beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR menurut yakni sebagai berikut.

a. Faktor Ibu

1) Infeksi

Infeksi bakteri bergejala (*streptokokus grup B, Listeria monocytogenes*) atau tidak bergejala (*ureaplasma ureolyticum, mycoplasma hominis, chlamydia, gardnerella vaginalis*) pada cairan amnion dan ketuban (korioamnionitis) dapat memicu terjadinya kelahiran preterm. Bakteri dapat merangsang produksi sitokin lokal seperti interleukin-6 dan prostaglandin yang dapat menimbulkan kontraksi uterus prematur (Arvin, 2015).

2) Status Gizi Ibu

Status gizi ibu berhubungan dengan BBLR di India, Kamboja, Nepal, Pakistan, Yordania, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Senegal, Tanzania, Uganda, dan Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). Ibu dengan gizi buruk (<18.5) beresiko 1.49 kali melahirkan bayi yang BBLR. IMT yang rendah pada ibu hamil menjadi

penanda bahwa cadangan zat gizi pada jaringan terbatas dan merupakan salah satu prediktor malnutrisi energy protein, yang dapat memengaruhi pertumbuhan janin (Helena dkk., 2021; Noor dkk., 2020).

3) Usia Ibu

Usia ibu berhubungan dengan kejadian BBLR di Armenia, Kamboja, Yordania, Nepal, Pakistan, Tanzania, Zimbabwe, Burkina Faso, Ghana, dan Senegal (F. R. Agustina & Utari, 2020). Ibu yang berusia ≥ 35 tahun lebih berisiko untuk melahirkan bayi yang BBLR sebesar 1.6 kali dibandingkan dengan ibu yang berusia 20-34 tahun. Hal ini dapat disebabkan karena ibu hamil berusia ≥ 35 tahun memiliki risiko yang lebih besar mengalami penyulit dalam persalinan dan komplikasi kehamilan, seperti diabetes kehamilan, dan plasenta previa yang mungkin menjadi penyebab melahirkan bayi dengan BBLR (Helena dkk., 2021). Usia reproduktif yang optimal bagi seorang ibu adalah 20 – 35 tahun. Pada usia tersebut rahim sudah siap menerima kehamilan, mental ibu sudah matang, dan mampu merawat bayi dan dirinya. Pada usia kurang dari 20 tahun, organ – organ reproduksi belum matang dan belum siap untuk menerima kehamilan, sehingga beresiko melahirkan bayi BBLR (Noor dkk., 2020).

4) Pendidikan Ibu

Ibu yang berpendidikan rendah memiliki risiko yang lebih besar melahirkan bayi BBLR di Afganistan, Armenia, India, Nepal, Oman, Pakistan, Yordania, Burkina Faso, Malawi, Senegal, Uganda, Tanzania, dan Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). Seseorang dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki

pengetahuan kesehatan yang baik karena kemudahan mendapatkan informasi, dibandingkan dengan pendidikan rendah (Helena dkk., 2021).

5) Paritas

Ibu yang memiliki jumlah paritas > 3 dapat meningkatkan resiko terjadinya BBLR di Indonesia sebesar 1.31 kali dibandingkan dengan ibu yang mempunyai anak 2 atau 3 orang. Hal ini serupa ditemukan di Armenia, Kamboja, Nepal, Pakistan, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Nigeria, Tanzania, Uganda, dan Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). Ibu dengan paritas 1 biasanya belum siap secara fisik dan mental untuk hamil, sedangkan ibu dengan paritas ≥ 4 telah banyak melahirkan sehingga menyebabkan fungsi organ reproduksinya mengalami kemunduran. Ini berkaitan dengan kerja sistem tubuh yang terlalu sering dan dalam jangka waktu yang relatif singkat (Noor dkk., 2020).

6) Pendapatan atau Ekonomi

Status ekonomi keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian BBLR di Afganistan, Armenia, Indonesia, Kamboja, Nepal, Oman, Pakistan, Yordania, Tanzania dan Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). Hal ini disebabkan karena ibu dengan ekonomi yang rendah cenderung dapat melahirkan BBLR, dikarenakan pola makan yang buruk sebagai akibat dari rendahnya pendapatan. Keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung mampu memenuhi kebutuhan gizinya (F. R. Agustina & Utari, 2020; Helena dkk., 2021)

7) Pekerjaan Ibu

Pekerjaan ibu memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian BBLR di Nepal dan Pakistan (F. R. Agustina & Utari, 2020). Adanya tekanan di tempat

kerja dapat menyebabkan ibu mengalami stress, gangguan tidur, gangguan sistem pencernaan, kejang otot, sesak napas, bahkan hipertensi. Selain itu, kondisi tempat kerja yang tidak menguntungkan seperti kontak dengan bahan kimia, posisi berdiri atau duduk selama berjam-jam secara signifikan terkait dengan BBLR (F. R. Agustina & Utari, 2020; Helena dkk., 2021).

8) Frekuensi *Antenatal Care* (ANC)

Jumlah kehadiran ANC yang kurang memiliki hubungan signifikan dengan kejadian BBLR di India, Nepal, Pakistan, Yordania, Malawi, Tanzania, Uganda, dan Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). ANC menyediakan pemantauan rutin terhadap berat badan, saran gizi, identifikasi masalah medis ibu atau janin, intervensi dini yang dapat mengurangi dampak terjadinya hal-hal seperti BBLR (F. R. Agustina & Utari, 2020).

9) Komplikasi Kehamilan

Komplikasi selama kehamilan memiliki hubungan yang signifikan dengan BBLR hanya di Indonesia dan Oman. Beberapa jenis komplikasi yang sering terjadi selama masa kehamilan, yaitu pre-eklampsia, kehamilan ektopik, perdarahan, plasenta previa dan diabetes gestasional (F. R. Agustina & Utari, 2020). Penyebab lainnya yang dapat menyebabkan kelahiran prematur adalah penyakit jantung sianosis, penyakit ginjal, dan penyalahgunaan obat (misalnya kokain) (Arvin, 2015).

b. Faktor Janin

1) Gawat Janin

Gangguan pada janin dapat terjadi pada masa antepartum atau intrapartum. Penyebab utama kegawatan janin antepartum adalah insufisiensi uteroplasenta. Kurangnya pasokan oksigen pada janin yang disebabkan baik karena kondisi tubuh ibu hamil ataupun kondisi janin yang berada dalam kandungan akan menyebabkan hambatan pada pertumbuhan janin (Arvin, 2015).

2) Kehamilan Gemeli

Kehamilan ganda akan mempengaruhi jumlah sirkulasi ibu-janin, karena janin yang berjumlah >1 akan memerlukan asupan nutrisi dan oksigen yang lebih banyak, sehingga jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi tumbuh kembang janin termasuk berat badan lahir (Noor dkk., 2020). Ibu dengan kehamilan ganda berisiko 15 kali menyebabkan BBLR, dibandingkan ibu dengan kehamilan tunggal (Mahardika, 2020).

3) Ketuban Pecah Dini

Ketuban pecah dini dapat menyebabkan oligohidramnion yang akan menekan tali pusat, sehingga terjadi asfiksia dan hipoksia pada janin dan membuat nutrisi ke janin berkurang. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan bayi terganggu (Helena dkk., 2021).

4) Jenis Kelamin Bayi

Jenis kelamin bayi menunjukkan hubungan yang tidak konsisten dengan kejadian BBLR. Gender laki-laki memiliki efek protektif terhadap BBLR di India. Sebaliknya, bayi yang berjenis kelamin perempuan memiliki risiko yang lebih

besar mengalami kejadian BBLR di Indonesia, Afghanistan, Armenia, Kamboja, Yordania dan Tanzania (F. R. Agustina & Utari, 2020). Faktor janin lainnya yang dapat menyebabkan kelahiran prematur ataupun kelahiran BBLR adalah kehamilan multiple, eritroblastosis, dan hidrops nonimun (Arvin, 2015).

c. Faktor Plasenta

Ibu dengan kelainan vaskular seperti *preeklamsi* mengalami perubahan fisiologi patologi diantaranya perubahan pada plasenta dan uterus, yaitu menurunnya aliran darah ke plasenta yang mengakibatkan gangguan fungsi plasenta, yang jika berlangsung lama, pertumbuhan janin akan terganggu, sehingga sangat berpotensi melahirkan bayi BBLR. Selain itu, *preeklamsi* dan *eklamsi* dapat menyebabkan kepekaan terhadap rangsangan, sehingga mudah terjadi partus prematur yang mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan rendah (Mahardika, 2020; Noor dkk., 2020). Faktor plasenta lainnya yang dapat menyebabkan kelahiran preterm dan kelahiran BBLR adalah plasenta previa dan abrupsio plasenta (Arvin, 2015).

5. Permasalahan pada BBLR

Terdapat beberapa dampak atau permasalahan yang terjadi pada bayi BBLR. Menurut permasalahan yang terjadi pada BBLR yaitu sebagai berikut.

a. Gangguan Metabolik

Pada bayi BBLR dapat terjadi gangguan metabolik dan dapat diikuti dengan hipotermi. Hal ini karena bayi BBLR memiliki jumlah lemak yang sangat sedikit di dalam tubuhnya yang belum matur (Afifah, 2020) dan ketidakmampuan untuk menggigil (Kosim dkk., 2009). Masalah yang sering terjadi pada bayi BBLR yaitu

hipoglikemi. Pada bayi dengan BBLR, simpanan glikogen dalam jaringan berkurang, sehingga proses glukoneogenesis juga akan menurun. Defisiensi pengangkutan glukosa ke otak dapat menyebabkan kejang (Arvin, 2015).

b. Gangguan Imunitas

Pada bayi prematur dan BBLR perkembangan sistem imun saat janin tidak berkembang dengan sempurna, sehingga risiko infeksi pada BBLR tinggi. Hal ini disebabkan karena pada trimester ketiga transfer IgG maternal melalui plasenta kurang, juga dapat disebabkan oleh fagositosis terganggu dan penurunan faktor komplemen pada bayi BBLR (Kosim dkk., 2009).

c. Gangguan Pernapasan

Gangguan sistem pernapasan pada bayi BBLR dapat disebabkan karena kurang adekuatnya surfaktan pada paru-paru, paru-paru belum berkembang sempurna, otot pembantu respirasi masih lemah, sehingga pada bayi BBLR dapat timbul asfiksia saat lahir. Pada bayi prematur ataupun BBLR juga beresiko mengalami aspirasi, hal ini disebabkan karena belum terkoordinasinya refleks batuk, refleks menghisap dan refleks menelan bayi BBLR (Kosim dkk., 2009).

d. Gangguan Cairan dan Elektrolit

Bayi BBLR kurang dapat mengatur pembuangan sisa metabolisme dan juga kerja ginjal yang belum matang, hal ini menyebabkan absorpsi sedikit, produksi urin berkurang, dan tidak mempunya mengeluarkan kelebihan air di dalam tubuh, sehingga menyebabkan edema dan asidosis metabolik pada bayi BBLR (Kosim dkk., 2009). Kurangnya absorpsi makanan menyebabkan sedikitnya nutrisi yang

diserap oleh tubuh, sehingga menyebabkan lambatnya tumbuh kembang pada BBLR (Afifah, 2020).

e. Gangguan Pencernaan

Saluran pencernaan pada bayi BBLR kurang sempurna, sehingga otot-otot pencernaan dan pengosongan dalam lambung bayi BBLR melemah. Refleks isap dan telan bayi prematur dan BBLR buruk terutama sebelum 34 minggu, motilitas usus menurun, pencernaan dan absorpsi vitamin yang larut dalam lemak kurang, yang dapat berdampak pada pertumbuhan bayi (Kosim dkk., 2009).

f. Imaturitas Hati

Masalah imaturitas hati disebabkan karena adanya defisiensi faktor pembekuan yang bergantung pada vitamin K. Pada bayi BBLR, konjugasi dan ekskresi bilirubin terganggu, sehingga dapat menyebabkan ikterus (Kosim dkk., 2009).

g. Masalah Fisik

Pada bayi BBLR sering terjadi *retinopathy of prematurity* (ROP) dengan BB 1500 gram dan masa gestasi < 30 minggu. Hal ini menyebabkan gangguan pada penglihatan pada bayi dengan BBLR (Afifah, 2020).

6. Penatalaksanaan BBLR

a. Mempertahankan Suhu dengan Ketat

Bayi BBLR akan mudah mengalami kehilangan panas badan dan menjadi hipotermi, karena pada pusat pengaturan panas badan belum berfungsi secara baik dan optimal, metabolismenya masih rendah, dan permukaan badannya yang sangat relatif luas (Kosim dkk., 2009), sehingga bayi harus dirawat di dalam inkubator,

agar mendapatkan kehangatan atau panas badan sesuai suhu dalam rahim. Bila tidak memiliki alat atau tidak terdapat inkubator, bayi dapat dibungkus menggunakan lampu pemanas, selimut, bantalan pemanas, dan botol air panas serta mengendalikan suhu dan kelembaban kamar (Arvin, 2015). Selain itu, terdapat metode kanguru yang dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau menempelkan bayi secara langsung di atas dada ibu (Agusthia dkk., 2020).

b. Mencegah Infeksi dengan Ketat

Bayi BBLR memiliki imunitas yang sangat kurang, sehingga sangat rentan terkena infeksi (Kosim dkk., 2009), sehingga fungsi perawatan di sini adalah memberi perlindungan terhadap bayi BBLR dari bahaya infeksi. Oleh karena itu, bayi tidak boleh kontak dengan penderita infeksi dalam bentuk apapun, serta menggunakan masker dan baju khusus dalam penanganan bayi (Subekti, 2007).

c. Pengawasan Nutrisi dan ASI

ASI merupakan pilihan utama untuk bayi BBLR apabila bayi masih mampu mengisap, tetapi jika bayi tidak mampu untuk mengisap, maka dapat dilakukan dengan cara ASI diperas terlebih dahulu, lalu diberikan kepada bayi dengan menggunakan sendok atau dapat dengan cara memasang sonde ke lambung secara langsung (Arvin, 2015). Jika ASI tidak dapat mencukupi atau bahkan tidak ada, khusus pada bayi dengan BBLR dapat digunakan susu formula yang komposisinya mirip ASI atau biasanya dapat disebut susu formula khusus untuk bayi BBLR (Permenkes RI, 2013). ASI tidak selalu optimal untuk bayi yang beratnya kurang dari 1000 g, karena bayi BBLR memerlukan lebih banyak kalsium, fosfor, natrium, dan protein. ASI prematur dan *fortifier* ASI dapat menambah ASI dengan protein,

kalsium, dan fosfor atau dapat digunakan formula prematur khusus. Formula prematur tidak boleh diberikan pada umur kehamilan mencapai sekitar 34-36 minggu, karena hiperkalsemia dapat muncul sebagai akibat dari formula yang memiliki kadar kalsium dan vitamin D yang lebih tinggi (Arvin, 2015).

C. Tumbuh Kembang BBLR

Bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu asah, asih dan asuh (Esty Pamungkas dkk., 2020).

1. Kebutuhan Asuh

Kebutuhan Asuh merupakan kebutuhan bayi dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai, meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan seperti: nutrisi (ASI, pendamping ASI), perawatan kesehatan dasar (imunisasi dan kesehatan yang memadai/pengobatan), penimbangan yang teratur, pemukiman yang layak, sanitasi lingkungan, pakaian, rekreasi, dan lain - lain (Yertiasih, 2020). Untuk tumbuh kembang diperlukan zat makanan yang adekuat seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air yang harus dikonsumsi secara seimbang dan sesuai dengan tahapan usianya. Kekurangan makanan yang bergizi akan menyebabkan retardasi pertumbuhan anak, sedangkan kelebihan makanan juga tidak baik, karena dapat menyebabkan obesitas. Kedua keadaan ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas anak (Setiyaningrum, 2017).

2. Kebutuhan Asah

Kebutuhan asah adalah kebutuhan akan stimulasi dini. Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapat stimulasi. Lingkungan yang kondusif akan

mendorong perkembangan fisik dan mental yang baik, sedangkan lingkungan yang kurang kurang mendukung akan mengakibatkan perkembangan anak di bawah potensi genetiknya (Soetjiningsih, 2012).

Dalam proses tumbuh kembang BBLR banyak mengalami hambatan. Tidak sedikit dari BBLR yang mengalami gangguan perkembangan dan pertumbuhan seperti lumpuh, gangguan pendengaran, penglihatan, kognitif, fungsi motor susunan saraf pusat, dan penyakit – penyakit seperti hidrosefalus, cerebral palsy, dan sebagainya. Pemantauan pertumbuhan dinilai dari kenaikan berat badan dan tinggi badan. Alat yang digunakan untuk memantau tumbuh kembang BBLR adalah buku KIA (Esty Pamungkas dkk., 2020).

3. Kebutuhan Asih

Kebutuhan Asih bayi adalah kebutuhan emosi atau kasih sayang dari orang tua, sehingga akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, psikososial (Esty Pamungkas dkk., 2020). Anak memerlukan kasih sayang dan perlakuan yang adil dari orang tuanya, tetapi anak yang diberikan kasih sayang yang berlebihan akan menjurus ke arah memanjakan, sehingga dapat menghambat bahkan mematikan perkembangan kepribadian anak (Soetjiningsih, 2012).

D. Nutrisi untuk BBLR

Pemberian nutrisi bayi berat lahir rendah (BBLR) tidak sama dengan pemberian pada bayi cukup bulan. Hal ini dikarenakan kematangan fungsi saluran cerna, enzim serta kemampuan pengosongan lambung yang berbeda dengan bayi cukup bulan. BBLR memerlukan pemenuhan nutrisi yang adekuat untuk

mendukung peningkatan pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat tumbuh seperti bayi normal lainnya (A. N. Agustina dkk., 2018).

Besarnya energi tambahan yang dibutuhkan untuk mengejar pertumbuhan adalah 90-100 kkal/kg/hari. Pemberian nutrisi untuk mengejar pertumbuhan bayi BBLR dapat dilakukan dengan pemberian ASI, susu formula BBLR, dan nutrisi parenteral. Pada umumnya BBLR dengan berat lahir kurang dari 1500 gram, memerlukan nutrisi parenteral segera sesudah lahir. Pemberian nutrisi parenteral yang dapat diberikan adalah glukosa, protein, lipid, dan zat besi. Setelah pemberian nutrisi parenteral selesai untuk membantu meningkatkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan maka diberikan ASI terfortifikasi sebagai ASI tambahan (Sulistijono dkk., 2016). Pemberian ASI pada bayi yang memiliki berat badan bayi 1250-2500 gr adalah diberikan minimal delapan kali dalam 24 jam atau setiap 3 jam, dan jika berat badan bayi kurang dari 1250 gr dapat diberikan ASI 12 kali dalam 24 jam atau setiap 2 jam. Pemberian cairan pada bayi yang cukup bulan biasanya dimulai dari 60-70 ml/kg pada hari pertama dan dinaikkan sampai 100-120 ml/kg pada hari ke-2 dan ke-3 (Arvin, 2015). Pemberian volume makanan dan cairan pada BBLR berbeda harus disesuaikan dengan kondisi dan berat badan bayi. Volume ASI pada bayi dengan berat badan 1500-1749 gr dapat diberikan sebanyak 12 ml/kg pada hari pertama dan dinaikkan sampai 22-26 ml/kg pada hari ke-3 dan ke-4. Berat badan bayi 1250-1490 gr dapat diberikan sebanyak 10 ml/kg pada hari pertama dan dinaikkan sampai 15-18 ml/kg pada hari ke-2 dan ke-3, dan pada bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 1250 gr dapat diberikan 3-4 ml/kg pada hari ke-3 dan dinaikkan sampai 5-8 ml/kg pada hari ke-4 dan ke-5 (Subekti, 2007).

Bayi kurang bulan dan BBLR yang mendapatkan ASI, membutuhkan zat besi elemental sekitar 2 mg /kg yang diberikan sejak umur 2 – 4 minggu. Pada bayi dengan BB kurang dari 1500 gr membutuhkan 3 mg/kg/hr, dan pada bayi BB kurang dari 1000-1500 g membutuhkan 4 mg/kg/hari (Sjarif dkk., 2011).


E. Pertumbuhan Pada BBLR

Pertumbuhan pada bayi dengan berat badan normal akan berbeda dengan pertumbuhan bayi dengan riwayat berat lahir rendah. Pada umumnya, ketika baru dilahirkan, bayi yang normal memiliki berat badan sekitar 2.500-3.000 gr, dengan panjang badan 48-50 cm. Bayi yang lahir cukup bulan akan mengalami kehilangan berat badan sekitar 5-10% pada 7 hari pertama, dan akan kembali pada hari 7-10. Perkiraan penambahan berat badan bayi normal pada 4-5 bulan sebesar 2 kali berat badan lahir. Pada usia 3-4 bulan pertama akan mengalami kenaikan berat badan sebanyak 20-30 gr/hari, dan pada 1 tahun, peningkatan berat badan diperkirakan sebanyak 3 kali berat badan lahir (Soetjiningsih, 2012). Pada usia 0-3 tahun, pertumbuhan tinggi badan bayi akan mencapai 1.5 kali panjang lahir. Pada usia 6-12 bulan, penambahan tinggi badan anak mencapai 5-7 cm per tahun. Pertumbuhan tinggi dan berat badan setiap bayi tidak akan sama, tergantung pada beberapa faktor yang melingkupinya, seperti faktor genetik, faktor gizi, faktor hormon, dan faktor lingkungan. Ukuran lingkaran kepala normal pada bayi lahir dengan berat badan normal adalah sekitar 34-35 cm. Kenaikan lingkaran kepala pada tahun pertama adalah 1 cm/bulan, tetapi pada 3 bulan pertama akan terjadi kenaikan sebanyak 2 cm/bulan, dan selanjutnya mulai melambat (Soetjiningsih, 2012). Pada usia 6-12 bulan, pertumbuhan ukuran kepala berkisar 0.5 cm per bulan (Ebtanasari, 2018).

Pada BBLR akan kehilangan berat badan pada minggu pertama kehidupannya sebesar 10 – 15%, dan akan kembali lagi pada usia 10-14 hari sebesar 25 – 30 gram per hari selama 3 bulan. Pada BBLSR akan kehilangan berat badan selama 7 – 10 hari kehidupannya sebesar 10 – 15%, dan akan kembali lagi pada usia 10 – 14 hari (Natalina, 2019). Pertambahan pertumbuhan pada BBLR adalah 15-20 gram/hari. Pertambahan panjang badan pada BBLR yaitu 0.8-1 cm/minggu, sedangkan pertumbuhan lingkaran kepala bayi BBLR yaitu 0.7 cm/minggu (Subekti, 2007). Bayi BBLR yang diberi susu formula BBLR akan mengalami kenaikan berat badan dengan rata-rata 171,8 g/minggu pada satu bulan pertama. Bayi BBLR yang berumur 1-2 bulan mengalami kenaikan berat badan dengan rata-rata 242,4 g/minggu, namun pemberian susu formula BBLR terlalu dini pada bayi BBLR dapat meningkatkan tingkat kesakitan (Septira & Anggraini, 2016). Pengukuran dan pemantauan pertumbuhan bayi usia 0-6 bulan dapat menggunakan kurva pertumbuhan bayi menurut WHO.

Bayi dikatakan memiliki berat badan normal jika berada di rentang -2 hingga +1 SD. Jika kurang dari -3 SD, maka berat badan bayi sangat kurang (*severely underweight*). Jika berada di rentang -3 SD hingga kurang dari -2 SD, bayi dikatakan berat badan kurang (*underweight*). Jika berada dalam kurva lebih dari +1 SD, berarti berat badan bayi berada dalam kategori risiko berlebih. Penilaian status gizi bayi didasarkan PB/U, yaitu sangat pendek (*Severely Stunted*) jika kurang dari -3 SD, pendek (*Stuned*) jika berada dalam rentang -3 SD hingga kurang dari -2 SD, normal jika berada pada rentang -2 SD hingga +3 SD, dan dikatakan tinggi jika lebih dari +3 SD. Penilaian status gizi bayi yang didasarkan BB/PB, yaitu dikatakan

gizi buruk jika hasil penilaian kurang dari -3 SD, dikatakan gizi kurang jika berada pada -3 SD hingga kurang dari -2 SD, gizi baik pada -2 SD hingga +1 SD, dan risiko gizi lebih ketika hasil pengukuran lebih dari +1 SD sampai dengan +2 SD. Sementara bayi dikatakan gizi lebih jika lebih dari +2 SD hingga +3 SD dan dikatakan obesitas jika lebih dari +3 SD (Kemenkes RI, 2020).




Gambar 2. 1 Berat Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Laki-Laki

M A K A S S A R

Weight-for-age GIRLS


Birth to 6 months (z-scores)



Gambar 2. 2 Berat Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Perempuan

Length-for-age BOYS


Birth to 6 months (z-scores)



Gambar 2. 3 Panjang Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Laki-Laki

Length-for-age GIRLS


Birth to 6 months (z-scores)



Gambar 2. 5 Panjang Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Perempuan.

Weight-for-length BOYS


Birth to 2 years (z-scores)



Gambar 2. 6 Berat Badan Menurut Panjang Badan (0-6 Bulan) Bayi Laki-laki

Weight-for-length GIRLS

Birth to 2 years (z-scores)




WHO Child Growth Standards

Gambar 2.7 Berat Badan Menurut Panjang Badan (0-6 Bulan) Bayi Perempuan




F. Kerangka Teori



Gambar 2. 8 Kerangka Teori

G. Kerangka Konsep

Variabel independen



Gambar 2. 9 Kerangka Konsep

Keterangan:

- : variabel independen
- : variabel dependen
- : yang diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *analitik observasional* dengan menggunakan data kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional* untuk mengetahui hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota Makassar Tahun 2020-2022.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota Makassar. Beberapa alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk daerah yang memiliki prevalensi tinggi kasus BBLR tergolong tinggi ke-5 di Indonesia tahun 2020.
2. Kota Makassar memiliki prevalensi kasus BBLR terbanyak ke-2 di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019.
3. Puskesmas Tamangapa memiliki prevalensi kasus BBLR tertinggi di seluruh Puskesmas Kota Makassar pada tahun 2022 dan mewakili wilayah Makassar bagian Selatan.
4. Puskesmas Antang memiliki prevalensi kasus BBLR tertinggi ke-3 di Puskesmas Kota Makassar tahun 2022 dan mewakili wilayah Makassar bagian Timur.

5. Puskesmas Jongaya memiliki prevalensi kasus BBLR tertinggi ke-6 di Puskesmas Kota Makassar tahun 2022 dan mewakili wilayah Makassar bagian Barat.
6. Puskesmas Bira memiliki prevalensi kasus BBLR tertinggi ke-4 di Puskesmas Kota Makassar tahun 2022 dan mewakili wilayah Makassar bagian Utara.

C. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Desember - Januari 2023

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian suplementasi susu formula.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status nutrisi bayi.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti (Ririn, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi BBLR yang dilahirkan di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira dalam 3 tahun terakhir sebanyak 268 kasus.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto & Sodik, 2015). Cara pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari total populasi sebanyak 268 sampel, yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebanyak 160 sampel.

Cara penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = tingkat signifikan

Berdasarkan data pengambilan awal di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira didapatkan populasi bayi BBLR di wilayah Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira, yaitu 268 orang, sehingga jumlah sampel bayi BBLR yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

$$n = \frac{268}{1 + 268 (0,05^2)}$$

$n = 160,47$ bayi, sehingga menjadi 160 bayi.

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah

Tabel 3. 1 Kriteria Penelitian

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1. Bayi lahir hidup yang dilahirkan di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota Makassar tiga tahun terakhir dengan riwayat BBLR. 2. Bayi riwayat BBLR yang berusia 0-6 bulan. 3. Bayi riwayat BBLR yang berusia 7-36 bulan memiliki data rekam medik yang lengkap pada saat berusia 0-6 bulan. 4. Bayi dengan ibu yang tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi dan bersedia menjadi responden.	1. Bayi yang mengalami kelainan kongenital. 2. Bayi yang mengalami sakit kronis. 3. Responden berpindah domisili saat penelitian.

Tabel 3. 2 Kriteria Penelitian (Lanjutan)

Kriteria Inklusi	
5. Bayi yang tinggal menetap di wilayah Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota Makassar	

F. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek yang akan diteliti dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang akan dilakukan pengisian secara langsung oleh responden dan melakukan pengukuran tinggi badan, panjang badan secara langsung menggunakan alat ukur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari instansi tempat dilakukan penelitian berupa data demografi anak di wilayah tersebut dan data juga dapat didapatkan melalui buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dimiliki responden.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik, buku Kesehatan Ibu dan Anak, kuesioner melalui metode *online* dengan menggunakan *google form* yang didampingi oleh peneliti dan *length board*, metlin, serta timbangan bayi untuk mengukur berat badan dan panjang badan bayi usia 0-6 bulan, sedangkan bayi usia 7-32 bulan menggunakan data sekunder yakni buku KIA untuk mengukur berat badan dan panjang badan bayi.

H. Pengolahan Data

1. Seleksi

Melakukan seleksi untuk mengklasifikasikan data sesuai kategori.

2. Editing (Penyuntingan)

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan seluruh data sesuai dan lengkap.

3. Coding (Pengkodean)

Memberikan kode atau tanda pada data yang didapatkan untuk menyederhanakan jawaban dari pihak responden dan memudahkan dalam proses analisa data.

4. Tabulasi (tabulating)

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data.

I. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Science (SPSS) for Windows* selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dipresentasikan dalam bentuk narasi.


1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan dengan cara mendeskripsikan variabel dependen dan independen untuk melihat gambaran distribusi frekuensinya dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing frekuensi.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan pada dua variabel yang berhubungan dengan menggunakan uji *chi-square*. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pemberian susu formula dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan.

J. Alur Penelitian



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

K. Etika Penelitian

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin penelitian.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan.
4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Tamangapa, Antang, Jongaya, Bira, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai Desember hingga Januari 2023. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 160 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasional* dengan pendekatan *cross sectional*. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi dengan riwayat berat badan lahir rendah usia 0-6 bulan di lokasi penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social the Science (SPSS)*, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat pada tiap variabel penelitian akan menunjukkan hasil distribusi dan persentase dari tiap variabel kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *chi-square* untuk mengetahui hubungan antara variabel. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Analisis Univariat

Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi frekuensi persentase tiap-tiap variabel tunggal dan karakteristik responden dan sampel yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Distribusi Data Karakter Ibu dan Bayi dengan Riwayat BBLR Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar

Karakteristik	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	76	47.5
Perempuan	84	52.5
Usia Bayi		
0-6 bulan	26	16.25
7-36 bulan	134	83.75
Usia Ibu		
17-25 tahun	41	25.6
26-35 tahun	106	66.3
36-45 tahun	13	8.1
Pekerjaan Ibu		
IRT	127	79.4
PNS	19	11.9
Swasta	13	8.1
Pengusaha	1	0.6
Tingkat Pendidikan Ibu		
SD	31	19.4
SMP	41	25.6
SMA	63	39.4
D3	1	0.6
S1	24	15.0
Pemberian Suplementasi Susu Formula		
Ya	67	41.9
Tidak	93	58.1

Sumber: Data primer dan sekunder, 2020-2022

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Antang, Puskesmas Jongaya dan Puskesmas Bira diperoleh hasil bahwa jenis kelamin bayi laki-laki sebanyak 76 bayi (47.5%), sedangkan bayi perempuan sebanyak 84 bayi (52.5%). Distribusi frekuensi usia bayi diperoleh hasil bahwa usia bayi 0-6 bulan sebanyak 26 bayi (16.25%), usia bayi 7-36 bulan sebanyak 134 bayi (83.75%). Dari seluruh total sampel, didapatkan median usia 16.5 (1-35), dengan median usia 4 (1-6) pada kelompok usia 0-6 bulan, dan dengan median usia 19.5 (7-35) pada kelompok usia 7-36 bulan. Distribusi frekuensi usia ibu diperoleh hasil bahwa usia 17-25 tahun sebanyak 41 responden (25.6%), usia 26-35 tahun sebanyak 106 responden (66.3%), dan usia 36-45 tahun sebanyak 13 responden (8.1%). Dari seluruh total sampel didapatkan median usia ibu 29 (17-42), dengan median usia 23 (17-25) pada kelompok usia 17-25 tahun, dengan median usia 30 (26-35) pada kelompok usia 26-35 tahun, dan dengan median usia 37 (36-42) pada kelompok usia 36-45 tahun. Distribusi frekuensi pekerjaan ibu diperoleh hasil dengan ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 127 responden (79.4%), PNS sebanyak 19 responden (11.9%), karyawan swasta sebanyak 13 responden (8.1%), dan pengusaha sebanyak 1 responden (0.6%). Distribusi frekuensi pendidikan ibu diperoleh hasil ibu yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 31 responden (19.4%), pendidikan SMP sebanyak 45 responden (30.8%), pendidikan SMA sebanyak 41 responden (25.6%), pendidikan D3 sebanyak 1 responden (0.6%), pendidikan S1 sebanyak 24 responden (15.0%), dan pendidikan S2 sebanyak 1 responden (0.7%). Distribusi frekuensi pemberian suplementasi susu formula diperoleh hasil bahwa bayi yang diberi suplementasi

susu formula sebanyak 67 bayi (41.9%), dan 93 bayi (58.1%) bayi yang diberi selain suplementasi susu formula.

Tabel 4. 2 Distribusi Status Nutrisi (BB/U) Bayi dengan Riwayat BBLR di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2021-2022.

Status Nutrisi (BB/U)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Sangat Kurang	0	00.0
Kurang	46	28.7
Normal	107	66.9
Beresiko BB lebih	7	4.4
Total	160	100.0

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bayi di Puskesmas Kota Makassar sebagian besar menunjukkan status nutrisi (BB/U) normal yakni sebanyak 107 bayi (66.9%), bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) kurang sebanyak 46 bayi (28.7%), sedangkan bayi yang beresiko berat badan lebih sebanyak 7 bayi (4.4%).

Tabel 4. 3 Distribusi Status Nutrisi (PB/U) Bayi dengan Riwayat BBLR di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022

Status Nutrisi (PB/U)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Sangat Pendek	2	1.3
Pendek	78	48.8
Normal	80	50.0
Tinggi	0	00.0
Total	160	100.0

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan bayi di Puskesmas Kota Makassar dengan status nutrisi (PB/U) normal sebanyak 80 bayi (50.0%), bayi dengan status nutrisi

(PB/U) pendek sebanyak 78 bayi (48.8%). Sedangkan bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) sangat pendek sebanyak 2 bayi (1.3%).

Tabel 4. 4 Distribusi Status Nutrisi (BB/PB) Bayi dengan Riwayat BBLR di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022

Status Nutrisi (BB/PB)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Gizi Buruk	0	0.0
Gizi Kurang	18	11.3
Gizi Baik	123	76.9
Berisiko gizi lebih	7	4.4
Gizi Lebih	6	3.8
Obesitas	6	3.8
Total	160	100.0

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan bayi di Puskesmas Kota Makassar sebagian besar menunjukkan status nutrisi (BB/PB) gizi baik yakni sebanyak 123 bayi (76.9%), bayi dengan status nutrisi (BB/PB) gizi kurang sebanyak 18 bayi (11.3%), bayi dengan status nutrisi (BB/PB) berisiko gizi lebih sebanyak 7 bayi (4.4%), bayi dengan status nutrisi (BB/PB) gizi lebih sebanyak 6 bayi (3.8%), bayi dengan status nutrisi (BB/PB) obesitas sebanyak 6 bayi (3.8%).

2. Analisis Bivariat

Hubungan pemberian suplementasi susu formula terhadap status nutrisi bayi pada usia 0-6 bulan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. 5 Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi (BB/U) dengan Riwayat BBLR pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022

Suplementasi Susu Formula	Status Nutrisi (BB/U)			Total	P-value
	Kurang (%)	Normal (%)	Risiko Lebih (%)		
Ya	30 (44.8%)	30 (44.8%)	7 (10.4%)	67 (100.0%)	0.001
Tidak	16 (17.2%)	77 (82.8%)	0 (0.0%)	93 (100.0%)	
Total	46 (28.7%)	107 (66.9%)	7 (4.4%)	160 (100.0%)	

Sumber : Data primer dan sekunder, 2020-2022

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa jumlah bayi yang diberikan suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, dan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) normal sebanyak 30 bayi (44.8%) dari total bayi yg diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) kurang sebanyak 30 bayi (44.8%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) risiko lebih sebanyak 7 bayi (10.4%). Jumlah bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula sebanyak 93 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, dan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) normal sebanyak 77 bayi (82.8%) dari total anak yang tidak diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) yang kurang sebanyak 16 bayi (17.2%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, sedangkan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) resiko lebih sebanyak 7 bayi (10.4%) dari total anak yang tidak diberikan suplementasi susu formula.

Hasil analisis untuk melihat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi BBLR usia 0-6 bulan menggunakan uji statistik *chi-square*, dikatakan terdapat hubungan yang signifikan jika *p-value* <0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.001 yang berarti terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi (BB/U) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4. 6 Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi (PB/U) dengan Riwayat BBLR Pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022

Suplementasi Susu Formula	Status Nutrisi (PB/U)				Total	P-value
	Sangat Pendek (%)	Pendek (%)	Normal (%)	Tinggi (%)		
Ya	1 (1.5%)	44 (65.7%)	22 (32.8%)	0 (0.0%)	67 (100.0%)	0.001
Tidak	1 (1%)	34 (36.6%)	58 (62.4%)	0 (0.0%)	93 (100.0%)	
Total	2 (1.2%)	78 (48.8%)	80 (50.0%)	0 (0.0%)	160 (100.0%)	

Sumber : Data primer dan sekunder, 2020-2022

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa jumlah bayi yang diberikan suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, dan bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) pendek sebanyak 44 bayi (65.7%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) normal sebanyak 22 bayi (32.8%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) sangat pendek sebanyak 1 bayi (1.5%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula.

Jumlah bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula sebanyak 93 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) normal sebanyak 58 bayi (62.4%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) yang pendek sebanyak 34 (36.6%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) sangat pendek sebanyak 1 (1%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula.

Hasil analisis untuk melihat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi BBLR usia 0-6 bulan menggunakan uji statistik *chi-square*, dikatakan terdapat hubungan yang signifikan jika *p-value* < 0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.001 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi (PB/U) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4. 7 Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi (BB/PB) dengan Riwayat BBLR Pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022

Suplementasi Susu Formula	Status Nutrisi (BB/PB)						Total	P-value
	Gizi buruk (%)	Gizi kurang (%)	Gizi baik (%)	Berisiko gizi lebih (%)	Gizi lebih (%)	Obesitas (%)		
Ya	0 (0.0%)	9 (13,4%)	45 (67,2%)	4 (6.0%)	4 (6.0%)	5 (7.5%)	67 (100.0%)	0.080
Tidak	0 (0.0%)	9 (9.7%)	78 (83.9%)	3 (3.2%)	2 (2.2%)	1 (1.1%)	93 (100.0%)	
Total	0 (0.0%)	18 (11.3%)	123 (76.9%)	7 (4.4%)	6 (3.8%)	6 (3.8%)	160 (100.0%)	

Sumber : Data primer dan sekunder, 2020-2022

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa jumlah bayi yang diberikan suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, dan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) normal sebanyak 45 bayi (67,2%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi kurang sebanyak 9 bayi (13.4%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) obesitas sebanyak 5 bayi (7.5%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) beresiko gizi lebih sebanyak 4 bayi (6.0%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, dan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi lebih sebanyak 4 bayi (6.0%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula. Jumlah bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula sebanyak 93 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi baik sebanyak 78 bayi (83.9%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi kurang sebanyak 9 bayi (9.7%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) berisiko gizi lebih sebanyak 3 bayi (3.2%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi lebih sebanyak 2 bayi (2.2%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, dan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) obesitas sebanyak 1 bayi (1.1%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula.

Hasil analisis untuk melihat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi BBLR usia 0-6 bulan menggunakan uji statistik

chi-square, dikatakan terdapat hubungan yang signifikan jika $p\text{-value} < 0,05$. Pada penelitian ini didapatkan $p\text{-value}$ 0.080 yang berarti tidak terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi (BB/PB) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima.

B. Pembahasan

1. Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Bayi BBLR Usia 0-6 Bulan

Susu formula merupakan produk olahan susu yang dibuat khusus untuk bayi dan memiliki kandungan menyerupai kandungan yang dimiliki ASI. Kandungan zat gizi yang terdapat didalam susu formula tersebut tidak seluruhnya dapat diserap baik oleh tubuh bayi (Suryani, 2021). Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa bayi yang diberikan suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) normal sebanyak 30 bayi (44.8%), bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) kurang sebanyak 30 bayi (44.8%), dan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) risiko lebih sebanyak 7 bayi (10.4%). Hasil uji *chi-square* ditunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bayi yang mengalami status nutrisi (BB/U) yang tidak normal lebih banyak. Secara teori, pemberian susu formula dapat menyebabkan berat badan tidak normal jika diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan bayi, berat badan yang tidak normal ini juga dapat disebabkan oleh kandungan yang terdapat dalam susu formula. Susu formula mengandung dua

macam protein utama, yaitu *whey* dan kasein. Protein yang terdapat pada susu formula lebih banyak terdiri dari kasein dari pada protein *whey*. Protein *whey* merupakan protein halus, lembut, dan mudah dicerna, sedangkan kasein adalah protein yang bentuknya kasar, bergumpal, dan sukar dicerna oleh usus bayi, sehingga terdapat dua resiko yang sering terjadi pada penggunaan susu formula, yaitu susu formula yang yang diberikan dengan pelarutan yang tidak tepat seperti penambahan air yang berlebih akan menyebabkan bayi kekurangan gizi. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat penambahan air yang berlebih, kadar kalori dan juga protein pada susu formula akan berkurang. Kalori dan protein ini merupakan nutrisi yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan bayi, sehingga jika nutrisi ini kurang maka kebutuhan tubuh bayi untuk pertumbuhannya tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan gizi bayi kurang atau bahkan dapat menimbulkan malnutrisi, dan sebaliknya jika susu formula yang dibuat terlalu kental maka dapat menimbulkan kegemukan (Sjarif dkk., 2011).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frelestanty & Yunida (2018), dituliskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian susu formula dengan status nutrisi bayi usia 0-6 bulan, didapatkan bayi yang diberikan susu formula dan berstatus gizi (BB/U) baik sebanyak 14 bayi (30.4%), sedangkan bayi yang berstatus gizi (BB/U) buruk atau kurang yaitu sebanyak 7 bayi (15.2%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Noor, dkk (2019) dituliskan bahwa terdapat hubungan antara pemberian susu formula dengan status gizi berat badan bayi usia 3-5 bulan, sebanyak 54 bayi yang diberikan susu formula memiliki gizi berlebih. Status gizi berat badan berlebih ini dipengaruhi oleh kadar

protein, frekuensi pemberian susu, dan ukuran botol. Pemberian susu dengan kadar tinggi protein pada susu formula memiliki resiko terjadi status gizi berat badan lebih 4 kali dibandingkan kadar normal protein, kadar protein yang tinggi pada susu formula menstimulasi insulin dan IGF-1 yang berdampak pada berat badan bayi. Frekuensi pemberian susu formula > 12 kali dalam sehari meningkatkan kejadian status gizi berat badan berlebih, dan faktor lainnya adalah ukuran botol. Pemberian susu formula dengan ukuran botol susu >180 ml berkorelasi 0.21 kali terjadinya peningkatan berat badan (Retnowati dkk., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya juga mendukung hasil penelitian ini.

Susu formula memiliki jumlah kalori yang lebih besar dibanding ASI, sehingga bayi yang diberikan susu formula yang melebihi kebutuhannya akan beresiko obesitas (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010). Sebaliknya pemberian susu formula dapat menyebabkan berat badan kurang (kurus) pada bayi, hal ini dikarenakan konsumsi gizi yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam waktu tertentu. Kekurangan gizi secara umum menyebabkan gangguan pada proses pertumbuhan, produksi tenaga, pertahanan tubuh, perilaku, struktur dan fungsi otak, maka dari itu semakin bertambah usia bayi maka makin bertambah pula kebutuhannya (Frelestanty & Haryanti, 2018), salah satu penyebab kekurangan berat badan pada bayi yang diberikan susu formula adalah pemberian susu formula terlalu encer, hal ini dapat menyebabkan kadar kalori dan juga protein dalam susu formula berkurang sehingga nutrisi bayi tidak terpenuhi dan menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Selain itu, susu formula mempunyai efek samping

antara lain; kurang praktis karena harus dipersiapkan terlebih dahulu, tidak dapat bertahan lama, mahal dan tidak selalu tersedia, cara penyajian harus tepat jika tidak akan dapat menyebabkan alergi atau gangguan pencernaan yang akan berpengaruh pada pertumbuhan bayi, kontaminasi mikroorganisme, bayi bisa diare dan sering muntah, menyebabkan bayi terkena infeksi. Sehingga memungkinkan cukup besar bayi yang mengkonsumsi susu formula akan mengalami status gizi berat badan kurang (kurus) ataupun berat badan berlebih (gemuk) (Sjarif, dkk., 2011; Yuliana & Melyani, 2019). Namun terdapat pula kondisi bayi memerlukan susu formula seperti pada bayi yang mengalami galaktosemia, kondisi ini menyebabkan bayi tidak dapat mencerna galaktosa dengan baik, oleh karena itu bayi membutuhkan susu formula bebas galaktosa. Selain itu, kondisi bayi feniletonuria, bayi dengan berat badan lahir yang amat sangat rendah, bayi berisiko hipoglikemia juga merupakan kondisi yang memerlukan susu formula, namun dalam penggunaannya harus memperhatikan aturan dan kebutuhan bayi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita Rahel, dkk (2020) dituliskan bahwa anak yang diberikan kombinasi susu formula menunjukkan bahwa semua anak memiliki pertumbuhan dan status nutrisi yang normal. Hal ini disebabkan karena asupan nutrisi yang didapatkan bayi tercukupi dan pemberian susu formula sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi (Frelestanty & Haryanti, 2018).

2. Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Panjang Badan Berdasarkan Usia (PB/U) Bayi BBLR Usia 0-6 Bulan

Berdasarkan data penelitian ditunjukkan bahwa total sampel bayi BBLR sebanyak 160 bayi. Bayi yang mendapatkan suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) pendek sebanyak 44 bayi (65.7%), bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) normal sebanyak 22 bayi (32.8%), bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) sangat pendek sebanyak 1 bayi (1.5%). Hasil uji *chi-square* menunjukkan adanya hubungan antara pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (PB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bayi yang diberikan suplementasi susu formula lebih banyak mengalami status nutrisi (PB/U) pendek dari pada bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) normal. Hal ini dapat disebabkan oleh karena nutrisi yang diberikan kepada bayi tidak sesuai dengan kebutuhannya, hal ini karena kandungan kalsium dalam susu formula yang diberikan kepada bayi tidak dapat memenuhi kebutuhan kalsium bayi, sehingga bayi tidak cukup menyerap semua nutrisi untuk menyokong pertumbuhan panjang badannya. Panjang bayi yang pendek tidak hanya disebabkan oleh pemberian nutrisi, tetapi juga dapat disebabkan oleh genetik dan panjang badan yang pendek saat dilahirkan (Novianti, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Apriyani, dkk (2022), ditunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu formula dengan status gizi (PB/U) bayi 0-6 bulan, dengan nilai *p-value* 0.050 ($p > 0.05$) yakni pada bayi yang diberikan suplementasi susu formula mempunyai

status gizi (PB/U) yang tidak normal (pendek) (Sitohang, dkk., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Anita, dkk (2020), dituliskan bahwa bayi yang diberikan susu formula mengalami pertumbuhan yang kurang (pendek) lebih banyak, sebanyak 66 bayi (91.7%) dibandingkan bayi yang diberikan ASI eksklusif, sedangkan bayi yang memiliki pertumbuhan normal sebanyak 11 bayi (15.3%). Hal ini disebabkan oleh kadar kalsium yang terdapat di dalam susu formula yang diberikan kepada bayi tidak dapat memenuhi kebutuhan kalsium tubuh bayi, sehingga pembentukan dan pertumbuhan tulang tidak sempurna (Pramulya, dkk., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya juga mendukung hasil penelitian ini.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2020), didapatkan hasil uji statistik *chi-square* diperoleh nilai *p-value*= 0.929 ($p < 0.05$), dituliskan bahwa tidak terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu formula dengan panjang badan menurut umur (PB/U) pada usia 6-24 bulan. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa pemberian susu formula kepada bayi mempunyai resiko lebih besar terhadap kejadian status gizi pendek (Hamid, dkk., 2020).

Status nutrisi panjang badan bayi yang tidak normal pada penelitian ini tidak hanya disebabkan oleh pemberian nutrisinya, tetapi juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni genetik dan riwayat panjang lahir rendah. Penelitian yang dilakukan Aring, dkk (2018) dituliskan bahwa genetik dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilahirkan, orang tua yang pendek memungkinkan untuk menurunkan sifat pendek tersebut kepada anak yang

dilahirkannya. Penelitian Windasari, dkk (2020), dituliskan bahwa anak dengan BBLR menunjukkan kurangnya gizi yang diasuh ibu selama masa kehamilan dan gaya hidup sehingga pertumbuhan janin tidak optimal. Bayi dengan riwayat BBLR akan mempengaruhi pertumbuhan anak selanjutnya termasuk tinggi badan anak, sehingga bayi dengan BBLR berpeluang lebih tinggi untuk tumbuh pendek dibandingkan bayi BBLN (berat badan lahir normal) (Windasari, dkk., 2020). Kekurangan nutrisi yang berlangsung lama dapat berpengaruh pada pertumbuhan dimana terjadi hambatan dalam pencapaian tinggi badan yang sesuai, hal ini biasa terjadi pada masyarakat yang berpendapatan kurang (Aring, dkk., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Devriany, dkk (2018) terkait pemberian nutrisi pada bayi, dituliskan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara panjang badan kelompok neonatus yang diberikan ASI eksklusif dengan kelompok neonatus yang diberikan suplementasi susu formula. Rata-rata panjang badan kelompok bayi neonatus yang diberikan ASI eksklusif lebih besar, yaitu 10.87 cm dibandingkan dengan kelompok bayi neonatus yang diberikan suplementasi susu formula, yaitu 8.53 cm (Devriany, dkk., 2018). Terdapat kecenderungan bahwa pemberian ASI non eksklusif (suplementasi susu formula) kepada bayi mempunyai resiko lebih besar terhadap kejadian status gizi tidak normal (Ginanti, dkk., 2015). Namun terdapat beberapa kondisi bayi membutuhkan susu formula, misalkan pada bayi yang mengalami galaktosemia, fenilketonuria, hiperbilirubinemia, dan bayi yang lahir dengan berat badan yang amat sangat rendah, namun dalam pemakaiannya harus memperhatikan kebutuhan bayi seperti tepat frekuensi, takaran, dan sanitasi penyajiannya.

3. Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Berat Badan Berdasarkan Panjang Badan (BB/PB) Bayi BBLR Usia 0-6 Bulan

Status gizi balita dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang mempengaruhi status gizi balita adalah penyakit infeksi dan asupan makan balita. Sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi balita adalah salah satunya adalah konsumsi susu formula. Susu formula adalah salah satu makanan pendamping ASI. Berdasarkan data penelitian ditunjukkan bahwa total sampel bayi BBLR sebanyak 160 bayi. Bayi yang mendapatkan suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) normal sebanyak 45 bayi (67,2%), bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi kurang sebanyak 9 bayi (13.4%), bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) obesitas sebanyak 5 bayi (7.5%), bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) beresiko gizi lebih sebanyak 4 bayi (6.0%), dan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi lebih sebanyak 4 bayi (6.0%). Hasil uji *chi-square* menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/PB) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan. Dari hasil penelitian tersebut menandakan bahwa bayi yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan susu formula memiliki peluang yang sama untuk menderita gizi kurang ataupun gizi berlebih.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2020), disebutkan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi (BB/PB). Penelitian lain yang dilakukan oleh Latta, dkk (2017), disebutkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu

formula dengan status gizi bayi menurut indeks BB/PB, dengan nilai uji *chi-square* diperoleh nilai $\rho = 0,716$. Secara teori, pemberian susu formula dengan status nutrisi harusnya memiliki hubungan, namun pada penelitian ini tidak melihat prematur atau tidaknya bayi yang diteliti sehingga kekuatan penelitiannya kurang.

Proses pembuatan susu formula, kandungan karbohidrat, protein dan mineral dari susu sapi telah diubah kemudian ditambah vitamin serta mineral sehingga mengikuti komposisi yang dibutuhkan sesuai untuk bayi berdasarkan usianya. Susu formula yang dibuat dari susu sapi telah diproses dan diubah kandungan komposisinya sebaik mungkin agar kandungannya sama dengan ASI tetapi tidak 100% sama (Sjarif dkk., 2011). Status nutrisi (BB/PB) gizi baik pada penelitian ini disebabkan oleh asupan nutrisi yang didapatkan bayi tercukupi dan pemberian susu formula sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riance, dkk (2017), dikatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara riwayat pemberian ASI tidak eksklusif (Suplementasi susu formula) dengan indeks BB/TB bayi 6-11 bulan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kendala dikarenakan yaitu peneliti kekurangan nomor telepon responden sehingga sulit dihubungi. Peneliti tidak melihat prematur atau tidaknya bayi yang diteliti dan hasil penelitian bergantung pada kejujuran dari responden, sebab menggunakan instrumen penelitian kuesioner. Beberapa responden penelitian sudah berpindah domisili sehingga sulit untuk dikunjungi sehingga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, selain itu waktu penelitian juga dibatasi oleh jadwal akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/U) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022, dengan nilai *p-value* sebesar 0.001.
2. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (PB/U) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022, dengan nilai *p-value* sebesar 0.001.
3. Tidak terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/PB) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022, dengan nilai *p-value* sebesar 0.080.
4. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu formula di Puskesmas Kota Makassar sebesar 41.9%.
5. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan ASI di Puskesmas Kota Makassar sebesar 58.1%.
6. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu formula di Puskesmas Kota Makassar memiliki status nutrisi (BB/U) yang kurang sebanyak 30 bayi (44.8%), risiko berat badan lebih sebanyak 7 bayi (10.4%), sedangkan BB/U normal sebanyak 30 bayi (44.8%).

7. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu formula di Puskesmas Kota Makassar memiliki status nutrisi (PB/U) yang tidak normal lebih banyak yaitu pendek sebanyak 44 bayi (65.7%), dan bayi yang sangat pendek sebanyak 1 bayi (1.5%), sedangkan bayi yang memiliki PB/U normal sebanyak 22 bayi (32.8%).
8. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu formula di Puskesmas Kota Makassar memiliki status nutrisi (BB/PB) yang normal yaitu 45 bayi (67.2%), gizi kurang sebanyak 9 bayi (13,4%), obesitas sebanyak 5 bayi (7.5%), gizi berisiko lebih sebanyak 4 bayi (6.0%), dan gizi lebih sebanyak 4 bayi (6.0%).

B. Saran

1. Bagi Ibu

Kepada ibu terutama yang memiliki bayi BBLR disarankan agar meningkatkan program ASI eksklusif dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi hingga bayi berusia 6 bulan.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Memerlukan peran dari tenaga kesehatan puskesmas untuk meningkatkan penyuluhan terkait pentingnya pemberian ASI, kondisi-kondisi yang memperbolehkan pemberian susu formula pada bayi, serta dalam pemberian susu formula harus memperhatikan kebutuhan bayi, takaran susu formula dan kebersihan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan pertumbuhan bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yaitu, sebagai berikut.

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengukuran lingkaran kepala pada BBLR usia 0-6 bulan.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melihat prematuritas sampel.
- c. Dapat dilakukan penelitian lanjutan pada sampel yang sama untuk melihat pertumbuhan bayi saat balita.



KEPUSTAKAAN

- Afifah, I. (2020). Hubungan Usia Ibu dan Paritas dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RS Muhammadiyah Surabaya. Skripsi. *Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 68(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Agusthia, M., M. Noer, R., & Susilawati, I. (2020). Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Peningkatan Berat Badan BBLR pada Ruang Perinatologi RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Tahun 2019. *Jurnal Penelitian Kebidanan*, 1(1). <https://doi.org/10.52999/jpkebidanan.v1i1.6>
- Agustina, A. N., Rustina, Y. R., & Triwaluyanti, F. T. (2018). Upaya Meningkatkan Berat Badan BBLR Melalui Intervensi Comfort Food for The Soul Kolcaba (Perawatan Metode Kanguru). *JIKO (Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi)*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.46749/jiko.v2i2.11>
- Agustina, F. R., & Utari, D. M. (2020). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) di Asia dan Afrika. *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2 (2), 56. <https://doi.org/10.35473/proheallth.v2i2.562>
- Amalia, A. E. R. (2022). Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021. 3(April), 49–58.
- Amalia, R., Nurdin, A., Sari, J. I., & Sakinah, A. I. (2020). Hubungan Lengan Atas Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar. *Jurnal Kedokteran*, 06(01), 57–67.
- Aminah, F. (2019). Kejadian Asfiksia Neonatorum pada Bayi Baru Lahir. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, 3(1), 183–192.
- Aprilia, W. (2020). Perkembangan pada Masa Pranatal dan Kelahiran. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4197, 17.
- Aring, E. S., Kapantow, N. H., & Punuh, M. I. (2018). Hubungan Antara Tinggi Badan Orang Tua Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Kesmas*, 7(4), 1–8.

- Arvin, B. K. (2015). Nelson Ilmu Kesehatan Anak. In S. Wahab (Ed.), *Penerbit Buku Kedokteran :EGC* (15th ed.). EGC.
- Astuti, A. (2019). Gambaran Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Wates Kulon Progo Yogyakarta. <http://digilib.unisayogya.ac.id/4152/>
- Astuti, R. H., Astuti, A. P., & Maharani, E. T. W. (2020). Analisis Kandungan Laktosa dan Protein pada ASI dan Susu Formula di Kota Semarang. *Seminar Nasional Edusainstek*, 416.
- Azzahra, D., & Kusumaningsih, T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ibu dalam Pemberian Susu Formula pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Cangkrep Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Dinda. *15*(2), 1–23.
- Bakri, S. F. M., Nasution, Z., Safitri, E. M., & Wulan, M. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Desa Daulat Kecamatan Langsa Kota Tahun 2021. *Miracle Journal*, *2*(1), 178–192. <https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/mj/article/view/253>
- Damaris, Y. (2018). Hubungan Pemberian Susu Formula dengan Berat Badan Bayi 1-6 Bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. *Poltekkes Kemenkes RI Medan*, 1–76.
- Devriany, A., Wardani, Z., & Yuniyar, Y. (2018). Perbedaan Status Pemberian ASI Eksklusif terhadap Perubahan Panjang Badan Bayi Neonatus. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, *14*(1), 44.
- Dinkes Kota Makassar. 2020. BBLR di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2019.
- Dinkes Sulawesi Selatan. 2020. BBLR di Sulawesi Selatan Tahun 2019.
- Dinkes Kota Makassar. 2022. BBLR di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2022.
- Ebtanasari, P. (2018). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1-5 Tahun di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
- Enamberea, R. R., Kurniasari, M. D., Dary, D., & Putra, K. P. (2020). Pemberian Asi Eksklusif, Susu Formula dan Kombinasi Keduanya Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 6-11 Bulan di Puskesmas Cebongan Salatiga. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, *11*(1), 13.
- Esty Pamungkas, C., Amini, A., & Rahmawati, C. (2020). Sentuhan Kasih Ibu, Upaya Stimulasi Tumbuh Kembang Anak dengan Pijat Bayi pada Anak Usia 0-3 Tahun di Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak Kabupaten

- Lombok Timur. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 356. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3223>
- Fitriati, D., & Fahrudin, M. (2019). Perangkingan Jenis Susu Untuk Balita Non-Asi dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal Teknologi Terpadu*, 5(1). <https://doi.org/10.54914/jtt.v5i1.188>
- Frelestanty, E., & Haryanti, Y. (2018). Hubungan Pemberian ASI Dan Susu Formula Dengan Status Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan. *Jurnal Medika Usada*, 1(2), 13–20.
- Ginanti, N. A., P, D. R., & Rahfiludin, M. Z. (2015). Hubungan Praktik Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Dengan Status Gizi Bayi (Usia 0-6 Bulan) Di Wilayah Kerja Puskesmas Gayamsari Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 3(3), 213–220.
- Hartiningrum, I., & Fitriyah, N. (2019). Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 7(2), 97. <https://doi.org/10.20473/jbk.v7i2.2018.97-104>
- Helena, D. F., Sarinengsih, Y., Ts, N., & Suhartini, S. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Soreang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel*, 14(2), 105.
- Ipsan, N. C., & Dewanto, N. E. F. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Susu Formula pada Bayi Usia 6 Bulan di Posyandu Bougenville Jakarta Barat Tahun 2020. *Ebers Papyrus Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 27(1), 62–74. https://journal.untar.ac.id/index.php/ebers_papyrus/article/view/12156
- Irwan, T. (2021). Pengaruh ASI Eksklusif Terhadap Prestasi Akademik Siswa Sdn 1 Kabila, Kab. Bone Bolango, Tahun Ajaran 2019/2020. *Skripsi*. Fakultas Kedokteran. Universitas Hasanuddin Makassar, November.
- Ismayanah, I., Nurfaizah, N., & Syatirah, S. (2020). Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir pada Bayi Ny “I” dengan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 2019. *Jurnal Midwifery*, 2(2), 60–70. <https://doi.org/10.24252/jm.v2i2a2>
- Kemenkes RI. (2012). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011*. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

- Kemenkes RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak*. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kosim, M. S., Yunanto, A., Dewi, R., Sarosa, gatot irawan, & Usman, A. (2009). *Buku Ajar Neonatologi* (pertama). IDAI.
- Lukman, S., Wahyuningsih, S., Rahmawati, R., & M, S. (2020). Perbedaan Pemberian ASI Eksklusif dengan PASI terhadap Tumbuh Kembang pada Anak Usia 0-12 Bulan. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 1(1), 19–27
- Maemunisah, Triana, N. Y., & Cahyaningrum, E. D. (2021). Asuhan Keperawatan Ketidakefektifan Pola Menyusu Bayi pada Bayi Ny.U dengan BBLR Prematur di Ruang Perinatal RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM)*.
- Mahardika, M. (2020). Literature Review: Hubungan Ketuban Pecah Dini (Kpd) Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Halaman Persetujuan Literature Review: Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*.
- Menkes RI. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
- Natalina, R. (2019). Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kenaikan BBLR Di RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya. *Mahakam Midwifery Journal (MMJ)*, 4(2), 51. <https://doi.org/10.35963/midwifery.v4i2.129>
- Nations, United, & Fund Unicef. 2013. *Improving Child Nutrition The Achievable Imperative For Global Progress*.
- Noor, M. S., Husaini, H., Puteri, A. O., & Hidayat, D. T. (2020). Hubungan Faktor Ibu, Janin, dan Plasenta dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). *Jurnal Berkala Kesehatan*, 6(2), 75. <https://doi.org/10.20527/jbk.v6i2.9403>

- Perdana, H. M., Darmawansyah, D., & Faradilla, A. (2020). Gambaran Faktor Risiko Malnutrisi pada Anak Balita di Wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Tahun 2019. *UMI Medical Journal*, 5(1), 50–56
- Presiden RI. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Pohan, R. (2019). Perspektif Islam Terhadap Pemberian Susu Formula Kepada Anak. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 150. <https://doi.org/10.24014/jiik.v9i2.8393>
- Puspaningsih, R; Fitriyanti, RE; Fitriyati, Y. (2022). 726-2558-1-Pb. *Pontianak Nutrition Journal*, 4(1), 79–85.
- Ramadhan, D. C., & Rahmawati, R. D. (2019). Manfaat Air Susu Ibu (ASI) pada Anak dalam Persepektif Islam. *Eduscope*, 05 (01), 76. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/eduscope/article/view/376/298>
- Raudhotun Nisak. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Susu Formula dengan Kejadian Obesitas pada Balita di Plagroup Modern Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. *Cakra Medika*, 5(1), 5–11.
- Ririn, H. (2020). *Metodologi Penelitian* (Issue April). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=339473>
- Riskesdas. (2018). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* (Vol. 110, Issue 9). <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/lpb/article/view/3658>
- S, I. P., Wijayanti, F., & Mona Sapparwati. (2021). Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-60 Bulan. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 7(1), 8–13.
- Setyaningrum, E. (2017). *Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak Usia 0-12 Tahun* (pertama). Indomedia Pustaka.
- Sjarif, D. R., Lestari, E. D., Mexitalia, M., & Nasar, S. S. (2011). *Buku Ajar Nutrisi Pediatrik Dan Penyakit Metabolik* (jilid 1). Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Sitohang, A. M., Sarjana, P., Gizi, T., Kaltim, P., Anshory, J., Farmasi, J., & Mulawarman, U. (2022). Hubungan Pola Pemberian Asi Dan Pengetahuan Ibu Dengan Status Gizi Bayi 0-6 Bulan Tahun 2022. 4(2), 33–41.
- Siyoto, S., & Sodik, M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. *Literasi Media Publishing*, June 2015, 78.

- Soetjiningsih & Ign. N. Gede Ranuh. (2015). *Tumbuh Kembang Anak*. Edisi 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Subekti, N. B. (2007). *Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir* (P. E. Karyun & E. Meiliya (eds.)). Jakarta : EGC.
- Sulistijono, E., Alasiry, E., Irawan, G., Utomo, M., Iskandar, R., Etika, R., Wandita, S., Hendrato, T., Wibowo, T., & Hendarto, A. (2016). Konsensus Asuhan Nutrisi pada Bayi Prematur. *Asuhan Nutrisi Pada Bayi Prematur Konsensus Ikatan Dokter Anak Indonesia*, 15–88. https://doi.org/10.1007/978-3-322-95497-8_1
- Suryani, Indah. 2021. Hubungan Pemberian Susu Formula Terhadap Kenaikan Berat Badan Bayi Usia 1-6 Bulan di Desa Soak Batok Kabupaten Ogan Ilir. *Skripsi*. Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- Thomas, J. P., Raine, T., Reddy, S., & Belteki, G. (2017). Probiotics for The Prevention Of Necrotising Enterocolitis In Very Low-Birth-Weight Infants: A Meta-Analysis And Systematic Review. *Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992)*, 106(11), 1729–1741. <https://doi.org/10.1111/apa.13902>
- Yertiasih, M. A. (2020). Hubungan Pola Asuh Bayi Terhadap Pertumbuhan Balita Usia 13-24 Bulan. *Poltekkes Kemenkes Kendari*.
- Yulendasari, R., & Firdaus, M. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Susu Formula pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu. *Jurnal Sains Kesehatan*, 24(2), 69–79. <https://doi.org/10.37638/jsk.24.2.69-79>
- Yuliana, & Melyani. (2019). Perbedaan Status Gizi Antara Bayi Usia 0-6 Bulan Dengan Pemberian Asi Secara Eksklusif Dan Tidak Secara Eksklusif Di Puskesmas Kampung Dalam Tahun 2018. *Jurnal Kebidanan*, 9(1).
- WHO. (2018). *Low Birth Weight*.
- WHO. (2017). *Low Birth Weight : country, regional and global estimates*
- Windasari, D. P., Syam, I., & Kamal, L. S. (2020). Faktor hubungan dengan kejadian stunting di Puskesmas Tamalate Kota Makassar. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 5(1), 27.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner.

1. Kuesioner ini terdiri dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah dilengkapi dengan tempat untuk mengisi jawaban maupun alternatif jawaban yang telah disediakan.
2. Pengisian jawaban dilakukan pada tempat yang telah disediakan.
3. Berilah tanda (V) pada jawaban yang sesuai!

Nama ibu :

Umur ibu :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Nama anak :

Jenis kelamin :

Umur anak :

Berat Badan Lahir (BBL) :

Panjang Badan Lahir (PBL) :

BB saat ini/saat usia 6 bulan :

- 1) Apakah ibu hanya memberikan susu formula tanpa memberikan makanan/minuman lain pada bayi 0-6 bulan?

Ya

Tidak

- 2) Apakah ibu hanya memberikan susu formula selain ASI pada bayi 0-6 bulan?

Ya

Tidak

3) Apakah bayi pernah mengalami sakit lama pada 0-6 bulan?

Ya

Tidak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran Informed Consent.

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin(L/P) :

Umur/Tgl Lahir :

Alamat :

Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari:

Nama :

Jenis Kelamin(L/P) :

Umur/Tgl Lahir :

Alamat :

Telp :

Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan pengukuran berat badan dan panjang badan

Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan dan kemungkinana pasca tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.


Makassar,2022

Pelaksana,
Ttd

Yang membuat pernyataan,
Ttd

(.....)

(.....)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran Uji Statistik

Analisis Univariat

Jenis Kelamin Bayi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	76	47.5	47.5	47.5
	Perempuan	84	52.5	52.5	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Usia Bayi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0-12 bulan	55	34.4	34.4	34.4
	13-24 bulan	66	41.3	41.3	75.6
	25-36 bulan	39	24.4	24.4	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Usia Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-25 tahun	41	25.6	25.6	25.6
	26-35 tahun	106	66.3	66.3	91.9
	36-45 tahun	13	8.1	8.1	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Pekerjaan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	127	79.4	79.4	79.4
	Swasta	13	8.1	8.1	87.5
	PNS	19	11.9	11.9	99.4
	Pengusaha	1	.6	.6	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	31	19.4	19.4	19.4
	SMP	41	25.6	25.6	45.0
	SMA	63	39.4	39.4	84.4
	D3	1	.6	.6	85.0
	S1	24	15.0	15.0	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Suplementasi Susu Formula

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	67	41.9	41.9	41.9
	Tidak	93	58.1	58.1	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Analisis Bivariat

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Suplementasi susu formula * Berat badan menurut usia	160	100,0%	0	0,0%	160	100,0%

Suplementasi susu formula * Berat badan menurut usia Crosstabulation

		Berat badan menurut usia			Total	
		kurang	normal	risiko lebih		
Suplementasi susu formula	Ya	Count	30	30	7	67
		% within Suplementasi susu formula	44,8%	44,8%	10,4%	100,0%

	% within Berat badan menurut usia	65,2%	28,0%	100,0%	41,9%
	% of Total	18,8%	18,8%	4,4%	41,9%
Tidak	Count	16	77	0	93
	% within Suplementasi susu formula	17,2%	82,8%	0,0%	100,0%
	% within Berat badan menurut usia	34,8%	72,0%	0,0%	58,1%
	% of Total	10,0%	48,1%	0,0%	58,1%
Total	Count	46	107	7	160
	% within Suplementasi susu formula	28,7%	66,9%	4,4%	100,0%
	% within Berat badan menurut usia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	28,7%	66,9%	4,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	28,431 ^a	2	<,001
Likelihood Ratio	31,155	2	<,001
Linear-by-Linear Association	4,175	1	,041
N of Valid Cases	160		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,93.

Case Processing Summary

Valid		Cases Missing		Total	
N	Percent	N	Percent	N	Percent

Suplementasi susu formula * Panjang badan menurut usia	160	100,0%	0	0,0%	160	100,0%
--	-----	--------	---	------	-----	--------

**Suplementasi susu formula * Panjang badan menurut usia
Crosstabulation**

		Panjang badan menurut usia			Total	
		sangat pendek	pendek	normal		
Suplementasi susu formula	Ya	Count	1	44	22	67
		% within Suplementasi susu formula	1,5%	65,7%	32,8%	100,0%
		% within Panjang badan menurut usia	50,0%	56,4%	27,5%	41,9%
		% of Total	0,6%	27,5%	13,8%	41,9%
	Tidak	Count	1	34	58	93
		% within Suplementasi susu formula	1,1%	36,6%	62,4%	100,0%
		% within Panjang badan menurut usia	50,0%	43,6%	72,5%	58,1%
		% of Total	0,6%	21,3%	36,3%	58,1%
Total	Count	2	78	80	160	
	% within Suplementasi susu formula	1,3%	48,8%	50,0%	100,0%	
	% within Panjang badan menurut usia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	1,3%	48,8%	50,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,617 ^a	2	,001
Likelihood Ratio	13,838	2	<,001
Linear-by-Linear Association	12,628	1	<,001
N of Valid Cases	160		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,84.

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Suplementasi susu formula * Berat badan menurut panjang badan	160	100,0%	0	0,0%	160	100,0%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Suplementasi susu formula * Berat badan menurut panjang badan Crosstabulation

Suplementasi susu formula	Ya	Count	Berat badan menurut panjang badan gizi					
			kurang	gizi baik	berisiko gizi lebih	gizi lebih	obesitas	
			9	45	4	4	5	67
		% within Suplementasi susu formula	13,4%	67,2%	6,0%	6,0%	7,5%	100,0%
		% within Berat badan menurut panjang badan	50,0%	36,6%	57,1%	66,7%	83,3%	41,9%

	% of Total	5,6%	28,1%	2,5%	2,5%	3,1%	41,9%
Tidak	Count	9	78	3	2	1	93
	% within Suplementasi susu formula	9,7%	83,9%	3,2%	2,2%	1,1%	100,0%
	% within Berat badan menurut panjang badan	50,0%	63,4%	42,9%	33,3%	16,7%	58,1%
	% of Total	5,6%	48,8%	1,9%	1,3%	0,6%	58,1%
Total	Count	18	123	7	6	6	160
	% within Suplementasi susu formula	11,3%	76,9%	4,4%	3,8%	3,8%	100,0%
	% within Berat badan menurut panjang badan	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	11,3%	76,9%	4,4%	3,8%	3,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,325 ^a	4	,080
Likelihood Ratio	8,453	4	,076
Linear-by-Linear Association	4,088	1	,043
N of Valid Cases	160		

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,51.

Lampiran Dokumentasi





M A K A S S A R



ALAUDDIN
M A K A S S A R



13.8.2024

Azzahra

Grak BBU mengikat garis pertumbuhan atau KEM BB sama dengan KEM

Grak BBU mendaki atau menurun memotong garis pertumbuhan dibawahnya atau dibawah BB sama dengan KEM

Umur (th)	Bulan pertumbuhan	BB (kg)	KEM (gr)	N/T	Asi Eksklusif
1	Jan 21	4.5	800		
2	Feb		800		
3	Mar		800		
4	Apr		800		
5	Mei		800		
6	Juni		800		
7	Juli		800		
8	Agst		800		
9	Sept		800		
10	Oktober		800		
11	November		800		
12	Desember		800		
13	Jan 21		800		
14	Feb		800		
15	Mar		800		
16	Apr		800		
17	Mei		800		
18	Juni		800		
19	Juli		800		
20	Agst		800		
21	Sept		800		

Lila
16,5

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

