

UJI IRITASI AKUT DERMAL LARUTAN AMBROXOL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi Jurusan
Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

VERA OLFIANA

NIM : 70100118035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Olfiana
NIM : 70100118035
Tempat/ Tgl Lahir : Polmas, 06 September 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Toddopuli 1, No. 17A
Judul : Uji Iritasi Akut Dermal Larutan Ambroxol

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dengan orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 01 Januari 2023



Vera Olfiana
NIM. 70100118035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Uji Iritasi Akut Dermal Larutan Ambroxol"** yang disusun oleh **Vera Olfiana NIM: 70100118035**, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, **21 Februari 2023** yang bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 21 Februari 2023
1 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc	(.....)
Penguji I	: apt. H. Muh. Rusdi., S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G., M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada nabiullah Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul “Uji Iritasi Akut Dermal Larutan Ambroxol” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan dan kesulitan, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada ibu saya tercinta, yaitu ibu Fachita yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, bantuan, serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa
8. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
11. Nursyamsi Dhuha., S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Dr. Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc., selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Apt. H. Muh. Rusdi., S.Si., M.Si., selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

15. Dr. Wahyuddin G. M.Ag., selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
17. Teman- teman SUSPENSI (Farmasi Angkatan 18) yang tak henti-hentinya memberi semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul dalam tahapan penyusunan skripsi

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini, Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Samata, 1 Januari 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Uraian Ambroxol	11
B. Uraian Biofilm	13
C. Infeksi.....	20
D. Iritasi Kulit.....	22
F. Uraian Toksisitas.....	27
G. Rancangan Uji Iritasi Akut Dermal	30
H. Tinjauan Islam.....	37
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	42

D. Alat dan Bahan.....	42
E. Prosedur Uji Iritasi Akut Dermal.....	43
BAB IV.....	47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	50
BAB V.....	53
PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57
RIWAYAT HIDUP.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar spesies bakteri pembentuk Biofilm.....	15
Tabel 2. Kategori respon iritasi.....	36
Tabel 3. Penilaian Reaksi Pada Kulit.....	45
Tabel 4. Hasil Uji Iritasi Akut Dermal.....	47
Tabel 5. Hasil Skoring Uji Iritasi Akut Dermal.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pembentukan Biofilm	19
Gambar 2. Kelinci	24
Gambar 3. Iritasi Primer.....	34
Gambar 4. Hasil uji iritasi kulit kelinci. Gambar diambil dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 4x	49
Gambar 5. Hasil uji iritasi kulit kelinci. Gambar diambil dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 40x	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pembuatan Larutan Ambroxol.....	57
Lampiran 2. Prosedur Uji Iritasi.....	58
Lampiran 3. Uji Histopatologi	59
Lampiran 4. Perhitungan Indeks Iritasi Primer	60
Lampiran 5. Lampiran Surat Izin Penelitian.....	64
Lampiran 6. Lampiran Kode Etik Penelitian.....	65
Lampiran 7. Hasil Uji Histopatologi Kulit Kelinci.....	66
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....	68



ABSTRAK

Nama : Vera Olfiana
NIM : 70100118035
Judul : Uji Toksisitas Akut Dermal Larutan Ambroxol

Ambroxol terbukti dapat mengatasi infeksi akibat adanya biofilm pada tubuh dengan mengganggu pembentukan biofilm yang melekat dan mengurangi produksi biofilm, sehingga sangat berpotensi diberikan pada sediaan topikal untuk pengobatan infeksi. Adapun salah satu syarat topikal yang baik adalah tidak mengiritasi kulit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur daya efek iritasi pada kulit punggung kelinci yang dihasilkan dari larutan ambroxol untuk menilai keamanan dari larutan ambroxol. Metode yang digunakan mengacu pada BPOM tahun 2020, yaitu dengan menotolkan 0,5ml larutan ambroxol pada kulit punggung kelinci, kemudian ditutup dengan kassa dan plester non iritan, setelah 4 jam dilakukan pembersihan residu lalu diamati pada jam ke 1, jam ke 24, jam ke 48 dan jam 72 untuk melihat ada atau tidaknya efek eritema dan edema yang timbul akibat pengaruh percobaan tersebut, dan diakhir percobaan dilakukan uji histopatologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan ambroxol secara makroskopis tidak terlihat adanya eritema dan edema sehingga didapatkan skor indeks iritasi primer pada seluruh larutan uji skornya 0, sedangkan pada uji iritasi secara mikroskopis didapatkan skor eritema adalah 4 dan edema adalah 3. Kesimpulan dari penelitian ini larutan ambroxol berdasarkan uji iritasi akut dermal tidak mengiritasi kulit.

Kata kunci : Biofilm, ambroxol, iritasi akut dermal.

ABSTRACT

Name : Vera Olfiana
NIM : 70100118035
Title : Dermal Acute Toxicity Test of Ambroxol Solution

Ambroxol is proven to be able to overcome infections due to the presence of biofilms on the body by interfering with the formation of attached biofilms and reducing the production of biofilms, so it has the potential to be given to topical preparations for the treatment of infections. One of the good topical requirements is not to irritate the skin. The purpose of this study was to measure the irritating effect on the skin of rabbit backs resulting from ambroxol solution to assess the safety of ambroxol solution. The method used refers to BPOM in 2020, namely by highlighting 0.5ml of ambroxol solution on the skin of the rabbit's back, then covered with non-irritant kassa and plaster, after 4 hours of residual cleaning and then observed at the 1st hour, 24th hour, 48th hour and 72nd hour to see whether or not there is an erythema and edema effect arising from the influence of the experiment, and at the end of the experiment, a histopathological test was carried out. The results showed that the macroscopic ambroxol solution did not show erythema and edema so that the primary irritation index score was obtained in all test solutions with a score of 0, while in the microscopic irritation test, the erythema score was 4 and the edema was 3. The conclusion of the study is that ambroxol solution based on acute dermal irritation tests does not irritate the skin.

Keywords: Biofilm, ambroxol, acute dermal irritation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ambroxol adalah metabolit dari bromhexin dan digunakan sebagai mukolitik. Ambroxol hidroklorida biasa diberikan dalam dosis harian 60 mg hingga 120 mg melalui oral, dibagi menjadi 2 dosis. Mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Ambroxol hidroklorida memiliki nama kimia Trans-4-[(2-Amino-3,5- dibromobenzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride. Ambroxol diindikasikan sebagai terapi sekretolitik, aktivitas sekretolitik ini meningkatkan klirens lendir, mempermudah pengeluaran dahak dan batuk. Ambroxol juga bekerja sebagai antiinflamasi dan antioksidan untuk meringankan gejala batuk dan pilek (Rivai & Andalas, 2018). Selain sebagai agen mukolitik, ambroxol juga dilaporkan dapat mengganggu pembentukan biofilm yang melekat dan mengurangi produksi biofilm (H. A. Abbas, 2014). Hal itu telah dibuktikan pada beberapa penelitian. Ambroxol telah terbukti dapat menghambat jamur dengan baik, dan menjadi agen pembentuk antibiofilm dalam pengobatan oral *candidiasis* yang disebabkan oleh *Candida albicans*. Biasanya, timbulnya kandidiasis ditandai dengan munculnya biofilm dari *Candida albicans* yang berhubungan dengan beberapa penyakit termasuk kandidiasis oral pada orang muda dan orang tua. Pada penelitian secara in vitro mengungkapkan bahwa 2 mg/ml ambroxol menunjukkan aktivitas fungisida yang lebih tinggi daripada

3,3 mg/ml. Ambroxol ditemukan efektif dalam menghambat pembentukan biofilm *Candida albicans* dan mengerahkan aktivitas fungisidanya terhadap sel-sel jamur yang diselingi di biofilm yang telah terbentuk sebelumnya (Hussain et al., 2015). Ambroxol juga bisa menjadi anti virus untuk pengobatan infeksi *Serratia Marcences*. *Serratia marcescens* adalah infeksi nosokomia. Pengobatan dengan antibiotik sudah tidak mempan karena sangat resisten terhadap antibiotik dan dapat menyebabkan infeksi oleh faktor virulen seperti protease, prodigiosin dan produksi biofilm yang mempunyai kemampuan untuk membentuk koloni. Untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik, pengaturan ekspresi gen adalah target yang menarik dari terapi baru untuk infeksi mikroba. Pengaturan ekspresi gen sesuai dengan kepadatan populasi dapat mengontrol produksi faktor virulen *Serratia marcescens* dan pembentukan biofilm. Didapatkan bahwa ambroxol dapat menghambat faktor virulen, menghambat biofilm dan menghambat kemampuan *Serratia marcescens* untuk membentuk koloni. Konsentrasi penghambatan ambroxol ditentukan dengan metode pengenceran mikro. Pada konsentrasi 0,9 mg/ml dapat menghambat pembentukan biofilm sebesar 82,16% dan konsentrasi 0,3mg/ml dapat menghambat biofilm sebesar 65,23%. Kesimpulannya, ambroxol dapat menjadi agen anti virulen untuk pengobatan infeksi *Serratia marcescens* (H. A. Abbas & Hegazy, 2017).

Pada penelitian pengaruh ambroxol pada pneumonia yang disebabkan oleh *Pseudomonas aeruginosa* dengan formasi biofilm dalam model tikus intubasi endotrakeal. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ambroxol dapat merusak struktur biofilm pada tabung yang digunakan untuk intubasi dan mengurangi

bakteri. Selanjutnya, penurunan respon sitokin dan perubahan patologis yang lebih ringan pada paru-paru tikus yang diintubasi endotrakeal menunjukkan bahwa ambroxol dapat menurunkan kerusakan yang disebabkan oleh infeksi terkait biofilm di paru-paru (Li et al., 2011). Kemudian pada penelitian sepuluh agen antibiofilm potensial seperti (N-acetylcysteine (NAC), ambroxol, piroxicam, natrium diklofenak, ketoprofen, 4-nitropyridine-N-oxide (4NPO), natrium askorbat, sucralose, xylitol dan sorbitol) menunjukkan aktivitas yang bervariasi terhadap biofilm yang terbentuk sebelumnya. Pada hasil penelitian menunjukkan 4NPO adalah yang paling aktif, Natrium diklofenak, ketoprofen, N-asetilsistein, ambroxol, sodium ascorbate dan piroxicam menunjukkan aktivitas sedang, sedangkan sucralose, xylitol, dan sorbitol menunjukkan aktivitas yang lemah (H. a Abbas et al., 2012).

Ambroxol adalah agen baru untuk pengobatan ulkus kaki diabetik yang disebabkan oleh *Proteus mirabilis* karena diketahui ambroxol dapat mengganggu pembentukan koloni akibat perlekatan bakteri secara terus-menerus dari *Proteus mirabilis* untuk menyerang jaringan kaki diabetik sehingga membentuk biofilm. Ambroxol secara signifikan dapat memblokir aktivitas *Proteus mirabilis* dalam membentuk biofilm pada konsentrasi 0,6, 0,7, 0,8 dan 0,9 mg/ml. Pada konsentrasi 0,9mg/ml, ambroxol secara signifikan menghambat pembentukan biofilm dan menghilangkan biofilm yang telah terbentuk sebelumnya. Sehingga ambroxol sangat berpotensi digunakan untuk pengobatan infeksi kaki diabetik *Proteus mirabilis* (H. A. Abbas, 2014).

Biofilm adalah kumpulan mikroorganisme di mana sel-sel mikroba menempel satu sama lain pada permukaan hidup atau tidak hidup dalam matriks zat polimer ekstraseluler yang diproduksi sendiri. Menurut *National Institutes of Health* (NIH) sekitar 65% dari semua infeksi mikroba, dan 80% dari semua infeksi kronis berhubungan dengan biofilm. Hampir semua (99,9%) mikroorganisme memiliki kemampuan untuk membentuk biofilm pada berbagai permukaan. Ketika mikroorganisme mengikat ke permukaan, mereka menghasilkan zat polimer ekstraseluler (EPS) dan membentuk biofilm.

Biofilm mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia karena biofilm telah diketahui terlibat dalam berbagai macam infeksi mikroba pada tubuh. Pembentukan biofilm juga telah tercatat sebagai strategi pertahanan diri patogen. (Purbowati, 2018). Biofilm berperan dalam terjadinya infeksi, evaluasi mikroskopis spesimen dari luka kronis yang sering menunjukkan adanya biofilm (Jamal et al., 2015). Salah satu akibat dari biofilm terhadap infeksi ialah penyakit Infeksi kaki diabetik. Bakteri *Proteus mirabilis* adalah penyebab umum infeksi bakteri termasuk infeksi luka. Kemampuan berkoloni dari *Proteus mirabilis* dapat menyerang jaringan dari pasien infeksi kaki diabetik. Ketika bakteri tersebut membentuk koloni maka akan terbentuk biofilm. Biofilm juga menimbulkan masalah besar bagi kesehatan karena sifatnya yang resisten terhadap antibiotik. Oleh karena itu diperlukannya agen terapi yang baru untuk mengganggu atau menghambat biofilm untuk mencapai bakteri yang berada jauh didalam biofilm.

Ambroxol sejauh ini belum tersedia pada sediaan topikal, tapi hanya tersedia pada sediaan oral. Namun, pada beberapa penelitian telah terbukti bahwa ambroxol bisa digunakan sebagai antibiofilm dengan menghambat pembentukan biofilm pada patogen, sehingga berpotensi diberikan pada sediaan topikal. Maka dari itu sebagai langkah awal perlunya melakukan uji iritasi akut dermal. Pengujian iritasi akut dermal dilakukan untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit (BPOM RI, 2020).

Melihat begitu banyak dampak dari biofilm yang diberikan kepada manusia salah satunya ialah infeksi. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa ambroxol dapat digunakan sebagai agen antibiofilm. maka untuk skrining awal mengetahui toksisitas suatu bahan terhadap kulit untuk pertama kali, sehingga pada larutan Ambroxol perlu dilakukan Uji Iritasi Akut Dermal terhadap kelinci untuk melihat respon terhadap kulit. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan uji iritasi akut dermal dari larutan ambroxol.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berapa nilai kategori respon iritasi pemberian larutan ambroxol pada kulit kelinci?
2. Bagaimana pengaruh iritasi pemberian larutan ambroxol pada kulit kelinci?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Uji Iritasi Akut Dermal

Uji iritasi akut dermal adalah suatu uji pada hewan uji untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji dengan pemaparan sediaan uji untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit (BPOM RI, 2020).

b. Iritasi

Iritasi adalah respon lokal pada kulit karena adanya suatu reaksi kulit setelah terpapar zat kimia, sehingga menyebabkan inflamasi atau luka. Gejala yang dapat terjadi antara lain panas karena adanya dilatasi pembuluh darah pada daerah yang terkena paparan senyawa asing yang ditandai dengan adanya kemerahan pada daerah tersebut (eritema), dan dapat juga menyebabkan edema yang terjadi karena adanya pembesaran plasma yang membeku pada daerah kulit yang terluka (Nur, 2019).

c. Larutan

Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, misal : terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan, umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampurkan (Depkes RI, 1995).

d. Ambroxol

Ambroksol HCl yaitu obat yang berfungsi untuk mengencerkan dahak yang berfungsi menurunkan viskositas *mucus* melalui pemutusan serat-serat mukopolisakarida sehingga lender mudah dikeluarkan lewat bantuan batuk. (Ulfa et al., 2017). Selain itu, Ambroxol juga dapat mengganggu pembentukan biofilm karena kemampuannya untuk menghambat perlekatan, penginderaan kuorum dan menghambat produksi biofilm (H. A. Abbas, 2014).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi hasil uji iritasi akut dermal larutan ambroxol.

D. Kajian Pustaka

Menurut (H. A. Abbas, 2014) “*Ambroxol blocks swarming and swimming motilities and inhibits biofilm formation by Proteus mirabilis isolated from diabetic foot infection Ambroxol blocks swarming and swimming motilities and inhibits biofilm formation by Proteus mirabilis isolated from diabetic foot infection*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ambroxol dalam menghambat gerakan dalam membentuk biofilm *Proteus mirabilis* yang diisolasi dari ulkus kaki diabetik sebagai agen baru untuk pengobatan infeksi kaki diabetik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ambroxol dapat menghambat perlekatan sel bakteri secara terus menerus pada konsentrasi 0,6, 0,7, 0,8 dan 0,9 mg/ml. Pada konsentrasi 0,9 mg/ml, ambroxol secara signifikan menghambat pembentukan biofilm dan menghilangkan biofilm yang telah terbentuk sebelumnya.

Menurut (Rene et al., 2014) “*Effects of ambroxol on Candida albicans growth and biofilm formation*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara in vitro aktivitas anti jamur serta aktivitas antibiofilm ambroxol terhadap pertumbuhan *C.albicans*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 2mg/ml ambroxol menunjukkan aktivitas fungisida yang lebih tinggi daripada 3,3mg/ml. Ambroxol ditemukan efektif dalam menghambat pembentukan biofilm *C. albicans* dan mengerahkan aktivitas fungisidanya terhadap sel-sel jamur yang diselengi di biofilm yang telah terbentuk sebelumnya. Sehingga ambroxol bisa menjadi alternatif yang menarik untuk mengatasi infeksi *C.albicans*.

Menurut (H. A. Abbas & Hegazy, 2017) “*Targeting The Virulence Factors of Serratia Marcescens by Ambroxol*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemampuan ambroxol untuk menghambat keberadaan biofilm. Kesimpulan menunjukkan bahwa ambroxol dapat menghambat faktor virulen, menghambat biofilm dan menghambat kemampuan *Serratia marcescens* untuk membentuk koloni. Konsentrasi penghambatan ambroxol ditentukan dengan metode pengenceran mikro. Pada konsentrasi 0,9 mg/ml dapat menghambat pembentukan biofilm sebesar 82,16% dan konsentrasi 0,3mg/ml dapat menghambat biofilm sebesar 65,23%, Sehingga ambroxol dapat menjadi agen anti virulen untuk pengobatan infeksi *Serratia marcescens*.

Menurut (H. a Abbas et al., 2012) “*Combating Pseudomonas aeruginosa Biofilms by Potential Biofilm*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki anti planktonik in vitro dan aktivitas antibiofilm dari sepuluh agen antibiofilm potensial

terhadap biofilm *P. aeruginosa* yang sudah mapan. Kesimpulan menunjukkan Sepuluh agen antibiofilm potensial (N-acetylcysteine (NAC), ambroxol, piroxicam, natrium diklofenak, ketoprofen, 4-nitropyridine-N-oxide (4NPO), natrium askorbat, sucralose, xylitol dan sorbitol) menunjukkan aktivitas yang bervariasi terhadap biofilm yang dibentuk oleh dua puluh isolat klinis *P. aeruginosa*. Kesimpulan menunjukkan bahwa 4NPO adalah yang paling aktif; Natrium diklofenak, ketoprofen, N-asetilsistein, ambroxol, sodium ascorbate dan piroxicam menunjukkan aktivitas sedang, sedangkan sucralose, xylitol, dan sorbitol menunjukkan aktivitas yang lemah.

Menurut (Hakim et al., 2018) "*Uji Iritasi Akut Dermal Pada Hewan Uji Kelinci Albino Terhadap Sediaan Body Lotion Ekstrak Kulit Biji Pinang (Areca Catechu L.)*". Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur daya efek iritasi pada kulit punggung kelinci yang dihasilkan dari sediaan *body lotion* ekstrak kulit biji pinang untuk menilai keamanan sediaan *body lotion*. Metode yang digunakan mengacu pada peraturan Ka BPOM RI nomor 7 tahun 2014, yaitu dengan mengoleskan 0,5 gram formula *body lotion* ekstrak kulit biji pinang pada kulit kelinci, kemudian diamati ada atau tidaknya eritema dan edema yang timbul akibat pengaruh percobaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *body lotion* ekstrak kulit biji pinang jika dilihat dari parameter terbentuknya eritema dan edema skor tertinggi yaitu 1 (hampir tidak dapat dibedakan) dan dilihat dari skor indeks iritasi primer pada seluruh formula skornya yaitu 0. Kesimpulannya yaitu pada seluruh formula sediaan *body lotion* ekstrak kulit biji pinang setelah diukur menggunakan skor penilaian reaksi pada kulit terbukti aman tanpa menyebabkan efek iritasi pada kulit.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui berapa nilai kategori respon iritasi pemberian larutan ambroxol pada kulit kelinci.
- b. Untuk mengetahui pengaruh iritasi pemberian larutan ambroxol pada kulit kelinci.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi lebih lanjut mengenai iritasi akut dermal larutan ambroxol pada kelinci dan memperkirakan resiko penggunaan larutan ambroxol pada manusia. Hasil ini juga diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Kesehatan terutama dalam pengembangan dan penelitian obat-obat baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Uraian Ambroxol

1. Profil Ambroxol

Nama Resmi : Ambroxol Hydrochloride

Nama Lain : Ambroxol HCL

RM : $C_{13}H_{18}Br_2N_2O$ HCL



Struktur :

BM : 414,6

Pemerian : Putih atau kekuningan bubuk Kristal.

Kelarutan : sedikit larut dalam air, praktis tidak larut dalam diklorometana, larut dalam metal alkohol.

pH : 4,5-6,0.

Penyimpanan : Lindungi dari cahaya (Swetman, 2009).

2. Pengertian Ambroxol

Ambroxol adalah metabolit dari bromhexin yang digunakan sebagai mukolitik. Mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas dengan jalan memecah benang muko protein dan mukopolisakarida dari sputum. Ambroxol diindikasikan sebagai terapi sekretolitik pada penyakit bronko pulmonalis akut dan

kronis dengan sekresi lendir yang abnormal dan transportasi lendir terganggu. Aktivitas sekretolitik ini meningkatkan klirens lendir, mempermudah pengeluaran dahak dan batuk produktif. Ambroxol diserap dengan baik dalam saluran pencernaan, waktu paruhnya antara 9- 10 jam. (Rivai & Andalas, 2018). Ambroxol juga telah digunakan untuk profilaksis atau pengobatan sindrom gangguan pernapasan, displasia bronkopulmoner, proteinosis alveolar, dan penyakit paru pascaoperasi. Efek farmakologis ambroxol mencakup berbagai macam, termasuk regulasi lender pada sel kelenjar, peningkatan produksi pulmonal surfaktan, netralisasi oksidatif dan nitrosatif stres, penekanan replikasi virus pernapasan, pengurangan sitokin proinflamasi, kemotaksis, dan jaringan peroksidasi lipid. beberapa efek klinis terlihat dengan ambroxol, yaitu pengurangan rasa sakit dan bengkak, tampaknya disebabkan oleh sifat lokal anestesi dari ambroxol. Namun, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa sifat antiinflamasi ambroxol memainkan peran utama dalam efek pada sakit tenggorokan dan faringitis (Beeh et al., 2018).

3. Ambroxol Sebagai Antibiofilm

Selain digunakan sebagai salah satu agen pengencer dahak, ambroxol dapat menghambat pembentukan biofilm (H. A. Abbas, 2014). Hal itu telah dibuktikan pada beberapa penelitian. ambroxol telah terbukti dapat menghambat jamur dengan baik, dan menjadi agen pembentuk antibiofilm dalam pengobatan oral candidiasis yang disebabkan oleh *C. albicans* (Hussain et al., 2015). Ambroxol juga bisa menjadi anti virus untuk pengobatan infeksi *Serratia Marcences*. (H. A. Abbas & Hegazy, 2017). Pada penelitian in vitro untuk menyelidiki anti planktonik dan antivitas antibiofilm dari

sepuluh agen antibiofilm potensial terhadap biofilm *P. aeruginosa* yang sudah mapan, menunjukkan bahwa ambroxol memiliki aktivitas sedang dalam menghambat pembentukan biofilm (H. a Abbas et al., 2012). Ambroxol adalah agen baru untuk pengobatan ulkus kaki diabetik yang disebabkan oleh *Proteus mirabilis* karena diketahui ambroxol dapat mengganggu koloni dari *Proteus mirabilis* untuk menyerang jaringan kaki diabetik sehingga membentuk biofilm, jadi secara signifikan ambroxol dapat menghambat kemampuan membentuk koloni dari *Proteus mirabilis* dengan cara yang bergantung pada dosis (H. A. Abbas, 2014).

B. Uraian Biofilm

1. Komposisi Biofilm

Biofilm adalah kelompok atau mikroorganisme dimana mikroba menghasilkan zat polimer ekstraseluler (EPS) seperti protein (<1-2%) termasuk enzim, DNA (<1%), polisakarida (1-2%) dan RNA (<1%).1%), dan air (sampai 97%). Komposisi biofilm terdiri dari dua komponen utama yaitu saluran air untuk transportasi nutrisi dan wilayah padat sel tidak memiliki pori-pori yang menonjol di dalamnya. Sel-sel mikroba dengan biofilm diatur sedemikian rupa dengan fisiologi dan sifat fisik yang berbeda secara signifikan. Bakteri pembentuk biofilm mengaktifkan beberapa gen yang mengaktifkan ekspresi gen yang akan beralih ke fenotip resisten karena perubahan tertentu misalnya kepadatan sel, nutrisi atau suhu, kepadatan sel, pH dan osmolaritas. Ketika saluran air biofilm dibandingkan dengan sistem sirkulasi menunjukkan bahwa biofilm dianggap organisme multi seluler. Berbagai komponen biofilm menandakan

integritas biofilm dan membuatnya tahan terhadap berbagai faktor lingkungan (Hussain et al., 2015).

Biofilm memberi keuntungan pada bakteri pembentuk biofilm seperti perlindungan dari agen antimikroba, pertukaran nutrisi, metabolit, dan/ atau pertukaran genetik dengan mikroorganisme lainnya. Biofilm mengakibatkan terbatasnya penetrasi antibiotik untuk menjangkau bakteri penyebab infeksi serta mengakibatkan rendahnya laju multiplikasi sel mikroorganisme sehingga menyebabkan penyakit infeksi semakin berkembang. Biofilm dapat terbentuk pada permukaan tubuh dan bertahan setelah terapi dengan beragam antibiotik. Sel biofilm juga dapat menahan respon imun inang (bawaan dan adaptif), sangat resisten terhadap fagositosis, dan 10-1000 kali lipat lebih tahan terhadap pengobatan dengan antibiotik dibandingkan dengan bentuk planktoniknya (Sahputri et al., 2018).

2. Peranan Biofilm Terhadap Infeksi dan Resistensi Antibiotik

Hampir semua (99,9%) mikroorganisme memiliki kemampuan untuk membentuk biofilm pada berbagai permukaan yaitu permukaan biologis dan *inert*. Ketika mikroorganisme mengikat ke permukaan, mereka menghasilkan zat polimer ekstraseluler (EPS) dan membentuk biofilm (Hussain et al., 2015).

Fungsi biofilm menurut Jamal et al., (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme pertahanan bakteri dengan meningkatkan resistensi terhadap gaya fisik yang dapat menurunkan perkembangan sel-sel bakteri yang tidak menempel, fagositosis oleh sel imun dan penetrasi senyawa yang toksis terhadap bakteri.

- b. Bakteri dapat melekat pada permukaan yang kaya akan nutrisi
- c. Pembentukan biofilm membantu bakteri untuk hidup berdekatan dan membentuk koloni yang memfasilitasi komunikasi antar sel (quorum sensing) dengan molekul sinyal sebagai peningkatan peluang pertukaran materi genetik.

Berikut menyajikan daftar spesies bakteri yang dapat membentuk biofilm.

Tabel 1. Daftar spesies bakteri pembentuk Biofilm.

No.	Spesies Bakteri Pembentuk Biofilm Umum
1.	<i>E. coli</i>
2.	<i>P. aeruginosa</i>
3.	<i>S. epidermidis</i>
4.	<i>S. aureus</i>
5.	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
6.	<i>Enterobacter cloacae</i>
7.	<i>Actenomyces israelii</i>
8.	<i>Haemophilus influenza</i>
9.	<i>Burkholderia cepacia</i>

Pembentukan biofilm selanjutnya mempersulit penyakit infeksi dan meningkatkan jumlah bakteri pembentuk biofilm lebih toleran terhadap antibiotik (Jamal et al., 2015). Diperkirakan sekitar 65% kejadian infeksi mikroba berhubungan dengan pembentukan biofilm. Mekanisme terjadinya resistensi antibiotik pada biofilm, yaitu:

- a. Inaktivasi molekul aktif secara langsung

Difusi antibiotik dapat terjadi melalui matriks biofilm. Difusi atau penetrasi antibiotik ke lapisan biofilm yang lebih dalam dipengaruhi oleh exopolysaccharide yang

berperan sebagai penghalang fisik. Ketika molekul berinteraksi langsung dengan matriks ini, gerakan antibiotik ke bagian dalam biofilm melambat, sehingga mengakibatkan resistensi antibiotik. Bakteri yang melepaskan diri dari biofilm, tidak menghasilkan polisakarida dan mudah diserang oleh sel sistem kekebalan tubuh. Inaktivasi antibiotik terjadi saat mengikat matriks biofilm (Jamal et al., 2015).

b. Melambatnya perkembangan dan metabolisme bakteri

Menurunnya perkembangbiakan dan metabolisme bakteri didalam biofilm akibat minimnya nutrisi dan oksigen yang terdapat didalam biofilm sehingga merubah target antibiotik terhadap bakteri tersebut. Hal ini karena antibiotik lebih aktif bekerja jika mikroorganisme dalam tahap berkembang biak aktif. Setiap saat 1-10% sel dalam biofilm melambat karena metabolisme dan ekspresi yang berubah. Sel-sel dorman menunjukkan metabolisme yang lebih lambat dan lebih resisten terhadap antibiotik. Dormansi bersifat reversibel, dan bila terjadi perubahan lingkungan, sel-sel ini dapat kembali ke bentuk yang lebih aktif kembali (Jamal et al., 2015)

c. Perubahan fenotip bakteri

Bakteri dalam biofilm secara fenotip sangat berbeda dari planktoniknya, sehingga agen antibiotik sulit untuk membasmi mikroorganisme didalam biofilm. Bakteri dalam biofilm mengaktifkan banyak gen yang mengubah sel envelope, target molekul dan kerentanan terhadap agen antibiotik (resistensi intrinsik). Perubahan fenotipik yang disebabkan oleh pergeseran genetik (perubahan 65-80 protein), memainkan peran yang lebih penting dalam perlindungan dari agen antibiotik. Gen *rpoS* sangat penting dalam pembentukan biofilm, gen ini menginduksi respon stresor dan penekanan metabolisme

energi dan motilitas, mengakibatkan perubahan fisiologis yang dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Bakteri dalam biofilm dapat merasakan lingkungan eksternal, berkomunikasi satu sama lain dan mentransfer informasi genetik dan plasmid di dalam biofilm (Sahputri et al., 2018).

d. Transfer gen resisten

Kedekatan antar bakteri dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berbagi gen resisten antara satu sama lain. Mekanisme terjadinya resistensi antibiotik ini belum sepenuhnya dapat dimengerti. Pada setiap penelitian yang dilakukan mengenai resistensi antibiotik akibat biofilm, ditemukan adanya kombinasi dari beberapa mekanisme, hal ini juga bergantung terhadap fisiologi yang heterogen dari setiap mikroorganisme yang berkoloni didalam biofilm Jamal et al., 2015).

3. Siklus Kehidupan Biofilm

Pembentukan biofilm merupakan proses yang sangat kompleks, di mana sel-sel mikroorganisme berubah dari planktonik menjadi mode pertumbuhan sesil. Juga telah dikemukakan bahwa pembentukan biofilm bergantung pada ekspresi gen spesifik yang memandu pembentukan biofilm. Proses pembentukan biofilm terjadi melalui serangkaian peristiwa yang mengarah pada adaptasi di bawah kondisi nutrisi dan lingkungan yang beragam. Ini adalah proses multi-langkah di mana mikroorganisme mengalami perubahan tertentu setelah mengikuti permukaan. Berikut Proses pembentukan biofilm (Hussain et al., 2015).

a. Perlekatan

Sel Perlekatan mikroorganisme pada permukaan tertentu dapat terjadi secara aktif atau pasif, tergantung pada motilitas bakteri atau transportasi dari sel planktonik oleh gravitasi, difusi atau kekuatan dinamis cairan dari fase cairan disekitarnya. Perlekatan juga tergantung pada ketersediaan hara dalam media sekitarnya, dan tahap pertumbuhan sel bakteri itu sendiri. Dua tahapan yang dapat diidentifikasi dalam proses ini yaitu perlekatan reversibel diikuti oleh perlekatan irreversibel. Awalnya, interaksi jangka panjang terbentuk antara sel bakteri dan substrat disebut perlekatan reversibel, dan melibatkan interaksi *Van der waals*, gaya elektrostatik dan interaksi hidrofobik. Selama tahap ini, bakteri masih menunjukkan gerak *Brown* dan dapat dengan mudah dihilangkan dengan gaya geser fluida (misalnya hanya dengan membilasnya). Kemudian dilanjutkan perlekatan irreversibel, interaksi jangka pendek yang melibatkan interaksi dipol-dipol, ion hidrogen, dan ikatan kovalen, dan interaksi hidrofobik. Interaksi antara bakteri dan permukaan terjadi terutama melalui alat pelengkap bakteri seperti flagela, fimbriae, pili dan fibril, dan pengangkatan sel membutuhkan energi yang lebih kuat seperti scrubbing atau menggores. Suhu dan pH permukaan kontak memiliki pengaruh pada tingkat perlekatan mikroorganisme (Hussain et al., 2015).

b. Pembentukan Mikrokoloni

Proliferasi sel-sel bakteri yang melekat secara irreversibel dapat terjadi dengan menggunakan nutrisi yang ada di lingkungan cairan sekitarnya. Ini mengarah pada pembentukan mikrokoloni yang membesar dan menyatu untuk membentuk lapisan sel yang menutupi permukaan. Sel-sel yang melekat menghasilkan polimer tambahan


(eksopolisakarida), yang membantu dalam perlekatan sel-sel ke permukaan dan dalam menstabilkan koloni dari fluktuasi lingkungan (Hussain et al., 2015).

c. Pembentukan Biofilm

Pembentukan biofilm adalah konsekuensi dari perlekatan terus menerus sel bakteri terhadap substrat dan pertumbuhan selanjutnya, bersama dengan produksi EPS. Komposisi biofilm dapat heterogen karena kolonisasi oleh mikroorganisme yang berbeda dengan kebutuhan gizi yang berbeda. Peningkatan ukuran biofilm yang lebih besar dapat terjadi melalui deposisi atau perlekatan dari bahan-bahan organik dan anorganik yang terlarut lainnya dan partikel dari fase cair di sekitarnya (Hussain et al., 2015).

d. Pematangan dan Perluasan Biofilm

Setelah terbentuk biofilm matang, bakteri yang menempel tersebut untuk bertahan hidup harus mampu melepaskan diri dan menyebar dari biofilm. Sel anak dapat menjadi individu baru atau terkelupas. Bakteri yang terlepas kemudian dapat berpindah ke lokasi baru dan memulai kembali proses biofilm (Hussain et al., 2015).



Gambar 1. Proses Pembentukan Biofilm

C. Infeksi

1. Pengertian Infeksi

Penyakit infeksi ialah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembangbiaknya mikroorganisme, suatu kelompok luas dari organisme mikroskopik yang terdiri dari satu atau banyak sel seperti bakteri, fungi, dan parasit serta virus. Penyakit infeksi terjadi ketika interaksi dengan mikroba menyebabkan kerusakan pada tubuh dan kerusakan tersebut menimbulkan berbagai gejala dan tanda klinis (Novard et al., 2019).

2. Infeksi Biofilm

Biofilm menimbulkan masalah besar bagi kesehatan masyarakat karena sifatnya yang resisten terhadap antibiotik dan penyakit yang terkait dengan perangkat medis yang ada (Hussain et al., 2015).

Biofilm telah diketahui terlibat dalam berbagai macam infeksi mikroba pada tubuh. Pembentukan biofilm juga telah tercatat sebagai strategi pertahanan diri patogen. Beberapa mikroorganisme dalam biofilm bahkan dapat memodulasi potensi bakteri patogen lain seperti terlihat dari bakteri kariogenik pada plak biofilm. Menurut pernyataan resmi terbaru dari National Institutes of Health, lebih dari 65% dari semua infeksi mikroba disebabkan oleh biofilm. Jumlah ini mungkin tampak tinggi, tetapi jika kita ingat bahwa infeksi umum seperti saluran kemih infeksi (disebabkan oleh *E. coli* dan patogen lainnya), infeksi kateter (yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* dan patogen gram positif lainnya), infeksi telinga tengah anak (yang disebabkan oleh

Haemophilus influenzae), pembentukan plak pada gigi, dan radang gusi, yang semuanya disebabkan oleh biofilm, sulit untuk diobati atau juga sering kambuh, maka angka ini cukup realistis. Sehingga proses infeksi yang melibatkan biofilm telah terlibat pada penyakit-penyakit umum seperti infeksi saluran kemih, infeksi kateter, infeksi telinga tengah, pembentukan gigi plak, gingivitis, legionellosis, infeksi pada pemakaian lensa kontak, dan infeksi yang kurang umum namun lebih mematikan seperti endokarditis, infeksi pada cystic fibrosis, dan infeksi implan permanen seperti prostesis persendian dan katup (Purbowati, 2018).

Munculnya fenomena biofilm mikroba dikaitkan dengan adanya sifat resistensi mikroba terhadap antimikroba dan sistem imun. Sifat biologis sel bakteri pembentuk biofilm matur berbeda dari sifat biologis sel planktoniknya walaupun pada strain bakteri yang sama. Penting diketahui bahwa sifat-sifat yang diperoleh tersebut memungkinkan bakteri yang tersembunyi dalam biofilm mampu bertahan hidup di alam, terutama pada lingkungan mikro yang tidak bersahabat. Adaptasi ini memiliki konsekuensi yang cukup signifikan terhadap diagnostik dan terapi sehingga bakteri pembentuk biofilm menunjukkan peningkatan resistensi terhadap antibiotik dan desinfektan. Konsentrasi terapeutik efektif pada beberapa antibiotik terhadap bakteri dalam biofilm mungkin 100 bahkan 1000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan bakteri bentuk planktoniknya. Selain itu, bakteri biofilm resisten terhadap proses fagositosis dan mekanisme lain dari sistem imun bawaan dan adaptif. Sehingga bakteri patogen pembentuk biofilm yang tumbuh menyebabkan infeksi yang persisten dan inflamasi serta kerusakan jaringan kronis (Purbowati, 2018).

Perbedaan biofilm dengan koloni infeksi ialah adanya agregat mikrokoloni sel yang melekat pada permukaan. Pembentukan biofilm sebagai mekanisme pertahanan memiliki implikasi besar pada inang karena mikroorganisme yang tumbuh dan akan lebih resisten terhadap antibiotik. Ada empat kriteria untuk mendefinisikan etiologi dari infeksi biofilm, yaitu bakteri patogen pada permukaan yang melekat pada substrat, pemeriksaan langsung menunjukkan bakteri dalam kelompok, terbungkus dalam matriks bakteri, infeksi yang terlokalisasi, dan infeksi yang resisten terhadap terapi antibiotik (Homenta, 2016).

D. Iritasi Kulit

1. Pengertian Iritasi

Iritasi merupakan suatu fenomena inflamasi yang terjadi pada kulit akibat senyawa asing. Gejala yang dapat terjadi antara lain panas karena adanya dilatasi pembuluh darah pada daerah yang terkena paparan senyawa asing yang ditandai dengan adanya kemerahan pada daerah tersebut (eritema), dan dapat juga menyebabkan edema yang terjadi karena adanya pembesaran plasma yang membeku pada daerah kulit yang terluka (Nur, 2019).

Eritema merupakan suatu reaksi kemerahan pada kulit yang timbul akibat dari efek samping penggunaan sediaan topikal. Kemerahan ini juga ditandai dengan timbulnya bercak-bercak yang menonjol tersebar secara simetris. Gejalanya selain timbul eritema (kemerahan), juga timbul vesikulasi (berair) yang disertai rasa gatal dan panas (Hakim et al., 2018). Sedangkan edema merupakan suatu reaksi pembengkakan pada kulit yang

timbul akibat dari efek samping penggunaan sediaan topikal. Udem terjadi akibat meningkatnya volume cairan diluar sel (ekstraseluler) dan diluar pembuluh darah (ekstravaskuler) yang terakumulasi di dalam jaringan-jaringan tubuh (Hakim et al., 2018).

2. Penyebab Iritasi

Iritasi kulit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena suhu ekstrim panas maupun dingin, paparan deterjen / sabun, produk pembersih rumah tangga. Selain itu, iritasi kulit juga dapat disebabkan oleh basis / vehikulum maupun bahan/ zat kimia yang terkandung dalam produk sediaan topikal.

E. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Kelinci

Kingdom : *Animalia*

Filum : *Chordata*

Kelas : *Mamalia*

Ordo : *Legomorpha*

Famili : *Leporidae*

Genus : *Oryctagalus*

Spesies : *Oryctagalus cuniculus* (Mu'nisa et al, 2022).

2. Karakteristik

Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae, yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut

vivipar. Bagian tubuh kelinci di selimuti dengan bulu yang halus tetapi lebat, memiliki warna yang bermacam-macam mulai dari warna hitam, abu-abu, kecoklatan, hitam putih, dan lain-lain. Bagian mata pada kelinci memiliki warna kemerahan, berbentuk bulat kelonjongan. Bagian hidung pada kelinci berbentuk silindris, mempunyai gigi seri di bagian depan yang digunakan kelinci untuk memotong atau mengunyah rumput (Mu'nisa et al, 2022).

Secara makroskopis, lidah kelinci berbentuk pipih memanjang dengan puncak dan tepi bulat, panjangnya mencapai sekitar 5,3 cm, lebar 4,5 cm pada bagian bebas, 5 cm pada tonjolan lingual dan mencapai 4,8 cm pada akar lidah. Lidah terbagi menjadi tiga bagian; bagian anterior, tengah dan posterior (Mu'nisa et al, 2022).



Gambar 2. Kelinci

Kelinci juga mampu melakukan *caecotrophy* atau *coprophage*, yaitu proses memakan kembali faeces di pagi atau malam hari. Umur hidup kelinci dapat mencapai lima sampai sepuluh tahun dengan umur produktif dua hingga tiga tahun dan memiliki kemampuan beranak sepuluh kali per tahun. Kelinci beraktivitas secara umum pada

tengah malam di kala hari mulai senja dan dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan luar (Mu'nisa et al, 2022).

Kelinci memiliki kemampuan biologi yang menonjol terletak pada system pencernaannya dan system reproduksinya yaitu setiap pejantan dapat dikawinkan dengan delapan sampai sepuluh betina, jumlah anak per kelahiran enam sampai tujuh ekor, anak kelinci di sapih oleh induknya rata-rata umur enam hingga delapan minggu, setelah melahirkan, induk dapat dikawinkan kembali (Mu'nisa et al, 2022).

Kelinci yang digunakan pada penelitian ini adalah kelinci albino (*Oryctolagus cuniculus*), galur New Zealand sebanyak 3 ekor kelinci jantan yang sehat dan dewasa yang berumur 8-9 bulan. Hewan yang digunakan berasal dari Pasar Hobi, Toddopuli. Jenis kelamin dipilih kelinci jantan karena kelinci jantan mempunyai kondisi biologis yang lebih stabil daripada kelinci betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi oleh masa siklus, masa kehamilan dan masa menyusui (Peresia et al., 2009). Berat hewan kelinci ditentukan sekitar 1,5-2kg (Fatmawaty et al., 2016) guna mengurangi variabilitas efek karena pengaruh perbedaan berat badan. Berat hewan kelinci ditentukan sekitar 1,5-2kg (Fatmawaty et al., 2016). Adapun berat badan kelinci yang digunakan pada penelitian ini, kelinci 1 yaitu 1,75kg, kelinci 2 yaitu 1,7kg, dan kelinci 3 yaitu 1,7kg.

3. Teknik Pemeliharaan

Faktor-faktor yang memengaruhi pemeliharaan kelinci diuraikan sebagai berikut :

a. Kandang

Kandang yang digunakan kelinci biasanya dibuat dalam bentuk panggung dengan ketinggian kandang 75 cm dari tanah. Rangka kandang terbuat dari kayu ukuran 4 cm x 6 cm, kayu 3 cm x 5 cm dan kayu reng. Sisi samping kandang di tutup dengan anyaman kawat dan bagian bawah kandang terbuat dari anyaman kawat dengan diameter 1 cm agar kotoran dan air kencing ternak dapat terbuang dengan mudah. Setiap petak kandang berukuran panjang 70 cm, lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. Tempat pakan dan air minum yang diletakkan di dalam bilik kandang dan digantung pada pinggir kandang. Suhu udara dalam kandang selama penelitian cukup ideal untuk pemeliharaan ternak kelinci yaitu berkisar antara 25-26oC. Kelinci dapat hidup dan berkembang baik pada suhu ideal 15-20oC dan kelembaban ideal 60- 90%. Kelembaban udara dalam kandang selama penelitian termasuk ideal yaitu 80-82%. Kelembaban ideal untuk ternak kelinci adalah 60-90% dimana kelembaban udara maksimum terjadi pada waktu pagi hari dan minimum pada sore hari (Mu'nisa et al, 2022).

b. Pakan

Kelinci merupakan hewan herbivora non ruminansia yang sebagian besar kebutuhan pakannya berasal dari hijauan. Pakan hijauan yang diberikan untuk pakan kelinci antara lain rumput lapangan, limbah sayuran (kangkung, sawi, wortel, caisim, kol, daun singkong), daun turi, daun lamtoro, daun kembang sepatu, daun kacang panjang, daun ubi jalar, daun kacang tanah, daun dan batang jagung, daun pepaya, talas

dan lain-lain. Selain itu kelinci juga biasanya diberikan pellet, yaitu campuran beberapa bahan pakan yang diproses secara mekanik dengan tekanan tertentu melalui die sehingga akan terbentuk pakan yang kompak. Konsumsi pellet pada kelinci adalah sebanyak 5% dari berat badan (Mu'nisa et al, 2022).

Selama proses penelitian, pembersihan kandang rutin dilakukan tiap hari untuk tetap menjaga agar hewan coba merasa tenang dan tidak stress. memberikan pakan juga rutin dilakukan pada pagi dan sore hari yaitu berupa pelet dan sayuran segar seperti wortel dan kangkung.

F. Uraian Toksisitas

1. Pengertian Toksisitas

Uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis-respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila dipaparkan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis yang akan penggunaannya demi keamanan manusia (BPOM RI, 2020).

Uji toksisitas menggunakan hewan uji sebagai model berguna untuk melihat adanya reaksi biokimia, fisiologik dan patologik pada manusia terhadap suatu sediaan uji. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan/ sediaan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia (BPOM RI, 2020).

2. Jenis-jenis Uji toksisitas

a. Uji toksisitas akut oral

Uji toksisitas akut oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal, atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam (BPOM RI, 2020).

b. Uji toksisitas subkronik oral

Uji toksisitas subkronik oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan (BPOM RI, 2020).

c. Uji toksisitas kronis oral

Uji toksisitas kronis oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama sebagian besar umur hewan uji (BPOM RI, 2020).

d. Uji teratogenitas

Uji teratogenitas adalah suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus (masa organogenesis) (BPOM RI, 2020).

e. Uji sensitasi kulit

Uji sensitasi kulit adalah suatu pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitasi kulit (BPOM RI, 2020).

f. Uji iritasi mata

Uji iritasi mata adalah suatu uji pada hewan uji (kelinci albino) untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada mata (BPOM RI, 2020).

g. Uji iritasi/korosi akut dermal

Uji iritasi/ korosi akut dermal adalah suatu uji pada hewan (kelinci albino) untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal sampai 4 jam (BPOM RI, 2020).

h. Uji iritasi mukosa vagina

Uji iritasi mukosa vagina adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain (BPOM RI, 2020).

i. Uji toksisitas akut dermal

Uji toksisitas akut dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal (BPOM RI, 2020).

j. Uji toksisitas subkronis dermal

Uji toksisitas subkronis dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan melalui rute dermal pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan (BPOM RI, 2020).

k. Uji toksisitas karsinogenitas

Uji karsinogenisitas adalah suatu pengujian untuk mendeteksi dan memperoleh informasi/ mengidentifikasi sifat karsinogenik sediaan uji setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan pada hewan uji selama sebagian besar rentang hidup hewan tersebut sesuai dengan rute pemberian yang diinginkan (BPOM RI, 2020).

3. Faktor yang Mempengaruhi Toksisitas

Faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara *in vivo* dapat dipercaya adalah: pemilihan spesies hewan uji, galur dan jumlah hewan; cara pemberian sediaan uji; pemilihan dosis uji; efek samping sediaan uji; teknik dan prosedur pengujian termasuk cara penanganan hewan selama percobaan (BPOM RI, 2020).

G. Rancangan Uji Iritasi Akut Dermal

1. Pemilihan Hewan Coba

Hewan uji yang digunakan adalah kelinci albino jantan atau betina yang sehat dan dewasa, berat sekitar 2 kg. Penggunaan spesies lain dapat digunakan dengan justifikasi (BPOM RI, 2020). Sejumlah model hewan *in vivo* digunakan sebagai alternatif iritasi kulit, antara lain dengan menggunakan marmot, mencit, dan tikus (Puji, 2018). Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan kurang lebih selama 5 tujuannya untuk mengkondisikan hewan dengan suasana laboratorium dan untuk menghilangkan stress akibat transportasi. (BPOM RI, 2020).) Satu hari sebelum perlakuan, bulu kelinci dicukur terlebih dahulu seluas 2x3 cm² yang dibuat sebanyak 4 kotak dengan bantuan alat cukur elektrik dan mengoleskan krim perontok bulu supaya

larutan yang akan dipaparkan pada kulit kelinci dapat menyerap dengan baik tanpa ada penghalang bulu.

2. Pembuatan Larutan Uji

Pada pembuatan larutan sampel, ambroxol dilarutkan dengan Propilen glikol. Setelah ambroxol larut, ditambahkan aquadest sebagai campuran pelarut, lalu diaduk hingga homogen. Pada penelitian ini larutan ambroxol dibuat dalam dosis 15mg/5ml dan 30ml/5ml sebagai larutan sampel. Sedangkan untuk larutan kontrol menggunakan Propilen glikol sebagai kontrol negatif dan sediaan sirup ambroxol sebagai kontrol positif.

Pada penelitian ini menggunakan Propilen glikol sebagai kosolven. Kosolven adalah pelarut yang ditambahkan dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan atau meningkatkan stabilitas dari suatu zat, cara ini disebut kosolvensi. Cara ini cukup potensial dan sederhana dibanding beberapa cara lain yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan stabilitas suatu bahan. Penggunaan kosolven dapat mempengaruhi polaritas sistem, yang dapat ditunjukkan dengan perubahan tetapan dielektrikanya. Kosolven seperti etanol, propilen glikol, polietilen glikol, gliserin, dan glikofural telah lama digunakan sebagai zat untuk meningkatkan kelarutan obat dalam larutan pembawa berair. Efek peningkatan kelarutan ini terutama disebabkan oleh polaritas obat terhadap solven (air) dan kosolven. Pemilihan sistem kosolven yang tepat dapat menjamin kelarutan semua komponen dalam formulasi dan meminimalkan resiko pengendapan (presipitasi) karena pendinginan atau pengenceran oleh cairan

darah. Akibatnya, hal ini akan mengurangi iritasi jaringan pada tempat administrasi obat (Widyaningsih, 2009).

Propilen glikol digunakan dalam berbagai formulasi farmasi dan umumnya dianggap sebagai bahan yang relatif tidak beracun. Ini juga digunakan secara luas dalam makanan dan kosmetik. Mungkin sebagai konsekuensi dari metabolisme dan ekskresinya, propilen glikol kurang beracun dibandingkan glikol lainnya. Dalam sediaan topikal, propilen glikol dianggap sebagai iritasi minimal. Konsentrasi yang digunakan sebagai kosolven pada sediaan topikal adalah 5-80% (Rowe et al, 2009). Propilen glikol merupakan salah satu enhancer kimia yang dapat meningkatkan penetrasi obat ke dalam kulit. Mekanisme propilen glikol sebagai peningkat penetrasi yaitu meningkatkan kelarutan bahan obat sehingga dapat meningkatkan difusi obat menembus membran sel dan memberikan efek hidrasi pada kulit yaitu melunakkan lapisan keratin pada stratum korneum sehingga meningkatkan jumlah obat yang berpenetrasi lewat kulit. Propilen glikol memiliki aktivitas peningkat penetrasi yang tinggi dan dianggap paling aman karena efek iritasi yang rendah pada kulit (Niswah et al., 2021).

3. Cara pemberian

Sediaan uji dipaparkan di area kulit seluas $\pm 6 (2 \times 3)$ cm², kemudian lokasi pemaparan ditutup dengan kasa dan diplester dengan plester yang bersifat non-iritan. Plester harus dibuat longgar menggunakan balutan semi-oklusif yang sesuai selama periode paparan. Bila sediaan uji/bahan uji diaplikasikan ke plester, plester harus menempel pada kulit sedemikian rupa sehingga ada kontak yang baik dan distribusi

bahan uji yang seragam pada kulit. Harus dicegah hewan dapat menghirup ataupun menelan bahan uji pada plester. Jika pemberian secara langsung tidak memungkinkan (misalnya cairan atau pasta), sediaan uji harus dioleskan terlebih dahulu pada kassa lalu ditempelkan pada kulit. Sediaan uji cair tidak perlu diencerkan sedangkan sediaan uji padat dihaluskan lebih dulu dan dibasahi dengan sedikit air atau dengan pelarut yang cocok yang bersifat non-iritan untuk memastikan interaksi yang baik antara sediaan uji dengan kulit. Untuk pembawa selain air, potensi pengaruh dari pembawa harus seminimal mungkin. Pada akhir periode paparan, (normalnya 4 jam), residu sediaan uji harus dihapus, dapat menggunakan air atau pelarut yang sesuai tanpa mengubah respon yang telah muncul atau integritas epidermis (BPOM RI, 2020).


4. Penentuan dosis pemberian

Dosis yang digunakan untuk sediaan uji cair adalah sebanyak 0,5 ml dan untuk sediaan uji padat atau semi padat sebanyak 0,5 g (BPOM RI, 2020). Pada pengujian ini, menggunakan dosis ambroxol 15mg/5ml dan 30ml/5ml serta akan diberikan pula sediaan sirup ambroxol sebagai kontrol positif dan propilen glikol sebagai kontrol negatif.

5. Pengamatan klinis dan penilaian dari reaksi kulit

Pada pengamatan uji toksisitas akut dermal ini menggunakan empat responden terlatih untuk menilai skor dari keadaan kelinci setelah dilakukan perlakuan Untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian reaksi kulit/skoring, maka dilakukan oleh individu yang terlatih dan jika diperlukan dapat menggunakan ilustrasi gambar penilaian/skoring.

Semua hewan uji harus diamati ada atau tidaknya eritema dan edema, penilaian respon dilakukan pada jam ke 1, 24, 48, dan 72 setelah pembukaan tempelan. Pengamatan dilakukan segera setelah pembukaan tempelan. Jika kerusakan kulit tidak dapat diidentifikasi sebagai iritasi atau korosi pada jam ke 72, pengamatan dapat dilanjutkan sampai hari ke-14 untuk menentukan reversibilitas. Pengujian uji histopatologi dilampirkan bila ada (BPOM RI, 2020). Berikut Gambar iritasi primer (Puji, 2018).



Gambar 3. Iritasi Primer

6. Analisis data

Hasil pengamatan dirangkum dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keadaan secara individual, memuat skor iritasi untuk eritema dan udema tiap hewan pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah tempelan dibuka. Untuk melihat reversibilitas, pengamatan dilanjutkan sampai 14 hari. (BPOM RI, 2020). Pemeriksaan histopatologi perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan respon yang meragukan.

7. Evaluasi hasil

Skor iritasi kulit yang harus dievaluasi adalah terhadap tingkat keparahan luka, ada atau tidaknya reversibilitas. Skor individu tidak mewakili standar absolut untuk sifat iritan dari sediaan uji. Dilakukan evaluasi efek-efek lain dari sediaan uji, skor individual harus dilihat sebagai nilai referensi. Luka kulit yang bersifat reversibel harus diperhitungkan di dalam evaluasi respon iritan. Jika terlihat respon seperti alopecia (area terbatas), hiperkeratosis, hiperplasia, dan scaling yang bertahan sampai akhir dari pengamatan selama 14 hari, maka sediaan uji tersebut dimasukkan ke dalam kategori zat yang bersifat iritan. Disamping gambaran iritasi kulit, efek toksik lain yang disebabkan oleh bahan uji juga diamati dan dicatat. Skor iritasi (Indeks Iritasi Primer) sediaan uji adalah kombinasi dari seluruh observasi dari pengujian. Indeks Iritasi Primer dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (BPOM RI, 2020).

$$\text{Indeks iritasi primer} = \frac{A-B}{C}$$

Keterangan :

A : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan sampel pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan

B : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan kontrol pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan

C : Jumlah hewan

Berikut tabel untuk penilaian terhadap sediaan uji yang mengakibatkan terjadinya reaksi kulit (BPOM RI, 2020).

Tabel 2. Kategori respon iritasi

Nilai Rata-Rata	Kategori Respon
0,0-0,4	Sangat ringan (neglible)
0,5-1,9	Iritan ringan (slight)
2,0-4,9	Iritan sedang (moderate)
5,0-8,0	Iritas kuat (severe)

8. Uji Histopatologi

Histologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari struktur dan sifat jaringan dan organ tubuh untuk menjelaskan fungsinya dalam keadaan normal, termasuk perubahannya sepanjang usia dan dalam keadaan sakit (Strajhar et al., 2016).

Pada akhir percobaan uji toksisitas ini dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk melihat adanya kelainan pada organ yang ditimbulkan akibat pemberian sediaan uji. Prinsip dari pemeriksaan histopatologi adalah organ yang telah difiksasi dengan formalin, dicuci, didehidrasi, dibuat blok dengan parafin, kemudian dipotong menjadi sayatan tipis dan diberi pewarnaan selanjutnya diperiksa dengan mikroskop (BPOM RI, 2020).

Pada penelitian ini, hewan coba di cukur bulunya terlebih dahulu kemudian ditotolkan larutan ambroxol dengan dosis 30mg/5ml, lalu diamati punggung kelinci pada jam ke jam ke 1, 24, 48, dan 72 setelah pembukaan tempelan. Setelah 72 jam, hewan coba akan dianastesi terlebih dahulu lalu dibiopsi untuk mengambil sampel yaitu kulit kelinci yang telah dipaparkan larutan ambroxol dosis 30mg/5ml, setelah dibiopsi kemudian dilakukan pengujian histopatologi sesuai dengan prosedur. Uji histopatologi ini dilakukan di Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin.

H. Tinjauan Islam

Kehidupan manusia begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Pada zaman global ini, orang menganggap bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari Barat. Padahal kemajuan yang dicapai barat tersebut tidak lepas dari zaman sebelumnya, yakni dunia Islam. Para ilmuwan farmasi Muslim selain menguasai riset-riset ilmiah di bidang farmasi, mereka juga berhasil membuat komposisi, dosis, tata cara penggunaan, dan efek dari obat-obatan (baik obat sederhana maupun obat campuran). Masa kejayaan Islam merupakan masa di mana ilmu farmasi mencapai puncaknya (Fay, 2020).

Terkait dengan riset ilmiah, Allah SWT telah menerangkan dalam QS. Al-Alaq/96: 1-5

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ٥

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang diketahuinya”.

Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan bacalah wahai Nabi, apa yang diturunkan kepadamu, dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Esa dalam penciptaan, yang menciptakan manusia dari segumpal daging kental yang merah.

Bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu. Sesungguhnya kebaikan Tuhanmu banyak, kemurahanNya melimpah, yang mengajari makhlukNya menulis dengan pena, mengajari manusia apa yang belum diketahuinya, dan memindahkannya dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu (Hikmat et al, 2016).

Perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan sangatlah besar, hal ini dibuktikan di setiap ayat terdapat pembelajaran, dan bahkan di beberapa ayat membahas ilmu pengetahuan secara khusus sehingga dapat dikatakan relevan jika Islam adalah agama ilmu pengetahuan kemudian mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Di sini jelaslah bahwa perlunya pengetahuan (Masykur & Solekhah, 2021).

Sebagai kesimpulan dari tafsir di atas yaitu bahwa umat manusia, apalagi umat Islam, harus mengembangkan kemampuan baca tulis untuk memahami seluruh ayat Allah SWT, baik qauliyah yang maupun yang kauniyah. Membaca dan mendalami ayat-ayat Allah SWT harus karena Dia dan dengan meminta bantuan-Nya, supaya ilmu yang dihasilkan bermanfaat bagi manusia.

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah SWT. atas hamba-hamba-Nya, Sesungguhnya musibah itu bermanfaat bagi manusia, dan Allah SWT menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dari kesalahan mereka. Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu dilaksanakan oleh ahlinya agar sesuai dengan

penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan. Sebagaimana tertera dalam QS. asy-Syu'ara/26 : 80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۝ ٨٠ .

Terjemahnya :

“Dan apabila aku tertimpa sakit, maka Dialah yang menyembuhkan”.

Firman وَإِذَا مَرَضْتُ, dan apabila aku sakit berbeda dengan redaksi lainnya.

Dalam hal penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan, dan minum secara tegas beliau menyatakan bahwa yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam itu (Shihab, 2012).

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk terus berusaha meski yang menentukan hasilnya adalah Allah SWT. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang, manusia dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha mencapai kesembuhan (Masood, 2009).

Disamping itu manusia juga diperintahkan untuk mencari obat dari berbagai penyakit yang dideritanya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah RA :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah radhianallahu’anh, bahwa Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda : Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa adanya obat disetiap penyakit. Ini menunjukkan apabila ingin mencari pengobatan pasti akan menemukan sebuah obat (Ar-Rumaikhon, 2008).

Semua penyakit memiliki obatnya, manusialah yang perlu berusaha untuk mencari dan menggunakan obat-obat tersebut bagi penyembuhan penyakitnya. Yang tidak dapat dihindari hanyalah kematian dan ketuaan. Kematian dan ketuaan merupakan hal yang tidak bisa ditolak, dimajukan, dan dimundurkan, tapi berjalan sesuai ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Meskipun manusia berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah dari kematian, seperti berobat pada saat sakit, tetapi bila Allah SWT, telah menetapkan kematiannya maka ia akan meninggal saat itu pula. Demikian halnya dengan ketuaan, seberapa besarpun upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menghindarinya, tapi usia manusia akan terus bertambah, tidak dapat berkurang atau kembali, dan seiring itu pula fungsi-fungsi organ dari tubuhnya akan berkurang.

Al-Qur’an dan sunnah memberikan perhatian besar kepada umat Islam dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam menjaga kesehatan dan menyembuhkan sakit. Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana cara memohon kesehatan dan

kesembuhan kepada Allah SWT, mengajarkan berikhtiar dengan cara cara halal dan diridhai. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah SWT, adalah Zat yang Maha Menyembuhkan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang urusan kesehatan untuk dipelajari dan diperhatikan oleh segenap umat manusia, terutama para pengikut Al-Qur'an. Karena dengan ilmu ini, kaum muslimin akan memperoleh kesehatan bagi jasmaninya dan dengan kesehatan tubuhnya itulah mereka akan dapat melaksanakan tugas-tugas kewajibannya dalam agama (Shihab, 2012).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang merupakan studi eksperimental laboratorium yang menggunakan kelinci sebagai hewan percobaan.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratorium.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022 hingga Januari 2023.

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat pencukur elektrik (*Kemei*), timbangan analitik (*Ohaus*), batang pengaduk, pipet skala, gelas kimia (*pyrex®*), gelas ukur (*pyrex®*), kandang kelinci, botol obat, gunting, penggaris.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah larutan ambroxol dengan dosis 15mg/5ml dan 30ml/5ml, sediaan sirup ambroxol 30mg/5ml, kasa steril (*Onemed*), plester non iritan (*Onemed*), aquadest, propilen glikol, hewan uji kelinci albino (*Oryctagalus cuniculus*), Krim penghilang bulu (*Veet*), pakan kelinci (*Vital Rabbit*).

E. Prosedur Uji Iritasi Akut Dermal

1. Pembuatan Larutan Ambroxol

Dibuat larutan ambroxol 60ml. Ambroxol dicampurkan dengan propilen glikol 10%, diaduk hingga larut. Kemudian dicampurkan dengan aquadest sebagai campuran pelarut, lalu diaduk hingga homogen. Pada penelitian ini yang menggunakan dosis 15mg/5ml dan 30ml/5ml.

2. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba

Hewan uji yang digunakan yaitu kelinci albino (*Oryctagalus cuniculus*) jantan yang sehat. Jumlah hewan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 3 hewan dengan bobot badan 1,5kg-2kg dan usia hewan coba 8-9 bulan. Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan minimal 5 hari (BPOM RI, 2020).

3. Perlakuan pada hewan coba

Hewan ditempatkan 1 hewan untuk 1 kandang. Sesaat sebelum pengujian, bulu hewan dicukur dengan luas sekitar 2x3 cm pada area punggung untuk tempat pemaparan sediaan uji. Pencukuran dilakukan kira-kira 24 jam sebelum pemberian

sediaan uji. Ketika mencukur, hindari luka atau pengelupasan pada kulit karena dapat menyebabkan kenaikan/penurunan permeabilitas kulit, kecuali jika pengelupasan kulit merupakan bagian dari persyaratan dalam pengujian (BPOM RI, 2020).

4. Cara pemberian

Pada penelitian uji iritasi akut dermal, hewan coba akan diberikan larutan ambroxol. Pemberian larutan dengan cara mengaplikasikan pada kulit hewan yang ditentukan dengan sediaan uji dioleskan terlebih dahulu pada kassa lalu ditempelkan pada hewan uji, kemudian lokasi paparan ditutup dengan kassa steril dan dibalut dengan plester yang tidak mengiritasi. Plester harus dibuat longgar menggunakan balutan semi-oklusif yang sesuai selama periode paparan (BPOM RI, 2020).

Pada akhir periode paparan, (normalnya 4 jam), residu sediaan uji harus dihapus, dapat menggunakan aquadest (BPOM RI, 2020). Pemberian larutan pada kulit mencit diberikan sesuai dengan tingkatan konsentrasi dan akan diberikan pula sediaan sirup ambroxol yang beredar sebagai kontrol.

- Kelompok 1. Kontrol (+) : diberi sediaan sirup ambroxol
- Kelompok 2. Kontrol (-) : diberi propilen glikol
- Kelompok 3 : diberi larutan ambroxol 15mg/5ml
- Kelompok 4 : diberi larutan ambroxol 30mg/5ml

5. Pengamatan

Pada uji iritasi akut dermal, semua hewan uji harus diamati ada atau tidaknya eritema dan edema, penilaian respon dilakukan pada jam ke 1, 24, 48, dan 72 setelah pembukaan tempelan. Hewan yang menunjukkan tanda-tanda kesakitan atau

penderitaan yang parah harus dikorbankan sesuai dengan prosedur pemusnahan hewan. Reaksi kulit dapat dinilai berdasarkan tabel dibawah ini dengan nilai maksimum adalah 4 (BPOM RI, 2020).

Tabel 3. Penilaian Reaksi Pada Kulit

Pembentukan Eritema	Skor
Pembentukan Eritema	0
Tidak ada eritema.....	1
Eritema yang sangat kecil (hampir tidak bisa dibedakan)....	2
Eritema terlihat jelas.....	3
Eritema sedang sampai parah.....	4
Eritema parah (merah daging) sampai pembentukan <i>eschar</i> yang menghambat penilaian eritema.....	4
Pembentukan Udema	0
Tidak ada udema.....	1
Udema sangat kecil (hampir tidak dapat dibedakan).....	2
Udema kecil (batas area terlihat jelas).....	3
Udema tingkat menengah (luasnya bertambah sekitar 1mm).....	4
Udema parah (luas bertambah lebih dari 1 mm melebar melebihi area pemaparan oleh sediaan uji).....	4

6. Analisis data

Hasil pengamatan dirangkum dalam bentuk tabel yang memuat skor iritasi untuk eritema dan udema tiap hewan pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah tempelan dibuka. Evaluasi hasil dilakukan dengan menghitung indeks iritasi primer. Skor iritasi (Indeks Iritasi Primer) sediaan uji adalah kombinasi dari seluruh observasi dari pengujian. Indeks Iritasi Primer dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Indeks iritasi primer} = \frac{A-B}{C}$$

Keterangan :

A : Jumlah skor eritema dan edema seluruh titik pengamatan sampel pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan

B : Jumlah skor eritema dan edema seluruh titik pengamatan kontrol pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan

C : Jumlah hewan

7. Uji Histopatologi







Pada akhir percobaan uji toksisitas dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk melihat adanya kelainan pada organ yang ditimbulkan akibat pemberian sediaan uji (BPOM RI, 2020). Pada penelitian ini, hewan coba di berikan larutan ambroxol dengan dosis 30mg/5ml pada punggung kelinci yang telah dicukur, lalu ditutup dengan kasa steril dan plester yang tidak mengiritasi kemudian diamati pada jam ke jam ke 1, 24, 48, dan 72 setelah pembukaan tempelan. Setelah 72 jam, kulit hewan coba yang telah diberi paparan akan diberikan anestesi dan dibiopsi kemudian dilakukan pembuatan sampel lalu diperiksa dengan mikroskop.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Toksisitas Akut Dermal Larutan Ambroxol

Tabel 4. Hasil Uji Iritasi Akut Dermal

Kelinci	Waktu			
	1 jam	24 jam	48 jam	72 jam
Kelinci 1				
Kelinci 2				
Kelinci 3				

Keterangan :

Hitam (Bagian atas) : Larutan Ambroxol Dosis 30mg/5ml

Merah : Kontrol (-) yaitu Propilen Glikol

Biru : Kontrol (+) yaitu Sediaan Sirup Ambroxol

Hitam (Bagian Bawah) : Larutan Ambroxol Dosis 15mg/5ml


Berdasarkan hasil uji iritasi akut dermal dengan melakukan penotolan larutan sampel dan kontrol, tidak terlihat adanya reaksi eritema maupun uema pada kulit punggung hewan uji.

Tabel 5. Hasil Skoring Uji Iritasi Akut Dermal


Formula	Hasil Eritema dan Udema								
	1 jam		24 jam		48 jam		72 jam		
	E	U	E	U	E	U	E	U	
Kontrol + (Sirup Ambroxol)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kontrol - (Propilen glikol)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ambroxol 15 mg / 5 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ambroxol 30 mg / 5 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0

Berdasarkan hasil uji iritasi akut dermal, maka didapatkan hasil skoring “0” pada jam ke 1, jam ke 24, jam ke 48 dan jam ke 72 untuk setiap titik totolan sampel dan kontrol.

2. Hasil Uji Histopatologi



Gambar 4. Hasil uji iritasi kulit kelinci. Gambar diambil dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 4x



Gambar 5. Hasil uji iritasi kulit kelinci. Gambar diambil dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 40x

Berdasarkan hasil uji histopatologi yang dilakukan di Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin Makassar, dengan merujuk pada aturan (BPOM RI, 2020) yaitu penilaian reaksi pada kulit didapatkan untuk sampel kelinci yang terlihat dari

gambaran histopatologi adalah eritema yang terbentuk dalam kategori parah, sedangkan edema yang terbentuk berada dalam kategori sedang menuju parah (berat).

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek iritasi dari sediaan larutan setelah digunakan pada kelinci sehingga dapat diketahui tingkat keamanan dari larutan ambroxol. Pengamatan uji iritasi akut dermal mengacu pada aturan (BPOM RI, 2020), dengan melihat adanya eritema dan edema yang ditimbulkan pada kulit hewan coba setelah dilakukan pemaparan larutan uji. Eritema merupakan suatu reaksi kemerahan pada kulit yang timbul akibat dari efek samping penggunaan sediaan topikal. Kemerahan ini juga ditandai dengan timbulnya bercak-bercak yang menonjol tersebar secara simetris. Gejalanya selain timbul eritema (kemerahan), juga timbul vesikulasi (berair) yang disertai rasa gatal dan panas (Hakim et al., 2018). Sedangkan edema merupakan suatu reaksi pembengkakan pada kulit yang timbul akibat dari efek samping penggunaan sediaan topikal. Edema terjadi akibat meningkatnya volume cairan diluar sel (ekstraseluler) dan diluar pembuluh darah (ekstravaskuler) yang terakumulasi di dalam jaringan-jaringan tubuh (Hakim et al., 2018).

Hasil penelitian uji iritasi akut dermal menunjukkan bahwa pada pengujian kelinci pertama, kelinci kedua dan kelinci ketiga tidak terdapat eritema maupun edema pada setiap titik pengamatan pada jam ke 1, jam ke 24, jam ke 48 dan jam ke 72, baik itu pada perlakuan sampel maupun perlakuan kontrol, sehingga pada perhitungan indeks iritasi primer didapatkan hasil skoring eritema dan edema pada jam ke 1, jam ke 24, jam

ke 48 dan jam ke 72 adalah 0, jika dilihat dari kategori respon indeks iritasi primer, maka nilai tersebut termasuk dalam kategori sebagai bahan yang tidak mengiritasi kulit. Hasil ini menunjukkan bahwa larutan ambroxol tergolong tidak membahayakan jika digunakan secara topikal.

Ambroxol adalah agen baru untuk pengobatan infeksi terkait biofilm dengan menghambat pembentukan biofilm pada patogen, sehingga berpotensi diberikan pada sediaan topikal untuk mengobati infeksi akibat biofilm. Salah satu penyakit infeksi akibat biofilm adalah ulkus kaki diabetik yang disebabkan oleh *Proteus mirabilis*. Namun pada penelitian (H. A. Abbas, 2014), Ambroxol secara signifikan menghambat pembentukan biofilm dan menghilangkan biofilm yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga ambroxol dapat digunakan untuk pengobatan infeksi kaki diabetik *Proteus mirabilis*. Sejauh ini ambroxol belum tersedia pada sediaan topikal, tapi hanya tersedia pada sediaan oral, maka sebagai langkah awal perlunya melakukan uji iritasi akut dermal untuk melihat respon terhadap kulit.

Pada penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk melihat adanya kelainan pada organ yang ditimbulkan akibat pemberian sediaan uji (BPOM RI, 2020). Uji histopatologi ini dilakukan di Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin. Pengujian ini menggunakan larutan ambroxol dengan dosis 30mg/5ml. Hasil uji histopatologi yang dapat dilihat pada **Gambar 4.** dan **Gambar 5.** menunjukkan adanya eritema yang terbentuk dalam kategori parah, jika dilihat dari tabel penilaian reaksi kulit dapat diberikan skor “4”. Sedangkan edema yang terbentuk berada dalam kategori

sedang, yang jika dilihat pada tabel penilaian reaksi kulit, maka dapat diberikan skor “3”. Dari hasil skoring yang telah dilakukan, hasil uji iritasi secara mikroskop pada larutan ambroxol dengan dosis 30mg/5ml yaitu mengiritasi. Adanya eritema dan udem yang muncul pada sampel kulit kelinci yang dilakukan uji histopatologi pada pengujian ini bisa terjadi akibat pencukuran yang dilakukan terhadap hewan coba, kulit kelinci ada yang tergores sehingga kulit yang terluka ini berarti barrier pertama dari kulit terganggu dan kulit yang lecet memang menyebabkan permeabilitas meningkat. Menurut (Fatmawaty et al., 2016), pada dasarnya sensitifitas kulit hewan coba sedikit berbeda dengan kulit manusia. Khususnya hewan coba kelinci, tingkat iritasinya sangat mudah terlihat. Indeks iritasi pada manusia masih tidak bisa dipastikan apabila nilai pada hewan coba memiliki iritasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil indeks iritasi primer larutan ambroxol dengan dosis 15mg/5ml dan dosis 30mg/ml secara makroskopis adalah 0, sedangkan pengujian secara mikroskopis didapatkan skor eritema adalah 4 dan skor edema adalah 3.
2. Berdasarkan hasil uji iritasi secara makroskopis larutan ambroxol tidak mengiritasi kulit kelinci, sedangkan pada uji secara mikroskopis larutan ambroxol mengiritasi kulit.

B. Saran


Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji toksisitas dengan menggunakan metode yang berbeda agar didapatkan informasi lebih mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA


- Abbas, H. A. (2014). *Ambroxol blocks swarming and swimming motilities and inhibits biofilm formation by Proteus mirabilis isolated from diabetic foot infection*. *Ambroxol blocks swarming and swimming motilities and inhibits biofilm formation by Proteus mirabilis isolated from diabetic.*
- Abbas, H. A., & Hegazy, W. A. H. (2017). *Targeting the Virulence Factors of Serratia marcescens by Ambroxol*. 76(2), 27–32.
- Abbas, H. a, Serry, F. M., & El-masry, E. M. (2012). *Combating Pseudomonas aeruginosa biofilms by potential biofilm inhibitors*. 2(2), 66–72. www.asianpharmaonline.org
- Annita. (2018). *Formula dan Tingkat Iritasi Akut Dermal Serbuk Biji Kelor (Moringan oleifera) Pada Sediaan Lulur Krim Dengan Metode Draize Test*. 7(2), 44–68.
- Beeh, K. M., Beier, J., Esperester, A., & Paul, L. D. (2018). *Antiinflammatory Properties of Ambroxol*. 557–562.
- BPOM RI. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pedoman Uji Toksisitas Praktinik Secara in Vivo*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25.
- Cabral-Romero, C., Martínez-Sanmiguel, J. J., Diana, R.-P., del Socorro, F.-G. M., & Hernandez-Delgadillo, R. (2013). *Antibacterial and Anti-Biofilm Activities of Ambroxol Against Oral Bacteria*. *The Pharma Innovation*, 2(3, Part A), 52.
- Depkes RI. (1995). *Farmakope Indonesia edisi IV*. In *Departemen Kesehatan Republik Indonesia*.
- Depkes RI. (2020). *Farmakope Indonesia edisi VI*. In *Departemen Kesehatan Republik Indonesia*.
- Fatmawaty, A., Manggau, M. A., Tayeb, R., & Adawiah, R. Al. (2016). *Uji Iritasi Krim Hasil Fermentasi Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L .) Dengan Variasi Konsentrasi Emulgator Novemer Pada Kulit Kelinci (Oryctolagus cuniculus)*. 1(2), 62–65.
- Fay, D. L. (2020). *Farmasi Dalam prespektif Islam*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–121.
- Hakim, Z. R., Purbarini, K. A., & Tjiptasurasa, T. T. (2018). *Uji Iritasi Akut Dermal Pada Hewan Uji Kelinci Albino Terhadap Sediaan Body Lotion Ekstrak Kulit Biji Pinang (Areca Catechu L.)*, 18(1), 213–221.


- Hikmat, Hazim, Mushthafa, Abdul (2016). *Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*. Jakarta.
- Homenta, H. . (2016). *Infeksi Biofilm Bakterial*. *Jurnal E-Biomedik*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.35790/ebm.4.1.2016.11736>
- Hussain, T., Jamal, M., & Tasneem, U. (2015). *Penelitian & Ulasan : Jurnal Mikrobiologi dan Bioteknologi.*, 1–14.
- Jamal, M., Tasneem, U., Hussain, T., & Andleeb, S. (2015). *Historical Background of Biofilm*. *Research & Reviews: Journal of Microbiology and Biotechnology*, 4(3), 1–14.
- Li, F., Wang, W., Hu, L., Li, L., & Yu, J. (2011). *Effect of ambroxol on pneumonia caused by pseudomonas aeruginosa with biofilm formation in an endotracheal intubation rat model*. *Chemotherapy*, 57(2), 173–180.
- Masykur, M., & Solekhah, S. (2021). *Tafsir Quran Surah Al-'Alaq Ayat 1 Sampai 5 (Perspektif Ilmu Pendidikan)*. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 73.
- Masood, Ehsan (2009). *Ilmuwan-ilmuwan Muslim Pelopor Hebat Di Bidang Sains Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mu'nisa et al. (2022). *Percobaan Memahami Perawatan Dan Kesejahteraan Hewan Percobaan*. 109.
- Niswah, U., Farmasi, P. S., Farmasi, F., & Hasanuddin, U. (2021). *Ketoprofen dari sediaan gel dengan metode respons surface optimization of propylene glycol and ethanol concentration on the release respons og ketoprofen in gel preparation using response surface*
- Novard, M. F. A., Suharti, N., & Rasyid, R. (2019). *Gambaran Bakteri Penyebab Infeksi Pada Anak Berdasarkan Jenis Spesimen dan Pola Resistensinya di Laboratorium RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014-2016*. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2S), 26. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i2s.955>
- Nur, E. (2019). *uji sediaan gel antijerawat fraksi larut etil asetat ekstrak etanol daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) pada kelinci*. 32(2), 33–37.
- Peresia, S., Hapsari, I., & Susanti. (2009). *Uji Fototoksisitas Sediaan Krim Muka "X" Terhadap Kelinci Putih Jantan*. *Pharmacy*, 6(1), 82–93.
- Puji, R. (2018). *the Effect of Using the Same Individual Testing Animal*. 12(1), 42–52.
- Purbowati, R. (2018). *Hubungan Biofilm dengan Infeksi: Implikasi pada Kesehatan Masyarakat dan Strategi Mengontrolnya*. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30742/jikw.v5i1.1>

- Rene, H. D., José, M. S. J., Isela, S. N. R., & Claudio, C. R. (2014). *Effects of ambroxol on Candida albicans growth and biofilm formation*. 57(4), 228–232. <https://doi.org/10.1111/myc.12147>
- Rivai, H., & Andalas, U. (2018). *Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Ambroxol Hidroklorida dalam Tablet dengan Metode Absorbansi dan Luas Daerah di Bawah Kurva secara Spektrofotometri Ultraviolet Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Ambroxol Hidroklorida dalam Tablet dengan Me. March*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29423.53927>
- Sahputri, J., Lindarto, D., & Ganie, R. A. (2018). *Hubungan Pembentukan Biofilm Oleh Bakteri Gram Negatif Dengan Resistensi Antibiotik Pada Wanita Diabetes Melitus Tipe 2*. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh, 4(1), 50. <https://doi.org/10.29103/averrous.v4i1.804>
- Shihab, Q. 2012. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 11. Jakarta: Penerbit Lentera Hati
- Strajhar, P., Schmid, Y., et al (2016). *Pembuatan Cairan Fiksatif Untuk Jaringan Histologi*. *Nature Methods*, 7(6), 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997> <http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>
- Ulfa, A. M. U., Winahyu, D. A., & Resmawati. (2017). *Validasi Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (Kckt) Pada Pemisahan Ambroksol Hcl Dalam Sediaan Obat Sirup Merek X*. In Jurnal Analisis Farmasi (Vol. 2, pp. 214–220).
- Widyaningsih, L. (2009). *Pengaruh Penambahan Kosolven Propilen Glikol Terhadap Kelarutan Asam Mefenamat*.

LAMPIRAN***Lampiran 1. Pembuatan Larutan Ambroxol***

Lampiran 2. Prosedur Uji Iritasi



Lampiran 3. Uji Histopatologi

Lampiran 4. Perhitungan Indeks Iritasi Primer

Rumus Indeks Iritasi Primer

$$\text{Indeks iritasi primer} = \frac{A-B}{C}$$

Keterangan :

A : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan sampel pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan

B : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan kontrol pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan

C : Jumlah hewan

Kelinci I	
<p>Responden Pertama</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> <p>$\frac{0-0}{1} = 0$</p>	<p>Responden Kedua</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> <p>$\frac{0-0}{1} = 0$</p>

<p>Responden Ketiga</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> $\frac{0-0}{1} = 0$	<p>Responden Keempat</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> $\frac{0-0}{1} = 0$
---	--

Kelinci II	
<p>Responden Pertama</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> $\frac{0-0}{1} = 0$	<p>Responden Kedua</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> $\frac{0-0}{1} = 0$

<p>Responden Ketiga</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> <p>$\frac{0-0}{1} = 0$</p>	<p>Responden Keempat</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> <p>$\frac{0-0}{1} = 0$</p>
---	--

Kelinci III	
<p>Responden Pertama</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> <p>$\frac{0-0}{1} = 0$</p>	<p>Responden Kedua</p> <p>Diketahui :</p> <p>A : 0</p> <p>B : 0</p> <p>C : 1</p> <p>Dijawab</p> <p>Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$</p> <p>$\frac{0,5-0}{1} = 0$</p>

Responden Ketiga	Responden Keempat
Diketahui :	Diketahui :
A : 0	A : 0
B : 0	B : 0
C : 1	C : 1
Dijawab	Dijawab
Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$	Indeks iritasi primer = $\frac{A-B}{C}$
$\frac{0-0}{1} = 0$	$\frac{0-0}{1} = 0$

Lampiran 5. Lampiran Surat Izin Penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 202 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan
 di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : vera offiana
 NIM : 70100118035
 Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2021-2022
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Farmasi
 Alamat : jalan toddopuli 1, no 17A
 No. HP. : 082292311943

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Uji Iritasi Akut Dermal Larutan Ambroxol.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar** dari tanggal **18 Juli 2022.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

September 2022

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
 NIP. 196605081987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal

Lampiran 6. Lampiran Kode Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
 "ETHICAL EXPEDITED"

NO. A.092/KEPK/FKIK/X/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : VERA OLVIANA, MUNIFAH WAHYUDDIN
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"UJI IRITASI AKUT DERMAL LARUTAN AMBROXOL"

"Ambroxol Solution Dermal Acute Irritation Test"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
This declaration of ethics applies during the period Oct 26, 2022 until Oct 26, 2023

October 26, 2022

Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syutirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 7. Hasil Uji Histopatologi Kulit Kelinci



**LABORATORIUM TERPADU
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**
Kompleks Kampus Unhas, Jl. Sunu, Baraya, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90213


Tipe pembacaan : Pembacaan Histopatologi

Hewan : Kelinci

Tipe sampel : Kulit

Kostumer : Mahasiswa

Hasil : Menunjukkan adanya eritema dan edema pada sediaan preparat yang dihasilkan.



Kulit 4x. Edema (panah biru); erythema (panah hitam), HE.

UNIVERSITAS
HASANUDDIN
MAKASSAR



Kulit 40x. Edema (panah biru); erythema (panah hitam), HE. Skala bar 100 μ m.

Skoring untuk sampel kelinci yang terlihat dari gambaran histopatologi adalah eritema yang terbentuk dalam kategori parah, sedangkan edema yang terbentuk berada dalam kategori sedang menuju parah (berat).

Makassar, 29 Desember 2022.

Drk. Nurul Sulfi Andini, M.Sc

*Jika ada pertanyaan, terkait hasil pembacaan silahkan menghubungi via email labterpadu.kh.uh@gmail.com atau via WA 085342038124 (drh.Nurul chat only)

M A K A S S A R

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian



Penimbangan Ambroxol



Sediaan Larutan Ambroxol



Pencukuran Hewan Coba



Penotoloan Larutan Uji



Pemberian Kasa dan Plester



Pembersihan Residu Larutan Uji

RIWAYAT HIDUP



Mahasiswa bernama lengkap Vera Olfiana, lahir di Polmas, tepatnya pada tanggal 06 September 2000. Merupakan buah hati dari pasangan Anthon Panggua dan Fachita, yang terlahir sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Saat ini penulis tinggal di jln. Toddopuli 1 nomor 17A. Mengawali pendidikan dasar di SDN 34 Deteng-deteng dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Majene, Kab. Majene, kemudian menamatkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Majene, Kab. Majene. Penulis memutuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan memilih Jurusan Farmasi sebagai pilihan pertama. Akhirnya ia pun lulus melalui jalur UM-PTKIN dan tercatat sebagai Mahasiswa Farmasi UIN Alauddin Makassar angkatan 2018.