

**ANALISIS GC-MS SENYAWA AKTIF ANTIOKSIDAN DARI FRAKSI
ETIL ASETAT RIMPANG LEMPUYANG GAJAH
(*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Alauddin Makassar

Oleh :

YUSRIL AR

NIM : 70100118045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yusril AR
NIM : 70100118045
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai/ 21 Januari 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Villa Pattallassang Indah 1
Judul : “Analisis GC-MS Senyawa Aktif Antioksidan Dari Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 27 Februari 2023

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Yusril AR
70100118045

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis GC-MS Senyawa Aktif Antioksidan Dari Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.)” yang disusun oleh Yusril AR, NIM: 70100118045, Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 27 Februari 2023 M** yang bertepatan dengan tanggal **6 Sya’ban 1444 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Samata, 27 Februari 2023 M
6 Sya’ban 1444 H

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes
Sekretaris : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si
Pembimbing I : Haeria, S.Si, M.Si
Pembimbing II : apt. H. Muh. Rusdi, S.Si, M.Si
Penguji I : Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si
Penguji II : Dr. Asriyah M.Pd.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada nabiullah Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul “Analisis GC-MS Senyawa Aktif Antioksidan Dari Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan dan kesulitan, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, bantuan, serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
11. Apt. Nursyamsi Dhuha., S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Haeria, S.Si, M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. apt., H. Muh. Rusdi, S.SI, M.Si, selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Dr. Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si., selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

15. Dr. Asriyah M.Pd.I, selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
17. Teman- teman SUSPENSI (Farmasi Angkatan 18) yang tak henti-hentinya memberi semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul dalam tahapan penyusunan skripsi

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini, Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Samata, 27 Februari 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional	3
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka	4
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Sm.).....	7
B. Antioksidan.....	12
C. Metode Preparasi Sampel	17

D.	Uji Senyawa Antioksidan	27
E.	Tinjauan Islam	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		32
A.	Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	32
B.	Pendekatan Penelitian.....	32
C.	Sampel.....	32
D.	Alat dan Bahan.....	32
E.	Cara Kerja.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
A.	Hasil Penelitian.....	39
B.	Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....		56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Partisi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah.....	39
Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Rimpang Lempuyang Gajah.....	39
Tabel 3. Berat Fraksi Hasil Fraksiasi dengan KCV yang Telah diuapkan dan Memiliki Aktivitas Antioksidan Setelah Penetasan DPPH.....	41
Tabel 4. Hasil Analisis Senyawa Pada Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dengan GC-MS Fraksi 3 (2:4).....	43
Tabel 5. Hasil Analisis Senyawa Pada Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dengan GC-MS Fraksi 4 (2:8).....	45
Tabel 6. Hasil Analisis Senyawa Pada Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dengan GC-MS yang Memiliki Aktivitas Antioksidan dari Fraksi 3 (2:4) dan Fraksi 4 (2:8).....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penampang melintang daun lempuyang gajah.....	9
Gambar 2. Batang daun dan pembungaan lempuyang gajah.	9
Gambar 3. Rimpang Lempuyang Gajah.....	10
Gambar 4. Reaksi penetralan DPPH.....	17
Gambar 5. Profil KLT dengan Eluen N-heksan : Etil Asetat (8:2).....	40
Gambar 6. Profil KLT dengan Eluen N-heksan : Etil Asetat (4:2).....	40
Gambar 7. Profil KLT dengan Eluen N-heksan : Etil Asetat (2:4).....	40
Gambar 8. Profil KLT dengan Eluen N-heksan : Etil Asetat (2:8).....	41
Gambar 9. Identifikasi Noda Lempeng KLT.....	41
Gambar 10. Penampakan Noda Setelah Ditetesi H ₂ SO ₄ 10%	42
Gambar 11. Penampakan Noda Setelah Dielusi dan Ditetesi DPPH.....	42
Gambar 12. Spektrum GC-MS Fraksi 3 (2:4).....	43
Gambar 13. Spektrum GC-MS Fraksi 4 (2:8).....	43
Gambar 14. Sampel lempuyang gajah	80
Gambar 15. Pencucian sampel.....	79
Gambar 16. Proses pengeringan sampel	79
Gambar 17. Proses meserasi	81
Gambar 18. Pemekatan ekstrak.....	80
Gambar 19. Ekstrak metanol kental.....	81
Gambar 20. Proses partisi aquadest dan etil asetat	80
Gambar 21. Ekstrak pekat etil asetat hasil partisi	81
Gambar 22. Skrining fitokimia ekstrak etil asetat.....	81


Gambar 23. Fraksinasi ekstrak etil asetat dengan berbagai perbandingan eluen.. 82

Gambar 24. Karakterisasi dengan GC-MS..... 83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	66
Lampiran 2. Perhitungan Rendemen dan Pembuatan Pereaksi.....	77
Lampiran 3. Perhitungan Nilai Rf Noda dengan Penetasan DPPH	78
Lampiran 4. Gambar Penelitian	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Yusril AR
NIM : 70100118045
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : ANALISIS GC-MS SENYAWA AKTIF ANTIOKSIDAN DARI FRAKSI ETIL ASETAT RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.)

Riskesmas 2018 melaporkan peningkatan prevalensi penyakit degeneratif yang dapat disebabkan oleh radikal bebas. Lempuyang gajah telah lama digunakan berbagai etnis di Indonesia maupun etnis lainnya sebagai obat tradisional maupun sebagai bahan jamu. Bagian rimpang lempuyang gajah diketahui memiliki berbagai jenis metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui karakter metabolit sekunder larut etil asetat pada rimpang lempuyang gajah yang berpotensi sebagai antioksidan sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pembuatan sediaan yang berfokus pada pengobatan penyakit degeneratif. Pada penelitian ini dilakukan metode ekstraksi meserasi menggunakan pelarut metanol. Ekstrak metanol kemudian dipartisi dengan metode partisi cair-cari menggunakan pelarut n-heksan dan etil asetat. Ekstrak etil hasil partisi dilanjutkan dengan skrining fitokimia yang menunjukkan rimpang lempuyang gajah memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, triterpenoid dan tannin. Kemudian dilakukan fraksinasi dengan menggunakan KCV dan didapatkan 4 fraksi yang kemudian diuji aktivitas antioksidannya dengan metode KLT-bioautografi menggunakan DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazil) dan dikarakterisasi menggunakan Gas Chromatography–Mass Spectroscopy (GC-MS). Analisis dengan Gas Chromatography–Mass Spectroscopy (GC-MS) menunjukkan senyawa-senyawa yang beraktifitas sebagai antioksidan yaitu: Disulfide, methyl 1-(methylthio)propyl; 2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 2,6,9,9-tetramethyl-, (E,E,E)-; (1R,4aR,7R,8aR)-7-(2-Hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyldecahydronaphthalen-1-ol; 9,12 Octa decadienoic acid, methyl ester, (E,E)-; Glycylsarcosine; Oxiraneundecanoic acid, 3-pentyl-, methyl ester, cis-; 1-Heptatriacotanol; Oleic Acid; Hexadecanoic acid, methyl ester; Naringin; n-Hexadecanoic acid; 10-Octadecenoic acid, methyl ester; Benzoic acid, 3-hydroxy-; tert-Hexadecanethiol.

Kata kunci : Lempuyang Gajah, Antioksidan, GC-MS

ABSTRACT

Name : Yusril AR
NIM : 70100118045
Department : Farmasi
Title : ANALYSIS OF GC-MS ANTIOXIDANT ACTIVE COMPOUNDS FROM ETHYL ACETATE FRACTION OF LEMPUYANG GAJAH RHIZOME (*Zingiber zerumbet* (L.) sm.)

Risikesdas 2018 reported an increase in the prevalence of degenerative diseases that can be caused by free radicals. Lempuyang gajah has long been used by various ethnicities in Indonesia and other ethnicities as traditional medicine and as an ingredient in herbal medicine. The rhizome of elephant lempuyang is known to have various types of secondary metabolites that have the potential to be antioxidants. This study aims to identify and determine the character of secondary metabolites soluble ethyl acetate in the lempuyang gajah rhizomes which have the potential to be antioxidants so that they can be used as a foundation in making preparations that focus on the treatment of degenerative diseases. In this study, a matching extraction method was carried out using methanol solvent. The methanol extract is then partitioned by the liquid-liquid partition method using n-hexane solvents and ethyl acetate. Partitioned ethyl extract was followed by phytochemical screening which showed that the lempuyang gajah rhizome contains alkaloids, flavonoids, triterpenoids and tannins. Then fractionation was carried out using KCV and 4 fractions were obtained which were then tested for antioxidant activity using the method KLT-bioautografi use DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) and characterized using Gas Chromatography–Mass Spectroscopy (GC-MS). Analysis with Gas Chromatography–Mass Spectroscopy (GC-MS) shows compounds that are active as antioxidants, namely: Disulfide, methyl 1-(methylthio)propyl; 2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 2,6,9,9-tetramethyl-, (E,E,E)-; (1R,4aR,7R,8aR)-7-(2-Hydroxypropan-2-yl)-1,4a dimethyldecahydronaphthalen-1-ol; 9,12 Octa decadienoic acid, methyl ester, (E,E)-; Glycylsarcosine; Oxiraneundecanoic acid, 3-pentyl-, methyl ester, cis-; 1-Heptatriacotanol; Oleic Acid; Hexadecanoic acid, methyl ester; Naringin; n-Hexadecanoic acid; 10-Octadecenoic acid, methyl ester; Benzoic acid, 3-hydroxy-; tert-Hexadecanethiol.

Keywords : *Lempuyang Gajah, Antioxidant, GC-MS*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riskesmas 2018 melaporkan peningkatan prevalensi penyakit degeneratif yang dapat disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasi molekul lain, antioksidan dapat memberikan perlindungan endogen dan tekanan oksidatif eksogen dengan menangkap radikal bebas. Radikal bebas yang dihasilkan senyawa oksigen dan nitrogen merupakan salah satu penyebab utama penuaan akibat gangguan regulasi metabolisme pernafasan sel melibatkan pengurangan oksigen yang tidak lengkap di mitokondria dan produksi anion superoksida, radikal hidroksil. Antioksidan berfungsi untuk menghambat reaksi radikal bebas. Antioksidan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit yaitu sebagai antipenuaan, perlindungan dari ROS (Reactive Oxygen Species) akibat stress oksidatif dan perlindungan dari UV (Sinar Ultraviolet) (Haerani, Chaerunisa, & Subarnas, 2018).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup menyebabkan masyarakat pada masa kini lebih mudah terkena berbagai serangan jenis penyakit kronik yang amat berbahaya. Bertitik-tolak kepada masyarakat sekarang mulai sadar dan coba mengubah gaya hidup mereka dengan kembali menggunakan yang bersumber dari alam (back to nature), termasuk dalam aspek kesehatan. Tanaman menghasilkan banyak antioksidan untuk mengendalikan stres oksidatif disebabkan oleh sinar matahari dan oksigen dan

dapat menjadi sumber senyawa baru dengan aktivitas antioksidan (Haerani, Chaerunisa, & Subarnas, 2018).

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan sumber daya alam, yang bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan. Zingiber zerumbet telah lama digunakan berbagai etnis di Indonesia maupun etnis lainnya sebagai obat tradisional maupun sebagai bahan jamu (Silalahi, 2018). Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) sebagai salah satu agen antioksidan tumbuh melimpah di Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya penelitian terdahulu oleh Karimah pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa hasil pengujian fitokimia rimpang lempuyang gajah terbukti mengandung terpenoid, flavonoid dan fenol. Adapun penelitian lain rimpang lempuyang gajah yang dilakukan oleh Amaliah pada tahun 2021 didapatkan aktifitas antioksidan pada ekstrak fraksi etil asetat nilai IC_{50} 69,476 ppm yang berarti memiliki aktifitas antioksidan yang kuat.

Metode GC-MS merupakan metode dengan mekanisme pemisahan sampel yang dilakukan dengan metode kromatografi gas, sedangkan analisis menggunakan MS (Mass spectroscopy). Metode GC-MS memiliki sensitivitas tinggi sehingga dapat memisahkan senyawa yang saling bercampur dan mampu menganalisa berbagai senyawa walaupun dalam kadar/ konsentrasi yang rendah (Gandjar & Rohman, 2013). GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. (Universitas Gajah Mada, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian terhadap tumbuhan lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) untuk

mengetahui apakah golongan senyawa aktif antioksidan dan bagaimana karakteristiknya dari fraksi etil asetat dengan menggunakan metode GC-MS.

B. Rumusan Masalah

1. Apa golongan senyawa aktif antioksidan dari fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah ?
2. Bagaimana karakteristik senyawa aktif antioksidan dari fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah dengan menggunakan metode GC-MS ?

C. Definisi Operasional

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Antioksidan adalah zat yang menghambat proses oksidasi terhadap sistem atau penyusun utama sistem.
- b. Analisis GC-MS (*Gas Chromatography–Mass Spectrometry*) merupakan instrument gabungan dari alat GC dan MS. Sampel akan diidentifikasi terlebih dahulu dengan alat GC, kemudian diidentifikasi dengan alat MS. GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. GC-MS dapat mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif.
- c. Kromatografi Gas adalah prinsip kerjanya didasarkan pada pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, karena senyawa ini diangkut oleh gas

pembawa ke kolom pemisahan. Setiap sambungan akan memiliki kecepatan yang berbeda untuk bergerak melalui poros sesuai dengan nilai polaritasnya.

- d. Spektrofotometri Massa adalah teknik analisis berdasarkan pemisahan berkas ion menurut rasio massa untuk mengisi dan mengukur intensitas berkas ion ini. Informasi yang diperoleh dari spektrum MS adalah berat ion, yaitu massa molekul isolat ditambah atau dikurangi sumber ion.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratoium murni untuk menganalisis senyawa aktif antioksidan pada fraksi etuil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) menggunakan instrument GC-MS.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya dimana ini bertujuan untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, lalu dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Wicaksono (2013) sebelumnya sudah ditentukan bahwa daun lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) mempunyai aktivitas antioksidan, dengan hasil yang didapat adalah fraksi semipolar ekstrak etanol 96% daun lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* Smith.) memiliki aktivitas antioksidan yang lemah karena lebih dari 200 $\mu\text{g/mL}$, dengan IC_{50} 228,49 $\mu\text{g/mL}$ menggunakan spektrofotometer UV-VIS dan 255,35 $\mu\text{g/mL}$ dengan alat ELISA Reader.
2. (Hanwar, Dewi, Suhendi, & D.K, 2015). Analisis Profil Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* Smith) Menggunakan

Kromatografi Spektroskopi Massa Terderivatisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol lempuyang gajah dari dua daerah (Solo dan Yogyakarta) setelah diderivatisasi dan menentukan tingkat zerumbon nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan profil metabolit sekunder ekstrak etanol lempuyang gajah dari Solo dan Yogyakarta, namun tingkat zerumbon yang tidak berbeda dalam dua ekstrak adalah 13,00% (Solo) dan 13,35% (Yogyakarta).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indriani pada tahun 2020 yang berjudul “Isolasi Senyawa Bioaktif Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) serta Uji Toksisitas terhadap *Artemia salina* Leach” bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa bioaktif dari fraksi etil asetat rimpang Z. zerumbet serta menguji tingkat toksisitasnya terhadap larva *Artemia salina* Leach dengan menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Tahap isolasi senyawa bioaktif dilakukan dengan maserasi menggunakan aseton yang selanjutnya diekstraksi partisi cair-cair dengan n-heksana dan etil asetat, fraksinasi serta pemurnian senyawa dari fraksi etil asetat rimpang Z. zerumbet. Identifikasi senyawa bioaktif dilakukan dengan menggunakan spektrometer GC-MS. Hasil penelitian menunjukkan senyawa hasil isolasi dari fraksi etil asetat rimpang Z. zerumbet bersifat sangat toksik dengan nilai LC₅₀ sebesar 4,107 µg/mL. Uji fitokimia menunjukkan bahwa fraksi aktif mengandung terpenoid. Senyawa bioaktif hasil isolasi dari fraksi etil asetat rimpang Z. zerumbet diduga merupakan germakron, dengan titik leleh 55-56 °C.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin menguji dan mengetahui apakah golongan senyawa aktif antioksidan dari fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah dan bagaimana karakteristiknya dengan menggunakan metode GC-MS.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa golongan senyawa aktif antioksidan dari fraksi etil asetat.rimpag lempuyang gajah.
2. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik senyawa aktif antioksidan dari fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah dengan menggunakan metode GC-MS.

G. Manfaat Penelitian

1. Untuk Institusi Pendidikan

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh UIN Alauddin Makassar sebagai tambahan pengetahuan rimpang lempuyang gajah memiliki antioksidan berdasarkan dari hasil analisis menggunakan GC-MS.

2. Untuk Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini merupakan ilmu yang diperoleh selama kuliah serta wawasan tentang rimpang lempuyang gajah memiliki antioksidan berdasarkan dari hasil analisis menggunakan GC-MS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.)

Zingiber merupakan genus tunggal pada tribe Zingibereae, namun memiliki banyak spesies. Lempuyang (*Zingiber spp.*) merupakan spesies dari Zingiber yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat lokal Indonesia sebagai obat tradisional khususnya sebagai bahan jamu (Burkil 1966; de Guzman and Siemonsma 1999).

Secara umum lempuyang atau yang dikenal juga sebagai wild gingers dibedakan menjadi tiga spesies yaitu lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*), lempuyang emprit/pahit (*Zingiber americans*), dan lempuyang wangi (*Zingiber aromaticum*) (Husni dan Widjaja 1989), namun de Guzman and Siemonsma (1999) dan Wahyuni et al. (2013) menggolongkan lempuyang menjadi tiga varietas yaitu varietas zerumbet, emprit, dan aromaticum.

1. Klasifikasi

Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm..) juga dikenal sebagai Lempuyang kebo atau lempuyang kapur (Jawa) dan lampojang paek (Madura) mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : *Plantae*
Subkingdom : *Tracheobionta*
Superdivisi : *Spermatophyta*
Divisi : *Magnoliophyta*

Kelas : *Liliopsida*
 Subkelas : *Commelinidae*
 Ordo : *Zingiberales*
 Famili : *Zingiberaceae*
 Genus : *Zingiber*
 Spesies : *Zingiber zerumbet* (L.) Sm.

(*Zingiber zerumbet* (plantamor.com))

2. Nama Lokal


- a. Daerah Malaya : Lempuyang hajah, lempuyang kapur,
 lempuyang kebo
- b. Sunda : Lempuyang badak
- c. Madura : Lempuyang paek
- d. Jawa : Lempuyang gajah, lempuyang kapur,
 lempuyang kebo

(Heyne, 1950)

3. Anatomi dan Morfologi


Anatomi daun lempuyang gajah memiliki ikatan pembuluh pada tulang daun utama sebanyak 10 buah, banyak kristal silika pada jaringan bunga karang, sel jaringan palisade melebar dengan ukuran 25-37,5 x 12,5 – 15 μm , jumlah sel epidermis pada abaksial daun lebih dari 175 buah/satuan bidang pandangan (Silalahi, 2018). *Zingiber zerumbet* dapat dikenali dengan adanya pulvinus antara dasar tangkai daun (petiole) dan lidah daun (ligule)

(Sabu 2003; Kress et al. 2002). Anatomi daun *Zingiber zerumbet* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Penampang melintang daun lempuyang gajah (Husin dan Wijaya 1987).

Lempuyang memiliki batang tegak dengan tinggi sekitar 1-2m. Daun dan perbungaan dari *Zingiber aromaticum* berbentuk pinecone muncul dari rimpang yang tebal atau batang bawah yang tumbuh tepat di bawah permukaan tanah. Daun kadang-kadang berwarna keunguan di bawah tunas muda, tipis dengan ukuran sekitar 25-35 cm dengan pelepah mereka sangat kuat di permukaan bawah. Tangkai daun berukuran sekitar 6cm panjang sedangkan ligule sangat tipis, utuh, dan lebar, panjangnya sekitar 1,5-2,5 cm (Gambar 2).



Gambar 2. A. Batang dan daun lempuyang gajah (kiri) ; B. Pembungaan lempuyang gajah (kanan) (Yob et al. 2011).

Daun tersusun secara bergantian sepanjang batang semu (pseudostem) yang melengkung dan dapat tumbuh mencapai 1- 2m panjangnya. Pembungaan (inflorescence) berukuran 6-12 cm panjangnya, bewarna hijau ketika masih muda dan menjadi merah ketika sudah tua. Pembungaan muncul dari dari bagaian pseudostem dari daun dan berdekatan dan saling overlapping dengan satu braktea dengan braktea lainnya dan membentuk kantong terbuka pada saat bunga terbentuk (Gambar 2).

Morfologi rimpang lempuyang gajah adalah berbau aromatik dengan rasa pedas mirip mentol dan agak pahit. Rimpang berbentuk agak pipih atau agak bulat telur terbalik, bagian ujung bercabang-cabang pendek, pada tiap cabang terdapat parut melekok ke dalam dengan potongan sepanjang 7-18 cm dan tebal 2,5-5 cm. (Gambar 3)



Gambar 3. Rimpang Lempuyang Gajah (Source: shorturl.at/sUVWX)

Bagian luarnya berwarna coklat kekuningan sampai kuning pucat dan beralur-alur memanjang serta memberikan bekas patahan tidak rata dan berserat (Dep.Kes.RI, 1978).

4. Kandungan Kimia

Rimpang lempuyang gajah mengandung minyak atsiri 0,82% yang terdiri dari kariofilen, ar-kurkumen, y-kadinen, kariofilenoksid,

humulenepoksid I, II, III, humulenol I,II, zerumbonoksid. Pada ras tertentu ditemukan kamfen, humulen, zerumbon, mirsen, α -terpineol, γ -terpinen, zerumbonoksid, (+)-humulenol I, (+)-humulenol II, heksahidrohumulenol II, asetil afzelin, diasetil afzelin, kurkumol, kurkumenol, isokurkumenol, prokurkumenol, kurkumadiol, kurdion, dehidrokurdion, furanodienon, isofuranodienon, zederon, furanodien (suatu turunan germaken), kurserenon, epikurserenon, isofuranogermakren, furanogermakren, asam 4-metoksisinamat, kurkuminoid (turunan diaril heptanoid) (Sudarsono, 2002). Uji fitokimia dari ekstrak etanol rimpang tersebut positif adanya komponen fenolik, tanin, asam amino, karbohidrat, dan alkaloid (Somchit et al., 2005). *Zingiber zerumbet* dilaporkan mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, poliphenol dan essensial oil (Silalahi, 2018). Senyawa hasil isolasi dari fraksi etil asetat rimpang *Z. zerumbet* bersifat sangat toksik dengan nilai LC50 sebesar 4,107 $\mu\text{g/mL}$. Uji fitokimia menunjukkan bahwa fraksi aktif mengandung terpenoid (Indriani, 2020). Aktifitas antioksidan pada ekstrak fraksi etil asetat nilai IC50 69,476 ppm yang berarti memiliki aktifitas antioksidan yang kuat (Amaliah, 2021).

5. Manfaat

Zingiber zerumbet telah lama digunakan berbagai etnis di Indonesia maupun etnis lainnya sebagai obat tradisional maupun sebagai bahan jamu. Dalam bidang kuliner *Zingiber zerumbet* banyak digunakan sebagai pemberi aroma makanan (food flavoring) dan appetizer. Berbagai etnis di Asian, India, China, dan Arab telah lama memanfaatkan *Zingiber zerumbet* tujuan

pengobatan seperti sakit kepala, pembengkakan, pilek, bisul, luka dan kehilangan nafsu makan, mual dan bahkan ketidaknyamanan menstruasi (Yob et al. 2011; Prakash et al. 2011). Hasil bioessay terhadap rizoma *Zingiber zerumbet* menunjukkan sebagai anti-inflamatori, anti mikroba antipiretik dan analgesic (Jyothilakshmi et al. 2016; Tzeng et al. 2013; Murakami et al. 2002). Zerumbone dan α -caryophyllene terdapat dalam rimpang dan daun serta kedua senyawa ini pada konsentrasi tinggi menunjukkan aktivitas antiinflamasi, antiulkus, antioksidan dan antimikroba (Jaganath dan Ng, 2000; Somchit et al., 2005; Mascolo et al, 1989; Agrawal et al., 2000; Bhuiyan et al., 2009). Senyawa utama zerumbon yang diisolasi dari lempuyang gajah menunjukkan potensi sebagai anti kanker leher rahim, dibuktikan dengan uji sitotoksitas pada sel HeLa dengan metode MTT assay IC50 sebesar 11,3 μ M (2,5 μ g/ml) (Abdul et al., 2008).

B. Antioksidan

1. Definisi Antioksidan

Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasi molekul yang dapat menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu senyawa atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Adanya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada disekitarnya. Radikal bebas sangat berbahaya dikarenakan tingginya reaktivitasnya yang mengakibatkan terbentuknya senyawa radikal baru. Bila senyawa radikal baru tersebut

bertemu dengan molekul lain, maka akan terbentuk radikal baru lagi dan seterusnya hingga terjadi reaksi berantai (Rosawanti, Mulia, & Ardhan, 2018). Senyawa antioksidan akan mendonorkan satu elektronnya pada radikal bebas yang tidak stabil sehingga radikal bebas ini bisa dinetralkan dan tidak lagi mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017).

Radikal bebas dihasilkan karena beberapa faktor, seperti asap, debu, polusi, kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein dan lemaknya (Rahmi, 2017).

Aktivitas antioksidan dapat diketahui dengan nilai IC₅₀, semakin rendah nilai IC₅₀ maka aktivitas antioksidannya semakin tinggi (Rahmi, 2017).

2. Jenis-Jenis Antioksidan

Antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu antioksidan primer atau alami dan antioksidan sekunder atau sintetik.

- a) Antioksidan primer atau alami, Antioksidan yang paling banyak terdapat dalam buah-buahan, sayuran, tanaman polong-polongan, biji-bijian, teh, rempah-rempah dan anggur (Horubala 1999; Borowska, 2003). Berikut adalah pengelompokan antioksidan primer (Hurrell, 2003)

- 1) Antioksidan mineral adalah kofaktor antioksidan enzim. Keberadaannya mempengaruhi metabolisme makromolekul kompleks seperti karbohidrat. Contoh: selenium, tembaga, besi, seng dan mangan.

2) Antioksidan vitamin , dibutuhkan untuk fungsi metabolisme tubuh.

Contoh: vitamin C, vitamin E, vitamin B

3) Fitokimia adalah senyawa fenolik, yang bukan vitamin maupun mineral. Senyawa yang termasuk ke dalam golongan fitokimia adalah senyawa flavonoid. Flavonoid adalah senyawa fenolik yang memberi warna pada buah, biji-bijian, daun, bunga dan kulit. Sebagai contoh katekin adalah senyawa antioksidan paling aktif pada teh hijau dan hitam, karotenoid adalah zat warna dalam buah-buahan dan sayuran, β karoten terdapat pada wortel dapat dikonversi menjadi vitamin A, likopen banyak terdapat dalam tomat dan zeaxantin banyak pada bayam.

b) Antioksidan sekunder atau sintetis, berikut adalah contoh antioksidan sintetis: Butylated hydroxyl anisole (BHA), Butylated hydroxytoluene (BHT), Propyl gallate (PG) dan metal chelating agent (EDTA), Tertiary butyl hydroquinone (TBHQ), Nordihydro guaretic acid (NDGA) (Hamid, A. et al, 2010).


3. Mekanisme Kerja Antioksidan

Dikutip dari Rahmi (2017) Ada tiga macam mekanisme kerja antioksidan pada radikal bebas, yaitu:

a) Antioksidan primer yang mampu mengurangi dismutase (SOD), glutathion peroksidase, dan katalase stabil. Contohnya adalah superoksida yang dapat mengubah radikal superoksida menjadi molekul mengubahnya menjadi produk yang lebih.

- b) Antioksidan air pembentukan radikal bebas baru dengan cara memutus reaksi berantai dan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A (betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia.
- c) Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas.

Reaksi berantai pada radikal bebas (tanpa ada antioksidan) terdiri dari tiga tahap, yaitu:



Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal bebas (R^*) yang sangat reaktif, karena (RH) melepaskan satu atom hidrogen, hal ini dapat disebabkan adanya cahaya, oksigen atau panas. Pada tahap propagasi, radikal (R^*) akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi (ROO^*).

Radikal peroksi selanjutnya akan menyerang RH (misalnya pada asam lemak) menghasilkan hidropersida dan radikal baru. Hidrogen peroksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida dan keton (Inggrid & Santoso, 2014).

Tanpa adanya antioksidan, reaksi oksidasi lemak akan berlanjut sampai tahap terminasi, sehingga antar radikal bebas dapat saling bereaksi membentuk senyawa yang kompleks. Dengan adanya antioksidan, antioksidan memberikan atom hidrogen atau elektron pada radikal bebas (R^* , ROO^*), mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil RH . Sementara turunan radikal antioksidan (A^*) memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal semula R^* . Reaksi penghambatan antioksidan terhadap radikal lipid mengikuti persamaan reaksi sebagai berikut (Ingrid & Santoso, 2014) :




Radikal lipida



4. Uji Aktivitas Antioksidan

Metode yang umum untuk mengukur aktivitas antioksidan adalah dengan DPPH, DPPH adalah 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl. Pada metode ini antioksidan (AH) bereaksi dengan radikal bebas DPPH dengan cara mendonorkan atom hidrogen, menyebabkan terjadinya perubahan warna DPPH dari warna ungu menjadi kuning, intensitas warna diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm. Pada metode ini yang diukur adalah aktivitas penghambatan radikal bebas. Aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus berikut ini.



Gambar 4. Reaksi penetralan DPPH (Molyneux, 2003)

Aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus berikut ini :

$$\% \text{ Aktivitas antioksidan} = \frac{\text{Absorbansi kontrol} - \text{absorbansi sampel}}{\text{Absorbansi kontrol}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, makin kecil nilai absorbansi maka semakin tinggi nilai aktivitas penangkapan radikal. Aktivitas antioksidan dinyatakan secara kuantitatif dengan IC50. IC50 adalah konsentrasi larutan uji yang memberikan peredaman DPPH sebesar 50%.

C. Metode Preparasi Sampel

Isolasi merupakan teknik pemisahan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu bahan alam. Isolasi senyawa pada bahan alam terdiri dari beberapa tahap mulai dari ekstraksi, fraksinasi, kemudian pemurnian dan identifikasi (Ilyas, 2013).

1. Ekstraksi

Ekstraksi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh materi yang terkandung dalam makhluk hidup baik hewan, tumbuhan ataupun mikroba (Firdaus, Prihanto, & Nurdiani, 2013).

Secara umum, senyawa aktif yang terkandung dalam bahan alam dapat dikelompokkan menjadi dua yakni minyak atsiri dan non minyak atsiri

(contohnya flavonoid). Tiap kelompok senyawa memiliki perbedaan struktur kimia yang mengakibatkan perbedaan dalam sifat masing-masing senyawa seperti stabilitas terhadap udara, cahaya, pemanasan serta, kelarutannya (Yasni, 2013).

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam ekstraksi, diantaranya yaitu:

a. Maserasi

Metode maserasi ialah salah satu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel ke pelarut yang sesuai. Perendaman sampel pada pelarut mengakibatkan perbedaan tekanan di dalam dan luar sel sehingga dinding sel pecah dan metabolit sekunder yang terkandung dapat terlarut di cairan penyari. Dalam maserasi, semakin lama sampel melakukan kontak dengan cairan penyari maka semakin banyak metabolit yang terlarut akibat banyaknya dinding sel yang pecah. Proses ini akan berlanjut sampai terciptanya keseimbangan intrasel dan ekstrasel pada sampel. Metode maserasi memiliki keuntungan yaitu zat aktif yang diperoleh tidak akan rusak, namun kerugiannya yakni dibutuhkan cairan penyari yang cukup banyak dalam prosesnya (Chairunnisa, dkk., 2019).

b. Perkolasi

Perkolasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan melewatkan cairan penyari pada sampel sehingga senyawa organik akan ikut terbawa bersama dengan cairan tersebut (Hasrianti, dkk., 2016). Proses ekstraksi dilakukan dalam perkolator, sampel

dibasahi dengan perlahan dengan cairan penyari yang ditambahkan pada bagian atas sampel dan dibiarkan menetes perlahan di bagian bawah. Kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu sampel bahan alam senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area serta membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya (Mukhriani, 2014).

c. Sokletasi

Metode ekstraksi ini dilakukan dengan penempatan serbuk simplisia dalam sarung selulosa (dapat diganti dengan kertas saring) pada klonsong yang diletakkan di bagian bawah kondensor dan di bagian atas labu. Cairan penyari yang sesuai kemudian dituangkan ke dalam labu kemudian diatur suhu penangas dengan suhu yang lebih rendah dari suhu reflux. Keuntungan dari metode ini yakni proses ekstraksi yang berulang memungkinkan sampel dapat terekstraksi oleh cairan penyari hasil kondensasi pada reflux sehingga pelarut yang digunakan lebih hemat dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya. Kerugian dari metode ini ialah senyawa yang memiliki sifat tidak stabil terhadap perubahan suhu dapat mengalami degradasi terus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).

d. Refluks

Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dalam prosesnya. Pemanasan dapat meningkatkan efisiensi

dalam proses ekstraksi dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan penyari. Prinsip dalam metode ekstraksi ini ialah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, uap dari pelarut yang mengembun pada dinding dalam kondensor akan menetes turun kembali ke wadah. Hasil ekstraksi yang didapatkan kemudian disaring dan dipisahkan menggunakan rotary evaporator (Susanty, dkk., 2016). Kelebihan yang dimiliki metode ini ialah penggunaan waktu yang singkat dan hemat dalam penggunaan pelarut. Disamping kelebihan tersebut, kekurangan yang dimiliki metode ini ialah sampel yang digunakan harus tahan pada suhu panas (Kiswandono, 2011).

e. **Ultrasound-Assisted Solvent Extraction**

Teknik ekstraksi ini merupakan teknik yang telah dimodifikasi dengan penambahan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Penambahan ultrasound dimaksudkan untuk memberi tekanan mekanik pada sel-sel di simplisa sehingga menghasilkan ruang antar sel dan senyawa kimia pun dapat diperoleh dengan mudah. Teknik ekstraksi ini dilakukan dengan memasukkan wadah yang berisi sampel ke dalam wadah ultrasound. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014).

2. Fraksinasi dan Pemurnian

Fraksinasi merupakan metode pemisahan komponen berdasarkan perbedaan polaritas dan ukuran molekul dari elemen penyusun yang

terkandung dalam ekstrak. Fraksi-fraksi yang telah dipisahkan akan memiliki sifat fisik yang berbeda. Di awal fraksinasi tidak disarankan membuat banyak fraksi dengan alasan ditakutkan bahwa akan terjadi penyebaran 16 senyawa target dengan konsentrasi rendah di berbagai fraksi tersebut (Firdaus, dkk., 2013). Teknik kromatografi adalah teknik yang secara khusus dipakai dalam pemisahan senyawa dari kumpulan komponen kimia berdasarkan bentuk, muatan dan ukurannya. Konsep yang diterapkan dalam teknik kromatografi yakni penggunaan fase gerak dan fase diam. Terdapat bermacam-macam teknik kromatografi, meliputi kromatografi kertas (KKt), kromatografi lapis tipis (KLT), kromatografi kolom (KK), kromatografi cair (KC), kromatografi gas (KG), dan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) (Rabiu, dkk., 2020).

a. Kromatografi Gas

Kromatografi gas merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa-senyawa gas anorganik dalam suatu campuran. (Sumolang, Pontoh, & Abidjulu, 2018). Kromatografi gas digunakan untuk analisis sampel-sampel padat, cair dan gas. Sampel padat dapat diekstraksi atau dilarutkan dalam suatu pelarut sehingga dapat diinjeksikan ke dalam sistem GC, demikian juga sampel gas dapat langsung diambil dengan penyuntik (syringe) yang ketat terhadap gas (Gandjar dan Rohman, 2007).

b. Kromatografi Kertas

Prinsip kromatografi kertas yaitu metode pemisahan dari substansi menjadi komponen-komponennya yang bergantung pada distribusi suatu senyawa pada dua fase yaitu fase diam dan fase gerak, pelarut bergerak lambat pada kertas, komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Berbagai jenis pemisahan dengan kromatografi kertas dilakukan yang dikenal sebagai "analisa kapiler". Metoda ini sangat sesuai dengan kromatografi serapan dan kromatografi kertas sebagai perkembangan dari sistem partisi (Kemdikbud, 2018). Salah satu zat padat yang dapat digunakan untuk menyokong fasa tetap yaitu bubuk selulosa.

c. Kromatografi Kolom

Digunakan dalam pemisahan senyawa-senyawa organik, senyawa-senyawa nonpolar dan konsistuen-konstituen yang sulit untuk menguap (Sastrohamidjojo, 1991). Pemisahan kromatografi kolom adsorpsi didasarkan pada adsorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda-beda terhadap permukaan fase diam. Kromatografi kolom adsorpsi termasuk pada cara pemisahan cair-padat. Kromatografi cair-padat juga disebut Kromatografi Adsorpsi, metode ini banyak digunakan untuk analisis biokimia dan organik (Kemdikbud, 2018).

d. Kromatografi Lapis Tipis

Teknik kromatografi lapis tipis juga melibatkan penggunaan mekanisme adsorpsi untuk memisahkan suatu senyawa dari suatu campuran. Pemisahan didasarkan pada interaksi antara senyawa dalam campuran dan fase diam. Ini berlaku dalam pemisahan senyawa dengan berat molekul rendah. Fase diam biasanya 100 g silika gel yang dilarutkan dalam akuades untuk membuat bubur. Silika gel kemudian dituang ke dalam plat kaca dengan ukuran 20 cm × 20 cm hingga menghasilkan ketebalan 1,5 mm. Kemudian disimpan selama 1 jam pada suhu 105°C untuk memadat. Setelah itu, 10 mL ekstrak disuntikkan ke bagian bawah piring dan dibiarkan menyebar. Pelat kemudian dengan hati-hati dimasukkan ke dalam ruang pemisah yang berisi fase gerak dan didiamkan selama 30 menit. Senyawa yang terkandung dalam campuran akan naik ke berbagai posisi di atas pelat berdasarkan kelarutannya. Setiap senyawa yang dipisahkan diidentifikasi dengan menghitung faktor retardasinya yaitu perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut dan membandingkannya dengan senyawa yang diketahui). Senyawa yang terlihat pada posisi berbeda diambil menggunakan spatula dan akhirnya diekstraksi kembali menggunakan berbagai pelarut. Keunggulannya antara lain memakan waktu lebih sedikit, menghasilkan bintik-bintik bening, dan stabil menjadi asam sebagai pelarut (Rabiu, dkk., 2020).

e. Kromatografi Cair Vakum

Prinsip kerja KCV yaitu partisi dan adsorpsi yang pemisahannya menggunakan bantuan tekanan dari pompa vakum. Fase diam pada fraksinasi KCV menggunakan Silika G60 GF₂₅₄ dan fase gerak menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran meningkat (n-heksana : etil asetat). Penggunaan pelarut dengan kepolaran meningkat bertujuan agar setiap pelarut dapat melarutkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya (Maro, dkk., 2015)

3. Identifikasi dan Karakterisasi Senyawa

Beberapa metode digunakan dalam identifikasi senyawa dari ekstrak tumbuhan obat yang dimana metode-metode tersebut dilakukan untuk mendeteksi gugus fungsi, adanya beberapa ikatan dan cincin, hidrogen dan pengaturan karbon serta mengetahui structural dari senyawa yang diinginkan. Teknik yang digunakan antara lain spektroskopi massa (MS), spektroskopi ultraviolet (UV), spektroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR), dan spektroskopi inframerah (IR) (Rabiu, dkk., 2020).

a. Spektroskopi massa

Spektroskopi massa merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi berat molekul serta struktur kimia suatu senyawa. Teknik ini dapat diaplikasikan dalam identifikasi peptida dan oligonukleotida. Pertama-tama dilakukan penembakan elektron pada molekul organik yang kemudian mengubahnya menjadi energi ion bermuatan. Energi ionisasi elektron 70 eV pertama kali mendeteksi

sinyal, selanjutnya spektrum yang tertangkap dicatat sebagai presentase puncak. Suatu senyawa yang diidentifikasi dengan memplot massa ion yang terfragmentasi terhadap muatan ion individu sehingga diketahui berat molekul dan massa relatif molekulnya. Spektroskopi massa memberikan banyak informasi khususnya terkait molekul senyawa organik (Rabiu, dkk., 2020).

b. Spektroskopi ultraviolet

Metode spektroskopi ultraviolet dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai metabolit sekunder, contohnya tannin, fenol, antosianin dan pewarna polimer yang dapat ditemukan pada frekuensi tertentu sehingga sesuai untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tumbuhan. Terdapat frekuensi-frekuensi tertentu yang dapat mendeteksi metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman yakni antosianin (520 nm), flavonoid (320 nm), fenolik (280nm), dan asam fenolik (360 nm) (Rabiu, dkk., 2020). Spektrum UV-Vis memiliki fungsi dalam penentuan struktur senyawa organik yakni menentukan jenis kromofor yang dimiliki oleh molekul yang sedang diteliti (Suhartati, 2017).

Prinsip dari spektroskopi UV-Vis ialah radiasi pada rentang panjang gelombang 200-700 nm dilewatkan melalui suatu larutan senyawa. Elektron-elektron pada ikatan di dalam molekul menjadi tereksitasi sehingga menempati keadaan kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses menyerap sejumlah energi yang melewati larutan tersebut.

Semakin longgar elektron tersebut ditahan didalam ikatan molekul, semakin panjang gelombang (energy lebih rendah) radiasi yang diserap (Watson, 2013).

c. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir

Spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau nuclear magnetic resonance spectroscopy atau spektroskopi NMR merupakan teknik yang lebih menampakkan sifat fisik molekul bioaktif seperti jumlah dan susunan atom karbon, keberadaan isotop karbon, atom hidrogen, dan proton (Rabiu, dkk., 2020).

d. Spektroskopi inframerah

Spektroskopi inframerah merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari metabolit sekunder yang terkandung dalam senyawa. Gugus fungsi, mencakup ikatan tunggal maupun ganda yang diidentifikasi dapat mencerminkan sifat kimia dan fisika dari senyawa tersebut. Identifikasi dilakukan dengan bantuan radiasi inframerah yang kemudian diserap dalam frekuensi tertentu. Umumnya, preparasi sampel berbentuk cairan diidentifikasi menggunakan pelat NaCl, sedangkan sampel berbentuk padat ditentukan menggunakan KBr yang digiling bersama dan dikompresi menjadi pelet tipis. Hasilnya dicatat sebagai spektrum yaitu persentase transmitansi. Terakhir, spektra dianalisis; puncak yang diperoleh pada bilangan gelombang tertentu dibandingkan dengan acuan standar (Rabiu, dkk., 2020). Prinsip dari spektrofotometri inframerah yaitu rentang radiasi elektromagnetik yang berkisar antara

400 cm^{-1} dan 4000 cm^{-1} (2500 dan 20000 nm) dilewatkan pada suatu sampel dan diserap oleh ikatan-ikatan molekul didalam sampel sehingga molekul tersebut meregang atau menekuk. Panjang gelombang radiasi yang diserap merupakan ciri khas ikatan yang menyerapnya (Watson, 2013).

D. Uji Senyawa Antioksidan

Untuk mengetahui komponen yang terkandung dalam ekstrak rimpang lempuyang gajah dilakukan analisis dengan gas kromatografi mass spektrofotometri,

GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) merupakan instrument gabungan dari alat GC dan MS. Hal ini berarti sampel yang hendak diperiksa, difraksinasi terlebih dahulu dengan alat GC (Gas Chromatography), kemudian diidentifikasi dengan alat MS (Mass Spectrometry). GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. (Universitas Gajah Mada, 2018).

Adapun kegunaan alat GC-MS yaitu :

1. Untuk menentukan berat molekul suatu senyawa dengan sangat teliti.
2. Spektroskopi massa dapat digunakan untuk Mengetahui rumus molekul tanpa analisis unsur.
3. Dapat mengenali senyawa berdasarkan fragmentasi, sehingga bisa didapatkan cara tambahan untuk Mengetahui apakah senyawa tersebut termasuk golongan alcohol, asam karboksilat, aldehida, dan lain sebagainya.

Prinsip kerja GC-MS adalah sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injector kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh electron, sehingga terjadi ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detector dan dihasilkan spektrum massa (Cazes, 2001)

Keunggulan metode GC-MS antara lain; efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel yang sangat kecil, aliran gas sangat terkontrol dan kecepatannya tetap, analisis cepat, biasanya hanya beberapa menit, tidak merusak sampel, sensitivitas tinggi, dapat memisahkan berbagai senyawa yang bercampur satu sama lain dan dapat menganalisis berbagai senyawa bahkan dalam kadar/konsentrasi rendah (Hermanto, 2008).

Selain keunggulan metode GC-MS juga memiliki kekurangan antara lain; hanya untuk zat yang mudah menguap, tidak dapat memisahkan campuran dalam jumlah besar. Fase gerak tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut (Hermanto, 2008).

E. Tinjauan Islam

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat penyakit dan merupakan anugerah Allah SWT, karena Allah SWT tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obat (penyembuhnya). Inilah yang harus manusia pelajari dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّمْرُوتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S. An-Nahl/16:11)

Dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir, Allah mengeluarkannya dari bumi, dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala perbedaan, macamnya, rasanya, warnanya, baunya dan bentuknya sebagai bukti bahwasannya tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) kecuali Allah. (Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al, et al., 2019)

Dijelaskan pada tafsir ringkas Kementerian Agama RI, dengan air hujan itu pula dia menumbuhkan untuk kamu beragam tanam-tanaman yang dapat kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kamu. Dengan air hujan itu pula dia menumbuhkan pohon-pohon penghasil buah, seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan dari pohon-pohon yang tidak disebutkan. Sungguh, pada yang demikian itu, yakni turunnya hujan dan kenikmatan yang ditimbulkannya, benar-benar terdapat tanda yang nyata mengenai kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari, memanfaatkan dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena

merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Dalam penelitian ini, maka digunakan tanaman rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) yang memiliki banyak manfaat dan telah digunakan menjadi pengobatan tradisional untuk diketahui apakah golongan senyawa aktif antioksidan pada rimpang lempuyang gajah dan bagaimana karakterisasinya dengan menggunakan metode GC-MS.

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

Terjemahnya :

“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe” (QS. Al-Insan/76 : 17)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan beberapa tambahan pandangan bahwa di dalam surga itu mereka diberi minum segelas yang campurannya adalah jahe. Minuman ini terkdang berasal dari air kapur yang dingin. Namun, di lain waktu minuman tersebut bercampur jahe zanjabil (rempah-rempah) agar seimbang (Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al, et al., 2019)

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. dengan bentuk sebaik-baiknya, sehingga sudah sepantasnya kita mensyukuri hal ini dengan menjaga tubuh dan menghindarkan diri dari penyakit. Dengan akal dan pemikiran yang dianugrahi pula, manusia dengan baik dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mencari cara untuk mengobati dirinya apabila terkena penyakit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary melalui sahabat Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ
 وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
 عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا
 أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harith dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR Muslim).

Hadis tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Allah SWT. telah menurunkan obat bagi segala penyakit dan kita sebagai manusia tinggal menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah SWT. untuk mencari, meneliti dan mengolah sumber daya alam yang diberikan dengan bersungguh-sungguh sehingga dapat mengembangkan suatu bentuk obat yang dapat menjadi penawar dari bermacam jenis penyakit. Salah satu sumber daya alam yang Allah berikan sebagai bahan baku obat, dimana jumlahnya sangat melimpah ruah yakni tumbuh-tumbuhan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, untuk mengetahui golongan dan karakteristik senyawa aktif antioksidan pada fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (laboratorium kimia dan mikrobiologi) dan Fakultas Sains dan Teknologi (laboratorium kimia dan fisika), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2022 – Januari 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental yang dilakukan dengan berbagai tahap yaitu ekstraksi, partisi, identifikasi dan karakterisasi pada rimpang lempuyang gajah.

C. Sampel

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu rimpang tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.).

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yakni bejana maserasi, blender, botol cokelat, cawan porselen, chamber, corong Buchner, corong kaca, corong pisah, erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, lampu UV 245 nm dan 366 nm, lemari asam, mangkuk kaca, oven, penangas, pengayak mesh 20, pipa kapiler, pisau, pompa vakum, spatel, GC (Trace 1310)-MS (ISQ 7000), timbangan analitik, toples kaca, vacuum rotary evaporator (rotavapor).

2. Bahan

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yakni aquades, DPPH etil asetat, HCl 2N, HCl pekat, H₂SO₄ 10%, lempeng KLT, lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) metanol, n-heksana, pereaksi Dragendroff, pereaksi Lieberman-Burchard, serbuk Mg (Magnesium), serbuk silica gel 60 GF254.

E. Cara Kerja

1. Preparasi Sampel

Rimpang lempuyang gajah dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya kemudian dicuci dengan air mengalir. Sampel dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dengan menggunakan lemari pengering kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering dan digiling hingga menjadi serbuk simplisia (Lallo, dkk., 2018).

2. Ekstraksi Sampel

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi. Meserasi merupakan metode sederhana dan paling banyak digunakan. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah tertutup rapat pada suhu kamar. Meserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Seidel V, 2006). Simplisia rimpang lempuyang gajah yang telah dikeringkan kemudian dimaserasi dengan pelarut metanol sebanyak 3 x 24 jam pada suhu kamar. Filtrat metanol yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan vacuum rotary evaporator (Handayani, dkk., 2018).

3. Partisi Sampel

Ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) dipartisi dengan metode partisi cair-cair. Ekstraksi cair-cair merupakan metode yang didasarkan pada sifat kelarutan komponen target dan distribusinya dalam dua pelarut tidak saling bercampur dengan prinsip “*like dissolve like*” artinya senyawa polar akan terbawa dalam pelarut polar, senyawa semipolar akan terbawa dalam pelarut semipolar dan senyawa nonpolar akan terbawa dalam pelarut nonpolar (Khopkar, 2002).

Filtrat yang telah pekat kemudian melewati tahap partisi. Partisi pada sampel dilakukan dengan melarutkan ekstrak metanol sebanyak 20 gram dalam 100 ml aquadest. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah lalu ditambahkan 100 ml n-heksana, dikocok secara perlahan-lahan selama 5 menit, setelah itu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara ekstrak larut n-

heksana dan ekstrak larut aquadest. Ekstrak larut n-heksana dipisahkan dengan lapisan air kemudian diulangi kembali hingga hasil partisi n-heksan berwarna bening (Nuari, dkk., 2017).

Kemudian ekstrak aquadest dimasukkan kedalam corong pisah lalu ditambahkan 100 ml etil asetat, dikocok secara perlahan selama 5 menit, setelah itu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara ekstrak larut aquadest dan ekstrak larut etil asetat. Kemudian ekstrak larut etil asetat dipisahkan dengan lapisan aquadest kemudian di partisi kembali hingga larutan berwarna bening. Ekstrak etil asetat cair hasil partisi diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental (Nuari et al., 2017).

Hasil partisi dirotavapor kemudian dihitung persentase rendemennya: (Fasya, dkk., 2018)

$$\% \text{rendemen} = \frac{\text{berat ekstrak}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

4. Skrining Fitokimia

a. Uji Alkaloid

Hasil partisi etil asetat sebanyak 2 ml dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan 3 ml HCl 2N. Larutan dibagi ke dalam 2 tabung , dimana tabung pertama ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer dan tabung kedua ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff. Positif mengandung alkaloid apabila terbentuk endapan berwarna putih atau kuning pada tabung pertama (Malik, Edward, & Waris, 2014), dan endapan jingga pada tabung kedua (Susanti, dkk., 2015).

b. Uji Flavonoid

Sebanyak 2 mL larutan ekstrak ditambahkan 1 ml air panas, didihkan selama 5 menit, kemudian disaring. Filtrat ditambahkan sedikit serbuk Mg dan 1 mL HCl pekat, kemudian dikocok. Jika berubah menjadi warna kuning, jingga atau coklat kekuningan menunjukkan hasil positif flavonoid (Isnaini, Biworo, Khatimah, Gufron, & Puteri, 2021)

c. Uji steroid dan triterpenoid

Diambil 2 ml larutan partisi etil asetat kemudian ditambahkan 5 tetes pereaksi Lieberman-Burchard. Hasil positif mengandung steroid ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau atau biru dan hasil positif terpenoid ditandai dengan perubahan warna menjadi merah atau violet (Susanti, dkk., 2015).

d. Uji Saponin

Sebanyak 1 ml hasil partisi etil asetat dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu ditambahkan 9 ml aquadest, kemudian dikocok secara vertikal selama 10 detik lalu didiamkan selama 10 detik. Apabila terbentuk busa stabil setinggi 1-10 cm selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji mengandung saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl 2N (Susanti, dkk., 2015).

e. Uji Tanin dan Polifenol

Sebanyak 2 ml larutan hasil partisi etil asetat dimasukkan dalam tabung reaksi kemudian dilakukan penambahan beberapa tetes larutan besi (III) klorida 10%. Sampel mengandung tanin dan polifenol ditandai

dengan timbulnya warna hitam kehijauan (tanin) dan biru tua (polifenol) (Susanti, dkk., 2015).

5. Fraksinasi dan Uji DPPH Sampel Rimpang Lempuyang Gajah

Sebelum dilakukan pemisahan senyawa, terlebih dahulu dilakukan orientasi eluen dengan secara kromatografi lapis tipis (KLT) dengan menggunakan perbandingan dari pelarut yang memiliki tingkat kepolaran berbeda, yaitu eluen n-heksan : etil asetat (8:2), (4:2), (2,4), (2:8). Dilakukan penotolan pada lempeng KLT kemudian diamati dibawah sinar UV 254 dan 366 nm dan dipilih perbandingan eluen dengan pola pemisahan yang baik. (Utami, dkk., 2018). Didapatkan pola pemisahan noda yang baik pada perbandingan eluen n-heksan : etil asetat (2:8).

Pemisahan senyawa ekstrak dilanjutkan dengan menggunakan metode kromatografi vakum cair (KCV). Ekstrak etil asetat 1,967 hasil partisi yang telah dipisahkan dengan rotavapor kemudian dicampur dengan 4 gram silika gel lalu diaduk hingga homogen dan menjadi serbuk kering. Disambung pompa dengan corong Buchner dan dimasukkan silika gel sebanyak 16 gram untuk dimampatkan terlebih dahulu. Silika gel yang telah homogen dengan ekstrak kemudian dimasukkan ke dalam corong dan diratakan. Pada bagian atas serbuk silika diberi kertas saring agar mudah menuangkan pelarut dan tidak mengganggu serbuk silika. Tahap selanjutnya yakni dimasukkan berbagai pelarut sebagai fase gerak dengan perbandingan eluen n-heksan : etil asetat (8:2), n-heksan : etil asetat (4:2), n-heksan : etil asetat (2:4), n-heksan : etil asetat (2:8) yang telah ditentukan berlandaskan hasil orientasi eluen.

Eluen yang terpilih ditambahkan sebanyak 100 ml kemudian proses fraksinasi dilakukan dan dihasilkan empat fraksi. (Nuari, dkk., 2017).

Ditotolkan empat fraksi pada lempeng KLT, kemudian dielusi menggunakan perbandingan eluen n-heksan : etil asetat (2:8). Lempeng KLT hasil elusi kemudian ditetesi dengan H₂SO₄ 10% lalu dipanaskan menggunakan oven (Forestryana, dkk. 2020). Empat fraksi tersebut dielusi kembali dengan perbandingan eluen n-heksan : etil asetat (2:8) dan diidentifikasi dengan melihat penampakan nodanya, kemudian ditetesi menggunakan DPPH (2-2 Difenil-1-Pikrihidrazil) 0,45mM dan dilihat penampakan nodanya. Apabila terdapat bercak berwarna putih kekuningan maka dipastikan fraksi tersebut memiliki aktivitas antioksidan (Praptiwi, dkk., 2015). Bercak noda yang timbul kemudian dihitung nilai Retention factor (Rf)-nya dengan rumus:

$$Rf = \frac{\text{Jarak yang ditempuh komponen}}{\text{Jarak yang ditempuh pelarut}}$$

6. Karakterisasi Fraksi Aktif Antioksidan Rimpang Lempuyang Gajah

Fraksi aktif antioksidan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) yaitu fraksi 3 (2:4) dan fraksi 4 (2:8) kemudian dianalisis menggunakan Gas Chromatography–Mass Spectroscopy (GC-MS). Sampel sebanyak 1 µL diinjeksikan ke GC-MS yang dioperasikan menggunakan kolom kaca panjang 30 m, diameter 0,25 mm dan ketebalan 0,25 µm dengan temperatur oven diprogram antara 70-250 °C dengan total waktu 30 menit, gas pembawa Helium bertekanan 12 kPa, total laju 30 mL/menit dan split ratio sebesar 1:50 (Novitasari, Febrina, Agustina, Rahmadani, & Rusli, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Rendemen Ekstrak Partisi Etil Asetat

Tabel 1. Hasil Partisi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah

Berat Ekstrak Metanol Kental	Berat Ekstrak Etil Asetat Partisi	% Rendemen
20 gram	2,186 gram	10,93 %


2. Skrining Fitokimia

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Rimpang Lempuyang Gajah

Senyawa	Pereaksi	Hasil
Alkaloid	Ditambahkan 3 ml HCl 2N (+) Mayer (+) Dragendroff	Terbentuk endapan putih keruh pada pereaksi mayer (+)
Flavonoid	(+) Serbuk Mg (+) HCl pekat	Terbentuknya warna coklat kekuningan (+)
Steroid dan Triterpenoid	(+) Lieberman-Burhcard	Perubahan warna menjadi merah (+)
Saponin	(+) HCl 2N	Tidak terbentuk busa (-)
Tanin dan Polifenol	(+) FeCl ₃ 10%	Perubahan warna menjadi hitam kehijauan (+)

3. Fraksinasi dan Uji DPPH Sampel Rimpang Lempuyang Gajah

a. Penentuan Orientasi Eluen




UV 254 nm



UV 366 nm

Gambar 5. Profil KLT dengan Eluen N-heksan : Etil Asetat (8:2)




UV 254 nm



UV 366 nm

Gambar 6. Profil KLT dengan Eluen N-heksan : Etil Asetat (4:2)




UV 254 nm



UV 366 nm

Gambar 7. Profil KLT dengan Eluen N-heksan : Etil Asetat (2:4)



UV 254 nm

UV 366 nm


Gambar 8. Profil KLT dengan Eluen N-heksan : Etil Asetat (2:8)

b. Fraksinasi KCV

Tabel 3. Berat Fraksi Hasil Fraksinasi dengan KCV yang Telah diuapkan dan Memiliki Aktivitas Antioksidan Setelah Penetesan DPPH

Fraksi	Berat Fraksi (gram)
Fraksi 3 (2:4)	0,342
Fraksi 4 (2:8)	0,169

c. Profil KLT Hasil Fraksinasi KCV



UV 254 nm

UV 366 nm

Gambar 9. Identifikasi Noda Lempeng KLT

d. Noda Hasil Ditetesi H₂SO₄ 10%



Gambar 10. Penampakan Noda Setelah Ditetesi H₂SO₄ 10%

e. Uji DPPH



Gambar 11. Penampakan Noda Setelah Dielusi dan Ditetesi DPPH


Keterangan :

Nilai R_f Fraksi 3 : Noda 1 = 0,52
 Noda 2 = 0,54


Nilai R_f Fraksi 4 : Noda 1 = 0,29
 Noda 2 = 0,52

4. Karakterisasi dengan GC-MS

a. Spektrum GC-MS



Gambar 12. Spektrum GC-MS Fraksi 3 (2:4)



Gambar 13. Spektrum GC-MS Fraksi 4 (2:8)

b. Analisis Data Spektrum GC-MS

Tabel 4. Hasil Analisis Senyawa Pada Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dengan GC-MS Fraksi 3 (2:4)

No.	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Peak Area %	Rumus Molekul	Berat Molekul (g/mol)	Aktivitas Biologis	Golongan Senyawa
1.	1.469	1,3,5-Trioxane	11.63	C ₃ H ₆ O ₃	90.078	Sumber formaldehid	Sikloheksana

						a anhidrat W. O. Teeters; M. A. Gradsten (1950)	
2.	1.49 3	Disulfide, methyl 1- (methylthio)pro pyl	11.1 0	$C_5H_{12}S_3$	168.4	Antioksidan, antimikroba (Sharopov, et al., 2018)	Dialkyldis ulfides
3.	17.3 66	2,6,10- Cycloundecatrie n-1-one, 2,6,9,9- tetramethyl-, (E,E,E)-	7.37	$C_{15}H_{22}O$	218.33	Antioksidan antiinflamasi , antiulkus, dan antimikroba (Bhuiyan et al., 2009)	Sesquiterp enoid
4.	27.3 55	Phthalic acid, di(2- propylpentyl) ester	7.90	$C_{24}H_{38}O_4$	390.56	Anti- inflamasi, antimikroba (Osuntokun & Cristina, 2019)	Benzoate ester
5.	12.8 97	2,5-Hexadienoic acid, 3- methoxy-5- methyl-4-oxo-	3.64	$C_8H_{10}O_4$	170.16	Antibakteri (Nguyen, et al., 2016)	Acids, Acyclic
6.	8.07 8	Ethanol, 2-(2- butoxyethoxy)-	3.32	$C_8H_{18}O_3$	162.23	antijamur dan antibakteri (Rizwana, Alwhibi, Khan, & Soliman, 2016)	Ethylene Glycols
7.	12.9 62	3-Isopropyl-4- methyl-dec-1- en-4-ol	2.67	$C_{14}H_{28}O$	212.37	-	-
8.	8.16 6	3,7-Octadiene- 2,6-diol, 2,6- dimethyl-	2.59	$C_{10}H_{18}O_2$	170.25	Anti-tumor (Kadhim, Sosa, & Hameed, 2016)	Tertiary alcohol
9.	9.70 7	1,7-Octadiene- 3,6-diol, 2,6- dimethyl-	2.37	$C_{10}H_{18}O_2$	170.25	Anti-tumor (Kadhim, Sosa, & Hameed, 2016)	Monoterpe noids
10.	12.4 45	Benzoic acid, 4- methoxy-	1.64	$C_{12}H_{16}O_3$	208.25	Antiinflamasi, antimikroba (biocrick.co m)	Hydroxybe nzoate Ethers
11.	18.9 03	Aromadendrene oxide-(2)	1.88	$C_{15}H_{24}O$	220.35	Antibakteri (biocrick.co	Sesquiterp enoid

12.	18.6 14	(1R,4aR,7R,8aR)-7-(2-Hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyldecahydronaphthalen-1-ol	1.44	$C_{15}H_{28}O_2$	240.38 16	Antioksidan, anti-alergi, antitumor (Bennett & Inengite, 2022)	Sesquiterp enoid
13.	21.9 71	9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)-	0,59	$C_{19}H_{34}O_2$	294.5	Antioksidan (Mazumder, Nabila, Aktar, & Farahnaky, 2020)	Fatty acid methyl ester
14	13.1 59	Glycylsarcosine	0.57	$C_5H_{10}N_2O_3$	146.14	Antioksidan, anti hipertensi, antidiabetes (Manzanares, Gandia, Garrigues, & Marcos, 2019)	Dipeptide
15.	18.0 02	Oxiraneundecanoic acid, 3-pentyl-, methyl ester, cis-	0.50	$C_{19}H_{36}O_3$	312.5	Antioksidan (Al-Marzoqi, Hadi, & Hameed, 2016)	Fatty acid methyl esters

Tabel 5. Hasil Analisis Senyawa Pada Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dengan GC-MS Fraksi 4 (2:8)

No.	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Peak Area %	Rumus Molekul	Berat Molekul (g/mol)	Aktivitas Biologis	Golongan Senyawa
1.	1.47 3	1-(1-(Methylthio)propyl)-2-propylsulfane	27.6 3	$C_7H_{16}S_3$	196.39 7	Anti nyamuk (Muturi, Ramirez, Zilkowski, Flor-Weiler, & P. Rooney, 2018)	Organic disulfide
2.	27.3 52	Phthalic acid, di(2-propylpentyl) ester	11.2 8	$C_{24}H_{38}O_4$	390.56	Anti-inflamasi, antimikroba (Osuntokun & Cristina, 2019)	Benzoate ester
3.	24.9 58	1,2-Benzenedicarbo	11.0 8	$C_{24}H_{38}O_4$	390.56	Anti-inflamasi,	Benzoate ester

		xylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester				antimikroba (Osuntokun & Cristina, 2019)	
4.	21.9 61	1-Heptatriacotanol	1.36	$C_{37}H_{76}O$	537.0	Antioksidan, antimikroba, arthiritis (Thanjavur & Nadu, 2019)	Fatty alcohols
5.	22.5 43	Oleic Acid	1.29	$C_{18}H_{34}O_2$	282.5	Antioksidan, antikanker, mengurangi tekanan darah, Mengurangi penyakit jantung koroner (PJK), (Muthukrishnan, et al., 2022)	Fatty acids
6.	12.3 74	Benzoic acid, 4-methoxy	1.25	$C_8H_8O_3$	152.15	Antiinflamasi, antimikroba (biocrick.com)	Benzoic acids
7.	19.8 15	Hexadecanoic acid, methyl ester	1.14	$C_{17}H_{34}O_2$	284.5	Antioksidan (Mazumder, Nabila, Aktar, & Farahnaky, 2020)	Fatty acid methyl ester
8.	24.2 71	Naringin	1.13	$C_{27}H_{32}O_{14}$	580.5	Antioksidan, anti-hipokolesterolemik, anti-hiperglikemia (biocrick.com)	Flavanone
9.	12.9 89	2,4-Dimethylhexanedioic acid	0.98	$C_8H_{16}O_2$	144.21	Antikonvulsan (Dembitsky, 2022)	Fatty acid
10.	12.4 45	Estra-1,3,5(10)-trien-17 β -ol	0.97	$C_{18}H_{24}O$	256.38 26	New chemical compound (Sosa, Bagi, & Hameed, 2016)	Benzene Derivatives
11.	20.3 08	n-Hexadecanoic acid	0.97	$C_{16}H_{32}O$	256.42	Antioksidan, anti-inflamasi	Fatty acid

						(Muthukrishnan, et al., 2022)	
12.	22.0 53	10-Octadecenoic acid, methyl ester	0.78	$C_{19}H_{36}O_2$	296.5	Antioksidan antibakteri, antijamur, , menurunkan kolesterol darah (Belakhdar, Benjouad, & Abdennebi, 2015)	Fatty esters
13.	22.5 91	cis-Vaccenic acid	0.76	$C_{18}H_{34}O_2$	282.5	Antibakteri mengurangi risiko penyakit jantung coroner (Muthukrishnan, et al., 2022)	Fatty acid
14	13.8 36	Benzoic acid, 3-hydroxy-	0.74	$C_7H_6O_3$	138.12	Antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba (Šiler & Mišić, 2016)	Benzoates
15.	12.6 83	tert-Hexadecanethiol	0.64	$C_{16}H_{34}S$	258	Antioksidan, antitumor, antijamur, insektisida (Chirumamilla, Dharavath, & Taduri, 2022)	Thio-Alcohol

Tabel 6. Hasil Analisis Senyawa Pada Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dengan GC-MS yang Memiliki Aktivitas Antioksidan dari Fraksi 3 (2:4) dan Fraksi 4 (2:8)

No.	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Peak Area %	Rumus Molekul	Berat Molekul (g/mol)	Aktivitas Biologis	Golongan Senyawa
1.	1.49 3	Disulfide, methyl 1-(methylthio)propyl	11.10	$C_5H_{12}S_3$	168.4	Antioksidan, antimikroba (Sharopov, et al., 2018)	Dialkyldisulfides
2.	17.3 66	2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 2,6,9,9-	7.37	$C_{15}H_{22}O$	218.33	Antioksidan antiinflamasi, antiulkus,	Sesquiterpenoid

		tetramethyl-, (E,E,E)-				dan antimikroba (Bhuiyan et al., 2009)	
3.	18.6 14	(1R,4aR,7R,8aR)-7-(2- Hydroxypropan- 2-yl)-1,4a- dimethyldecah ydronaphthalen- 1-ol	1.44	$C_{15}H_{28}O_2$	240.38 16	Antioksidan, anti-alergi, antitumor (Bennett & Inengite, 2022)	Sesquiterp enoid
4.	21.9 71	9,12- Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)-	0,59	$C_{19}H_{34}O_2$	294.5	Antioksidan (Mazumder, Nabila, Aktar, & Farahnaky, 2020)	Fatty acid methyl ester
5.	13.1 59	Glycylsarcosine	0.57	$C_5H_{10}N_2O$ 3	146.14	Antioksidan, anti hipertensi, antidiabetes (Manzanares , Gandia, Garrigues, & Marcos, 2019)	Dipeptide
6.	18.0 02	Oxiraneundecan oic acid, 3- pentyl-, methyl ester, cis-	0.50	$C_{19}H_{36}O_3$	312.5	Antioksidan (Al- Marzoqi, Hadi, & Hameed, 2016)	Fatty acid methyl esters
7.	21.9 61	1- Heptatriacotanol	1.36	$C_{37}H_{76}O$	537.0	Antioksidan, antimikroba, arthritis (Thanjavur & Nadu, 2019)	Fatty alcohols
8.	22.5 43	Oleic Acid	1.29	$C_{18}H_{34}O_2$	282.5	Antioksidan, antikanker, mengurangi tekanan darah, Mengurangi penyakit jantung koroner (PJK), (Muthukrish nan, et al., 2022)	Fatty acids
9.	19.8 15	Hexadecanoic acid, methyl ester	1.14	$C_{17}H_{34}O_2$	284.5	Antioksidan (Mazumder, Nabila, Aktar, &	Fatty acid methyl ester

						Farahnaky, 2020)	
10.	24.2 71	Naringin	1.13	$C_{27}H_{32}O_{14}$	580.5	Antioksidan, anti-hipokolesterolemik, anti-hiperglikemia (biocrick.com)	Flavanone
11.	20.3 08	n-Hexadecanoic acid	0.97	$C_{16}H_{32}O$	256.42	Antioksidan, anti-inflamasi (Muthukrishnan, et al., 2022)	Fatty acid
12.	22.0 53	10-Octadecenoic acid, methyl ester	0.78	$C_{19}H_{36}O_2$	296.5	Antioksidan antibakteri, antijamur, menurunkan kolesterol darah (Belakhdar, Benjouad, & Abdennebi, 2015)	Fatty esters
13	13.8 36	Benzoic acid, 3-hydroxy-	0.74	$C_7H_6O_3$	138.12	Antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba (Šiler & Mišić, 2016)	Benzoates
14.	12.6 83	tert-Hexadecanethiol	0.64	$C_{16}H_{34}S$	258	Antioksidan, antitumor, antijamur, insektisida (Chirumamilla, Dharavath, & Taduri, 2022)	Thio-Alcohol

B. Pembahasan

Penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.). dengan cara dibersihkan dari kotoran yang masih menempel kemudian dicuci dengan air mengalir. Dilakukan perajangan lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa mengenai sinar

matahari langsung. Sampel yang telah kering kemudian disortasi kering. Sampel diblender hingga agak halus agar mempermudah difusi senyawa aktif menuju eluen, dengan ini sudah cukup untuk memperluas permukaan dari simplisia sehingga mempermudah cairan penyari masuk ke dalam partikel. Simplisia lalu dimasukkan ke dalam toples kaca untuk selanjutnya melewati tahap ekstraksi.

Ekstraksi merupakan teknik pemisahan komponen atau senyawa dari campurannya (simplisia) menggunakan eluen/pelarut tertentu. Metode maserasi dilakukan dengan merendam simplisia dalam pelarut tanpa menggunakan pemanasan agar bahan alam yang terkandung tidak mengalami kerusakan ataupun terdegradasi akibat pemanasan. Pada maserasi, terjadi proses keseimbangan konsentrasi antar larutan di dalam dan di luar sel simplisia sehingga perlu dilakukan pergantian pelarut secara berulang (Hanani, 2015). Dalam penelitian ini, eluen metanol dipilih untuk mengekstraksi simplisia. Metanol diketahui dapat melarutkan senyawa-senyawa yang berbeda kepolarannya, baik polar ataupun non-polar, sehingga cocok digunakan dalam mengekstraksi lebih banyak jenis metabolit sekunder pada sampel (Muaja, dkk., 2017).

Hasil ekstraksi kemudian disaring dan dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$, penguapan pelarut dilakukan pada suhu tersebut agar mengurangi proses penguraian yang mungkin terjadi pada komponen kimia di dalamnya (Saputra, dkk., 2018).

Ekstrak metanol lempuyang gajah yang telah pekat diambil sebanyak 20 gram untuk dipartisi dengan menggunakan eluen n-heksan dan aquadest. Ekstrak

metanol dilarutkan ke dalam 100 ml aquadest, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Sebanyak 100 ml n-heksan ditambahkan ke dalam corong pisah lalu dilanjutkan pengocokan secara perlahan selama 5 menit agar pelarut dapat menarik senyawa dengan sempurna. Metode partisi menggunakan corong pisah dengan dua pelarut yang tidak saling bercampur bertujuan agar senyawa-senyawa dalam sampel dapat terlarut pada pelarut yang sesuai dengan kepolarannya sehingga lebih mudah mengklasifikasikan metabolit sekunder yang didapatkan (Saputra, dkk., 2018). Dilakukan beberapa kali partisi dengan pergantian pelarut n-heksan secara berkala hingga pelarut n-heksan dalam corong pisah berubah warna menjadi bening yang dimana dalam penelitian ini partisi dengan pelarut n-heksan dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian dilanjutkan partisi dengan etil asetat, dilakukan hal yang sama seperti pada partisi n-heksan, sampai berubah menjadi bening sedangkan dengan pelarut etil asetat dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil partisi kemudian kembali dipekatkan menggunakan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak pekat etil asetat hasil partisi sebanyak 2,186 gram dengan rendemen ekstrak etil asetat hasil partisi yaitu 10,93%. Rendemen dikatakan baik jika nilainya lebih dari 10% (Wardaningrum et al., 2019).

Skrining fitokimia dilakukan pada ekstrak n-heksan hasil partisi sebagai analisis kualitatif sebagai gambaran awal untuk mengetahui metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya (Wirdayanti, dkk., 2019). Dilakukan 5 pengujian yakni uji alkaloid, flavonoid, steroid dan triterpenoid, saponin, tanin dan polifenol.

Pada pengujian senyawa alkaloid, hasil yang didapatkan setelah penambahan reagen mayer adalah terbentuknya endapan kuning dan pada penambahan reagen dragendorff didapatkan hasil berupa perubahan warna menjadi hitam. Positif mengandung alkaloid apabila pada tabung reaksi dengan reagen mayer terbentuk endapan berwarna putih atau kuning (Malik, Edward, & Waris, 2014), dan pada tabung reaksi dengan reagen dragendorff terbentuk endapan jingga (Susanti, dkk., 2015). Pada pengujian flavonoid, hasil yang didapatkan setelah penambahan sedikit serbuk Mg dan 1 ml HCl pekat serta dilakukan pengocokan yaitu terbentuknya warna coklat kekuningan. Jika berubah menjadi warna coklat kekuningan menunjukkan hasil positif flavonoid (Isnaini, Biworo, Khatimah, Gufron, & Puteri, 2021). Pada pengujian steroid dan triterpenoid, hasil yang didapatkan setelah penambahan reagen Lieberman-Burchard yaitu perubahan warna menjadi merah. Hasil positif mengandung steroid ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau atau biru dan hasil positif terpenoid ditandai dengan perubahan warna menjadi merah atau violet (Susanti, dkk., 2015). Pada pengujian saponin, hasil yang didapatkan setelah ditambahkan 9 ml aquadest, dan dilakukan pengocokan secara vertical selama 10 detik, lalu ditambahkan 1 tetes HCl 2N yaitu tidak menunjukkan adanya busa. Apabila terbentuk busa stabil setinggi 1-10 cm selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji mengandung saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl 2N (Susanti, dkk., 2015). Pada pengujian tanin dan polifenol, hasil yang didapatkan setelah penambahan larutan besi (III) klorida 10 % yaitu perubahan warna menjadi hitam kehijauan. Sampel

mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna hitam kehijauan (tanin) dan biru tua (polifenol) (Susanti, dkk., 2015). Berdasarkan uraian hasil skrining fitokimia tersebut rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) dari fraksi etil asetat dapat dikatakan mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid dan triterpenoid, tannin dan polifenol.

Sebelum menentukan tingkatan pelarut yang digunakan, dilakukan orientasi/gradiasi eluen untuk menentukan variasi fase gerak dalam kromatografi cair vakum (KCV) (Fadlilaturrahmah, dkk., 2015). Eluen yang akan digunakan yakni n-heksan dan etil asetat dengan berbagai perbandingan. Ekstrak n-heksan hasil partisi ditotolkan pada lempeng KLT berukuran 1x7 cm dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1 cm, dan diaktivasi dengan oven pada suhu 110°C selama 30 menit. Pada chamber kromatografi dilakukan penjenuhan menggunakan eluen yang telah ditentukan terlebih dahulu agar tekanan uap dari eluen tersebar secara merata dalam chamber (Arsyinta, dkk., 2018). Orientasi eluen menunjukkan pemisahan yang baik pada perbandingan n-heksan : etil asetat (2 : 8).

Fraksinasi dilakukan dengan 4 variasi perbandingan pelarut n-heksan : etil asetat (8:2), n-heksan : etil asetat (4:2), n-heksan : etil asetat (2:4), n-heksan : etil asetat (2:8). Hasil fraksinasi diidentifikasi ulang penampakan nodanya dengan metode KLT menggunakan pelarut n-heksan : etil asetat (2 : 8) dan diamati menggunakan lampu UV 254 nm dan 366 nm. Pada lampu UV 254 nm, lempeng berflouresensi sehingga sampel terlihat gelap, sedangkan lampu UV 366 nm memberikan penampakan lempeng yang gelap dan noda berflourosensi

akibat interaksi gugus kromofor dengan sinar UV. Fraksi yang menunjukkan penampakan noda hanya 2 dari 4 fraksi yaitu, fraksi 3 dan 4. Selanjutnya penampakan noda diamati menggunakan menyemprotkan H₂SO₄ 10% pada lempeng KLT yang telah dielusi. Asam sulfat digunakan sebagai oksidator yang merusak gugus fungsi kromofor pada komponen senyawa sehingga panjang gelombang bergeser ke daerah yang lebih panjang, akibatnya noda yang terbentuk dapat terlihat oleh mata (Forestryana, dkk., 2020).

Pada plat KLT, ditetaskan DPPH pada plat KLT fraksi 3 dan 4 yang telah dielusi menggunakan eluen n-heksan : etil asetat (2 : 8) dan diamati nodanya untuk melihat letak senyawa kimia yang bersifat antioksidan (Praptiwi, dkk., 2015). Penetesan lempeng KLT menggunakan DPPH menghasilkan 2 noda pada tiap Fraksi. Fraksi 3 dengan nilai R_f 0,52 dan 0,54, kemudian fraksi 4 dengan nilai R_f 0,29 dan 0,52. Senyawa radikal bebas yakni 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) merupakan senyawa yang tidak stabil. Senyawa antioksidan mereduksi DPPH dengan menyumbangkan atom hidrogen sehingga terbentuk senyawa yang lebih stabil yaitu 1,1-difenil-2-pikrilhidrazin (DPPH-H). Hal ini juga mengakibatkan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi putih kekuningan oleh reagen DPPH (Bahriul, dkk., 2014).

Karakterisasi senyawa antioksidan yang terkandung pada sampel dilakukan menggunakan Gas Chromatography–Mass Spectroscopy (GC-MS). Senyawa yang telah diperoleh dari Gas Chromatography–Mass Spectroscopy (GC-MS) kemudian diurutkan menjadi 15 senyawa terbesar yang dilihat dari nilai peak areanya. Pada fraksi 3 senyawa yang mempunyai aktifitas biologis

sebagai antioksidan yaitu: Disulfide, methyl 1-(methylthio)propyl; 2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 2,6,9,9-tetramethyl-, (E,E,E)-; (1R,4aR,7R,8aR)-7-(2-Hydroxypropan-2-yl)-1,4a-dimethyldecahydronaphthalen-1-ol; 9,12 Octa decadienoic acid, methyl ester, (E,E)-; Glycylsarcosine; Oxiraneundecanoic acid, 3-pentyl-, methyl ester, cis-. Sedangkan pada fraksi 4 senyawa yang mempunyai aktivitas biologis sebagai antioksidan yaitu: 1-Heptatriacotanol; Oleic Acid; Hexadecanoic acid, methyl ester; Naringin; n-Hexadecanoic acid; 10-Octadecenoic acid, methyl ester; Benzoic acid, 3-hydroxy-; tert-Hexadecanethiol.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu:

1. Hasil identifikasi golongan senyawa antioksidan dari fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) yaitu terdapat kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, triterpenoid dan tanin.
2. Hasil karakterisasi senyawa menggunakan Gas Chromatography–Mass Spectroscopy (GC-MS) menghasilkan kesimpulan yaitu:
 - a. Pada fraksi 3 senyawa yang mempunyai aktifitas biologis sebagai antioksidan yaitu: Disulfide, methyl 1-(methylthio)propyl; 2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 2,6,9,9-tetramethyl-, (E,E,E)-; (1R,4aR,7R,8aR)-7-(2-Hydroxypropan-2-yl)-1,4a dimethyldecahydronaphthalen-1-ol; 9,12 Octa decadienoic acid, methyl ester, (E,E)-; Glycylsarcosine; Oxiraneundecanoic acid, 3-pentyl-, methyl ester, cis-.
 - b. Pada fraksi 4 senyawa yang mempunyai aktivitas biologis sebagai antioksidan yaitu: 1-Heptatriacotanol; Oleic Acid; Hexadecanoic acid, methyl ester; Naringin; n-Hexadecanoic acid; 10-Octadecenoic acid, methyl ester; Benzoic acid, 3-hydroxy-; tert-Hexadecanethiol.

B. Saran

Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk membuat sediaan dari fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.) seperti halnya sunscreen untuk menangkal radikal bebas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A.B.H., Abdelwahab, S.I., Al-Zubairi, A.S., Elhasan, M.M., dan Murali, S.M., 2008, *Anticancer and Antimicrobial Activities of Zerumbone from the Rhizomes of Zingiber zerumbet*, International Journal of Pharmacology, 4 (4), 301-304.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh ; Pengedit Isi: M. Yusuf Harun... [et.al] ; Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* .2019
- Agrawal, A.K., Rao, C.V., Sairam, K., dan Joshi, V.K., 2000, *Antipyretic dan Analgesic Activities of Zingiber zerumbet Extracts*, Indian J Exp Biol, 38. 994-998.
- Al-Marzoqi, A. H., Hadi, M. Y., & Hameed, I. H. (2016). *Determination of metabolites products by Cassia* . Academic Journals, 25-48.
- Bahriul, P., Rahman, N., & Diah, A. (2014). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Salam (Syzygium polyanthum) Dengan Menggunakan 1,1-Difenil-2- Pikrilhidrazil*. Jurnal Akademika Kimia, 3(3), 143–149.
- Belakhdar, G., Benjouad, A., & Abdennebi, E. (2015). *Determination of some bioactive chemical constituents from* . J. Mater. Environ. Sci., 2778-2783.
- Bennett, V., & Inengite, A. K. (2022). *Comparative Study of the Chemical Composition of Three* . Journal of Diseases and Medicinal Plants, 55-60.
- Bhuiyan, N, I., Chowdury, J, U., and Begum, J., 2009, *Chemical Investigation of the Leaf and Rhizome Essential Oil of Zingiber zerumbet (L.) Smith from Bangladesh*, Bangladesh J Pharmacol, 4: 9-12.
- Borowska, E. J., Borowski, J., Szajdek, A., Ciska, E. & Zielinski, H. 2003. *Content of Selected Bioactive Components and Antioxidant Properties of Broccoli (Brassica oleracea L.)*. eur Food Res Technol 226 : 459 – 465.
- Cazes, Jack. 2001. Encyclopedia of Chromatography. Marcel Dekker Inc. New York, dikutip dari Lestari, Puji. 2008. “*Identifikasi Senyawa Nimetazepam Pada Tablet Psikotropika Secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (KG-SM)*”. Akademi Analisis Kimia: Bogor.
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). *Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (Ziziphus mauritiana L.) sebagai Sumber Saponin*. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri, 7(4), 551–560.
- Chirumamilla, P., Dharavath, S. B., & Taduri, S. (2022). *GC–MS profiling and antibacterial activity*. Bulletin of the National Research Centre, 1-10.
- Dembitsky, V. M. (2022). *Hydrobiological Aspects of Fatty Acids: Unique, Rare,*

and. MDPI, 331-432.

- Departemen Kesehatan RI. (1978). *Materia Medika Indonesia. Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- Fadlilaturrahmah, Arnida, & Irzan, A. (2015). *Isolasi dan Identifikasi Alkaloid Fraksi Kloroform Batang Tantaran Gayung Asal Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Workshop Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinik*, 6-7.
- Fasya, A. G., Dinasti, A. R., Shofiyah, M., Rahmawati, L. M., Millati, N., Safitri, D. A., Handoko, S., Hanapi, A., & Ningsih, R. (2018). *Ekstraksi, Hidrolisis dan Partisi Metabolit Sekunder dari Mikroalga Chlorella sp.* *Alchemy*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.18860/al.v5i1.3686>
- Firdaus, M., Prihanto, A. A., & Nurdiani, R. (2013). *Tanaman Bakau : Biologi dan Bioaktivitas*. Malang: UB (Universitas Brawijaya) Press.
- Forestryana, D., & Arnida. (2020). *Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Ekstrak Etanol Daun Jeruju (HYDROLEA SPINOSA L.)*. *Jurnal Ilmiah Farmako Bahariri*, 11(2), 113-124.
- Gandjar, I. G., & Rohman, A. (2013). *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haerani, A., Chaerunisa, A. Y., & Subarnas, A. (2018). *Antioksidan Untuk Kulit*. *Farmaka*, 135-151.
- Haeria, Hermawati, & Ugi, andi tenri. (2016). *Penentuan Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Bidara (Ziziphus spinachristi L.).* *1(2)*, 57-61.
- Hanani, E. (2015). *Analisis Fitokimia*. EGC. Jakarta.
- Handayani, S., Mursiti, S., & Wijayati, N. (2018). *Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Flavonoid dari Rimpang Temu Kunci (Kaempferia pandurata Roxb.) terhadap Streptococcus mutans*. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 7(2), 146-152.
- Hanwar, D., Dewi, M. S., Suhendi, A., & D.K, I. T. (2015). *Analisis Profil Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Lempuyang Gajah (Zingiber . Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hamid dkk. 2010. *Antioxidants: Its medicinal and pharmacological Applications*. *African Journal of Pure and Applied Chemistry* Vol. 4(8), pp. 142-151
- Hermanto. (2008). *Aplikasi Alat HPTLC dan .* Jakarta.
- Heyne, K., 1950, *Tumbuhan Berguna Indonesia, Jilid III*, diterjemahkan oleh Badan Litbang Kehutanan Jakarta, Penerbit Yayasan Sarana Wanaraja, Jakarta.

- Horubala, A. 1999. *Antioxidant Capacity and Their Changes in Fruit and Vegetable Processing*. Przemysl Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. Vol.3: 30-31
- Hurrell, F. R. & Reddy, M. B. 2003. *Degradation of phytic acid in cereal porridges improves iron absorption by human subjects*. The American J. of Clinical Nutrition. 77(5): 1213- 1219.
- Husin, M.D. and Widjaja, EA. 1987. *Bukti Anatomi dalam taksonomi Kerabat-kerabat Zingiber Zerumbet*. Floribunda 1(1): 1-4.
- Ilyas, A. (2013). *Kimia Organik Bahan Alam (M. Baharuddin (ed.))*. Alauddin University Press.
- Indriani, S. (2020). *Isolasi Senyawa Bioaktif Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) serta Uji Toksisitas terhadap Artemia salina Leach*. Skripsi Thesis: Universitas Jenderal Soedirman.
- Inggrid, M., & Santoso, H. (2014). *EKSTRAKSI ANTIOKSIDAN DAN SENYAWA AKTIF*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Isnaini, Biworo, A., Khatimah, H., Gufron, K. M., & Puteri, S. R. (2021). *Aktivitas Antibakteri dan Antijamur Ekstrak Galam (Melaleuca cajuputi subsp. Cuminglana (Turcz.) Barlow) terhadap Bakteri E.coli dan Jamur C. albicans*. JOURNAL OF AGROMEDICINE AND MEDICAL SCIENCES , 79-83.
- Jaganath, I.B., and Ng, L.T., 2000, *Herbs: The Green pharmacy of Malaysia, Vinpress Sdn. Bhd. and Malaysia Agricultural Research and Development Institute*, pp 95-99.
- Jasim, H., Hussein, A. O., Hameed, I. H., & Kareem, M. A. (2015). *Characterization of alkaloid constitution and evaluation of antimicrobial activity of Solanum nigrum using gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)*. Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, 57-73.
- Jc, N., Jf, A., Cm, N., Okorie, C., Ho, Kg, A., . . . Sa, O. (2022). *Phytochemical Composition, Antioxidant and Antimicrobial Potentials of some*. J. Appl. Sci. Environ. Manage., 1733-1741.
- Jyothilakshmi, M., Jyothis, M., and Latha, M.S. 2016. *Anti-inflammatory efficacy of the rhizome of Zingiber zerumbet-an in vitro study using THP1 cell line*. Journal of Medicinal Plants Studies 4(1): 103-106.
- Kadhim, M. J., Sosa, A. A., & Hameed, I. H. (2016). *Evaluation of anti-bacterial activity and bioactive chemical analysis of Ocimum basilicum using Fourier transform infrared (FT-IR) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) techniques*. Academic Journals, 127-146.

- Karimah, Azka (2020) *Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Sitotoksik Kombinasi Ekstrak Etanol Zingiber Zerumbet (L.) Sm dan Zingiber Officinale Roscoe Terhadap Sel Kanker Payudara MCF-7*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Kemdikbud. (2018). *Buku Informasi Analisis Kromatografi*. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian.
- Khopkar. 2002. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. UI Press. Jakarta.
- Kiswando, A. A. (2011). *Skrining Senyawa Kimia dan Pengaruh Metode Maserasi dan Refluks Pada Biji Kelor (Moringa oleifera, Lamk) Terhadap Rendemen Ekstrak yang Dihasilkan*. Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa, 1(2), 126–134.
- Kress, W.J., Prince, L.M., and Williams, K.J. 2002. *The phylogeny and a new classification of the gingers (Zingiberaceae): Evidence from molecular data*. Amer. J. Bot. 89(11): 1682–1696.
- Lallo, S., Kasim, S., Tayeb, R., Hasan, A. D., Sere, H., Ismail, I., & Arifin, T. (2018). *Analisis Zerumbone Dalam Zingiber zerumbet Dan Aktivitas Penghambatannya Terhadap Bakteri Mycobacterium tuberculosis*. Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal), 4(2), 126–132. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2018.v4.i2.11138>
- Malik, A., Edward, F., & Waris, R. (2014). *Skrining Fitokimia Dan Penetapan Kandungan*. Jurnal Fitofarmaka Indonesia, 1-5.
- Manzanares, P., Gandia, M., Garrigues, S., & Marcos, J. F. (2019). *Improving Health-Promoting Effects of Food-Derived*. MDPI, 1-22.
- Maro, JP, Alimuddin, A. H., dan Harlia, 2015, *Aktivitas Antioksidan Hasil Kromatografi Vakum Cair Fraksi Metanol Kulit Batang Ceria (Baccaurea hookeri)*, JKK, 4 (4):35- 40, ISSN 2303-1077.
- Mazumder, K., Nabila, A., Aktar, A., & Farahnaky, A. (2020). *Bioactive Variability and In Vitro and In Vivo*. MDPI, 1-23.
- Mascolo, N., Jain, R, Jain S.C., dan Capasso F.J., 1989, *Ethnopharmacologic Investigation of Ginger (Zingiber officinale)*, Ethnopharmacology, 27, 129.
- Muaja, M. G. D., Runtuwene, M. R. J., & Kamu, V. S. (2017). *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol dari Daun Soyogik (Saurauia bracteosa DC.)*. Jurnal Ilmiah Sains, 17.
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif*. Jurnal Kesehatan UIN Alauddin, 7(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24252/kesehatan.v7i2.55>

- Muthukrishnan, S., Prakathi, P., Sivakumar, T., Thiruvengadam, M., Jayaprakash, B., Baskar, V., . . . Shariati, M. A. (2022). *Bioactive Components and Health Potential of Endophytic*. MDPI, 1-22.
- Muturi, E. J., Ramirez, J. L., Zilkowski, B., Flor-Weiler, L. B., & P. Rooney, A. (2018). *Ovicidal and Larvicidal Effects of Garlic and Asafoetida* . Journal of Insect Science, 1-6.
- Molyneux, P. (2003). *The Use of Stable Free Radical Dipheylpicrylhydrazyl* . J. Sci.Technoi, 211-219.
- Mulyani, F. (2015). *Pemanfaatan Ekstrak Rimpang Lempuyang Emprit (Zingiber Amaricans) SEBAGAI ALTERNATIF*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Murakami, A., Takahashi, D., Kinoshita, T., Koshimizu, K., Kim, H.A., Yoshihiro, A., Nakamura, Y., Jiwajinda, S., Terao, J., and Ohigashi, H. 2002. *Zerumbone, a Southeast Asian ginger sesquiterpene, markedly suppress free radical generation, proinflammatory protein production and cancer proliferation accompanied by apoptosis; the α , β unsaturated carbonyl group is a prerequisite*. Carcinogenesis 23(5): 798-802.
- Nguyen, H., Yu, N., Jeon, S., Lee, H., Bae, C., Yeo, J., . . . Kim, J. (2016). *Antibacterial activities of penicillic acid isolated from Aspergillus persii against various plant pathogenic bacteria*. Applied Microbiology International, 488-493.
- Novitasari, M. R., Febrina, L., Agustina, R., Rahmadani, A., & Rusli, R. (2016). *Analisis Gc-Ms Senyawa Aktif Antioksidan Fraksi Etil Asetat* . Jurnal Sains dan Kesehatan, 221-225.
- Nuari, S., Anam, S., & Khumaidi, A. (2017). *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol Buah Naga*. Galenika Journal of Pharmacy, 2(2), 118–125. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2017.v3.i2.118>
- Nugroho, A. E. 2007. *Manggis (Garcinia Mangostana L.): Dari Kulit Buah Yang Terbuang Hingga Menjadi Kandidat Suatu Obat*. MOT. 12 (42).
- Osuntokun, O. T., & Cristina, G. M. (2019). *Bio-guided isolation, chemical purification,* . International Journal of Molecular Biology, 135-143.
- Prakash, R.O.,Rabinarayan, A., and Kumar, M.S. 2011. *Zingiber zerumbet (L.) Sm., a reservoir plant for therapeutic uses: A review*. Int. J. Pharma. World Res. 2: 1-23.
- Praptiwi, Jamal, Y., Wulansari, D., Fathoni, A., Palupi, K., Nurainas, & Agusta, A. (2015). *Skrining Aktivitas Antioksidan Beberapa Tumbuhan Suku Zingiberaceae*. Prosiding SEMNAS Biodiversitas, 4(MAY), 188–192.
- Rabiu, A., & Haque, M. (2020). *Preparation of Medicinal Plants : Basic*

Extraction and Fractionation Procedures for Experimental Purposes. Journal of Pharmacy and BioAllied Sciences, 12(January), 6–9. <https://doi.org/10.4103/jpbs.JPBS>


- Rahmi, H. (2017). *Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Sumber Buah-buahan di Indonesia.* Jurnal Agrotek Indonesia, 34-38.
- Rizwana, H., Alwhibi, S., Khan, F., & Soliman, D. (2016). *Chemical Composition And Antimicrobial Activity Of Eruca Sativa Seeds.* The Journal of Animal & Plant Sciences, 1859-1871.
- Rosawanti, P., Mulia, D. S., & Ardhany, S. D. (2018). *Kandungan Antioksidan Daun Mahang Damar .* jurnal Surya Medika, 122-131.
- Sabu, M. 2003. "Revision of the genus *Zingiber* in South India," *Folia Malesiana*, 4: 25-52.
- Salem, M. Z., Zayed, M. Z., Ali, H. M., & Abd El-Kareem, M. S. (2016). *Chemical composition, antioxidant and antibacterial activities.* J Wood Sci, 548-561.
- Save, S., Lokhande, R., & Chowdhary, A. (2015). *Determination of 1, 2-Benzenedicarboxylic acid, bis (2-ethylhexyl) .* Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences, 349-362.
- Saputra, T. R., Ngatin, A., & Sarungu, Y. T. (2018). *Penggunaan Metode Ekstraksi Maserasi dan Partisi pada Tumbuhan Cocor Bebek (Kalanchoe pinnata) dengan Kepolaran Berbeda.* Fullerene Journal of Chemistry, 3(1), 5. <https://doi.org/10.37033/fjc.v3i1.26>
- Sastrohamidjojo, H, 1991, *Kromatografi, Edisi II*, hal 26-36, Liberty, Yogyakarta.
- Seidel, V., 2006, *Initial and Bulk Extraction*, In: Sarker, S. D., Latif, Z., & Gray, A. I., (eds) *Natural Product Isolation*, 27-46, Humana Pers, New Jersey.
- Sharopov, F. S., Khalifev, P. D., Satyal, P., Sun, Y., Safomuddin, A., Musozoda, S., . . . Setzer, W. N. (2018). *The Chemical Composition and Biological Activity of the Essential.* ACG Publications, 18-23.
- Silalahi, M. (2018). *Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet (L.) Smith.).* Jurnal EduMatSains, 147-160.
- Šiler, B., & Mišić, D. (2016). *Biologically Active Compounds from the Genus Centaurium s.l. (Gentianaceae): Current Knowledge and Future Prospects in Medicine.* Elsevier.
- Somchit, M.N., Shukriyah, M.H.N., Bustamam, A.A., and Zuraini, A. 2005. *Antipyretic and analgesic activity of Zingiber zerumbet.* Int. J. Pharmacol.1: 277-280.
- Sopiah, B., Muliastari, H., & Yuanita, E. (2019). *Skrining Fitokimia dan Potensi*

- Aktivitas Antioksidan* . JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, 27-33.
- Sosa, A. A., Bagi, S. H., & Hameed, I. H. (2016). *Analysis of bioactive chemical compounds of* . Academic Journals, 109-126.
- Subositi, A. P. D. (2014). *Analisis Ukuran Partikel Bahan Penyusun Ramuan Jamu Dan Volume Air Penyari Terhadap Mutu Ekstrak Yang Dihasilkan*. Jurnal Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik, 111–115.
- Sudarsono. (2002). *Tumbuhan Obat II: Hasil Penelitian, Sifat-sifat, dan Penggunaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suhartati, T. (2017). *Dasar-Dasar Spektrofotometer UV-VIS dan Spektrofotometri Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik*. Lampung: AURA.
- Sumolang, D., Pontoh, J., & Abidjulu, J. (2018). *Analisis Komponen Kimia Pada Berbagai Tingkat Umur* . PHARMACON, 2302-2493.
- Susanti, N. M. P., Budiman, I. N. ., & Warditiani, N. K. (2015). *Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 90 % Daun Katuk (Sauropus androgynus (L .) Merr .)*. Repository Universitas Udayana, 83–86.
- Thanjavur, & Nadu, T. (2019). *Identification Of Bioactive Compounds In Flower Of Tabernaemontana* . *Asin Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 129-132.
- Tzeng, T.F., Liou, S.S., Chang, C.J., and Liu, I.M. 2013. *The ethanol extract of Zingiber zerumbet attenuates streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats*. *Evid. Based Complement. Alternat. Med.*
- Universitas Gajah Mada. (2018). *Peralatan Laboratorium*. Yogyakarta: Komite Akreditasi Nasional.
- Wardaningrum, R. Y., Susilo, J., & Dyahariesti. (2019). *Perbandingan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Terpurifikasi Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) dengan Vitamin E*. *Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan*. Ungaran: Universitas Ngudi Waluyo
- Watson, D.G., 2013. *Analisis Farmasi edisi 2*. *Diterjemahkan oleh Syarief, WR*. Jakarta : EGC.
- Wirdayanti, & Sofiyanti, N. (2019). *Skrining Fitokimia Lima Jenis Tumbuhan Paku Polypodiaceae Dari Provinsi Riau*. *Jurnal Biota*, 4(2), 40–49. <https://doi.org/2527-323X>
- Wicaksono, A.N., 2013, *Perbandingan Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Semipolar Ekstrak Daun Lempuyang Gajah (Zingiber Zerumbet Smith.) Dengan Metode Difenilpikril Hidrazil (DPPH) Menggunakan Elisa*

Reader Dan Spektrofotometer Uv- Vis, Skripsi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yasni, S. (2013). *Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Produk Ekstraktif Rempah* (Y. HE Frandy, H. Baihaqi, & N. Tensai (ed.)). PT. Penerbit IPB Press.


Yob, N.J., Jofrry, S.M., Affandi, M.M., Teh, L.K., Salleh, M.Z., and Zakaria, Z.A. 2011. Zingiber zerumbet (L.) Smith: *A Review of Its Ethnomedicinal, Chemical, and Pharmacological Uses*. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 543216. [CrossRef] [PubMed].




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 1. Skema Kerja

A. Skema Kerja Secara Umum



B. Preparasi sampel



C. Ekstraksi sampel

Dimasukkan 0,68 kg sampel dalam bejana kaca meserasi


Direndam sampel dengan 1 liter metanol

Dilapisi bagian atas wadah dengan aluminium foil dan tutup rapat wadah. Diamkan selama 3x24 jam

Disaring hasil meserasi lalu dilakukan remeserasi dengan pelarut metanol selama 3x24 jam. Diulangi sampai meserat berwarna bening (4 meserat)

Dipekatkan hasil meserasi dengan rotavapor (50C) dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental

D. Partisi ekstrak



E. Skrining Fitokimia

a. Uji Alkaloid


Disiapkan hasil partisi etil aseat sebanyak 2 ml dalam tabung reaksi

Ditambahkan 3 ml HCl 2N

Dibagi larutan ke dalam 2 tabung, tabung pertama ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer dan tabung kedua ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendroff

Positif menandakan alkaloid apabila terbentuk endapan putih keruh (Mayer) dan jingga (Dragendroff)

b. Uji Flavonoid



c. Uji Steroid dan Triterpenoid



f. Uji Saponin

Disiapkan 1 ml hasil partisi etil asetat dalam tabung reaksi dan ditambhkan 9 ml aquadest

Dikocok tabung reaksi secara vertikal da didiamkan selama 10 detik

Busa setinggi 1-10 cm yang terbentuk selama tidak kurang dari 10 detik menandakan adanya saponin dan busa tidak hilang dengan penambahan 1 tetes HCl 2N

g. Uji Tanin dan Polifenol

Disiapkan 2 ml hasil partisi etil asetat dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 tetes FeCl 10%

Hasil positif mengandung tanin ditandai dengan warna hitam kehijauan dan positif polifenol ditandai dengan warna biru tua

F. Orientasi Eluen

Disiapkan lempeng KLT,
pelarut etil asetat dan n-
heksan

Disiapkan ekstrak n-heksan
hasil partisi

Diaktifkan lempeng KLT
lalu dipotong dengan
ukuran 1x7 cm dan dibagi
atas dan bawah pada
lempeng

Ditolkan ekstrak
menggunakan pipa kapiler


Dijenuhkan chamber
dengan eluen yang
digunakan

Dielusi lempeng KLT


Diamati di lampu UV 254
dan 366 nm serta dipilih
eluen dengan pemisahan
noda yang baik

G. Fraksinasi Sampel



H. Uji DPPH dan H₂SO₄ 10%

I. Karakterisasi dengan GC-MS



Lampiran 2. Perhitungan Rendemen dan Pembuatan Pereaksi

A. Perhitungan Rendemen

Dihitung persentase rendemen ekstrak larut etil asetat dalam ekstrak methanol hasil meserasi

$$\% \text{ rendemen} = \frac{\text{berat ekstrak}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = \frac{2,186 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = 10,93\%$$

B. Pembuatan Pereaksi

1. Larutan HCl 2N

Diketahui konsentrasi HCl pekat 37%, berat jenis (bj) HCl 1,19 g/mol, berat molekul (BM) HCl 36,5 g/mol.

$$\text{Normalitas (N)} = \frac{(10 \times \% \text{ konsentrasi HCl pekat} \times \text{bj})}{\text{BM}} \times \text{valensi}$$

$$\text{Normalitas (N)} = \frac{(10 \times 37\% \times 1,19)}{36,5} \times 1$$

$$\text{Normalitas (N)} = 12,06 \text{ N}$$

Dibuat larutan HCl 2N sebanyak 20 ml

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$2 \text{ N} \times 20 \text{ ml} = 12,06 \text{ N} \times V_2$$

$$V_2 = 3,3 \text{ ml}$$

Dibuat larutan HCl 2 N sebanyak 20 ml dengan mengambil 3,3 ml HCl pekat lalu dicukupkan hingga 20 ml dan disimpan dalam botol coklat.

2. Pembuatan Pereaksi DPPH 0,45 Mm

Diketahui massa molekul relatif (M_r) dari DPPH ialah 394,32 dan larutan yang dibuat sebanyak 10 ml.

$$0,45 \text{ mM} = 0,00045$$

$$\text{Molaritas (M)} = \frac{\text{massa (g)}}{\text{molekul relatif (Mr)}} \times \frac{1000}{\text{volume (V)}}$$

$$0,00045 = \frac{\text{massa (g)}}{394,32} \times \frac{1000}{10}$$

$$100 \times \text{massa (g)} = 394,32 \times 0,00045$$

$$\text{Massa (g)} = 0,00177 \text{ gram}$$

$$\text{Massa} = 1,77 \text{ mg} \approx 1,8 \text{ mg}$$

Lampiran 3. Perhitungan Nilai Rf Noda dengan Penetasan DPPH

1. Fraksi 3

$$\text{Noda 1} = \frac{2,9}{5,5} = 0,52$$

$$\text{Noda 2} = \frac{3}{5,5} = 0,54$$

2. Fraksi 4

$$\text{Noda 1} = \frac{1,6}{5,5} = 0,29$$

$$\text{Noda 2} = \frac{2,9}{5,5} = 0,52$$

Lampiran 4. Gambar Penelitian



Gambar 14. Sampel lempuyang gajah
(*Zingiber zerumbet* (L.) Sm.)



Gambar 15. Pencucian sampel



Gambar 16. Proses pengeringan sampel

MAKASSAR



Gambar 17. Proses meserasi



Gambar 18. Pemekatan ekstrak



Gambar 19. Ekstrak metanol kental



Gambar 20. Proses partisi aquadest dan etil asetat



Gambar 21. Ekstrak pekat etil asetat hasil partisi




Gambar 22. Skrining fitokimia ekstrak etil asetat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 23. Fraksinasi ekstrak etil asetat dengan berbagai perbandingan eluen

ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 24. Karakterisasi dengan GC-MS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



Yusril AR atau yang sering dipanggil Yusril, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ia lahir di Sinjai pada tanggal 21 Januari 2000. Penulis merupakan anak dari pasangan Arman dan Nurjannah. Penulis memulai pendidikannya di TK Pertiwi X pada umur 4 tahun dan melanjutkan pendidikannya di SDN I03 Bontompore pada usia 6 tahun. Pada umur 12 tahun, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Sinjai dan menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Sinjai. Pada tahun 2018, penulis lulus dan kembali melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih jurusan Farmasi.

Penulis memiliki hobi bermain bulutangkis, main game dan mengedit. Penulis memiliki prinsip ikuti kata orang tua, karena tanpa restu dari orang tua semua yang dilakukan terasa sia-sia. Penulis berharap kedepannya dapat menjadi pribadi yang sukses dan mendapat kemudahan dalam mencapai cita-cita yakni sebagai apoteker

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR