


**UJI TOKSISITAS FRAKSI BIJI BUAH SALAK (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)
TERHADAP LARVA *Artemia salina* Leach DENGAN METODE
BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

HAMIDA
NIM. 70100112085

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMIDA
NIM : 70100112085
Tempat/Tgl. Lahir : Lena, 30 Juni 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Samata
Judul : Uji Toksisitas Fraksi Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) terhadap Larva *Artemia salina* Leach dengan Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, Juli 2016

Penyusun,

HAMIDA
NIM. 70100112085

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Toksisitas Fraksi Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) terhadap Larva *Artemia salina* Leach dengan Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)” yang disusun oleh Hamida, NIM: 70100112085, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Agustus 2016 M yang bertepatan dengan **22 Dzulqa’idah 1437 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, **25 Agustus 2016**
22Dzulqa’idah 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt	(.....)
Penguji I	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt	(.....)
Penguji II	: Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, M.Ag	(.....)
Pelaksana	: Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19530203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. atas segala nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rasa syukur yang tiada terhingga kepada-Nya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan. Salam dan shalawat senantiasa kita haturkan pada junjungannabi besar Muhammad saw., keluarga, dan sahabat beliau yang telah memberi kontribusi besar dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Semoga kita semua menjadi umatnya yang taat.

Skripsi dengan judul “*Uji Toksisitas Fraksi Biji Buah Salak (Salacca zalacca (Gaert.) Voss) terhadap Larva Artemia salina Leach dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan kedepannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis menyadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari betapa banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat doa, motivasi, dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Banyak terima kasih penulis haturkan kepada pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Lemba dan Ibunda Harisa dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudaraku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doanya.
2. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Dekan (bidang akademik), Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. Wakil Dekan (bidang administrasi dan keuangan), dan Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Haeria, S.Si., M.Si. Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

8. Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt. Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan bantuan, arahan, dan motivasi dalam proses penelitian dan mengoreksi hal-hal yang perlu dikoreksi dalam penulisan skripsi ini.
9. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, M.Ag. Penguji Agama yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan S1 Farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang farmasi pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Samata-Gowa, Juli 2016
Penyusun,

HAMIDA
NIM. 70100112085

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
1. Definisi Operasional	4
2. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman Salak	6
1. Klasifikasi	6
2. Nama Daerah	6
3. Morfologi Tanaman	6
4. Jenis-Jenis Salak	8
5. Varietas Salak Unggul Nasional	12

6. Kandungan Kimia	13
7. Kegunaan Tanaman	14
B. Uraian <i>Artemia salina</i> Leach	14
1. Klasifikasi	14
2. Morfologi	14
3. Lingkungan Hidup	15
4. Perkembangbiakan dan Siklus Hidup	16
5. Penetasan Telur <i>Artemia salina</i> Leach	18
6. Penggunaan <i>Artemia salina</i> Leach dalam Penelitian.....	18
C. Ekstraksi	19
1. Definisi Ekstrak dan Ekstraksi	19
2. Tujuan dan Prinsip Ekstraksi	19
3. Metode Ekstraksi	20
4. Pemilihan Pelarut	23
D. Fraksinasi	24
1. Kromatografi Cair Vakum	25
2. Kromatografi Lapis Tipis	26
E. Uji Toksisitas dengan Metode <i>Brine Shrimp Lethality Test</i> (BSLT)	29
F. Tinjauan Islam	31
1. Kedudukan Obat dalam Islam	31
2. Pemanfaatan Tanaman dalam Perspektif Islam	35
3. Tumbuhan sebagai Obat	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Lokasi Penelitian	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Instrumen Penelitian	43
1. Alat yang Digunakan	43

2. Bahan yang Digunakan	44
C. Metode Pengumpulan Data	44
1. Penyiapan Sampel	44
2. Fraksinasi Komponen Kimia	45
3. Uji Toksisitas	46
4. Identifikasi Komponen Kimia	47
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
1. Ekstraksi Sampel	49
2. Fraksinasi Sampel	49
3. Uji BSLT (<i>Brine Shrimp Lethality Test</i>)	49
4. Identifikasi Senyawa Aktif	51
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
KEPUSTAKAAN	57
LAMPIRAN	61
RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Biji Buah Salak dengan Metode BSLT	49
2. Hasil Uji Toksisitas Fraksi dari Ekstrak Etanol Biji Buah Salak dengan Metode BSLT	49
3. Hasil Uji Identifikasi Fraksi A Ekstrak Etanol Biji Buah Salak dengan Berbagai Pereaksi Penampak Noda	50
4. Data Hasil Pengamatan Jumlah Larva Udang (<i>Artemia salina</i> Leach) yang Mati Setelah 24 Jam Perlakuan dengan Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	69
5. Data Hasil Pengamatan Jumlah Larva Udang (<i>Artemia salina</i> Leach) yang Mati Setelah 24 Jam Perlakuan dengan Fraksi-Fraksi Hasil Fraksinasi KCV Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	70
6. Data Hasil Perhitungan LC_{50} Ekstrak Etanol Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi	71
7. Data Hasil Perhitungan LC_{50} Fraksi A Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi	72
8. Data Hasil Perhitungan LC_{50} Fraksi B Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi	73
9. Data Hasil Perhitungan LC_{50} Fraksi C Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi	74
10. Harga Probit Sesuai Persentasenya	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tanaman Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	64
2. Buah, Daging dan Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	64
3. Siklus Hidup <i>A. salina</i> Leach	65
4. Profil Kromatogram Lapis Tipis Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss) pada UV 366 nm dan UV 254 nm	66
5. Profil Kromatogram Lapis Tipis Fraksi Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss) pada UV 366 nm dan UV 254 nm	67
6. Profil Kromatografi Lapis Tipis Hasil Identifikasi Fraksi A Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	68
7. Kurva Regresi Linear Ekstrak Etanol	71
8. Kurva Regresi Linear Fraksi A	72
9. Kurva Regresi Linear Fraksi B	73
10. Kurva Regresi Linear Fraksi C	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Skema Kerja Ekstraksi dan Fraksinasi Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	61
2 Pelaksanaan Uji BSLT Ekstrak dan Fraksi Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	62
3 Identifikasi Komponen Senyawa Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	63
4 Tanaman Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	64
5 Siklus Hidup <i>Artemia salina</i> Leach	65
6 Profil Kromatogram Lapis Tipis Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	66
7 Profil Kromatogram Lapis Tipis Fraksi Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	67
8 Profil Kromatogram Lapis Tipis Hasil Identifikasi Fraksi A Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (<i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss)	68
9 Hasil Pengamatan Larva Udang (<i>Artemia salina</i> Leach)	69
10 Hasil Perhitungan LC_{50} Ekstrak Etanol Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi	71
11 Hasil Perhitungan LC_{50} Fraksi A Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi	72
12 Hasil Perhitungan LC_{50} Fraksi B Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi	73
13 Hasil Perhitungan LC_{50} Fraksi C Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi	74
14 Harga Probit Sesuai Persentasenya	75
15 Perhitungan Pengenceran	76
16 Komposisi dan Cara Pembuatan Pereaksi Penampak Noda	77
17 Hasil Determinasi Tumbuhan	78

ABSTRAK

Nama : Hamida

NIM : 70100112085

Judul : Uji Toksisitas Fraksi Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) terhadap Larva *Artemia salina* Leach dengan Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)

Telah dilakukan penelitian Uji Toksisitas Fraksi Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) Terhadap Larva *Artemia salina* Leach dengan Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek toksisitas dari fraksi ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) dengan pengujian terhadap *Artemia salina* Leach. Penelitian diawali dengan pemilihan sampel, pengeringan sampel, dan ekstraksi dengan refluks menggunakan etanol. Ekstrak dipekatkan dengan cara diuapkan. Ekstrak etanol diidentifikasi profil KLT-nya (Kromatografi Lapis Tipis) dengan eluen etil asetat:metanol (1:4), selanjutnya difraksinasi menggunakan KCV (Kromatografi Cair Vakum) sehingga diperoleh 3 fraksi gabungan yaitu fraksi A, B, dan C. Masing-masing fraksi diuji toksisitasnya dan diperoleh LC_{50} fraksi A = 0,147 ppm, fraksi B = 0,988 ppm, dan fraksi C = 2,654 ppm. Fraksi A memiliki tingkat toksik yang lebih besar dibandingkan fraksi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi A memiliki potensi nilai LC_{50} sebagai antikanker dan hasil identifikasi fraksi A menunjukkan adanya senyawa aktif golongan triterpen dan steroid.

Kata kunci: Biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss), ekstrak etanol, fraksinasi, BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*), *Artemia salina* Leach, antikanker.

ABSTRACT

Name : Hamida

NIM : 70100112085

Title : Toxicity Effect Studies of Fractions of Snake Fruit Seeds (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) against *Artemia salina* Leach using Method *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)

Toxicity studies have been conducted Toxicity Effect Studies of Fractions of Snake Fruit Seeds (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) against *Artemia salina* Leach using Method *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT). This study is purposed to determine the toxicity effect of fractions of ethanol extracts of seeds snake fruit (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) by testing againts *Artemia salina* Leach. The study begins with the selection of the sample, desiccation of the sample, and extractions by reflux using ethanol. The extract was concentrated by evaporated. The TLC (Thin Layer Chromatography) profile of ethanol extract then identified by the eluen ethyl acetate:methanol (1:4), subsequently fractionated using Vacuum Liquid Chromatography to obtain 3 combined fractions are A, B, and C. Each fractions was tested and obtained toxicity LC₅₀ fraction A = 0,170 ppm, fraction B = 0,988 ppm, and fraction C = 2,654 ppm. Fraction A had a toxic level is greater than the other factions. This showed that Fraction A has potential LC₅₀ value as anticancer and the identification fraction A showed of active compound triterpene and steroid.

Keywords: Snake fruit seeds (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss), ethanol extract, fractionation, BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*), *Artemia salina* Leach, anticancer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan bumi yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan yang baik, yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Tumbuhan menghasilkan zat-zat seperti vitamin, minyak, dan masih banyak lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat suatu penyakit, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

"Allah tidak menciptakan suatu penyakit tanpa menciptakan pula obat untuknya." (HR. Bukhari)

Hadis ini menegaskan adanya obat bagi setiap macam penyakit. Ini berarti bahwa manusia apabila ingin mencari pengobatan, pasti akan menemukan. Selain itu, Rasulullah saw. menegaskan bahwa obat tersebut ada, namun dibutuhkan orang yang ingin mencarinya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian serta menemukannya (Abdel, 2012).

Hadis di atas menunjukkan bahwa Allah Maha Adil yang menciptakan suatu penyakit beserta obatnya. Hal itu akan diketahui manusia dengan adanya ilmu. Ilmu pengetahuanlah yang akan menuntun manusia untuk menemukan obat-obatan dari suatu penyakit. Jika manusia tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, maka tidak akan pernah tahu bahwa Allah telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Ada berbagai obat yang telah tersedia di alam dan seringkali disebut tanaman (herbal) (Farooqi, 2005).

Tanaman-tanaman berkhasiat obat ditelaah dan dipelajari secara ilmiah, hasilnya pun mendukung bahwa tanaman obat memang memiliki kandungan zat-zat atau senyawa yang secara klinis terbukti bermanfaat bagi kesehatan (Muchlisah, 2001). Namun, masih banyak tanaman yang belum diketahui kadar toksisitasnya, sehingga perlu diteliti lebih lanjut (Hyeronimus, 2006).

Pengobatan yang tersedia saat ini untuk penyakit-penyakit kanker dan infeksi tidak mampu membasmi penyakit bahkan menimbulkan resistensi atau menyebabkan efek samping yang parah. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya penemuan baru yang menuntun untuk ditemukannya senyawa yang mempunyai aktivitas yang lebih baik dan toksisitas yang rendah (El Sayed. *et al.*, 2001).

Metode awal yang sering dipakai untuk mengamati toksisitas senyawa dan merupakan metode penapisan untuk aktivitas antikanker senyawa kimia dalam ekstrak tanaman adalah *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT), dengan menggunakan cara Meyer. Metode ini ditunjukkan dengan tingkat mortalitas larva udang *Artemia salina* L. yang disebabkan oleh ekstrak uji. Hasil yang diperoleh dihitung sebagai nilai LC_{50} (*Lethal Concentration*) ekstrak uji, yaitu jumlah dosis atau konsentrasi ekstrak uji yang dapat menyebabkan kematian larva udang sejumlah 50% setelah masa inkubasi 24 jam. Senyawa dengan $LC_{50} < 1000 \mu\text{g/ml}$ dapat dianggap sebagai suatu senyawa aktif berdasarkan Meyer (Colegate, 1993; Meyer, 1982).

Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) merupakan tanaman asli Indonesia yang buahnya sangat digemari oleh masyarakat. Salak juga diketahui memiliki banyak kandungan gizi yang baik untuk kesehatan (Schuilling dan Moges, 1992). Biji buah salak mengandung tanin, quinon, monoterpen, sesquiterpen, alkaloid, dan polifenol (Purwanto, dkk., 2015).

Hampir semua limbah biji salak dibuang karena dianggap sudah tidak bermanfaat lagi. Akan tetapi, masyarakat di daerah Sumatera Utara dan Jawa mengolah biji salak dan mengkonsumsinya seperti minuman kopi. Khasiatnya antara lain mengatasi asam urat, melancarkan sistem peredaran darah, meningkatkan kinerja otot, dan meningkatkan kecerdasan. Pemanfaatan biji salak selama ini sangatlah kurang karena biji salak mempunyai tekstur yang keras dan tidak mudah hancur sehingga untuk mengolah biji salak ini cukup sulit.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Purwanto, dkk., 2015) yang berjudul “*Uji Sitotoksik Ekstrak Biji Salak (Salacca zalacca (Gaert.) Voss) dengan Menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)*” diketahui bahwa ekstrak etanol dari biji buah salak (*Salacca zalacca (Gaert.) Voss*) toksik terhadap larva *Artemia salina* Leach. yaitu (LC_{50}) yang diperoleh adalah 80,728 ppm.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi aktivitas biologis fraksi dari biji buah salak (*Salacca zalacca (Gaert.) Voss*) berdasarkan toksisitas senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya dan sekaligus sebagai uji penapisan awal aktivitas antikanker senyawa kimia yang dikandungnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca (Gaert.) Voss*) memiliki potensi toksisitas terhadap larva *Artemia salina* Leach?
2. Berapakah nilai LC_{50} dari pengujian toksisitas fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca (Gaert.) Voss*) terhadap larva *Artemia salina* Leach?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Fraksinasi komponen kimia adalah fraksinasi ekstrak etanol biji buah salak menggunakan kromatografi cair vakum dengan berbagai perbandingan eluen.
- b. Uji toksisitas adalah pengujian toksisitas fraksi biji buah salak menggunakan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BST) dengan pengamatan LC_{50} pada hewan uji larva *Artemia salina* Leach.
- c. Identifikasi komponen kimia adalah pengidentifikasian fraksi dengan LC_{50} yang paling rendah menggunakan kromatografi lapis tipis yang kemudian kromatogramnya disemprot dengan pereaksi penampak noda.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengujian toksisitas dari fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) menggunakan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) dengan pengamatan LC_{50} pada hewan uji larva *Artemia salina* Leach.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Purwanto, dkk., 2015) yang berjudul “*Uji Sitotoksik Ekstrak Biji Salak (Salacca zalacca (Gaert.) Voss) dengan Menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)*” diketahui bahwa ekstrak etanol dari biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) toksik terhadap larva *Artemia salina* Leach yaitu (LC_{50}) yang diperoleh adalah 80,728 ppm.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) memiliki potensi toksisitas terhadap larva *Artemia salina* Leach.
- b. Mengetahui nilai LC_{50} dari pengujian toksisitas fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) terhadap larva *Artemia salina* Leach.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta gambaran kepada masyarakat luas mengenai pemanfaatan dari biji buah salak bagi kesehatan sebagai pengobatan herbal dan memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai efek toksik dari fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) terhadap larva udang (*Artemia salina* Leach) serta golongan senyawa yang terkandung didalamnya yang memiliki potensi bioaktivitas, sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan dari penelitian sebelumnya dan rujukan pada penelitian tahap selanjutnya.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Salak

1. Klasifikasi (Steenis, 1975; Tjitrosoepomo, 1988)

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledoneae
Ordo	: Palmae
Famili	: Palmaceae (Arecaceae)
Genus	: Salacca
Spesies	: <i>Salacca zalacca</i> (Gaert.) Voss
Sinonim	: <i>Salacca edulis</i> Reinw.

2. Nama Daerah

Masyarakat Deli, Sunda, Jawa, Madura, Bali menyebutnya salak; masyarakat Minang, Makassar, Mandar, dan Bugis menamainya sala; sedangkan masyarakat Kalimantan menyebutnya hakam atau tusum (Anonim, 1992).

3. Morfologi Tanaman

Tanaman salak berakar serabut dan menyerupai pohon palem yang seolah-olah tidak berbatang, rendah dan tegak dengan tinggi tanaman antara 1,5-7 meter, tergantung dari jenisnya (Harsoyo, 1999). Daun tersusun menyirip, termasuk daun sempurna yaitu mempunyai helai daun, tangkai daun, dan pelepah. Tangkai daun tersusun roset, sehingga batang sangat pendek dan seolah-olah tidak ada. Permukaan atas daun berwarna hijau tua mengkilap dan permukaan bawahnya berwarna keputih-

putihan berlapis lilin (Rukmana, 1999).

Dari segi rasa, buah salak memiliki rasa khas sepat. Namun, ada beberapa salak varietas unggul memiliki rasa manis dan tidak sepat sama sekali. Sebagai buah segar, salak mengandung nilai gizi yang cukup tinggi dari beberapa jenis salak (Sutoyo dan Suprpto, 2010). Warna daging buah bervariasi, mulai dari putih sampai dengan putih kekuning-kuningan (Sudjijo, 2009). Biji salak yang masih muda berwarna pucat dan lunak, sedangkan setelah matang berwarna kuning hingga kehitaman dan keras, dan dalam setiap buah terdapat satu sampai tiga biji. Biji salak berbentuk hampir bulat dan bersegi-segi, berkeping satu, dan berwarna coklat sampai kehitam-hitaman (Budagara, 1998).

Tanaman salak berbunga banyak, tersusun dalam tandan rapat dan bersisik dengan tandan bunga jantan dan tandan bunga betina terletak pada pohon yang berlainan (Ashari, 1995). Kulit buah salak tersusun seperti genteng, dengan warna bervariasi. Berbagai variasi warna kulit buah ini sering digunakan untuk mempermudah identifikasi (Suskendriyati, dkk., 2000).

Duri tersebar tidak merata, sangat banyak pada pangkal tangkai daun dan tersebar jarang di ventral tangkai. Duri juga terdapat di seluruh permukaan buah salak dan tepi helaian daun. Warna duri pada tangkai daun hampir sama yaitu coklat sampai kehitaman (Suskendriyati, dkk., 2000).

Buah salak yang sudah matang ditandai dengan sisik yang jarang, warna kulit buah merah kehitaman atau kuning tua dan bulu-bulunya telah hilang. Ujung kulit buah (bagian buah yang meruncing) bila ditekan terasa lunak, warnanya mengkilat dan mudah terlepas bila dipetik dari tandannya (Tim Karya Tani Mandiri, 2010).

4. Jenis-Jenis Salak

Sentra produksi salak terdapat di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, serta kini mulai meluas ditanam di berbagai provinsi lain di Indonesia (Rukmana, 1999).

Terdapat berbagai jenis salak yang diperdagangkan, yakni salak manonjaya dari daerah Tasik/Manonjaya, salak bali dari Bali, salak padang sidempuan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, salak condet dari Condet DKI Jakarta, salak bongkok dari daerah Sumedang, salak pondoh dari Yogyakarta, serta salak enrekang dari Sulawesi Selatan. Cita rasa salak bervariasi tergantung jenisnya, ada yang sepat, asam, dan manis. Tanda-tanda fisik bahwa buah salak dapat dipanen antara lain bila mata pada kulit buah telah melebar dan tidak ada bulunya (Suyanti, 2010).

Jenis salak yang tumbuh di dunia sedikitnya terdapat 20 macam. Namun, baru 13 jenis yang sudah diidentifikasi (dideterminasi) oleh kalangan pakar botani dan pertanian. Ketiga belas jenis salak tersebut adalah sebagai berikut (Haryani, 1994).

a. *Salacca magnifica*

Jenis salak ini berasal dari Sarawak (Malaysia) dan Kalimantan Timur. Karakteristik jenis salak ini ditandai dengan daunnya lebar dan tidak pecah, produksi buah 2-6 tandan per tangkai, buahnya lebat berisi 30-40 butir per tangkai. Buah yang matang rasanya manis sedikit asam dan tidak sepat, daging buah tebal dan beraroma seperti jambu air, serta berwarna putih krem. Di Sarawak, salak ini disebut *baroh* atau *lisum*, sedangkan di Kalimantan populer dengan sebutan *selindung*.

b. *Salacca multiflora*

Jenis salak ini berasal dari Semenanjung Malaysia. Ciri khas salak ini ditandai dengan daun lebar-lebar dan tidak pecah, produksi buah 3-9 tandan per tangkai,

jumlah per tandan hanya 2-4 butir, tangkai (tandan) buah cukup panjang, dan terkulai atau tergeletak di atas tanah. Buah berbentuk lonjong, berujung tumpul, daging buah cukup tebal, berwarna putih krem, agak berair, rasanya manis masam dan sedikit agak sepat.

c. *Salacca affinis*

Jenis salak ini berasal dari Kalimantan, yang dikenal dengan sebutan *romunjan, jomburan, romuran, lisum, kersin*, atau salak *tetek*. Karakteristik salak ini adalah buahnya berwarna merah cerah, merah kecokelat-cokelatan sampai merah kekuning-kuningan, bentuknya bulat dan ujungnya menonjol. Buah berukuran sedang, berisi 50 buah per tandan, dan bertandan panjang. Daging buahnya bertekstur lunak, berair, kulit buah agak sulit dikupas, dan rasa daging buah manis sampai masam.

d. *Salacca sumatrana*

Jenis salak ini tersebar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan sebutan salak *sidempuan*. Ciri-ciri salak ini adalah ukuran buahnya bervariasi dari kecil sampai besar, daging buah tebal, berwarna kuning kemerah-merahan, rasanya manis sedikit masam, agak berair, dan tidak sepat. Kulit buahnya bersisik besar, berwarna cokelat sampai kehitaman. Bijinya besar berwarna cokelat kehitam-hitaman.

e. *Salacca zalacca* (*S. edulis*)

Jenis salak ini mempunyai ciri-ciri: daun-daunnya pecah berbentuk menyirip, permukaan atas daun berwarna hijau tua mengkilap dan permukaan bawahnya berwarna keputih-putihan berlapis lilin. Jenis salak ini dibedakan atas dua subspecies atau varietas, yaitu *S. zalacca* var. *zalacca* dan *S. zalacca* var. *amboinensis*.

S. zalacca var. *zalacca* disebut salak jawa. Salak jawa umumnya berumah dua, sehingga pembuahannya membutuhkan bantuan penyerbukan. Jenis salak inilah yang mempunyai banyak varietas dan tersebar di berbagai daerah di Jawa, Madura, dan Sumatera Selatan.

S. zalacca var. *amboinensis* berasal dari Ijen (Jawa Timur), namun penyebarannya meluas di pulau Bali, Ambon, Ternate, Pangu (Manado), Sumba, dan Lombok. Jenis salak ini sering disebut salak bali. Karakteristik jenis salak ini adalah anak daunnya melipat ke bawah dan berumah satu. Jenis salak ini pun mempunyai banyak varietas yang tersebar di berbagai daerah di pulau Bali.

f. *Salacca glabrescens*

Jenis salak ini berasal dari Semenanjung Malaya. Karakteristiknya adalah daun-daun seperti salak jawa, namun permukaan bawah daun berwarna hijau tanpa lapisan putih. Daging buahnya lunak, berair, rasa manis sampai masam, dan bijinya tidak melekat pada daging buah.

g. *Salacca sarawakensis*

Jenis salak ini berasal dari Sarawak. Karakteristiknya adalah daun-daun tidak pecah dan ujungnya terbelah dua seperti sirip ikan. Kulit buahnya berwarna merah, daging buah agak tebal sampai tebal, berwarna putih krem dan rasanya manis sampai masam manis. Jenis salak ini potensial dijadikan tanaman hias.

h. *Salacca dubia*

Jenis salak ini berasal dari Sumatera Selatan. Tanaman salak ini ditandai dengan daunnya pecah membentuk anak-anak yang tersusun menyirip. Habitus tanaman relatif besar, tingginya antara 6-7 m. Buahnya mirip buah salak *S. affinis*, berwarna merah kecokelat-cokelatan.

i. *Salacca flabellata*

Jenis salak ini berasal dari daerah Pangkalan Kajang, Tenggau. Habitus tanamannya kecil, tinggi tanaman hanya 2 meter, berdaun lebar dan pecah-pecah sampai tidak pecah seperti pada *S. sarawakensis*. Kulit buah berwarna kecokelat-cokelatan, daging buah agak tebal, berwarna putih krem, dan rasanya agak manis. Bentuk buah mirip dengan buah salak jawa dan berukuran kecil.

j. *Salacca minuta*

Jenis salak ini berasal dari Semenanjung Malaya. Karakteristik tanaman mirip *S. multiflora*. Buahnya sedikit, tiap tandan hanya berisi 1-2 butir buah.

k. *Salacca dransfieldiana*

Jenis salak ini berasal dari Kalimantan Selatan. Ciri-ciri tanamannya adalah berdaun tidak pecah dan menyirip, ukuran dan warna buahnya mirip buah salak jawa, daging buah agak tebal, dan rasanya agak manis.

l. *Salacca vermiculata*

Jenis salak ini berasal dari Kalimantan, disebut *lisum*, *rakam* atau *salak hutan*. Ciri-ciri jenis salak ini adalah tanamannya mirip salak *sidempuan*, daun-daunnya menyirip, kulit buah berduri tajam, daging buah menyerupai salak *selindung* (*S. magnifica*).

m. *Salacca walliciana*

Jenis salak ini berasal dari Thailand, disebut *rakam*. Tanaman salak ini mirip dengan salak *sidempuan*, tetapi pelepah daun bagian bawahnya tidak berduri. Tangkai bunganya panjang dan berisi 40 butir buah atau lebih. Kulit buah berwarna jingga kemerah-merahan, dan rasa daging buahnya masam agak manis.

5. Varietas Salak Unggul Nasional

Varietas salak yang dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia yang telah dilepas (dirilis) sebagai varietas unggul nasional adalah varietas Pondoh (1988), Swaru (1991), Enrekang (1992), Nglumut (1993), Gula Pasir dan Bali (1994) (Rukmana, 1999).

Varietas salak dibedakan berdasarkan tekstur daging buah, warna kulit buah, besar buah, aroma, dan rasa daging buah, serta habitus. Perbedaan ini tidak hanya terjadi pada tanaman salak dari sentra produksi yang berbeda, tetapi juga antar tanaman dalam satu daerah (Hambali, 1994). Fenomena ini menyebabkan tanaman salak yang sudah dikelompokkan atas dasar sistem klasifikasi/taksonomi, masih menunjukkan keanekaragaman diantara anggota setiap populasi (Sofro, 1994).

Varietas atau keanekaragaman buah salak terjadi karena adanya: (Rochani, 2007)

a. Perkawinan Silang

Perkawinan silang yaitu perkawinan yang terjadi karena serbuk sari berasal dari bunga tanaman lain, tapi masih dalam 1 keluarga. Melalui perkawinan silang akan diperoleh keturunan yang sifatnya mirip induk jantan, betina, atau gabungan dari sifat keduanya yang merupakan sifat yang baru.

Keragaman varietas akan terus berkembang sejalan dengan sistem perkembangbiakan salak secara kawin silang dan penggunaan biji sebagai bahan tanaman. Namun informasi tentang keragaman genetik salak masih sangat kurang.

b. Proses Adaptasi atau Penyesuaian Diri terhadap Lingkungan

Proses adaptasi terjadi karena adanya lingkungan yang berubah, dan makhluk hidup harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sebab jika tidak,

mahluk hidup itu akan punah atau mati. Varietas baru dapat muncul karena faktor lingkungan dan variasi genetik. Perbedaan dan persamaan kemunculan morfologi luar spesies suatu tanaman dapat digunakan untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan (Suskendriyati, dkk., 2000).

6. Kandungan Kimia

Beberapa penelitian membuktikan bahwa kandungan buah dan kulit buah salak memiliki senyawa aktif berupa flavonoid, saponin, tanin, serta alkaloid (Sahputra, 2008). Biji buah salak mengandung tanin, quinon, monoterpen dan sesquiterpen, alkaloid, dan polifenol (Purwanto, dkk., 2015).

Menurut (Sahputra, 2008) hasil uji fitokimia pada sampel daging dan kulit buah salak menunjukkan bahwa senyawa flavonoid dan tanin lebih dominan daripada senyawa fitokimia lainnya, serta mengandung sedikit senyawa alkaloid.

Flavonoid merupakan golongan senyawa bahan alam dari senyawa fenolik yang merupakan pigmen tumbuhan. Fungsi kebanyakan flavonoid dalam tubuh manusia adalah sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel, memiliki hubungan sinergis dengan vitamin C (meningkatkan efektivitas vitamin C), antiinflamasi, mencegah tulang keropos, dan sebagai antibiotik (Barnes, *et al.*, 1996).

Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat, yaitu sebagai astringen, antidiare, antibakteri, dan antioksidan (Desmiaty, dkk., 2008). Tanin memiliki peranan biologis yang kompleks mulai dari pengendap protein hingga pengkhelat logam (Hagerman, 2002).

7. Kegunaan Tanaman

Buah salak memiliki kandungan flavonoid pada buah dan kulit buahnya sehingga menjadikan salak berpotensi sebagai antioksidan alami yang baik (Aralas, 2009), sebagai penghambat xantin oksidase (Herliani, *et al.*, 2012) dan sebagai penurun kadar gula darah (Aminah, 2014).

B. Uraian *Artemia salina* Leach

1. Klasifikasi (Mudjiman, 2004)

Kingdom	: Animalia
Divisi	: Arthropoda
Subdivisi	: Mandibulata
Kelas	: Crustacea
Subkelas	: Branchiopoda
Ordo	: Anostraca
Famili	: Artemiidae
Genus	: <i>Artemia</i>
Spesies	: <i>Artemia salina</i> Leach

2. Morfologi

Artemia salina Leach dewasa berwarna putih pucat, merah muda, hijau, atau transparan dan biasanya hanya hidup beberapa bulan (Emslie, 2003). Ukuran *Artemia salina* Leach dewasa hanya 10-20 mm, bentuknya menyerupai udang kecil. Telur *Artemia* yang masih bercangkang berdiameter sekitar 300 mikron dan berat kering sekitar 3,65 mikrogram. Telur yang telah didekapsulasi (dibuang cangkangnya) memiliki diameter sekitar 210 mikron. Larva yang baru menetas panjangnya sekitar 0,4 mm dan berat sekitar 15 mikrogram, bagian kepala lebih besar dan kemudian

mengecil pada bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata dan sepasang antenula (sungut), pada bagian kaki terdapat sebelas pasang kaki atau secara khusus disebut torakopoda. Jumlah kaki ini yang membedakan *Artemia salina* dengan spesies lain dari kelas Crustacea yang umumnya hanya memiliki sepuluh pasang kaki. Antara ekor dan pasangan kaki paling belakang terdapat sepasang alat kelamin, masing-masing penis pada jantan dan ovarium pada betina (Mudjiman, 2004).

3. Lingkungan Hidup

A. salina Leach memiliki resistensi luar biasa pada perubahan dan mampu hidup pada variasi salinitas air yang luas dari *seawater* (2,9-3,5%) sampai *the great salt lake* (25-35%), dan masih dapat bertoleransi pada kadar garam 50% (jenuh). *A. salina* Leach juga mendiami kolom-kolom evaporasi buatan manusia yang biasa digunakan untuk mendapatkan garam dari lautan. Insang membantunya agar cocok dengan kadar garam tinggi dengan absorpsi dan ekskresi ion-ion yang dibutuhkan dan menghasilkan urin pekat dari glandula *maxillaris*. Hidup pada variasi temperatur air yang tinggi pula, dari 6-37°C dengan temperatur optimal untuk reproduksi pada 25°C (suhu kamar). Keuntungan hidup pada lokasi berkadar garam tinggi adalah sedikitnya predator namun sumber makanannya sedikit (Emslie, 2003).

Cara *Artemia salina* mengambil makanannya yaitu dengan menyaring (*filter feeder*). Sebagai penyaring makanan *Artemia* menelan apa saja yang ukurannya kecil. Biasanya berupa sisa-sisa jasad hidup yang menghancurkan, ganggang renik, cendawan, dan bakteri. Makanan yang akan ditelan dikumpulkan terlebih dahulu ke depan mulutnya dengan menggerak-gerakkan kakinya. Arus air yang ditimbulkan oleh gerakan kaki itu akan membawa makanan ke arah mulut, sehingga *Artemia* tinggal menelannya saja. Untuk pemeliharaan, maka diperlukan makanan dengan ukuran

partikel khusus, yaitu lebih kecil dari 60 mikron. Makanan yang diberikan dapat berupa makanan buatan maupun makanan hidup atau plankton. Makanan buatan yang biasa diberikan antara lain tepung beras, tepung terigu, tepung kedelai, bekatul padi, atau ragi (Mudjiman, 2004).

A. salina Leach bersifat fototaksis positif yang berarti menyukai cahaya. Di alam, hal tersebut dibuktikan dengan adanya gerakan tubuh menuju ke permukaan karena sinar matahari sebagai sumber cahaya secara alami, dimana akan selalu di permukaan saat siang hari dan tenggelam pada malam hari. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat pula mengakibatkan respon fototaksis negatif sehingga ia akan menjauhi cahaya. *A. salina* Leach yang baru menetas mempunyai perilaku geotaksis positif, hal ini terjadi ketika naupli tenggelam ke bawah setelah menetas akibat efek gravitasi (Emslie, 2003).

4. Perkembangbiakan dan Siklus Hidup

Menurut cara reproduksinya *Artemia* dipilah menjadi dua yaitu, *Artemia* yang bersifat biseksual dan *Artemia* yang bersifat partenogenik. Keduanya mempunyai cara berkembang biak yang berlainan. *Artemia* biseksual berkembang biak secara seksual, yaitu perkembangbiakannya didahului dengan perkawinan antara jantan dan betina. Sedangkan *Artemia* partenogenik berkembang biak secara parthenogenesis yaitu betina menghasilkan telur atau naupli tanpa adanya pembuahan (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).

Pada jenis *A. salina* Leach ovovivipar, anakan yang keluar dari induknya sudah berupa arak atau burayak yang dinamakan naupli, sehingga sudah langsung dapat hidup sebagai *A. salina* Leach muda. Sedangkan pada cara ovipar, yang keluar dari induknya berupa telur bercangkang tebal yang dinamakan kista. Proses untuk

menjadi naupli masih harus melalui proses penetasan terlebih dahulu. Kondisi ovovivipar biasanya terjadi bila keadaan lingkungan cukup baik, dengan kadar garam kurang dari 150 per mil dan kandungan oksigennya cukup. Oviparitas terjadi apabila keadaan lingkungan memburuk, dengan kadar garam lebih dari 150 per mil dan kandungan oksigennya kurang. Telur ini memang dipersiapkan untuk menghadapi keadaan lingkungan yang buruk, bahkan kering. Bila keadaan lingkungan baik kembali, telur akan menetas dalam waktu 24-36 jam (Mudjiman, 1995; Kanwar, 2007).

A. salina Leach yang sudah dewasa dapat hidup sampai enam bulan. Sementara induk-induk betinanya akan beranak atau bertelur setiap 4-5 hari sekali, dihasilkan 50-300 telur atau naupli. Naupli akan dewasa setelah berumur 14 hari, dan siap untuk berkembang biak (Mudjiman, 1995).

A. salina Leach dapat diperjualbelikan dalam bentuk telur istirahat yang disebut kista. Kista ini berbentuk bulatan-bulatan kecil berwarna kecoklatan dengan diameter berkisar 200-300 mikron. Kista yang berkualitas baik akan menetas sekitar 18-24 jam apabila diinkubasi air yang bersalinitas 5-70 per mil (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).

Kista *Artemia salina* yang ditetaskan pada salinitas 15-35 ppt akan menetas dalam waktu 24-36 jam. Larva *Artemia* yang baru menetas dikenal dengan naupli. Naupli berangsur-angsur mengalami perkembangan dan perubahan morfologis dengan 15 kali pergantian kulit hingga menjadi dewasa. Pada setiap tingkatan pergantian kulit disebut dengan instar, sehingga dikenal instar I hingga instar XV. Udang ini mulai mengambil makanan setelah mencapai instar II (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).

Instar I berukuran 400 mikron, lebar 170 mikron dan berat 15 mikrogram, berwarna orange kecoklatan. Setelah 24 jam menetas, naupli akan berubah menjadi instar II, sudah berbulu, bermulut, terdapat saluran pencernaan dan dubur. Tingkatan selanjutnya, pada kanan dan kiri mata naupli terbentuk sepasang mata majemuk. Bagian samping badannya mulai tumbuh tunas-tunas kaki, setelah instar XV kakinya sudah lengkap sebanyak 11 pasang. Naupli menjadi artemia dewasa (proses instar I-XV) antara 1-3 minggu (Mukti, dkk., 2003).

5. Penetasan Telur *Artemia salina* Leach

Subaidah dan Mulyadi (2004) memberikan penjelasan langkah-langkah penetasan dengan cara dekapsulasi, sebagai berikut:

- a. kista *Artemia* dihidrasi dengan menggunakan air tawar selama 1-2 jam;
- b. kista disaring menggunakan *plankton net* 120 mikron dan dicuci bersih;
- c. kista dicampur dengan larutan kaporit/klorin dengan dosis 1,5 ml per 1 gram kista, kemudian diaduk hingga warnanya menjadi merah bata;
- d. kista segera disaring menggunakan *plankton net* 120 mikron dan dibilas menggunakan air tawar sampai bau klorin hilang, barulah siap untuk ditetaskan;
- e. kista akan menetas setelah 18-24 jam.

6. Penggunaan *Artemia salina* Leach dalam Penelitian

Artemia salina Leach merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem laut yang keberadaannya sangat penting untuk perputaran energi dalam rantai makanan. Selain itu, *Artemia salina* Leach juga dapat digunakan dalam uji laboratorium untuk mendeteksi toksisitas suatu senyawa dari ekstrak tumbuhan (Kanwar, 2007). Ketersediaan telur *Artemia salina* dengan harga yang murah, kerentanannya terhadap senyawa toksik selama masa pertumbuhan, menjadi alasan

sering dipilihnya larva *Artemia salina* Leach sebagai indikator biologi (Chaulk dan Park, 2002).

Hewan uji yang digunakan dalam BST adalah *Artemia salina* Leach. *Artemia salina* adalah salah satu jenis udang primitif tingkat rendah. Zooplankton ini hidup di air laut yang berkadar garam tinggi, yaitu 15-300 per mil, bersuhu 26-31°C, dan ber-pH 7,3-8,4. *Artemia salina* sebagai plankton mampu hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, sedangkan tidak satu pun organisme lain yang mampu bertahan hidup pada kondisi tersebut. Dengan demikian *Artemia salina* relatif aman dari gangguan organisme pemangsa lain (Mudjiman, 2004).

C. Ekstraksi

1. Definisi Ekstrak dan Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 2000).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Kelarutan dan stabilitas senyawa pada simplisia terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman dipengaruhi oleh struktur kimia yang berbeda-beda (Ditjen POM, 2000).

2. Tujuan dan Prinsip Ekstraksi

Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa

komponen zat kedalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka kemudian berdifusi masuk kedalam pelarut (Harborne, 1987; Dirjen POM, 1986).

Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat yang terdapat didalam simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi, dan hal ini memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya. Dalam sediaan ekstrak dapat distandarisasi zat berkhasiat, sedangkan kadar zat berkhasiat dalam simplisia sukar didapat kadar yang sama (Anief, 1997).

Prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non polar dalam pelarut non polar. Serbuk simplisia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda polaritasnya (Harborne, 1987). Proses ekstraksi merupakan penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dengan zat yang diinginkan larut (Voight, 1994).

3. Metode Ekstraksi

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya: (Sarker SD, dkk., 2006)

- a. senyawa bioaktif yang tidak diketahui;
- b. senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme;
- c. sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.

Menurut Ditjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi:

a. Cara Dingin

1) Maserasi

Maserasi berasal dari kata "*macerare*" artinya melunakkan. Maserasi merupakan proses penyarian yang sederhana dan banyak digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang halus. Simplisia ini direndam dalam penyari sampai meresap dan melemahkan susunan sel sehingga zat-zatnya akan terlarut, serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan pada wadah bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian diaduk berulang-ulang, sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia (Ansel, 1989). Maserat adalah hasil penarikan simplisia dengan cara maserasi (Syamsuni, 2006). Remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Ditjen POM, 2000). Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Keuntungan dari metode maserasi yaitu prosedur dan peralatannya sederhana (Agoes, 2007).

2) Perkolasi

Percolare berasal dari kata "*colare*", artinya menyerkai dan "*per*" = *through*, artinya menembus. Dengan demikian, perkolasi adalah suatu cara penarikan memakai alat yang disebut perkolator dimana simplisia terendam dalam cairan penyari, zat-zat akan terlarut dan larutan tersebut akan menetes secara beraturan (Syamsuni, 2006). Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan perkolat) terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Ditjen POM, 2000). Keuntungan dari metode perkolasi ini adalah proses penarikan zat berkhasiat dari

tumbuhan lebih sempurna, sedangkan kerugiannya adalah membutuhkan waktu yang lama dan peralatan yang digunakan mahal (Agoes, 2007).

b. Cara Panas

1) Refluks

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi berkesinambungan. Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu, dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak, lalu dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam simplisia tersebut, demikian seterusnya. Ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi selama 4 jam (Harborne, 1987; Dirjen POM, 1986).

2) Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Ditjen POM, 2000). Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah

senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih (Seidel V, 2006).

3) Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

4) Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5) Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥ 30 °C) dan temperatur sampai titik didih air.

4. Pemilihan Pelarut

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan. Dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung (Ditjen POM, 2000).

Faktor utama untuk pertimbangan pada pemilihan cairan penyari adalah sebagai berikut: (Ditjen POM, 2000)

- a. selektivitas;
- b. kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut;

- c. ekonomis;
- d. ramah lingkungan;
- e. keamanan.

Pada prinsipnya cairan pelarut harus memenuhi syarat kefarmasian atau dalam perdagangan dikenal dengan kelompok spesifikasi “*pharmaceutical grade*”. Sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah air dan alkohol (etanol) serta campurannya. Jenis pelarut lain seperti metanol (alkohol dan turunannya), heksan (hidrokarbon alifatik), toluen (hidrokarbon aromatik), kloroform (segolongannya), dan aseton umumnya digunakan sebagai pelarut untuk tahap separasi dan tahap pemurnian (fraksinasi). Khusus metanol, dihindari penggunaannya karena sifatnya yang toksik akut dan kronik (Ditjen POM, 2000).

Kepolaran suatu pelarut menunjukkan tingkat kelarutan pelarut air ataupun pelarut organik terhadap suatu bahan. Kepolaran ini timbul dari perbedaan dua kutub (*pole*) kelarutan. Kecenderungan suatu bahan yang lebih larut dalam air disebut memiliki sifat yang polar dan sebaliknya yang cenderung lebih larut dalam pelarut organik disebut non polar. Secara fisika, tingkat polaritas ini dapat ditunjukkan dengan lebih pasti melalui pengukuran konstanta dielektrikum (D) suatu pelarut. Semakin besar konstanta dielektrikum suatu pelarut disebut semakin polar (Sudarmadji, dkk., 2003).

D. *Fraksinasi*

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan kedalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Fraksinasi adalah proses untuk memisahkan

golongan kandungan senyawa yang satu dengan golongan yang lainnya dari suatu ekstrak. Prosedur pemisahan dengan fraksinasi ini didasarkan pada perbedaan kepolaran kandungan senyawanya (Harborne, 1987). Fraksinasi dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum (KCV), kromatografi kolom (KK), *size-exclusion chromatography* (SEC), *solid-phase extraction* (SPE) (Sarker SD, dkk., 2006).

Kromatografi adalah suatu metode pemisahan berdasarkan perbedaan perpindahan dari komponen-komponen senyawa diantara dua fase yaitu fase diam (dapat berupa zat cair atau zat padat) dan fase gerak (dapat berupa gas atau zat cair) (Ditjen POM, 1995). Fase diam berupa zat padat maka cara tersebut dikenal sebagai kromatografi serapan, jika zat cair dikenal sebagai kromatografi partisi (Sastrohamidjojo, 2007).

1. Kromatografi Cair Vakum

Vacuum Liquid Chromatography (VLC) atau Kromatografi Cair Vakum (KCV) merupakan pengembangan dari kromatografi kolom. Pada KCV, elusi diaktivasi dengan menggunakan vakum. Elusi dilakukan dengan menggunakan fase gerak dengan gradien polaritas dari polaritas paling rendah sampai polaritas yang paling tinggi. Pemisahan senyawa pada KCV didasarkan pada kelarutan senyawa yang dipisahkan dalam fase gerak yang digunakan. Fase gerak dengan gradien polaritas diharapkan dapat memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki polaritas berbeda (Padmawinata, 1995).

Kolom kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dari pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolarannya ditingkatkan

perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu, kromatografi cair vakum menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostettmann, *et al.*, 1995).

Kromatografi cair vakum mempunyai keuntungan yang utama dibandingkan dengan kolom konvensional, yaitu: (Gritter, 1991)

- a. konsumsi fase gerak KCV hanya 80% atau lebih kecil dibanding dengan kolom konvensional karena pada kolom mikrobor kecepatan alir fase gerak lebih lambat (10-100 $\mu\text{l}/\text{menit}$);
- b. adanya aliran fase gerak lebih lambat membuat kolom mikrobor lebih ideal jika digabung dengan spektrometer massa;
- c. sensitivitas kolom mikrobor ditingkatkan karena *solute* lebih pekat sehingga jenis kolom ini sangat bermanfaat jika jumlah sampel terbatas, misal sampel klinis.

Kerugian KCV (Kromatografi Cair Vakum): (Gritter, 1991)

- a. membutuhkan waktu yang cukup lama;
- b. sampel yang dapat digunakan terbatas.

2. Kromatografi Lapis Tipis

Salah satu cara pemisahan adalah kromatografi lapis tipis. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan salah satu kromatografi yang berdasarkan proses adsorpsi. Lapisan yang dipisahkan terdiri atas fase diam dan fase gerak (Vogel, 1989). Fase diam berupa serbuk yang dilapiskan tipis merata pada lempeng kromatografi (plat, gelas, logam atau lempeng yang cocok). Fase diam berfungsi sebagai penyerap. Fase diam yang sering dipakai adalah silika gel, aluminium oksida, kieselgur, selulosa dan turunannya, dan lain-lain. Fase gerak ialah media angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat, sistem pelarut multi

komponen ini harus berupa suatu campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimal 3 komponen (Stahl, 1985).

Perkiraan identifikasi diperoleh dengan pengamatan bercak dengan harga R_f yang identik dan ukuran yang hampir sama, dengan menotolkan zat uji dan baku pembanding pada lempeng yang sama (Ditjen POM, 1995). Visualisasi dilakukan menggunakan pereaksi warna atau sinar ultraviolet. Deteksi terhadap bercak dapat dilakukan secara visual apabila komponen tersebut tampak oleh mata telanjang. Bila komponen tersebut tidak berwarna atau sulit diamati dengan mata telanjang, maka senyawa hasil pengembangan dapat dideteksi dengan bantuan sinar UV atau pereaksi untuk membantu menampakkan bercak (Sherma and Fried, 1996).

Senyawa yang tidak berwarna dan tidak berpendar, dapat divisualisasi di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 254 nm dengan cara memberi indikator fluoresensi pada lempeng KLT (Sherma and Fried, 1996). Sinar UV 254 dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa yang mempunyai kromofor dan senyawa tersebut terikat pada fase diam silika gel GF254. Apabila dipapari sinar UV 254, senyawa yang mempunyai kromofor akan menggunakan energi dari sinar tersebut untuk eksitasi elektron-elektron terluar sehingga dapat memadamkan fluoresensi. Sinar UV 366 dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi yang lebih panjang. Senyawa ini dapat merupakan senyawa yang mengandung inti aromatik seperti flavonoid atau senyawa dengan ikatan rangkap tak jenuh seperti lemak dan asam lemak (Stahl, 1985).

Pada sistem ini dikenal istilah kecepatan rambat suatu senyawa yang diberi simbol R_f (*Retardation factor*). Harga R_f ditentukan oleh jarak rambat senyawa dari titik awal dan jarak rambat fase gerak dari titik awal. Harga R_f ini dapat digunakan

untuk identifikasi senyawa yang dianalisa. Penentuan harga Rf adalah sebagai berikut: (Stahl, 1985)

$$R_f = \frac{\text{Jarak perambatan bercak dari titik awal}}{\text{Jarak perambatan fase gerak dari titik awal}}$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Rf, yaitu: (Sastrohamidjojo, 2007)

- a. struktur kimia dari senyawa yang sedang dipisahkan;
- b. sifat penjerap;
- c. tebal dan kerataan dari lapisan penjerap;
- d. pelarut dan derajat kemurniannya;
- e. derajat kejenuhan uap pengembang dalam bejana;
- f. teknik percobaan;
- g. jumlah cuplikan yang digunakan;
- h. suhu;
- i. kesetimbangan.

KLT dapat digunakan jika: (Gandjar IG, 2008)

- a. senyawa tidak menguap atau tingkat penguapannya rendah;
- b. senyawa bersifat polar, semi polar, non polar, atau ionik;
- c. sampel dalam jumlah banyak harus dianalisis secara simultan, hemat biaya, dan dalam jangka waktu tertentu;
- d. sampel yang akan dianalisis akan merusak kolom pada Kromatografi Cair (KC) ataupun Kromatografi Gas (KG);
- e. pelarut yang digunakan akan mengganggu penjerap dalam kolom kromatografi cair;

- f. senyawa dalam sampel yang akan dianalisis tidak dapat dideteksi dengan metode KC ataupun KG atau memiliki tingkat kesulitan yang tinggi;
- g. setelah proses kromatografi, semua komponen dalam sampel perlu dideteksi (berkaitan dengan nilai Rf);
- h. komponen dari suatu campuran dari suatu senyawa akan dideteksi terpisah setelah pemisahan atau akan dideteksi dengan berbagai metode secara bergantian (misalnya pada *drug screening*).

KLT digunakan secara luas untuk analisis *solute-solute* organik terutama dalam bidang biokimia, farmasi, klinis, forensik, baik untuk analisis kualitatif dengan cara membandingkan nilai Rf *solute* dengan nilai Rf senyawa baku atau untuk analisis kualitatif. Penggunaan umum KLT adalah untuk menentukan banyaknya komponen dalam campuran, identifikasi senyawa, memantau berjalannya suatu reaksi, menentukan efektivitas pemurnian, menentukan kondisi yang sesuai untuk kromatografi kolom, serta untuk memantau kromatografi kolom, melakukan *screening* sampel untuk obat (Gandjar IG, 2008).

E. Uji Toksisitas dengan Metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)

Beberapa metode skrining aktivitas biologis dapat digunakan sebagai pencarian bahan bioaktif yang mempunyai aktivitas antikanker. Metode tersebut antara lain: Uji Kematian Larva Udang Laut atau *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT), Uji Hambatan Tumor pada Lempeng Kentang atau *Potato Disc Crow Gall Tumor Inhibition Assay*, Uji Proliferasi Kuncup Lemma atau *Lemma Frond Proliferation Assay*, dan Uji Sitotoksik *In Vivo* dan *In Vitro* (Hidayat, 2002).

Uji toksisitas metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BST) merupakan uji pendahuluan yang dapat digunakan untuk memantau senyawa bioaktif dari bahan

alami (Anderson, *et al.*, 1991). Adanya korelasi positif antara metode BST dengan uji sitotoksik menggunakan kultur sel kanker maka metode ini sering dimanfaatkan untuk skrining senyawa antikanker (Carballo, *et al.*, 2002). Metode tersebut memiliki beberapa keuntungan antara lain, lebih cepat, murah, mudah, tidak memerlukan kondisi aseptis, dan dapat dipercaya (Meyer, *et al.*, 1982).

Senyawa bioaktif hampir selalu toksik pada dosis tinggi. Oleh karena itu, daya bunuh *in vitro* dari senyawa terhadap organisme hewan dapat digunakan untuk menguji ekstrak tumbuhan yang mempunyai bioaktivitas dan untuk memonitor fraksi bioaktif selama fraksinasi dan pemurnian. Salah satu organisme yang sangat sesuai untuk hewan uji tersebut adalah *brine shrimp* (Lenny, 2006).

Nilai LC_{50} merupakan nilai yang menunjukkan besarnya konsentrasi suatu bahan uji yang dapat menyebabkan 50% kematian jumlah hewan uji setelah perlakuan 24 jam. Melalui metode tersebut, pelaksanaan skrining awal suatu senyawa aktif akan berlangsung relatif cepat dengan biaya yang relatif murah. Hal ini dikarenakan hanya ekstrak atau senyawa yang memiliki aktivitas antikanker berdasarkan metode BST tersebut selanjutnya dapat diyakinkan antikankernya terhadap biakan sel kanker (Dwiatmaka, 2001; Mukhtar, dkk., 2007).

Suatu ekstrak dikatakan aktif sitotoksik bila nilai $LC_{50} < 1000$ ppm untuk ekstrak dan < 200 ppm untuk suatu senyawa. Tingkat toksisitas suatu ekstrak: (Meyer, *et al.*, 1982).

1. $LC_{50} \leq 30$ ppm = sangat toksik
2. LC_{50} 31 ppm - 1000 ppm = toksik
3. $LC_{50} > 1000$ ppm = tidak toksik

F. Tinjauan Islam

1. Kedudukan Obat dalam Islam

Pengobatan ialah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kepercayaan dan keyakinan, karena manusia merasa di dalam alam ini ada sesuatu yang lebih kuat dari manusia. Baik yang dapat dirasakan oleh panca indera maupun yang tidak dirasakan, yang bersifat gaib. Pengobatan ini pun tidak lepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang dianut manusia (Akbar, 1988).

Prinsip pengobatan didalam penyembuhan penyakit menurut Rasulullah saw. diterapkan sebagai pedoman yang perlu diketahui dan dilaksanakan. Rasulullah saw. mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi harus halal dan baik. Jika kita menginginkan kesembuhan dari Allah swt. maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridhoi oleh Allah swt. karena Allah melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh kita (Muhadi dan Muadzin, 2009).

Kesehatan merupakan ketahanan jasmaniah, ruhaniah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah swt. yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan, memelihara, dan mengembangkannya. Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan sebab apa yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sehat lebih banyak daripada yang bisa dilakukannya dalam keadaan sakit. Referensi tentang sehat dapat ditemui dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda: (Hendrik, 2009).

نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya:

“Dua nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang” (HR. Bukhari)

Ibnu Baththol mengatakan, “Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barangsiapa yang memiliki dua nikmat ini (yaitu waktu senggang dan nikmat sehat), hendaklah ia bersemangat, jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan tidak melaksanakan setiap larangan Allah. Barangsiapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah yang tertipu.”

Sesuai dengan sunnah Nabi inilah, umat Islam diajarkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah swt. Bahkan bisa dikatakan jika kesehatan adalah nikmat Allah swt. yang terbesar dan harus diterima manusia dengan rasa syukur. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah karena telah diberi nikmat kesehatan adalah senantiasa menjaga kesehatan. Konsekuensi rasa syukur atas nikmat Allah swt. akan berdampak pada diri manusia itu sendiri.

Indikasi sakit, sembuh, dan sehat dalam bahasa Al-Quran, secara berurutan dapat didasarkan pada kata *maradl*, *syifa'*, dan *salim*. Kata *maradl* dan *syifa'* secara berdampingan diungkapkan dalam Surah Asy-Syuara'/26: 80 berikut.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku kembali.”
(Departemen Agama RI, 2008: 370)

Firman-Nya: (وإنما مرضت) *wa idzâ maridhtu/dan apabila aku sakit*, berbeda dengan redaksi lainnya. Perbedaan pertama adalah penggunaan kata *idzâ/apabila* dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa sakit berat atau ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Perbedaan kedua adalah redaksinya yang menyatakan “*Apabila aku sakit*” bukan “*Apabila Allah menjadikan aku sakit*”. Namun demikian, dalam hal penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan dan minum secara tegas beliau menyatakan bahwa yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam itu (Shihab, 2002: 69).

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa berbicara tentang nikmat secara tegas Nabi Ibrahim as. menyatakan bahwa sumbernya adalah Allah swt., berbeda dengan ketika berbicara tentang penyakit. Ini karena penganugerahan nikmat adalah sesuatu yang terpuji, sehingga wajar disandarkan kepada Allah, penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak wajar dinyatakan bersumber dari Allah swt. Demikian Nabi Ibrahim as. mengajarkan bahwa segala yang terpuji dan indah bersumber dari-Nya. Adapun yang tercela dan negatif, maka hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri (Shihab, 2002: 69).

Pada ayat ini tampak dengan jelas bahwa sakit (*maradl*) terkait dengan manusia, sedangkan kesembuhan (*syifa'*) merupakan sesuatu yang diberikan kepada manusia, dan bersandar kepada Allah swt., kandungan makna ini mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obatnya sesuai dengan penyakitnya, kesembuhan akan terjadi, dan atas izin dari Allah swt. (Muntaha, 2012).

Shifa' dalam Al-Quran menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar adalah segala sesuatu yang diupayakan oleh seseorang dalam penyembuhan dari penyakitnya, sehingga ia menjadi normal, benar keimanan, pemikiran dan akidahnya dalam memperoleh kebahagiaan di hadapan Allah. *Shifa'* dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah penyembuhan dari penyakit, penyembuhan ini telah menjadi sebuah usaha manusia dalam membersihkan dirinya dari berbagai gangguan dan kesulitan lahiriah maupun batiniah (Hamka, 2000).

Penyembuhan manusia dari suatu penyakit yang dideritanya adalah mutlak kekuasaan Allah swt., bukan kekuasaan manusia, karena penyakit datangnya dari Allah swt., dan pasti Allah akan menurunkan obatnya. Beberapa kaidah dalam pengobatan yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim saat berusaha mengobati penyakit yang dideritanya adalah bahwa obat dan dokter hanya merupakan sarana kesembuhan terhadap suatu penyakit. Dalam berusaha mencari obat/pengobatan, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang syirik dan diharamkan oleh syariat-syariat Islam (baik yang berhubungan dengan teknik pengobatan maupun obat-obatnya) (Hendrik, 2009).

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi saw. bersabda: (Al-Ju'aisin, 2001).

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأً
بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Jabir dari Rasulullah saw. bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah azza wajallah” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, baik itu penyakit yang muncul pada zaman nabi maupun sesudah nabi. Segala jenis penyakit pasti ada obatnya, tergantung bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut bisa sembuh dengan izin Allah swt. (Hawari, 1997).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua penyakit memiliki obat dan obat yang diberikan harus sesuai dengan penyakitnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berusaha dan mencari tahu, meneliti obat untuk memperoleh pengobatan yang sesuai. Namun, tidak lupa bahwa kesembuhan dari suatu penyakit hanya karena izin Allah swt.

2. Pemanfaatan Tanaman dalam Perspektif Islam

Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk memikirkan dan mengkaji tanda-tanda penciptaan di sekitar mereka. Rasulullah Muhammad saw., Sang utusan Allah juga memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Barangsiapa menyelidiki seluk-beluk alam semesta dengan segala sesuatu yang hidup dan tak hidup di dalamnya dan memikirkan serta menyelidiki apa yang dilihatnya di sekitarnya, akan mengenali kebijakan, ilmu, dan kekuasaan abadi Allah (Yahya, 2004).

Dalam Al-Quran Surah Ali Imran/3: 190-191 Allah berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.”

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Departemen Agama RI, 2008: 75)

Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan, pada hakikatnya ditetapkan dan diatur oleh Allah Yang Maha Hidup Lagi Qayyum (Maha Menguasai dan Maha Mengelola Sesuatu). Hakikat ini kembali ditegaskan pada ayat ini dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi dan porosnya, yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya terdapat tanda-tanda ke-Mahakuasaan Allah bagi *ulul albab*, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang ke-Esaan dan ke-Kuasaan Allah swt. (Shihab, 2009).

Ulul albab yang disebutkan pada ayat adalah orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah, dengan ucapan dan atau

hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: *“Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan. Maha Suci Engkau dari semua itu. Itu adalah ulah atau dosa dan kekurangan kami yang dapat menjerumuskan kami ke dalam siksa neraka maka peliharalah kami dari siksa neraka”* (Shihab, 2009).

Di atas, terlihat bahwa objek zikir adalah Allah, sedang objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada *qalbu*, sedang pengenalan alam raya oleh penggunaan akal, yakni berpikir (Shihab, 2009).

Keanekaragaman tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah swt. yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu digunakan sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. memiliki banyak manfaat sehingga dihamparkan di bumi dan dikelola oleh manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Hanya saja dalam pengelolaannya dibutuhkan ilmu pengetahuan, dengan itu manusia sebagai khalifah dapat mengambil manfaat dari ciptaan Allah swt. terutama dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pengobatan.

Firman Allah swt. dalam Al-Quran Surah Thaahaa/20: 53 berikut.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Departemen Agama RI, 2008: 316)

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, bahwa Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagai mana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Dan kata *azwaj* yang menguraikan aneka tumbuhan dapat dipahami dalam arti *jenis-jenis tumbuhan*, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam kacang-kacangan, atau tumbuhan berkeping satu (monokotil) seperti pisang, nenas, palem, dan lain-lain (Shihab, 2006).

Dalam buku Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 5, menjelaskan bahwa “Dan yang menurunkan air dari langit, kemudian Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan”. Maksudnya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan, ada yang masam, manis, pahit, dan yang lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan (Tim Ahli Tafsir, 2001).

Dari ayat di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt. memberi hidayah kepada manusia dengan menurunkan air dari langit berupa hujan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya adalah dalam pemanfaatannya sebagai obat.

3. Tumbuhan sebagai Obat

Sekelompok orang yang menjadi tenaga ahli pengobatan sudah ada semenjak masa ke-Nabi-an, juga sebelum itu dan sesudahnya. Salah satu bidang pengobatan yang sudah ada sejak itu adalah ilmu obat alam atau disebut juga dengan farmakognosi. Adapun yang dimaksud dengan farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat/bahan obat yang berasal dari alam baik dari tumbuhan, hewan maupun mineral (Rahim, 2007).

Menurut Akbar (1988), pada dasarnya obat tradisional diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak diri sendiri dan orang lain, lebih penting lagi adalah pengobatan tradisional diperbolehkan oleh Islam selama tidak membawa kepada syirik, seperti jampi-jampi, berdoa kepada ruh halus, karena Islam berarti keselamatan, sebagai agama tauhid yang rasional dan tidak mistik. Pengobatan tradisional ini tidak akan subur di Indonesia selama umatnya masih percaya kepada hal-hal mistik, supranatural, ruh halus dan ruh jahat, serta selama derajat pendidikan masih rendah dan terutama karena pengertian mengenai Islam belum mendalam hingga belum mengerti serta menghayati arti dan makna tauhid.

Para ahli dalam bidang ini mengetahui formula obat-obatan, karakteristik dan cara penggunaannya. Diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja. Dan Allah-lah yang menjadikan penyebab itu semua. Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan ini dan berobatlah dengannya (Ar-Rumaikhon, 2008).

Di dunia ini terdapat bermacam-macam tumbuhan dengan warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syua'ara/26: 7 berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Departemen Agama RI, 2008: 367)

Kata (إلى) *ilâ/ke* pada firman-Nya di awal ayat ini: (أولم يروا إلى الأرض) *awalam yarâ ilâ al-ardh/apakah mereka tidak melihat ke bumi*, merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir. Dengan demikian, ayat ini mengajak manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2002: 11).

Kata (كريم) *karîm* antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002: 12).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah Allah swt. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, batang, rimpang, bunga, buah, dan bijinya. Tumbuhan yang baik paling tidak adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002).

Dari ayat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Allah swt. memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti hingga

menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat. Dapat dipahami bahwa untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun mineral. Dimana ketiganya menghendaki agar manusia senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah swt. yang memiliki manfaat untuk kebutuhan manusia.

Islam senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan. Hal inilah yang mendorong umat muslim untuk mengenal banyak ilmu, salah satunya adalah ilmu pengobatan yang menggunakan bahan alam khususnya tumbuhan. Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan muslim di era kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim juga tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Selain itu, dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman/55: 6 dinyatakan:

وَالَّتِجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.” (Departemen Agama RI, 2008: 531)

Kata (يسجدان) *yasjudân* dipahami oleh banyak ulama dalam arti *tunduk* dan *patuh* mengikuti ketentuan Allah menyangkut pertumbuhannya. Matahari dan bulan yang berada di angkasa, pohon, dan tumbuh-tumbuhan yang berada di bumi, kesemuanya diatur dengan teliti dan sesuai oleh Allah swt. dan kesemuanya bahkan alam raya seluruhnya, tunduk dan patuh serta mengarah hanya kepada-Nya semata

(Shihab, 2002: 498). Tumbuhan merupakan rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan, dan bahan obat-obatan. Subhanallah, begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain (Sandi, 2008).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara eksperimental. Perlakuan dengan pemberian ekstrak dan fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) terhadap larva *Artemia salina* Leach.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimental.

C. Instrumen Penelitian

1. Alat yang Digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah aerator, cawan porselin, *chamber*, erlenmeyer (*Pyrex*) 100 ml, gelas kimia 1000 ml, gelas ukur (*Pyrex*) 5; 10; 50; 100 ml, lampu UV 254 dan 366 nm, mikropipet (*Nesco*) 1-10; 10-100; 100-1000 μ l, neraca analitik (*Kern*), neraca Ohaus, *microwave* (*Sharp*), pengayak (*Retsch*), penyemprot KLT, pipa kapiler, seperangkat alat kromatografi cair vakum, seperangkat alat refluks, seperangkat alat uji BSLT, *vial*, dan *vortex mixer* (*K*).

2. Bahan yang Digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah air garam, air suling, etanol, etil asetat, larva *Artemia salina* Leach., lempeng silika gel F₂₅₄ (*E. Merck*), metanol, pereaksi AlCl₃ 5%; Dragendorff; FeCl₃ 5%; H₂SO₄ 10%; KOH etanolik; Liebermann-Bouchard, sampel biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss), silika gel 60 PF₂₅₄ (*Merck*).

D. Metode Pengumpulan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode kuantitatif dengan cara menghitung hasil pengamatan yang diperoleh menggunakan analisis probit untuk mendapatkan nilai LC₅₀.

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan Sampel

Sampel biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) diperoleh dari daerah Buntu Mondong, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Sampel diambil ketika buah sudah masak yang dapat ditandai dengan sisik yang jarang, warna kulit buah merah kehitaman dan bulu-bulunya telah hilang, ujung kulit buah (bagian buah yang meruncing) bila ditekan terasa lunak, warnanya mengkilat dan mudah terlepas bila dipetik dari tandannya.

b. Pengolahan Sampel

Biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir, dirajang, diserbukkan, dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam lemari pengering dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena sinar matahari langsung, diayak menggunakan pengayak dengan nomor Mesh 10.

c. Ekstraksi Sampel

Sebanyak 50 g sampel biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) dimasukkan ke dalam labu alas datar lalu ditambahkan pelarut etanol hingga 500 ml kemudian diekstraksi dengan cara refluks selama 4 jam pada suhu 80 °C. Proses ekstraksi dilakukan sebanyak 7 kali. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan pelarutnya hingga diperoleh ekstrak kental.

2. Fraksinasi Komponen Kimia

a. Persiapan Kolom Kromatografi Cair Vakum

Kolom kromatografi cair vakum dibersihkan kemudian dipasang tegak lurus. Ditimbang silika gel 60 PF₂₅₄ sebanyak 13 g. Pompa vakum dijalankan dan adsorben (silika gel 60 PF₂₅₄) dimasukkan ke dalam kolom lalu dimampatkan hingga adsorben menjadi rapat. Preparasi fase diam dilakukan dengan cara kering dengan mencampurkan sampel dengan sebagian kecil fase diam yang digunakan hingga berbentuk serbuk. Campuran kemudian dimasukkan dalam kolom yang telah terisi dengan fase diam.

b. Pemisahan Komponen Kimia

Ekstrak difraksinasi menggunakan kromatografi cair vakum dengan fase diam silika gel 60 PF₂₅₄ dan fase gerak dengan gradien kepolaran pelarut yang meningkat yaitu berturut-turut etil asetat:metanol (9:1); (6:1); (3:1); (1:1); (1:4); (1:7); (1:10); (1:13); (1:16); (1:19); metanol. Hasil fraksinasi diperoleh 11 fraksi. Masing-masing fraksi dimonitor komponen kimianya dengan KLT menggunakan fase diam silika gel F₂₅₄ dan fase gerak etil asetat:metanol (1:4). Fraksi yang memiliki profil KLT yang sama digabung hingga diperoleh 3 fraksi, yaitu fraksi A (1-3), fraksi B (4-6), dan

fraksi C (7-11). Masing-masing fraksi kemudian diuji toksisitasnya dengan metode BSLT.

3. Uji Toksisitas

a. Penyiapan Larva Udang

Terlebih dahulu disiapkan wadah untuk menetas telur udang yang dilengkapi dengan sistem aerasi (gelembung udara) serta penyinaran lampu secara terus-menerus. Telur udang *Artemia salina* Leach direndam dalam wadah pada suhu kamar 25 °C. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah penetasan, air laut disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin terdapat pada air laut. Kemudian telur dibiarkan menetas selama 24 jam. Selanjutnya, larva yang telah menetas lalu dipindahkan ke dalam wadah bersekat yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terang yang disinari lampu terus-menerus dan dilengkapi dengan sistem aerasi dan bagian gelap yang ditutup. Larva dimasukkan ke dalam wadah bagian yang gelap. Larva yang berumur 48 jam yang berhasil melewati pembatas wadah bersekat dapat digunakan sebagai larva uji.

b. Pembuatan Konsentrasi Sampel dan Kontrol Negatif

Pengujian aktivitas toksisitas ekstrak etanol dilakukan dengan 3 variasi konsentrasi yaitu 10, 100, dan 1000 ppm, sedangkan untuk fraksi digunakan 4 variasi konsentrasi yaitu 1, 10, 100, dan 1000 ppm. Setiap konsentrasi dibuat 3 replikasi. Ekstrak etanol dan fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) ditimbang sebanyak 50 mg lalu dilarutkan dalam pelarut etanol untuk ekstrak dan pelarut metanol untuk fraksi sebanyak 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi 10.000 ppm sebagai stok. Dari larutan stok tersebut dipipet ke dalam *vial* masing-masing 5, 50, dan 500 μ l untuk ekstrak etanol sedangkan untuk fraksi 0,5, 5, 50, dan 500 μ l

menggunakan mikropipet. Sedangkan untuk kontrol negatif disiapkan larutan uji etanol untuk ekstrak dan metanol untuk fraksi dengan volume masing-masing 500 µl. *Vial* yang telah berisi larutan sampel dan kontrol negatif kemudian dibiarkan selama 24 jam untuk menguapkan pelarutnya.

c. Pelaksanaan Uji

Dimasukkan air laut sebanyak 2 ml ke dalam masing-masing *vial* lalu dimasukkan 10 ekor larva udang *Artemia salina* Leach yang telah berumur 48 jam lalu dicukupkan volumenya dengan air laut hingga 5 ml. Masing-masing *vial* ditambahkan 1 tetes suspensi ragi (3 mg/5 ml) sebagai sumber makanan larva. Untuk kontrol positif, digunakan 5 *vial* yang hanya berisi air laut dan larva. Selanjutnya, disimpan di tempat yang cukup mendapatkan sinar lampu. Pengamatan larva yang mati dihitung setelah 24 jam.

Persen kematian larva dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ kematian larva} = \frac{\Sigma \text{ larva uji yang mati} - \Sigma \text{ larva kontrol yang mati}}{\text{jumlah larva uji}} \times 100 \%$$

4. Identifikasi Komponen Kimia

Fraksi dengan LC_{50} yang paling rendah ditotolkan pada lempeng KLT kemudian dielusi. Selanjutnya, kromatogram disemprot dengan menggunakan pereaksi penampak noda sebagai berikut (Harborne, 1987).

- a. Pereaksi H_2SO_4 10%: kromatogram dipanaskan lalu diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, dan hitam.
- b. Pereaksi Dragendorff: pengamatan langsung yang menghasilkan warna jingga dengan latar belakang kuning untuk senyawa golongan alkaloid.

- c. Pereaksi FeCl_3 5%: pengamatan langsung menghasilkan warna hitam-biru atau hijau untuk senyawa golongan fenol.
- d. Pereaksi Liebermann-Bouchard: kromatogram terlebih dahulu dipanaskan. Diamati dengan lampu UV 366 nm, munculnya noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan adanya triterpen, sedangkan munculnya warna hijau-kebiruan menunjukkan adanya steroid.
- e. Pereaksi AlCl_3 5%: diamati di lampu UV 366 nm, akan dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan flavonoid.
- f. Pereaksi KOH etanolik: pengamatan langsung menghasilkan warna merah untuk senyawa kumarin.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diolah dengan analisis probit. Dihitung jumlah hewan uji yang mati lalu dianalisis dengan analisis probit terhadap data probit persentase dan log konsentrasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Sampel

Hasil ekstraksi dari 350 g serbuk kering biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) dengan metode refluks menggunakan pelarut etanol diperoleh ekstrak kental sebanyak 17 g dengan % rendemen 4,85 %. Profil KLT ekstrak etanol dapat dilihat pada gambar 4.

2. Fraksinasi Sampel

Ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) sebanyak 2 g difraksinasi menggunakan kromatografi cair vakum (KCV) diperoleh 11 fraksi. Fraksi yang memiliki kesamaan profil KLT digabung sehingga diperoleh 3 fraksi gabungan, yaitu fraksi A (fraksi 1-3) seberat 0,2 gram, B (fraksi 4-6) seberat 1,3 gram, dan C (fraksi 7-11) seberat 0,5 gram. Profil KLT dari masing-masing fraksi dapat dilihat pada gambar 5.

3. Uji BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*)

Uji toksisitas ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) dengan metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*) menggunakan larva *Artemia salina* Leach berumur 48 jam. Pada ekstrak etanol digunakan konsentrasi 10, 100, dan 1000 ppm dan diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel 4, sedangkan untuk fraksi digunakan konsentrasi 1, 10, 100, dan 1000 ppm dan hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 1. Hasil uji toksisitas ekstrak etanol biji buah salak dengan metode BSLT

Sampel	% Kematian pada Konsentrasi ($\mu\text{g/ml}$)			LC_{50} ($\mu\text{g/ml}$)	Persamaan Regresi
	1000	100	10		
Ekstrak Etanol	100%	60%	36%	26,54	$y = 2,543 + 1,725x$

Tabel 2. Hasil uji toksisitas fraksi dari ekstrak etanol biji buah salak dengan metode BSLT

Sampel	% Kematian pada Konsentrasi ($\mu\text{g/ml}$)				LC_{50} ($\mu\text{g/ml}$)	Persamaan Regresi
	1000	100	10	1		
Fraksi A	100%	93%	86%	80%	0,170	$y = 5,55 + 0,715x$
Fraksi B	100%	93%	73%	63%	0,988	$y = 5,005 + 0,915x$
Fraksi C	100%	83%	66%	46%	2,654	$y = 4,571 + 1,011x$

4. Identifikasi Senyawa Aktif

Fraksi A yang memiliki toksisitas tertinggi selanjutnya diidentifikasi dengan berbagai pereaksi penampak noda sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil uji identifikasi fraksi A ekstrak etanol biji buah salak dengan berbagai pereaksi penampak noda

No.	Jenis Pereaksi	Hasil	Keterangan
1.	H ₂ SO ₄ 10%	+	Noda kuning/coklat/hitam menunjukkan senyawa organik
2.	Dragendorf	-	Noda jingga latar kuning menunjukkan senyawa alkaloid
3.	FeCl ₃ 5%	-	Noda hitam-biru/hijau menunjukkan senyawa fenol
4.	AlCl ₃ 5%	-	Noda berfluoresensi kuning menunjukkan senyawa flavonoid
5.	Lieberman-Bouchard	+	Noda berfluoresensi hijau-kebiruan menunjukkan senyawa steroid Noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan senyawa triterpen
6.	KOH Etanolik	-	Noda merah menunjukkan senyawa kumarin

Keterangan:

1. Dengan pereaksi H₂SO₄ 10%
2. Dengan pereaksi Dragendorf
3. Dengan pereaksi FeCl₃ 5%
4. Dengan pereaksi AlCl₃ 5%
5. Dengan pereaksi Lieberman-Bouchard
6. Dengan pereaksi KOH Etanolik

B. Pembahasan

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss). Tanaman ini termasuk keluarga Palmaceae atau Arecaceae. Hampir semua limbah biji salak dibuang karena dianggap sudah tidak bermanfaat lagi. Akan tetapi, masyarakat di daerah Sumatera Utara dan Jawa mengolah biji salak dan mengkonsumsinya seperti minuman kopi.

Pemisahan komponen kimia biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) dilakukan secara bertahap yang meliputi ekstraksi dan fraksinasi. Masing-masing hasil pemisahan tersebut dilakukan pengujian bioassay dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) sebagai proses pengujian toksisitas yang terbukti memiliki efek toksik. Pada penelitian ini proses pemisahan komponen bioaktif dari biji buah salak dilakukan secara bertahap menggunakan metode ekstraksi dengan cara refluks dan fraksinasi menggunakan metode kromatografi cair vakum (KCV) untuk memperoleh komponen senyawa yang lebih spesifik. Kromatografi cair vakum memiliki kemampuan melarutkan yang bagus, mudah diaplikasikan dalam kromatografi skala kecil dan cepat. Teknik ini ekonomis dan secara signifikan mengurangi penggunaan pelarut dan jumlah silika yang digunakan.

Mula-mula sampel diserbukkan untuk memperbesar luas permukaan sampel sehingga kontak antara cairan penyari dan sampel lebih besar sehingga memudahkan penyarian komponen senyawa kimia yang terdapat dalam sampel. Sampel kemudian dikeringkan dalam lemari pengering dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena sinar matahari langsung, diayak menggunakan pengayak dengan nomor Mesh 10. Sampel diekstraksi menggunakan metode refluks dengan pelarut etanol dengan lama waktu ekstraksi 3-4 jam. Komponen kimia yang memiliki kepolaran yang sama

dengan kepolaran etanol akan ikut tertarik atau tersari, sehingga akan didapatkan ekstrak etanol yang cair. Untuk mendapatkan ekstrak yang kental maka ekstrak yang didapatkan kemudian dipekatkan dengan cara diuapkan pelarutnya.

Ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) selanjutnya dilakukan pencarian profil KLT-nya dengan tujuan untuk mengetahui eluen yang sesuai untuk penampakan nodanya dan untuk menentukan eluen yang cocok untuk digunakan pada proses fraksinasi. Profil KLT yang didapatkan untuk ekstrak etanol biji buah salak yaitu dengan menggunakan eluen etil asetat:metanol (1:4). Selanjutnya, ekstrak difraksinasi dengan menggunakan metode kromatografi cair vakum (KCV). Metode ini digunakan karena cepat dan mudah dalam pemisahan komponen kimia. Pada proses ini digunakan fase diam silika gel 60 PF₂₅₄ dan fase gerak dengan gradien kepolaran yang semakin meningkat yaitu berturut-turut etil asetat:metanol (9:1); (6:1); (3:1); (1:1); (1:4); (1:7); (1:10); (1:13); (1:16); (1:19); metanol.

Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, yang dimulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu, kromatografi cair vakum menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostettmann, *et al.*, 1995).

Pada proses fraksinasi digunakan 11 perbandingan eluen yang tingkat kepolarannya mulai dari rendah ke tinggi diperoleh 11 fraksi yang selanjutnya dilakukan proses KLT untuk menggabungkan hasil fraksinasi yang dianggap mengandung senyawa yang sama yang dapat dilihat dari penampakan noda yang sama. Dari proses KLT tersebut diperoleh 3 fraksi gabungan, yaitu fraksi A (fraksi 1-

3) seberat 0,2 gram, B (fraksi 4-6) seberat 1,3 gram, dan C (fraksi 7-11) seberat 0,5 gram dan adapun profil KLT-nya dapat dilihat pada gambar 4.

Uji toksisitas ekstrak dan fraksi biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) dilakukan dengan metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*) menggunakan larva *Artemia salina* Leach. Uji toksisitas dengan larva udang *Artemia salina* Leach dipilih karena pengerjaannya yang sederhana, murah, mudah, dan cepat pelaksanaannya serta memiliki korelasi positif terhadap efek toksiknya. Penggunaan larva udang sebagai hewan uji ketoksikan disebabkan karena ukurannya yang sangat kecil sehingga tidak membutuhkan sampel yang banyak dan tidak sulit dalam penanganan. Metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*) dilakukan untuk mendeteksi keberadaan senyawa toksik yang dipakai untuk memonitor senyawa dari tumbuhan yang berefek toksik dengan menentukan nilai LC_{50} dari senyawa aktif. Larva *Artemia salina* Leach diuji pada saat berumur 48 jam karena pada umur tersebut *Artemia salina* Leach mengalami pertumbuhan sel yang abnormal layaknya sel kanker.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ekstrak etanol memiliki efek toksik terhadap larva *Artemia salina* Leach dengan nilai $LC_{50} = 26,54$ ppm. Sedangkan hasil pengamatan pada fraksi diperoleh nilai LC_{50} yang lebih kecil daripada ekstrak. Dari 3 fraksi yang diuji didapatkan hasil nilai LC_{50} dari yang paling rendah adalah fraksi A dengan nilai $LC_{50} = 0,170$ ppm, lalu fraksi B dengan nilai $LC_{50} = 0,988$ ppm, dan fraksi C dengan nilai $LC_{50} = 2,654$ ppm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua fraksi memiliki efek sangat toksik.

Fraksi yang memiliki toksisitas paling besar atau nilai LC_{50} yang paling rendah yaitu fraksi A selanjutnya diidentifikasi senyawa golongannya. Mula-mula

fraksi A dilarutkan dengan metanol secukupnya lalu ditotolkan pada lempeng KLT kemudian dielusi dengan etil asetat:metanol (1:4). Hasil kromatogramnya disemprot dengan menggunakan pereaksi penampak noda seperti H_2SO_4 10% sebagai pereaksi penampak umum, Dragendorff untuk senyawa golongan alkaloid, FeCl_3 5% untuk senyawa golongan fenol, AlCl_3 5% untuk senyawa golongan flavonoid, Lieberman-Bouchard untuk senyawa triterpen dan steroid, dan pereaksi KOH etanolik untuk senyawa golongan kumarin.

Pada uji identifikasi senyawa golongan menggunakan H_2SO_4 10% menunjukkan hasil positif dengan adanya penampakan noda berwarna kuning, coklat, dan hitam setelah pemanasan yang menunjukkan adanya senyawa organik, AlCl_3 5% memberikan hasil negatif dengan tidak adanya noda berfluoresensi kuning pada pengamatan dibawah sinar UV 366 nm yang berarti tidak adanya senyawa golongan flavonoid, pereaksi Dragendorff menunjukkan hasil negatif dengan tidak adanya noda berwarna jingga dengan latar kuning pada pengamatan mata secara langsung yang berarti tidak adanya senyawa golongan alkaloid, pada pereaksi Lieberman-Bouchard menunjukkan hasil positif dengan adanya noda berfluoresensi coklat yang berarti adanya senyawa triterpen dan adanya noda berfluoresensi hijau-kebiruan yang berarti adanya senyawa steroid. Pada pereaksi FeCl_3 5% menunjukkan hasil negatif dengan tidak adanya noda berwarna hitam-biru/hijau pada pengamatan secara langsung, dan pada pereaksi KOH etanolik menunjukkan hasil negatif dengan tidak adanya noda merah yang berarti tidak adanya senyawa golongan kumarin.

McLaughin (1991) menyatakan bahwa suatu ekstrak dikatakan toksik ketika nilai $\text{LC}_{50} < 1000$, tidak toksik ketika nilai $\text{LC}_{50} > 1000$, memiliki potensi sebagai

antikanker ketika nilai $LC_{50} < 30$, memiliki potensi antimikroba ketika nilai LC_{50} 30-200, dan memiliki potensi sebagai pestisida ketika nilai LC_{50} 200-1000.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa fraksi A memiliki nilai $LC_{50} = 0,170$ ppm. Ini menunjukkan bahwa fraksi A memiliki potensi nilai LC_{50} sebagai antikanker. Adapun golongan senyawa yang terdapat dalam fraksi A yaitu triterpen dan steroid.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil fraksinasi ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) diperoleh 3 fraksi, yaitu fraksi A, B, dan C. Semua fraksi tersebut memiliki efek toksisitas terhadap larva *Artemia salina* Leach.
2. Nilai LC₅₀ dari masing-masing fraksi, yaitu fraksi A adalah 0,170 ppm, fraksi B adalah 0,988 ppm, dan fraksi C adalah 2,654 ppm.

B. Saran

Perlu dilakukan pengujian lanjutan untuk memperoleh isolat murni aktif dari biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) kemudian diujikan langsung ke sel kanker dan mengidentifikasi senyawa aktif hasil isolasi tersebut untuk ditentukan struktur kimianya.

KEPUSTAKAAN


- Abatzopoulos, *et al.* *Biology of Aquatic Organism: Artemia-Basic and Applied Biology*. 1996.
- Abdel, Daem al-Kaheel. *Rahasia Medis dalam Al-Qur'an dan Hadis; Operasi Tanpa Luka*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Agoes, G. *Teknologi Bahan Alam*. Bandung: ITB Press. 2007.
- Akbar, Ali. *Etika Kedokteran dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Antara. 1988.
- Al-Ju'aisin, Abdullah bin Ali. *Kado untuk Orang Sakit*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2001.
- Aminah, S. *Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol Kulit Buah Salak Salacca zalacca (Gaertner) Voss pada Mencit Swiss Webster Jantan yang Diinduksi Aloksan*. Bandung: Program Studi Farmasi, FMIPA, UNISBA. 2014.
- Anderson, *et al.* *A Blind Comparison of Simple Bench-top Bioassay and Human Tumor Cell Cytotoxicities as Antitumor Prescreens, Natural Product Chemistry*. Amsterdam: Elseiver. 1991.
- Anief, M. *Ilmu Meracik Obat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1997.
- Anonim. *18 Varietas Salak*. Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya. 1992.
- Ansel, H.C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, Edisi IV*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1989.
- Aralas, S. *Antioxidant Properties of Selected Salak (Salacca zalacca) Varieties in Sabah, Malaysia*. Nutrition and Food Science. 2009.
- Ar-Rumaikhon, Dr. 'Ali bin Sulaiman. *Fiqh Pengobatan Islami: Kajian Komprehensif Berbagai Aspek Pengobatan dalam Perspektif Islam*. Solo: Al-Qowam. 2008.
- Ashari, S. *Penyimpanan Serbuk Sari Bunga Salak (Salacca zalacca (Gaertner) Voss)*. Universitas Brawijaya. 1995.
- Barnes, *et al.* *Herbal Medicine, 2nd Edition*. London: Pharmaceutical Press. 1996.
- Budagara, I.K. *Pengkajian Respirasi Buah Mangga dan Salak Terolah Minimal Selama Penyimpanan*. Bogor: Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. 1998.
- Carballo, *et al.* *Comparison Between Two Brine Shrimp Assays to Detect in Vitro Cytotoxicity in Marine Natural Products*. BMC Biotechnology. 2002.
- Chaulk, J. & Park, J. *Environmental Science 1000: Artemia salina, The Common Brine Shrimp. As A Useful Biological Indicator*. 2002.
- Colegate SM, and J.M Russel. *Bioactive Natural Products, Detection, Isolation, and Structural Determination*. Boca Raton USA: CRC Press. 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2008.

- Dirjen POM. *Sediaan Galenika*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1986.
- Desmiaty, dkk. *Penentuan Jumlah Tanin Total pada Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk) dan Daun Sambang Darah (Excoecaria bicolor Hassk) Secara Kolorimetri dengan Pereaksi Biru Prusia*. Ortocarpus. 2008.
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1995.
- _____. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2000.
- Dwiatmaka, Y. *Identifikasi Simpleks dan Uji Toksisitas Akut Secara BST Ekstrak Kulit Batang Pule (Alstonia scholaris)*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Farmasi, Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam. Program Pascasarjana UGM. 2001.
- El Sayed, K.A, *et al.* *New Manzamine Alkaloids with Potent Againts Infectious Diseases*. J. Am. Chem. Soc. 2001.
- Emslie, S. *Artemia salina Leach, Brine Shrimp Ses Monkeys*. Artemia Reference Center. 2003.
- Farooqi, M.I.H. *Terapi Herbal Cara Islam; Manfaat Tumbuhan Menurut Al-Qur'an dan Sunah Nabi*. Jakarta: Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika). 2005.
- Gandjar, I.G. dan Abdul Rohman. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Gritter, R.J. *Pengantar Kromatografi, Edisi Kedua*. Bandung: Penerbit ITB. 1991.
- Hagerman, A.E. *Condensed Tannin Structural Chemistry. Department of Chemistry and Biochemistry*. Oxford: Miami University. 2002.
- Hambali, G. *Spesies dan Varietas*. Jakarta: Trubus. 1994.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 2000.
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung: ITB Press. 1987.
- Harsoyo, Y. *Analisis Efisiensi Produksi dan Pemasaran Komoditi Salak Pondoh di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Bogor: Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. 1999.
- Haryani. *Spesifikasi Salak dan Varietasnya*. Jakarta: Trubus. 1994.
- Hawari, D. *Doa dan Dzikir Sebagai Pelengkap Terapi Medis*. Jakarta: Dana Bhakti Primayasa. 1997.
- Hendrik. *Habbatus Sauda': Tibbun Nabawiy untuk Mencegah & Mengobati Berbagai Penyakit*. Solo: Pustaka Iltizam. 2009.
- Herliani, L. *et al.* *Antihyperuricemic Effect of Ethanol Extract of Snake Fruit (Salacca edulis Reinw.) var. Bongkok on Wistar Male Rat*. Journal of Food Science and Engineering. 2012.
- Hidayat, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.


- Hostettmann, *et al.* *Cara Kromatografi Preparatif*. Bogor: ITB. 1995.
- Hyeronimus SB. *Ragam dan Khasiat Tanaman Obat, 1st Edition*. Jakarta: Agro Media. 2006.
- Isnansetyo, A. dan Kurniastuty. *Teknik Kultur Phytoplankton dan Zooplankton: Pakan Alami untuk Pembenihan Organisme Laut*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1995.
- Kanwar, A.S. *Brine Shrimp (Artemia salina) A Marine Animal for Simple and Rapid Biological Assays*. Chinese Clinical Medicine. 2007.
- Lenny, S. *Uji Bioaktifitas Kandungan Kimia Utama Puding Merah dengan Metode Brine Shrimp*. Medan: USU. 2006.
- Meyer, H.N. *Brine Shrimp Lethality Test: Med. Plant Research, Volume 45*. Amsterdam: Hipokrates Verlag Gmbhl. 1982.
- Muchlisah, F. *Tanaman Obat Keluarga, Jilid I*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2001.
- Mudjiman, A. *Udang Renik Air Asin (Artemia salina)*. Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara. 1995.
- _____. *Makanan Ikan*. Jakarta: PT. Penerbit Swadaya. 2004.
- Muhadi dan Muadzlin. *Semua Penyakit Ada Obatnya: Menyembuhkan Penyakit Ala Rasulullah*. Jagakarsa: Mutiara Media. 2009.
- Mukhtar, dkk. *Uji Toksisitas Minyak Atsiri Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) dengan Metode Uji Brine Shrimp Lethality Test Bioassay*. Jurnal Sains Teknologi Farmasi. Volume 12. 2007.
- Mukti, A.T., M. Arief dan W. Hastuti. *Dasar-Dasar Akuakultur*. Surabaya: Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga. 2003.
- Muntaha, Ismail. *Sehat Cara Al-Quran*. Jakarta: Al Maghfirah. 2012.
- Padmawinata, K. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Bandung: Penerbit ITB. 1995.
- Purwanto, dkk. *Uji Sitotoksik Ekstrak Biji Salak (Salacca zalacca (Gaert.) Voss) dengan Menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)*. Bandung: Prodi Farmasi, Fakultas MIPA, Unisba. 2015.
- Rahim, Naid. Abu Nawas. *Farmakognosi*. Makassar. 2007.
- Rochani, Siti. *Bercocok Tanam Salak Pondoh*. Yogyakarta: Azka Mulia Media. 2007.
- Rukmana, R. *Salak, Prospek Agribisnis dan Teknik Usaha Tani*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1999.
- Sahputra, Fahrizan Manda. *Potensi Ekstrak Kulit dan Daging Buah Salak sebagai Antidiabetes*. Bogor: FMIPA Institut Pertanian Bogor. 2008.
- Sandi, Evika Savitri. *Khasiat Tumbuhan Berkhasiat Obat Perpektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

- Sarker SD, Latif Z, & Gray AI. *Natural Products Isolation, 2nd Edition*. New Jersey: Humana Press Inc. 2006.
- Sastrohamidjojo, H. *Kromatografi*. Yogyakarta: UGM Press. 2007.
- Seidel, V. *Initial and Bulk Extraction*. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc. 2006.
- Sherma, J. and Fried, B. *Practical Thin-Layer Chromatography: A Multidisciplinary Approach, 1st Edition*. New York: CRC Press. 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 10, 13; Lentera Hati: Jakarta. 2002.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati: Jakarta. 2009.
- Sofro, A.S.M. *Keanekaragaman Genetik*. Yogyakarta: Andi Offset. 1994.
- Stahl, E. *Analisis Obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung. 1985.
- Steenis, C.G.G.J. van. *Flora untuk Sekolah di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1975.
- Sudarmadji, dkk. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Sudjijo. *Karakterisasi dan Evaluasi 10 Aksesori Salak di Sijunjung Sumatera Barat*. Buletin Plasma Nutfah. 2009.
- Suskendriyati, dkk. *Studi Morfologi dan Hubungan Kekerbatan Varietas Salak Pondoh (Salacca zalacca (Gaert.) Voss) di Dataran Tinggi Sleman*. Jurusan Biologi FMIPA UNS. 2000.
- Sutoyo dan Suprpto. *Budidaya Tanaman Salak*. Jawa Tengah: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 2010.
- Suyanti. *Panduan Mengolah 20 Jenis Buah*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup. 2010.
- Syamsuni, H. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2006.
- Tim Ahli Tafsir. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2001.
- Tim Karya Tani Mandiri. *Pedoman Budidaya Buah Salak*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2010.
- Tjitrosoepomo, G. *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1988.
- Vogel. *Textbook of Quantitative Chemical Analysis, Fifth Edition*. Great Britain: Longman Scientific & Technical Copublished with John Wiley & Sons. 1989.
- Voight, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Edisi V*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994.
- Yahya, Harun. *Al-Quran dan Sains*. Bandung: Dzikra. 2004.


Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi dan Fraksinasi Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)



Lampiran 2. Pelaksanaan Uji BSLT Ekstrak dan Fraksi Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)



Lampiran 3. Identifikasi Komponen Senyawa Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)



Lampiran 4. Tanaman Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)



Gambar 1. Tanaman salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)




(a)

(b)


Gambar 2. (a) buah, (b) daging dan biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)

Lampiran 5. Siklus Hidup *Artemia salina* Leach



Gambar 3. Siklus hidup *Artemia salina* Leach

Lampiran 6. Profil Kromatogram Lapis Tipis Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)



Gambar 4. Profil kromatogram lapis tipis ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) pada (a) UV 366 nm dan (b) UV 254 nm

Keterangan gambar:

Fase gerak : etil asetat:metanol (1:4)


Fase diam : silika gel F₂₅₄

a : gambar profil KLT dilihat pada UV 366 nm

b : gambar profil KLT dilihat pada UV 254 nm

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 7. Profil Kromatogram Lapis Tipis Fraksi Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)



Gambar 5. Profil kromatogram lapis tipis fraksi ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss) pada (a) UV 366 nm dan (b) UV 254 nm

Keterangan gambar:


Fase gerak : etil asetat:metanol (1:4)

Fase diam : silika gel F₂₅₄

a : gambar profil KLT dilihat pada UV 366 nm

b : gambar profil KLT dilihat pada UV 254 nm

Lampiran 8. Profil Kromatogram Lapis Tipis Hasil Identifikasi Fraksi A Ekstrak Etanol Biji Buah Salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)



Gambar 6. Profil kromatogram lapis tipis hasil identifikasi fraksi A ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)

Keterangan gambar:

- A : identifikasi dengan pereaksi H_2SO_4 10%
- B : identifikasi dengan pereaksi Dragendorf
- C : identifikasi dengan pereaksi $FeCl_3$ 5%
- D : identifikasi dengan pereaksi $AlCl_3$ 5%
- E : identifikasi dengan pereaksi Lieberman-Bouchard
- F : identifikasi dengan pereaksi KOH Etanolik

Lampiran 9. Hasil Pengamatan Larva Udang (*Artemia salina* Leach)

Tabel 4. Data hasil pengamatan jumlah larva udang (*Artemia Salina* Leach) yang mati setelah 24 jam perlakuan dengan ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)

Sampel	Konsentrasi $\mu\text{g/ml}$		
	1000	100	10
Ekstrak Etanol	10	5	4
	10	6	4
	10	7	3
Jumlah	30	18	11
% Kematian	100%	60%	36%
Etanol Kontrol Negatif	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
% Kematian	-	-	-
Air Laut Kontrol Positif	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
% Kematian	-	-	-


Tabel 5. Data hasil pengamatan jumlah larva udang (*Artemia salina* Leach) yang mati setelah 24 jam perlakuan dengan fraksi-fraksi hasil fraksinasi KCV ekstrak etanol biji buah salak (*Salacca zalacca* (Gaert.) Voss)

Sampel	Konsentrasi $\mu\text{g/ml}$			
	1000	100	10	1
Fraksi A	10	9	8	8
	10	9	9	7
	10	10	9	9
Jumlah	30	28	26	24
% Kematian	100%	93%	86%	80%
Fraksi B	10	9	6	7
	10	10	7	5
	10	9	9	7
Jumlah	30	28	22	19
% Kematian	100%	93%	73%	63%
Fraksi C	10	9	7	4
	10	8	7	5
	10	8	6	5
Jumlah	30	25	20	14
% Kematian	100%	83%	66%	46%
Metanol Kontrol Negatif	-	-	-	-
	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
% Kematian	-	-	-	-
Air Laut Kontrol Positif	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
% Kematian	-	-	-	-

Lampiran 10. Hasil Perhitungan LC₅₀ Ekstrak Etanol Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi

Tabel 6. Data hasil perhitungan LC₅₀ ekstrak etanol biji buah salak menurut metode grafik probit log konsentrasi

Konsentrasi	Log Konsentrasi	% Kematian	Probit (Y)
1000	3	100	8,09
100	2	60	5,25
10	1	36	4,64



Gambar 7. Kurva regresi linear ekstrak etanol

Persamaan garis linear:

$$y = a + bx$$

y = persentase respon kematian dalam satuan probit

x = log konsentrasi

a = intersep

b = slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh:

$$a = 2,543$$

$$b = 1,725$$

$$r = 0,936$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 2,543 + 1,725x$$

Untuk log LC₅₀ y = 5, maka

$$5 = 2,543 + 1,725x$$

$$x = \frac{5 - 2,543}{1,725}$$

$$x = 1,424$$


$$\text{Antilog } 1,424 = 26,54$$

$$\text{LC}_{50} = 26,54 \text{ ppm}$$

Lampiran 11. Hasil Perhitungan LC₅₀ Fraksi A Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi

Tabel 7. Data hasil perhitungan LC₅₀ fraksi A biji buah salak menurut metode grafik probit log konsentrasi

Konsentrasi	Log Konsentrasi	% Kematian	Probit (Y)
1000	3	100	8,09
100	2	93	6,48
10	1	86	6,08
1	0	80	5,84



Gambar 8. Kurva regresi linear fraksi A

Persamaan garis linear:

$$y = a + bx$$

y = persentase respon kematian dalam satuan probit

x = log konsentrasi

a = intersep

b = slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh:

$$a = 5,55$$

$$b = 0,715$$

$$r = 0,910$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 5,55 + 0,715x$$

Untuk log LC₅₀ y = 5, maka

$$5 = 5,55 + 0,715x$$

$$x = \frac{5 - 5,55}{0,715}$$

$$x = - 0,769$$


Antilog - 0,769 = 0,170 ppm

LC₅₀ = 0,170 ppm

Lampiran 12. Hasil Perhitungan LC₅₀ Fraksi B Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi

Tabel 8. Data hasil perhitungan LC₅₀ fraksi B biji buah salak menurut metode grafik probit log konsentrasi

Konsentrasi	Log Konsentrasi	% Kematian	Probit (Y)
1000	3	100	8,09
100	2	93	6,48
10	1	73	5,61
1	0	63	5,33



Gambar 9. Kurva regresi linear fraksi B

Persamaan garis linear:

$$y = a + bx$$

y = persentase respon kematian dalam satuan probit

x = log konsentrasi

a = intersep

b = slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh:

$$a = 5,005$$

$$b = 0,915$$

$$r = 0,904$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 5,005 + 0,915x$$

Untuk log LC₅₀ y = 5, maka

$$5 = 5,005 + 0,915x$$

$$x = \frac{5 - 5,005}{0,915}$$

$$x = - 0,005$$


$$\text{Antilog } - 0,005 = 0,988$$

$$\text{LC}_{50} = 0,988 \text{ ppm}$$

Lampiran 13. Hasil Perhitungan LC₅₀ Fraksi C Biji Buah Salak Menurut Metode Grafik Probit Log Konsentrasi

Tabel 9. Data hasil perhitungan LC₅₀ fraksi C biji buah salak menurut metode grafik probit log konsentrasi

Konsentrasi	Log Konsentrasi	% Kematian	Probit (Y)
1000	3	94	6,55
100	2	82	5,92
10	1	36	4,64
1	0	32	4,53



Gambar 10. Kurva regresi linear fraksi C

Persamaan garis linear:

$$y = a + bx$$

y = persentase respon kematian dalam satuan probit

x = log konsentrasi

a = intersep

b = slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh:

$$a = 4,571$$

$$b = 1,011$$

$$r = 0,866$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 4,571 + 1,011x$$

Untuk log LC₅₀ y = 5, maka

$$5 = 4,571 + 1,011x$$

$$x = \frac{5 - 4,571}{1,011}$$

$$x = 0,424$$

$$\text{Antilog } 0,424 = 2,654$$

$$\text{LC}_{50} = 2,654 \text{ ppm}$$

Lampiran 14. Harga Probit Sesuai Persentasenya

Tabel 10. Harga probit sesuai persentasenya

Persentase	Probit									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,92	3,95	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,17	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
99	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,58	7,66	7,75	7,88	8,09

Sumber: Mursyidi, A. *Statistik Farmasi dan Biologi*. Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984. Hal. 157.

Lampiran 15. Perhitungan Pengenceran

Stok : 10 mg/ml = 10000 ppm

1. 1000 µg/ml

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$V_1 \cdot 10000 = 5 \cdot 1000$$

$$V_1 = 0,5 \text{ ml}$$

$$V_1 = 500 \text{ µl}$$

2. 100 µg/ml

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$V_1 \cdot 10000 = 5 \cdot 100$$

$$V_1 = 0,05 \text{ ml}$$

$$V_1 = 50 \text{ µl}$$

3. 10 µg/ml

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$V_1 \cdot 10000 = 5 \cdot 10$$

$$V_1 = 0,005 \text{ ml}$$

$$V_1 = 5 \text{ µl}$$

4. 1 µg/ml

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$V_1 \cdot 10000 = 5 \cdot 1$$

$$V_1 = 0,0005 \text{ ml}$$

$$V_1 = 0,5 \text{ µl}$$

Lampiran 16. Komposisi dan Cara Pembuatan Pereaksi Penampak Noda

1. Asam sulfat encer LP

Larutan asam sulfat 10% yang dibuat dengan cara menambahkan secara hati-hati 57 ml asam sulfat P ke dalam lebih kurang 100 ml air, dinginkan hingga suhu kamar dan encerkan dengan air hingga 1.000 ml.

2. Dragendorff LP

Campur 20 ml larutan bismuth subnitrat P 40% b/v dalam asam nitrat P dengan 50 ml kalium iodida P 54,4% b/v, diamkan sampai memisah sempurna. Ambil larutan jernih dan encerkan dengan air secukupnya hingga 100 ml.

3. Besi (III) klorida 5% LP

Larutkan 5 g besi (III) klorida P dalam air hingga 100 ml.

4. Aluminium klorida LP

Larutan aluminium klorida $6\text{H}_2\text{O}$ P 5%, dalam etanol P.

5. Kalium hidroksida etanol LP

Larutan kalium hidroksida P 11,2% b/v dalam etanol (90%) P (2N). Larutan dibuat segar.

6. Liebermann-Bouchard LP

Campurkan 5 bagian volume asam sulfat P dengan 50 bagian volume etanol 95% P. Tambahkan hati-hati 5 bagian volume asam asetat anhidrat ke dalam campuran tersebut, dinginkan.

Sumber: Farmakope Herbal Indonesia Edisi Pertama. 2009. Hal. 181-182.

RIWAYAT HIDUP



Hamida, akrab disapa Mida. Lahir di Polewali Mandar pada 30 Juni 1993. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami isteri Lemba dan Harisa. Mulai mengenyam bangku sekolah di MI DDI Silopo pada tahun 2000 lalu melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Polewali. Pada tahun 2009, melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Polewali dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama berhasil diterima sebagai mahasiswa jurusan farmasi, fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R