

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN GERIATRI TERHADAP
PENANGANAN PERTAMA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
(KIPI) VAKSIN COVID-19**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI ARWINI PUSPITASARI

70100117055

**JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

GOWA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Arwini Puspitasari
NIM : 70100117055
Tempat / Tgl Lahir : Ujung Pandang, 15 Maret 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN. Minasa Upa Blok G 18 No.6
Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Geriatri Terhadap Penanganan Pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 29 Juli 2022


Andi Arwini Puspitasari
NIM. 70100117055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Geriatri terhadap Penanganan Pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19” yang disusun oleh Andi Arwini Puspitasari, NIM. 70100117055, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 29 Juli 2022 M yang bertepatan dengan 30 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 29 Juli 2022 M
30 Dzulhijjah 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
Sekretaris : apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.
Pembimbing I : apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc.
Pembimbing II : apt. Nurshalati Tahar, S.Si., M.Si.
Penguji I : apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin.
Penguji II : Dr. Wahyuddin G., M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar, M.

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabiullah Muhammad saw. Skripsi yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Geriatri terhadap Penanganan Pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada keluarga besar tercinta.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. apt. Surya Ningsi, S.Si, M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. apt. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya hingga penyelesaian tahap proposal.
13. apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc., selaku pembimbing I yang membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. apt. Nurshalati Tahar, S.Si., M.Si., selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
15. apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Dr. Wahyuddin G., M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
17. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
18. Teman-teman KOVALEN Farmasi Angkatan 2017 yang tak henti-hentinya memberi semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul dalam tahapan penyusunan skripsi di masa pandemi Covid-19 ini.

19. Kepada saudara-saudara saya yang menjadi pengganti orang tua dan tak henti-hentinya memberi nasehat serta menyemangati agar skripsi ini selesai.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Gowa, 29 Juli 2022



Andi Arwini Puspitasari



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Geriatri	9
B. Vaksin COVID-19	15
C. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).....	17
D. Tinjauan Islami tentang tingkat pengetahuan, geriatri dan penanganan KIPI 21	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
D. Populasi dan Sampel	26
E. Penentuan Besaran Sampel	27
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	28
G. Variabel Penelitian	28
H. Instrumen Penelitian.....	29

I. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner	29
J. Langkah Analisis Data	30
K. Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian	50
Lampiran 2. Kuesioner	51
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	59
Lampiran 4. Kode Etik Penelitian	61
Lampiran 5. Surat Izin Pengambilan Data dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	62
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data Dari PTSP Sulsel	62
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar	64
Lampiran 8. Data Validitas dan Reliabilitas	65
Lampiran 9. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner	67
Lampiran 10. Data Hasil Penelitian	69
Lampiran 11. Karakteristik Responden	74
Lampiran 12. Uji Normalitas	76
Lampiran 13. Tingkat Pengetahuan Geriatri	76
Lampiran 14. Uji Chi-Square	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Geriatri Berdasarkan Jenis Kelamin ...	33
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Geriatri Berdasarkan Usia.....	33
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Geriatri Berdasarkan Pekerjaan	34
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Geriatri Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Dasar (A)	35
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pengetahuan tentang KIPI (B)	35
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sikap Geriatri terhadap KIPI (C)	36
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Pernyataan A,B,C.....	36
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Pernyataan Pengetahuan dasar, Pengetahuan KIPI (AB) dan sikap terhadap KIPI (C).....	37
Tabel 10. Distribusi frekuensi responden berdasarkan item pernyataan tentang pengetahuan dasar	37
Tabel 11. Distribusi frekuensi pengetahuan geriatri tentang pengetahuan dasar..	37
Tabel 12. Distribusi frekuensi responden berdasarkan item pernyataan Pengetahuan tentang KIPI.....	38
Tabel 13. Distribusi frekuensi pengetahuan geriatri tentang Pengetahuan tentang KIPI.....	39
Tabel 14. Distribusi frekuensi responden berdasarkan item pernyataan Sikap Geriatri terhadap KIPI.....	39
Tabel 15. Distribusi frekuensi geriatri tentang sikap terhadap KIPI.....	40
Tabel 16. Distribusi frekuensi pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19.....	40

ABSTRAK

Nama : Andi Arwini Puspitasari
NIM : 70100117055
Judul Skripsi : Hubungan Tingkat Pengetahuan Geriatri terhadap Penanganan Pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19.

Di Indonesia sedang mengalami krisis pandemi COVID-19 dan kelompok geriatri merupakan kelompok yang rentan atau mudah terjangkit virus COVID-19 ini. Solusi yang diberikan pemerintah yaitu adanya perlakuan vaksinasi sebagai pencegahan penyebaran virus. Namun setelah pemberian vaksin terdapat gejala-gejala yang tidak dapat dihindari, gejala tersebut dinamakan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama KIPI vaksin covid-19. Metode yang digunakan yaitu observasional korelatif pendekatan *cross-sectional*. Populasi sampelnya ialah kelompok geriatri di wilayah Makassar dengan jumlah 162 responden. Hasil penelitian didapatkan 97 orang (59,9%) responden dengan pengetahuan baik dan 97 orang (59,9%) dengan kategori cukup pada penanganan pertama KIPI. Hasil analisis bivariat dengan uji *Chi Square* didapatkan ada hubungan antara tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19 dengan p value = 0,000 ($\alpha = 0,05$), hubungan yang dimaksud yaitu semakin baik pengetahuan geriatri maka semakin cukup untuk melakukan penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19.

Kata kunci: Covid-19, Geriatri, KIPI, Pengetahuan, Vaksin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Andi Arwini Puspitasari
Student ID Number : 70100117055
Research Title : Relationship Level of Knowledge Geriatrics to The First Management Adverse Events Following Immunization (AEFI) Covid-19 Vaccine

Indonesia is currently experiencing a COVID-19 pandemic crisis and the geriatric group is a group that is vulnerable or easily infected with the COVID-19 virus. The solution given by the government is the existence of vaccination treatment to prevent the spread of the virus. However, after giving the vaccine, there are symptoms that cannot be avoided, these symptoms are called AEFI (Adverse Events Following Immunization). The purpose of this study was to determine the relationship between the level of geriatric knowledge and the first management AEFI of the Covid-19 vaccine. This study uses a correlative observational method with a cross-sectional approach. The sample population is the geriatric group in the Makassar area with a total of 162 respondents. The results showed that 97 people (59.9%) respondents with good knowledge and 97 people (59.9%) with sufficient category in the first treatment of AEFI. The results of the bivariate analysis with the Chi Square test found that there was a relationship between the level of geriatric knowledge on the first treatment of Adverse Events Following Immunization (AEFI) of the Covid-19 vaccine with p value = 0.000 ($\alpha = 0.05$), the relationship in question is the better geriatric knowledge, the better the knowledge of geriatrics. more and more sufficient to carry out the first treatment of Adverse Events Following Immunization (AEFI) for the Covid-19 vaccine.

Keywords: Covid-19, Geriatrics, AEFI, Knowledge, Vaccine



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geriatri adalah orang dengan usia lanjut (> 60 tahun) yang memiliki satu penyakit fisik dan/atau mengalami fungsi penurunan organ, memiliki masalah psikologis dan sosial ekonomi. Saat ini di Indonesia sedang mengalami krisis pandemi COVID-19 dan kelompok geriatri merupakan kelompok yang rentan atau mudah terjangkit virus COVID-19 ini dikarenakan kondisi kekebalan tubuh yang berkurang seiring pertambahan usia, berdasarkan data Satgas COVID-19 terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berasal dari geriatri dan sebesar 48,3% dari kasus pasien meninggal karena COVID-19 adalah kelompok geriatri (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi pandemi ini, namun karena jumlah kasus yang bertambah setiap harinya semakin meningkat maka diperlukan solusi yang dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19.

Dalam konferensi pers tanggal 11/03/2020, WHO telah mengumumkan bahwa wabah COVID-19 ini sebagai pandemik global, dan cara dalam menanggulangi agar wabah tidak semakin menyebar telah diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِغَ بَلَعَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ
بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ "

Artinya:

"Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori) (Al Asqalani, 2014).

Pada zaman itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Rasulullah pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terdampak wabah, apakah itu daerah yang terkena pes, maupun lepra, serta penyakit menular lainnya. Sama halnya dengan pandemi saat ini, solusi untuk mencegah penyebaran virus ini, kita tidak diperbolehkan keluar rumah jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun tetap saja protokol kesehatan belum cukup menjadi solusi pencegahan tersebarnya virus ini.

Vaksinasi menjadi solusi selanjutnya dalam mengurangi penyebaran virus. Upaya vaksinasi di Indonesia telah dilaksanakan mulai 13 Januari 2021 untuk kelompok tenaga kesehatan kemudian dilanjutkan ke kelompok geriatri atau lansia sebagai prioritas kedua untuk diberikan vaksin. Kelompok geriatri ini divaksinasi setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA) pada 5 Februari 2021, pemberian vaksinnnya sama seperti pemberian pada tenaga kesehatan, yaitu sebanyak 2 dosis suntikan dan untuk dosis vaksin kedua ini diberikan dalam selang waktu 28 hari sejak dosis pertama disuntikkan (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Vaksin COVID-19 yang diberikan di Indonesia untuk tenaga kesehatan dan kelompok geriatri ialah Vaksin CoronaVac.

Vaksin COVID-19 atau CoronaVac dikeluarkan oleh perusahaan Sinovac Biotech, vaksin ini merupakan vaksin inaktif virus SARS-CoV-2 dengan bahan tambahan aluminium hidroksida (Ophinni et al., 2020). Vaksin tidak hanya memberikan perlindungan bagi orang yang telah divaksinasi, namun juga bagi orang-orang disekitarnya dan dapat mengurangi penyebaran virus dalam suatu populasi (Sari & Sriwidodo, 2020). Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) kemungkinan terdapat setelah pemberian vaksin dan hal ini juga bisa terjadi pada pemberian vaksin CoronaVac.

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah kejadian medis merugikan yang terjadi setelah perlakuan imunisasi, namun tidak selalu memiliki hubungan sebab-akibat dengan penggunaan vaksin. Kejadian ini dapat berupa tanda yang merugikan baik itu gejala atau penyakit. Kejadian yang tidak diharapkan ini memerlukan investigasi lebih lanjut agar lebih diketahui dan dipahami gejala apa saja yang mungkin timbul setelah vaksinasi meskipun hanya gejala ringan (Barbara & Miriam, 2020). Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada kelompok geriatri perlu diantisipasi karena kelompok geriatri yang diberikan vaksin cenderung memiliki berbagai penyakit penyerta atau komorbid yang harus diperhatikan penyedia layanan kesehatan vaksinasi (BPOM, 2021). Beberapa penelitian telah melaporkan mengenai reaksi simpang setelah pemberian vaksin COVID-19.

Salah satu penelitian mengenai reaksi simpang dari vaksin CoronaVac yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zhiwei Wu (2021) terdapat berbagai reaksi simpang (*adverse reaction*) yang dirasakan oleh partisipan geriatri setelah uji klinis vaksin CoronaVac di China, diantaranya terdapat reaksi lokal: nyeri, eritema, pruritus dan bengkak, dan reaksi sistemik: demam, rasa lelah, diare, nyeri otot, mual, sakit kepala, dan-lain-lain. Reaksi simpang ini tetap ada meskipun hanya sedikit, bersifat ringan dan hanya berlangsung antara 7 hari setelah pemberian vaksin. Namun, bagi kelompok geriatri reaksi simpang ini bisa sangat merugikan jika tidak ditangani secepatnya. (Wu et al., 2021).

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka akan dilakukan penelitian tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan Geriatri terhadap Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin COVID-19. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin COVID-19

sehingga kelompok geriatri dapat mengatasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengalami kejadian ikutan atau reaksi simpang setelah mendapatkan perlakuan vaksinasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin COVID-19?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

- a. Tingkat pengetahuan adalah tingkatan hasil penginderaan manusia mengenai suatu objek, tingkatan ini terdiri atas dari rasa ingin tahu, memahami dan menjelaskan objek, mempraktekkan suatu materi, mengaitkan dan menjabarkan suatu materi, serta penilaian terhadap objek. Tingkat pengetahuan geriatri pada penelitian ini diukur dengan memberikan kuesioner pada kelompok geriatri menggunakan perangkat lunak administrasi survei atau disebut juga *Google Form*.
- b. Geriatri adalah ilmu tentang perawatan kesehatan dan penyakit pada orang dengan usia lanjut (> 60 tahun). Kelompok geriatri yang menjadi responden ialah geriatri dengan usia 60-80 tahun.
- c. Penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang mendapatkan pengobatan awal jika merasakan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin COVID-19.
- d. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah kejadian medis merugikan yang terjadi setelah perlakuan imunisasi, namun tidak selalu memiliki hubungan sebab-akibat dengan penggunaan vaksin. Kejadian ini dapat berupa tanda yang merugikan baik itu gejala atau penyakit.

- e. Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk kelompok geriatri yaitu Coronavac. Vaksin ini dikeluarkan oleh perusahaan Sinovac Biotech yang berupa vaksin inaktif dari virus SARS-CoV-2 dengan bahan tambahan aluminium hidroksida. Vaksin ini merupakan vaksin yang di pilih di Indonesia untuk diberikan kepada kelompok geriatri.

2. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan survei kepada kelompok geriatri. Penelitian ini hanya mencakup tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin COVID-19.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Widyastuti tahun 2016 dengan judul “*Hubungan pengetahuan dan sikap ibu balita dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) di puskesmas oebobo tahun 2016*” menggunakan metode penelitian survey analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh ibu balita di wilayah kerja puskesmas Oebobo berjumlah 348 orang. Teknik pengambilan sampel dengan cara *accidental sampling* yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yaitu sebanyak 80 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisa data menggunakan analisa univariat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan bivariat dengan Chi Square. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu distribusi frekuensi balita yang terkena KIPI sebanyak 52 orang (65%) dengan reaksi ringan 45 kasus (86.5%), pengetahuan responden tentang KIPI adalah baik 29 responden (36.25%). Sikap positif ibu balita sebesar 68 responden (85%). Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu balita dengan KIPI (p-value: 0.038) dan

tidak terdapat hubungan antara sikap ibu balita dengan KIPI (p-value: 0.744). Dari penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu balita dengan KIPI di Puskesmas Oebobo Tahun 2016 (Widyastuti, 2016). Pada penelitian saya yang menjadi sampel adalah kelompok geriatri yang akan di vaksinasi ataupun yang telah divaksinasi Coronavac dan hal yang ingin diketahui yaitu mengenai hubungan pengetahuan kelompok geriatri terhadap cara mereka menangani KIPI setelah mereka mendapatkan perlakuan vaksinasi.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yudi tahun 2017 dengan judul *“Hubungan pengetahuan ibu tentang kejadian ikutan pasca imunisasi dasar dengan kepatuhan ibu dalam memberikan imunisasi dasar pada bayi di kelurahan tlogomas malang”* menggunakan metode deskriptif korelasional dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel penelitian ini yaitu ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan di RW 02 Kelurahan Tlogomas Malang sebanyak 30 responden dengan instrumen penelitian berupa lembar kuesioner. Data hasil penelitian dianalisis dengan uji statistik Koefisiensi Kontingansi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sebanyak 18 responden (60%) mempunyai pengetahuan yang baik mengenai KIPI dasar dan 27 responden (90%) patuh memberikan imunisasi dasar pada bayinya. Peneliti memperoleh hasil uji hipotesis yaitu nilai p yaitu 0,025 ($<0,05$) yang menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang KIPI dasar dengan kepatuhan ibu tentang memberikan imunisasi dasar pada bayinya di RW 02 Kelurahan Tlogomas Malang (Yudi et al., 2017). Pada penelitian yang saya lakukan untuk menunjukkan ada atau tidak hubungan pengetahuan kelompok geriatri terhadap cara mereka menangani diri mereka jika terdapat KIPI setelah diberikan vaksin COVID-19.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, ITAGI, UNICEF dan WHO tahun 2020 dengan judul “ *Survei penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia*” yang melakukan pengumpulan data dengan survei-daring kepada 115.000 responden dari 34 provinsi. Sebagian besar dari 514 Kabupaten Kota (hampir 99%) mengikuti survei ini. Pada penelitian ini responden diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai ketertarikan terhadap informasi mengenai vaksin COVID-19 dan sumbernya serta saluran komunikasi pilihan mereka. Kebanyakan responden berusia 18-45 tahun, responden dengan usia 56-65 tahun sebanyak 5% dan responden dengan usia >65 tahun 1,3%. Hasil dari survei-daring yang dilakukan terdapat 74% responden yang mengaku tahu tentang rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara nasional. Untuk survei mengenai mendengar tentang vaksin dan kesediaan menerima vaksin menurut kelompok usia, responden dengan usia 56-65 tahun sebanyak 83% (mendengar tentang vaksin) dan 73% (kesediaan menerima vaksin), sedangkan responden dengan usia > 65 tahun sebanyak 85% (mendengar tentang vaksin) dan 73% (kesediaan menerima vaksin). Responden berusia > 65 tahun paling tahu sedikit banyak soal vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan serta paling bersedia divaksin dan membayarnya. Untuk survei mengenai penerimaan informasi lebih lanjut mengenai vaksin COVID-19, kelompok usia > 65 tahun menunjukkan permintaan penerimaan informasi yang tinggi yaitu sebanyak 95% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia et al., 2020). Dengan banyaknya permintaan informasi ini, maka penelitian yang saya lakukan dapat memberikan informasi tambahan kepada kelompok geriatri bahwa terdapat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah mereka divaksinasi,

meskipun KIPI ini tidak berlangsung lama namun tetap dapat merugikan bagi kelompok geriatri jika tidak ada pengetahuan awal mengenai apa penanganan pertama yang tepat jika terdapat KIPI setelah mereka di vaksinasi.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin COVID-19 sehingga kelompok usia lanjut dapat mengatasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terdapat kejadian ikutan atau reaksi simpang setelah mendapatkan perlakuan vaksinasi.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat pengetahuan geriatri mengenai penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin covid-19.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tenaga kesehatan dalam pemberian sosialisasi tentang pelaksanaan vaksin dan terdapat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin covid-19 setelah perlakuan vaksinasi kepada kelompok geriatri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Geriatri

1. Definisi

Geriatri adalah cabang ilmu kedokteran yang membahas semua problem khusus mengenai usia tua dan penuaan, termasuk problem klinis keadaan lanjut usia dan kepikunan (Dorland, 2020). Geriatri sebagai sub-spesialisasi penyakit dalam mengenai perawatan lansia dengan gangguan akibat menurunnya fungsi organ, psikologi, sosial dan lingkungan (Sunarti, 2019). Menurut UU Nomor 13 Tahun 1998, lanjut usia adalah seseorang yang telah masuk ke usia 60 tahun keatas (Badan Pusat Statistik et al., 2020). Lanjut usia dibagi dalam dua kategori yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial, lanjut usia potensial adalah orang dengan usia lanjut yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan barang/jasa sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah orang dengan usia lanjut yang tidak dapat melakukan pekerjaan dan bergantung pada bantuan orang lain (Nur Kholifah, 2016).

2. Perubahan fisiologis

Perubahan fisiologis dikarenakan bertambahnya usia akan mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat-obat yang dikonsumsi. Perubahan fisiologis pada kelompok geriatri mengakibatkan berkurangnya kemampuan mereka dalam menanggapi dan mempertahankan keseimbangan sehingga dalam situasi tertekan kelompok geriatri rentan terhadap kegagalan fungsi organ. Kerentanan yang terdapat pada seseorang dengan usia lanjut menjadi faktor risiko dalam perubahan farmakokinetik dan farmakodinamiknya (DiPiro et al., 2016).

a. Perubahan farmakokinetik

1) Absorpsi

Perubahan fisiologis yang terjadi pada gastrointestinal kelompok usia lanjut mempengaruhi absorpsi obat. Fungsi gastrointestinal harus diperhatikan karena dipengaruhi oleh interaksi obat-makanan, konsumsi beberapa obat secara bersamaan dan komorbiditas (DiPiro et al., 2016).

Sebagian besar obat diserap dengan difusi pasif dan perubahan fisiologis lanjut usia tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap bioavailabilitas obat. Nutrisi yang diserap oleh transpor aktif seperti vitamin B12, zat besi, kalsium, magnesium, dan leusin, dapat mengganggu proses absorpsi pada lansia. Terdapat bukti penurunan *first-pass effect* di metabolisme hati atau dinding usus akan menghasilkan peningkatan bioavailabilitas dan konsentrasi obat dalam plasma seperti pada obat propranolol dan labetalol dan penurunan bioavailabilitas pada *prodrugs* seperti enalapril dan kodein (DiPiro et al., 2016).

Obat yang terabsorpsi dalam lingkungan yang asam (ketokonazol, zat besi, digoksin, dan atazanavir) mungkin telah mengurangi tingkat absorpsi dengan meningkatkan pH lambung. Efek penuaan pada absorpsi obat oral tidak diketahui, meskipun ada perubahan motilitas atau pH gastrointestinal yang mempengaruhi absorpsi obat pada beberapa pasien (DiPiro et al., 2016).

2) Distribusi

Distribusi obat-obatan di dalam tubuh bergantung pada beberapa faktor seperti aliran darah, pengikatan protein plasma, dan komposisi tubuh, yang masing-masing dapat berubah seiring bertambahnya usia. Lansia juga menunjukkan perbedaan dalam distribusi obat ke tempat kerja obat tersebut. Perubahan pada pengikatan protein yaitu penurunan albumin dan peningkatan glikoprotein asam α_1 terdapat selama proses penuaan, namun perubahan ini

umumnya tidak memiliki efek signifikan pada distribusi obat kecuali untuk obat-obatan yang ditarik oleh hati, mengikat protein secara ekstensif, dan diberikan IV. Permeabilitas sawar darah-otak dan *transport function* dapat berubah pada lansia, sehingga mempengaruhi distribusi obat yang masuk dan keluar dari sistem saraf pusat (SSP). Akibatnya, otak lansia mungkin dapat terpapar obat dan racun yang lebih tinggi dari biasanya (DiPiro et al., 2016).

3) Metabolisme

Variasi pada metabolisme obat dan klirens obat merupakan sumber utama variabilitas respon saat pengobatan pada lansia. Untuk obat yang memiliki klirens intrinsik tinggi (rasio ekstraksi hati tinggi) dan dengan metabolisme hati yang cepat, akan bergantung pada aliran darah hepatic (metabolisme aliran terbatas). Untuk obat yang memiliki klirens intrinsik rendah (rasio ekstraksi hati rendah) dan secara perlahan dimetabolisme oleh hati, akan bergantung pada aktivitas enzim hati (metabolisme kapasitas terbatas) (DiPiro et al., 2016).

Penurunan aliran darah hati (*hepatic blood flow*) yang berkaitan dengan usia dapat menurunkan metabolisme secara signifikan dari obat dengan rasio ekstraksi tinggi yang di metabolisme dengan aliran terbatas. Aliran darah hati (*hepatic blood flow*) bisa menurun 20% sampai 50%, dan klirens propranolol dan amitriptilin di hati bisa berkurang 40% atau lebih pada lansia. Obat dengan rasio ekstraksi tinggi lainnya yang telah terbukti mengurangi klirens hati pada lansia termasuk diltiazem, lidokain, metoprolol, morfin, dan verapamil. Hal ini menunjukkan pengaruh usia pada metabolisme obat dengan metabolisme kapasitas terbatas lebih kompleks. Klirens hati dari obat dengan kapasitas terbatas bergantung pada fraksi yang tidak terikat dalam darah dan klirens hati intrinsik. Peneliti melaporkan bahwa sebagian besar dari lansia ukuran hatinya mengecil dan kekurangan enzim (DiPiro et al., 2016).

Sebagian besar penelitian tentang metabolisme obat hati dan penuaan berfokus pada perbedaan usia dalam jalur metabolisme obat fase I. Umumnya, jalur metabolisme fase II dipertahankan pada yang lansia ehat. Namun, lansia yang lemah mengalami penurunan metabolisme fase II. Kerapuhan merupakan faktor risiko penurunan status kesehatan dan kecacatan. Meskipun lemahnya seseorang sulit untuk didefinisikan, hal ini dapat ditandai dengan berkurangnya massa tubuh, kehilangan otot, kekurangan gizi, penurunan fungsi, dan penurunan daya tahan. Kelemahan dikaitkan dengan peradangan, yang dapat menurunkan regulasi metabolisme dan transportasi obat (DiPiro et al., 2016).

4) Eliminasi

Ekskresi ginjal adalah jalur utama eliminasi obat dan metabolit. Penurunan terkait usia pada laju filtrasi glomerulus (GFR) didokumentasikan dengan baik. Namun, sebanyak sepertiga dari subjek lansia "normal" mungkin tidak mengalami penurunan yang diukur dengan kreatinin klirens, dan lansia yang melakukan diet protein tinggi tetap memiliki laju filtrasi glomerulus yang serupa dengan orang dewasa. Selain itu, penurunan fungsi ginjal mungkin lebih terkait erat dengan proses penyakit seperti hipertensi dan penyakit jantung daripada penuaan itu sendiri. Oleh karena itu, usia mungkin tidak berdampak besar pada ekskresi/eliminasi obat melalui ginjal. Estimasi kreatinin klirens, meskipun tidak sepenuhnya akurat pada masing-masing pasien, dapat berfungsi sebagai pendekatan skrining yang berguna untuk tujuan penyesuaian dosis. Cockcroft dan Gault membuat salah satu persamaan yang paling umum digunakan untuk orang dewasa dengan fungsi ginjal stabil yang berat sebenarnya berada dalam 30% berat badan ideal (DiPiro et al., 2016):

$$\text{Creatinine clearance} = \frac{(140 - \text{Age})(\text{Actual body weight})}{72(\text{Serum Creatinine Concentration})}$$

Usia diberikan dalam tahun, berat badan dalam kg, dan konsentrasi kreatinin serum dalam mg/dL. Kreatinin klirens yang dihasilkan dalam satuan mL/menit. Untuk wanita, dikalikan hasil ini dengan 0,85.

$$\text{Creatinine clearance} = \frac{(140 - \text{Age})(\text{Actual body weight})}{0,814(\text{Serum Creatinine Concentration})}$$

Saat menggunakan persamaan Cockcroft dan Gault untuk memperkirakan kreatinin klirens pada lansia, beberapa dokter membulatkan nilai hingga 1 jika konsentrasi serum kreatinin pasien kurang dari 1 mg/dL (88 $\mu\text{mol/L}$). Membulatkan konsentrasi kreatinin serum dapat memberikan perkiraan yang sangat rendah dari kreatinin klirens dan mengakibatkan penyesuaian dosis yang tidak tepat dari obat yang dieliminasi pada ginjal. Penting untuk disadari bahwa persamaan tersebut hanyalah perkiraan, dan upaya harus dilakukan untuk menentukan kreatinin klirens secara akurat ketika mempertimbangkan penggunaan obat-obat tertentu (DiPiro et al., 2016).

Farmakokinetik terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi/eliminasi obat. Setelah diabsorpsi, obat akan melewati hati dan mengalami metabolisme awal. Jika pada tahap ini mengalami penurunan, sisa dari dosis obat yang masuk dalam darah dapat melebihi perkiraan, hal ini mungkin akan menambah efek obat, bahkan sampai memberikan efek yang merugikan. Nutrisi dan obat lain dapat mempengaruhi absorpsi obat yang diberikan secara oral. Distribusi obat dapat dipengaruhi oleh berat dan komposisi tubuh, yaitu cairan dalam tubuh, massa otot, fungsi, dan peredaran darah ke berbagai organ tubuh. Beberapa obat yang larut lemak memiliki peningkatan volume distribusi sehingga tingkat pembersihan relatif memanjang pada lansia. Selain itu, eliminasi

obat terjadi melalui ginjal, dan fungsi ginjal sering menurun seiring pertambahan usia (Fauziah et al., 2020).

b. Perubahan farmakodinamik

Ada kecenderungan umum dari respon obat yang berubah atau peningkatan "sensitivitas" pada lansia. Mekanisme yang mungkin telah dilaporkan yaitu: (a) perubahan konsentrasi obat di reseptor, (b) perubahan jumlah reseptor, (c) perubahan afinitas reseptor, (d) perubahan postreseptor, dan (e) gangguan terkait usia mekanisme homeostatis. Perbedaan farmakodinamik dari usia mungkin disebabkan oleh sensitivitas yang berubah, tetapi juga dapat dikarenakan perbedaan dalam kinerja atau konsentrasi obat yang berbeda di tempat kerja antara orang dewasa dan lansia. Sebagian besar studi tentang perbedaan farmakodinamik dari usia berfokus pada obat yang bekerja pada sistem saraf pusat (SSP) dan sistem kardiovaskular. Lansia sangat sensitif terhadap efek obat-obatan sistem saraf pusat (SSP). Perubahan ukuran dan berat otak serta perubahan sistem neurotransmitter telah dilaporkan seiring bertambahnya usia. Selain itu, obat dapat lebih mudah menembus sistem saraf pusat (SSP). Misalnya, ada beberapa perubahan pada sistem dopaminergik seiring bertambahnya usia, termasuk penurunan kadar transporter dopamin, penurunan jumlah neuron dopaminergik, dan penurunan kepadatan beberapa jenis reseptor dopamin. Perubahan ini konsisten dengan peningkatan sensitivitas lansia terhadap efek obat antipsikotik yang merugikan. Peningkatan sensitivitas terhadap efek SSP obat pada lansia telah dibuktikan pada benzodiazepin, agen anestesi, analgesik opioid, antipsikotik, lithium, dan obat antikolinergik. Perubahan farmakodinamik terkait usia telah dilaporkan pada *calcium channel blockers* (peningkatan efek hipotensi dan bradikardik), β -blockers (penurunan respons tekanan darah), dan warfarin (peningkatan risiko perdarahan) (DiPiro et al., 2016).

B. Vaksin COVID-19

Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang telah dilemahkan, masih utuh atau hanya bagian dari mikroorganisme, yang telah diolah, dari toksin menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila disuntikkan kepada seseorang akan merangsang pembentukan imunitas atau kekebalan yang spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit infeksi (Hadianti et al., 2014).

Vaksin merupakan satu metode dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang paling berhasil secara efektif dan efisien. Vaksin telah terbukti mengurangi kematian, mencegah rasa sakit, dan meningkatkan kemungkinan sembuh. Sampai tahun 2020 ini di dunia hanya ada sekitar 40 vaksin untuk manusia. Tujuh belas vaksin di antaranya, ditujukan untuk infeksi virus (Husada, 2020).

Pembuatan sebuah vaksin akan melalui beberapa tahap sampai vaksin tersebut dapat diproduksi dan diterima secara global, hal ini juga terjadi pada pengembangan vaksin COVID-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis dalam mencegah penyakit menular, sehingga pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2 sangat diperlukan (Makmun & Hazhiyah, 2020).

Upaya pengembangan vaksin untuk menangani virus etiologi SARS-CoV-2 sejauh ini menghasilkan berbagai modalitas vaksin dalam waktu yang sangat singkat. Kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia yaitu model vaksin mRNA (buatan BioNTech/Pfizer, Moderna), virus inaktif (Sinovac, Sinopharm), vektor virus (Oxford/AstraZeneca, Gamaleya, Janssen/Johnson&Johnson, CanSino) dan subunit protein (Novavax) (Ophinni et al., 2020).

1. CoronaVac

Pembuatan vaksin dari virus inaktif merupakan metode “*tried-and-true*” dan telah diterapkan pada berbagai penyakit bakteri dan virus seperti tifus, influenza, dan virus papiloma manusia. Virus pertama kali tumbuh dalam kultur sel mamalia sebelum diinaktivasi dengan bahan kimia formaldehida atau β -propiolakton. Metodenya sederhana dan relatif mudah, tetapi memakan waktu dan hasilnya tergantung pada skala kultur, replikasi virus secara *in vitro*, dan persyaratan fasilitas biosafety level 3 (Ophinni et al., 2020).

CoronaVac (sebelumnya PiCoVacc) oleh Sinovac adalah vaksin virus yang tidak aktif dengan bahan tambahan aluminium hidroksida sebagai adjuvan. SARS-CoV-2 strain CN2 diekstraksi dari bronchoalveolar lavage (BAL) pasien rawat inap di Wuhan, dibiakkan dalam sel Vero, dipanen, dinonaktifkan menggunakan β -propiolakton, dan dimurnikan sebelum akhirnya diserap ke dalam aluminium hidroksida (Ophinni et al., 2020). Selain aluminium hidroksida, bahan tambahan lainnya yang digunakan ialah disodium hidrogen fosfat, natrium dihidrogen fosfat, natrium klorida, natrium hidroksida dan HCl sebagai pengatur pH (BPOM, 2021).

Coronavac telah menjalankan uji klinis fase 3 di Indonesia, Turki, Brasil, dan Chili, dengan target total setidaknya 30.000 peserta di bulan Oktober 2020. Di Indonesia, Sinovac — bekerja sama dengan perusahaan farmasi milik negara Biofarma dan Universitas Padjajaran — telah merekrut 1.620 subjek berusia 18-59 tahun di Bandung, Jawa Barat. Analisis sementara dapat dilakukan jika sejumlah kasus positif telah muncul di kumpulan subjek, yang diperkirakan akan tercapai pada Januari 2021. Analisis independen dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) dan akan memberikan Otorisasi Penggunaan Darurat (EUA) jika disetujui. Vaksin diberikan dalam dua

dosis dengan jarak dua minggu. Tes darah terakhir untuk subjek diharapkan pada bulan Desember, tetapi dapat diperpanjang hingga Maret untuk meninjau kemanjuran dan efek samping jangka panjang. Menurut data sementara dari uji coba di Turki, CoronaVac menunjukkan kemanjuran 91,25%, karena hanya 3 dari 29 orang yang terinfeksi selama uji coba diberi vaksin sebagai lawan 26 pada kelompok plasebo. Namun, data ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena jumlah subjek yang dimasukkan dalam analisis sementara relatif kecil ($n = 1,322$). Uji coba di Brasil dilaporkan mencapai jumlah subjek yang terinfeksi yang lebih tinggi (74 kasus), memberikan kemanjuran "lebih dari 50%", tetapi hasil terperinci ditunda atas permintaan perusahaan. Coronavac akan menjadi vaksin utama yang akan digunakan oleh pemerintah Indonesia dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya. Gelombang pertama 1,2 juta dosis vaksin Sinovac telah dikirim ke Indonesia pada 6 Desember, dengan gelombang kedua 1,8 juta dosis diharapkan tiba pada awal Januari. Vaksin itu sendiri telah disetujui untuk penggunaan terbatas di China. Mirip dengan vaksin tidak aktif lainnya, CoronaVac stabil pada penyimpanan 4°C (Ophinni et al., 2020).

C. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

1. Definisi

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah kejadian medis merugikan yang terjadi setelah perlakuan imunisasi, namun tidak selalu memiliki hubungan sebab-akibat dengan penggunaan vaksin. Kejadian ini dapat berupa tanda yang merugikan baik itu gejala atau penyakit (Barbara & Miriam, 2020).

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) bisa berupa efek samping yang sangat ringan sekali sampai dengan efek samping yang lebih berat. KIPI dapat menyebabkan keraguan masyarakat terhadap keamanan vaksin. Gejala KIPI bisa

berupa gejala ringan yang dirasakan tidak nyaman atau berupa kelainan hasil pemeriksaan laboratorium (WHO, 2021).

2. Klasifikasi KIPI

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dapat berupa reaksi simpang yang sangat ringan sekali sampai dengan reaksi simpang yang lebih berat. Untuk menentukan KIPI dibutuhkan keterangan mengenai seberapa besar frekuensi kejadian KIPI saat pemberian vaksin tertentu; bagaimana sifat kelainan yang terjadi, lokal atau sistemik; bagaimana derajat kesakitan, apakah perlu dirawat, apakah menyebabkan cacat atau kematian; apakah penyebab kelainan dapat dipastikan atau tidak terbukti; dan apakah dapat disimpulkan bahwa KIPI yang terjadi berhubungan dengan vaksin, kesalahan pada produksi vaksin, atau kesalahan saat pemberian vaksin (WHO, 2021). Berdasarkan keterangan tersebut, maka KIPI diklasifikasikan sebagai berikut (Handayani, 2021):

a. Reaksi KIPI terkait komponen vaksin

Vaksin mengandung berbagai komponen untuk membuatnya efektif dan memberikan perlindungan kepada penerima vaksin. Komponen dari vaksin ini tentu dapat menimbulkan resiko. Kejadian yang ditimbulkan terjadi dikarenakan kandungan vaksin.

b. Reaksi KIPI terkait dengan cacat mutu vaksin

Pada pembuatan vaksin digunakan antibiotik sebagai substansi untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik ini berguna untuk mencegah kontaminasi bakteri. Komponen ini yang menjaga efektivitas vaksin. Jika pada stabilitas vaksin tidak terjaga dengan baik, maka hal ini dapat menimbulkan KIPI karena terlanjur diberikan kepada penerima vaksin.

c. Reaksi KIPI akibat kesalahan prosedur

Kesalahan prosedur imunisasi meliputi kesalahan dalam penyiapan, penanganan, penyimpanan dan cara pemberian vaksin. Kesalahan prosedur imunisasi dapat menyebabkan KIPI yang bersifat kluster yaitu terjadi dua atau lebih KIPI yang sama yang terkait dengan waktu, tempat dan vaksin yang sama. KIPI kluster juga sering terjadi pada petugas kesehatan dikarenakan fasilitas kesehatan atau vaksin dari vial dan batch yang sama dikelola tidak sesuai dengan SOP atau vaksin sudah terkontaminasi.

d. Reaksi KIPI akibat kecemasan takut disuntik

Seseorang biasanya bereaksi sebelum atau sesudah disuntik. Reaksi ini tidak berkaitan dengan vaksin, namun lebih ke rasa takut disuntik. Terdapat 4 jenis reaksi KIPI akibat kecemasan karena takut disuntik yaitu pusing, hiperventilasi, muntah dan kejang.

e. Kejadian koinsiden

KIPI ini terjadi dikarenakan hal-hal di luar produk vaksin, kekeliruan imunisasi atau kecemasan akibat imunisasi. Misalnya, Demam yang timbul bersamaan dengan pemberian imunisasi (asosiasi waktu) padahal sebenarnya disebabkan oleh malaria.

3. Gejala klinis Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin COVID-

19

Gejala klinis KIPI dapat dibagi menjadi gejala lokal dan sistemik serta reaksi lainnya, dapat timbul secara cepat maupun lambat (Hadinegoro, 2016).

a. Gejala klinis pada orang dewasa

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanjun Zhang (2020) dengan melakukan pengujian Keamanan, tolerabilitas, dan imunogenisitas dari Vaksin SARS-CoV-2 inaktif terhadap orang dewasa sehat berusia 18–59 tahun,

Ditemukan bahwa dua dosis CoronaVac pada konsentrasi yang berbeda dan menggunakan jadwal pemberian dosis yang berbeda dapat ditoleransi dengan baik dan cukup imunogenik pada orang dewasa sehat berusia 18–59 tahun. Insiden reaksi merugikan pada kelompok 3 µg dan 6 µg adalah serupa (nyeri di tempat suntikan), menunjukkan tidak ada masalah keamanan terkait dosis tetapi diperlukan tindak lanjut jangka panjang yang lebih banyak. Selain itu, sebagian besar reaksi merugikan ringan, dengan gejala yang paling umum adalah nyeri di tempat suntikan, yang sesuai dengan temuan sebelumnya untuk vaksin COVID-19 inaktif lain dari Sinopharm (Beijing, Cina). Dibandingkan dengan kandidat vaksin COVID-19 lainnya, seperti vaksin vektor virus atau vaksin DNA atau RNA, kejadian demam setelah vaksinasi dengan CoronaVac relatif rendah (Zhang et al., 2021).

b. Gejala klinis pada geriatri/lansia

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Zhiwei Wu (2021) dengan melakukan pengujian keamanan, tolerabilitas, dan imunogenisitas dari Vaksin SARS-CoV-2 (CoronaVac) terhadap lansia sehat di atas 60 tahun, berbagai reaksi simpang (*adverse reaction*) dirasakan oleh partisipan uji klinis vaksin CoronaVac di China, diantaranya terdapat reaksi lokal: nyeri, eritema, pruritus dan bengkak, dan reaksi sistemik: demam, rasa lelah, diare, nyeri otot, mual, sakit kepala, *mucocutaneous*, anoreksia, hypoesthesia, pusing, hypoesthesia oral, edema perifer, sakit perut, muntah, kantuk, nyeri sendi, ruam, darah tinggi, hipersensitivitas, palpitasi. Reaksi simpang ini tetap ada meskipun hanya sedikit, bersifat ringan hingga sedang dan membaik dalam kurun waktu 48 jam setelah divaksinasi. (Wu et al., 2021).

D. Tinjauan Islami tentang tingkat pengetahuan, geriatri dan penanganan

KIPI

1. Tingkat Pengetahuan

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)
(المجادلة/58:11)

Terjemahnya:

“Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mujadalah/58:11) (KEMENAG, 2021)

Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia Maha Mengetahui semua yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibalas dengan azab neraka. (Al-Mujadalah/58:11)

Menurut imam al-Qurthubi, Allah akan memberikan pahala di akhirat dan kemuliaan ketika di dunia, maka diangkat derajat orang beriman atas orang yang tidak beriman, dan diangkat derajat orang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Kata Ibn Mas’ud, melalui ayat ini Allah memuji kedudukan orang berilmu. Sedangkan derajat orang yang berilmu atas orang beriman yang tidak berilmu adalah derajat agama apabila mereka melakukan amal berdasarkan ilmu. Simpulan secara umum, pada ayat ini Allah mengangkat derajat seseorang karena keimanannya, kedua karena ilmunya (*Tafsir al-Qurthubi*, 1964: 17/299-230). Jadi yang diangkat derajatnya itu adalah orang berilmu yang telah beriman. Diangkat derajatnya karena keimanan, kemudian derajat karena ilmu yang mereka miliki. Mereka ini akan mendapat kemuliaan di dunia dan balasan pahala di akhirat.

2. Geriatri

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (٥٤) (الزوم/30: 54)

Terjemahnya:

“Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.”(Ar-Rum/30:54) (KEMENAG, 2021)

Allah SWT. memberitahukan siklus tentang siklus manusia pada setiap fase penciptaan kondisi demi kondisi, maka asal mulanya dari tanah kemudian dari setetes nuthfah (sperma) kemudian dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, lalu jadilah tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging dan kemudian ruh ditiupkan padanya, lalu ia keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah tak berdaya, lalu iapun tumbuh berkembang sedikit demi sedikit sehingga ia menjadi seorang anak kecil, kemudian remaja lalu tumbuh menjadi dewasa. Itulah kekuatan setelah kelemahan. Lalu mulailah ia berkurang iapun mulai lanjut usia, lalu menjadi tua dan menjadi lemah, itulah kelemahan setelah kekuatan, maka menjadi lemahlah keinginan, ruang gerak juga kekuatan, ubanpun mulai tumbuh, sifat-sifat yang nampak dan tak terlihatpun berubah, oleh karenanya Allah berfirman "Kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya," yaitu Allah SWT. melakukan apa yang dikendaki-Nya dan mengatur hamba-Nya sesuai yang Dia inginkan (Katsir, 2015).

Demikianlah Allah menciptakan makhluk yang dikehendaki-Nya, yaitu bahwa perjalanan hidup manusia di dunia pada umumnya demikian. Namun Allah dapat menentukan lain, yaitu bahwa manusia dapat saja wafat pada usia-usia yang dikehendaki-Nya sebelum usia tua tersebut. Demikianlah lemahnya manusia di

depan Tuhan. Oleh karena itu, mereka hendaknya tidak menyombongkan diri, tetapi beriman dan patuh kepada-Nya. (Ar-Rum/30:54) (KEMENAG, 2021).

3. Penanganan KIPI

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝٨٢ (الاسراء/17: 82)

Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.” (Al-Isra’/17:82) (KEMENAG, 2021)

Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sebagai obat dari penyakit fisik juga penyakit hati. Al-Qur'an juga merupakan rahmat bagi kaum Muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah (KEMENAG, 2021).

Kata *syifa'* yang dimaksud merupakan *dawa'*, yakni obat untuk menyembuhkan penyakit baik itu fisik maupun mental. Penyebutan *syifa'* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah sebagai subjek yang dapat menyembuhkan. Adapun yang dimaksud objek yang dapat dijadikan sebagai sarana penyembuhan disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu dalam QS. al-Nahl: 69 dan QS. Asy-Syuara:80. Tentulah dalam hal memelihara kesehatan, sejalan dengan ajaran Islam secara menyeluruh, yakni mencegah terjadinya sesuatu yang berakibat buruk atau mengambil langkahlangkah preventif seperti ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobati.” Agama memerintahkan agar orang yang terkena penyakit agar berobat. Dalam dunia kedokteran, banyak persoalan yang tidak sederhana permasalahannya menyangkut pengobatan suatu penyakit, terkadang pengobatan itu bertentangan dengan ajaran Islam (Sukmal et al., 2020).

Pahala berobat yaitu akan disembuhkan oleh Allah SWT., berobat hanyalah ikhtiar dan yang menyembuhkan bukanlah obat melainkan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ... ۞

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu , beliau berkata, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah.” (HR. Muslim)

Hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim (no. 2664). Dishahihkan oleh Syaikh al-Banirahimahullah dalam Hidâyatur Ruwat ila Takhriji Ahaditsil Mashabih wal Misykat (no. 5228).

Berobat tidaklah bertentangan dengan tawakal. Sebagaimana halnya menolak rasa lapar, rasa dahaga, rasa panas, dan rasa dingin dengan hal-hal yang menjadi kebalikannya. Bahkan, hakikat tauhid itu hanya sempurna dengan melakukan sebab musabab yang memang telah Allah jadikan sebagai hukum sebab akibat, baik dalam ajaran syariat-Nya maupun menurut takdir-Nya.

Kaitan ayat-ayat diatas dengan penelitian yang dilakukan yaitu Allah akan memberikan pahala di akhirat dan kemuliaan ketika di dunia, dan diangkat derajat orang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Diangkatnya derajat orang-orang yang berilmu yaitu orang-orang yang tetap berusaha meningkatkan ilmu pengetahuannya dalam melakukan pengobatannya, mencari tahu usaha apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kesembuhan.

Berdiam diri ketika sakit sama saja dengan tidak memiliki semangat hidup dan tidak disukai oleh Allah. Seseorang wajib berusaha mencari obat yang terbaik

disertai dengan berdoa kepada Allah agar mendapatkan berkah dan kesembuhan dari obat tersebut. Allah tetap akan meninggikan derajat orang-orang yang tetap meningkatkan ilmu pengetahuannya meskipun usia hamba-Nya bukan lagi usia yang muda.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional korelatif untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin COVID-19. Menurut Dr. Siswanto tahun 2018, penelitian observasional adalah penelitian yang melakukan kajian terhadap persoalan kesehatan pada suatu komunitas atau kelompok sosial (Siswanto et al., 2018).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*. Penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan variabel tanpa mencari hubungan antar variabel, data hasil penelitian disajikan apa adanya dan tidak perlu dianalisis mengapa kejadian pada variabel terjadi (Siswanto et al., 2018).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2021 hingga Januari 2022.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh geriatri di Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu geriatri di Makassar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel adalah bagian yang dianggap dapat mewakili jumlah dan karakteristik dari populasi. (Siswanto et al., 2018).

a. Kriteria sampel

Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1) Kriteria inklusi

- a) Usia antara 60-80 tahun.
- b) Geriatri yang telah diberi vaksin COVID-19.
- c) Geriatri/lansia yang menandatangani *informed consent*, bersedia menjadi responden.

2) Kriteria eksklusi

- a) Responden yang mengundurkan diri.
- b) Geriatri/lansia yang tinggal sendiri tanpa wali.
- c) Geriatri/lansia yang kondisi lemah sehingga tidak bisa mengisi kuesioner.

E. Penentuan Besaran Sampel

Menurut M. Sopiudin Dahlan (2017), rumus yang digunakan untuk menentukan besaran sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \alpha^2 PQ}{d^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

Z α = Nilai standar alfa yaitu 1,96

P = Proporsi kategori variabel yaitu 0,12

Populasi lansia di Makassar 2021= 172.520

Populasi manusia di Makassar 2021= 1.423.000

$$P = \frac{172.520}{1.423.000} = 0,12$$

$$Q = 1 - P = 1 - 0,12 = 0,88$$

Maka jumlah sampel yang dibutuhkan yaitu:

$$n = \frac{1,96^2 \times 0,12 \times 0,88}{0,05^2} = 162,2 \approx 162$$

(M. Sopiudin Dahlan, 2017)

F. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dan didasarkan atas ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari populasi (Siswanto et al., 2018).

G. Variabel Penelitian

1. Variabel independen/bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan/timbul variabel terikat (Siswanto et al., 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen/bebas adalah tingkat pengetahuan geriatri tentang KIPI.
2. Variabel dependen/terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel independen (Siswanto et al., 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi vaksin COVID-19.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang telah disiapkan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden (Siswanto et al., 2018).

I. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner

1. Validitas

Uji Validitas kuesioner dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data yang ditampung pada kuesioner mengukur apa yang akan diukur. Kuesioner harus berkaitan dengan variabel yang akan diukur dan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Jenis pengujian validasi kuesioner pada penelitian ini yaitu pengujian validitas konstruk. Sebuah instrumen yang dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila kriteria yang ada dalam instrumen secara teoritis telah mencerminkan apa yang diukur. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, untuk mencari kerangka tersebut dapat dilakukan: (1) mencari definisi-definisi konsep yang dikemukakan para ahli yang tertulis dalam literatur, (2) jika tidak terdapat pada literatur maka harus didefinisikan sendiri konsep tersebut, (3) menanyakan kepada calon responden. (Siswanto et al., 2018).

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita susun tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skors (nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan skors total kuesioner tersebut.

Langkah-langkah dalam pengujian validitas:

- a. Membuat tabel di Ms. Excel dengan isi skor total masing-masing variabel (Tabel perhitungan skor).
- b. Membuka aplikasi SPSS, masukkan data dari Ms. Excel pada kolom *data view*.

- c. Melakukan analisis dengan perintah klik *Analyze* kemudian *Correlate Bivariate* (Gambar/Output SPSS).
- d. Cek list Pearson ; Two Tailed ; Flag.
- e. Klik OK, lalu akan keluar hasil output validitas alat ukur.
- f. Menyortir item yang valid dan tidak valid.

2. Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat dipercaya atau diandalkan. Bila instrumen dapat digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dengan hasil pengukuran relatif konstan, maka instrumen tersebut reliabel (Siswanto et al., 2018).

Langkah-langkah dalam pengujian reliabilitas (M. Sopiudin Dahlan, 2018):

- a. Membuat tabel di Ms. Excel dengan isi skor total masing-masing variabel (Tabel perhitungan skor).
- b. Membuka aplikasi SPSS, masukkan data dari Ms. Excel pada kolom *data view*.
- c. Klik *Analyze, Scale, Reliability Analysis*.
- d. Masukkan semua pertanyaan ke kotak *item(s)*.
- e. Klik kotak *Statistics*.
- f. Centang *Scale if item deleted* pada *Descriptive for*.
- g. Klik *Continue* dan lihat hasilnya pada *Reliability Statistics*. Apabila diperoleh r hitung $>$ dan r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

J. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden dengan cara mengelompokkan data ke dalam suatu kategori, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Proses kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah proses memeriksa data yang telah dikumpulkan terkait kelengkapan identitas responden dan daftar pertanyaan yang telah dijawab. Memastikan bahwa variable yang diteliti telah sesuai dengan isian pada instrument atau tidak.

2. Memberi kode (*coding*)

Memberi kode adalah kegiatan menyederhanakan data hasil penelitian dengan memberikan simbol-simbol tertentu untuk masing-masing data yang sudah diklasifikasikan.

3. Tabulasi data (*tabulating*)

Tabulasi adalah kegiatan menyusun data yang telah diberikan kode dalam bentuk tabel dengan analisis yang dibutuhkan.

K. Analisis Data

Analisis data dengan melakukan uji normalitas data dan analisis bivariat pada aplikasi SPSS *statistics* 26.0. dengan langkah-langkah sebagai berikut (M. Sopyudin Dahlan, 2014):

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat statistik variabel penanganan KIP berdasar variabel independent tingkat pengetahuan geriatri, berdistribusi secara normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Residual. Hasil data normalitas uji Kolmogorv-Smirnov dikatakan normal apabila hasil nilai p yang didapatkan adalah $p > 0,05$.

- a. Membuka aplikasi SPSS, masukkan data dari Ms. Excel pada kolom *data view*.
- b. Lihat *Variabel View*. Beri keterangan variabel yang ada pada file tersebut.
- c. Lihat *Data View*.

- d. Membuat variabel *unstandardized residual*: *analyze, regression, linear*.
- e. Masukkan variabel Tingkat pengetahuan geriatri ke dalam *Independent List*.
- f. Masukkan variabel Penanganan KIPI ke dalam *Dependent List*.
- g. Pilih *save*: klik *unstandardized* pada *residuals*. Lalu *continue*: *Ok*.
- h. Kembali ke *data view*. Muncul variabel baru RES_1
- i. Klik *analyze: nonparametric tests: legacy dialogs: 1-sample K-S*.
- j. Masukkan variabel *Unstandardized residuals* ke kolom *Test variabel list*.
- k. Klik *Normal* pada *Test Distribution*: *Ok*.
- l. Interpretasi data pada *output spss* yang muncul.
 2. Analisis Bivariat
- a. Jika data yang dihasilkan normal, dilanjutkan dengan melakukan uji Pearson *Chi square*.

Uji ini dilakukan untuk melihat skor variabel tingkat pengetahuan geriatri dan variabel penanganan KIPI apabila hasil dari selisih ini menunjukkan $p > 0,05$.
- b. Jika data yang dihasilkan berdistribusi tidak normal, maka dilanjutkan dengan melakukan uji Spearman. Uji ini dilakukan untuk mengetahui korelasi skor variabel pengetahuan geriatri dan variabel tingkat pendidikan apabila hasil dari selisih ini menunjukkan $p < 0,001$.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Jenis Kelamin, Usia, Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan.

a. Jenis Kelamin

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Geriatri Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Laki-laki	63	38,9%
2	Perempuan	99	61,1%
Jumlah		162	100%

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa responden laki-laki memiliki frekuensi sebanyak 63 orang (38,9%), sedangkan pada responden perempuan memiliki frekuensi sebanyak 99 orang (61,1%).

b. Usia

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Geriatri Berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	60-65 tahun	93	57%
2	66-70 tahun	41	25%
3	71-75 tahun	20	12%
4	76-80 tahun	8	5%
Jumlah		162	100%

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa frekuensi responden yang berusia 60-65 tahun sebanyak 93 orang (57%), frekuensi responden yang berusia 66-70 tahun sebanyak 41 orang (25%), frekuensi responden yang berusia 71-75 tahun sebanyak 20 orang (12%), dan frekuensi responden yang berusia 76-80 tahun sebanyak 8 orang (5%).

c. Pekerjaan

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Geriatri Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Buruh Harian Lepas	44	27,2%
2	Guru/Dosen	11	6,8%
3	IRT	53	32,7%
4	Karyawan Swasta	4	2,5%
5	Pedagang	4	2,5%
6	Pemulung	1	0,6%
7	Pensiun	29	17,9%
8	PNS	10	6,2%
9	Supir	1	0,6%
10	Tukang Ojek	1	0,6%
Jumlah		162	100%

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan buruh sebanyak 44 orang (27,2%), frekuensi responden dengan pekerjaan guru/dosen sebanyak 11 orang (6,8%), frekuensi responden dengan pekerjaan IRT sebanyak 53 orang (32,7%), frekuensi responden dengan pekerjaan karyawan swasta dan pedagang sebanyak 4 orang (2,5%), frekuensi responden dengan pekerjaan pemulung 1 orang (0,6%), frekuensi responden pensiun sebanyak 29 orang (17,9%), frekuensi responden PNS sebanyak 10 orang (6,2%), frekuensi responden supir dan tukang ojek masing-masing 1 orang (0,6%).

d. Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	13	8%
2	SD/MI/Sederajat	27	16,7%
3	SMP/MTs/Sederajat	27	16,7%
4	SMA/MA/Sederajat	49	30,2%
5	D1	2	1,2%
6	D2	1	0,6%
7	D3	6	3,7%
8	S1	34	21%
9	S2	2	1,2%
10	S3	1	0,6%
Jumlah		162	100%

Dari tabel menunjukkan bahwa frekuensi responden yang tidak menempuh pendidikan sebanyak 13 orang (8%), frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir SD/Mi/Sederajat sebanyak 27 orang (16,7%), frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir SMP/MTs/Sederajat sebanyak 27 orang (16,7%), frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir SMA/MA/Sederajat sebanyak 49 orang (30,2%), frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir D1 sebanyak 2 orang (1,2%), frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir D2 sebanyak 1 orang (0,6%), frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir D3 sebanyak 6 orang (3,7%), frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir S1 sebanyak 34 orang (21%), frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir S2 sebanyak 2 orang (1,2%), dan frekuensi responden dengan tingkat pendidikan akhir S3 sebanyak 1 orang (0,6%).

2. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas Kuesioner

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Dasar (A)

Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (0,05)$	Ket.
1	0,438	0,361	Valid
2	0,438	0,361	Valid

Dari pengujian validitas kuesioner untuk $N=30$ orang responden dengan $\alpha=0,05\%$ dan derajat kebebasan (df) $N-2$ yaitu $30-2=28$, diperoleh hasil nilai $r_{tabel}=0,361$. Berdasarkan tabel di atas nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga 2 item pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pengetahuan tentang KIPI (B)

Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (0,05)$	Ket.
1	0,493	0,361	Valid
2	0,380	0,361	Valid
3	0,426	0,361	Valid
4	0,474	0,361	Valid
5	0,623	0,361	Valid
6	0,642	0,361	Valid

7	0,436	0,361	Valid
8	0,661	0,361	Valid
9	0,562	0,361	Valid
10	0,516	0,361	Valid

Dari pengujian validitas kuesioner untuk N=30 orang responden dengan $\alpha=0,05\%$ dan derajat kebebasan (df) N-2 yaitu 30-2=28, diperoleh hasil nilai $r_{tabel}=0,361$. Berdasarkan tabel di atas nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga 10 item pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sikap Geriatri terhadap KIPI (C)

Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (0,05)$	Ket.
1	0,452	0,361	Valid
2	0,553	0,361	Valid
3	0,491	0,361	Valid
4	0,600	0,361	Valid
5	0,463	0,361	Valid
6	0,476	0,361	Valid
7	0,469	0,361	Valid
8	0,386	0,361	Valid
9	0,435	0,361	Valid
10	0,532	0,361	Valid
11	0,405	0,361	Valid

Dari pengujian validitas kuesioner untuk N=30 orang responden dengan $\alpha=0,05\%$ dan derajat kebebasan (df) N-2 yaitu 30-2=28, diperoleh hasil nilai $r_{tabel}=0,361$. Berdasarkan tabel di atas nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga 11 item pernyataan dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas Kuesioner

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Pernyataan A,B,C

Item Pernyataan	r_{hitung}	Batasan	Ket.
A	0,608	0,6	Reliabel
B	0,819	0,6	Reliabel
C	0,808	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas kuesioner yang meliputi pernyataan tentang Pengetahuan dasar (A), Pengetahuan tentang KIPI (B) dan Sikap Geriatri terhadap KIPI (C) masing-masing adalah 0,608; 0,819 dan 0,808. Digunakan metode Cronbach Alpha pada tingkat kepercayaan

95% dengan ketentuan $r_{hitung} >$ konstanta (0,6), sehingga dapat diketahui bahwa variabel A, B dan C dalam penelitian telah reliabel.

3. Uji Normalitas Data

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Pernyataan Pengetahuan dasar, Pengetahuan KIPI (AB) dan sikap terhadap KIPI (C)

Variabel	Asymp. Sig.	Ket.
Unstandardized residual	0,200	distribusi data normal

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Asymp. Sig.* (signifikansi) dari variabel *unstandardized residual* adalah $0,200 > 0,05$, sehingga diketahui bahwa pernyataan pada variabel A,B dan C berdistribusi secara normal.

4. Tingkat Pengetahuan Geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19

a. Pengetahuan Dasar

Tabel 10. Distribusi frekuensi responden berdasarkan item pernyataan tentang pengetahuan dasar

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
A1	0 (0%)	1 (0,6%)	11 (6,8%)	48 (29,6%)	102 (63%)	162 (100%)
A2	1 (0,6%)	7 (4,3%)	23 (14,2%)	63 (38,9%)	68 (42%)	162 (100%)

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Tabel 11. Distribusi frekuensi pengetahuan geriatri tentang pengetahuan dasar

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (F)	Persentase(%)
Baik	133	82,1%
Cukup	28	17,3%
Kurang	1	0,6%
Jumlah	162	100%

Dari tabel 11 menunjukkan bahwa frekuensi pengetahuan geriatri tentang pengetahuan dasar berdasarkan kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 133 responden (82,1%), untuk kategori tingkat pengetahuan cukup sebanyak 28 responden (17,3%), dan untuk kategori tingkat pengetahuan kurang sebanyak 1 responden (0,6%).

b. Pengetahuan tentang KIPI

Tabel 12. Distribusi frekuensi responden berdasarkan item pernyataan Pengetahuan tentang KIPI

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
B1	4 (2,5%)	12 (7,4%)	29 (17,9%)	74 (45,7%)	43 (26,5%)	162 (100%)
B2	3 (1,9%)	22 (13,6%)	57 (35,2%)	53 (32,7%)	27 (16,7%)	162 (100%)
B3	3 (1,9%)	25 (15,4%)	15 (9,3%)	82 (50,6%)	37 (22,8%)	162 (100%)
B4	17 (10,5%)	47 (29%)	29 (17,9%)	57 (35,2%)	12 (7,4%)	162 (100%)
B5	16 (9,9%)	44 (27,2%)	38 (23,5%)	46 (28,4%)	18 (11,1%)	162 (100%)
B6	5 (3,1%)	25 (15,4%)	23 (14,2%)	58 (35,8%)	51 (31,5%)	162 (100%)
B7	14 (8,6%)	35 (21,6%)	32 (19,8%)	53 (32,7%)	28 (17,3%)	162 (100%)
B8	7 (4,3%)	29 (17,9%)	26 (16%)	74 (45,7%)	26 (16%)	162 (100%)
B9	32 (19,8%)	51 (31,5%)	47 (29%)	26 (16%)	6 (3,7%)	162 (100%)
B10	6 (3,7%)	15 (9,3%)	22 (13,6%)	49 (30,2%)	70 (43,2%)	162 (100%)

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Tabel 13. Distribusi frekuensi pengetahuan geriatri tentang Pengetahuan tentang KIPI

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (F)	Persentase(%)
Baik	52	32,1%
Cukup	90	55,6%
Kurang	20	12,3%
Jumlah	162	100%

Dari tabel 13 menunjukkan bahwa frekuensi pengetahuan geriatri tentang KIPI berdasarkan kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 52 responden (32,1%), untuk kategori tingkat pengetahuan cukup sebanyak 90 responden (55,6%), dan untuk kategori tingkat pengetahuan kurang sebanyak 20 responden (12,3%).

c. Sikap terhadap KIPI

Tabel 14. Distribusi frekuensi responden berdasarkan item pernyataan Sikap Geriatri terhadap KIPI

Item Pernyataan	Frekuensi Tanggapan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
C1	6 (3,7%)	14 (8,6%)	17 (10,5%)	49 (30,2)	76 (46,9%)	162 (100%)
C2	3 (1,9%)	27 (16,7%)	42 (25,9%)	49 (30,2%)	41 (25,3%)	162 (100%)
C3	6 (3,7%)	16 (9,9%)	40 (24,7%)	55 (34%)	45 (27,8%)	162 (100%)
C4	19 (11,7%)	46 (28,4%)	50 (30,9%)	35 (21,6%)	12 (7,4%)	162 (100%)
C5	6 (3,7%)	33 (20,4%)	18 (11,1%)	63 (38,9%)	42 (25,9%)	162 (100%)
C6	7 (4,3%)	35 (21,6%)	18 (11,1%)	66 (40,7%)	36 (22,2%)	162 (100%)
C7	13 (8%)	41 (25,3%)	56 (34,6%)	40 (24,7%)	12 (7,4%)	162 (100%)
C8	14 (8,6%)	39 (24,1%)	56 (34,6%)	42 (25,9%)	11 (6,8%)	162 (100%)
C9	38 (23,5%)	61 (37,7%)	28 (17,3%)	26 (16%)	9 (5,6%)	162 (100%)
C10	0 (0%)	2 (1,2%)	13 (8%)	49 (30,2%)	98 (60,5%)	162 (100%)
C11	2 (1,2%)	2 (1,2%)	20 (12,3%)	36 (22,2%)	102 (63%)	162 (100%)

Tabel 15. Distribusi frekuensi geriatri tentang sikap terhadap KIPI

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (F)	Persentase(%)
Baik	54	33,3%
Cukup	97	59,9%
Kurang	11	6,8%
Jumlah	162	100%

Dari tabel 15 menunjukkan bahwa frekuensi pengetahuan geriatri tentang sikap terhadap KIPI berdasarkan kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 54 responden (33,3%), untuk kategori tingkat pengetahuan cukup sebanyak 97 responden (59,9%), dan untuk kategori tingkat pengetahuan kurang sebanyak 11 responden (6,8%).

d. Hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19

Tabel 16. Distribusi frekuensi pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19

Pengetahuan Geriatri	Penanganan Pertama KIPI						Total		P (Value)
	Baik		Cukup		Kurang		F	%	
	F	%	F	%	F	%			
Baik	34	20,9%	62	38,2%	1	0,6%	97	59,9%	0,000
Cukup	19	11,7%	31	19,1%	7	4,3%	57	35,1%	
Kurang	1	0,6%	4	2,4%	3	1,8%	8	4,9%	
Total	54	33,3%	97	59,9%	11	6,8%	162	100%	

Berdasarkan tabel 16, responden dengan kategori baik pada pengetahuan dan penanganan KIPI sebanyak 34 orang (20,9%), kemudian responden dengan kategori cukup pada pengetahuan dan penanganan KIPI sebanyak 31 orang (19,1%), untuk responden dengan kategori kurang pada pengetahuan dan penanganan KIPI sebanyak 3 orang (1,8%).

B. Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan pada Geriatri di wilayah Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner secara langsung oleh responden. Data yang digunakan dalam kuesioner ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebar kepada geriatri di wilayah makassar. Penelitian ini

dilakukan pada 162 responden yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dengan karakteristik subjek penelitian tercantum pada tabel 1.

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan jenis kelamin, responden dengan frekuensi paling banyak yaitu yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 99 orang dengan persentase 61,1%. Hal ini sesuai dengan persentase populasi penduduk lansia di Kota Makassar, jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 10 % sedangkan laki-laki sebanyak 8%, sehingga didapatkan responden perempuan dengan frekuensi lebih tinggi dibanding laki-laki (Badan Pusat Statistik et al., 2020).

Berdasarkan usia, responden dengan frekuensi paling banyak yakni responden yang berusia 60-65 tahun sebanyak 93 orang (57%). Hal ini dikarenakan untuk usia diatas 65 tahun memiliki lebih banyak penyakit penyerta dibanding dengan responden yang baru memasuki usia 60 tahun, penyakit penyerta yang dimaksudkan seperti penyakit paru, jantung dan ginjal lebih rentan sehingga jumlahnya lebih sedikit dan jarang ditemukan geriatri > 65 tahun yang menerima vaksin Covid-19 (Saputra et al., 2021).

Berdasarkan pekerjaan, responden yang paling banyak yakni responden dengan pekerjaan IRT sebanyak 53 orang dengan persentase 32,7%. Ketika sudah memasuki usia lanjut, geriatri menyadari bahwa terdapat resiko yang lebih besar terkait kesehatan fisik maupun mental, dengan kondisi tersebut maka geriatri akan mengurangi aktivitas fisik seperti kerja keras dan lebih banyak beraktivitas di rumah (Sulistiyawati, 2018). Oleh karenanya, jumlah responden yang berprofesi sebagai IRT lebih banyak dan mudah ditemukan di area vaksinasi.

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden yang paling banyak yaitu responden yang menempuh pendidikan hingga SMA/Ma/Sederajat sebanyak 49 orang dengan persentase 30,2%. Pendidikan seseorang dapat mempengaruhi

perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan, termasuk dalam meningkatkan pengetahuannya dan melakukan praktik terhadap kesehatan sehingga dapat mengatasi masalah kesehatannya sendiri (Mandesa et al., 2018).

2. Uji Normalitas Data

Pengujian Normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Residual melalui program analisis data SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah variabel atau untuk mengetahui kenormalan distribusi data penelitian. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu nilai *Asymp. Sig.* (signifikansi) dari variabel *unstandardized residual* yang merupakan penggabungan pernyataan A,B, dan C adalah 0,200. Nilai $0,200 > 0,05$ sehingga diketahui bahwa nilai residual dari pernyataan variabel A,B dan C berdistribusi secara normal.

3. Tingkat Pengetahuan Geriatri

a. Pengetahuan dasar

Frekuensi pengetahuan geriatri tentang pengetahuan dasar berdasarkan kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 133 responden dengan persentase 82,1%, untuk kategori tingkat pengetahuan cukup sebanyak 28 responden dengan persentase 17,3%, dan untuk kategori tingkat pengetahuan kurang sebanyak 1 responden dengan persentase 0,6%. Untuk variabel pernyataan A yaitu pengetahuan dasar mengenai vaksin Covid-19, pengetahuan geriatri dapat dikategorikan baik.

b. Pengetahuan tentang KIPI

Frekuensi pengetahuan geriatri tentang KIPI berdasarkan kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 52 responden (32,1%), untuk kategori tingkat pengetahuan cukup sebanyak 90 responden (55,6%), dan untuk kategori tingkat pengetahuan kurang sebanyak 20 responden (12,3%). Untuk variabel pernyataan

B yaitu pengetahuan mengenai KIPI vaksin Covid-19, pengetahuan geriatri dapat dikategorikan cukup.

c. Sikap terhadap KIPI

Frekuensi pengetahuan geriatri tentang sikap terhadap KIPI berdasarkan kategori tingkat pengetahuan baik sebanyak 54 responden (33,3%), untuk kategori tingkat pengetahuan cukup sebanyak 97 responden (59,9%), dan untuk kategori tingkat pengetahuan kurang sebanyak 11 responden (6,8%). Untuk variabel pernyataan C yaitu sikap terhadap KIPI vaksin Covid-19, pengetahuan geriatri dapat dikategorikan cukup.

d. Hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19

Frekuensi responden dengan kategori baik pada pengetahuan dan penanganan KIPI sebanyak 34 orang (20,9%), kemudian responden dengan kategori cukup pada pengetahuan dan baik pada penanganan KIPI sebanyak 19 orang (11,7%), kemudian responden dengan kategori kurang pada pengetahuan dan baik pada penanganan KIPI sebanyak 1 orang (0,6%), responden dengan kategori baik pada pengetahuan dan cukup pada penanganan KIPI sebanyak 62 orang (38,2%), kemudian responden dengan kategori cukup pada pengetahuan dan penanganan KIPI sebanyak 31 orang (19,1%), responden dengan kategori kurang pada pengetahuan dan cukup pada penanganan KIPI sebanyak 4 orang (2,4%), responden dengan kategori baik pada pengetahuan dan kurang pada penanganan KIPI sebanyak 1 orang (0,6%), responden dengan kategori cukup pada pengetahuan dan kurang pada penanganan KIPI sebanyak 7 orang (4,3%), untuk responden dengan kategori kurang pada pengetahuan dan penanganan KIPI sebanyak 3 orang (1,8%).

Hasil yang diperoleh untuk frekuensi pengetahuan geriatri terbanyak yaitu dengan kategori baik sebanyak 97 orang (59,9%) sedangkan untuk frekuensi penanganan pertama KIPI terbanyak yaitu dengan kategori cukup sebanyak 97 orang (59,9%). Hasil dengan kategori pengetahuan yang baik dikarenakan responden geriatri rata-rata berada pada tingkat pendidikan akhir SMA dan masih mampu untuk memperkaya pengetahuan mengenai KIPI melalui media yang ada, namun untuk kategori mengenai pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama KIPI berada dalam kategori cukup dikarenakan banyak responden geriatri belum memahami cara yang tepat dalam menghadapi KIPI-nya, sehingga diperlukan kembali sosialisasi terkait penanganan yang tepat dalam menghadapi KIPI vaksin Covid-19.

Untuk hasil pengetahuan geriatri dalam kategori baik, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirait tahun 2020 dengan judul hubungan pengetahuan tentang covid-19 terhadap tingkat kecemasan pada lansia yang mengalami hipertensi yaitu frekuensi pengetahuan lansia tentang covid-19 terbanyak berada dalam kategori baik sejumlah 14 orang (50%) (Sirait, 2020).

Rumusan Hipotesis Penelitian

H₀: Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19.

H_a: Ada hubungan antara tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian\ Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19.

Pembacaan hasil pada uji *chi square* berlandaskan pada dua hal yaitu membandingkan antar nilai *Asymp. Sig.* dengan batas kritis yaitu 0,05 atau dengan membandingkan antara nilai *chi square* tabel dan nilai *chi square* hitung pada tabel signifikansi 5%. Nilai *Asymp. Sig.* dan nilai *chi square* hitung dapat dilihat

pada tabel output *Chi Square Test* dari hasil olah data pada aplikasi IBM SPSS *Statistics 26 Version*.

1) Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (*Asymp.Sig.*)

- a) Apabila nilai *Asymp.sig.(2-sided)* $< 0,05$; dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Apabila nilai *Asymp.sig.(2-sided)* $> 0,05$; dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.


Berdasarkan hasil output dari tabel diketahui bahwa nilai *Asymp.sig.* pada uji *chi square* adalah 0,000. Nilai *Asymp.sig.* $0,000 < 0,05$ sehingga keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima, mengartikan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19.

2) Pengambilan keputusan berdasarkan nilai *Chi Square*

- a) Apabila nilai *chi square hitung* $>$ *chi square* tabel, dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Apabila nilai *chi square hitung* $<$ *chi square* tabel, dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan hasil output dari tabel diketahui bahwa nilai *chi square hitung* adalah sebesar 20,190. Nilai *chi square* tabel untuk $df= 4$ pada signifikansi 5% atau 0,05 adalah 9,488. Nilai *chi square hitung* $20,190 >$ *chi square* tabel 9,488, sehingga keputusan yang diambil bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, mengartikan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19. Hubungan yang dimaksud yaitu semakin baik pengetahuan geriatri maka semakin cukup untuk melakukan penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti pada tahun 2016 yaitu mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan ibu balita dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di puskesmas Oebobo, dengan hasil uji *chi square* memberikan nilai $p\text{-value} = 0,038 (< 0,05)$. Nilai ini mengartikan bahwa hipotesis diterima dan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu balita dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Puskesmas Oebobo (Widyastuti, 2016).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin covid-19, dapat disimpulkan bahwa dari 162 responden geriatri sebanyak 97 orang (59,9%) termasuk dalam kategori baik untuk frekuensi tingkat pengetahuan geriatri, kemudian sebanyak 97 orang (59,9%) dengan kategori cukup untuk frekuensi penanganan pertama KIPI. Untuk analisis *chi square* nilai *Asymp.sig.* adalah 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05 mengartikan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19, hubungan yang dimaksud yaitu semakin baik pengetahuan geriatri maka semakin cukup untuk melakukan penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi individu ataupun keluarga dari kelompok geriatri diharapkan tetap memperhatikan kesehatan dan menambah wawasan mengenai Covid-19, Vaksin Covid-19 dan KIPI yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin.
2. Bagi tenaga kesehatan, diharapkan dapat melaksanakan pemberian sosialisasi tentang pelaksanaan vaksin Covid-19, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin covid-19 setelah perlakuan vaksinasi kepada kelompok geriatri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi bahan dalam pengembangan variabel yang ada sehingga hasil yang diperoleh juga lebih baik. Serta mempersempit wilayah pengambilan sampel agar hasil lebih akurat.


DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, I. H. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*. Pustaka Azzam. 2014.
- Badan Pusat Statistik, Sari, N. R., Maylasari, I., Dewi, F. W. R., Putrianti, R., Nugroho, S. W., & Wilson, H. *Statistik Penduduk Usia Lanjut 2020* (Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial (ed.)). Badan Pusat Statistik. 2020.
- Barbara, L., & Miriam, S. *Safety Platform for Emergency vACcines. Priority List of Adverse Events of Special Interest: COVID-19. December, V2.0*. 2020.
- DiPiro, J. T., Talbert, R. L., Yee, G. C., Matzke, G. R., Wells, B. G., & Posey, L. M. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Tenth Edition*. American Journal of Health-System Pharmacy (10th ed.). McGraw Hill. <https://doi.org/10.1093/ajhp/54.14.1668>. 2016.
- Fauziah, H., Mulyana, R., & Martini, R. D. *Polifarmasi Pada Pasien Geriatri*. Human Care Journal, 5(3), 804. <https://doi.org/10.32883/hcj.v5i3.796>. 2020.
- Hadianti, D. N., Elis Mulyati, M. K., Ester Ratnaningsih, M. K., Fia Sofiati, SST, M. K., Hendro Saputro, S.Si., A. M., Heni Sumastri, S.Pd., M. K., Herawati M., SST, M.Pd., M. P., Ida Farida Handayani, M. K., Pudji Suryani, M., Siana Dondi, SKM., SST, M. K., Sudiyati, SST, M. K., & Yopita Ratnasari, S. *Buku Ajar Imunisasi*. Kementerian Kesehatan RI. 2014. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html%0Ahttps://www.depkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html>
- Hadinegoro, S. R. S. *Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi*. Sari Pediatri, 2(1), 2. <https://doi.org/10.14238/sp2.1.2000.2-10>. 2016.
- Husada, D. *Vaksin SARS-CoV-2: Tinjauan Kepustakaan*. Journal Of The Indonesian Medical Association, 70(10), 228–242. 2020. <http://mki-ojs.idionline.org/jurnal/article/view/254>
- Katsir, I. I. *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 8)* (A. Hidayat (ed.); 8th ed.). Insan Kamil Solo. 2015.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ITAGI, WHO, & UNICEF. *Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia*. Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, November. 2020.
- M. Sopiudin Dahlan. *Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Edisi 3 Seri Evidence Based Medicine 2*. Salemba Medika (Vol. 53, Issue 9). 2017.
- M. Sopiudin Dahlan. *Penelitian Diagnostik, Validitas dan Reliabilitas* (2nd ed.). PT. Epidemiologi Indonesia. 2018.
- Makmun, A., & Hazhiyah, S. F. *Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19*. Molucca Medica, 13, 52–59. 2020. <https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i2.52>
- Mandesa, E. M., Sarimin, D. S., & Ismanto, A. Y. *Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap orang tua tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (Kipi)*. Jurnal Keperawatan UNSRAT, 2(1), 104887. 2018.

- Nur Kholifah, S. *Keperawatan Gerontik* (M. Dwisatyadini (ed.); 1st ed.). Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2016.
- Ophinni, Y., Hasibuan, A. S., Widhani, A., Maria, S., Koesnoe, S., Yuniastuti, E., Karjadi, T. H., Rengganis, I., & Djauzi, S. *COVID-19 Vaccines: Current Status and Implication for Use in Indonesia*. *Acta Medica Indonesiana*, 52(4), 388–412. 2020.
- Saputra, Y. E., Prahasanti, K., Laitupa, A. A., & Irawati, D. N. *Gambaran Faktor Risiko Lanjut Usia terhadap Kematian Pasien*. 2(2), 114–126. 2021.
- Sari, I. P., & Sriwidodo, S. *Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19*. *Majalah Farmasetika*, 5(5), 204. 2020. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i5.28082>
- Sirait, H. S. *Hubungan Pengetahuan Tentang Covid-19 Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Lansia yang Mengalami Hipertensi*. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 102–111. 2020.
- Siswanto, Susila, & Suyanto. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran* (1st ed.). Bursa Ilmu. 2018.
- Sukmal, M., Syamsuwir, S., & Satriadi, I. *Syifa` dalam Perspektif Alquran*. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 87. 2020. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v1i2.1777>
- Sulistiyawati, I. *Hubungan Antara Pekerjaan, Pendapatan, Pengetahuan Sikap Lansia Dengan Kunjungan Ke Posyandu Lansia*. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 14–20. 2018.
- Widyastuti, R. *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Balita Dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Di Puskesmas Oebobo Tahun 2016*. *Jurnal Info Kesehatan*, 14(2), 1271–1278. 2016.
- Wu, Z., Hu, Y., Xu, M., Chen, Z., Yang, W., Jiang, Z., Li, M., Jin, H., Cui, G., Chen, P., Wang, L., Zhao, G., Ding, Y., Zhao, Y., & Yin, W. *Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) in healthy adults aged 60 years and older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial*. *The Lancet Infectious Diseases*, 3099(20), 1–9. 2021. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(20\)30987-7](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(20)30987-7)
- Yudi, Yudiernawati, A., & Wibowo, R. C. A. *Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dasar dengan Kepatuhan Ibu dalam Memberikan Imunisasi Dasar pada Bayi Di Kelurahan Tlogomas Malang*. *Nursing News*, 2, 209–216. 2017.
- Zhang, Y., Zeng, G., Pan, H., Li, C., Hu, Y., Chu, K., Han, W., Chen, Z., Tang, R., Yin, W., Chen, X., Hu, Y., Liu, X., Jiang, C., Li, J., Yang, M., Song, Y., Wang, X., Gao, Q., & Zhu, F. *Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18–59 years: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial*. *The Lancet Infectious Diseases*, 21(2), 181–192. 2021. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30843-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30843-4)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian



Lampiran 2. Kuesioner

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN GERIATRI TERHADAP
PENANGANAN PERTAMA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
(KIPI) VAKSIN COVID-19

Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya Andi Arwini Puspitasari, NIM: 70100117055 mahasiswa program studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul (Hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin COVID-19). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan geriatri terhadap penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin COVID-19 sehingga kelompok usia lanjut dapat mengatasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terdapat kejadian ikutan atau reaksi simpang setelah mendapatkan perlakuan vaksinasi. Penelitian ini telah mendapat persetujuan etik nomor A.059/KEPK/FKIK/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dan persetujuan Dinas Kesehatan Makassar.

Saya membutuhkan waktu dan kesediaan saudara(i) agar bersedia mengisi lembar kuesioner untuk menjawab pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian saya. Saya akan menjamin jawaban anda akan dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Anda berhak menolak jika tidak bersedia menjadi infoman. Namun sangat kami harapkan kesediaan anda sekalian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan kami mengharapkan jawaban jujur anda atas pertanyaan yang kami berikan. Peneliti

akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban para informan jika bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

- Demi menjaga kerahasiaan informan, peneliti tidak mencantumkan nama informan, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas informan.
- Keikutsertaan secara sukarela. informan dapat mengundurkan diri kapan saja dan tidak mempengaruhi kualitas.
- Pengisian kuesioner di lakukan kepada informan sekitar 10-15 menit untuk mengetahui persepsi kelompok geriatri tentang penanganan KIPI vaksin COVID-19.

Apabila informan ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka responden dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan informan. Apabila terdapat hal – hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini 085299121202. Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Jika terdapat hal yang belum jelas dan Bapak/Ibu membutuhkan keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kontak di bawah ini.

Andi Arwini Puspitasari (Peneliti)

HP: 085299121202

Email: 70100117055@uin-alauddin.ac.id

Surat Pernyataan
(Informed Consent)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:

Umur:

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan mengenai maksud pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan oleh Andi Arwini Puspitasari, mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan Geriatri terhadap Penanganan Pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19 dan bersedia menjadi responden penelitian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh kesadaran dan tanpa paksaan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2021

Responden

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Alamat :
5. No. Telp./Hp :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan Terakhir :
 - a. Tidak Sekolah
 - b. SD/MI/Sederajat
 - c. SMP/MTs/Sederajat
 - d. SMA/MA/Sederajat
 - e. Diploma
 - D1
 - D2
 - D3
 - f. Sarjana
 - S1
 - S2
 - S3
8. Apakah anda sudah menerima vaksin COVID-19?
 - a. Sudah
 - b. Belum

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan telitilah sebelum anda menjawab.
2. Untuk kelancaran penelitian ini mohon isilah jawaban sesuai dengan pengetahuan anda, tidak perlu bertanya dengan orang lain dan jawab dengan jujur apa adanya.
3. Silahkan memilih satu kategori jawaban yang paling sesuai dengan pemahaman dan pengalaman anda (✓).

ket:

STS (Sangat Tidak Setuju)

TS (Tidak Setuju)

N (Netral)

S (Setuju)

SS (Sangat Setuju)

A. Pengetahuan Dasar

No.	Pertanyaan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
1	Vaksin Covid-19 diberikan melalui lengan					
2	Vaksin Covid-19 diberikan untuk mengurangi resiko terpapar virus corona.					


B. Pengetahuan tentang KIPi

No.	Pertanyaan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
1	KIPi adalah gejala atau reaksi merugikan yang mungkin terjadi setelah vaksinasi.					
2	Efek samping vaksin bisa dilihat pada 30 menit pertama setelah vaksin.					
3	Salah satu KIPi setelah di vaksin ialah merasa nyeri di tempat penyuntikan.					
4	Salah satu KIPi setelah di vaksin ialah merasa gatal dan kemerahan di tempat penyuntikan.					
5	Salah satu KIPi setelah di vaksin ialah terdapat bengkak di tempat penyuntikan.					
6	Salah satu KIPi setelah di vaksin ialah merasa demam.					
7	Salah satu KIPi setelah di vaksin ialah merasa pusing/sakit kepala.					
8	Salah satu KIPi setelah di vaksin ialah merasa nyeri otot.					
9	Salah satu KIPi setelah di vaksin ialah merasa mual/muntah.					
10	Salah satu KIPi setelah di vaksin ialah merasa kantuk/lemas.					






C. Sikap Geriatri terhadap KIPI






No.	Pertanyaan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
1	Dengan mengetahui adanya KIPI setelah pemberian vaksin, anda merasa divaksin tidak merugikan.					
2	Setelah divaksin, Anda harus tetap berada di lokasi vaksin selama 30 menit.					
3	Jika merasakan tidak enak badan setelah divaksin, anda akan minum air lebih banyak.					
4	Jika merasakan demam atau tidak enak badan setelah divaksin, anda akan mandi air hangat dan menggunakan pakaian yang nyaman.					
5	Jika merasa demam setelah divaksin, anda akan meminum paracetamol.					
6	Jika merasakan nyeri setelah divaksin, anda akan meminum paracetamol.					
7	Jika lengan gatal dan kemerahan setelah divaksin, anda akan mengompres lengan dengan air dingin.					
8	Jika lengan bengkak setelah divaksin, anda akan mengompres lengan dengan air dingin.					
9	Jika merasa mual/muntah setelah divaksin,					

	anda akan meminum domperidon.					
10	Jika merasa kantuk setelah divaksin, anda akan beristirahat.					
11	Jika terjadi reaksi KIPi yang lebih parah, kita harus menghubungi nomor telepon yang diberikan petugas vaskin.					



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

No.	Foto	Inisial	Tanggal
1.		NG	26 November
2		HP	26 November
3		AR	27 November
4		SR	27 November
5		JM	29 November

6		KR	30 November
7		AS	1 Desember
8		AM	14 Desember
9		BR	18 Desember
10		RH	20 Desember

Lampiran 4. Kode Etik Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
 Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63, Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : J. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.059/KEPK/FKIK/VII/2021
 Judul Penelitian : UBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN GERIATRI TERHADAP PENANGANAN PERTAMA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) VAKSIN COVID-19
 Nama Peneliti : A. Arwini Puspitasari
 No. Register :

U	I	N	A	M	2	9	0	7	A	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A

Gowa, 29/07/2021

Ketua

 Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
 NID. 198007012006042002

Lampiran 5. Surat Izin Pengambilan Data dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telepon (0411) 858720 Faksimil(0411) 854923
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon 1500363 (0411)841829 Faksimil(0411) 8221400
Email: fak.kin-alauddin.ac.id

Nomor : B-3430 / Un.06/FKIK/PP.00.9/09/2021 Gowa, 21 September 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
 Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andi Arwini Puspitasari
 N I M : 70100117055
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : BTN. Minasa Upa G 18 No.6 Rappocini Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Hubungan Tingkat Pengetahuan Geriatri Terhadap Penanganan Pertama Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Vaksin Covid-19".


Dengan Dosen Pembimbing : 1. Apt. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm.Klin
 2. Apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Sulawesi Selatan, waktu penelitian 20 September 2021 – 31 Oktober 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam

Kepala Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,



Syafiqah

Tembusan :
 -Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data Dari PTSP Sulsel



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21505/S.01/PTSP/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3490/Un.06/FKIK/PP.00.9/09/2021 tanggal 21 September 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI ARWINI PUSPITASARI**
 Nomor Pokok : 70100117055
 Program Studi : Farmasi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN GERIATRI TERHADAP PENANGANAN PERTAMA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) VAKSIN COVID-19 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 September s/d 31 Oktober 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 23 September 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. **Pertinggal**.

SIMAP PTSP 23-09-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar

EDUH BERSINAR NO.1 Tlp (0411) 881943
FAX. (0411) 887710

Diterima	22/10-2021
Nomor	3720
Diteruskan Kepada	

1. Untuk diketahui seperlunya/diarsipkan
2. Untuk dipelajari
3. Untuk ditanggapi
4. Untuk disindaklanjuti
5. Untuk menghadiri

12/10

ato
Helel

- I. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
 1. Subag Umum dan Kepegawaian
 2. Subag Keuangan
 3. Subag Perencanaan dan Pelaporan
- II. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Pasyankes dan Peningkatan Mutu
- III. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN
 1. Seksi Kefarmasian
 2. Seksi Alat Kesehatan Perbekalan Kesehatan & Jaminan Kesehatan
 3. Seksi SDM Kesehatan dan Registrasi Kesehatan
- IV. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT
 1. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular
 2. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
 3. Seksi Surveilans dan Imunisasi
- V. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- VI. SEKRETARIS KORPRI



Lampiran 8. Data Validitas dan Reliabilitas

Responde n	A. Pengetahuan dasar			B. Pengetahuan tentang KIPI										C. Sikap Geriatri terhadap KIPI												
	A 1	A 2	total A	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B1 0	total B	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8	C 9	C1 0	C1 1	tota l C
1	4	4	8	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	37	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	47
2	5	5	10	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	33	5	5	5	4	3	5	3	3	5	5	4	47
3	5	5	10	5	4	3	3	3	4	3	3	3	5	36	5	5	4	3	4	4	4	4	3	5	5	46
4	4	4	8	4	4	1	1	3	5	2	2	2	5	29	1	1	4	3	5	5	5	3	3	3	5	38
5	5	5	10	5	1	5	2	5	5	1	5	1	5	35	5	5	5	5	5	5	5	1	4	5	5	50
6	1	5	6	4	4	4	2	2	2	2	4	2	2	28	4	1	1	4	4	4	4	4	4	3	4	37
7	4	5	9	4	4	4	2	2	4	2	2	2	4	30	4	1	1	1	4	1	2	4	2	4	4	28
8	3	5	8	4	3	4	5	4	5	4	4	4	4	41	5	3	4	4	4	5	4	5	5	4	5	48
9	4	4	8	3	1	4	3	3	4	3	3	3	3	30	1	1	4	3	4	4	4	4	4	3	5	37
10	5	4	9	3	3	2	2	3	4	3	3	3	5	31	4	4	4	3	5	5	4	4	3	5	5	46
11	5	5	10	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	35	4	4	4	4	5	5	2	5	5	5	5	48
12	4	2	6	4	2	4	4	4	4	2	4	2	3	33	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	43
13	5	5	10	2	4	2	2	2	3	3	2	1	1	22	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	50
14	5	4	9	4	1	2	3	3	3	3	3	3	3	28	5	1	4	2	4	4	4	4	2	4	4	38
15	5	5	10	4	5	5	3	4	4	3	3	3	5	39	5	5	5	2	4	4	3	3	4	4	5	44
16	4	4	8	3	3	4	4	4	4	4	5	3	5	39	5	4	4	3	4	4	5	3	3	5	5	45
17	5	5	10	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4	35	5	4	5	3	5	4	5	3	3	5	5	47
18	5	5	10	5	4	5	4	3	5	5	4	3	4	42	5	5	4	3	5	5	3	5	4	5	5	49
19	5	5	10	1	1	4	4	3	3	2	3	1	3	25	5	5	5	5	5	5	4	4	3	5	5	51
20	5	5	10	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	21	1	1	2	2	4	4	2	2	4	1	1	24
21	3	2	5	3	3	2	2	3	4	3	3	3	5	31	1	4	1	3	1	5	1	1	3	5	5	30
22	2	2	4	4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	36	1	4	4	2	4	4	1	1	2	5	5	33

23	3	5	8	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	45	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	51
24	5	1	6	2	4	2	2	2	3	3	2	1	1	22	1	2	1	3	5	5	5	1	5	5	5	38
25	4	4	8	3	1	4	3	3	4	3	3	3	3	30	2	1	4	3	1	4	4	4	1	3	5	32
26	5	4	9	3	3	4	4	4	4	4	5	3	5	39	4	5	4	3	4	4	5	3	5	5	5	47
27	5	5	10	4	5	5	4	4	4	2	4	2	3	37	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	51
28	5	5	10	4	2	4	4	4	4	2	4	2	3	33	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	49
29	1	1	2	1	1	4	4	3	3	2	3	1	3	25	5	5	5	1	1	1	1	2	3	1	5	30
30	5	5	10	5	4	5	4	3	5	5	4	3	4	42	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	52

Lampiran 9. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,608	2

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	4,17	1,592	,438	.
A2	4,20	1,407	,438	.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,819	10

M A K A S S A R

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	29,77	33,978	,493	,804
B2	29,87	33,568	,380	,825
B3	29,53	35,292	,426	,811
B4	30,00	35,172	,474	,805
B5	29,93	35,582	,623	,795
B6	29,37	34,999	,642	,792
B7	30,23	36,047	,436	,809
B8	29,80	34,303	,661	,789
B9	30,67	34,644	,562	,797
B10	29,63	33,689	,516	,801

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,808	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	38,77	51,289	,452	,798
C2	38,87	48,878	,553	,785
C3	38,73	53,582	,491	,791
C4	39,30	53,734	,600	,782
C5	38,50	55,017	,463	,794
C6	38,27	56,064	,476	,794
C7	38,87	53,982	,469	,793
C8	39,03	55,137	,386	,802
C9	38,83	55,316	,435	,796
C10	38,33	54,230	,532	,788
C11	37,83	58,764	,405	,801

Lampiran 10. Data Hasil Penelitian

Responden	A. Pengetahuan dasar			B. Pengetahuan tentang KIPI											C. Sikap Geriatri terhadap KIPI												
	A1	A2	total A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	total B	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	total C	
1	4	4	8	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	37	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
2	5	4	9	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	33	5	4	5	4	3	3	3	3	3	4	4	41	
3	5	5	10	5	4	3	3	3	4	3	3	3	5	36	5	5	4	3	4	4	4	4	3	5	5	46	
4	4	4	8	4	4	1	1	3	5	2	2	2	5	29	1	5	4	3	5	5	5	3	3	3	5	42	
5	5	5	10	5	1	5	2	5	5	1	5	1	5	35	5	5	5	1	1	5	5	1	4	4	5	41	
6	4	5	9	4	4	4	2	2	2	2	4	2	2	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	
7	4	5	9	4	4	4	2	2	4	2	2	2	4	30	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	42	
8	3	3	6	4	3	4	5	4	5	4	4	4	4	41	3	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	45	
9	4	4	8	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	32	2	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	40	
10	3	4	7	3	3	2	2	3	4	3	3	3	5	31	4	4	4	3	5	5	4	4	3	5	5	46	
11	5	5	10	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	35	4	4	4	4	4	4	2	2	2	5	5	40	
12	4	5	9	4	2	4	4	4	4	2	4	2	3	33	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	43	
13	5	5	10	2	4	2	2	2	3	3	2	1	1	22	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	53	
14	5	4	9	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	
15	5	5	10	4	3	3	3	4	4	3	3	3	5	35	5	5	5	3	4	4	3	3	4	4	5	45	
16	4	4	8	3	3	4	4	4	4	4	5	3	5	39	4	4	4	3	4	4	3	3	3	5	5	42	
17	5	5	10	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4	35	2	4	5	3	5	4	3	3	3	4	5	41	
18	5	5	10	5	4	5	4	3	5	5	4	3	4	42	4	5	4	5	5	5	3	5	1	5	5	47	
19	5	5	10	1	4	4	4	3	3	2	3	1	3	28	5	5	5	1	5	5	4	4	3	5	5	47	
20	5	5	10	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	24	1	4	2	2	4	4	2	2	4	4	5	34	
21	5	2	7	5	3	4	3	2	4	4	4	2	4	35	5	3	5	3	5	4	3	2	3	4	3	40	
22	5	5	10	5	5	4	2	2	5	2	4	1	3	33	3	3	5	4	4	4	3	3	2	5	3	39	
23	4	4	8	5	3	5	1	1	2	2	5	2	3	29	4	3	4	4	5	5	3	3	3	5	3	42	
24	4	4	8	5	4	4	2	2	5	1	2	2	2	29	4	3	5	5	1	1	2	2	1	5	3	32	
25	5	3	8	2	2	4	4	4	4	1	4	1	5	31	5	3	4	5	4	4	3	3	2	4	3	40	
26	5	4	9	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	47	5	3	5	4	4	4	3	3	2	3	3	39	
27	5	4	9	5	3	2	2	1	1	1	1	1	1	18	4	3	5	2	4	4	3	3	1	5	3	37	
28	5	4	9	4	3	4	4	1	5	4	4	1	1	31	5	3	5	5	5	5	3	4	2	4	3	44	
29	5	5	10	4	4	3	3	2	3	2	2	2	5	30	5	5	5	5	5	3	2	2	2	5	1	40	
30	5	5	10	3	3	2	2	2	2	2	2	2	5	25	5	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	36	

31	4	4	8	5	3	5	1	1	2	2	5	1	5	30	5	4	5	5	4	2	3	3	4	5	5	45	
32	4	4	8	5	4	5	2	2	5	5	5	2	3	38	4	4	5	3	4	1	1	1	2	5	3	33	
33	5	4	9	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	21	4	3	4	2	3	1	3	3	1	3	3	30	
34	5	4	9	4	4	5	1	1	5	2	5	1	3	31	5	4	4	5	4	1	1	1	3	5	3	36	
35	5	5	10	4	4	4	1	2	2	2	4	1	5	29	5	5	5	4	1	2	4	4	4	5	5	44	
36	5	4	9	4	4	4	1	4	5	2	4	1	5	34	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	49	
37	5	5	10	5	5	4	4	4	5	3	3	3	5	41	5	5	5	1	5	5	1	1	1	5	5	39	
38	5	4	9	5	4	4	2	2	4	4	4	1	5	35	5	5	3	1	4	4	1	1	2	4	4	34	
39	5	5	10	5	4	4	4	2	5	2	2	2	5	35	5	5	5	3	5	2	3	3	2	5	5	43	
40	5	5	10	4	4	4	2	3	5	4	4	2	5	37	5	5	3	1	5	5	2	2	2	5	5	40	
41	5	5	10	1	1	1	2	1	2	2	2	2	5	19	4	3	5	4	2	2	2	2	2	4	3	33	
42	5	5	10	4	4	4	2	2	5	2	3	2	2	30	5	2	5	2	4	4	2	3	2	4	4	37	
43	2	4	6	2	3	2	2	2	5	3	2	2	5	28	5	3	5	2	1	1	2	2	1	4	3	29	
44	5	2	7	5	5	2	4	2	2	2	2	2	5	31	5	5	1	1	2	2	2	2	2	5	5	32	
45	5	5	10	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	26	5	5	5	2	2	1	2	2	1	4	4	33	
46	5	5	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	22	5	5	5	5	5	5	2	4	5	5	5	51	
47	5	4	9	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	53
48	5	5	10	5	4	4	4	2	5	2	2	2	5	35	5	5	5	3	5	2	3	3	2	5	5	43	
49	5	2	7	4	4	5	2	2	2	3	5	2	5	34	5	5	5	2	2	2	2	2	2	5	5	37	
50	5	4	9	5	4	4	2	2	3	3	4	3	5	35	4	4	5	4	4	4	2	2	3	5	4	41	
51	5	5	10	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13	4	4	4	3	2	2	3	3	1	4	4	34	
52	5	5	10	5	5	4	1	5	2	1	4	1	5	33	5	5	5	5	5	5	2	2	4	5	5	48	
53	5	5	10	5	3	5	4	2	5	2	5	2	5	38	4	5	4	2	4	4	2	2	2	5	5	39	
54	3	3	6	3	2	2	2	3	2	3	4	2	5	28	1	1	1	4	4	4	2	2	1	4	1	25	
55	5	4	9	5	5	4	5	2	5	5	4	1	2	38	5	5	5	2	4	4	4	4	5	5	5	48	
56	5	4	9	4	4	4	1	1	5	4	4	1	5	33	5	4	4	3	4	4	3	3	2	4	4	40	
57	5	5	10	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5	33	5	5	5	3	4	4	2	2	2	5	4	41	
58	5	5	10	4	4	4	5	1	5	5	4	1	2	35	5	5	5	2	5	5	4	4	4	5	5	49	
59	5	5	10	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	36	3	3	2	2	4	4	2	3	2	5	5	35	
60	5	5	10	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39	2	2	4	4	4	4	2	2	2	5	5	36	
61	5	4	9	5	3	5	2	2	2	5	5	2	4	35	4	3	5	1	5	5	2	2	2	4	4	37	
62	5	4	9	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	20	4	2	4	1	4	4	2	2	2	5	3	33	
63	3	3	6	4	2	4	1	1	4	4	4	4	5	33	4	3	4	2	4	4	1	1	1	4	4	32	
64	5	4	9	5	3	2	4	4	4	5	1	1	1	30	2	2	4	4	2	2	1	1	1	4	4	27	
65	5	5	10	3	3	4	2	2	3	1	4	1	5	28	4	4	5	4	1	1	1	1	1	5	5	32	

66	5	4	9	5	4	5	5	1	5	5	2	2	5	39	4	3	4	1	4	4	2	4	1	3	4	34
67	3	1	4	4	3	3	3	2	4	3	4	2	3	31	2	3	5	4	3	4	4	4	1	4	4	38
68	3	3	6	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	28	2	2	2	2	3	3	2	2	1	3	2	24
69	4	3	7	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	22	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4	28
70	4	4	8	4	4	3	3	3	4	5	5	4	4	39	3	3	3	3	5	5	4	4	1	3	3	37
71	5	5	10	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	45	3	3	3	3	5	5	4	4	2	5	5	42
72	3	3	6	3	3	3	2	2	4	4	3	3	3	30	3	3	3	2	4	4	3	3	2	4	4	35
73	4	3	7	5	1	2	2	2	4	4	2	2	3	27	3	2	1	1	2	3	3	3	1	3	5	27
74	4	3	7	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	34	2	2	3	2	2	2	3	3	1	3	3	26
75	4	4	8	4	3	5	3	3	5	4	3	3	3	36	3	3	3	3	4	4	3	3	2	5	4	37
76	3	3	6	2	2	3	2	2	2	4	3	2	2	24	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
77	5	5	10	3	5	4	2	4	4	4	4	4	4	38	3	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	41
78	5	4	9	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	26	3	4	2	3	2	4	4	2	2	5	3	34
79	5	5	10	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	5	4	3	4	4	2	2	2	5	5	40
80	5	4	9	4	5	4	3	3	4	4	4	3	5	39	4	5	3	2	4	4	2	2	2	5	5	38
81	5	5	10	5	5	2	2	2	5	2	2	2	5	32	5	5	4	2	4	4	2	2	3	5	5	41
82	5	5	10	4	4	4	2	2	4	2	4	2	4	32	5	5	5	4	4	4	4	4	2	5	5	47
83	4	4	8	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	28	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	48
84	5	4	9	4	4	2	2	2	1	5	2	2	2	26	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	48
85	5	5	10	5	4	5	4	2	2	5	4	4	5	40	5	5	4	4	4	4	5	5	2	5	5	48
86	5	4	9	4	2	5	2	4	4	4	5	4	4	38	2	2	4	2	4	4	2	1	1	5	4	31
87	5	5	10	5	5	5	2	2	5	2	2	2	4	34	4	5	2	2	4	4	2	2	4	5	5	39
88	4	4	8	4	2	4	3	3	4	1	4	1	5	31	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	43
89	4	4	8	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	44	4	2	4	3	4	4	3	4	2	5	5	40
90	5	5	10	5	5	4	2	2	2	4	2	4	5	35	5	4	4	4	2	2	5	4	5	5	5	45
91	4	4	8	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	40	4	4	3	3	2	2	4	4	2	5	5	38
92	4	3	7	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	37	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
93	5	4	9	5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	38	1	4	3	3	4	4	3	3	4	5	5	39
94	4	4	8	5	3	4	1	4	1	1	2	1	1	23	1	3	2	1	2	2	3	3	5	5	5	32
95	4	4	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2	5	4	3	4	4	2	2	2	4	4	36
96	5	4	9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	40	2	4	1	2	4	4	3	3	1	4	4	32
97	5	4	9	4	4	4	1	1	1	1	4	1	5	26	3	4	5	1	5	4	3	3	4	5	5	42
98	4	2	6	4	4	2	2	3	2	2	5	2	5	31	5	5	4	2	3	3	4	4	4	5	5	44
99	4	4	8	4	2	4	2	3	5	5	4	1	5	35	5	3	4	3	4	4	2	2	1	5	4	37
100	5	2	7	5	5	4	1	4	4	3	4	3	5	38	1	1	2	2	2	2	2	2	3	4	4	25

101	4	4	8	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4	39	4	4	3	2	3	3	3	3	1	4	4	34
102	5	5	10	4	3	5	3	4	5	4	4	3	5	40	5	1	4	3	2	2	3	3	3	5	5	36
103	4	4	8	3	3	4	1	1	4	1	4	1	5	27	4	4	4	2	3	3	4	4	3	5	5	41
104	5	5	10	5	5	2	4	4	4	4	4	2	4	38	4	4	3	2	5	5	4	4	4	5	5	45
105	5	5	10	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	41	3	3	3	1	5	5	3	3	3	5	5	39
106	5	5	10	4	5	5	3	3	5	5	2	2	5	39	4	4	3	2	4	4	3	3	3	5	5	40
107	4	4	8	4	4	2	2	4	5	5	5	2	5	38	5	4	3	2	5	5	3	3	3	5	5	43
108	4	3	7	3	3	4	2	2	2	4	4	2	4	30	4	3	3	2	5	5	2	2	2	5	4	37
109	5	5	10	4	3	4	4	5	5	5	4	2	5	41	4	3	3	2	4	4	1	1	3	3	3	31
110	3	3	6	2	3	4	1	4	4	4	5	1	5	33	4	2	3	1	3	3	1	3	1	5	5	31
111	4	4	8	5	5	5	4	5	5	5	5	2	5	46	4	3	4	1	4	4	1	1	1	5	5	33
112	5	5	10	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	47	4	4	3	3	5	5	4	4	3	5	5	45
113	4	4	8	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	36	3	3	3	3	4	4	3	3	2	5	5	38
114	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
115	5	5	10	5	5	5	4	5	5	4	4	3	5	45	5	5	4	3	5	5	3	3	3	5	5	46
116	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	44
117	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49	5	5	4	3	5	5	4	4	2	5	5	47
118	5	5	10	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	44	5	3	4	3	3	3	4	4	3	5	5	42
119	5	5	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	5	5	4	4	3	5	5	47
120	5	5	10	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	47	4	5	4	3	5	5	4	4	3	5	5	47
121	5	5	10	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	41	4	4	4	3	5	5	3	3	2	5	5	43
122	5	5	10	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	40	5	3	4	3	3	3	4	4	2	5	5	41
123	5	5	10	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	35	5	3	3	3	2	2	3	3	1	4	5	34
124	5	3	8	4	2	4	2	3	4	3	4	3	5	34	5	3	3	2	2	2	3	4	1	5	5	35
125	5	3	8	4	2	3	3	2	3	3	4	3	5	32	5	2	3	2	2	2	3	3	1	4	5	32
126	5	4	9	4	3	4	4	3	4	2	3	2	4	33	5	2	3	2	1	2	3	3	1	4	5	31
127	5	3	8	3	3	4	3	3	3	4	3	4	5	35	5	3	3	3	2	2	3	4	2	4	5	36
128	5	4	9	3	2	5	4	3	3	4	4	3	4	35	5	2	3	2	2	2	3	3	2	5	5	34
129	5	4	9	4	3	5	4	4	3	3	3	3	3	35	5	2	3	3	2	2	3	3	2	4	5	34
130	5	5	10	3	3	5	4	3	4	3	3	3	3	34	5	2	3	2	2	2	3	3	2	5	5	34
131	5	5	10	4	2	5	4	4	4	4	4	3	3	37	5	2	3	3	3	3	4	3	2	4	5	37
132	5	5	10	4	3	5	4	4	4	3	4	3	4	38	5	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	38
133	5	5	10	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	36	5	2	4	3	3	3	4	3	2	5	5	39
134	4	3	7	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	36	5	2	3	3	2	2	3	3	2	5	5	35
135	5	3	8	4	2	4	3	3	2	3	4	3	4	32	5	2	3	2	2	2	3	3	1	5	5	33

136	4	2	6	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	33	5	2	2	2	2	2	3	3	2	5	5	33
137	4	2	6	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	35	4	2	2	2	2	2	3	2	3	5	5	32
138	4	3	7	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	34	5	3	3	3	2	2	3	3	2	5	5	36
139	4	3	7	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	34	5	2	3	3	2	2	2	3	2	5	5	34
140	4	4	8	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	35	5	2	2	3	2	2	3	3	2	5	5	34
141	4	4	8	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	35	5	3	3	3	2	2	2	3	2	5	5	35
142	4	4	8	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	36	5	3	3	3	2	2	3	2	2	5	5	35
143	4	3	7	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	36	3	3	3	3	2	2	3	3	2	5	5	34
144	4	4	8	3	3	4	1	5	4	3	4	1	5	33	5	4	4	2	4	4	4	2	2	5	5	41
145	4	3	7	4	2	2	2	4	4	2	2	4	5	31	5	5	5	1	5	5	3	3	4	4	4	44
146	4	4	8	3	3	4	4	5	5	3	3	5	5	40	4	4	2	4	4	4	1	1	1	4	4	33
147	3	4	7	4	3	1	2	3	4	5	4	2	5	33	5	4	5	4	5	4	4	2	1	4	4	42
148	5	3	8	4	5	5	4	4	5	2	2	2	5	38	5	4	1	1	3	3	2	2	1	5	5	32
149	3	4	7	3	3	4	4	4	5	5	5	1	5	39	4	3	5	2	5	5	5	5	1	4	4	43
150	5	5	10	4	5	2	2	2	5	2	4	3	4	33	3	4	4	2	3	4	4	4	2	2	5	37
151	4	4	8	4	4	2	2	1	5	4	1	1	5	29	5	5	3	2	5	5	2	2	1	5	5	40
152	5	5	10	4	4	5	5	5	5	1	5	1	5	40	4	4	2	1	4	4	3	3	3	4	3	35
153	5	5	10	4	4	3	3	3	5	5	3	3	5	38	3	4	2	2	5	5	1	1	2	5	5	35
154	5	5	10	4	4	4	4	1	5	1	1	1	5	30	4	4	3	3	3	3	4	4	1	4	4	37
155	5	5	10	3	3	4	4	2	2	4	4	2	2	30	5	3	2	2	4	4	2	2	1	5	5	35
156	4	4	8	4	2	4	4	4	4	2	2	2	2	30	4	4	2	2	3	3	3	3	1	4	4	33
157	5	5	10	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	54
158	5	5	10	3	4	4	1	1	4	1	1	1	3	23	4	4	1	1	3	3	1	1	1	3	5	27
159	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	54
160	5	5	10	4	4	5	4	4	5	5	5	5	3	44	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	52
161	4	4	8	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	38	2	4	4	4	5	5	4	4	3	5	5	45
162	5	5	10	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	46	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	52

Lampiran 11. Karakteristik Responden

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60	29	17,9	17,9	17,9
	61	18	11,1	11,1	29,0
	62	11	6,8	6,8	35,8
	63	10	6,2	6,2	42,0
	64	10	6,2	6,2	48,1
	65	15	9,3	9,3	57,4
	66	14	8,6	8,6	66,0
	67	3	1,9	1,9	67,9
	68	11	6,8	6,8	74,7
	69	8	4,9	4,9	79,6
	70	5	3,1	3,1	82,7
	71	5	3,1	3,1	85,8
	72	5	3,1	3,1	88,9
	73	5	3,1	3,1	92,0
	74	3	1,9	1,9	93,8
	75	2	1,2	1,2	95,1
	76	2	1,2	1,2	96,3
	77	2	1,2	1,2	97,5
	79	1	,6	,6	98,1
	80	3	1,9	1,9	100,0
	Total	162	100,0	100,0	

Rentang usia	Frekuensi	Persentase
60-65	93	57%
66-70	41	25%
71-75	20	12%
76-80	8	5%
Total	162	100%

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	63	38,9	38,9	38,9
	Perempuan	99	61,1	61,1	100,0
	Total	162	100,0	100,0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	-	44	27,2	27,2	27,2
	Buruh harian lepas	11	6,8	6,8	34,0
	Guru/Dosen	4	2,5	2,5	36,4
	IRT	53	32,7	32,7	69,1
	Karyawan Swasta	4	2,5	2,5	71,6
	Pedagang	4	2,5	2,5	74,1
	Pemulung	1	,6	,6	74,7
	Pensiun	29	17,9	17,9	92,6
	PNS	10	6,2	6,2	98,8
	Supir	1	,6	,6	99,4
	Tukang Ojek	1	,6	,6	100,0
	Total	162	100,0	100,0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D1	2	1,2	1,2	1,2
	D2	1	,6	,6	1,9
	D3	6	3,7	3,7	5,6
	S1	34	21,0	21,0	26,5
	S2	2	1,2	1,2	27,8
	S3	1	,6	,6	28,4
	SD/MI/Sederajat	27	16,7	16,7	45,1
	SMA/MA/Sederajat	49	30,2	30,2	75,3
	SMP/MTs/Sederajat	27	16,7	16,7	92,0
	Tidak Sekolah	13	8,0	8,0	100,0
	Total	162	100,0	100,0	

Lampiran 12. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		162
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,00890156
Most Extreme Differences	Absolute	,050
	Positive	,050
	Negative	-,028
Test Statistic		,050
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 13. Tingkat Pengetahuan Geriatri

1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	133	82,1	82,1	82,1
	2,00	28	17,3	17,3	99,4
	3,00	1	,6	,6	100,0
	Total	162	100,0	100,0	

2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	52	32,1	32,1	32,1
	2,00	90	55,6	55,6	87,7
	3,00	20	12,3	12,3	100,0
	Total	162	100,0	100,0	

33

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	54	33,3	33,3	33,3
	2,00	97	59,9	59,9	93,2
	3,00	11	6,8	6,8	100,0
	Total	162	100,0	100,0	

Lampiran 14. Uji Chi-Square

1 Pengetahuan Geriatri * 2 Penanganan KIPI Crosstabulation

Count

		2 Penanganan KIPI			Total
		1	2	3	
1 Pengetahuan Geriatri	1	34	62	1	97
	2	19	31	7	57
	3	1	4	3	8
Total		54	97	11	162

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,190 ^a	4	,000
Likelihood Ratio	16,928	4	,002
Linear-by-Linear Association	6,931	1	,008
N of Valid Cases	162		

ALAUDDIN
M A K A S S A R



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Andi Arwini Puspitasari akrab dipanggil Wini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Andi Pallawarukka dan Ibu almh. Nurhawaisyah. Lahir di Makassar, 15 Maret 1999. Beralamatkan di BTN Minasa Upa Blok G 18/6, RT. 005, RW. 006, kel. Minasa Upa, kec. Rappocini, Makassar. Memulai pendidikan di TK. Sulawesi pada usia pada 4 tahun (2004). Pada tahun 2005 melanjutkan pendidikannya di SD Inpres Minasa Upa dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Model Makassar mulai dari tahun 2011-2014, kemudian lanjut di MAN 2 Model Makassar dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikannya di UIN Alauddin Makassar dengan mengambil Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Berkat usaha serta doa yang terus menerus dipanjatkan, Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Diharapkan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara, keluarga, teman-teman serta semua pihak yang telah memberikan doa serta dukungan baik secara materi maupun moril sehingga penulis bias mencapai tahap ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR