

**ANALISIS PROFIL ABSORPSI DAN PENAMBATAN MOLEKULER
SENYAWA KURKUMIN SEBAGAI INHIBITOR NF-KB UNTUK
KADIDAT OBAT ANTI KANKER PAYUDARA SECARA IN SILICO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

ENDANG ADILLAH

70100117017

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2022**

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endang Adillah
NIM : 70100117017
Tempat/Tgl.Lahir : Berare/11 Juli 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : H. M. Yasin Limpo Samata, Gowa
Judul : “Analisis Absorpsi dan Penambatan Molekuler Senyawa Kurkumin Sebagai Inhibitor NF-Kb Untuk Kadidat Obat Anti Kanker Payudara Secara *In-Silico*”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R
Samata, 09 Agustus 2022

Endang adillah

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Absorpsi dan Penambatan Molekuler Senyawa Kurkumin Sebagai Inhibitor NF-Kb Untuk Kandidat Obat Anti Kanker Payudara Secara *In Silico*" yang disusun hasil oleh Endang Adillah, NIM: 70100117017, Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2022 yang bertepatan pada 11 Muharram 1444 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gawa, 09 Agustus 2022
11 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syarifah, Sp. A., M. Kes
Sekretaris	: Dwi Wahyuni Leboe, S. Si., M. Si
Pembimbing I	: apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M. Si
Pembimbing II	: apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si
Penguji I	: Haerita, S. Si., M. Si
Penguji II	: Dr. Hj. Rosmiaty Azis, M. Pd. I



Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syarifah, Sp. A., M. Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. tuhan semesta alam atas rahmat-Nya penulis dapat memulai dan menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan dalam meraih gelar S. Farm. Dan tidak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada nabi junjungan kita Muhammad saw serta para sahabatnya yang telah berkerja keras mencurahkan hidupnya sampai titik darah penghabisan untuk menyampaikan islam sehingga dapat tersampaikan kepada kita. Terima kasih kepada para ulama dan ilmuwan muslim yang mendedikasikan hidupnya untuk islam sehingga masyarakat muslim selalu dapat berjalan di jalan yang lurus dengan arahan yang jelas. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta Saifuddin dan Ibunda tercinta Suhada yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan selalu memberi saran serta nasehat yang baik. Dan terimakasih kepada Bapak Syafruddin Tandring Agani yang selalu mendukung dalam menuntut ilmu.

Skripsi yang berjudul “Analisis Absorpsi dan Penambatan Molekuler Senyawa Kurkumin Sebagai Inhibitor NF-Kb Untuk Kadidat Obat Anti Kanker Payudara Secara *In Silico*” dalam proses pengerjaannya peneliti memiliki banyak kekurangan , hambatan, serta berbagai macam hal yang tak terduga. Banyak pelajaran yang didapatkan dalam pengerjaan sampai penyelesain skripsi ini. Skripsi ini tidak akan mencapai titik ini tanpa rahmat dan izin dari Allah swt.

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti dan teman-teman mahasiswa lainnya untuk lebih memahami “Analisis Absorpsi dan

Penambatan Molekuler Senyawa Kurkumin Sebagai Inhibitor NF-Kb Untuk Kadidat Obat Anti Kanker Payudara Secara *In Silico*". Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan diharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai kalangan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar, sekaligus sebagai pembimbing II dan pembimbing akademik yang telah mendampingi dari masih menjadi mahasiswa baru hingga sekarang serta terima kasih telah meluangkan waktunya membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Haeria, S.Si., M.Si, selaku penguji kompetensi yang telah memberikan masukan serta kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Rosmiati azis, M.Pd.I, selaku penguji agama yang telah memberikan masukan serta kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan staf Jurusan Farmasi yang telah memberikan ilmunya dan bantuan kepada peneliti.
11. Kak Risman Rifalsi S. Si dan kak Sahrul Gunawan S.Si yang telah membagi ilmunya serta berkontribusi dalam penelitian ini. Dan kak Sabilla Suryaning Amanda yang telah memberikan banyak informasi dalam proses pengerjaan skripsi.
12. Keluarga besar tercinta yang ada di Sumbawa yang selalu senantiasa memberikan dukungan kepada penulis,
13. Sahabat dan teman terkasih saya lis Andri Mulyani, Sahri Raini , Egidia Djuti Safitri, Yusi Safitri, Fadilla Dwi Yanti Sabri, Rakhmi Khasanah, Nurul Muamanah Amal, yang telah membantu penulis atas motivasinya.

14. Teman Farmasi angkatan 2017 “KOVALEN” atas segala kebersamaan, semangat, dan bantuannya selama ini baik dibangku kuliah, lab dan skripsi.
15. Dan kepada semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan panulisan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan penelitian-penelitian selanjutnya khusus di bidang farmasi. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah swt. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata, 09 Agustus 2022

Penyusun



Endang Adillah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
F. Kajian Pustaka.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TEORI UMUM	10
A. Senyawa Kurkumin	10
B. Kanker Payudara.....	14
C. Protein NF-kB.....	17
D. Simulasi <i>Molecular Docking</i> (Penambanatan Molekuler)	19
E. Perancang Penunjang.....	21

F. Tinjauan Umum Jenis Interaksi Antara Reseptor dengan Ligan	24
G. <i>Lipinski Rule Of Five</i> (ROF)	35
H. Kerangka Berpikir	39
I. Tinjauan Islam Tentang Penyakit	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis, waktu dan lokasi penelitian	45
B. Pendekatan penelitian	44
C. Variabel Penelitian	45
D. Instrumen Penelitian	46
E. Teknik pengolahan dan analisis data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas Kurkumin	10
Tabel 2. Hasil <i>Binding Affinity</i> PyRx.....	54
Tabel 3. Keterangan Visualisasi PyMOL.....	55
Tabel 4. Hasil <i>Lipinski Rules Of Five</i>	56




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ikatan Hidrogen	28
Gambar 2. Interaksi Ionik antara Asetilkolin dengan Molekul Reseptor.....	30
Gambar 3. Interaksi Dipol-Dipol dan Ion-Dipol Asetilkolin-Reseptor	31
Gambar 4. Pembentukan Ikatan Hidrofobik.....	32
Gambar 5. Interaksi Van der Waals	32
Gambar 6. Struktur 3D Protein NF-K β dengan Kode (2DBF)	51
Gambar 7. wwPDB Validation Protein NF-K β dengan Kode	51
Gambar 8. Struktur Makromolekul Nuclear Factor Kappa Beta (2DBF)	52
Gambar 9. Ligan Uji Kurkumin	53
Gambar 10. Ligan Uji Kurkumin Penampakan <i>Space-Filling</i>	53
Gambar 11. Interaksi Ligan-Reseptor 3D Visualisasi <i>Discovery Studio</i>	54
Gambar 12. Interaksi Ligan-Reseptor 2D Visualisasi <i>Discovery Studio</i>	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Preparasi Ligan	67
Lampiran 2. Preparasi Protein.....	68
Lampiran 3. Penambatan	69
Lampiran 4. PyMOL.....	70
Lampiran 5. Visualisasi <i>Discovery Studio</i>	71
Lampiran 6. RMSD.....	72
Lampiran 7. Lipinski Rules Of Five	73



ABSTRAK

Nama : Endang Adillah
NIM : 70100117017
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : Analisis absorpsi Dan Penambatan Molekuler Senyawa Kurkumin Sebagai Inhibitor NF-Kb Untuk Kadidat Obat Anti Kanker Payudara Secara *In Silico*

Kurkumin (diferuloylmethane) merupakan komponen bioaktif dari metabolit sekunder yang memberi warna kuning pada spesies *Curcuma*, serta menunjukkan aktivitas dan potensi terapeutik yang hebat, termasuk aktivitasnya sebagai antikanker. Penambatan molekuler docking ligan senyawa kurkumin dan protein NF-Kb untuk mengetahui nilai *Lipinski rule of five* untuk menggambarkan senyawa tersebut dapat menembus membran sel secara difusi pasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah senyawa kurkumin dapat dijadikan obat kanker payudara.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *in silico* dengan molekuler docking (penambatan molekul) yang menggunakan beberapa program berupa Autodock Vina (PyRx), Yasara, PyMol, dan Discovery Studio 2019 serta menambatkan ligan kurkumin yang berpotensi sebagai inhibitor NF-Kb. Nilai ΔG_{bind} terbaik dari hasil *docking* dengan protein target *Nuclear Factor Kappa Beta* (2DBF) yaitu -6.2 kkal/mol. Dari ligan potensial tersebut dilakukan uji *Lipinski rule of five* untuk mengetahui sifat absorpsi dari senyawa dalam tubuh. Hasil *Lipinski rule of five* berat molekul 368 g/mol, donor ikatan hidrogen 2, akseptor ikatan hidrogen 6, Log P 3.369898, dan refraksi molar 102.016571. Kurkumin memenuhi syarat Lipinski sehingga berpotensi untuk di rujuk sebagai obat kanker payudara.

Kata kunci : Kurkumin, NF-Kb, Kanker Payudara, *In silico*.



ABSTRACT

Nama : Endang Adillah
NIM : 70100117017
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : *Analysis Of Absorption And Molecular Docking Of curcumin Compounds As Inhibitor Of NF-Kb For In Silico Anti-Breast Cancer Drug*

Curcumin (diferuloylmethane) is a bioactive component of secondary metabolites that gives Curcuma species their yellow hue. It has a lot of medicinal potential, including anticancer properties. Molecular docking of curcumin ligands and the NF-Kb protein, as well as understanding the Lipinski rule of five to describe these molecules, can allow them to move across cell membranes via passive diffusion. The goal of this research is to see if curcumin molecules may be employed as breast cancer treatments. The in silico method with molecular docking was used, as well as tethering curcumin ligands that have the potential to be NF-Kb inhibitors, using several programs such as Autodock Vina (PyRx), Yasara, PyMol, and Discovery Studio 2019, as well as tethering curcumin ligands that have the potential to be NF-Kb inhibitors. Gbind had the greatest value of -6.2 kcal/mol when docked with the target protein Nuclear Factor Kappa Beta (2DBF). The Lipinski rule of five test was used to determine the absorption qualities of substances in the body using these potential ligands. Lipinski rule of five molecular weight 368 g/mol 500 g/mol, hydrogen bond donor 2 5, hydrogen bond acceptor 6 10, Log P 3.369898 > 5, and molar refraction 102.016571 in the 40-130 range. Curcumin satisfies Lipinski's criteria and hence has the potential to be classified as a drug.

Keywords: Lipinski, Curcumin, NF-Kb, In Silico, Breast Cancer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kanker meningkat dari tahun ke tahun dan terjadi hampir terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, berdasarkan angka morbiditas dan mortalitas akibat kanker yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka prevalensi tumor/kanker di Indonesia meningkat dari 1,4 per 1 juta jiwa pada 2013 menjadi 1,79 per 1 juta jiwa pada 2018 (Badan Litbang Kesehatan, 2018).

Data yang dirilis *Global Burden Of Cancer (GLOBOCAN)*, *World Health Organization (WHO)* menyebutkan 14,87 per 100.000 kasus kanker diseluruh dunia dengan kasus kematian mencapai 9,38 per 100.000 dan prevalensi kasus 5 tahun kebelakang mencapai 345,9 per 100.000. Diperkirakan pada tahun 2030 jumlah kematian akibat kanker akan terus meningkat (Pangribowo, 2019).

Kanker merupakan istilah umum yang digunakan untuk sekelompok besar penyakit pada manusia yang ditandai dengan munculnya sel-sel abnormal di dalam tubuh dengan pertumbuhan yang tidak terkendali kemudian mempengaruhi sel-sel sehat dan menyerang organ tubuh lainnya. Dari semua kasus kanker yang terjadi, kanker payudara menempati urutan pertama diseluruh dunia menurut data GLOBOCAN 2020 dan menempati urutan kedua kasus kematian akibat kanker di seluruh dunia.

Kanker payudara masuk dalam urutan ke 23 di Asia dan menjadi urutan ke-8 di Asia Tenggara, dengan kasus sebesar 42,1 per 100 penduduk (Kemenkes, 2019). Kanker payudara merupakan penyebab kematian tertinggi kedua dari kasus kanker di Indonesia, sekitar 60-80% ditemukan pada stadium lanjut dan berakibat fatal (Kemenkes, 2015).

Kanker payudara merupakan sekelompok sel abnormal pada bagian payudara dan semakin meningkat yang menyebabkan benjolan di payudara. Kanker payudara hampir seluruhnya terjadi pada wanita tetapi dapat juga terjadi pada pria. Penyakit ini menjadi pusat perhatian dunia karena penyebabnya belum bisa dipastikan dan sifatnya yang multifaktorial. Salah satu parameter kanker dapat dilihat dengan memperhatikan aktivasi NF-Kb-nya.

Aktivasi *Nuclear Factor Kappa Beta* menjadi suatu parameter apoptosis kanker yang menyebabkan beberapa fungsi selular seperti preferasi sel meningkat dan penurunan apoptosis. NF-Kb termasuk kunci atau hal yang diperlukan dalam transkripsi sel yang bertindak sebagai *integrator* utama pada respon inflamasi pada penyakit maligna dan non maligna. NF-Kb merupakan molekul protein yang terletak pada sitoplasma sel dalam bentuk in-aktif dan terikat dalam sel. Molekul ini akan meregulasi inflamasi, respon imunitas, penyembuhan luka serta apoptosis dalam sel (Supriono et al., 2019).

Beberapa penelitian telah mencoba mempelajari senyawa yang digunakan sebagai agen yang dapat menghambat NF-Kb pada pasien kanker payudara. Salah satu senyawa yang diketahui mempunyai potensi anti kanker adalah kurkumin. Senyawa kurkumin memiliki aktivitas farmakologi yang luas dan secara tradisional telah dimanfaatkan sebagai penyembuhan berbagai macam penyakit termasuk kanker dan anti inflamasi (Ariani, 2021).

Kurkumin (*diferuloylmethane*) merupakan komponen bioaktif dari metabolit sekunder yang memberi warna kuning pada spesies *Curcuma*, *Zingiberaceae* serta menunjukkan aktivitas dan potensi terapeutik yang hebat, termasuk aktivitasnya sebagai antiinflamasi, antioksidan biologi, antikarsinogenik, antimutagenik, antikoagulan, antifertilitas, antidiabetik, antibakteri, antifungi, antiprotozoa, antiviral, antifibrosis, antivenom, antiulcer,

hipotensi, dan hipokolesterolemia. Kurkumin telah banyak mengalami modifikasi agar didapatkan senyawa stabil yang memiliki aktivitas spesifik terhadap protein target (Kusbiantoro, 2018). Modifikasi senyawa ini termasuk dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komputasi yang merupakan metode awal dalam mendesain dan menemukan obat baru.

In silico merupakan salah satu metode komputasi yang digunakan untuk mencari senyawa yang dapat dijadikan sebagai kandidat obat. Penggunaan metode ini mempunyai banyak keuntungan antara lain yaitu mengurangi jumlah hewan coba yang digunakan saat percobaan serta metode ini juga merupakan pengganti dari penelitian *in vivo* dan *in vitro* karena dapat menghemat biaya dan waktu penelitian. Dalam penentuan struktur senyawa kandidat obat terhadap targetnya dalam bentuk visualisasi menggunakan metode *molecular docking* (Mirza, 2019).

Molecular docking adalah metode yang digunakan untuk mencari pola hubungan yang paling tepat antara molekul ligan dan reseptor. Saat ini penelitian dengan memakai metode komputasi sangat krusial dibanyak aspek penelitian di bidang biologi dan medis. Salah satu manfaat asal penggunaan metode ini yaitu dapat dicermati pada berbagai proses penemuan serta pembuatan obat (Widodo et al., 2018)

Molecular docking (penambatan molekuler) merupakan suatu metode berbasis komputasi yang digunakan untuk mencari pola interaksi yang melibatkan dua molekul yaitu reseptor dan ligan. Hasil dari analisis penambatan molekuler akan memperlihatkan nilai kekuatan interaksi senyawa terhadap struktur protein, serta digunakan sebagai tahap awal untuk memastikan suatu metode atau manfaat suatu senyawa yang masih tidak biasa dilakukan secara konvensional.

Dari uraian tersebut diharapkan dari penelitian ini dapat memberi hasil terhadap potensi senyawa kurkumin dalam menghambat NF-KB untuk penanganan kanker payudara.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah senyawa kurkumin dapat dijadikan kandidat obat untuk mengatasi penyakit kanker payudara?
2. Bagaimana absorpsi kurkumin di dalam tubuh setelah melakukan penambatan secara *in silico*?

C. Hipotesis

Senyawa kurkumin sebagai inhibitor terhadap NF-kB (*Nuclear Factor Kappa Beta*) mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara serta membantu apoptosis sel kanker payudara.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui apakah senyawa kurkumin dapat dijadikan kandidat obat untuk mengatasi penyakit kanker payudara.
2. Mengetahui absorpsi kurkumin di dalam tubuh setelah melakukan penambatan secara *in silico*.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a) Ligan sendiri merupakan molekul sinyal kecil yang terlibat dalam kedua proses anorganik dan biokimia. Ligan merupakan zat yang memiliki satu atau lebih pasangan electron bebas dan merupakan molekul sederhana yang dalam senyawa kompleks bertindak sebagai donor pasangan elektron (basa Lewis) (Setiawan & Irawan, 2017).
- b) Protein merupakan biomolekul yang paling banyak dan paling bervariasi di dalam sel (Suhartono, 2017).

- c) NF-Kb (Nuclear Faktor Kalfa Beta) adalah famili dari faktor transkripsi dan merupakan suatu bentuk protein dalam sitoplasma sel dan bentuk in-aktif yang berfungsi dalam mengatur inflamsi, respon imun, serta kematian dan fungsi sel (Supriono et al., 2019).
- d) Senyawa kurkumin merupakan senyawa polifenol yang terdapat pada rimpang kunyit berupa pigmen berwarna kuning. Kandungan polifenol ini menunjukkan bahwa kurkumin dapat mencegah dan mengobati kanker (Sianipar et al., 2018).
- e) In silico merupakan simulasi yang dilakukan di komputer dengan pendekatan perkembangan teknologi dan informasi database yang tersedia (Khaerunnisa et al., 2020).
- f) Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan adanya jaringan yang tumbuh secara tidak terkontrol (Fristiohady et al., 2020).
- g) Kanker payudara merupakan tumor ganas yang menyerang jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar susu, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara (Rastini et al., 2019).
- h) RMSD (*Root Mean Square Deviation*) merupakan nilai validasi program *docking* yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses penambatan. Nilai RMSD dikatakan baik jika nilai yang ditunjukkan $\leq 200\text{\AA}$.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah analisis senyawa kurkumin yang berfungsi sebagai inhibitor pada NF-kB sebagai penghambat sel kanker payudara dan apaptosis sel kanker payudara.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian (Arwansyah et al., 2014) dengan judul Simulasi *Docking* Senyawa Kurkumin dan Analognya sebagai Inhibitor Reseptor Androgen pada Kanker Prostat. Ligan uji yang digunakan adalah kurkumin beserta

analognya dan bikalutamida sebagai ligan pembanding, bikalutamida merupakan obat komersial yang digunakan dalam pengobatan kanker prostat karena kemampuannya untuk menghambat aktivitas reseptor androgen. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dan analognya berpotensi sebagai inhibitor bagi aktivitas reseptor androgen dalam pengobatan kanker prostat.

Berdasarkan penelitian (Fristiohady et al., 2020) dengan judul *Peran factor Transkripsi Nuclear Factor Kappa-Light-Chain-Enhancer Of Activated B Cells (NF-kB) Terhadap Sel Kanker Payudara*. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode studi pustaka, baik yang berasal dari pustaka primer maupun sekunder. Hasil yang didapat memaparkan bahwa NF-kB memiliki fungsi dalam respon seluler terhadap berbagai rangsangan seperti stres, sitokin, dan lainnya. NF-kB berperan sebagai penanda respon imun terhadap infeksi baik itu virus, iradiasi UV, bakteri, bahkan LDL yang telah teroksidasi. Over ekspresi dan down regulasi dari NF-kB memiliki hubungan dengan mekanisme terjadinya kanker payudara. Sehingga diharapkan pengembangan suatu inhibitor terhadap NF-kB yang dapat digunakan sebagai terapi baru terhadap kanker payudara.

Berdasarkan penelitian (Murwanti et al., 2020) dengan judul *Effect of curcumin on NF-kB P105/50 expression on triple-negative breast cancer (TNBC) and its possible mechanism of action* membuktikan bahwa kurkumin merupakan pigmen kuning yang diisolasi dari kunyit, telah dilaporkan menekan NF-kB. Beberapa penelitian melaporkan bahwa kurkumin menghambat NF-kB melalui penghambatan fosforilasi IKK dan penghambatan translokasi ke nukleus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kurkumin terhadap NF-kB p105 pada sel kanker payudara 4T1. Bahan yang digunakan berupa senyawa (1,7-bis-(4hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiena-3,5-dione) yang kemudian akan dilarutkan dalam DMSO untuk studi lebih lanjut. *Study docking* menggunakan

MOE-Dock pada mesin yang memiliki *workstation Pentium* 1.6GHz, memori 512MB menggunakan sistem operasi *windows*. Kultur yang digunakan yaitu sel kanker payudara 4T1 yang dimasukkan ke dalam inkubator suhu 37°C 1*24 jam. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kurkumin secara selektif menghambat ekspresi NF-kB p105 mRNA pada sel kanker payudara 4T1 dengan berinteraksi dengan tulang punggung Ile residu dibawah domain RH.

Berdasarkan penelitian (Elengoe & Devi Sundramoorthy, 2020) yang berjudul “*Molecular Docking Of Curcumin With Breast Cancer Cell Line Protein*” yang mana tujuan penelitian ini dimana struktur 3D caspase 3, yang bertempat di mukosa adhesi sel 1 (MADCAM1) dan factor nuklir subunit NF-Kappa-p105 (payudara protein garis sel kanker) dibuat dan diinteraksikan pengikatan antara protein dan kurkumin melalui pendekatan molekuler docking. Protein yang digunakan ini dibuat dengan Swiss model dan di lihat pada perangkat lunak PyMOL. Karakter fisik dan kimia proteinnya dianalisis dengan server *Exspasy's ProtParam Preteomic*. Dan struktur sekunder protein dianalisis dengan server SOPMA (*Self Optimized Prediction Methode From Alignment*). Dan dievaluasi dengan analisis PROCECK, ProQ, ERRAT dan Verify3D. Teruntuk protein kanker payudara di rapatkan dengan kurkumin menggunakan server BSP-Slim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurkumin memiliki *binding energy* dengan caspase 3 yang terletak pada mukosa dalam adhesi sel molekul 1 dan faktor nuklir subunit NF-Kappa-B-p105. Dimana faktor inti subunit NF-Kappa-B-p105 memiliki ikatan yang paling kuat dengan kurkumin. Sehingga kurkumin dapat menjadi obat potensial untuk kanker payudara.

Berdasarkan penelitian (Pushpalatha et al., 2017) dengan judul “*Comparative insilico Docking Analysis of Curcumin and Resveratrol on Breast*

Cancer Proteins and their Synergistic Effect on MCF-7 Cell Line”, dimana penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aktivitas molekuler kurkumin dan resveratrol pada reseptor protein kanker payudara dan untuk menyelidiki kombinasinya sinergis untuk melawan sel kanker payudara menggunakan MCF-7 *line cell*. Kurkumin dan resveratrol sebagai sasaran pada proses pengerjaan menggunakan studi *docking in silico* menggunakan glide untuk menginvestigasi aktivitas obat melawan HER2, human estrogen reseptor, ERBB2, faktor pertumbuhan epidermal protein tirosin kinase C-SRC, dan protein HSP90. Pengujian MTT digunakan untuk menilai viabilitas sel kurkumin dan resveratrol secara individual dalam rasio kombinasi 1:1, 1:3 dan 3:1. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini sesuai perkiraan dimana *glid score* dan *glide energy* untuk obat ini baik untuk melawan protein kanker payudara, kurkumin dan resvetrol memiliki afinitas yang lebih mengikat untuk protein dengan berbagai macam asam amino.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi upaya penanganan terhadap penyakit kanker payudara dalam keilmuan dan penelitian lebih lanjut mengenai inhibitor kurkumin terhadap NF-kB dalam menghambat sel kanker payudara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang penghambatan inhibitor kurkumin terhadap NF-kB pada sel kanker payudara.

- b. Bagi bidang kesehatan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan menambah informasi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam pengobatan pada pasien kanker payudara.




BAB II

TEORI UMUM

A. Senyawa Kurkumin

Tabel 1. Identitas Kurkumin (PubChem, 2022)

Nama IUPAC	(1 <i>E</i> ,6 <i>E</i>)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
ID PubChem	969516
SMILE Code	COC1
Berat Molekul	368,4 g/mol
Struktur 2 Dimensi	 <p>(Song et al., 2019)</p>
Rumus Molekul	C ₁₂ H ₁₆ O ₆

Kurkumin pertama kali diperkenalkan oleh Vogel dan Pelletier pada tahun 1815 dan diisolasi pada tahun 1870, kemudian struktur kimia kurkumin sepenuhnya ditentukan oleh Lempe (Goot, 1995). Kurkumin merupakan golongan fenolik yang terkandung dalam jahe. Tiga kurkuminoid yang telah diisolasi adalah *Curcumin* (C), *Curcumin detoksifikasi* (DMC), dan *Bisdemethoxy curcumin* (BDMC). Ketiganya berkontribusi terhadap warna kuning rimpang tanaman kunyit. *Tetrahydro curcumin* (THC) yang dihasilkan dari proses hidrogenase memiliki sifat tidak berwarna, sehingga sering digunakan sebagai bahan kosmetik (Ariani, 2021).

Kurkumin adalah bahan alami yang dikenal aktif secara biologis, hadir dalam rimpang kunyit (*Curcumincuma longa* Val) dan temulawak (*Curcumincuma xanthoriza* Robx), kurkumin banyak digunakan sebagai obat tradisional di Asia di Indonesia. Kurkumin merupakan komponen utama dari kunyit. Kurkumin memiliki berbagai aktivitas biologis, seperti anti jamur, anti diabetes, anti oksidan, anti inflamasi dan antibakteri (Ariani, 2021).

Kurkumin adalah senyawa polifenol yang berasal dari keluarga *Curcuma* yang berperan dalam proses peradangan, pertumbuhan sel dan apoptosis. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa kurkumin adalah penghambat NF-Kb yang sangat potensial. Adanya inhibisi sinyal NF-Kb meningkatkan apoptosis miofibrolas hati melalui hambatan ekspresi JNK (c-Jun N-terminal kinase) sehingga terjadi regresi fibrosis. Ketika proses regresi diinduksi oleh kurkumin, maka akan semakin menurunkan ekspresi dari NF-Kb sehingga menurunkan survival dari aHSC (*activated hepatic stellate cell*) (Supriono et al., 2019).

Kurkumin atau *diferuloylmethane* dengan rumus kimia (*1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksipenil)-1,6-heptadiena-3,5-dion*). Kurkumin merupakan agen anti-angiogenik yang potensial dan menginduksi proses apoptosis pada sel tumor sehingga terjadi supresi kanker. Banyak penelitian telah menunjukkan aktivitas antitumor kurkumin pada kanker prostat, kepala dan karsinoma sel skuamosa leher, kanker paru-paru, kanker payudara, dan tumor otak. Fungsi antikanker kurkumin melibatkan penghambatan jalur NF-Kb dan STAT3, mekanisme molekuler utama dalam perkembangan dan perkembangan kanker. Kurkumin juga memberikan aktivitas antiproliferatif yang memiliki jalur yang berbeda, seperti *forkhead box O3* (FOXO3), *-catenin*, *cyclooxygenase-2* (COX-2), serta faktor transkripsi, termasuk cyclin D1, protein kinase B (Akt), dan HIF-1a (Ghasemi et al., 2019).

Kurkumin (*diferuloylmethane*), komponen aktif dari rempah kunyit (*Curcuma longa*), memiliki sifat kemo-preventif dan terapeutik terhadap banyak tumor baik in vitro dan in vivo. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin menginduksi apoptosis lebih kuat pada sel kanker daripada sel normal dan menghubungkan efeknya dengan penghambatan angiogenesis, sintase oksida nitrat, reseptor tirosin kinase dan aktivitas protein kinase C, dan regulasi faktor

transkripsi gen tertentu, seperti c-Jun/AP-1, JNK, faktor inti B, dan P53. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kurkumin menghambat proliferasi sel dan menginduksi apoptosis sel pada kanker paru-paru melalui modulasi jalur lisosom dan jalur pensinyalan mitokondria yang bergantung pada spesies oksigen reaktif. Selanjutnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin secara signifikan menghambat invasi dan metastasis tumor. Baru-baru ini, beberapa penelitian menemukan bahwa kurkumin menekan *doxorubicin* atau LPS menginduksi EMT pada kanker payudara dan menjelaskan peran jalur pensinyalan TGF- β /PI3K/Akt dan NF-Kb-Snail dalam proses ini. Selain itu, kurkumin terbukti menghambat proliferasi sel endotel vaskular in vitro dan pembentukan tabung kapiler in vivo. Studi-studi ini menunjukkan bahwa aktivitas kemopreventif ampuh kurkumin mungkin sebagian berasal dari penghambatan langsung angiogenesis dan EMT (Jiao et al., 2016).

Kurkumin adalah antioksidan kuat dan telah ditemukan bahwa kurkumin dapat langsung mengais berbagai radikal bebas, seperti oksigen reaktif dan spesies nitrogen (ROS dan RNS, masing-masing), menghambat enzim penghasil ROS seperti *lipoygenase/cyclooxygenase* dan *xanthine dehidrogenase/oxidase*, dan meningkatkan enzim pertahanan antioksidan seperti *superoksida dismutase* dan glutathione peroksidase. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak studi praklinis dan klinis mendukung gagasan bahwa kurkumin memiliki potensi besar untuk pencegahan dan terapi berbagai kanker, dan aktivitas antikankernya terbukti terkait dengan banyak faktor (Shen & Ji, 2012).

Induksi apoptosis kurkumin dapat mengaktifkan reaksi redoks dalam sel yang menginduksi produksi *reactive oxygen species* (ROS). Menunjuk pada peningkatan regulasi reseptor apoptosis di membran sel tumor. Kurkumin juga bisa menaikkan ekspresi serta kegiatan p53 yang merusak proliferasi sel tumor

serta mempertinggi apoptosis. Selain itu, kurkumin memiliki pengaruh penghambatan yang bertenaga pada kegiatan NF-kB serta COX-2 yang terlibat dalam ekspresi gen anti apoptosis Bcl-2 sebagai akibatnya bisa memicu terjadinya apoptosis (Mortezaee et al., 2019).

Kurkumin memiliki aktivitas yang rendah dalam tubuh akibat adanya metabolisme, oleh karena itu dilakukan modifikasi terhadap struktur kurkumin untuk memperoleh senyawa yang lebih poten, stabil, aman, efektif, dan memiliki aktivitas yang lebih baik. Beberapa modifikasi senyawa kurkumin telah diteliti dan akan digunakan sebagai sampel penelitian yaitu struktur 2,6-*dibenzilidenesikloheksanon*, struktur 2,5-*dibenzildienasiklopentanon*, struktur 1,5-*difenil-1,4-pentadien-3-on* telah disintesis oleh (Sardjiman et al. 1997). Struktur 1,7-bis(R-fenil)-1,6-heptadien-3,5-dion yang disintesis oleh (Nurfina et al. 1997). Penelitian untuk mengetahui afinitas senyawa modifikasi kurkumin dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara *in silico* dengan metode *molecular docking* dengan memanfaatkan informasi dari struktur dan sifat fisikokimia protein target untuk memprediksi sisi aktif protein yang dapat menimbulkan aktivitas biologis (Mulatsari et al., 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurkumin menghambat ekspresi NF-kB dan oleh karena itu jalur pensinyalan hilir tambahan, yang pada akhirnya mengarah pada pembungkaman sitokin inflamasi, termasuk ligan *chemokine* (motif CXC) (CXCL) 1 dan CXCL2; dan perubahan ekspresi MMP-9, urokinase plasminogen activator (uPA), reseptor uPA, molekul adhesi antar sel 1 dan reseptor *chemokine*. Dengan cara ini, kurkumin cenderung menghambat pertumbuhan dan invasi kanker payudara, sebagian, dengan menurunkan regulasi jalur pensinyalan NF-kB. Kurkumin dapat memodulasi ekspresi gen target NF-kB, yang meliputi Bcl-2, *Ornithine*

Decarboxylase (ODC) dan *c-myc*, yang terkait dengan apoptosis atau kelangsungan hidup sel. Misalnya, ODC adalah enzim pembatas laju dalam biosintesis poliamina dan kurkumin telah ditunjukkan untuk menekan aktivitas ODC dan menghambat proliferasi sel. Aktivasi jalur NF- κ B / Bcl-2 dikaitkan dengan resistensi obat dalam sel kanker. Mengumpulkan bukti menunjukkan bahwa menargetkan NF- κ B untuk menghambat pertumbuhan sel dan membalikkan EMT mungkin merupakan strategi terapi baru pada kanker payudara (Song et al., 2019).

B. Kanker Payudara

Kanker adalah penyakit yang ditandai adanya jaringan yang tumbuh dengan sangat cepat dan sangat invasif sehingga dapat menyebabkan kematian (Fristiohady et al., 2020). Menurut National Cancer Institute atau NCI (2015) menyebutkan bahwa kanker termasuk istilah umum untuk satu kelompok besar penyakit pada manusia yang ditandai dengan munculnya sel-sel abnormal dalam tubuh yang melampaui batas.

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, terutama di negara berkembang. World Health Organization (WHO) melaporkan sekitar 7,6 juta (13%) orang meninggal akibat kanker pada tahun 2008. Apabila tidak dilakukan penanganan lebih lanjut terhadap penyakit ini, WHO memperkirakan bahwa kematian akibat kanker akan terus meningkat hingga 13,1 juta orang pada tahun 2030. Kanker yang merupakan akibat dari adanya abnormalitas pembelahan (proliferasi) sel yang dapat menginvasi jaringan lain dan menyebar ke organ lainnya, bahkan dapat menimbulkan kematian. Pada sel tumor, proliferasi yang sangat cepat disebabkan oleh adanya ekspresi berlebih dari protein NF- κ B.

Kanker payudara adalah tumor ganas yang dapat menyerang jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar susu (kelenjar yang membuat air susu), saluran kelenjar (saluran air susu), dan jaringan penunjang payudara. Kanker payudara menyebabkan sel dan jaringan payudara berubah bentuk menjadi abnormal dan bertambah banyak secara tidak terkendali (Rastini et al., 2019).

Faktor resiko didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi peluang seseorang terkena penyakit. Faktor risiko utama tertentu untuk kanker payudara berada di luar kendali individu. Berikut beberapa predisposisi genetik sebagai faktor penting kanker payudara (Feng et al., 2018):

a. Gender

Menjadi seorang wanita merupakan faktor risiko utama kanker payudara karena penyakit ini sekitar 100 kali lebih mungkin terjadi pada wanita daripada pria.

b. Penuan

Penuaan pasti meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa sebagian besar kanker payudara didiagnosis pada wanita berusia 55 tahun ke atas.

c. Genetik

Risiko seorang wanita terkena kanker payudara meningkat dua kali lipat apabila memiliki kerabat tingkat pertama (ibu, saudara perempuan, atau anak perempuan) didiagnosis menderita kanker payudara. Hampir 15% wanita AS menderita kanker payudara dan rata-rata memiliki anggota keluarga yang telah didiagnosis kanker payudara.

d. Mutasi gen

Secara keseluruhan, sekitar 5-10% dari kanker payudara terkait dengan mutasi gen yang diwarisi orang tua. Penyebab paling umum dari kanker payudara

herediter adalah mutasi gen bawaan pada BRCA1 atau BRCA2. BRCA (*Breast Cancer Gene*) yang secara umum memiliki tugas memperbaiki kerusakan DNA penyebab kanker dan pertumbuhan tumor. Oleh karena itu, bila terjadi mutasi gen pada BRCA maka kemampuan tubuh untuk menekan terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium menurun. Secara statistik, wanita dengan BRCA1 mutasi memiliki 55-65% risiko seumur hidup terkena kanker payudara. Untuk wanita dengan BRCA2 mutasi, risiko seumur hidup adalah 45%. Rata-rata, seorang wanita dengan BRCA1 atau BRCA2 mutasi gen memiliki sekitar 70% kemungkinan terkena kanker payudara pada usia 80 tahun. Efek dari mutasi terkait dengan berapa banyak anggota keluarga lain yang menderita kanker payudara, karena risiko kanker payudara meningkat jika lebih banyak anggota keluarga yang terkena.

Di Amerika, BRCA mutasi lebih sering terjadi pada orang Yahudi asal Ashkenazi (Eropa Timur) daripada di kelompok ras dan etnis lain meskipun siapa pun dapat memiliki mutasi ini. Wanita dengan salah satu dari dua mutasi ini juga lebih mungkin didiagnosis menderita kanker payudara pada usia yang lebih muda, serta memiliki kanker di kedua payudara. Dampak dari BRCA1 dan BRCA 2 mutasi berkembang lebih dari sekadar kanker payudara karena mutasi pada salah satu dari gen ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker ovarium juga. Sebaliknya, BRCA1 mutasi ditemukan lebih jarang terjadi pada pria dan BRCA2 mutasi dikaitkan dengan risiko kanker payudara seumur hidup dengan persentase sekitar 6,8%.

Wanita bule sedikit lebih mungkin terkena kanker payudara daripada perempuan *American-African* meskipun kanker payudara sering terjadi pada perempuan *American-African* pada usia dibawah 45 tahun. Dan ras lain seperti

Asia, Hispanik dan wanita asli amerika memiliki risiko rendah terkena dan meninggal akibat kanker payudara.

C. *Protein NF-kB*

Nuclear Factor Kappa B (NF-Kb) adalah suatu bentuk protein di dalam sitoplasma sel yang terikat dalam bentuk inaktif yang berfungsi mengatur inflamasi, respons imun, penyembuhan luka, serta kematian dan fungsi sel. Aktivasi NF-Kb di dalam HSC (*Human Sitoplasma Cell*) mengakibatkan HSC menjadi aktif dan meningkatkan survival dari aHSC (Supriono et al., 2019).

NF-Kb adalah famili faktor transkripsi dengan berbagai peran, termasuk menginduksi pertahanan sel, proliferasi, dan memainkan peran dalam regulasi sistem kekebalan dan peradangan. Aktivasi NF-Kb pada sel normal akan mengaktifkan beberapa gen yang terlibat dalam penghambatan kematian sel melalui jalur mitokondria dan reseptor kematian (Ratnasari et al., 2016).

NF-Kb ada di sitoplasma dalam bentuk tidak aktif sampai dirangsang, dianggap sebagai faktor transkripsi respons pertama karena tidak memerlukan aktivasi sintetik. Setelah stimulasi, NF-Kb mentranslokasi ke nukleus, memicu ekspresi gen tertentu yang menghambat apoptosis sel dan mendorong proliferasi dan metastasis. *Nuclear Factor Kappa Beta* (NF-Kb) merupakan faktor transkripsi yang dapat mengatur banyak gen yang berhubungan dengan pertumbuhan, inflamasi, kanker dan apoptosis (Abdurrahman, 2019).

NF-Kb terdiri dari lima family yaitu Rel (c-Rel), Rel A (p65), Rel B, NF-kB1 (p50) dan NF-kB2 (p52), berbagai domain umum yang disebut *Rel homology domain* (RMD) dan bentuk aktif faktor transkripsi melalui homo dan heterodimerisasi yang mampu mengikat DNA pada urutan promotor spesifik. Protein p50 dan p52 berasal dari protein yang lebih besar, masing-masing p105 dan p100, melalui pasca translasi. Kontrol aktivasi transkripsi NF-Kb adalah hasilnya

aktivasi jalur transduksi sinyal. Misalnya, satu jalur pensinyalan yang dipelajari dengan baik mengaktifkan transkripsi gen yang dikendalikan. NF-Kb adalah jalur tumor nekrosis factor (TNF). “Dimer NF-Kb” yang tidak aktif ditahan dalam kompleks dengan inhibitor KB (IKB) dalam sitosol sel yang tidak distimulasi. Setelah stimulasi dengan TNF degradasi proteosomal berikutnya dari IKB dan pelepasan translokasi NF-Kb yang aktif secara transkripsi ke inti sel. Kumpulan gen apa yang di transkripsi secara aktif tergantung bentuk dimer NF-Kb mana yang aktif (Xu & Russu, 2013).

Salah satu protein yang terlibat dalam penghancuran apoptosis adalah jalur aktivasi NF-Kb. NF-Kb menginduksi ekspresi inhibitor apoptosis (IAP) dan beberapa anggota keluarga Bcl2 anti-apoptosis. NF-Kb juga dapat mengganggu aktivitas transkripsi p53 dengan meningkatkan gen anti-apoptosis dan menghambat p53, sehingga menghambat proses apoptosis sel yang diinduksi oleh p53. Selain itu, NF-kB mendorong kemajuan siklus sel dengan mengatur gen terkait siklus sel, seperti cyclin D1, D2, D3 dan cyclin E, c-myc dan c-mycb. Selain itu, NF-kB mendorong kemajuan siklus sel dengan mengatur gen terkait siklus sel, seperti cyclin D1, D2, D3 dan cyclin E, c-myc dan c-mycb. NF-Kb diyakini terkait dengan aktivitas pRb melalui cyclin D1. Mekanisme anti-apoptosis NF-Kb mengedepankan konsep umum bahwa aktivasi NFB berperan dalam resistensi apoptosis (Ratnasari et al., 2016).

Aktivasi NF-Kb dapat dihambat secara langsung atau tidak langsung strategi langsung melibatkan inhibitor yang berinteraksi dengan satu atau lebih protein keluarga NF-Kb untuk mencegah fungsinya. Inhibitor ini dapat mencegah dimerisasi anggota keluarga NF-Kb atau mencegah pengikatan denah titik strategi tidak langsung melibatkan penghambatan molekul yang mempengaruhi fungsi NF-Kb (Xu & Russu, 2013).

NF-Kb adalah keluarga faktor transkripsi yang terlibat dalam respon imun dan peradangan. Studi profil ekspresi gen menunjukkan bahwa jalur NF-Kb adalah pengatur kunci dalam *Triple Negative Breast Cancer* (TNBC), dengan aktivasi pensinyalan NF-kB sangat terlibat dalam patogenesis TNBC tertentu. NF-Kb sitoplasma terikat pada sekelompok protein penghambat yang dikenal sebagai penghambat NF-Kb (I κ B); akumulasi I κ B nonterfosforilasi melarang translokasi NF-kB dari sitoplasma ke nukleus, mengakibatkan inaktivasi NF-kB dan target hilirnya. NF-kB mempromosikan transkripsi dari banyak regulator kunci dari invasi dan perkembangan kanker, termasuk sitokin, kemokin, molekul adhesi sel dan enzim pro- inflamasi yang dapat diinduksi (Song et al., 2019).

D. Simulasi Molecular Docking (Penambatan Molekuler)

In silico adalah suatu istilah yang menggambarkan simulasi yang dilakukan di komputer. Di Los Alamos, New Mexico pada tahun 1989 istilah *in silico* telah digunakan pada workshop dengan judul *Cellular automata: Theory and Application*. Penggunaan *in silico* dapat berkontribusi dalam penanganan penyakit baru dan pengembangan suatu obat (Khaerunnisa et al., 2020).

In silico adalah salah satu metode yang merupakan kemajuan dari studi imun informatika yang memprediksi molekul baru serta fungsinya. Metode ini membantu memilih molekul yang lebih baik sebelum dilakukan pengujian secara *in vitro* atau kondisi *in vivo*. Metode ini dilakukan untuk mendesain, memprediksi sifat stabilitas fisika kimia dan mengoptimalkan ekspresi dari host (Dana et al., 2020).

In silico merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari senyawa yang dapat dijadikan sebagai kandidat obat. Penggunaan metode studi *in silico* ini memiliki banyak keuntungan diantaranya yaitu mengurangi jumlah hewan coba yang digunakan dan dibutuhkan pada saat percobaan serta dapat

mengetahui mekanisme senyawa kandidat obat terhadap targetnya dalam bentuk visualisasi (Mirza, 2019). Metode ini mengambil peranan penting dalam katalisis homogen. *In silico* membantu dalam menafsirkan hasil penelitian, menafsirkan interaksi pada obat dan target reseptor serta memprediksi aktivitas katalitik dan selektivitas. Metode ini juga digunakan untuk membuat visualisasi dari molekul sederhana tiga dimensi (3D) yang dapat dengan mudah dilakukan atau bahkan digabungkan dengan *real time* (Foscato & Jensen, 2020).

Penambatan molekuler adalah metode berbasis struktur *in silico* yang banyak digunakan dalam obat-obatan penemuan. Penambatan memungkinkan identifikasi senyawa baru dari minat terapeutik, memprediksi interaksi ligan-target pada tingkat molekuler, atau menggambarkan hubungan struktur-aktivitas (SAR), tanpa mengetahui apriori struktur kimia dari modulator target lainnya. Meskipun awalnya dikembangkan untuk membantu memahami mekanisme pengenalan molekul antara kecil dan molekul besar, penggunaan dan aplikasi *docking* dalam penemuan obat telah banyak berubah selama tahun-tahun terakhir. Berdasarkan ulasan tersebut penambatan molekuler pertama kali diterapkan untuk membantu penemuan obat, termasuk prediksi efek samping, polifarmakologi, penggunaan kembali obat dan profil target yang di tunjang oleh perangkat lunak (Pinzi & Rastelli, 2019).

Penambatan molekuler merupakan salah satu metode *in silico* berbasis struktur yang paling populer dan sukses, yang membantu memprediksi interaksi yang terjadi antara molekul dan target biologis. Proses ini umumnya dicapai dengan terlebih dahulu memprediksi orientasi molekuler dalam reseptor, dan kemudian memperkirakan untuk saling melengkapi melalui penggunaan fungsi penilaian. Metode berbasis struktur yang bergantung pada informasi yang diperoleh dari pengetahuan tentang struktur 3D target yang diminati dan

memungkinkan peringkat database molekul sesuai dengan struktur dan komplementaritas elektronik ligan ke target tertentu (Pradani et al., 2021).

Molecular docking merupakan suatu metode simulasi untuk mengetahui interaksi antara ligan terhadap reseptor. Proses *molecular docking* terbagi atas dua jenis, yaitu *blind docking* dan *oriented docking*. *Oriented docking* adalah proses docking yang telah diketahui letak sisi aktif dari reseptor, sedangkan *blind docking* adalah proses docking yang dilakukan tanpa mengetahui letak sisi aktif atau tempat penambatan dari reseptor (Pradani et al., 2021).

Molecular docking digunakan untuk mencari pola interaksi yang paling tepat antara molekul ligan dan reseptor. (Widodo et al., 2018). Kelebihan dari *molecular docking* diantaranya untuk mendalami struktur suatu protein secara detail dalam mengidentifikasi, mempelajari, dan memetakan struktur semua protein yang ada di dalam tubuh suatu organisme adalah hampir mustahil untuk dilakukan. Dalam bidang farmasi perkembangan obat terbaru diperoleh melalui berbagai rangkaian proses yang efisien untuk menghasilkan senyawa obat dan memerlukan waktu yang sangat lama. menggunakan metode *molecular docking* ini dapat mempercepat proses pengembangan suatu obat dan mampu untuk mengidentifikasi identitas kimianya (Widodo et al, 2018).

E. Perangkat Penunjang

Piranti lunak yang digunakan dalam penelitian penambatan molekuler diantaranya antara lain:

1. PyRx

PyRx adalah piranti lunak tertambah (add on) screening virtual yang dapat digunakan untuk screening pustaka senyawa. PyRx memungkinkan pengguna untuk menjalankan screening virtual dalam berbagai platform dan membantu penggunaanya dalam setiap tahap proses. Proses yang dapat dilakukan

menggunakan piranti lunak ini mencakup preparasi data ligand an makromolekul, melakukan kalkulasi serta analisis hasil. PyRx dikembangkan oleh molecular Graphics Laboratory, The Scripps Research Institute (Dallakyan, 2010).

2. YASARA

YASARA “*Yet Another Scientific Artificial Reality Application*” adalah program molekuler-grafik, modeling dan simulasi untuk windows, Linux, MacOS, serta android yang dikembangkan sejak 1993. YASARA didukung oleh PVL (*Portable Vector Language*), kerangka kerja pengembangan baru yang memberikan kinerja jauh diatas perangkat lunak tradisonal. PVL memyngkinkan untuk memvisualisasikan bahkan protein terbesar dan memungkinkan simulasi real-time interactive yang sebenarnya dengan gaya sangat akurat pada PC standar (Yasara, 2018).

YASARA digunakan untuk mempreparasi struktur protein yang berformat .pdb. Preparasi struktur menggunakan YASARA dilakukan untuk memisahkan residu dan ligan alami yang terdapat pada file .pdb, sehingga hanya menyisakan struktur protein murni (reseptor) beserta pocket cavity-nya untuk memudahkan dalam pencarian binding site dari protein pada prosedur simulasi (Rachmania et al., 2018). Setelah reseptor selesai dipreparasi, reseptor tersebut disimpan dengan format pdbqt (Sari et al, 2020).

3. PyMOL dan *Discovery Studio*

Visualisasi dan analisis interaksi hasil penambatan dilakukan untuk melihat hasil penambatan antara ligan pembanding dan ligan uji yang digunakan. Hasil visualisasi ini berupa interaksi residu asam amino dengan ligan. Adanya interaksi asam amino yang terlibat memungkinkan adanya kontak antara ligan dengan reseptor sehingga memiliki aktivitas penghambatan (Sari et al, 2020).

Pymol dan *Discovery studio visualizer* digunakan untuk memvisualisasikan hasil penambatan. Pymol digunakan untuk RMSD perhitungan, sementara *Discovery Studio Visualizer* digunakan untuk menganalisis interaksi antarmolekul dalam ruang dua dimensi (Docking, 2020).

Discovery Studio adalah perangkat lunak offline yang menyediakan informasi rangkaian ilmu alam diantaranya untuk visualisasi protein, ligan, dan *pharmacophore modeling* (B. G. Samy & Xavier, 2015). Perangkat lunak ini merupakan sebuah *tool* yang dapat digunakan menganalisis secara 2D jenis ikatan dan molekul protein reseptor dan ligan yang saling berinteraksi. Analisis ini umumnya disebut analisis *pharmacophore*. Analisis interaksi molekul ini menjadi sangat penting untuk mengetahui ikatan ligan yang dapat mempengaruhi aktivitas reseptor (Widodo et al., 2018).

PyMOL adalah sistem visualisasi molekuler yang dibuat oleh Warren Lyford DeLano, disponsori pengguna pada fondasi sumber terbuka, dikelola dan didistribusikan oleh Schrodinger yang dapat tersedia untuk digunakan pada *windows EXE Installer*, *Windows ZIP Archive*, *macOS DMG Disk Image* dan *Linux*. PyMOL menggunakan OpenGL Extension Wrangler Library (GLEW) dan FreeGLUT dan dapat menyelesaikan Poisson-Boltzmann menggunakan adaptif Poisson Boltzmann Solver. PyMOL menggunakan Tk untuk widget GUI dan memiliki binary aqua asli untuk MacOS melalui Schrodinger, yang diganti dengan antarmuka pengguna PyQt di semua platform yang di rilis versi 2.0 dan sekarang PyMOL sudah memiliki versi 2.5 (Pymol, 2021).

PyMOL merupakan suatu *Free and open source program* yang digunakan sebagai visualisasi molekuler untuk struktur kimia tiga dimensi seperti struktur kristal hasil sinar X dari protein, asam nukleat (DNA, RNA, tRNA), karbohidrat, struktur senyawa kecil dari obat ataupun inhibitor, metabolit dan nukleotida

fosfat. PyMOL juga bermanfaat untuk penggambaran molekuler seperti ikatan kimia, permukaan molekul dan bentuk caroon ribbon dari biomolekul. PyMOL dijalankan dengan menggunakan bahasa pemrograman Pyhthon. Berkas dengan format PDB (Protein Data Bank), PQR, MOL, SDF, MOL2, XPLOR, CCP4, DSN6, DX, TRJ, DCD, XCT dan GRID dapat dibaca oleh PyMOL. Selain itu PyMOL juga dapat membaca berkas pemodelan molekuler yang dihasilkan oleh MOE (*Moleculer Operating Enviroment*) (Ahmad Najib et al. 2019).

PyMOL adalah program yang paling sering digunakan untuk menghasilkan gambar kualitas publikasi struktur molekul dan menawarkan beberapa opsi rendering lanjutan. Selain itu, ia menyediakan fungsionalitas tampilan 3D yang luar biasa yang dapat sangat berguna dalam desain obat berbasis struktur. Karena PyMOL mendukung beberapa format file yang umum digunakan untuk peta kerapatan elektron PyMOL juga merupakan alat yang disukai untuk kristalografer (Seeliger et al., 2010). Kelebihan PyMOL yaitu dapat digunakan pada berbagai system operasi, menggunakan perintah dalam bahasa yang umum, dapat melakukan pemilihan atom, pemotongan dan penyambungan molekul serta mengubah konformasi, mempunyai berbagai jenis tampilan untuk visualisasi dengan efek tertentu dan program ini dapat terus dikembangkan (Ahmad Najib et al. 2019)

F. Tinjauan Umum Jenis Interaksi Antara Reseptor dengan Ligan

Protein merupakan molekul yang memiliki banyak fungsi vital terutama dalam segala proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Beberapa contoh fungsi protein adalah untuk reaksi katalisis, sebagai transporter untuk proses keluar masuknya senyawa kimia pada sel. Protein yang tidak adekuat dapat mempengaruhi proses yang terjadi dalam tubuh sebab protein memiliki fungsi sebagai enzim, pengatur pergerakan, pengatur sistem imun sehingga tubuh akan

lebih mudah untuk terserang penyakit. Protein juga terlibat dalam kondisi patologis seperti penyakit kanker, tekanan darah tinggi dan diabetes (Yuswadinata & Wathoni, 2021).

Protein tersusun atas asam amino yang saling berhubungan membentuk ikatan peptida. Asam amino tersusun oleh unsur hydrogen (H), karbon (C), nitrogen (N) dan oksigen (O). Di dalam asam amino terdapat gugus α -karboksil, α -amino serta gugus R yang melekat pada gugus α -karbon. Urutan asam amino yang menyusun rantai protein akan menentukan fungsi dan karakteristik spesifik protein yang dibentuknya. Protein terbentuk dari berbagai bentuk struktur. Dimana terdapat empat bentuk struktur protein antara lain (Yuswadinata & Wathoni, 2021):

1. Struktur Primer
2. Struktur Sekunder
3. Struktur Tersier
4. Struktur Kuartener

Struktur primer, sekunder dan tersier akan membentuk rantai tunggal polipeptida. Selain itu, peptida terbentuk dari susunan 3-70 asam amino. Struktur kuartener akan membentuk molekul protein yang kompleks dan berantai banyak melalui interaksi beberapa polipeptida. Jumlah asam amino, panjang rantai dan perbedaan struktur inilah yang membedakan peptida dan protein (Yuswadinata & Wathoni, 2021).

Asam amino yang menyusun peptida dan protein dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu asam amino hidrofobik dan asam amino hidrofilik. Sifat ini diatur oleh rantai samping yang menyusun asam amino. Kelarutan protein dalam air berbeda-beda, ada yang mudah larut dan ada yang sukar larut. Semua protein tidak bisa larut dalam pelarut organik yaitu kloroform, eter dan benzene. Protein merupakan

molekul yang cukup mudah dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia sehingga mudah untuk mengalami denaturasi. Apabila protein telah terdenaturasi maka kelarutan dan aktivitas biologinya akan berubah. Penambahan garam pada suatu larutan yang mengandung protein dapat menyebabkan protein mengendap. Pemberian alkohol atau pemanasan juga akan menyebabkan protein menggumpal (Yuswadinata & Wathoni, 2021).

Selain sifatnya yang termolabil, protein juga bersifat amfoter. Pada pH rendah, gugus amino akan bereaksi dengan ion H^+ sehingga protein akan bermuatan positif. Pada kondisi pH tinggi, gugus karboksilat akan bereaksi dengan ion OH^- dan menyebabkan protein bermuatan negative (Yuswadinata & Wathoni, 2021).

Reseptor merupakan suatu protein spesifik yang terdapat dalam tubuh yang akan berinteraksi dengan obat atau metabolit obat. Reseptor merupakan tempat molekul obat berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon disebut agonis. Selain itu senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tapi tidak dapat menimbulkan respons dinamakan antagonis. Sedangkan senyawa yang mempunyai aktivitas diantara dua kelompok tersebut dinamakan antagonis parsial. Pada suatu kejadian dimana tidak semua reseptor diduduki atau berinteraksi dengan agonis untuk menghasilkan respons maksimum, sehingga seolah-olah terdapat kelebihan reseptor, kejadian ini dinamakan reseptor cadangan merupakan komponen spesifik sel yang jika berinteraksi dengan agonis atau obat akan menghasilkan efek (Basuki & Melinda, 2017).

Ion atau molekul yang terikat pada atom/ion pusat dalam entitas koordinasi disebut ligan, seperti ion sederhana Cl^- , molekul kecil seperti H_2O atau NH_3 ,

molekul yang lebih besar seperti $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ atau $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_3$ atau bahkan makromolekul, seperti protein (Bhatt & Ram, 2015).

Ketika ligan terikat pada ion logam melalui donor tunggal atom, seperti Cl^- , H_2O atau NH_3 , ligan dikatakan unidentate. Ketika ligan dapat mengikat melalui dua atom donor seperti pada $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ (etana-1,2-diamin) atau $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ (oksalat), ligan dikatakan didentat dan ketika beberapa atom donor hadir dalam ligan tunggal seperti pada $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_3$, ligan tersebut dikatakan menjadi polidentat (Bhatt & Ram, 2015).

Pada umumnya, ikatan obat-reseptor bersifat reversibel sehingga obat segera meninggalkan reseptor bila kadar obat dalam cairan luar sel menurun. Ikatan yang terlibat pada interaksi obat-reseptor harus relatif lemah tetapi masih cukup kuat untuk berkompetisi dengan ikatan lainnya. Tipe ikatan kimia yang terlibat dalam interaksi obat reseptor antara lain adalah ikatan-ikatan kovalen, ion-ion yang saling memperkuat (*reinforce ions*), ion (elektrostatik), hidrogen, dan lain-lain. Tetapi, pada umumnya merupakan campuran berbagai ikatan di atas. Suatu zat obat atau ligan dapat mengenali reseptornya dengan tepat karena hanya obat dengan bentuk molekul tertentu saja yang dapat berikatan dengan reseptor seperti kunci dengan gemboknya (*key and lock*) (Basuki & Melinda, 2017).

Berikut beberapa ikatan kimia untuk mengetahui kestabilan suatu ikatan:


1. Ikatan Hidrogen

Ikatan hidrogen (*hydrogen bond*) adalah jenis interaksi dipol-dipol antara hidrogen dalam ikatan polar, seperti $\text{N}-\text{H}$, $\text{O}-\text{H}$, atau $\text{F}-\text{H}$ dengan atom elektronegatif O, N atau F. Dimana interaksi ditulis:



A dan B mewakili O, N atau F, $\text{A}-\text{H}$ mewakili satu molekul atau bagian dari molekul dan B merupakan bagian dari molekul lain, garis titik-titik mewakili

ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen memiliki energy rata-rata cukup besar untuk satu interaksi dipol-dipol (hingga 40 kJ/mol). Jadi, ikatan hidrogen merupakan suatu gaya yang kuat dalam menentukan struktur dan sifat-sifat dari banyak senyawa. Berikut beberapa contoh ikatan kimia yang ditunjukkan oleh gambar 1. (Chang, 2004).



Gambar 1. Ikatan Hidrogen

Ikatan hidrogen merupakan salah satu jenis interaksi dipol-dipol yang terbentuk antara suatu proton dari gugus X-H (X merupakan suatu atom elektronegatif) dengan atom elektronegatif lain (Y) yang mempunyai pasangan elektron bebas. Ikatan hidrogen dalam suatu molekul yang terbentuk signifikan jika X dan Y adalah N, O, atau F. X menarik kerapatan elektron dari hidrogen sehingga hidrogen bermuatan parsial positif. Hidrogen yang bermuatan parsial positif akan ditarik dengan kuat oleh pasangan elektron bebas yang terdapat pada atom Y. Interaksi yang terjadi digambarkan dengan titik-titik, —X—H---Y— untuk menunjukkan bahwa ikatan kovalen antara X dengan H masih ada, tetapi interaksi antara H dengan Y juga terjadi. Jika X dan Y mempunyai elektronegatifitas dan derajat ionisasi equivalent maka proton dapat dibagi sama diantara dua gugus —X---H--- Y— (Siswandono & Soekardjo, 2017).

Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang unik karena hanya atom hidrogen yang dapat mengemban muatan positif pada pH fisiologis sembari masih terikat secara kovalen dalam molekul dan atom hidrogen merupakan atom yang cukup kecil untuk berdekatan dengan atom elektronegatif kedua. Kekuatan ikatan hidrogen berhubungan dengan konstanta Hammet σ . Ikatan hidrogen mempunyai nilai $\Delta G^\circ = -1$ sampai -7 Kkal/mol tetapi biasanya berada pada rentang -3 sampai -7 Kkal/mol. Ada dua macam ikatan hidrogen yaitu ikatan hidrogen intramolekuler (ikatan hidrogen yang terjadi dalam satu molekul) dan ikatan hidrogen intermolekuler (ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul). Ikatan hidrogen intramolekuler lebih kuat dibanding ikatan hidrogen intermolekuler. Ikatan hidrogen cukup penting untuk aktivitas biologis karena dapat mempengaruhi sifat-sifat fisika dan kimia senyawa, seperti titik didih, titik lebur, kelarutan dalam air, kemampuan pebentukan kelat dan keasaman (Siswandono & Soekardjo, 2017).


2. Ikatan Kovalen

Ikatan kovalen merupakan ikatan yang paling kuat. Secara umum mempunyai nilai stabilitas -40 sampai -110 Kkal/mol. Ikatan kovalen jarang terlibat dalam pembentukan ikatan antara obat dengan reseptor, kecuali dengan enzim dan DNA (Siswandono & Soekardjo, 2017).

3. Interaksi Ionik (elektrostatik)

Obat dan reseptor akan saling tarik-menarik (berinteraksi) karena adanya muatan yang berlawanan. Interaksi ionik berlangsung secara efektif pada jarak yang lebih jauh dari pada yang dipersyaratkan untuk tipe interaksi yang lain dan interaksi ini berlangsung lebih lama. Ikatan Pi-kation dan Pi-anion termasuk dalam ikatan elektrostatik atau paling umum dikenal dengan jembatan garam (Hamid et al., 2021) Suatu interaksi ionik yang sederhana mempunyai nilai $\Delta G^\circ =$

-5 Kkal/mol. Bila interaksi ionik diperkuat oleh interaksi lain yang secara simultan terjadi maka interaksi ionik menjadi lebih kuat ($\Delta G^{\circ} = -10$ Kkal/mol) dan berlangsung lebih lama. Contoh interaksi ionik ini adalah interaksi antara molekul asetilkolin dengan molekul reseptor yang dapat dilihat pada gambar 2. dibawah ini (Siswandono & Soekardjo, 2017).




Gambar 2. Interaksi ionik antara asetilkolin dengan molekul reseptor

4. Interaksi ion-dipol dan dipol-dipol

Sifat elektronegatifitas dari atom-atom seperti oksigen, nitrogen, sulfur, dan halogen yang lebih besar dibandingkan elektronegatifitas dari atom karbon akan berpengaruh terhadap ikatan obat dengan reseptor. Ikatan C-X (X adalah atom-atom elektronegatif) yang terdapat pada obat maupun yang terdapat pada reseptor akan mengakibatkan distribusi elektron yang tidak simetris. Hal ini akan menghasilkan suatu dipol elektronik. Suatu dipol yang terbentuk di dalam molekul obat dapat berinteraksi dengan ion (interaksi ion-dipol) atau dipol lain (interaksi dipol-dipol) yang bermuatan berlawanan yang terdapat pada reseptor (Siswandono & Soekardjo, 2017).

Muatan pada suatu dipol lebih lemah dibanding dengan muatan pada suatu ion. Oleh karena itu, interaksi dipol-dipol lebih lemah dari pada interaksi ion-dipol. Pada gambar dibawah dapat dilihat contoh interaksi dipol-dipol maupun


interaksi ion-dipol pada asetilkolin yang mempunyai harga $\Delta G^0 = -1$ sampai -7 Kkal/mol (Siswandono & Soekardjo, 2017).



Gambar 3. Interaksi Dipol-Dipol dan Ion-Dipol Antara Asetilkolin dengan Reseptor

5. Interaksi Hidrofobik


Bila ada dua buah gugus nonpolar seperti gugus lipofilik pada suatu obat dan gugus non polar pada reseptor yang masing-masing dikelilingi oleh molekul air, saling mendekat satu dengan yang lain maka molekul air ini akan menjadi kacau dalam usaha untuk bergabung dengan molekul air yang lain. Peningkatan kekacauan molekul air akan meningkatkan entropi yang berakibat pada menurunnya energi bebas yang menstabilkan kompleks obat-reseptor. Stabilisasi yang dilakukan untuk menjaga stabilitas kompleks obat-reseptor akibat menurunnya energi bebas kompleks obat-reseptor disebut dengan interaksi hidrofobik. Interaksi ini bukan merupakan gaya atraktif dari dua gugus nonpolar "yang larut" satu dengan yang lainnya tetapi lebih merupakan kompensasi dari turunya energi bebas gugus nonpolar karena meningkatnya entropi dari molekul air yang mengelilinginya (Siswandono & Soekardjo, 2017).



Gambar 4. Pembentukan Ikatan Hidropobik

6. Gaya Van der Waals atau London

Atom-atom pada molekul nonpolar secara temporal mempunyai distribusi kerapatan elektron nonsimetris yang merupakan akibat dari pembentukan dipol sementara. Ketika atom dari molekul lain (seperti molekul obat atau reseptor) saling mendekat, dipol sementara dari suatu molekul menginduksi dipol yang berlawanan dari molekul yang mendekat. Akibatnya terjadi suatu antaraksi intermolekul yang dikenal dengan gaya Van der Waals. Gaya Van der Waals menjadi signifikan ketika terjadi kontak permukaan (pada jarak yang dekat) dari atom-atom. Bagaimanapun juga ketika ada molekul-molekul yang komplemen mengakibatkan terjadinya sejumlah interaksi atom (masing-masing memberikan kontribusi ΔG^0 -0,5 Kkal/mol) yang mana bisa menambah secara signifikan ikatan obat-reseptor secara keseluruhan (Siswandono & Soekardjo, 2017).



Gambar 5. Interaksi Van der Waals

Berdasarkan jenis ligannya, penambatan molekuler dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis ligannya, yaitu (Widodo et al., 2018):

1. Protein-protein *docking* (protein reseptor dengan protein ligan)

Protein-protein *docking* adalah salah satu cabang dari metode *molecular docking* yang melibatkan dua protein berbeda yang mana ukuran keduanya relatif tidak jauh berbeda (sama). Pada umumnya, permukaan bagian protein reseptor yang berfungsi sebagai lokasi *docking* (*docking site*) cenderung lebih datar (planar) dibandingkan dengan protein reseptor yang berfungsi sebagai lokasi *docking* yang melibatkan protein ligan dengan ligan yang berukuran kecil (*small molecule*). Kondisi (*docking* terjadi di permukaan protein reseptor yang cenderung datar) relatif umum ditemukan pada kompleks *docking* yang melibatkan protein dengan protein lainnya. Namun, untuk beberapa kasus yang relatif sangat jarang terjadi pernah ditemukan sebuah kompleks *docking* yang melibatkan dua protein berbeda dan lokasi *docking* pada kompleks ini berada didalam salah satu rongga dipermukaan protein reseptor.

2. Protein-ligan *docking*

Protein-ligan *docking* adalah salah satu cabang dari metode *molecular docking* yang melibatkan sebuah molekul berukuran kecil (ligan). Metode protein-ligan *docking* sangat sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan senyawa kandidat obat baru maupun memodifikasi senyawa obat yang sudah ada dengan tujuan agar efikasinya semakin meningkat atau

untuk meminimalisir efek samping yang bisa ditimbulkan oleh senyawa obat tersebut. Pada metode ini dikenal istilah *lock and key* yang mana artinya selama proses docking berlangsung, ligan diposisikan didalam rongga yang terdapat pada permukaan protein reseptor.

Yang termasuk kedalam klasifikasi protein-ligan yaitu:

- a. Protein *small molecule docking* (protein reseptor dengan molekul kecil)
- b. Protein-DNA/RNA *docking* (protein reseptor dengan asam nukleat)

Berdasarkan fleksibilitas molekul pada penambatan molekuler dibedakan berdasarkan jenis ligan, metode *molecular docking* dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu (Widodo et al., 2018):

1. Rigid Docking

Rigid *docking* adalah salah satu cabang dari metode *molecular docking* yang memposisikan molekul yang akan dipasangkan (di-*docking*-kan) sebagai objek yang bersifat rigid. Rigid diartikan sebagai suatu kondisi dimana kedua molekul dikondisikan untuk tetap (tidak mengalami perubahan konformasi) selama proses docking sedang berlangsung.

2. Semi-Flexible Docking

Semi-Flexible docking adalah satu cabang dari *molecular docking* yang memperlakukan dua molekul yang akan dipasangkan secara berbeda (asimetris). Salah satu molekul (biasanya molekul yang berukuran lebih kecil; ligan) diperlakukan sebagai molekul yang fleksibel sedangkan molekul yang berukuran lebih besar atau protein reseptor diperlakukan sebagai molekul rigid.

3. Flexible Docking

Flexible docking adalah salah satu cabang dari metode molekuler *docking* yang memperlakukan dua molekul yang akan dipasangkan sebagai molekul yang fleksibel, meskipun pada aplikasinya fleksibilitas salah satu atau kedua molekul

yang akan di-*docking* relatif dibatasi (telah disederhanakan). Selain itu, metode fleksibel *docking* juga dapat dilakukan melalui metode simulasi dinamika molekuler.

G. Lipinski Rule Of Five (ROF)

Untuk memajukan penemuan dan pengembangan obat baru, upaya besar sedang dilakukan untuk mengevaluasi sifat 'seperti obat' yang serupa dari molekul pada tahap awal proses penemuan-penelitian. Ada pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah ini, tetapi pendekatan yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dikembangkan oleh Chris Lipinski dan rekan-rekannya di Pfizer, yang umumnya disebut sebagai Aturan Lipinski atau Aturan Lima (ROF) (Petit et al., 2012).

Aturan Lipinski pada dasarnya menjelaskan tentang sifat senyawa yang aktif secara oral dan paramater yang digunakan dalam menentukan sifat fisikokimianya. Aturan Lipinski bertujuan untuk mengevaluasi suatu senyawa kimia yang memiliki aktivitas farmakologi yang dapat aktif jika diberikan secara oral pada manusia. Senyawa/Ligan dianggap memiliki sifat fisikokimia yang baik jika memenuhi aturan Lipinski sehingga senyawa tersebut dapat dianggap memiliki potensi masuk kedalam sel dan diserap oleh tubuh (Zubair et al., 2020).

Untuk mengetahui apakah senyawa mampu menembus membran biologis dan mempunyai permeabilitas yang baik, senyawa harus memenuhi hukum lima dari Lipinski (Lipinski, 1997). Kelarutan dan permeabilitas dari suatu senyawa berperan penting dalam mempertimbangkan pengembangan obat lebih lanjut (Kelutur et al., 2020). Hal ini dilakukan untuk mencegah kegagalan dari suatu obat yang disebabkan oleh rendahnya absorpsi atau permeasi. Berdasarkan kaidah Lipinski dalam pengembangan dan penemuan

suatu kandidat bahan obat yang digunakan secara oral, maka harus memenuhi lima syarat yang dikenal dengan *Rule of Five* (Kelutur et al., 2020). Untuk parameter sifat kimia-fisika yang ditentukan adalah nilai log koefisien partisi oktanol-air (logP), dan Calculated logP (ClogP) yang mempresentasikan sifat lipofilik, Molar Refractivity (MR) dan Calculated MR (CMR), yang mempresentasikan sifat sterik, dan berat molekul (BM) (Saifuddin A, Siswandono, 2014). Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ligan berdasarkan aturan Lipinski adalah berat molekul < 500 Da, nilai LogP < 5, ikatan hidrogen donor < 5, ikatan hidrogen akseptor < 10 dan molar refractivity antara 40-130 (Adriani, 2018). *Lipinski rule of five* tidak berlaku untuk obat antibiotic, antifungi, vitamin dan glikosida jantung (*cardiac glycosides*).

a. Massa molekul

Berat molekul merupakan variabel yang teristimewa penting sebab berhubungan langsung dengan sifat kimia polimer. Umumnya polimer dengan berat molekul tinggi mempunyai sifat yang lebih kuat. Banyak sekali bahan polimer yang tergantung pada massa molekulnya (Habiba et al., 2013). Ligan dengan berat molekul < 500 Da lebih mudah menembus membran sel dibandingkan ligan yang berat molekulnya > 500 Da (Adriani, 2018).

b. Donor ikatan hydrogen dan Akseptor ikatan hydrogen

Selain berat molekul tinggi dan lipofilisitas, sejumlah besar gugus donor ikatan hidrogen dalam suatu senyawa dapat mengurangi kemampuan molekul untuk menembus lapisan ganda membran. Senyawa yang memiliki sejumlah besar donor ikatan hidrogen akan berpartisipasi menjadi pelarut ikatan hidrogen yang kuat (seperti air) daripada ke dalam lingkungan lipofilik yang ada dalam membran seluler. Kemampuan ikatan

hidrogen gugus fungsi dalam suatu molekul dapat diukur dengan perhitungan sederhana ikatan NH dan OH dalam suatu molekul (Dong et al., 2012).

Untuk alasan yang sama bahwa donor ikatan hidrogen mengurangi permeabilitas senyawa ke dalam lingkungan lipofilik, akseptor ikatan hidrogen mempengaruhi permeabilitas dengan berinteraksi secara baik dengan pelarut ikatan hidrogen yang kuat seperti air. Sekali lagi, sementara parameter ikatan hidrogen dapat dihitung, Lipinski dan rekan kerja mengamati bahwa hanya menjumlahkan jumlah atom nitrogen dan oksigen dalam molekul berfungsi sebagai pengganti yang baik untuk berkorelasi dengan bioavailabilitas oral (Dong et al., 2012). Jumlah ikatan hidrogen pada donor dan akseptor berkorelasi dengan aktivitas biologi suatu ligan/obat (Adriani, 2018).

c. Log P (log koefisien partisi oktanol-air)

Nilai logP berkaitan dengan polaritas ligan dalam pelarut lemak, minyak maupun pelarut non polar. Ligan dengan nilai log P > 5 akan berinteraksi lebih mudah menembus lapisan lipid bilayer pada membran sel dan terdistribusi luas di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan sensitifitas ikatan ligan terhadap molekul target berkurang dan toksisitas ligan meningkat. Semakin kecil nilai log P maka ligan cenderung larut dalam air dan bersifat hidrofilik. Nilai Log P ligan tidak boleh terlalu negatif karena tidak dapat melewati membran lipid bilayer (Adriani, 2018).

Koefisiensi partisi dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu molekul dalam menembus membran biologis yang bersifat seperti halnya lapisan lemak. Hal ini karena sebagian besar membran biologis terdiri dari lipid. Obat-obat yang mudah larut dalam lipid akan mudah

diabsorpsi, sedangkan obat yang tidak mudah larut dalam lemak akan sulit untuk diabsorpsi. Obat yang memiliki kelarutan lipid yang besar maka mempunyai koefisien partisi yang besar lemak dibanding kelarutan dalam air. Semakin tinggi nilai log p maka semakin mudah obat dapat terabsorpsi di dalam tubuh.

Nilai Log P dalam aturan Lipinski ditetapkan dengan rentang ≤ 5 , dimana ligan tidak boleh terlalu negatif karena tidak dapat melewati membran lipid bilayer (Hidrofilik) dan tidak boleh terlalu positif karena semakin hidrofobik molekul tersebut. Sifat yang hidrofobik menandakan tingkat toksisitas tinggi karena akan tertahan lama pada lipid bilayer dan terdistribusi lebih luas didalam tubuh menyebabkan selektivitas ikatan enzim target menjadi berkurang (Naconha, 2021).

d. *Molar Refractivity* (MR)

Molar refractivity merupakan suatu ukuran nilai total polarisabilitas dari molekul obat yang sangat bergantung pada suhu, indeks bias, dan tekanan. Refraksi molar adalah sifat aditif-konstitutif yang dihitung dengan rumus Lorenz-Lorentz:


$$MR = \frac{\eta^2 - 1}{\eta^2 + 2} = \frac{M}{\rho}$$

Di mana M adalah berat molekul, n adalah indeks bias (refraction index) dan ρ adalah kerapatan (density), dan nilainya hanya bergantung pada garis bujur gelombang cahaya yang digunakan untuk mengukur indeks bias. Untuk radiasi dengan panjang gelombang tak terhingga, refraksi molar mewakili volume sebenarnya dari molekul. Refraksi molar berhubungan, tidak hanya dengan volume molekul tetapi juga dengan gaya dispersi London yang bekerja dalam interaksi

obat-reseptor. Nilai refraktivitas molar menurut aturan lipinski yaitu 40-130 (Padrón & Carrasco, 2002).



H. Kerangka Pikir



I. Tinjauan Islam Tentang Penyakit

Ibnu Sina mengemukakan bahwa pengobatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu teori dan praktik. Pengobatan secara teoritis merupakan bagian pengobatan yang memberikan penjelasan dari segi ilmu-ilmu tentang berbagai pendapat dari ilmuwan-ilmuwan tanpa langsung memberikan pengaruh dalam bidang praktik salah satu contoh yang dapat diambil yaitu ilmu pengetahuan tentang kanker payudara yang akan banyak membahas mengenai jenis penyakit, gejala penyakit, penyebab sakit, dan perancangan obat. Dan pengobatan secara praktik adalah pengobatan yang berhubungan dengan ilmu cara untuk melakukan suatu tindakan dengan pengebotan dan perawatan berdasarkan pengobatan secara teoritis. Penelitian yang akan dilakukan disini yaitu pengobatan berdasarkan teoritis dengan harapan dapat di terapkan secara praktik dalam menangani kanker payudara yang sampai saat ini menjadi masalah (Muhadi dan Muadz, 2015).

Pengobatan secara teoritis yang dilakukan disini dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada dari senyawa kurkumin dan kanker payudara dimana memanfaatkan media komputasi (pengerjaan menggunakan computer) dalam melihat potensi senyawa kurkumin sebagai obat kanker payudara.

Dalam era teknologi yang semakin canggih, ilmu pengobatan semakin hari semakin berkembang. Tetapi, masih saja dijumpai orang penderita kanker payudara dan angka kematian akibat penyakit ini-pun meningkat. Inilah ketentuan Allah yang berlaku dan tidak ada sesuatupun yang dapat mengubahnya.

Al-Quran dan sunah memberikan petunjuk besar kepada umat islam dalam segala bidang kehidupan, termasuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Rasullullah telah mengajarkan bagaimana memohon kesehatan dan kesembuhan hanya kepada Allah swt. dan mengajarkan berikhtiar dengan cara

yang halal dan diridhainya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 78-80.

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا
مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)

Terjemahnya:

(Yaitu Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku (Kementerian Agama RI, 2019).

Menurut Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Sihab) “Dialah adalah Zat yang telah menciptakan aku dalam sebaik-baiknya bentuk dan aku diberi kesempatan dalam hidupku menyembah Allah, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Menuju jalan yang benar melalui wahyu yang telah diberikan kepadaku. Dialah yang mengaruniakan makanan dan minuman kepadaku sehingga aku memperoleh manfaat untuk kelangsungan hidupku. Dan bila aku menderita sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah diri kepada-Nya (Shihab, 2010).

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa penyakit disandarkan pada diri manusia (insan), sekalipun hal ini merupakan ketetapan dan ciptaan Allah swt., tetaplah memiliki sifat beradab dengan tidak menyalahkan keadaan yang menyimpannya (penyakit). Makna dari itu semua, jika manusia sakit, maka tidak ada seorangpun yang memiliki kuasa menyembuhkannya kecuali atas izin Allah swt., sesuai takdirnya masing-masing. Selain berserah diri pada-Nya, kita sebagai manusia di haruskan ikhtiar untuk mencari obat untuk penyakit tersebut, karena Allah swt., telah memberikan manusia akal untuk digunakan sebaik-baiknya.

Dalam pengobatan berbagai macam penyakit dapat melalui obat-obatan herbal, kimia, hingga operasi. Sehingga, banyak seruan untuk mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah saw sebagai penyembuh segala penyakit, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam hadisnya yang berbunyi:

حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى، قالوا
 حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد
 عن أبي الزبير عن جابر عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
 لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin ‘Isa, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab; telah mengabarkan kepadaku ‘Amru yaitu Ibnu al-Harits dari ‘Abdu Rabbih bin Said dari Abu Az-Zubair dari Jabir R.A dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya dan jika obat itu sesuai dengan penyakitnya niscaya akan sembuh atas ijin Allah swt.”(HR. Muslim no. 2204, Kitab As-Salaam bab “*Likulli da’in dawa’un wa istihbaab at-tadaawi*”).

Hadis ini mengandung penjelasan, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Obat bagi penyakit laksana makanan yang mampu mengusir rasa lapar atau air yang mampu menghilangkan rasa haus. Jika ternyata orang yang sakit belum sembuh juga padahal sudah minum obat, hal ini tidaklah bertentangan dengan keterangan nabi. Dimana kemungkinan yang mungkin terjadi karena ada salahnya diagnosa, karena banyak memiliki gejala yang mirip. Atau benar diagnosanya tapi tidak tepat dalam *kaifiyah* dan *kamiyahnya* (cara dan dosisnya). Penyakitnya sesuai, tapi belum bisa diobati sampai sekarang, bisa jadi lantaran

belum ada ahli yang bisa menemukan obatnya. Dan itu karena kehendak Allah swt. Sehingga pada akhir hadist ini Nabi menyebutkan “dengan izin Allah Azza wa Jalla” karena memang segalanya terjadi atas kehendak dan takdir-Nya.

Ungkapan dari “ setiap penyakit ada obatnya “ itu bersifat umum. Dimana, yang termasuk dalam cakupan ini penyakit-penyakit yang mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran dikarenakan belum ditemukan obatnya. Ilmu pengetahuan manusia hanya sebatas apa yang diajarkan Allah SWT padanya dan oleh karena itu rasullullah saw menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit berdasarkan pada cocok atau tidaknya dengan suatu penyakit.

Ketika obat dianggap efektif dalam metode pencegahan dan metode pengobatan. Pemberian obat-obatan untuk tujuan penyembuhan diperbolehkan, dengan catatan hal tersebut dapat dijadikan sebagai obat. Karena setiap ciptaan Allah SWT itu pasti ada lawan kebalikannya dimana setiap penyakit pasti punya juga cara mengatasinya yaitu obat yang dapat dijadikan lawan dari penyakit.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis, waktu dan lokasi penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimental dimana peneliti memanipulasi satu atau lebih variable bebas (*independent variable*), mengontrol variable lain yang relevan dan mengamati efek dari manipulasi pada variable terikat (*dependen variable*).

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2021 sampai selesai.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Samata, Kab. Gowa, Sulawesi selatan pada perangkat keras berupa Laptop Lenovo dengan prosesor intel® Inside™ dengan menggunakan windows 10 pro, dan dilakukan eksplorasi senyawa dan reseptor pada data bank protein dan pubchem.

B. *Pendekatan penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk mengetahui apakah senyawa kurkumin dapat menjadi inhibitor terhadap protein NF-kB (*Nuclear Factor Kappa Beta*) pada sel kanker payudara menggunakan aplikasi PyRx 0.8, Discovery Studio, YASARA dan PyMOL.

C. *Variabel Penelitian*

Penelitian memiliki dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat dimana variabel bebas meliputi bentuk konformasi ikatan yang terbentuk antara ligan dan protein dan variabel terikat mencakup penambatan antara molekul ligan dan molekul reseptor.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain berupa perangkat keras satu set Laptop Lenovo dengan prosesor intel® Inside™ dengan menggunakan windows 10 pro serta beberapa perangkat lunak yaitu PyRx 0.8, Discovery Studio 2019, YASARA dan Pymol.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu struktur 2D ligan uji berupa kurkumin dan struktur protein 3D Nf-Kb.

E. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Preparasi ligan kurkumin (Widodo et al., 2018)

- a. Dilakukan preparasi ligan dengan mengunduh struktur senyawa kurkumin melalui Pubchem
- b. Didownload ligan dalam bentuk 2D
- c. Disimpan dalam format SDF
- d. Dilakukan preparasi menggunakan autodock tools pada aplikasi PyRx 0.8 yaitu pada *open babel*
- e. Diperlakukan senyawa ligan tersebut dengan *minized selected* lalu di *convert to pdb**.
- f. Disimpan dalam bentuk *pdbqt**.

2. Preparasi reseptor Nf-kB (Widodo et al., 2018)

- a. Dilakukan preparasi menggunakan software YASARA
- b. Mendownload data protein pada PDB (*Protein Data Bank*). Pada data yang ditampilkan oleh protein target diperhatikan nilai *Ramanchanran outlaner*, nilai RMSD dan nilai *Uniqe Ligand*-nya.

- c. Di buka *software* YASARA dengan meng-klik “*Load*” pada menu file lalu meng-klik “PDB file” dan akan menampilkan “*Load Protein Data Bank Files*” lalu memilih protein yang digunakan.
- d. Dibersihkan molekul dari residu yang tidak diinginkan seperti air dan ligan sehingga siap digunakan untuk docking dengan terlebih dahulu memperhatikan “*SCENE CONTENT*” pada sebelah kanan layar.
- e. Disimpan dalam format **pdb* untuk molekul yang sudah dibersihkan dengan cara meng-klik “*Save as*” > “*Other File Format*” dan akan menampilkan menu “*Export File With OpenBabel*” lalu pilih object yang telah disediakan, format “*mol2-Sybyl Mol2*” atau “*pdbqt-Autodock PDBQT*” dan terakhir pilih tempat penyimpanan, Klik “*Ok*”.

3. Penambatan (Widodo et al., 2018)

Dilakukan *docking* menggunakan program autodock Vina pada Pyrx 0.8

- a. Dilakukan instal PyRx 0.8 program dan membukanya
- b. Dipilih menu vina Wizard
- c. Dipilih menu “*select Molecules*”- klik “*Add macromolecule*”
- d. Mengklik makromolekul untuk menginput protein target –klik “*open*” untuk menampilkan protein
- e. Ditambahkan preparasi ligand dengan mengklik “*add ligand*”
- f. Dibuka “*Open*” untuk menampilkannya
- g. Dilakukan langkah selanjutnya dengan mengklik tombol “*foreward*”
- h. Di langkah ini merupakan langkah penting untuk menentukan situs peningkatan. Dan bila tidak mempunyai informasi situs aktif (*Active site*) di sarankan mengklik “*Maximize*”
- i. Ditunggu proses *docking* sedang berlangsung dan hasilnya akan mendapatkan nilai afinitas yang mengikat dan ligan yang dioptimalkan.

4. Pymol (Widodo et al., 2018)

- a. Dibuka aplikasi Pymol
- b. Di buka “Open” untuk menampilkan protein
- c. Dibuka “Open” untuk menampilkan ligan uji
- d. Di berikan warna pada protein dan ligan dengan mengklik “Color” sebelah kanan layar
- e. Di klik “Surface” untuk menampilkan bentuk 3D dari ligand an protein
- f. Disimpan hasil dengan “Export Molecule”
- g. Dipilih pilihan *Selection > all, State > 1*
- h. Disave dalam format PDB atau MOL2

5. Validasi Penambatan Molekul (Rastini et al., 2019)

Validasi *molecular docking* bertujuan untuk mengetahui apakah protein yang digunakan untuk *molecular docking* dapat digunakan atau tidak. Validasi ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai RMSD (*Root Mean Square Deviation*) pada data protein. Nilai RMSD yang dikatakan valid adalah $<2.00\text{\AA}$.

RMSD (Root Mean Square Deviation) merupakan parameter yang menggambarkan seberapa besar perubahan interaksi protein-ligan pada struktur kristal sebelum dan sesudah di docking untuk mengetahui nilai penyimpangannya. Metode docking dikatakan valid apabila nilai RMSD $<2.00\text{\AA}$, yang artinya parameter docking yang digunakan telah valid sehingga metode docking dapat digunakan untuk docking senyawa uji (Sari et al, 2020).

6. Visualisasi Hasil Penambatan (Widodo et al., 2018)

Hasil analisis dari *molecular docking* dapat divisualisasikan dengan lebih akurat menggunakan aplikasi *Biovia Discovery Studio 2019*.

- a. Dilakukan penginstalan aplikasi *Discovery Software*
- b. Dibuka aplikasi

- c. Di buka komplek PDB dengan meng-klik “*open file* (Ctrl+O)
- d. Protein akan berbentuk 3D di jendela *windows*
- e. Dilakukan pengeditan visualisasi pada automatic script dengan meng-klik “*Scripts*” > “*Visualization*” > “*Publication Quality*”
- f. Dianalisis interaksi *molecular receptor - ligand*
- g. Diklik ligan interaksi untuk menampilkan detail
- h. Dilakukan Show 2D diagram plot untuk analisis dari tipe interaksi dan asam amino dalam menstabilkan interaksi
- i. Dilakukan penampakan komplek dari interaksi ikatan yang terjadi.

7. Interpretasi Data (Rastini et al., 2019)

Dilakukan analisis data dari hasil yang di peroleh docking pada sisi *binding site*, yang meliputi nilai *scoring energy* bebas ikatan dan interaksi ikatannya. Energi bebas ikatan atau *binding affinity* yang lebih rendah dari ligan kontrol adalah faktor dan standar penentuan potensi ligan uji dan jenis ikatannya.

Area ikatan (Binding site) merupakan area dari pengikatan protein terhadap ligan yang akan mempengaruhi konformasi maupun fungsi dari protein. Binding site memperlihatkan residu-residu asam amino yang berperan penting dalam membentuk interaksi antara makromolekul dengan ligan seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatik (Arwansyah et al., 2014).

8. Screening Ligand Based Drug Likeness (Drug Scan) (Adriani, 2018a)

Dilakukan analisis pengamatan obat dengan mempertimbangkan aturan *Lipinski' rule of Five*. 5 aturan Lipinski meliputi berat molekul kurang dari 500, memiliki gugus hidrogen donor tidak lebih dari 5, memiliki gugus hidrogen akseptor tidak lebih dari 10, nilai log-P tidak lebih dari 5 dan *Molar refractivity* sebaiknya antara 40-130.

Aturan Lipinski 5 membantu dalam membedakan antara molekul seperti obat dan non obat. Ini memprediksi kemungkinan keberhasilan atau kegagalan yang tinggi karena kemiripan obat untuk molekul yang mematuhi 2 atau lebih aturan Lipinski (“Lipinski Rule Of Five”, 2009: 59159).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Senyawa kurkumin merupakan salah satu senyawa yang terkandung dalam tanaman kunyit yang berpotensi menjadi inhibitor terhadap NF-Kb dalam sel kanker. Hasil penelitian *Molecular docking*, tahap-tahap penambatan ligan-protein memperoleh hasil sebagai berikut.

1. Hasil *Molecular Docking*


Molecular docking merupakan penelitian yang menggunakan metode komputasi untuk mengetahui interaksi dan ikatan suatu senyawa dengan reseptor pada protein target. Hasil dari pada penelitian ini berupa skor *affinity* dan visualisasi dalam bentuk 3D dan 2D interaksi ligan dan reseptor. Nilai *affinity* yang baik yaitu memiliki skor yang paling sedikit dibawah acuan ligan kontrol. Ini menunjukkan bahwa ligan dapat mengikat reseptor dengan mudah dan tidak memerlukan banyak energi untuk berikatan. Selanjutnya menggunakan aplikasi PyMOL dan *Discovery Studio* untuk melihat jenis ikatan dan interkasinya dalam bentuk visualisasi.

a. Penyiapan Struktur Molekul Reseptor


Protein Data Bank (PDB) merupakan kumpulan data untuk biologi structural. Dimana pada situs ini kita dapat mempelajari struktur DNA, protein dan kapsid virus dengan mendownload file PDB. Semua sampel yang terkumpul dikumpulkan dari data eksperimen seperti (X-Crystallography, NMR etc). Kita dapat mengunduhnya pada situs <https://www.rcsb.org> (Inbio Indonesia.,2005)

Protein target yang diunduh pada situs <https://www.rcsb.org>, akan dijadikan sebagai reseptor. Berkas diunduh dalam bentuk berkas (file) “pdb”,

pada penelitian ini protein target yang digunakan sebagai reseptor adalah NF-Kb atau *Nuclear Factor Kappa Beta* dengan kode protein 2DBF. Berdasarkan data pada situs <https://www.rcsb.org/structure/2DBF> memiliki nilai Ramachandran outliers 2.0% yang bisa dijadikan sebagai reseptor target melihat warna pada *percentile ranks* tidak condong warna merah.




Gambar 6. Struktur 3D protein NF-Kb dengan kode (2DBF) (*Full WwPDB NMR Structure Validation Report, 2020*)



Gambar 7. wwPDB validation protein NF-Kb dengan kode (2DBF) (*Full WwPDB NMR Structure Validation Report, 2020*)

Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan data protein tersebut menggunakan aplikasi Yasara. Tahapan ini penting karena pada dasarnya molekul memiliki penyusun residu yang sama pada berkas protein, sehingga beberapa molekul yang terdapat pada protein perlu dihapus untuk mengambil 1 molekul saja. Residu yang perlu dihapus disini yaitu residu yang dianggap residu penghambat (senyawa air) dan senyawa *native ligand* (ligan asli), untuk menghindari kemungkinan ligan uji melekat pada molekul pengganggu. Berkas yang telah terpreparasi di simpan dalam bentuk “pdb” dengan format penyimpanan “mol2-sybylmol2” disesuaikan dengan kode proteinnya “2DBF.pdb”. Berikut makromolekul target NF-Kb yang dipilih setelah proses preparasi.




Gambar 8. Struktur makromolekul *Nuclear factor Kaffa Beta* (2DBF) Visualisasi PyMOL (a) Struktur makromolekul Nuclear Factor Kaffa Beta (2DBF) sebelum dipreparasi (b) Struktur makromolekul Nuclear Faktor Kaffa Beta (2DBF. Pdb) setelah dipreparasi


b. Penyiapan Ligan Uji

Penyiapan ligan uji yang diunduh pada situs <https://pubchem.ncbi>, akan dijadikan sebagai ligan. Berkas diunduh dalam bentuk berkas (file) “2D” dalam format “SDF”. Preparasi ligan ini bertujuan untuk menurunkan energi aktivasi dari ligand dan menyesuaikan dengan format yang dapat diterima

oleh aplikasi docking. Data preparasi dapat disimpat dengan format “pdbqt”. Berikut ligan uji setelah dipreparasi.



Gambar 9. Ligan Uji Kurkumin Visualisasi PyRx (a) ligan uji kurkumin sebelum preparasi (b) ligan uji kurkumin setelah preparasi



Gambar 10. Ligan Uji Kurkumin Visualisasi *Space-Filling* (a) Ligan kurkumin sebelum preparasi penampakan *Space-Filling* PubChem (b) Ligan kurkumin sebelum preparasi penampakan *Space-Filling* PyMOL

c. Penambatan Molekul dengan *Autodock Vina*

Penambatan ligan dan protein target menggunakan aplikasi PyRx dengan *autodock vina* dengan memperhatikan nilai interaksi pada sisi binding site-nya yaitu nilai ΔG_{bind} atau energi bebas.


Berikut hasil binding affinity dari penambatan ligan uji kurkumin dan reseptor NF-Kb.

Tabel 2. Hasil *Binding Affinity* PyRx


No.	Protein	Ligan	Binding affinity	RMSD
1.	NF-kappa B p105	Kurkumin	-6.2 kkal/mol	<2.00

d. Interaksi Ligan dan Protein

Interaksi ligan dan protein dapat divisualisasikan menggunakan aplikasi Pymol untuk mengetahui kecocokan bentuk antara ligan dan protein. Begitu juga dengan residu-residu tambat ligan dan bentuk ikatan yang terjadi. Digunakan Discovery Studio untuk melihat interaksi yang terjadi antara ligan dan protein target. Berikut interaksi keduanya:



Gambar 11. Interaksi Ligan-Reseptor 3D Visualisasi *Discovery Studio*



Interactions



Gambar 12. Interaksi Ligan-Reseptor 2D Visualisasi *Discovery Studio*

Tabel 3. Keterangan Warna Visualisasi PyMOL (Apriani, 2015)

Nama Atom	PyMOL
Hidrogen	Hijau
Carbon	Putih
Oksigen	Merah
Sulfure	Orange
Pi-Sigma	Ungu
Alkyl	Ungu muda
Nitrogen	Biru

2. Hasil Uji *Lipinski Rule Of Five*

Hasil terbaik *docking* akan unggah di <http://www.scfbio-iitd.res.in/software/drugdesign/lipinski.jsp>, dilakukan analisa dengan menggunakan *Lipinski rules of five* untuk mengetahui senyawa tersebut dapat di serap oleh tubuh atau tidak. Berikut hasil dari *Lipinski rules of five*.

Tabel 4. Hasil *Lipinski rules of five*

No.	Parameter	Kurkumin
1.	Mass	368
2.	Hidrogen bond donor	2
3.	Hidrogen bond acceptors	6
4.	Log P	3.369898
5.	Molar Refractivity	102.016571

B. Pembahasan

Kanker payudara tumbuh dari jaringan di payudara dan kanker invasif yang paling sering menyerang pada wanita. Tanda dari kanker ini adalah perubahan bentuk payudara, gumpalan di payudara, nipple discharge, dan sedikit sisik merah pada kulit. Faktor resiko dari kanker payudara ini adalah wanita, obesitas, jarang beraktivitas fisik, alkohol, terapi pelepasan hormon saat menopause, radiasi ion, siklus menstruasi yang terlalu cepat atau terlalu lambat (Handayani et al., 2013).

Penentuan penggunaan makromolekul didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa NF-Kb menjadi faktor transkripsi, mengatur ekspresi dari beberapa gen yang dapat menekan apoptosis dan merangsang progresi sel tumor (Andjani et al., 2016). Pemilihan protein dengan memperhatikan nilai ramacahanran outlaner dan penelitian sebelumnya. Data protein di unduh dari RSCB *Protein Data Bank*, dengan kode "2DBF". Identitas protein 2DBF merupakan struktur dari molekul *nuclear factor NF-kappa-B p105*

subunit pada manusia (*Homo sapiens*) yang diperoleh menggunakan metode *solution NMR (Nuclear Magnetic Resonance)*.

Pemilihan ligan dilihat dari manfaat kunyit berdasarkan beberapa sumber terkait kandungan senyawa kurkuminoid yaitu kurkumin (Rathore et al., 2020). Kurkumin dapat menghambat sejumlah molekul yang terlibat peradangan termasuk faktor nekrosis tumor (Rathore et al., 2020). Senyawa kurkumin diunduh dari PubChem dengan bentuk 2D dan disimpan dalam format SDF.

Proses preparasi ligan menggunakan aplikasi PyRx pada fitur open babel bertujuan untuk meminimasi ligan untuk mendapatkan konformasi struktur dengan energi yang lebih rendah dari pada sebelum minimasi sehingga memudahkan dalam proses penambatan (Nusantoro & Fadlan, 2020). Preparasi protein dengan aplikasi yasara bertujuan untuk menghilangkan ligan kontrol dan molekul air yang terikat pada makromolekul karena dapat mengganggu proses penambatan (Apriani, 2015).

Penambatan dilakukan pada aplikasi PyRx pada fitur Autodock vina dengan memasukkan protein dan ligan yang telah dipreparasi menggunakan format “pdbqt”. Hasil dari proses penambatan didapatkan nilai binding affinity, afinitas ikatan dan juga konformasi dari ligan-ligan yang dipreparasi, kemudian ligan yang memiliki binding affinity terendah dan memiliki ikatan terbaik disimpan dalam format “sdf” dan nanti akan dibuka pada aplikasi pymol untuk melihat posisi dan orientasi ligan yang telah ditambatkan. Discovery studio dilanjutkan untuk melihat asam amino yang terikat pada ligan dan juga jarak ikatan asam amino dalam bentuk 3D dan 2D.

Hasil docking antara ligan reseptor mendapatkan nilai RMSD (*Root Mean Square Deviation*) $< 2.00 \text{ \AA}$ dan binding affinity -6.2 kkal/mol . RMSD membandingkan posisi ligan hasil penambatan dengan ligan ko-kristal alami

dalam protein dan nilai dikatakan valid adalah $<2.00\text{\AA}$ menunjukkan presisi hasil konformasi *docking* yang baik (Nusantoro & Fadlan, 2020). Nilai RMSD digunakan untuk menunjukkan keberhasilan proses docking dan validasi program docking serta menampilkan kecocokan antar suatu atom pada satu konformasi atom dari unsur sejenis pada konformasi lainnya (Leukotrien et al., 2015). Binding affinity merupakan ukuran kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor. Semakin kecil nilai binding affinity maka, afinitas antara reseptor dengan ligan semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika semakin besar nilai binding affinity maka afinitas antara reseptor semakin rendah (Saputri et al., 2015).

Hasil uji Lipinski menunjukkan massa 368 Da, donor ikatan hidrogen 2, akseptor ikatan hidrogen 6, log P 3.369898, dan refraktivitas molar 102,016571. Dan dari hasil ini memenuhi aturan lipinski dimana massa dimana berat molekul ≥ 500 Da yang menandakan bahwa obat tersebut dapat berdifusi dalam membran sel dalam tubuh dan semakin besar ukuran molekul besar lebih lambat untuk berdifusi melintasi membrane molekul sehingga berat molekul dibatasi ≥ 500 g/mol (Lipinski, 2000). Donor ikatan hidrogen ≤ 5 dan akseptor ikatan hidrogen ≤ 10 mempengaruhi permeabilitas membrane sel dimana obat harus melintasi membrane dan membrane dilintasi secara pasif oleh obat yang berdifusi melintasi membrane bersifat nonpolar sehingga obat oral tidak perlu beriteraksi terlalu kuat dengan air. Jumlah ikatan hidrogen pada donor dan akseptor berkorelasi dengan aktivitas biologi suatu ligan/obat sehingga jumlah donor dan akseptor dibatasi (Adriani, 2018). Nilai log P meyakinkan keluturan dalam lemak (hidrofobik) atau air (hidrofilik) dengan rentang nilai ≤ 5 , ligan tidak boleh terlalu negatif karena tidak dapat melewati membran lipid bilayer dan tidak boleh terlalu positif karena semakin hidrofobik molekul tersebut. Sifat yang hidrofobik menandakan tingkat

toksistas tinggi karena akan tertahan lebih lama pada lipid bilayer dan terdistribusi lebih luas di dalam tubuh menyebabkan selektifitas ikatan terhadap enzim target menjadi berkurang (Naconha, 2021).

Hasil penambatan ligan kurkumin dan reseptor NF-Kb yang divisualisasikan dengan Discovery Studio 2019 dapat dilihat pada gambar 11. Dan gambar 12. Terlihat adanya ikatan hidrogen yang ditandai warna hijau pada ASN 32, ASN 47 dan terbentuk ikatan pi-alkil yang ditandai dengan warna ungu muda tergolong ikatan hidrofobik ALA 34, ARG 50 (Apriani, 2015). Adanya ikatan Hidrofobik memungkinkan terjadinya interaksi hidrofobik pada proses penambatan ligan dan reseptor serta meningkatkan interaksi hidrofobik ligan dalam kantong pengikat reseptor (Maghfirah et al., 2021).



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Senyawa kurkumin dapat dijadikan obat kanker payudara dilihat dari hasil uji Lipinski yang memenuhi syarat berat molekul $369 \text{ g/mol} \geq 500 \text{ g/mol}$, HBD $2 \leq 5$ dan HBA $6 \leq 10$, $\log P \ 3,369898 > 5$.
2. Senyawa kurkumin memiliki berat molekul $369 \text{ g/mol} \geq 500 \text{ g/mol}$ menandakan molekul senyawa kurkumin dapat melintasi membrane sel, HBD $2 \leq 5$ dan HBA $6 \leq 10$ menandakan obat bergerak secara pasif melintasi membran, $\log P \ 3,369898 > 5$ menentukan hidropobik molekul tersebut, semakin hidropobik semakin toksik.

B. *Saran*

Diharapkan penelitian ini dilanjutkan ke Molekuler dinamik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, N. (2019). *Agromedicine*. Volume 6. Nomor 2. Oktober. *J*, 6, 410.
- Adriani. (2018). Prediksi Senyawa Bioaktif dari Tanaman Sanrego (*Lunasia amara Blanco*) sebagai Inhibitor Enzim Siklooksigenase-2 (COX-2) melalui Pendekatan Molecular Docking. *Jurnal Ilmiah Pena, Sains Dan Ilmu Pendidikan*, 1, 6–11. <http://ojs.stkippi.ac.id/index.php/jip/article/view/128>
- Adriani. (2018). *Program Studi Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia Dosen Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Pembangunan Indonesia Makassar 6*. 1, 6–11.
- Ahmad Najib, dkk. 2019. *Potensi Tumbuhan Kanunang (Cordia myxa L.) Sebagai Bahan Obat Anti-Diabetes*. Jakarta: Penerbit Deepublish. ISBN: 978-623-209-624-0
- Andjani, N., Sujuti, H., & Winarsih, S. (2016). Efek Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera*) terhadap Nuclear Factor Kappa Beta (NF- κ B) Aktif dan Apoptosis Cell Line Kanker MCF-7. *Majalah Kesehatan*, 3(4), 204–212. <https://doi.org/10.21776/ub.majalahkesehatan.003.04.6>
- Apriani, F. (2015). *Studi Penambatan Molekul Senyawa-Senyawa Amidasi Etil Para Metokisinamat Pada Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-Gamma (Ppar γ)*. *Skripsi*, 1–121.
- Ariani, Novida. (2018). *Rahasia Herbal Kurkumin Mengobati Vulvovaginal Kandidiasis*. Jawa Barat: Lakaeisha.
- Arwansyah, A., Ambarsari, L., & Sumaryada, T. I. (2014). Simulasi Docking Senyawa Kurkumin dan Analognya Sebagai Inhibitor Reseptor Androgen pada Kanker Prostat. *Current Biochemistry*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.29244/cb.1.1.11-19>
- Arwansyah, & Hasrianti. (2014). Simulasi Molecular Docking Senyawa Kurkumin dan Analognya Sebagai Selective Androgen Receptor Modulators (SARMs) Pada Kanker Prostat. *Jurnal Dinamika*, 5(2), 60–75.
- Badan Litbang Kesehatan, K. K. R. (2018). *Laporan Nasional RKD2018 FINAL.pdf*. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (p. 198)*. http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Basuki, S. A., & Melinda, N. (2017). Prediksi mekanisme kerja obat terhadap reseptornya secara in silico (studi pada antibiotika Sefotaksim). *Research Report*, 0(0), 89–94. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/research-report/article/view/1367>
- Bhatt, V., & Ram, S. (2015). The Role of Ligands , Polytopic Ligands and Metal Organic Ligands (Mols) in Coordination Chemistry. *Chemical Science Review and Letters*, 4(14), 414–428.

- B. G. Samy, & Xavier, L. (2015). International Journal of Advanced Research in Molecular Docking Studies on Antiviral Drugs for SARS. *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*, 5(3), 75–79.
- Chang, taymond. 2004. *Kimia Dasar Jilid 1 Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga. ISBN: 97978103999
- Dana, H., Chalbatani, G. M., Gharagouzloo, E., Miri, S. R., Memari, F., Rasoolzadeh, R., Zinatizadeh, M. R., Zarandi, P. K., & Marmari, V. (2020). In silico analysis, molecular docking, molecular dynamic, cloning, expression and purification of chimeric protein in colorectal cancer treatment. *Drug Design, Development and Therapy*, 14, 309–329. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S231958>
- Dallakyan, S. *Virtual Screening and Computer-Aided Drug Design-PyRx'* (2010), h 24; dikutip dalam *Potensi Tumbuhan Kanunang (Cordia myxa L.) Sebagai Bahan Obat Anti-Diabetes*. (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019). ISBN: 978-623-209-624-0
- Docking, M. (2020). Parameter and Molecular Docking Study of Antidiabetic Compounds from *Syzygium polyanthum* and *Syzygium cumini*. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Prediction of Pharmacokinetics* 23, 189–195. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa>
- Dong, X., Zhang, Z. M., Liu, F., Wang, W., Yu, F., Lin, Y. H., Jiang, H. Y., & He, Z. Y. (2012). Metamorphic rocks of the causes of southeastern Lhasa terrane and the Mesozoic - Cenozoic orogeny. *Acta Petrologica Sinica*, 28(6), 1765–1784.
- Elengoe, A., & Devi Sundramoorthy, N. (2020). Molecular Docking of Curcumin With Breast Cancer Cell Line Proteins. *Pharmaceutical and Biomedical Research, January*. <https://doi.org/10.18502/pbr.v6i1.3425>
- Feng, Y., Spezia, M., Huang, S., Liu, B., Lei, Y., Du, S., Vuppapapati, A., Luu, H. H., Haydon, R. C., He, T., & Ren, G. (2018). ScienceDirect Breast cancer development and progression: Risk factors , cancer stem cells , signaling pathways , genomics , and molecular pathogenesis. *Genes & Diseases*, 5(2), 77–106. <https://doi.org/10.1016/j.gendis.2018.05.001>
- RCSB PDB. 2020. *Full wwPDB NMR Structure Validation Report*: <https://www.rcsb.org/structure/2Dbf> (Diakses pada 28 Mei 2020)
- Foscato, M., & Jensen, V. R. (2020). Automated in Silico Design of Homogeneous Catalysts. *ACS Catalysis*, 10(3), 2354–2377. <https://doi.org/10.1021/acscatal.9b04952>
- Fristiohady, A., Ningsih, M. B., & Malik, F. (2020). Review Artikel : Peran Faktor Transkripsi Nuclear Factor Kappa-Light-Chain-Enhancer of Activated B Cells (NF-κB) Terhadap Sel Kanker Payudara. *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, 6(2), 81–90. <https://doi.org/10.35311/jmpi.v6i1.59>


- Ghasemi, F., Shafiee, M., Banikazemi, Z., Pourhanifeh, M. H., Khanbabaei, H., Shamshirian, A., Amiri Moghadam, S., ArefNezhad, R., Sahebkar, A., Avan, A., & Mirzaei, H. (2019). Curcumin inhibits NF- κ B and Wnt/ β -catenin pathways in cervical cancer cells. *Pathology Research and Practice*, 215(10), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.prp.2019.152556>
- Handayani, F. W., Muhtadi, A., Farmasi, F., Padjadjaran, U., Dara, T., Manis, K., & Aktif, S. (2013). Aktivitas Anti Kanker Payudara Beberapa Tanaman Herbal. *Farmaka*, 16(2), 1–15.
- Hamid, Nurnisa., Raiz razak., Ahmad, Najib. 2021. *Virtual Screening pada Senyawa Kimia Tumbuhan Terap (Artocarpus Elasticus) Terhadap Reseptor ALPHA Estrogen*. Perum: Penerbit NEM. ISBN: 19786256906897
- Inbio Indonesia., *Moleculer Docking And Dynamics Simulation*. (Malang: Global Science, 2005). ISBN: 978-623-90343-9-9
- Jiao, D., Wang, J., Lu, W., Tang, X., Chen, J., Mou, H., & Chen, Q. Y. (2016). Curcumin inhibited HGF-induced EMT and angiogenesis through regulating c-Met dependent PI3K/Akt/mTOR signaling pathways in lung cancer. *Molecular Therapy - Oncolytics*, 3(February), 16018. <https://doi.org/10.1038/mto.2016.18>
- Kelutur, F. J., Mustarichie, R., & Umar, A. K. (2020). Virtual Screening Kandungan Senyawa Kipas Laut (*Gorgonia mariae*) sebagai Anti-Asma. *ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia*, 16(2), 48. <https://doi.org/10.20961/alchemy.16.2.39965.48-59>
- Khaerunnisa, S., Kurniawan, H., Awaluddin, R., & Suhartati, S. (2020). Potential Inhibitor of COVID-19 Main Protease (M pro) from Several Medicinal Plant Compounds by Molecular Docking Study. *Preprints, March*, 1–14. <https://doi.org/10.20944/preprints202003.0226.v1>
- Kusbiantoro, D. (2018). *Pemanfaatan kandungan metabolit sekunder pada tanaman kunyit dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat Utilization of secondary metabolite in the turmeric plant to increase community income*. 17(1), 544–549.
- Lipinski, C. A., Lombardo F., Dominy B. W., & Feeney P. J. (1997). Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 23, 3-25.
- Lipinski, C. A. (2000). Drug-like properties and the causes of poor solubility and poor permeability. *Journal of Pharmacological and Toxicological Methods*, 44(1), 235–249. [https://doi.org/10.1016/S1056-8719\(00\)00107-6](https://doi.org/10.1016/S1056-8719(00)00107-6)
- Maghfirah, A., Israyusnita, F., & Wiranata, R. (2021). *Optimasi Afinitas Flavonoid dan Antrakuinon dari Mengkudu (Morinda citrifolia Linn .) Terhadap ACE-1 sebagai Solusi Antihipertensi*. October.


- Mirza, D. M. (2019). *Studi In Silico Dan In Vitro Aktivitas Daun Marsilea crenata C Presl . Skripsi*, 1–134.
- Mortezaee, K., Potes, Y., Mirtavoos-Mahyari, H., Motevaseli, E., Shabeeb, D., Musa, A. E., Najafi, M., & Farhood, B. (2019). *Boosting immune system against cancer by melatonin: A mechanistic viewpoint. Life Sciences*, 238, 116960. <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2019.116960>
- Muhadi dan Muadzin., *Semua Penyakit Ada Obatnya*. Yogyakarta: Media Pressindo. ISBN 979-878-050-7
- Mulatsari, E., Martati, T., Mumpuni, E., & Dewi, N. L. (2020). *In Silico Analysis of Antiviral Activity of Analog Curcumin Compounds. Jurnal Jamu Indonesia*, 5(3), 114–121. <https://doi.org/10.29244/jji.v5i3.173>
- Murwanti, R., Kholifah, E., Ari Sudarmanto, B. S., & Hermawan, A. (2020). *Effect of curcumin on NF- κ B P105/50 expression on triple-negative breast cancer (TNBC) and its possible mechanism of action. AIP Conference Proceedings*, 2260(September). <https://doi.org/10.1063/5.0016423>
- Naconha, A. E. (2021). *Studi In Silico Senyawa Nitazoxanide Dan Arbidol Sebagai Antivirus Sars-Cov-2 Terhadap Reseptor Nsp5 (7bqy Dan 2gz7) Dan Ace2 (3d0g Dan 1r4l)*. 4(1), 6.
- Nusantoro, Y. R., & Fadlan, A. (2020). Analisis Sifat Mirip Obat, Prediksi ADMET, dan Penambatan Molekular Isatinil-2-Aminobenzoilhidrazon dan kompleks logam transisi Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) Terhadap BCL2-XL. *Akta Kimia Indonesia*, 5(2), 114. <https://doi.org/10.12962/j25493736.v5i2.7881>
- Padrón, J. A., & Carrasco, R. (2002). Molecular Descriptor Based On A Molar Refractivity Partition Using Randic- Type Graph-Theoretical Invariant . 5(3), 258–265.
- Pangribowo, S. (2019). *Beban Kanker di Indonesia*. 1–16. ISSN 2442-7659
- Petit, J., Meurice, N., Kaiser, C., & Maggiora, G. (2012). Softening the Rule of Five—where to draw the line? *Bioorganic and Medicinal Chemistry*, 20,5343–5351. Pollastri,
- Pinzi, L., & Rastelli, G. (2019). Molecular docking: Shifting paradigms in drug discovery. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(18). <https://doi.org/10.3390/ijms20184331>
- Pradani, T. C., Fatimawali, ., Manampiring, A. E., Kepel, B. J., Budiarmo, F. D., & Bodhi, W. (2021). Molecular Docking Terhadap Senyawa Kurkumin dan Arturmeron pada Tumbuhan Kunyit (*Curcuma Longa* Linn.) yang Berpotensi Menghambat Virus Corona. *Jurnal E-Biomedik*, 9(2), 208–214. <https://doi.org/10.35790/ebm.v9i2.31888>
- Pushpalatha, R., Selvamuthukumar, S., & Kilimozhi, D. (2017). Comparative


insilico docking analysis of curcumin and resveratrol on breast cancer proteins and their synergistic effect on MCF-7 cell line. *Journal of Young Pharmacists*, 9(4), 480–485. <https://doi.org/10.5530/jyp.2017.9.94>


- PubChem. 2022. *Kurkumin*. Retrieved from PubChem: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/969516> (Diakses pada 2 Mei 2022)
- PyMOL. 2021. *PyMOL Oleh Schrodinger*. Retrieved from PyMOL; <https://pymol.org/2/> (Diakses pada 20 Agustus 2021)
- Rachmania, R. A., Efendi, K., & Atmojo, T. T. (2018). *Potensi Biji Buah Nangka (Artocarpus heterophyllus L .) Dalam Menghambat Reseptor Alfa-Glukosidase Pada Tikus. 1*, 118–130.
- Rathore, S., Mukim, M., Sharma, P., Devi, S., Nagar, J. C., & Khalid, M. (2020). *Curcumin : Ulasan untuk Manfaat Kesehatan*. 273–290.
- Rastini, M. B. O., Giantari, N. K. M., Adnyani, K. D., & Laksmiani, N. P. L. (2019). Molecular Docking Aktivitas Antikanker Dari Kuersetin Terhadap Kanker Payudara Secara in Silico. *Jurnal Kimia*, 180. <https://doi.org/10.24843/jchem.2019.v13.i02.p09>
- Ratnasari, A. A., Winarto, H., Purbadi, S., Sekarutami, S. M., & Sutrisna, B. (2016). Hubungan Ekspresi NF-Kb dengan Respons Radiasi Kanker Serviks Stadium Lokal Lanjut. *EJournal Kedokteran Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.23886/ejki.4.5906.31-6>
- Rini, C., Widjajanto, E., & Loekito, R. (2011). Peranan Curcumin terhadap Proliferasi, Apoptosis dan Diferensiasi Hepatosit Mice Balb/C yang Dipapar dengan Benzapyrene. *The Journal of Experimental Life Sciences*, 1(2), 64–71. <https://doi.org/10.21776/ub.jels.2011.001.02.02>
- Saifuddin A, Siswandono, dan B. P. E. W. (2014). Studi in silico Gendarusin A, B, C, D, dan E untuk prediksi absorpsi dan aktivitas terhadap hialuronidase (Ec 3.2.1.35). *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 1(2), 42–47. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jfikd5b141cb18full.pdf>
- Saputri, K. E., Fakhmi, N., Kusumaningtyas, E., Priyatama, D., & Santoso, B. (2015). *Docking Molekular Potensi Anti Diabetes Melitus Tipe 2 Turunan Zerumbon Sebagai Inhibitor Aldosa Reduktase Dengan Autodock-Vina*.
- Sari, Indah Wulan., Junaidi., Dini Pratiwi. (2020). *Studi Molekuler Docking Senyawa Kumis Kucing (Orthosiphon stamineus B.) Pada Reseptor alfa-Glukosidase Sebagai Anti-Diabetes Tipe 2*. <https://dx.doi.org/10.47653/farm.v7i2.194>
- Seeliger, D., Groot, B. L. De, & Pymol, V. (2010). *Ligand docking and binding site analysis with PyMOL and Autodock / Vina*. 417–422. <https://doi.org/10.1007/s10822-010-9352-6>


- Setiawan, H., & Irawan, M. I. (2017). Kajian Pendekatan Penempatan Ligan Pada Protein Menggunakan Algoritma Genetika. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(2), 2–6. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.25468>
- Shen, L., & Ji, H. F. (2012). *The pharmacology of curcumin: Is it the degradation products?* *Trends in Molecular Medicine*, 18(3), 138–144. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2012.01.004>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sianipar, E. A., Louisa, M., & Wanandi, S. I. (2018). Kurkumin Meningkatkan Sensitivitas Sel Kanker Payudara terhadap Tamoksifen Melalui Penghambatan Ekspresi P-glikoprotein dan Breast Cancer Resistance Protein. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2018.v4.i1.9209>
- Siswandono & Soekardjo, B. (2017). *Kimia Medisinal*. Malang: CV Seribu Bintang. ISBN: 978-602-72738-6-3
- Song, X., Zhang, M., Dai, E., & Luo, Y. (2019). Molecular targets of curcumin in breast cancer (Review). *Molecular Medicine Reports*, 19(1), 23–29. <https://doi.org/10.3892/mmr.2018.9665>
- Supriono, S., Pratomo, B., & Praja, D. I. (2019). Pengaruh Kurkumin Terhadap Kadar NF- κ B dan Derajat Fibrosis Hati pada Tikus Fibrosis Hati. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 5(4), 174–183. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v5i4.271>
- Suhartono, Maggy Thenawidjaya. *Protein Serial Biokimia Mudah dan Mengunggah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017. ISBN: 9786023758296
- Widodo., Didik Huswo., A. N. (2018). *Cara Mudah Melakukan Docking dengan PyRx.pdf*. Global Science.
- Yasara. 2018. *Yet Another Scientific Artificial Really Application*. Retrived from Yasara: <http://www.yasara.org/> (Diakses pada April 2018)
- Yuswadinata, N. S., & Wathoni, N. (2021). Tinjauan Bentuk Sediaan Farmasi Mengandung Peptida. *Majalah Farmasetika*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v6i1.31990>
- Xu, L., & Russu, W. A. (2013). Molecular docking and synthesis of novel quinazoline analogues as inhibitors of transcription factors NF- κ B activation and their anti-cancer activities. *Bioorganic and Medicinal Chemistry*, 21(2), 540–546. <https://doi.org/10.1016/j.bmc.2012.10.051>
- Zubair, M. S., Maulana, S., & Mukaddas, A. (2020). Penambatan Molekuler dan Simulasi Dinamika Molekuler Senyawa Dari Genus *Nigella* Terhadap Penghambatan Aktivitas Enzim Protease HIV-1. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 6(1), 132–140. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2020.v6.i1.14982>

Lampiran 1. Preparasi Ligan Kurkumin

Lampiran 2. Preparasi Reseptor NF-Kb


Lampiran 3. Penambatan

Lampiran 4. PyMOL

Lampiran 5. Visualisasi Hasil Penambatan

Lampiran 6. RMSD

Ligand, Binding Affinity, rmsd/ub, rmsd/lb
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -6.4, 0, 0
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -6.2, 5.969, 0.243
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -6, 6.363, 1.65
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -5.9, 6.027, 1.673
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -5.8, 6.205, 1.44
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -5.7, 7.804, 1.871
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -5.7, 25.706, 23.83
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -5.6, 7.657, 4.25
2dbf_terpreparasi_kurkumin_preparasi, -5.6, 25.535, 23.33



Lampiran 7. Lipinski Rules Of Five

Step 3: Click on 'Submit' to submit your job

Submit Reset

Result

```
mass: 368.000000
hydrogen bond donor: 2
hydrogen bond acceptors: 6
LOGP: 3.369898
Molar Refractivity: 102.016571
```

How to Use the Tool

OPTION 1:-

- The input File should be in the following formats[* .pdb, *.mol, *.mol2, *.xyz, *.sdf, *.smi]
- The input file name should not contain whitespace(s).
- Browse and Upload the file.
- Click on Submit.
- If the results were not showing, please recheck you input file format and submit it again.

OPTION 2:-

- To draw a chemical structure [Click Here](#) .
- Follow the instructions given.
- Browse and Upload the file.
- Click on Submit.

For Feedback/Queries/Reportings bugs/Suggestions mail us at : abhilash@scfbio-iitd.res.in

References:
 Cite as:
 Lipinski CA (December 2004). "Lead- and drug-like compounds: the rule-of-five revolution". *Drug Discovery Today: Technologies* **1** (4): 337-341. doi:10.1016/j.ddtec.2004.11.007
 B. Jayaram, Tanya Singh, Goutam Mukherjee, Abhinav Mathur, Shashank Shekhar, and Vandana Shekhar, "Sanjeevini: a freely accessible web-server for target directed lead molecule discovery", *BMC Bioinformatics*, **2012**, *13*, S7. <http://www.biomedcentral.com/1471-2105/13/S17/S7>

© Copyright 2004-2015, Prof B. Jayaram & Co-workers. All rights reserved. | Disclaimer
 Number of Hits since 4th April 2009: 53833

For further queries, suggestions and comments kindly contact the Web Administrator at abhilash@scfbio-iitd.res.in

M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Endang Adillah lahir di Berare 11 Juli 1999. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Saifuddin dan Ibu Suhada. Memiliki satu saudara perempuan bernama Uci Ramdhani yang lahir di Berare 10 oktober 2006. Pendidikan dasar ditempuh di SD 1 Berare Moyo Hilir sampai kelas 4 SD dan SD 6 Negeri Utan sampai tamat. Kemudian di lanjutkan di SMP 01 Moyo Hilir pada 2011 dan menyelesaikan pada tahun 2011. Di jenjang SMP mengikuti organisasi Osis, dan Boxer. Pendidikan tingkat menengah sederajat ditempuh di SMAN 3 Sumbawa Besar dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017. Di jenjang SMA mengikuti organisasi nihongo kurabu smaniga club, karya ilmiah remaja, debat bahasa Indonesia, palang merah remaja (PMR), organisasi dakwa masyarakat, dan komunitas menulis. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di UIN Alauddin Makassar tahun 2017, melalui jalur SPAN-PTKIN pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama menjadi mahasiswa pernah bergabung di komunitas Forum Lingkar Pena, Forum Back To Muslim Identity. Dan penulis akhirnya menyelesaikan studinya pada 09 agustus 2022.

