

**GAMBARAN KADAR GLUKOSA DARAH DAN KONDISI LUKA ULKUS
DIABETIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS **HAJRA** AM NEGERI

NIM : 70300118053

ALAUDDIN
MAKASSAR

JURUSAN KEPERAWATAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hajra

NIM : 70300118053

Tempat/Tgl Lahir : Bolaromang 22 Maret 2000

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Dusun Bolaromang

Judul : Gambaran Kadar Glukosa Darah Dan Kondisi Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 13 Juli 2022

Penulis



Hajra

Nim : 70300118053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Gambaran Kadar Glukosa Darah Dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Mellitus" yang disusun oleh Hajra, NIM: 70300118053, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 22 Juli 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan

Gowa, 22 Juli 2022 M
23 Dzulhijah 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Musdalifah, S.Kep., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Susmithara, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Ahmad J, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep MB	(.....)
Pembimbing II	: Ardian Adhiwijaya, S.Kep, M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, atas berkat rahmat dan hidayahnya yang masih tercurah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Gambaran Kadar Glukosa Darah Dan Kondisi Ulkus Diabetik”. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad saw, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar pendidikan strata satu (S1) Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak, segala kerendahan hati penulis menghanturkan terimakasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan mensupport penulis dalam segala hal apapun, yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat hidup dalam menggapai cita-cita, teruntuk bapak Yaman dan ibu Murni atas kasih sayang, bimbingan, dukungan dan do'a, serta telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis.

Sekian ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan paling tinggi kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.

2. Dr.dr. Syatira Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelolah serta mengurus pada bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep,Ns, M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan, dan Hasnah, S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta Staf dan Dosen atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi penelitian ini.
4. Ahmad J, S.Kep,Ns, M.Kep, Sp.Kep MB selaku pembimbing I dan Ardian Adhiwijaya, S.Kep,Ns M.Kes selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan bantuannya sehingga penulis mampu merampungkan skripsi penelitian ini.
5. Musdalifah, S.Kep,Ns, M.Kep selaku penguji I dan Dr. Susmihara, M.Pd selaku penguji II karena telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi penelitian ini sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang berkualitas dan komprehensif.
6. Kepada teman-teman saya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu samanya, terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi, bahwa kesalahan tersebut murniya dari penulis sebagai manusia biasa dan benarnya serta yang bermanfaat dalam tulisan ini murni datangnya dari Allah swt. Dengan segala kemurahan hati penulis mudah-mudahan dapat membantu yang lain sehingga dapat bernilai pahala di sisi Allah swt.

Gowa, 05 Juli 2022

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	7
F. Kajian Pustaka.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Konsep Kadar Glukosa Darah.....	19
1. Definisi kadar glukosa darah.....	19
2. Metode pemeriksaan kadar glukosa darah	19
3. Faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah	20
B. Konsep Diabetes Melitus	22
1. Definisi diabetes mellitus	22
2. Etiologi diabetes mellitus	22
3. Patofisiologi diabetes mellitus	25
4. Manifestasi klinis diabetes mellitus	28
5. Komplikasi diabetes mellitus	30
6. Penatalaksanaan diabetes mellitus	33
C. Konsep Ulkus Diabetik	35
1. Definisi ulkus diabetik	35
2. Etiologi ulkus diabetik	35
3. Patofisiologi ulkus diabetik.....	36

4. Faktor yang mempengaruhi ulkus diabetik	37
5. Klasifikasi ulkus diaetik	38
6. Manifestasi klinis ulkus diabetik.....	39
7. Diagnosis ulkus diabetik	40
8. Penatalaksanaa ulkus diabetik.....	41
9. Pengkajian luka skala BWAT.....	44
D. Diabetes Melitus Dalam Perspektif Islam.....	45
E. Kerangka Teori.....	48
F. Kerangka Konsep.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Desain Penelitian.....	50
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	50
C. Populasi Dan Sampel	50
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	52
E. Metode Pegumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian	54
G. Tehnik Pengelolaan Dan Penyajian Data.....	54
H. Analisis Data	55
I. Kode Etik Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Hasil Penelitian.....	59
C. Pembahasan	69
D. Keterbatasan Penelitian.....	80
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86


DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Definisi Operasional.....	7
Tabel 1.2	Kajian Pustaka.....	10
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan Pada Pasien Diabetes Melitus.....	59
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus.....	60
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Kondisi Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus.....	60
Tabel 4.4	Frekuensi Kadar Glukosa Darah Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan Pada Pasien Diabetes Melitus.....	61
Tabel 4.4	Frekuensi Kadar Glukosa Darah Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan Pada Pasien Diabetes Melitus.....	61
Tabel 4.5	Frekuensi Kondisi Ulkus Diabetik Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan Pada Pasien Diabetes Melitus.....	62
Tabel 4.6	Frekuensi Pengkajian Luka Pada Pasien Diabetes Melitus.....	63




DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Teori	48
Bagan 1.2 Kerangka Konsep.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Klasifikasi Ulkus Diabetik	39
---	----



ABSTRAK

Nama : Hajra

NIM : 70300118053

Judul : Gambaran Kadar Glukosa Darah dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus

Diabetes Melitus merupakan gangguan metabolisme kronik yang terjadi karena pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Luka kaki diabetik adalah infeksi, ulserasi, dan atau destruksi jaringan ikat dalam yang berhubungan dengan neuropati dan penyakit yang berhubungan dengan dengan neuropati dan penyakit vaskular perifer pada tungkai bawah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah dan kondisi luka ulkus diabetik pada pasien diabetes melitus. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *Deskriptif analitik* dengan rancangan pendekatan *Cross sectional*. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Random sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 15 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner karakteristik responden, pengukuran kadar glukosa darah menggunakan alat *Glukometer*, dan pengukuran kondisi luka ulkus diabetik menggunakan lembar observasi dan pengkajian *Skala BWAT (Bates Jensen Wound Assesment Tool)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus lebih banyak mengalami kadar glukosa darah yang tinggi dengan presentase 66,7% dengan jumlah responden 10 orang. Status kondisi luka pada pasien diabetes melitus lebih banyak berada pada kategori kondisi luka Regenerasi luka: Skor 13-59 dengan presentase 86,7% dengan jumlah responden sebanyak 13 orang.

Kesimpulan dari penelitian ini dapat menggambarkan kadar glukosa darah dan kondisi luka ulkus diabetik pada responden, sehingga diharapkan bagi responden untuk lebih optimal dalam mengontrol kadar glukosa darah sehingga kadar glukosa darah berada dalam rentang normal.

Kata Kunci : Diabetes Melitus, Kadar Glukosa Darah, Kondisi Ulkus Diabetik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diabetes Melitus merupakan gangguan metabolisme kronik yang terjadi karena pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Penyakit diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia (Lellu, 2021). Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemia akibat insensivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal, karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, oleh sebab itu diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non insulin dependent diabetes melitus (Fatimah, 2015). Menurut *World Health Organization* (WHO), diabetes melitus merupakan penyakit metabolik kronis ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan serius pada organ jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf (Luthfiyana et al., 2021).

Prevelensi diabetes melitus di Dunia semakin meningkat. Berdasarkan perolehan data dari *Internasional Diabetes Federation* (IDF), prevalensi global penderita diabetes melitus pada tahun 2020 sebesar 9,3% dari populasi penduduk dunia. Prevelensi diabetes diperkirakan akan meningkat seiring penambahan umur penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta orang pada umur 65-79 tahun. IDF memperkirakan pada tahun 2030 jumlah insiden diabetes melitus akan

mengalami peningkatan menjadi 578 juta dan 700 juta di tahun 2045 (Alfaqih et al., 2022).

Setiap tahun orang dengan diabetes melitus di Indonesia semakin meningkat. Hasil Rikesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes melitus di Indonesia sebesar 8,4 juta, angka ini meningkat jika di bandingkan dari tahun 2013 yang hanya sebesar 1,5%. Angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita diabetes melitus yang tersebar di Indonesia yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes melitus. Diabetes melitus di Indonesia di perkirakan akan meningkat hingga 2-3 kali lipat pada tahun 2030 dari 8,4 juta mencapai 21,3 juta orang (Kemenkes RI, 2020).

Kejadian Diabetes Melitus di Sulawesi Selatan juga cukup besar. Menurut hasil Riskesdas tahun 2018 penyandang diabetes di Sulawesi Selatan sebanyak 91.823 orang. Diabetes melitus yang didiagnosis dokter atau berdasarkan gejala sebesar 3,6%. Prevalensi diabetes yang didiagnosis dokter tertinggi terdapat di Kabupaten Toraja 6,1%, Kota Makassar 5,3%, Kabupaten Luwu 5,2%, dan Kabupaten Luwu Utara 4,0%. Berdasarkan data survailens penyakit tidak menular bidang P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat diabetes melitus 29.530 kasus baru, 84.870 kasus lama dengan 1364 kematian (Dinkes Prov SulSel, 2018).

Diabetes melitus memiliki komplikasi kronik dan yang paling sering ditemukan adalah luka kaki diabetik. Komplikasi kronik terdiri dari komplikasi makrovaskular dan komplikasi mikrovaskular. Komplikasi luka kaki diabetik

merupakan komplikasi makrovaskular, dan merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes melitus. Hal ini disebabkan karena pada penderita diabetes melitus sistem metabolisme tubuhnya mengalami gangguan sehingga menghambat proses penyembuhan luka. Hal ini dapat berakibat buruk berupa infeksi kulit dan tulang, abses gengren, defomitas, sampai pada amputasi (Maria, 2021).

Luka Diabetik adalah luka atau lesi pada pasien diabetes melitus yang mengakibatkan ulserasi aktif dan merupakan penyebab utama amputasi kaki (Lede, 2018). Ulkus diabetik merupakan komplikasi umum dari diabetes melitus yang penyebab paling sering penderita diabetes melitus di rawat di rumah sakit dan penyebab utama tindakan amputasi pada kaki diabetik (Sinaga, 2020). Luka kaki diabetik adalah infeksi, ulserasi, dan atau destruksi jaringan ikat dalam yang berhubungan dengan neuropati dan penyakit yang berhubungan dengan dengan neuropati dan penyakit vaskular perifer pada tungkai bawah. (Istiqomah & Efendi, 2014).

Jumlah Prevelensi luka ulkus diabetik di Dunia mengalami peningkatan. Prevelensi penderita ulkus diabetik pada penyandang diabetes melitus di dunia berkisar 4-10%. Terdapat 40-70% kasus amputasi dan trauma, dan 85% kasus amputasi adalah diabetes melitus. Penyebab amputasi adalah faktor iskemik 50-70% dan infeksi 30-50% (Kurnia et al., 2017). Pada tahun 2017 prevelensi ulkus kaki diabetik adalah sekitar 40% dari keseluruhan penderita diabetes mellitus di seluruh dunia yaitu sekitar 30 juta orang (Setiorini et al., 2019).

Kejadian luka ulkus diabetik di Indonesia cukup besar dan setiap tahun mengalami peningkatan yang menyebabkan amputasi dan kematian. Prevelensi ulkus diabetik pada penyandang diabetes melitus di laporkan sebesar 15%. Angka kematian dan amputasi sangat tinggi yaitu sebesar 32,5% dan 23,5% serta merupakan penyebab terbanyak perawatan penyandang diabetes melitus di rumah sakit yaitu sebesar 80% (Kurnia et al., 2017). Diperkirakan setiap tahunnya satu juta pasien yang menderita ulkus diabetik menjalani amputasi ekstremitas bawah 85% dan angka kematian yaitu 15-40% setiap tahunnya serta 39-80% setiap 5 tahunnya (Setiorini et al., 2019).

Luka ulkus diabetik di pengaruhi oleh kadar glukosa darah, dimana kadar glukosa darah merupakan jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah, yang digunakan untuk menegakkan diagnosis diabetes melitus (Lede, 2018). Glukosa darah adalah glukosa yang di alirkan melalui darah sebagai sumber-sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Umumnya tingkat glukosa dalam darah bertahan pada batas-batas 4-8 mmol/L/Hari (70-150 mg/dl), kadar ini meningkat setelah makan dan biasanya berada pada level terendah di pagi hari sebelum mengonsumsi makanan (Nadrati et al., 2021). Keadaan kadar glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan resiko terjadinya ulkus kaki diabetik yang sukar di sembuhkan. Karena terjadinya penurunan kemampuan pembuluh darah dalam berkontraksi dan mengakibatkan perfusi jaringan bagian distal dari tungkai kurang baik, dan keadaan hiperglikemia merupakan lingkungan yang subur untuk berkembang biaknya kuman patogen yang bersifat plasma darah, penderita diabetes yang tidak

terkontrol baik dan memiliki kekentalan yang tinggi dan mengakibatkan aliran darah melambat dan suplai oksigen berkurang (Nadrati et al., 2021).

Fenomena yang di temukan terkait kejadian luka diabetes dengan kadar glukosa yang tidak terkontrol masih banyak terjadi. Data awal yang di dapatkan di beberapa klinik perawatan luka modern dalam satu tahun terakhir total terdapat 280 kasus luka ulkus diabetik dengan kadar glukosa yang tinggi. Kondisi luka ulkus tersebut dan kadar glukosa yang tidak terkontrol memerlukan analisis yang lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Ulkus diabetik merupakan komplikasi serius yang sering kali di jumpai pada diabetes mellitus. Keadaan kadar glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya resiko ulkus kaki yang sukar disembuhkan antara lain penurunan kemampuan pembuluh darah dalam berkontraksi maupun relaksasi akibatnya perfusi jaringan bagian distal dari tungkai kurang baik dan kadar glukosa dalam darah tinggi dapat menjadi makanan bagi kuman untuk berkembang biak dan mengakibatkan infeksi bertambah buruk dan apabila tidak segera di tangani dan semakin memburuk dapat menimbulkan gengren.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ‘‘Bagaimana Gambaran Kadar Glukosa Darah Dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus’’.

C. Tujuan Masalah

1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah dan kondisi luka ulkus diabetik pada pasien diabetes melitus.

2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi karakteristik demografi pasien diabetes melitus.
- b. Mengidentifikasi kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus.
- c. Mengidentifikasi derajat atau kondisi luka ulkus diabetik pada pasien diabetes melitus.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penderita diabetes melitus

Untuk memberikan tindakan berupa pengukuran kadar glukosa darah dan derajat ulkus diabetik sehingga bisa mengetahui kondisi kesehatannya.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan terutama mengenai gambaran kadar glukosa darah dengan luka ulkus diabetik pada pasien diabetes melitus.

3. Bagi institusi

Sebagai bahan acuan dan bahan referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya, terutama untuk mahasiswa jurusan keperawatan.

4. Bagi masyarakat

Sebagai bahan bacaan agar mengetahui hubungan kadar glukosa darah dengan kondisi luka ulkus diabetik, dan sebagai sumber informasi dalam menjaga kesehatan.

E. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

Variabel	Definisi	Alat ukur	Kriteria	Skala ukur
Karakteristik responden Usia	Umur responden yang dihitung dari tgl lahir sampai proses pengambilan data yang dilakukan yang dinyatakan dalam tahun.	Kuesioner	1. Dewasa awal = 26-35 tahun 2. Dewasa akhir = 36-45 tahun 3. Lansia awal = 45-55 tahun 4. Lansia akhir = 56-65 tahun 5. Masa manula = 65-sampai atas	Interval
Jenis kelamin	Perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pengamatan secara fisik.	Kuesioner	1. Laki-laki 2. Perempuan	Nominal

Pekerjaan	Kegiatan rutin yang dilakukan dalam upaya mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.	Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja (Berpenghasilan tetap/ perbulan) 2. Tidak bekerja (Tidak berpenghasilan tetap) 	Nominal
Independen Kadar glukosa darah	Kadar glukosa darah merupakan kandungan glukosa yang terdapat didalam darah.	Glukometer	Kadar glukosa darah(<i>mg/dl</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendah = <100 mg/dl 2. Normal = <200 mg/dl 3. Tinggi = >200 mg/dl 	Ordinal

<p>Dependen</p> <p>Luka ulkus diabetik</p>	<p>Luka ulkus diabetik merupakan luka terbuka dan merupakan luka yang terjadi akibat kadar glukosa darah yang tidak terkontrol, dan kebanyakan terjadi dibagian kaki,</p>	<p>Skala BWAT [<i>Bates jensen wound assesment tool</i>]</p>	<p>Indikator status kondisi luka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan sehat: Skor 1-13 2. Regenerasi luka: Skor 13-59 3. Degenerasi luka: Skor 60-65 	<p>Ordinal</p>
---	---	--	--	----------------

F. Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1.	(Kale & Akoit, 2015)	Analisis Luka Kaki Diabetik Pada Penderita Diabetes Melitus Di Poliklinik Diabetes Melitus Dan Penyakit Dalam.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis luka kaki diabetik pada penderita diabetes melitus di Poli diabetes melitus RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohannes Kupang.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan studi deskriptif. Sampel penelitian yaitu penderita diabetes melitus di Poli diabetes melitus RSUD Prof Dr. W.Z. Yohannes Kupang sebanyak 30 orang yang dipilih secara non random dengan teknik purposive	Hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu sebanyak 21 orang (70%), sebagian besar responden memiliki sedangkan sebanyak 7 orang (23.3%) kadar gula darah puasa yang tinggi yaitu beresiko sedang untuk terjadinya luka sebanyak 19 orang (63,3%) dari 30 kaki diabetik, dan sisanya 2 orang orang penderita diabetes melitus. Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita diabetes melitus memiliki resiko tinggi	Terdapat sedikit perbedaan Pada penelitian yang dilakukan oleh (Era Dorihi Kale), dimana penelitian yang dilakukan menggunakan pengukuran GDP Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pengukuran GDS.

				sampling	terjadinya ulkus diabetik yang parah.	
2.	(Lellu, 2021)	Analisis kadar glukosa darah dengan terjadinya gangren pada pasien diabetes melitus tipe II di RSUD batara gutu belopa tahun 2021	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar glukosa darah dan terjadinya gangrene pada pasien Diabetes Melitus Tipe II	Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling, yang berjumlah 30 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden yang diteliti terdapat responden yang memiliki Kadar Glukosa Darah Sewaktu 80-179 (Normal) berjumlah 10 (33.3%) responden, dan yang memiliki Kadar Glukosa Darah Sewaktu Tidak normal (>179) berjumlah 20 (66.7%) responden. Dan berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa dari 30 responden yang diteliti terdapat 24 (80%) responden yang mengalami gangren, dan 6 (20%) responden tidak mengalami gangren.	Terdapat perbedaan yang dilakukan (Amos lellu,2021) Yaitu di mana di penelitian ini langsung berfokus ke gangren atau jaringan mati, sedangkan penelitian saya nanti melihat kondisi luka awal sampai dengan luka terparah pada pasien diabetes Melitus

3.	(Verani ta et al., 2016)	Gambaran kadar glukosa darah dan derajat ulkus kaki diabetik	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat ulkus kaki diabetik dengan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus di RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja	Desain penelitian deskriptif analitik dengan rancangan pendekatan cross-sectional. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode total sampling dengan kriteria inklusi yaitu sebanyak 30 penderita diabetes mellitus dengan ulkus kaki diabetik.	Diperoleh 10,0% derajat 1 ulkus kaki diabetik dengan kadar glukosa darah <200 mg/dl, 40,0% derajat 2 ulkus kaki diabetik dengan kadar glukosa darah ≥200 mg/dl, 50,0% derajat 3 ulkus kaki diabetik dengan kadar glukosa darah ≥200 mg/dl dan tidak di temukannya derajat ulkus kaki diabetik.	Hanya terdapat sedikit perbedaan antara jurnal ini dengan yang akan saya teliti nanti, di mana hanya membedakan dari beberapa sampel dan tempat penelitian, di mana penelitian ini di lakukan di rumah sakit, sedangkan target penelitian saya nantinya akan di laksanakan di beberapa klinik untuk memenuhi sapel.
4.	(Sinaga , 2020)	Hubungan tingkat pengetahuan dan kadar	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui	Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan	Hasil penelitian pada variabel pengetahuan mayoritas responden berpengetahuan cukup sebanyak 18 responden	Terdapat sedikit perbedaan dimana di jurnal ini lebih berfokus ke tingkat pengetahuan penderita

		gula darah dengan derajat ulkus kaki diabetik di klinik asri wound care center medan tahun 2019	Hubungan Tingkat Pengetahuan, Kadar Gula Darah Dengan Derajat Ulkus Kaki Diabetik Di Klinik Asri Wound Care Center Medan Tahun 2019.	pendekatan cross-sectional, dengan populasi dalam penelitian semua pasien Diabetes Melitus yang memiliki ulkus kaki diabetik dan jumlah responden sebanyak 39 responden.	(46.20%). Pada variabel KGD mayoritas responden memiliki KGD tidak normal (>200 mg/dL) sebanyak 27 responden (69.2%). Pada variabel derajat ulkus diabetik responden mayoritas derajat I yaitu sebanyak 16 orang (41,0%).	terhadap kadar glukosa darah dengan terjadinya luka pada kaki, sedangkan yang akan saya teliti nanti akan lebih berfokus dulu ke kadar glukosa darah dan kondisi ulkus diabetik
5.	(Taharuddin, 2017)	Efektifitas pelaksanaan model konservasi discharge	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas	Penelitian ini merupakan penelitian quasy experimental dengan pre-test and post-test	Dapat disimpulkan bahwa model konservasi discharge planning terstruktur lebih efektif dalam perubahan derajat luka dan kadar glukosa	Terdapat perbedaan dimana pada jurnal ini menerapkan salah satu model yaitu konservasi discharge planning terhadap


		<p>planning terstruktur terhadap perubahan derajat luka dan kadar glukosa darah pada pasien ulkus diabetikum</p>	<p>pelaksanaan model konservasi discharge planning terhadap perubahan derajat luka dan kadar glukosa darah pada pasien ulkus diabetikum di Klinik Kitamura Pontianak.</p>	<p>with control group design. Jumlah sampel 36 respondendengan tehknik insidental sampling (18 intervensi dan 18 kontrol dengan random sampling) yang diberikan intervensi discharge planning. Analisis data menggunakan t-test untuk kadar gula darah dan uji nonparametric test untuk derajat luka.</p>	<p>darah. Diharapkan agar model konservasi discharge planning terstruktur dapat dijadikan sebagai model discharge planning di tempat pelayanan kesehatan pasien ulkus diabetikum.</p>	<p>luka ulkus diabetik, sedangkan yang akan saya teliti nantinya tidak menggunakan model atau intervensi apapun hanya saja ingin menganalisis kadar glukosa darah dan luka ulkus diabetik</p>
6.	(Mega	Analisis interpretasi	Tujuan penelitian	Jenis penelitian yang digunakan adalah	Dari 30 responden yang diteliti berdasarkan jenis ulkusnya,	Terdapat perbedaan yang di teliti oleh (Megawati,

	wati, 2020).	kadar GDS, dan GDP, pasien diabetes melitus tipe II yang mengalami dan tidak mengalami ulkus dikubitus di RSUD Dr Pirngadi medan tahun 2019	adalah untuk melihat gambaran pasien ulkus diabetik berdasarkan jenis ulkusnya, mengetahui rerata kadar GDS dan GDP pada pasien diabetes melitus Tipe II yang mengalami dan tidak mengalami	dengan deskriptif dengan tehnik accidental sampling yang berdasarkan data sekunder dari rekam medik dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang yang mengalami ulkus diabetik dan 30 orang yang tidak mengalami ulkus diabetik.	70% diantaranya adalah ulkus yang sudah sampai terjadi abses. Nilai rerata kadar GDS(Glukosa darah Sewaktu) pada penderita diabetes melitus Tipe II yang mengalami ulkus diabetik adalah 264,8 mg/dl. Nilai rerata kadar GDP (Glukosa Darah Puasa) pada penderita diabetes melitus tipe II yang mengalami ulkus diabetik adalah 173,5 mg/dl. 4. Perbedaan GDS responden diabetes melitus Tipe II yang mengalami dengan yang tidak mengalami ulkus diabetik senilai 44,8 mg/dl, sedangkan perbedaan GDPnya senilai 27 mg/dl.	2020, dimana di penelitiannya membandingkan antara yang terkena ulkus diabetik dan yang tidak terkena dikubitus dengan kadar glukosa darahnya, sedangkan yang ingin saya teliti antinya hanya berfokus ke pasien yang mempunyai luka diabetik dan di sesuaikan dengan kadar glukosa darahnya
--	--------------	---	---	--	---	--

			<p>ulkus diabetik, dan mengetahui perbedaan nilai rerata kadar GDS dan GDP pada pasien diabetes melitus Tipe II yang mengalami dan tidak mengalami ulkus diabetik.</p>			
7.	(Kasum ayanti &	Gambaran Kadar Gula Darah	Tujuan penelitian ini adalah	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini	Dari hasil penelitian pada analisa univariat didapatkan bahwa dari 32 Responden	Terdapat sedikit perbedaan dari jurnal ini, dimana ingin melihat pasien

	Maharani, (2021)	Penderita Diabetes Melitus Tipe II Yang Mendapatkan Diabetes Self Management Education (DSME) Di Desa Sungai Pinang Wilayah Kerja UPT BLUD Puskesmas Tambang.	untuk mengetahui gambaran kadar gula darah penderita diabetes mellitus Tipe II yang mendapatkan Diabetes Self-Management Education (DSME) di Desa Sungai Pinang Wilayah Kerja UPT	adalah penelitian deskriptif.	sebagian besar umur 45 tahun 12 orang (37.5%), sebagian besar jenis kelamin perempuan 18 orang (56.2%), sebagian besar pendidikan SMP 15 orang (46.9%), sebagian besar memiliki kadar gula darah tidak normal sebanyak 25% (78%). Dengan diketahuinya hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kadar gula darah responden sehingga diharapkan bagi responden untuk lebih optimal dalam mengontrol kadar gula darah dengan menerapkan Diabetes Self Manajemen Education (DSME) sehingga kadar gula darah berada dalam	diabetes melitus yang Mendapatkan diabetes Self management, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan langsung berfokus ke analisis kadar glukosa darah dan kondisi ulkus diabetik.
--	------------------	---	---	-------------------------------	--	---

			BLUD Puskesmas Tambang Tahun 2021.		rentang normal.	
--	--	--	---	--	-----------------	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kadar Glukosa Darah

1. Definisi Kadar Glukosa Darah

Glukosa darah adalah glukosa yang di alirkan melalui darah sebagai sumber sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Umumnya tingkat glukosa dalam darah bertahan pada batas-batas 4-8 mmol/L/Hari (70-150 mg/dl), kadar ini meningkat setelah makan dan biasanya berada pada level terendah di pagi hahi sebelum mengonsumsi makanan (Nadrati et al., 2021). Kadar glukosa darah adalah jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah, kadar glukosa darah digunakan untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus (Lede, 2018).

2. Metode Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah

Ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap glukosa darah antara lain yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah puasa (GDP), glukosa darah sewaktu (GDS), dan glukosa 2 jam setelah makan.

a. Glukosa darah sewaktu

Pemeriksaan yang dilakukan kapan saja atau dilakukan setiap waktu sepanjang hari tanpa memeperhatikan waktu makan terakhir.

b. Glukosa darah puasa

Pemeriksaan yang di lakukan setelah pasien berpuasa

selama 8-10 jam, yaitu untuk menghindari adanya peningkatan kadar glukosa darah lewat makanan yang mempengaruhi hasil tes yang di lakukan.

c. Glukosa 2 jam setelah makan

Pemeriksaan glukosa 2 jam setelah makan adalah pemeriksaan yang dilakukan 2 jam dihitung setelah pasien makan (Nadrati et al., 2021).

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kadar Glukosa Darah

1. Pola hidup

a. Konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat

Karbohidrat adalah salah satu bahan utama yang diperlukan oleh tubuh. Sehingga besar karbohidrat yang kita konsumsi terdapat dalam bentuk polisakarida yang tidak dapat di serap secara langsung. Oleh karena itu karbohidrat harus dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk dapat di serap melalui mukosa saluran pencernaan. Dan kebanyakan karbohidrat dalam makanan akan di serap kedalam aliran darah dalam bentuk monosakarida glukosa, jenis glukosa lain akan di ubh oleh hati menjadi glukosa.

b. Aktifitas fisik

Aktifitas fisik mempengaruhi kadar glukosa darah. Ini di buktikan jika aktivitas tubuh tinggi, maka penggunaan glukosa oleh otot akan ikut mengikat. Sintesis glukosa endogen akan

ditingkatkan untuk menjaga agar kadar glukosa dalam darah tetap seimbang. Dan ketika tubuh tidak dapat mengkompensasi kebutuhan glukosa yang tinggi akibat aktifitas fisik yang berlebihan, maka kadar glukosa tubuh akan menjadi terlalu rendah.

2. Hormon yang mempengaruhi kadar glukosa

a. Insulin

Hormon ini di hasilkan oleh sel-sel beta pada pulau-pulau *Langernas* pankreas sebagai reaksi langsung terhadap keadaan hiperglikemia. Hormon insulin mempunyai peranan sentral dalam mengatur konsentrasi glukosa. Insulin mempunyai efek segera meningkatkan glukosa di jaringan seperti jaringan adipose dan otot. Dan sebaliknya, hormon insulin tidak memiliki efek langsung terhadap penetrasi glukosa pada sel-sel hati.

b. Hormon tiroid

Kadar glukosa puasa tampak naik diantara pasien hipertiroid dan menurun diantara pasien hipotiroid. Pada pasien hipertiroid menggunakan glukosa dengan kecepatan yang normal atau meningkat, sedangkan hipotiroid mengalami penurunan kemampuan dalam menggunakan glukosa dan mempunyai sensitivitas terhadap insulin yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan orang normal.

c. Hormon glukagon

Hormon glukagon di produksi didalam pankreas oleh sel-sel alfa pulau langerhans, hormon ini dapat meningkatkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan pembebasan glukosa dari glikogen. Sebagian besar glukagon dikeluarkan dari peredaran oleh hati. Glikogen juga menambah glukoneogenesis dan glikoneolisis hati ikut berperan pada efek hiperglikemik dari glukagon (Suryati, 2021)

B. Konsep Diabetes Melitus

1. Definisi Diabetes Mellitus

Menurut *World Health Organization* (WHO), diabetes melitus merupakan penyakit metabolik kronis ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan serius pada organ jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit yang progresif dimana seseorang mengalami resistensi terhadap insulin secara bertahap (Trinovita, 2019).

Diabetes melitus (DM) adalah penyakit kronis progresif yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat. Lemak dan protein, mengarah ke hiperglikemia (kadar glukosa darah tinggi) (Maria, 2021).

2. Etiologi Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus diklasifikasikan, baik sebagai *insuline-dependen diabetes mellitus* (IDDM) maupun *non-insuline-dependen* (NIDDM).

Dengan penggunaan terapi insuline yang sudah biasa dengan kedua tipe diabetes melitus, IDDM sekarang di sebut sebagai DM tipe1 (*juvenile onset*) dan NIDDM sebagai DM tipe 2 (*maturity onset*).

- a. **Diabetes Melitus Tipe I.** Disebabkan destruktur sel betaautoimun biasanya memicu terjadinya defisiensi insulin absolut. Faktor herediter berupa antibodi sel islet, tingginya insiden HLA tipe DR3 dan DR 4. Faktor lingkungan berupa infeksi virus (virus coxsackie, enterovirus, retrovirus, mumps), defisiensi vitamin D, toksin lingkungan, menyusui jangk pendek, paparan dini terhadap protein kompleks, berbagai modifikasi epigenetik ekspresi gen juga terobsesi sebagai penyebab genetik berkembangnya diabetes mellitus tipe 1.
- b. **Diabetes Melitus Tipe II.** Akibat resistensi insulin perifer, defek progresif sekresi insulin, peningkatan gluconeogenesis. Diabetes mellitus tipe 2 dipengaruhi faktor lingkungan berupa obesitas, gaya hidup tidak sehat, diet tinggi karbohidrat. Diabetes mellitus tipe 2 memiliki presimtomatis yang panjang menyebabkan penegakan diabetes mellitus tipe 2 dapat tertunda 4-7 tahun.
- c. **Diabetes Melitus Gestasional.** Diabetes mellitus gestasional (2%-5% dari semua kehamilan). Diabetes mellitus yang di diagnosis selama hamil. Diabetes mellitus gestasional merupakan diagnosis diabetes melitus yang menerapkan untuk perempuan dengan intoleransi glukosa atau ditemukan pertama kali selama kehamilan.

Diabetes mellitus gestasional terjadi pada 2-5% perempuan hamil namun menghilang ketika kehamilannya berakhir. Diabetes mellitus ini lebih sering terjadi pada keturunan Amerika-Afrika, Amerika Hispanik, Amerika pribumi dan perempuan dengan riwayat keluarga diabetes mellitus atau lebih dari 4 kg saat lahir, obesitas juga merupakan faktor resiko, riwayat diabetes mellitus gestasional, sindrom ovarium polistik. Atau melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4,5 kg.

d. Diabetes Mellitus Tipe Lainnya. Diabetes mellitus tipe spesifik lain (1%-2% kasus terdiagnosis). Mungkin sebagai akibat dari defek genetik fungsi sel beta, penyakit pankreas misal kistik fibrosis, atau penyakit yang di induksi oleh obat-obatan. Diabetes mellitus mungkin juga akibat dari gangguan-gangguan lain atau pengobatan. Defek genetik pada sel beta dapat mengarah perkembangan diabetes mellitus. Beberapa hormon seperti hormon pertumbuhan, kortisol, glukagon, dan epinefrin merupakan antagonis atau menghambat insulin. Jumlah berlebihan dari hormon-hormon ini (seperti pada akromegali, sindrom cushing, glukagonoma, dan feokromositoma) menyebabkan diabetes mellitus. Selain itu obat-obat tertentu (glukokortikoid dan tiazid) mungkin menyebabkan diabetes mellitus. Tipe diabetes mellitus sekunder tersebut terhitung 1-2 % dari semua kasus diabetes mellitus terdiagnosis (Maria, 2021).

3. Patofisiologi Diabetes Mellitus

a. Patofisiologi diabetes mellitus tipe 1

Manifestasi Diabetes Mellitus tipe 1 terjadi akibat kekurangan insulin untuk menghantarkan glukosa menembus membran sel ke dalam sel. Molekul glukosa menumpuk dalam peredaran darah, mengakibatkan hiperglikemia. Hiperglikemia menyebabkan hiperosmolaritas serum, yang menarik air dari ruang intraseluler ke dalam sirkulasi umum. Peningkatan volume darah meningkatkan aliran darah ginjal dan hiperglikemia bertindak sebagai diuretik osmosis. Diuretik osmosis yang dihasilkan meningkatkan haluan urine. Kondisi ini disebut poliuria. Ketika kadar glukosa darah melebihi ambang batas glukosa biasanya sekitar 180 mg/dl-glukosa diekskresikan ke dalam urine suatu kondisi yang disebut glukosuria. Penurunan volume intraseluler dan peningkatan haluan urine menyebabkan dehidrasi, mulut menjadi kering dan sensor haus dia aktifkan, yang menyebabkan orang tersebut minum jumlah air yang banyak.

Glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tanpa insulin. Produksi energi menurun. Penurunan energi ini menstimulasi rasa lapar dan orang makan lebih banyak. Meski asupan makanan meningkat, berat badan orang tersebut turun saat tubuh kehilangan air dan memecah protein dan lemak sebagai upaya memulihkan sumber energi. Malaise dan kelelahan menyertai penurunan energi,

penglihatan yang buram juga umum terjadi, akibat pengaruh osmotik yang menyebabkan pemebengkakan lensa mata.

Oleh sebab itu, manifestasi klasik meliputi poliuria, polidipsia, dan polifagia, disertai dengan penurunan berat badan, malaise, dan keletihan. Bergantung pada tingkat kekurangan insulin, manifestasinya bervariasi dari ringan hingga berat. Orang dengan diabetes melitus tipe 1 membutuhkan sumber insulin eksogen untuk mempertahankan hidup.

b. Patofisiologi diabetes tipe 2

Patogenesis diabetes mellitus tipe 2 berbeda signifikan dari diabetes mellitus tipe 1 respons terbatas sel beta terhadap hiperglikemia tampak menjadi faktor mayor dalam perkembangannya. Sel beta terpapar secara kronis terhadap kadar glukosa darah tinggi menjadi secara progresif kurang efisien ketika merespons peningkatan glukosa lebih lanjut. Fenomena ini dinamai *desensitisasi*, dapat kembali dengan menormalkan kadar glukosa. Rasio *proinsulin* terhadap insulin tersekresi juga meningkat.

Diabetes mellitus tipe 2 adalah suatu kondisi hiperglikemia puasa yang terjadi meski tersedia insulin endogen. Kadar insulin yang dihasilkan pada diabetes mellitus tipe 2 berbeda-beda dan meski ada, fungsinya dirusak oleh resistensi insulin di jaringan perifer. Hati memproduksi glukosa lebih dari normal, karbohidrat

dalam makanan tidak dimetabolisme dengan baik, dan akhirnya pankreas mengeluarkan jumlah insulin yang kurang dari yang dibutuhkan.

Faktor utama perkembangan diabetes melitus tipe 2 adalah resistensi selular terhadap efek insulin. Resistensi ini ditingkatkan oleh kegemukan, tidak beraktifitas, penyakit, obat-obatan, dan pertambahan usia. Pada kegemuan, insulin mengalami penurunan kemampuan untuk memengaruhi absorpsi dan metabolisme glukosa oleh hati, otot rangka, dan jaringan adiposa. Hiperglikemia meningkat secara perlahan dan dapat berlangsung lama sebelum diabetes mellitus didiagnosis, sehingga kira-kira separuh diagnosis baru diabetes mellitus tipe 2 yang baru didiagnosis sudah mengalami komplikasi.

Proses patofisiologi dalam diabetes mellitus tipe 2 adalah resistensi terhadap aktifitas insulin biologis, baik di hati maupun jaringan perifer. Keadaan ini disebut sebagai resistensi insulin. Orang dengan diabetes mellitus tipe 2 memiliki penurunan sensitivitas insulin terhadap kadar glukosa, yang mengakibatkan produksi glukosa hepatic berlanjut, bahkan sampai dengan kadar glukosa darah tinggi. Hal ini bersamaan dengan ketidakmampuan otot dan jaringan lemak untuk meningkatkan ambilan glukosa. Mekanisme penyebab resistansi insulin perifer tidak jelas namun; namun, ini tampak terjadi setelah insulin berikatan terhadap

reseptor pada permukaan sel (Maria, 2021).

4. Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus

Peningkatan kadar glukosa darah, disebut hiperglikemia, mengarah kepada manifestasi klinis umum yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Pada diabetes mellitus tipe 1, onset manifestasi klinis mungkin tidak kentara dengan kemungkinan situasi yang mengancam hidup yang biasanya terjadi misal, ketoasidosis diabetikum. Pada diabetes mellitus tipe 2, onset manifestasi klinis mungkin berkembang secara bertahap yang klien mungkin mencatat sedikit atau tanpa manifestasi klinis selama beberapa tahun. Manifestasi klinis diabetes mellitus adalah peningkatan frekuensi buang air kecil/poliuria, peningkatan rasa haus dan munum/polidipsi, dan karena penyakit berkembang, penurunan berat badan meskipun lapar dan peningkatan makan/polifagi (Maria, 2021).

Terdapat beberapa tanda dan gejala diabetes mellitus tipe 2 yaitu sebagai berikut;

1. Poliuri (peningkatan pengeluaran urin)

Peningkatan pengeluaran urin mengakibatkan glikosuria karena glukosa darah mencapai kadar “ambang ginjal”, yaitu 180mg/dl pada ginjal yang normal. Dengan kadar glukosa darah 180mg/dl, ginjal sudah tidak bisa mereabsorpsi glukosa dari filtrat glomerulus sehingga timbul glikosuria. Karena glukosa menarik air, osmotik diuresis akan mengakibatkan

poliuria.

2. Polidipsia (peningkatan rasa haus)

Peningkatan pengeluaran urin yang sangat besar dapat menyebabkan dehidrasi ekstrasel. Dehidrasi intrasel mengikuti ekstrasel karena air intrasel akan berdifusi keluar sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi ke plasma yang hipertonik. Dehidrasi intrasel merangsang pengeluaran ADH (Antidiuretic hormone) dan menimbulkan rasa haus.

3. Polifagia (peningkatan rasa lapar)

Sel tubuh mengalami kekurangan bahan bakar sehingga pasien merasa sering lapar dan lemas, hal tersebut disebabkan karena glukosa dalam tubuh semakin habis sedangkan kadar glukosa dalam darah cukup tinggi.

4. Rasa lelah dan kelemahan otot

Rasa lelah dan kelemahan otot terjadi karena ketabolisme protein diotot dan ketidakmampuan organ tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai energi sehingga hal ini membuat pasien dengan diabetes mellitus sering merasa lelah.

5. Berat badan menurun

Turunnya berat badan pada pasien dengan diabetes mellitus disebabkan karena tubuh terpaksa mengambil dan membakar lemak dan protein sebagai energi (Anggit, 2017).

5. Komplikasi Diabetes Mellitus

Komplikasi diabetes mellitus dapat terjadi di antaranya komplikasi akut;

a. Hiperglikemia dan Ketoasidosis Diabetik

Kurangnya Hiperglikemia akibat saat glukosa tidak dapat diangkut ke dalam sel karena insulin. Tanpa tersedianya KH untuk bahan bakar sel. Sel hati mengubah simpanan glikogennya kembali ke glukosa/glikogenesis dan meningkatkan biosintesis glukosa/glukogenolisis. Namun, respons ini memperberat situasi dengan meningkatnya kadar glukosa darah bahkan lebih tinggi. Etiologi dan faktor resiko penyebab umum ketoasidosis diabetik termasuk berikut; memakai terlalu sedikit insulin, mangkir menggunakan insulin ketidakmampuan memenuhi peningkatan kebutuhan insulin yang dibuat oleh pembedahan, trauma, kehamilan, stres, pubertas atau infeksi, berkembangnya resistansi insulin melalui kehadiran antibodi insulin.

b. Sindrom hiperglikemia hiperosmolar nonketosis

Sindrom hiperglikemia hiperosmolar nonketosis (*hyperglycemic hyperosmolar nonketotic syndrome*) adalah varian ketoasidosis diabetik yang ditandai dengan hiperglikemia ekstrem (600-2.000 mg/dl), dehidrasi nyata, ketonuria ringan atau tidak terdeteksi, dan tidak ada asidosis. HHNS umumnya banyak terjadi pada klien lansia dengan diabetes melitus tipe 2.

c. Hipoglikemia

Hipoglikemia juga dikenal sebagai reaksi insulin hipoglikemia adalah ciri umum dari diabetes mellitus tipe 1 dan juga di jumpai di dalam klien tipe 2 yang di obati dengan insulin atau obat oral. Kadar glukosa darah yang tepat pada klien mempunyai gejala hipoglikemia bervariasi, tapi gejala itu tidak terjadi sampai kadar glukosa darah kurang dari 50-60 mg/dl. Etiologi dan faktor resiko, reaksi hiperglikemia mungkin terjadi akibat dari sebagai berikut; dosis berlebihan insulin atau sulfonilurea/ jarang di resepkan, menghindari makanan atau makan lebih sedikit dari biasanya, pemakaian tenaga berlebihan tanpa penambahan kompensasi karbohidrat, ketidakseimbangan nutrisi dan cairan disebabkan mual dan muntah, asupan alkohol, Kurang hati-hati atau kesalahan sengaja dalam dosis insulin *acting* menyebabkan hipoglikemia. Perubahan lain dalam jadwal makan atau pemberian insulin. Latihan fisik penuh semangat yang tidak diharapkan. Atau tidur lebih dari biasanya di pagi hari dapat juga menyebabkan hipoglikemia. Pengaruh alkohol, ganja, atau obat-obatan lain dapat menyamarkan kesadaran klien akan hipoglikemia pada tahap paling dini.

Komplikasi diabetes mellitus dapat terjadi di antaranya komplikasi kronis:

a. Komplikasi Mikrovaskular

komplikasi mikrovaskular merupakan penyakit arteri koroner, penyakit serebrovaskular, hipertensi penyakit pembuluh darah, infeksi. Kemudian komplikasi mikrovaskular yaitu retinopati, nefropati, ulkus tungkai dan kaki, neuropati sensorimotor, neuropati autonomy yaitu pupil, jantung, gastrointestinal, urogenital. Komplikasi kronis adalah penyebab utama kesakitan dan kematian pada klien diabetes mellitus. Perubahan ini banyak memengaruhi sistem tubuh dan dapat menghancurkan klien diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Komplikasi terkait diabetes di klasifikasikan sebagai 1 dan 2 tipe.

Peningkatan kadar glukosa darah terus menerus membuat ketidakseimbangan bahan yang digunakan untuk membuat matriks antar sel. Sistem enzim secara normal mengubah glukosa ke bentuk gula lain, seperti sultibol, fruktosa, sampai kadar glukosa darah lebih rendah. Sustibotol, fruktosa, dan glukosa mengumpul di membran basal sel dan di antara sel. Akumulasi sorbitol intraseluler menyebabkan edema intraseluler dan memengaruhi fungsi.

b. Komplikasi Makrovaskular

Komplikasi makrovaskular merupakan penyakit arteri koroner, penyakit serebrovaskular, dan penyakit pembuluh darah perifer adalah lebih umum, cenderung terjadi pada usia lebih awal,

dan lebih luas dan berat pada orang dengan diabetes melitus. Penyakit makrovaskular/ penyakit pembuluh besar mencerminkan aterosklerosis dengan penumpukan lemak pada lapisan dalam dinding pembuluh darah. Resiko berkembangnya komplikasi makrovaskular lebih tinggi pada diabetes mellitus tipe 1 daripada tipe 2. Penyakit makrovaskular, khususnya penyakit pembuluh darah koroner, paling umum penyebab kematian klien diabetes, terhitung 40-60 persen dari semua kasus penyakit makrovaskular terkait diabetes. Alasan paling umum klien di rawat inap adalah pengobatan komplikasi makrovaskular. Diabetes mellitus tidak hanya faktor resiko bebas untuk komplikasi ini tapi juga faktor resiko utama hipertensi dan hiperlipidemia (Maria, 2021).

6. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus

Penanganan dan pengobatan bertujuan untuk mengurangi gejala-gejala, mengusahakan keadaan gizi dimana berat badan ideal dan mencegah terjadinya komplikasi. Secara garis besar penanganan dan pengobatan dilakukan dengan:

1. Pengelolaan makanan

Diet yang di anjurkan yaitu diet rendah kalori, rendah lemak, rendah lemak jenuh, dan tinggi serat. Jumlah asupan kalori ditunjukkan untuk mencapai berat badan ideal. Selain itu, karbohidrat kompleks merupakan pilihan dan diberikan secara terbagi dan seimbang sehingga tidak menimbulkan

puncak glukosa darah yang tinggi setelah makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan berdasarkan 3J yaitu jumlah , jadwal dan jenis diet.

2. Latihan fisik

Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani teratur (3-4 kali seminggu kurang lebih selama 30 menit), jeda antara latihan jasmani tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes tipe dua, latihan jasmani dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, sehingga memperbaiki kendali kadar glukosa darah.

3. Monitor kadar glukosa darah

Pemantauan diabetes mellitus merupakan pengendalian kadar glukosa darah mencapai kondisi senormal mungkin. Dengan terkendalinya kadar glukosa darah maka akan terhindar dari keadaan hiperglikemia dan hipoglikemia serta mencegah terjadinya komplikasi.

4. Terapi

Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan hal yang utama dalam penatalaksanaan diabetes melitus. Namun bila diperlukan dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian obat antihiperglikemia oral tunggal atau kombinasi. pemberian obat antihiperglikemia oral ataupun insulin selalu dimulai dengan

dosis rendah, untuk kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respons kadar glukosa darah (Perkeni, 2015)

C. Konsep Ulkus Diabetik

1. Definisi Ulkus Diabetik

Kaki diabetik adalah infeksi, ulserasi, dan atau destruksi jaringan ikat dalam yang berhubungan dengan neuropati dan penyakit yang berhubungan dengan dengan neuropati dan penyakit vaskular perifer pada tungkai bawah (Istiqomah & Efendi, 2014). Luka diabetik adalah luka yang terjadi pada pasien diabetes yang melibatkan gangguan pada saraf peripheral dan autonomik, luka diabetik adalah luka atau lesi pada pasien diabetes mellitus yang mengakibatkan ulserasi aktif dan merupakan penyebab utama amputasi kaki (Lede, 2018).

2. Etiologi Ulkus Diabetik

Proses terjadinya kaki diabetik diawali oleh angiopati, neuropati, dan infeksi. Neuropati menyebabkan gangguan sensorik yang menghilangkan atau menurunkan sensasi nyeri kaki, sehingga ulkus dapat terjadi tanpa terasa. Gangguan motorik menyebabkan atrofi otot tungkai sehingga mengubah titik tumpu yang menyebabkan ulserasi kaki. Angiopati akan mengganggu aliran darah ke kaki, penderita dapat merasa nyeri tungkai sesudah berjalan dalam jarak tertentu. Infeksi sering merupakan komplikasi akibat berkurangnya aliran darah atau neuropati. Ulkus dikubitus bisa menjadi gengen kaki diabetik (Kaertika, 2017).

3. Patofisiologi Ulkus Diabetik

Ulkus kaki diabetes disebabkan tiga faktor yang sering di sebut trias, yaitu; iskemi, neuropat, dan infeksi. Kadar glukosa darah tidak terkendali akan menyebabkan komplikasi kronik neuropati perifer berupa neuropati sensorik, motorik, dan autonom.

Neuropati sensorik, biasanya cukup berat hingga menghilangkan sensasi proteksi yang berakibat rentan terhadap trauma fisik dan termal, sehingga meningkatkan resiko ulkus kaki. Sensori propriosepsi yaitu sesasi posisi kaki juga hilang.

Neuropati Motorik, mempengaruhi semua otot, mengakibatkan penonjolan abnormal tulang, arsitektur normal kaki berubah, deformitas khas seperti *hammer toe* dan *hallux rigidus*. Deformitas kaki menimbulkan terbatasnya mobilitas, sehingga dapat meningkatkan tekanan plantar kaki dan mudah terjadi ulkus.

Neuropati Autonom, ditandai dengan kulit kering, tidak berkeringat, dan peningkatan pengisian kapiler sekunder akibat pintasan arteriovenosus kulit. Hal ini mencetuskan timbulnya fisura, kerak kulit, sehingga kaki rentan terhadap trauma minimal. Hal tersebut juga dapat karena penimbunann sorbitol dan fruktosa yang mengakibatkan akson menghilang, kecepatan induksi menurun, perestesia, srta menurunnya refleks otot dan atrofil otot.

Penderita diabetes juga menderita kelainann vaskular berupa iskemi. Hal ini di sebabkan proses makroangiopati dan menurunnya

sirkulasi jaringan yang ditandai oleh hilang atau berkurangnya denyut nadi arteri dorsalis pedis, arteri tibialis, dan arteri poplitea; menyebabkan kaki menjadi atrofi, dingin, dan kaku menebal. Selanjutnya terjadi nekrosis jaringan, sehingga timbul ulkus yang biasanya dimulai dari ujung kaki atau tungkai.

Kelainan neurovaskular pada penderita diabetes diperberat dengan aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan kondisi arteri menebal dan menyempit karena penumpukan lemak didalam pembuluh darah. Menebalnya arteri di kaki dapat dapat mempengaruhi otot-otot kaki karena berkurangnya suplai darah, kesemutan, rasa tidak nyaman, dan dalam jangka lama dapat mengakibatkan kematian jaringan yang akan berkembang menjadi ulkus kaki diabetes. Proses anginopati pada penderita diabetes melitus berupa penyempitan penyumbatan pembuluh darah perifer tungkai bawah terutama kaki, akibat perfusi jaringan bagian distal tungkai berkurang.

Diabetes Melitus yang tidak terkontrol akan menyebabkan penebalan tunika intima/hiperplasia membran basalis arteri, pembuluh darah besar dan kapiler, sehingga aliran darah jaringan tepi ke kaki terganggu dan nekrosis yang menyebabkan ulkus diabetikum (Kaertika, 2017).

4. Faktor yang Mempengaruhi Ulkus Diabetik

Menurut Brunner dan Suddarth (2008), resiko infeksi pada kaki pasien diabetes mellitus meliputi; durasi diabetes lebih dari 10 tahun,

usia lebih dari 40 tahun, riwayat merokok, penurunan denyut nadi perifer, penurunan sensasi, deformitas anatomi atau area tekan (misalnya *bunion, callus, hammer toes*) (Nurhanifa, 2017).

Hal-hal yang meningkatkan resiko antara lain neuropati perifer dengan hilangnya sensasi protektif. Komplikasi kardiovaskular, retina dan ginjal, riwayat ulkus atau amputasi serta kelaianan kuku berat. Luka timbul spontan atau karena trauma, misalnya kemasukan pasir, tertusuk duri, lecet akibat sepatu atau sandal sempit dan bahan yang keras. Luka terbuka menimbulkan bau dari gas gangren, dapat mengakibatkan infeksi tulang (osteomielitis) (Kaertika, 2017).

5. Klasifikasi Ulkus Diabetik

Klasifikasi Wagner-Meggitt dikembangkan pada tahun 1970-an, digunakan secara luas untuk mengklasifikasi lesi pada kaki diabetes.

Klasifikasi kaki diabetik berdasarkan Wagner-Meggitt.

- a. Derajat 0, Simptom pada kaki seperti nyeri
- b. Derajat 1, Ulkus superfisial
- c. Derajat 2, Ulkus dalam
- d. Derajat 3, Ulkus sampai mengenai tulang
- e. Derajat 4, Gangren telapak kaki
- f. Derajat 5, gangren seluruh kaki



Gambar 1.1 Klasifikasi Ulkus Diabetik

Sumber (Nather,2016).

Klasifikasi Wagner-Meggitt dianjurkan oleh *international working group on diabetic foot* atau di sebut dengan IWGDE dan dapat diterima semua pihak agar memudahkan perbandingan hasil-hasil penelitian. Dengan klasifikasi ini akan dapat ditentukan kelainan yang dominan, vaskular, infeksi atau neuropatik dengan *ankle brachial index, filamet test, nefve conduction study, electromyography, autonomic testing*, sehingga pengelolaan lebih baik. Ulkus gengren dengan *critical limb ischemia* lebih memerlukan evaluasi dan perbaikan keadaan vaskularnya. Sebaliknya jika faktor infeksi menonjol, antibiotik harus adekuat. Sekiranya faktor mekanik yang dominan, harus diutamakan koreksi untuk mengurangi tekanan plantar (Kaertika, 2017).

6. Manifestasi Klinis Ulkus Diabetik

Tanda dan gejala ulkus diabetik (Arisanty, 2013)

- a. Sering kesemutan
- b. Nyeri kaki saat istirahat

- c. Sensasi rasa berkurang
- d. Kerusakan jaringan/nekrosis
- e. Penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis dan poplitea
- f. Kaki menjadi atrofi, dingin dan kaku menebal
- g. Kulit kering

7. Diagnosis Ulkus Uiabetik

Pemeriksaan Fisik

- a. Pemeriksaan ulkus dan keadaan umum ekstremitas.
- b. Penilaian resiko insufisiensi vaskular.
- c. Penilaian resiko neuropati perifer.

a. Ektremitas

Ulkus diabetik cenderung terjadi di daerah tumpuan beban terbesar, seperti tumit area kaput metatarsal di telapak, ujung jari yang menonjol/jari pertama dan jari kedua. Ulkus di malleolus terjadi karena sering mendapat trauma. Kelainan lain yang dapat ditemukan seperti *callus* hipertropik, kaku rapuh/pecah, kulit kering, *hammer toes* dan *fissure*.

b. Insufisiensi Arteri Parifer

Pemeriksaan fisik akan mendapatkan hilang atau menuruannya nadi perifer. Penemuan lainyang berhubungan dengan aterosklerosis meliputi bising arteri iliaka dan femoralis,

atrofi kulit, hilangnya rambut kaki, sianosis jari kaki, ulserasi dan nekrosis iskemik, serta pengisian arteri tepi lebih dari 2 detik.

c. Neuropati Perifer

Tanda neuropati perifer meliputi hilangnya sensasi rasa getar dan posisi, hilangnya reflek tendon dalam, ulserasi tropik, *foot drop*, atrofi otot, dan pembentukan *callu* hipertropik khususnya di daerah penekanan misalnya tumit (Kaertika, 2017).

8. Penatalaksanaan Ulkus Diabetik

Tujuan utama pengelolaan ulkus diabetik yaitu untuk mengakses proses kearah penyembuhan luka secepat mungkin karena memperbaiki dari ulkus kaki dapat menurunkan kemungkinan terjadinya amputasi dan kematian pasien diabetes. Secara umum penanganan ulkus kaki diabetik meliputi:

a. Penanganan iskemia

Perfusi arteri merupakan hal penting dalam proses penyembuhan dan harus dinilai awal pada pasien ulkus kaki diabetik. Penilaian kompetensi vaskular pedis pada ulkus kaki diabetik seringkali memerlukan bantuan pemeriksaan penunjang seperti MRI angiogram, *depler* maupun angiografi pemeriksaan sederhana seperti perabaan pulsasi arteri poplitea, tibialis posterior dan dorsalis pedis dapat dilakukan pada kasus ulkus diabetik kecil yang tidak disertai edema ataupun selulitis yang luas. Ulkus atau gangren kaki tidak akan sembuh bahkan

dapat menyerang tempat lain dikemudian hari bila penyempitan pembuluh darah kaki tidak di atasi .

b. Debridemen

Debridemen merupakan upaya untuk membersihkan semua jaringan nekrotik, karena luka tidak akan sembuh bila masih terdapat jaringan *nonviabel*, debris dan fistula. Tindakan debribemen juga dapat menghilangkan koloni bakteri pada luka. Saat ini terdapat eerapa jenis debridemen yaitu autolitik, enzimatik, mekanik, biologik dan tajam.

c. Perawatan luka

Prinsip perawatan luka yitu meciptakan lingkungan *moist wound healing* atau menjaga agar luka senantiasa dalam keadaan lembab. Bila ulkus memproduksi sekret maka untuk pembalut/*dressing* digunakan yang bersifat absorben. Sebaliknya bila ulkus kering maka digunakan pembalut yang mampu melembabkan ulkus. Bila ulkus cukup lembab, maka dipilih pembalut ulkus yang dapat mempertahankan kelembaban.

d. Menurunkan tekanan pada plantar pedis (*off-loading*)

Tindakan *off-loading* merupakan salah satu prinsip utama dalam penatalaksanaan ulkus kronik dengan dasar neuropati. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada telapak kaki. Tindakan *off-loading* dapat dilakukan secara persial

maupun total. Mengurangi tekanan pada ulkus neuropati dapat mengurangi trauma dan mempercepat proses penyembuhan luka.

e. Penanganan bedah

Jenis tindakan bedah tergantung pada dari berat ringannya ulkus kaki diabetik. Tindakan efektif ditujukan untuk menghilangkan nyeri akibat deformitas seperti pada kelainan *spur* tulang, *hammertoes* atau *bunions*. Tindakan bedah profilaktif diindikasikan untuk mencegah terjadinya ulkus atau ulkus berulang pada pasien yang mengalami neuropati dengan melakukan koreksi deformitas seni tulang atau tendo.

f. Penanganan komorbiditas

Diabetes merupakan penyakit sistemik multiorgan sehingga komorbiditas lain harus dinilai dan di kelolah melalui pendekatan tim multidisiplin untuk mendapatkan hasil optimal.

g. Mencegah kambuhnya ulkus

Pencegahan dianggap sebagai elemen kunci dalam menghindari amputasi kaki . pasien diajarkan untuk memperhatikan kebersihan kaki, memeriksa kaki setiap hari, menggunakan alas kaki yang tepat mengobati segera jika terdapat luka, pemeriksaan rutin ke podiatri, termasuk debridemen pada kapalan dan kuku kaki yang tumbuh ke dalam.

h. Pengelolaan infeksi

Infeksi pada ulkus kaki diabetik merupakan faktor pemberat yang turut menentukan derajat agresifitas tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan ulkus kaki diabetik. Di lainpihakiinfeksi pada ulkus kaki diabetik mempunyai permasalahan sendiri dengan adanya berbagai resiko seperti status lokasi maupun sistemik yang *imunocompromised* pada pasien diabetes mellitus, resistensi mikroba terhadap antibiotik, dan jenis mikroba yang ada kalanya memerlukan antibiotik spesifik yang mahal dan berkepanjangan (Langi, 2011).

9. Pengkajian Luka Skala BWAT (*Bates Jensen Wound Assesment Tool*).

BWAT (*Bates jensen wound assesment tool*) merupakan skala yang dikembangkan dan digunakan untuk mengkaji kondisi luka ulkus diabetik. Skala ini sudah teruji validasi dan rehabilitasinya, sehingga alat ini sudah bisa digunakan. Nilai yang dihasilkan dari skala ini menggambarkan status keparahan luka, semakin tinggi nilai yang dihasilkan maka menggambarkan pula status luka pasien yang semakin parah.

BWAT terdiri dari 13 item pengkajian yang terdiri dari; *Size, Depth, Edges, Undermining, Necrotic tissue type, Necrotic tissue amount, Exudate type, Exudate amount, Skin color surrounding wound, peripheral tissue edema, Pheriperal tissue incharation,*

Granulation tissue, dan Epithelialisation. Dari ke 13 item tersebut digunakan sebagai pengkajian luka ulkus diabetik pada pasien. Setiap item diatas mempunyai nilai yang menggambarkan status luka teka pasien(Rasyid et al., 2018)

D. Diabetes Melitus Dalam Perspektif Islam

Islam dalam anjurannya telah telah memberikan cara menghindari penyakit diabetes melitus , misalnya mengatur pola makan dan gaya hidup sederhana dan jangan berlebihan untuk mengontrol kadar glukosa darah.

Ajaran Islam sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan. Maka ajara Islam mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup seimbang dan tidak berlebihan. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Thaha/20:81.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ
عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

Terjemahnya:

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh, binasalah dia (Kementrian Agama).

Tafsir Al Jalalain berpendapat bahwa (makanlah diantara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian) yakni nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian, (dan janganlah melapauai batas padanya), seumpamanya kalian meningkari nikmat-nikmat itu (yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian). Bila dibaca Yahilla artinya wajib

kemurkaanku menimpa kalian, bila dibaca Yahulla artinya, pastikemurkaanku menimpa kalian (dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku) lafal Yahlil dapat pula dibaca Yahlul (maka sungguh binasalah ia) terjerumuslah ia kedalam neraka (Al-Mahalli & As-suyuthi, 2018).

Asumsi peneliti bahwa, ayat tersebut menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan, terutama tidak berlebihan dalam segala sesuatu termasuk dalam mengenai makanan. Hal ini bisa dikaitkan dengan faktor penyebab diabetes melitus, antara lain karena pola makanan yang tidak baik, kegemukan serta faktor lainnya yang dapat berdampak pada kerusakan ginjal dan pankreas yang berfungsi untuk memproduksi insulin sebagai penetral glukosa darah.

Hal senada dapat ditemukan didalam surah al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya:


Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (Kementrian Agama).

Tafsir Al Jalalain berpendapat bahwa ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan, (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang

terdapat dimuka bumi), halal menjadi ‘hal’ (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu), artinya jelas dan terang permusuhannya itu (Al-Mahalli & As-suyuthi, 2018).


Asumsi peneliti bahwa, ayat ini menjelaskan bahwa kita di anjurkan makan makanan yang halal dan baik. Dimana hal tersebut juga berkaitan dengan kesehatan terutama terkait dengan pola makan, serta makan dengan makanan yang halal dan jangan melampaui batas, makan dan minumlah sesuai kebutuhan, karena salah satu untuk menjaga agar kadar glukosa darah lebih stabil perlu melakukan gaya hidup yang sehat seperti salah satunya mengatur pola makan, jenis makanan serta jumlah makanan porsi makanan yang dibutuhkan didalam tubuh.

E. Kerangka Teori



Gambar 1 Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep




Keterangan:

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

Gambar 2 Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitik* dengan rancangan pendekatan *cross-sectional* yang merupakan penelitian yang mengamati data-data populasi atau sampel satu kali saja pada saat yang sama, dan berfokus pada waktu pengukuran atau observasi data variabel (Nursalam, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah dan kondisi luka dikubitus pada pasien diabetes melitus.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa klinik yang ada di daerah Makassar, yaitu di Klinik ETN Center Makassar, Klinik Griya Afiat.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juli 2022.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh subjek yang akan diteliti dan memenuhi karakteristik yang telah ditentukan (Adiputra et al., 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien ulkus diabetik yang melakukan perawatan di Klinik ETN Center Makassar, Klinik Griya Afiat, dengan total populasi 18.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, A, 2021). Besar sampel pada penelitian ini ditentukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Kriteria Inklusi

1. Semua pasien ulkus diabetik.
2. Pasien yang sedang melakukan perawatan luka di klinik tersebut.
3. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Bersedia menjadi responden.

b. Kriteria Eksklusi

1. Pasien yang mempunyai kondisi penurunan kesadaran.
2. Pasien yang mempunyai komplikasi penyakit jantung dan gagal ginjal.
3. Pasien tidak kooperatif.

Penentuan besar sampel ditentukan dengan rumus *Slovin* Sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

D = Tingkat Singnifikasi (1%, 5%, 10%)

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N (d)^2} \\
 &= \frac{18}{1 + 18 (d)^2} \\
 &= \frac{18}{1 + 18 (0,10)^2} \\
 &= \frac{18}{1,18}
 \end{aligned}$$

15,2 (15) Responden

Jadi, jumlah sampel yang akan diteliti berdasarkan rumus di atas sebanyak 15 responden.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling merupakan suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga sebuah sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *teknik random sampling* dimana yang merupakan pengambilan sampel secara acak sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi (Rofflin, 2021).

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Mamik, 2015).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu pengambilan data awal dan penelitian. Pengumpulan data awal dilakukan dengan:

1. Melakukan analisis artikel untuk menemukan fenomena/masalah penelitian
2. Pengumpulan data responden dan jumlah populasi yang dilakukan dengan memasukkan surat pengambilan data awal di Klinik ETN Center Makassar, Klinik Griya Afiat,
3. Pengumpulan data pada tahap penelitian dilakukan dengan memasukkan surat izin melakukan penelitian terlebih dahulu di Klinik tempat meneliti, kemudian data di peroleh dilokasi penelitian.
4. Menentukan responden dengan cara teknik random sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusif.
5. Memberikan lembar informed consent kepada responden.
6. Responden diminta untuk mengisi kuesioner karakteristik responden.
7. Mengecek kadar glukosa darah responden dengan alat glukometer, dan waktu pemeriksaan dilakukan pada saat responden datang ke klinik tersebut.
8. Kemudian melakukan pengkajian luka ulkus diabetik menggunakan Skala BWAT [*Bates jensen wound assesment tool*], dan waktu pelaksanaanya setelah dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah.
9. Kemudian pengolahan data kadar glukosa darah dan kondisi luka ulkus diabetik menggunakan Uji Deskriptif.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau sampel mengenai topik atau masalah yang diteliti (Kurniawan, 2021).

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar kuesioner karakteristik responden dan lembar observasi untuk mengetahui hubungan kadar glukosa darah dengan kondisi luka Ulkus Diabetik. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Glukometer untuk mengukur kadar glukosa darah, dan menggunakan pengkajian Skala BWAT (*Bates Jensen Wound Assesment*) untuk mengukur derajat luka ulkus diabetik. Pengkajian skala BWAT sudah diuji validitas dan realibilitasnya oleh peneliti sebelumnya (Karahana, 2014), dengan menggunakan foto atau gambar, dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil *content validity agreement* 0.82, reinterater dari reliabilitas instrumen 0.82, konsistensi internal di hitung dengan cronbach alpha 0,85.

G. Tehnik Pengolahan Dan Penyajian Data

Pengolahan data merupakan bagian dari proses penelitian. Menurut (Notoatmodjo, 2012)

a. *Editing*

Editing merupakan upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

b. *Coding*

Setelah data diedit atau di sunting, selanjutnya dilakukan ‘‘pengkodean’’ atau *coding*’’ yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan.

c. *Data Entry*

Data yang dalam bentuk ‘‘kode’’ angka atau huruf dimasukkan ke dalam program atau ‘‘software’’ komputer. Dalam proses ini di tuntut ketelitian orang yang melakukan ‘‘*data entry*’’.apabila tidak maka akan terjadi bias, meskipun hanya memasukkan data.

d. *Cleaning*

Apabila semua data dari setiap sumber atau responden selesai di masukkan, perlu dicek kembali untuk melihat keungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya. Kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. Proses ini disebut pembersihan data/*data cleaning*.

e. *Tabulating*

Tabulating yakni membuat tabel-tabel data, sesuai dengan tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti. Tabel yang akan tabulasi adalah tabel yang berisikan data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah

fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data (Siyoto, 2015). Adapun tujuan melakukan analisa data yaitu untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan dan memperoleh kesimpulan secara umum dari penelitian yang merupakan kontribusi dalam pengembangan pembangan ilmu yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2012). Penelitian ini menggunakan Analisis Univariat. Uji yang digunakan dalam analisis univariat adalah Uji Analisis Deskriptif.

I. Kode Etik Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, sudah seharusnya seorang peneliti memperhatikan kode etik yang merupakan suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian, melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti, maupun masyarakat yang akan memperoleh dampak dari hasil penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini, penelitian menekankan ada beberapa etika yang sebagai berikut;

1. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Dimana peneliti tidak memberikan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan responden. Namun peneliti hanya menggunakan coding sebagai pengganti dari identitas responden. Dengan kata lain, informasi yang telah didapatkan oleh peneliti tidak akan tersebar ke orang lain dan hanya di pergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini hanya menggunakan inisial nama dalam menjaga merahasiaan responden.

2. *Justice* (Keadilan)

Dimana penelitian ini mempunyai prinsip keterbukaan serta adil dan yang perlu di jaga peneliti yaitu kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. Untuk prinsip keterbukaan, peneliti menjelaskan tentang prosedur penelitian. Kemudian, prinsip keadilan dimana peneliti menjamin semua subjek dalam peneliti, memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama. Dimana penelitian ini tidak membedakan untuk semua responden yang ada di kota makassar.

3. *Beneficence* (Manfaat)

Dalam penelitian diharapkan agar memperoleh manfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat pada umumnya dan terkhusus untuk responden penelitian. Di penelitian ini mempunyai resiko sangat rendah dikarenakan dalam penelitian ini memberikan pernyataan dalam bentuk kuisioner dan tidak melakukan perlakuan ataupun uji coba.

4. *Non Maleficence*

Dalam penelitian ini mempunyai kewajiban agar tidak menyebabkan bahaya bagi responden. Responden bisa memutuskan apakah akan ikut andil dalam penelitian tanpa adanya resiko yang merugikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Klinik Griya Afiat Makassar

Griya Afiat Makassar merupakan klinik perawatan luka yang terletak di Jl. Syekh Yusuf, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Griya Afiat didirikan pada tahun 2008. Griya Afiat sudah menangani berbagai jenis luka seperti diantaranya luka kaki diabetes, luka arteri, luka vena, luka kanker, luka bakar, luka operasi, luka section caesar, luka dikubitus, klinik griya afiat ini juga memberikan pelayanan home care. Adapun misi dari Klinik Griya Afiat yaitu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dan terpadu.

2. Klinik ETN Centre Makassar

Klinik ETN Centre Makassar merupakan klinik perawatan luka yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Klinik Etn Centre ini merupakan rumah pusat perawatan luka bagi penderita luka, seperti stoma, inkontensia, luka dikarenakan diabetes, luka bakar dan luka lainnya. ETN Centre juga memberikan sarana kemudahan dalam berkonsultasi tentang luka yang diderita, dengan teknologi mutakhir rumah perawatan luka ETN Centre adalah sarana kesehatan uka dengan sistem cara modern penanganannya.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang gambaran kadar glukosa darah dan kondisi luka ulkus diabetik pada pasien diabetes melitus, penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 27 Mei-7 Juni 2022. Responden dalam penelitian ini adalah pasien ulkus diabetik sebanyak 15 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan hasil data penelitian yang diperoleh berupa angka-angka, kemudian desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia,
Jenis Kelamin, Pekerjaan.

Karakteristik	Frekuensi	Presentase
Usia		
Dewasa Awal = 26-35	-	0,0%
Dewasa Akhir = 36-45	3	20,0%
Lansia Awal = 45-55	5	33,3%
Lansia Akhir = 56-65	4	26,7%
Masa Manula = >65	3	20,0%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	6	40,0%
Perempuan	9	60,0%
Pekerjaan		
Bekerja	4	26,7%
Tidak bekerja	11	73,3%

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa jika dilihat dari usia, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu usia 45-55 tahun dengan jumlah responden sebanyak 5 (33,3%). Jika dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden ialah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 9 (60,0%). Jika dilihat dari segi pekerjaan, mayoritas responden ialah yang tidak bekerja dengan jumlah responden 11(73,3%).

2. Analisis Univariat

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Kadar Glukosa Darah Pasien Diabetes Meliitus

Kadar Glukosa Darah	Frekuensi	Presentase
Rendah = < 100 mg/dl	1	6,7%
Normal = < 200 mg/dl	4	26,7%
Tinggi = > 200 mg/dl	10	66,7%
Total	15	100%

Tabel 4.2 didapatkan bahwa, kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus lebih banyak mengalami kadar glukosa darah yang tinggi, dengan presentase 66,7% dengan jumlah responden 10 orang. Sedangkan presentase untuk responden dengan kadar glukosa darah normal dengan presentase 26,7%, dengan jumlah responden sebanyak 4 orang. Dan untuk responden dengan kadar glukosa darah rendah sebanyak 1 orang dengan presentase 6,7%.

Tabel 4.3

Distribusi Fekuensi Status Kondisi Luka Pasien Diabetes Melitus

Indikator Status Kondisi Luka	Frekuensi	Presentase
Jarinagan Sehat: Skor 1-13	1	6,7%
Regenerasi Luka: Skor 13-59	13	86,7%
Degenerasi Luka: Skor 60-65	1	6,7%
Total	15	100%

Tabel 4.3 didapatkan bahwa status kondisi luka pada responden diabetes melitus lebih banyak dengan kategori kondisi luka regenerasi luka: skor 13-59 dengan presentase 86,7%, dengan jumlah responden sebanyak 13 orang, dan yang memiliki status kondisi luka dengan degenerasi luka: skor 60-65 sebanyak 1 orang dengan presentase 6,7%, dan yang memiliki status kondisi luka jarinagan sehat: skor 1-12 ialah sebanyak 1 responden dengan presentase 6,7%.

Tabel 4.4
Frekuensi Kadar Glukosa Darah Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan.

Kadar Glukosa Darah	Frekuensi					Total
	1 (26-35)	2 (36-45)	3 (45-55)	4 (56-65)	5 (> 65)	
Usia						15
Rendah = < 100 mg/dl	-	-	1	-	-	
Normal = < 200 mg/dl	-	1	-	2	1	
Tinggi = > 200 mg/dl	-	2	4	2	2	
Presentase	0,0%	20,0%	33,3%	26,7%	20,0%	100,0%
Jenis Kelamin	1 Laki-laki		2 Perempuan			15
Rendah = < 100 mg/dl	1		-			
Normal = < 200 mg/dl	2		2			
Tinggi = > 200 mg/dl	3		7			
Presentase	40,0%		60,0%			100%
Pekerjaan	1 Bekerja		2 Tidak Bekerja			15
Rendah = < 100 mg/dl	1		-			
Normal = < 200 mg/dl	1		3			
Tinggi = > 200 mg/dl	2		8			
Presentase	26,7%		73,3%			100%

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa, kadar glukosa darah berdasarkan usia, mayoritas berada dikategori kadar glukosa darah tinggi yaitu sebanyak 10 responden, 4 diantaranya berada di usia lansia awal yaitu 45-55 tahun, 2 diantaranya berada di usia dewasa akhir yaitu 36-45 tahun, 2 diantaranya berada diusia lansia akhir 56-65 tahun, dan 2 responden berada di usia >65 tahun. Responden dengan kadar glukosa darah berdasarkan jenis kelamin, didapatkan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 9 responden, 7 diantaranya

mempunyai kadar glukosa darah tinggi, dan 2 diantaranya mempunyai kadar glukosa darah normal. Responden kadar glukosa darah berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden tidak bekerja, yaitu sebanyak 11 responden, 8 responden diantaranya mempunyai kadar glukosa darah tinggi, dan 2 diantaranya mempunyai kadar glukosa darah normal.

Tabel 4.5
Frekuensi Kondisi Luka Ulkus Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan.

Kondisi Ulkus Diabetik	Frekuensi					Total
	1 (26-35)	2 (36-45)	3 (45-55)	4 (56-65)	5 (>65)	
Usia						15
Jarinagan Sehat: Skor 1-13	-	1	-	-	-	
Regenerasi Luka: Skor 13-59	-	1	5	4	3	
Degenerasi Luka: Skor 60-65	-	1	-	-	-	
Presentase	0,%	20,0%	33,3%	26,7%	20,0%	100,%
Jenis Kelamin	1 Laki-laki		2 Perempuan			15
Jarinagan Sehat: Skor 1-13	-		1			
Regenerasi Luka: Skor 13-59	6		7			
Degenerasi Luka: Skor 60-65	-		1			
Presentase	40,0%		60,0%			100%
Pekerjaan	1 Bekerja		2 Tidak Bekerja			15
Jarinagan Sehat: Skor 1-13	-		1			
Regenerasi Luka: Skor 13-59	4		9			
Degenerasi Luka: Skor 60-65	-		1			
Presentase	26,7%		73,3%			100%

Bedasarkan tabel 4.5 didapatkan bahwa, kondisi luka ulkus diabetik berdasarkan usia, mayoritas berada di kategori regenerasi luka yaitu sebanyak 13 responden, 5 diantaranya berada di usia lansia awal 45-55 tahun, 4 responden berada di usia lansia akhir 56-65 tahun, 3 responden

berada di usia >65 tahun, dan 1 responden berada di usia dewasa akhir 36-45 tahun. Sedangkan responden dengan kondisi ulkus diabetik berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 9 responden, 7 diantaranya mempunyai kondisi luka berada di kategori regenerasi luka, 1 responden mempunyai kondisi luka degenerasi luka, dan 1 responden berada di kategori kondisi luka jaringan sehat. Responden dengan kondisi luka ulkus diabetik berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden tidak bekerja yaitu sebanyak 11 orang, 9 diantaranya berada di kategori kondisi luka regenerasi luka, 1 responden berada di kategori degenerasi luka, dan 1 responden berada di kategori jaringan sehat.

Tabel 4.6
Frekuensi Pengkajian Luka Pada Pasien Diabetes Melitus.

Item Pengkajian	Jumlah Responden	Persentase
1. Ukuran		
1 = < 4 cm	3	20%
2 = 4 s/d < 16 cm ²	11	73%
3 = 16 s/d < cm ²	1	7%
4 = 36 s/d < 80 cm ²	0	0
5 = > 80 cm ²	0	0
Total	15	100%

Pada bagian pengkajian ukuran luka, mayoritas responden mempunyai besar ukuran luka yaitu 4 s/d < 16 cm², dengan jumlah responden sebanyak 11 orang (73%).

2. Kedalaman		
1. Eritema atau kemerahan	1	7%
2. Leserasi lapisan epidermis dan atau dermis	6	40%
3. Seluruh lapisan kulit hilang, kerusakan atau nekrosis subkutan, tidak mencapai fascia, tertutup jaringan granulasi	5	33%
4. Tertutup jaringan nekrosis	3	20%
5. Seluruh lapisan kulit hilang dengan dekstruksi luas, kerusakan jaringan otot, tulang.	0	0
Total	15	100%

Pada pengkajian kedalaman luka, mayoritas responden berada pada kategori leserasi lapisan epidermis dan atau dermis, dengan jumlah responden 6 orang (40%).

3. Tepi Luka		
1. Samar, tidak terlihat dengan jelas	2	13%
2. Batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka	4	27%
3. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka	9	60%
4. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal	0	0
5. Jelas, fibrotik, perut tebal/hiperkeratonik	0	0
Total	15	100%

Pada bagian tepi luka, mayoritas responden yang mempunyai bagian tepi luka yang jelas, tidak menyatu dengan dasar luka sebanyak 9 responden (60%).

4. Terowongan/goa		
1. Tidak ada gua	5	33%
2. Gua < 2 cm diarea manapun	5	33%
3. Gua 2 – 4 cm seluas <50% pinggir luka.	4	27%
4. Gua 2 – 4 cm seluas >50% pinggir luka.	1	7%
5. Gua > 4 cm diarea manapun.	0	0
Total	15	100%

Pada bagian pengkajian luka pada bagian terowongan luka /goa, mayoritas responden mempunyai kedalaman goa < 2-4 cm di area

manapun, sebanyak 5 responden (33%).

5. Tipe Jaringan Nekrotik		
1. Tidak ada jaringan nekrotik	2	13%
2. Putih/abu-abu jaringan tidak dapat teramati dan atau jaringan nekrotik kekuningan yang mudah dilepas.	8	53%
3. Jaringan nekrotik kekuningan yang melekat tapi mudah dilepas.	4	27%
4. Melekat, lembut, eskar hitam.	1	7%
5. Melekat kuat, keras, eskar hitam	0	0
Total	15	100%

Pada bagian tipe jaringan nekrotik pada hasil pengkajian pada responden yang terdiri dari 15 responden, didapatkan mayoritas responden mempunyai tipe jaringan nekrotik yang berwarna putih/abu-abu jaringan tidak dapat teramati dan atau jaringan nekrotik kekuningan yang mudah dilepas, sebanyak 8 responden (53%).

6. Jumlah Jaringan Nekrotik		
1. Tidak jaringan nekrotik.	3	14%
2. < 25% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik.	6	43%
3. 25 % permukaan Luka tertutup jaringan nekrotik.	2	14%
4. > 50% dan < 75% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik.	2	14%
5. 75% s/d 100% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik.	2	14%
Total	15	100%

Pada pengkajian jumlah jaringan nekrotik, didapatkan mayoritas responden mempunyai jumlah jaringan nekrotik < 25% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik, sebanyak 6 responden (43%).

7. Tipe Eksudat		
1. Tidak ada eksudat	1	7%
2. Bloody	5	33%
3. Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink).	7	47%
4. Serosa (encer, berair, jernih).	0	0
5. Purulen (encer atau kental, keruh, kecoklatan/kekuningan, dengan atau tanpa bau).	2	13%
Total	15	100%

Pada bagian tipe eksudat, mayoritas responden mempunyai tipe eksudat Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink), sebanyak 7 responden (47%).

8. Jumlah Eksudat		
1. Tidak ada, luka kering.	1	7%
2. Moist, luka tampak lembab tapi eksudat tidak teramati.	3	20%
3. Sedikit : Permukaan luka moist, eksudat membasahi < 25% balutan	10	67%
4. Modert : Eksudat terdapat > 25% dan < 75% dari balutan yang digunakan	1	7%
5. Banyak : Permukaan luka dipenuhi dengan eksudat dan eksudat membasahi > 75% balutan yang digunakan.	0	0
Total	15	100%

Jumlah eksudat pada pengkajian yang telah dilakukan pada 15 responden, mayoritas responden memiliki jumlah eksudat yang sedikit: permukaan luka moist, eksudat membasahi < 25% balutan, sebanyak 10 responden (67%).

9. Warna Kulit Sekitar Luka		
1. Pink atau warna kulit normal setiap bagian luka.	2	13%
2. Merah terang jika disentuh	4	27%
3. Putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi.	5	33%
4. Merah gelap atau ungu dan atau tidak	4	27%

pucat.		
5. Hitam atau hiperpigmentasi.	0	0
Total	15	100%

Warna kulit sekitar luka pada beberapa luka responden, mayoritas responden mempunyai warna kulit pada sekitaran luka yang berwarna putih atau abu-abu, pucat atau hiperpigmentasi, sebanyak 5 responden (33%).

10. Edema		
1. Tidak ada Pembengkakan atau edema.	2	13%
2. Tidak ada pitting edema sepanjang <4 cm sekitar luka.	12	80%
3. Tidak ada pitting edema sepanjang \geq 4 cm sekitar luka.	1	7%
4. Pitting edema sepanjang <4 cm disekitar luka	0	0
5. Krepitus dan atau pitting edema sepanjang >4cm disekitar luka	0	0
Total	15	100%

Edema pada luka responden mayoritas responden tidak mengalami pitting edema sepanjang < 4 cm sekitar luka, sebanyak 12 responden (80%).

11. Indurasi Jaringan Perifer		
1. Tidak ada indurasi	5	33%
2. Indurasi <2 cm sekitar luka	10	67%
3. Indurasi 2-4 cm seluas < 50% sekitar luka.	0	0
4. Indurasi 2- 4 cm seluas \geq 50% sekitar luka	0	0
5. Indurasi > 4 cm dimana saja pada luka.	0	0
Total	15	100%

Pada bagian pengkajian indurasi jaringan perifer, mayoritas responden memiliki indurasi jaringan perifer < 2 cm disekitar luka, yaitu

sebanyak 10 responden (63%).


12. Jaringan Granulasi		
1. Kulit utuh atau luka pada sebagian kulit.	2	8%
2. Terang, merah seperti daging 75% s/d 100% luka terisi granulasi, atau jaringan tumbuh.	3	23%
3. Terang, merah seperti daging, <75% dan > 25% luka terisi granulasi.	8	54%
4. Pink, dan atau pucat, merah kehitaman dan atau luka < 25% terisi granulasi.	3	8%
5. Tidak ada jaringan granulasi.	1	8%
Total	15	100%

Pengkajian pada jaringan granulasi, mayoritas responden memiliki jaringan granulasi yang terang, merah seperti daging, < 75% dan > 25% luka terisi granulasi, yaitu sebanyak 8 responden (54%).

13. Epitalisasi		
1. 100% luka tertutup, permukaan utuh.	0	0
2. 75 s/d 100% epitalisasi	2	13%
3. 50 s/d 75% epitalisasi.	9	60%
4. 25% s/d 50% epitalisasi.	3	20%
5. < 25% epitalisasi	1	7%
Total	15	100%

Pada pengkajian epitalisasi pada 15 responden, mayoritas responden dengan jumlah epitalisasi 50-75% epitalisasi pada 9 responden (60%) yang mengalami luka ulkus diabetik.

Keterangan:



C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Usia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu berada di usia lansia awal 45-55 tahun sebanyak 5 orang dari keseluruhan 15 jumlah responden, dan selebihnya berada di usia lansia akhir 56-65 sebanyak 4 orang, dan dewasa akhir sebanyak 3 orang, dan usia >65 tahun sebanyak 3 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Era Dorihi Kale, 2015), yang menjelaskan bahwa dari 53 orang yang menderita diabetes melitus, rata-rata usia mereka adalah 57 tahun. Diabetes melitus biasanya sering terjadi pada klien setelah usia 30 tahun dan semakin sering terjadi pada usia 40 tahun. Sekitar 6% individu berusia 45-64 tahun dan 11 individu diatas 65 tahun menderita diabetes melitus. Meningkatnya usia berpengaruh terhadap perubahan fisiologis yang akan menurun drastis pada usia diatas 40 tahun. Proses penuaan menyebabkan kurangnya kemampuan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah (Kale & Akoit, 2015)

Usia merupakan salah satu faktor resiko penyebab terjadinya ulkus kaki diabetik, karena pada usia lanjut fungsi tubuh secara fisiologi menurun, hal ini disebabkan karena penurunan

sekresi atau retensi insulin, sehingga kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian glukosa darah yang tinggi kurang optimal (Ferawati, 2014). Hal ini bisa juga dilihat pada pasien ulkus diabetik yang datang untuk melakukan perawatan luka di Klinik Griya Afiat dan Klinik ETN Centre, dimana memiliki rata-rata usia 45-72 tahun, dan tidak menutup kemungkinan bahwa usia lanjut menjadi penyebab komplikasi dari penyakit diabetes mellitus ulkus diabetik.

Asumsi peneliti bahwa, seiring bertambahnya usia, resiko untuk terkena penyakit kronik semakin meningkat, salah satunya yaitu penyakit diabetes melitus. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin meningkatnya usia maka fungsi tubuh juga akan mengalami penurunan, termasuk cara tubuh mengolah glukosa darah, dimana semakin bertambahnya usia maka fungsi sel penghasil insulin pada pankreas akan menurun dan respon sel tubuh terhadap insulin juga tidak sebaik dulu atau sejak usia masih muda.

b. Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan yaitu sebanyak 9 orang dari total keseluruhan 15 responden. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Era Dorihi Kale, 2015), bahwa pada 364 penyandang diabetes melitus sebagian besar

adalah perempuan. Diabetes melitus tipe 2 lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan diketahui bahwa laki-laki lebih sering melakukan aktifitas fisik dan olahraga yang dilakukan secara teratur, dapat merangsang sensitivitas sel terhadap insulin serta pengurangan lemak sentral dan perubahan jaringan otot.

Faktor penting lain juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka kejadian diabetes melitus pada wanita yaitu peningkatan hormon testoteran pada wanita. Dijelaskan lebih lanjut bahwa wanita dengan kadar testoteran yang tinggi, mempunyai hormon androgen yang tinggi. Hormon androgen sangat erat kaitannya dengan intoleransi glukosa dan resistensi insulin. Sehingga pada saat terjadi peningkatan hormon androgen tersebut, peningkatan hormon androgen tersebut, dapat pula terjadi peningkatan resistensi insulin yang meningkatkan resiko diabetes melitus (Kale & Akoit, 2015).

Asumsi peneliti bahwa, jenis kelamin mejadi salah satu faktor terjadinya diabetes melitus dan seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan perempuan yang lebih beresiko terkena penyakit diabetes melitus. Mengapa demikian karena seperti yang kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan dalam melakukan semua aktivitas dan gaya hidup sehari-hari yang sangat berpengaruh kejadian diabetes melitus.

c. Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden dalam penelitian ini yaitu kebanyakan responden yang tidak bekerja yaitu sebanyak 11 responden dari total keseluruhan 15 responden. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Era Dorihi Kale, 2015) bahwa, sebagian responden yang tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga, dan bisa dikaitkan bahwa dengan seringnya dilakukan aktifitas fisik dan olahraga yang dilakukan secara teratur, dapat merangsang sensitivitas sel terhadap insulin serta pengurangan lemak sentral dan perubahan jaringan otot.

Gaya hidup yang tidak aktif bergerak diketahui berpotensi memicu beragam gangguan metabolik. Salah satu indikator terjadi gangguan metabolik ialah terjadi peningkatan kadar glukosa darah dalam tubuh. Aktivitas fisik yang kurang memengaruhi peningkatan kadar glukosa darah. Melakukan aktivitas fisik dapat mengendalikan kadar glukosa darah karena pada saat beraktivitas fisik diperlukan energi yang diubah yang diubah dari glukosa (Ugahari et al., 2016).

Asumsi peneliti bahwa, seperti yang kita ketahui bahwa kurang beraktivitas bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Saat tubuh semakin jarang bergerak maka akan lebih beresiko mengalami resistensi insulin, itulah mengapa kebanyakan orang

tidak bekerja lebih beresiko terkena penyakit diabetes melitus karena kurangnya aktivitas yang dilakukan.

2. Gambaran Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus

Hasil penelitian didapatkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus lebih banyak mengalami kadar glukosa darah yang tinggi, sebanyak 10 dari 15 responden. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan pasien diabetes melitus mempunyai kadar glukosa darah yang sangat tinggi. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Amos Lellu,2021) dengan hasil penelitannya dari jumlah 30 responden terdapat 20 (66,7) responden yang mengalami kadar glukosa darah tinggi, dan selebihnya memiliki kadar glukosa darah normal.

Dalam penelitian ini jenis pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan adalah pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu atau acak merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir. Kadar glukosa darah sewaktu pada pasien diabetes melitus dikatakan terkendali apabila pada rentang <200 mg/dl. Kadar glukosa darah sewaktu dilakukan kapan saja tanpa berpuasa terlebih dahulu, jika kadar glukosa darah sewaktu >200 mg/dl dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemia, maka sudah termasuk kriteria diagnosis diabetes melitus (PERKENI,2021).

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kadar glukosa darah, jika dikaitkan dengan data umum berupa usia maka umur juga dapat

memengaruhi kadar glukosa darah seseorang. Seperti yang dikaitkan bahwa dari data umum berupa umur responden, kebanyakan responden berusia 45-55 tahun. Seperti yang dikemukakan oleh (Maryam, 2018) didalam penelitiannya dikatakan bahwa masalah gizi pada usia lanjut sebagian besar merupakan masalah gizi berlebihan dan kegemukan (obesitas) yang memicu timbulnya degeneratif termasuk diabetes melitus.

Selain usia, jenis kelamin juga ikut berperan dalam mempengaruhi diabetes melitus. Seperti yang diketahui jenis kelamin dalam penelitian ini sebagian besar adalah perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Itsnani,2020) bahwa, perempuan lebih banyak yang menderita kadar glukosa darah tinggi atau diabetes melitus disebabkan karena perempuan di masyarakat mempunyai angka harapan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga semakin banyak perempuan lanjut usia yang menderita diabetes melitus, dan kecenderungan yang lebih tinggi proporsi diabetes melitus pada perempuan dibanding laki-laki, hal ini berhubungan dengan penyebab kejadian obesitas sebagai faktor resiko diabetes melitus yang lebih banyak menyerang perempuan. Dalam penelitian lain menyampaikan bahwa selain faktor obesitas yang banyak terjadi pada perempuan terdapat faktor hormonal yang dapat mempengaruhi metabolisme perempuan. Dimana pada usia responden kebanyakan masuk pada usia menopause bagi perempuan. Pada kondisi ini terjadi peningkatan hormon dehidroepiandrosteron (DHEA) dan hormon testosteron serta penurunan hormon estrogen. Peningkatan testosteron

dapat menyebabkan peningkatan resistensi terhadap insulin dan peningkatan kadar glukosa dalam darah (Ahmad J, 2020).

Dari kedua faktor umum tersebut, bisa kita simpulkan bahwa usia dan jenis kelamin menjadi salah satu faktor terjadinya diabetes melitus, dan tidak hanya itu, adapun faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya kadar glukosa darah seperti pengaruh gaya hidup, seperti berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, kurang berolahraga, stres, dan lain sebagainya. Hal ini juga dikaitkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Erma Kasumayanti, 2021) bahwa, menurut asumsi peneliti penderita yang mempunyai kadar glukosa darah tidak normal disebabkan oleh belum terbiasanya mengonsumsi diet diabetes melitus yang dianjurkan, belum terbiasa melakukan aktifitas olahraga, tidak rutin memantau glukosa darah, serta kurangnya pengontrolan obat dan perawatan kaki.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi yang menjadi faktor terjadinya diabetes melitus, tapi yang menjadi faktor yang paling memegang peranan penting dalam meningkatnya kadar glukosa darah yaitu makanan. Dimana makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak dapat meningkatkan kadar glukosa darah. karbohidrat diresap tubuh melalui usus, kemudian berubah menjadi glukosa dan beredar didalam aliran darah. Setelah satu sampai dua jam setelah makan, glukosa darah akan mencapai angka yang paling tinggi. Maka dari itu penyandang diabetes melitus perlu diberikan penekanan

mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat untuk meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin (Kasumayanti & Maharani, 2021).

Dalam surah al-A'raf/7:31 dijelaskan bahwa:

□ **يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ**

Terjemahnya:

Wahai anak cucu adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah Swt tidak menyukai orang yang berlebihan (Kementerian Agama).

Ahli tafsir Ibnu Abbas berpendapat bahwa, larangan berlebihan itu mengandung arti salah satu diantaranya yaitu, jangan berlebihan dalam porsi makan dan minum itu sendiri. Sebab, makan dan minum dengan porsi yang berlebihan dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makan kalau sudah merasa lapar, dan kalau sudah makan, janganlah sampai terlalu kenyang. Begitu juga dengan minuman, minumlah kalau merasa haus dan bila rasa haus telah hilang, berhentilah minum, waupun nafsu makan atau minum masih ada.

Asumsi peneliti bahwa, berdasarkan ayat dan tafsiran diatas dapat diketahui bahwa makan dan minum yang melampaui batas wajar akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan dapat menimbulkan banyak penyakit pada seseorang termasuk pada tinggi rendahnya kadar glukosa darah, dimana seperti yang diketahui bahwa yang menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi kadar glukosa darah yaitu tidak mengontrol pola makan atau kebanyakan mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat.

3. Gambaran Kondisi Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus.

Hasil penelitian didapatkan bahwa responden dengan kondisi luka ulkus diabetik terbanyak berada di kategori regenerasi luka, sebanyak 13 dari 15 responden. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran kondisi luka terbanyak berada pada indikator regenerasi luka. Penelitian ini sejalan juga dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Mikhayandi,2018) bahwa hasil penelitian diketahui bahwa seluruh responden 30 orang (100%) dikategorikan wound regeneration. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Megawati, 2020) bahwa, dari 30 responden yang diteliti didapatkan 70% diantaranya adalah ulkus dengan derajat 3, atau ulkus yang sudah sampai mengenai sampai tulang. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan pasien diabetes melitus mempunyai luka ulkus diabetik yang cukup parah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan pengukuran kondisi luka dari 15 responden dengan menggunakan skala BWAT yang terdiri dari 13 item pengkajian luka yang terdiri dari: Ukuran, Kedalaman, Tepi Luka, Terowongan/goa, Tipe Jaringan Nekrotik, Jumlah Eksudat, Jumlah Jaringan Nekrotik, Tipe Eksudat, Warna Kulit Sekitar Luka, Edema, Indurasi Jaringan Perifer Jaringan Granulai, Epitalisasi.

Dari 13 item pengkajian luka tersebut, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai yang dihasilkan maka menggambarkan pula status keparahan luka. Jika indikator status kondisi luka berada di skala 1-13 maka termasuk jaringan sehat, dan jika skala berada di skor 13-59 maka termasuk regenerasi luka, dan jika skala berada di skor 60-65 maka termasuk degenerasi luka. Hal ini juga dipengaruhi salah satunya yaitu dari proses penyembuhan luka atau lama penyembuhan luka, karena semakin lama penyembuhan luka maka akan semakin parah atau semakin luas luka yang diperoleh.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka pada pasien diabetes diantaranya yaitu, suplai oksigen, dimana suplai oksigen merupakan kritikal untuk leukosit dalam menghancurkan bakteri dan untuk fibroblast dalam menstimulasi sintesis kolagen. Kemudian stres, cemas dan depresi telah dibuktikan dapat mengurangi efisiensi dari sistem imun sehingga dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Kemudian gangguan sensasi atau gerakan, dimana aliran darah yang disebabkan oleh tekanan dan gesekan benda asing pada pembuluh darah kapiler dapat menyebabkan jaringan mati pada tingkat lokal. Kemudian status nutrisi, dimana kadar serum albumin rendah akan menurunkan difusi (penyebaran) dan membatasi kemampuan *neutrofil* untuk membunuh bakteri. (Putra, 2017)

Faktor lain yang menghambat penyembuhan luka yaitu sirkulasi. Sirkulasi yang tidak baik dapat mempengaruhi gangguan aliran dalam

pembuluh darah, sehingga akan sedikit memiliki oksigen. Dalam konteks penyembuhan, ketika jaringan memiliki sedikit oksigen maka akan terjadi hipoksia. Sirkulasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mempertahankan proses penyembuhan luka yang adekuat.

Adapun faktor internal yang menjadi faktor penyembuhan luka yaitu usia. Menurut sebuah studi bahwa semakin tua seseorang, maka semakin lama dalam proses penyembuhannya, karena terjadi penurunan dalam struktur dan karakteristik kulit. Perubahan-perubahan yang memperburuk sejalan dengan usia meliputi penurunan frekuensi penggati sel epidermis, respon inflamasi terhadap cedera, persepsi sensori, proteksi mekanis, serta fungsi barrier kulit. Menurut WHO, usia > 60 tahun semakin besar resiko gangguan penyembuhan luka, dikarenakan lambatnya infiltrasi sel T ke daerah luka yang disertai dengan gangguan produksi kemokin dan penurunan kapasitas fagositosis makrofag (Putra, 2017).

Menurut (Suyono, 2013) ada beberapa masalah yang sering terjadi pada pasien kaki diabetik diantaranya yaitu:

- a. Kapalan (callus), adalah penebalan atau pengerasan kulit yang juga terjadi pada kaki diabetik, karena adanya neuropati dan penurunan sirkulasi darah, gesekan atau tekanan yang berulang pada daerah tertentu di kaki.
- b. Ulkus, mayoritas ulkus dapat digolongkan menjadi neuropati, iskemik atau neuroiskemik. Ulkus kaki pada neuropati sering kali terjadi pada permukaan plantar kaki di area yang terkena tekanan tinggi. Seperti

yang melapisi kaput metatarsal, atau diarea lain yang melapisi deformitas tulang. Ulkus kaki neuropati berkontribusi terhadap >50% ulkus kaki penderita diabetes dan sering tanpa nyeri disertai luka yang terlihat lebam. Ulkus atau borok dikaki adalah masalah serius yang harus ditangani oleh dokter dan perawatannya lama sehingga bisa menyebabkan amputasi (Lellu, 2021).

Asumsi peneliti bahwa, terkait dengan status kondisi luka ulkus diabetik yang menjadi faktor atau penentu penyembuhan luka itu dikaitkan kembali kepada penderita diabetes melitus, dimana kepatuhan atau cara penderita sendiri dalam memperbaiki pola hidupnya sangat berpengaruh terhadap kondisi luka ulkus diabetik, salah satunya yaitu dengan patuh dalam mengontrol kadar glukosa darah agar tetap normal, rutin dalam melakukan perawatan luka serta memperbaiki asupan nutrisi, karena beberapa faktor tersebut menjadi penentu dalam fase penyembuhan luka.

D. Keterbatasan penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni:

Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan pemeriksaan GDS, dan disarankan penelitian selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan HbA1c atau GDP agar lebih akurat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Merujuk pada hasil penelitian, karakteristik responden pada pasien diabetes melitus sebagian besar berusia 45-55 tahun. Pada kategori jenis kelamin sebagian besar responden adalah perempuan. Pada kategori pekerjaan sebagian besar pasien yang tidak bekerja.
2. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan gambaran kadar glukosa darah responden sebagian besar memiliki kadar glukosa darah tinggi yaitu sebanyak 10 orang (66,7%) dengan kadar glukosa darah >200 mg/dl.
3. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan gambaran kondisi ulkus diabetik pada responden sebagian besar berada di kategori regenerasi luka dengan skor 13-59 sebanyak 13 orang (86,7%).

B. Saran


1. Bagi Peneliti Berikutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kembali dengan alat ukur dan menggunakan kadar glukosa darah puasa sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.
2. Bagi Institusi Pendidikan
Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan pembelajaran, dan diharapkan dapat memberikan nilai positif untuk menambah wawasan terutama terkait dengan diabetes melitus.

3. Bagi Instansi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini digunakan sebagai upaya pendidikan kesehatan pada pasien diabetes melitus, tentang pentingnya mengontrol kadar glukosa darah.

4. Bagi Masyarakat dan pasien diabetes melitus

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi kesehatan tentang penyakit diabetes melitus dengan ulkus kaki diabetik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Trisnadewi, Oktsviani, Munthe, Hulu, Budiastutik, Faridi, Ramdany, Fitriani, Rahmatia, Susilawaty, & suryana. (2021). *motodologi penelitian kesehatan*. yayasan kita menulis.
- Alfaqih, mohammad roni, Anugerah, A., & Khayudin, bayu akbar. (2022). *manajemen penatalaksanaan diabetes melitus*. the firs on publisher.
- Al-Mahalli, J., & As-suyuthi, J. (2018). *TAFSIR JALALAIN*. UMMUL QURO.
- Anggit. (2017). *Gambatan klinis pasien dengan diabetes mellitus*.
- Arisanty, L. . (2013). *Konsep dasar manajemen keperawatan luka*.
- Dinkes Prov SulSel. (2018). Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar*.
- Fatimah, Restyana Noor. (2015). diabetes mellitus tipe 2. *MAJORITY*, 4, 5.
- Hidayat, A, A. (2021). *Cara mudah menghitung besar sampel*. HEALTH BOOKS PUBLISHER.
- Istiqomah, & Efendi, asri ahram. (2014). faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian ulkus kaki diabetik pada pasien diabetes mellitus di RSU Anutapura palu. *Jurnal Ilmiah Kedokteran*, 1, 2.
- Ahmad J. (2020). *GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 TENTANG MANAJEMEN DIABETES MELITUS*.
- Kaertika, Ronald W. (2017). Pengelolaan Gengren Kaki Kiabetik. *Continuing Medical Education*, 44, 1.
- Kale, E. D., & Akoit, E. E. (2015). ANALISIS RESIKO LUKA KAKI DIABETIK PADA PENDERITA DM DI POLIKLINIK DM DAN PENYAKIT DALAM. *JURNAL INFO KESEHATAN*, 14.
- Kasumayanti, E., & Maharani. (2021). GAMBARAN KADAR GLUKOSA DARAH PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE II YANG MENDAPATKAN DIABETES SELF MANAGEMENT. *Jurnal Ners*, 5(2).
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Diabetes Mellitus. *Pusat Data Dan Informasi*.

- Kurnia, S., Sumangkut, R., & Hatibie, M. (2017). perbandingan kepekaan pola kuman ulkus diabetik terhadap pemakaian PHMB gel dan NaCl gel seara klinis. *Jurnal Biomedik*, 9, 1.
- Kurniawan, H. (2021). *Pengantar praktis penyusunan instrumen penelitian*. DEEPUBLISH PUBLISHER, CV, budi utama.
- Langi, Yuanita A. (2011). penatalaksanaan ulkus kaki diabetes secara terpadu. *Jurnal Biomedik*, 3, 2.
- Lede, M. J. (2018). Pengaruh Kadar Gula Darah terhadap Penyembuhan Luka Diabetes Mellitus di Puskesmas di Noyo Malang. *Nursing News*, 3(1).
- Lellu, A. (2021). Analisis Hubungan Kadar Glukosa Darah dengan Terjadinya Genggren pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Luwu Raya*, 8(1).
- Luthfiyana, N. ulya, Ersanti, arina mufida, & Permatasari, E. (2021). edukasi Heads-Up sebagai pencegahan diabetes melitus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6, 1.
- Mamik. (2015). *Metodologi kualitatif*. zifatama publisher.
- Maria, I. (2021). *Asuhan keperawatan diabetes mellitus dan asuhan keperawatan stroke*. CV BUDI UTAMA.
- Megawati. (2020). Analisis Interpretasi kadar GDS (Gula Dara Sewaktu) dan GDP (Gula Darah Puasa) pada Pasien Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2 yang Mengalami dan yang Tidak Mengalami Ulkus Diabetik di Rumah Sakit di RSUD Pirngadi Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Pannmed*, 15(2).
- Nadrati, B., Oktaviana, E., & Supriata, lalu dedy. (2021). *pemanfaatan air seduhan daun tin untuk penurunan kadar gula darah dan kolesterol pada pasin diabetes melitus*. monograf.
- Notoatmodjo. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. rineka cipta.
- Nurhanifa, D. (2017). faktor faktor yang berhubungan dengan ulkus kaki diabetik di poliklinik kaki diabetik. *Health-Mu*, 1, 1.
- Nursalam. (2015). *Metodologi ilmu keperawatan*. salemba medika.
- Perkeni. (2015). *konsesnsus pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 di indonesia*. PB Perkeni.

- Putra, M. R. C. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYEMBUHAN LUKA KAKI DIABETIK DI KLINIK KITAMURA PONTIANAK. *Jurnal Kesehatan*.
- Rasyid, N., Yusuf, S., & Tahir, T. (2018). *STUDY LITERATUR : PENGKAJIAN LUKA KAKI DIABETES*. 4(September), 123–137.
- Roflin, E. (2021). *populasi, sampel, variabel*. PT. Nasya expanding management.
- Santoso, P., Mansur, M. A., & Susilawati, E. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Luka pada Penderita Diabetes Mellitus Tinjauan Literatur. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(4).
- Setiorini, H., Pahria, T., & Sitini, T. (2019). gambaran harga diri pasien diabetes mellitus yang mengalami ulkus diabetik di rumah perawatan luka bandung. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 5, 2.
- Sinaga, N. O. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan kadar Gula Darah dengan Derajat Ulkus Kaki Diabetik Di Klinik Asri Wond Care Center Medan tahun 2019. *Poltekes Kemenkes Medan*.
- Siyoto, S. S. (2015). *Dasar metode penelitian*. literasi media publisher.
- Suryati, I. (2021). *Buku keperawatan latihan efektif untuk pasien diabetes mellitus berbasis hasil penelitian*. grup penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Taharuddin. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Model konservasi Diascharge Plenning Terstruktur terhadap Derajat Perlukaan Luka dan Kadar Glukosa Darah pada Pasien Ulkus Diabetikum. *Jurnal Care*, 5(3).
- Trinovita, E. (2019). *Bahan ajar farmakoterapi gangguan patomekanisme dan metabolik endokrin*. CV.PENERBIT QIARA MEDIA.
- Ugahari, L. E., Mewo, Y. M., & Kaligis, S. H. M. (2016). Gambaran kadar glukosa darah puasa pada pekerja kantor. *Jurnal E-Biomedik*, 4(2).
- Veranita, Wahyuni, D., & Hikayati. (2016). Hubungan antara Kadar Glukosa Darah dengan Derajat Ulkus Kaki Diabetik. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 3(2).

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hajra
NIM : 70300118053
Alamat : Samata,Gowa
No. Telepon : 085341709502

Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Kadar Glukosa Darah Dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik**”. Penelitian ini merupakan bagian persyaratan untuk program pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi responden. Responden penelitian hanya akan mengisi lembar kuesioner yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk proses pengisiannya. Kerahasiaan semua informasi akan terjaga dan dipergunakan hanya untuk kepentingan penelitian semata. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Gowa, 2 Maret 2022

Peneliti,

Hajra

Lampiran 2

Kode Responden :

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Inisial responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “**Analisis Kadar Glukosa Darah Dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik**”. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Makassar, 2 Maret 2022

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
()
M A K A S S A R

Lampiran 3**Kuesioner Karakteristik Responden**


Nama Responden :

Usia :

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Pekerjaan : Bekerja Tidak bekerja

Alamat/No. Telp :



Lampiran 4

Lembar Observasi Luka Ulkus Diabetik
Skala BWAT (*Bates-Jensen Wound Assesment Tool*)

No	Item	Pengkajian	Skor
1	Ukuran	*0 = Sembuh, luka terselesaikan panjang x lebar 1 = < 4 cm 2 = 4 s/d < 16 cm ² 3 = 16 s/d < cm ² 4 = 36 s/d < 80 cm ² 5 = > 80 cm ²	
2	Kedalaman	*0= sembuh, luka terselesaikan 1. Eritema atau kemerahan 2. Leserasi lapisan epidermis dan atau dermis 3. Seluruh lapisan kulit hilang, kerusakan atau nekrosis subkutan, tidak mencapai fascia, tertutup jaringan granulasi 4. Tertutup jaringan nekrosis 5. Seluruh lapisan kulit hilang dengan dekstruksi luas, kerusakan jaringan otot, tulang	
3	Tepi Luka	*0 = Sembuh, luka terselesaikan 1. Samar, tidak terlihat dengan jelas 2. Batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka 3. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka 4. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal 5. Jelas, fibrotik, perut tebal/hiperkeratonik	


4	Terowongan/Gua	<p>*0= Sembuh, luka terselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada gua 2. Gua < 2 cm di area manapun 3. Gua 2 – 4 cm seluas < 50% pinggir luka. 4. Gua 2 – 4 cm seluas > 50% pinggir luka. 5. Gua > 4 cm di area manapun. 	
5	Tipe Jaringan Nekrotik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada jaringan nekrotik 2. Putih/abu-abu jaringan tidak dapat teramati dan atau jaringan nekrotik kekuningan yang mudah dilepas. 3. Jaringan nekrotik kekuningan yang melekat tapi mudah dilepas. 4. Melekat, lembut, eskar hitam. 5. Melekat kuat, keras, eskar hitam. 	
6	Jumlah jaringan nekrotik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak jaringan nekrotik. 2. < 25% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik. 3. 25 % permukaan Luka tertutup jaringan nekrotik. 4. > 50% dan < 75% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik. 5. 75% s/d 100% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik. 	
7	Tipe Eksudat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada eksudat 2. Bloody 3. Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink). 4. Serosa (encer, berair, 	

		<p>jernih).</p> <p>5. purulen (encer atau kental, keruh, kecoklatan/kekuningan, dengan atau tanpa bau).</p>	
8	Jumlah Eksudat	<p>1. Tidak ada, luka kering.</p> <p>2. Moist, luka tampak lembab tapi eksudat tidak teramati.</p> <p>3. Sedikit : Permukaan luka moist, eksudat membasahi <25% balutan</p> <p>4. Modert : Eksudat terdapat > 25% dan <75% dari balutan yang digunakan</p> <p>5. Banyak : Permukaan luka dipenuhi dengan eksudat dan eksudat membasahi > 75% balutan yang digunakan</p>	
9	Warna Kulit Sekitar Luka	<p>1. Pink atau warna kulit normal setiap bagian luka.</p> <p>2. Merah terang jika disentuh</p> <p>3. Putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi.</p> <p>4. Merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat.</p> <p>5. Hitam atau hiperpigmentasi.</p>	
10	Edema Perifer/Tapi Jaringan	<p>1. Tidak ada pembengkakan atau edema.</p> <p>2. Tidak ada pitting edema sepanjang <4 cm sekitar luka.</p> <p>3. Tidak ada pitting edema sepanjang \geq4 cm sekitar luka.</p> <p>4. Pitting edema sepanjang <4 cm disekitar luka</p> <p>5. Krepitus dan atau pitting edema sepanjang > 4cm disekitar luka.</p>	
11	Indurasi Jaringan	<p>1. Tidak ada indurasi</p> <p>2. Indurasi <2 cm sekitar</p>	

	Perifer	luka. 3. Indurasi 2-4 cm seluas < 50% sekitar luka. 4. Indurasi 2- 4 cm seluas \geq 50% sekitar luka 5. Indurasi > 4 cm dimana saja pada luka.	
12	Jaringan Granulasi	1. Kulit utuh atau luka pada sebagian kulit. 2. Terang, merah seperti daging 75% s/d 100% luka terisi granulasi, atau jaringan tumbuh. 3. Terang, merah seperti daging, <75% dan > 25% luka terisi granulasi. 4. Pink, dan atau pucat, merah kehitaman dan atau luka < 25% terisi granulasi. 5. Tidak ada jaringan granulasi.	
13	Epitalisasi	1. 100% luka tertutup, permukaan utuh. 2. 75 s/d 100% epitalisasi 3. 50 s/d 75% epitalisasi. 4. 25% s/d 50% epitalisasi. 5. < 25% epitalisasi	
	Total Skor		

(Sumber; Barbara Bates-Jensen,2001)

Keterangan



Lampiran 5**Lembar observasi pengukuran kadar glukosa darah**

No	Inisial Nama	Jenis Kelamin		Kadar Glukosa Darah
		L	P	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 6

Hasil karakteristik responden

		Usia			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Dewasa akhir= 36-45 tahun	3	20.0	20.0	20.0
	Lansia awal= 45-55	5	33.3	33.3	53.3
	Lansia akhir=56-65	4	26.7	26.7	80.0
	Masa manula=65 keatas	3	20.0	20.0	100.0
Total		15	100.0	100.0	

		Jenis kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-laki	6	40.0	40.0	40.0
	Perempuan	9	60.0	60.0	100.0
Total		15	100.0	100.0	

		Pekerjaan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Bekerja	4	26.7	26.7	26.7
	Tidak bekerja	11	73.3	73.3	100.0
Total		15	100.0	100.0	

Lampiran 7

Distribusi Frekuensi kadar glukosa darah dan kondisi luka ulkus diabetik

Kadar glukosa darah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rendah= <100 mg/dl	1	6.7	6.7	6.7
Normal= <200 mg/dl	4	26.7	26.7	33.3
Tinggi= >200 mg/dl	10	66.7	66.7	100.0
Total	15	100.0	100.0	

Kondisi ulkus diabetik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Jaringan sehat: Skor 1-12	1	6.7	6.7	6.7
Regenerasi luka: Skor 13-59	13	86.7	86.7	93.3
Degenerasi luka: Skor 60-65	1	6.7	6.7	100.0
Total	15	100.0	100.0	

Lampiran 8

Master tabel

Kode Responden	Usia	JK	Pekerjaan	KADAR GLUKOSA	PENGAKAJIAN LUKA													LUKA ULKUS				
				TOTAL	P2	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	TOTAL	KADAR GL	LUKA ULKUS	DIABETIK	
R1	2	2	2	402	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	60	3	3		
R2	2	2	2	229	2	3	3	2	3	4	3	3	2	2	2	3	3	35	3	2		
R3	3	1	1	80	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	17	1	2		
R4	4	1	2	302	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	32	3	2		
R5	3	1	1	321	2	2	1	2	1	1	3	3	1	1	1	2	2	22	3	2		
R6	3	2	2	372	2	3	3	2	3	3	3	3	4	2	2	3	4	37	3	2		
R7	4	2	2	198	2	3	3	1	2	2	3	3	4	2	2	2	3	32	2	2		
R8	4	1	1	195	2	2	3	1	2	2	3	3	3	2	2	3	3	31	2	2		
R9	5	2	2	285	3	4	3	1	4	5	3	3	2	2	2	4	5	41	3	2		
R10	5	1	2	127	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	1	2	3	30	2	2		
R11	4	2	2	231	1	2	1	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	28	3	2		
R12	3	2	1	331	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	1	3	3	32	3	2		
R13	2	2	2	180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	2	1		
R14	3	2	2	230	1	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	29	3	2		
R15	5	1	2	369	2	4	2	2	3	4	5	4	4	2	2	4	5	43	3	2		



Lampiran 9

Surat keterangan layak etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION "

No. C.87/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Hajrah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"ANALISIS Kadar Glukosa Darah (D_{2A}) Kondisi Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus"
"Relationship Of Blood Glucose Levels With Diabetic Ulcer Condition In Diabetes Mellitus Patient"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemesataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion-Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21/4/2022, sampai dengan tanggal 21/4/2023
This declaration of ethics applies during the period 21/4/2022 until 21/4/2023


 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 10

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

<p>Nomor : 944/S.01/PTSP/2022</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : <u>Izin penelitian</u></p>	<p>Kepada Yth.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Klinik Griya Afiat Makassar 2. Pimpinan Klinik ETN Center Makassar 3. Pimpinan Isam Cahaya Makassar <p>di-</p> <p style="text-align: center;">Tempat</p>
---	---

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B/1811/Un.06/FKIK/PP.00.9/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

<p>Nama</p> <p>Nomor Pokok</p> <p>Program Studi</p> <p>Pekerjaan/Lembaga</p> <p>Alamat</p>	<p>: HAJRA</p> <p>: 70300118053</p> <p>: Keperawatan</p> <p>: Mahasiswa (S1)</p> <p>: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN</p>
--	--

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH PADA KONDISI LUKA ULKUS DIABETIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Mei s/d 13 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
 Nip : **19650606 199003 2 011**

Tersusun Yth.
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
 2. Peripagal.

Lampiran 11

Dokumentasi



ALAUDDIN
MAKASSAR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Kadar Glukosa Darah Dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik” bernama lengkap Hajra, lahir di Gowa pada tanggal 22 Maret 2000. Anak ke tiga dari tiga bersaudara dari Bapak Yaman dan Ibu Murni.

Menempuh pendidikan dasar di MI Maarif Bolaromang pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di Mts Maarif Bolaromang, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 6 Sinjai. Karena kecintaan yang lebih terhadap dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar jalur UMM pada tahun 2018 sampai sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R