

**PENGARUH TERAPI MUROTTAL TERHADAP PERUBAHAN
TINGKAT KECEMASAN PASIEN DIABETES MELITUS
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ISMAYANTI

70300118043

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismayanti
NIM : 70300118043
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 10 Desember 2000
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Manimpahoi, Sinjai Tengah
Judul :Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulisan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain Sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 18 Agustus 2022
Penulis,

Ismayanti

70300118043

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar", yang disusun oleh Ismayanti, NIM: 70300118043, mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 M, bertepatan dengan 12 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).*

Gowa, 10 Agustus 2022 M
12 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI:

| | | |
|---------------|--|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes | (.....) |
| Munaqisy I | : Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep, Sp.Kep MB | (.....) |
| Munaqisy II | : Dr. Nurhidayat Said, M.Ag | (.....) |
| Pembimbing I | : Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep | (.....) |
| Pembimbing II | : Ardian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep | (.....) |

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

*Disesuaikan dengan keadaan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatnya untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar”. Tak lupa pula kita haturkan shalawat serta salam pada Sayyidina Muhammad SAW. Nabi yang secara fisik beliau tidak lagi bersama kita. Namun, spirit untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatanlilalamin masih kita rasakan sampai saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program strata 1 Sarjana Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwasanya banyak pihak yang andil dalam membantu, memberikan semangat serta mendoakan penulis, hingga skripsi ini terselesaikan. Tentunya ucapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Iskandar serta Ibu Masniah, atas semua dukungan baik moril maupun materil, nasihat serta doa-doa yang tak pernah terhenti kepada Allah SWT untuk penulis, terimakasih atas setiap perjuangan serta pengorbanan yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

Sekian ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan paling tinggi kepada:

1. **Prof. H. Hamdan Juhanis, MA PhD**, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya
2. **Dr. dr. Syatira Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes** sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap

pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelolah serta mengurus administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. **Dr.Muh. Anwar Hafid, S.Kep., M.Kes** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan **Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. **Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep** Selaku Pembimbing I dan **Ardian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep** yang senantiasa menyisihkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan setulus hati sampai proposal ini dapat terselesaikan.
5. **Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB** selaku penguji I serta **Dr. H. Nur Hidayat Said, M.Ag** selaku penguji II, yang mau meluangkann waktu, mengarahkan memberikan saran kepada penulis.
6. Kepada rekan-rekan seperjuangan khususnya **Maulinda, Sunarti, Nurul Putri Savira, Nadia Hamrawati, Andi Alifah Nur Ulfiyah** serta mahasiswa program studi keperawatan **Angkatan 2018 (F18ROSA)** atas kebersamaannya, bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain baik suka maupun duka dalam proses mencapai cita-cita.
7. Kepada senior terkhusus **Abdul Haris Haery, S.Kep.,Ns** terima kasih telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, motivasi serta ilmu dalam menjawab tantangan hidup di kampus, mulai peneliti baru menginjakkan kaki di kampus sampai pada tahap ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini , maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan kesempurnaan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Gowa, Agustus 2022
Penulis,

Ismayanti
NIM: 70300118043



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR BAGAN | ix |
| ABSTRAK..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Hipotesis Penelitian..... | 4 |
| D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif | 5 |
| E. Kajian Pustaka..... | 7 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | |
| A. Tinjauan Tentang Murottal Al-Quran | 9 |
| B. Tinjauan Tentang Kecemasan | 11 |
| C. Tinjauan Tentang Diabetes Melitus | 18 |
| D. Tinjauan Tentang Terapi Murottal Al-Quran Pada Tingkat Kecemasan ... | 33 |
| E. Tinjauan Tentang Kecemasan Pada Pasien Diabetes Melitus..... | 33 |
| F. Kerangka Konsep | 36 |
| G. Alur Penelitian..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian..... | 37 |

| | |
|--|----|
| B. Populasi dan Sampel | 37 |
| C. Instrument Penelitian..... | 39 |
| D. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 39 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 39 |
| F. Pengolahan Data..... | 40 |
| G. Etika Penelitian | 42 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 44 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 44 |
| B. Deskripsi Hasil Penelitian | 46 |
| C. Pembahasan..... | 50 |
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN..... | 67 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 92 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Definisi Oprasional dan Kriteria Objektif | 6 |
| Tabel 2.1 Aspek Penilaian Kuesioner HARS | 18 |
| Tabel 2.2 Manifestasi Klinis Terpilih DM saat Diagnosis..... | 23 |
| Tabel 2.3 Ciri-ciri yang membedakan DM | 24 |
| Tabel 2.4 Pemeriksaan Gula Darah Dalam Darah | 25 |
| Tabel 3.1 Coding Karakteristik Responden | 41 |
| Tabel 4.1 Distribusi frekuensi karakteristik responden..... | 46 |
| Tabel 4.2 Distribusi frekuensi kecemasan | 47 |
| Tabel 4.3 Tingkat kecemasan masing-masing responden sebelum dan setelah pemberian terapi murottal | 48 |
| Tabel 4.4 Tingkat kecemasan..... | 48 |
| Tabel 4.5 Pengaruh terapi murottal terhadap perubahan tingkat kecemasan..... | 49 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Konsep..... | 36 |
| Bagan 2.2 Alur Penelitian | 37 |



ABSTRAK

Nama : Ismayanti

NIM : 70300118043

Judul : Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar

Diabetes melitus merupakan kondisi kronis dan berlangsung seumur hidup yang mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menggunakan energi dari makanan yang telah dicerna, dimana tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat sehingga kadar glukosa didalam darah menjadi tinggi. Masalah psikologis sering dialami penderita diabetes melitus yaitu kecemasan karena memikirkan kondisi penyakitnya, untuk itu kecemasan perlu dikendalikan. Pengendalian kecemasan dengan pendekatan spiritual dipandang penting dan efektif salah satunya yaitu terapi murottal karena diyakini memiliki efek samping yang lebih rendah, lebih aman dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh terapi murottal Al-Quran terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien diabetes melitus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, salah satu pendekatan kuantitatif yaitu quasi eksperimen dengan jenis *one group pretest-postest*. Teknik pengumpulan sampel yaitu teknik *quota sampling* yaitu 15 sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner *Hamilton Rating Scale For Anxiety* (HARS)

Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kecemasan pada pasien Diabetes Melitus sebelum dilakukan intervensi terapi murottal yaitu kecemasan sedang 2 (13,3%) dan, kecemasan berat 10 (66,7%) kecemasan berat sekali 3 (20), tingkat kecemasan pada pasien diabetes mellitu setelah dilakukan intervensi terapi murottal kecemasan sedang 2 (13,3%) dan kecemasana ringan 13(86,7%) pada uji "*paired sample T-test* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar dengan diperolehnya nilai signifikan *p-value 0,0001 (p<0,05)*.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni terdapat perubahan yang signifikan terapi murottal terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien diabetes melitus di RS Bhayangkara Makassar. Terapi murottal ini dapat dipertimbangkan untuk diterapkan sebagai intervensi keperawatan dalam mengatasi respon cemas pasien.

Kata Kunci: Terapi Murottal, Kecemasan, Diabetes Melitus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diabetes melitus adalah kondisi kronis dan berlangsung seumur hidup yang mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menggunakan energy dari makanan yang telah dicerna, dimana tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat sehingga kadar glukosa didalam darah tinggi (Suryati et al., 2020). Diabetes melitus sebagai penyakit tidak menular menjadi ancaman serius bagi kesehatan, terlebih setelah adanya kebijakan WFH (*Work From Home*) yang mewajibkan masyarakat melakukan aktivitas didalam rumah, sehingga banyak aktivitas fisik yang tidak berjalan sehingga mengubah gaya hidup dan pola perilaku sebagian masyarakat, hal itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan kejadian diabetes melitus (Sibagariang & Lumban, 2022).

Organisasi *International Diabetes Federation* (IDF) tahun 2021 mencatat 537 juta orang menderita diabetes di dunia dan jumlah ini diproyeksikan mencapai 643 juta pada tahun 2030, dan 783 juta pada tahun 2045, diperkirakan juga bahwa lebih dari 6,7 juta orang dewasa (umur 20-79) akan meninggal di sebabkan diabetes ditahun 2021. Di Indonesia, pada tahun 2019 berada diposisi ketujuh dengan 10,7 juta orang penderita diabetes, pada tahun 2021 penderita diabetes di Indonesia bertambah, Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta. Dengan jumlah penduduk sebesar 179,72 juta ini berarti prevelensi diabetes di Indonesia sebesar 10,6%. Sehingga disimpulkan bahwa indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap prevalensi kasus diabetes di Asia Tenggara.

Menurut hasil penelitian kesehatan dasar (Kementrian Kesehatan RI, 2018), menyebutkan bahwa prevalensi penderita diabetes melitus di Indonesia meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. diabetes melitus di Indonesia adalah tipe 2 hampir 90% dan diperkirakan pada tahun 2030 akan ada 21,3 juta penderita diabetes melitus. 55% tahu itu terjadi pada kelompok usia 55-64, yang terjadi berdasarkan gejala dan diagnosis yang ditetapkan.

Prevalensi penderita diabetes melitus di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,4% (414.513 jiwa) dari hasil Riskesdas (2018), meningkat 2 kali lipat dari Riskesdas sebelumnya Riskesdas (2013). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, kejadian diabetes meningkat dari sekitar 1.697 kasus pada tahun 2015 menjadi 4.242 kasus pada tahun 2016, meningkat 59% (Dahlan et al., 2018). Berdasarkan data dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes melitus mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini terjadi karena kurangnya pengendalian penyakit diabetes, dilihat pada tahun 2019 sebanyak 601 pasien, dan mengalami kenaikan pada taun 2020 sebanyak 650 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 623 pasien. Perubahan dalam hidup yang mendadak membuat penderita diabetes melitus menunjukkan reaksi psikologis yang bermacam-macam. Dari hasil wawancara di RS Bhayangkara dengan 5 orang pasien, 3 diantaranya mengatakan bahwa dia merasakan cemas dengan kondisinya serta takut jika lukanya semakin memburuk dan 2 diantaranya mengeluh kesulitan dalam beraktifitas dan kurang dapat beristirahat dengan tenang.

Menurut Nusantro (2018), penderita diabetes melitus dapat mengalami kecemasan karena memikirkan kondisi penyakitnya. Sehingga

dapat memperburuk kadar gula dalam darah penderita diabetes melitus. Sejalan dengan hasil penelitian Wijayanto & Widya (2019) yang mengatakan bahwa terdapat keterkaitan rasa cemas dengan kadar gula darah pada pasien diabetes melitus di Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu Lampung tahun 2017. Untuk itu kecemasan perlu dikendalikan agar tidak memperburuk kondisi fisik penderita.

Susan K.Chandler (2019) menyebutkan bahwa terapi pada pasien dapat diberikan secara farmakologis maupun non farmakologis. Terapi nonfarmakologis diyakini memiliki efek samping yang lebih rendah, lebih aman dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama, jika dibandingkan dengan obat golongan ansietas. Terapi komplementer merupakan bentuk terapi nonfarmakologis, salah satu pendekatan yang memperhatikan dimensi spiritual yaitu terapi murottal. Mendengarkan Al-Qur'an memiliki pengaruh untuk diri sendiri, terutama dalam memberikan ketenangan dan mengurangi kecemasan. Pada pertemuan tahunan American Medical Association, dijelaskan oleh Ahmad Al-Kahdi tentang hasil penelitiannya mengenai pengaruh Al-Qur'an pada manusia dari sudut pandang fisiologis dan psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an memiliki pengaruh yang signifikan dalam penurunan ketegangan syaraf reflektif dan hasil ini dicatat secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan alat berbasis komputer.

Kecemasan merupakan bagian dari hidup yang artinya, kecemasan ada pada setiap orang, tetapi jika kecemasan melebihi dari batas normal, maka akan mengganggu kualitas hidup, sehingga kecemasan ini perlu dikendalikan. Pengendalian kecemasan dengan pendekatan psikologis

yang memperhatikan dimensi spiritual, memiliki pandangan sebagai jalan lain yang dianggap memiliki kepentingan juga dan efektifitas dalam menurunkan rasa cemas.

Gangguan kecemasan yang dialami penderita DM dapat memperburuk kondisi pasien. Kecemasan merangsang hipotalamus kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon ACTH, sehingga hormon ini memicu kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon epinefrin dan kortisol, yang meningkatkan gula darah. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada penderita diabetes melitus (Jeharu et al., 2021).

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan penelitian perihal “terapi murottal Al-Qur’an terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti terkait apakah terapi murottal Al-Quran tersebut berpengaruh terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS.Bhayangkara

C. Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan hubungan satu/beberapa variabel-variabel yang saling berhubungan serta bersifat sementara atau dugaan dari masalah yang diteliti sehingga kebenarannya harus diuji secara empiris. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Nihil (H_0)

Tidak ada pengaruh Terapi Murottal Al-Quran terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS.Bhayangkara Makassar

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada pengaruh Terapi Murottal Al-Quran terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS.Bhayangkara Makassar

D. Definisi oprasional dan kriteria Objektif

Definisi oprasional yaitu aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada peneliti mengenai bagaimana cara mengukur suatu variable. Adapun definisi oprasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



Tabel 1.1
Definisi Oprasional dan Kriteria Objektif

| No. | Variabel | Definisi Oprasional | Kriteria Objektif | Skala Ukur |
|-----|--|--|--|---------------|
| 1. | Variabel Independent: Terapi Murottal | Terapi Murottal adalah terapi mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran, yang dibacakan oleh Qori' menggunakan earphone, dari handphone pasien diabetes melitus, dengan surah Ar-Rahman oleh Qori' Muzammil Hasballah. Durasi: 15 menit Desibel : 50dB Lama: 3 hari berturut-turut | - | - |
| 2. | Variable Dependent: Tingkat Kecemasan | Kecemasan yaitu gambaran emosional terhadap perasaan yang tidak pasti, tidak menyenangkan yang dirasakan oleh pasien diabetes melitus tipe 2 yang dirawat di RS Bhayangkara Makassar, diukur menggunakan HARS | Penentuan tingkat kecemasan menggunakan HARS (<i>Hamilton Anxiety Rating Scale</i>) yaitu apabila: Skor <14 = tidak ada kecemasan Skor 14-20 = kecemasan ringan Skor 21-27 =kecemasan sedang Skor 28-41 = kecemasan berat Skor 42 - 56 = krcrmasan berat sekali/panik | Interval |
| 3. | Variabel Dependent: Perubahan Tingkat Kecemasan | Menilai perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus tipe 2 di RS Bhayangkara setelah dilakukan terapi murottal Al-Qur'an | Berubahnya tingkatan rasa cemas bisa dilihat apabila: Menurun = Pre > Post Tetap = Pre = Post Meningkat = Pre < Post | Skala ordinal |

E. Kajian pustaka

1. Murottal Al-Quran banyak digunakan sebagai terapi komplementer kecemasan atau ansietas. Ummat Islam meyakini bahwa kitab suci Al-Quran sebagai obat. Imam Fakhrudin Ar-Razi dalam kitab Mafaatihul Ghyab menafsirkan kata syifa sebagai obat untuk penyakit-penyakit hati (*syifaa'min al-maraadh arr-ruhaniyyah*) dan obat untuk penyakit-penyakit jasmani (*syifaa' min al-amraadh al-jasmaniyyah*) (Al-Razi,1990).
2. K.Chandler et al (2019) menyebutkan, bahwa terapi ansietas dapat diberikan secara farmakologis (antiansietas) dan nonfarmakologis. Terapi nonfarmakologis diyakini melalui efek samping yang lebih rendah, lebih aman dan dapat digunakan digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan obat golongan antiansietas.
3. Penelitian Kumar et al (2019) menyimpulkan bahwa music yang didengar oleh telinga dan diterima oleh otak kanan dapat merangsang pelepasan hormon endorfin dari kelenjar pituitary dan dapat meningkatkan persepsi senang dan bahagia melalui penurunan kadar *adrenocorticotropic hormone* (ACTH).
4. Penelitian oleh Al-Khasanah & Pitayanti (2021) tentang Efektifitas terapi Murottal Al-Qur'an terhadap kecemasan dan Stress pada pasien Pre Operasi dengan dilakukan 15 menit terapi murottal 2 jam sebelum operasi didapatkan hasil bahwa terapi murottal Al-Qur'an efektif menurunkan kecemasan dan stress pada pasien pre operasi serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepasrahan pasien preoperasi terhadap Tuhan.

5. Penelitian oleh Susilawati et al (2019) tentang pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Stress Pasien Hipertensi Di Ruang Penyakit Dalam RSUD Waled Cirebon setelah dilakukan terapi murottal dengan durasi 10-15 menit 1 kali sehari selama 3 hari didapatkan hasil terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata tingkat stress pasien hipertensi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
6. Penelitian oleh Maulidia,M (2018) tentang Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi Section Caesura didapatkan hasil yaitu tingkat kecemasan responden menurun setelah diberikan intervensi terapi murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman

F. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui pengaruh terapi murottal Al-Quran terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS.Bhayangkara Makassar.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus sebelum pemberian Terapi Murottal Al-Quran Diabetes Melitus di RS.Bhayangkara Makassar
- b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus setelah pemberian Terapi Murottal Al-Quran Diabetes Melitus di RS.Bhayangkara Makassar

- c. Untuk mengetahui perbedaan sebelum dan setelah pemberian Terapi Murottal Al-Quran terhadap tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS.Bhayangkara Makassar

G. Manfaat penelitian

1. Manfaat Institusi

Hasil dari riset tersebut memiliki harapan mampu dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai saran intervensi keperawatan non farmakologis terhadap kecemasan pada pasien diabetes melitus untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada peneliti lain terhadap pengaruh Terapi Murottal terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus

3. Manfaat Praktis

Manfaat bagi peneliti adalah memperoleh wawasan ataupun ilmu pengetahuan untuk menerapkan penanganan mengurangi tingkat kecemasan pada pasien diabetes melitus dengan cara non farmakologis yaitu dengan Terapi Murottal

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Murottal Al-Quran

1. Pengertian Murottal Al-Quran

Murottal Al-Quran merupakan salah satu metode pengobatan yang memiliki semua jenis program dan data yang diperlakukan untuk mengobati berbagai macam gangguan pada sel tubuh. Murottal mempunyai efek yang baik pada seseorang yang mendengarnya yang juga menjadi satu dari beberapa cara menyembuhkan dengan memakai Al-Qur'an (Arum et al., 2021)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا

Terjemahannya:

“ Dan kami turunkan dari Al-Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang dzalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian (QS Al-Isra'/17/82) (Departemen Agama RI, 2004)

Esensi yang terkandung dalam Q.S Al-Isra ayat 82 ini sebagaimana pendapat para mufassir diantaranya: Al-Qur'an merupakan syifa dan rahmat dalam menghadapi permasalahan hidup dengan cara membina mental manusia, iman yang kuat terhadap Al-Qur'an memiliki dampak yang luar biasa dalam mengatasi gangguan kesehatan mental, orang-orang yang dzalim terhadap tuntunan Al-Qur'an, mereka tidak akan mendapatkan ketentraman jiwa (mental yang tidak sehat).

Salah satu jenis tehnik distraksi yang memiliki pengaruh positif terhadap kecemasan yaitu Terapi Mulottar Al Quran, saat ketika

seseorang mendengar Terapi Murottal, gendang telinga dirangsang, yang ditransmisikan ke korteks pendengaran otak melalui saraf pendengaran, yang mengurangi kortisol dan menciptakan keadaan rileks dan mendapatkan kenyamanan. Ayat suci Al-Qur'an yang didengar, dibacakan dengan tartil dan baik pastinya mendatangkan rasa tenang. Bacaan fisik Al-Qur'an memiliki unsur bunyi manusia, kemudian bunyi manusia merupakan instrumen yang bisa menyembuhkan yang unik dan begitu mudah diakses. Bunyi mengurangi hormon kecemasan, membuat endorfin aktif, perasaan santai meningkat juga perasaan takut teralihkan, cemas dan stres, peningkatan sistem kimia dalam badan dengan demikian tekanan darah menurun juga pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Demikian itu menggambarkan bahwasanya membaca Al-Qur'an bisa digunakan sebagai terapi tambahan dikarenakan bisa membuat perasaan santai meningkat. (Sulistyowati, 2021).

2. Manfaat Murottal Al-Quran

Murottal Al-Quran yang didengarkan, ia melakukan pekerjaan di otak, memberikan rangsangan ke otak untuk memproduksi bahan kimia, bisa diberikan feedback yaitu rasa santai ataupun rasa nyaman, dan memiliki kandungan unsur meditasi yang memberi ketenangan, meng sugestikan diri, dan relaksasi. Berikut ini merupakan manfaat terapi Murottal al-Quran adalah:

- a. Rasa takut dan cemas bisa berkurang
- b. Cemas berkurang
- c. Pereda nyeri
- d. Meredakan stres

- e. Dapat memberi ketenangan janin dan memperlancar persalinan
- f. Peningkatan kualitas tidur dan relaksasi (Arum et al., 2021)

B. Tinjauan Tentang Kecemasan

1. Pengertian Kecemasan

Kecemasan (ansietas) atau rasa cemas adalah respon terhadap ancaman yang sumbernya tidak diketahui, internal dan samar-samar. Ansietas berbeda dengan rasa takut yang merupakan respon dari suatu ancaman yang asalnya diketahui, eksternal, jelas atau bukan bersifat konflik (Murwani, 2009). Adapun beberapa faktor memberikan pengaruhnya pada rasa cemas:

a. Faktor internal

1) Usia

Masalah cemas ini gampang untuk dirasakan individu yang memiliki umur muda daripada seseorang yang sudah berumur Kaplan, (2010). Akan tetapi, Stuart (2013) mengungkapkan bahwa bukan berarti orang tua tidak akan mengalaminya, usia yang bertambah membuat seseorang banyak merasakan perubahan, ketika ada hal yang dapat memberikan bahaya untuknya.

2) Stressor

Stresor merupakan kebutuhan adaptasi individu akibat berubahnya kondisi hidup. Stresor ini sifatnya bisa mengalami perubahan kapanpun juga tepat bisa memberikan pengaruh bagi individu ketika berhadapan dengan rasa cemas, bergantung pada mekanisme coping orang tersebut. Makin besar stresor yang dirasakan, makin banyak pula efek untuk

keberfungsian badan, dengan demikian ketika stresor kecil ada bisa menimbulkan respons yang berlebih (Kaplan, 2010)

3) Jenis kelamin

Pria dan wanita mempunyai kesempatan sama untuk merasakan cemas. Namun, wanita acapkali merasakan cemas dibanding pria. Demikian itu disebabkan wanita sensitif terhadap sikap emosionalnya, permasalahan selesai memakai emosi, dan pikiran yang tidak logis dibanding dengan laki-laki (Kaplan, 2010)

4) Pendidikan

Pada tingkatan pendidikan lebih di bawah bisa membuat individu lebih gampang merasa cemas. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin mudah berfikir rasional dan menangkap informasi baru termasuk menguraikan masalah baru (Stuart Gail W, 2013)

b. Faktor eksternal

1) Dukungan keluarga

Adanya dukungan keluarga akan menyebabkan seseorang lebih siap dalam menghadapi permasalahan (Stuart Gail W, 2013)

2) Kondisi lingkungan

Individu jadi tangguh ketika berhadapan dengan masalah bisa disebabkan kondisi lingkungan sekitar, misalnya lingkungan, bekerja ataupun lingkungan pergaulan yang tidak menceritakan negative perihal dampak negative sebuah

masalah yang jadi penyebab individu tangguh ketika masalah kehidupan menghadang. (Stuart Gail W, 2013)

2. Tingkat kecemasan

Kemampuan individu dalam merespon terhadap suatu ancaman berbeda satu sama lain. Perbedaan kemampuan ini berimplikasi terhadap perbedaan tingkat ansietas yang dialaminya. Menurut Stuart (2009) didalam buku Damanik, (2021) merumuskan ada 4 tingkat kecemasan diantaranya:

a. Kecemasan ringan

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada. Kecemasan ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Cemas termasuk normal, waspadai juga meningkat pada persepsinya.

1) Repon fisiologi

- a) Hanya beberapa kali napas pendek
- b) Peningkatan nadi dan tekanan darah

2) Respon kognitif

- a) Lapangan persepsi meluas
- b) Konsentrasi pada masalah
- c) Respon perilaku dan emosi
- d) Tidak dapat duduk tenang
- e) Tremor halus pada tenang
- f) Sara kadang-kadang tinggi

b. Kecemasan sedang

Kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. Cemas sedang memberikan peluang individu pada pemusatan fokus dibagian penting juga mempersulit lapangan persepsinya.

1) Respon fisiologis

- a) Dering napas pendek
- b) Peningkatan nadi dan tekanan darah
- c) gelisah

2) respon kognitif

- a) Lapangan persepsi menyempit
- b) Rangsangan dari luar tidak mampu diterima

3) Respon perilaku dan emosi

- a) Gerakan tersentak-sentak
- b) Berbicara banyak dan lebih cepat

c. Kecemasan berat

Sangat mempengaruhi lapang persepsi individu, seseorang dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada area lain. Tingkat kecemasan berat sangat mengurangi lahan persepsi dan memusatkan sesuatu yang spesifik dan tidak dapat berpikir dalam hal lain

- 1) Respon fisiologi
 - 1) Sering napas pendek
 - 2) Nadi dan tekanan darah naik
- 2) Respon kognitif
 - a) Lapangan persepsi kurang
 - b) Belum memiliki kemampuan mengakhiri permasalahan
- 3) Respon perilaku dan emosi
 - a) Peningkatan rasa diancam
 - b) Verbalisasi cepat
- d. Kecemasan berat sekali (kecemasan sangat berat)

Berhubungan dengan ketakutan, terpengaruh dan terror karena mengalami kehilangan kendali. Orang yang sedang panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Kecemasan yang dialami akan memberikan berbagai repon yang dapat dimanifestasikan pada respon fisiologis, respon kognitif dan respon perilaku. Hal terinci terpecah dari proporsinya karena mengalami kehilangan kendali, individu yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional.

- a) Respon fisiologi
 - 1) Napas pendek
 - 2) Dada sakit

- b) Respon kognitif
 - 1) Tidak dapat berpikir
 - c) Respon perilaku dan emosi
 - 1) Mengantuk dan marah
 - 2) Persepsi kacau
3. Respon Tubuh Terhadap Kecemasan

Stuart (2013) menyebutkan ada dua jenis respon tubuh terhadap kecemasan:

a. Respon Fisiologis

Respon fisiologis yaitu dengan mengaktifkan system saraf otonom (simpatis maupun saraf parasimpatis). System saraf simpatis akan mengaktifasi proses tubuh, sedangkan proses parasimpatis akan meminimalkan respon tubuh, beberapa respon fisiologis yang dapat terjadi diantaranya:

- 1) Kardiovaskuler: palpitasi: jantung berdebar, TD meningkat, denyut nadi menurun
- 2) Pernapasan: napas cepat, sesak napas
- 3) Neuromuskuler: reaksi terkejut, mata berkedip-kedip, insomnia, gelisah
- 4) Gastrointestinal: kehilangan nafsu makan, menolak makan, mual, nyeri uluh hati, diare.
- 5) Saluran perkemihan: sering berkemih, tidak dapat menahan kencing
- 6) Integument: telapak tangan berkeringat, gatal

b. Respon Psikologis

Rasa cemas memberikan pengaruhnya dibagian interpersonal dan pribadi. Tingkat cemas yang tinggi mempengaruhi kordinasi juga refleks. Sulitnya mendengar mempengaruhi hubungan dengan seseorang. Cemas bisa menyebabkan orang mengurung dirinya juga mengurangi aktivitas yang banyak orang terlibat:

1) Respon kognitif

Mampu memiliki pikiran yang baik proses berpikir ataupun isi pikiran, dapat dipengaruhi dari kecemasan, diantaranya: tidak memiliki kemampuan memperhatikan, fokus turun, gampang kelupaan, lapangan persepsi yang turun, kebingungan

2) Respon afektif

Seseorang akan berekspresi yang menggambarkan perasaan bingung juga kecurigaan berlebih yang merupakan respon pada cemas.

4. Cara mengukur kecemasan

Ada berbagai cara mengukur tingkat kecemasan pada pasien, salah satunya adalah *Hamilton Anxiety Scale* (HARS), cara pengukuran kecemasan ini adalah untuk mengetahui tingkatan rasa cemasnya ringan, sedang, berat, atau sangat parah, dengan alat ukurnya adalah *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS). Skala ini dikembangkan oleh Max Hamilton dengan maksud agar penilaian pada cemas yang merupakan masalah klinis juga melakukan pengukuran pada gejala kecemasan. Kuesioner HARS memiliki empat belas pertanyaan yang terdiri dari tiga belas kategori pertanyaan terkait

gejala kecemasan dan satu kategori perilaku selama wawancara (Nursalam, 2013).

Beberapa di bawah ini merupakan nilai kuesioner HARS di antaranya:

Tabel 2.1

Aspek Penilaian Kuesioner HARS

| No. | Aspek penilaian |
|-----|-------------------------|
| 1 | Ketakutan |
| 2 | Kecemasan |
| 3 | Kegelisahan /ketegangan |
| 4 | Optimisme |
| 5 | Kesedihan/ depresi |
| 6 | Intelektual |
| 7 | Minat |
| 8 | Otot (somatik) |
| 9 | Insomnia |
| 10 | Kardiovaskuler |
| 11 | Pernapasan |
| 12 | Perkemihan |
| 13 | Gastrointestinal |
| 14 | Perilaku |

Tiap nilai memiliki jawaban diantaranya 1= tidak pernah, 2 = kadang-kadang, 3 = sering, 4 = selalu. Hasilnya dapat digambarkan dengan keterangan:

- a. Skor kurang dari 14 = tidak ada kecemasan
- b. Skor 14-20 = kecemasan ringan
- c. Skor 21- 27 = kecemasan sedang
- d. Skor 28 – 41 = kecemasan berat
- e. Skor 42-56 = kecemasan berat sekali/panik

C. Tinjauan Tentang Diabetes Melitus

1. Definisi Diabetes Melitus

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang umum terjadi pada dewasa yang membutuhkan supervisi medis berkelanjutan dan edukasi perawatan mandiri pada pasien. Namun, bergantung pada

tipe DM dan usia pasien, kebutuhan dan asuhan keperawatan pasien dapat sangat berbeda (Priscilla, 2016)

Diabetes melitus (DM) adalah penyakit kronis progresif yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, mengarah ke hiperglikemia (kadar gula darah tinggi). Diabetes melitus dapat berhubungan dengan komplikasi serius, namun orang dengan DM dapat mengambil cara-cara pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kejadian.(Black Joice M, 2014)

2. Etiologi Diabetes Melitus

Diabetes melitus dikelompokkan dengan *insuline dependent diabetes melitus* (IDDM) ataupun *non-insuline dependent diabetes melitus* (NIDDM). Menggunakan terapi insulin sejak lama dan terbiasa diistilahkan sebagai dua tipe DM, IDDM saat ini sebutannya DM tipe 1 (*juvenile onset*) dan NIDDM merupakan DM tipe 2 (*maturity onset*) (Black Joice M, 2014).

a. Diabetes melitus tipe 1

Respon autoimun terjadi disebabkan meradangnya sel beta dipankreas, menghasilkan antibodi pada sel beta yang diistilahkan antibodi sel pulau (ICA). Respon antigen-antibodi tersebut jadi penyebab hanculnya sel beta. (Irwan, 2016).

b. Diabetes melitus tipe 2

Pada diabetes melitus tipe II, kadar insulin normal atau lebih tinggi, tetapi karena reseptor insulin cukup tapi ada gangguan post receptor maka kerja insulin menjadi terganggu, mulai dari dominasi resistensi insulin disertai kekurangan insulin

relatif sampai hilangnya sekresi insulin absolute yang disertai resistensi (Irwan, 2016).

c. Diabetes melitus gestasional

Diabetes melitus gestasional yaitu diabetes yang didiagnosis selama hamil. Diabetes gestasional adalah diagnosa diabetes pada wanita yang memiliki intoleransi glukosa atau didiagnosis kali pertamanya ketika hamil. Diabetes gestasional ada di 2-5% wanita hamil, tetapi hilang pasca persalinan dilakukan. Riwayat diabetes gestasional, adanya sindrom ovarium polikistik atau kelahiran bayi yang memiliki BBL di atas 4,5 kg (Priscilla, 2016)

d. Diabetes melitus tipe lainnya.

DM tipe spesifik lain (1%-2% kasus terdiagnosis), mungkin sebagai akibat dari defek genetik fungsi sel beta, penyakit pankreas (misalnya kistik fibrosis), atau penyakit yang diinduksi oleh obat-obatan, serta mungkin dampak masalah atau pengobatan lain. Cacat genetik di sel beta dapat menyebabkan perkembangan DM. Banyak hormon misalnya hormon pertumbuhan, kortisol, glukagon, dan epinefrin adalah antagonis ataupun penghambat insulin. Kadar hormon yang berlebih seperti akromegali, sindrom Cushing, glukagonoma, pheochromocytoma jadi penyebab munculnya diabetes melitus.

3. Klasifikasi Diabetes Melitus

4 macam diabetes melitus berdasarkan penyebabnya:

a. Diabetes melitus tipe 1

Diabetes melitus tipe 1 disebut juga dengan *juvenile diabetes* (diabetes usia muda) namun ternyata diabetes ini juga dapat terjadi pada orang dewasa, maka istilahnya lebih sering digunakan diabetes melitus tipe 1 atau *Insulin Dependent Diabetes Melitus* (IDDM) yaitu tipe diabetes melitus dimana penderitanya akan bergantung pada pemberian insulin dari luar (Kurniadi & Nurrahmadi, 2014).

b. Diabetes tipe II

Diabetes tipe 2 adalah gangguan sekresi insulin ataupun gangguan kerja insulin (*resistensi insulin*) pada organ target terutama hati dan otot. Awalnya *resistensi insulin* masih belum menyebabkan diabetes secara klinis. Pada saat tersebut *sel beta pancreas* masih dapat mengkompensasi keadaan ini dan terjadi suatu *hiperinsulinemia* dan glukosa darah masih normal atau sedikit meningkat (Suyono, 2012)

c. Diabetes melitus gestasional

Diabetes tipe ini merupakan gangguan toleransi glukosa berbagai derajat yang ditemukan pertama kali pada saat hamil. Biasanya diabetes melitus gestasional mulai muncul pada minggu ke 24 kehamilan (6 bulan) dan akan secara umum menghilang setelah melahirkan, namun hampir setengah angka kejadiannya akan muncul kembali dimasa yang akan datang (Kurniadi & Nurrahmadi, 2014).

d. Diabetes melitus lainnya

Penyakit diabetes tipe lainnya dapat berupa diabetes yang spesifik yang disebabkan oleh kondisi seperti kelainan genetic yang spesifik (kerusakan genetic sel beta pancreas dan kerja insulin), penyakit pada pankreas, gangguan endokrin lain, infeksi, obat-obatan dan beberapa bentuk lain yang jarang terjadi (Suirakoa, 2012)

4. Manifestasi Klinis Diabetes Melitus

Kadar glukosa darah yang meningkat disebut hiperglikemia, mengarah ke manifestasi klinis umum yang berhubungan dengan DM. Pada DM tipe 1, onset manifestasi klinis memungkinkan keadaan yang memberikan ancaman jiwa sering muncul misalnya ketoasidosis diabetikum. Di diabetes tipe 2, timbulnya gejala klinis bisa bertahap, sehingga klien dimungkinkan mengalami sedikitnya ataupun tidak ada gejala klinis dalam beberapa tahun. Manifestasi klinis diabetes melitus yaitu meningkatnya buang air kecil (poliuria), rasa haus dan peningkatan minum (polidipsia), dan seiring perkembangan penyakit, meskipun kelaparan dan diet meningkat (polidipsia), berat badan saya turun (Black Joice M, 2014).

Tabel 2.2

Manifestasi Klinis Terpilih DM saat Diagnosis

| Manifestasi Klinis | Dasar Patofisiologi | DM Tipe 1 | DM Tipe 2 |
|---|---|------------------|------------------|
| Manifestasi utama | | | |
| Poliuria* (sering BAK) | Air tidak diserap kembali oleh tubulus ginjal sekunder untuk aktivitas osmotik glukosa, mengarah kepada kehilangan air glukosa dan elektrolit | ++* | + |
| Polifagi* (haus berlebihan) | Dehidrasi sekunder akibat poliuria menyebabkan rasa haus | ++ | + |
| Polifagi *(lapar berlebihan) | Kelaparan sekunder untuk katabolisme jaringan menyebabkan kelaparan | ++ | + |
| Penurunan berat badan | Kehilangan awal akibat menipisnya cadangan air, glukosa, dan trigliserida; wasting kronis akibat berkurangnya massa otot karena asam amino diubah menjadi glukosa dan keton | ++ | - |
| Pandangan kabur berulang | Sekunder akibat paparan konstan retina dan lensa terhadap cairan hiperosmolar | + | ++ |
| Pruritus, infeksi kulit, vaginitis | Infeksi kulit jamur dan bakteri tampaknya lebih umum, hasil penelitian saling bertentangan | + | ++ |
| Ketonuria | Ketika glukosa tidak tersedia untuk energi dalam sel yang bergantung pada insulin, asam lemak digunakan untuk energi; asam lemak dipecah menjadi keton dalam darah dan diekskresikan oleh ginjal; Pada diabetes tipe 2, insulin cukup untuk mencegah penggunaan asam lemak yang berlebihan, tetapi tidak cukup untuk menggunakan glukosa. | ++ | - |
| Lemah dan letih, pusing | Penurunan plasma menyebabkan hipertensi postural, kehilangan kalium dan katabolisme protein yang berkontribusi terhadap kelemahan | ++ | + |
| Sering asimtomatik | Tubuh dapat "beradaptasi" dengan peningkatan glukosa darah yang lambat daripada peningkatan yang cepat. | - | ++ |

(Black Joice M, 2014)

Ket:

* : Sering dirujuk sebagai gejala klasik DM

+ : Ada

+* : Kadang-kadang ada

++ : Biasanya ada

- : Biasanya tidak ada

Tabel 2.3

Ciri-ciri yang membedakan DM

| Ciri-Ciri | Tipe 1 | Tipe 2 |
|----------------------------------|--|--|
| Sinonim | IDDM, diabetes masa kanak-kanak, diabetes tidak stabil atau rapuh | NIDDM, diabetes dewasa atau dewasa ringan |
| Onset usia | Biasanya terjadi sebelum usia 30 tahun, tetapi dapat terjadi pada semua usia | Biasanya terjadi setelah usia 30 tahun, tetapi dapat terjadi pada anak-anak |
| Insidensi | 10% | 90% |
| Tipe onset | Biasanya tiba-tiba, dengan onset cepat hiperglikemia | Penyamaran, mungkin asimtomatik atau relatif asimtomatik; tubuh secara bertahap beradaptasi dengan peningkatan hiperglikemia |
| Produksi insulin endogen | sedikit atau tidak | Di bawah normal, normal atau di atas normal |
| BB saat onset | berat badan ideal atau kurus | 85% klien mengalami obesitas; dapat terjadi pada berat badan ideal |
| Ketosis | Kecenderungan ketosis biasanya muncul pada awalnya dan seringkali tidak terkontrol | Resistensi ketosis, dapat terjadi dengan stres infeksi |
| Gejala | Poliuria, polidipsia, polifagia, malaise | Acapkali tidak ada, peluang munculnya tanda hiperglikemia biasa |
| Pengelolaan diet | Esensial | Esensial |
| Pengelolaan olahraga | Esensial | Esensial |
| Pemberian insulin eksogen | Ketergantungan insulin | Memerlukan 20-30 |
| OHO | tidak berpengaruh | Efektif |
| Kebutuhan edukasi | Saat diagnosis dan seterusnya | Ketika didiagnosa juga selebihnya |

Sumber : (Black Joice M, 2014)

5. Diagnosis Diabetes Melitus

Untuk menegakkan diagnosa dapat dilaksanakan melalui metode di bawah ini:

a. Anamnesa

1. Poli uria, polidipsi, polifagia
2. Berat badan turun tanpa penyebab pasti
3. Mengeluh lemas, kesemutan, rasa baal, gatal anggota badan, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, pruritus vagina, bisul hilang timbul

b. Pemeriksaan fisik

Ditemukan tanda yang pas dengan masalah yang ada

c. Pemeriksaan penunjang

Memeriksa gula dalam darah

Tabel 2.4

Pemeriksaan Gula Darah Dalam Darah

| | Bukan DM | Belum pasti | DM |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Sewaktu (mg/dl) | Vena <110 | 110-199 | >200 |
| | Kapiler <90 | 90-199 | >200 |
| Puasa (mg/dl) | Vena <110 | 110-199 | >120 |
| | Kapiler <90 | 90-199 | >110 |

Sumber: (Irwan, 2016)

Ket:

Belum pasti: (gangguan toleransi glukosa yang dapat timbul)

6. Patofisiologi Diabetes Melitus

a. Patofisiologi diabetes melitus tipe 1:

Gejala diabetes tipe 1 disebabkan oleh kurangnya insulin untuk mengangkut glukosa melalui membran sel ke sel. Molekul glukosa menumpuk dialiran darah dan menyebabkan hiperglikemia. Hiperglikemia menyebabkan tekanan hiperosmotik

dalam serum, menarik air dari ruang intraseluler kedalam sirkulasi sistemik. Peningkatan volume darah meningkatkan aliran darah ginjal, dan hiperglikemia bertindak sebagai diuretik osmotik. Diuretik osmotik yang diproduksi membuat keluaran urin meningkat. Keadaan itu disebut poliuria. Saat kadar glukosa darah biasanya sekitar 180 mg/dL, glukosa diekskresikan dalam urin, suatu kondisi yang diistilahkan glukosuria. Menurunnya volume intraseluler juga meningkatnya output urin jadi penyebab dehidrasi, mulut kering, dan mengaktifkan sensor rasa haus, yang membuat seseorang minum lebih banyak air (Priscilla, 2016).

Glukosa tidak dapat masuk ke sel tanpa insulin, mengurangi produksi energi, merangsang rasa lapar, dan menyebabkan orang makan lebih banyak. Kondisi ini dikenal sebagai polifagi. Dengan peningkatan atau peningkatan asupan makanan, tubuh kehilangan air, memecah protein dan lemak, serta memulihkan sumber energi, yang mengakibatkan penurunan berat badan. Ketidaknyamanan dan kelelahan berhubungan dengan berkurangnya energi. Penglihatan kabur juga umum terjadi karena efek osmotik dari perluasan lensa kristal mata (Priscilla, 2016).

Sehingga manifestasi kalsik meliputi poliuria, polidipsia dan polifagia dengan penurunan berat badan, malaise dan kelelahan. Tergantung pada tingkat defisiensi insulin, gejalanya dapat berkisar dari ringan hingga berat. Orang dengan diabetes tipe 1 membutuhkan sumber insulin eksogen (eksternal) untuk tetap hidup (Priscilla, 2016)

b. Patofisiologi diabetes melitus tipe 2

Diabetes melitus tipe 2, reaksi sel beta yang terbatas pada hiperglikemia tampaknya jadi faktor penting ketika berkembang. Sel beta yang terus-menerus terpapar kadar glukosa darah tinggi menjadi tidak efisien saat mereka memberikan reaksi meningkatnya glukosa. Kejadian tersebut di namai desensitisasi, bisa dikembalikan pada kondisi normal kadar glukosa. Rasio proinsulin(precursor insulin) terhadap insulin tersekresi menjadi meningkat (Black Joice M, 2014).

Diabetes tipe 2 merupakan keadaan hiperglikemia puasa yang ada meskipun insulin endogen tersedia. Tingkat insulin yang diproduksi pada diabetes tipe 2 berfluktuasi dan, jika ada, fungsinya terganggu oleh resistensi insulin jaringan perifer. Hati menghasilkan lebih banyak glukosa daripada normal dan karbohidrat makanan Tidak dimetabolisme dengan baik dan akhirnya pankreas mengeluarkan lebih sedikit insulin daripada yang diperlukan Priscilla (2016).

Alasan utama berkembangnya diabetes tipe 2 adalah resistensi seluler terhadap efek insulin. Resistensi ini diperparah oleh obesitas, tidak aktif, penyakit, pengobatan dan usia. Pada obesitas, insulin memiliki kemampuan yang berkurang untuk mempengaruhi pengambilan glukosa dan metabolisme hati, otot rangka dan jaringan adiposa. Hiperglikemia berkembang perlahan dan dapat bertahan lama sebelum diabetes didiagnosis, sehingga sekitar setengah dari penderita diabetes tipe 2 yang baru didiagnosis mengalami komplikasi (Priscilla, 2016).

Mekanisme patofisiologi diabetes tipe 2 merupakan resistensi pada kegiatan biologis insulin, entah itu terjadi dihati ataupun jaringan perifer. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Seseorang dengan diabetes tipe 2 telah mengurangi sensitivitas insulin terhadap kadar gula darah, sehingga kadar gula darah yang tinggi pun terus memproduksi glukosa di hati. Hal ini sesuai dengan ketidakmampuan otot dan jaringan adiposa untuk meningkatkan ambilan glukosa. Proses yang menyebabkan resistensi insulin perifer tidak diketahui, tetapi tampaknya terjadi setelah insulin berikatan dengan reseptor permukaan sel (Priscilla, 2016)

7. Komplikasi Diabetes Melitus

Komplikasi diabetes melitus dapat terjadi diantaranya, komplikasi akut:

- a. Hiperglikemia dan Ketoasidosis Diabetik: Hiperglikemia terjadi ketika glukosa tidak dapat diangkut ke dalam sel karena kekurangan insulin. Tanpa fenomena KH untuk sel bahan bakar. Hati mengubah simpanan glikogennya kembali menjadi glukosa (glikogenolisis) dan meningkatkan biosintesis glukosa (glukoneogenesis). Sayangnya, reaksi ini memperburuk keadaan dengan meningkatkan kadar glukosa darah lebih tinggi (Black Joice M, 2014).

Etiologi umum juga faktor risiko ketoasidosis diabetik diantaranya: Tidak mendapatkan cukup insulin, tidak menyuntikkan insulin. Tidak mampu dalam pemenuhan banyaknya insulin yang dibutuhkan yang disebabkan karena

- proses bedah, trauma, hamil, stres, pubertas atau infeksi, perkembangan resistensi insulin karena adanya antibodi insulin
- b. Sindrom Hiperglikemia Hiperosmolar Nonketosis: Sindrom hiperglikemia hiperosmolar non ketosis (*hyperglucemic hiperosmolar nonketotic syndrome* [HHNS]) merupakan variasi ketoasidosis diabetic merupakan tanda hiperglikemia ekstrem (600-2000 mg/dl), dehidrasi nyata, ketonuria ringan atau tidak terdeteksi, dan tidak ada asidosis. HHNS umumnya seringkali ada diklien yang sudah tau dengan DM tipe 2.
- c. Hipoglikemia: Hipoglikemia (dikenal sebagai reaksi insulin atau reaksi hipoglikemia) adalah ciri umum dari DM tipe 1 dan juga dijumpai didalam klien dengan klien dengan DM tipe 2 yang juga diobati dengan insulin atau obat oral. Kadar glukosa darah yang tepat pada klien mempunyai gejala hipoglikemia bervariasi, tapi gejala itu tidak terjadi sampai kadar glukosa darah <50-60 mg/dl. Etiologi serta faktor resiko reaksi hiperglikemia mungkin terjadi akibat: dosis berlebihan insulin atau sulfonilurea, menghindari makanan atau makan lebih sedikit dari biasanya, pemakaian tenaga berlebihan tanpa penambahan kompensasi karbohidrat, ketidak seimbangan nutrisi dan cairan disebabkan mual dan muntah, Asupan alcohol. Kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam dosis kerja insulin menyebabkan hipoglikemia. Perubahan lain dalam diet atau pemberian insulin. Latihan fisik berat yang tidak terduga atau tidur lebih dari biasanya di pagi hari juga dapat menyebabkan hipoglikemia. Pengaruh alcohol,

mariyuana, atau obat lain dapat mengaburkan kesadaran klien akan hipoglikemia pada tahap awal.

Komplikasi kronis yaitu sakit juga kematian sebagai penyebab utama pada klien DM. Banyaknya yang berubah memberikan pengaruh sistem tubuh juga bisa membuat klien dan keluarganya hancur; keadaan itu mempengaruhi klien DM tipe 1 dan 2. Adapun masalah kronis diabetes melitus diantaranya:

a. Komplikasi Mikrovaskuler

Komplikasi Mikrovaskuler yaitu penyakit arteri koroner, penyakit serebrovaskuler, hipertensi, gangguan pembuluh darah, infeksi. Selanjutnya gangguan Mikrovaskuler yakni retinopati, nefropati, ulkus tungkai dan ekstremitas bawah, neuropati autonomy yakni pupil, jantungm gastrointestinal, urogenital. Peningkatan kadar glukosa terus menerus membuat ketidakseimbangan bahan yang digunakan untuk membuat matriks antarsel. Sistem enzim secara normal mengubah glukosa ke bentuk gula lain, seperti sorbitol dan fruktosa, dna glukosa mengumpul di membrane basal sel dan di antara sel. Akumulasi sorbitol intraseluler menyebabkan edema intraseluler dan mempengaruhi fungsi.

b. Komplikasi makrovaskuler

Penyakit makrovasakuler (penyakit pembuluh darah besar) seperti gangguan arteri koroner, sakit serebrovaskuler dan sakit pembuluh darah perifer, mencerminkan aterosklerosis dengan pengumpulan lemak pada lapisan dalam dinding pembuluh darah. Resiko berkembangnya komplikasi mikrovaskuler lebih tinggi pada DM tipe 1 dibanding dengan DM tipe 2. Penyakit makrovaskular,

utamanya sakit arteri koroner, adalah yang menyebabkan kematian biasanya pada pasien diabetes, sudah 40-60% pada seluruh masalah sakit makrovaskular berkaitan diabetes. (Black Joice M, 2014)

8. Penatalaksanaan Diabetes Melitus

Maksud dari manajemen diabetes merupakan untuk peningkatan kualitas hidup penyandang diabetes, meredakan ketidaknyamanan, berkurangnya risiko gangguan akut, pencegahan juga memperlambat perkembangan komplikasi mikro dan makroangiopati, serta menurunkan morbidity juga mortalitas DM. Tujuan terapi DM merupakan untuk membuat proses insulin dan kadar glukosa darah normal hingga bisa kejadian komplikasi vaskuler dan neuropatik jadi berkurang. Pengobatan bermaksud agar semua jenis diabetes yaitu agar semua pasien bisa sampai pada kadar gula darah normal (euglikemia) dengan tidak hipoglikemia ataupun masalah yang signifikan dari pola kegiatan pasien.

a. Langkah penatalaksanaan umum:

- 1) Riwayat sakit: tanda yang dirasakan, obat yang memberikan pengaruh pada kadar glukosa darah, faktor risiko (okok, tekanan darah tinggi, sakit jantung, obesitas, riwayat keluarga), riwayat kesehatan dan perawatan, juga *life style*, budaya, psikososial, pendidikan, dan perekonomian.
- 2) Pemeriksaan fisik: mengukur TBC, BB, tekanan darah, nadi, memeriksa lengkap kaki.
- 3) Pemeriksaan laboratorium: glukosa darah puasa dan 2 jam pasca makan.
- 4) Albumin urin kuantitatif, elektrokardiogram

b. Langkah-langkah pemeriksaan khusus:

- 1) Pendidikan: kemajuan kehidupan yang kokoh
- 2) *Medical Nutrition Therapy* (TNM): menjelaskan pentingnya standar jadwal makan, jenis dan takaran makanan, khususnya bagi pasien yang menggunakan obat penurun glukosa darah dan insulin
- 3) Aktivitas fisik. Penting untuk melakukan aktivitas aktual biasa (3-5 hari sekaligus 150 menit aktivitas setiap minggu. Rentang antar aktivitas tidak boleh lebih dari 2 hari berturut-turut). Aktivitas yang sebenarnya adalah konsumsi oksigen dengan kekuatan sedang (50-70% tingkat karung maksimal) seperti jalan-jalan yang energik, bersepeda yang nyaman, lari dan berenang.
- 4) Tindakan pengobatan:
 - a) Pengobatan antihiperglikemik mulut termasuk promotor sekresi insulin (sulfonilurea dan glinida), sensitizer insulin (metformin dan thiazolidinediones), penghambat penyerapan glukosa, penghambat DPP-IV (dipeptidyl peptidase-IV), dan SGLT-2 (pengangkut natrium glukosa 2)
 - b) Antihipertensi suntik: insulin
 - c) Pengobatan kombinasi: agen antihiperglikemik oral dan insulin
 - d) Pengobatan mulut umumnya dipakai sekarang ini yaitu sulfenilurea, biguanida dan acarbose. Beberapa herbal

antidiabetes, termasuk pare, bawang putih, tanaman kersen.
(Ota & P.ulrih, 2017)

D. Tinjauan Tentang Terapi Murottal Al-Quran Pada Tingkat Kecemasan

Metode psikologis telah dikembangkan dalam pelayanan kesehatan untuk mengurangi kecemasan yang dialami oleh pasien dengan penyakit kronis. Salah satunya adalah metode yang memperhatikan dimensi spiritual. Pendekatan spiritual dengan pendekatan psiko-religius dianggap sebagai alternatif yang dianggap penting dan efektif dalam meningkatkan harga diri, optimisme dan resiliensi pasien. Pendekatan psikoreligius dengan menggunakan hal-hal yang dianggap sakral oleh individu telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi stres.

Mendengarkan bacaan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki efek tersendiri, terutama dalam memberikan ketenangan dan mengurangi tingkat kecemasan. Seperti pada XVII. pada konferensi tahunan American Medical Association, Missouri Ahmad Al-Kahdi menjelaskan hasil penelitiannya tentang topik pengaruh Al-Qur'an pada manusia dari sudut pandang fisiologis dan psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mendengarkan ayat suci Al-Qur'an memiliki efek yang signifikan dalam mengurangi ketegangan saraf refleks, dan hasil ini dicatat dan diukur secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan alat komputerisasi. (Sulistyowati & Hasibuan, 2021)


E. Tinjauan Tentang Kecemasan Pada Pasien Diabetes Melitus

Kegelisahan merupakan hal yang merepotkan bagi penderita diabetes melitus untuk dikelola (Black joyce M, 2014). Apabila terjadi tekanan mental pada penderita diabetes melitus maka terjadi reaksi sistem sensori otonom sehingga menimbulkan aksi wajib dalam tubuh yang

dikenang untuk komponen proteksi diri. Filamen saraf yang bijaksana menggerakkan tanda-tanda penting pada setiap tanda peringatan untuk mengatur perlindungan tubuh. Organ adrenal melepaskan adrenalin (epinefrin), yang membuat tubuh mengambil lebih banyak oksigen, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi, mencekik pembuluh darah tepi dan memicu darah dari sistem pencernaan dan regenerasi dan meningkatkan glikogenolisis menjadi glukosa bebas untuk membantu jantung, otot, dan sistem sensorik focal. Glukosa yang diperoleh dari proses glikogenesis kemudian akan diubah menjadi pati. Karbohidrat ini dapat masuk ke aliran darah sehingga menyebabkan kadar glukosa meningkat. Pada saat bahaya selesai, filamen saraf parasimpatis membalikkan siklus ini dan mengembalikan tubuh ke keadaan normal sampai sinyal bahaya berikut mengaktifkan kembali reaksi bijaksana. Pasien diabetes melitus yang gelisah memiliki kontrol glukosa yang buruk dan efek samping penyakit yang meluas (Soelitijo et al., 2015).


Dalam catatan yang berjudul hubungan antara tensi dan kadar glukosa pada penderita diabetes melitus tipe II di wilayah kerja Puskesmas Batua Kota Makassar, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara derajat kegelisahan dengan peningkatan kadar gula. kadarnya pada individu dengan diabetes melitus. Kegelisahan dapat mempengaruhi kadar glukosa dan pencernaan insulin dengan memperluas kortisol. Klien diabetes melitus yang mengalami kegelisahan akan kesulitan untuk menurunkan kadar glukosanya, karena mereka menyadari bahwa penyakit ini adalah infeksi yang terus-menerus dan tidak dapat dihilangkan, namun dengan mengubah gaya hidup yang solid dengan pengawasan pola makan

yang ketat dan penurunan ketegangan. , klien diabetes melitus dapat menjauhkan diri dari belitan. . Ketidaknyamanan karena ketegangan peningkatan diabetes untuk klien. Kegugupan dapat memengaruhi kadar glukosa dan pencernaan insulin melalui ekspansi kortisol, yang memengaruhi pola makan, penambahan berat badan, dan diabetes. Kemudian lagi, diabetes dapat memicu tekanan dan ketegangan yang berkelanjutan, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko diabetes. Keduanya terkait secara umum, tetapi juga secara organik, karena penyakit ini adalah penyakit yang terus-menerus dan tidak dapat disembuhkan dengan cara apa pun, tetapi harus diselesaikan selamanya, harus menjalankan pola makan yang parah dan cara mengontrol tekanan, untuk tetap jauh dari ketegangan. (Angriani & Baharuddin, 2020)



G. Alur Penelitian

Bagan 2.2 Alur Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Didasarkan pada masalah yang nantinya diteliti, sehingga peneliti memakai metode yang akan dipakai pada penelitian, yaitu jenis penelitian kuantitatif. Salah satu jenis penelitian kuantitatif yaitu kuasi-eksperimental (quasi-experimental), yaitu metode penelitian yang dirancang untuk agar diketahuinya pengaruh keadaan yang disengaja diciptakan dalam sebuah keadaan. (Zulmayetri et al., 2019).

Desain penelitian berbentuk eksperimen yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni pre-experimental design atau seringkali disebut quasi-experimental yang merupakan tipe one-group pretest-posttest design, berarti penelitian dilakukan tanpa perbandingan dalam satu kelompok.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat disebutkan sebagai keseluruhan individu-individu dengan karakteristik dan ciri yang sudah ditentukan dan digunakan sebagai sumber data, karakteristik atau ciri ini dikaitkan sebagai variable, sedangkan individu-individu yang ada dalam populasi dikaitkan sebagai anggota populasi (Zulkarnain Lubis, 2021).

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien diabetes dengan kecemasan yang di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel penelitian ini memanfaatkan Teknik *Quota Sampling*, yakni suatu teknik dalam

menentukan sampel pada suatu populasi dengan karakteristik tertentu dari suatu besaran (kuota) yang diinginkan. Dalam teknik ini, populasi tidak diperhitungkan, tetapi menjadi jelas dalam 1 kelompok. Sampel diambil dengan memberikan kelompok kuorum tertentu. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Jika terpenuhi, pengumpulan data berhenti (Sugiyono, 2010).

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *quota sampling*, yaitu 15 sampel. Gay dan Diehl dalam bukunya *Research Methode for Business* menuliskan bahwa penelitian eksperimen minimal sampelnya adalah 15 elemen perkelompok. Dalam Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklarifikasikan dalam kelompok, sampel diambil dengan memberikan jatah *quorum* tertentu pada kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling.

a. Kriteria inklusi

- 1) Responden telah didiagnosa diabetes melitus
- 2) Responden yang beragama islam
- 3) Responden beriman
- 4) Responden yang siap ikut penelitian
- 5) Mampu berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik
- 6) Responden dengan kemampuan mendengar yang baik/normal.

b. Kriteria eksklusi

- 1) Responden yang drop out
- 2) Responden dengan kesadaran menurun

C. Instrument penelitian

Dalam penelitian instrument yang digunakan berupa kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan alat ukur kecemasan yaitu HARS (*Hamilton Anxiety Rating Scale*), yaitu pengukuran untuk mengetahui tingkat kecemasan sebagai gangguan klinikal, apakah ringan sedang atau berat. Kuesioner ini berisi empat belas pertanyaan terdapat empat belas pertanyaan, 13 belas kategori pertanyaan diantaranya berisi pertanyaan tentang gejala kecemasan dan satu kategori perilaku saat wawancara.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan diruang rawat inap Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 27 mei sampai 13 juni 2022.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

a) Data Primer

Data primer yaitu informasi yang diperoleh berasal dari informasi ke yang mengumpulkan informasi diistilahkan dengan data langsung. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

b) Data Sekunder

Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui arsip atau lainnya atau biasa disebut informasi menyimpang. Dalam tinjauan ini, informasi opsional diperoleh dari Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar.

F. Pengolahan Data

Penanganan informasi dilakukan secara fisik dengan menyelesaikan lembar persepsi yang diberikan. Penanganan informasi tersebut kemudian ditangani dengan memanfaatkan program SPSS dengan tahapan-tahapan yang menyertainya:

1. Editing

Proses editing dilakukan setelah pendataan dan dilakukan dengan pengecekan kelengkapan data, kesalahan data, konsistensi kesalahan pengisian data setiap respon.

2. Koding

Dibuat untuk memudahkan pengolahan data, semua respon sebagai data, kesalahan pengisian konsistensi data disetiap respon (encoding).

Tabel 3.1
Coding Karakteristik Responden

| No. | Karakteristik | Kode |
|-----|----------------------|------|
| 1. | Umur | |
| | 36-45 | 1 |
| | 46-55 | 2 |
| | 56-65 | 3 |
| | >66 | 4 |
| 2. | Pendidikan | |
| | SD | 1 |
| | SMP | 2 |
| | SMA | 3 |
| | PERGURUAN TINGGI | 4 |
| 3. | Pekerjaan | |
| | IRT | 1 |
| | Wiraswasta | 2 |
| | Pensiunan | 3 |
| | Polri | 4 |
| | Buruh harian | 5 |
| 4. | Jenis Kelamin | |
| | Laki-Laki | 1 |
| | Perempuan | 2 |

3. Tabulasi

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data ke dalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Analisa data

Selanjutnya membuat pengolahan data ke dalam satu tabel berdasarkan klasifikasi yang dipunyainya disesuaikan dengan tujuannya dalam penelitian

a) Analisa Univariate

Dilaksanakan dengan membuat tabel distribusi kategorik frekuensi juga numerik.

b) Analisa Bivariate

Dilaksanakan pada dua variable yang dianggap memiliki hubungan ataupun keterkaitan. Informasi yang dibentuk berbentuk ordinal dianalisis selanjutnya diuji normalitas. Sebelum kedua variabel dilakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data menggunakan Shapiro Wilk karena besar sampel penelitian 15, data dikatakan terdistribusi normal jika value $>0,05$. Berdasarkan hasil uji normalitas data diketahui nilai signifikansinya Pre 0,122 $>0,05$ dan Post 0,738 $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai berdistribusi normal.

Uji statistik pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan Sample Paired T-Test, peneliti ingin mencari tahu pengaruh terapi murottal pada berubahnya tingkatan cemas pasien Diabetes Melitus. Kedua variabel masuk ke dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini telah lulus uji komite etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dengan nomor etik :C.88KEPK/FKIK/IV/2022. Penelitian ini memakai etika penelitian Notoadmojo (2010):

1. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Informasi yang diberikan oleh responden merupakan jaminan kerahasiaan dari pihak peneliti. Kerahasiaan dijamin dengan tidak mencantumkan identitas responden dalam lembar angket dan informasi tersebut disimpan dan tidak dapat diakses oleh orang lain, setelah itu formulir pengisian data disimpan sampai akhir proses pendidikan.

Informasi yang diberikan oleh responden tidak akan dibagikan kepada orang lain dan hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian

2. *Beneficience* (bermanfaat)

Aturan ini mengharapakan spesialis untuk membatasi peluang dan meningkatkan manfaat untuk melayani individu atau masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini sangat baik karena dalam konsentrat ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebagai polling.

3. *Justice* (keadilan)

Dalam tinjauan ini, spesialis harus masuk akal untuk responden. Semua responden diberikan mediasi serupa tanpa segregasi. Responden akan diberikan klarifikasi kemudian, pada saat itu, mengisi lembar persepsi dan lembar survei serupa

4. *Non maleficience* (tidak merugikan)

Standar ini merupakan komitmen untuk tidak merugikan responden eksplorasi. Responden memiliki pilihan untuk memilih dengan sengaja mengenai apakah akan mengambil bagian dalam ulasan tanpa bahaya kerusakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Sejarah berdirinya RS Bhayangkara Makassar diawali berdasarkan perintah lisan Pangdak (Panglima Daerah Kepolisian) XVIII Sulselra Brigjen Imam Supoyo kepada kapten Polisi dr. Adam Imam Santoso pada tanggal 2 November 1965, untuk menempati dan memfungsikan bekas sekolah polisi Negara Djongaya menjadi Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Makassar dan sebagai Kepala Rumah Sakit pertama adalah Komisarisi Polisi (Tit) dr. Zainal Arifin, berdasarkan surat perintah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian XVIII Sulselra Nomor: 6/1069, tanggal 24 Januari 1969. Pada tanggal 10 Januari 1970 Rumah Sakit Bhayangkara Makassar diakui oleh Mabes Polri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : B/117/34/I/1970 yang ditandatangani oleh Wakapolri. Dalam perjalanan waktu, RS Bhayangkara akhirnya berubah status menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II dengan surat Kapolri No. Pol : Skep/1549/X/2001 tanggal 10 November 2001.

Upaya untuk menghilangkan kesan bahwa Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara hanya diperuntukkan bagi anggota Polri maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol: Skep/321/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 diputuskan pergantian nama Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Makassar menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Mappaoudang Makassar.

a. Kondisi Geografis

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar mempunyai lokasi yang strategis dipinggir jalan perkotaan dan lingkungan padat penduduk, Jalan Mappaoudang No. 63 Makassar, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

1. Visi, Misi dan Motto RS Bhayangkara Makassar

Visi : Menjadi Rumah Sakit Bhayangkara terbaik di kawasan Timur Indonesia dan jajaran Polri, dengan pelayanan Prima dan mengutamakan penyembuhan serta terkendali dalam pembiayaan.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima dengan meningkatkan kualitas disegala bidang pelayanan kesehatan, termasuk kegiatan kedokteran kepolisian (forensic, perawatan tahanan, kesehatan kamtibmas dan DVI) baik kegiatan operasional kepolisian, pembinaan kemitraan maupun pendidikan dan latihan.
- 2) Menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan anggaran secara transparan dan akuntabel
- 3) Meningkatkan kualitas SDM yang professional, bermoral dan memiliki budaya organisasi sebagai pelayan prima.
- 4) Mengelola seluruh sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional polri.

Motto :

Prima dalam pelayanan, Utama dalam penyembuhan,
Terkendali dalam pembiayaan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini mengenai Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan pasien Diabetes Melitus di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang telah dilaksanakan pada 27 Mei - 13 Juni 2022. Responden pada penelitian ini adalah pasien Diabetes Melitus Tipe 2 sebanyak 15 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, kemudian desain penelitian yang digunakan adalah *quasi experiment* dengan jenis *one group pretest-postest design*

1. Karakteristik responden

Tabel 4.1
Distribusi frekuensi karakteristik responden

| Karakteristik | Frekuensi | Presentase % |
|----------------------|-----------|--------------|
| Umur | | |
| 36-45 | 4 | 26.7 |
| 46-55 | 5 | 60 |
| 56-65 | 3 | 33.3 |
| >66 | 3 | 20 |
| Pendidikan | | |
| SD | 7 | 46.7 |
| SMP | 1 | 6.7 |
| SMA | 5 | 33.3 |
| Perguruan tinggi | 2 | 13.3 |
| Pekerjaan | | |
| IRT | 8 | 53.3 |
| Wiraswasta | 3 | 20 |
| Pensiunan | 1 | 6.7 |
| Polri | 2 | 13.3 |
| Buruh harian | 1 | 6.7 |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-Laki | 4 | 26.7 |
| Perempuan | 11 | 73.3 |

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi umur, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berumur 46-55 (33,3%) sebanyak 5 responden, kemudian responden berumur 36-45 (26,7%) sebanyak 4 responden. Pendidikan mayoritas responden ialah berpendidikan SD dengan jumlah responden 7 (46,7%). Mayoritas pekerjaan responden ialah IRT, dengan jumlah responden 8(53,3%). Mayoritas jenis kelamin responden perempuan dengan jumlah responden yaitu 11 (63.3%).

2. Analisis Univariat

a. Skor kecemasan sebelum dan sesudah terapi murottal

Tabel 4.2

Distribusi frekuensi kecemasan

| Tingkat Kecemasan | Mean | Std. Deviation | Min | Max |
|-------------------|-------|----------------|-----|-----|
| Pre | 33.33 | 6.831 | 24 | 44 |
| Post | 18.13 | 2.748 | 14 | 24 |

Paired T-test

Pada tabel 4.2 terdapat nilai mean yang mengalami penurunan yang bisa dilihat dari penurunan Pre 33,33 ke Post 18.13. Standar deviation pada Pre 6.831 dan Post 2.783. Kemudian nilai minimum pada Pre yaitu 24, Post 14 dan nilai maximum pada Pre yaitu 44 dan nilai maximum pada post yaitu 24.

b. Tingkat kecemasan

Tabel 4.3

Tingkat kecemasan masing-masing responden sebelum dan setelah pemberian terapi murottal

| Kode Responden | Umur | Pendidikan | Jenis Kelamin | Pre Test | | Post Test | |
|----------------|------|------------|---------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | | | Skor | Tingkat Kecemasan | Skor | Tingkat Kecemasan |
| 1 | 67 | SD | Perempuan | 37 | Berat | 19 | Ringan |
| 2 | 70 | SMA | Laki-laki | 44 | Berat sekali | 22 | Sedang |
| 3 | 51 | SD | Perempuan | 34 | Berat | 15 | Ringan |
| 4 | 44 | SD | Perempuan | 43 | Berat sekali | 19 | Ringan |
| 5 | 77 | SMA | Perempuan | 36 | Berat | 20 | Ringan |
| 6 | 54 | S2 | Perempuan | 28 | Berat | 19 | Ringan |
| 7 | 40 | SMA | Perempuan | 38 | Berat | 18 | Ringan |
| 8 | 64 | SD | Perempuan | 29 | Berat | 17 | Ringan |
| 9 | 45 | SMA | Laki-laki | 28 | Berat | 16 | Ringan |
| 10 | 49 | SMP | Laki-laki | 25 | Sedang | 14 | Ringan |
| 11 | 60 | SD | Perempuan | 34 | Berat | 16 | Ringan |
| 12 | 54 | S1 | Laki-Laki | 24 | Sedang | 18 | Ringan |
| 13 | 39 | SD | Perempuan | 28 | Berat | 20 | Ringan |
| 14 | 47 | SMA | Perempuan | 28 | Berat | 15 | Ringan |
| 15 | 57 | SD | Perempuan | 44 | Berat sekali | 25 | Sedang |

Pada tabel 4.3 terlihat tingkat kecemasan dari kecemasan berat sekali sebanyak 3 responden menjadi kecemasan sedang 2 responden dan kecemasan sedang sebanyak 12 responden menjadi 13 responden dengan tingkat kecemasan ringan.

Tabel 4.4

Tingkat kecemasan pre dan post

| Tingkat Kecemasan | Pre | | Post | |
|---------------------|-----|------|------|------|
| | F | % | F | % |
| Tidak ada kecemasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ringan | 0 | 0 | 13 | 86,7 |
| Sedang | 2 | 13,3 | 2 | 13,3 |
| Berat | 10 | 66,7 | 0 | 0 |
| Berat sekali | 3 | 20 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 100 | 15 | 100 |

Sumber: Data Primer 2022

Pada tabel 4.4 pada pre eksperimen terdapat 10 (66,7%) responden dengan kecemasan berat, 3 (20%) responden dengan kecemasan berat sekali dan 2 (13,3) responden dengan kecemasan sedang. Pada post eksperimen terdapat 13 (86,7%) responden dengan kecemasan ringan dan 2 (13,3%) responden dengan kecemasan sedang 2 (13,3%).

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada sampel yang berpasangan dengan menggunakan uji Paied Sample T-*test*

Tabel 4.5

Pengaruh terapi murottal terhadap perubahan tingkat kecemasan

| Perubahan Tingkat Kecemasan | (f) | % | <i>p-value</i> |
|-----------------------------|-----|-----|----------------|
| Menurun | 15 | 100 | 0,0001 |
| Tetap | 0 | 0 | 0 |
| Meningkat | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 100 | 0,0001 |

Paired Sampel T-*test*

Pada tabel 4.5 diperoleh hasil pengaruh terapi murottal terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus mengalami penurunan dengan menggunakan uji paired T-*test* untuk melihat perbedaan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai *P-value* = 0,0001 dengan taraf signifikan ($<0,05$). Nilai *p-value* 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan terapi murottal.

C. Pembahasan

1. Gambaran tingkat kecemasan responden sebelum terapi murottal

Tingkat kecemasan pada pasien Diabetes Melitus sebelum dilakukan intervensi terapi murottal yaitu kecemasan berat sekali 3 (20%), kecemasan berat 10 (66,7%) dan kecemasan sedang 2 (13,3%). Pada penelitian ini, mayoritas responden mengalami tingkat kecemasan berat, menurut asumsi peneliti pasien dengan Diabetes Melitus bukan hanya berpengaruh pada kondisi fisik saja, namun memiliki pengaruh secara psikologis serta sosial dimana hal ini berkaitan dengan dampak dari perubahan fisik atau kondisi fisik pasien yang tidak sedikit sudah mengalami komplikasi diabetes melitus sehingga pasien harus beradaptasi dengan lingkungannya atas perubahan fisik yang dialami serta harus mengubah pola hidup seperti pengaturan makan, pemantauan glukosa darah agar kondisinya tetap terkontrol.

Sejalan dengan itu Taluta (2014) melalui penelitiannya di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan tingginya kecemasan yang dialami penderita Diabetes Melitus yaitu kecemasan berat yaitu 43,8 % dan kecemasan sedang 43,8% dan 12,5% penderita DM mengalami kecemasan ringan. Memperkuat penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Asiyah & Istikhomah (2019) menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah terapi murottal Al-Qur'an. Dimana sebelum dilakukan terapi murottal Al-Qur'an didapatkan tingkat kecemasan pasien diabetes melitus berada pada kategori kecemasan berat yaitu 15 responden (100%).

Menurut Brunner & Suddarth (2002) yang menyatakan bahwa kecemasan merupakan reaksi terhadap penyakit karena dirasakan sebagai suatu ancaman, ketidaknyamanan akibat nyeri dan keletihan, perubahan diet, berkurangnya kepuasan seksual, timbulnya krisis finansial, frustrasi dalam mencapai tujuan, kebingungan dan ketidakpastian masa kini dan masa depan. Penderita diabetes melitus pada umumnya cenderung akan mengalami banyak perubahan dalam hidup, sebagian besar ada yang menjadi cemas, panik, bahkan memberontak (Davison et al., 2006).

Peneliti berasumsi bahwa tingkat kecemasan yang dialami oleh seseorang dipengaruhi oleh perubahan dari kondisi kesehatan yang dialaminya. Ketika kondisi kesehatan seseorang memburuk maka akan berpengaruh terhadap tingkat kecemasan yang dialami oleh pasien Diabetes Melitus.

2. Gambaran tingkat kecemasan responden setelah terapi murottal

Tingkat kecemasan pada pasien diabetes melitus setelah dilakukan intervensi terapi murottal kecemasan sedang 2 responden (13,3%) dan kecemasan ringan 13 responden (86,7%). Berarti terapi murottal ini berhasil untuk mengurangi kecemasan pada pasien diabetes melitus. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihati (2018) yang menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi setelah dilakukan terapi murottal mengalami penurunan tingkat stres, dari tingkat stress ringan berjumlah 6 orang menjadi stress ringan berjumlah 16 orang dan hasil uji *wilcoxon test*, pada kelompok intervensi menunjukkan terdapat perbedaan tingkat stress antara

sebelum dan sesudah diberikan terapi audio dengan murottal surah Al-Fatihah.

Al-Qahdi melalui penelitiannya di Klinik besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, baik mereka yang bisa berbahasa Arab maupun tidak, dapat merasakan perubahan psikologis yang besar. Penurunan depresi, kesedihan, ketenangan jiwa, menangkal berbagai penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati & Hasibuan (2021) didapatkan hasil bahwa ada pengaruh penurunan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah pemberian terapi murottal Al-Qur'an pada pasien yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Aminah.

Peneliti berasumsi, murottal Al-Qur'an memiliki lantunan yang indah sehingga membuat tubuh menjadi rileks menurunkan hormon penyebab cemas yaitu hormon adrenalin, norepinephrine dan kortisol, serta dapat mengalihkan perhatiannya dari rasa cemas dan tegang dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini diperoleh dari hasil validasi perasaan setelah dilakukan intervensi, yang mengungkapkan bahwa perasaannya lebih nyaman dan tenang ketika mendengarkan murottal Al-Qur'an.

3. Perbedaan tingkat kecemasan pasien diabetes melitus sebelum dan setelah terapi murottal

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Pada saat sebelum dilakukan terapi murottal tingkat kecemasan pasien diabetes melitus

berada pada tingkat kecemasan berat sekali sebanyak 3 responden (20%), kecemasan berat 10 (66,7) responden dan kecemasan sedang 2 responden (13,3) sedangkan pada saat setelah dilakukan terapi murottal, cemas ringan 13 responden (86,7%) dan cemas sedang 2 responden (13,3%). Hal ini menunjukkan bahwa terapi murottal dapat menurunkan kecemasan pada pasien diabetes melitus, meskipun tingkat kecemasan yang dialami pasien masih berada pada tingkat kecemasan sedang dan ringan.

Pada 3 responden dengan tingkat kecemasan berat sekali, setelah dilakukan intervensi terapi murottal, 2 diantaranya mengalami penurunan tingkat kecemasan menjadi sedang dan 1 diantaranya mengalami penurunan tingkat kecemasan ringan. Menurut asumsi peneliti perubahan tingkat kecemasan dari berat sekali ke sedang dan berat sekali ke ringan dipengaruhi oleh usia, semakin tua seseorang maka semakin mudah untuk mengalami kemunduran fisik maupun psikologis sehingga akibat dari perubahan tersebut mempengaruhi perbedaan respon tubuh masing-masing individu. Pada perubahan tingkat kecemasan berat sekali kesedang berada pada tahapan usia lansia akhir serta manula, pada perubahan tingkat kecemasan dari berat sekali keringan berada pada tahapan usia dewasa akhir. Pada tingkat kecemasan berat ke ringan sebanyak 10 responden dan tingkat kecemasan sedang ke ringan 2 responden, berat ringannya kecemasan yang dialami pasien diabetes tergantung pada masing-masing individu, dalam menyikapi penyakitnya.

Dari uraian diatas menurut Stuart Gail W, (2013) yang mengatakan bahwa kecemasan yaitu respon emosional terhadap

penilaian keadaan emosional yang tidak memiliki objek yang spesifik, dimana kecemasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin.

Faktor pertama yang mempengaruhi kecemasan yakni usia. Pada penelitian ini mayoritas responden berusia 46-55 sebanyak 5 responden, sebelum dilakukan intervensi 3 diantaranya memiliki tingkat kecemasan berat dan 2 diantaranya memiliki kecemasan sedang, menurut WHO (2014) tahapan usia tersebut masuk kedalam usia lansia awal, dikarenakan proses menua perlahan-lahan akan menurunkan kemampuan untuk mempertahankan kondisinya. Hasil penelitian dari Nurhayati (2020) yang mengatakan bahwa semakin tua usia seseorang maka semakin mudah mengalami kecemasan ketika mengalami DM tipe 2. Cemas yang dialami pasien DM tipe 2 pada usia lanjut memiliki hubungan biologi dasar, dimana pada lanjut usia mengurangi berkurangnya neuro transmitter yang berkaitan dengan *mood* dan emosi. Periode cemas pada lansia lebih panjang dan kemungkinan kambuh meningkat dengan bertambahnya umur.

Faktor selanjutnya yaitu pendidikan, pada penelitian ini pendidikan responden paling banyak adalah SD sebanyak 7 responden, sebelum dilakukan intervensi, 5 diantaranya memiliki tingkat kecemasan berat dan 2 diantaranya memiliki tingkat kecemasan berat sekali setelah dilakukan intervensi, ke 7 responden berada pada tingkat kecemasan ringan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2020) mengatakan bahwa responden dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih mudah mengalami cemas dan depresi dibandingkan dengan responden berpendidikan

tinggi. Pendidikan mendorong individu menuju pemahaman yang tepat tentang mekanisme penyakit dan komplikasi yang dialami serta meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, sehingga seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi beresiko lebih rendah untuk mengalami kecemasan (Ganasegeran et al., 2014).

Faktor selanjutnya yaitu pekerjaan, pada penelitian ini mayoritas responden bekerja sebagai IRT sebanyak 8 responden, 6 diantaranya memiliki tingkat kecemasan berat dan 2 diantaranya memiliki tingkat kecemasan berat sekali, penelitian yang dilakukan oleh Ganasegeran et al. (2014) yang menyatakan seseorang yang bekerja semakin cemas jika penyakit diabetes yang dialami membuat responden memiliki keterbatasan dalam bekerja, menurunkan produktifitas kerjanya hal ini dikarenakan seseorang yang bekerja memiliki beban fisik dan psikologis yang lebih berat. Peneliti berasumsi bahwa IRT seringkali dianggap tidak bekerja, namun kenyataannya IRT melakukan pekerjaan fisik secara terus menerus dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya, harus mengurus urusan rumah tangganya, merawat suami dan anaknya, sehingga merak akan lebih rentan untuk mengalami beban psikologis maupun fisik. Kemudian faktor jenis kelamin, pada penelitian ini sebanyak 11 responden berjenis kelamin perempuan, tingkat kecemasan sebelum dilakukan intervensi sebanyak 9 responden dengan kecemasan berat dan 2 responden dengan kecemasan berat sekali dan 4 responden berjenis kelamin laki-laki, 2 diantaranya dengan tingkat kecemasan sedang. Menurut Kaplan (2010) perempuan lebih sering mengalami kecemasan dibanding laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan lebih

peka terhadap emosinya, sering menyelesaikan masalah dengan perasaan, berbanding dengan laki-laki yang lebih berpikir logis dan tidak menggunakan perasaan. Sejalan dengan itu, hasil penelitian (Sousa et al., 2009) yang menunjukkan bahwa seluruh responden berjenis kelamin perempuan dan menjelaskan bahwa Diabetes Melitus tipe 2 lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Pada Wanita timbunan lemak lebih besar dibanding dengan laki-laki yang dapat menurunkan sensitifitas terhadap kerja insulin pada otot dan hati.

Dari uraian diatas menurut asumsi peneliti faktor terjadinya kecemasan pada pasien diabetes melitus dapat berasal dari dirinya sendiri, pada penelitian ini rata-rata responden sebelum diberikan intervensi mengalami kecemasan berat dimana individu memerlukan banyak arahan untuk dapat memusatkan pada suatu area lain yang ditandai dengan responden yang sulit berpikir, bingung, cemas serta kontak mata yang buruk.

4. Pengaruh terapi murottal terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien diabetes melitus

Setelah dilakukan Analisa dengan menggunakan Uji Sampel Paired T-test menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai $P\text{-value} = 0,0001$. Interpretasi dari hasil dari $p\text{-value}$ kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan terapi murottal. Maka disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi murottal terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nirwana (2014) dimana ada perbedaan yang signifikan terapi murottal terhadap perubahan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RSUD Labuang Baji Makassar, dengan nilai $p=0,002$. Kecemasan yaitu kondisi emosi yang muncul karena adanya ketidaknyamanan dan pengalaman yang samar disertai perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh hal yang belum jelas (Annisa & Ifdil, 2016)

Salah satu terapi yang dapat menurunkan menurunkan kecemasan, menenangkan jiwa seseorang adalah mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Hal ini karena murottal Al-Quran dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkat perasaan rileks, mengalihkan dari rasa takut, cemas dan tegang Srisuryani (2016). Sejalan dengan penelitian itu, menurut perdana dan Andika (2008) didalam Lestari et al., (2015) terapi murottal Al-Quran sangat efektif dalam menurunkan kecemasan pasien karena stimulan Al-Quran rata-rata didominasi oleh gelombang delta, dimana gelombang delta ini mengindikasikan bahwa kondisi otak sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat rileks. Terapi murottal Al-Quran memiliki aspek yang sangat diperlukan dalam mengatasi kecemasan, murottal Al-Quran memiliki kemampuan untuk membentuk suatu koping baru untuk mengatasi kecemasan sehingga secara garis besar terapi murottal Al-Quran memiliki dua poin penting, yakni memiliki irama yang indah dan juga secara psikologis dapat memotivasi dan memberikan dorongan semangat seseorang untuk menghadapi problem yang sedang dihadapinya (Lestari et al., 2015).

Mekanisme bagaimana terapi murottal ini dapat menurunkan tingkat kecemasan pasien diabetes melitus dapat dilihat dari aspek fisiologis dan aspek spiritual. Menurut pendapat (Bensons & Proctor, 2000) dalam buku Phatimah (2020) fisiologis tubuh Ketika mengalami cemas maka system tubuh akan bekerja dengan meningkatkan kerja saraf simpatis sebagai respon terhadap stress dan kecemasan. System saraf simpatis bekerja melalui aktivasi medulla adrenal untuk meningkatkan pengeluaran *epinephrine*, *norepinephrine*, *cortisol* serta menurunkan *nitric oxide*. Keadaan tersebut akan menyebabkan respon tubuh seperti peningkatan denyut jantung, pernafasan, tekanan darah, aliran darah ke berbagai organ meningkat serta peningkatan metabolisme tubuh. Untuk menghambat kerja saraf simpatis dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivasi kerja saraf parasimpatis untuk menghasilkan respon relaksasi.

Saraf parasimpatis akan menstimulasi medulla adrenal untuk menurunkan pengeluaran *epinephrine*, *norepinephrine*, *cortisol* serta meningkatkan *nitric oxide*. Keadaan tersebut akan menyebabkan perubahan respon tubuh seperti penurunan denyut nadi, tekanan darah, konsumsi oksigen, metabolisme tubuh, produksi laktat dan seseorang merasakan perasaan nyaman (Bensons & Proctor, 2000).

Ketika seseorang diperdengarkan murottal, maka harmonisasi murottal yang indah akan masuk ke dalam telinga dalam bentuk suara (audio), menggetarkan gendang telinga, mengguncangkan cairan di telinga dalam serta menggetarkan sel-sel rambut didalam koklea untuk selanjutnya melalui saraf koklearis menuju otak dan menciptakan imajinasi keindahan di otak kanan dan otak kiri (Smeltzer et al.,

2008). Hal ini akan berdampak pada kenyamanan dan perubahan perasaan. Perubahan perasaan ini dikarenakan murottal dapat menjangkau wilayah kiri korteks cerebri (Mindlin, 2009). Dari korteks limbik, jaras pendengaran dilanjutkan ke hipokampus, dan meneruskan sinyal suara ke Amigdala yang merupakan area perilaku kesadaran yang bekerja pada tingkat bawah sadar, sinyal kemudian diteruskan ke hipotalamus (Smeltzer et al., 2008).

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Allah SWT yang menyembuhkan dari segala macam penyakit dan keraguan. Kesembuhan ada dua macam yaitu kesembuhan maknawi rubi, yaitu kesembuhan dari penyakit hati dan kesembuhan yang nampak terlihat, yaitu kesembuhan badan. Firman Allah SWT dalam QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” QS Yunus/10/57

Menurut M. Quraish Shihab, (2002) dalam tafsir Al-Mishbah, ayat di atas menjelaskan bahwa dimanapun dan kapanpun sepanjang masa telah ada semua pengajaran yang sangat agung dan bermanfaat dari Allah SWT. yaitu Al-Qur'an Al-Karim dan obat yang sangat ampuh untuk penyakit-penyakit kejiwaan yang terdapat dalam hati manusia serta menjadi petunjuk yang sangat jelas menuju kebenaran dan kebajikan agar memperoleh rahmat yang berlimpah bagi orang-orang

yang beriman. Ayat di atas menegaskan bahwa al-Qur'an adalah obat bagi apa yang terdapat dalam dada. Sementara ulama memahami ayat-ayat al-Qur'an juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani.

Peneliti berasumsi bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan spiritual, sehingga terapi murottal bisa dijadikan salah satu intervensi dalam aspek spiritual untuk mencapai pemenuhan pemberian asuhan keperawatan secara holistic, menyadarkan pasien akan kebesaran Tuhan, sehingga membawa pasien dalam perasaan berserah diri terhadap ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan, dengan demikian muncullah perasaan tenang dan religius dalam menghadapi kondisi penyakit yang dialami.

5. Keterbatasan penelitian

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data, diantaranya:

- a. Pada saat dilakukan intervensi terapi murottal QS Ar-Rahman, responden kurang mengetahui arti atau makna dari surah tersebut, meskipun tidak memahami arti dari surah, tetap mampu merasakan perubahan fisiologis yang besar.
- b. Pada penelitian ini tidak menentukan nada serta irama apa yang digunakan
- c. Pada penelitian ini tidak menentukan frekuensi suara yang digunakan dalam terapi murottal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat kecemasan pada pasien Diabetes Melitus sebelum dilakukan intervensi terapi murottal yaitu kecemasan sedang 2 (13,3%) dan, kecemasan berat 10 (66,7%) kecemasan berat sekali 3 (20)
2. Tingkat kecemasan pada pasien diabetes melitus setelah dilakukan intervensi terapi murottal kecemasan sedang 2 (13,3%) dan kecemasana ringan 13(86,7%).
3. Pada uji “*paired sample T-test* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar dengan diperolehnya nilai signifikan *p-value 0,0001* ($p < 0,05$).

B. Saran

Terapi murottal Al-Qur'an merupakan intervensi yang mudah digunakan dan dapat menurunkan kecemasan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan variable dependen yang lain, sehingga ruang lingkup penelitian dapat lebih luas dan tidak hanya pada kecemasan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya untuk menentukan irama murottal serta frekuensi suara yang digunakan dalam murottal Al-Quran.

Terapi murottal Al-Qur'an ini berpengaruh dalam menurunkan tingkat kecemasan, sehingga diharapkan terapi ini dapat dipertimbangkan untuk diterapkan sebagai intervensi keperawatan dalam mengatasi respon cemas pasien

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khasanah, A., & Pitayanti, A. (2021). Efektifitas Terapi Murottal Al-Quran Terhadap dan Kecemasan pada Pasien Pre Operasi. *Jurnal Keperawatan, Vol.13 No.*, 129–136.
- Angriani, S., & Baharuddin. (2020). Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Kadar Gula Darah pada Penderita Diabetes Melitus tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 102–106.
- Annisa, D. F., & Ifdil, I. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia). *Konselor*, 5(2), 93. <https://doi.org/10.24036/02016526480-0-00>
- Arum, S., Erlinawati, Fauzia, Apriyanti, F., Afriyanti, I., Hastuty, M., Rahayu, S. F., Mariati, N., Esme, Anggeriyane, Mirawati, Widiyanti, S., Syukrianti, & Syahda. (2021). *Kehamilan Sehat Mewujudkan Generasi Berkualitas di masa New Normal*. Penerbit Insania.
- Asiyah, S. N., & Istikhomah, I. (2019). Efektivitas Terapi Murottal dalam Mengurangi Kecemasan Pada Penderita Diabetes. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Pencegahan, vol 3*.
- Bensons, H., & Proctor, W. (2000). *Dasar Dasar Respons Relaksasi*. Kaifa.
- Black Joice M, J. H. H. (2014). *Medical Surgical Nursing Vol.2*. Salemba Medika.
- Brunner, & Suddarth. (2002). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, alih bahasa: Waluyo Agung, Yasmin Asih, Kuncana.,I madekaryasah*. EGC.
- Dahlan, N., Bustan, M. N., & Kurnaesih, E. (2018). Pengaruh Prolanis Terhadap Pengendalian Gula Darah Terkontrol pada Penderita DM di Puskesmas Sudiang Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional, vol.1*, 39–49.
- Damanik, R. K. (2021). *Kecemasan Masyarakat & Resiliensi pada Masa Vaksinasi Covid-19*. PT. Insan Cendekia Mandiri Groub.
- Davison, G. C., Neale, J. M., & Kring, A. M. (2006). *Psikologi abnormal (9th ed.)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Mekar Surabaya.
- Ganasegeran, K., Renganathan, P., Manaf, R. A., & Al-Dubai, S. A. R. (2014). Factors Associated with Anxiety and Depression among Type 2 Diabetes

- Outpatients in Malaysia: a Descriptive Cross-Sectional Single-Centre Study. *Journal of BMJ Open*, 1-7.
- Irwan. (2016). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Katalog Dalam Terbitan.
- Jeharu, A. F., Hepilita, Y., & Fredi Daar, G. (2021). Literatur Review : Hubungan Kecemasan Dengan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. *48 Jwk*, 6(1), 2548–4702.
- K.Chandler, S., Robins, J. L., & A.Kinser, P. (2019). Nonpharmacologic Interventions for the Self Management of Anxiety in Parkinson's Disease: A Comprehensive Review. *Behavioral Neurology*, 9.
- Kaplan, & Sadock. (2010). *Buku Ajar: Psikiatri Klinis*. EGC.
- Kementrian Kesehatan RI. (2018). *Hasil Utama Riskedas Tentang Prevalensi Diabetes Melitus di Indonesia 2018*.
- Kumar, S., Wong, P. S., & Hasan., S. S. (2019). The Relationship Between Sleep, Quality Inappropriate Medication Use and Frailty Among Older Adults in Aged Care Home in Malaysia. *Research Article*, 1–11.
- Kurniadi, & Nurrahmadi. (2014). *Stop Diabetes, Hipertensi, Kolesterol Tinggi, Jantung Koroner*. Istana Media.
- Lestari, D., Adriana, & Fauzan, S. (2015). Pengaruh Terapi Murotal Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Dengan Penyakit Jantung Koroner di Ruang ICCU RSUD Dr. Soedarso Pontianak. *Naskah Publikasi*, 2(1), 1–11.
- Maulidia, Z., & Muladiatin, I. (2018). Terapi Murottal Al-Quran Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Kesehatan*, 7 no. <https://doi.org/10.37048>
- Mindlin. (2009). *Pengaruh Al-Qur'an terhadap Fisiologi dan Psikologi Manusia, Al-Qur'an dan terjemahannya*. Salemba.
- Murwani, A. (2009). *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*. Fitramaya.
- Nirwana. (2014). Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus Di RSUD Labuang Baji Makassar. *Implementation Science*, 39(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025> <http://dx.doi.org/10.1038/nature10402> <http://dx.doi.org/10.1038/nature21059> <http://journal.sta>

inkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://

- Nurhayati, P. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan dan depresi pada pasien diabetes melitus tipe 2. *Health Sciences and Pharmacy Journal, Vol. 4, No.*
- Nursalam. (2013). *Metodelogi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Ota, A., & P.ulrih, N. (2017). An Overview of Herbal Product and Secondary Metabolisme Used for Management of Type Two Diabetes. *Fronties in Pharmacology, 1–14.*
- Phatimah, I. (2020). *Konsep Relaksasi Zikir dan Implikasinya Terhadap Penderita Gagal Ginjal Kronis*. CV.Adanu Abimata.
- Prihati, D. R., & Wirawati, M. K. (2018). Intervensi Terapi Audio Dengan Murottal Surah Al-Fatihah Terhadap Penurunan Stres Pada Diabetes Melitus Tipe II. *Prosiding Seminar Nasional Unimus, 1, 64–69.*
http://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/34
- Priscilla, L. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah (EGC (ed.))*.
- Riskesdas. (2018). No Title. *Hasil Utama Riskesdas Tentang Prevalensi Diabetes Melitus Di Indonesia 2018*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah; pesan, kesan dan keserasian Al_Qur'an. Cet. I.* (Lentera Ha).
- Sibagariang, E. E., & Lumban, Y. C. G. (2022). Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Diabetes Melitus Pada Saat Pandemi Covid-19. *Kedokteran Sains Dan Teknologi Medik, 5(1), 43–49.*
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2008). *Brunner and Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing (11th ed.)*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Soelitijo, S. A., Novida, H., Rudjianto, A., Soewondo, P., Suastika, K., Manaf, A., Sanusi, H., Lindarto, D., Shahab, A., Pramono, B., Langi, Y. A., Sari, D. P., Soetedjo, N. N., & Saraswati, M. R. (2015). *Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2*. Pengurus Besar Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PB PERKENI).

- Sousa, V. D., Hartman, S. W., Miller, E. H., & Carroll, M. A. (2009). New measure of diabetes self-care agency, diabetes self-efficacy, and diabetes self-management for insulin-treated individual with type 2 diabetes. *Journal of Clinical Nursing, 18*, 1305-1312.
- Srisuryani. (2016). Pengaruh Terapi Audio Murottal Surah Ar_Rahman Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lanjut Usia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Ponggalan Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan, Volume 3, Januari 2017, 1-13*.
- Stuart Gail W. (2013). *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. EGC.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suirakoa. (2012). *Penyakit Degeneratif*. Nuha Medika.
- Sulistyowati, Y., & Hasibuan, M. T. D. (2021). Pengaruh Terapi Relaksasi Audio Murottal Al-Qur'an Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan pada pasien yang di Rawat di Ruang ICU Rumah Sakit Aminah. *Indonesian Trust Health Jurnal, 487-490*.
- Suryati, I., Jafri, Y., Putri, N., & Srimutia, R. (2020). Penyuluhan Buerger Allen Exercise Pada Pasien. *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis, 66-71*.
- Susilawati, S., Nurcahyati, S., & Syaripuddin, A. (2019). Pengaruh Terapi Murottal Al-Quran Terhadap Stres Pasien Hipertensi di Ruang Penyakit Dalam RSUD Waled Cirebon. *Jurnal Kesehatan Mahardika, Vol.6 No.1, 32-36*.
- Suyono. (2012). *Kecendrungan Peningkatan Jumlah Penyandang Diabetes Melitus dalam: Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu*. Penerbit FK UI.
- Taluta, Y. P., & Hamel, R. S. (2014). Koping Pada Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Halmahera Utara. *Ejournal Keperawatan (e-Kp), 2(1), 1-9*.
- WHO. (2014). *Definiation of an Older or Elderly Person*.
- Wijayanto, T., & Widya. (2019). HubunganKecemasan dengan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus. *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung, 91-102*.
- Zulkarnain Lubis. (2021). *Statistika Terapan untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*. Penerbit ANDI.

Zulmayetri, Nurhastuti, & Safaruddin. (2019). *Penulisan Karya Ilmiah*. Kencana.



LAMPIRAN



Lampiran 1

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Ismayanti

NIM : 70300118043

Akan mengadakan penelitian tentang **“Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar”** untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 27 Mei 2022

Peneliti,

Ismayanti

Lampiran 2

| |
|-----------------|
| KODE RESPONDEN: |
|-----------------|

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :

Usia :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian (Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar) Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Makassar, 27 Mei 2022

Responden,

()

Lampiran 3

KUESIONER RESPON KECEMASAN

Kuesioner ini merupakan kuesioner untuk mengetahui tingkat kecemasan menurut alat ukur kecemasan yang disebut HARS yang merupakan pengukuran kecemasan yang didasarkan pada munculnya gejala pada individu yang mengalami kecemasan. Skala HARS ini pertama kali digunakan pada tahun 1959, yang diperkenalkan oleh Max Hamilton dan telah menjadi standar dalam pengukuran kecemasan.

Petunjuk Pengisian:

1. Daftar pertanyaan dibawah ini mengukur mengenai tingkat kecemasan
2. Isilah pertanyaan dengan memberi tanda check list pada jawaban yang paling benar
3. Bila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti

A. Data Demografi

Inisial responden :
 Umur :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jenis Kelamin :

B. Penilaian

Cara penilaian tingkat kecemasan adalah memberikan nilai dengan kategori:

- 0: tidak ada gejala sama sekali
- 1: satu dari gejala yang ada
- 2: sedang atau separuh dari gejala ada
- 3: berat atau lebih dari ½ gejala yang ada
- 4: sangat berat atau semua gejala ada

| No. | Pertanyaan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kecemasan: 1. Cemas 2. Firasat Buruk 3. Takut akan pikiran sendiri 4. Mudah tersinggung | | | | | |
| 2. | Ketegangan: 1. Merasa tegang 2. Lesu 3. Tak bisa istirahat dengan tenang 4. Mudah terkejut 5. Mudah menangis 6. Gemetar 7. Gelisah | | | | | |
| 3. | Ketakutan: 1. Ketika gelap 2. Ketika ada orang asing 3. Ketika ditinggal sendiri 4. Takut pada binatang besar 5. Keramaian lalu lintas 6. Orang banyak | | | | | |
| 4. | Gangguan tidur 1. Sukar tidur 2. Terbangun di malam hari 3. Tidak nyenyak 4. Bangun dengan lesu 5. Banyak mimpi-mimpi 6. Mimpi buruk 7. Mimpi menakutkan | | | | | |
| 5. | Gangguan kecerdasan | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sukar konsentrasi 2. Daya ingat buruk 3. Daya ingat menurun | | | | | |
| 6. | <p>Perasaan depresi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangnya minat 2. Berkurangnya kesenangan pada hobi 3. Sedih 4. Bangun dini hari 5. Perasaan berubah-ubah sepanjang hari | | | | | |
| 7. | <p>Gejala somatic</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sakit dan nyeri otot 2. Kaku 3. Kedutan otot 4. Gigi gemeretak 5. Suara tidak stabil | | | | | |
| 8. | <p>Gejala somatik (sensori)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telinga bordering 2. Penglihatan kabur 3. Muka merah atau pucat 4. Merasa lemah 5. Perasaan ditusuk-tusuk | | | | | |
| 9. | <p>Gejala kardiovaskuler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Denyut jantung cepat 2. Berdebar-debar 3. Nyeri di dada 4. Perasaa lesu/ lemas seperti mau pingsan 5. Detak jantung mengilang (berenti sekejap) | | | | | |
| 10. | <p>Gejala respiratori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasa tertekan atau sempit di dada | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Perasaan tercekik 3. Sering menarik napas 4. Sesak | | | | | |
| 11. | <p>Gejala gastrointestinal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit menelan 2. Perut melilit 3. Gangguan pencernaan 4. Nyeri sebelum dan sesudah makan 5. Perasaan terbakar di perut 6. Mual 7. Muntah 8. Buang air besar lembek 9. Keilangan berat badan 10. Sukar buang air besar | | | | | |
| 12. | <p>Gejala urogenital</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sering BAK 2. Tidak dapat menahan air seni 3. Tidak datang bulan 4. Darah haid berlebihan 5. Darah haid amat sedikit 6. Masa haid berkepanjangan 7. Masa haid amat pendek 8. Haid beberapa kali dalam sebulan 9. Menjadi dingin 10. Ejakulasi dini ereksi melemah 11. Ereksi hilang | | | | | |
| 13. | <p>Gejala otonom</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mulut kering 2. Mulut merah 3. Mudah berkeringat | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 4. Pusing dan sakit kepala 5. Kepala terasa berat 6. Kepala terasa sakit 7. Bulu-bulu berdiri | | | | | |
| 14. | <p>Tingkah laku pada wawancara</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Gelisah 2. Tidak tenang 3. Jari gemetar 4. Kerut kening 5. Muka tegang 6. Tonus otot meningkat 7. Napas pendek dan cepat 8. Muka merah | | | | | |

Lampiran 4

Instrumen asli

[50]

THE ASSESSMENT OF ANXIETY STATES BY RATING

BY MAX HAMILTON*

In the last decade many scales have been devised for the assessment of psychiatric symptoms. Most have been designed for use with patients in mental hospitals and have therefore concentrated chiefly on behaviour in the ward and in hospital activities. Not many of the items are concerned with symptoms, and these are chiefly those of schizophrenia and the depressive psychoses. Even less attention is paid to neurotic symptoms, especially anxiety states, despite the fact that the scales are intended generally to cover the full range of psychiatric syndromes. These scales have been designed to enable the research worker to obtain a quantified measure of the patient's clinical status, e.g. for use in clinical trials of treatment. In them, the separate items are summed in groups and a set of scores or 'profile' is obtained for each patient. This 'profile' is often used as a diagnostic aid, although this is not the primary purpose of the scale. Users are generally warned not to use the scale for making a diagnosis.

In practice, these scales have two other functions of great importance. The first is that the investigator can describe precisely certain characteristics of his group of patients using the mean score and standard deviation. The description and definition of the population from which a sample is drawn is of fundamental importance and is one of the difficult problems that faces research in psychiatry. For this purpose diagnostic categories are notoriously unreliable and rating scales are invaluable. The second function is that they help to define syndromes and subsyndromes,

and in a manner which permits of reproduction in another enquiry.

The present scale was designed along different lines. It is intended for use with patients already diagnosed as suffering from neurotic anxiety states, not for assessing anxiety in patients suffering from other disorders. Anxiety in greater or lesser degree is found in agitated depression and obsessional states particularly, and also in such states as organic dementia, hysteria and schizophrenia, but it must be clearly emphasized that the scale is not intended to cope with these conditions.

The usual methods for scale design were used. A series of symptoms were assembled which were considered to cover the condition adequately. These were then grouped together according to their nature, or where clinical experiences indicated that they were associated. It was decided that for practical purposes twelve groupings were sufficient. Together with the patient's behaviour at interview, these formed the thirteen variables of the scale. They are: anxious mood (a continued state of apprehension), tension (including irritability), fears (of specific or phobic type), insomnia, cognitive changes (difficulty in concentration and forgetfulness), depression, somatic symptoms of a general type, cardiovascular, respiratory, gastro-intestinal, genito-urinary, and general autonomic symptoms, the latter consisting chiefly of headaches and sweating. Each of the variables was defined in a series of brief statements, headed by the name of the variable, printed on a sheet which faced the interviewer during the interview with the patient (see Appendix 1).

Assessments were made on a five-point scale (see Appendix 2). In practice, the last grade is very rarely used for out-patients, and serves more as a marker, a method of delimiting

* Senior Research Fellow, Department of Psychiatry, University of Leeds. Based on a paper read at the Annual General Meeting of the British Psychological Society, April 1957. Manuscript received 2 August 1958.

ASSESSMENT OF ANXIETY STATES

51

the range, rather than as a grade of practical use. In order to determine the reliability of the scale the patients were seen by two interviewers simultaneously. The principal interviewer conducted the interview and endeavoured to obtain information regarding the patient's symptoms. The second interviewer made his ratings independently of the first and could add his own questions if he thought he had not had sufficient information.

Table 1. *Correlations and t tests between raters*

| | Raters | | | |
|-------------------|--------|------|------|---------------------------|
| | I | II | III | |
| I <i>t</i> test | — | 0.30 | 0.54 | } First inter- view |
| Correlation | — | 0.93 | 0.39 | |
| No. of subjects | — | 8 | 8 | |
| II <i>t</i> test | 0.07 | — | 0.63 | |
| Correlation | 0.83 | — | 0.91 | |
| No. of subjects | 8 | — | 10 | |
| III <i>t</i> test | 0.64 | 1.30 | — | } Second interview |
| Correlation | 0.95 | 0.93 | — | |
| No. of subjects | 8 | 10 | — | |

The initial testing of the scale involved three psychiatrists. Preliminary discussions eliminated many of the difficulties in the first version of the definitions of the variables. The rating scale was then tried on a number of patients and the discrepancies and agreements between psychiatrists carefully considered in detail, in an endeavour to eliminate difficulties. The scale was then tried on a group of patients and this paper is concerned with the results. An identical procedure was followed throughout. Each patient was assessed by two raters and the results recorded. Afterwards the results were compared and any discrepancies noted and discussed. Nevertheless, once a rating had been made it was not altered. The measure of reliability was based

on the sum of crude scores for each patient. Product-moment correlations were calculated between each pair of physicians, and since the patients were interviewed on two occasions for purposes of a drug trial, two such correlations between each pair of physicians is available. The results are to be seen in Table 1. The weighted mean of these correlations, using the *z* transformation, is 0.89. This is remarkably high and illustrates the reliability of psychiatric assessments under suitable conditions. Since the reliability coefficient does not give information on the bias of raters towards high or low scores, *t* tests were calculated between pairs of raters in the same way (see Table 1). The weighted mean of these *t* tests is 0.61 and shows that very little bias is to be found.

The relations between the variables were then examined. Product-moment correlations were calculated between the variables and the resultant matrix factor-analysed by the method of Simple Summation (the matrix of correlations is available on request). Communalities were estimated by five iterations of the process. This is very easily done using the shortened method of Burt (1949). A general and one bipolar factor were extracted. The general factor is clearly a general factor of anxiety and the bipolar divides the symptoms into two groups: The first contains psychic symptoms consisting of tension, fears, insomnia, anxiety, intellectual (cognitive) changes, depression, and behaviour at interview. This was contrasted with a group of somatic symptoms consisting of gastro-intestinal, genito-urinary, respiratory, cardiovascular, somatic general and autonomic symptoms (Table 2).

When the factor saturations are plotted it may be seen that the vectors lie almost completely within a right angle. In other words it is possible to rotate the saturations to give two orthogonal group factors. The variance of the general factor constitutes 27% of the bipolar 18%, giving a total of 45% of the total variance. This total was probably reduced by selection.

Table 2. Saturations for centroid and rotated factors

| | G | BP | I | II |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| Tension | 0.60 | 0.26 | 0.36 | 0.54 |
| Fears | 0.29 | 0.37 | 0.04 | 0.46 |
| Insomnia | 0.79 | 0.32 | 0.48 | 0.70 |
| Anxious mood | 0.43 | 0.75 | -0.06 | 0.86 |
| Cognitive changes | 0.56 | 0.07 | 0.42 | 0.37 |
| Depression | 0.38 | 0.52 | 0.02 | 0.64 |
| Behaviour | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.39 |
| Gastro-intestinal symptoms | 0.41 | 0.00 | 0.34 | 0.22 |
| Genito-urinary symptoms | 0.43 | -0.34 | 0.55 | -0.05 |
| Respiratory symptoms | 0.31 | -0.54 | 0.56 | -0.27 |
| Cardiovascular symptoms | 0.34 | -0.62 | 0.62 | -0.33 |
| Somatic (general) symptoms | 0.48 | -0.31 | 0.57 | 0.01 |
| Autonomic symptoms | 0.56 | -0.10 | 0.52 | 23 |
| Communality | 2.93 | 2.09 | — | — |
| Communality as percentage | 23 | 16 | — | — |

DISCUSSION

This particular matrix of correlations can be resolved either into a general factor of anxiety and a bipolar factor of psychic versus somatic symptoms, or alternatively, into two orthogonal group factors of 'psychic anxiety' and 'somatic anxiety'. Since both factorizations give orthogonal factors, there is no advantage in one over the other. On general grounds, we know that had there been less selection of subjects, so that they extended through the full range from those with trivial symptoms to those severely ill, then in the centroid analysis, the general factor would have had a greater variance, the bipolar factor still being orthogonal to it. In the group factor analysis, the two group factors would have been positively correlated, this implying a general second order factor. The British school of factorists, following Burt, emphasize the value of orthogonality. The American school, following Thurstone, emphasize the value of being able

to identify the same factors regardless of the problems introduced by selection. In this particular case, the group factor analysis has the advantage of orthogonality as well.

Despite the apparent advantage of the group factor approach over the general factor approach, it must not be forgotten that mathematically, the two have an equivalence, since the one can be converted into the other by a simple transformation, in this case, the simplest of all, an orthogonal rotation. No new information can appear from such a transformation. (In fact, factor analysis, except for the method of principal components with full variance, actually loses information. Its great advantage is that it makes information clearer and more comprehensible.) The choice between general and group factor analysis must depend on other considerations.

In this case, the selection of patients is based on the fact that they all suffer from anxiety neurosis, and this condition shows itself as a general factor, i.e. a dimension to which all the variables are positively correlated, or on which they all have positive non-zero projections. It may be that, in other circumstances, the division into group factors may be preferred. For example, the response to treatment, or the effects of some drug, may show as a change in one or other of the group factors. Even if this should be so, it would only mean that whereas for such a situation, the group factor is appropriate, for the present situation, i.e. for diagnosis, the general factor is the appropriate one.

It is interesting to compare this rating scale with the factor analysis of the Taylor scale by O'Connor, Lorr & Stafford (1956). Although the present scale is concerned with general symptoms, whereas the Taylor scale deals with specific statements, the two factors A and B correspond roughly with the present general and bipolar factors. Factors A and B correlate 0.068, so they too are orthogonal.

Both the Taylor scale and the scales of Dixon, de Monchaux & Sandler (1957*a, b*) differ from the present one in that they are concerned with the content of the patient's

ASSESSMENT OF ANXIETY STATES

53

symptoms, rather than the form. This is also true of the Taylor scale. Although in the course of treatment the specific nature of a patient's fears and anxieties may change, it does so much less readily than the intensity. The assessment of both these kinds of changes is of practical and theoretical importance, and therefore the two kinds of scale are complementary.

The present scale obviously invites comparison with that designed by Buss, Wiener, Durkee & Baer (1955). It is important to recognize the difference between the two. The present scale is designed for the rating of anxiety neurosis as a syndrome, not for the rating of anxiety. Until the contrary is proved, it must be regarded as invalid for the rating of anxiety in any other setting. This limits the range of usefulness of the scale but, within these limits, patients can be compared meaningfully. It places great emphasis on the patient's subjective state. (This follows from the medical bias of the author, for in treatment the patient's subjective state takes first place both as a criterion of illness, which brings the patient for treatment, and as a criterion of improvement.) The various symptoms are rated separately, the somatic ones being given equal place with the psychic. This is because in out-patient practice patients place great emphasis on somatic symptoms, and a large number go first to the general medical departments for investigation of these. The scale of Buss *et al.* was used for rating anxiety on all types of patient except those suffering from cerebral damage. It therefore has a wider range of application. This is counter-balanced by the fact that the comparison of scores for anxiety, e.g. schizophrenia, depression and anxiety neuroses, has no clear meaning. It assembles symptoms into fewer groups. It gives less weight to somatic symptoms, or alternatively, gives more weight to psychic symptoms. Both scales group many single items under a limited number of headings, and it would be clearly desirable to investigate the appropriateness and usefulness of this procedure. Both show high reliability in use. I do not intend to

suggest that either scale is better than the other. Only practical use will determine which is the more useful, and it is to be hoped that both will be superseded by something better.

The scale can by no means be considered to be in its final state. Ideally, each of the items listed under the heading of a variable should be handled separately for purposes of full item analysis. The sheer labour of doing this in a rating scale (as opposed to a questionnaire) will delay this for a long time. Some of the variables are obviously a rag-bag of oddments and need further investigation. Further work is being done in which the general somatic symptoms are separated into two variables: muscular and sensory.

Experience has shown that grade 2 can be split up into two grades without increasing the difficulty of rating. In practice, grade 4 is almost never used because the rater is reluctant to give the maximum score to subjects who could obviously be much worse. An additional grade would probably be rarely or never used, but would encourage the rater to subdivide grade 3, shifting some of his ratings to the higher grade.

SUMMARY

A rating scale for the symptoms of anxiety neurosis has been prepared as an aid to the quantification of symptoms. It was used on thirty-five patients by three physicians working in pairs. The reliability of the scale, as shown by correlations and *t* tests between raters, is high. The correlations between variables can be factorized into a general factor of anxiety and a bipolar factor contrasting psychic with somatic symptoms; or into two orthogonal group factors of 'psychic' and 'somatic' anxiety.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank Prof. Hargreaves for permission to publish this paper, and particularly for his advice and guidance in the design of the rating scale. I have to thank him and Dr Roberts for taking part in the ratings of patients. The Research Fellowship is supported in part by a grant from the Mental Health Research Fund to whom thanks are due.

APPENDIX I

*Symptoms of anxiety states**Anxious mood*

Worries
 Anticipation of the worst
 Apprehension (fearful anticipation)
 Irritability

Tension

Feelings of tension
 Fatigability
 Inability to relax
 Startle response
 Moved to tears easily
 Trembling
 Feelings of restlessness

Fears

Of Dark
 Strangers
 Being left alone
 Large animals, etc.
 Traffic
 Crowds

Insomnia

Difficulty in falling asleep
 Broken sleep
 Unsatisfying sleep and fatigue on waking
 Dreams
 Nightmares
 Night terrors

Intellectual (cognitive)

Difficulty in concentration
 Poor memory

Depressed mood

Loss of interest
 Lack of pleasure in hobbies
 Depression
 Early waking
 Diurnal swing

General somatic (muscular)

Muscular pains and aches
 Muscular stiffness
 Muscular twitchings
 Clonic jerks
 Grinding of teeth
 Unsteady voice

General somatic (sensory)

Tinnitus
 Blurring of vision
 Hot and cold flushes
 Feelings of weakness
 Pricking sensations

Cardiovascular symptoms

Tachycardia
 Palpitations
 Pain in chest
 Throbbing of vessels
 Fainting feelings
 Missing beat

Respiratory symptoms

Pressure or constriction in chest
 Choking feelings
 Sighings
 Dyspnoea

Gastro-intestinal symptoms

Difficulty in swallowing
 Wind
 Dyspepsia:
 pain before and after meals
 burning sensations
 fullness
 waterbrash
 nausea
 vomiting
 sinking feelings
 'Working' in abdomen
 Borborygmi
 Looseness of bowels
 Loss of weight
 Constipation

Genito-urinary symptoms

Frequency of micturition
 Urgency of micturition
 Amenorrhoea
 Menorrhagia
 Development of frigidity
 Ejaculatio praecox
 Loss of erection
 Impotence

Autonomic symptoms

Dry mouth
 Flushing
 Pallor
 Tendency to sweat
 Giddiness
 Tension headache
 Raising of hair

Behaviour at interview (general)

Tense, not relaxed
 Fidgetting: hands,
 picking fingers,
 clenching, tics,
 handkerchief
 Restlessness: pacing
 Tremor of hands
 Furrowed brow
 Strained face
 Increased muscular tone
 Sighing respirations
 Facial pallor

Behaviour (physiological)

Swallowing
 Belching
 High resting pulse rate
 Respiration rate over 20/min.
 Brisk tendon jerks
 Tremor
 Dilated pupils
 Exophthalmos
 Sweating
 Eye-lid twitching

Lampiran 5

Master tabel

| Inisial Responden | Umur | Pendidikan | Pekerjaan | Jenis Kelamin | Pre Test | | Post Test | |
|-------------------|------|------------|--------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|------|
| | | | | | Skor | Tingkat Kecemasan | Tingkat Kecemasan | Skor |
| H | 67 | SD | IRT | Perempuan | 37 | Berat | Ringan | 19 |
| A.M | 70 | SMA | Wiraswasta | Laki-laki | 44 | Berat sekali | Sedang | 22 |
| N | 51 | SD | IRT | Perempuan | 34 | Berat | Ringan | 15 |
| H | 44 | SD | IRT | Perempuan | 43 | Berat sekali | Ringan | 19 |
| M | 77 | SMA | Pensiunan | Perempuan | 36 | Berat | Ringan | 20 |
| R | 54 | S2 | Wiraswasta | Perempuan | 28 | Berat | Ringan | 19 |
| M | 40 | SMA | IRT | Perempuan | 38 | Berat | Ringan | 18 |
| I | 64 | SD | IRT | Perempuan | 29 | Berat | Ringan | 17 |
| S | 45 | SMA | Polri | Laki-laki | 28 | Berat | Ringan | 16 |
| J | 49 | SMP | Buruh harian | Laki-laki | 25 | Sedang | Ringan | 14 |
| H | 60 | SD | IRT | Perempuan | 34 | Berat | Ringan | 16 |
| R | 54 | S1 | Polri | Laki-laki | 24 | Sedang | Ringan | 18 |
| H | 39 | SD | IRT | Perempuan | 28 | Berat | Ringan | 20 |
| M | 47 | SMA | Wiraswasta | Perempuan | 28 | Berat | Ringan | 15 |
| S | 57 | SD | IRT | Perempuan | 44 | Berat sekali | Sedang | 24 |

Lampiran 6

Hasil karakteristik responden

UMUR

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 36-45 | 4 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| | 46-55 | 5 | 33.3 | 33.3 | 60.0 |
| | 56-65 | 3 | 20.0 | 20.0 | 80.0 |
| | >66 | 3 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| | Total | 15 | 100.0 | 100.0 | |

PENDIDIKAN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SD | 7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| | SMP | 1 | 6.7 | 6.7 | 53.3 |
| | SMA | 5 | 33.3 | 33.3 | 86.7 |

| | | | | | |
|--|------------------|----|-------|-------|-------|
| | Perguruan tinggi | 2 | 13.3 | 13.3 | 100.0 |
| | Total | 15 | 100.0 | 100.0 | |

JENIS KELAMIN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | LAIKI-LAKI | 4 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| | PEREMPUAN | 11 | 73.3 | 73.3 | 100.0 |
| | Total | 15 | 100.0 | 100.0 | |

PEKERJAAN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | IRT | 8 | 53.3 | 53.3 | 53.3 |
| | WIRASWASTA | 3 | 20.0 | 20.0 | 73.3 |
| | PENSIUNAN | 1 | 6.7 | 6.7 | 80.0 |
| | POLRI | 2 | 13.3 | 13.3 | 93.3 |
| | BURUH HARIAN | 1 | 6.7 | 6.7 | 100.0 |
| | Total | 15 | 100.0 | 100.0 | |

Lampiran 7

Distribusi frekuensi kecemasan

Statistics

| | | PRE | POST |
|----------------|---------|-------|-------|
| N | Valid | 15 | 15 |
| | Missing | 0 | 0 |
| Mean | | 33.33 | 18.13 |
| Median | | 34.00 | 18.00 |
| Mode | | 28 | 19 |
| Std. Deviation | | 6.831 | 2.748 |
| Minimum | | 24 | 14 |
| Maximum | | 44 | 24 |

Pre

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Kecemasan sedang | 2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| | Kecemasan Berat | 10 | 66.7 | 66.7 | 80.0 |
| | Kecemasan Berat Sekali | 3 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| Total | | 15 | 100.0 | 100.0 | |

Post

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Kecemasan ringan | 13 | 86.7 | 86.7 | 86.7 |
| | Kecemasan sedang | 2 | 13.3 | 13.3 | 100.0 |
| Total | | 15 | 100.0 | 100.0 | |

Lampiran 8

Hasil uji *sampel paired T-test*

Paired Samples Statistics

| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--------|------|-------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 | PRE | 33.33 | 15 | 6.831 | 1.764 |
| | POST | 18.13 | 15 | 2.748 | .710 |

Paired Samples Test

| | | Paired Differences | | 95% Confidence Interval of the Difference | | T | df | Sig. (2-tailed) |
|--------|------------|--------------------|----------------|---|--------|--------|----|-----------------|
| | | Mean | Std. Deviation | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 | PRE - POST | 15.200 | 5.467 | 12.173 | 18.227 | 10.769 | 14 | .000 |

Ranks

| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| POST - PRE | Negative Ranks | 15 ^a | 8.00 | 120.00 |
| | Positive Ranks | 0 ^b | .00 | .00 |
| | Ties | 0 ^c | | |

| | | | |
|-------|----|--|--|
| Total | 15 | | |
|-------|----|--|--|

- a. POST < PRE
- b. POST > PRE
- c. POST = PRE



Lampiran 9


Surat pengambilan data awal

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA
NOMOR : S. Ket/ 100 /VI/KES 2.8/2022/Rumkit
TANGGAL : 14 Juni 2022

DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENGAMBILAN DATA AWAL
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

| NO | NAMA | STAMBUK | JUDUL |
|----|-----------|-------------|--|
| 1. | ISMAYANTI | 70300118043 | PENGARUH TERAPI MURROTAL TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN DIABETES MELLITUS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR |

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 14 Juni 2022
a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
KASUBBAG BINFUNG
u.b.
KEPALA KAUR DIKLIT


DARDIN, S. Kep Ns, M. Kep
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

Lampiran 10

Surat keterangan layak etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No. C.88/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Ismayanti
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Pengaruh Terapi Murottal terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar"

"Effect Of Murottal Therapy On Changes In Anxiety Levels Of Diabetes Melitus Patient At Bhayangkara Hospital Makassar"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 22/4/2022, sampai dengan tanggal 22/4/2023

This declaration of ethics applies during the period 22/4/2022 until 22/4/2023


and Chairperson,
Syarif, Sp.A., M.Kes

Lampiran 11

Surat izin penelitian Surat Penanaman Modal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulsebprov.go.id> Email : ptsp@sulsebprov.go.id
 Makassar 90231

| | | |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nomor | : 745/S.01/PTSP/2022 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : - | Kepala RS. Bhayangkara Makassar |
| Perihal | : <u>izin penelitian</u> | |

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-1766/UN06/FKIK/PP.00.9/04/2022 tanggal 28 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

| | |
|-------------------|--|
| N a m a | : ISMAYANTI |
| Nomor Pokok | : 70300118043 |
| Program Studi | : Keperawatan |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1) |
| Alamat | : Jl. HM Yasin Limpo No. 36, Gowa |



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH TERAPI MUROTTAL TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN DIABETES MELLITUS DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 mei s/d 30 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 12


Surat telah melakukan penelitian

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA
 NOMOR : S.Ket/176 MI/KES.2.6/2022/Rumkit
 TANGGAL : 13 Juni 2022

DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

| NO | NAMA | STAMBUK | JUDUL |
|----|-----------|-------------|--|
| 1. | ISMAYANTI | 70300118043 | PENGARUH TERAPI MURROTAL TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN DIABETES MELLITUS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR |

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : 13 Juni 2022
 a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
 KASUBBAG BINFUNG
 u.b.
 KEPALA KAUH DIKLIT


 DARDIN, S.Kep Ns, M.Kep
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

LAMPIRAN 13

Pembagian kuesioners dan implementasi terapi murottal







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus di RS Bhayangkara Makassar” bernama lengkap Ismayanti, lahir di Makassar pada tanggal 10 Desember 2000. Anak tunggal dari Bapak Iskandar dan Ibu Masniah. Menempuh pendidikan di SDN 235 Tarangkeke pada tahun 2006-2012, selanjutnya menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Sinjai Tengah, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah kejuruan di SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Sejahtera Makassar, jurusan keperawatan. Karena kecintaan yang lebih terhadap dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018. Penulis aktif diorganisasi internal kampus yaitu di HMJ Keperawatan sebagai anggota divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), selain itu penulis juga bergabung dalam organisasi daerah Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS).

Syukur Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan keras dan disertai iringan doa dari orang tua, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif untuk dunia kesehatan dan pendidikan.