

**PENGARUH *PRENATAL GENTLE YOGA* DAN TERAPI DZIKIR
TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL
DI PKM BAJENG**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar S1 Keperawatan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

Jumriani
70300118042

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Prenatal Gentle Yoga Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Di PKM Bajeng" yang disusun oleh Jumriani, NIM: 70300118042, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 02 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 02 Agustus 2022
4 Muharram 1444

DEWI PENGUJI:

Ketua	Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqasyah I	Dr. Hasnah S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqasyah II	Dr. Abdul Ghany, M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	Nurhidayah, S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	Muthalharah, S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat sampai pada tahap ini dan dapat menyelesaikan proposal dengan judul "**Pengaruh Prenatal Gentle Yoga dan Terapi Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil**" Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para penulisnya hingga akhir zaman.

Penulisan proposal ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Burhanuddin dan Ibunda Nur Baya atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doanya dan segala hal baik yang menghantarkan penulis pada tahap ini, juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan penuh kesabaran pada mahasiswanya yang sangat fakir ilmu dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis MA.PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pimpinan fakultas sejawaran, serta Staf Akademik yang telah membantu administrasi penulis.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes selaku ketua jurusan keperawatan dan Ibunda Hasnah S.SIT., S.Kep.,Ns., M.Kes selaku sekretaris jurusan

keperawatan beserta Staf dan Dosen atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan proposal penelitian ini.

4. Nurhidayah S.Kep. Ns, M.Kep selaku dosen pembimbing 1 dan Muthahharah, S.Kep. Ns, M.Kep selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian proposal penelitian ini.
5. Dr. Hasnah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku penguji I dan Dr. Abdul Ghany M.Th.I selaku penguji II karena telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan proposal penelitian ini sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang berkualitas dan komprehensif.
6. Bapak/Ibu Kepala Puskesmas Bajeng yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pengambilan data awal dan melakukan penelitian.
7. HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual yang bertujuan untuk menciptakan pribadi yang bertanggung jawab.
8. Kepada teman-teman jurusan keperawatan (F18ROSA) teman mahasiswa seperjuangan khususnya saudari Miftahul Jannnah yang telah kebersamaan selama proses penelitian sampai sesi akhir.
9. Kepada teman-teman saya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi. Bahwa kesalahan tersebut murni dari penulis sebagai

manusia dan segala hal positif serta yang bermanfaat dalam tulisan ini datangnya dari Allah SWT. Penulisnya sangat berkenan menerima kritik dan saran untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, February 2022
Penulis

Jumriani



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ivi
DAFTAR BAGAN.....	vii
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Variabel Dan Definisi Operasional.....	6
E. Kajian Pustaka / Penelitian Sebelumnya.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan.....	11
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Prenatal Gentle Yoga</i>	18
D. Tinjauan Umum Tentang Terapi Dzikir.....	24
E. Kerangka Teori	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Desain Penelitian.....	37
B. Populasi.....	37
C. Sampel.....	37
D. Instrumen Penelitian.....	38
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
F. Metode Pengumpulan.....	39
G. Langkah Pengolahan Data.....	39
H. Analisa Data.....	41
I. Etika Penelitian.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Deskripsi Penelitian.....	47
C. Pembahasan.....	50
D. Keterbatasan Penelitian	61
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67
A. Lembar Pernyataan Peneliti	67
B. Lembar Persetujuan menjadi responden	68
C. Kuesioner Perinatal Anxiety Screening Scale	69
D. Lembar Observasi	72

E. Standar Operasional Prosedur	74
F. Gambar Gerakan Prenatal Gentle Yoga	77
G. Hasil Uji Karakteristik Responden	79
H. Distribusi Frekuensi Kecemasan	80
I. Hasil Uji Sampel Paired T-Test	80
J. Surat Keterangan Layak Etik	82
K. Surat Penelitian PKM Bajeng Kab.Gowa	83
L. Dokumentasi	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	11
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	13
Tabel 3.1 Karakteristik Responden.....	40
Tabel 4.1 Ditribusi Frekuensi Karakteristik Responden.....	47
Tabel 4.2 Distribusi frekuensi kecemasan.....	48
Tabel 4.3 Tingkat Kecemasan.....	49
Tabel 4.4 Pengaruh Prenatal Gentle Yoga dan Terapi Dzikir.....	50



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	36
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	37



ABSTRAK

Nama : Jumriani

Nim : 70300118042

Judul : Pengaruh *Prenatal Gentle Yoga* Dan Terapi Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Di Puskesmas Bajeng Kab. Gowa

Kecemasan yang terjadi selama kehamilan diperkirakan akan mempengaruhi antara 15-20 persen wanita dan berpengaruh dengan peningkatan resiko negatif pada ibu dan anak yang dilahirkan. Prevalensi kecemasan pada ibu hamil diperkirakan antara 7-20 persen di negara maju sementara pada negara berkembang dilaporkan 20 persen atau lebih. Di Indonesia sendiri dilaporkan 28,7 persen yang mengalami kecemasan pada ibu hamil. *Prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir adalah tindakan non farmakologi untuk mengatasi kecemasan pada ibu hamil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah *pre-eksperimental design* dengan rancangan *one group pretest and posttest design* dengan melibatkan 1 kelompok. Penelitian menggunakan intervensi *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir untuk mengurangi kecemasan pada ibu hamil. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat dilakukan untuk melihat karakteristik sampel yaitu usia, pendidikan, usia, paritas dan usia kehamilan. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat pengaruh sebelum dan setelah *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir.

Hasil penelitian ini di uji dengan menggunakan aplikasi spss versi 24. Data terdistribusi secara normal sehingga uji yang digunakan adalah uji paired T-Test untuk melihat perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai *p-value* = 0,000 dengan taraf signifikan (<0.05). Nilai *p-value* 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi kesimpulannya bahwa *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir sangat efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil di Puskesmas Bajeng Kab.Gowa.

ABSTRACT

Name : Jumriani

Nim : 70300118042

Title : The effect of prenatal gentle yoga and dhikr therapy on the anxiety level of pregnant women at the Bajeng Kab. gowa

Anxiety that occurs during pregnancy is estimated to affect between 15-20 percent of women and is associated with an increased negative risk for both mother and child. The prevalence of anxiety in pregnant women is estimated to be between 7-20 percent in developed countries while in developing countries it is reported to be 20 percent or more. In Indonesia alone, it was reported that 28.7 percent experienced anxiety in pregnant women. Prenatal gentle yoga and dhikr therapy are non-pharmacological measures to treat anxiety in pregnant women.

The purpose of this study was to determine the effect of prenatal gentle yoga and dhikr therapy on the anxiety level of pregnant women at the Bajeng Health Center.

This research method is quantitative. The research design used was a pre-experimental design with a one group pretest and posttest design involving 1 group. This study uses gentle yoga prenatal intervention and dhikr therapy to reduce anxiety in pregnant women. The data analysis used in this research is univariate and bivariate analysis. Univariate analysis was conducted to see the characteristics of the sample, namely age, education, age, parity and gestational age. Bivariate analysis was carried out to see the effect before and after prenatal gentle yoga and dhikr therapy

The results of this study were tested using the SPSS version 24 application. The data were normally distributed so that the test used was the paired T - Test to see differences in the level of anxiety of pregnant women which showed significant results with $p\text{-value} = 0.000$ with a significant level (< 0.05). The $p\text{-value} 0.000$ is smaller than the α value of 0.05 so that H_0 is rejected and H_a is accepted. So the conclusion is that prenatal gentle yoga and dhikr therapy are very effective in reducing anxiety for pregnant women at the Bajeng Kab. Gowa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan suatu proses terjadinya ovulasi pelepasan sel telur, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, implantasi pada uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm. Selama kehamilan ibu mengalami perubahan fisik dan psikis yang terjadi akibat perubahan hormon. Proses penyesuaian diri terhadap keadaan baru yang dialami ibu hamil ini kemudian dapat menimbulkan kecemasan. (Niko, 2018).

Kecemasan dan kekhawatiran pada ibu hamil apabila tidak ditangani secara serius akan membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis, baik pada ibu maupun janin. Ibu yang mengalami kecemasan atau stress, akan mempengaruhi hipotalamus untuk merangsang kelenjar endokrin yang mengatur kelenjar hipofise. Reaksi ini menyebabkan peningkatan produksi hormon yang mempengaruhi sebagian besar organ tubuh seperti jantung yang berdebar, denyut dan nafas yang cepat, keringat berlebih, dan lain-lain (Niko, 2018).

Dampak yang ditimbulkan akibat kecemasan selama kehamilan di antaranya adalah depresi post partum, persalinan premature, operasi *caesar*, gangguan cemas perpisahan dan gangguan perilaku pada anak (*baby blues*). Penelitian yang dilakukan oleh Nesreen (2010) di Bangladesh bahwa depresi

dan kecemasan pada ibu hamil trimester III secara signifikan berhubungan dengan resiko Berat Bayi Lahir (BBLR). Kecemasan bisa terjadi dari kekhawatiran tentang persalinan yang akan dilakukan dan menyiapkan segala kebutuhan bayi (Bingan, 2019).

Menurut WHO (2019) Angka Kematian Ibu (AKI) didunia yaitu sebanyak 303.000 jiwa. AKI di ASEAN yaitu sebesar 235 per 100.000 kelahiran hidup (ASEAN Secretariat, 2020). Menurut Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) AKI di Indonesia meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007-2012. AKI mengalami penurunan pada tahun 2012-2015 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017 angka kematian ibu sebanyak 1712 orang dan jumlah kematian ibu di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebanyak 4.221 kasus. Dimana salah satu penyebab kematian ibu hamil adalah adanya komplikasi saat persalinan ataupun saat nifas salah satunya yaitu adanya rasa cemas/stress yang tidak tertangani dengan baik saat hamil (Kemenkes RI, 2019).

Berdasarkan penelitian, Kecemasan sering terjadi pada ibu hamil sebesar 29,2 persen dibandingkan ibu yang postpartum sebesar 16,5 persen. Kecemasan yang terjadi selama kehamilan diperkirakan akan mempengaruhi antara 15-20 persen wanita dan berpengaruh dengan peningkatan resiko negatif pada ibu dan anak yang dilahirkan. Prevalensi kecemasan pada ibu hamil diperkirakan antara 7-20 persen di negara maju sementara pada negara berkembang dilaporkan 20 persen atau lebih. Di Indonesia sendiri dilaporkan

28,7 persen yang mengalami kecemasan pada ibu hamil trimester III (Siregar et al., 2021).

Berdasarkan data Sul-sel pada penelitian (Ilmiah & Iqra, 2019) tingkat kecemasan responden dengan tingkat kecemasan responden ringan sebanyak 22 (73 persen) kecemasan sedang sebanyak 4 (13 persen) dan keemasan berat sebanyak 1 (3 persen).

Tingkat kecemasan pada ibu hamil dapat diminimalisir menggunakan tindakan nonfarmakologi. Beberapa contoh tindakan non farmakologi yang dapat mengurangi rasa cemas dan memberikan rasa nyaman pada ibu hamil yaitu *prenatal gentle yoga*, terapi dzikir, terapi aroma, terapi sentuhan dan lain sebagainya (Ritsma Zunaira Aryani, Rohmi Handayani & Kementerian, 2018).

Prenatal Gentle yoga dapat mempengaruhi hipotalamus untuk menekan sekresi CRH (*Corticotropin releasing hormone*) yang akan mempengaruhi kelenjar hipofisis lobus anterior untuk menekan pengeluaran hormone ACTH (*adrenocorticotropic hormone*) sehingga produksi hormon adrenal dan kortisol menurun serta memerintahkan kelenjar hipofisis lobus anterior mengeluarkan hormon endorphin (Maharani & Hayati, 2020). *American College of Obstetri and Gynecologist* (2012), menyarankan bahwa selama kehamilan, perempuan sebaiknya melakukan olahraga 30 menit setiap hari dengan intensitas sedang (*moderate-intensity physical activity*) tetapi jika tidak mampu melakukan setiap hari per minggu maka dianjurkan memilih beberapa hari dalam seminggu (Eka Jayanti et al., 2021). Selain *Prenatal*

Gentle Yoga, tindakan non farmakologi lainnya yang dapat menurunkan tingkat kecemasan yaitu Terapi Dzikir.

Dzikir adalah salah satu cara yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekati diri kepada Tuhan-Nya. Terapi dzikir memiliki fungsi yang cukup efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan seseorang, karena dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Luluk Masluchah dan joko sutrisno dengan fokus penelitian *pengaruh bimbingan do'a dan dzikir terhadap kecemasan pasien pre-operasi* (maslichah,2010) telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, bahwa dzikir dapat memberikan pengaruh yang efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil (Rahman, 2020).

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester III.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa ada pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil di Puskesmas Bajeng

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil di Puskesmas Bajeng

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui karakteristik responden

- b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan sebelum dan setelah *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir dalam menurunkan kecemasan pada ibu hamil

3. Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesehatan ibu hamil dengan menggunakan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir.

2. Bagi Profesi Keperawatan

Sebagai bahan masukan atau informasi kepada keperawatan khususnya di Puskesmas, betapa pentingnya *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil.

3. Institusi Pendidikan

Sebagai bahan rekomendasi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis dan sebagai masukan dalam proses belajar mengajar bahwa pentingnya pemenuhan spiritual sebagai modal untuk menjadi perawat yang profesional

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pengaruh terapi dzikir dan *Prenatal gentle yoga* dalam menekan angka kematian ibu hamil akibat kecemasan.

D. Variabel Dan Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur
1.	Independen			
	Prenatal gentle Yoga dan terapi dzikir	<p><i>Prenatal gentle yoga</i> adalah jenis olah tubuh, fikiran dan mental ibu yang sangat membantu ibu hamil dalam melenturkan persendian dan menenangkan fikiran ibu hamil.</p> <p><i>Terapi dzikir</i> adalah suatu metode atau prosedur tindakan spiritual yang dapat membantu seseorang menjadi rileks sehingga bisa menurunkan kecemasan.</p>	<p>Pelaksanaan <i>prenatal gentle yoga</i> terlebih dahulu akan dilakukan pelatihan 1 kali untuk melatih ibu hamil kemudian selanjutnya ibu hamil akan diinstruksikan melakukan prenatal gentle yoga secara mandiri selama 3 minggu dan peneliti akan mengobservasi 3 kali dalam 3 minggu dengan durasi 15 menit, kemudian setelah prenatal gentle yoga dilanjutkan dengan terapi dzikir sebagai tahap meditasi. Pelaksanaan terapi dzikir dengan mengucapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "SUBHANALLAH" 2. "ALHAMDULILLAH" 3. "LAILAHAILLALLAH" 4. "ALLAHU AKBAR" 	Lembar Observasi
2.	Dependen			
	Kecemasan	<p>Kecemasan adalah Suatu keadaan emosional yang ditandai rangsangan fisiologis, perasaan-perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan perasaan ketakutan, prasangka (firasat).</p>	<p>Total skor 0-93, dengan klasifikasi 0-20 tidak ada gejala, 21-41 kecemasan ringan-sedang dan 42-93 kecemasan berat. (D. R. Yuliani & Aini, 2020)</p>	Kuesioner

E. Kajian Pustaka / Penelitian Sebelumnya

Table 1.2 kajian Pustaka

No.	Nama Penulis	Judul	Tahun	Jenis penelitian	Hasil penelitian
1.	Ritsma Zunaira Aryani, Rohmi Handayani, Dewi Susilowati	Pengaruh pelaksanaan <i>prenatal gentle yoga</i> terhadap kecemasan menjelang persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di klinik bidan kita klaten.	2018	Jenis penelitian ini merupakan <i>Quasi Eksperimen design</i> dengan rancangan <i>one group pretest posttest design</i> . Observasi dilakukan 2 kali yaitu sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Perlakuan disebut pretest dan observasi sesudah perlakuan disebut posttest.	Berdasarkan hasil penelitian Ritsma Zunira dkk menyebutkan Hasil Pengukuran Skor Kecemasan sebelum dan sesudah Melakukan <i>Prenatal Gentle Yoga</i> , bahwa sebelum melakukan <i>prenatal gentle yoga</i> skor rata-rata kecemasan responden yaitu 27.4375. Dengan nilai persebarannya adalah 4.31006. Sedangkan setelah melakukan prenatal gentle yoga skor rata-rata kecemasan responden yaitu 23.1563.
2.	Eline Charla S. Bingan	Pengaruh <i>Prenatal Gentle Yoga</i> dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil Trimester III	2019	Jenis penelitian ini masuk dalam kelompok penelitian semu (<i>Quasi Eksperimen</i>) dengan rancangan yaitu <i>Pre and Post Test One Grup Design</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan dengan berat sangat mengganggu mendominasi responden. Hal ini sejalan dengan penelitian dari penelitian Wahyuni (2017) yang meneliti tentang dukungan suami, kecemasan dan kualitas tidur ibu hamil.
3.	Ashari, Gabrielle Sura Pongsibidan g, andi Mikhrunnisa i	Pengaruh Senam <i>Prenatal Yoga</i> terhadap Penurunan Kecemasan Ibu Hamil Trimester III	2019	Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian eksperimen semu (<i>quasi experiment</i>) dengan rancangan yaitu <i>non-randomized pretest post test with control group design</i> .	Hasil penelitian dari Apriliani mengemukakan bahwa cara berpikir positif yang dibangun oleh ibu hamil terkait persalinan adalah salah satu bentuk manfaat yang didapatkan dari senam yoga pada tahap relaksasi yang dalam.

				Teknik pengambilan sampel secara <i>purposive sampling</i> .	
4.	Yuniza, Tasya, Suzanna	Pengaruh <i>Prenatal Yoga</i> Terhadap Kecemasan Pada Ibu Hamil Trimester III Di Kecamatan Plaju	2021	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Quasi Eksperimen</i> merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pengaruh dan treatment (perlakuan) <i>prenatal yoga</i> dalam menurunkan kecemasan pada ibu hamil trimester III. Rancangan penelitian ini menggunakan <i>Pre And post One Group Design</i> .	Hasil penelitian Mulyati & Zafariyana 1 terdapat pengaruh <i>prenatal yoga</i> dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida dalam menghadapi persalinan di Jasmine MQ Medika Kota Bandung. Pada penelitian Fiftisia et al9 menyatakan dari 15 responden menjawab bahwa yoga dipercaya dapat menurunkan kecemasan pada ibu hamil. Hal ini juga menyatakan bahwa efektivitas Prenatal Yoga untuk menurunkan kecemasan dan stress pada ibu hamil di masa pandemi covid-19.
5.	Zusinta Asri Dasri, Melania Wahyuningsih, Eko Mindarsih	Perbedaan Pengaruh Terapi Relaksasi Dzikir Dan Hipnosis Lima Jari Terhadap Kecemasan Ibu Hamil	2021	Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimen dengan desain pre and post test without control group. Populasi dalam penelitian adalah seluruh ibu hamil primigravida di wilayah kerja Puskesmas Tempel II.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil nilai tengah skor cemas pada pre test kelompok relaksasi dzikir yaitu sebesar 29,00, yang berarti yang berarti skor cemas pada pre test kelompok relaksasi dzikir berada dalam tingkat cemas berat. Dari hasil wawancara dengan responden didapatkan hasil bahwa perasaan cemas yang dirasakan responden dalam penelitian ini disebabkan oleh perasaan khawatir tentang kondisi bayi akan dilahirkan nanti, takut jika terjadi komplikasi, dan belum adanya pengalaman dalam merawat bayi.
6.	Puti Febrina Niko	Pengaruh Terapi Dzikir Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Ibu Hamil	2018	Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kecemasan ibu hamil (<i>Anxiety Scale For Pregnancy/ASP</i>)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terapi dzikir efektif untuk menurunkan kecemasan pada ibu hamil berdasarkan analisis Independent Sample T-test. Pada kedua kelompok menunjukkan adanya perbedaan skor kecemasan ibu hamil yang sangat signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipengaruhi oleh terapi dzikir

					Setelah sepuluh hari dilakukan tindak lanjut untuk melihat pengaruh terapi dzikir terhadap penurunan kecemasan ibu hamil.
7.	Nurhidayah, Nurul Khusnul Khotimah	Pengaruh Latihan <i>Gentle Yoga</i> Terhadap Kestabilan Tekanan Darah Ibu Hamil Berbasis Teori <i>Self Care Orem</i>	2020	Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian <i>pre experiment</i> dan desain penelitian <i>one group pre and post design</i> . dengan melibatkan 1 kelompok. Populasi pada penelitian ini yaitu 29 ibu hamil, Sedangkan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan Jumlah sampel 5 orang yang memenuhi kriteria inklusi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan prenatal gentle yoga efektif terhadap kestabilan tekanan darah sistol pada ibu hamil akan tetapi tidak berpengaruh terhadap tekanan darah diastolik di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Hamdiah, Suwondo, Sri Hardjanti, Soe Joenoes, & Anwar, (2017) menunjukkan bahwa prenatal yoga memiliki efek yang signifikan terhadap kecemasan, denyut jantung janin dan tekanan darah sistol, akan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah diastole.
8.	Usdati Mardhiya,N uristighfari Masri Khaerani	Pelatihan Dzikir Untuk Menurunkan Kecemasan Ibu Hamil Pertama	2017	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan memberikan pelatihan dzikir kepada ibu hamil pertama yang mengalami kecemasan.	dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecemasan sebelum dilakukan pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan. Uji perbedaan dengan <i>Wilcoxon</i> pada skor <i>pretest</i> dan <i>post-test</i> menunjukkan perbedaan kecemasan dengan skor $Z = 1,826$ $p = 0,034$ ($p < 0,05$). Uji perbedaan skor <i>post-test</i> dan <i>follow up</i> menunjukkan adanya perbedaan tingkat kecemasan dengan skor $Z = 1,602$ dan $p = 0,054$.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

Proses kehamilan adalah proses dimana bertemunya sel telur dengan sel sperma sehingga terjadi pembuahan. proses kehamilan (gestasi) berlangsung selama 40 minggu atau 280 hari dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir (Syaiful & Fatmawati, 2019).

Kehamilan adalah masa dimana terdapat janin didalam seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan yaitu bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Setelah pembuahan, terbentuk kehidupan baru berupa janin dan tumbuh didalam rahim ibu yang merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi janin (Syaiful & Fatmawati, 2019).

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional (Syaiful & Fatmawati, 2019).

Lamanya kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT), namun sebenarnya fertilisasi terjadi sekitar 2 minggu setelah HPHT. Sehingga umur janin pasca konsepsi kurang dua minggu dari perhitungan sejak HPHT, yaitu 266 hari atau 38 minggu. Usia pasca konsepsi tersebut akan

digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan janin. Kehamilan terbagi menjadi dalam 3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (ke 13- ke 27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke -28 hingga minggu ke 40) (diki retno Yuliani et al., 2021).

Kehamilan merupakan sumber stress khususnya bagi ibu muda dan merupakan episode dramatis terhadap kondisi biologis dan adaptasi dari wanita yang pernah mengalaminya. Sebagian kaum wanita menganggap sebagai peristiwa yang menentukan kehidupan selanjutnya. Kekhawatiran dan kecemasan pada ibu hamil apabila tidak ditangani dengan serius akan membawa dampak dan pengaruh terhadap fisik dan psikis, baik pada ibu maupun janin (muzayyana, 2021).

B. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan

1. Defenisi Kecemasan

Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang ditandai rangsangan fisiologis, perasaan-perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan perasaan ketakutan. Kecemasan berkaitan dengan keadaan khawatir berupa rasa takut atau perasaan yang tidak pasti maupun tidak berdaya,serta keadaan emosi yang belum jelas akan objek spesifiknya. Pada kehamilan pertama ketakutan ini sering dirasakan terutama dalam menghadapi persalinan. (Ashari et al., 2019)

Selama periode kehamilan sebagian ibu hamil akan merasakan kecemasan. Tetapi tingkat kecemasan yang dirasakan ibu hamil berbeda-beda dan tergantung sejauh mana ibu hamil itu mempersiapkan

kehamilannya. Banyak faktor Penyebab timbulnya perasaan cemas pada ibu hamil secara umum perasaan tersebut berhubungan dengan kondisi seperti kesejahteraan dirinya dan bayinya yang akan dilahirkan, pengalaman keguguran kembali, penemuan jati dirinya dan persiapan menjadi orang tua, sikap memberi dan menerima kehamilan, keuangan keluarga, support tenaga medis dan keluarga (Pieter & Lubis, 2010).

Kecemasan yang dirasakan pada ibu hamil dapat menimbulkan dampak buruk bagi janin dan dirinya. Salah satunya adalah terjadi rangsangan kontraksi rahim. Akibat dari kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan darah pada ibu hamil sehingga dapat memicu terjadinya preeklamsia dan keguguran. Kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan bayi lahir prematur juga merupakan dampak negatif dari kecemasan pada ibu hamil (Dasri et al., 2021)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman dalam Qs. Ar-Ra'd:28



 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah-lah hati (jiwa) menjadi tenang” (Qs dan Terjemahan)

Qs. Ar Ra'd ayat 28 menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan tuntunan Allah SWT, yaitu orang-orang beriman kepada-Nya dan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang beriman dan mengingat Allah hatinya

akan menjadi tenteram. Kehidupan orang beriman akan tenang dan tidak akan merasa gelisah, takut atau khawatir. Dengan demikian, ketenangan tersebut akan mendorong mereka untuk melakukan amal yang baik dan merasa bahagia dengan kebajikan yang telah diamalkannya. Pada intinya, iman dan mengingat Allah akan mendatangkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di sisi Allah pada hari akhir.

2. Tanda-tanda Cemas

Efek terhadap respon cemas dapat diketahui dari hal-hal berikut :

a. Fisiologis

Muncul dalam keadaan mulut kering, tangan dan kaki dingin, diare, sering kencing, nadi cepat, tensi meningkat, ketegangan otot, sukar bernafas, berkeringat, pupil mata, anoreksia, konstipasi, sakit kepala, penglihatan kabur, mual muntah dan gangguan tidur.

b. Perilaku

Gelisah, tremor, mudah terkejut, bicara cepat, aktivitas gerak kurang terkoordinasi atau gerakan tidak menentu seperti gemetar, serta perasaan tegang berlebihan.

c. Kognitif

Tidak mampu memusatkan perhatian atau konsentrasi, persepsi menyempit atau kreativitas menurun, sering kali memikirkan tentang malapetaka atau kejadian buruk yang akan terjadi. (Rahman, 2020)

3. Faktor predisposisi

a. Faktor Internal

- 1) Pengalaman
 - 2) Respon terhadap stimulus
 - 3) Usia
 - 4) Jenis Kelamin atau gender
- b. Faktor Eksternal
- 1) Dukungan keluarga
 - 2) Kondisi lingkungan (Rahman, 2020)
4. Jenis-jenis Kecemasan
- a. Kecemasan realitas atau objektif (*reality of objective anxiety*)
 - b. Kecemasan kecemasan Neurosis (*Neurotic anxiety*)
 - c. Kecemasan moral

Dapat dikatakan bahwa yang menyebabkan kecemasan adalah kata hati individu itu sendiri. Kecemasan merupakan suatu tanda peringatan kepada individu.

5. Gejala Klinis cemas

Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan antara lain sebagai berikut :

- a. Cemas, khawatir, firasat buruk, takut atau pikiran sendiri, mudah tersinggung.
- b. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut.
- c. Takut sendirian, takut pada keramaian, dan banyak orang.
- d. Pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan.
- e. Gangguan konsentrasi dan daya ingat

- f. Keluhan-keluhan somatic, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdengung, berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan lain sebagainya.
(Rahman, 2020)

6. Penyebab Kecemasan

Kecemasan terjadi dari apa yang disadari seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa versalah dan sebagainya. Dan kecemasan terjadi diluar kesadaran dan tidak mampu menghindari perasaan yang tidak menyenangkan. Adapun empat Penyebab kecemasan sebagai berikut :

- a. Stress
- b. Traumatic
- c. Genetika
- d. Adanya perubahan struktur otak (Rahman, 2020)

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

- a. Kondisi individu
Umur, tahapan kehidupan, jenis kelamin, pendidikan, suku, kebudayaan, sosial ekonomi dan kondisi sosial.
- b. Karakteristik kepribadian
Kepribadian, ketabahan, stabilitas emosi secara umum
- c. Sosial kognitif
Dukungan sosial yang dirasakan, control pribadi yang dirasakan.
- d. Hubungan dengan lingkungan sosial
Dukungan sosial yang diterima, integrasi dalam jaringan sosial.

e. Strategi koping

Sebuah cara atau perilaku individu untuk menyelesaikan suatu masalah.

(Rahman, 2020)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan ibu hamil menjelang proses persalinan diantaranya yaitu usia, paritas, pendidikan dan dukungan keluarga atau suami.

- a. Usia
- b. Paritas
- c. Pendidikan
- d. Dukungan keluarga atau suami (Rinata & Andayani, 2018)

8. Komplikasi

Kecemasan pada ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan, serta terjadinya penyulit pada bayi baru lahir (kelahiran premature, BBLR, kematian bayi, asfiksia dan lain sebagainya. (Hanifah, 2019)

9. Tingkat Kecemasan

Terdapat empat tingkat kecemasan, yaitu :

a. Ansietas Ringan

Ansietas ringan terjadi saat ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Selama tahap ini seseorang waspada dan lapangan persepsi meningkat kemampuan seseorang untuk melihat, mendengar, dan menangkap lebih dari sebelumnya. Jenis ansietas ringan dapat memotivasi pelajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreatifitas.

b. Ansietas Sedang

Ansietas sedang dimana seseorang hanya berfokus pada hal yang penting saja, lapang persepsi menyempit sehingga kurang melihat, mendengar, dan menangkap. Seseorang memblokir area tertentu tetapi masih mampu mengikuti perintah jika diarahkan untuk melakukannya.

c. Ansietas Berat

Ansietas berat ditandai dengan penurunan yang signifikan di lapang persepsi. Cenderung memfokuskan pada hal yang detail dengan tidak berpikir tentang hal lain.

d. Panik

Dikaitkan dengan rasa takut dan teror, sebagian orang yang mengalami kepanikan tidak dapat melakukan hal-hal bahkan dengan arahan. Gejala panik adalah peningkatan aktivitas motorik, penurunan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Persepsi yang menyempit, dan kehilangan pemikiran yang rasional. (Wahyudi et al., 2019)

10. Alat Ukur Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan pada ibu hamil yaitu PASS (*The perinatal anxiety screening scale*). PASS adalah instrumen *self-report* yang dirancang untuk skrining masalah kecemasan pada wanita hamil dan postpartum (kurang dari 1 tahun). PASS terdiri dari 31 item pertanyaan yang terbukti valid dan reliabel. Empat domain yang diukur adalah Kekhawatiran Berlebihan dan Ketakutan

Khusus, Perfeksionisme, Kontrol dan Trauma, Kecemasan Sosial serta Kecemasan Akut dan Pengaturan. Total skor 0-93, dengan klasifikasi 0-20 “tidak ada gejala”; 21-41 “kecemasan ringan-sedang” dan 42-93 “kecemasan berat” (Somerville et al., 2014).

C. Tinjauan Umum Tentang *Prenatal Gentle Yoga*

1. Definisi *Prenatal Gentle Yoga*

Kata yoga pertama kali muncul dalam kitab weda. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa yoga berasal dari kata “*jul*” atau bahasa inggris berarti “*to yoke*” yang dapat dimaknai sebagai menyatukan. Pada mulanya, hanya ada di beberapa kelompok kecil yang memperhatikan yoga di india. Yoga bukan hanya sekedar menggerakkan atau melipat-lipat tubuh saja. Terapi yoga adalah filosofi saat dimana pola pikir sehari-hari kita, beserta dengan keseluruhan keinginan, rasa khawatir, rasa takut dan kebingungan yang kita miliki akhirnya hilang. Yoga merupakan cara untuk mengatakan bahwa pada saat kita menyatu dengan diri sejati kita yang sebenarnya, kita akan mulai mengerti tentang siapa diri kita dan tujuan keberadaan kita, dan yoga adalah belajar tentang *mindfulness*, dimana gerakan yang dilakukan bukan sekedar ingat “*show off*”. Namun gerakan yang penuh dengan filosofi dan kesadaran serta kelembutan kasih sayang (Bingan, 2019)

Yoga adalah suatu proses penyatuan dari tubuh (body), pikiran (maind), dan jiwa (sould). Yoga mengkombinasikan teknik bernafas, relaksasi dan meditasi serta latihan peregangan. Yoga dianjurkan karena memiliki efek relaksasi yang dapat meningkatkan sirkulasi darah keseluruh

tubuh. Sirkulasi darah yang lancar, mengindikasikan kerja jantung yang baik. Penelitian menemukan bahwa kombinasi antara yoga, meditasi dapat meningkatkan metabolisme tubuh (Bingan, 2019).

Prenatal gentle yoga adalah sejenis olah tubuh, pikiran dan mental ibu yang sangat membantu ibu hamil dalam melenturkan persendian dan menenangkan pikiran (Yuniza & Tasya, 2021). Selain prenatal gentle yoga, dalam islam Allah swt mewajibkan hambanya untuk melakukan sholat yang memiliki fungsi dan manfaat yang tidak kalah penting dari yoga yaitu untuk menentramkan hati, menyehatkan mental, melancarkan peredaran darah, menyeimbangkan sendi dan menenangkan pikiran sehingga ibu hamil juga disarankan untuk tetap melakukan sholat lima waktu. Sebagaimana Firman Allah swt pada (Qs.Ibrahim:40)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya :

"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." (Qs dan Terjemahan)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. At-Taubah 9: Ayat 54:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَا لِي وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

Terjemahnya :

"Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak (pula)

menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa). (Qs dan Terjemahan)

2. Manfaat *Prenatal Gentle Yoga*

1. Fisik

- a. Meningkatkan energi, vitalitas, dan daya tahan tubuh
- b. Melepaskan stress dan cemas
- c. Meningkatkan kualitas tidur
- d. Menghilangkan ketegangan otot
- e. Mengurangi keluhan fisik secara umum semasa kehamilan, seperti nyeri panggul, pembengkakan bagian tubuh
- f. Membantu proses penyembuhan dan pemulihan setelah melahirkan.

2. Mental dan emosi

- a. Menstabilkan emosi ibu hamil yang cenderung fluktuatif
- b. Memperkuat tekad dan keberanian
- c. Meningkatkan rasa percaya diri dan kekuatan pikiran pada saat melahirkan.

3. Spiritual

- a. Menenangkan dan mengheningkan pikiran melalui relaksasi dan meditasi
- b. Memberikan waktu yang tenang untuk menciptakan ikatan batin antara ibu dengan bayi
- c. Menanamkan rasa kesabaran, intuisi dan kebijaksanaan.(Pratigny, 2014)

3. Prinsip

- a. Napas dengan penuh kesadaran; napas yang dalam dan teratur bersifat menyembuhkan dan menenangkan. Melalui teknik pernafasan yang benar, sang ibu akan lebih dapat mengontrol pikiran dan tubuhnya.
- b. Gerakan yang lembut dan perlahan
- c. Gerakan yang lembut dan mengalir akan membuat tubuh ibu lebih luwes sekaligus kuat
- d. Gerakan prenatal yoga fokus pada otot-otot dasar panggul, pinggul, paha dan punggung
- e. Relaksasi dan meditasi; dengan relaksasi dan meditasi, seluruh tubuh dan pikiran ibu dalam kondisi yang tidak relaks, tenang, dan damai.
- f. Ibu dan bayi; prenatal yoga meluangkan waktu special dan meningkatkan bonding antara ibu dan calon bayi pun akan merasakan yang sama. (Pratignyo, 2014)

4. Kontraindikasi

- a. Pembengkakan pada tangan dan kaki
- b. Tremor pada ekstremitas atas maupun bawah
- c. Kram pada perut bagian bawah
- d. Hamil dengan penyakit jantung dan kehamilan dengan gerakan janin yang lemah (Syafar, 2020).

5. Gerakan-gerakan Yoga

- a. Persiapan
 - 1) Persiapan Alat

Pakaian nyaman dan longgar, tidak menggunakan alas kaki, menggunakan matras atau karpet

2) Persiapan Klien

Minum sesaat Sebelum latihan yoga, makan 1-3 jam Sebelum latihan, mengukur tekanan darah (sistolik <180 mmHg dan diastolik <120 mmHg), tidak ditemukan tanda-tanda syok (akral dingin, wajah pucat dan berkeringat), frekuensi irama jantung <100x/menit.

3) Persiapan Lingkungan

Yoga sebaiknya dilakukan di pagi hari, tempat tenang dan nyaman, udara segar, melakukan yoga secara rutin di waktu yang sama, dapat dilakukan dengan music relaksasi (Syafar, 2020).

b. Pelaksanaan

1) Pemanasan

Pemanasan dilakukan Sebelum melakukan yoga yang menggunakan melenturkan otot dan sendi sehingga gerakan yoga mudah dilakukan dan menghindari risiko cedera. Pemanasan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menengadahkan kepala ke atas dan ke bawah selama 8 kali
- b. Menengok ke arah kanan dan kiri selama 8 kali
- c. Memutar leher dari kiri dan kanan dan arah sebanyak 8 kali
- d. Memutar bahu kiri dan kanan sebanyak 8 kali

- e. Meregangkan pergelangan tangan, lutut dan jari-jari kaki (Syafar, 2020).

2) Gerakan *Prenatal Gentle Yoga*

- a. Gerakan *prenatal gentle yoga* terdiri atas *side angle pose* dan *triangle pose* yang dilakukan selama 5-10 kali nafas. Gerakan ini memiliki beberapa manfaat antara lain menguatkan kaki, lutut, pergelangan kaki, pangkal paha, tulang belakang dan pinggang serta menstimulus, merangsang organ perut.
- b. Gerakan berikutnya adalah *warior 1* dan *warrior 2*. Gerakan ini juga dilakukan dengan 5-10 kali nafas. Adapun manfaat dari gerakan ini adalah menggunakan otot bokong, pinggul, mendapatkan atau meningkatkan energi di dalam tubuh.
- c. Gerakan selanjutnya adalah *Goddess Pose*. Gerakan ini juga dilakukan selama 5-10 kali nafas. Manfaat gerakan ini adalah menguatkan bahu dan dada, mengurangi stress, meningkatkan aliran energi pada bagian fungsi organ reproduksi serta meregangkan otot paha, dada dan panggul.
- d. Gerakan Selanjutnya adalah *Half Squat*. Gerakan ini juga dilakukan dengan 5-10 kali nafas. Gerakan ini memiliki manfaat antara lain menguatkan tubuh bagian bawah, melebarkan pinggul dan panggul, keseimbangan dan stabilitas ibu hamil meningkat, meningkatkan ketenangan serta menenangkan pikiran

- e. Gerakan berikutnya adalah *Gate Pose*. Gerakan ini dilakukan dengan 5-10 kali napas. Gerakan ini memberikan manfaat antara lain meregangkan tulang belakang, paha belakang, bahu dan merangsang organ perut. Selain itu, terdapat pula gerakan *tiger stretch*. Gerakan ini juga dilakukan selama 5-10 kali napas, dengan manfaat antara lain memberikan kekuatan pada kaki dan tulang punggung.
- f. Gerakan terakhir adalah *butterfly pose*. Gerakan ini dilakukan 5-10 kali napas. Gerakan ini bermanfaat untuk membuka panggul dan memperkuat otot paha. (Syafar, 2020)

D. Tinjauan Umum Tentang Terapi Dzikir

a. Defenisi

Dzikir adalah salah satu cara yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekati diri kepada Tuhan-Nya. Dzikir dapat membantu individu membentuk persepsi keyakinan bahwa setiap stressor atau perasaan cemas akan sesuatu hal yang dialami dapat dihadapi dengan baik atas bantuan Allah SWT. Saat seorang muslim mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dengan berdzikir maka susunan saraf pusat dan kelenjar hormon endokrin akan bekerja dan memproduksi dengan seimbang. Keseimbangan mekanisme hormone ini akan mendatangkan perilaku yang baik, terarah dan terkendali. Umat islam percaya bahwa dengan berdzikir menyebut nama Allah dapat memberikan ketenangan jiwa dan menyembuhkan dari berbagai penyakit. Salah satu manfaat dzikir

adalah mendapatkan ketenangan batin, sehingga orang yang melakukan dzikir dapat membuat hati menjadi tenang (Dasri *et al.*, 2021).

Terapi relaksasi dzikir adalah suatu metode atau Prosedur kegiatan spiritual yang dapat membantu seseorang menjadi rileks, dan menurunkan kecemasan. Dzikir adalah pujian kepada Allah SWT yang diucapkan secara berulang-ulang, dengan berdzikir dan menyerahkan segala permasalahan yang dihadapi kepada Allah SWT maka segala beban yang membuat pikiran cemas dan stress akan berkurang, tubuh akan menjadi lebih rileks dan pikiran menjadi tenang.

Seseorang yang melakukan dzikir secara berulang-ulang dengan sikap khusyu, tawadhu, berkonsentrasi dan berharap penuh agar doa tersebut dikabulkan, maka susunan saraf pusat dan kelenjar hormon dalam tubuh akan bekerja dan memproduksi dengan seimbang. Umat islam percaya bahwa dengan dzikir menyebut nama Allah dan berserah diri kepadanya dapat memberikan ketenangan jiwa dan menyembuhkan diri dari berbagai penyakit seperti; cemas, stress, tekanan darah tinggi, stroke, arteriosklerosis, dan lain-lain. (Dasri *et al.*, 2021)

Terapi dzikir berupaya untuk menghadirkan kegiatan kepada Allah SWT dalam aktivitas sehari-hari baik dengan menyebutkan lafal-lafal tertentu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, maupun dengan merenungi penciptaan makhluk-Nya. Ketika aktivitas dzikir sudah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka dampak positif

sebagaimana diuraikan di atas akan muncul pada seseorang (Husain, 2019)

Terapi dzikir memiliki fungsi yang cukup efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan seseorang, karena dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Luluk Masluchah dan joko sutrisno dengan fokus penelitian *pengaruh bimbingan do'a dan dzikir terhadap kecemasan pasien pre-operasi* (maslichah,2010). Telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, bahwa dzikir dapat memberikan pengaruh yang efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil sebelum melakukan operasi (Rahman, 2020).

Jika dipandang dari sudut kesehatan jiwa, doa dan dzikir mengandung unsur psikoterapeutik yang mendalam. Terapi psikoreligius tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan psikoterapi psikiatri, karena mengandung kekuatan spiritual atau kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme. Terapi dzikir yang dimaksud adalah metode terapi dengan menggunakan dzikir sebagai media untuk menstabilkan kesehatan jiwa. Terapi dzikir yang telah ditetapkan. Terapi dzikir yang dilakukan yaitu sebanyak 5 kali (dalam seminggu sekali dengan durasi waktu 60 menit) (Rahman, 2020).

Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu berzikir yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. al-Ahzab 33: Ayat 41-42:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah), zikir yang sebanyak-banyaknya," "dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang." (Qs dan Terjemahan)

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, pada ayat ini, Allah menganjurkan kepada semua orang beriman yang membenarkan Allah dan rasul-Nya supaya banyak dzikir mengingat Allah dengan menyebut nama-Nya sebanyak-banyaknya dengan hati dan lidah pada setiap keadaan dan setiap waktu. Sebab Allah-lah yang melimpahkan segala nikmat kepada mereka yang tidak terhingga banyaknya. Mereka diperintahkan bertasbih kepada-Nya dengan pengertian membersihkan dan menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya.

Berdzikir dan bertasbih ini dilakukan pagi hari ketika baru bangun dari tidur, sebab ketika itu seakan-akan seseorang hidup kembali setelah mati, untuk menghadapi hidup yang baru. Diperintahkan juga berstasbih pada sore hari karena pada saat itu seseorang telah selesai mengerjakan bermacam-macam pekerjaan sepanjang hari. Dzikir pada saat itu merupakan tanda bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan dapat memperoleh rezeki untuk keperluan hidupnya dan nafkah bagi keluarganya.

b. Manfaat Terapi Dzikir

a) Dzikir sebagai media relaksasi

Fokus dari relaksasi ini tidak pada pengendoran otot namun pada frase tertentu yang di ucapkan berulang kali dengan ritme yang teratur disertai sikap pasrah kepada objek transedensi yaitu Tuhan. Frase yang digunakan dapat berupa nama-nama tuhan atau kata yang memiliki makna menenangkan . pengucapan lafadz dzikir disertai dengan keyakinan terhadap kasih sayang-Nya, perlindungan-Nya dan sifat-sifat baik-Nya yang lain akan menimbulkan rasa tenang dan aman.

b) Dzikir sebagai media katarsis

Dzikir akan selalu berhubungan dengan doa dan memiliki ikatan yang kuat, terlebih dalam kaitannya sebagai pengobat hati, maka dzikir lebih utama disampaikan dalam doa yang tulus.

c) Dzikir sebagai media pengharapan terhadap tuhan

Dzikir akan menimbulkan perasaan optimis pada Allah SWT bahwa Allah akan senantiasa membantu dirinya dalam menghadapi segala musibah yang menimpa.

d) Dzikir sebagai media pasrah kepada Allah SWT

Berdzikir membuat seseorang terus ingat kepada sang khalik. Mereka akan senantiasa akan Bahagia dan ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. (Niko, 2018)

c. Tujuan Dzikir

Perintah untuk berdzikir memiliki tujuan agar setiap muslim

1. Taat kepada-Nya, maksudnya dengan dzikir merupakan manifestasi bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang khalik
2. Dzikir merupakan sarana ampuh terkabulnya doa
3. Selalu bertafakur pada saat menyendiri dan diharapkan Allah menurunkan pertolongan-Nya
4. Selalu ingat akan kehidupan baik didunia maupun di akhirat
5. Selalu mengingatnya di dunia sehingga Allah juga mengingatnya di akhirat
6. menyembahNya dengan ikhlas sehingga Allah SWT meninggikan derajatnya
7. tekun dalam menjalankan ibadah sehingga Allah swt memberi perhatian yang istimewa
8. menggunakan karunia Allah swt di jalan yang benar sehingga pertolonganNya turun di saat petaka datang
9. berhijab di jalanNya sehingga petunjuk Allah senantiasa menyertai dalam setiap hirupan nafas. (Qomaruddin sholeh;462)

d. Macam-macam Dzikir

Muhammad Said Thohuri (1986:20) dalam islam ada tiga cara melakukan dzikir yaitu :

1. Dzikir Zhahir (nampak) mencakup
 - a. Pujian-pujian kepada Allah, seperti ucapan “*Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu akbar*

- b. Doa seperti ucapan “wahai dzat yang maha hidup dan maha menjaga, dengan rahmat Allah saya memohon pertolongan”
 - c. *Ar-Ri'ayah* (penjagaan) seperti ucapan : “Allah pasti bersamaku” atau “Allah pasti bersamaku”
2. Dzikir Khofi atau tersembunyi, yaitu dzikir dalam hati
 3. Dzikir Haqiqi, yaitu : jika Allah SWT mengingat seorang hamba, seperti dalam firmanNya “ karena itu ingatlah kalian kepada-Ku dan janganlah mengingkari (nikmat)-Ku” (QS.al-Baqarah:152)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Terjemahnya :

“karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku. (Qs dan Terjemahan)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan secara umum dzikir dibagi menjadi dua macam, yaitu dzikir dengan hati dan dzikir dengan lisan.

- a. Dzikir dengan lisan berarti menyebut nama Allah, berulang-ulang kali, sifat-sifat-Nya berulang kali atau berulang-ulang kali
- b. Dzikir kepada Allah dengan hati, ialah menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah di dalam diri dan jiwanya sendiri sehingga mendarah daging.

Syaikh Ibnu Athaillah ra. Beliau berkata :

“Janganlah engkau tinggalkan dzikir semata-mata karena tidak adanya kehadiran hatimu bersama Allah di dalamnya. Sebab kelalaian hatimu (kepada Allah) tanpa adanya dzikir adalah lebih berbahaya daripada kelalaian hatimu di dalam dzikir. Arangkali Allah akan mengangkatmu dari dzikir yang lalai menuju dzikir yang sadar, dari

dzikir yang sadar menuju dzikir yang hadir, dari dzikir yang hadir kepada dzikir dengan hilangnya selain dzikir yang di-dzikiri”. (Husain, 2019)

e. Keutamaan dzikir

Seandainya tidak ada ayat al-Qur'an atau hadits Nabi yang menerangkan tentang dzikrullah, maka dzikir yang hakiki kepada Yang Maha Pemberi nikmat ini tetaplah sangat penting. Sebab, kita adalah hamba-Nya, maka kita harus selalu mengingat-Nya jangan sampai melalaikan-Nya. Dialah Yang Maha Pemberi yang telah memberi nikmat dan kebaikan yang tidak terhitung banyaknya tanpa batas waktu. Karena itu, berdzikir kepada Allah dan menslukuri karunia-Nya merupakan sesuatu yang fitrah bagi seorang hamba. (Husain, 2019)

Banyak orang yang masih menganggap remeh kegiatan dzikir atau mengingat Allah. Mereka menganggap duduk diam sambil berzikir menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia sia dan hanya membuang waktu percuma. Ini terjadi karena sebagian besar manusia perhatiannya hanya tercurah pada kehidupan dunia. Sebagian besar manusia hanya fokus pada kehidupan jangka pendek, yaitu kehidupan dunia. Mereka merancang kehidupannya hanya sampai hari tua, seluruh perhatian dan aktivitasnya dicurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup didunia Mereka tidak peduli dengan kehidupan jangka panjang, bahkan mereka ragu dengan adanya kehidupan akhirat yang abadi dan pertemuan dengan Allah kelak. (Husain, 2019)

Dalam sebuah riwayat Shahih Muslim juga dikatakan, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

"Tidak ada suatu kaum yang duduk dan berdzikir kepada Allah Swt, kecuali malaikat mengelilingi mereka dan memberi rahmat dan menurunkan ketenangan kepada mereka, serta Allah Swt, akan menyebut mereka termasuk dalam orang-orang yang ada di sisi Allah Swt. Dzikir juga menumbuhkan-suburkan rahmat Allah, dan menghapus dosa-dosa kecil" (Husain, 2019). Keterangan ini kita dapati dalam QS. al-Ahzab : 43

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman (QS dan Terjemahan)

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang berdzikir, dan malaikat juga memohon kepada-Nya, supaya dosa-dosa orang yang berdzikir diampuni dan dikeluarkan dari kehidupan gelap (tanpa cahaya), kepada kehidupan yang penuh cahaya-Nya. (Husain, 2019)

f. Bacaan Yang Berhubungan dengan Dzikir

Bacaan yang berhubungan dengan dzikir Ucapan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah kalimat, "*La ilaha illallah*", "*Alhamdulillah*", *Subhanallah* dan *Allahu Akbar* (Ahmad bin Abdullah, 181 :2007) Keutamaan membaca Tahlil (*La ilaha illallah*)

dalam hadis dijelaskan: "Dzikir yang paling utama ialah *Laa illallah*, sedangkan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah (HR.An Nasa"i, Ibnu Majah dan al Hakim) dalam hadits lainnya : "seutama-utama dzikir adalah *La ilaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah)" (HR.Tirmidzi)

Keutamaan membaca Tahmid (alhamdulillah) telah banyak dijelaskan dalam hadis Nabi. Imam Hakim dan Baihaqi mengeluarkan hadis dari Jabir, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah Allah memberi suatu nikmat kepada hambaNya, kemudian hambanya itu mengucapkan Alhamdulillah, kecuali Allah telah menilainya telah mensyukuri nikmat itu.

Keutamaan membaca Takbir (allahu akbar) firman Allah

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Terjemahnya :

“Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah (QS. al-Muddatstsir :1-3)

Keutamaan membaca tasbih (subhanallah) dijelaskan dalam firman

Allah

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ


Terjemahnya :

“Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang” (QS.Thaha: 130)




E. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori



Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di teliti maka peneliti memilih pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *pre-eksperimental design* dengan rancangan *one group pretest and posttest design* (Siti fadjarajani et. al.,2020). Kuesioner diberikan dua kali yaitu Sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Kuesioner yang diberikan Sebelum perlakuan disebut pretest dan kuesioner yang diberikan sesudah perlakuan disebut posttest. Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Bajeng kabupaten Gowa.

B. Populasi

Populasi adalah seluruh subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi (sugianto, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah ibu hamil dengan usia kandungan ≥ 20 minggu yaitu sebanyak 51 orang.

C. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan metode *Accidental sampling*. Dimana teknik penarikan sampel ini dilakukan secara kebetulan. Peneliti dapat memilih orang atau responden terdekatnya atau pertama kali dijumpainya. Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja (Agusinta, 2020). Jumlah sampel penelitian ini yaitu sebanyak 15 orang.

Adapun sampel yang diambil harus memiliki beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :

1. Kriteria inklusi

- a. Populasi penelitian ini adalah ibu hamil dengan usia kehamilan ≥ 20 minggu
- b. Ibu hamil yang tidak memiliki riwayat penyakit tertentu yang dapat menyebabkan komplikasi
- c. Ibu hamil yang bersedia menjadi responden
- d. Ibu hamil yang merasakan kecemasan

2. Kriteria eksklusi

- a. Usia kehamilan ibu belum mencapai ≥ 20 minggu
- b. Ibu hamil tidak bersedia mengikuti *prenatal gentle yoga*
- c. Ibu hamil tidak bersedia mengikuti terapi dzikir
- d. Adanya komplikasi pada ibu hamil
- e. Ibu hamil tidak merasakan kecemasan

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar skrining kecemasan yaitu PASS (*The perinatal anxiety screening scale*), yaitu pengukuran untuk mengetahui tingkat kecemasan ibu hamil, apakah ringan, sedang atau berat. Kuesioner ini berisi 31 pertanyaan yang diantaranya berisi pertanyaan tentang gejala kecemasan yang dirasakan ibu hamil.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Bajeng Kab. Gowa.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 6 juni sampai 8 juli 2022.

F. Metode Pengumpulan

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari responden ibu hamil kepada pengumpul data atau biasa disebut dengan data langsung. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiarto,2018)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui dokumen atau orang lain atau biasa juga disebut data tidak langsung (Suginto, 2018).

Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari data Puskesmas Bajeng.

G. Langkah Pengolahan Data

Pengelolaan data melalui beberapa proses menurut (Setiadi, 2007) yaitu :

1. Editing

Setelah tabel observasi terkumpul berupa data, dilakukan pengecekan data, tujuannya untuk mengecek keutuhan, kesinambungan dan konsistensi data, serta mencoba melengkapi data yang masih kurang.

2. Coding

Tujuan pengkodean adalah agar data dapat ditelusuri, yaitu menyederhanakan semua jawaban terhadap data dengan memberikan simbol/kode berupa angka dan huruf pada nomor variabel daftar pertanyaan.

Tabel 3.1
Karakteristik responden

No.	Karakteristik	Kode
1.	Usia	
	<20	1
	20-35	2
2.	Usia Kehamilan	
	Trimester II	1
	Trimester III	2
3.	Paritas	
	Nullipara	1
	Primipara	2
	Multipara	3
4.	Grande Multipara	4
	Pendidikan	
	Rendah	1
	Sedang	2
Tinggi	3	

3. Tabulasi data

Mengelompokkan data ke dalam tabel, kemudian melakukan analisis statistik data melalui perhitungan dan menjumlahkan hasil perhitungan tersebut.

H. Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS untuk melakukan analisis data dengan uji univariat dan bivariat.

1. Analisis Univariat

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis univariat yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang dimiliki. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti baik dari jenis data numerik maupun kategorik. Pada penelitian yang merupakan karakteristik responden yaitu usia, pendidikan, paritas dan usia kehamilan.

2. Analisis Bivariat

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bivariat, untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Data yang dibentuk berbentuk ordinal dianalisa dengan melakukan uji normalitas menggunakan *Shapiro Wilk* karena besar sampel penelitian 15 dan didapatkan hasil 0,115, berdasarkan uji tersebut data dikatakan terdistribusi normal karena $>0,05$. Karena data terdistribusi dengan normal maka dilanjutkan dengan uji *Sample Paired T-Test*, dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil.

I. Etika Penelitian (No.C.83/KEPK/FKIK/IV/2022)

Menurut KNEPK (Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan) (Yurisa,2008) dalam (sari,2018) terdapat 4 prinsip etik dalam penelitian yaitu :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*Respect for human dignity*)

Penelitian perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian

serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Prinsip etik penelitian ini yaitu responden diperlakukan sebagai agent otonom dan orang yang rentan harus dilindungi. Beberapa tindakan yang terkait prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir penelitian subyek (*informed consent*) yang terdiri dari :

- a. Penjelasan dan manfaat penelitian
- b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan
- c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan Prosedur penelitian
- e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja
- f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

Pada penelitian ini, sebelum dilakukan intervensi *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir, peneliti meminta persetujuan kepada responden dan peneliti menjelaskan kepada respon tentang prosedur intervensi *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir, menjelaskan tentang resiko dan ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, menjelaskan tentang manfaat dari gerakan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir. Memberikan kebebasan kepada respon jika kedepannya ingin mengundurkan diri sebagai responden.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu dapat menggunakan coding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas.

Pada penelitian ini, pada saat proses pengolahan data dan dimasukkan dalam skripsi ini peneliti hanya mencantumkan inisial saja untuk menjaga privasi responden.

3. Keadilan (*justice*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, kesaksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religious subjek penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti memberikan intervensi *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir secara merata dan adil pada semua responden tanpa membeda-bedakan responden yang satu dengan yang lainnya.

4. *Beneficence*

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digenerelisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek

(*nonmaleficence*). Prinsip etik penelitian ini yaitu peserta atau responden tidak boleh dilukai serta manfaat harus lebih dimaksimalkan dan hal yang merugikan lebih diminimalkan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan intervensi sebaik mungkin dan yang bermanfaat bagi kesehatan responden dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan responden.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Data Umum

Puskesmas Bajeng berada di Ibu Kota Kecamatan Bajeng yang merupakan salah satu wilayah dari Kabupaten Gowa , terletak di sebelah Selatan Kota Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa. Dari segi geografis Kecamatan Bajeng terdiri dari dataran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara dengan Kecamatan Palangga
- b) Sebelah Timur dengan Kabupaten Takalar
- c) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bontonompo Sebelah Barat dengan Kecamatan Bajeng Barat Koordinat dan ketinggian letak kantor Desa / Kelurahan, desa yang paling jauh dari permukaan laut adalah Desa Bone yang paling menarik dekat dengan laut adalah Desa Maccini Baji .

2. Geografis

Puskesmas Bajeng merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki wilayah seluas 34,39 Km² atau 57,24% dari luas wilayah. Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Puskesmas Bajeng memiliki 10 wilayah Desa/Kelurahan dengan desa yang terluas adalah Desa Tangkebajeng dengan luas wilayah 6,35 Km² atau 18,46 % dari luas

Wilayah Puskesmas Bajeng. Untuk desa yang luas adalah Kelurahan Mataallo dengan luas wilayah 1,53 Km² atau 4,45 % dari Wilayah Puskesmas Bajeng. Akses dari Puskesmas Bajeng keseluruhan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Bajeng relatif mudah , karena semua. Desa/Kelurahan dapat dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua .

3. Luas Wilayah

Puskesmas Bajeng merupakan wilayah dataran yang memiliki wilayah seluas 34,39 KM atau 57,23 % dari luas wilayah Kecamatan Bajeng, Puskesmas Bajeng memiliki 10 wilayah Desa/Kelurahan dengan Desa yang terluas adalah Desa Tangkebajeng dengan luas 6,35 KM² atau 18, 46 % dari luas wilayah Kerja Puskesmas Bajeng, Untuk Desa/Kelurahan terkecil adalah Kelurahan Mataallo dengan luas wilayah 1,53 KM² atau 4,45% dari luas wilayah kerja Puskesmas Bajeng Akses dari Ibu Kota Kecamatan keseluruhan Desa/Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng relatif mudah karena semua Desa/ Kelurahan dapat dicapai dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

4. Keadaan Mata Pencaharian

Pada umumnya masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bajeng hidup dengan masyarakat agraris (bertani), tukang batu, buruh harian dan sebagian kecil bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Swasta.

B. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini mengenai pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil di puskesmas bajeng yang telah dilaksanakan 6 juli sampai 8 juni 2022. Responden pada penelitian ini adalah ibu hamil trimester II dan III sebanyak 15 orang. Jenis penelitian adalah jenis penelitian kuantitatif, kemudian desain penelitian yang digunakan adalah *Quasi Eksperiment* dengan jenis *one group pretest-posttest design*.

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Tabel. 2.3
Distribusi frekuensi karakteristik responden

Karakteristik	Frekuensi	Presentasi %
Usia		
<20	2	13.3%
20-35	10	33.7%
>35	3	20%
Paritas		
Nullipara	7	46.7%
Primipara	3	20.0%
Multipara	4	26.7%
Grande Multipara	1	6.7%
Usia Kehamilan		
Trimester II	6	40.0%
Trimester III	9	60.0%
Pendidikan		
Rendah	3	30.0%
sedang	6	40.0%
Tinggi	6	40.0%

Sumber, Data primer, 2022

Table 2.3 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi usia, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil dengan usia 20-35 sebanyak 10 responden (33.3%), kemudian responden berusia >35 sebanyak 3 responden (20%) dan responden

berusia <20 sebanyak 2 responden (13.3%). Paritas mayoritas respon adalah nullipara sebanyak 7 responden (46%), multipara sebanyak 4 responden (26%), primipara sebanyak 3 responden (20%) dan grande multipara sebanyak 1 responden (6.7%). Usia kehamilan responden mayoritas adalah trimester II sebanyak 9 responden (60%) dan trimester I sebanyak 6 responden (40%). Pendidikan mayoritas responden adalah pendidikan rendah sebanyak 3 responden (30%), kemudian pendidikan sedang sebanyak 6 responden (40%), dan pendidikan tinggi sebanyak 6 responden (40%).

b. Tingkat Kecemasan

Tabel. 2.5

Tingkat Kecemasan

Tingkat Kecemasan	Pre		Post	
	F	%	F	%
Tidak cemas	0	0	9	60%
Ringan	1	6.7%	2	13%
Sedang	13	86.7%	4	26%
Berat	1	6.7%	0	0
TOTAL	15	100%	15	100%

Sumber Data Primer 2022

Pada tabel 2.5 sebelum dilakukan intervensi *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terdapat 13 responden dengan kecemasan sedang (86.7%), 1 responden dengan kecemasan berat (6.7%) dan 1 responden dengan kecemasan ringan (6.7%). Kemudian setelah intervensi *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir kecemasan mengalami penurunan yaitu terdapat 9 responden tidak cemas (60%), 4 responden dengan kecemasan sedang (26%) dan 2 orang dengan kecemasan ringan (13%).

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada sampel yang berpasangan dengan menggunakan uji Paired Sample T-test.

- a. Skor Kecemasan sebelum dan sesudah *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir

Tabel. 2.4

Distribusi Frekuensi Kecemasan

Tingkat Kecemasan	Mean	Std. Deviation	Min	Max
Pre	31.87	6.186	23	47
Post	19.47	8.297	5	30

Paired T-test

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai mean sebelum intervensi 31.87 dan setelah intervensi 19.97. Nilai standar deviation sebelum intervensi didapatkan 6.186 dan setelah intervensi didapatkan 8.297. Kemudian skor nilai minimum sebelum dilakukan intervensi didapatkan skor 23 (kecemasan sedang) dan setelah dilakukan intervensi didapatkan skor 5 (tidak cemas) kemudian skor nilai maksimum sebelum dilakukan intervensi didapatkan skor 47 (kecemasan berat) dan setelah dilakukan intervensi didapatkan skor 30 (kecemasan sedang). Hal ini menunjukkan ada penurunan sebelum dan setelah intervensi *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir pada ibu hamil di Puskesmas Bajeng.

- b. Pengaruh pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil.

Tabel 2.6

Pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil

Perubahan Tingkat Kecemasan	(f)	%	<i>p-value</i>
Menurun	12	80%	0.000
Tetap	3	20%	
Meningkat	0	0	
Total	15	100%	

Paired Sampel-Test

Pada tabel 1.6 diperoleh hasil pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap perubahan tingkat kecemasan ibu hamil mengalami penurunan dengan menggunakan uji paired T-Test untuk melihat perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai $P\text{-value} = 0,000$ dengan taraf signifikan (<0.05). Nilai $P\text{-value}$ 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada 15 responden dengan karakteristik yaitu usia, pendidikan, paritas dan usia kehamilan.

Karakteristik usia, pada penelitian ini terdapat 5 responden yang beresiko mengalami kecemasan yaitu usia <20 dan >35 kemudian terdapat

10 responden yang tidak beresiko mengalami kecemasan. Pada penelitian ini terdapat satu responden dengan usia <20 tahun yaitu usia 15 tahun dengan kecemasan sedang dan terdapat 3 responden dengan usia >35 sebanyak 3 orang yaitu usia 36 dengan kecemasan ringan, usia 38 dengan kecemasan berat dan usia 48 dengan kecemasan sedang.

Berdasarkan hasil uji chi square pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara usia terhadap kecemasan ibu hamil. Hal ini berarti usia ibu hamil baik yang berada dalam kategori beresiko (<20 tahun atau >35) dan kategori tidak beresiko (20-35 tahun) tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat kecemasan ibu hamil.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Murdayah dkk, 2021) menemukan bahwa usia ibu hamil tidak memiliki hubungan dengan kecemasan ibu hamil. Penelitian menemukan bahwa kecemasan tidak bergantung pada usia ibu hamil sehingga usia tidak menjadi faktor yang mempengaruhi kecemasan ibu hamil. Matang tidaknya seseorang tidak hanya berdasarkan usia. Ada yang usianya masih muda tetapi dia belum siap menjadi ibu sehingga tidak mengalami kecemasan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Handayani,2015) yang menunjukkan bahwa usia ibu merupakan salah satu faktor tingkat kecemasan pada ibu hamil. Kehamilan ibu dengan usia beresiko (<20 dan <35) dapat menjadi penyebab rasa cemas pada ibu. Sebagaimana dalam teori yang menyatakan bahwa ibu hamil dengan usia

beresiko dapat terjadi gangguan pada janin atau kelainan sehingga dapat menimbulkan rasa cemas terhadap ibu hamil terutama primigravida.

Seperti yang dijelaskan Susanti (2008), bahwa usia ibu < 20 tahun dan ≥ 35 akan memberikan dampak terhadap perasaan takut dan cemas menjelang proses persalinan. Karena apabila ibu hamil pada usia tersebut, kehamilannya termasuk dalam kategori kehamilan berisiko tinggi dan seorang ibu yang berusia lebih lanjut akan berpotensi tinggi untuk melahirkan bayi cacat lahir.

Karakteristik pendidikan, pada penelitian ini terdapat 3 responden dengan tingkat pendidikan sedang, 6 responden dengan tingkat pendidikan rendah dan 6 responden dengan tingkat pendidikan tinggi. Pada penelitian ini terdapat 3 responden dengan pendidikan rendah (SD) yang memiliki kecemasan sedang 2 responden dan kecemasan berat 1 responden. Kemudian terdapat 6 responden dengan pendidikan sedang (SMP-SMA) yang memiliki kecemasan ringan sebanyak 2 responden dan kecemasan sedang sebanyak 4 responden. Dan terdapat 6 responden dengan pendidikan tinggi (DIII-S1) yang memiliki kecemasan ringan sebanyak 4 responden dan kecemasan sedang sebanyak 2 responden.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pendidikan tidak berpengaruh dalam tingkat kecemasan ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecemasan ibu hamil tidak bisa dinilai dari tingkat pendidikan. Asumsi peneliti bahwa untuk melihat faktor penyebab dari tingkat kecemasan ibu hamil tidak bisa dilihat dari tingkat pendidikan ibu hamil saja tetapi bisa

juga dilihat dari sedikitnya responden yaitu hanya 15 responden sehingga ketika data di uji chi square pendidikan tidak berpengaruh dalam tingkat kecemasan ibu hamil atau faktor lain seperti lingkungan, adanya tekanan dari luar menyebabkan ibu hamil merasakan kecemasan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Murdayah dkk, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bisa mempengaruhi seseorang dalam berfikir dan bertindak, orang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah berfikir rasional sehingga mudah memecahkan masalah dan mengetahui bagaimana cara mekanisme coping yang positif.

Karakteristik usia kehamilan, pada penelitian ini terdapat 6 responden dengan usia kehamilan trimester II dengan tingkat kecemasan ringan 1 responden dan kecemasan sedang 5 responden. Kemudian terdapat 9 responden dengan usia kehamilan trimester III dengan tingkat kecemasan sedang sebanyak 8 responden dan kecemasan berat terdapat 1 responden.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan handayani (2015) bahwa faktor kecemasan pada trimester II rasa cemas ibu akan kehamilannya mulai berkurang sebagaimana disebutkan dalam teori bahwa ibu hamil trimester II mulai mampu untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan bagi janin (Pieter, 2012). Perasaan cemas ibu hamil akan semakin akut dan intensif seiring dengan mendekatnya kelahiran bayi pertama. Di samping itu trimester III merupakan masa beresiko tinggi terjadinya kelahiran bayi premature sehingga menyebabkan tingginya kecemasan pada ibu hamil.

Karakteristik paritas, berdasarkan penelitian ini terdapat 7 responden dengan kategori Nullipara, 3 responden primipara, 4 responden multipara dan 1 responden dengan kategori grande multipara. Berdasarkan hasil skrining pada penelitian ini ibu hamil yang mengalami tingkat kecemasan berat dan sedang merupakan ibu hamil dengan paritas nullipara atau ibu hamil yang baru pertama kali mengandung. Dan ibu hamil yang mengalami tingkat kecemasan ringan merupakan ibu hamil dengan paritas multipara dan grande multipara atau ibu hamil yang sudah mempunyai 3 anak ke atas.

Asumsi peneliti bahwa semakin sering ibu hamil mengandung dan melahirkan maka tingkat kecemasan akan semakin rendah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan ibu hamil multipripara yang mengatakan bahwa kecemasan berat yang dirasakan hanya pada saat kehamilan pertamanya setelah kehamilan yang ke 4 responden hanya merasakan kecemasan tingkat ringan saja karena sudah berpengalaman dalam proses mengandung dan melahirkan.

2. Tingkat kecemasan sebelum dan setelah *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir

Hasil perbandingan pre test dan post test tingkat kecemasan ibu hamil di Puskesmas Bajeng Kab. Gowa diketahui bahwa sebelum dilakukan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir diperoleh 13 kecemasan sedang (86.7%), 1 responden dengan kecemasan berat (6.7%) dan 1 responden dengan kecemasan ringan (6.7%). Sedangkan setelah dilakukan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir diperoleh kecemasan 9 responden tidak cemas

(60%), 4 responden dengan kecemasan sedang (26%) dan 2 orang dengan kecemasan ringan (13%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kecemasan sesudah dilakukan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir.

Berat ringannya kecemasan yang dialami ibu hamil tergantung pada masing-masing individu dalam menyikapi kondisinya. Menurut Stuart Gail W (2013) yang mengatakan bahwa kecemasan adalah respon emosional terhadap penilaian keadaan emosional yang tidak memiliki objek spesifik.

Berdasarkan hasil wawancara responden mengatakan kecemasan muncul ketika responden melihat berita masalah dalam kehamilan, seperti keguguran, BBLR, dan kecacatan bayi. Responden takut hal tersebut terjadi terhadap janinnya, hal ini menyebabkan tingkat keceasan ibu hamil meningkat.

Asumsi peneliti bahwa kecemasan akan tetap muncul ketika ibu hamil sering ingin tahu dengan berita-berita yang muncul di media social seperti keguguran, kecacatan pada janin dan masalah kehamilan lainnya meskipun kecemasan mengalami penurunan setelah dilakukan intervensi *perenatal gentle yoga* dan terapi dzikir. Jadi disarankan untuk responden agar tetap melakukan intervensi tersebut secara mandiri khususnya saat kecemasan tersebut muncul.

Menurut Blockrun dan Davidson (1994) secara teoritis terjadinya kecemasan diawali oleh pertemuan individu dengan stimulai berupa situasi

yang berpengaruh dalam membentuk kecemasan. (situasi mengancam) mengancam dari pengetahuan tentang kemampuan dirinya untuk mengendalikan dirinya dalam situasi tersebut.

Asumsi peneliti bahwa kecemasan terjadi karena individu tidak dapat mengendalikan dirinya terhadap situasi yang mengancam, tidak mampu mengelola emosi dan tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa ibu hamil sebelum dilakukan intervensi *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir, responden mengatakan bahwa mereka memiliki bayangan yang tidak menentu akan proses persalinan yang akan mereka hadapi nanti. Muncul rasa tidak yakin akan kondisi kesehatan janin, dan juga merasa bahwa takut akan proses persalinan secara normal dan apakah proses persalinan akan berjalan dengan selamat dan lancar. Responden juga mengatakan bahwa kondisi fisiknya tidak lagi selincah dan senyaman dulu, membuat responden merasa cepat lelah dan mudah merasa pegal – pegal terutama pada pinggang

Hal ini sejalan dengan penelitian Yuniza dkk (2021) yang membahas tentang *pengaruh prenatal gentle yoga* terhadap kecemasan ibu hamil trimester III di Kecamatan Plaju.

Masa kehamilan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi ibu hamil, apalagi bagi mereka yang baru pertama kali mengalami kehamilan. Pada ibu hamil dengan kehamilan pertama mereka masih belum mempunyai pengalaman sebelumnya, maka dari itu butuh beberapa waktu

untuk ibu hamil beradaptasi dengan keadaannya mulai dari perubahan hormon, perubahan fisik dan juga bagaimana dan apa yang akan mereka lakukan, dan bayangan persalinan yang membuat ibu hamil merasa cemas akan kehamilannya (Yuniza & Tasya, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, responden mengatakan kecemasannya timbul dikarenakan memikirkan apakah dirinya mampu untuk melakukan persalinan nanti, bagaimana keadaan bayinya nanti dan setelah responden rutin melakukan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir, nyeri pinggang mulai berkurang, mulai tenang dan rileks, sehingga kecemasan akibat kekhawatiran yang responden rasakan secara perlahan berkurang.

Asumsi peneliti bahwa ibu hamil yang memiliki kecemasan berat, sedang maupun ringan dapat diturunkan dengan menggunakan pengobatan *nofarmakologi* yaitu *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir.

3. Pengaruh prenatal gentle yoga dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil

Patofisiologi *Prenatal Gentle yoga* yaitu gerakan-gerakan *yoga* dapat mempengaruhi hipotalamus untuk menekan sekresi CRH (*Corticotropin releasing hormone*) yang akan mempengaruhi kelenjar hipofisis lobus anterior untuk menekan pengeluaran hormon ACTH (*adrenocorticotrophic hormone*) sehingga produksi hormon adrenal dan kortisol menurun serta memerintahkan kelenjar hipofisis lobus anterior mengeluarkan hormon endorfin (Maharani & Hayati, 2020).

Pada penelitian ini perubahan yang terjadi setelah *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir yaitu pada pemberian intervensi minggu ke-3 yang artinya intervensi akan efektif ketika dilakukan secara rutin selama 1 bulan dan sebaliknya jika intervensi hanya dilakukan 2 atau 3 kali saja maka tidak ada perubahan tingkat kecemasan pada ibu hamil. Penelitian ini sejalan dengan teori *American College of Obstetri and Gynecologist* (2012), menyarankan bahwa selama kehamilan, perempuan sebaiknya melakukan olahraga 30 menit setiap hari dengan intensitas sedang (*moderate-intensity physical activity*) tetapi jika tidak mampu melakukan setiap hari per minggu maka dianjurkan memilih beberapa hari dalam seminggu.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pengaruh *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terhadap perubahan tingkat kecemasan ibu hamil mengalami penurunan dengan menggunakan uji paired T-Test untuk melihat perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai $P\text{-value} = 0,000$ dengan taraf signifikan ($<0,05$). Nilai $P\text{-value}$ 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian aswatami (2017) tentang *pengaruh yoga antenatal* terhadap tingkat kecemasan pada ibu hamil di klinik yayasan bumi sehat dengan hasil penelitian menggunakan uji statistik diperoleh nilai p value sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05 yang artinya

terdapat pengaruh yoga antenatal terhadap tingkat kecemasan pada ibu hamil.(Aswitami, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian Ashari (2019), senam yoga pada fase prenatal berpengaruh terhadap turunnya rasa cemas ibu hamil di Puskesmas Patingalloang dan Puskesmas Tamalate. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2012) dan Sumiatik (2016) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara wanita hamil yang melakukan senam yoga dengan menurunnya kecemasan pada kehamilan. (Bingan, 2019)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prenatal *gentle* yoga dapat menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil. Melalui senam prenatal *gentle* yoga ibu hamil telah diberi persiapan baik secara fisik dan mental berupa pengetahuan dan teknik untuk mengurangi kecemasan dalam menghadapi kehamilan hingga proses persalinan. (Bingan, 2019)

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian retnowati (2011) dengan hasil penelitian Hasil penelitian yang signifikan mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa relaksasi dzikir dapat mengatasi kecemasan ibu hamil. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa relaksasi dengan dzikir juga dapat membantu mengurangi kecemasan kehamilan. Bedanya, penelitian ini melibatkan unsur keyakinan yang dimiliki oleh subjek (Retnowati, 2011)

Asumsi peneliti bahwa dengan melakukan terapi dzikir bukan hanya sebagai media relaksasi tetapi juga sebagai media pasrah kepada

Allah SWT dan merupakan bentuk ketaatan kepada-Nya. Sebagaimana

Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu berzikir yaitu

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah), zikir yang sebanyak-banyaknya," "dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang." (QS. al-Ahzab 33: Ayat 41-42)

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, pada ayat ini, Allah menganjurkan kepada semua orang beriman yang membenarkan Allah dan rasul-Nya supaya banyak dzikir mengingat Allah dengan menyebut nama-Nya sebanyak-banyaknya dengan hati dan lidah pada setiap keadaan dan setiap waktu. Sebab Allah lah yang melimpahkan segala nikmat kepada mereka yang tidak terhingga banyaknya. Mereka diperintahkan bertasbih kepada-Nya dengan pengertian membersihkan dan menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya.

Berdasarkan hasil wawancara, responden mengatakan ada perubahan yang responden rasakan setelah *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir, sebelum dilakukan intervensi responden merasakan jantung sering berdebar, sesak nafas dan sangat cemas dengan kehamilannya karena responden pertama kali mengandung atau tidak ada pengalaman sebelumnya akan tetapi setelah dilakukan *prenatal gentle yoga* dan terapi

dzikir responden menjadi lebih tenang, detak jantung tidak lagi berdetak kencang, tubuh menjadi lebih rileks dan stress berkurang.

Asumsi peneliti bahwa *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir terbukti sangat efektif dalam menurunkan kecemasan ibu hamil bukan hanya kecemasan tetapi juga dapat meringankan nyeri punggung, membuat ibu hamil rileks sehingga dapat mencegah terjadinya stress.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menghadapi beberapa keterbatasan yaitu :

1. Penentuan responden berdasarkan kriteria inklusi yang mana sebagian besar ibu hamil yang ingin menjadi responden
2. Responden kurang memiliki kesadaran bahwa *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir mempunyai banyak manfaat untuk kehamilannya sehingga banyak responden yang di *drop out* dengan berbagai alasan.
3. Pekerjaan setiap ibu hamil yang berbeda-beda membuat responden sangat sulit untuk ditemui.
4. Sedikitnya sample membuat peneliti susah untuk mengukur pengaruh karakteristik responden terhadap kecemasan ibu hami

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat kecemasan pada ibu hamil sebelum *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir diperoleh 13 kecemasan sedang (86.7%), 1 responden dengan kecemasan berat (6.7%) dan 1 responden dengan kecemasan ringan (6.7%).
2. Tingkat kecemasan pada ibu hamil setelah dilakukan *prenatal gentle yoga* dan terapi dzikir diperoleh kecemasan 9 responden tidak cemas (60%), 4 responden dengan kecemasan sedang (26%) dan 2 orang dengan kecemasan ringan (13%).
3. Pada uji *paired sample T-test* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan ibu hamil di Puskesmas Bajeng Kab.Gowa dengan diperolehnya nilai signifikansi *p-value* 0,000 ($p < 0,05$).
4. Terdapat pengaruh prenatal gentle yoga dan terapi dzikir terhadap tingkat kecemasan ibu hamil di Puskemas Bajeng Kab.Gowa

B. Saran

1. Diharapkan intervensi ini dapat digunakan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas pada ibu hamil yang mengalami kecemasan pada trimester II dan III menjelang persalinan sebagai salah satu bentuk pengobatan *non farmakologi*.

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penelitian yang lain mengenai manfaat *prenatal gentle yoga* seperti optimalisasi posisi janin dan terapi dzikir untuk ketenangan batin.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya, hal yang penting harus di perhatikan adalah kondisi saat melakukan intervensi. Pastikan tempat atau lokasi penelitian dalam keadaan kondusif sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan.
4. Kecemasan berawal dari fikiran-fikiran yang membuat ibu hamil menjadi takut, gelisah, emosian, stress dan mudah tersinggung maka dari itu ibu hamil disarankan untuk melakukan *prenatal gentle yoga* dan dzikir baik itu setelah melakukan sholat ataupun setelah bangun tidur karena ibu hamil harus selalu beraktivitas untuk kesehatan janin dan selalu mengingat Allah sehingga hatinya menjadi tentram.

Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman : ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah-lah hati (jiwa) menjadi tentram” (Qs.Ar-Ra’d:28)

Islam menganjurkan umatnya untuk tidak bermalas-malasan. Bahkan Nabi Muhamad Saw selalu berdoa agar dilindungi dari sifat malas ini.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ
وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ

Artinya :

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengecutan dan kekikiran, tindihan hutang dan penindasan orang.” (HR. Bukhari no. 6369)



DAFTAR PUSTAKA

- Agusinta, L. (2020). *pengantar metode penelitian manajemen*. cv jagad media publishing.
- Ashari, A., Pongsibidang, G. S., & Mikhrunnisai, A. (2019). Pengaruh Senam Prenatal Yoga terhadap Penurunan Kecemasan Ibu Hamil Trimester III. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 55. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v15i1.5554>
- Bingan, E. C. S. (2019). Pengaruh Prenatal Gentle Yoga dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 466. <https://doi.org/10.26630/jk.v10i3.1505>
- Dasri, Z. A., Wahyuningsih, M., & Mindarsih, E. (2021). Perbedaan Pengaruh Terapi Relaksasi Dzikir Dan Hipnosis Lima Jari Terhadap Kecemasan Ibu Hamil. *Health Care : Jurnal Kesehatan*, 10(1), 125–137.
- Eka Jayanti, pande putu N., Parwati, ni wayan manik, Astti, ni komang erny, & Lindayani, i komang. (2021). *pelayanan kebidanan komplementer* (Susanti (ed.)).
- Hanifah, D. (2019). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Antenatal. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(1), 16–23. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.888>
- Husain, F. (2019). *dzikir dalam islam*.
- Ilmiah, J., & Iqra, K. (2019). *Di Puskesmas Rappang*. 7, 32–37.
- Maharani, S., & Hayati, F. (2020). Pengaruh Prenatal Gentle Yoga Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Persalinan. *Jurnal Endurance*, 5(1), 161. <https://doi.org/10.22216/jen.v5i1.45241>
- muzayyana, sitti nurul hikma saleh. (2021). *kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi persalinan di maa pandemi covid-19*.
- Niko, P. F. (2018). Pengaruh Terapi Dzikir Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Ibu Hamil. *Jurnal ISLAMIKA*, 01(01), 24–33.
- Pratigny, T. (2014). *yoga ibu hamil*. pustaka bunda.
- Rahman, A. (2020). Terapi Dzikir Dalam Islam Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil. *Jurnal Tarbawi*, 5(1), 76.
- Rinata, E., & Andayani, G. A. (2018). Karakteristik ibu (usia, paritas, pendidikan) dan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil trimester III. *Medisains*, 16(1), 14. <https://doi.org/10.30595/medisains.v16i1.2063>
- Ritsma Zunaira Aryani, Rohmi Handayani, D. S., & Kementerian. (2018). *Pengaruh Pelaksanaan Prenatal Gentle Yoga Terhadap Kecemasan Menjelang Persalinan Pada Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii Di Klinik Bidan Kita Klaten Ritsma Zunaira Aryani, Rohmi Handayani, Dewi Susilowati*. 78–83.
- Setiadi. (2007). *Konsep Dan Penulisan Riset Keperawatan*. Graha Ilmu.
- Siregar, N. Y., Kias, C. F., Nurfatimah, N., Noya, F., Longgupa, L. W., Entoh, C., & Ramadhan, K. (2021). Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III dalam Menghadapi Persalinan. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(1), 18–24.

- <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i1.131>
- Syafar, M. (2020). *Modul Intervensi Keperawatan Pencegahan Preeklamsia Pada Ibu hamil*.
- Syaiful, Y., & Fatmawati, L. (2019). *asuhan keperawatan kehamilan*. CV.Jagad publishing surabaya.
- Wahyudi, I., Bahri, S., & Handayani, P. (2019). *Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Budaya Indonesia*. V(1), 135–138. <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>
- Yuliani, diki retno, Saragih, E., Astuti, A., & Ani, wahyuni murni. (2021). *asuhan kehamilan* (A. Karim (ed.)). yayasan kita menulis.
- Yuliani, D. R., & Aini, F. N. (2020). Kecemasan Ibu Hamil Dan Ibu Nifas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Baturraden. *Jurnal Sains Kebidanan*, 2(2), 11–14. <https://doi.org/10.31983/jsk.v2i2.6487>
- Yuniza, & Tasya, S. (2021). Artikel Penelitian. *Jurnal Perspektif*, 4(4), 519. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i4.466>
- Aswitami, N. G. A. P. (2017). Pengaruh Yoga Antenatal Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Tw Ii Dalam Menghadapi Proses Persalinan Di Klinik Yayasan Bumi Sehat. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.36002/jkt.v1i1.155>
- Bingan, E. C. S. (2019). Pengaruh Prenatal Gentle Yoga dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 466. <https://doi.org/10.26630/jk.v10i3.1505>
- Rahman, A. (2020). Terapi Dzikir Dalam Islam Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil. *Jurnal Tarbawi*, 5(1), 76.
- Retnowati, S. (2011). Pengaruh Pelatihan Relaksasi Dengan Dzikir Untuk Mengatasi Kecemasan Ibu Hamil Pertama. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i1.1543>
- Rinata, E., & Andayani, G. A. (2018). Karakteristik ibu (usia, paritas, pendidikan) dan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil trimester III. *Medisains*, 16(1), 14. <https://doi.org/10.30595/medisains.v16i1.2063>
- Yuniza, & Tasya, S. (2021). Artikel Penelitian. *Jurnal Perspektif*, 4(4), 519. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i4.466>

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR PERNYATAAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Jumriani

NIM : 70300118042

Akan mengadakan penelitian tentang **“Pengaruh Prenatal Gentle Yoga Dan Terapi Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Di PKM Bajeng”**. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terimakasih.

Gowa, 10 Februari

2022

Peneliti,

Jumriani

Lampiran 2**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang **“Pengaruh Prenatal Gentle Yoga Dan Terapi Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Di PKM Bajeng”** Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Makassar, 2 Februari 2022

Responden

()

Lampiran 3**KUESIONER*****PERINATAL ANXIETY SCREENING SCALE (PASS)*****IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :
 Usia :
 Usia Kehamilan :
 Agama :
 Alamat :
 No. HP :
 Tanggal :

Petunjuk pengisian kuesioner:

- c. Berikan tanda checklist (√) pada kolom jawaban/penilaian yang ada di sebelah kanan pernyataan yang anda anggap benar dan sesuai dengan apa yang anda pikirkan/rasakan.
- d. Bila ingin mengganti jawaban yang salah berilah tanda (=) pada jawaban yang salah

LEMBAR PENGUKURAN TINGKAT KECEMASAN (PASS)

No.	Pernyataan	Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering	Selalu
1.	Khawatir terhadap janin atau kehamilan				
2.	Takut jika bahaya akan datang pada janin				
3.	Merasa takut akan hal-hal buruk yang akan terjadi				
4.	Khawatir tentang banyak hal				
5.	Khawatir tentang masa depan				
6.	Merasa kelelahan				
7.	Merasa takut terhadap jarum, darah, kelahiran, nyeri dan sakit				

8.	Mendadak merasa takut atau tidak nyaman berlebihan				
9.	Memikirkan suatu hal berulang-ulang dan sulit untuk dihentikan atau dikontrol				
10.	Sulit untuk tidur bahkan saat memiliki kesempatan untuk tidur				
11.	Merasa harus melakukan hal-hal dengan cara yang tepat dan sesuai aturan				
12.	Menginginkan segala sesuatu menjadi sempurna				
13.	Merasa perlu untuk mengendalikan segala hal				
14.	Kesulitan untuk berhenti memeriksa atau melakukan sesuatu secara berlebihan				
15.	Merasa gelisah atau mudah terkejut				
16.	Merasa khawatir akan berbagai pikiran yang datang secara berulang-ulang				
17.	Menjadi waspada atau merasa perlu untuk mengawasi sesuatu hal				
18.	Merasa terganggu akan kenangan yang datang berulang-ulang, mimpi-mimpi buruk				
19.	Merasa khawatir apabila saya akan mempermalukan diri saya sendiri di hadapan orang lain				
20.	Khawatir bahwa orang lain akan menilai saya negatif				
21.	Merasa sangat tidak nyaman berada di tengah-tengah keramaian				
22.	Menghindari kegiatan sosial karena hal tersebut akan membuat gugup				
23.	Menghindari hal-hal yang membuat saya merasa risau				

24.	Merasa terpisah seakan saya melihat diri saya sendiri seperti di film				
25.	Lupa mengenai waktu dan tidak mampu mengingat apa yang telah terjadi				
26.	Kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan baru				
27.	Khawatir tidak mampu melakukan suatu hal				
28.	Suatu pikiran yang tidak dapat berhenti dan membuat sulit untuk berkonsentrasi				
29.	Takut kehilangan kendali				
30.	Merasa panik				
31.	Merasa gelisah				

PASS terdiri dari 31 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban dengan pemberian skor:

0 = tidak pernah,

1 = kadang-kadang,

2 = jawaban sering dan

3 = jawaban selalu

dengan kategori skor :

0 - 20 : Tidak cemas

21 - 26 : Cemas ringan

27 - 40 : Cemas sedang

41 - 93 : Cemas berat



Lampiran 4

LEMBAR OBSERVASI *PRENATAL GENTLE YOGA* DAN TERAPI

DZIKIR

Hari/Tanggal Pelaksanaan :

Tempat Pelaksanaan :

Nama :

Usia Kehamilan :

Alamat :

No. HP :

Berikan tanda \surd pada “Ya” jika tindakan tidak dilakukan dan berikan tanda \surd pada “tidak” jika tindakan tidak dilakukan.

No.	Aspek Yang Di nilai	Pencapaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Teknik Pemanasan a. Menengadahkan kepala ke atas dan ke bawah selama 8 kali b. Menengok ke arah kanan dan kiri selama 8 kali c. Memutar leher dari kiri dan kanan sebanyak 8 kali d. Memutar bahu kiri dan kanan sebanyak 8 kali e. Meregangkan pergelangan tangan, lutut dan jari-jari kaki.			
2.	Gerakan <i>prenatal gentle yoga</i> a. Gerakan <i>side angle pose</i> dilakukan selama 5-10 kali nafas. b. Gerakan <i>triangle pose</i> dilakukan selama 5-10 kali nafas. c. Gerakan <i>warrior 1</i> dilakukan dengan 5-10 kali nafas d. Gerakan <i>warrior 2</i> dilakukan dengan 5-10 kali nafas			

	<p>e. Gerakan <i>Goddess Pose</i> dilakukan selama 5-10 kali napas.</p> <p>f. Gerakan Selanjutnya adalah <i>Half Squat</i> dilakukan dengan 5-10 kali napas</p> <p>g. Gerakan <i>Gate Post</i> dilakukan dengan 5-10 kali napas.</p> <p>h. Gerakan <i>tiger stretch</i> dilakukan selama 5-10 kali napas.</p> <p>i. Gerakan terakhir adalah <i>butterfly pose</i>. Gerakan ini juga dilakukan 5-10 kali napas</p>			
3.	<p>Tahap Meditasi Dengan Terapi Dzikir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Duduk dengan santai atau mengatur posisi nyaman mungkin 2. menutup mata 3. mengendurkan otot 4. Bernapas secara alami dan mulai mengucapkan kalimat spiritual yang dibaca secara berulang-ulang yang dilakukan 10 menit yaitu : “Subhanallah”, “Alhamdulillah”, “Lailahailallah”, “Allahu Akbar” 			

Lampiran 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PRENATAL GENTLE YOGA DAN TERAPI DZIKIR		
1.	Pengertian	<p><i>Prenatal gentle yoga</i> adalah jenis olah tubuh, fikiran dan mental ibu yang sangat membantu ibu hamil dalam melenturkan persendian dan menenangkan fikiran ibu hamil.</p> <p><i>Terapi dzikir</i> adalah suatu metode atau prosedur tindakan spiritual yang dapat membantu seseorang menjadi rileks sehingga bisa menurunkan kecemasan.</p>
2.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan energi, vitalitas, dan daya tahan tubuh Melepaskan stress dan cemas Meningkatkan kualitas tidur Menghilangkan ketegangan otot Mengurangi keluhan fisik secara umum semasa kehamilan, seperti nyeri panggul, pembengkakan bagian tubuh Membantu proses penyembuhan dan pemulihan setelah melahirkan. Dzikir dapat menghapus dosa dan menyelamatkan adzab Allah, karena dengan berdzikir dosa akan menjadi suatu kebaikan yang besar, sedangkan kebaikan akan menghapus dosa.
3.	Indikasi	Ibu hamil dengan usia kandungan ≥ 20 minggu dan beragama islam
4.	Kontraindikasi	<ol style="list-style-type: none"> Pembengkakan pada tangan dan kaki Tremor pada ekstremitas atas maupun bawah Kram pada perut bagian bawah Hamil dengan penyakit jantung dan kehamilan dengan gerakan janin yang lemah Ibu hamil yang bukan islam
5.	Persiapan Pasien	Minum sesaat Sebelum latihan yoga, makan 1-3 jam Sebelum latihan, menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman, tidak menggunakan alas kaki.
6.	Persiapan Alat	<ol style="list-style-type: none"> matras atau karpet Lembar observasi Kuesioner Alat tulis
7.	Cara kerja	<p>Orientasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berikan salam, perkenalkan nama perawat Panggil klien dengan nama kesukaan Jelaskan prosedur, tujuan dan lamanya kegiatan Berikan kesempatan pada klien untuk bertanya

		<p>5. Menginstruksikan ibu hamil untuk mengisi kuesioner tingkat kecemasan sebelum dilakukannya intervensi.</p> <p>Tahap Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan dimulai dengan teknik pemanasan untuk menghangatkan tubuh, meningkatkan kelenturan otot dan sendi, serta menghindari risiko cedera otot dan ligamen serta tahap meditasi dengan menggunakan terapi dzikir. 2. Latihan dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu. <p>Teknik Pemanasan</p> <ol style="list-style-type: none"> f. Menengadahkan kepala ke atas dan ke bawah selama 8 kali g. Menengok ke arah kanan dan kiri selama 8 kali h. Memutar leher dari kiri dan kanan sebanyak 8 kali i. Memutar bahu kiri dan kanan sebanyak 8 kali j. Meregangkan pergelangan tangan, lutut dan jari-jari kaki <p>Gerakan <i>prenatal gentle yoga</i></p> <ol style="list-style-type: none"> j. Gerakan <i>prenatal gentle yoga</i> terdiri atas <i>side angle pose</i> dan <i>triangle pose</i> yang dilakukan selama 5-10 kali nafas. Gerakan ini memiliki beberapa manfaat antara lain menguatkan kaki, lutut, pergelangan kaki, pangkal paha, tulang belakang dan pinggang serta menstimulus, merangsang organ perut. k. Gerakan berikutnya adalah <i>warior 1</i> dan <i>warrior 2</i>. Gerakan ini juga dilakukan dengan 5-10 kali napas. Adapun manfaat dari gerakan ini adalah menggunakan otot bokong, pinggul, mendapatkan atau meningkatkan energi di dalam tubuh. l. Gerakan selanjutnya adalah <i>Goddess Pose</i>. Gerakan ini juga dilakukan selama 5-10 kali napas. Manfaat gerakan ini adalah menguatkan bahu dan dada, mengurangi stress, meningkatkan aliran energi pada bagian fungsi organ reproduksi serta meregangkan otot paha, dada dan panggul. m. Gerakan Selanjutnya adalah <i>Half Squat</i>. Gerakan ini juga dilakukan dengan 5-10 kali napas. Gerakan ini memiliki manfaat antara lain menguatkan tubuh bagian bawah, melebarkan pinggul dan panggul, keseimbangan dan stabilitas ibu hamil meningkat, meningkatkan ketenangan serta menenangkan pikiran n. Gerakan berikutnya adalah <i>Gate Pose</i>. Gerakan ini dilakukan dengan 5-10 kali napas. Gerakan ini memberikan manfaat antara lain meregangkan tulang belakang, paha belakang, bahu dan merangsang organ perut. Selain itu, terdapat pula gerakan <i>tiger stretch</i>.
--	--	--

		<p>Gerakan ini juga dilakukan selama 5-10 kali napas, dengan manfaat antara lain memberikan kekuatan pada kaki dan tulang punggung.</p> <p>o. Gerakan terakhir adalah <i>butterfly pose</i>. Gerakan ini dilakukan 5-10 kali napas. Gerakan ini bermanfaat untuk membuka panggul dan memperkuat otot paha.</p> <p>Tahap Meditasi Dengan Terapi Dzikir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilihlah kalimat spiritual yang akan digunakan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. "SUBHANALLAH" 2. "ALHAMDULILLAH" 3. "LAILAHAILLALLAH" 4. "ALLAHU AKBAR" 2. Duduklah dengan santai atau atur posisi senyaman mungkin 3. Tutup mata 4. Kendorkan otot 5. Bernapaslah secara alami dan mulai mengucapkan kalimat spiritual yang dibaca secara berulang-ulang 6. Bila ada pikiran yang mengganggu, kembalilah fokuskan pikiran 7. Lakukan selama 10 menit 8. Jika selesai jangan langsung berdiri duduklah dulu dan beristirahat, buka pikiran kembali, barulah berdiri melakukan kegiatan kembali. <p>Tahap Terminasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi respon klien 2. Berikan reinforcement positif 3. Lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya 4. Akhiri pertemuan dengan cara yang baik 5. menginstruksikan ibu hamil untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui tingkat kecemasan setelah dilakukannya intervensi.
--	--	--

Lampiran 6**GAMBAR GERAKAN *PRENATAL GENTLE YOGA***

Slide Angle Pose (5-10 kali napas)

Triangle Pose (5 - 10 kali napas)



Warior 1 (5 - 10 kali napas)

Warior 2 (5 - 10 kali napas)



Goddess Pose (5 - 10 kali napas)



Half Squat (5-10 kali napas)



Gate Pose

Tiger Stretch



Butterfly Pose (5-10 kali napas)

Lampiran 7 Hasil karakteristik responden

Kelompok Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	beresiko	2	13.3	13.3	13.3
	tidak beresiko	10	66.7	66.7	80.0
	beresiko	3	20.0	20.0	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

kelompok Uk

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Trimester II	6	40.0	40.0	40.0
	Trimester III	9	60.0	60.0	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

kelompok paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Nullipara	7	46.7	46.7	46.7
	Primipara	3	20.0	20.0	66.7
	Muttipara	4	26.7	26.7	93.3
	Grande Multipara	1	6.7	6.7	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

kelompok pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	6	20.0	20.0	20.0
	Sedang	3	40.0	40.0	60.0
	Tinggi	6	40.0	40.0	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

Lampiran 8

Distribusi frekuensi kecemasan

		Statistics	
		Kelompok Pre	Kelompok Post
N	Valid	15	15
	Missing	0	0
Mean		3.00	1.67
Median		3.00	1.00
Std. Deviation		.378	.900
Minimum		2	1
Maximum		4	3

Lampiran 9

Hasil uji sampel paired T-test

		Paired Samples Test							
		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval		t	df	Sig. (2-tailed)
					Mean	Upper			
Pair 1	PRE - POST	12.400	9.303	2.402	7.248	17.552	5.162	14	.000

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRE	31.87	15	6.186	1.597
	POST	19.47	15	8.297	2.142



Lampiran 10

Surat Keterangan Layak Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION "

No.C.83/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama
Principal In Investigator

: Jumriati

Nama Institusi
Name of the Institution

: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dengan judul:
Title

“Pengaruh Prenatal Gentle Yoga dan Terapi Zikir terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil di PKM Bajeng”

“The Effect Of Prenatal Gentle Yoga And Zikir Therapy On The Anxiety In PKM Bajeng”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Eujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS-2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

MAKASSAR

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21/4/2022. sampai dengan tanggal 21/4/2023

This declaration of ethics applies during the period 21/4/2022 until 21/4/2023

April 21, 2022
 Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 11

Surat Penelitian PKM Bajeng

REGISTRASI/132/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2022



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 31 Mei 2022

KepadaYth.

Nomor : 503/519/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2022
 Lamp :
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Puskesmas Bajeng kab.gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 1560/S.01/PTSP2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Izin Penelitian,

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **JUMRIANI**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tabang / 18 Februari 1999
 Nomor Pokok : 70300118042
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Program Studi : keperawatan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl.Tien Soeharto

Bermaksud akan mengadakan Penelitian Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**PENGARUH PRENATAL GENTLE YOGA DAN TERAPI DZIKIR TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL DI PKM BAJENG**"

Selama : 31 Mei 2022 s/d 30 Juni 2022
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada kesempatan ini dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua Jur. Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E-BSSN.



Lampiran 12

a. Dokumentasi Pre test (pembagian kuesioner pada ibu hamil)



b. Pelatihan Prenatal gentle yoga dan terapi dzikir



c. Kunjungan rumah



d. Pembagian kuesioner post test



RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Pengaruh *Prenatal Gentle Yoga* Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Dipuskesmas Bajeng Kab Gowa” bernama lengkap Jumriani, lahir di Selayar pada tanggal 18 february 1999. Anak ke3 dari 5 bersaudara dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Nurbaya. Menempuh pendidikan dasar di SDN Tabang pada tahun 2016-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Benteng, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri 5 Selayar, karena rasa ingin tahu yang lebih terhadap dunia keperawatan, penulis melanjutkan pendidikan di jurusan keperawatan UIN Alauddin Makassar jalur Mandiri pada tahun 2018.

ALAUDDIN
MAKASSAR