

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA  
DENGAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN MENGGUNAKAN  
TERAPI DZIKIR DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DADI  
SULAWESI SELATAN**



NIM: 70900121011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA  
DENGAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN MENGGUNAKAN  
TERAPI DZIKIR DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DADI  
SULAWESI SELATAN**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ners Program Studi  
Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**KHAERATUNNAFISAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
NIM: 70900121011

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khaeratunnafisah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bima, 27 Oktober 2000  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan/Ners/Keperawatan Jiwa  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Seruni Gang Jenaluma Lewisape, Kel. Sarae  
Kota Bima. Nusa Tenggara Barat  
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Risiko Perilaku Kekerasan Menggunakan Terapi Dzikir Di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tugas akhir ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Makassar, 27 Juni 2022

Penyusun

Khaeratunnafisah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners saudari Khaeratunnafisah NIM : 70900121011, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Risiko Perilaku Kekerasan Menggunakan Terapi Dzikir Di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Sulawesi Selatan" memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 27 Juni 2022



Hj. Sysnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J

Pembimbing I



Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep





Pembimbing II

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul, "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Risiko Perilaku Kekerasan Menggunakan Terapi Dzikir Di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Sulawesi Selatan", yang disusun oleh Khaeratunnafisah, NIM: 70900121011, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 M, bertepatan dengan Dzulqaidah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 27 Juni 2022 M.  
27 Dzulqaidah 1443 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes	(  )
Sekretaris	: Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep	(  )
Munaqisy I	: Eny Sutria, S. Kep., Ns., M. Kes	(  )
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Irham, S. Th. I., M. Th. I	(  )
Pembimbing I	: Hj. Sysnawati, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. J	(  )
Pembimbing II	: Aidah Fitriani, S. Kep., Ns., M. Kep	(  )

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin  
Makassar,

  
Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes.  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir profesi ners dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan Dengan Menggunakan Intervensi Terapi Psikoreligius Dzikir di RSKD Dadi Sulawesi Selatan” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga sahabatnya dari para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan tugas akhir ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada Program Profesi Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021/2022

Dengan terselesaikannya penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua saya tercinta. Drs.Hatta dan Dra.Nunung atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materilnya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, meraih gelar Ners. Ucapan terimakasih yang tulus saya haturkan kepada pembimbing, yang senantiasa mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp. A, M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.


3. Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kes selaku ketua jurusan dan Hj. Sysnawati, S.Kep., Ns.,M.Kep., Sp.Kep.J selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak kenal lelah memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Hj. Sysnawati, S.Kep., Ns.,M.Kep., Sp.Kep.J selaku pembimbing I dan Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep dan Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku pembimbing II yang selama ini telah dengan sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan tugas akhir, motivasi yang membangun sehingga penulis bisa ketahap ini.
5. Eny Sutria,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku penguji I dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I.,M.Th.I selaku penguji II yang sabar dan ihklas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada Kakak saya tercinta Anis Khairunnisa dan Adik- adikku M.Rizqi Rismawan, dan Moh.Darmawan yang telah memberikan Semangat dan bantuan baik secara materil ,maupun moril selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya Ners Angkatan XIX yang telah bahu membahu saling memberikan semangat selama 1 tahun proses ini dan seluruh teman-teman Angkatan LEUKOS17 yang telah memberikan penulis motivasi dan pemikiran positif.
8. Kepada Sahabat-sahabat saya Zahida Yulianti, Ricka Aprilya, dan Muhammad Iqbal yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
9. Kepada keluarga besar HMJ Keperawatan tercinta yang memberikan saya ilmu dan pelajaran tentang makna organisasi, sehingga saya mampu besar dan belajar dalam sebuah organisasi yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih

Makassar, Juni 2022

Khaeratunnafisah

70900121011



## ABSTRAK

Nama : Khaeratunnafisah

NIM : 70900121011

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan Menggunakan Terapi Dzikir di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Sulawesi Selatan.

---

**Latar Belakang:** Berdasarkan data yang tercatat mulai September 2016–Januari 2017 di RSKD Dadi Sulawesi Selatan, didapatkan jumlah pasien diagnosis risiko perilaku kekerasan berjumlah 9.984, masalah risiko perilaku kekerasan menempati urutan kedua dengan kasus terbanyak. Skizofrenia perlu dicegah agar manusia mencapai derajat kesehatan jiwa yang baik, salah satunya adalah mengatasi resiko perilaku kekerasan seseorang dengan gangguan jiwa. Pemberian terapi dzikir, merupakan salah satu cara untuk mengontrol perilaku kekerasan.

**Tujuan:** Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir di RSKD Dadi Sulawesi Selatan. **Metode:** Menggunakan *study case* dengan pemberian intervensi dzikir kepada pasien dengan masalah risiko perilaku kekerasan di RSKD Dadi Sulawesi Selatan. **Hasil:** Sesudah pemberian terapi dzikir selama enam hari, ia menyadari marah tersebut perilaku yang buruk dan membahayakan diri orang lain dan lingkungan. Pasien nampak lebih rileks setelah diberikan terapi dzikir. **Kesimpulan:** intervensi terapi dzikir terbukti efektif untuk menurunkan tanda dan gejala perilaku kekerasan, sehingga pasien dapat mengontrol perilaku kekerasannya.

**Kata kunci:** Terapi dzikir, Skizofrenia, Risiko Perilaku Kekerasan

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

Nama : Khaeratunnafisah

NIM : 70900121011

Judul : “Analysis of Nursing Care in Patients at Risk of Violent Behavior Using Dhikr Therapy at Dadi Regional Special Hospital, South Sulawesi”

---

**Background:** Based on data recorded from September 2016- January 2017 at Dadi Hospital, South Sulawesi, there were 9,984 patient behavioral risk diagnoses, violent behavior problems ranked second with the most cases. Mental disorders must be handled so that humans achieve a good degree of mental health, one of which is overcoming the violent behavior of someone with a mental disorder. Give dhikr therapy, is one way to control violent behavior. **Objective:** To analyze the treatment of schizophrenia patients with violent behavior using dhikr therapy at Dadi Hospital, South Sulawesi. **Methods:** Using a case study method, namely offering dhikr interventions to patients who are at risk of violent behavior at Dadi Hospital, South Sulawesi. **Results:** After being given the intervention for six days, the patient realized that anger is a bad act and can do good damage to others, themselves and the environment. The patient seemed more relaxed after being given dhikr therapy. **Conclusion:** dhikr psychoreligius intervention has been proven to be effective in reducing signs and symptoms of violent behavior, so that patients so that patients can ontrol their violent behavior.

**Keyword :** Dhikr therapy, Schizophrenia, Risk of Violent Behavior.



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Konsep Medis.....	6
1. Definisi .....	6
2. Etiologi .....	7
3. Manifestasi Klinis .....	13
4. Penatalaksanaan .....	14
B. Konsep Asuhan Keperawatan .....	17
1. Pengkajian .....	17
2. Diagnosis Keperawatan.....	23
3. Intervensi Keperawatan .....	23
C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan .....	24
D. <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> .....	26
1. Pengertian .....	26
2. Tujuan .....	28
E. Indikasi.....	28
F. Kontraindikasi.....	29
G. Prosedur Pemberian dan rasionalisasi .....	29
H. Kriteria evaluasi.....	30

I. Artikel utama dan pendukung .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Rancangan Studi Kasus .....	32
B. Subyek Studi Kasus.....	32
C. Fokus Studi Kasus.....	32
D. Instrumen Studi Kasus .....	33
E. Prosedur Pengambilan Data .....	33
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus.....	33
H. Etika Studi Kasus .....	34
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
<b>LAPORAN KASUS.....</b>	<b>35</b>
A. Asuhan Keperawatan .....	35
1. Pengkajian Keperawatan .....	35
2. Diagnosa Keperawatan .....	49
3. Intervensi Keperawatan.....	50
4. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan .....	54
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Asuhan Keperawatan .....	61
1. Analisis Pengkajian Keperawatan.....	61
2. Analisis Diagnosis Keperawatan .....	63
3. Analisis Intervensi Keperawatan .....	64
4. Analisis Implementasi Keperawatan .....	65
5. Analisis Evaluasi Keperawatan .....	69
B. Analisis Intervensi EBPN.....	71
C. Keterbatasan.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Jurnal Utama dan Jurnal Pendukung .....37



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Penurunan Tanda dan Gejala Perilaku kekerasan .....79



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketika seseorang merasa sehat, bahagia, dan mampu menghadapi tantangan hidup serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain disebut kesehatan jiwa. Atau kondisi dimana individu merasa dirinya dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu menyadari kemampuannya, dan dapat mengatasi tekanan sehingga dapat berkerja (UU No.18 tahun 2014).

Berbagai permasalahan kesehatan jiwa telah diidentifikasi dan perlu ditanggulangi. Berdasarkan Data dari WHO tahun 2019 terdapat 20 juta orang didunia mengalami skizofrenia. Sementara, Riskesdas RI menyatakan sekitar 282.654 jiwa memiliki anggota keluarga pengidap gangguan jiwa (Tim Riskesdas 2018).

Kasus gangguan jiwa di Indonesia pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan ini terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ di Indonesia. Ada peningkatan jumlah menjadi 7 permil rumah tangga. Artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat. Di Sulawesi Selatan sendiri, jumlah penderita gangguan jiwa mencapai 7,8 % dengan penderita usia >15 tahun. Hal ini menempati urutan ke-10 terbanyak di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Banyaknya faktor yang menjadi penyebab gangguan jiwa tersebut muncul, diantaranya seperti perkawinan yang gagal, hubungan interpersonal (antar pribadi) yang tidak baik, lingkungan hidup, pekerjaan atau bahkan disebabkan karena faktor keluarga yang membuat individu mengalami stress akibat keadaan keluarga yang tidak baik. Pasien dengan gangguan jiwa merupakan seseorang yang berisiko tinggi melakukan tindakan kekerasan baik pada diri sendiri, orang lain, maupun

lingkungannya (Aras, 2019). Penatalaksanaan pasien resiko perilaku kekerasan di rumah sakit jiwa, perawat sebagai pemberi layanan kesehatan pada pasien melakukan aspek guna mendukung kesehatan pasien (Erwina, 2012). Stuart dan Laraia (2015) terdapat 3 strategi yang dapat diberikan pada pasien dengan perilaku kekerasan yaitu preventif, antisipasi dan pengekangan lingkungan, perilaku dan psikofarmaka. Tindakan yang tepat untuk pasien RPK biasanya yaitu restrain, isolasi dan kolaborasi pemberian obat antipsikotik (Sulaiman, 2016).

Pada pasien perilaku kekerasan dapat diberikan penatalaksanaan meliputi terapi farmakologi, dan tidak menggunakan obat-obatan. Terapi pengobatan mengarah pada pemberian terapi aktifitas, dan obat-obatan dengan pendekatan terapi modalitas terhadap individu, lingkungan, biologi dan terapi kognitif (Videbeck, 2018). Salah satu terapi nonfarmakologi yang terbukti dapat mengurangi perilaku kekerasan adalah terapi psikoreligius dzikir. Dzikir ialah mengingat nikmat-nikmat Tuhan. (Ash-Shiddieqy, 2018). Penerapan terapi psikoreligius dzikir pada pasien risiko perilaku kekerasan bertujuan untuk mengontrol perilaku kekerasan pasien, karena ketika pasien melakukan penerapan psikoreligius dzikir, pasien akan terdistraksi sehingga fokus perhatian pasien akan beralih dari keinginannya untuk marah menjadi lebih tenang dan dapat mengontrolnya. Penelitian yang dilakukan Romayanti, 2020 mengatakan bahwa dzikir dapat menurunkan risiko perilaku kekerasan, ini diakibatkan dengan pengucapannya yang berulang kali, sehingga memberikan stimulus kepada otak agar menjadi lebih tenang. Dzikir juga dapat mengubah persepsi individu dalam menghadapi stressor yang sedang dialaminya. Umat islam percaya bahwa dzikir merupakan obat dari segala penyakit, yang dapat menyembuhkan jiwa dan menyembuhkan berbagai penyakit (Romayanti, 2020). Ketika individu menjadikan dzikir sebagai kebiasaan, ia akan senantiasa merasa dirinya dekat dengan Allah dan berada dalam penjagaan dan lindungan Allah SWT, hal tersebut dapat memunculkan rasa percaya diri, aman, tentram damai, dan bahagia bagi yang melakukannya. (Najati,

2019). Dzikir tersebut bekerja dengan menekan kerja sistem syaraf simpatis dan mengaktifkan kerja sistem syaraf parasimpatis (Saleh, 2015). Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Yunus (10): 57:

لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً وَهُدًى الصُّدُورِ فِي لَمَّا وَشِفَاءً رَبِّكُمْ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَتْكُمْ قَدْ النَّاسُ يَأْتِيهَا

Terjemahnya :

*”Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”* (Kementrian Agama,2019).

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an melalui rasul-Nya kepada umat manusia, sebagai penyembuh bagi penyakit yang bersarang didada manusia, seperti penyakit syirik, kufur, munafik, termaksud pula penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman jiwa manusia seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyiakan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut. Serta menjadi petunjuk yang menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah (Kementrian Agama RI, 2021). Berdasarkan Tafsir Al- Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab, ayat ini merupakan renungan dan anjuran untuk melakukan pengamatan terhadap rahasia-rahasia alam dan keagungan ciptaan-Nya. Ayat ini juga mengandung terapi untuk penyakit hati, semisal kemusyrikan dan kemunafikan (Tafsir Al-Misbah,2012).

Penggunaan terapi dzikir untuk penelitian ini karena, dzikir merupakan salah satu terapi spiritual dan masuk kedalam strategi pelaksanaan (SP) jiwa dengan masalah perilaku kekerasan. Sehingga terapi dzikir dapat diimplementasikan pada pasien tersebut, jika terapi dilakukan dengan baik dan sempurna, maka pasien yang sedang mengalami perilaku kekerasan dapat mengontrol amarahnya dan lebih menyibukkan diri dengan berdzikir (Puspita et al., 2021). Ernawati et al,

2020, diberikan latihan mengontrol fisik (memukul bantal dan Kasur, latihan tarik napas dalam), berikan pendkes minum obat teratur, melatih pasien meminta dan menolak dengan bicara yang baik, latih pasien mengontrol marah dengan cara spiritual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ernawati et al, 2020) terdapat perubahan pemberian terapi spiritual dengan menggunakan dzikir.

Berdasarkan data yang tercatat mulai September 2016–Januari 2017 di RSKD Dadi Sulawesi Selatan sejumlah 9.984 pasien, risiko perilaku kekerasan menempati urutan kedua dengan kasus terbanyak. Gangguan jiwa tersebut perlu ditangani sesegera mungkin, agar individu dapat hidup seperti individu pada umumnya. kondisi berisiko berbahaya secara fisik dan mental disebut perilaku kekerasan. Perilaku tersebut dilihat dengan adanya perilaku amuk dan gaduh gelisah yang tidak terkontrol (Wuryaningsih et al., 2020).

Direja (2016) bahwa skizofrenia adalah suatu bentuk psikosa fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir serta disharmoni (keretakan, perpecahan) antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan halusinasi, asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul inkoherenasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pemberian terapi dzikir pada Tn. S yang mengalami skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan menggunakan intervensi dzikir di RSKD Dadi Sulawesi Selatan?

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir di RSKD Dadi Sulawesi Selatan.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir

#### **D. Manfaat**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis aspek pasien skizofrenia risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir di RSKD Dadi Sulawesi Selatan.

##### **2. Manfaat Aplikatif**

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Medis**

##### **1. Definisi**

Risiko perilaku kekerasan adalah seseorang mengalami riwayat tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan dan orang lain baik secara fisik, verbal, emosional dan seksual. Perilaku kekerasan

merupakan perilaku melukai atau mencederai diri sendiri, orang lain, lingkungan baik secara fisik, verbal, emosional dan seksual (Keliat et al, 2014). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (Niko, 2018) Perilaku kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut (Purba dkk, 2008).

Perilaku kekerasan merupakan bentuk kekerasan dan pemaksaan secara fisik maupun verbal ditunjukkan kepada diri sendiri maupun orang lain. Perilaku kekerasan adalah salah satu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologi. Perilaku agresif dan perilaku kekerasan sering dipandang sebagai rentang dimana agresif verbal di satu sisi dan perilaku kekerasan (*violence*) di sisi yang lain. Suatu keadaan yang menimbulkan emosi, perasaan frustrasi, benci atau marah. Hal ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Berdasarkan keadaan emosi secara mendalam tersebut terkadang perilaku menjadi agresif atau melukai karena penggunaan coping yang kurang bagus (Kandar & Iswanti, 2019).

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang membahayakan secara fisik, baik kepada diri sendiri, maupun orang lain (Yoseph, 2009). Ancaman atau

kebutuhan yang tidak terpenuhi mengakibatkan seseorang stress berat, membuat orang marah bahkan kehilangan kontrol kesadaran diri, misalkan: memaki-maki orang disekitarnya, membanting-banting barang, menciderai diri dan orang lain, bahkan membakar rumah.

## 2. Etiologi

Penyebab dari perilaku kekerasan bukan terdiri cuman satu faktor tetapi termasuk juga faktor keluarga, media, teman, lingkungan, biologis. Perilaku kekerasan dapat menimbulkan dampak seperti gangguan psikologis, merasa tidak aman, tertutup, kurng percaya diri, risiko bunuh diri, depresi, harga diri rendah, ketidak berdayaan, isolasi sosial (Putri, Arif & Renidayati 2020).

### a. Faktor Predisposisi

Faktor pengalaman yang dialami tiap orang yang merupakan faktor predisposisi, artinya mungkinditerjadi atau mungkin tidak terjadi perilaku kekerasan jika faktor berikut di alami oleh individu :

#### 1) Psikologis

Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustasi yang kemudian menyenagkan atau perasaan ditolak, dihina, dianiaya, atau sanksi penganiayaan.

#### 2) Perilaku reinforcement

Yang diterima saat melakukan kekerasan, dirumah atau di luar rumah, semua aspek ini menstimulasi individu mengadopsi perilaku kekerasan.

#### 3) Teori psikonaltik

Menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya ego dan membuat konsep diri yang rendah. Agresi dapat meningkatkan citra diri serta memberikan arti dalam hidupnya (Sasongko & Hidayati, 2020).

Dalam islam, sudah sangat jelas bagaimana kita dianjurkan untuk bisa mengontrol amarah, sebagaimana. Allah swt berfirman dalam Q.S. Ali Imran(3):134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S..Ali Imran (3): 134).

Ayat diatas menjelaskan mengenai sifat kikir yang tertanam dalam hati manusia hendaklah diberantas dengan segala macam cara dan usaha. Ayat ini menjelaskan mengenai orang-orang yang menahan amarahnya akibat faktor apa pun yang memancing kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan sangat terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah atau jahat kepadanya, karena Allah mencintai, melimpahkan rahmat-Nya tiada henti kepada orang yang berbuat kebaikan (Kementrian Agama RI,2021).

#### a. Faktor Presipitasi

Faktor-faktor yang dapat mencetuskan perilaku kekerasan sering kali berkaitan dengan (Yosep, 2019):

- 1) Ekspresi diri, ingin menunjukkan eksistensi diri atau simbol solidaritas seperti dalam sebuah konser, penonton sepak bola, geng sekolah, perkelahian masal dan sebagainya.
- 2) Ekspresi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan kondisi sosial ekonomi.
- 3) Kesulitan dalam mengkomunikasikan sesuatu dalam keluarga serta tidak membiasakan dialog untuk memecahkan masalah cenderung melalukan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

- 4) Ketidaksiapan seorang ibu dalam merawat anaknya dan ketidakmampuan dirinya sebagai seorang yang dewasa.
- 5) Adanya riwayat perilaku anti sosial meliputi penyalahgunaan obat dan alkoholisme dan tidak mampu mengontrol emosinya pada saat menghadapi rasa frustrasi.
- 6) Kematian anggota keluarga yang terpenting, kehilangan pekerjaan, perubahan tahap perkembangan, atau perubahan tahap perkembangan keluarga.

Faktor presipitasi secara umum seseorang akan marah jika dirinya merasa diancam, baik injuri fisik, psikis atau ancaman konsep diri. Factor pencetus sebagai berikut:

- 1) Pasien: Kelemahan fisik, keputusan, ketidakberdayaan, kehidupan yang penuh agresif dan masa lalu yang tidak menyenangkan.
- 2) Interaksi: penghinaan, kekerasan, kehilangan orang yang berarti, konflik, merasa terancam baik internal maupun eksternal (Putri, Arif & Renidayati, 2020).

b. Respon rentang marah

Dalam setiap orang terdapat kapasitas untuk berperilaku pasif, asertif, dan agresif/perilaku kekerasan :

- 1) Perilaku asertif merupakan perilaku individu yang mampu menyatakan atau mengungkapkan rasa marah atau tidak setuju tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain sehingga perilaku ini dapat menimbulkan kelegaan pada individu.
- 2) Frustrasi merupakan respon rentang marah seseorang yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dibandingkan asertif. Seseorang akan nampak tegang, mengurangi interaksi sosial atau lebih sering menyendiri yang biasanya ditunjukkan apabila tidak dapat menerima kenyataan ataupun gagal mencapai tujuan.

- 3) Perilaku pasif merupakan perilaku individu yang tidak mampu untuk mengungkapkan perasaan marah yang sedang dialami, dilakukan dengan tujuan menghindari suatu ancaman nyata.
- 4) Agresif/perilaku kekerasan. Merupakan hasil dari kemarahan yang sangat tinggi atau ketakutan (panik).
- 5) Stress, cemas, harga diri rendah dan rasa bersalah dapat menimbulkan kemarahan yang dapat mengarah pada perilaku kekerasan. Respon rasa marah dapat diekspresikan secara eksternal (perilaku kekerasan) maupun internal (depresi dan penyakit fisik). Sedangkan Mengekspresikan marah dengan perilaku konstruktif (positif) seperti menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti dan diterima tanpa menyakiti hati orang lain akan memberikan perasaan lega dan menurunkan ketegangan. Sedangkan perilaku destruktif (negatif) seperti menekan perasaan marah, pura-pura tidak marah atau melarikan diri dari perasaan marahnya sehingga rasa marahnya tidak terungkap. Kemarahan demikian akan menimbulkan rasa bermusuhan yang lama dan suatu saat akan menimbulkan masalah kesehatan yang ditujukan kepada diri sendiri (Deden et al, 2013).

c. Tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan

Menurut Amimi et al (2020) pada penelitiannya yang berjudul analisis tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia, menunjukkan bahwa tanda dan gejala yang sering muncul pada pasien risiko perilaku kekerasan yaitu mengepalkan tangan, bicara kasar, suara tinggi, menjerit dan berteriak. Selain itu, terdapat pula tanda dan gejala yang biasanya muncul seperti muka merah dan tegang, mata melotot,

pandangan tajam, rahang mengatup dengan kuat dan otot tegang.

d. Mekanisme Koping

Tanda dan gejala perilaku kekerasan berdasarkan standar asuhan keperawatan jiwa dengan masalah risiko perilaku kekerasan (Pardede,2020):

Subjektif :

- 1) Mengungkapkan perasaan kesal atau marah
- 2) Keinginan untuk melukai diri sendiri, orang lain dan lingkungan.
- 3) Pasien suka membentak dan menyerang orang lain.

Objektif :

- 1) Mata melotot/ pandangan tajam
- 2) Tangan mengepal dan rahang mengatup
- 3) Wajah memerah
- 4) Postur tubuh kaku
- 5) Mengancam dan mengumpat dengan kata-kata kotor
- 6) Suara keras
- 7) Bicara kasar, ketus
- 8) Menyerang orang lain dan melukai diri sendiri/ orang lain.
- 9) Merusak lingkungan
- 10) Amuk/ agresif (Volkan, 2020).

Mekanisme koping adalah tiap upaya yang diarahkan pada penatalaksanaan stress, termasuk upaya penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri (Stuart, 2014). Kemarahan merupakan ekspresi dari rasa cemas yang timbul karena adanya ancaman. Beberapa mekanisme koping yang dipakai pada pasien marah untuk melindungi diri antara lain:

- 1) Sublimasi: menerima suatu sasaran pengganti artinya saat mengalami suatu dorongan, penyaluran ke arah lain.

Misalnya seseorang yang sedang marah melampiaskan kemarahannya pada objek lain meremas adonan kue, meninju tembok dan sebagainya, tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan akibat rasa marah.

- 2) Proyeksi: menyalahkan orang lain, mengenal kesukarannya atau keinginannya yang tidak baik. Misalnya seseorang wanita muda yang menyangkal bahwa ia mempunyai perasaan seksual terhadap rekan kerjanya, berbalik menuduh bahwa temannya tersebut mencoba merayunya.
- 3) Represi: mencegah pikiran yang menyakitkan atau membahayakan masuk ke alam sadar. Misalnya seseorang anak yang sangat benci kepada orang tuanya yang tidak disukainya. Akan tetapi menurut ajaran atau didikan yang diterimanya sejak kecil, membenci orang tua merupakan hal yang tidak baik dan dikutuk oleh tuhan sehingga perasaan benci itu ditekannya dan akhirnya ia dapat melupakannya.
- 4) Reaksi formasi: mencegah keinginan yang berbahaya bisa diekspresikan dengan berlebih-lebihan sikap dan perilaku yang berlawanan dan menggunakannya sebagai rintangan. Misalnya seorang yang tertarik pada teman-teman suaminya, akan memperlakukan orang tersebut dengan kasar.
- 5) *Displacemen*: melepaskan perasaan yang tertekan, melampiaskan pada objek yang tidak begitu berbahaya seperti yang pada mulanya yang membangkitkan emosi itu. Misalnya Timmy berusia 4 tahun yang marah karena ia baru saja mendapat hukuman dari ibunya karena menggambar di dinding kamarnya, mulai bermain perang-perangan dengan temantemannya (Muhith, 2015).

### 3. Manifestasi Klinis

Yosep (2009) mengemukakan bahwa tanda dan gejala perilaku kekerasan adalah sebagai berikut:

#### a. Fisik

- 1) Muka merah dan tegang
- 2) Mata melotot/ pandangan tajam
- 3) Tangan mengepal
- 4) Rahang mengatup
- 5) Postur tubuh kaku
- 6) Jalan mondar-mandir

#### b. Verbal

- 1) Bicara kasar
- 2) Suara tinggi, membentak atau berteriak
- 3) Mengancam secara verbal atau fisik
- 4) Mengumpat dengan kata-kata kotor
- 5) Suara keras
- 6) Ketus

#### c. Perilaku

- 1) Melempar atau memukul benda/orang lain
- 2) Menyerang orang lain
- 3) Melukai diri sendiri/orang lain
- 4) Merusak lingkungan
- 5) Amuk/agresif
- 6) Emosi

Tidak adekuat, tidak aman dan nyaman, rasa terganggu, dendam dan jengkel, tidak berdaya, bermusuhan, mengamuk, ingin berkelahi, menyalahkan dan menuntut.

#### 7) Intelektual

Mendominasi, cerewet, kasar, berdebat, meremehkan, sarkasme.

#### 8) Spiritual

Merasa diri berkuasa, merasa diri benar, mengkritik pendapat orang lain, menyinggung perasaan orang lain, tidak peduli dan kasar.

9) Sosial

Menarik diri, pengasingan, penolakan, kekerasan, ejekan, sindiran.

10) Perhatian

Bolos, mencuri, melarikan diri, penyimpangan seksual.

#### **4. Penatalaksanaan**

Penatalaksanaan perilaku kekerasan bisa juga dengan melakukan terapi restrain. Restrain adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada individu, tanpa injin individu tersebut, untuk mengatasi kebebasan gerak, terapi ini melibatkan penggunaan alat mekanis atau manual untuk membatasi mobilitas fisik pasien. Terapi restrain dapat diindikasikan untuk melindungi pasien atau orang lain dari cedera pada saat pasien lagi marah ataupun amuk (Hastuti, Agustina, & Widiyatmoko 2019). Tindakan yang dilakukan perawat untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan yaitu melakukan Strategi Pelaksanaan (SP) yang dilakukan oleh pasien dengan perilaku kekerasan adalah diskusi mengenai cara mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, obat, verbal, dan spiritual. Mengontrol perilaku kekerasan secara fisik dapat dilakukan dengan cara latihan tarik nafas dalam, dan pukul kasur atau bantal. Mengontrol secara verbal yaitu dengan cara menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapka dengan baik. Mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual dengan cara shalat dan berdoa. Serta mengontrol perilaku kekerasan dengan minum obat secara teratur dengan prinsip lima benar (benar pasien, benar nama obat, benar cara minum obat, benar waktu minum obat, dan benar dosis obat), (Sujarwo & Livana, 2018).

Penatalaksanaan untuk pasien yang mengalami skizofrenia dengan masalah risiko perilaku kekerasan, ada 2 yaitu:

a. Psikofarmakologi

Penggunaan obat-obatan untuk gangguan jiwa berkembang dari penemuan neurobiologi. Obat-obatan tersebut memengaruhi sistem saraf pusat (SSP) secara langsung dan selanjutnya memengaruhi perilaku, persepsi, pemikiran, dan emosi (Videbeck, 2001). Menurut (Stuart dan Laraia, 2005), beberapa kategori obat yang digunakan untuk mengatasi perilaku kekerasan adalah sebagai berikut :

- 1) *Antianxiety* dan *Sedative Hipnotics*: Obat-obatan ini dapat mengendalikan agitasi yang akut. Benzodiazepines seperti Lorazepam dan Clonazepam, sering digunakan didalam kedaruratan psikiatrik untuk menenangkan perlawanan pasien. Tapi obat ini direkomendasikan untuk dalam waktu lama karena dapat menyebabkan kebingungan dan ketergantungan, juga bisa memperburuk gejala depresi. Selanjutnya pada beberapa pasien yang mengalami disinhibiting effect dari Benzodiazepines dapat mengakibatkan peningkatan perilaku agresif. Buspirone obat *Antianxiety*, efektif dalam mengendalikan perilaku kekerasan yang berkaitan dengan kecemasan dan depresi. Ini ditunjukkan dengan menurunnya perilaku agresif dan agitasi pasien dengan cedera kepala, demensia dan '*developmental disability*'
- 2) *Antidepressant* : Penggunaan obat ini mampu mengontrol impulsif dan perilaku agresif pasien yang berkaitan dengan perubahan mood. Amitriptyline dan Trazodone, efektif untuk menghilangkan agresivitas yang berhubungan dengan cedera kepala dan gangguan mental organik (Keliat, dkk., 2005).

e. Psikoterapi

Terapi kesehatan jiwa telah dipengaruhi oleh perubahan terkini dalam perawatan kesehatan dan pemulihan, seperti pada semua area kedokteran, keperawatan, dan disiplin ilmu kesehatan terkait. Bagian ini secara singkat menjelaskan modalitas terapi yang saat

ini digunakan baik pada lingkungan, rawat inap, maupun rawat jalan (Videbeck, 2001).

#### 1) Terapi lingkungan

Begitu pentingnya bagi perawat untuk mempertimbangkan lingkungan bagi semua pasien ketika mencoba mengurangi atau menghilangkan agresif. Aktivitas atau kelompok yang direncanakan seperti permainan kartu, menonton dan mendiskusikan sebuah film, atau diskusi informal memberikan pasien kesempatan untuk membicarakan peristiwa atau isu ketika pasien tenang. Aktivitas juga melibatkan pasien dalam proses terapeutik dan meminimalkan kebosanan.

Penjadwalan interaksi satu-satu dengan pasien menunjukkan perhatian perawat yang tulus terhadap pasien dan kesiapan untuk mendengarkan masalah, pikiran, serta perasaan pasien. Mengetahui apa yang diharapkan dapat meningkatkan rasa aman pasien (Videbeck, 2001, hlm. 259).

#### 2) Terapi Kelompok

Pada terapi kelompok, pasien berpartisipasi dalam sesi bersama kelompok individu. Para anggota kelompok bertujuan sama dan diharapkan memberi kontribusi kepada kelompok untuk membantu yang lain dan juga mendapat bantuan dari yang lain. Peraturan kelompok ditetapkan dan harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok. Dengan menjadi anggota kelompok pasien dapat mempelajari cara baru memandang masalah atau cara coping atau menyelesaikan masalah dan juga membantunya mempelajari keterampilan interpersonal yang penting (Videbeck, 2001, hlm. 70).

#### 3) Terapi keluarga

Terapi keluarga adalah bentuk terapi kelompok yang mengikutsertakan pasien dan anggota keluarganya. Tujuannya ialah memahami bagaimana dinamika keluarga memengaruhi

psikopatologi pasien, memobilisasi kekuatan dan sumber fungsional keluarga, merestrukturisasi gaya perilaku keluarga yang maladaptif, dan menguatkan perilaku penyelesaian masalah keluarga (Steinglass, 1995 dalam Videbeck, 2001, hlm. 71).

#### 4) Terapi individual

Psikoterapi individu adalah metode yang menimbulkan perubahan pada individu dengan cara mengkaji perasaan, sikap, cara pikir, dan perilakunya. Terapi ini memiliki hubungan personal antara ahli terapi dan pasien. Tujuan dari terapi individu yaitu, memahami diri dan perilaku mereka sendiri, membuat hubungan personal, memperbaiki hubungan interpersonal, atau berusaha lepas dari sakit hati atau ketidakbahagiaan (Wuryaningsih et al., 2020). Hubungan antara pasien dan ahli terapi terbina melalui tahap yang sama dengan tahap hubungan perawat-pasien: introduksi, kerja, dan terminasi. Upaya pengendalian biaya yang ditetapkan oleh organisasi pemeliharaan kesehatan dan lembaga asuransi lain mendorong upaya mempercepat pasien ke fase kerja sehingga memperoleh manfaat maksimal yang mungkin dari terapi (Videbeck, 2001, hlm. 69)

## **B. Konsep Asuhan Keperawatan**

### **1. Pengkajian**

#### a. Identitas

Riwayat ketidakjelasan nama atau identitas serta pendidikan yang rendah, atau riwayat putus sekolah yang mengakibatkan perkembangan kurang efektif. Status sosial tuna wisma, kehidupan terisolasi (kehilangan kontak sosial, misal pada lansia). Agama dan keyakinan pasien tidak bisa menjelaskan aktivitas keagamaan secara rutin (Mellia Trisyani Putri, 2020).

b. Alasan masuk

Biasanya pasien masuk dengan alasan sering mengamuk tanpa sebab, memukul, membanting, mengancam, menyerang orang lain, melukai diri sendiri, mengganggu lingkungan, bersifat kasar dan pernah mengalami gangguan jiwa dimasa lalu kambuh karena tidak mau minum obat secara teratur (Keliat,2016).

c. Faktor predisposisi

- 1) Biasanya pasien pernah mengalami gangguan jiwa pada masa lalu dan pernah dirawat atau baru pertama kali mengalami gangguan jiwa (Parwati, Dewi & Saputra 2018).
- 2) Biasanya pasien berobat untuk pertama kalinya kedukun sebagai alternative serta memasing dan bila tidak berhasil baru di bawa kerumah sakit jiwa.
- 3) Trauma, Biasanya pasien pernah mengalami atau menyaksikan penganiayaan fisik, seksual, penolakan, dari lingkungan.
- 4) Biasanya ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, kalau ada hubungan dengan keluarga, gejala, pengobatan dan perawatan.
- 5) Biasanya pasien pernah mengalami pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan misalnya, perasaan ditolak, dihina, dianiaya, penolakan dari lingkungan

d. Pengkajian fisik

- 1) Ukur dan observasi tanda-tanda vital seperti tekanan darah akan bertambah naik, nadi cepat, suhu, pernapasan terlihat cepat.
- 2) Ukur tinggi badan dan berat badan.

e. Psikososial

- 1) Genogram Genogram dibuat 3 generasi keatas yang dapat menggambarkan hubungan pasien dengan keluarga. Tiga

generasi ini dimaksud jangkauan yang mudah diingat oleh pasien maupun keluarga apa disaat pengkajian.

- 2) Konsep diri Biasanya ada anggota tubuh pasien yang tidak disukai pasien yang mempengaruhi keadaan pasien saat berhubungan dengan orang lain sehingga pasien merasa terhina, diejek dengan kondisinya tersebut.
- 3) Identitas Biasanya pada pasien dengan perilaku kekerasan tidak puas dengan pekerjaannya, tidak puas dengan statusnya, baik disekolah, tempat kerja dan dalam lingkungan tempat tinggal
- 4) Harga diri Biasanya pasien dengan risiko perilaku kekerasan hubungan dengan orang lain akan terlihat baik, harmoni sata terdapat penolakan atau pasien merasa tidak berharga, dihina, diejek dalam lingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga.
- 5) Peran diri Biasanya pasien memiliki masalah dengan peranatau tugas yang diembannya dalam keluarga, kelompok atau masyarakat dan biasanya pasien tidak mampu melaksanakan tugas dan peran tersebut dan merasa tidak berguna.
- 6) Ideal diri Biasanya pasien memilki harapan yang tinggi terhadap tubuh, posisi dan perannya baik dalam keluarga, sekolah, tempat kerja dan masyarakat.

f. Hubungan sosial

- 1) Orang yang berarti Tempat mengadu, berbicara
- 2) Kegiatan yang diikuti pasien dalam masyarakat dan apakah pasien berperan aktif dalam kelompok tersebut
- 3) Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain/tingkat keterlibatan pasien dalam hubungan masyarakat.

g. Spiritual

- 1) Nilai dan keyakinan Biasanya pasien mengatakan bahwa dia tidak mengalami gangguan jiwa.
- 2) Kegiatan ibadah
- 3) Biasanya dalam selama sakit pasien jarang melakukan ibadah.

h. Status mental

- 1) Penampilan
- 2) Biasanya penampilan pasien kotor
- 3) Pembicaraan
- 4) Biasanya pada pasien perilaku kekerasan pada saat dilakukan pengkajian bicara cepat, keras, kasar, nada tinggi dan mudah tersinggung.
- 5) Aktifitas motoric  
Biasanya aktivitas motorik pasien dengan perilaku kekerasan akan terlihat tegang, gelisah, gerakan otot muka berubah-ubah, gemetar, tangan mengempal, dan rahang dengan kuat
- 6) Efek  
Biasanya pasien mudah tersinggung dan sering marah-marah tanpa sebab.
- 7) Alam perasaan  
Biasanya akan merasa sedih dan menyesali apa yang telah dilakukan.
- 8) Interaksi selama wawancara  
Biasanya pasien dengan risiko perilaku kekerasan akan terlihat bermusuhan, curiga, tidak kooperatif, tidak mau menatap lawan bicara dan mudah tersinggung.
- 9) Persepsi  
Biasanya pasien dengan perilaku kekerasan masih dapat menjawab pertanyaan dengan jelas.
- 10) Isi pikir

Biasanya pasien meyakini dirinya tidak sakit, dan baikbaik saja.

11) Tingkat kesadaran

Biasanya pasien perilaku kekerasan kadang tampak bingung,

12) Memori

Biasanya pasien diwaktu wawancara dapat mengingat kejadian yang terjadi dan mengalami gangguan daya ingat jangka panjang.

13) Kemampuan penilaian

Biasanya pasien mengalami kemampuan penilaian ringan dan sedang dan tidak mampu mengambil keputusan

14) Daya fikir diri

Biasanya pasien mengingkari penyakit yang dideritanya

i. Kebutuhan persiapan pulang

1) Makan

Biasanya pasien tidak mengalami perubahan

2) BAB/BAK

Biasanya pasien dengan risiko perilaku kekerasan tidak ada gangguan

3) Mandi

Biasanya pasien jarang mandi, tidak menyikat gigi, jarang mencuci rambut dan bercukur atau berhias. Badan pasien sangat bau dan kotor, dan pasien hanya melakukan kebersihan diri jika disuruh.

4) Berpakaian

Biasanya pasien jarang mengganti pakaian, dan tidak mau berdandan. Pasien tidak mampu mengenakan pakaian dengan sesuai dan pasien tidak mengenakan alas kaki

5) Istirahat dan tidur

Biasanya pasien tidak melakukan persiapan sebelum tidur, seperti: menyikat gigi, cucu kaki, berdoa. Dan sesudah tidur

seperti: merapikan tempat tidur, mandi atau cuci muka dan menyikat gigi. Frekuensi tidur pasien berubah-ubah, kadang nyenyak dan kadang gaduh atau tidak tidur.

6) Penggunaan obat

Biasanya pasien mengatakan minum obat 3 kali sehari dan pasien tidak mengetahui fungsi obat dan akibat jika putus minum obat.

7) Pemeliharaan kesehatan Biasanya pasien tidak memperhatikan kesehatannya, dan tidak peduli tentang bagaimana cara yang baik untuk merawat dirinya.

8) Aktifitas didalam rumah Biasanya pasien mampu merencanakan, mengolah, dan menyajikan makanan, merapikan rumah, mencuci pakaian sendiri dan mengatur biaya sehari-hari.

j. Mekanisme koping

Biasanya pasien menggunakan respon maldaptif yang ditandai dengan tingkah laku yang tidak terorganisir, marah-marah bila keinginannya tidak terpenuhi, memukul anggota keluarganya, dan merusak alat-alat yg ada dirumah.

k. Masalah psikologis dan lingkungan

Biasanya pasien merasa ditolak dan mengalami masalah interaksi dengan lingkungan

l. Pengetahuan

Biasanya pasien dengan perilaku kekerasan kurang pengetahuan tentang penyakitnya, dan pasien tidak mengetahui akibat dari putus obat dan fungsi dari obat yang diminumnya.

Menurut (Keliat at al, 2014) data perilaku kekerasan dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara tentang perilaku berikut ini:

- a. Wajah merah dan tegang
- b. Pandangan tajam

- c. Mengarupkan rahang dengan kuat
- d. Mengepalkan tangan
- e. Jalan mondar-mandir
- f. Bicara kasar
- g. Suara tinggi, menjerit atau berteriak
- h. Mengancam atau memukul benda/orang lain
- i. Merusak barang atau benda
- j. Tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah atau mengontrol perilaku kekerasan.

## 2. Diagnosis Keperawatan

Menurut Keliat (2014) daftar masalah yang mungkin muncul pada perilaku kekerasan yaitu :

- a. Perilaku kekerasan
- b. Risiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan
- c. Perubahan persepsi sensori: halusinasi
- d. Harga diri rendah kronis
- e. Berduka disfungsi
- f. Penatalaksanaan regimen terapeutik tidak efektif
- g. Koping keluarga tidak efektif

## 3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan disesuaikan dengan diagnosa keperawatan yang muncul setelah melakukan pengkajian dan rencana keperawatan dilihat pada tujuan khusus sebagai berikut:

No.	Tindakan Keperawatan	Tindakan Keperawatan Keluarga
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendiskusikan penyebab marah/kekerasan pasien</li> <li>2. Mendiskusikan tanda dan gejala marah/kekerasan</li> <li>3. Mendiskusikan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan pada saat marah (verbal, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan lingkungan)</li> <li>4. Mendiskusikan akibat perilakunya</li> <li>5. Melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik: tarik nafas dalam, pukul kasur/bantal, kegiatan fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kemampuan keluarga dalam merawat pasien</li> <li>2. Menjelaskan peran serta keluarga dalam merawat pasien</li> <li>3. Menjelaskan cara merawat pasien RPK</li> </ul>

	6. Memasukkan ke jadwal kegiatan harian	
2.	1. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian dalam mengontrol PK secara fisik 2. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur dalam mengontrol perilaku marah 3. Menganjurkan pasien memasukkan ke jadwal kegiatan harian	1. Melatih keluarga merawat pasien dengan RPK 2. Menjelaskan tentang obat Untuk mengatasi RPK
3.	1. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian mencegah Pk dengan patuh minum obat 2. Melatih cara social Untuk mengekspresikan marah: (bicara yang baik: meminta, menolak dan mengungkapkan rasa marahnya kepada sumber) 3. Menganjurkan memasukkan ke jadwal kegiatan harian	1. Menjelaskan sumber rujukan yang tersedia untuk mengatasi anak PK 2. Mendorong untuk memanfaatkan sumber rujukan yang tersedia
4.	1. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian mencegah PK dengan cara spiritual 2. Melatih De-enskalasi: curhat, tulis 3. Menganjurkan memasukkan ke jadwal kegiatan harian	
5.	1. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian mencegah PK dengan De-enskalasi 2. Melatih cara spiritual Untuk mencegah PK 3. Menganjurkan memasukkan ke jadwal kegiatan harian	

### C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Teori keperawatan dengan model stress yang diadaptasi oleh Roy, yang memandang keperawatan adalah ilmu yang berperan dalam meningkatkan adaptasi individu dan kelompok terhadap kesehatan sehingga sikap yang muncul positif. Keperawatan memberi perbaikan pada manusia sebagai satu kesatuan yang utuh untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan dan berespons terhadap stimulus internal yang mempengaruhi adaptasi. Jika ada stressor dan individu tidak dapat menggunakan koping secara efektif, maka individu tersebut memerlukan perawatan. Tujuan keperawatan adalah meningkatkan interaksi individu dengan lingkungan, sehingga adapasi dalam setiap aspek semakin meningkat. Komponen-komponen adaptasi mencakup fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan saling ketergantungan.

Adaptasi adalah komponen pusat dalam model keperawatan. Didalamnya menggambarkan manusia sebagai sistem adaptif. Adaptasi menggambarkan proses koping terhadap stressor dan produk akhir dari koping. Proses adaptasi termasuk fungsi holistik bertujuan untuk mempengaruhi kesehatan secara positif yang pada akhirnya akan meningkatkan intergritas. Proses adaptasi termasuk didalamnya proses interaksi manusia dengan lingkungan yang terdiri dari dua proses. Bagian pertama dari proses ini dimulai dengan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal yang membutuhkan sebuah respon.

Perubahan tersebut dalam model adaptasi Roy digambarkan sebagai stressor atau stimulus fokal dan ditengahi oleh faktor-faktor konstektual dan residual.

Stressor menghasilkan interaksi yang biasanya disebut stress. Bagian kedua adalah mekanisme koping yang dirangsang untuk menghasilkan respon adaptif dan efektif. Produk adaptasi adalah hasil dari proses adaptasi dan digambarkan dalam istilah kondisi yang meningkatkan tujuan-tujuan manusia yang meliputi: kelangsungan hidup, pertumbuhan, reproduksi dan penguasaan yang disebut intergritas. Kondisi akhir ini adalah kondisi keseimbangandinamik equilibrium yang meliputi peningkatan dan penurunan respon-respon. Setiap kondisi adaptasi baru di pengaruhi oleh adaptasi yang lain, sehingga dinamika equilibrium manusia berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jarak yang besar dari stimulus dapat di sepakati dengan suksesnya manusia sebagai sistem adaptif. Jadi peningkatan adaptasi mengarah pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi pada keadaan sejahtera atau sehat. Adaptasi kemudia disebut sebagaisuatu fungsi dari stimuli yang masuk dan tingkatan adaptasi.

Tahun 1964, Roy kemudian mengembangkan model adaptasi keperawatan yang diyakini berupa:

- a. Individu merupakan makhluk biologis, psikologis dan sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh.
- b. Setiap individu akan berespon terhadap kebutuhan fisiologis, tingkat kemandirian, konsep diri yang positif serta kemampuan secara optimal dalam melakukan peran ataupun fungsi dalam memelihara integritas diri.
- c. Individu akan berada dalam rentang sehat-sakit yang berkaitan dengan keefektifan coping dalam mempertahankan kemampuan adaptasi.
- d. Setiap individu selalu menggunakan coping, baik bersifat positif maupun negative agar bisa beradaptasi.

Roy berpendapat respons yang dapat menimbulkan penurunan integritas tubuh dapat menyebabkan sejumlah kebutuhan bagi individu. Respon atau perilaku adaptasi individu dipengaruhi oleh stimulus yang masuk dan tingkat/kemampuan adaptasi setiap individu dengan tingkattersebut ditentukan oleh tiga hal yaitu masukan (*input*), kontrol dan keluaran (*output*). Tipe teori keperawatan Roy yaitu terpusat pada keterikatan, *out come* dan timbal balik.

Konsep Roy tentang manusia berupa individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat luas yang masing-masing merupakan sebuah sistem adaptasi holistik. Roy memiliki pandangan terhadap manusia secara holistik yakni merupakan suatu kesatuan yang hidup secara konstan serta berinteraksi dengan lingkungannya.

#### ***D. Evidence Based Practice in Nursing***

##### **1. Pengertian**

Secara bahasa, dzikir yaitu *dzakara-yadzkurudzikrun wa dzukrun*, berarti mengingat, memperhatikan, mengenang, ingatan.

Kata ingat ini sangat dalam, karena salah satu fungsi pikiran yang jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Secara istilah, dzikir yaitu ingatan atau latihan-latihan spiritual untuk menyatakan kehadiran tuhan dengan membayangkan-Nya.

Dzikir secara Islami, ialah suatu perlakuan dan pengobatan yang ditujukan kepada kesembuhan *mental ilnees*, individu dengan kekuatan batin atau rohani, seperti: ritual keagamaan tanpa penggunaan obat-obatan, berfungsi untuk memperkuat iman seseorang agar ia dapat mengembangkan potensi diri dan fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal. Seperti melakukan shalat wajib, berdoa dan berzikir dari perbuatan tersebut dapat membuat hidup selaras, seimbang dan sesuai dengan ajaran agama (Yusuf, 2016).

Menurut Hasbi Ash-Syiddieqy dzikir merupakan menyebut nama Allah seraya membaca tasbih (*Subhanallah*), tahlil (*La illallah*), tahmid (*Alhamdulillah*), takbir (*Allahu Akbar*), hauqalah (*la haula wala quwwata illa billahi*), hasbullah (*hasbiyallahu*), basmallah (*bismillahirrahmanirrahim*), membaca Al quran, asmaul husna, sholawat dan mengucapkan doa-doa yang ma'tsur. Terapi dzikir mengingat Allah yang bertujuan untuk memfokuskan pikiran. Dengan bacaan do'a dan dzikir orang akan menyerahkan segala permasalahan kepada Allah, sehingga beban stress mengalami penurunan. (Fanada, 2012 dikutip Indri W, 2014).

Pada kitab Al-Hikam, dzikir ialah jalan menuju fana' dan makrifat kepada Allah, maka tiap masuk dan keluarnya nafas kita senantiasa berdzikir di jalan yang dekat menuju Allah SWT. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dzikir adalah mengingat dengan perbuatan baik dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yang dimana Allah akan menambah selalu rahmat dan nikmat-Nya kepada makhluknya. Di dalam Tafsir Al-Qurtuby menerangkan dzikir itu sebagai pengingat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjahui apa yang dilarangkan-Nya (Niko, 2018).

Peneliti menyimpulkan dzikir dalam penelitian ini yaitu sebagai ucapan yang jahar (jelas) yakni dengan mengucapkan taasbih, tahlil, tahmid, takbir, hauqalah, hasbullah, basmallah serta membaca Al quran dan doa-doa yang ma'tsur.

## **2. Tujuan**

Pemberian terapi dzikir bertujuan untuk menstabilkan perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir, dengan mengucapkan dzikir dapat membuat hati menjadi tenang dan rileks, mendengarkan Al-qur'an dapat mengurangi hormon-hormon stres, menghasilkan hormon endorfin, memberikan perasaan santai dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, dan tegang, juga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung denyut nadi dan aktivitas gelombang otak. Pernapasan terkontrol menghadirkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik.

- a. Memberikan ketenangan dan kebahagiaan jiwa.
- b. Dapat menghilangkan tipu daya setan.
- c. Menangkan dan menghilangkan kegelisahan, serta ketenangan.
- d. Memberikan kuatnya jiwa dan raga
- e. Mempermudah rezeki
- f. Memunculkan sikap muraqabah (merasa diawasi Allah),
- g. Menjadikannya penerang pikiran atas datangnya petunjuk dari Allah.

## **E. Indikasi**

- a) Pasien beragama islam
- b) Pasien yang menderita skizofrenia
- c) Pasien yang pernah melakukan perilaku kekerasan
- d) Pasien dengan kecemasan
- e) Pasien yang memiliki masalah koping (Samain & Budihardjo, 2020).

## **F. Kontraindikasi**

- a) Pasien non-muslim

## **G. Prosedur Pemberian dan rasionalisasi**

- a. Berikan kesempatan pasien bertanya

Rasional: Untuk menghindari kesalahpahaman antara pasien dan perawat.

- b. Menanyakan keluhan utama pasien

Rasional: Mengetahui keadaan pasien sebelum dan sesudah terapi.

- c. Jaga privasi pasien

Rasional: Memberikan kenyamanan

- d. Bantu pasien untuk memilih posisi yang nyaman

Rasional: Agar pemberian intervensi menjadi lebih efektif dengan perasaan yang rileks dan nyaman

- e. Memulai dengan membaca basmalah

Rasional: Agar diridhai Allah SWT

- f. Membatasi stimulasi luar yang mengganggu proses pemberian terapi.

Rasional: pasien dapat fokus menjalankan proses terapi tanpa terdistraksi.

- g. Menetapkan perubahan pada perilaku dan/atau fisiologi yang diinginkan seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi, dan mengurangi rasa sakit.

Rasional: menetapkan intervensi selanjutnya dan bahkan evaluasi Tindakan yang diberikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indri, W (2014), SOP terapi dzikir yaitu:

- a. Memposisikan tubuh dengan nyaman duduk, boleh diatas lantai secara bersila atau di atas kursi.
- b. Menenangkan diri sampai nyaman.
- c. Memulai dengan menyebut kata dan kalimat secara perlahan

- d. Bernapas secara alami kemudian mengucapkan kalimat (*Bismillahirrahmanirrahim*) sebanyak 3 kali. *Astaghfirullaahaladhim* (Saya mohon ampun kepada allah yang maha besar) sebanyak 3 kali, *Subhanallah* (maha suci allah) 33 kali, *Alhamdulillah* 3x, *Allahuakbar* 33x. Bacaan tersebut diucapkan secara berulang-ulang pada pagi (08.00), sore (16.00).
- e. Menyingkirkan pikiran yg mengganggu, tetap fokuskan pikiran.
- f. Terapi dilaksanakan selama 10 menit.  
Ketika selesai, dianjurkan duduk dan beristirahat, kemudian buka pikiran, setelah itu dapat melakukan kegiatan kembali

#### H. Kriteria evaluasi

- a) Mengkaji proses dan hasil dari terapi spiritual menggunakan catatan aktivitas terapi yang telah dilakukan
- b) Menganalisis sesi tindakan keperawatan yang telah dilakukan untuk melihat keefektifan terapi.
- c) Menganalisis hasil catatan, serta tanda dan gejala perilaku kekerasan sehingga perawat dapat mengetahui progress teknik yang dilakukan pasien (Indri W,2014).

#### I. Artikel utama dan pendukung

Tabel 1.1 Artikel Utama dan Pendukung

Penulis	Tahun	Judul	Sumber
Ernawati, Samsualam, Suhermi	2020	Pengaruh pelaksanaan terapi spiritual terhadap kemampuan pasien mengontrol perilaku kekerasan	Jurnal Kesehatan, Vol.3 No.1 – <i>Google Scholars</i>
Nur Cahyo Sasongko, Eni Hidayati	2020	Penerapan terapi musik, dzikir dan rational emotive cognitive behavior therapy pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan	Jurnal Ners Muda/ <i>Google Scholars</i>
Jocelyn R. Smith Lee, Andrea G. Hunter, Fernanda Priolli, Veronica J. Thornton	2020	“ <i>Pray that I live to see another day</i> ”: <i>Religious and spiritual coping with vulnerability to violent injury, violent death, and homicide</i>	<i>Journal of Applied Developmental Psychology/ Science Direct</i>

		<i>bereavement among young Black men</i>	
Arif Munandar, Kellyana Irawati, Yoni Prianto	2019	Terapi Psikoreligius Dzikir Menggunakan Jari Tangan Kanan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Vol. 10 No. 1 Juli 2019/ <i>Google Scholars</i>
Is Susilaningih, Evi cahya ningih	2021	Penerapan terapi psikoreligius terhadap perilaku kekerasan	Jurnal Keperawatan/ <i>Google Scholars</i>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Studi Kasus**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nursalam (2016) studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh pasien dengan sistematis.

#### **B. Subyek Studi Kasus**

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu atau pasien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

- 1) Kriteria inklusi
  - a) Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Khusus Dadi Sulawesi Selatan
  - b) Pasien yang bersiap menjadi pasien binaan
  - c) Pasien yang bisa diajak komunikasi dengan kooperatif.
  - d) Pasien yang pernah melakukan perilaku kekerasan dan berisiko perilaku kekerasan
  - e) Pasien beragama Islam
- 2) Kriteria Eksklusi
  - a) Individu atau pasien yang belum stabil
  - b) Individu atau pasien yang tidak dapat dikaji
  - c) Individu atau pasien non-muslim

#### **C. Fokus Studi Kasus**

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien atau individu dengan masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan dengan menggunakan intervensi psikoreligi dzikir. Pemberian terapi psikoreligius dzikir ini diberikan kepada Tn.S selama 6 hari dengan

durasi waktu 15 menit dan diulang selama 3 kali sehari pada waktu pagi (08.00), siang (13.00).

#### **D. Instrumen Studi Kasus**

Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan Jiwa, dan lembar checklist tanda dan gejala perilaku kekerasan.

#### **E. Prosedur Pengambilan Data**

Prosedur penelitian ini berisi tentang uraian proses dalam melakukan studi kasus yang terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

##### 1. Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus, pencarian literatur.

##### 2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan pengumpulan data base melalui internet.

##### 3. Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah sesuai panduan karya tulis akhir profesi ners UIN Alauddin Makassar Tahun 2022

#### **F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus**

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Februari 2022 – 16 Februari 2022.

#### **G. Analisis Data dan Penyajian Data**

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi dan evaluasi keperawatan, pengolahan data yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian memasukan data yang telah didapatkan kedalam tabel analisa data dan kemudian dilakukan kategorisasi data untuk menentukan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian terapi dzikir pada pasien, penyajian data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta menggambarkan bagaimana hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

#### **H. Etika Studi Kasus**

Setiap penelitian kesehatan yang mengikuti sertakan relawan manusia sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik (kaidah dasar moral), yaitu

1. *respect for persons* (others): secara mendasar bertujuan menghormati otonomi untuk mengambil keputusan mandiri (*self determination*) dan melindungi kelompokkelompok *dependent* (tergantung) atau rentan (*vulnerable*), dari penyalahgunaan (*harm* dan *abuse*).
2. *Beneficence & Non Maleficence*: prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko yang minimal, sebagai contoh kalau ada risiko harus yang wajar (*reasonable*), dengan desain penelitian yang ilmiah, peneliti ada kemampuan melaksanakan dengan baik, diikuti prinsip *do no harm* (tidak merugikan, *non maleficence*).
3. Prinsip etika keadilan (*Justice*): prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya menyangkut keadilan distributif dan pembagian yang seimbang (*equitable*). Jangan sampai terjadi kelompokkelompok yang rentan mendapatkan problem yang tidak adil. Sponsor dan peneliti umumnya tidak bertanggung jawab atas perlakuan yang kurang adil ini.

## **BAB IV**

### **LAPORAN KASUS**

#### **A. Asuhan Keperawatan**

##### **1. Pengkajian Keperawatan**

RUANG RAWAT : Ruang Sawit  
TANGGAL DIRAWAT : 24 Januari 2022

#### **I. IDENTITAS PASIEN**

Inisial : Tn. S (L)  
Tanggal pengkajian : 7 Februari 2022  
Umur : 43 Tahun  
RM No. : 076470  
Informan : Pasien Sendiri

#### **II. ALASAN MASUK**

---

Pasien mengatakan masuk di RSKD Dadi diantar oleh kakak dan polisi dengan keadaan tangan diborgol. Pasien mengatakan sebelum ia dibawa ke RSKD Dadi, ia sering beradu mulut, mengamuk dan memukul kakaknya. Pasien mengatakan ia pernah melempar rumahnya sendiri menggunakan batu karena selalu dipaksa untuk bekerja. Selain itu, pasien mengatakan pernah juga memukul tetangganya karena merasa tetangganya tersebut suka mengolok-oloknya dan mengatakan ia gila.

Pasien mengatakan, ini merupakan kali ke lima ia masuk di RSKD Dadi dengan penyebab yang sama.

Berdasarkan dari pengkajian awal di buku status, pasien memiliki riwayat putus obat selama 2 minggu sebelum dibawa ke RSKD Dadi.

Keluarganya juga mengatakan pasien sering berbicara sendiri dan berjalan sendiri tanpa tujuan yang jelas.

### KONDISI SAAT INI

Pasien tampak tenang. Pasien pada saat dikaji mengenai keluhan fisik ia mengatakan tidak ada masalah atau tidak merasakan sakit pada tubuhnya. Pada saat berbicara juga pasien tampak spontan dan lancar.

### III. FAKTOR PREDISPOSISI

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu?

Ya  Tidak

2. Pengobatan sebelumnya

Berhasil  Kurang berhasil  Tidak berhasil

3.

	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Aniaya fisik	<input checked="" type="checkbox"/> 42	<input checked="" type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aniaya seksual	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Penolakan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Kekerasan dalam keluarga	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tindakan Kriminal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Jelaskan No. 1, 2, 3 :

- 1) Pasien mengatakan ini merupakan kali ke- 5 ia masuk ke RSKD Dadi
- 2) Pasien mengatakan ia kembali memukul kakaknya sehingga ia dibawa masuk ke rskd Dadi kembali
- 3) Pasien mengatakan ia memukul kakaknya terakhir pada akhir tahun 2021

**Masalah Keperawatan : Risiko Perilaku Kekerasan**

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

Ya  Tidak

Hubungan keluarga    Gejala    Riwayat pengobatan/perawatan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah**

5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan :

Pasien mengatakan ia pernah ditinggal menikah oleh pacarnya yang telah lama ia menjalin hubungan dengannya

**Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah**

#### IV. FISIK

1. Tanda vital : TD: 120/ 80 , N: 98x/ menit , S: 36,7 C, P: 22X / menit

2. Ukur : TB: 160 cm, BB: 70 Kg


3. Keluhan fisik :  Ya  Tidak

Jelaskan : Tidak ada masalah

**Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah**

#### V. PSIKOSOSIAL

1. Genogram :



Keterangan :

- : Laki - Laki
- : Perempuan
- : Laki – laki meninggal dunia
- : Perempuan meninggal dunia
- : Pasien
- : Garis pernikahan / garis persaudaraan
- : Garis serumah

Jelaskan :

G1 : Pasien mengatakan kakek dan neneknya sudah kama meninggal dunia oleh sebab yang tidak diketahui.

G2 : pasien mengatakan bahwa ayah nya telah meninggal dunia dikarenakan

G3 : pasien mengatakan ia adalah anak ke-5 dari 9 bersaudara. Ia tinggal Bersama adik dan ibunya. Pola asuh pasien dahulu menurutnya cukup baik. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah ibunya. Kakak dan adik-adiknya telah menikah semua, hanya pasien yang belum menikah.

**Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah**

2. Konsep diri

- a. Gambaran diri : Pasien mengatakan ia menyukai semua anggota tubuhnya
- b. Identitas : Pasien mengetahui dirinya sebagai seorang anak, dan dahulu sebelum masuk RSKD Dadi ia bekerja sebagai photographer dan mempunyai studio rumahnya.
- c. Peran : Pasien adalah seorang anak

- d. Ideal diri : pasien mengatakan sangat ingin kembali kerumah dan bertemu dengan keluarganya. Ia juga ingin kembali berkumpul dengan keluarganya
- e. Harga diri : pasien mengatakan hubungannya dengan saudara-saudaranya kurang baik, karena ia selalu dipaksa untuk bekerja oleh kakaknya.

Pasien mengatakan ia merasa minder karena hanya ia yang belum menikah dan belum memiliki pekerjaan tetap dikeluarganya.

Pasien mengatakan ia pernah ditinggal nikah oleh kekasihnya, padahal ia telah menjalin hubungan yang lama. Karena ia terkendala restu dari orangtua kekasihnya.

Pasien mengatakan ia sering dipanggil orang gila oleh tetangganya yang membuat ia sakit hati, dan merasa dikucilkan dilingkungannya.

Pasien juga berpikir bahwa ia normal, karena tidak buka baju dan telanjang dipinggir jalan sehingga Ketika orang memanggilnya dengan sebutan orang gila, ia akan melempar dan mengamuk.

**Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah**

3. Hubungan Sosial

- a. Orang yang berarti : pasien mengatakan orang yang berarti dan sebagai tempat ia berbagi keluh kesah adalah ibunya .
- b. Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat: pasien mengatakan ketika ia masih dirumah, ia jarang membantu kegiatan / acara di kampung. Selama ia sakit, pasien berperan sebagai pasien yang diberdayakan.
- c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain : pasien mengatakan ia merasa malu karena belum mempunyai pekerjaan tetap dan studi nya juga sudah sepi.

**Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah**

4. Spritual :

- a. Nilai dan keyakinan : Pasien mengatakan ia menganut agama islam
- b. Kegiatan Ibadah : pasien mengatakan kadang ia dibawa keruang rehabilitasi untuk terapi dzikir dan doa Bersama dengan pasien lain 1 kali seminggu dan rutin.
- Pasien mengatakan selama ia di rawat di RSKD Dadi, pasien tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu.

## VI. SATUS MENTAL

### 1. Penampilan

- Tidak rapih  Penggunaan pakaian tidak sesuai  cara berpakaian seperti biasanya

Jelaskan : Pasien tampak menggunakan pakaian bersih, tidak terbalik dengan padanan baju dan celana yang cocok

#### Masalah Keperawatan : -

### 2. Pembicaraan

- Cepat  Keras  Gagap  Inkoheren  
 Apatis  Lambat  Membisu  Tidak mampu memulai pembicaraan

Jelaskan : pasien hanya berbicara Ketika diberikan pertanyaan dan cukup focus seta mampu memberikan jawaban sesuai pertanyaan

### 3. Aktivitas Motorik :

- Lesu  Tegang  Gelisah  Agitasi  
 Tik  Grimasen  Tremor  Kompulsif

Jelaskan : -

#### Masalah Keperawatan : -

### 4. Alam Perasaan

- Sedih  ketakutan  Putus asa  Khawatir  Gembira

berlebihan

Jelaskan : pasien terkadang merasa sedih karena sudah lama tinggal dirumah sakit, terkadang pasien juga merasakan rindu karna jarang dikunjungi oleh keluarganya. Sesekali pasien tampak merenung dengan tatapan kosong dikamarnya.

**Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah**

5. Afek

Datar  Tumpu  Labil  Tidak sesuai

Jelaskan : -

**Masalah Keperawatan : -**

6. Interaksi selama wawancara

Bermusuhan  Tidak kooperatif  Masalah tersinggung  
 Kontak mata (-)  Defensif  Curiga

Jelaskan : Selama wawancara, pasien nampak kooperatif dan pandangan kearah lain.

**Masalah Keperawatan : -**

7. Persepsi

Pendengaran  Penglihatan  Perabaan  
 Pengecepan  Penghidu

Jelaskan : Pasien mengatakan sudah tidak pernah mendengar bisikan-bisikan.

**Masalah Keperawatan : -**

8. Proses Pikir

Sirkumtansial  Tangensial  Kehilangan asosiasi  
 *Flight of idea*  *Blocking*  penglangan  
pembicaraan/persevarasi



12. Tingkat Konsentrasi dan berhitung

- Mudah beralih  Tidak mampu konsentrasi  Tidak mampu berhitung

13. Kemampuan penilaian

- Gangguan ringan  Gangguan ringan

Jelaskan : Selama wawancara, pasien mampu menjawab pertanyaan dengan tepat dan sesekali meminta pernyataan diulang. Pasien dapat menghitung angka sederhana  $5+2 = 7$ , namun tidak mampu menghitung penjumlahan angka puluhan yang terlalu banyak. Pasien juga mampu membaca.

**Masalah Keperawatan :**

14. Daya Tilik Diri

- Mengingkari penyakit yang diderita  Menyalahkan hal-hal diluar dirinya

Jelaskan : Pasien mengatakan bahwa ia sadar, tingkah lakunya yang memukul kakak dan tetangganya itu merupakan hal yang salah dan ia menyadari bahwa hal tersebut tidak dikarenakan ia tidak dapat mengontrol emosinya dengan dipaksa bekerja oleh kakaknya.

**Masalah Keperawatan : -**

**VII. KEBUTUHAN PERSIAPAN PULANG**

1. Makan

- Bantuan minimal  Bantuan total

2. BAB/BAK

- Bantuan minimal  Bantuan total

Jelaskan :

- 1) Pasien mengatakan makan 3X sehari dengan makanan yang bervariasi yang terdiri Nasi, Ikan/ ayam, Sayur
- 2) Pasien mengatakan ia mampu makan tanpa bantuan
- 3) Pasien mengatakan ia mampu BAB dan BAK sendiri WC

**Masalah Keperawatan : -**

3. Mandi

Bantuan minimal                       Bantuan total

**Jelaskan :** Pasien mampu membersihkan diri secara mandiri

4. Berpakaian/berhias

Bantuan minimal                       Bantuan total

**Jelaskan : -**

5. Istirahat dan tidur

Tidur siang lama : 14.00 s/d 15.35

Tidur malam lama : 20.00 s/d 05.00

Kegiatan sebelum/sesudah tidur

6. Penggunaan obat

Bantuan minimal                       Bantuan total

7. Pemeliharaan Kesehatan

Perawatan lanjutan                       Ya                       Tidak

Perawatan pendukung                       Ya                       Tidak

8. Kegiatan di dalam rumah

Mempersiapkan makanan                       Ya                       Tidak

Menjaga kerapian rumah                       Ya                       Tidak

Mencuci pakaian                       Ya                       Tidak

Pengaturan pakaian                       Ya                       Tidak

9. Kegiatan di luar rumah

Belanja                       Ya                       Tidak

Transportasi                       Ya                       Tidak

Lain-lain                       Ya                       Tidak

Jelaskan : Pasien mengatakan ia mampu mengendarai transportasi, seperti motor dan mobil

**Masalah Keperawatan : -**

## VIII. MEKANISME KOPING

Adaptif

Maladaptif

- |                                     |                             |                                     |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Bicara dengan orang lain    | <input checked="" type="checkbox"/> | Minum alkohol                    |
| <input type="checkbox"/>            | Mampu menyelesaikan masalah | <input checked="" type="checkbox"/> | Reaksi lambat/belebi             |
| <input type="checkbox"/>            | Tehnik relaksasi            | <input type="checkbox"/>            | Bekerja berlebihan               |
| <input type="checkbox"/>            | Aktivitas konstruktif       | <input type="checkbox"/>            | Menghindar                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Olahraga                    | <input type="checkbox"/>            | Mencederai diri                  |
| <input type="checkbox"/>            | Lainnya                     | :                                   | <input type="checkbox"/> Lainnya |

**Masalah Keperawatan : -**

### **IX. MASALAH PSIKOSOSIAL DAN LINGKUNGAN**

- Masalah dengan dukungan kelompok, spesifik : tidak ada
- Masalah berhubungan dengan lingkungan, spesifik : pasien mengatakan ia kurang bergaul karena malu belum mempunyai pekerjaan tetap
- Masalah dengan pendidikan, spesifik : pasien mengatakan ia hanya lulusan SMP
- Masalah dengan pekerjaan, spesifik : pasien mengatakan ia seorang photographer yang menunggu panggilan untuk foto dan pendapatannya sedikit.
- Masalah dengan perumahan, spesifik : tidak ada
- Masalah ekonomi, spesifik : Pasien mengatakan, ia tinggal dirumah tinggal dirumah ibunya yang sudah tua dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ia mengandalkan dari pemberian kakaknya yang telah memiliki pekerjaan.
- Masalah dengan pelayanan kesehatan, spesifik: tidak ada
- Masalah lainnya, spesifik : tidak ada

**Masalah Keperawatan: Harga Diri Rendah**

### **X. PENGETAHUAN KURANG TENTANG**

- |                                     |                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Penyakit jiwa       | <input type="checkbox"/>            | Sistem pendukung |
| <input type="checkbox"/>            | Faktor predisposisi | <input type="checkbox"/>            | Penyakit fisik   |
| <input type="checkbox"/>            | Koping              | <input checked="" type="checkbox"/> | Obat-obatan      |
| <input type="checkbox"/>            | Lainnya             |                                     |                  |

**Masalah Keperawatan : -**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Analisa Data

Data	Masalah
<p>Data Subjektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan penyebab ia masuk RSKD Dadi karena mengamuk dan memukul kakak kandungnya.</li> <li>- Pasien mengatakan pernah beradu mulut dan memukul tetangganya karena ia merasa tetangganya mengolok-oloknya.</li> <li>- Pasien juga mengatakan ia sering beradu mulut dan berkata kasar kepada kakaknya.</li> <li>- Pasien juga mengatakan ia pernah melempar rumahnya sendiri menggunakan batu karena capek selalu dipaksa oleh kakaknya.</li> <li>- Pasien mengatakan ini merupakan kali ke-5 ia masuk ke RSKD Dadi karena memukul kakaknya.</li> <li>- Pasien mengatakan sebelum ia masuk RSKD ia selalu berdebat dengan kakaknya.</li> <li>- Pasien mengatakan ia terakhir memukul kakaknya di akhir tahun 2021.</li> <li>- Pasien juga berpikir bahwa ia normal, karena tidak buka baju dan telanjang dipinggir jalan sehingga Ketika orang memanggilnya dengan sebutan orang gila, ia akan melempar dan mengamuk.</li> </ul> <p>Data Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga pasien mengatakan Tn. S putus obat sekitar 2 minggu.</li> <li>- Pasien tampak menggunakan pakaian bersih, tidak terbalik dengan padanan baju dan celana yang cocok</li> <li>- Selama wawancara, pasien mampu menjawab pertanyaan dan tidak ada hambatan. Topik pembicaraan terfokus, namun terjadi perubahan harapan dan emosi pada pasien ketika pembicaraan kearah keluarganya.</li> <li>- Intonasi suara pasien saat berkomunikasi didominasi oleh intonasi datar, tetapi ada pada saat membahas mengani keluarganya, intonasi pasien meninggi seketika.</li> <li>- Tekanan Darah : 120/80 MmHg</li> <li>- Suhu : 36,7<sup>0</sup>C</li> <li>- Pernapasan : 22X/ menit</li> <li>- Tinggi badan : 160cm</li> <li>- Berat Badan 70 Kg</li> </ul>	<p>Risiko Perilaku Kekerasan</p>
<p>Data Subyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan ia pernah ditinggal menikah oleh pacarnya yang sudah lama ia menjalanin hubungan dengannya.</li> <li>- Pasien mengatakan hubungannya dngan saudara-saudaranya kurang baik, karena ia selalu dipaksa untuk bekerja oleh kakaknya.</li> <li>- Pasien mengatakan ia merasa minder karena hanya ia yang belum menikah dan mempunyai pekerjaan tetap dikeluarganya.</li> </ul>	<p>Harga Diri Rendah</p>


<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan ia pernah ditinggal nikah oleh kekasihnya, padahal ia telah menjalin hubungan yang lama. Karena ia terkendala restu dari orang tua kekasihnya.</li> <li>- Pasien mengatakan ia sering dipanggil orang gila oleh tetangganya yang membuat ia sakit hati, dan merasa dikucilkan dilingkungannya.</li> <li>- pasien mengatakan ia merasa malu karena belum mempunyai pekerjaan tetap dan studi photo nya juga sudah sepi.</li> <li>- pasien mengatakan ketika ia masih dirumah, ia jarang membantu kegiatan / acara di kampung. Selama ia sakit, pasien berperan sebagai pasien yang diberdayakan.</li> <li>- pasien terkadang merasa sedih karena sudah lama tinggal dirumah sakit, terkadang pasien juga merasakan rindu karna jarang dikunjungi oleh keluarganya.</li> </ul> <p>Data Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesekali pasien tampak merenung dengan tatapan kosong dikamarnya.</li> <li>- Kontak mata pasien kurang.</li> <li>- Pasien Nampak defensif dan merendahkan diri</li> </ul>	
<p>Data Subjektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan orang yang berarti dan sebagai tempat ia berbagi keluh kesah adalah ibunya.</li> <li>- Pasien mengatakan hanya menceritakan hal-hal tertentu saja pada ibunya.</li> <li>- Pasien mengatakan ingin keluar dari RSKD Dadi karena merasa dirinya baik-baik saja</li> <li>- Pasien mengatakan penyebab ia masuk di RSKD Dadi karena kakaknya</li> <li>- Pasien mengatakan ketika ia masih dirumah, jarang ikut bergabung dalam kegiatan sosial yang ada dilingkungannya.</li> </ul> <p>Data Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien tampak jenuh melakukan perawatan di RSKD Dadi</li> <li>- Pasien pernah melakukan rehabilitasi selama 5x di RSKD Dadi</li> <li>- Pasien tampak susah untuk beradaptasi dengan pasien lain, ketika ada kegiatan.</li> </ul>	Koping individu tidak efektif

## XI. ASPEK MEDIK

Terapi Medik :

Nama Obat	Dosis
Risperidone	2 Mg / Oral
Clozapine	25 Mg / Oral

## XII. POHON MASALAH



### 2. Diagnosa Keperawatan

1. Risiko perilaku kekerasan
2. Harga diri rendah
3. Koping individu tidak efektif

### 3. Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		Rasional
		Tujuan dan Kriteria Evaluasi	Tindakan Keperawatan	
1.	Risiko perilaku kekerasan	<p>Setelah dilakukan 3x interaksi, pasien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasannya dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan</li> <li>2. Pasien dapat mengidentifikasi tanda dan gejala perilaku kekerasan.</li> <li>3. Pasien dapat menyebutkan jenis perilaku kekerasan yang pernah dilakukannya.</li> <li>4. Pasien dapat menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukannya.</li> <li>5. Pasien dapat menyebutkan cara mengontrol perilaku kekerasanny</li> <li>6. Pasien dapat mengontrol perilaku kekerasannya melalui Latihan fisik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusikan penyebab marah / kekerasan pasien</li> <li>2. Diskusikan tanda dan gejala marah dan kekerasan</li> <li>3. Diskusikan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan pada saat marah (verbal, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan lingkungan)</li> <li>4. Diskusikan akibat perilakunya</li> <li>5. Latih mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik: tarik nafas dalam, pukul kasur/bantal, kegiatan fisik.</li> <li>6. Masukkan ke jadwal kegiatan harian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui penyebab marah/ PK dapat menjadi acuan penentuan terapi pasien</li> <li>2. Pasien dapat mengidentifikasi dirinya saat ingin marah.</li> <li>3. Mengidentifikasi perilaku pasiensaat marah</li> <li>4. Mengetahui dampak dari perilaku pasien</li> <li>5. Menjadi wadah pasien utnuk melampiaskan marah sehingga tidak merusak.</li> <li>6. Melatih pasien disiplin terhadap jadwal yang telah dibuat</li> </ol>
		<p>Setelah dilakukan 2x interaksi diharapkan pasien dapat mencegah perilaku kekerasan dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dapat menyebutkan nama obat yang diberikan</li> <li>2. Pasien dapat mengetahui tujuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusikan jadwal kegiatan harian dalam mengontrol PK secara fisik</li> <li>2. Berikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur dalam mengontrol perilaku marah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi kepatuhan pasien dalam mengikuti terapi</li> <li>2. Mengetahui obat dapat mencegah pasien salah komsumsi obat dan</li> </ol>

		<p>pengobatan</p> <p>3. Pasien dapat menyebutkan dosis obat</p>	<p>3. Anjurkan pasien memasukkan ke jadwal kegiatan harian.</p>	<p>pasien dapat mengetahui obat yang dikonsumsi.</p> <p>3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam melaksanakan jadwal terapi.</p>
		<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien diharapkan pasien dapat mengontrol perilaku kekerasan dengan kriteria hasil:</p> <p>1. Pasien rutin dan disiplin minum obat</p> <p>2. Pasien menyebutkan cara positif mengekspresikan marah</p>	<p>1. Diskusikan jadwal kegiatan harian mencegah Pk dengan patuh minum obat.</p> <p>2. Latih cara social Untuk mengekspresikan marah: (bicara yang baik: meminta, menolak dan mengungkapkan rasa marahnya kepada sumber).</p> <p>3. Anjurkan memasukkan ke jadwal kegiatan harian</p>	<p>1. Mengevaluasi kepatuhan pasien dalam mengikuti terapi.</p> <p>2. Dengan mengekspresikan marah dengan secara perlahan dapat mencegah pasien bertindak lebih jauh.</p> <p>3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam melaksanakan jadwal terapi</p>
		<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien diharapkan pasien dapat mengontrol perilaku marah dengan kriteria hasil:</p> <p>1. Pasien dapat menyebutkan cara positif mengungkapkan marah</p> <p>2. Pasien dapat beribadah secara mandiri</p>	<p>1. Diskusikan jadwal kegiatan harian mencegah PK dengan cara spiritual</p> <p>2. Latih De-enskalisasi: curhat, tulis</p> <p>3. Anjurkan memasukkan ke jadwal kegiatan harian</p>	<p>Dengan mengingat tuhan pasien dapat mencegah pasien PK</p> <p>2. Menulis akan membantu pasien untuk mengungkapkan marahnya tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain</p> <p>3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam</p>

				melaksanakan jadwal terapi
		Setelah dilakukan 2x interaksi diharapkan pasien dapat mengontrol perilaku kekerasannya dengan kriteria hasil: 1. Pasien dapat menyebutkan cara positif mengekspresikan marah 2. Pasien lebih rajin ibadah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusikan jadwal kegiatan harian mencegah PK dengan De-enskalisasi</li> <li>2. Latih cara spiritual Untuk mencegah PK</li> <li>3. Anjurkan memasukkan ke jadwal kegiatan harian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pasien mengingat jadwal harian pasien</li> <li>2. Terapi spiritual dapat membuat pasien lebih dekat dengan tuhan dan dapat meredam amarah pasien</li> <li>3. Melatih pasien disiplin mengikuti rencana terap</li> </ol>
2.	Harga diri rendah	Setelah dilakukan 2x interaksi pasien diharapkan dapat mengetahui kemampuan dan aspek positif yang dimilikinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien</li> <li>2. Bantu pasien menilai kemampuan pasien yang masih dapat digunakan</li> <li>3. Bantu pasien memilih kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan pasien.</li> <li>4. Latih pasien sesuai kemampuan yang dipilih</li> <li>5. Berikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan pasien.</li> <li>6. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mampu mengenal hal-hal yang menyebabkan pasien tidak percaya diri dan merendah</li> <li>2. Mengidentifikasi kegiatan yang masih dapat dilakukan</li> <li>3. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan pasien</li> <li>4. Mengisi waktu luang pasien dan meningkatkan harga diri pasien</li> </ol>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan kepercayaan diri pasien</li> <li>6. Melatih pasien melakukan kegiatan yang dirpilih.</li> </ol>
		<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien diharapkan dapat memiliki daftar kemampuan/ kegiatan yang dapat dilakukan dan memasukkannya kedalam jadwal kegiatan harian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien</li> <li>2. Melatih kemampuan kedua</li> <li>3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dapat mengetahui jadwal kegiatan harian pasien</li> <li>2. Agar pasien semakin pandai dalam melakukan kemampuannya yang lain</li> <li>3. Agar melatih pasien utnuk lebih mampu melakukan kegiatan tersebut</li> </ol>

#### 4. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

Inisial pasien : Tn. S

Umur Pasien : 43 Th

Ruangan : Sawit

No. RM : 076470

No.	Diagnosis Keperawatan	Hari/ Tanggal	Implementasi	Evaluasi
1.	Risiko Perilaku Kekerasan	Senin, 7 Februari 2022 10.00 Wita  10.05  10.07  10.10  10.14	<p>1. Mendiskusikan penyebab marah / kekerasan pasien Hasil : Pasien mengatakan bahwa biasanya ia marah ketika kakaknya memaksanya untuk bekerja</p> <p>2. Mendiskusikan tanda dan gejala marah dan kekerasan Hasil : Setelah diberikan penjelasan pasien dapat mengidentifikasi tanda dan gejala marah yang dialami, seperti tangan menggepal, mata melotot, sesak napas, berbicara keras, mengatupkan rahang dan merusak benda atau lingkungan sekitar.</p> <p>3. Mendiskusikan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan pada saat marah (verbal, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan lingkungan) Hasil : Pasien mengatakan bahwa ketika ia marah, ia akan beradu mulut dengan kakaknya dan tidak mau mengalah, kemudian kalau sudah marah sekali biasanya pasien langsung memukul atau bahkan mengancamnya menggunakan parang/ pisau.</p> <p>4. Mendiskusikan akibat perilakunya Hasil : Pasien mengatakan menyadari perbuatannya merugikan dirinya dan orang lain, tapi pasien mengatakan sulit menahannya jika sudah marah apalagi kakaknya sering memaksa.</p> <p>5. Melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik: tarik nafas dalam, pukul kasur/bantal, kegiatan fisik.</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan penyebab ia marah adalah karena kakaknya yang memaksanya untuk bekerja</li> <li>- Pasien mengatakan ketika marah ia beradu mulut dengan kakaknya, tetapi jika sudah marah sekali ia akan memukul bahkan mengancam kakaknya menggunakan parang/ pisau</li> <li>- Pasien mengatakan ia menyadari hal tersebut merugikan orang lain. Namun kadang sulit menahan amarahnya</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dapat mengidentifikasi tanda dan gejala marah</li> <li>- Pasien dapat mendiskusikan akibat dari perilakunya</li> <li>- Pasien dapat melatih mengontrol perilaku kekerasannya.</li> </ul> <p>A :</p> <p>Risiko perilaku kekerasan</p> <p>P :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buatkan pasien jadwal harian</li> <li>- Evaluasi kemampuan pasien dalam mengidentifikasi perilaku</li> </ul>

		10.17	<p>Hasil : Pasien diajarkan cara relaksasi napas dalam, kemudian berdzikir apabila dalam kondisi marah. Pasien memahami penjelasan perawat dan berjanji akan mencoba ketika dirinya merasa ingin marah.</p> <p>6. Masukkan ke jadwal kegiatan harian</p> <p>Hasil : Pasien bersedia dibuatkan jadwal harian.</p>	<p>kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan Pendidikan kesehatan terkait terapi obat.</li> </ul>
		<p>Selasa, 8 februari 2022</p> <p>09.30 Wita</p> <p>09.35</p>	<p>1. Memberikan Pendidikan kesehatan terkait terapi obat pasien</p> <p>Hasil : Pasien dapat menyebutkan tujuan obat dan dosis obat yang dikonsumsi 1 kali/ hari</p> <p>2. Mengajukan pasien untuk memasukkan ke dalam jadwal harian</p> <p>Hasil : pasien bersedia untuk menambahkan ke jadwal harian</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan ia mengetahui jumlah obat yang ia konsumsi</li> <li>- Pasien mengetahui jadwal minum obatnya.</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat jam makan siang, pasien tampak meminum obatnya terlebih dahulu kemudian makan</li> <li>- Pasien telah dibuatkan jadwal harian</li> </ul> <p>A : Risiko perilaku kekerasan</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi jadwal harian pasien</li> </ul>
		<p>Rabu, 9 Februari 2022</p> <p>10.10 Wita</p> <p>10.13</p>	<p>1. Mengevaluasi kepatuhan pasien dalam menjalankan daftar jadwal harian</p> <p>Hasil : pasien sudah dapat mengetahui dan melakukan cara melampiaskan marahnya dengan berdzikir (<i>Bismillahirrahmanirrahim 3x, Astagfirullahdzim 3x, Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, dan Allahuakbar 33x</i>) dan Tarik napas (Menarik napas menggunakan hidung, menahan 3 detik dan mengeluarkan perlahan menggunakan mulut)</p> <p>2. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian mencegah PK dengan patuh minum obat</p> <p>Hasil : Pasien telah memiliki jadwal kegiatan harian, dan mengetahui jadwal minum obatnya adalah sehari</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mengerti mengenai cara mengekspresikan marahnya</li> <li>- Pasien mengatakan ia mengulangi dzikir dan Tarik napas ketika sedang marah</li> <li>- Pasien mengatakan mengetahui jadwal minum obatnya sekali sehari</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampak pasien dapat melafalkan dzikir yang diajarkan.</li> <li>- Pasien Nampak melakukan Teknik</li> </ul>



				33x, <i>Allahuakbar</i> 33x.
		<p>Jumat, 11 Februari 2022 09.30 Wita</p> <p>09.34</p> <p>09.38</p>	<p>1. Mengevaluasi jadwal harian pasien Hasil : Pasien mengatakann ia mulai rutin melakukan dzikir ketika waktu luang, pada pagi,siang. Pasien juga rutin membersihkan kamar dan membantu teman-temannya.</p> <p>2. Latih cara spiritual Untuk mencegah PK Hasil : Pasien diminta untuk mengulan terapi dzikir yang diajarkan yaitu (<i>Bismillahirrahmanirrahim 3x, Astagfirullahalazim 3x, Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, dan Allahuakbar 33x</i>).dan mulai lancar dan menggunakan nyanyian.</p> <p>3. Mengajukan memasukkan ke jadwal kegiatan harian Hasil : Pasien telah memasukkannya kedalam jadwal kegiatan harian yang rutin ia lakukan</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakann ia mulai rutin melakukan dzikir ketika waktu luang, pada pagi,siang. Pasien juga rutin membersihkan kamar dan membantu teman-temannya.</li> <li>- Pasien mengatakan ia sudah menghafal dzikir yang telah diajarkan</li> <li>- Pasien mengatak ia merasa lebih tenang ketika menerapkan dzikir setiap hari</li> <li>- Pasien mengatakan ia merasa bersyukur telah diajarkan berdzikir</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien tampak lancar berdzikir</li> <li>- Pasien tampak bersemangat berdzikir dan tampak lebih tenang</li> </ul> <p>A : risiko perilaku kekerasan</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kegiatan harian pasienn</li> <li>- Evaluasi kegiatan spiritual pasien</li> </ul>
		<p>Sabtu, 12 Februari 2022 09.00 Wita</p>	<p>Mengevaluasi seluruh Tindakan yang diberikan untuk mengontrol perilaku kekerasan</p>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan cara mengontrol marah dengan Latihan napas dalam, memukul bantal, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik dan berdzikir</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dapat mengulangi Teknik yang diajarkan</li> <li>- Pasien tampak mengulang cara mengontrol perilaku kekerasan</li> </ul>

				<p>yang diajarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan dengan rutin berdzikir hatinya merasa lebih tenang</li> </ul> <p>A : Risiko perilaku kekerasan</p>
2.	Harga Diri Rendah	<p>Rabu, 9 Februari 2022</p> <p>10.20 Wita</p> <p>10.23</p> <p>10.25</p> <p>10.28</p> <p>10.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien            Hasil : Pasien mengatakan selama dir RSKD banyak yang bisa ia lakukan, seperti membantu membersihkan kamar, dan mencukur rambut pasien lain.</li> <li>2. Membantu pasien menilai kemampuan pasien yang masih dapat digunakan            Hasil : pasien mampu bekerja dan mengerti terhadap yang diperintahkan oleh perawat seperti membantu membersihkan kamar dan wc, membantu membagikan makanan. Dan juga membantu mencukur rambut pasien lain.</li> <li>3. Membantu pasien memilih kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan pasien.            Hasil : Pasien memilih kegiatan membantu mencukur rambut pasien lain.</li> <li>4. Melatih pasien sesuai kemampuan yang dipilih            Hasil : Pasien dibantu dan didampingi perawat dalam proses mencukur rambut pasien lain, kemudian pasien juga diberikan beberapa referensi potongan rambut modern.</li> <li>5. Memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan pasien.            Hasil : Pada saat mencukur rambut pasien lain, pasien diberikan pujian sebelum dan sesudah melakukan hal tersebut. Dan pasien Nampak gembira dan bersemangat melakukannya.</li> <li>6. Mengannjurkan pasien memasukkan dalam</li> </ol>	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan kegiatan yang dapat dilakukan dirumah sakit yaitu membantu membersihkan kamar dan mencukur rambut pasien lain.</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampak setiap pagi pasien membantu membersihkan kamar</li> <li>- Tampak pasien membantu mencukur rambut pasien lain.</li> </ul> <p>A : Harga diri rendah</p> <p>P :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latih pasien sesuai dengan kemampuan yang dipilih (membersihkan kamar 2 kali sehari, pagi-sore)</li> <li>- Latih pasien sesuai dengan kemampuan yang dipilih (mencukur rambut pasien lain)</li> </ul>

			<p>jadwal kegiatan harian.</p> <p>Hasil : pasien mengatakan siap menjadikan hal tersebut kedalam jadwal kegiatan hariannya.</p>	
		<p>Kamis, 10 Februari 2022 09.20 Wita</p> <p>09.24</p> <p>09.30</p>	<p>1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien Hasil : pasien mengatakan telah membersihkan kamarnya pada pagi hari.</p> <p>2. Melatih kemampuan kedua Hasil : Pasien hari ini membantu mencukur rambut pasien lain.</p> <p>3. Menganjurkan pasien memasukkan kedalam jadwal kegiatan harian Hasil : pasien memasukkan kedalam jadwal, untuk membantu mencukur rambut temannya 2x/ minggu</p>	<p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mampu melakukan kegiatan yang dipilih</li> <li>- Pasien mengatakan ia senang membantu temannya</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien nampak membantu temannya dalam mencukur rambut</li> </ul> <p>A : Harga diri rendah</p> <p>P :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latih pasien sesuai dengan kemampuan yang dipilih (membersihkan kamar tiap hari dan mencukur rambut teman)</li> </ul>
		<p>Jumat, 11 Februari 2022 09.30 Wita</p> <p>09.33</p> <p>09.35</p>	<p>1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien Hasil : Pasien mengatakan hari ini sudah selesai membersihkan kamar.</p> <p>2. Melatih kemampuan ketiga Hasil : pasien mengatakan membagikan makanan dan bubur pasien lain</p> <p>3. Menganjurkan pasien memasukkan kedalam jadwal kegiatan harian Hasil : pasien diminta untuk memasukkan kegiatan membagikan makanan dan bubur pasien lain</p>	<p>S : pasien mengatakan ia yang membagikan makanan dan bubur pasien lain</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien tampak membagikan makanan dan bubur pasien lain</li> <li>- Pasien tampak bersemangat dan penuh senyum membagikan makanan pasien lain</li> </ul> <p>A : Harga diri rendah</p> <p>P :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latih pasien sesuai dengan kemampuan yang dipilih (membagikan makanan pasien lain pada pagi: 06.20 wita dan siang 12.05, kemudian bubur/roti jam 09.00 wita)</li> </ul>

		Sabtu 12 Februari 2022 10.00	Mengevaluasi seluruh Tindakan yang diberikan untuk mengontrol perilaku kekerasan	<p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan kemarin pasien membagikan makanan pasien lain pada pagi dan siang hari.</li> <li>- Pasien mengatakan ia hari ini telah membagikan makan pagi dan roti pasien lain.</li> </ul> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien Nampak bersemangat menceritakan semua yang ia lakukan hari ini</li> </ul> <p>A : Harga diri rendah</p>
--	--	------------------------------------	--	---

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Asuhan Keperawatan**

##### **1. Analisis Pengkajian Keperawatan**

Pengkajian dilakukan pada Tn. S berumur 43 tahun, pasien diantar ke RSKD Dadi pada tanggal 22 Januari 2022 disebabkan mengamuk dan memukul kakak dan tetangganya. Pasien merupakan pasien lama, ia sudah masuk di RSKD Dadi sejak tahun 2014, ini merupakan kali ke-5 pasien masuk di RSKD Dadi. Pasien mengatakan ia masuk di RSKD dadi karena sering mengamuk, memukul orang lain, melempar rumah, dan keluarga pasien mengatakan ia sering berjalan sendiri tanpa arah dan tujuan. Pasien mengatakan ia memiliki pengalaman buruk, sejak kecil ia sering dipukul oleh ayahnya ketika tidak pergi bersekolah, hingga saat ia dewasa ini pasien selalu dipaksa bekerja oleh kakaknya yang menjadikannya tak bisa mengontrol emosinya sehingga sering memukul dan mengamuk. Dalam penelitian Amin (2019) pola perilaku pada pasien skizofrenia diakibatkan oleh pola asuh patogenik yang diberikan orang tua. Hubungan antara pribadi yang buruk mengakibatkan pasien skizofrenia mendapatkan contoh yang buruk. Selain itu, berdasarkan data diatas menunjukkan kesesuaian dengan teori menurut Keliat (2014) menyebutkan, perilaku kekerasan terjadi bahwa adanya kekerasan dalam rumah, keluarga atau lingkungan. Tindakan kekerasan ialah ungkapan rasa tidak berdaya dan harga diri rendah, pelaku terhadap tindak kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan keadaan Tn. S merasa dirinya dipaksa bekerja oleh kakaknya dan menyalahkan keluarganya karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuknya. selain itu, Tn. S menyatakan ia sejak kecil sudah menerima pola asuh yang

keras dari keluarganya, sehingga sering mendapat pukulan dan kata-kata makian dari ayahnya.

Riwayat pengobatan pasien sebelumnya kurang berhasil, sebelum masuk di RSKD dadi pasien mengatakan ia putus obat selama kurang lebih 2 minggu, dari data diatas menunjukkan bahwa pasien memperlihatkan gejala RPK, dengan risiko membahayakan baik secara fisik, emosional maupun seksual pada diri sendiri dan orang lain dengan selalu menatap tajam, sesekali ia memandang kearah yang lain.

Pengkajian dalam penelitian ini dilakukan selama 3 hari yaitu pada 7 Februari 2022- 9 Februari 2022, selama tahap pengkajian perawat melakukan pemeriksaan fisik, dan diperoleh tekanan darah: 120/80 MmHg Nadi: 98x/menit Pernapasan: 22x/menit Suhu: 36,5°C, tinggi badan 160 cm, berat badan 70kg. didapatkan warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam dan beberapa nampak memutih, pasien mengatakan ia rajin mandi dan tidak memiliki keluhan fisik lainnya. Dalam memlakukan pengkajian, perawat melakukan komunikasi teraupetik dengan pasien untuk memudahkan dalam proses asuhan keperawatan. Teknik komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat yaitu dengan menggunakan komunikasi yang lembut, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang tegas kepada pasien yang tidak kooperatif, serta komunikasi terapeutik yang perawat lakukan supaya terjalin suatu hubungan saling percaya atau disebut dengan BHSP (bina hubungan saling percaya) antara perawat dengan pasien gangguan jiwa. Komunikasi juga merupakan kendaraan bagi perawat untuk mewujudkan tujuan pemberian layanan asuhan yang berkualitas kepada pasien. Bentuk komunikasi yang dilakukan perawat dan pasien yaitu komunikasi antarpribadi (Sumangkut et al., 2013).

Pasien menyatakan dirinya selalu ingin memukul, dan menghancurkan apa yang ada didepannya, selain itu dari hasil

wawancara, nampak perbedaan ekspresi pasien saat ditanya mengenai kakaknya, pasien dengan sedikit emosional menceritakan dan tangannya mengepal, dengan mata melotot. Tindakan tersebut berisiko melukai diri sendiri dan lingkungan. Perilaku kekerasan tersebut membuat individu kehilangan atas dirinya (Sutejo,2019). Sehingga orang dengan skizofrenia memiliki resiko untuk menyakiti diri dan menyerang orang lain, selain itu beresiko merusak fasilitas umum, bahkan resiko bunuh diri. Sejalan dengan hal tersebut, Tn. S sering melakukan tindakan kekerasan kepada kakak, tetangga, dan lingkungan sekitar. Dari kasus yang ditemukan menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori maupun kasus yang dialami Tn. S.

Pada kasus Tn. S ia merespon marahnya secara verbal dan menentang, ia selalu mengeluarkan kata-kata kasar hingga berdebat dengan kakaknya dan selalu merasa dirinya selalu dipaksa bekerja. Dan cenderung menantang apa yang disampaikan oleh kakaknya. Bahkan pasien juga cenderung merespon marah dengan merusak benda atau lingkungan disekitarnya. Menurut Kelliat,2012 Respon marah dapat diungkapkan dengan 3 cara yaitu, mengungkapkan dengan kata-kata, menekan, dan menantang. Mengungkapkan kemarahan melalui perilaku konstruksi menggunakan kalimat yang dimengerti dan tidak menyakiti orang lain dengan kelegaan individu. Apabila marah diungkapkan dengan perilaku agresif dan menentang, karena merasa kuat akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan apabila digunakan untuk mengungkapkan kemarahan, karena dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (Kelliat, 2012).

## **2. Analisis Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah risiko perilaku kekerasan, dengan data penunjang bahwa Tn. S pernah memukul kakak dan tetangganya. Pasien juga mengatakan ia sering beradu mulut dan

berkata kasar dengan kakaknya. Pasien juga mengatakan ia pernah melempar rumahnya sendiri menggunakan batu karena merasa selalu dipaksa oleh kakaknya. Selain itu pasien juga memiliki pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan, yaitu sering dipukul oleh ayahnya apabila ia tidak bersekolah, selain itu Tn.S juga sering mendapat umpatan dan kata-kata kasar dari ayahnya, sehingga diagnosis yang cocok untuk Tn. S adalah risiko perilaku kekerasan. Penyebab pasien dengan perilaku kekerasan biasanya tidak lepas dari stress yang dapat melatarbelakangi hal tersebut, seperti anggota keluarga yang selalu melakukan tindak kekerasan, keinginan yang tidak tercapai, faktor pemicu biasanya seperti stressor dengan kehilangan orang yang dicintai (Nurhalimah, 2016).

Stressor yang dihadapi seseorang dalam melakukan tindak perilaku kekerasan terhadap dirinya dan orang lain biasanya menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Perilaku kekerasan tersebut dapat juga diartikan sebagai tindak melukai diri sendiri/ orang lain, secara lisan, jasmani, psikologis yang menyebabkan kerugian dan trauma fisik, kejiwaan, bahkan kematian. Untuk mengatasi dan meminimalisir pengaruh tersebut (Volkan, 2020).

Kemudian diagnosis keperawatan yang kedua adalah harga diri rendah, dibuktikan dengan pasien mengatakan ia minder jika berkumpul bersama keluarganya, dikarenakan hanya ia yang belum memiliki pekerjaan tetap kemudian studio fotonya juga sepi dan hanya ia yang belum menikah di keluarganya, pasien juga merasa tidak percaya diri semenjak lamarannya pernah ditolak oleh orang tua kekasihnya dan kekasihnya menikah duluan. Selama di rumah, pasien juga sering dipanggil orang gila oleh tetangganya, yang membuat ia sakit hati dan merasa dikucilkan, selama pengkajian kontak mata pasien kurang, dan pasien bersikap defensif dan merendahkan dirinya.

### **3. Analisis Intervensi Keperawatan**

Rencana tindakan keperawatan untuk Tn. S disusun berdasarkan tindakan keperawatan Jiwa selama 6 hari. Proses awal ialah BHSP dengan

pasien cara tersebut sesuai dengan teori (Yosep, 2011) yang mengatakan, Langkah pertama yang dapat dilakukan perawat ketika ingin melakukan intervensi pada pasien yaitu dengan membina hubungan saling percaya. Intervensi diberikan pada pasien jiwa dengan masalah RPK menggunakan SP agar dapat mengontrol marah penderita. Strategi pelaksanaannya dimulai dengan mengidentifikasi penyebab marah, mengetahui manifestasi klinis dari marah, mengajarkan pasien cara mengontrol marah dengan Latihan fisik, pukul bantal dan cara spiritual, selain itu pasien juga diberikan pendkes mengenai terapi obat (Romayanti, 2020).

Rencana keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan yang muncul yaitu harga diri rendah dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 6 hari, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil pasien dapat membina hubungan sosial secara bertahap. Pada tindakan keperawatan 1 yaitu bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik baik secara verbal maupun non verbal, dengan kriteria hasil yaitu setelah 2 kali interaksi, pasien diharapkan dapat mengetahui kemampuan dan aspek positif yang dimilikinya dan memasukkannya kedalam jadwal kegiatan harian. pada tindakan keperawatan kedua, pasien akan dibantu untuk melatih kemampuan kedua yang dimiliki pasien, selain itu perawat juga akan mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien dihari sebelumnya. Dengan kriteria hasil, sesudah diberikan 2x intervensi, pasien diinginkan memiliki daftar kemampuan/ kegiatan yang dapat dilakukan dan memasukkannya kedalam jadwal kegiatan harian.

#### **4. Analisis Implementasi Keperawatan**

Implementasi dalam penelitian diberikan mulai pada tanggal 10 Februari sampai 16 Februari 2022 dengan proses intervensi yang telah diberikan pada masalah risiko perilaku kekerasan dengan Tindakan keperawatan 1-5, dan harga diri rendah diberikan 1-2 tindakan keperawatan. Proses pengimplementasian, dilakukan sesuai dengan

rencana tindakan keperawatan. Sebelum melakukan tindakan keperawatan perawat perlu memvalidasi dengan singkat apakah rencana yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan keadaan atau kebutuhan pasien. Perawat juga menilai diri sendiri, apakah kemampuan interpersonal, intelektual, tekhnikal sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan, dinilai kembali apakah aman bagi pasien. Setelah semuanya tidak ada hambatan maka tindakan keperawatan boleh dilaksanakan (Sahputra, 2021).

Tindakan keperawatan untuk mengurangi perilaku kekerasan diantaranya, yaitu pencagahan, bayangan, dan pengekangan atau manajemen krisis. Upaya pencegahannya yaitu *self awareness* perawat, pembelajaran, manajemen marah, terapi kognitif, dan terapi kongnitif perilaku. Sedangkan strategi perilaku meliputi teknik komunikasi, perubahan lingkungan, psikoedukasi keluarga, dan pemberian obat antipsikotik. Strategi yang ketiga yaitu pengekangan (Restrain) meliputi pengikatan, dan pembatasan gerak (Stuart, 2013).

Pada kasus Tn. S dengan masalah perilaku kekerasan diberikan implementasi bagaimana mengontrol PK, obat, verbal dan spiritual, untuk latih fisik diberikan intervensi berupa tarik nafas dalam dan pukul kasur/bantal. Teknik yang dibutuhkan dalam melakukan implementasi yaitu komunikasi strategi komunikasi, yang harus dilakukan yaitu : bersikap tenang, bicara lambat, bicara tidak dengan cara menghakimi, bicara netral dengan cara yang kongkrit, tunjukkan respek pada pasien, hindari intensitas kontak mata langsung, demonstrasikan cara mengontrol situasi tanpa kesan berlebihan, fasilitasi pembicaraan pasien, dengarkan pasien, jangan terburu-buru menginterpretasikan.

Dalam proses pemberian implementasi seperti mengajarkan Teknik napas dalam, pasien diarahkan untuk menarik napas melalui hidung kemudian menghembuskan perlahan melalui hidung, pemberian Teknik relasasi napas dalam ini bertujuan untuk mengatur frekuensi pola napas, menurunkan kecemasan, meningkatkan relaksasi otot, dan memperbaiki

kekuatan otot-otot pernapasan (Lusianah & Indaryani, 2012). Ketika manusia marah, akan terjadi ketegangan terhadap otot-otot tubuh. Dalam otak tersebut terdapat zat kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter yang disebut katekolamin, bila zat tersebut meningkat akan timbul ledakan energi yang berlangsung selama beberapa menit. Pada saat yang sama, detak jantung tersebut meningkat, dan pernapasan menjadi cepat. Sehingga hormon dan neurotransmitter otak tambahan, adrenalin dan nonadrenalin dilepaskan, sehingga memicu keadaan stimulasi yang lebih lama (Yosep Iyus, 2010).

Selanjutnya pasien diberikan intervensi terapi psikoreligius dzikir, diberikan selama 3 kali sehari pada pagi hari (08.00), dan sore (16.00) sebagaimana kisah dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “*Ada dua sifat (amalan) yang tidaklah seorang muslim menjaga keduanya (yaitu senantiasa mengamalkannya) kecuali dia akan masuk jannah, dua amalan tersebut yang pertama adalah mensucikan Allah Ta’ala setelah selesai dari setiap shalat sebanyak sepuluh kali dengan membaca (Subhaanallaah, Alhamdulillah, Allahuakbar). Amalan yang kedua yaitu bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah swt sebanyak 33x.*

Q.S Al-A’raaf: 205 yang juga menjelaskan mengenai waktu yang diutamakan dalam melaksanakan dzikir yaitu :

وَالْأَصَالِ بِالْعُدْوِ الْقَوْلِ مِنَ الْجَهْرِ وَدُونَ وَخِيفَةً تَضْرَعًا نَفْسِكَ فِي رَبِّكَ وَأَذْكَرُ  
الْغَافِلِينَ مِنْ تَكُنُّ وَلَا

Terjemahnya :

“Dan sebutlah (nama) tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, diwaktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termaksud orang-orang lalai” (Q.S Al-A’raaf(7): 205).

Pasien yang diberikan terapi dzikir dapat membatasi pergerakannya untuk hal yang tidak penting dan berfokus pada kegiatan

yang berguna untuk dirinya. Kondisi fisik tersebut dapat mempengaruhi respon emosi. respon yang mengikuti terhadap perubahan kognitif pada pasien PK disebut respon fisik (Sulistyowati & Prihantini,2015).

Pasien juga dilatih untuk minum obat secara teratur, hal tersebut sehingga diperoleh hasil berupa pasien mampu menyebutkan ulang cara minum obat, manfaat dan frekuensi minum obat dan pasien mengatakan akan mengkonsumsi obatnya secara rutin 2 kali/hari agar cepat sembuh, pasien juga diberikan latihan verbal berupa latihan mengungkapkan, meminta, menolak dengan benar, dimana diperoleh hasil pasien mengucapkan kalimat tolong apabila meminta bantuan dan mengucapkan maaf jika menolak, pasien mengatakan lebih baik jika mengungkapkan apa yang dirasakan, latihan ini juga termasuk latihan tegas. Latihan tindakan tersebut diberikan untuk melatih pasien menyatakan amarah dan perasaan tersinggung, menyatakan sopan santun dan selalu menolong orang lain, serta membantu pasien untuk mengatakan tidak untuk hal yang tidak ia kuasai (E. Koeswara,2013).

Untuk diagnosis kedua, yaitu harga diri rendah, perawat melakukan bina hubungan saling percaya (BHSP) dengan menggunakan prinsip komunikasi teraupetik, selanjutnya melakukan strategi pelaksanaan (SP) jiwa yaitu menggali aspek positif yang dimiliki pasien, Kemampuan positif merupakan kemampuan atau aspek positif yang dimiliki individu untuk mengidentifikasi kemampuan yang ada pada diri individu itu sendiri, sehingga klien dapat memilih kegiatan sesuai kemampuan yang di milikinya (Farida & Yudi 2018). Kemudian membantu pasien dalam menilai kemampuan yang ia miliki, dan melatih pasien mengikuti kemampuan yang dipilih. Selain itu untuk pasien dengan diagnosis harga diri rendah, perawat dianjurkan untuk memberikan pujian yang wajar atas setiap keberhasilan yang dilakukan pasien, dan menganjurkan pasien untuk memasukkan kegiatan tersebut kedalam jadwal harian yang akan dievaluasi setiap harinya oleh perawat.

Menurut Khusna Safarina (2019) mengatakan bahwa latihan melakukan kegiatan sesuai kemampuan dapat mengelola/ mengontrol harga diri rendah, karena dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang sehingga membangkitkan pikiran positif pasien. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nela Laili Khadiqah (2020) menyebutkan setelah diberikan tindakan latihan melakukan aktivitas sesuai kemampuan menunjukkan hasil bahwa pasien dapat melakukan SP 2 dan mampu untuk melanjutkan dengan melakukan SP berikutnya.

## 5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Implementasi keperawatan yang diberikan pada Tn. S selama 6 hari dimulai hari Kamis, 10 Februari 2022–16 Februari 2022 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun. Evaluasi dilakukan setiap hari. Evaluasi pada diagnosis pertama yaitu risiko perilaku kekerasan diperoleh bahwa pasien telah mampu menjelaskan penyebab marahnya yang disebabkan oleh kakaknya yang memaksanya untuk bekerja, selain itu pasien juga mengatakan ketika ia marah, sering beradu mulut dengan kakaknya, bahkan ia pernah sampai mengancamnya dengan parang/ pisau. Pasien tampak kooperatif dan mau mendiskusikan penyebab marahnya. Pasien juga telah diajarkan cara mengekspresikan marahnya dengan berdzikir (*Bismillahirrahmanirrahim 3X, Astagfirullahalazim 3x, Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahuakbar*). Teknik Tarik napas menggunakan hidung dan mengeluarkan lewat mulut dan berbicara dengan baik dan sopan, pasien tampak melafalkan dzikir yang telah diajarkan, pasien mengatakan ia lebih rileks dan tenang setelah melafalkan dzikir yang telah diajarkan, pasien mengatakan juga mengulangi dzikir 3 kali sehari pada pagi (8.00), dan sore (16.00) pasien juga mulai merubah intonasi pembicaraannya dengan sesama temannya.

Hasil evaluasi setelah pemberian implementasi didapatkan pasien mampu menyebutkan ulang cara tarik nafas dalam dan pukul bantal, pasien memperagakan cara tarik nafas dalam, penerapan teknik relaksasi


nafas dalam ini sesuai dengan hasil penelitian dari Sudia (2021), setelah dilakukan terapi relaksasi nafas dalam untuk mengontrol marah didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan tindakan relaksasi nafas dalam tampak pasien menjadi lebih rileks, tenang dan pasien mulai mampu mengontrol emosinya. Artinya setelah dilakukan intervensi terapi nafas dalam pasien mengatakan marahnya sedikit berkurang dan pasien tampak lebih rileks dan terapi relaksasi nafas dalam efektif berpengaruh dalam pengontrolan marah pada pasien perilaku kekerasan.

Dalam proses pelaksanaan evaluasi, untuk masalah risiko perilaku kekerasan pasien telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dan telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dan telah mampu mengontrol perilaku kekerasannya dengan kriteria hasil yaitu, pasien telah dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan, pasien telah dapat mengidentifikasi tanda dan gejala dari perilaku kekerasan, pasien dapat menyebutkan cara untuk mengontrol perilaku kekerasan, pasien telah mampu menyebutkan nama obat, pasien telah mampu membicarakan hal positif dari dirinya. Kriteria hasil yang belum dapat dilakukan oleh pasien, diantaranya pasien belum rutin melakukan ibadah secara mandiri, hal tersebut karena pasien mengatakan sulit menjalankan ibadah tersebut, dan belum terbiasa, ditambah dengan keadaan kamarnya yang tidak mendukung untuk ia melaksanakan sholat setiap hari.

Pada diagnosis harga diri rendah, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1-2 didapatkan evaluasi subjektif yaitu pasien menyatakan sudah dapat melakukan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat untuk dirinya dan lingkungan. Pasien juga mengatakan ia mulai melakukan aktifitas seperti membersihkan kamar setiap pagi dan membantu temannya untuk mencukur rambut, pasien juga mengatakan ia sudah mulai membantu dalam pembagian makanan kepada pasien lain pada pagi dan siang. Evaluasi objektif ditemukan bahwa pasien tampak lebih bersemangat ketika menceritakan kegiatan yang ia lakukan, proses pengevaluasian untuk diagnosis harga diri rendah, pasien telah

menunjukkan beberapa kemajuan menjadi lebih percaya diri, dengan beberapa kriteria hasil telah mampu mengetahui dan melakukan aspek positif yang ada pada dirinya, selain itu juga pasien telah memiliki daftar aspek positif yang ada pada dirinya dan list kegiatan yang akan ia lakukan ketika ia menjadi pasien di RSKD Dadi.

## B. Analisis Intervensi EBPN



Grafik 5.1: Penurunan tanda dan gejala perilaku kekerasan

Pada kasus Tn. S dengan masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan, penulis memberikan intervensi terapi dzikir ialah intervensi utama dalam tugas akhir ini, bertujuan untuk mengontrol perilaku kekerasan. Terapi dengan menggunakan pendekatan terhadap kepercayaan yang dianut oleh manusia, disebut terapi spiritual. Salah satu diantaranya ialah dzikir, dzikir secara umum bertujuan untuk mengagungkan Allah, mensucikan hati dan jiwa, mengagungkan Allah selaku hamba yang bersyukur, dzikir dapat menyehatkan tubuh, dapat mengobati penyakit dengan metode ruqyah, mencegah manusia dari bahaya nafsu (Munandar, 2019). Dalam Penelitian Ernawati,2020 pemberian terapi dzikir

memberikan dampak yang baik bagi pasien. Penerapan terapi dzikir dalam penelitian ini, dapat membuat hati pasien dapat lebih tenang, melantunkan kalimat-kalimat tahmid bisa mengurangi hormon stress, memberikan endorphin, memberikan perasaan nyaman dan mengurangi cemas danketeganganm, dapat menurunkan tekanan darah juga membuat pernapasan, nadi cepat. Pernapasan cepat atau lambat dapat menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik (Puspita et al., 2021).

Terapi spiritual menggunakan dzikir ialah bertujuan untuk menyembuhkan penyakit mental individu, menggunakan kekuatan batin dan rohani, berupa ritual keagamaan tidak menggunakan obat-obatan, berfungsi meningkatkan keimanan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dan fitrah beragama secara baik sesuai dengan Al-Quran dan hadits, seperti melakukan shalat 5 waktu, berdoa dan berzikir dapat membuat hidup selaras, seimbang dan sesuai ajaran islam (Yusuf, 2016). Terapi dzikir merupakan tindakan yang dapat meminimalisir perilaku kekerasan (Sianturi, 2019). Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 152

تَكْفُرُونَ وَلَا لِيَ وَاشْكُرُوا أَنذَرْتُكُمْ فَادْكُرُونِي

Terjemahnya:

*“Maka ingatlah kepada-ku, akupun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku”*

Q.S. Al-Baqarah: 152

Dalam tafsir al-Misbah lafaz فَادْكُرُون M. Quraish Shihab menfasirkan bahwa dalam mengingat allah tidak hanya melalui lidah tetapi juga dengan pikiran hati dan anggota badan. Hal ini dibuktikan dalam penafsirannya yang berbunyi *“karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku dengan lidah, pikiran hati, dan anggota badan.”*. Beliau menjelaskan, bahwa mengingat Allah Swt. dengan lidah maksudnya adalah menggunakan lidah untuk mensucikan dan memuji-Nya. seperti yang kita ketahui bahwa mensucikan Allah swt yaitu dengan melafalkan

*Subhanallah* (Maha Suci Allah), dan memuji-Nya dengan melafalkan *Alhamdulillah* (segala puji bagi Allah). Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dzikir ialah aktivitas amal ketaan, ibadah dan ketakwaan seseorang kepada Allah Swt. Secara khusus dzikir dimaknai dengan menyebut dan mengingat Allah dengan bacaan dengan lisan maupun dengan hati dengan lisan, dzikir dalam makna ini secara umum adalah mutlak tidak terikat pada tempat, waktu dan cara-cara tertentu (Tafsir Al-Misbah,2012).

Allah Swt Berfirman dalam Q.S Al. Ahzab;22:41

كَثِيرًا ذِكْرًا اللَّهُ اذْكُرُوا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا

Terjemahannya :

“Wahai orang- orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak- banyaknya” (Q.S.Al-Ahzab:22;41)

Hasil penelitian lain, Ftiani (2017) menemukan bahwa ada perbedaan respon perilaku setelah diberikan intervensi antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, sehingga pemberian psikoreligi berpengaruh terhadap penurunan respon perilaku (Suryanti & Ariani, 2018). Pada kondisi nyaman, terjadi penurunan tekanan darah, nadi, dan ketegangan otot. Pada kasus Tn. S terdapat penurunan tanda dan gejala dalam melakukan perilaku kekerasan dari 12 tanda dan gejala menjadi 3 tanda dan gejala, seperti: kenaikan tekanan darah, nadi, dan ketegangan otot merupakan tanda gejala fisiologis pada klien perilaku kekerasan (Chanda & Levitin, 2013) (Moradipanah, F., Mohammadi, E., & Mohammadil, n.d.; Noorratri, E. D., 2010).

Berdasarkan penelitian dari Hawari, 2019 ia menyatakan bahwa aspek agama (spiritual) merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan seutuhnya. WHO pada tahun 1947 memberikan batasan kesehatan terhadap individu dengan hanya melihat 3 aspek yaitu aspek bio, psiko dan sosial. Pada tahun 1984 batasan tersebut ditambah dengan aspek agama (spiritual), yang oleh *American Psychiatric Association*

dikenal dengan rumusan “*bio-psycho, socio-spiritual*”. Dipandang dari sudut kesehatan jiwa, doa dan dzikir mengandung unsur psikoterapeutik yang mendalam. Terapi psikoreligius tidak kalah pentingnya dengan psikoterapi psikiatrik karena dalam psikoterapeutik mengandung kekuatan spiritual atau kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri dan rasa optimisme. Dua hal tersebut yang dapat menjadi dasar bagi penyembuhan suatu penyakit disamping obat- obatan dan tindakan medis lainnya (Hawari, 2019).

Craigie, Greenwold, Larson, Sherrill, Larson, Lyons, dan Thielman (1992) menyatakan kegiatan keagamaan, berdoa dan berdzikir mampu menjaga kesehatan mental dan mencegah seseorang menderita penyakit hipertensi. Terapi dzikir dapat mengontrol RPK pada pasien jiwa, dengan menstimulus syaraf agar dapat menganalisa dan menghantarkan informasi. Kemudian informasi tersebut akan dikumpul di sistem sensorik dan di integrasikan pada frontal lobe yang berfungsi sebagai perencanaan, pengaturan, perhatian, dan pemecahan masalah serta tingkah laku dan emosi manusia. Frontal lobe dapat disebut sebagai prefrontal cortex sebagai fungsi kognitif yang dapat menentukan kepribadian yang akan diteruskan pada otak belakang, terdiri atas premotor dan motor bertugas untuk sistem otonom dan sensorik sebagai pengontrol Gerakan aktifitas dan fungsi-fungsi endoktrin (Ikawati, 2014).

Dzikir ialah upaya untuk mendekati diri kepada Allah dengan cara mengingat-Nya. Dzikir membantu individu membentuk persepsi yang lain selain ketakutan yakni keyakinan bahwa stressor apapun akan dihadapi dengan baik dengan bantuan Allah. Saat individu membiasakan berdzikir, ia akan merasa dirinya dekat dengan Allah, berada dalam penjagaan dan lindungan-Nya kemudian membangkitkan percaya diri, kekuatan perasaan aman, tenang dan Bahagia (Najati, 2015). Dzikir akan membuat seseorang merasa tenang sehingga kemudian menekan kerja sistem syaraf simpatis dan mengaktifkan kerja sistem saraf parasimpatis (Saleh, 2010). Salah satu bacaan dzikir *Astagfirullahaladzim* menurut

Yurisaldi (2010) kalimat yang mengandung jahr, seperti kalimat tauhid dan istigfar, akan meningkatkan pembuangan karbondioksida dalam paru-paru. Manfaat lainnya disebutkan Rasulullah saw “barangsiapa senantiasa beristigfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, memberikan kelapangan dari kesusahan dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tak di sangka-sangka” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Sesudah diberikan terapi, pasien sebelumnya akan selalu merasakan gelisah dan khawatir akan dirinya, hal tersebut ia rasakan ketika ia jauh dengan Allah SWT (Suci & Milkhatun, 2020). Keyakinan terhadap Allah swt dapat membuat hati menjadi tenang, hanya dengan mengingatnya. Allah swt menunjukkan banyak hal yang dapat digambarkan sebagai ketenangan hati. Riset dilakukan oleh Rusdi 2016, ketenangan hati tersebut diantaranya *al-yaqin* (keyakinan) dan *al-sukun* (ketenangan). Dengan kepercayaan dan keyakinan tersebut, munculah ketenangan pada diri yang mengingatnya. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian oleh Mutiara Anjarwati, 2021 yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh pemberian terapi psikoreligius: dzikir terhadap pengendalian marah pada pasien resiko perilaku kekerasan di RSJ Soeharto Jakarta.

### **C. Keterbatasan**

Keterbatasan pada karya tulis ini adalah perlunya pemberian intervensi dengan rentang waktu yang lama dan perlu dilakukan secara konsisten secara berulang kali agar keefektifan dalam pemberian intervensi dapat berpengaruh dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu dinas dari perawat yang kurang, sehingga tidak bisa mendampingi pasien dalam pelaksanaan intervensi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn. S dengan intervensi utama pemberian terapi psikoreligius dzikir dengan masalah risiko perilaku kekerasan, maka dapat disimpulkan :

1. Pengkajian dilakukan pada Tn. S, pengkajian merupakan tahap awal proses keperawatan. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut ditemukan bahwa pasien memiliki riwayat melakukan perilaku kekerasan terhadap kakak dan tetangganya, dan pernah merusak benda atau sesuatu yang didekatnya sebagai bentuk respon terhadap marahnya pasien.
2. Diagnosis keperawatan, berdasarkan hasil pengkajian penulis merumuskan 3 diagnosis yaitu, risiko perilaku kekerasan, harga diri rendah dan coping individu tidak efektif.
3. Intervensi keperawatan, berdasarkan dari diagnosis yang telah dirumuskan, penulis Menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai dengan tindakan keperawatan jiwa (Sp) untuk Tn.S.
4. Implementasi keperawatan, dilakukan selama 6 hari secara rutin dengan pemberian tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pemberian terapi psikoreligius dzikir berupa (*Bismillahirrahmanir Rahim 3x, Astagfirullahalazim 3x, Subhanallah 33X, Alhamdulillah 33x, Allahuakbar 33x*) lebih difokuskan dalam penelitian ini.
5. Evaluasi dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan dari hasil diagnosis keperawatan yang telah ditegakkan dan implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan didapatkan hasil bahwa untuk diagnosis resiko perilaku kekerasan pada Tn. S dapat mengidentifikasi tanda dan resiko marahnya,

kemudian telah dapat mengontrol marah dengan menarik napas, berbicara yang baik dan dengan menggunakan terapi spiritual (dzikir). Untuk diagnosis kedua yaitu harga diri rendah, pasien telah mampu mengetahui aspek positif dalam dirinya dan telah mampu memasukkannya kedalam daftar kegiatan harian.

6. Terjadi pengurangan tanda dan gejala perilaku kekerasan pada Tn. S, setelah pemberian terapi dzikir pada tanggal 10-15 Februari 2022. Sebelum pemberian didapatkan 10 tanda dan gejala risiko perilaku, tetapi setelah pemberian ditemukan hanya 3 tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan. Semakin sedikit tanda dan gejala maka semakin bagus pasien dalam mengontrol marah.

## **B. Saran**

1. Bagi profesi Keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi
2. Bagi institusi Pendidikan penulis ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Quranul Qarim

Arham, MU. 2015. Terapi spiritual melalui dzikir pada santri gangguan jiwa di PP Al Qadir Cangkringan Yogyakarta. Yogyakarta: FKD UIN Sunan Kalijaga

Anshori, A. (2003). *Dzikir demi Kebaikan Jiwa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basri, M.M., (2014). *24 Jam Dzikir & Do'a Rasulullah*.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4265/24%20Jam%20Dzikir%20%26%20Doa%20Rasulullah%20%20OK2.pdf?sequence=1&isAllowed=>

Dermawan, D. 2017. Pengaruh Terapi Psikoreligius: Dzikir Pada Pasien Halusinasi Pendengaran di RSJD dr.Arif Zainudin Surakarta. Volume 15 no. 1. [ejournal@stikespku.ac.id](mailto:ejournal@stikespku.ac.id)

Eni, H. (2012). Pengaruh Terapi Kelompok Suportif Terhadap Kemampuan Mengatasi Perilaku Kekerasan Pada Klien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Kota Semarang. *Ecological Economics*, 1(1), 1–7.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Faturochman, F. (2014). *Komunikasi terapeutik Perawat Dan Pasien Gangguan Jiwa*.

Fitriana, I. (2017). Penerapan Tindakan Keperawatan Mengontrol Marah Dengan Spiritual : Psikoreligius Pada Klien Resiko Perilaku Kekerasan Di Wisma Dwarawati RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. *STIKES Muhammadiyah Gombong*.

Fatihuddin. (2010). *Tentram Hati Dengan Dzikir*. Delta Prima Press.

Heri, S. (2015). Tanda Gejala Dan Kemampuan Mengontrol Perilaku Kekerasan Dengan Terapi Musik dan Rational Emotive Cognitif Behavior Therapy. *Jurnal Ners*, 1-No 2, 233–241.

Hidayati, Wahyu Catur, Dwi Heppy Rochmawati T. Pengaruh Terapi Religius Zikir Terhadap Peningkatan Kemampuan Mengontrol Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Halusinasi Di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*. 2014;1–9.

Hidayati, W. C. (2014). Pengaruh Terapi Religius Zikir Terhadap Peningkatan Kemampuan Mengontrol Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Halusinasi Di RSJD DR. Amino Gondohutomo Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan (JKK)*.

Hasyim, M. Prasetyo, J. dan Ghofar, A. 2014. *Buku Pedoman Keperawatan Dari Etika Sampai Kampus Keperawatan*. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi

- Hussein, JW. 2016. The social psychological and phenomenological construct of spirituality in the culture of dhikr in Eastern Ethiopia. [https://doi.org/10.117711354067-16672415, 0\(0\) 1-23](https://doi.org/10.117711354067-16672415,0(0)1-23). SAGE.
- Kemenkes RI. (2019). Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS. Jakarta: Kemenkes RI. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/08/persebaran-prevalensiskizofreniapsikosis-di-indonesia#>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Rencana Aksi Kegiatan 2020 - 2024. *Ditjen P2P Kemenkes*, 29. <https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-401733-4tahunan-440.pdf>
- Niko, P. F. (2018). Pengaruh Terapi Dzikir Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Ibu Hamil. *Jurnal ISLAMIKA*, 01(01), 24–33. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/view/674>
- Nurhalimah. (2016). *Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Nursaly, E., & Damaiyanti, M. (2018). Analisis Praktik Klinik Keperawatan pada Tn. E Risiko Perilaku Kekerasan dengan Intervensi Inovasi Terapi Berkebudayaan dengan Polybag terhadap Tanda-Tanda Gejala Risiko Perilaku Kekerasan di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda. <https://dspace.umkt.ac.id/handle/463.2017/571>
- Nugraha, Dwi Asriani. 2015. *Komunikasi Antarpribadi Perawat Terhadap Pasien Skizofrenia Dalam Proses Peningkatan Kesadaran di Rumah Sakit Jiwa DR. H. Marzoeqi Mahdi Bogor*. Abstrak.
- Munandar, A., Irawati, K., & Prianto, Y. (2020). Terapi Psikoreligius Dzikir Menggunakan Jari Tangan Kanan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(1), 69–75. <https://doi.org/10.33859/dksm.v10i1.451>
- Muhtador. 2014. Pemaknaan Ayat Al-Quran Dalam Mujahadah: Studi Living Al Quran Di PP Al-Munawwir Krapyak Komplek Al Kandiyas” *Jurnal Penelitian*. Vol.8 No. 1
- Mellia, T. P. F. I. E. T. A. (2020). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Masalah Risiko Perilaku Kekerasan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr Arif Zainudin Surakarta. Diss iversitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/6134>.
- Puspita, D., Fitri, N. L., Utami, I. T., Keperawatan, A., Wacana, D., & Kunci, K. (2021). *Pengaruh Penerapan Religius Zikir Terhadap Tanda Gejala Halusinasi Klien Di Ruang Kutilang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung*. 1(September), 334–338.
- Pardede, J. A., Siregar, L. M., & Halawa, M. (2020). Beban dengan Koping Keluarga Saat Merawat Pasien Skizofrenia yang Mengalami Perilaku Kekerasan. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 189-196.

<http://dx.doi.org/10.26630/jk.v1i1i2.1980>

- Parwati, I. G., Dewi, P. D., & Saputra, I. M. (2018). Asuhan Keperawatan Perilaku Kesehatan. [https://www.academia.edu/37678637/asuhan\\_keperawatan\\_perilaku\\_kekerasan](https://www.academia.edu/37678637/asuhan_keperawatan_perilaku_kekerasan)
- Romayanti, Y. (2020). *Manajemen Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Ny . A Dengan Risiko Perilaku Kekerasan*. 1–37.
- Rina, H. (2015). Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Perubahan Perilaku Kekerasan Klien Skizofrenia. *Jurnal Keperawatan, 11 No 3*, 199–208.
- Susilowati Y, Ningsih DW. Penatalaksanaan Pasien Gangguan Jiwa Dengan Perilaku Kekerasan Di Ruang Citro Anggodo RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. *Jurnal Profesi Keperawatan (JPK)*. 2015 Jul 1;2(2)
- Samain, & Budihardjo. (2020). Konsep Kesehatan Mental dalam Al-Qur'Ān dan Implikasinya terhadap Adversity Quotient Perspektif Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(2)*, 18–29. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/attadib/article/view/961>
- Sasongko, N. C., & Hidayati, E. (2020). Penerapan Terapi Musik, Dzikir dan Rational Emotive Cognitive Behavior Therapy pada Pasien dengan Resiko Perilaku Kekerasan. *Ners Muda, 1(2)*, 93. <https://doi.org/10.26714/nm.v1i2.5751>
- Sianturi, N. (2019). *SPIRITUAL CARE DI RSUD DR DJOELHAM BINJAI TAHUN 2016 Nurjuliati Sianturi secara content analysis . I*, 55–69.
- Suci, E. P. M. E., & Milkhatun. (2020). Analisis Rekam Medis Pasien Risiko Perilaku Kekerasan dengan Menggunakan Algoritma C4.5 di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda. *Bsr, 2(1)*, 16–24. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/download/1423/636/>
- Sumangkut, C. ., Boham, A., & Marentek, E. A. (2013). Peran Komunikasi Antar Pribadi Perawat Dengan Pasien Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Ratumbuysang Manado. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9)*, 1689–1699.
- Subandi, M.A (2009). Psikologi Dzikir fenomenologi Dzikir Tawakal Pengalaman Transformasi Religius, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, A.E. (2015). *Pengaruh Pengamalan Dzikir terhadap Ketenangan Jiwa di Majlisul Dzakirin Kamulan Durenan Trenggalek*, Skripsi, Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Sujarwo, S., & Livana, P. H. (2019). Studi Fenomenologi: Strategi Pelaksanaan Yang Efektif Untuk Mengontrol Perilaku Kekerasan Menurut Pasien Di Ruang Rawat Inap Laki Laki. *Jurnal Keperawatan Jiwa, 6(1)*, 29-35.

<https://doi.org/10.26714/jkj.6.1.2018.29-35>

- Stuart G.W. (2016). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart*. Singapura. Elsevier
- Varcarolis, E.M. (2006). *Psychiatric nursing clinical guide; assesment tools and diagnosis*. Philadelphia: W.B Saunders Co.
- Volkan, K. (2020). Schizophrenia: Epidemiology, Causes, Neurobiology, Pathophysiology, and Treatment. *Journal of Health and Medical Sciences*, 3(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1994.03.04.143>
- Wuryaningsih, Emi W, Dwi Heni, Iktiarini Erti, Deviantony, & Hadi Enggal. (2020). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa 1*. May, 194. [https://www.google.co.id/books/edition/Buku\\_Ajar\\_Keperawatan\\_Kesehatan\\_Jiwa\\_1/PFnYDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Keperawatan_Kesehatan_Jiwa_1/PFnYDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- W, Yuhanda, dkk. (2014). *Efektifitas Terapi Relaksasi Napas Dalam dan Tertawa Dalam Mengontrol Perilaku Kekerasan Pada Pasien Perilaku Kekerasan di RSJD. Dr. Amino GondoHutomo Semarang*. Semarang: Stikes Tlogorejo Semarang.
- WHO. (2017). *Publications world health statistics*. Switzerland: [https://www.who.int/gho/publications/world\\_health\\_statistics/2017/EN\\_WHS\\_2017\\_TOC.PDF?UA=1](https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/EN_WHS_2017_TOC.PDF?UA=1)
- Yasa, I. (2020). Gambaran asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi sesi III: menggunakan rasa marah secara verbal untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di UPTD Rsj Dinkes provinsi bali tahun 2020 <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/5031>
- Yusuf, Ah. fitryasari, Rizky. Nihayati HE. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika; 2015.
- Yusky Margaretha. “Pentingnya Peran Komunikasi dalam Komunikasi Kesehatan.” Kompasiana, 24 November, 2017, <http://kompasiana.com/yuskymargaretha> <https://dosenpsikologi.com/macammacam-gangguan-jiwa>

## LAMPIRAN

1. Hasil Observasi Tanda dan gejala Resiko Perilaku Kekerasan pada pasien skizofrenia, menurut (Riska Amimi, 2020):

No.	Tanda dan Gejala	10 02 22	11 02 22	12 02 22	13 02 22	14 02 22	15 02 22
1.	Muka marah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tegang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Mata melotot/ pandangan tajam	✓	✓	✓	✓		
4.	Mengepalkan tangan	✓	✓	✓			
5.	Mengatup rahang dengan kuat	✓	✓				
6.	Bicara kasar	✓	✓	✓	✓		
7.	Suara tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Mengancam secara verbal dan fisik	✓					
9.	Melempar atau memukul benda/ orang lain						
10.	Menjerit atau berteriak	✓	✓	✓	✓		

## 2. Lampiran Rujukan Utama

Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2020) : 049-056  
Terakreditasi Nasional Peringkat 3 No. 36/EKPT/2019

E-ISSN 2614-5375



**Window of Health**  
Jurnal Kesehatan  
Journal homepage : [www.jurnal.fkmumi.ac.id](http://www.jurnal.fkmumi.ac.id)



### ARTIKEL RISET

URL artikel: <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh3106>

### Pengaruh Pelaksanaan Terapi Spiritual Terhadap Kemampuan Pasien Mengontrol Perilaku Kekerasan

Ernawati<sup>1</sup>, Samsualam<sup>2</sup>, <sup>K</sup>Suhermi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia

Email Penulis Korespondensi (\*): [suhermi.suhermi@umi.ac.id](mailto:suhermi.suhermi@umi.ac.id)

[ernawatv0697@gmail.com](mailto:ernawatv0697@gmail.com)<sup>1</sup>, [samsualamalam@yahoo.com](mailto:samsualamalam@yahoo.com)<sup>2</sup>, [suhermi.suhermi@umi.ac.id](mailto:suhermi.suhermi@umi.ac.id)<sup>3</sup>  
(085242002916)

### ABSTRAK

Perawat dapat mengontrol perilaku kekerasan pasien dengan melakukan tindakan salah satunya adalah terapi spiritual atau religius. Bentuk dari terapi spiritual dalam penelitian ini adalah dzikir dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an surah Ar-Rahman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan terapi spiritual terhadap kemampuan pasien mengontrol perilaku kekerasan di Ruang Kenari Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Pre Experimental One Group Pretest-Posttest Design*, yaitu design penelitian yang terdapat *Pre-test* sebelum diberi perlakuan dan *Post-test* setelah diberi perlakuan. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi tanda dan gejala yang muncul pada pasien sebelum dan sesudah diberikan terapi spiritual. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan dasar sampel sebanyak 30 pasien. Uji statistik dilakukan dengan



### 3. Lampiran Dokumentasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

#### 4. Lampiran Hasil Uji Turnitin

---

Revisi Rara 9/8/22

ORIGINALITY REPORT

**21** %

SIMILARITY INDEX

**21** %

INTERNET SOURCES

**1** %

PUBLICATIONS

**8** %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<b>10</b> %
<b>2</b>	<a href="https://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<a href="https://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<b>1</b> %
<b>5</b>	<a href="https://repository.uki.ac.id">repository.uki.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="https://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<a href="https://eprints.umg.ac.id">eprints.umg.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	<b>1</b> %

## BIODATA



**Khaeratunnafisah**, lahir di Kota Bima, pada tanggal 27 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan Bapak Hatta dan Ibu Nunung. Penulis Bernama panggilan Rara, mulai mengikuti Pendidikan 2005 di SDN 21 Kota Bima dan selesai pada 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MTsN 1 Kota Bima dan selesai pada tahun 2014. Dan melanjutkan SMA di MAN 2 Kota Bima pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu melanjutkan Kuliah Strata 1 (S1) di salah satu Universitas di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan Jurusan Keperawatan dan selesai pada tahun 2021. Kemudian sangat bersyukur saat ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa menuntut ilmu kembali, menyelesaikan program Profesi Ners di Uin Alauddin Makassar. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari Do'a dan dukungan dari kedua orang tua, keluarga dan teman-teman yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan dan berhasil menyusun tugas akhir yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan dengan Menggunakan Intervensi Terapi Psikoreligius Dzikir di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Sulawesi Selatan".

Penulis aktif dalam organisasi Intra sekolah (OSIS) di MAN 2 Kota Bima, kemudian saat di perguruan tinggi bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan sebagai Ketua bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) periode 2018/2019, pernah menjadi Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar 2020/2021 dan pernah menjadi Wakil Bendahara Umum Dewan Eksekutif (DEMA-U) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2020/2021.