

**KAJIAN ASPEK KLINIS RESEP PASIEN RAWAT JALAN DI
INSTALASI FARMASI KLINIK MUSAFIR UTAMA BAROMBONG
MAKASSAR PERIODE JULI – DESEMBER 2021**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

RETI DAYANTI

70100117043

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reti Dayanti

NIM : 7010011743

Tempat, Tanggal lahir : Wotu, 19 Oktober 1998

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Perjanjian Bungaya

Judul : Kajian Aspek Klinis Resep Pasien Rawat Jalan di
Instalasi Farmasi Klinik Musafir Utama
Barombong Makassar Periode Juli – Desember
2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 06 Juni 2022

Penyusun


RETI DAYANTI
NIM. 70100117043

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**Kajian Aspek Klinis Resep Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Klinik Musafir Utama Barombong Makassar Periode Juli – Desember 2021**” yang disusun oleh Reti Dayanti, NIM. 70100117043, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari 10 agustus 2022 M yang bertepatan dengan 12 muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 10 Agustus 2021 M
12 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(..... )
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	(..... )
Pembimbing I	: apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.	(..... )
Pembimbing II	: apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm., Klin.	(..... )
Penguji I	: apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc.	(..... )
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G. M.Ag	(..... )

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar, 


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai syarat meraih Gelar Sarjana farmasi. Sholawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya.

Skripsi dengan judul “Kajian Aspek Klinis Resep Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Klinik Musafir Utama Barombong Makassar Periode Juli – Desember 2021” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu serta memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami penulis ucapkan kepada orang tua tercinta bapak Makmur Lahuddin dan ibu Sarkiah yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada keluarga besar tercinta atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhanis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
2. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani., S.Si., M.Si. selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. Selaku wakil dekan II, dan bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku wakil dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu apt. Surya Ningsi., S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
4. Ibu apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si selaku pembimbing I dan ibu apt. Khaerni, S.Farm.,M.Farm.,Klin selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas bantuan bapak dan Ibu dengan pahala bahkan hal yang lebih baik di dunia dan akhirat kelak.
5. Ibu apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc. selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan saran dan kritiknya demi perbaikan dan kelengkapan skripsi ini, serta Dr. Wahyuddin G. M.Ag selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan sekaligus bimbingan terhadap kelengkapan dan perbaikan khususnya tinjauan islam dalam skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf jurusan farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh Pendidikan farmasi hingga saat ini.

7. Ibu apt. Alwiyah Nur Syarif, M.Si. yang telah menjadi dosen, kakak, serta sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Ibu Nursyam dan Capt. Rachmat Tj yang juga senantiasa memberikan support yang sangat luar biasa bagi peneliti.
9. Nahdah Nur Anisah Rachmat, My 24/7 saudara sekaligus sahabat tercinta terimakasih telah tumbuh kebersamai sejak 11 tahun terakhir dalam keadaan apapun. Terimakasih selalu menjadi 911 untuk reti.
10. Nurul Hidayah Yusran, *half of me* sumber dopamine, serotonin, oksitosin dan endorfin terimakasih atas semua waktu dan perhatian yang diberikan serta kasih sayang yang tiada henti sejak menyandang status maba farmasi hingga mencapai gelar S.Farm. terimakasih untuk semua sabar, pengertian, yang diberikan dalam menghadapi keras kepala, serta sikap saya yang sangat labil. Terimakasih telah menjadi rumah untuk reti
11. Angie Maulina, Yaumil, Nisa, Tina, Erna yang selama ini telah menemani saya dalam menghilangkan kejenuhan dalam penyusunan skripsi ini walaupun kalian sangat suka *nge-gas* but *I know U love me*.
12. Saudara(i)ku seperjuangan Farmasi Angkatan 2017 (KOVALEN) yang telah saling memberikan dukungan dan semangat, menemani dalam suka dan duka sejak awal menginjakan kaki di dunia kampus hingga saat ini tetap kompak dan sukses selalu.
13. Kakak-kakak Alumni dan adik-adik Farmasi UIN Alauddin Makassar yang telah berbagi cerita, motivasi, dan inspirasi selama di kampus peradaban.

14. Organisasi HMJ Farmasi dan Komunitas Belajar Avicanna Zone, yang telah mengajarkan pengembangan soft skill yang sangat bermanfaat dalam menempuh Pendidikan hingga saat ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT dan bermanfaat bagi semua pihak serta menjadi amal jariyah, aamiin.

Makassar, 10 Agustus 2022

Penyusun



Reti Dayanti

NIM. 70100117043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pelayananan Resep Berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.....	8
B. Obat.....	11
C. Resep.....	10
D. Komponen Resep.....	16
E. Jenis-Jenis Resep	18
F. Kerahasiaan Dalam Penulisan Resep.....	18
G. Permasalahan Dalam Penulisan Resep	20
H. Instalasi Farmasi	22
I. Tinjauan Keislaman	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	29

D. Populasi dan Sampel	30
E. Instrument Penelitian	32
F. Analisis Data Penelitian	32
G. Alur Penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Karakteristik Pasien	35
2. Data Penggunaan Obat	35
3. Aspek Klinis Resep	36
4. Gambaran Interaksi Obat Berdasarkan Tingkat Keparahan.....	36
5. Distribusi Penggunaan Obat.....	36
6. Potensi Interaksi Obat	38
B. Pembahasan.....	40
1. Karakteristik Pasien	40
2. Data Penggunaan Obat	40
3. Aspek Klinis Resep	41
4. Gambaran Interaksi Obat Berdasarkan Tingkat Keparahan.....	44
5. Distribusi Penggunaan Obat.....	45
6. Potensi Interaksi Obat	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	569

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tipe <i>medication error</i> secara umum	21
Tabel 2. Hasil Gambaran Karakteristik Pasien	35
Tabel 3. Hasil Penggolongan Data Jenis Penggunaan Obat	35
Tabel 4. Hasil Aspek Klinis Resep Pasien Rawat Jalan Klinik Musafir Utama	35
Tabel 5. Hasil Penggolongan Kejadian Interaksi Obat Berdasarkan Tingkat Keparahan	36
Tabel 6. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat Antihipertensi Klinik Musafir Utama	36
Tabel 7. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat Antidiabetes Klinik Musafir Utama	36
Tabel 8. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat Gout dan Hiperurisemia Klinik Musafir Utama	36
Tabel 9. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat Antihiperkolesteromia Klinik Musafir Utama	37
Tabel 10. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat ISPA Klinik Musafir Utama	37
Tabel 11. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat Antigastritis Klinik Musafir Utama	37
Tabel 12. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat Antihemoroid Klinik Musafir Utama	37
Tabel 13. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat Tambahan yang ada Pada Resep Pasien	38
Tabel 14. Hasil Evaluasi Data Mekanisme dan Interaksi Obat Pada Pasien Rawat Jalan di Klinik Musafir Utama	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pola penulisan resep	19
Gambar 2. Contoh penulisan resep	20
Gambar 3. Alur penelitian.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Meneliti	64
Lampiran 2. Kode Etik Penelitian	65
Lampiran 3. Data Pasien	



ABSTRAK

Nama : Reti Dayanti
NIM : 70100117043
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : Kajian aspek klinis resep pasien rawat jalan di instalasi farmasi
Klinik Musafir Utama Barombong Makassar periode juli –
desember 2021

Pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan yang langsung diberikan apoteker kepada pasien untuk menjamin kualitas hidup serta keselamatan pasien. Salah satu pelayanan kefarmasian yang dilakukan adalah pengkajian resep. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan obat pada peresepan di apotek klinik musafir utama pada aspek klinis resep yang mencakup ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, interaksi obat, duplikasi pengobatan, serta alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif non-eksperimental yang menggunakan desain penelitian deskriptif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 93 orang hasil penelitian menunjukkan aspek klinis kategori ketepatan indikasi (91,3%) terpenuhi, aspek ketepatan dosis (98,92%) terpenuhi, kategori waktu penggunaan obat menunjukkan (98,92%) terpenuhi, sebanyak (98,92%) resep tidak mengalami duplikasi, serta jenis interaksi yang paling sering terjadi berdasarkan tingkat keparahannya yaitu moderate (40,1%).

Kata kunci: *Aspek klinis, Resep*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Reti Dayanti
Student ID : 70100117043
Major : Pharmacy
Thesis Title : Study of prescription errors in clinical aspects of outpatient prescriptions at the pharmacy installation of the Musafir Utama Barombong Clinic, Makassar, July – December 2021

Pharmacists who specialize in clinical pharmacy provide direct care to patients in order to protect their safety and quality of life. Evaluation of prescriptions is one of the pharmaceutical services offered. This study intends to investigate the clinical aspects of prescribing at the clinic usafir utama, including accuracy of indications, drug interactions, medication duplication, contraindications, as well as allergies and unfavorable drug reactions. Non-experimental quantitative research using a descriptive research design is the methodology employed. The sample in this study consisted of 93 individuals, 48 of whom were female patients (51.61%) and 45 of whom were male patients (49.39%). The use of pharmaceuticals revealed that 84 prescriptions, or 90.32% of all prescriptions, contained two or more different types of drugs. Moderat 43 occurrences, or 40.1% of all interactions, occurred most frequently, whereas drug use patterns were most common. 26 prescriptions for amlodipin (8.2%) were written, and the combination of amlodipin and simvastatin had the highest potential for medication interactions, with up to 13 occurrences.

Keywords: prescription errors of clinical aspect, receipe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orientasi pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser, dari obat ke pasien yang mengacu kepada *pharmaceutical care*. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker memiliki peran sebagai *decision maker*, yang berarti memiliki landasan kerja pada keputusan akurat yang dibuat terkait dengan penggunaan obat. Kurangnya perhatian yang diberikan oleh apoteker / petugas apotik dalam memberikan obat kepada pasien dapat mempengaruhi adanya potensi interaksi obat (Sonia, 18). Paradigma yang terjadi dimasyarakat saat ini adalah semakin banyak obat yang dikonsumsi maka akan mempercepat peluang kesembuhan namun pada kenyataannya dengan penggunaan obat secara bersamaan maka peluang interaksi obat yang terjadi semakin besar (Kavanagh C, 2017).

Kesalahan (*error*) pengobatan bisa diartikan sebagai kegagalan dari suatu rencana yang akan dicapai atau kekeliruan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kesalahan tersebut bisa terjadi pada berbagai tahapan dalam proses pengobatan mulai dari diagnosis, penetapan terapi (dalam hal ini berwujud penulisan resep oleh dokter), penyiapan obat dan penyerahan obat oleh apoteker (*drug dispensing*), serta penggunaannya oleh pasien. Masing-masing tahap tersebut berpeluang untuk terjadinya kesalahan. Secara keseluruhan prevalensi dari kesalahan pemberian obat diperkirakan antara 1,7% - 59,1% dari total peluang kesalahan yang terjadi. Di negara – negara Timur Tengah rata – rata

kejadian kesalahan pemberian obat berkisar antara 7 – 90%. Di Asia Tenggara kejadian *medication error* berkisar antara 15 – 88% (Hines et al., 2018).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ada persepsian yang salah, informasi yang tidak sesuai tentang obat, baik yang diberikan oleh dokter maupun apoteker, serta cara penggunaan obat yang tidak benar oleh pasien dapat menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi pasien yang juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya (Oktarlina, 2017). Kerugian yang dialami pasien mungkin tidak akan tampak sampai efek samping yang berbahaya baru terjadi. Karena itu perlu perhatian yang cukup besar untuk mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kesalahan persepsian (Sheila, 2019). Kesalahan persepsian yang dapat terjadi misalnya pemberian dosis yang tidak tepat, dan adanya interaksi obat bila resep yang diberikan terdiri lebih dari satu jenis obat. Pemberian dosis obat yang melebihi dosis terapeutik dinyatakan sebagai dosis toksik, Apabila pemberian obat dosisnya kurang maka dapat berakibat tidak tercapainya efek terapeutik obat yang diinginkan dan terjadi kegagalan terapi (Joenes, 2016).

Penelitian terkait di *Royal Hobart Hospital* Tasmania, Australia, yang dilakukan selama sepuluh minggu, dari 691 pasien yang masuk rumah sakit, ditemukan 10% pasien masuk rumah sakit karena penggunaan obat. Dilaporkan bahwa 45,6% karena ketidaksesuaian dosis dan 4,4% disebabkan oleh interaksi obat (Stanton *et al.*, 2015). Penelitian lain yang dilakukan oleh (Marquito, 2014) di Kabupaten Pematang, terhadap 306 resep yang ditinjau dari aspek klinisnya, ditemukan 22,54% resep dengan frekuensi pemberian kurang. (Handayani, 2015) dalam laporan studinya melaporkan proporsi interaksi obat dengan obat lain (antar obat) berkisar antara 2,2% hingga 30% terjadi pada pasien rawat-inap dan 9,2% hingga 70% terjadi pada pasien rawat jalan. Menurut (Erlisa, 2015) dalam 240

resep 107 lembar mengalami interaksi obat dengan mekanisme farmakokinetik sebanyak 3,74%, dan farmakodinamik 5,81% sedangkan menurut (Risa, 2016) potensi interaksi obat pada pasien sepsis (13 pasien) didapatkan interaksi sebanyak 20 kombinasi obat yang memiliki potensi interaksi mayor dan moderat sebanyak 6 dan 14 kombinasi obat dengan jenis interaksi farmakokinetik sebesar 15 kombinasi obat dan interaksi farmakodinamik sebesar 5 kombinasi obat. Oleh karena itu, bagi farmasis sangatlah penting untuk mengembangkan suatu pendekatan sistematis terhadap pemantauan resep atau pasien sehingga dapat mencegah, mengidentifikasi, membuat prioritas dan mencari penyelesaian masalah-masalah terkait resep yang aktual dan potensial (Khairurrijal, 2018)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 (2014) pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku”. Untuk setiap alur pelayanan peresepan dilakukan upaya pencegahan agar dapat mengurangi kesalahan pemberian obat. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan pengkajian resep yang meliputi pengkajian sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan (Oktarlina & Wafiyatunisa, 2017).

Klinik adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorang yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialisik. Klinik musafir utama merupakan fasilitas kesehatan pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kepada pasien umum, BPJS, dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang mulai beroperasi sejak tahun 2016 dengan visi “memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien serta

mengutamakan mutu dan keselamatan pasien”. Instalasi farmasi yang berwenang dalam pelayanan kefarmasian harus dapat menjamin pelayanan yang dilakukan sudah tepat dan sudah sesuai dengan standar kefarmasian. Seorang apoteker harus bisa memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan adalah skiring resep atau pengkajian resep untuk mencegah adanya kelalaian pemberian informasi serta penulisan resep yang buruk dan tidak tepat. (Rauf et al., 2020)

Pada pelayanan kefarmasian di Apotek Klinik Musafir Utama belum terdapat data mengenai pengkajian resep terkhusus pada aspek klinis sehingga dari uraian di atas maka dilakukan penelitian tentang pengkajian resep berdasarkan PERMENKES RI No. 32 tahun 2016 aspek klinis pada pasien rawat jalan di Klinik Musafir Utama Barombong Makassar periode Juli – Desember 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran persepsian pada aspek klinis resep pasien rawat jalan di Apotek Klinik Musafir Utama Barombong Makassar Juli – Desember 2021?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Defenisi Operasional
 - a. Resep adalah pelayanan terhadap permintaan tertulis oleh dokter, dokter gigi dan dokter hewan terhadap apoteker dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Aspek klinis merupakan aspek yang ada pada resep meliputi ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, duplikasi pengobatan, alergi dan reaksi obat yang tidak diketahui, kontraindikasi dan interaksi obat

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian observasi dengan pengambilan data secara *retrospektif* untuk mengetahui aspek klinis resep pasien rawat jalan di instalasi farmasi Klinik Musafir Utama Barombong Makassar periode Juli – Desember 2021.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terkait oleh (Zulfiana,2016) *Studi Penggunaan Obat Pada Pasien Sepsis yang Berpotensi Menimbulkan Interaksi Obat di Ruang ICU RSUD Dr. Soetomo Surabaya*. Berdasarkan hasil penelitian terdapat potensi interaksi obat pada pasien yaitu sebanyak 20 kombinasi obat yang berpotensi menimbulkan interaksi obat, sedangkan untuk interaksi farmakokinetik terjadi 15 interkasi obat dan 4 interaksi obat pada interaksi farmakodinamik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Noviana, 2016) *Evaluasi Interaksi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Inap Di Bangsal Cempaka RSUD Panembahan Senopati Bantul Periode Agustus 2015*. Tercatat hasil kejadian interaksi obat yaitu 69 kasus (67,7%), sedangkan untuk interaksi yang paling sering terjadi yaitu penggunaan kaptopril dengan furosemide yang terjadi sebanyak 26 kejadiannya atau sekitar 27,1%.

Menurut penelitian yang dilakukan (Sheila, 2019) *Potensi Interaksi Obat Pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Rengas Pada Bulan Januari – Maret 2019* sebesar 25%. Jenis kombinasi 2 obat tersering yang berpotensi terjadi

interaksi yaitu amlodipin-simvastatin, amlodipin-metformin, dan diklofenak-glimepirid.

Berdasarkan penelitian (Sonia, 2018) *Potensi Interaksi Obat Pada Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Seogiri Lamongan Peiode Tahun 2017* dengan metode observasi mendapatkan hasil jumlah pasien yang mengalami interaksi obat sebanyak 326 jumlah kejadian dimana 17 merupakan tingkat keparahan minor, 6 merupakan tingkat keparahan moderat, dan 18% merupakan tingkat keparahan mayor.

Berdasarkan penelitian (Hannisa, 2017) *Evaluasi Interaksi Obat Potensial Pada Pasien Gastritis Dan Dyspepsia Di Rawat Inap RSUD Moewardi Tahun 2016* didapatkan hasil dari 157 pasien gastritis dan dyspepsia didapatkan 80 pasien (2,8%) mengalami interaksi obat potensial ada fase absorbs 31,25% interaksi fase distribusi 7,5% interaksi fase metabolisme 50% dan interaksi fase ekskresi 11,25%. Sedangkan tingkat keparahan interaksi 22,02% adalah minor, 74,31% moderat dan 3,67% mayor.

E. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa penggunaan obat pada peresepan di apotek klinik musafir utama pada aspek klinis resep yang mencakup ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan, duplikasi pengobatan, mengkategorikan interaksi obat dengan obat, serta melihat ada atau tidaknya alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki yang tertulis pada resep.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian terkhusus penggunaan obat agar dapat menghindari interaksi obat.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan dalam peresepan di Klinik Musafir Utama Barombong Makassar sehingga dapat mendukung upaya pelaksanaan *patient safety* dan sedapat mungkin meminimalisir kejadian *medication error*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Resep Berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016

Keputusan Menteri Kesehatan 2016 menyatakan bahwa instalasi farmasi merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan pembekalan kesehatan, dispensing obat, pengendalian mutu dan distribusi, penggunaan seluruh perbekalan kesehatan serta pelayanan farmasi klinik. Instalasi farmasi tersebut di pimpin oleh seorang tenaga ahli dibidangnya yaitu seorang Apoteker, asisten apoteker dan yang oleh tenaga ahli madya farmasi (D3), dan tenaga menengah farmasi (AA) yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku (Kemenkes, 2016).

Pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan yang langsung diberikan apoteker kepada pasien untuk menjamin kualitas hidup serta keselamatan pasien. Salah satu pelayanan kefarmasian yang dilakukan adalah pengkajian resep. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Dalam pengkajian dan pelayanan resep, apoteker bertanggung jawab dalam menganalisa adanya masalah terkait obat yang bila terdapat masalah terkait obat tersebut maka dapat dikonsultasikan dengan dokter penulis resep. Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang farmasis untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan. Apoteker melakukan pengkajian resep sesuai

dengan persyaratan administrasi, farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap (Kemenkes, 2016).

Aspek administratif merupakan suatu skrining awal ketika resep dilayani di instalasi farmasi rumah sakit maupun di apotek. Pengkajian administrasi resep diperlukan karena mencakup informasi di dalam resep diantaranya kejelasan tulisan obat keabsahan resep, serta kejelasan informasi di dalam resep (Megawati & Santoso, 2017). Persyaratan administrasi resep dalam (Kemenkes, 2016) meliputi :

1. Nama, umur, jenis kelamin, berat dan tinggi badan.
2. Nama, nomor izin, alamat dan paraf dokter.
3. Tanggal resep, dan
4. Ruang/unit asal resep. (Kemenkes, 2016)

Aspek farmasetik resep yang juga merupakan suatu skrining awal pada pelayanan resep yang menjadi suatu usaha yang penting dalam pencegahan *medication error* (Rauf et al., 2020) adapun yang termasuk dalam persyaratan farmasetik meliputi (Kemenkes, 2016):

1. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan.
2. Dosis dan jumlah obat.
3. Stabilitas, dan
4. Aturan cara penggunaan.

Aspek klinis dipilih untuk menjamin keselamatan pasien dan meminimalkan kesalahan pengobatan. Yang termasuk dalam persyaratan klinis menurut (Kemenkes, 2016) yaitu:

1. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat.
2. Duplikasi pengobatan.
3. Interaksi obat dan ROTD

B. Resep

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku”. Resep berfungsi untuk meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat sehingga pengobatan yang rasional dapat dicapai untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Ardianti, 2018). Pada prinsipnya resep dijadikan sebagai bentuk komunikasi yang mencakup kejelasan informasi pasien yang diberikan oleh dokter kepada apoteker. Penulisan resep dapat diartikan sebagai pemberian obat secara tidak langsung dengan menggunakan format dan kaidah penulisan yang telah diatur menurut undang-undang yang berlaku sedangkan yang berhak menulis resep adalah dokter umum, dokter gigi (terbatas pada pengobatan gigi dan mulut), dokter hewan (terbatas pada pengobatan hewan/pasiennya hanya hewan). (Murtini, 2016). Pihak apoteker sebagai penerima resep memiliki kewajiban penuh untuk melayani pasien secara cermat dan memberikan informasi terutama mencakup penggunaan obat serta mengoreksi jika terjadi kesalahan dalam penulisan (Mardiah, 2017).

1. Tujuan Penulisan Resep

Tujuan penulisan resep, menurut (Bilqis, 2015):

- a. Memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi serta meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat.
- b. Lebih memudahkan pasien dalam mengakses obat yang sesuai penyakit
- c. Golongan obat tidak dapat diserahkan kepada masyarakat secara bebas sehingga melalui penulisan resep pengawasan distribusi obat kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

d. Penulisan resep dapat membentuk pelayanan berorientasi kepada pasien.

2. Prinsip Penulisan Resep di Indonesia

Masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri tentang informasi apa yang tercantum dalam sebuah resep. Sedangkan untuk penulisan resep yang berlaku di Indonesia (Jas, 2009) dalam (Audina, 2018).

- a. Obat ditulis dengan nama paten atau dagang, generik, resmi atau kimia.
- b. Karakteristik nama obat yang ditulis harus sesuai dengan yang tercantum di label kemasan.
- c. Resep yang ditulis harus jelas dengan kop resmi.
- d. Bentuk sediaan dan jumlah obat ditentukan oleh dokter penulis resep.
- e. Signatura ditulis singkat dalam Bahasa latin.
- f. Pro atau peruntukan dinyatakan umur pasien.

C. Obat

Obat merupakan suatu bahan yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan serta menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit yang berguna bagi kesehatan, namun dapat memberikan dampak buruk apabila penggunaan dan pengelolaannya tidak benar (Djas, 2017).

Penggunaan obat harus sesuai dengan kebutuhan klinis pasien, obat yang diberikan harus tepat diagnosis dan penanganannya harus tepat indikasi sehingga keputusan untuk melakukan upaya terapi sesuai dengan spectrum penyakit. Penggunaan dosis yang tepat sangat menunjang efek terapi sehingga pemberian dosis harus diperhatikan agar tidak membahayakan status pasien, selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat adalah kemungkinan terjadinya interaksi obat, sebab semakin banyaknya item obat yang diresepkan dalam setiap lembar resep maka hal tersebut dapat menjadi faktor resiko terjadinya interaksi obat yang merugikan (Amalia, 2020)

Interaksi obat adalah pemberian dua atau lebih obat secara bersamaan yang dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi yang di timbulkan oleh satu obat dan obat lainnya dapat berupa interaksi yang menguntungkan dan sebaliknya juga dapat menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan (*antagonis*), namun terkadang juga dapat memberikan efek lain (BPOM, 2015)

Interaksi obat berdasarkan tingkat keparahan dari konsekuensi klinis yang dapat ditimbulkan digolongkan kedalam tiga bagian yaitu kategori ringan (*minor*) adalah ketika terjadi interaksi obat yang tidak menimbulkan masalah kesehatan yang bermakna. Selanjutnya yaitu kategori sedang (*moderat*) merupakan interaksi obat yang menyebabkan kondisi klinis pasien harus diawasi. Sedangkan untuk kategori berat (*mayor*) apabila interaksi obat tersebut membahayakan pasien termasuk nyawa pasien serta menyebabkan kerusakan/kecacatan yang mungkin terjadi (Dasopang, 2015).

Beberapa penyebab yang mempengaruhi interaksi obat :

- a. Pemberian obat yang banyak secara bersamaan pada suatu waktu yang disebut sebagai polifarmasi dapat menimbulkan interaksi obat.
- b. Pasien yang mengunjungi banyak dokter sekaligus tanpa memberitahukan tentang konsultasi dan pengobatan yang diberikan sebelumnya, dikarenakan terkadang pasien tidak puas dengan satu dokter.
- c. Pasien yang tidak mematuhi instruksi yang diberikan seperti mengkonsumsi bahan makanan yang dipantang, contoh mengkonsumsi keju saat mendapatkan terapi obat penghambat *monoamine oxidase* yang dapat menyebabkan krisis hipertensi berat (Nidhi 2012).

Studi menyebutkan bahwa proporsi interaksi obat dengan obat lain berkisar antara 10,2%-30% yang terjadi pada pasien rawat inap. Sedangkan sekitar 1,2% hingga 70% terjadi pada pasien rawat jalan (Sonia, 2018). Terdapat tiga tipe interaksi obat yaitu duplikasi, *opposition* dan *alteration*. Duplikasi dapat diartikan ketika dua obat dengan efek yang sama diberikan secara bersamaan, sehingga akan meningkatkan resiko terjadinya efek samping. *Opposition* adalah pemberian dua obat dengan efek yang berlawanan diberikan secara bersamaan yang kemudian akan menimbulkan interaksi atau menyebabkan menurunnya efektivitas salah satu obat atau keduanya. Sedangkan *alteration* yaitu terjadinya perubahan dari fungsi (absorbs, distribusi, metabolisme, dan ekskresi) suatu obat dikarenakan obat yang lain (Selvam, 2018).

1. Mekanisme Interaksi Obat

Mekanisme interaksi obat di dalam tubuh dibedakan menjadi dua kelompok yaitu interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Pada fase farmakokinetik menunjukkan waktu pelepasan obat dari bentuk sediaan menuju organ yang ditentukan. Obat yang dikonsumsi dapat mengikat protein darah dan mengalami metabolisme, terutama ketika melintasi hepar. Sedangkan fase farmakodinamik adalah ketika obat yang dikonsumsi berinteraksi dengan sisi reseptor biasanya protein membrane yang akan menimbulkan respon biologis (Haeria, 2017).

2. Interaksi Farmakokinetik

Aspek farmakokinetik obat didefinisikan sebagai setiap proses yang dilakukan oleh tubuh terhadap obat yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, distribusi dan ekskresi (ADME). Obat yang masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan efek dalam artian lain farmakokinetik merupakan perubahan obat di dalam tubuh dan jaringan berdasarkan perubahan waktu (Eria, 2021).

b. Absorpsi

Absorpsi merupakan proses pemindahan obat dari lokasi pemberian menuju aliran darah (Nurhayati, 2017 dalam Selvem). Obat-obat yang digunakan peroral biasanya akan diserap dari saluran cerna ke sistem sirkulasi. Absorpsi obat dapat terjadi melalui transport pasif maupun aktif. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian obat. Pada pemberian secara intravena, absorpsi berlangsung sempurna karena dosis total langsung obat mencapai sirkulasi sistemik. Sedangkan pemberian obat dengan rute lain hanya bisa menghasilkan absorpsi parsial sehingga menurunkan bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah jumlah fraksi suatu dosis obat yang mencapai tempat kerjanya atau cairan tubuh yang dilewati obat sebelum mencapai tempat kerjanya (Harvey, 2014).

c. Distribusi

Ketika obat diabsorpsi maka obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah menuju cairan ekstraseluler atau sel-sel jaringan (Risa, 2016). Organ yang menerima aliran darah yang lebih tinggi seperti hati, jantung dan ginjal akan menerima obat lebih cepat dibandingkan dengan organ yang menerima aliran darah rendah seperti otot, lemak dan jaringan perifer. Faktor yang memengaruhi distribusi obat adalah sejauh mana mengikat dengan protein plasma dan jaringan, obat-obatan yang saling berinteraksi selama proses distribusi untuk menempati tempat ikatan pada protein plasma (Selvam, 2018).

d. Metabolisme

Metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi didalam tubuh serta dikatalisis oleh enzim. Pada tahapan metabolisme molekul obat dalam tubuh di ubah menjadi lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak (polar) agar mudah di eksresikan melalui ginjal menjadi urin atau

empedu (Haeria, 2017). Lokasi utama metabolisme obat adalah hati, namun beberapa obat tertentu dapat mengalami biotransformasi dalam jaringan lain seperti ginjal dan usus (Harvey, 2014).

e. Ekskresi

Obat yang dieliminasi dalam tubuh dalam bentuk molekul utuh atau dalam bentuk metabolitnya. Ginjal merupakan organ utama dalam mengeluarkan obat. Ekskresi pada ginjal melalui 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus proksimal dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Perubahan fungsi pada ginjal akan memengaruhi proses tersebut. Selama masa deasa terjadi penurunan fungsi ginjal secara perlahan berkisar 1% tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan pada usia lanjut usia biasanya terjadi kerusakan ginjal. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat, air liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relative kecil (Haeria, 2017).

3. Interaksi Farmakodinamik

Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek aditif, sinergis, atau antagonis (Sa'adah 2016).

a. Efek Obat Aditif

Interaksi terjadi apabila pemberian dua atau lebih obat yang memiliki efek farmakologi yang sama saat diberikan secara bersamaan, dan menimbulkan efek dari penjumlahan dari masing-masing efek obat (Stockley, 2008 dalam Sonia 2018).

b. Efek Obat Sinergis

Interaksi yang terjadi apabila dua obat atau lebih yang tidak memiliki atau memiliki efek farmakologi yang sama diberikan secara bersamaan akan memperkuat efek obat lain (Sonia, 2018).

c. Efek Obat Antagonis

Efek dari kombinasi dua atau lebih obat yang berinteraksi yang memiliki efek farmakologi yang berlawanan. Efe yang ditimbulkan dari obat-obatan yang saling berinteraksi akan menghilangkan efek obat obat lain yang diberikan secara bersamaan (Sonia, 2018).

D. Komponen Resep

Dalam penulisan resep sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang resep yang lengkap harus memiliki komponen yang jelas dan mudah di pahami, komponen tersebut meliputi (Amalia, 2016):

1. *Inscriptio*

- a. Identitas dokter: nama, alamat dan nomor izin praktek dokter (SIP) dokter, alamat nomor telepon, kota, tempat, dan tanggal penulisan resep.
- b. Nama kota serta tanggal penulisan resep
- c. Tanda R/ pada bagian kiri resep yang merupakan singkatsn dari *recipe* yang artinya “harap diambil”

2. *Praescriptio/Ordonatio*

Praescriptio/Ordonatio merupakan komponen resep yang berisi nama obat serta jumlah dan bentuk sediaan yang diinginkan dan dosis obat

3. *Signatura*

Signatura yaitu petunjuk penggunaan terdiri dari tanda cara pakai, regimen dosis pemberian obat, rute dan interval waktu pemberian harus jelas demi keamanan dan keberhasilan terapi.

Menurut (Bilqis, 2015) ada beberapa tanda yang biasa dijumpai dalam penulisan resep diantaranya:

- a. Tanda segera, yang merupakan tanda peringatan diberikan agar pasien harus segera dilayani. Tanda segera atau peringatan dapat ditulis sebelah kanan atas atau bawah balnko resep. contoh tandatanda ini antara lain:

- 1) *Cito!*= segera
- 2) *Statim* = penting sekali
- 3) PIM (*Periculum in mora*) = berbahaya bila ditunda

Sedangkan untuk urutan yang didahulukan adalah PIM, *Statim*, dan *Cito!*

- b. Tanda tidak dapat diulang, *Ne iteratie* (N.I) Apabila dokter penulis resep tidak menghendaki resepnya diulang, makan tanda N.I ditulis sebelah atas blanko resep. Resep yang tidak boleh diulang adalah resep yang mengandung obat-obatan narkotik, psikotropik dan obat keras yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dan Menkes Republik Indonesia.

- c. Tanda resep dapat diulang, *Iteratie* (Iter). Merupakan tanda yang ditulis bila dokter penulis resep menginginkan agar resepnya dapat diulang. Penulisan *Iter* (*Iteritie*) ditulis di sebelah kanan atas resep dan beberapa kali pengulangan dapat dilakukan misalnya :

- 1) Iter 1x, artinya resep dapat dilayani 2x
- 2) Iter 2x, artinya resep dapat dilayani $1+2 = 3x$

- d. Tanda dosis segera dilampaui, tanda seru diberikan pada belakang nama obat jika dokter penulis resep sengaja memberikan obat dengan dosis yang melebihi dosis maksimumnya.

- e. Resep yang mengandung narkotik, resep dengan obat narkotik harus disimpan terpisah dengan resep lainnya. Pada resep yang mengandung narkotik tidak boleh terdapat tulisan *iterasi* yang artinya dapat diulang, tidak boleh ada tulisan m.i (*mihipsi*) yang berarti hanya untuk dipakai sendiri, tidak boleh terdapat tulisan u.c (*usus cognitus*) yang artinya pemakaiannya diketahui.

4. *Subscriptio*

Tanda tangan atau paraf dokter yang menuliskan resep dan berperan sebagai legalitas serta keabsahan resep tersebut.

5. *Pro*

Pro yang artinya “diperuntukkan” dicantumkan nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien.

E. Jenis-Jenis Resep

Jenis – jenis resep dibagi menjadi (Amalia, 2016)

1. Resep Standar, (*Resep Officinalis/Pre Compounded*) adalah resep yang komposisinya telah dibakukan dan terdapat dalam buku farmacope atau buku standar lainnya. Resep standar menuliskan obat jadi (campuran dari zat aktif) yang dibuat oleh pabrik farmasi dengan merek dagang dalam sediaan standar atau generik.
2. Resep *magistrales*, (*Resep Polifarmasi/Compounded*) merupakan resep yang telah dimodifikasi oleh dokter penulis resep, dalam hal ini dokter yang menentukan dosis dan bentuk sediaan sesuai kondisi pasien.
3. Resep *medicinal*, adalah resep obat yang telah jadi berupa obat paten, merek dagang, ataupun generik, dalam pelayanannya tidak mengalami peracikan.

F. Kerahasiaan Dalam Penulisan Resep

Resep adalah sarana komunikasi profesional antara dokter penulis resep, APA (penyedia/pemberi obat) dan penderita yang menggunakan obat. Oleh karena itu, resep seharusnya tidak diberikan atau diperlihatkan kepada yang tidak berhak karena resep bersifat rahasia. Rahasia dokter dan apoteker menyangkut penyakit penderita, khusus pada beberapa penyakit dimana penderita/pasien tidak ingin

orang lain mengetahuinya. Inilah yang menyebabkan resep harus dijaga kerahasiaannya (Audina, 2018).

Menurut (Syamsuni, 2007) dan (Jas, 2009) bahwa resep asli harus disimpan di apotek dan tidak boleh diperlihatkan kecuali oleh yang berhak, yaitu:

- a. Dokter penulis resep atau yang merawatnya.
- b. Pasien dan keluarga pasien yang bersangkutan.
- c. Paramedic/tenaga medis yang merawat pasien.
- d. Apoteker yang mengelola apotek bersangkutan.
- e. Aparat pemerintah serta pegawai seperti kepolisian, kehakiman, kesehatan yang ditugaskan untuk memeriksa.
- f. Petugas asuransi untuk kepentingan kelm pembayaran.

1. Pola Penulisan Resep

RUMAH SAKIT ABID ALZAM Jl. Perjanjian Bungaya No. 019, Makassar Telp : 15181920 / 12190098 No. Resep S/K/M :	TELAAH RESEP	
Tanggal..... Dr No SIP..... Poli/Bangsal.....	1. Tepat obat, dosis, frekuensi, dan rute pemberian obat	
	2. Duplikasi terapi	
Riwayat Alergi Obat <input type="checkbox"/> Tidak	3. Alergi Obat/ROTD	
<input type="checkbox"/> Ya, Nama obat :	4. Interaksi obat	
	5. Kontraindikasi	
R/ Nama obat, bentuk sediaan obat, wadah obat, jumlah wadah, aturan pakai, regmen dosis, rute, interval waktu, paraf dokter	VERIFIKASI	
	Benar pasien	
	Benar indikasi	
	Benar obat	
	Benar dosis	
	Benar rute	
	Benar frekuensi dan pemberian	
Nama : Tanggal lahir : Alamat :		

Gambar 1. Pola penulisan resep

2. Contoh Penulisan Resep

RUMAH SAKIT ALZAM Jl. Perjanjian Bungaya No. 019, Makassar Telp : 15181920 / 12190098	
No. Resep S/K/M :	
Tanggal :	No :
Dr :	
R/ Claneksi Forte Syr Fls I S 3 dd. Cth Iparaf	PRESCRIPTIO
R/ Toplexil elixir Fls I S 3 dd. Cth IIparaf	SUBSCRIPTIO
R/ Curcuma plus Syr Fls I S 3 dd. Cth Iparaf	
	INVOCATIO
Pro : Nama Pasien	Alamat/Hp :
TTL :	No. RM :

Gambar 2. Contoh penulisan resep

G. Permasalahan Dalam Penulisan Resep

Banyak permasalahan yang dapat dijumpai dalam penulisan resep, berdasarkan tahapannya kesalahan yang biasa dijumpai dibagi menjadi *prescribing error* (kesalahan peresepan), *dispensing error* (kesalahan penyebaran/distribusi), *administration error* (kesalahan pemberian obat) dan

patient compliance error (kesalahan kepatuhan penggunaan oleh pasien) permasalahan tersebut dikenal sebagai *medication error* (Susanti, 2016)

Tabel 1. Tipe *medication error* secara umum

Tipe	Keterangan
<i>Prescribing error</i> (kesalahan dalam peresepan)	Kesalahan pemilihan bentuk sediaan obat, dosis, rute, kesalahan berdasarkan indikasi, kontraindikasi, alergi yang tidak diketahui, terapi obat yang sedang dikonsumsi, penulisan resep yang tidak jelas , dan lain- lain yang menyebabkan terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien
<i>Omission error</i> (kesalahan karena kekurangan stok obat)	Kegagalan memberikan dosis obat pada pasien sampai jadwal berikutnya
<i>Wrong time error</i> (kesalahan dalam waktu pemberian)	Memberikan obat pada pasien diluar waktu dari interval waktu yang telah ditentukan
<i>Wrong patient</i> (salah pasien)	Memberikan obat kepada pasien yang salah
<i>Improper dose error</i> (kesalahan karena dosis yang tidak tepat)	Dosis obat yang diberikan kepada pasien lebih besar atau lebih kecil dari dosis yang dianjurkan oleh dokter/memberikan dosis duplikasi
<i>Wrong dosage form</i> (kesalahan dari dosis yang salah)	Kesalahan pemberian obat yang tidak sesuai dengan dosis / bentuk sediaan yang tidak sesuai
<i>Wrong drug preparation error</i> (kesalahan dari persiapan obat)	Kesalahan dalam mempersiapkan obat dengan bentuk sediaan yang tidak sesuai
<i>Wrong administration technique error</i> (kesalahan dari segi administrasi obat)	Kesalahan dalam prosedur / teknik saat memberikan obat
<i>Deteriorated drug error</i> (kesalahan pemberian obat yang aktivitasnya menurun)	Pemberian obat yang telah kedaluwarsa / memberikan obat yang telah mengalami penurunan
<i>Monitoring error</i> (kesalahan dalam pemantauan)	Kesalahan dalam pemantauan kelayakan dan deteksi permasalahan regimen yang telah

	diesepkan atau kegagalan menggunakan data klinis dan laboratorium untuk assessment respon pasien terhadap terapi obat yang telah diresepkan
<i>Compliance error</i> (kesalahan kepatuhan penggunaan obat oleh pasien)	Kesalahan yang ditimbulkan oleh pasien yang berkaitan dengan ketaatan penggunaan obat yang diresepkan

Selain itu menurut (Bilqis, 2015) kesalahan dalam penulisan resep yang paling sering dijumpai yaitu menuliskan resep dengan tidak jelas dan tidak dapat terbaca, menggunakan singkatan dalam menuliskan nama obat atau nomenklatur yang tidak terstandarisasi, menuliskan instruksi obat yang ambigu, tidak mencantumkan tanda tangan penulis resep. Serta kesalahan dalam transkripsi dengan menyalin obat secara tidak benar pada daftar obat pasien.

H. Instalasi Farmasi

Keputusan Menteri Kesehatan 2016 menyatakan bahwa instalasi farmasi merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan pembekalan kesehatan, dispensing obat, pengendalian mutu dan distribusi, penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit serta pelayanan farmasi klinik. Instalasi farmasi tersebut di pimpin oleh seorang tenaga ahli dibidangnya yaitu seorang Apoteker, asisten apoteker dan yang oleh tenaga ahli madya farmasi (D3), dan tenaga menengah farmasi (AA) yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku (Kemenkes, 2016).

1. Tugas Instalasi Farmasi

- a. Menyelenggarakan, mengkoordinasi, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi klinik yang optimal dan professional serta sesuai prosedur dan etik profesi.

- b. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu dan efesisien.
- c. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan seidaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan.
- d. Melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien
- e. Berperan aktif dalam tim farmasi dan terapi
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan farmasi klinis
- g. Memfasilitasi dan medorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit

2. Fungsi Instalasi Farmasi (Bilqis, 2015)

- a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
 - 1) Memilih sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis sesuai kebutuhan rumah pelayanan rumah sakit.
 - 2) Merencanakan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara efektif, efesien dan optimal.
 - 3) Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
 - 4) Memproduksi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
 - 5) Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai degan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.

- 6) Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian
 - 7) Mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ke unit-unit pelayanan rumah sakit
 - 8) Melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu
 - 9) Melaksanakan pelayanan obat “unit dose” / dosis sehari.
 - 10) Mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - 11) Melakukan pemusnahan, penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - 12) Melakukan administrasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
- b. Pelayanan Farmasi Klinik
- 1) Mengkaji serta melaksanakan pelayanan resep atau permintaan obat.
 - 2) Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat.
 - 3) Melaksanakan rekonsiliasi obat.
 - 4) Memberikan informasi serta edukasi terkait penggunaan obat yang baik berdasarkan resep maupun obat non resep kepada pasien/keluarga pasien.
 - 5) Mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - 6) Melaksanakan visit mandiri maupun bersama dengan tenaga kesehatan yang lain.
 - 7) Melaksanakan pemantauan terapi obat (PTO).
 - 8) Melaksanakan evaluasi penggunaan obat (EPO).
 - 9) Melaksanakan dispensing sediaan steril seperti melakukan pencampuran obat, menyiapkan nutrisi parenteral, melaksanakan penanganan sediaan

sitotoksik, serta melaksanakan pengemasan ulang sediaan steril yang tidak stabil.

10) Melaksanakan pelayanan informasi obat (PIO) serta melaksanakan penyuluhan kesehatan rumah sakit (PKRS).

I. Tinjauan Islam

Al-Qur'an telah mengajarkan kita agar bisa bersikap kritis, dengan cara menggunakan pendengaran, penglihatan, serta akal pikiran. Oleh sebab itu, ajaran islam melarang orang beraqlid yaitu mengikuti saja tanpa mengetahui dalil atau sumber rujukan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam hal ini pelayanan resep kepada pasien, kita harus memiliki pedoman resep yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga mampu meminimalisir terjadinya kekeliruan yang dapat merugikan pasien seperti *medication error*. Salah satu ayat yang relevan dengan pengkajian resep dari aspek klinis yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar Ayat 49.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran*”
(Kemenag, 2019).

Dalam ayat di atas, maka didapatkan bahwa Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu dengan aturan yang tertentu bukan karena suatu kebetulan. Menurut tafsir Ibnu Katsir seluruh makhluk hidup diciptakan-Nya sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Segala sesuatu ditetapkan ukurannya bahkan kelemahan dan kecerdasan. Kadar tersebut juga dituangkan ke dalam bentuk hubungan sebab dan akibat, yang tidak akan berubah dan berselisih. Adapun secara istilah, kadar dapat dipahami sebagai ilmu (teori) Allah, yang meliputi ukuran dan ketetapan (aturan). Oleh karena itu, tidak ada

satupun, baik di langit ataupun bumi, kecil ataupun besar, kecuali akan terjadi atau berlaku sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam dunia medis obat yang diberikan kepada pasien tentu saja memiliki ukuran atau dosis yang sebelumnya telah ditetapkan. Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari dengan ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah dan hukum sebab akibat.

Penjelasan dari Ibnu hajar Al-Asqalani rahimahullahu, beliau menjelaskan dengan lebih rinci bahwa obat sesuai dosisnya dengan umur, kebiasaan, kombinasinya dengan apa saja dan lain-lainnya. Beliau berkata “seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan dan daya tahan fisik. karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit, jika dosisnya berkurang maka tidak bisa menyembuhkan dengan total dan jika dosisnya berlebih dapat menimbulkan bahaya yang lain” (Fathul Baari 10/169-170,)

Selain di ajarkan untuk taat kita juga di ajarkan untuk selalu mengevaluasi diri, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr/59 ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Kemenag, 2019).

Muhasabah atau evaluasi diri adalah cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang telah kita lakukan. Evaluasi dibutuhkan baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Sebagai seseorang yang beriman ayat di atas memberikan nasehat kepada kita semua agar senantiasa memuhasabah atau

mengevaluasi apa yang telah kita telah persiapkan untuk bekal kita akhirat nanti dan dalam amanah sebagai tenaga kesehatan evaluasi agar bisa menjadi bahan perbaikan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Sebagai seorang farmasis tentu saja kita harus memiliki sifat ketelitian yang lebih tinggi agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan pasien seperti ayat dalam Al-Qur'an (Al-Hujurat: 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
 دَمِيرٌ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu (Kemenag, 2019).

Menurut tafsir Jalalayn (Hai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita) maka periksalah oleh kalian kebenaran berita apakah itu benar atau berdusta. Menurut suatu qiraat dibaca Fatatsabbatuu berasal dari lafal Ats-Tsabaat, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya (agar kalian tidak tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum) menadi Ma'ul dari lafal Fatabayyanuu, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah kepada suatu kaum (tanpa mengetahui keadaannya) menjadi Hal atau kata keterangan keadaan dari Fai'il yakni tanpa sepengetahuannya (yang menyebabkan kalian) membuat kalian (atas perbuatan kalian itu) yakni berbuat kekeliruan terhadap kaum tersebut menyesal) selanjutnya Rasulullah saw. Mengutus Khalid kepada mereka sesudah mereka kembali ke negerinya.. ternyata Khalid tiada menjumpai mereka melainkan hanya ketaatan dan kebaikan belaka, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw.

Jadi penelitian ini sangat kongkrit dengan dalil baik kepatuhan kepada pemimpin (*Ulil Amri*), serta evaluasi dan pelayanan kepada pasien. Semua aspek ini akan menjadi bahan referensi dalam menyingkronkan Islam dan Kesehatan yang tentunya menjadi nasehat bagi kita semua sebagai tenaga medis yaitu farmasi, dokter, perawat atau yang lainnya yang intinya kita memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental yang menggunakan desain penelitian deskriptif, artinya subjek yang digunakan tidak mendapatkan intervensi atau perlakuan selain itu fenomena yang ada diobservasi apa adanya dengan tujuan agar mampu menjelaskan hubungan antar variabel dan data yang telah didapatkan dideskripsikan secara objektif dengan bantuan tabel atau gambar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif *retrospektif*, artinya pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dengan melihat kebelakang. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran nominal yaitu suatu skala yang paling sederhana yang disusun menurut jenis/kategorinya dan fungsi bilangan hanya digunakan sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik (Sudaryono, 2019).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Klinik Musafir Utama Barombong Makassar.

2. Waktu Penelitian

Waktu pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada Januari 2022.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan elemen dalam wilayah generalisasi mencakup objek dan subjek yang memiliki karakteristik serta kuantitas untuk diteliti (Siyoto & Sodik, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh resep pasien rawat jalan di Apotek Klinik Musafir Utama Barombong Makassar Juli – Desember 2021.

2. Sampel

Sampel penelitian merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut (Siswanto, 2018) sampel adalah bagian yang dipilih menggunakan cara tertentu yang akan mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah resep pasien rawat jalan periode Juli – Desember 2021.

a. Penentuan Besaran Sampel

Penentuan jumlah sampel berdasarkan rumus slovin telah banyak digunakan oleh peneliti, karena pendekatan rumus slovin dinilai mudah dan praktis dalam penggunaannya. Pendekatan pengambilan sampel berdasarkan slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimal (n) jika diketahui populasi (N) pada taraf signifikan α dengan rumus (Ismaya et al., 2019):

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Total populasi

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel

Besaran sampel penelitian dengan menggunakan pendekatan rumus slovin akan ditentukan oleh nilai tingkat kesalahan, semakin besar tingkat kesalahan yang digunakan maka semakin kecil jumlah sampel yang diambil.

Tingkat kesalahan 10 % dengan jumlah populasi sebanyak 1344

$$n = \frac{1344}{(1 + 1344 \times (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{1344}{(1 + 1344 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{1344}{14,44}$$

$n = 93,07$ (dapat dibulatkan menjadi 93 jadi sampel yang digunakan yaitu 93 orang)

b. Kriteria Sampel

Kriteria Sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1) Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi merupakan suatu karakteristik yang perlu dipenuhi bagi setiap anggota populasi yang telah diseleksi dan dijadikan sampel penelitian (Notoatmodjo, 2017). Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini adalah seluruh resep pasien rawat jalan periode Juli – Desember 2021 yang menebus resep di apotek klinik musafir dengan jumlah obat yang diresepkan 2 atau lebih.

2) Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kriteria yang tidak dapat diambil sebagai sampel pada populasi (Notoatmodjo, 2017). Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah resep yang rusak serta rekam medik yang tidak lengkap

c. Cara Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terkait resep dari aspek klinis pada pasien rawat jalan di Klinik Musafir Utama Barombong Makassar Juli – Desember 2021, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder selanjutnya

sampel yang telah diambil berdasarkan teknik *random sampling* yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata sehingga populasi yang diambil homogen jadi setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel menggunakan rumus slovin dengan memilih n (jumlah sampel) dari N (jumlah populasi) secara random (Ardianti, 2018) untuk mendapatkan data yang representatif, dikumpulkan dan dilakukan analisis.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun parameter atau indikator yang digunakan dalam penelitian. Instrument yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa tabel *chek list* kesesuaian aspek klinis menurut Permenkes no 72 tahun 2016 serta resep pasien rawat jalan, dan data rekam medik di Klinik Musafir Utama Barombong Makassar Juli – Desember 2021.

F. Analisis Data Penelitian

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dari penelitian untuk menentukan masalah yang akan diteliti dan menganalisis situasi kemudian melakukan diskusi untuk pengajuan izin penelitian dengan pihak RSUD Klinik Musafir Utama Barombong Makassar Harun Lasusua Kolaka Utara.

2. Tahap Pengambilan Data

Pada tahap ini, peneliti telah mendapatkan izin dari pihak Klinik Musafir Utama Barombong Makassar. Selanjutnya dilakukan pengambilan data secara *retrospektif*. Resep yang diambil yaitu resep pada Juli – Desember 2021 kemudian dilakukan analisis aspek klinis resep. Dilanjutkan dengan transkripsi data yang

dikumpulkan dalam logbook dan komputer. Pemrosesan data dilakukan dalam tahapan berikut:

a. Editing

Hal ini dilakukan dengan cara meneliti data mentah, tetapi terlebih dahulu memeriksa kebenaran data yang diperoleh dan membuang data yang tidak memenuhi kriteria penelitian.

b. Coding

Dengan pengkodean untuk memudahkan peneliti memasukkan data yang diperoleh dari resep dan rekam medis.

c. Entry Data

Setelah coding, data dimasukkan ke dalam program Microsoft Excel dalam bentuk tabel.

d. Cleaning Data

Dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dimasukkan ke dalam sistem komputer untuk menghindari ketidaklengkapan atau kesalahan data.


3. Tahap Pengelolaan Data

Analisis data dilakukan dengan *microsoft excel 2019* dan akan di sajikan dalam bentuk tabel dan deskriptif pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tahap berikut :

- a. Melakukan pengelompokkan berdasarkan demografi pasien yang meliputi persentase jenis kelamin dan sebaran usia (Hidayat, 2019)
- b. Mengakaji penggunaan obat meliputi ketepatan indikasi, dosis, duplikasi pengobatan, serta interaksi obat dengan obat (Kemenkes, 2016)
- c. Menganalisis interaksi obat yang diberikan kepada pasien dengan merujuk ke *stockley's Drug Interaction Ninth Edition* (Presyon, 2015)

- d. Mengkategorikan tingkat keparahan interaksi obat mayor, moderat, dan minor berdasarkan *Drug Interaction Facts* (Tatro, 2011)
- e. Mengklasifikasikan distribusi penggunaan obat (Hidayat, 2019)
- f. Menyimpulkan hasil kajian aspek klinis berdasarkan permenkes no 72 tahun 2016.

G. Alur Penelitian



Gambar 3. Alur penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Pasien

Tabel 2. Karakteristik Resep Pasien Rawat Jalan Klinik Musafir Utama Periode Juli – Desember 2021

No	Karakteristik pasien		
1	Jenis kelamin	Laki-laki 45 pasien	Perempuan 48 pasien
		48,3%	51,61%

2. Data Penggunaan Obat

Tabel 3. Hasil Akumulasi Data Jenis Penggunaan Obat Pada Aspek Klinis Resep Pasien Rawat Jalan Klinik Musafir Utama Periode Juli – Desember 2021

Kategori	Jumlah	Jumlah Resep	Persentase
Jenis Obat	2 - ≤ 5	84	90,32%
	≥ 5	9	9,68%
Total		93	100%

3. Aspek Klinis Resep

Tabel 4. Hasil Evaluasi Aspek Klinis Resep Pasien Rawat Jalan Klinik Musafir Utama Periode Juli – Desember 2021

Kategori	Jumlah	keterangan	Persentase %
Tepat indikasi	85	Terpenuhi	91,3%
	8	Tidak terpenuhi	8,60%
Tepat dosis	92	Terpenuhi	98,92%
	1	Tidak terpenuhi	1,07%
Waktu penggunaan	92	Terpenuhi	98,92%
	1	Tidak terpenuhi	1,07%

Duplikasi	92	Terpenuhi	98,92%
	1	Tidak terpenuhi	1,07%
ROTD	93	Tidak terpenuhi	100%

4. Gambaran Interaksi Obat Berdasarkan Tingkat Keparahan

Tabel 4. Penggolongan Kejadian Interaksi Obat Berdasarkan Tingkat Keparahan Resep Pasien Rawat Jalan Klinik Musafir Utama Periode Juli – Desember 2021

Tingkat keparahan	Jumlah	Persentase (%)
Mayor	12	11,2%
Moderat	43	40,1%
Minor	8	7,4%
Tidak terjadi interaksi	44	41,3%
Total		100%

5. Distribusi Penggunaan Obat

Tabel 5. Hasil Evaluasi Data Penggunaan Obat Klinik Musafir Utama Periode Juli – Desember 2021

No.	Antihipertensi	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Calsium Channel Blokers (CCB)	Amlodipin	26	8,2%
2	Calsium Channel Blokers (CCB) + Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI)	Amlodipin + Kaptopril	1	0,3%
No.	Antidiabetes	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Biguanid	Metformin	8	2,5%
2	Sulfonilurea	Glimepirid	7	2,2%
No.	Antihiperurisemia	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Xantin Oxidase Inhibitor	Allopurinol	3	0,9%
2	Analgetik Antipiretik & Antiinflamasi /Nsaid	Meloxicam Asam Mafenamat	7 8	2,2% 2,5%

		Na Diclofenak	6	1,8%
3	Kortikosteroid	Methylprednisolon	5	1,5%
No.	Antihiperkolestromia	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Statin	Simvastatin Atorvastatin	19 9	6,0% 2,8%
No.	ISPA	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Antibiotik	Amoxicillin Cefadroxil	8 7	2,5% 2,2%
2	Analgetik Antipiretik	Paracetamol Ibuprofen	24 1	7,5% 0,3%
3	Kortikosteroid	Methyl Prednisolon Dexamethasone	22 3	6,9% 0,9%
4	Mukolitik	Acetylcysteine Ambroxol	3 6	0,9% 1,8%
5	Ekspektoran	Guaifenesin	3	0,9%
6	Antihistamin	CTM	6	1,8%
No.	Gastritis	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Antasida	Antasida Doen Tab Hufamag	8 2	2,5% 0,6%
2	Proton Pumb Inhibitor	Omperazole Lanzoprazol	18 2	5,6% 0,6%
3	Prokinetik	Domperidone Metoclopramide	1 1	0,3% 0,3%
4	Antagonis Reseptor H2	Ranitidin	4	1,2%
5	Sitoprotektif	Sukralfat Episan	3 1	0,9% 0,3%
No.	Antihemoroid	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Laksatif	Antihemoroid	3	0,9%
2	Pencahar	Dulcolax	3	0,9%
No	Kelas Terapi Vitamin	Nama Obat	Jumlah	Persentase
5	Vitamin Dan Mineral	Vitamin B12 Vitamin B1 Vitamin B Comp Vitamin C Neurodex Corovit	15 9 9 12 11 4	4,7% 2,8% 2,8% 3,7% 3,4% 1,2%

		Caviplex	9	2,8%
		Corobion	5	1,5%
		Selcom C	3	0,9%

6. Potensi Interaksi Obat

Tabel 6. Hasil Evaluasi Data Interaksi Obat Pada Pasien Rawat Jalan di Klinik Musafir Utama Periode Juli – Desember 2021

Obat yang Berinteraksi	Tingkat Keparahan	Mekanisme	Jumlah
Amlodipin Simvastatin	Mayor	Amlodipin secara signifikan meningkatkan AUC HMG-coa reductase inhibitos setelah pemberian simvastatin sehingga meningkatkan resiko kerusakan hati dan rhabdomyolisis (Stockley, 2015)	13
Omeprazole Simvastatin	Moderat	PPI dan inhibitor HMG-coa reduktase tergolong substrat P-glikoprotein dan CYP450 3A4 . Omeprazole meningkatkan konsentrasi plasma simvastatin sehingga mengakibatkan kerusakan hati dan resiko terkait miopati. (Tatro, 2011)	9
Amlodipin Na.diclofenac	Moderat	Kombinasi obat ini dapat meningkatkan tekanan darah (Tatro, 2011)	1
Ciprofloxacin amlodipin	Moderat	Ciprofloxacin dapat meningkatkan toksisitas dari amlodipin (Tatro, 2011)	1
Ciprofloxacin asam mefenamat	Moderat	Pemberian ciprofloxacin dengan asam mefenamat dapat meningkatkan resiko toksisitas SSP (Stockley, 2015)	3
Ciprofloxacin metformin	Moderat	Pemberian ciprofloxacin dengan metformin dapat meningkatkan efek hipoglikemia (Stockley, 2015)	1
Methylprednisolon meloxicam	Moderat	Kombinasi kedua obat ini dapat menimbulkan efek gastrointestinal seperti inflamasi, perdarahan dan	3

		ulser (Stockley, 2015)	
Methylprednisolon asam mefenamat	Moderat	Pemberian kortikosteroid bersamaan dengan nsaid dapat meningkatkan risiko perdarahan pada gastrointestinal dan ulser (Stockley, 2015)	3
Methylprednisolon Na. Diclofenac	Moderat	Penggunaan bersama kedua obat ini dapat Mengakibatkan peningkatan resiko ulcer pada saluran pencernaan. Hal ini dikarenakan keduanya bekerja tidak selektif pada COX 1 sehingga proteksi alami lambung semakin berkurang (Stockley, 2015)	1
Antasida dexametasone	Moderat	Dexamethasone merupakan golongan kortikosteroid jika digunakan bersamaan dengan antasida akan menyebabkan interaksi berupa penurunan kadar glukokortikoid darah sehingga terjadi peningkatan produksi asam lambung (Stockley, 2015)	2
Dexametasone Asam mefenamat	Moderat	Dexamethason bersama dengan asam mefenamat dapat meningkatkan risiko efek samping pada saluran pencernaan Seperti peradangan, pendarahan, ulserasi (ulkus GI), dan kadang perforasi (Stockley, 2015)	1
Amlodipin meloxicam	Moderat	Dapat meningkatkan tekanan darah (Stockley, 2015)	1
Antasida Sukralfat	Moderat	Sukralfat mengurangi pengikatan Dari antasida dan mengurangi efek terapi (Tatro, 2011)	3
Omeprazole sukralfat	Moderat	Pemberian omeprazole dapat mengurangi pengikatan sukralfat sehingga mengurangi efek terapi dari sukralfat (Tatro, 2011)	1

Ciprofloxacin methylprednisolon	Moderat	Interaksi yang terjadi pada pemberian secara bersamaan kortikosteroid dan fluorokuinolon dapat mempotensi resiko tendinitis (Tatro, 2011)	1
Salbutamol methylprednisolon	Minor	Penggunaan salbutamol dengan kortikosteroid metilprednisolon dapat menyebabkan efek hypokalemia (Stockley, 2015)	1
Methylprednisolon Amlodipin	Minor	Methyl prednisolon dapat mengurangi efek amlodipin dalam menurunkan tekanan darah (Tatro, 2011)	2
Omeprazole glimpepirid	Minor	Omeprazole dapat meningkatkan Efek dari glimpepirid (Stockley, 2015)	1
Ranitidin Asam mefenamat	Minor	Pemberian bersama antara NSAID dengan golongan H2 antagonis menyebabkan penurunan kadar plasma NSAID (Tatro, 2011)	1

B. Pembahasan

1. Karakteristik Pasien

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang di peroleh dari resep dan rekam medik pasien rawat jalan di klinik musafir utama periode juli – desember 2021 yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis karakteristik pasien dilakukan untuk mengetahui angka maupun jumlah pasien yang melakukan pengobatan rawat jalan di klinik musafir utama. Berdasarkan tabel 2 di ketahui bahwa jumlah pasien perempuan lebih banyak yaitu 48 pasien (51,61%) sedangkan untuk pasien laki-laki yang terdiri dari 45 pasien (48,3%).

2. Data Penggunaan Obat

Resep yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rumus slovin yaitu 93 resep. Berdasarkan hasil penelitian resep yang diberikan mengandung jumlah obat paling sedikit yaitu 2 jenis obat dan paling banyak yaitu 6 jenis obat.

Berdasarkan tabel 3 data penggunaan obat menunjukkan bahwa resep yang mengandung 2 - 4 jenis obat yaitu sebanyak 84 resep (90,32%) sedangkan untuk resep dengan jumlah obat ≥ 5 sebanyak 9 resep (9,68%). Obat tersebut mencakup seluruh jenis obat yang diresepkan kepada pasien. Menurut (eva, 2015) semakin banyak jumlah obat yang terdapat dalam satu lembar resep maka kemungkinan adanya potensi interaksi yang terjadi semakin besar. Jumlah obat yang terdapat pada tiap lembar resep mengandung 2 – 4 obat dikategorikan menjadi polifarmasi minor. Sedangkan untuk resep yang mengandung ≥ 5 obat dikategorikan sebagai polifarmasi mayor. Berdasarkan data dari tabel 3 didapatkan bahwa jumlah rata-rata obat setiap lembar resep dalam penelitian ini adalah 4 macam obat sehingga polifarmasi minor lebih banyak daripada polifarmasi mayor.

3. Aspek Klinis Resep

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diklinik musafir utama pada aspek klinis yang meliputi ketepatan indikasi, dosis, waktu penggunaan, duplikasi pengobatan serta ROTD (tabel 3) menunjukkan bahwa 85 resep (91,3%) memenuhi persyaratan ketepatan indikasi namun terdapat 8 resep (8,06%) yang tidak tepat indikasi. Salah satunya yaitu dapat dilihat pada kode 45 lampiran pasien dengan diagnosis diabetes mellitus tipe II yang pemeriksaan gula darah sewaktu didapatkan 257 mg/dL, kolesterol 289 mg/dL, tekanan darah menunjukkan angka 14/93mmHg dengan keluhan batuk disertai sakit kepala, berdasarkan resep yang diberikan tidak terdapat obat untuk penanganan diabetes melitus pasien. Dalam hal ini tidak terdapat obat yang diberikan untuk menurunkan nilai gula darah sementara kembali menjadi normal. Pasien hanya diberikan antihipertensi berupa amlodipine 10 mg, atorvastatin 20 mg, methylprednisolone 4 mg, serta sanadryl syp. Adapun keputusan pemilihan obat

yang diresepkan didasari pada indikasi penyakit serta pemilihan obat yang efektif dan aman. Yang dimaksud dengan ketepatan indikasi adalah ketepatan penggunaan obat yang sesuai dengan diagnosa penyakit yang akurat karena setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik (Nuryati, 2017).

Pada aspek tepat dosis terdapat 92 resep (98,92%) yang memenuhi persyaratan dan 1 resep (1,07%) tidak terpenuhi. dapat dilihat pada kode 60 lampiran pasien dengan diagnosis hipertensi nilai tekanan darah 200/120 mmHg dan kolestrol 238 mg/dL pada resep diberikan simvastatin 20 mg dengan aturan pakai 2x1. Menurut (Hidayah,2018) pasien yang mendapatkan amlodipin dan simvastatin dalam satu resep maka simvastatin dimulai dari dosis terendah. Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan akan beresiko menimbulkan efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan (Nurhayati, 2017).

Berdasarkan penelitian pada aspek waktu penggunaan obat didapatkan hasil 92 resep (98,92%) terdapat petunjuk penggunaan obat dalam jangka waktu terapi yang sesuai dengan anjuran. Namun 1 resep (1,07%) tidak terpenuhi pada kode lampiran 60, simvastatin 20 mg dengan aturan pakai 2x1 diberikan kepada pasien dengan kolestrol 238 mg/dL hal ini tidak sesuai dengan peneltian yang dilakukan oleh (Mortensen, 2018) menyatakan bahwa simvastatin seharusnya diminum 1x1 saat akan tidur dimalam hari untuk mendapatkan terapi secara bermakna. Hal ini disebabkan karena simvastatin adalah *pro-drug* dengan waktu paruh cukup singkat yaitu sekitar 3 jam. Mengonsumsi simvastatin sebelum tidur mmaksimalkan efek hambatan enzim HMG-CoA reductase membentuk kolestrol yang beraksi saat tubuh terlelap.

Sedangkan untuk aspek klinis duplikasi pengobatan yang dapat diartikan sebagai pemberian dua obat atau lebih dengan efek yang sama untuk indikasi yang sama namun kombinasi obat tersebut tidak dibutuhkan atau bahkan dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Duplikasi pengobatan yang terjadi di klinik musafir utama berdasarkan tabel yaitu 92 resep (98,92%) tidak mengalami duplikasi dan 1 resep (1,07%) mengalami duplikasi. Resep yang mengalami duplikasi dapat dilihat pada lampiran kode 54 pasien gerd diberikan 2 jenis obat hufamag syr dan antasida syr dengan golongan yang sama yaitu golongan antasida.

Aspek klinis Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) didefinisikan sebagai setiap efek berbahaya yang tidak diinginkan dan terjadi secara tidak sengaja dari suatu obat yang timbul pada pemberian obat dengan dosis normal pada manusia untuk tujuan pencegahan, diagnosa, atau terapi dan modifikasi fungsi fisiologis (Lovia, 2019). Bentuk pemantauan terhadap timbulnya reaksi obat yang tidak dikehendaki dirangkum dalam suatu kegiatan yang dikenal dengan farmakovigilans yaitu suatu ilmu dan aktivitas yang berhubungan dengan pendeteksian, penelian, pemahaman dan pencegahan kejadian tidak diinginkan atau kejadian lainnya yang terkait dengan penggunaan obat. Identifikasi ROTD memerlukan penilaian kausalitas yaitu metode yang menunjukkan hubungan antara obat dan reaksi yang mungkin terjadi dengan bantuan skala penilaian. Namun pada penelitian ini, ROTD hanya dilihat pada telaah serta verifikasi yang tertulis pada resep hingga didapatkan hasil sebanyak 93 resep tidak memenuhi syarat aspek klinis ROTD hal ini disebabkan karena klinik musafir utama belum menerapkan penggunaan resep yang melibatkan telaah resep serta verifikasi pasien.

4. Gambaran Interaksi Obat Berdasarkan Tingkat Keparahan

Interaksi obat berdasarkan tingkat keparahan dibagi menjadi mayor, moderat dan minor. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk menilai risiko maupun manfaat terapi. Dengan mengatur dosis yang sesuai, modifikasi maupun mengatur jadwal pemberian, efek negatif dari interaksi obat dapat dihindari. Jenis interaksi mayor merupakan interaksi yang dapat menimbulkan efek membahayakan serta mengakibatkan kerusakan permanen sehingga memerlukan monitoring/intervensi. Interaksi moderat tergolong dalam interaksi yang menyebabkan perubahan status klinis pasien dalam hal ini terapi tambahan dan rawat inap mungkin dibutuhkan. Sedangkan interaksi minor memiliki efek yang tidak terlalu mengganggu sehingga tidak memerlukan terapi tambahan (Yadi, 2019). Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5 menunjukkan jumlah tingkat keparahan yang paling banyak yaitu moderat sebanyak 43 jumlah kejadian (40,1%). Interaksi mayor 12 jumlah kejadian (11,2%) dan interaksi minor 8 kejadian (7,4%). Sedangkan obat yang tidak berinteraksi sebanyak 44 (41,3%). Dalam penerapan *pharmaceutical care* yang berfokus pada pasien, apoteker dituntut untuk dapat mencegah dan mengatasi adanya interaksi obat dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan tingkat keparahan interaksi. (Irianti, 2021) menyatakan bahwa interaksi minor umumnya masih dapat ditoleransi, jika ditemukan dalam resep maka tidak diperlukan adanya perubahan regimen terapi dan dapat dilakukan penanganan seperti penjadwalan waktu pemberian obat. Interaksi moderat memerlukan perhatian medis seperti pemantauan efek samping pada pasien sedangkan interaksi mayor memerlukan intervensi/penanganan medis dengan cara menghindari penggunaan obat secara bersamaan serta memonitoring secara berkala sebab kombinasi obat yang berinteraksi mayor dianggap kontraindikasi dan harus dihindari.

5. Distribusi Penggunaan Obat

Distribusi penggunaan obat dilakukan untuk melihat gambaran obat yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian pola penggunaan obat di klinik musafir utama juli – desember 2021 penggunaan obat antihipertensi yang diresepkan kepada pasien pada tabel 6 menunjukkan persentase terbesar distribusi jumlah obat antihipertensi yaitu golongan *calcium channel bloker* (CCB) sebanyak 24 lembar resep (8,2%) yang merupakan terapi tunggal. Hasil penelitian menunjukkan algoritma pengobatan hipertensi pada tahap awal pengobatan hipertensi stage I lebih banyak menggunakan terapi tunggal. Hal ini disebabkan karena hipertensi stage I masih dapat diturunkan dengan satu macam obat antihipertensi (Udayani et al., 2018) Penggunaan amlodipin secara tunggal banyak diberikan karena obat ini sangat bermanfaat mengatasi hipertensi yang bekerja dengan cara menghambat ion kalsium masuk kedalam vaskularisasi otot polos dan otot jantung sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Sedangkan terapi kombinasi diberikan kepada pasien hipertensi yang disertai dengan komplikasi penyakit kardiovaskular diabetes mellitus dan gagal jantung. Selain itu terapi kombinasi 2 obat antihipertensi pada penelitian ini digunakan terhadap pasien hipertensi derajat II dengan tujuan tercapainya target terapi <140/90 mmHg. Hasil penelitian menunjukkan kombinasi CCB + ACEI digunakan sebanyak 0,3%. Penggunaan kombinasi obat pada pasien hipertensi dianjurkan karena mempunyai sifat saling mengisi untuk menurunkan efek samping masing – masing obat serta kombinasi dosis obat yang tepat akan meningkatkan kepatuhan pasien. Berdasarkan guideline JNC VIII dan ESH-ESC 2018 terapi kombinasi yang disarankan adalah golongan ACEI + diuretic, ACEI + CCB, ARB +diuretic dan ARB + CCB. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Tandililing dkk, 2017) dan (Fadhilla & Permana, 2020) dimana monoterapi antihipertensi

amlodipin digunakan sebesar 67,86% dan penggunaan kombinasi antihipertensi yaitu golongan CCB + ACE Inhibitor 9,34%. Golongan obat CCB merupakan antihipertensi yang paling banyak digunakan karena dianggap sebagai salah satu terapi lini pertama dalam penanganan hipertensi yang mampu menurunkan tekanan darah dalam waktu yang singkat (Tandililing et al., 2017).

Hasil penelitian menunjukkan sebaran obat antidiabetes yang paling banyak digunakan yaitu antidiabetes oral metformin (2,5%) sebanyak 8 resep. Penatalaksanaan diabetes mempunyai tujuan akhir untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas DM, yang secara spesifik ditujukan untuk mencapai target utama yaitu menjaga kadar glukosa plasma normal dan mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi (Kovy, 2019). Golongan obat yang di resepkan pada pasien diabetes mellitus tipe II meliputi golongan biguanid dan sulfoniurea. Dalam penelitian ini antidiabetes oral golongan biguanid yaitu metformin paling banyak digunakan menurut (Oktaviana, 2021) hal ini dikarenakan biguanid merupakan *first line therapy* pasien diabetes mellitus tipe II. Efek utama dari metformin adalah menurunkan pengeluaran glukosa hepatic dan menurunkan kadar glukosa puasa. Penggunaan monoterapi dengan metformin dapat menurunkan HbA1c sebesar 1,5%. Metformin menurunkan kadar glukosa darah melalui pengaruh terhadap kerja insulin pada tingkat selular dan menurunkan produksi gula hati dan menahan nafsu makan hingga berat badan tidak meningkat sehingga layak untuk diberikan kepada penderita yang *overweight*. Selain itu efek samping obat ini yang umumnya ringan dan frekuensi rendah, seperti tidak menyebabkan hipoglikemia dan dapat mengurangi risiko komplikasi makrovaskular. Metformin merupakan lini pertama pada pasien yang baru di diagnosis DM tipe II dalam terapi tunggal, juga dapat digunakan sebagai kombinasi dengan obat antidabetik oral lainnya (Poluan et al., 2020). Pada penelitian ini antidiabetik oral lain yang digunakan

yaitu glimepirid (2,2%) sebanyak 7 resep yang merupakan golongan sulfonilurea yang mampu menurunkan kadar gula darah 85 – 90% namun hanya efektif apabila sel beta Langerhans pancreas masih dapat memproduksi insulin. Antiabetes oral golongan sulfonilurea merupakan obat pilihan bagi penderita diabetes dewasa baru dengan berat badan normal dan kurang serta tidak pernah mengalami ketoasidosis sebelumnya. Golongan obat sulfonilurea bekerja dengan cara mensekresi insulin di kelenjar pancreas oleh karena itu hanya efektif bila sel beta Langerhans pankreas masih dapat memproduksi. Pada penelitian ini obat golongan sulfonilurea yang digunakan adalah glimepirid yang merupakan generasi ketiga dengan durasi kerja lebih panjang dan onset yang lebih cepat dan mampu mengurangi komplikasi kardiovaskular (Kovy, 2019).

Hiperurusemia adalah keadaan ketika kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal atau >7 mg/dl pada laki – laki dan >6 mg/dl pada perempuan. Sedangkan gout merupakan salah satu penyakit progresif yang diakibatkan oleh desposisi Kristal asam urat monosodium di sendi, ginjal, serta penyakit di jaringan ikat lainnya sebagai akibat hiperurisemia yang berlangsung kronik(Putri, 2020). Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 8 menunjukkan terapi gout dan hiperurisemia menggunakan rute pemberian oral golongan *xantin oksidase inhibitor* yaitu allopurinol digunakan sebanyak 3 resep 0,9% sebagai terapi awal. Obat ini bekerja dengan cara menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan menghambat enzim *xantin oksidase inhibitor* yang bertanggung jawab untuk mengubah xantin menjadi asam urat (sholihah 2014). Terapi NSAID yang digunakan pada penelitian ini untuk meredakan nyeri yang diakibatkan karena penumpukan kadar asam urat adalah meloxicam sebanyak 8 resep (2,5%), asam mefenamat 7 resep (2,2%), dan natrium diklofenak 6 resep (1,8%). Golongan NSAID non selektif yang paling banyak digunakan yaitu meloxicam

karena memiliki efek samping paling kecil pada saluran cerna dan mampu menghambat enzim siklooksigenase 2 sepuluh kali lipat dari pada enzim siklooksigenase 1 pada percobaan *ex vivo* (Anggriani, 2016) enzim ini bekerja pada inflamasi dan rasa sakit dengan menghambat COX 2 maka prostaglandin tidak terbentuk sehingga tidak terjadi rasa nyeri namun tetap memberikan proteksi lambung karena COX 1 tidak di hambat. Natrium diklofenak digunakan karena mampu terakumulasi dengan baik pada cairan synovial setelah pemberian oral. Pada penelitian ini penggunaan obat methylprednisolon golongan kortikosteroid digunakan sebanyak 5 pasien (1,5%) methylprednisolon menduduki reseptor spesifik dalam sitoplasma sel yang responsive serta mempunyai efek antiinflamasi yang kuat (Putri, 2020). Obat golongan kortikosteroid sering digunakan untuk mengatasi gejala gout akut dan akan mengontrol serangan (Chilappa et al., 2010).

Berdasarkan tabel data penggunaan obat hypercholestromia golongan statin yang paling banyak digunakan yaitu simvastatin dengan jumlah 19 resep (6,0%) sedangkan atorvastatin yaitu 9 resep (2,8%). Hasil yang didapatkan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meisy, 2019) penggunaan statin pada pasien hiperkolstromia menyatakan bahwa statin yang paling sering digunakan yakni simvastatin 41 peresepan (70,7%) sedangkan atorvastatin 17 resep (29,3%). Pemilihan obat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti apakah obat termasuk dalam daftar obat antihiperlipidemia yang ditanggung oleh BPJS. Menurut perkumpulan endokrinologi Indonesia bahwa penulisan resep disarankan mempertimbangkan aspek ekonomi terkait dosis harian yang diperlukan dan harga obat tersebut, dari segi harga simvastatin lebih dipilih dibanding atorvastatin (M. Handayani, 2019) Mc Carey *et al* melaporkan bahwa statin memiliki keuntungan terapeutik pada penyakit yang berhubungan dengan peningkatan

kadar kolestrol seperti pada penyakit reumatik dan stroke iskemik. Kolestrol merupakan zat lemak diproduksi oleh hati dan beredar dalam darah, namun ketika kadar kolestrol melebihi batas normal >200 mg/dL maka akan menimbulkan gangguan pada pembuluh darah, jantung serta otak (Ririn, 2016) Cara kerja statin yaitu HMG-CoA reductase memperantarai langkah awal biosintesis sterol. Statin memblok secara parsial reaksi konversi *3-hidroksi 3-metilglutaril* koenzim A menjadi asam mevalonate sehingga membuat kadar kolestrol turun dengan cepat (Nur, 2018)

Dari hasil evaluasi penggunaan terapi obat pada pengobatan ISPA penggunaan obat terbesar yaitu paracetamol sebagai analgetik-antipiretik sebanyak 24 resep (7,5%) ibuprofen sebanyak 1 resep (0,3%). Paracetamol digunakan sebagai pengobatan simptomatik untuk mengobati panas yang dapat terjadi karena adanya infeksi pada pasien, sehingga tubuh mengalami gangguan metabolisme yang mengakibatkan suhu tubuh meningkat. Penggunaan paracetamol lebih disukai karena kurang mengiritasi lambung (Nurwadidah, 2016) Jenis antibiotik yang paling banyak diresepkan yaitu amoxicillin 8 resep (2,5%) dan cefadroxil 7 resep (2,2%). Amoxicillin termasuk golongan antibiotik derivat dari penisilin yang merupakan antibiotik spectrum luas. Antibiotik ini bekerja dengan melawan bakteri gram negative dan gram positif (Ayuningtyas et al., 2021) Penggunaan kortikosteroid oral pada penyakit infeksi diindikasikan pada septicemia gram negative dan mampu menekan peradangan yang berlebihan. Suatu studi metaanalisis yang mencakup 8 penelitian menyimpulkan bahwa kombinasi antara kortikosteroid dan antibiotik dapat meredakan nyeri lebih cepat dibanding tanpa memakai steroid (Yulianto & Ayu, 2014) kortikosteroid yang digunakan pada penelitian ini yaitu metilprednisolon sebanyak 22 resep (6,9%) dexamethasone 3 resep (0,9%). Sedangkan untuk golongan obat mukolitik yang

digunakan berdasarkan tabel yaitu acetylcysteine 3 resep (0,9%) dan ambroxol 6 resep (1,8%) ekspektoran yang digunakan yaitu 3 resep (0,9%). Mukolitik diberikan agar mempermudah pengeluaran dahak dengan cara memecahkan protein mucus sehingga menjadi Cairan dan mudah dikeluarkan. Sedangkan ekspektoran membasahi saluran mucus menjadi lebih cair dan mudah dikeluarkan (R. S. Handayani et al., 2021) Golongan antihistamin yaitu CTM yang digunakan adalah 6 resep (1,8%) penggunaan antihistamin dibenarkan pada sinusitis yang disebabkan oleh alergi juga dapat menurunkan produksi sekret efek sedasi dari antihistamin dibutuhkan terutama pada malam hari (Amellita et al., 2019)

Golongan obat yang paling banyak digunakan untuk pasien yang di diagnosis mengalami gangguan gastrointestinal dan dyspepsia paling banyak dijumpai yaitu penggunaan omeprazole golongan *proton pump inhibitor* sebanyak 18 pasien (5,6%). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhana et al., 2019) menyatakan bahwa golongan PPI lebih efektif daripada golongan antihistamin-2 dan sukralfat dalam mengobati gastritis. Golongan PPI menghambat produksi asam lambung melalui penghambatan terhadap elektron yang menimbulkan potensial aksi pada saraf otonom vagus. Dalam studi yang melibatkan perbandingan pada pasien gastritis, individu yang mendapatkan terapi PPI menunjukkan tingkat penyembuhan yang lebih tinggi. Penggunaan golongan obat antasida dalam penelitian ini yaitu antasida doen tablet 8 pasien (2,5%), antagonis reseptor H₂ yaitu ranitidin jumlah 4 pasien (1,4%) golongan sitoprotektif yaitu sukralfat 3 pasien (0,9%) dan prokinetik domperidone sebanyak 1 pasien (0,3%). Mekanisme antagonis reseptor histamin H₂ menghambat sekresi asam lambung dengan melakukan inhibisi kompetitif terhadap reseptor histamine H₂ yang terdapat pada sel parietal dan menghambat sekresi asam lambung sedangkan antasida menetralkan asam lambung.

Penggunaan laksatif dan pencahar pada penelitian ini adalah 3 pasien (0,9%). Sedangkan tabel 13 daftar obat tambahan yang digunakan pada resep adalah untuk kelas terapi antibiotik yaitu cefixime 3 pasien (0,9%) dan ciprofloxacin 4 pasien (1,2%). Kelas terapi antikolinergik yaitu salbutamol 1 pasien (0,3%), antihistamin cetirizine sebanyak 2 pasien (0,6%), untuk kelas terapi vertigo obat yang digunakan adalah betahistin dengan jumlah 4 pasien (1,2%) adapun distribusi penggunaan vitamin dan mineral pada penelitian ini yaitu vitamin B12 15 pasien (4,7%) sebanyak vitamin B1 9 pasien (2,8%) bitamin B kompleks 9 pasien (2,8%), pasien yang menggunakan vitamin C sebanyak 12 orang (3,7%), terdapat 11 pasien (3,4%) yang menggunakan neurodex, sedangkan corovit 4 pasien (1,2%), caviplex 9 pasien (2,8%), corobion 5 pasien (1,5) dan selkom C 3 pasien (0,9%).

6. Potensi Interaksi Obat

Interaksi obat didefinisikan sebagai perubahan aktivitas farmakologis yang mencangkup perubahan efek obat selain efek asli dari obat yang terjadi akibat bercampur dengan obat lainnya, makanan, minuman zat kimia ataupun obat herbal (K. Handayani, 2015) Interaksi obat dapat menimbulkan efek samping/toksisitas, penurunan serta peningkatan kadar obat di dalam darah yang menyebabkan efek terapeutik obat yang tidak adekuat (Amellita et al., 2019). Interaksi obat dianggap penting secara klinis jika interaksi tersebut berakibat meningkatkan toksisitas atau mengurangi efektivitas obat yang berinteraksi terkhusus ketika menyangkut obat dengan keamanan yang sempit (Amellita et al., 2019). Mekanisme interaksi obat dengan obat pada pasien rawat jalan di klinik musafir utama berdasarkan tabel 5.1 akan dibahas sebagai berikut:

a. Amlodipine + Simvastatin

Berdasarkan hasil penelitian kategori signifikansi klinis interaksi obat paling banyak terjadi pada kombinasi amlodipin dan simvastatin (13 kasus). Statin adalah antikolestrol yang bekerja dengan menghambat kerja enzim *HMG CoA Reductase* yaitu enzim yang bertanggung jawab untuk membentuk kolestrol dari makanan, protein, gula maupun asam lemak. Statin dimetabolisme oleh enzim sitokrom 3A4 sedangkan amlodipin menghambat kerja enzim 3A4 sehingga ketika menggunakan amlodipine dan simvastatin secara bersamaan maka akan membuat kadar statin meningkat dalam darah. Interaksi yang terjadi merugikan pasien seperti kerusakan hati dan rhabdomyolysis yang melibatkan pemecahan jaringan otot rangka, dalam keadaan yang mengharuskan penggunaan 2 obat ini maka pemberian simvastatin tidak boleh melebihi 20 mg selain itu perlu dilakukan pemantauan lebih sering untuk keamanan pasien (Hidayah, 2018).

b. Omeprazole + simvastatin

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 6 kombinasi omeprazole dan simvastatin tingkat signifikansi klinis yang ditimbulkan yaitu moderat sebanyak 9 kasus. Pemberian obat golongan statin dengan omeprazole secara bersamaan menimbulkan interaksi farmakokinetik pada fase metabolisme. Omeprazole dapat meningkatkan plasma dan efek statin dalam darah dengan mekanisme terjadi yaitu penghambatan kompetitif metabolisme CYP450-3A4. Sehingga meningkatkan risiko kerusakan hati dan rhabdomyolysis yang melibatkan kerusakan jaringan otot rangka, ginjal dan kematian sehingga pemberian obat ini diperluhan perhatian khusus (Ramadhana et al., 2019).

c. Amlodipine + Diklofenak

Interaksi obat yang ditemukan pada kombinasi amlodipin dengan natrium diclofenac (NSAID) termasuk dalam kategori moderat. Efek dari kombinasi obat

tersebut adalah menurunkan efek hipertensi amlodipin (Anggriani et al., 2021). Mekanisme NSAID yang dapat menghambat sintesis prostaglandin yang tidak hanya menyebabkan efek antiinflamasi namun juga dapat menyebabkan vasokonstriksi pada afferent ginjal yang menyebabkan penurunan aliran darah menuju ginjal sehingga menyebabkan teraktifasinya sistem renin angiotensin (Fournier et al., 2012). Namun penelitian yang dilakukan oleh (White, 2009) menyebutkan bahwa pemberian obat hipertensi golongan CCB bersamaan dengan NSAID tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pasien hipertensi karena didasarkan pada mekanisme CCB yang tidak berhubungan dengan kadar natrium sehingga dapat mengontrol tekanan darah pasien.

d. Ciprofloxacin + Amlodipine

Berdasarkan hasil penelitian kombinasi obat ciprofloxacin dan amlodipin (1 kasus) dikategorikan dalam tingkat keparahannya moderat. Ciprofloxacin akan meningkatkan konsentrasi amlodipin dalam plasma darah sehingga dapat menyebabkan terjadinya toksisitas dari amlodipin (ahmad azrul et al., 2020).

e. Ciprofloxacin + Asam Mefenamat

Berdasarkan hasil penelitian pemberian golongan obat NSAID asam mefenamat dengan ciprofloxacin golongan fluoroquinolone tercatat 3 kasus termasuk dalam tingkat keparahan moderat. Kombinasi obat ini dapat meningkatkan resiko toksisitas SSP seperti tremor, otot tidak sadar (ahmad azrul et al., 2020).

f. Ciprofloxacin + Metformin

Berdasarkan hasil penelitian kombinasi ciprofloxacin dan metformin (1 kasus) dengan tingkat keparahan moderat ciprofloxacin meningkatkan efek dari metformin dengan cara meningkatkan pelepasan insulin melalui mekanisme

penghambatan kanal ion kalium pada sel beta pancreas, sehingga menimbulkan terjadinya efek hipoglikemia (Udayani et al., 2018).

g. Methylprednisolone + Meloxicam

Interaksi moderat methylprednisolon dan meloxicam pada penelitian ini tercatat 3 kasus, hal ini dapat meningkatkan risiko toksisitas gastrointestinal yang disebabkan oleh induksi methylprednisolon pada enzim fosfolipase sehingga menyebabkan penurunan asam arakidonat. Penurunan asam arakidonat dapat mengurangi substrat untuk enzim siklooksigenase sehingga meningkatkan efek samping gastrointestinal dari meloxicam. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian jeda saat mengkonsumsi (moore *et al*, 2015).

h. Methylprednisolone + Asam Mefenamat

Terdapat 3 kasus interaksi obat dengan tingkat keparahan moderat ada kombinasi methylprednisolon dan asam mefenamat yang didapatkan pada penelitian diklinik musafir utama. Hal ini dapat menimbulkan meningkatnya risiko perdarahan pada gastrointestinal. Efek samping yang ditimbulkan oleh asam mefenamat yaitu gangguan saluran cerna pada mukosa lambung sedangkan efek samping dari penggunaan kortikosteroid adalah perdarahan lambung sehingga untuk pemakaian secara bersamaan sebaiknya di hindari agar tidak terjadi efek samping pada saluran cerna yang lebih besar (pantalone *et al*, 2011).

i. Methylprednisolone + Natrium Diklofenak

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 1 kasus interaksi moderat yang tercatat pada penggunaa methylprednisolon dan natrium diclofenak. penggunaan bersama kedua obat ini dapat meningkatkan risiko gangguan ulcer pada saluran cerna. Hal ini dikarenakan kombinasi kedua obat ini tidak selektif pada COX1 sehingga proteksi alami lambung semakin berkurang (Soleha et al., 2018).

j. Antasida + Dexamethasone

Jumlah kejadian interaksi antasida dan dexamethasone (2 kasus) mengalami interaksi farmakokinetik pada fase absorpsi. Penggunaan bersamaan antara golongan kortikosteroid dan antasida akan menyebabkan penurunan kadar glukokortikoid darah yang menyebabkan penurunan selaput lendir lambung sehingga meningkatkan produksi asam lambung. Interaksi yang terjadi yaitu moderat yang mengakibatkan mual muntah, dan perdarahan gastrointestinal. Manajemen untuk menghindari terjadinya interaksi tersebut yaitu antasida diberikan 2 – 3 jam setelah mengonsumsi dexamethasone (DIH, 2009) (Farikhah, 2017).

k. Dexamethasone + Asam Mefenamat

Berdasarkan hasil penelitian jumlah kejadian pada penggunaan obat golongan kortikosteroid dan asam mefenamat yaitu sebanyak 1 kasus. Mekanisme kerja asam mefenamat yaitu menghambat enzim siklooksigenase sehingga konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin terganggu. Sedangkan dexamethasone memiliki efek antiradang dengan mekanisme kerja menekan perpindahan polimorfonuklear leukosit dan mengembalikan permeabilitas kapiler yang meningkat. Pemberian obat ini secara bersamaan akan meningkatkan risiko efek samping pada saluran pencernaan seperti peradangan, perdarahan, ataupun ulkus gastrointestinal hal ini dikarenakan keduanya tidak bekerja selektif pada COX1 (Soleha et al., 2018).

l. Amlodipine + Meloxicam

Golongan obat NSAID dapat memberikan efek penurunan antihipertensi dari diuretic, *beta bloker*, *angiotensin converting enzyme inhibitor* (ACEi), vasodilator, alfa-2 agonis, alfa-1 antagonis, dan *angiotensin II bloker* dikarenakan sintesis prostaglandin yang bersifat vasodilator terhambat. NSAID dapat meningkatkan

tekanan darah systole < 5 mmHg, beberapa studi mengatakan bahwa penggunaan amlodipin dan meloxicam dapat meningkatkan tekanan darah (Soleha et al., 2018).

m. Antasida + Sulralfate

Kombinasi antasida dan sukralfat dalam penanganan penyakit GERD dan dyspepsia didapatkan hasil sebanyak 3 jumlah kejadian dengan tingkat keparahan moderat. Mekanisme kerja sukralfat adalah membentuk kompleks ulser adheren dengan eksudat protein seperti albumin dan fibrinogen pada sisi ulser dan melindunginya dari serangan asam, serta menghambat aktivitas pepsin dan membentuk ikatan garam dengan empedu. sukralfat akan mengurangi peningkatan dari antasida serta mengurangi efek terapinya sehingga dianjurkan pemberian sukralfat 1 – 2 jam sebelum antasida (Ramadhana et al., 2019).

n. Sucralfate + Omeprazole

Tingkat keparahan interaksi kombinasi omeprazole dan sukralfat adalah moderat. Perubahan pH lambung yang diinduksi oleh omeprazole dapat mengurangi peningkatan sukralfat dengan mukosa gastrointestinal, sehingga dapat mengurangi efek terapi (Ramadhana et al., 2019).

o. Methylprednisolone + Ciprofloxacin

Interaksi mayor yang ditimbulkan oleh kombinasi obat methylprednisolon dan ciprofloxacin pada penelitian yang dilakukan diklini musafir utama didapatkan 1 kasus. Interaksi yang terjadi yaitu meningkatkan risiko terjadinya tendon rupture yaitu kerusakan pada tendon yang menghubungkan otot betis ke tumit sehingga menimbulkan rasa nyeri ketika berjalan. Methylprednisolon menginduksi ciprofloxacin sehingga regulasi eksresi matriks metalloproteinase meningkat dan terjadi degradasi kolagen tipe 1 yang menyebabkan nyeri pada tendon (pantalone et al, 2011).

p. Amlodipine + methylprednisolon

Kategori signifikansi pada kombinasi amlodipin dan methylprednisolon yaitu minor dengan jenis interaksi farmakokinetik. Efek yang ditimbulkan ketika obat ini dikombinasikan yaitu methylprednisolon akan menurunkan efektivitas dari amlodipin karena mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati. Interaksi ini paling mungkin terjadi ketika methylprednisolon digunakan lebih dari seminggu, karena penggunaan panjang dapat menyebabkan retensi natrium dan air (Gunawan, 2016)

q. Omeprazole + Glimepirid

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1 kasus Interaksi yang terjadi jika omeprazole dikonsumsi bersama dengan glimepirid adalah interaksi minor. Omeprazole dapat meningkatkan efek dari glimepirid dengan penghambatan CYP450 2C19 (Wijayanti & Mutmainah, 2016).

r. Ranitidine + Asam Mefenamat

Obat golongan NSAID memiliki efek samping pada gastrointestinal sehingga diberikan bersama obat golongan H2 bloker terutama kepada pasien yang memiliki riwayat pada gastritis untuk meringankan terjadinya efek samping dari obat golongan NSAID (Anggriani et al., 2021). Ranitidine akan menghambat enzim glukoroniltransferase dari asam mefenamat sehingga dapat menyebabkan penurunan kadar plasma. Sebaiknya ranitidine diberikan satu jam setelah mengkonsumsi asam mefenamat. Namun interaksi yang terjadi antara ranitidine dan asam mefenamat tidak berdampak secara klinis sehingga tidak ada tindakan pencegahan khusus (Farikhah, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di klinik musafir utama diperoleh kesimpulan gambaran aspek klinis persepsian sebagai berikut :

1. Aspek klinis resep kategori tepat indikasi (91,3%) terpenuhi.
2. Aspek klinis resep kategori ketepatan dosis (98,92%) terpenuhi.
3. Aspek klinis kategori waktu penggunaan obat menunjukkan (98,92%) resep terpenuhi.
4. Aspek klinis kategori duplikasi pengobatan menunjukkan (98,92%) tidak mengalami duplikasi.
5. Jenis interaksi berdasarkan tingkat keparahan yang paling sering terjadi yaitu moderat 43 kejadian (40,1%) dan potensi interaksi obat dengan obat yang paling banyak adalah kombinasi amlodipin dan simvastatin sebanyak 13 kejadian.
6. Aspek klinis kategori reaksi obat yang tidak dikehendaki (100%) tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberian kombinasi penggunaan obat yang berpotensi menimbulkan interaksi.
2. Sebaiknya dilakukan pendataan data rekam medik yang lebih jelas utamanya pada kartu kontrol pasien yang dapat menimbulkan kekeliruan membaca data rekam medik pasien
3. Sebaiknya kolaborasi antar tenaga kesehatan perlu ditingkatkan demi tercapainya kualitas pelayanan kefarmasian dan pengobatan yang lebih

baik sehingga didapatkan terapi yang tepat, efektif, dan aman.

4. Hendaknya dilakukan penelitian dengan metode prospektif sehingga dapat diketahui efek yang ditimbulkan akibat interaksi obat secara aktual.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad azrul, Z., Siti, P., & Adis, N. (2020). Kajian Interaksi Obat Pada Resep Di Poli Penyakit Dalam RSUD X Cirebon. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(1), 1–9 2020
- Amalia. (2016). Rational Drug Prescription Writing. *Juke*, 4(7), 25.
- Amellita, D. W. I. S., Kedokteran, P. S., Kedokteran, F., Islam, U., & Syarif, N. (2019). *Potensi interaksi obat pada pasien rawat jalan di Puskesmas Rengas Kota Tangerang Selatan Pada Bulan Januari – Maret 2019*. 1–59.
- Anggriani, A., Kusumahati, E., & Mutazam, I. H. (2021). Potensi Interaksi Obat Amlodipin Pada Pasien Hipertensi Disalah Satu Puskesmas Kabupaten Sumedang. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.33759/jrki.v3i1.108>
- Ardianti, F., & Nyamin. (2018). *Kajian penulisan farmasetik resep pasien rawat jalan di rumah sakit petrokimia gresik driyorejo pharmaceutic*. 1(1), 15–26.
- Audina, T. (2018). Pengkajian resep pasien rawat jalan di rumah sakit universitas sumatera utara medan. In *Fakultas farmasi universitas sumatera utara*. <http://repositori.usu.ac.id/bitstre%0Aam/handle/123456789/3976/13%0A1501028.pdf>.
- Ayuningtyas, J. E. P., Astuti, P., & Fatmawati, D. W. A. (2021). Aktivitas Antibakteri Kombinasi Vitamin C dan Amoksisilin sebagai Bahan Alternatif Intrakanal Medikamen terhadap *Enterococcus faecalis* secara In Vitro. *Pustaka Kesehatan*, 9(1), 60. <https://doi.org/10.19184/pk.v9i1.19794>
- Bilqis, S. U. (2015). *Kajian Administrasi, Farmasetik, dan Klinis Resep Pasien Rawat Jalan Di Rumkital Dr. Mintohardjo Pada Bulan Januari 2015*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chilappa, C. S., Aronow, W. S., Shapiro, D., Sperber, K., Patel, U., & Ash, J. Y. (2010). Gout and hyperuricemia. *Comprehensive Therapy*, 36, 3–13. <https://doi.org/10.1201/9781420006452-31>
- Fadhilla, S. N., & Permana, D. (2020). The use of antihypertensive drugs in the treatment of essential hypertension at outpatient installations, Puskesmas Karang Rejo, Tarakan. *Yarsi Journal of Pharmacology*, 1(1), 7–14.
- Farikhah, H. N. (2017). Evaluasi Interaksi Obat Potensial Pada Pasien Gastritis. *Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tesis*, 1–24.
- Gunawan, Y. C. (2016). Kajian interaksi obat pada peresepan pasien hipertensi Geriatri di instalasi rawat jalan rumah sakit panti Nugroho Yogyakarta periode Januari-Juni 2016. *Skripsi Investigasi Jaringan WLAN*, 54.

- Handayani, K. (2015). Analisis Potensi Interaksi Obat Diabetes Melitus Pada Resep Obat Pasien rawat Jalan di RSAL Dr. Minto Hardjo. *Skripsi, April*, 1–84.
- Handayani, M., & Simatupang, A. (2019). The Use of Station in Hypercholesterolemia. *Majalah Kedokteran UKI*, 35(3), 96–103.
- Handayani, R. S., Sari, I. D., Prihartini, N., Yuniar, Y., & Gitawati, R. (2021). Pola Peresepan Anak dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Non Pneumonia di Klinik. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 11(2), 156–164. <https://doi.org/10.22435/jki.v11i2.4734>
- Hidayah, K. dkk. (2018). *Identifikasi Potensi Interaksi Obat pada Peresepan Obat Pasien Hipertensi dengan Diabetes Melitus*. 108–120.
- Hidayat, R., & Hayati, H. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Sop Perawat Pelaksana Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Di Rawat Inap Rsud Bangkinang. *Jurnal Ners*, 53(9), 1689–1699.
- Ismaya, N. A., Tho, I. La, & Fathoni, M. I. (2019). Gambaran Kelengkapan Resep Secara Administratif dan Farmasetik di Apotek K24 Pos Pengumben. *Edu Masda Journal*, 3(2), 1–10.
- Kavanagh C. (2017). Medication governance: preventing errors and promoting patient safety. *British Journal of Nursing*, 26(26), 1–8.
- Kemkes. (2016). *Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit*.
- Khairurrijal, M. A. W., & Putriana, N. A. (2018). Review : medication error pada tahap prescribing, transcribing, dispensing, dan administration. *Farmasetika.Com (Online)*, 2(4), 8. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v2i4.15020>
- Kovy, M. (2019). Evaluasi Penggunaan Obat Antidiabetes Oral pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Rawat Jalan di RSUD Prof. Dr. Soekandar Tahun 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mardiah, S. (2017). *Kajian administrasi, farmasetik dan klinis resep pasien rawat jalan di rsud kota tangerang selatan dan rumah sakit swasta ciputat x pada bulan januari 2017*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Megawati, F., & Santoso, P. (2017). Pengkajian Resep Secara Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Ri No 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 3(35), 12–16.
- Muhadi. (2016). JNC 8 : Evidence-based Guideline Penanganan Pasien Hipertensi Dewasa. *Cermin Dunia Kedokteran*, 43(1), 54–59.
- Murtini, G. (2016). Farmestika dasar. In *Kementrian Kesehatan Republik*

Indonesia.

- Notoatmodjo. (2017). Metodologi Penelitian. *BMC Public Health*.
- Nur, D. (2018). *Kajian Penggunaan Statin Pada Pasien Stroke Iskemik Di Instalasi Rawat Inap Neurologi RSUP DR. M. Djamil Padang Tahun 2017*.
- Nurwadidah, A. (2016). *Evaluasi Interaksi Obat Sebagai Drug Related Problems Pada Pasien Rawat Ina Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar*. May, 31–48. <http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12620012/index.pdf>
- Oktarlina, R. Z., & Wafiyatunisa, Z. (2017). Kejadian Medication Error pada Fase Prescribing di Poliklinik Pasein Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah Mayjend HM Ryacudu Kota Bumi. *Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*, 1(3), 540–545.
- Oktaviana, K. (2021). Evaluasi Penggunaan Obat Antidiabetik Pada Pasien Diabetes Melitus tipe II Di Apotek Kimia Farma 27 Medan. *Skripsi*, 1–48.
- Poluan, O. A., Wiyono, W. I., & Yamlean, P. V. Y. (2020). Identifikasi Potensi Interaksi Obat Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Rawat Inap Di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon Periode Januari – Mei 2018. *Pharmacon*, 9(1), 38. <https://doi.org/10.35799/pha.9.2020.27408>
- Presyon, C. (2015). *Stockley's Drug Interactions* (Bpharm, PGDipMedMan, & MRPPharmS (eds.)). Pharmaceutical Press.
- Putri, A. (2020). Rasionallitas Penggunaan Obat Hiperurisemia Dan Gout Arritis Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta Periode Tahun 2016-2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(1), 1–9.
- Ramadhana, A., Choesrina, R., & Yuniarni, U. (2019). Analisis Potensi Interaksi Obat pada Resep Antigastritis di Salah Satu Rumah Sakit di Kota Tangerang. *Prosiding Farmasi*, 481–488.
- Ramdani, R., Skarayadi, O., Wiwiek Indrawati, Hermanto, F., & Wahyuni, E. (2022). Potensi Interaksi Obat Antihipertensi Pada Pasien Geriatri Rawat Inap Di Salah Satu Rumah Sakit Kota Bandung. *Pharmacoscrypt*, 5(1), 71–92.
- Rauf, A., Muhrijannah, A. I., & Hurria, H. (2020). Study of Prescription Screening for Administrative and Pharmaceutical Aspects at CS Farma Pharmacy in the Period June-December 2018. *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/djps.v3i1.14007>
- Sari, R., Dewi, R., & Sanuddin, M. (2019). Pola Retinopati Diabetik Pada Pasien Diabetes Mellitus Rawat Jalan Di RSUD Raden Mattaher Jambi. *Journal of*

Healthcare Technology and Medicine, 5(2), 287.
<https://doi.org/10.33143/jhtm.v5i2.465>

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. In Ayup (Ed.), *literasi media publishing* (cetakan 1, Vol. 4, Issue 3). Literasi Media Publishing.
- Soleha, M., Isnawati, A., Fitri, N., Adelina, R., Soblia, H. T., & Winarsih, W. (2018). Profil Penggunaan Obat Antiinflamasi Nonstreoid di Indonesia. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8(2), 109–117.
<https://doi.org/10.22435/jki.v8i2.316>
- Susanti, I. (2016). Identifikasi medication error pada fase Prescribing, transcribing, dan dispensing di depo farmasi rawat inap penyakit dalam gedung teratai, instalasi farmasi rsup fatmawati periode 2013. In *Analisa* (Vol. 4, Issue 2).
- Tandililing, S., Mukaddas, A., & Faustine, I. (2017). Profil Penggunaan Obat Pasien Hipertensi Esensial Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Periode Januari-Desember Tahun 2014. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 3(1), 49–56. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2017.v3.i1.8139>
- Tatro, D. S. (2011). *Drug Interaction Facts* (P. David S. Tatro, D. I. Analyst, & S. Carlos (eds.)). Facts & Comparisons.
- Udayani, N. N. W., Riastini, N. W., & Putra, I. M. A. S. (2018). Perbedaan Efektivitas Penggunaan Obat Amlodipin Tunggal Dengan Kombinasi Amlodipin Dan Lisinopril Pada Pasien Hipertensi Rawat Inap Di Rs 'X' Tabanan Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 4(2), 128–133.
<https://doi.org/10.36733/medicamento.v4i2.871>
- Wijayanti, N., & Mutmainah, N. (2016). Identifikasi Drug Related Problems (DRPs) Potensial Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RS "X" Tahun 2015. *Skripsi*, 1–19.
- Yulianto, A., & Ayu, K. K. S. (2014). Pola Pemberian Kortikosteroid Pada Pasien ISPA Bagian Atas di Puskesmas Sukasada II Pada Bulan Mei-Juni 2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
 Kampus I : Jl.Sultan Alauddin No.63, Makassar
 Kampus II : Jl.H.M.Yasin Lirigo No.36, Romangpolong-Gowa.Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

Nomor : B-1500/Un.06-FKIK/PP.00.9/11/2021

Gowa, 9 september 2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Kepada Yth.
Klinik Musafir Utama Barombong Makassar
 Di-
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Reti Dayanti
 NIM : 70100117043
 Program Studi : Farmasi
 Judul Penelitian : Kajian Aspek Klinis Resep Pasien Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi Klinik Musafir Utama Barombong Makassar Periode Juli – Desember 2021
 Dosen Pembimbing : 1. Apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si
 2. Apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm., Klin

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjanan. Dengan itu kami memohon bapak/ibu kiranya berkenan memberikan izin untuk melakukan pengambilan data awal penelitian di klinik musafir utama.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastily Handayani

Tembusan
 -Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)

Lampiran 2. Kode Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No: A.075/KEPK/FKIK/I/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : RETI DAYANTI
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Name of the Institution

Dengan judul:
 Title

**"KAJIAN ASPEK KLINIS RESEP PASIEN RAWAT JALAN DI INSTALASI FARMASI
 KLINIK MUSAFIR UTAMA PERIODE JULI-DESEMBER 2021"**

**"STUDY OF CLINICAL ASPECTS OF PRESCRIPTION OF OUTSIDE PATIENTS IN
 PHARMACEUTICAL INSTALLATIONS OF THE MAIN TRAVELER CLINIC FOR THE PERIOD
 OF JULY-DECEMBER 2021"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023

This declaration of ethics applies during the period January 27, 2022 until January 27, 2023

January 27, 2022

Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 3. Resep pasien klinik musafir utama

KLINIK MUSAFIR UTAMA *Hersan*
 Jl. Perjanjian Bungaya No. 6 Barombong Makassar
 Sulawesi Selatan

dr / drg. *Hani Datta*

RESEP Makassar, *10/3/24*

R/ Atorvastatin *no. 5*
10-0-1

M. Allopurinol *no. 5*
12dd.i

M. Ceftriaxone *no. 5*
1dd.i malam

M. Combion *no. 3*
1dd.i

Pro : *Muhlis dg. Balu*
 Umur :
 Alamat :

KLINIK MUSAFIR UTAMA *Tkm*
 Jl. Perjanjian Bungaya No. 6 Barombong Makassar
 Sulawesi Selatan

dr / drg. *Hani Datta*

RESEP Makassar, *24/2/24*

R/ Hufanuy *no. 1*
13 dd. Icth.

M. Aluruti *no. 1*
13dd.i

M. Samol *no. 1*
13dd. 1/2 Icth

Pro : *Amrisa Peta*
 Umur :
 Alamat :

KLINIK MUSAFIR UTAMA *(T)*
 Jl. Perjanjian Bungaya No. 6 Barombong Makassar
 Sulawesi Selatan

dr / drg. *Dr. Elvan*

RESEP Makassar, *13/8/24*

R/

M. Amfongin *10 y / 2/1dd*

M. Atrovastatin *70 y / 2/1dd*

M. Doffin *80 y / 2/1dd*

M. Penicilin *12 / 1dd*

M.

Pro : *Sugiani*
 Umur : *42 th*
 Alamat : *Barombong*

KLINIK MUSAFIR UTAMA *Tkm*
 Jl. Perjanjian Bungaya No. 6 Barombong Makassar
 Sulawesi Selatan

dr / drg. *Dr. Elvan*

RESEP Makassar, *2/8/24*

R/

M. Amfongin *12 / 1dd*

M. Atrovastatin *20 y / 2/1dd*

M. Doffin *15 y / 2/1dd*

M. Amfongin *12 / 1dd*

Pro : *Nurhuda Dy. Balu*
 Umur : *60 th*
 Alamat :

KLINIK MUSAFIR UTAMA
 Jl. Perjanjian Bungaya No. 6 Barombong Makassar
 Sulawesi Selatan

dr / drg. Hurul Dalin

RESEP
 Makassar, 24/8/2021

R/ Antacid no. 3
 / 3 dd. $\frac{1}{2}$ cth

M/ Domperidon no. 1
 / 3 dd. $\frac{1}{2}$ cth

M/ Emlan no. 6
 / 1 dd. $\frac{1}{2}$

Pro : Andri
 Umur : 4 thn / 8 kg
 Alamat :

KLINIK MUSAFIR UTAMA
 Jl. Perjanjian Bungaya No. 6 Barombong Makassar
 Sulawesi Selatan

dr / drg. Hurul Dalin

RESEP
 Makassar, 17/6/2021

R/ Epitan syp no. 1
 / 3 dd. I cth 45 mnt sebelum makan, saat perut kosong

M/ omeprazole no. XXVIII
 / 2 dd. I 30 mnt sebelum makan

M/ Promag. no. X
 / 3 dd. I 1 jam sebelum makan

Pro : A GUS
 Umur : 50 Thn
 Alamat : Barombong

KLINIK MUSAFIR UTAMA
 Jl. Perjanjian Bungaya No. 6 Barombong Makassar
 Sulawesi Selatan

dr / drg. Hurul Dalin

RESEP
 Makassar, 23/4/2021

R/ Paracetamol no. 8
 / 3 dd. I

M/ Amoxicillin no. 8
 / 3 dd. I

M/ CSM no. 8
 / 3 dd. I

M/ Omeprazole no. VII
 / 1 dd. I

M/ Ciprofloxacin no. 8
 / 2 dd. I

M/ Amitriptylin 10 mg no. 8
 / 0-0-1

Pro : Henny Margaretha
 Umur : 52 thn
 Alamat : Dg. tetu BTW - Hatako

KLINIK MUSAFIR UTAMA
 Jl. Perjanjian Bungaya No. 6 Barombong Makassar
 Sulawesi Selatan

dr / drg. Hurul Dalin

RESEP
 Makassar, 24/8/2021

R/ PCT Syrup no. 1
 / 3 dd. I cth.

M/ Huprop no. 1
 / 3 dd. $\frac{1}{4}$ cth

M/ Vit C no. 8
 / 2 dd. I

M/ Zinc no. 8
 / 1 dd. I

Pro : Zea almyra putri
 Umur : 1.6 thn
 Alamat : STN. GUYA BAROMBONG BLK. 01/02

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Reti Dayanti, yang biasa dipanggil Reti, dilahirkan di Wotu pada tanggal 19 Oktober 1998. Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri Katoi Kolaka Utara. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 15 Makassar. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 20 Makassar dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Hingga saat ini, penulis qadarullah akhirnya berhasil menempuh Pendidikan di Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM). Dan berharap bisa membanggakan kedua orangtuanya serta mampu bermanfaat bagi orang-orang disekelilingnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R