

**PENGARUH PENAMBAHAN MENKUDU (*Morinda citrifolia*) PADA
EKSTRAK BIJI WINE KOPI ARABIKA (*Coffea Arabica* L.)
TERHADAP KADAR KAFEIN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SYAHWAH ISLAMIAH

60500118004

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahwah Islamiah
NIM : 60500118004
Tempat/ Tgl. Lahir : Takalar, 18 Juli 2001
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Haji Rustam Nassa, Maccini Sombala, Desa
Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar
Judul : Pengaruh Penambahan Mengkudu (*Morinda
Citrifolia*) pada Ekstrak Biji *Wine* Kopi Arabika
(*Coffea Arabica* L.) terhadap Kadar Kafein.

menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2022

Penyusun

Syahwah Islamiah
NIM: 60500118004






LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan Mengkudu (*Morinda citrifolia*) pada Ekstrak Biji *Wine* Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.) terhadap Kadar Kafein” yang disusun oleh Syahwah Islamiah, NIM: 60500118004, mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 November bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia.

Samata-Gowa, Senin, 10 November 2022 M
15 Rabiul Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si
Sekretaris : Dra. Sitti Chadijah, M.Si.
Munaqisy 1 : Asriani Ilyas, S.Si., M.Si.
Munaqisy 2 : Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag.
Pembimbing 1 : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.
Pembimbing 2 : Firnanelty, S.Si., M.Si

()
()
()
()
()
()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin penulis panjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta’ala* karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul **“Pengaruh Penambahan Mengkudu (*Morinda Citrifolia*) pada Ekstrak Biji Wine Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.) terhadap Kadar Kafein”**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang merupakan uswatun hasanah bagi umat manusia. Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan tetapi semua dapat dilalui karena dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada orang tua saya bapak Syamsuddin dan ibu Suriati serta saudara dan keluarga yang selalu ada untuk memberikan kasih sayang, do’a dan dukungan baik moral maupun materil. Tak lupa pula ucapan terimakasih yang sangat besar dan tulus penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku PA dan pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Firnanelty, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dalam memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Asriani Ilyas, S.Si., M.Si. selaku penguji I dan Dr. Hj. Rahmi Damis, M. Ag selaku penguji II yang senantiasa memberi kritik dan saran kepada penulis.
8. Seluruh dosen, staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, staf Fakultas Sains dan Teknologi serta Laboran Jurusan Kimia atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama pendidikan di bangku perkuliahan.
9. Pihak Kampong Kopi Bawakaraeng yang telah memberikan bantuan dalam menyediakan sampel *wine* kopi Arabika untuk penelitian ini.
10. Bapak Drs. H. Sahabuddin Nur dan ibu St. Halijah, S.Pd., M.Pd. serta Wanita Tangguh GCH A6/7 dan MOL18DENUM yang telah memberikan bantuan, dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi memperbaiki segala kekurangan dalam skripsi ini. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Samata, November 2022

Penulis

Syahwah Islamiah
NIM. 60500118004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI VF	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
DAFTAR ISI	vi-vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-7
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8-22
A. Kopi Arabika (<i>Coffea Arabica</i> L.)	8
B. Kafein ($C_8H_{10}N_4O_2$)	12
C. Mengkudu (<i>Morinda Citrifolia</i>).....	13
D. Ekstraksi Cair-cair.....	16
E. Spektrofotometri Ultraviolet-Visible (Uv-vis).....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22-28
A. Waktu dan Tempat	22
B. Alat dan Bahan	22
C. Prosedur Kerja.....	23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29-41
A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan	33
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44-49
LAMPIRAN	50-59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Buah Kopi Arabika.....	8
Gambar 2.2 Biji <i>Wine</i> Kopi Arabika dan Bubuk <i>Wine</i> Kopi Arabika.....	11
Gambar 2.3 Struktur Kafein	13
Gambar 2.4 Buah Mengkudu.....	14
Gambar 2.5 Ekstraksi Cair-cair	17
Gambar 2.6 Spektrofotometer Uv-Vis.....	19
Gambar 4.1 Hasil Positif Uji Kualitatif Kafein Metode Parry	30
Gambar 4.2 Panjang Gelombang Serapan Maksimum Senyawa Kafein	30
Gambar 4.3 Reaksi Kafein dengan $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$	36
Gambar 4.4 Kurva Deret Standar	37
Gambar 4.5 Penurunan Kadar Kafein <i>Wine</i> Kopi Arabika	38




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Sidik Ragam dari Ringkasan Rumus ANOVA	28
Tabel 4.1 Rendemen Ekstrak Sampel.....	29
Tabel 4.2 Nilai Absorban Enzim Protease	29
Tabel 4.3 Absorban Deret Standar Kafein	31
Tabel 4.4 Kadar Kafein <i>Wine</i> Kopi Arabika Sebelum dan Setelah Penambahan Buah Mengkudu.....	31
Tabel 4.5 Analisis Ragam Sidik ANOVA	32
Tabel 4.6 Hasil Uji DMRT Kadar Kafein	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Alur Penelitian	49
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	50
Lampiran 3 Contoh Perhitungan	51
Lampiran 4 Analisis Data ANOVA (<i>Analysis of Varians</i>)	57



ABSTRAK

Nama : Syahwah Islamiah
NIM : 60500118004
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Judul : Pengaruh Penambahan Mengkudu (*Morinda Citrifolia*) pada Ekstrak Biji *Wine* Kopi Arabika (*Coffea Arabica L.*) terhadap Kadar Kafein

Kafein merupakan senyawa alkaloid yang terkandung dalam *wine* kopi Arabika (*Coffea Arabica L.*). Kebiasaan mengonsumsi kopi secara berlebihan akan menimbulkan penyakit seperti insomnia, hipertensi, serangan jantung, dan penyakit lainnya. Dosis kafein yang diperbolehkan menurut SNI 01-7152-2006 sebesar 150 mg perhari atau 50 mg persajian. Salah satu alternatif yang digunakan untuk menurunkan kadar kafein yaitu dengan cara dekafeinasi dengan penambahan mengkudu (*Morinda Citrifolia*). Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penambahan mengkudu sebesar 0, 5, 10, 25, 30 dan 35% pada ekstrak biji *wine* kopi Arabika (*Coffea Arabica*) terhadap kadar kafein. Kadar kafein *wine* kopi Arabika yang diperoleh sebelum penambahan mengkudu sebesar 1,7467%. Konsentrasi optimum dalam menurunkan kadar kafein yaitu pada konsentrasi 35% yang menurunkan kadar kafein menjadi 0,1167%. Berdasarkan analisis ANOVA, P -signifikan $< 0,05$ H_0 ditolak dan H_1 diterima. Diketahui bahwa penambahan mengkudu memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penurunan kadar kafein $F_{hitung} (205,824) > F_{tabel} (3,11)$. Kadar kafein yang diperoleh setiap variasi konsentrasi memenuhi syarat SNI 01-7152-2006.

Kata kunci: *Wine* Kopi Arabika, Buah Mengkudu, Spektrofotometer Uv-Vis, Kafein

ABSTRACT

Name : Syahwah Islamiah
NIM : 60500118004
Majors : Chemistry
Faculty : Science and Technology
Topic : *The Effect of Adding Noni (Morinda Citrifolia) to The Extract of Arabica Coffee Wine (Coffea Arabica L.) on Caffeine Levels*

Caffeine is an alkaloid compound contained in Arabica coffee wine (*Coffea Arabica* L.). The habit of consuming coffee in excess will cause diseases such as insomnia, hypertension, heart attacks, and other diseases. The permissible dose of caffeine according to SNI 01-7152-2006 is 150 mg per day or 50 mg serving. One alternative used to reduce caffeine levels is decaffeination with the addition of noni (*Morinda Citrifolia*). This study aims to determine the effect of the addition of noni of 0, 5, 10, 25, 30 and 35% in Arabica coffee wine bean extract (*Coffea Arabica*) on caffeine levels. The caffeine content of Arabica coffee wine obtained before the addition of noni was 1.7467%. The optimum concentration in reducing caffeine levels is at a concentration of 25% which reduces caffeine to 0.1167%. Based on ANOVA analysis, P-significant <0.05 H_0 was rejected and H_1 was accepted. It is known that the addition of noni has a significant effect on decreasing caffeine levels $F_{count} (205.824) > F_{table} (3.11)$. The caffeine content obtained for each concentration variation met the requirements of SNI 01-7152-2006.

Keywords: Arabica Coffee Wine, Noni, Uv-Vis Spectrophotometer, Caffeine

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekspor kopi di Indonesia dapat mencapai 59,2% dan dikelola sendiri sebanyak 40,8% dari keseluruhan hasil produksi kopi yang mencapai 64.000 ton (Suharman dan Gafar, 2017: 87) hingga 700.000 ton per tahun (Winarno dan Perangin-angin, 2020: 86). Jenis kopi yang terkenal di Indonesia antara lain kopi Arabika, kopi Robusta dan kopi Liberika (Oktadina, dkk., 2013: 265). Salah satu jenis kopi yang banyak diekspor yaitu kopi Arabika sebesar 90% (Winarno dan Perangin-angin, 2020: 86). Kopi Arabika banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan seperti kebun kopi yang berlokasi di Kampong kopi Bawakaraeng Kec.Pattallassang Kab.Gowa (Latunra, dkk., 2021: 46).

Kopi Arabika banyak diolah di kalangan masyarakat karena memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis kopi yang lain (Handayani dan Muchlis, 2021: 44). Kualitas citarasa serta aroma yang dimiliki kopi Arabika yang khas, dikarenakan memiliki rasa yang tidak terlalu pahit dan bercitarasa jeruk (Swiranata, dkk., 2020: 150-151). Selain itu, kopi arabika mengandung senyawa kafein yang bermanfaat bagi tubuh. Beberapa penelitian terdahulu terkait kandungan kafein kopi Arabika yaitu Swiranata, dkk., (2020: 151), memperoleh kadar kafein sebesar 1,4-2,4%, Rosalinda, dkk., (2021: 28), memperoleh kadar kafein sebesar 0,4-2,4%. Secara umum, kadar kafein dalam satu cangkir kopi seduh sebesar 0,9%-1,6%. Kadar kafein khususnya pada kopi Arabika yang telah diseduh mencapai 1,4% (Swiranata, 2020: 151). Oleh karena itu pengolahan kopi Arabika yang sifatnya mudah dilakukan

sehingga banyak masyarakat yang mengelola, baik pengolahan sendiri untuk dijual maupun untuk dikonsumsi (Sari, dkk., 2019: 87).

Kopi Arabika dapat diolah menjadi produk olahan minuman melalui proses pemeraman atau fermentasi (Latunra, dkk., 2021: 46). Salah satu produk olahan kopi dengan cara fermentasi yaitu *wine* kopi. Pengolahan *wine* kopi dengan cara pengeringan dilakukan dengan proses penjemuran langsung di bawah matahari. Kulit kopi yang melekat pada biji kopi inilah yang menyebabkan adanya rasa dan aroma *wine*. *Wine* kopi ini aman untuk dikonsumsi meskipun memiliki aroma khas *wine* pada umumnya. *Wine* kopi tidak mengandung alkohol karena saat pengolahannya, alkohol menguap pada suhu 78-80 °C (saat penyangraian). Oleh karena itu, *wine* kopi halal dikarenakan tidak menimbulkan efek yang memabukkan sehingga aman untuk dikonsumsi (Dairobbi, dkk., 2017: 826). Makanan dan minuman yang halal itulah yang seharusnya dikonsumsi karena sudah ditegaskan Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ajakan ayat diatas ditujukan kepada seluruh manusia yang hidup di bumi. Manusia dinjurkan untuk mengonsumsi yang halal di bumi, karena semua yang ada di bumi halal untuk digunakan. Namun, semua yang halal belum tentu baik. Makanan halal terdiri dari empat jenis yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh, tidak semua makanan yang halal sesuai dengan kondisi

masing-masing. Ada makanan yang halal namun tidak memiliki nilai gizi, maka hal itu menjadi kurang baik. Salah satu tumbuhan yang halal dikonsumsi adalah *wine* kopi Arabika karena tidak mengandung alkohol dan memiliki berbagai manfaat bagi tubuh.

Kopi memiliki manfaat jika dikonsumsi karena adanya kandungan kafein yang memiliki efek farmakologis dalam meningkatkan psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga (Ramadhan dan Malingan, 2020: 34), menghilangkan rasa letih, mengantuk serta meningkatkan daya konsentrasi (Suwiyarsa, dkk., 2018: 189). Namun, manfaat kafein tidak berlaku untuk penderita penyakit jantung, diabetes, maag dan hipertensi karena memiliki efek samping jika dikonsumsi melebihi dosis yang seharusnya (Kuncoro, dkk., 2018: 106).

Dosis kafein yang dianjurkan menurut *Food Drug Administration* sebesar 100-200mg/hari sedangkan menurut SNI 01-7152-2006, kadar kafein dalam produk pangan memiliki ambang batas 150 mg perhari serta 50 mg persajian. Kadar yang melebihi nilai tersebut akan menimbulkan efek samping terhadap kesehatan tubuh (Arwangga, dkk., 2016: 110). Efek samping tersebut seperti dapat meningkatkan detak jantung, tangan gemetar, gangguan lambung (Suwiyarsa, dkk., 2018: 189) tekanan darah tinggi, (Kuncoro, dkk., 2018: 106), susah tidur, gelisah, *nerveous* (Oktadina, dkk., 2013: 268) meningkatkan kolesterol, ingatan berkurang, efek ketergantungan (Noviar, dkk., 2016: 40) dan kecacatan pada anak yang dilahirkan oleh ibu hamil (Megananda, dkk., 2019: 52).

Mengonsumsi kopi diperlukan ukuran yang telah ditetapkan dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. al-A'raf/7: 31.

﴿يَبْنَىِٔ ءَاَدَمَ خُذُوْا زَيْتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Terjemahnya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat di atas mengajak keturunan Adam untuk menggunakan pakaian terbaik sekurang-kurangnya dapat menutup aurat karena jika terbuka pasti tidak baik. Hal ini dilakukan disetiap memasuki atau berada di dalam masjid ataupun bangunan khusus. Selain itu, ayat tersebut memerintahkan makan makanan yang halal, enak, bermanfaat, bergizi, serta meminum apa saja yang tidak akan memabukkan atau menimbulkan penyakit dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam melakukan ibadah maupun pada saat mengonsumsi makanan atau minuman, akan tetapi jangan berlebih-lebihan karena Allah swt tidak menyukai dan tidak memberikan rahmat serta ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan. Termasuk kopi dilarang mengonsumsi secara berlebih-lebihan karena dapat menimbulkan mudarat atau penyakit bagi tubuh manusia. Seperti halnya mengonsumsi kafein yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping bagi tubuh. Oleh karena itu diperlukan pengolahan dalam menurunkan kadar kafein (Noviar, dkk., 2016: 40).

Inovasi pengolahan kopi rendah kafein dapat dilakukan dengan menggunakan teknik dekafeinasi. Teknik dekafeinasi digunakan dalam menurunkan kafein dengan penambahan bahan lain (Wijaya dan Yuwono, 2015: 1560). Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam menurunkan kadar kafein seperti penelitian

Oktadina, dkk. (2013: 272) yang menggunakan buah nanas dalam menurunkan kafein dari 2,27% menjadi 1,15% dengan lama waktu fermentasi 36 jam. Penelitian Putri, dkk. (2017: 149) menggunakan getah pepaya dalam menurunkan kafeinnya dari 1,53% menjadi 0,24% dengan konsentrasi getah pepaya 6%. Selain itu, penelitian menggunakan 80% ekstrak buah nanas dengan fermentasi 36 jam menurunkan kafein dari 1,55% menjadi 0,8% (Noviar, dkk., 2016: 45).

Upaya dalam menurunkan kadar kafein pada kopi yaitu dengan memecahkan komponen membran atau selaput sel kopi karena kafein berada dalam membran sel yang terdiri dari 52% protein. Oleh karena itu, protein dapat dipecah dengan penambahan enzim protease sehingga kafein lebih mudah larut (Putri, dkk., 2017: 140). Salah satu buah yang mengandung enzim protease yang dapat berfungsi untuk memecahkan membran adalah mengkudu (Adrian, dkk., 2015: 1137). Enzim protease pada buah mengkudu dapat diperoleh melalui proses ekstraksi pada pH 7. Enzim dapat bekerja secara efektif pada pH tersebut dalam memecah membran sel protein. Menurut Candra, dkk. (2021: 2346) kadar enzim protease dari 100 g buah mengkudu mencapai 0,53%

Sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian menggunakan penambahan mengkudu pada ekstrak biji *wine* kopi Arabika untuk menurunkan kadar kafein sehingga pada penelitian yang akan dilakukan adalah mengetahui pengaruh penambahan mengkudu (*Morinda Citrifolia*) sebesar (0, 5, 10, 25, 30 dan 35)% pada ekstrak biji *wine* kopi Arabika (*Coffea Arabica*) terhadap kadar kafein. Penggunaan konsentrasi tersebut mengacu pada penelitian Imama, dkk., (2019:15) menggunakan konsentrasi (0, 5, 10, 15, 20 dan 25)% kulit kopi dalam menurunkan kafein hingga 0,0042 % dengan konsentrasi terbaik 25%. Penelitian Putri, dkk., (2017: 144) yang

memperoleh konsentrasi getah pepaya terbaik 6% dalam menurunkan kadar kafein dari 0,99% menjadi 0,24%.

Ekstrak *wine* kopi Arabika akan diperoleh dengan metode ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut kloroform untuk memperoleh fraksi kafein secara maksimal (Putri dan Dellima, 2022: 33). Hal ini dikarenakan ekstraksi cair-cair tidak menggunakan suhu ekstrim dan proses ekstraksi berdasarkan perbedaan sifat kepolaran, yang mana kafein bersifat polar dan kloroform yang bersifat semipolar dan membentuk dua lapisan pada proses ekstraksi yang akan dianalisis kadarnya (Elfariyanti, 2020: 6). Analisis kadar kafein dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang maksimum. Instrumen ini digunakan karena biaya analisis yang rendah dan metodenya sederhana (Putri, 2017: 392).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penambahan mengkudu (*Morinda Citrifolia*) sebesar (0, 5, 10, 25, 30 dan 35)% pada ekstrak biji *wine* kopi Arabika (*Coffea Arabica*) terhadap kadar kafein?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penambahan mengkudu (*Morinda Citrifolia*) sebesar (0, 5, 10, 25, 30 dan 35)% pada ekstrak biji *wine* kopi Arabika (*Coffea Arabica*) terhadap kadar kafein.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengaruh penambahan buah mengkudu terhadap kadar kafein pada *wine* kopi Arabika.

2. Menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan dalam bidang sains khususnya pada analisis biji *wine* kopi Arabika, bahwa dengan penambahan mengkudu dapat memberikan pengaruh terhadap kadar kafein yang terdapat pada *wine* kopi Arabika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kopi Arabika (Coffea Arabica L.)

Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.) merupakan salah satu jenis tanaman kopi yang tumbuh pada iklim tropis dan subtropis (Handayani dan Muchlis, 2021: 44). Tanaman kopi biasanya ditemukan di daerah dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 1000-2000 m di atas permukaan laut (Elfariyanti, dkk., 2020: 1-2). Penyebaran tanaman kopi ini dapat ditemukan diberbagai negara dunia, seperti Benua Asia, Afrika, dan Amerika (Irwinsyah, dkk., 2021: 2).

Tanaman kopi termasuk dalam famili *Rubiacea* yang terdiri dari 66 spesies (Handayani, 2016: 222). Kopi Arabika memiliki karakteristik morfologi dengan penampakan tanaman yang mirip semak tebal atau pohon kecil yang tingginya mencapai 3,048 m (Abduh, 2018: 3). Kopi Arabika memiliki berbagai variasi warna seperti warna hijau, kuning, merah muda hingga merah tua tergantung pada tingkat kematangan yang dimiliki (Srikandi, dkk., 2019: 23). Biji kopi Arabika memiliki bentuk yang agak lonjong memanjang (Heriyanti, dkk., 2021: 52). Buah kopi Arabika dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Buah Kopi Arabika
(Sumber: Elfariyanti, dkk.,2020: 2)

Klasifikasi tanaman kopi Arabika adalah sebagai berikut (Vionita, 2020: 5):

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Kelas : Dikotil
Ordo : Rubiales
Famili : Rubiaceae
Genus : *Coffea*
Spesies : *Coffea arabica* L.

Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.) memiliki kandungan 35% karbohidrat, 5,2% fiber, 10,7% mineral, 84,2% air, 8,9% protein, 4,1% gula dan 0,7% abu (Harahap, 2017: 202). Biji kopi mengandung senyawa kafein, asam amino, asam klorogenat, asam lemak, trigonelin, asam organik dan aroma volatil (Suena dan Antari, 2020: 112). Kulit biji kopi memiliki kandungan senyawa polifenol seperti asam hidroksinamat, asam ferulat, flavonol, flavan-3-ol, tanin dan epikatekin (Harahap, 2017: 202).

Kopi memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai antikanker, antioksidan, merangsang kerja otak, menghilangkan rasa kantuk, letih dan lapar, mendorong kinerja sistem syaraf pusat, dan meningkatkan daya konsentrasi (Suwiyarsa, dkk., 2018: 189). Selain dari manfaat yang terkandung, kopi juga memiliki efek samping. Efek samping yang ditimbulkan jika mengonsumsi kopi secara berlebihan antara lain dapat menimbulkan gangguan seperti rasa gelisah, susah tidur, rasa cemas, tekanan darah tinggi, kehilangan selera makan, peningkatan detak jantung, dan respirasi (Rosalinda, dkk., 2021: 27). Selain itu, kopi juga memiliki sifat *Low Density Lipoprotein* yang menyebabkan tubuh menjadi tremor, rasa gugup, mual, kejang dan hipertensi (Susanti,


dkk., 2019: 29). Efek tersebut dapat diminimalisir dengan pengolahan biji kopi dengan menurunkan kadar kafein yang terkandung dalam kopi salah satunya dengan menggunakan teknik dekafeinasi.

Dekafeinasi merupakan proses dalam menurunkan kadar kafein yang terdapat pada kopi. Proses ini menggunakan bantuan bahan-bahan organik, non-organik dan menggunakan enzim. Selain itu, proses dekafeinasi dapat menggunakan pelarut (*solvent decaffeination*) dan air (*water decaffeination*). Kopi yang telah mengalami proses dekafeinasi dapat dijadikan sebagai produk alternatif pada masyarakat untuk mengurangi konsumsi kafein yang terlalu tinggi (Utama, dkk., 2022: 78).

Kandungan kafein yang terdapat pada kopi, banyak ditemukan pada sel biji kopi. Pada bagian ini, terdapat sekitar 40% lemak, 8% karbohidrat dan 52% protein. Protein pada sel biji kopi akan mengalami pemecahan pada bagian membran sehingga mengalami penurunan kadar kafein. Enzim yang berperan dalam proses hidrolisis yaitu enzim proteolitik. Enzim ini dapat diisolasi dari beberapa bahan alam seperti enzim papain dari pepaya, renin dari sapi, bromelin dari nanas, dan fisin dari getah pohon ficus (Utama, dkk., 2022: 78). Selain dari teknik dekafeinasi, kopi juga dapat diolah dengan menggunakan metode fermentasi yang dapat menghasilkan *wine* kopi (Maramis, dkk., 2013: 123).

Wine kopi adalah kopi yang diolah dengan cara fermentasi dengan waktu lama sehingga memiliki cita rasa menyerupai aroma *wine*. *Wine* kopi berasal dari biji kopi Arabika yang tumbuh pada ketinggian 1500 m di atas permukaan laut. Proses pengolahan biji kopi Arabika menjadi *wine* kopi dilakukan dengan pengeringan biji kopi Arabika melalui proses penjemuran langsung hingga daging buah kopi kering dan melekat sempurna pada biji kopi. Proses pengeringan ini dapat memakan waktu sekitar

30-60 hari. Semakin lama proses pengeringan, maka daging buah kopi semakin melekat yang dapat menyebabkan timbulnya rasa dan aroma *wine* (Ramadhan dan Malingan, 2020: 34). Biji *wine* kopi Arabika dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2 (a) Biji *Wine*Kopi Arabika (b) Bubuk *Wine* Kopi Arabika
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Prinsip fermentasi biji kopi dengan cara pengeringan bertujuan menguraikan komponen senyawa yang terdapat dalam lapisan lendir biji kopi menggunakan bantuan mikroorganisme alami. Selain itu, proses fermentasi dapat dipercepat dengan adanya bantuan oksigen dari udara (Tambarta, dkk., 2021: 32). Selama proses fermentasi biji kopi Arabika, terjadi perubahan struktur fisik dari biji kopi yang dihasilkan seperti penyusutan, tekstur yang rapuh dan perubahan warna. Selain proses fisik pada fermentasi, juga terjadi perubahan kimiawi seperti pembentukan citarasa dari komponen senyawa asam amino, asam organik serta gula pereduksi dalam biji kopi (Swiranata, 2020: 151).


Istilah *wine* diberikan karena rasa dan aroma *wine* yang dihasilkan pada saat penyeduhan kopi. Aroma *wine* tersebut dihasilkan karena adanya perombakan senyawa pada kopi setelah proses fermentasi. Namun, aroma yang dihasilkan tidak seperti *wine* pada umumnya yang terkandung pada alkohol. *Wine* kopi tidak mengandung alkohol karena sifatnya yang mudah menguap pada suhu tinggi sekitar 195-200°C. Titik didih

etanol pada suhu 78-80°C, menyebabkan terjadinya penguapan pada saat proses penyangraian *wine* kopi (Dairobbi, dkk., 2017: 823).

B. Kafein ($C_8H_{10}N_4O_2$)

Kafein atau 1,3,7-trimetilxantin termasuk golongan alkaloid purin dengan rumus molekul $C_8H_{10}N_4O_2$ (Isnindar, dkk., 2016: 188). Kafein dapat diisolasi dari bahan alam yang terdiri dari 60 jenis tanaman misalnya pada teh (1-4,8%), kopi (1-1,5%), dan biji kola (2,7-3,6%). Kafein dapat diproduksi secara komersial menggunakan metode ekstraksi dari tanaman tertentu yang kemudian disintesis lebih lanjut. Produksi kafein bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan suatu industri minuman untuk diproduksi dan dikomersilkan kepada konsumen. Selain itu, kafein juga dapat dimanfaatkan sebagai rasa dan aroma makanan, penguat rasa, dan pelengkap bumbu dalam keperluan industri dan rumah (Purba dan Andaka, 2018: 10).

Kafein merupakan stimulan dengan tingkat sedang yang sering diduga sebagai penyebab kecanduan. Efek kecanduan ini dapat timbul apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam kurun waktu yang lama. Kafein sangat dianjurkan untuk dikonsumsi dalam jumlah tertentu dan tidak melebihi batas yang diperbolehkan. FDA (*Food Drug Administration*) mengungkapkan bahwa dosis pada kafein yang diizinkan berkisar antara 100-200 mg/hari (Aprilia, dkk., 2018: 38), Sedangkan menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) 01-7152-2006 batas maksimum kafein dalam makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian (Elfariyanti, dkk., 2020: 3). Adapun gambar struktur kafein dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini:



Gambar 2.3 Struktur Kafein

Kafein memiliki sifat fisik berupa bubuk putih yang tidak berbau. Kafein mempunyai rumus molekul yaitu $C_8H_{10}N_4O_2$ dengan wujud senyawa 1,3,5- trimethylxanthine yang terbentuk dari kerangka dasar atom karbon (C), hidrogen (H), nitrogen (N) dan oksigen (O). Kafein memiliki nilai densitas 194,19 g/mol, titik leleh $227-228^{\circ}C$ (*anhydrous*), $234-235^{\circ}C$ (*monohydrous*) dan titik didih sebesar $178^{\circ}C$ (Purba dan Andaka, 2018: 10).

Kopi mengandung senyawa aktif yang secara farmakologi merupakan turunan metilxantin, yakni kafein. Senyawa kafein merupakan salah satu jenis alkaloid yang terdapat didalam biji kopi, daun teh dan biji coklat (Widowaty, dkk., 2020: 80). Kafein termasuk golongan metilxantin dari gugus alkaloid yang terbentuk secara alami berasal dari pembentukan derivat xantin (basa purin). Senyawa alkaloid yang terkandung di dalam kopi berkisar antara 1,0 - 2,5%. Dampak positif dari kafein pada kopi menyebabkan stimulasi otot jantung, peregangan otot polos, dan merangsang kinerja syaraf pusat. Sedangkan dampak negative jika dikonsumsi secara berlebihan seperti mengakibatkan tremor, hipertensi, mual, gugup, dan mengalami kejang kejang (Prasetyo, dkk., 2020: 76).

C. Mengkudu (*Morinda Citrifolia*)

Mengkudu (*Morinda Citrifolia*) adalah tanaman iklim tropis yang sering dijadikan sebagai obat herbal. Mengkudu telah lama dikenal oleh masyarakat sejak 200 tahun silam saat migrasi Polinesia ke wilayah Asia tenggara (Sari, 2015: 35). Tanaman

mengkudu dapat tumbuh pada berbagai iklim dan biasanya ditemukan pada ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut. Selain itu mengkudu juga dapat tumbuh dan berkembangbiak pada berbagai kondisi suhu mulai 5-18 °C hingga suhu 32-38 °C (Safitri, dkk., 2018: 3).

Buah mengkudu (*Morinda citrifolia*) termasuk dalam famili *Rubiaceae*. Buah mengkudu sering dijumpai dengan ciri-ciri buah yang berwarna hijau mengkilap disertai bintik-bintik biji pada permukaannya. Buah ini memiliki bentuk *oval* sedikit agak lonjong serta biji kecil yang terdapat pada daging buah (Megananda, dkk., 2019: 52). Buah mengkudu memiliki panjang sekitar 3-10 cm dan lebar 3-6 cm. Daun mengkudu bentuk bersilangan tegak lurus pada ujungnya dengan warna hijau mengkilap. Mengkudu berwarna putih jika telah matang dan berbau tengik (Abnaz dan Levita, 2018: 297). Tanaman ini sering ditemukan di hutan, kebun dan tumbuh liar di pekarangan warga (Megananda, dkk., 2019: 52). Buah mengkudu dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut.



Gambar 2.4 Buah Mengkudu
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Klasifikasi dari buah mengkudu adalah sebagai berikut (Abnaz dan Juth, 2018: 297):

Kindom : Plantae
Filum : Angiospermae
Subfilum : Dicotyledonae
Divisi : Lignosae
Famili : Rubiaceae
Genus : *Morinda*
Spesies : *Morinda citrifolia*

Buah mengkudu memiliki kandungan senyawa flavonoid, alizarin, saponin, acubin, alkaloid, asam kaprik, antrakuinon, asam malat, asam sitrat, gum dan glukosa (Muharrama, dkk., 2015: 2). Glukosa berguna sebagai nutrisi, baik bagi pertumbuhan tanaman mengkudu sendiri, maupun bagi makhluk hidup lain. Asam kaprik menghasilkan bau tidak sedap pada buah mengkudu yang telah matang (Rahmawati, dkk., 2015: 97). Buah ini memiliki manfaat mulai dari akar, batang, daun, dan buah. Tanaman ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai keperluan seperti obat herbal, antibakteri, insektisida, analgesik, antikanker, imunostimultan, antiparasit, penenang sekaligus imunomodulasi, antiinflamasi, antineoplastik serta antiradang (Abnaz dan Levita, 2018: 298).

Buah mengkudu memiliki kandungan enzim di dalamnya yang memiliki keterkaitan dengan proses bioaktivitas. Pemanfaatan buah mengkudu secara luas digunakan dalam produksi obat-obatan khususnya untuk mengobati luka besar. Buah ini memiliki kandungan enzim dengan aktivitas protease yang berperan dalam pengaturan pendewasaan sel, sintesis kolagen, perbanyakan sel, dan pergantian

kolagen dalam proses penyembuhan luka pada kulit (Ishartani, 2011: 78). Enzim protease merupakan salah satu enzim proteolitik yang berfungsi dalam menghidrolisis ikatan peptida pada protein. Enzim protease pada buah mengkudu secara luas dimanfaatkan dalam industri minuman seperti pembuatan bir dan deterjen (Candra, dkk., 2021: 1).

D. Ekstraksi Cair-Cair

Ekstraksi adalah proses perpindahan suatu zat dari larutan asal ke dalam pelarut tertentu. Prinsip dasar ekstraksi berdasarkan pada perbedaan kelarutan komponen-komponen yang ada dalam campuran yang dapat larut berdasarkan tingkat kepolaran yang dimiliki (Aji, dkk., 2017: 37). Prinsip tersebut didasarkan oleh senyawa metabolit sekunder pada sampel akan mudah larut jika berada pada pelarut dengan tingkat polaritas yang sama (Permadi, 2015: 2). Ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekstraksi padat-cair (*leaching*) dan ekstraksi cair-cair (Aji, dkk., 2017: 37).

Ekstraksi cair merupakan proses pemisahan komponen kimia yang dihasilkan dari dua buah fase yang tidak saling bercampur. Hal ini disebabkan sebagian komponen larut dalam fase pertama dan beberapa yang lain larut sebagian. Spesi yang mengalami dispersi akan mengalami guncangan akibat kesetimbangan konsentrasi zat yang diekstraksi membentuk dua buah fase. Proses ini dirangkaikan dengan mendinginkan larutan yang diekstrak sehingga terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan dari zat cair. Komponen kimia yang mengalami pemisahan akan masuk ke dalam kedua fase tersebut yang sesuai dengan tingkat kepolaran yang dimiliki dengan perbandingan konsentrasi yang tetap (Yuliana, dkk., 2021: 109).

Ekstraksi cair-cair adalah ekstraksi dengan pelarut yang tidak bercampur satu dengan yang lainnya dan melibatkan analit dari fase air ke dalam pelarut organik dengan tingkat kepolaran yang sama. Proses ekstraksi yang terjadi dalam komponen larutan melibatkan komponen senyawa polar dengan komponen pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sesuai mengalami ionisasi. Sementara itu, senyawa polar yang mengalami ionisasi akan tertahan dalam fase air akibat adanya pengaruh pelarut (Herdiana dan Aji, 2020: 101). Ekstraksi cair-cair dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini.



Gambar 2.5 Ekstraksi Cair-cair
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Prinsip dari ekstraksi cair-cair berdasarkan pada hukum *Nernst* dengan distribusi pelarut dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Semakin stabil kompleks maka, semakin besar harga K_d sehingga nilai efisiensi ekstraksi juga semakin tinggi (Dilla, dkk., 2018: 68). Kelebihan dari ekstraksi cair-cair antara lain dapat bekerja dalam suhu ruang, memisahkan sampel yang sensitif terhadap suhu tertentu, serta kecilnya energi relatif yang dibutuhkan (Mirwan, 2013: 33). Adapun kekurangan dari ekstraksi cair-cair yaitu campurannya perlu dipisahkan lagi menggunakan metode penguapan (Mirwan, 2013: 33).

Ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut (Tambun, dkk., 2016: 54):

1. Ukuran sampel, semakin kecil ukuran sampel maka akan semakin besar luas permukaan sampel sehingga kontak yang terjadi antara sampel dengan pelarut akan semakin besar. Maka dari itu proses ekstraksi akan lebih efektif.
2. Suhu, perlu digunakan suhu yang sesuai dengan sifat senyawa yang hendak diekstraksi. Proses ekstraksi akan semakin cepat jika berada pada suhu yang tinggi. Namun terdapat beberapa senyawa yang tidak tahan panas sehingga perlu diperhatikan suhu yang digunakan.
3. Jenis pelarut, larutan pengestrak yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kepolaran dari senyawa yang hendak diekstraksi.

E. Spektrofotometri Ultraviolet-Visible (Uv-vis)

Metode spektrofotometri UV-Vis adalah metode instrumentasi berdasarkan pada hukum *Lambert Beer*. Hukum *Lambert Beer* menjelaskan hubungan antara konsentrasi larutan analit yang berbanding lurus dengan absorbansi tetapi berbanding terbalik terhadap transmittan (Iskandar, 2017: 67). Spektrofotometri UV-Vis menggunakan metode pengukuran energi relatif apabila energinya diteruskan, dipantulkan dan dipancarkan sebagai fungsi panjang gelombang (Putri, 2017: 391).

Spektrofotometer UV-Vis biasa digunakan dalam melakukan berbagai analisis baik itu analisis kuantitatif maupun kualitatif (Badriyah dan Manggara, 2015: 26). Spektrofotometer UV-Vis adalah spektrofotometer yang menggunakan sinar UV dan juga cahaya tampak dengan mengacu pada energi cahaya dari zat kimia yang dapat mencapai panjang gelombang tertinggi (Lexia dan Ngibad, 2021: 243). Prinsip dasar spektrofotometer didasarkan pada hukum *Lambert Beer* yaitu apabila cahaya

monokromatis melewati media transparan, intensitas cahaya yang diteruskan akan menurun sebanding kepekaan dan tebal media yang digunakan. Sinar diserap sebanding dengan konsentrasi sampel. Sinar yang diserap berupa absorban sedangkan sinar yang diteruskan berupa transmittan. Sinar yang diteruskan akan melewati sebuah detektor dengan mengubah sinar menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan terbaca dalam *read out* (monitor) dengan bentuk puncak-puncak (spektrum) (Yanlinastuti dan Fatimah, 2016: 23). Spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini:



Gambar 2.6 Spektrofotometer UV-Vis
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan dalam analisis kuantitatif dengan kurva kalibrasi pada hubungan konsentrasi deret larutan secara komparatif dalam menganalisa kadar suatu sampel. Analisis kuantitatif ini dapat ditentukan dari nilai absorbansi berdasarkan spektrum senyawa pengompleks yang dianalisis. Analisis kualitatif dilakukan dengan membaca puncak spektrum yang diperoleh dari panjang gelombang sampel (Yanlinastuti dan Fatimah, 2016: 23).

Hukum *Lambert Beer* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$A = \log \left(\frac{I_0}{I} \right) = a.b.c \dots\dots\dots 2.1$$

Dimana,

- I_0 = intensitas sinar sebelum melalui sampel
- I = intensitas sinar setelah melalui sampel
- A = absorban
- a = absorptivitas ($L/mol^{-1} cm^{-1}$)
- b = lebar sel yang dilewati sinar (cm)
- c = konsentrasi (mol/L)

Pengukuran spektrofotometer *UV-Visible* menjangkau panjang gelombang 200-400 nm sedangkan untuk sinar tampak mencapai hingga panjang 400-750 nm (Lexia dan Ngibad, 2021: 243). Kelebihan yang dimiliki oleh instrumentasi Spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan untuk analisis berbagai zat organik maupun zat anorganik, memiliki kesalahan relatif 1-3%, selektif, proses analisis dengan cepat dan tepat, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam analisisnya. Selain itu spektrofotometer UV-Vis ini bisa digunakan dalam menganalisis zat meskipun kuantitasnya terbilang kecil. Hasil pengukuran yang didapatkan menggunakan instrumen ini cukup akurat karena hasil yang terbaca langsung dicetak dalam bentuk grafik yang telah diregresikan (Rohmah, dkk., 2021: 121). Kelebihan spektrofotometer ini juga dapat mendeteksi sinar putih melalui prisma, celah putih ataupun grating (Putri, 2017: 391).

Kekurangan dan metode ini karena setiap sinar yang melewati analit harus dianggap sebagai cahaya monokromatis. Penyerapannya dikerjakan pada volume dengan ketebalan yang sama. Zat kimia saat menyerap cahaya tidak bergantung pada zat lain yang terdapat pada larutan, larutan fluoresensi atau fosforesensi tidak dapat diukur serta indeks biasnya yang dipengaruhi oleh konsentrasi setiap larutan (Iskandar, 2017: 67).

Komponen spektrofotometer Uv-Vis terbagi atas beberapa bagian yang memiliki fungsi sebagai berikut (Noviyanto, 2020: 7):

1. Sumber cahaya pada spektrofotometer UV-Vis ini berupa cahaya polikromatis dari lampu Deuterium pada daerah ultraviolet dengan panjang gelombang 0-400 nm serta lampu Tungsten atau Wolfram di daerah *visible* dengan panjang gelombang 400-800 nm.
2. Monokromator digunakan dalam menyeleksi panjang gelombang.
3. Kuvet sampel digunakan sebagai wadah sampel. Kuvet memiliki lebar 1 cm dengan bentuk persegi panjang, permukaan sejajar dan lurus secara optis, tidak bereaksi dengan bahan kimia, transparan, tidak rapuh dan bentuknya sederhana tapi *solid*.
4. Detektor digunakan sebagai penangkap cahaya jika melewati sampel.
5. *Read Out* berfungsi sebagai sistem yang dapat menangkap isyarat dari detektor kemudian ditampilkan di layar display dalam bentuk absorbansi atau angka transmittan.

Penelitian terkait pengukuran kadar kafein seperti penelitian yang dilakukan Susanti, dkk., (2019: 32) pada sampel kopi hijau sediaan menghasilkan kadar kafein sebesar $0,155 \pm 0,053$ % dan kopi hitam sediaan sebesar $0,696 \pm 0,014$ %. Penelitian Arwanga, dkk., (2016: 113) memperoleh kadar kafein pada kopi mentah sebesar $1,28 \pm 0,82$ % dengan kadar airnya sebesar 3%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Februari-Agustus di Laboratorium Analitik, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Bioteknologi Terpadu Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Spektrofotometer UV-Vis (Varian *cary* 50), Spektrofotometer *Visible* (*Thermo Scientific*), neraca analitik (*Kern*), alat sentrifugasi (*Zenith Lab Jiangsu*), inkubator (*Thermo Scientific*), termometer, Vortex (*Velp Scientifica*), mesin *roasting* kopi, grinder kopi, *hot plate* (*Maspion*), *blender* (*Miyako*), corong pisah, labu ukur, pipet ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, gelas kimia, pipet tetes, botol semprot, statif dan klem, corong kaca, batang pengaduk, spatula dan *bulb*.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *aluminium foil*, akuades (H_2O), amonium hidroksida (NH_4OH), amonium sulfat ($(NH_4)_2SO_4$), asam klorida (HCl), asam trikloroasetat ($C_2HCl_3O_2$), biji *wine* kopi Arabika (*Coffee Arabica*), buffer natrium fosfat pH 7, buffer tris-HCl pH 7, kasein, kloroform ($CHCl_3$) p.a, kobalt (II) nitrat ($(Co(NO_3)_2)$), kertas saring, kertas saring *whatman*, mengkudu (*Morinda Citrifolia*), metanol (CH_3OH), natrium karbonat (Na_2CO_3), Pb-Asetat ($Pb(C_2H_3O_2)_2$), standar kafein ($C_8H_{10}N_4O_2$), L-tirosin ($C_9H_{11}NO_3$), dan tisu.

C. Prosedur Kerja

1. Preparasi dan Ekstraksi Wine Kopi Arabika

Biji *wine* Kopi Arabika yang digunakan berasal dari Kampong Kopi Bawakaraeng. Biji *wine* kopi yang digunakan telah difermentasi di Kampong Kopi dengan cara, biji *wine* kopi dicuci bersih tanpa menghilangkan daging bijinya. Biji kopi Arabika dikeringkan dan dijemur di bawah sinar matahari langsung dalam rentang waktu 1 bulan. Setelah proses pengeringan selesai, didapatkan biji *wine* kopi kering. Biji *wine* kopi kering tersebut kemudian disangrai menggunakan suhu 180°C selama 30 menit. Setelah itu, biji *wine* kopi digiling dan dihasilkan bubuk *wine* kopi Arabika (Irwinsyah, dkk., 2021: 3).

Sebanyak 2 gram sampel bubuk kopi dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dilarutkan dengan *aquades* sebanyak 100 mL dan dipanaskan pada suhu 100 °C hingga ½ volume larutan. Lalu filtratnya disaring dan ditambahkan Pb-Asetat tetes demi tetes, kemudian larutan sampel disaring. Selanjutnya larutan didinginkan dan dimasukkan ke dalam corong pisah sebanyak 25 mL. Kemudian diekstraksi dengan kloroform 25 mL berturut-turut sebanyak 2 kali. Selanjutnya larutan pada lapisan bawah ditampung di dalam gelas kimia. Kemudian pelarut kloroform diuapkan di dalam penangas air sehingga didapatkan ekstrak *wine* kopi (Suwiyarsa, 2018: 190).

Ekstrak *wine* kopi yang dihasilkan dilarutkan dengan *aquades* lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Selanjutnya dilakukan pengenceran dengan cara 2 mL larutan tersebut dipipet ke dalam labu ukur 50 mL dan diencerkan dengan *aquades* sampai tanda batas (Suwiyarsa, 2018: 190).

2. Preparasi dan Ekstraksi Buah Mengkudu

Langkah awal yang dilakukan yaitu memilih buah mengkudu yang akan digunakan. Kemudian dipilih mengkudu yang telah matang. Setelah itu buah mengkudu dicuci dengan bersih, lalu mengkudu dikupas kulitnya. Selanjutnya buah mengkudu yang sudah dibersihkan, diiris tipis-tipis. Kemudian daging buah dan bijinya dipisahkan. Daging buah mengkudu dihaluskan menggunakan *blender* sehingga diperoleh buah mengkudu halus yang akan diekstraksi (Rismawati, dkk., 2016: 3).

Sebanyak 100 mL mengkudu yang telah dihaluskan dihomogenkan dalam 200 ml buffer fosfat pada pH 7. Filtrat campuran disaring dan dipisahkan menggunakan alat sentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm selama 30 menit. Setelah itu amonium sulfat 60% ditambahkan ke supernatan dan dibiarkan mengendap selama 24 jam. Setelah pengendapan, ekstrak kasar enzim protease dipisahkan menggunakan alat sentrifugasi pada kecepatan 7000 rpm selama 20 menit dan dihasilkan ekstrak kasar enzim protease pada buah mengkudu (Candra, 2021: 2344).

3. Uji Aktivitas Ekstrak Kasar Enzim Protease pada Buah Mengkudu

Sebanyak 1 mL protease ditambahkan ke dalam 1 mL 1% (b/v) kasein, 1 mL 0,01 M buffer natrium fosfat (pH 7) dan 1 mL buffer tris-HCl. Campuran tersebut diinkubasi pada suhu 37 °C selama 30 menit dan dipisahkan menggunakan alat sentrifugasi dengan kecepatan 1200 rpm, kemudian ditambahkan 2 mL asam trikloroasetat 0,1 M. Larutan didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit dan dipisahkan lagi menggunakan alat sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. Filtrat ditambahkan dengan 5 mL Na_2CO_3 0,4 M dan diukur pada panjang gelombang 578 nm (Candra, 2021: 2344).

4. Analisis kualitatif kafein Metode Parry

Reagen Parry dibuat dengan melarutkan 0.25 gram kobalt (II) nitrat dengan methanol 16 mL dan dimasukkan ke dalam labu takar 50 mL lalu dihomogenkan dengan menambahkan *aquades*. Sebanyak 1 mL ekstrak kafein yang telah dilarutkan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi reagen Parry dan amonium hidroksida encer beberapa tetes. Setelah itu diamati perubahan warna yang terjadi. Larutan berwarna biru tua atau hijau mengandung kafein (Latunra, dkk., 2021: 47).

5. Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum Kafein

Standar kafein ditimbang sebanyak 20 mg. Standar kafein dilarutkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Kemudian dilarutkan dengan *aquades* sampai tanda batas dan dikocok hingga homogen. Diperoleh larutan standar kafein dengan konsentrasi 200 ppm. Larutan standar 200 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL sebanyak 15 mL. Kemudian diencerkan dengan *aquades* sampai tanda batas, sehingga diperoleh larutan baku 30 ppm. Diukur serapannya pada panjang gelombang antara 270 nm-350 nm (Suwiyarsa, 2018: 190).

6. Penentuan Kurva Kalibrasi Kafein

Standar kafein ditimbang sebanyak 20 mg. Standar kafein dilarutkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Kemudian dilarutkan dengan *aquades* sampai tanda batas dan dikocok hingga homogen. Diperoleh larutan standar kafein dengan konsentrasi 200 ppm. Kurva kalibrasi diperoleh dari deret standar dengan konsentrasi 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30ppm, 40 ppm dan 50 ppm, dipipet masing-masing sejumlah 0 mL, 5 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL dan 25 mL ke dalam labu ukur 100 mL. Setelah itu diencerkan dengan *aquades* sampai tanda batas. Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang serapan maksimum. *Aquades* digunakan sebagai blanko (Suwiyarsa, 2018: 190).

7. Penentuan Kadar Kafein *Wine* Kopi Arabika

Kadar kafein pada sampel diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh pada penentuan panjang gelombang maksimum yaitu 277 nm. Konsentrasi kafein akan ditentukan berdasarkan persamaan regresi dari kurva kalibrasi standar (Suwiyarsa, 2018: 190).

Kadar kafein dalam sampel dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Kadar kafein (g/g)} = \frac{M \cdot V \cdot F_p}{m}$$

Keterangan:

- M = Konsentrasi (ppm) atau (mg/L);
- V = Volume (L);
- Fp = Faktor pengenceran dan
- M = Berat sampel (mg).

8. Penentuan Kadar Kafein Setelah Penambahan Ekstrak Kasar Enzim Protease Buah Mengkudu Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis

Bubuk *wine* kopi Arabika ditambahkan dengan ekstrak kasar enzim protease pada buah mengkudu dengan beberapa konsentrasi yaitu 0%; 5%; 10%; 25%; 30%; 35% terhadap bubuk *wine* kopi Arabika. Setiap variasi komposisi bubuk biji *wine* kopi Arabika masing-masing ditambahkan *aquades* hingga 100 mL. Selanjutnya larutan *wine* kopi Arabika didiamkan pada suhu ruang selama 30 menit. Setelah itu larutan *wine* kopi Arabika dipanaskan hingga ½ volume larutan dan disaring. Kemudian filtrat ditambahkan Pb-Asetat lalu disaring. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah sebanyak 25 mL. Lalu diekstrak dengan kloroform berturut-turut 25 mL sebanyak 2 kali. Filtrat ditampung dalam gelas kimia kemudian diuapkan di dalam penangas (Suwiyarsa, 2018: 190).

Ekstrak kafein dilarutkan dan dihipitkan dalam 100 ml *aquades*. Selanjutnya larutan sampel kafein tersebut dipipet sebanyak 2 mL dan diencerkan dengan *aquades* ke dalam labu ukur 50 mL. Kadar kafein pada sampel diukur dengan spektrofotometer

UV-Vis pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh pada penentuan panjang gelombang maksimum yaitu 277 nm. Konsentrasi kafein akan ditentukan berdasarkan persamaan regresi dari kurva kalibrasi standar (Suwiyarsa, 2018: 190).

Kadar kafein dalam sampel dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Kadar kafein (mg/g)} = \frac{M \cdot V \cdot F_p}{m}$$

Keterangan:

M = Konsentrasi (ppm) atau (mg/L);

V = Volume (L);

F_p = Faktor pengenceran

m = Berat sampel (g).

9. Analisis Data ANOVA (*Anova of Variance*)

Analisis data yang digunakan adalah uji ANOVA (*Analysis of Variance*) satu arah (*One way*) menggunakan program *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 24 dengan tingkat kepercayaan 95%. Prosedur uji ANOVA dalam aplikasi SPSS versi 24 yaitu diawali dengan membuka aplikasi SPSS dan menekan pilihan *variable view*. Selanjutnya, dimasukkan data yang akan dianalisis. Setelah itu, dipilih data *View* dan pada bagian toolbars diklik *analyze*. Pilih *compare means* dan selanjutnya dipilih *oneway* ANOVA. Setelah itu, dimasukkan jumlah pada *dependedlist* dan perlakuan pada bagian *factor*. Kemudian, dipilih *option* dan menekan pilihan *descriptive* dan *homogeneity of variances test* lalu memilih *continue*. Selanjutnya dipilih *post hoc* dan diklik *duncan* (DMRT), kemudian diatur *significance level* pada signifikan 0,05 dan diklik *continue*. Setelah itu, dipilih OK dan dicek hasil uji ANOVA pada *sheet* yang baru yang ditampilkan secara otomatis oleh aplikasi.

Berdasarkan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini, H₀ diterima apabila P > 0,05 atau F_{hitung} < F_{tabel} 5% (tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap kadar kafein atau tidak beda nyata). Sedangkan H₀ ditolak atau H₁ diterima apabila P < 0,05

atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ (ada pengaruh variabel bebas terhadap kadar kafein atau berbeda nyata). Dengan variabel bebas yaitu perlakuan variasi konsentrasi 0% (sebelum penambahan mengkudu), 5%, 10%, 25%, 30%, 35%. Jika hasil yang diperoleh berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji DRMT (*Duncan's Multiple Range Test*).

Data uji ANOVA ini akan dianalisis secara manual sesuai dengan rumus pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Analisis Sidik Ragam dari Ringkasan Rumus ANOVA

Sumber Keragaman	Derajat bebas (db)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah	FK	F.hitung
Perlakuan	$t - 1$	$\left(\frac{\sum X^2}{r}\right) - FK$	$\frac{JKP}{dbp}$	$\left(\frac{\sum X^2}{n}\right)$	$\frac{KTP}{KTG}$
Galat	$t (r - 1)$	$JKT - JKP$	$\frac{JKG}{dbg}$	-	-
Total	$(t \cdot r) - 1$	$\sum x - FK$	-	-	-

Keterangan:

- t = Total perlakuan
- dbg = Derajat bebas galat (kesalahan)
- dbt = Derajat bebas total
- dpp = Derajat bebas perlakuan
- n = Jumlah ulangan
- FK = Faktor koreksi
- JKT = Jumlah kuadrat total perlakuan
- JKP = Jumlah kuadrat perlakuan
- JKG = Jumlah kuadrat galat
- KTP = Kuadrat tengah perlakuan
- KTG = Kuadrat tengah galat

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Rendemen Ekstrak Sampel

Ekstrak *Wine Kopi Arabika* dan ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu yang diperoleh dari proses ekstraksi. Hasil rendemen dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rendemen Ekstrak Sampel

Sampel	Bobot sampel (g)	Bobot ekstrak (g)	Rendemen (%)
<i>Wine Kopi Arabika</i>	2,0005	0,0501	2,5043
Buah Mengkudu (Ekstrak Kasar Enzim Protease Mengkudu)	251,3002	128,7003	51,2137

2. Nilai absorban dan Uji Aktivitas Enzim Protease

Nilai absorban larutan sampel enzim proteolitik ekstrak kasar mengkudu dan larutan standar tirosin dengan metode spektrofotometer *visible* dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Nilai Absorban Enzim Protease

Sampel	Absorban
Blanko	0,0620
Standar tirosin	0,0360
Enzim protease	0,0480

Berdasarkan hasil absorban blanko, standar tirosin dan enzim protease tersebut dapat diperoleh nilai aktivitas enzim protease pada buah mengkudu sebesar 0,0538 U/mL (contoh perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3).

3. Hasil Uji Kualitatif Kafein Metode Parry


Berikut hasil uji kualitatif kafein metode Parry seperti yang terdapat pada Gambar 4.1 dengan hasil positif berwarna biru kehijauan.



Gambar 4.1 Uji Kualitatif Kafein Metode Parry

4. Panjang Gelombang Serapan Maksimum Kafein

Panjang gelombang serapan maksimum senyawa kafein menggunakan larutan standar dengan konsentrasi 30 ppm yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang 270-350 nm. Panjang gelombang serapan maksimum yang dihasilkan berada pada panjang gelombang 277 nm dengan absorbansi sebesar 0,1107 seperti pada Gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4.2 Panjang Gelombang Serapan Masimum Senyawa Kafein

5. Kurva Kalibrasi Kafein

Kadar kafein yang terdapat pada ekstrak *wine* kopi Arabika dengan metode Spektrofotometer UV-Vis, diawali dengan pengukuran absorban larutan deret standar kafein dengan variasi konsentrasi 0 ppm; 10 ppm; 20 ppm; 30 ppm; 40 ppm dan 50 ppm. Data absorban standar dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Absorban Deret Standar Kafein

No.	Deret standar kafein (ppm)	Absorban
1.	10	0,5378
2.	20	1,0005
3.	30	1,5079
4.	40	1,9461
5.	50	2,4235

6. Kadar Kafein Sebelum dan Setelah Penambahan Buah Mengkudu Menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis

Hasil absorban larutan sampel ekstrak *wine* kopi Arabika sebelum dan setelah penambahan ekstrak kasar enzim protease dari buah mengkudu menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Kadar Kafein *Wine* Kopi Arabika Sebelum dan Setelah Penambahan Mengkudu

Larutan Sampel (% v/v)	Absorban	Kadar kafein pada <i>wine</i> kopi Arabika bubuk dalam 1 gram	
		mg	b/b (%)
0	0,6602	17,4670	1.7467
5	0,3670	9,7330	0.9733
10	0,3237	8,6000	0.8600
25	0,2146	5,7330	0.5733
30	0,0977	2,6670	0.2667
35	0,0411	1,1670	0.1167

Data hasil pengamatan diuji dengan ANOVA menggunakan program SPSS dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh penambahan ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu terhadap kadar kafein menunjukkan bahwa F_{hitung} dengan P-signifikan berbeda-beda pada setiap perlakuan variasi konsentrasi. Berikut hasil perhitungan ANOVA terhadap kadar kafein seperti pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Analisis Ragam Sidik ANOVA

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat (JK)	Rata-rata	F_{hitung}	P (Sig.)
Perlakuan	5	5.1630	1.0330	155.0220	0.0000
Galat	12	0.0800	0.0070	-	-
Total	17	5.2430	-	-	-

Berdasarkan uji ANOVA menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan tiap perlakuan terhadap kadar kafein. Hasil tersebut dilanjutkan dengan uji DMRT. Hasil uji DMRT dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji DMRT Kadar Kafein

Konsentrasi Ekstrak Kasar Mengkudu (%)	Kadar Kafein b/b (%)
A (0)	1.7467 ^a
B (5)	0.9733 ^b
C (10)	0.8600 ^b
D (25)	0.5733 ^c
E (30)	0.2667 ^d
F (35)	0.1167 ^e

Ket: Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kolom yang sama berbeda secara signifikan menurut uji jarak berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5%.

B. Pembahasan

1. Ekstrak Kafein *Wine* Kopi Arabika

Sampel biji kopi Arabika berasal dari kampong kopi Bawakaraeng. Proses pencucian biji *Wine* kopi Arabika bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada biji kopi arabika. Proses fermentasi dilakukan dengan metode kering menggunakan beberapa tahapan. Selama proses fermentasi biji kopi Arabika dengan bantuan sinar matahari ini, mikroorganisme pada kulit biji kopi Arabika dapat mengurai komponen senyawa pada selaput lendir yang terlepas pada kulit tanduk biji kopi dengan bantuan oksigen dan sinar matahari (Tambarta, dkk., 2021: 32).

Penyangraian biji *wine* kopi Arabika menggunakan suhu 180 °C karena merupakan suhu optimum yang digunakan pada proses penyangraian biji wine kopi Arabika sehingga dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada biji wine kopi arabika (Irwinsyah, dkk., 2021: 4). Pencampuran bubuk *wine* kopi arabika dengan *aquades* bertujuan untuk melarutkan bubuk kopi. Pemanasan dan pengadukan larutan kopi berfungsi agar larutan *wine* kopi menjadi homogen. Penyaringan larutan *wine* kopi dalam keadaan hangat agar proses penyaringan berlangsung lebih cepat. Penambahan Pb-Asetat pada larutan sampel *wine* kopi Arabika bertujuan untuk mengendapkan zat pengotor pada larutan sampel. Selanjutnya proses penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat pengotor dengan filtrat secara sempurna.

Proses ekstraksi filtrat hasil penyaringan *wine* kopi Arabika menggunakan pelarut kloroform. Kloroform digunakan karena senyawa kafein termasuk senyawa alkaloid yang akan mudah larut dengan kloroform, etil asetat dan benzene. Kloroform dipilih karena memiliki toksisitas dan kelarutan yang lebih aman, titik didih yang lebih rendah, serta harga yang lebih murah (Imama, 2019: 18). Ekstrak yang diperoleh dari lapisan bawah saat proses ekstraksi cair-cair sebagai fase kloroform. Penguapan

ekstrak kafein fase kloroform dengan penangas air berfungsi untuk menguapkan pelarut kloroformnya.

2. Ekstrak Kasar Enzim Protease Buah Mengkudu

Sampel buah mengkudu berasal dari kabupaten Takalar. Pemilihan buah Mengkudu dengan tingkat kematangan yang matang sempurna ditandai dengan kulit buah yang berwarna putih dengan daging yang mengandung banyak air. Pencucian buah mengkudu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat pada kulit buah. Pemisahan daging buah dengan bijinya untuk mempermudah proses penghancuran saat dihaluskan. Penghalusan daging buah mengkudu menggunakan *blender* untuk memperoleh ekstrak buah mengkudu. Penyaringan ekstrak buah mengkudu bertujuan untuk memisahkan filtrat dan residu.

Penambahan buffer fosfat pH 7 pada ekstrak buah mengkudu berfungsi untuk mempertahankan pH ekstrak dalam menghindari proses denaturasi enzim saat terjadi perubahan pH (Tazkiah, dkk., 2017: 18). Penyaringan ekstrak untuk memisahkan residu dan filtratnya. Proses sentrifugasi bertujuan agar ekstrak dapat terpisah dari sisa-sisa residu yang lolos saat penyaringan. Penambahan amonium sulfat berfungsi mengendapkan protein sehingga meningkatkan aktivitas enzim. Hal ini dikarenakan pengotor yang menghalangi sisi aktif enzim dalam berikatan dengan substrat mengalami penurunan (Alviyulita, dkk., 2014: 11). Sentrifugasi supernatan ekstrak kasar enzim bertujuan memisahkan endapan dengan supernatan. Hasil rendemen ekstrak kasar enzim protease yang diperoleh sebesar 51,2137 % (contoh perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3).

3. Nilai Aktivitas Ekstrak Kasar Enzim Protease Mengkudu


Penambahan ekstrak kasar enzim protease berfungsi sebagai larutan sampel enzim. Kasein berfungsi sebagai substrat. Penambahan buffer fosfat pH 7 berfungsi untuk mempertahankan pH larutan sampel yang dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi enzim pada saat terjadi perubahan pH. pH 7 merupakan pH optimum enzim protease (Herasari, dkk., 2022: 51). Sentrifugasi bertujuan untuk memisahkan endapan dengan supernatan. Penambahan asam trikloroasetat (TCA) bertujuan untuk menghentikan reaksi pada enzim protease (Noviyanti, dkk., 2012: 3). Penambahan Na_2CO_3 berfungsi menaikkan pH sampel sekitar 11,5 sebagai pH optimum untuk intensitas serta stabilitas warna yang hendak diukur panjang gelombangnya. Panjang gelombang 578 nm yang merupakan panjang gelombang maksimum dalam mengukur absorbansi protease (Candra, dkk., (2021: 3). Setiap satu unit aktivitas protease diartikan sebagai jumlah enzim yang dapat menghasilkan 1 μ mol tirosin dalam 1 menit dalam kondisi pengukuran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh aktivitas enzim protease sebesar 0,0538 U/mL. Hasil ini diperoleh lebih rendah dari aktivitas enzim protease yang diperoleh Candra, dkk., (2021: 3) yaitu 1,5110 U/mL. Hal ini dapat dipengaruhi oleh proses pemurnian enzim protease yang mana pada penelitian ini tidak dilakukan proses pemurnian enzim sedangkan pada penelitian Candra, dkk., (2021: 3) ekstrak kasar enzim protease melalui tahap pemurnian.

4. Hasil Kualitatif Kafein Metode Parry

Kobalt (II) nitrat dan metanol berfungsi sebagai bahan pembuatan reagen Parry. Ion kobalt (Co) dalam reagen Parry bermuatan dua positif bereaksi dengan gugus

nitrogen pada kafein yang membentuk kompleks berwarna hijau atau biru kehijauan (Latunra, dkk., 2021: 48), seperti pada Gambar 4.3 berikut ini:



Gambar 4.3 Reaksi Kafein dengan $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$

Amonium hidroksida berperan sebagai katalis dalam pembentukan kompleks warna hijau yang terjadi pada reaksi kafein dan kobalt (II) nitrat (Dalimunthe, dkk., 2020: 108). Identifikasi hasil positif dari reaksi antara reagen Parry dengan kafein ditunjukkan dari terbentuknya kompleks warna biru kehijauan. Hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian Latunra, dkk., (2021: 48) menggunakan sampel kopi Arabika dengan hasil positif berwarna hijau. Hal ini dipertegas oleh Dalimunthe, dkk. (2020: 108) yang memperoleh hasil positif berwarna biru kehijauan pada sampel kopi kemasan.


5. Nilai Panjang Gelombang Serapan Maksimum Kafein

Penentuan panjang gelombang maksimum senyawa kafein menggunakan larutan standar kafein 200 ppm yang berfungsi sebagai larutan baku. Serapan panjang gelombang maksimum suatu senyawa ditentukan dari absorbansi yang dihasilkan oleh instrumen yang memiliki spesifikasi tersendiri. Pembacaan absorbansi maksimum ditentukan oleh terbentuknya eksitasi elektronik dari panjang gelombang sampel. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum bertujuan untuk menentukan jumlah absorban tertinggi yang dihasilkan pada variasi konsentrasi yang berbeda-beda (Dalimunthe, dkk., 2022: 108). Panjang gelombang serapan maksimum senyawa kafein berada pada rentang 270-350 nm. Hal ini sesuai dengan hasil panjang

gelombang serapan maksimum yang didapatkan berdasarkan pengukuran absorbansi larutan baku standar 30 ppm yang berada pada daerah 277 nm yang menunjukkan nilai serapan larutan standar berada pada daerah UV (*Ultra-Violet*).

6. Kurva Kalibrasi

Kurva kalibrasi deret standar kafein didapatkan dengan mengukur absorbansi deret standar kafein dengan konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm pada panjang gelombang 277 nm. Kurva kalibrasi larutan kafein dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:




Gambar 4.4 Kurva Deret Standar

Pengukuran kurva kalibrasi deret standar kafein diperoleh persamaan garis regresi yaitu $y = 0,0475x + 0,00307$ dan diperoleh hubungan yang linear antara konsentrasi dengan absorbansi, dengan koefisien korelasi $R^2 = 0,9996$. Koefisien korelasi ini memenuhi syarat kriteria penerimaan yaitu $R^2 \geq 0,9995$ (Dalimunthe, dkk., 2022: 108).

7. Kadar Kafein Wine Kopi Arabika Sebelum dan Setelah Penambahan Ekstrak Kasar Enzim Protease Buah Mengkudu

Senyawa kafein pada *wine* kopi Arabika diperoleh nilai kadar kafein sebesar 17,4670 mg setara dengan 1,7467 % (b/b). Kadar kafein yang diperoleh pada penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Swiranata, dkk., (2020: 154) yang

memperoleh kadar kafein sedikit lebih tinggi pada kopi Arabika sebelum proses dekafeinasi yaitu sebesar 1,8100%. Persentase kadar kafein yang diperoleh berbeda karena kopi yang digunakan berasal dari tempat yang berbeda pula sehingga dipengaruhi oleh letak geografis yang mempengaruhi kandungan metabolit sekunder pada tanaman kopi yang disebabkan oleh perbedaan unsur hara dari masing-masing tempat.



Gambar 4.5 Penurunan Kadar Kafein *Wine* Kopi Arabika

Ket: Kadar *wine* Kopi Arabika (A) tanpa penambahan mengkudu, (B) penambahan mengkudu 5%, (C) penambahan mengkudu 10%, (D) penambahan mengkudu 25%, (E) penambahan mengkudu 30%, (F) penambahan mengkudu 35%.

Kadar kafein *wine* kopi Arabika mula-mula sebesar 17,4670 mg mengalami penurunan kadar kafein karena adanya penambahan ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. Penurunan kadar kafein tertinggi setelah penambahan ekstrak kasar enzim protease mengkudu terdapat pada konsentrasi 35% yang merupakan konsentrasi optimum dimana kadar kafein mengalami penurunan kadar sebesar 16,3000 mg dari kadar mula-mula sebelum penambahan ekstrak kasar enzim protease. Sedangkan penurunan kadar kafein terendah setelah penambahan ekstrak kasar enzim protease mengkudu terdapat pada konsentrasi 5% dengan penurunan kadar kafein sebesar 7,7340 mg.

Penurunan kadar kafein *wine* kopi Arabika disebabkan oleh adanya aktivitas enzim protease yang berupa reaksi enzimatik. Reaksi enzimatik dipengaruhi oleh suhu, derajat keasaman (pH), substrat dan jumlah konsentrasi enzim. Enzim protease akan berdifusi ke dalam substrat dan mendegradasi senyawa kafein (Ratih, dkk., 2022: 6). Senyawa kafein pada *wine* kopi Arabika mengalami perombakan oleh enzim akan mengalami pemutusan ikatan dengan senyawa lain yang menyebabkan senyawa kafein akan mudah larut dalam air (Tika, dkk., 2017: 845).

Analisis ragam dalam perlakuan penambahan ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu terhadap kadar kafein dianalisis secara statistik dengan penentuan ANOVA menggunakan program SPSS Versi 24. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan, selanjutnya dilakukan uji DMRT melalui analisis perbandingan berpasangan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan variasi perlakuan berbeda nyata yang diklasifikasikan ke dalam kelompok (Ratih, dkk., 2022: 6).

Berdasarkan analisis ANOVA pada Tabel 4.5 diperoleh P-signifikan 0,0000. Berdasarkan hipotesis yang digunakan, P-signifikan > 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. P-signifikan < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti terdapat pengaruh variabel bebas terhadap kadar kafein atau berbeda secara signifikan. Berdasarkan hipotesis tersebut terdapat pengaruh perlakuan yang dibuktikan melalui uji DMRT yang terdiri dari 5 kolom yang berbeda sebagai faktor beda nyata (signifikan).

Berdasarkan analisis ragam yang diperoleh pada program SPSS, sesuai dengan hasil perhitungan manual ANOVA seperti yang terlampir (Lampiran 4. analisis data). Hasil ANOVA tersebut diperoleh nilai $F_{hitung} (205,824) > F_{tabel} (3,11)$ atau $P < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa

ada pengaruh penambahan mengkudu terhadap kadar kafein pada *wine* kopi Arabika. Adanya pengaruh signifikan tersebut dilanjutkan dengan uji DMRT untuk melihat perbedaan nyata setiap perlakuan (Ratih, dkk., 2022: 6). Beda nyata tiap perlakuan variasi konsentrasi, dapat dilihat pada tabel 4.5. Perlakuan 0% (sebelum penambahan mengkudu) dan setelah penambahan mengkudu dengan beberapa variasi konsentrasi penambahan ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu (5%, 10%, 25%, 30% dan 35%) memiliki perbedaan kadar kafein atau terdapat pengaruh beda nyata yang disimbolkan dengan huruf a, b, c, d dan e.

Konsentrasi penambahan 0% berbeda secara signifikan dengan konsentrasi penambahan 5%, 10%, 25%, 30%, 35%. Perbedaan tersebut dapat dilihat, bahwa terdapat pengaruh penambahan ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu dalam menurunkan kadar kafein *wine* kopi Arabika. Konsentrasi penambahan 5% berbeda tetapi tidak signifikan dengan konsentrasi penambahan 10% namun berbeda secara signifikan dengan konsentrasi penambahan 0%, 25%, 30% dan 35%. Konsentrasi penambahan 10% berbeda tetapi tidak signifikan dengan konsentrasi penambahan 5% namun berbeda secara signifikan dengan konsentrasi penambahan 0%, 25%, 30% dan 35%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan konsentrasi kadar kafein namun, penurunan kadar kafein pada konsentrasi 5% dan 10% memiliki selisih yang kecil sehingga menyebabkan adanya pengaruh yang tidak signifikan pada kedua konsentrasi tersebut.

Konsentrasi penambahan 25% berbeda secara signifikan dengan konsentrasi penambahan 0%, 5%, 10%, 30% dan 35%. Konsentrasi penambahan 30% berbeda secara signifikan dengan konsentrasi penambahan 0%, 5%, 10%, 25% dan 35%. Konsentrasi penambahan 35% berbeda secara signifikan dengan konsentrasi

penambahan 0%, 5%, 10%, 25% dan 30%. Oleh karena itu, semakin tinggi konsentrasi penambahan ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu maka akan semakin efektif dalam menurunkan kadar kafein *wine* kopi Arabika.

Pemilihan metode dekafeinasi akan mempengaruhi presentase kadar kafein yang dihasilkan. Kadar kafein yang telah dilakukan dengan metode penambahan ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu memiliki penurunan nilai kadar kafein yang lebih tinggi (16,3000 mg) dari penelitian yang dilakukan Rosalinda., (2021: 30) dengan metode penambahan kulit buah pepaya (3,3000 mg). Penurunan nilai kadar kafein menggunakan enzim protease pada buah mengkudu lebih efektif dalam menurunkan kadar kafein pada kopi. Hal ini dipengaruhi oleh reaksi enzimatik yang terjadi saat pemutusan ikatan antara kafein dengan senyawa lain sehingga kafein lebih banyak larut dalam air dan mengalami perombakan struktur senyawa kafein sehingga terjadi penurunan nilai kadar kafein yang lebih tinggi (Rosalinda., 2021: 30).

Batas aman maksimum mengonsumsi kopi adalah 1-2 gelas sehari, namun sebagian besar masyarakat yang merupakan pecinta kopi mengonsumsi kopi lebih dari 2 gelas sehari. Kopi dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang berusia 45-59 tahun. Hal ini disebabkan oleh alasan mengonsumsi kopi untuk menghilangkan rasa kantuk. Konsumsi kopi 2-3 cangkir dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya hipertensi karena kandungan kafein yang tinggi dapat meningkatkan debar jantung dan tekanan darah hingga 5-15 mmHg dalam waktu 15-30 menit. Maka dari itu, konsumsi kopi lebih dari 3 cangkir kopi beresiko dapat meningkatkan tekanan darah hingga 12,5 kali lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang mengonsumsi kopi 1-3 cangkir sehari (Herlambang, 2021: 62). Oleh karena itu pentingnya dilakukan dekafeinasi

pada kopi untuk menurunkan risiko penyakit pada tubuh manusia yang dapat ditimbulkan karena mengonsumsi kopi.

Kadar kafein yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut Badan Standarisasi Nasional berdasarkan SNI 01-3542-2004 yaitu pada rentang 0,45%-2% (Suwiyarsa, 2018: 190). Secara keseluruhan variasi konsentrasi penambahan ekstrak kasar enzim pada mengkudu, kadar kafein pada *wine* kopi Arabika mengalami penurunan. Enam variasi konsentrasi memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia 01-7152-2006 yang menetapkan jumlah maksimum kafein yang dapat dikonsumsi dalam minuman ataupun makanan yaitu 150 mg/hari atau 50 mg/sajian. Selain itu, berdasarkan FDA (*Food Drug Administration*), kafein dapat dikonsumsi sesuai dosis dengan ambang batas 100-200 mg/hari (Isnindar, 2016: 190).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penambahan buah mengkudu (*Morinda Citrifolia*) pada ekstrak biji *wine* kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.) memiliki pengaruh terhadap penurunan kadar kafein. Kadar kafein yang diperoleh sebelum penambahan buah mengkudu yaitu sebesar 1,7467 % dan mengalami penurunan setelah penambahan buah mengkudu dengan variasi konsentrasi mengkudu 5 %, 10 %, 25%, 30 % dan 35 % dengan kadar kafein yang diperoleh berturut-turut sebesar 0,9733 %; 0,8600 %; 0,5733 %; 0,2667 % dan 0,1167 %. Konsentrasi optimum untuk menurunkan kadar kafein yaitu pada konsentrasi 35 % sebesar 0,1167 %.

B. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variasi waktu pada saat perendaman bubuk *wine* kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.) menggunakan penambahan buah mengkudu dalam menurunkan kadar kafein *wine* kopi Arabika. Selain itu, ekstrak kasar enzim protease buah mengkudu yang akan digunakan terlebih dahulu dimurnikan sebelum ditambahkan pada bubuk *wine* kopi Arabika.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Abduh, M. Yusuf. *Dari ITB Untuk Indonesia: Biorefinery Kopi*. Bandung: Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi, 2018.

Abnaz, Zahra Dzakhirah dan Jutti Levita. "Review : Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.), dan Biji Jinten Hitam (*Nigella Sativa* L.) dan Teori Uji Toksisitas". *Farmaka Suplemen*. 16, no. 1 (2018): h. 295-303.

Adrian, Muhamad Tommy, dkk., "Eksplorasi Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.) untuk Produksi Enzim Protease dan Potensinya sebagai Bahan Pengganti Rennet pada Industri Keju ". *Pangan dan Agroindustri*. 3, no. 3 (2015): h. 1136-1144.

Aji, Amri, dkk., "Pengaruh Waktu Ekstraksi dan Konsentrasi HCl untuk Pembuatan Pektin dari Kulit Jeruk Bali (*Citrus Maxima*)". *Teknologi Kimia Unimal*. 6, no. 1 (2017): h. 33-44.

Alviyulita, Mitha, dkk., "Pengaruh Penambahan Ammonium Sulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ dan Waktu Perendaman Buffer Fosfat terhadap Perolehan Crude Papain dari Daun Pepaya (*Carica Papaya*, L.)". *Teknik Kimia*. 3, no. 3 (2014): h. 8-12.

Aprilia, Fathia Rizqi, dkk., "Analisis Kandungan Kafein dalam Kopi Tradisional Gayo dan Kopi Lombok menggunakan HPLC dan Spektrofotometri Uv/Vis". *Biotika*. 16, no. 2 (2018): h. 37-41.

Arwangga, Aryanu Fahmi, dkk., "Analisis Kandungan Kafein pada Kopi di Desa Sesaot Narmada Menggunakan Spektrofotometri Uv-Vis". *Kimia*. 10, no. 1 (2016): h.110-114.

Badriyah, Lailatul dan Manggara, Al gafari B. "Penetapan Kadar Vitamin C pada Cabai Merah (*Capsicum Annum* L.) menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis". *Wiyata*. 2, no. 1 (2015): h. 25-28.

Candra, Andy, dkk., "Potential of Crude Protease from Mengkudu (*Morinda citrifolia*) Fruit on Extraction of Virgin Coconut Oil". *The Internasional Confeerence on Chemical Science and Technology*. 2021: p. 2342-2348.

Charlinia, Widya. "Pengaruh Penambahan Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.) terhadap Aktivitas Antioksidan dan Kadar Kafein Biji Kopi Robusta (*Coffea Canephora*)". *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, 2016.

Dairobbi, Achmad, dkk., "Kajian Mutu Wine Coffee Arabika Gayo (*Quality Study Wine Coffee Arabika Gayo*)". *Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*". 2, no. 4 (2017): h. 822-829.

Dalimunthe, Gabena Indrayani, dkk., "Caffeine Levels from Various Types of Coffee Drink Packaging Circulated in the Medan City Market Were Examined Using a Uv Spectrophotometry Method". *Indonesian Journal of Science and Technology*. 5, no. 2 (2020): p. 102-105.

- Dilla, Aulia Ayu Farah, dkk., "Ekstraksi Dispersium (Dy) pada Konsentrat Itrium Dalam Keasaman Klorida Menggunakan Cyanex 572". *Indonesian Journal Of Chemical Research*. 3, no. 2 (2018): h. 67-77.
- Elfariyanti, dkk., "Analisis Kandungan Kafein pada Kopi Seduhan Warung Kopi di Kota Banda Aceh". *Lantanida Journal*. 8, no. 1 (2020): h. 1-95.
- Fajriana, Nur Hasani dan Fajriati, Imelda. "Analisis Kadar Kafein Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.) pada Variasi Temperatur Sangrai secara Spektrofotometri Ultra Violet". *Analit: Analytical And Environmental Chemistry*. 3, no. 2 (2018): h. 148-162.
- Farhaty, Naeli dan Muchtaridi, "Tinjauan Kimia dan Aspek Farmakologi Senyawa Asam Klorogenat pada Biji Kopi: Review". *Farmaka*. 14, no. 1 (2016): h. 214-227.
- Handayani, Baiq Rien. "Coffee and Its Flavor". *Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem*. 4, no. 1 (2016): h. 222-227.
- Handayani, Retty dan Muchlis, Fadzilla. "Review: Manfaat Asam Klorogenat dari Biji Kopi (*Coffea*) sebagai Bahan Baku Kosmetik". *Ilmiah Farmasi*. 11, no. 1 (2021): h. 43-50.
- Harahap, Muhammad Ridwan. "Identifikasi Daging Buah Kopi Robusta (*Coffea Robusta*) Berasal dari Provinsi Aceh". *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology* 3, no. 2 (2017): h. 201-210.
- Herasari, Dian, dkk., "Karakterisasi Enzim Protease dari Bakteri *Klebsiella Sp.* Indigen Tanah Tercemar Minyak di Bandar Lampung". *Analytical and Environmental Chemistry*. 7, no. 1 (2022): h. 35-53
- Herdiana, Irvan dan Aji, Nur. "Fraksinasi Ekstrak Daun Sirih dan Ekstrak Gambir Serta Uji Antibakteri *Streptococcus Mutans*". *Ilmiah Kesehatan*. 19, no. 3 (2020): h. 100-106.
- Heriyanti, dkk., "Study Awal Karakterisasi Sensor Warna TC3200 untuk Menentukan Kadar Kafein pada Kopi". *JoP*. 7, no. 1 (2021): h. 52-57
- Herlambang, Tomi Wahyu, "Hubungan Konsumsi Kopi dengan Tekanan Darah pada Lansia di Dusun Klintar Desa Banjarwungu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi*. Jurusan Keperawatan. Stikes Bina Sehat PPNI, 2021.
- Imama, Ana Nur, dkk. "Pengaruh Penambahan Kulit Kopi Kering terhadap Penurunan Kadar Kafein pada Kopi Lanang (*Peaberry Coffee*)". 1, no. 2 (2019): h. 11-22.
- Irwinsyah, Asrul D., dkk., "Analisis Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH serta Tingkat Penerimaan Kopi Arabika Koya". *UNSTRAT*. 6, no. 6 (2021): h. 2-11.
- Ishartani, Dwi, dkk., "Pemurnian Protease dari Buah dan Daun Mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.)". *Teknologi dan Industri Pangan*. 27 no. 1 (2011): h. 78-84.
- Iskandar, Dodi. "Perbandingan Metode Spektrofotometri Uv-Vis dan Iodimetri dalam Penentuan Asam Askorbat sebagai Bahan Ajar Kimia Analitik Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian Berbasis *Open-Ended Experiment* dan *Problem Solving*". *Teknologi Technosciantia*. 10, no. 1 (2017): h. 66-70.

- Isnindar, dkk., “Analisis Kandungan Kafein pada Ekstrak Buah Kopi Mentah dari Perkebunan Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Spektrofotometer UV-Visible”. *Pharmacon*. 5, no. 20 (2016): h. 187-190.
- Kasa, Renaldo Apriadi, dkk., “Kajian Awal Spektrum Serapan Senyawa Hasil Ekstraksi Daun Sukun (*Artocarpus Altilis*) Asal Kota Kupang”. *FISA*. 2, no. 1 (2017): h. 10-16.
- Kuncoro, Sapto, dkk., “Kinetika Reaksi Penurunan Kafein dan Asam Klorogenat Biji Kopi Robusta melalui Pengukusan Sistem Tertutup”. *Agritech*. 38, no. 1 (2018): h. 105-111.
- Latunra, Andi Ilham, dkk., “Analisis Kandungan Kafein Kopi (*Coffea Arabica*) pada Tingkat Kematangan Berbeda menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis”. *Ilmu Alam dan Lingkungan*, 12, no. 1 (2021): h. 45-50.
- Lexia, Nevita dan Ngibad, Khoirul. “Aplikasi Spektrofotometri terhadap Penentuan Kadar Besi secara Kuantitatif dalam Sampel Air”. *Pijar Mipa*. 16, no. 2 (2021): h. 242-246.
- Maramis, Rialita Kesia, dkk., “Analisis Kafein dalam Kopi Bubuk di Kota Manado Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis”. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi*. 2, no. 4 (2013): h. 122-128.
- Megananda, Rafaella Chandraseta, dkk., “Diversifikasi Kopi Biji Mengkudu (*Morinda Citrifolia*) sebagai Upaya Pelestarian Tanaman Lokal”. *Prosiding Seminar Nasional Simbiosis IV*. (2019): h. 51-54.
- Mirwan, Agus, “Keberlakuan Model HB-GFT Sistem n-Heksana–Mek–Air pada Ekstraksi Cair-Cair Kolom Isian”. *Konversi*. 2, no. 1 (2013): h. 32-39.
- Muharrama, Anzila Rizki Wahyu, dkk., “Sensitivitas Ekstrak Buah Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.) terhadap Bakteri *Streptococcus agalactiae*”. *Online Mahasiswa FPIK*. 2, No. 1 (2015): h. 1-10.
- Noviar, Desi, dkk., “Pengaruh Ekstrak Kulit Buah Nanas (*Ananas Comosus* L. Merr) terhadap Karakteristik Fisiko Kimia dan Cita Rasa Kopi (*Coffea sp*)”. *JKK*. 5, no. 4 (2016): h. 40-46.
- Noviyanti, Tri, dkk., “Pengaruh Temperatur terhadap Aktivitas Enzim Protease dari Daun Sansakng (*Pycnarrhena Cauliflora* Diels). *Kimia Khatulistiwa*. 1, no. 1 (2012): 45-48.
- Noviyanto, Fajrin. *Penentuan Kandungan Ketoprofen dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis*. Bandung: Media Sains Sains, 2020.
- Oktadina, Fiona Drefin, dkk., “Pemanfaatan Nanas (*Ananas Comosus* L. Merr) untuk Penurunan Kadar Kafein dan Perbaikan Citarasa Kopi (*Coffea sp*) dalam Pembuatan Kopi Bubuk”. *Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem*. 1, no. 3 (2013): h. 265-273.
- Permadi, Afif, dkk., “Perbandingan Metode Ekstraksi Bertingkat dan Tidak Bertingkat terhadap Flavonoid Total Herba Ciplukan (*Physalis Angulata* L.) secara Kolorimetri”. *Online Mahasiswa*. 1, no. 1 (2015): h.1-10.

- Prasetyo, Dedy, dkk., “Penggunaan Spektrofotometer UV dan HPLC pada Analisis Kandungan Kafein Kopi Arabika dan Robusta”. *Atomik*, 5, no. 2 (2020): h. 76-80.
- Purba, Ronny Rezeki Tri Putra dan Ganjar Andaka, “Dekafeinasi Biji Kopi Robusta Melalui Proses Ekstraksi dengan Pelarut *Aquadest*”. *Inovasi Proses*, 3, no. 1 (2018): h. 10-15.
- Putri, Juwita Mayningsih Andari, dkk., “Pengaruh Penggunaan Getah Pepaya (*Carica Papaya* L.) pada Proses Dekafeinasi terhadap Penurunan Kadar Kafein Kopi Robusta”. *Media Ilmiah Teknologi Pangan*. 4, no. 2 (2017): h. 138–147.
- Putri, Lusya Eka. “Penentuan Konsentrasi Senyawa Berwarna $KMnO_4$ dengan Metoda Spektroskopi UV-Visible”. *Natural Science Journal*. 3, no. 1 (2017): h. 391-398.
- Putri, Mega Karina, dan Beta Ria Erika Marita Dellima. “Pengaruh Daerah Tempat Tumbuh Terhadap Kadar Kafein Biji Kopi Robusta (*Coffea Canephora*)”. *Ilmu Kesehatan Bhakti Setya Medika*. 7, no. 1 (2022): 33-43.
- Ramadhan, R. L. dan J. M. Malingan, “Pengaruh Lama Fermentasi dan Kehalusan Bubuk Sajian Tubruk *Wine* Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L)”. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pangan*. 2020.
- Rohmah, Siti Awwalul Amanatur, dkk., “Validasi Metode Penetapan Kadar Pengawet Natrium Benzoat pada Sari Kedelai di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulungagung menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis”. *Sains dan Kesehatan*. 3, no. 2 (2021): h. 120-127.
- Rahmawati, dkk. “Analisis Aktivitas Antioksidan Produk Sirup Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.) dengan Metode DPPH”. *Fitofarmaka Indonesia*. 2, no. 2 (2015): h. 97-101.
- Ratih, Dewa Ayu, dkk., “Pengaruh Variasi Waktu Inkubasi dengan Penambahan Paya *Meat Tenderizer* pada Proses Dekafeinasi Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.)”. *Agroekoteknologi Tropika*. 11, no. 1 (2022): h. 1-9.
- Rismawati, dkk., “Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.) sebagai Perendam Daging Ayam Kampung Afkir terhadap Kualitas Fisik dan Organoleptik”. *Peternakan Universitas Padjajaran*. 5, no. 4 (2016): h. 1-10.
- Rosalinda, S. dkk., “Penggunaan Berbagai Konsentrasi Kulit Buah Pepaya dalam Penurunan Kadar Kafein pada Kopi “. *Teknotan*. 15, no. 1 (2021): h. 27-34.
- Safitri, Isnaeni Anggi, dan Cahyati, Widya Hary, “Daya Bunuh Ekstrak Daun Mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.) dalam Bentuk Antinyamuk Cair Elektrik terhadap Kematian Nyamuk *Aedes Aegypti*”. *Care*. 6, no. 1 (2018): h. 1-14.
- Sari, Mentari Yunika, dkk., “Analisis Senyawa Asam Klorogenat dalam Biji Kopi Robusta (*Coffea Canephora*) Menggunakan HPLC”. *Analit: Analytical And Environmental Chemistry*. 4, no. 2, (2019): h. 83-93.
- Sari, Cici Yuliana, “Pengggunaan Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia* L.) untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi”. *Majority*. 4, no. 3 (2015): h. 34-40.

- Srikandi, dkk., “Tingkat Kematangan Biji Kopi Arabica (*Coffea Arabica* L.) dalam Menghasilkan Kadar Kafein”. *Sains Natural Universitas Nusa Bangsa*. 9, no.1 (2019): h. 22-28.
- Suena, Ni Made Dharma Shantini dan Antari, Ni Putu Udayana. “Uji Aktivitas Antioksidan Maserat Air Biji Kopi (*Coffea Canephora*) Hijau Pupuan dengan Metode DPPH (2,2-Difenil-1-Pikrilhidrazil)”. *Ilmiah Medicamento*. 6, no. 2 (2020): h. 111-117.
- Suharman dan Gafar, Patoni A. “Teknologi Dekafeinasi Kopi Robusta untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM)”. *Dinamika Penelitian Industri*. 28, no.2 (2017): h. 87-93.
- Srikandi, dkk., “Tingkat Kematangan Biji Kopi Arabica (*Coffea Arabica* L.) dalam Menghasilkan Kadar Kafein”. *Sains Natural Universitas Nusa Bangsa*. 9, no.1 (2019): h. 22-28.
- Susanti, Heri, dkk., “Perbandingan Metode Spektrofotometri Uv dan HPLC pada Penetapan Kadar Kafein dalam Kopi”. *Majalah Farmasetika*. 4, no. 1 (2019): h. 28-33.
- Suwiyarsa, I Nyoman, dkk., “Analisis Kadar Kafein dalam Kopi Bubuk Lokal yang Beredar di Kota Palu”. *Akademika Kimia*. 7, no. (2018): h. 189-192.
- Swiranata, I Wayan, dkk., “Pengaruh Metode Fermentasi dan Pengeringan terhadap Mutu Biji Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.)”. *Gema Agro*. 25, no. 02 (2020): h. 150-158.
- Tambarta, Emmia dkk., “Pengelolaan Pasca Panen Kopi Arabika Gayo Aceh”. *Visioner dan Strategis*. 10, no. 1 (2021): h. 29-36.
- Tambun, Rondang, dkk., “Pengaruh Ukuran Partikel, Waktu dan Suhu pada Ekstraksi Fenol dari Lengkuas Merah”. *Teknik Kimia USU*. 5, no. 4 (2016): h. 53-56.
- Tazkiah, Nita Puspita., dkk., “Isolasi dan Karakterisasi Enzim Amilase dari Biji Nangka (*Artocarpus Heterophyllus*)”. *Al-Kimiya*. 4, no. 1 (2017): h. 17-22.
- Tika, I Nyoman, dkk., “Kandungan Kafein Pada Kopi dengan Fermentasi Menggunakan Mikroba yang Diisolasi dari Kopi Kotoran Luwak Kebun Kopi di Kabupaten Buleleng”. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 2017.
- Utama, Qabul Dinanta, dkk., “Dekafeinasi Kopi Robusta (*Coffea Canephora*) Menggunakan Sari Labu Siam (*Sachium Edule*)”. *Ilmu dan Teknologi Pangan*. 8, no. 1 (2022): h. 77-87.
- Vionita, Silvy. “Identifikasi dan Karakteristik Morfologi Tanaman Kopi (*Coffea sp*) di Kabupaten Karo”. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Widowaty, Windy, dkk., “Analisis Cemaran Logam (Cu dan Zn) pada Kopi Bubuk”. *Agroscience*. 10, no. 1 (2020): h. 79-83.
- Wijaya, Dhira Ananta dan Yuwono, Sudarminto Setyo. “Pengaruh Lama Pengukusan dan Konsentrasi Etil Asetat terhadap Karakteristik Kopi pada Proses Dekafeinasi Kopi Robusta”. *Pangan dan Agroindustri*. 3, No. 4 (2015): h. 1560-1566.

Winarno, Retmono Agung dan Perangin-Angin, Mawar Indah Br. “Karakteristik Mutu dan Fisik Biji Kopi Arabika dengan Beberapa Metoda Pengolahan di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara”. *Agrica Ekstensia*. 14, no. 1 (2020): h. 86-93

Yanlinastuti dan Fatimah, Syamsul., “Penentuan Konsentrasi Pelarut untuk Menentukan Kadar Zirkonium dalam Paduan U-Zr dengan Menggunakan Metode Spektrofotometer UV-Vis”. *MIPA* 8, no. 13 (2016): h. 22-33.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Biji wine Kopi Arabika



Buah Mengkudu



Bubuk wine kopi Arabika



Ekstrak kasar enzim protease



Spektrofotometer visible



Ekstrak kafein



Ekstrak kafein encer



Uji kualitatif metode Parry



Spektrofotometer UV-Vis



Analysis of Varians

Lampiran 3. Contoh Perhitungan

1. Perhitungan Rendemen Sampel

Nilai rendemen ekstrak kafein sebelum penambahan mengkudu (0%)

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{berat ekstrak}}{\text{berat sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0501 \text{ gram}}{2,0005 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 2,5043\% \end{aligned}$$

Perhitungan rendemen sampel mengkudu dapat dihitung menggunakan rumus dan perhitungan yang sama

2. Perhitungan Aktivitas Enzim Protease Mengkudu

Berdasarkan pada metode Bergmeyer dan Grassi (1983), persamaan aktivitas enzim protease mengkudu adalah sebagai berikut:

$$\text{PU} = \frac{\text{Asp}-\text{Abl}}{\text{Ast}-\text{Abl}} \times \text{Fp} \times \frac{1}{\text{T}}$$

Keterangan:

PU : aktivitas enzim protease per satu menit (U/mL)

Asp : absorbansi sampel

Ast : absorbansi standar

Abl : absorbansi blanko

Fp : faktor pengenceran

T : waktu inkubasi enzim permenit

Dik: Asp : 0,0480

Ast : 0,0360

Abl : 0,0620

Fp : 1

T : 10 menit

Dit: PU :

Penyelesaian:

$$PU = \frac{Asp-Abl}{Ast-Abl} \times Fp \times \frac{1}{T}$$

$$PU = \frac{0,0480-0,0620}{0,0360-0,0620} \times 1 \times \frac{1}{10}$$

$$PU = \frac{-0,0140}{-0,0260} \times 1 \times \frac{1}{10}$$

$$PU = 0,0538 \text{ U/mL}$$

3. Perhitungan Larutan Baku Standar Kafein 200 ppm dalam 100 mL

$$\text{ppm} = \frac{\text{Massa terlarut (mg)}}{\text{Volume larutan (L)}}$$

$$\text{ppm} = \frac{20 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}} = 200 \text{ ppm}$$

4. Perhitungan Larutan Deret Standar Kafein 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm

Perhitungan pengenceran larutan baku standar 200 ppm menjadi konsentrasi 10 ppm

Penyelesaian:

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 200 \text{ ppm} = 100 \text{ mL} \times 10 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{1000 \text{ mL}}{200}$$

$$V_1 = 5 \text{ mL}$$

Keterangan:

V_1 = Volume Awal

V_2 = Volume Akhir

C_1 = Konsentrasi Awal

C_2 = Konsentrasi Akhir

Perhitungan konsentrasi 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm dan 50 ppm dapat dihitung menggunakan rumus dan perhitungan yang sama.

5. Perhitungan persamaan garis lurus dan penentuan nilai regresi kurva kalibrasi

No.	x	Y	x ²	y ²	xy
1	0	0,0000	0	0	0
2	10	0,5378	100	0,28922884	5,378
3	20	1,0005	400	1,00100025	20,01
4	30	1,5079	900	2,27376241	45,237
5	40	1,9461	1600	3,78730521	77,844
6	50	2,4235	2500	5,87335225	121,175
$\sum n = 6$	$\sum x = 150$	$\sum y = 7,4158$	$\sum x^2 = 5500$	$\sum y^2 = 13,22464896$	$\sum xy = 269,644$

Diketahui:

$$\begin{aligned}\sum n &= 6 \\ \sum x &= 150 \\ \sum y &= 7,4158 \\ \sum x^2 &= 5500 \\ \sum y^2 &= 13,22464896 \\ \sum xy &= 269,644\end{aligned}$$

Ditanyakan:

- 1) Nilai slope (a) = ...?
- 2) Nilai intersep (b) = ...?
- 3) Persamaan garis lurus (y) = ...?
- 4) Nilai regresi (R) = ...?

Penyelesaian:

- 1) Penentuan nilai slope (a)

$$\begin{aligned}a &= \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \\ &= \frac{(6 \times 268,644) - (150 \times 7,4158)}{6 \times 5500 - (150)^2} \\ &= \frac{1611,864 - 1112,37}{33000 - 22500}\end{aligned}$$

$$= \frac{499,494}{10500}$$

$$= 0,0475$$

2) Nilai intersep (b)

$$b = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n((\sum x^2) - (\sum x)^2)}$$

$$= \frac{(7,4158 \times 5500) - (150 \times 269,644)}{6 \times 5500 - (150)^2}$$

$$= \frac{40478,9 - 40446,6}{33000 - 22500}$$

$$= \frac{32,3}{10500}$$

$$= 0,00307$$

3) Persamaan garis lurus (y)

$$y = ax + b$$

$$y = 0,0475x + 0,00307$$

$$0,0475x = y + 0,00307$$

$$x = \frac{y + 0,00307}{0,0475}$$

4) Nilai regresi (R^2)

$$R^2 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{((n \sum x^2) - (\sum x)^2)((n \sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

$$= \frac{(6 \times 269,644) - (150 \times 7,4158)}{\sqrt{(6 \times 5500) - (150)^2} \sqrt{(6 \times 13,22464896) - (7,4158)^2}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(1617,864) - (1112,37)}{\sqrt{(33000)-(22500))((79,34789376)-(54,99408964))}} \\
 &= \frac{505,494}{\sqrt{(10500)(24,35380412)}} \\
 &= \frac{505,494}{\sqrt{(255714,94326)}} \\
 &= \frac{505,494}{505,6826} \\
 &= 0,9996
 \end{aligned}$$

6. Perhitungan Kadar Kafein

Perhitungan sebelum penambahan mengkudu (0%) dapat dihitung menggunakan persamaan garis lurus.

$$y = 0,0475 x + 0,00307$$

$$x = \frac{y + 0,00307}{0,0475}$$

$$y = 0,6801$$

$$x = \frac{0,6801 + 0,00307}{0,0475}$$

$$= \frac{0,68317}{0,0475}$$

$$= 14,3800 \text{ ppm} = 14,3800 \text{ mg/L}$$


$$C_{\text{kafein}} = M \times V \times Fp$$

$$C_{\text{kafein}} = 14,3800 \text{ ppm} = 14,3800 \text{ mg/L} \times 0,05 \text{ L} \times 25$$

$$= 17,9800 \text{ mg atau } 0,01798 \text{ g}$$

$$\begin{aligned}\% (b/b) &= \frac{\text{g kafein}}{\text{g kopi}} \times 100\% \\ &= \frac{0,01798 \text{ g}}{1 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,7980 \%\end{aligned}$$

Larutan sampel dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, 25%, 30% dan 35% untuk simple, duplo dan triplo dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama.



Lampiran 4. Analisis Data ANOVA (*Analysis of Varians*)

Ulangan	0 %	5%	10%	25%	30%	35%	Total
Simplo	1,80	0,89	0,67	0,56	0,28	0,12	5,65
Duplo	1,71	0,95	0,96	0,61	0,26	0,11	5,58
Triplo	1,73	1,08	0,95	0,55	0,26	0,12	5,65
Total	5,24	2,92	2,58	1,72	0,80	0,35	13,61
Rata-rata	1,75	0,97	0,86	0,57	0,27	0,12	

$$\sum X = 13,61$$

$$\begin{aligned} \sum X^2_{\text{total}} &= 1,80^2 + 1,71^2 + 1,73^2 + 0,89^2 + 0,95^2 + 1,08^2 + 0,67^2 + 0,96^2 + 0,95^2 + 0,56^2 \\ &\quad + 0,61^2 + 0,55^2 + 0,28^2 + 0,26^2 + 0,26^2 + 0,12^2 + 0,11^2 + 0,12^2 \\ &= 3,24 + 2,92 + 2,99 + 0,79 + 0,90 + 1,17 + 0,45 + 0,92 + 0,90 + 0,31 + \\ &\quad 0,37 + 0,30 + 0,078 + 0,0676 + 0,0676 + 0,0144 + 0,0121 + 0,0144 \\ &= 15,514 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum X^2_{\text{perlakuan}} &= 5,24^2 + 2,92^2 + 2,58^2 + 1,72^2 + 0,80^2 + 0,35^2 \\ &= 27,4576 + 8,5264 + 6,6564 + 2,9584 + 0,64 + 0,1225 \\ &= 46,3613 \end{aligned}$$

$$\text{a. FK} = \frac{(\sum X)^2}{\text{Perlakuan} \times \text{Ulangan}} = \frac{(13,61)^2}{6 \times 3} = \frac{185,2321}{18} = 10,29067$$

$$\text{b. JKT} = \sum X^2_{\text{total}} - \text{FK} = 15,514 - 10,29067 = 5,2233$$

$$\text{c. JKP} = \frac{\sum X^2}{r} - \text{FK} = \frac{46,3613}{3} - \text{FK} = 15,45377 - 10,2907 = 5,1631$$

$$\text{d. JKG} = \text{JKT} - \text{JKP} = 5,2233 - 5,1631 = 0,0602$$

$$\text{e. Db} =$$

1. $\text{dbp} = t - 1 = 6 - 1 = 5$
2. $\text{dbg} = t (r - 1) = 6 (3 - 1) = 12$

$$3. \text{ dbt} = (t-r) - 1 = (6 \times 3) - 1 = 17$$

$$f. \text{ KTP} = \frac{\text{JKP}}{\text{dbp}} = \frac{5,1631}{5} = 1,03262$$

$$g. \text{ KTG} = \frac{\text{JKG}}{\text{dbp}} = \frac{0,0602}{12} = 0,005017$$

$$h. F_{\text{hitung}} = \frac{\text{KTP}}{\text{KTG}} = \frac{1,03262}{0,005017} = 205,824$$

i. F_{tabel}

df	v1																																																	
v2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	30	40	50																											
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246	246	247	247	248	248	250	251	252																											
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5																											
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74	8,73	8,71	8,70	8,69	8,68	8,67	8,67	8,66	8,62	8,59	8,58																											
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,94	5,91	5,89	5,87	5,86	5,84	5,83	5,82	5,81	5,80	5,75	5,72	5,70																											
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62	4,60	4,59	4,58	4,57	4,56	4,50	4,46	4,44																											
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00	3,98	3,96	3,94	3,92	3,91	3,90	3,88	3,87	3,81	3,77	3,75																											
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57	3,55	3,53	3,51	3,49	3,48	3,47	3,46	3,44	3,38	3,34	3,32																											
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28	3,26	3,24	3,22	3,20	3,19	3,17	3,16	3,15	3,08	3,04	3,02																											
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,10	3,07	3,05	3,03	3,01	2,99	2,97	2,96	2,95	2,94	2,86	2,83	2,80																											
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,94	2,91	2,89	2,86	2,85	2,83	2,81	2,80	2,79	2,77	2,70	2,66	2,64																											
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,82	2,79	2,76	2,74	2,72	2,70	2,69	2,67	2,66	2,65	2,57	2,53	2,51																											
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,72	2,69	2,66	2,64	2,62	2,60	2,58	2,57	2,56	2,54	2,47	2,43	2,40																											
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,63	2,60	2,58	2,55	2,53	2,51	2,50	2,48	2,47	2,46	2,38	2,34	2,31																											
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,57	2,53	2,51	2,48	2,46	2,44	2,43	2,41	2,40	2,39	2,31	2,27	2,24																											
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,51	2,48	2,45	2,42	2,40	2,38	2,37	2,35	2,34	2,33	2,25	2,20	2,18																											
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,46	2,42	2,40	2,37	2,35	2,33	2,32	2,30	2,29	2,28	2,19	2,15	2,12																											
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,41	2,38	2,35	2,33	2,31	2,29	2,27	2,26	2,24	2,23	2,15	2,10	2,08																											
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,37	2,34	2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,22	2,20	2,19	2,11	2,06	2,04																											
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,34	2,31	2,28	2,26	2,23	2,21	2,20	2,18	2,17	2,16	2,07	2,03	2,00																											
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,31	2,28	2,25	2,22	2,20	2,18	2,17	2,15	2,14	2,12	2,04	1,99	1,97																											
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,28	2,25	2,22	2,20	2,18	2,16	2,14	2,12	2,11	2,10	2,01	1,96	1,94																											
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,26	2,23	2,20	2,17	2,15	2,13	2,11	2,10	2,08	2,07	1,98	1,94	1,91																											
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,24	2,20	2,18	2,15	2,13	2,11	2,09	2,08	2,06	2,05	1,96	1,91	1,88																											
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,22	2,18	2,15	2,13	2,11	2,09	2,07	2,05	2,04	2,03	1,94	1,89	1,86																											
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,20	2,16	2,14	2,11	2,09	2,07	2,05	2,04	2,02	2,01	1,92	1,87	1,84																											

ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Syahwah Islamiah, Lahir di Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Juli 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Syamsuddin dan Suriati. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Inpres No. 194 Taipanaorang mulai tahun 2006 sampai tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Galesong Utara mulai tahun 2012 dan tamat tahun 2015. Selepas lulus, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 4 TAKALAR mulai tahun 2015 dan tamat tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi dan menyelesaikan penelitian dan tugas akhir pada tahun 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R