

**UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN SERIBU (*Achillea
millefolium* L.) SEBAGAI IMUNOSTIMULAN PADA MENCIT JANTAN
(*Mus musculus*) DENGAN MENGGUNAKAN METODE *CARBON
CLEARANCE***



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih

Gelar sarjana farmasi pada jurusan Farmasi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

TIWLBAHAR

NIM. 70100117070

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tiwi Bahar
Nim : 70100117070
TTL : Bulukumba, 08 mei 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan ilmu kesehatan UINAM
Alamat : BTP Blok K No.185
Judul : Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Seribu (*Achillea Millefolium* L.) Sebagai Imunostimulan Pada Mencit Jantan (*Mus Musculus*) Dengan Menggunakan Metode *Carbon Clearance*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Romangpolong, Agustus 2021

Penulis,

Tiwi Bahar
NIM: 70100117070

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Scribu (*Achillea Millefolium* L.) Sebagai Immunostimulan Pada Mencit Jantan Dan Mencit Betina (*Mus Musculus*) Dengan Menggunakan Metode *Carbon Clearance*" yang disusun oleh Tiwi Bahar NIM. 70100117070, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1443 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, Januari 2022 M
1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes. (.....)
Sekretaris : Apt. Surya Ningsi S.Si M.Si (.....)
Pembimbing I : apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. (.....)
Pembimbing II : apt. Munifah Wahyudin, S. Farm., M.Sc. (.....)
Penguji I : apt. Asrul Ismail S. Farm M.Sc. (.....)
Penguji II : Dr. Hj. RosmiantjAzis, M.Pd.I (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai Rahmatan Lil'alam beserta para sahabat. Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintakan. Namun atas dukungan dari berbagai pihak yang terus memberikan motivasi sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar besarnya saya persembahkan kepada kedua orang paling spesial yaitu kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, dan bimbingannya kepada penulis dan tak terlupakan kepada sahabat-sahabat Saudara tak sedarah selama berkuliah, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Hj. Syatirah, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. H. Fais Satrianegara, SKM., Mars. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Apt. Munifah Wahyudin S. Farm., M.Sc selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Apt. Asrul Ismail S. Farm-M.Sc selaku penguji akademik yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
10. Dr. Hj. Rosmiati Azis, M.Pd. I selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Bapak dan ibu dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah swt membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

12. Kepada seluruh laboran, Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasetika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Sahabat – sahabat yang selalu support kasih semangat hingga saya biasa menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
14. Teman - teman seangkatan saya di kampus yaitu Kovalen 2017, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt. Aamiin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 17 Februari 2022

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tiwi bahar

NIM 70100117070

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup.....	5
1. Definisi Operasional.....	5
2. Ruang Lingkup.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
3. Hipotesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Uraian Sampel.....	9
1. Klasifikasi Tanaman.....	10
2. Morfologi Tanaman.....	10
3. Kandungan Kimia Tanaman.....	10

B. Klasifikasi Hewan Uji	11
1. Klasifikasi.....	11
2. Morfologi Hewan Uji	12
3. Anatomi.....	12
C. Sistem Imun.....	13
1. Pertahanan tubuh non spesifik.....	15
a. Pertahanan tubuh non spesifik eksternal.....	16
b. Pertahanan tubuh non spesifik internal.....	16
2. Pertahanan tubuh spesifik.....	19
a. Sel B.....	19
b. Sel T.....	19
3. Anti bodi.....	20
4. Sel sel dalam sistem imun.....	20
D. Uji bersihan karbon	21
E. Ekstraksi bahan alam.....	22
1. Cara dingin	22
a. Maserasi.....	22
b. Perkolasi.....	23
2. Cara panas	23
a. Refluks	23
b. Soxhlet.....	23
c. Digesti	24
d. Infus	24
F. Tinjauan islami	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis penelitian	27


B. Lokasi dan waktu penelitian.....	27
1. Lokasi penelitian	27
2. Waktu penelitian.....	27
C. Pendekatan penelitian.....	27
D. Populasi dan sampel	27
E. Alat dan bahan.....	27
1. Alat.....	27
2. Bahan.....	27
F. Prosedur kerja	
1. Penyiapan sampel	28
2. Determinasi tumbuhan daun seribu.....	28
3. Ekstraksi.....	28
4. Penyiapan suspensi karbon	28
5. Perencanaan dosis sediaan uji.....	28
6. Uji imunostimulan.....	28
a. Perhitungan konstanta fagositosis.....	28
b. Perhitungan indeks fagositosis.....	29
7. Analisis data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil penelitian.....	31
B. Pembahasan.....	31
BAB V PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.</i> Gambar tumbuhan daun seribu	9
<i>Gambar 2.</i> Mencit (Mus Musculus)	12
<i>Gambar 3.</i> Mekanisme pertahanan tubuh manusia	15
<i>Gambar 4.</i> Diagram konstanta fagositasi	33
<i>Gambar 5.</i> Diagram indeks fagositasi	34
<i>Gambar 6.</i> Skema kerja pengolahan ekstrak	43
<i>Gambar 7.</i> Skema kerja pengujian imunostimulan	44
<i>Gambar 8.</i> Skema kerja analisis data	45
<i>Gambar 9.</i> Diagram konstanta fagositasi	49
<i>Gambar 10.</i> Diagram indeks fagositasi	50
<i>Gambar 11.</i> Gambar daun seribu	51
<i>Gambar 12.</i> Suspensi ekstrak etanol daun seribu	52
<i>Gambar 13.</i> Suspensi karbon aktif	52
<i>Gambar 14.</i> Penimbangan karbon aktif	52
<i>Gambar 15.</i> Darah mencit	53
<i>Gambar 16.</i> Pengukuran nilai absorban	53

DAFTAR TABEL


<i>Tabel 1.</i> Rendamen ekstrak etanol daun seribu.....	31
<i>Tabel 2.</i> Nilai absorbansi mencit	31
<i>Tabel 3.</i> Nilai konstanta fagositas.....	32
<i>Tabel 4.</i> Nilai indeks fagositas	33
<i>Tabel 5.</i> Hasil perhitungan rendamen.....	47
<i>Tabel 6.</i> Nilai absorban.....	48
<i>Tabel 7.</i> Nilai konstanta fagositas.....	49
<i>Tabel 8.</i> Nilai indeks fagositas	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1.</i> Skema kerja	43
<i>Lampiran 2.</i> Perhitungan dosis.....	46
<i>Lampiran 3.</i> Hasil pemeriksaan karakteristik ekstrak	47
<i>Lampiran 4.</i> Hasil uji imunostimulan.....	48
<i>Lampiran 5.</i> Dokumentasi penelitian.....	51
<i>Lampiran 6.</i> Hasil analisis data	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Nama : Tiwi Bahar

Nim 70100117070

Department : Pharmacy

Title : Test The Effectiveness Of The Ethanolic Extract Of Achillea Millefolium L As An Immunostimulant In Male Mice (Mus Musculus) Using The Carbon Clearance Method

The main active compound of achillea millefolium is ascorbic acid, tocopherol, and rich in flavonoids, apigenin, quercetin, and also phenolic acids which is thought to have an immunostimulant effect. This research aimed to evaluate the immunostimulant effect of the ethanol extract of the achillea millefolium L using carbon clearance methods. The animal models used were albino mice male which were divided into 5 groups. Group I as negative control (NaCMC 0,5%), group II, III, IV were given ethanol extract of achillea millefolium L leaves at a dose of 10 mg/kgbw, 50 mg/kgbw, 100 mg/kgbw and group V as the positive control (stimuno forte). The dosage is given orally in a single dose for 6 days. The result showed the administration of test reparation with a dose of 10 mg/kgbw, 50 mg/kgbw, 100 mg/kgbw showed the phagocytosis constant value were significantly different from negative control ($P < 0,05$). Phagocytosis indices from test preparations with a dose of 10 mg/kgbw, 50 mg/kgbw, 100 mg/kgbw also show values greater than 1. It was concluded that the ethanol extract of achillea millefolium L leaves at a dose of 10 mg/kgbw, 50 mg/kgbw, 100 mg/kgbw is an immunostimulant.

Keywords: Achillea millefolium L, Carbon clearance, immunostimulant

ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Tiwi Bahar

Nim 70100117070

Jurusan : Farmasi

Judul skripsi : Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Seribu (*Achillea millefolium* L.) Sebagai Imunostimulan Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*) Dengan Menggunakan Metode *Carbon Clearance*

Senyawa aktif utama dari daun seribu adalah asam askorbat dan tokoferol, dan kaya akan flavonoid, apigenin, kuarsetin dan juga asam fenol yang diduga mempunyai efek imunostimulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek imunostimulan ekstrak etanol daun seribu (*Achillea Millefolium* L.). Menggunakan metode bersihan karbon. Hewan yang digunakan adalah mencit jantan putih. Hewan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif (NaCmc 0,5%), kelompok II, III, IV diberi ekstrak etanol daun seribu dengan dosis masing masing 10 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB dan kelompok V sebagai kontrol positif (Meniran *Phyllanthus Niruri*). Sediaan uji diberikan secara oral dengan dengan dosis tunggal selama 6 hari. Hasil penelitian menunjukkan pemberian sediaan uji dengan dosis 10 mg/kgBB 0,0424, 50 mg/kgBB 0,0606, 100 mg/kgBB menunjukkan nilai konstanta dan indeks fagositasi 10mg/kgBB 1,38 , 50 mg/kgBB 1,44, 100 mg/kgBB 1,51 berbeda makna dengan kontrol negatif ($p < 0,05$). Indeks fagositasi dari sediaan uji dengan dosis 10 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1. Disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun seribu dengan dosis 10 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB bersifat sebagai imunostimulan.

Kata kunci: *Achillea Millefolium* L, bersihan karbon, imunostimulan

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang memiliki keanekaragaman obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami termasuk tanaman. Tidak kurang dari 30.000 spesies tumbuhan ada di hutan tropis Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 7000 spesies yang diketahui memiliki khasiat obat namun semuanya dimanfaatkan secara optimal sebagai obat herbal atau dapat juga dijadikan sebagai tanaman obat oleh masyarakat banyak (Jumiarni & Komalasari, 2017).

Tanaman dan obat tradisional sejak zaman dahulu mempunyai peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, mempertahankan stamina dan mengobati segala penyakit. Oleh karena itu tanaman dan obat tradisional telah berakar kuat dan menyebar dalam kehidupan sebagian masyarakat hingga saat ini (Parawansah et al., 2020).

Tanaman sering digunakan sebagai bahan baku yang biasa digunakan dalam obat tradisional dan jamu, yang apabila dikonsumsi dapat meningkatkan kekebalan tubuh (immune system) karena tanaman ini mempunyai sifat spesifik sebagai tanaman obat yang bersifat pencegahan (preventif) dan promotif melalui kandungan metabolik sekunder contohnya seperti pada daun seribu jahe dan pada temulawak yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Pertiwi et al., 2020).

Setiap hari tubuh kita selalu menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar yang berupaya masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai macam cara. Terdapat jutaan mikroorganisme, virus, bakteri dan patogen lainnya yang bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara seperti melalui sistem

pernapasan, sistem pencernaan, dan juga bisa melalui permukaan kulit. Walaupun besarnya ancaman yang membahayakan tubuh kita, Maha besar Allah yang telah mempersiapkan dan memberikan sebuah sistem di dalam tubuh manusia yang dapat menangkal masuknya serangan tersebut melalui sistem pertahanan tubuh atau disebut sistem imun tubuh (Aripin, 2019).

Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap berbagai patogen seperti virus, bakteri, parasit, jamur serta sel-sel tumor. Sistem imun dapat mengenali dan membunuh patogen melalui mekanisme sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Meskipun demikian, patogen dan sel tumor juga memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap sistem imun sehingga dibutuhkan suatu substansi dari luar untuk membantu meningkatkan kinerja dan mencegah dampak patologis dari sistem imun (Nafis et al., 2020).

Imunostimulan adalah stimulasi sel – sel sistem kekebalan tubuh yang yang menginduksi reaksi spesifik antigen atau menghasilkan limfosit spesifik. Dimana imunostimulan juga mampu meningkatkan kerja komponen sistem kekebalan tubuh baik yang spesifik maupun non spesifik (sistem imun bawaan) (Skerfving S, Bergdahl I, 2015).

Bahan aktif dalam tanaman yang diduga dapat memodulasi sistem imun adalah polisakarida, flavonoid, fenolik, polifenol, alkaloid, kuinon, terpenoid, lektin, dan polipeptida (Nafis et al., 2020).

Beberapa tanaman yang telah dikenal sebagai imunostimulan antara lain echinaceae (*Echinacea purpurea*), meniran (*Phyllanthus niruri* L), mengkudu (*Morinda citrifolia*), dan sambiloto (*Andrographis paniculata*) (Suhirman dan Vienna rti, n.d.). Salah satu tanaman obat yang berpotensi sebagai sumber agen imunostimulan baru adalah daun seribu (*Achillea millefolium* L). penyelidikan produk alam untuk penemuan senyawa aktif dengan sifat antimikroba dan

antioksidan yang berasal dari tumbuhan. Daun seribu atau dikenal dengan nama latin *Achillea millefolium* L. merupakan tanaman yang kaya akan manfaat yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan khususnya bidang farmasi (Erjon., 2020).

Daun seribu merupakan jenis tumbuhan liar yang tumbuh di sembarang tempat dan sering dianggap sebagai gulma atau tumbuhan pengganggu yang layak untuk dicabut atau dijadikan pakan ternak. Tanaman seribu daun (*Achillea millefolium* L) sering digunakan sebagai obat dalam mitologi Yunani kuno. Achillea sang pahlawan Yunani menggunakan seribu daun untuk mengobati luka para prajuritnya yang terkena panah. Daun seribu telah populer di dunia pengobatan herbal Eropa. Tanaman yang dikenal sebagai Yaraow ini juga bisa membuat daun teh. Pendaki gunung yang mengalami pendarahan sering menyeduhnya menjadi teh untuk menekan pendarahan. Penduduk asli Amerika menggunakannya dengan cara diremas lalu digulung lalu dioleskan pada luka luar dengan cara diremas.

Penyelidikan produk alami untuk penemuan senyawa aktif dengan sifat antimikroba dan antioksidan yang berasal dari tanaman, salah satunya yaitu daun seribu (*Achillea millefolium* L.) Tanaman ini mengandung asam askorbat dan tokoferol, dan kaya akan flavonoid, apigenin, kuarsetin dan juga asam fenol (Barut., 2017). Hasil penelitian yaitu Uji HPLC-DPPH menunjukkan bahwa daun seribu (*Achillea millefolium* L.) memiliki aktivitas antiradikal yang signifikan karena adanya komponen senyawa flavanoid kompleks didalamnya. Hasil dari uji HPLC-DPPH menunjukkan adanya konstituen dalam asam kompleks flavonoid dan asam fenolkarbonik yang mampu menghambat radikal bebas. Menurut penelitian ini, ditemukan bahwa komponen utama diantara yang teridentifikasi pada daun seribu (*Achillea millefolium* L.) memiliki sifat penghambat radikal

bebas adalah luteolin dan asam klorogenat disertai dengan penghambat yang kurang yaitu rutin dan luteolin 7-O-glukosida. (Trumbeckaite et al., 2011) . Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa ekstrak metanol *Achillea millefolium* L. memiliki kandungan flavonoid dan fenolik. Selain itu, aktivitas antioksidannya diperoleh dengan menggunakan metode DPPH dan mendapat hasil inhibisi 75% (Eghdami et al., 2011) .

Melihat pemanfaatan daun seribu yang cukup luas terutama sebagai antimikroba serta uji aktivitas antioksidan ekstrak daun seribu dalam bidang farmakologi diketahui masih terbatas, oleh karena itu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji efektivitas imunostimulan dari daun seribu (*Achillea millefolium* L.)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L.) dapat digunakan sebagai imunostimulan pada mencit jantan?
2. Berapakah dosis ekstrak etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L.) yang efektif digunakan sebagai imunostimulan pada mencit jantan?

C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi oprasional

a. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan bagian tanaman yang berkhasiat obat dengan menggunakan pelarut tertentu. Tujuan dilakukan ekstraksi untuk mendapatkan senyawa kimia yang terdapat dari tanaman atau simplisia (Nn, 2015).

b. Ekstrak

Ekstrak adalah bahan atau preparat yang diperoleh dari ekstraksi tanaman seribu daun (*Achillea millefolium* L.) dengan menggunakan pelarut etanol.

c. Etanol

Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Imunostimulan

Imunostimulan adalah substansi (obat atau nutrient) yang menstimulasi sistem imun dengan meningkatkan aktivitas komponen sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit.

e. Sistem imun

Sistem imun adalah sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan (organisme) pathogen.

f. Carbon clearance

Pembersihan karbon merupakan uji kemampuan fagosit dengan menggunakan karbon sebagai antigen yang diberikan secara intravena. Karbon akan berkurang jumlahnya dalam darah seiring waktu, karena peristiwa fagositosis oleh sel-sel leukosit, terutama neutrofil, monosit, makrofag dan eosinofil.

2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah pengujian efektifitas ekstrak etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L.) yang dapat digunakan sebagai imunostimulan dengan menggunakan metode carbon clearance, dimana metode tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas sel sel fagosit untuk membunuh organisme pathogen yang masuk kedalam tubuh.

D. Kajian pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yufrialdi yang berjudul “Uji aktivitas imunomodulator dan jumlah sel leukosit dari ekstrak kemangi pada

mencit putih jantan” Telah dilakukan penelitian untuk menguji aktivitas imunomodulator dari ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*). Parameter yang diamati adalah densitas optik zat karbon yang disuntikkan secara intravena, jumlah leukosit dan berat limpa relatif dari mencit putih jantan. Hewan uji dibagi atas 4 kelompok yang masing-masingnya terdiri dari 5 mencit. Kelompok pertama adalah hewan yang hanya diberi NaCl fisiologis. Kelompok 2, 3 and 4 diberikan ekstrak daun kemangi dengan dosis 10 mg/kgBB, 50 mg/kgBB dan 100 mg/kgBB secara oral selama 6 hari. Pada hari ke-7 ditentukan persentase dan jumlah total leukosit dan sete padalah itu semua mencit disuntikkan secara intravena 0,2 ml larutan koloid karbon 6,4%. Nilai densitas optik karbon dalam darah mencit diukur di menit ke-0, 3, 6, 9, 12, dan 15 pada panjang gelombang 637, 5 nm dan hasilnya digunakan untuk mengukur indeks fagositosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi dapat berefek imunostimulan yang ditunjukkan dengan data indeks fagositosis lebih besar dari 1.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Puspitaningrum yang berjudul “*Aktivitas imunomodulator fraksi etil asetat daun som jawa (Talinum triangulare) terhadap respon imun non spesifik*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas imunomodulator fraksi etil asetat daun Som Jawa (*Talinum triangulare* (Jacq.) Willd) terhadap respon imun non spesifik. Uji respon imun non spesifik dengan menggunakan metode bersihan karbon dan indeks organ limfoid. Analisa data yang diperoleh menggunakan SPSS versi 16,0. Hasil uji bersihan karbon menunjukkan bahwa fraksi etil asetat daun Som Jawa 50 mg/kgBB bersifat imunostimulan sedang dengan indeks fagositik (K) 1,34. Sedangkan fraksi etil asetat daun Som Jawa 100 dan 150 mg/kgBB bersifat imunostimulan kuat dengan indeks fagositik (K) > 1,5. Hasil uji indeks organ limfoid menunjukkan adanya perbedaan signifikan persen indeks hati, limpa, dan timus

antara fraksi etil asetat daun Som Jawa ketiga dosis dengan kontrol negatif. Berdasarkan hasil uji respon imun non spesifik dapat disimpulkan bahwa fraksi etil asetat daun Som Jawa mempunyai aktivitas imunostimulan.

3. Berdasarkan penelitian Havisur Rahman yang berjudul “*Aktivitas imunomodulator dan jumlah sel leukosit dari ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus lemaire) pada mencit putih jantan*” Uji aktifitas imunomodulator dan jumlah sel leukosit pada mencit puqtih jantan telah dilakukan dengan menggunakan ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus lemairei (Hook.) Britton & Rose). Hewan dibagi atas 4 kelompok, yang terdiri dari kelompok 1 hanya diberi suspensi NaCMC, kelompok 2,3,4 diberi ekstrak kulit buah naga merah dengan dosis 10 mg/kg BB, 50 mg/kg BB dan 100 mg/kg BB ekstrak diberikan selama 6 hari secara oral. Hasil penelitian menunjukkan pemberian ekstrak kulit buah naga merah secara oral pada mencit putih jantan selama 6 hari dapat meningkatkan konstanta dan indeks fagositas, dan semakin meningkat pada dosis ke 100 mg/kgBB. Pada aktifitas ekstrak kulit buah naga merah juga meningkatkan jumlah sel dan jumlah total sel leukosit secara signifikan ($P < 0,05$). Dosis 100mg/kg BB adalah dosis terbaik yang meningkatkan aktivitas imunomoduator dan jumlah sel leukosit.

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun seribu memiliki efektifitas sebagai imunostimulan pada mencit jantan?
2. Untuk mengetahui berapa dosis yang efektif yang dapat digunakan sebagai imunostimulan pada mencit jantan?


F. Manfaat penelitian

Memberikan informasi berupa data ilmiah mengenai efektifitas imunostimulan ekstrak etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L.) yang memiliki

kandungan flavonoid yang dapat digunakan sebagai imunostimulan pada mencit jantan dan menambah inventaris tanaman obat tradisional yang berkhasiat sebagai imunostimulan.

G. Hipotesis

1. Ekstrak etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L) dapat memberikan efek imunostimulan pada mencit jantan
2. Peningkatan dosis ekstrak etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L) dapat meningkatkan respon imun pada mencit jantan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Daun Seribu

1. Klasifikasi tanaman daun seribu

Regnum	: Plantae
Subdivisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnolophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Asterales
Famili	: Asteraceae
Genus	: Achillea
Spesies	: <i>Achillea millefolium</i> L. (Wahyuni et al., 2016).

2. Morfologi



Gambar 1. Tanaman Daun Seribu

Seribu tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang berasal dari Eropa dan Asia dengan iklim sedang. Daun seribu tumbuh baik pada ketinggian 900-1.500 m dpl di tempat terbuka, terkena sinar matahari penuh, namun

pertumbuhannya kurang optimal jika berada di padang rumput atau hutan terbuka (Wahyuni et al., 2016).

Daun seribu merupakan herba dengan tinggi ± 45 cm. Akar tunggang berwarna coklat muda. Batangnya tidak berkayu, berbentuk bulat, kutu buku, berwarna hijau. Sifat batang seperti rumput, tumbuh tegak, permukaan berbulu (Wahyuni et al., 2016).

Daun majemuk menyirip ganda, daun duduk memeluk batang, roset akar, bentuk daun seperti daun pakis, bercangap, panjang 2-35 cm, lebar 1-4 cm, ujung runcing hingga membulat, pangkal menyempit. Helai daun berwarna hijau tua pada permukaan atas dan sedikit berbulu (Wahyuni et al., 2016).

Bunga majemuk, berbentuk rumbai pipih, terletak di ujung batang (terminal) dengan diameter ± 11 2 cm, terdiri dari 15-40 bunga. Bunga tunggal berbentuk tabung, memiliki 5 daun mahkota putih, 5 kelopak kehijauan, kuncup menonjol ke luar, benang sari banyak, aktif, bunga sensus, kuncup buah terletak di bawah pangkal bunga (inferus). Buah tanda kurung (achene) berbentuk pipih berwarna coklat tua (Wahyuni et al., 2016).

2. Nama Daerah

Di Indonesia tanaman daun seribu (*Achillea millefolium* L.) dikenal dengan berbagai sebutan di setiap daerah, diantaranya godong sewu (Jawa), daun hidung berdarah, gandana, momadra.

3. Kandungan Kimia

Daun seribu merupakan herba dengan tinggi ± 45 cm. Akar tunggang berwarna coklat muda. Batangnya tidak berkayu, berbentuk bulat, kutu buku, berwarna hijau. Sifat batang seperti rumput, tumbuh tegak, permukaan berbulu (Wahyuni et al., 2016).

Daun majemuk menyirip ganda, daun duduk memeluk batang, roset akar, bentuk daun seperti daun pakis, bercangap, panjang 2-35 cm, lebar 1-4 cm, ujung runcing hingga membulat, pangkal menyempit. Helaian daun berwarna hijau tua pada permukaan atas dan sedikit berbulu (Wahyuni et al., 2016).

Bunga majemuk, berbentuk malai pipih, terletak di ujung batang (terminal) dengan diameter ± 11 2 cm, terdiri dari 15-40 bunga. Bunga tunggal berbentuk tabung, memiliki 5 mahkota putih, 5 kelopak kehijauan, putik naik ke luar, benang sari banyak, aktibonorph, bunga banci, ovarium terletak di bawah pangkal bunga (inferus). Buah tanda kurung (achene) berbentuk pipih berwarna coklat kehitaman (Wahyuni et al., 2016).

Seribu tanaman mengandung lebih banyak lemak dan asam lemak jenuh dan memiliki nilai kalori yang lebih tinggi. Seribu tanaman juga merupakan sumber vitamin C dan mineral yang baik seperti aluminium, kobalt, kalium, tembaga dan garam kalsium (Ijaz et al., 2020).

3. Klasifikasi hewan uji

1. Klasifikasi

Kingdom : Animalia

Divisi : Chordata

Class : Mamalia

Ordo : Rodentia

Family : Muridae

Genus : Mus

Spesies : *Mus musculus*



Gambar 2. Mencit (*Mus musculus*)

2. Morfologi

Mencit (*Mus musculus*) berasal dari Eropa Barat dan Amerika Utara, tetapi saat ini ditemukan di seluruh dunia. Ada beberapa subspecies mencit dan dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti tengkorak, gigi, tubuh, dan kebiasaan alami (Vanderlip., 2016). Mencit (*Mus musculus*) merupakan mamalia dengan perilaku poliseksual, kecuali pada masa bunting atau kebuntingan mani, siklus ini berulang sepanjang tahun tanpa banyak perubahan. Mencit (*Mus musculus*) merupakan hewan yang sedang berahi, yang artinya satu tahun siklus reproduksi berulang. Siklus birahi mencit (*Mus musculus*) dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari. Meskipun memilih waktu siklus akan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cahaya, suhu, status gizi, dll (Vanderlip., 2016).

3. Anatomi

a. Mata: mencit memiliki mata gelap atau merah, tergantung pada susunan genetiknya. Mereka memiliki penglihatan yang buruk dan sensitif terhadap cahaya terang. Mereka terutama mengandalkan indera pendengaran, penciuman dan sentuhan.

- b. Telinga: mencit memiliki pendengaran yang tajam dan mengandalkan indera pendengarannya untuk mendeteksi bahaya dan mendengar panggilan dari mencit lain. Kemampuan pendengaran pada mencit tidak berkembang sampai usia 11 hari. Mencit dapat mendengar dan berkomunikasi dalam jangkauan ultrasonik. Mereka dapat mendengar suara dari 80 Hz hingga 100 kHz dan paling sensitif pada 15 kHz hingga 20 kHz dan 50 kHz. Kemampuan mendengar pada mencit bervariasi sesuai dengan usia dan genetiknya
- c. Hidung: Meskipun mencit memiliki hidung yang kecil, indra penciumannya sangat tajam dan berperan penting dalam kehidupan sosialnya. Penciuman dan penciuman adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh mencit untuk mengintai wilayah dan mengidentifikasi koloni mencit lainnya.
- d. Tubuh: mencit kecil dan lincah. Mereka mampu masuk ke dalam rongga kecil dalam upaya untuk melarikan diri dari bahaya atau bersembunyi.
- e. Kaki: Kaki mencit mungkin kecil, tetapi mereka bisa melompat, berlari cepat, dan memanjat dengan mudah
- f. Ekor: mencit memiliki ekor yang panjang dan kuat untuk ukurannya. Ekornya sangat sensitif terhadap rasa sakit. Namun, mencit dapat dipegang di tengah ekornya tanpa menimbulkan ketidaknyamanan jika ditangani dengan lembut. Ekor berfungsi sebagai alat keseimbangan, sekaligus sarana penting pelepasan panas tubuh. Jika ekor terluka dan terpisah dari tubuh, bagian ekor yang hilang tidak akan tumbuh kembali (Vanderlip, 2016).

B. Sistem Imun

Sistem kekebalan tubuh memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesehatan manusia. Sistem kekebalan yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan berbagai penyakit seperti radang sendi, kolitis ulserativa, asma, alergi, kanker dan penyakit menular. Penyakit seperti itu, yang disebabkan oleh

modulasi sistem imun. Zat yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dikenal sebagai imunomodulator. Imunomodulator dapat dibagi menjadi dua yaitu imunostimulan (meningkatkan fungsi sistem imun) dan immunosupresi (menekan respon imun) (Kumolosasi et al., 2018).


Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap berbagai patogen seperti virus, bakteri, parasit, jamur serta sel-sel tumor. Sistem imun dapat mengenali dan membunuh patogen melalui mekanisme sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif (Nafis et al., 2020).

Imunostimulan adalah stimulasi sel – sel sistem kekebalan tubuh yang yang menginduksi reaksi spesifik antigen atau menghasilkan limfosit spesifik. Dimana imunostimulan juga mampu meningkatkan kerja komponen sistem kekebalan tubuh baik yang spesifik maupun non spesifik (sistem imun bawaan) (Skerfving S, Bergdahl I., 2015).

Pada manusia terdapat sistem imun dengan kemampuan yaitu dapat membedakan antara zat asing atau lebih dikenal dengan antigen dan zat yang berasal dari tubuh sendiri. Namun pada beberapa kondisi, sistem imun tidak mampu untuk membedakan antara zat asing yang berasal dari luar tubuh dengan zat yang berasal dari tubuh itu sendiri sehingga sel-sel pada sistem imun mulai membentuk zat anti terhadap jaringan tubuhnya yaitu autoantibodi. Respon imun Pada tubuh merupakan suatu respon dari semua komponen sistem imun yang secara bersamaan terkoordinasi dalam melakukan eliminasi zat asing atau yang masuk ke dalam tubuh. Pada proses ini diawali dengan tahap adanya pengenalan molekul zat asing oleh komponen sistem imun yang melalui reseptor yang menstimulasi sistem saraf pada otak dengan tujuan membangkitkan serta melakukan reaksi yang tepat untuk mengeliminasi zat asing tersebut (Antasari, 2017).

Ada dua jenis imunitas, yaitu imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Imunitas bawaan (non-spesifik) adalah pertahanan yang sudah ada sejak lahir. Kekebalan ini berfungsi sebagai respon cepat dalam mencegah penyakit. Imunitas bawaan tidak mengenali mikroba tertentu dan melawan semua mikroba dengan cara yang sama. Selain itu, imunitas bawaan tidak memiliki komponen memori sehingga tidak dapat mengenali kontak masa lalu. Imunitas bawaan terdiri dari komponen lini pertama yaitu kulit dan selaput lendir dan lini kedua yaitu zat antimikroba, sel pembunuh alami, dan fagosit. Kekebalan adaptif (spesifik) adalah kekebalan yang melibatkan mekanisme pengenalan spesifik patogen atau antigen ketika bersentuhan dengan sistem kekebalan. Berbeda dengan imunitas bawaan, imunitas adaptif memiliki respon yang lambat, tetapi memiliki komponen memori, sehingga dapat segera mengenali kontak berikutnya. Limfosit adalah komponen imunitas adaptif (Aripin, 2019).

Berdasarkan urutan mekanisme sistem pertahanan tubuh seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 3. Mekanisme pertahanan tubuh manusia

1. Pertahanan Tubuh Non Spesifik

Sistem imun non-spesifik atau disebut imunitas bawaan (innate immunity) merupakan suatu respon imun terhadap paparan zat asing (antigen) yang terjadi walaupun sebelumnya pada tubuh belum pernah terpapar zat tersebut. Zat asing yang masuk ke dalam tubuh akan dihancurkan dengan adanya sistem imun nonspesifik melalui proses fagositosis sehingga dalam hal ini neutrofil, makrofag dan monosit memiliki peran yang sangat penting. Pada proses fagositosis sel-sel fagositosis berada dalam jarak yang dekat dengan partikel zat asing seperti bakteri atau bisa dikatakan zat asing tersebut harus melekat ke permukaan fagosit sehingga untuk dapat mencapai sasaran fagosit harus bergerak. Dilepasnya mediator atau zat tertentu dari sel makrofag, neutrofil atau komplemen yang sudah berada dilokasi sehingga dapat terjadi fagositosis (menelan patogen) (Ida et al., 2017).

Sistem imun non-spesifik (sistem imun bawaan) adalah garis pertahanan pertama terhadap agen infeksi dan sebagian besar patogen potensial. Individu yang sehat dilindungi mikroorganisme yang berpotensi berbahaya dilingkungan oleh sejumlah mekanis efektif yang ada sejak lahir, yang tidak tergantung pada paparan sebelumnya terhadap mikroorganisme tertentu. Mekanisme pertahanan sistem imunitas bawaan menunjukkan spesifikasi yang luas dalam arti bahwa mereka efektif melawan berbagai agen yang berpotensi menular (Stewart, 2012).

2. Pertahanan Tubuh Nonspesifik Eksternal

Respon imun adaptif berfungsi untuk menghancurkan patogen yang menyerang dan bergantung pada kapasitas sel imun untuk membedakan antara sel tubuh sendiri dan penyerang yang tidak diinginkan. Sistem imun spesifik merupakan sistem pertahanan tubuh yang diperankan oleh sel limfosit dengan atau tanpa bantuan sel makrofag dan komplemen ataupun komponen sistem imun yang

lain. Sistem imun spesifik ini hanya ditujukan kepada antigen khusus yaitu antigen yang merupakan pasangannya (ligannya). Respon imun spesifik akan mudah mengenali kembali antigen atau benda asing yang sama dan menyerang tubuh. Pada sistem imun spesifik dibentuk suatu antibodi dan limfosit efektor spesifik terhadap benda asing atau antigen yang telah merangsangnya sehingga terjadilah eliminasi antigen. Adapun sel-sel yang berperan penting dalam hal ini yaitu sel yang mempresentasikan antigen APC (antigen presenting cell atau makrofag) sel limfosit B dan sel limfosit T (Ida et al., 2017).

a. Pertahanan tubuh non spesifik internal

Mikroba yang mampu menembus sistem pertahanan tubuh, akan menghadapi second line of defense. Mekanisme utama sistem pertahanan non spesifik internal bergantung pada fagositosis, yaitu proses menelan mikroorganisme yang menyerang tubuh oleh sel darah putih tertentu. Selain itu, mekanisme pertahanan nonspesifik internal tubuh juga dilakukan oleh sel natural killer (NK), respon inflamasi dan senyawa antimikroba (Aripin, 2019).

1) Fagositosis

Sel fagosit yang disebut neutrofil dalam darah putih adalah yang paling banyak, sekitar 60-70%. Sel neutrofil mendekati sel yang diserang oleh mikroba dengan adanya sinyal kimia (kemotaksis). Neutrofil dapat meninggalkan aliran darah ke jaringan yang terinfeksi dan membunuh mikroba penyebab infeksi. Monosit, meskipun hanya sebanyak 5% dari semua sel darah putih, memberikan pertahanan fagositosis yang efektif. Setelah mengalami pematangan, monosit bersirkulasi dalam darah selama beberapa jam. Setelah itu, ia bergerak menuju jaringan dan berubah menjadi makrofag. Sel mirip amuba mampu memanjangkan pseudopodia untuk menarik mikroba yang akan dihancurkan oleh enzim pencernaan. Namun, beberapa mikroba telah berevolusi menuju sarana makrofag.

Misalnya, beberapa bakteri memiliki kapsul yang mencegah penempelan pseudopodia makrofag. Bakteri lain resisten terhadap enzim litik fagosit dan bahkan dapat bereproduksi dalam sel makrofag. Beberapa makrofag secara permanen berada di organ tubuh dan jaringan ikat.

Selain neutrofil dan monosit, terdapat juga eosinofil yang berperan dalam sistem pertahanan internal nonspesifik. Sekitar 1,5% sel darah putih adalah eosinofil. Eosinofil memiliki aktivitas fagosit yang terbatas, tetapi mengandung enzim penghancur dalam granula sitoplasmiknya. Eosinofil berperan dalam pertahanan tubuh terhadap cacing parasit. Eosinofil memosisikan diri di permukaan cacing dan mengeluarkan enzim dari butiran untuk menghancurkan cacing.

2) Sel Pembunuh Alami (NK)

Sel NK atau sel pembunuh alami tidak menyerang mikroorganisme secara langsung; malah merusak sel-sel tubuh yang diserang virus dan sel-sel abnormal yang bisa membentuk tumor. Sel NK tidak bersifat fagositik; tetapi malah menyerang membran sel sehingga sel lisis (pecah).

3) Respon inflamasi

Peradangan adalah respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya dari goresan atau benturan keras. Proses ini dipengaruhi oleh histamin dan prostaglandin. Histamin yang diproduksi oleh sel-sel tubuh berperan dalam meningkatkan konsentrasi otot dan permeabilitas dinding pembuluh darah kapiler di sekitar area yang terinfeksi. Peningkatan aliran darah akan memudahkan pergerakan sel fagosit dari darah ke jaringan yang terluka. Neutrofil merupakan fagosit pertama yang menyelubungi luka, kemudian monosit berperan dengan berkembang menjadi makrofag yang akan membersihkan sel-sel jaringan yang rusak.

4) Sel Natural Killer Natural (NK)

Sel NK atau sel pembunuh alami tidak menyerang mikroorganisme secara langsung; malah merusak sel-sel tubuh yang diserang virus dan sel-sel abnormal yang bisa membentuk tumor. Sel NK tidak bersifat fagositik; tetapi menyerang membran sel sehingga sel lisis (pecah).

5) Respon peradangan

Peradangan adalah respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya dari goresan atau benturan keras. Proses ini dipengaruhi oleh histamin dan prostaglandin. Histamin yang diproduksi oleh sel-sel tubuh berperan dalam meningkatkan konsentrasi otot dan permeabilitas dinding pembuluh darah kapiler di sekitar area yang terinfeksi. Peningkatan aliran darah akan memudahkan pergerakan sel fagosit dari darah ke jaringan yang terluka. Neutrofil merupakan fagosit pertama yang menyelubungi luka, kemudian monosit berperan dengan berkembang menjadi makrofag yang akan membersihkan sel-sel jaringan yang rusak.

6) Protein Antimikroba

Protein yang berperan dalam sistem pertahanan nonspesifik tubuh disebut sistem komplemen. Protein ini dapat membunuh mikroorganisme secara langsung atau mencegah reproduksinya. Ada sekitar 20 jenis protein yang termasuk dalam sistem ini. Histamin dan interleukin termasuk protein ini. Protein komplemen beredar dalam darah dalam bentuk tidak aktif. Ketika beberapa molekul dari satu jenis protein komplemen aktif, itu memicu gelombang besar reaksi. Mereka mengaktifkan banyak molekul pelengkap lainnya. Setiap molekul yang teraktivasi akan mengaktifkan jenis protein komplemen lain dan seterusnya. Aktivasi protein komplemen terjadi ketika protein komplemen berikatan dengan protein yang disebut antigen. Antigen telah dimiliki oleh patogen. Aktivasi dapat terjadi ketika

protein komplemen mengikat langsung ke permukaan bakteri. Beberapa protein komplemen dapat bergabung membentuk pori-pori kompleks yang menginduksi lisis (kematian sel) pada patogen. Beberapa protein komplemen yang teraktivasi juga menyebabkan respon imun nonspesifik yang disebut inflamasi. Selain itu, ia "menarik" sel fagosit menuju sel atau jaringan yang rusak.

3. Pertahanan Tubuh Spesifik

Sistem pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini bekerja ketika patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan non-spesifik tubuh. Sistem pertahanan tubuh tertentu disebut juga dengan sistem imun atau sistem imun. Sistem imun terbentuk karena peran antigen dan antibodi. Pertahanan tubuh secara khusus dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit akibat adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh. Limfosit terdiri dari dua jenis, yaitu limfosit B (sel B) dan limfosit T (sel T).

a. Sel B

"B" sebenarnya berasal dari Bursa Fabricius, yang merupakan organ unik pada unggas tempat sel B matang dan tempat limfosit B pertama kali ditemukan. Namun, karena sel B dari semua vertebrata lain berkembang di sumsum tulang, "B" dapat berarti "tulang" atau "stok".

Sel B berperan dalam pembentukan imunitas humoral dengan membentuk antibodi. Sel B dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu sel B membelah yang berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B memori (memori) sel B plasma yang berfungsi membentuk antibodi. Sel B reminder (memori), berfungsi untuk mengingat antigen yang telah masuk ke dalam tubuh dan merangsang pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua.

b. Sel T

"T" berasal dari kata timus, yaitu kelenjar di rongga dada di atas jantung yang berperan dalam pematangan limfosit T setelah diproduksi di sumsum tulang. Sel T berperan dalam pembentukan imunitas seluler dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Sel T juga membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sel T sitotoksik yang berfungsi menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, dan sel kanker secara langsung. Sel T penolong, merangsang pembentukan sel T jenis lain dan sel B plasma serta mengaktifkan makrofag untuk melakukan fagositosis, sel T supresor, berfungsi mengurangi dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan menurunkan aktivitas sel T sitotoksik. Sel T penekan akan bekerja setelah infeksi berhasil diobati.

4. Antibodi

Antibodi adalah biomolekul yang terdiri dari protein dan terbentuk sebagai respons terhadap keberadaan benda asing yang tidak diinginkan dalam tubuh kita. Benda asing ini disebut antigen. Setiap kali ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh dibutuhkan waktu 10-14 hari untuk membentuk antibodi. Antibodi diproduksi oleh limfosit B atau sel B. Antibodi digunakan untuk menetralkan atau menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Setiap detik sekitar 2.000 molekul antibodi diproduksi oleh sel B. Salah satu contoh peristiwa yang melibatkan antibodi adalah ketika kulit kita terinfeksi luka, akan muncul nanah. Nanah adalah limfosit atau sel B yang mati setelah melawan antigen. Antibodi dapat ditemukan dalam aliran darah dan cairan nonseluler. Antibodi memiliki struktur molekul yang sangat cocok dengan antigen, seperti kunci berlubang. Setiap jenis antibodi spesifik untuk jenis antigen tertentu (Aripin., 2019).

5. Sel- sel dalam sistem imun

Sel-sel dalam sistem kekebalan terletak di jaringan yang berbeda dan memiliki peran yang berbeda dalam pertahanan tubuh (Abbas., 2016).

- a. Limfosit bersirkulasi melalui organ limfoid dan jaringan non-limfoid. Mereka mengenali antigen asing dan memulai respon imun adaptif.
- b. Sel-sel dalam jaringan mampu mendeteksi keberadaan mikroba dan bereaksi terhadapnya. Sel-sel ini termasuk makrofag, yang berfungsi untuk menelan dan menghancurkan benda asing, sel dendritik yang menangkap mikroba dan menyajikannya ke limfosit untuk memulai respon imun, oleh karena itu sel penyaji antigen, dan sel mast yang membantu mengarahkan leukosit lain untuk menghancurkan mikroba.
- c. Fagosit yang biasanya berada dalam sirkulasi, seperti neutrofil dan monosit, direkrut dengan cepat ke tempat infeksi melalui proses yang dikenal sebagai peradangan. Leukosit ini memakan dan menghancurkan mikroba, kemudian memulai proses perbaikan jaringan yang rusak. Karena fagosit ini, seperti beberapa limfosit T, bertanggung jawab atas efek respon imun terhadap mikroba, mereka kadang-kadang disebut sebagai sel efektor.

C. Uji Bersihan Karbon

Pembersihan karbon adalah pengukuran spektrofotometer dari laju eliminasi partikel karbon dari darah hewan. Ini adalah ukuran aktivitas fagositosis. Tes ini merupakan respon non spesifik untuk mengetahui aktivitas fagositosis sel makrofag terhadap karbon sebagai benda asing. Uji klirens karbon menggunakan karbon aktif sebagai benda asing/antigen yang diberikan secara intravena. Nilai densitas optik karbon dalam darah yang dilihat dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 637 nm menunjukkan penurunan seiring waktu karena eliminasi. Karbon akan berkurang jumlahnya dalam darah seiring berjalannya

waktu, karena adanya peristiwa fagositosis oleh sel-sel leukosit terutama neutrofil, monosit, makrofag dan eosinofil (Aldi, 2016).

D. Ekstraksi Bahan Alam

Ekstraksi adalah proses pemisahan zat aktif dari senyawa padat atau cair dengan menggunakan pelarut tertentu. Prinsip proses ekstraksi adalah pelarut dipindahkan melalui bulk ke permukaan, kemudian pelarut menembus ke dalamnya atau disebut proses difusi massa pelarut pada permukaan padatan inert ke dalam pori padatan. Selanjutnya zat terlarut (solute) yang ada dalam padatan larut ke dalam pelarut karena adanya perbedaan konsentrasi. Kemudian campuran zat terlarut dalam pelarut berdifusi keluar dari permukaan padatan inert. Selanjutnya zat terlarut (solute) keluar dari pori-pori padatan dan bercampur dengan pelarut yang berada di luar padatan (Prayudol, dkk. 2016).

Ekstraksi bertujuan untuk menarik dan memisahkan senyawa murni yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki kelarutan berbeda sesuai dengan komponen pelarut yang terdapat pada bahan alam dari hewan, tumbuhan atau biota laut dengan menggunakan pelarut organik (Direktorat Jenderal Badan POM. 2000).

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berbentuk kering, kental, cair, yang dibuat dari proses ekstraksi simplisia nabati, hewani atau mineral dengan cara yang sesuai, di luar pengaruh cahaya langsung (FI Ed III. 2010: 9).

Beberapa metode ekstraksi menggunakan pelarut dingin atau pelarut dingin panas adalah:

1. Cara Dingin

a. Maserasi

Maserasi merupakan proses perendaman simplisia dengan pelarut yang sesuai untuk menarik senyawa aktif dari tanaman (Nn, 2015). Metode ini nyaman

dan sangat cocok untuk bahan tanaman termolabil. Dan metode ini juga merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian.

b. Perkolasi

Perkolasi merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pelarut yang selalu baru untuk menghasilkan ekstrak yang sempurna, umumnya dilakukan pada suhu kamar (Direktorat Jenderal Badan POM. 2000).

Metode perkolasi merupakan metode ekstraksi dingin yang membutuhkan alat khusus yang disebut perkolator. Kelebihan dari metode perkolasi adalah dapat mengekstrak ekstrak yang lebih sempurna dibandingkan dengan metode maserasi namun memiliki kelemahan yaitu membutuhkan pelarut yang cukup banyak dan membutuhkan waktu yang lama (Verawati & Noviandi. 2017).

2. Cara Panas

a. Refluks

Refluks adalah suatu metode ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik didihnya, dengan waktu tertentu dan jumlah pelarut yang terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Proses pada residu umumnya dilakukan 3-5 kali pada residu pertama, sehingga dapat dianggap sebagai proses ekstraksi yang lengkap (Dirjen POM. 2000).

b. Soxhlet

Soxhlet merupakan metode ekstraksi dengan pemanasan dan penggunaan pelarut dapat lebih efisien karena terdapat proses sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses ini sangat cocok untuk senyawa yang tidak terpengaruh panas (Nururrahmah & Nurasia. 2016).

sebagai berkah oleh Allah Swt. Yang tentunya penuh dengan manfaat sehingga dapat digunakan salah satunya sebagai obat suatu penyakit.

Rasulullah saw bersabda, dalam hadits Abu Hurairah R.A:

مَا أَذَقْتُ دَاءً إِلَّا هُوَ شَفَاؤُهُ
أَنْزَلَ اللَّهُ

Artinya:

“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula (H.R. Al-Bukhari).

Hadits tersebut dapat diketahui bahwa penyembuhan bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi karena hal tersebut banyak dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad saw yang memerintahkan untuk berobat karena dari suatu penyakit yang diberikan oleh Allah Swt pasti ada obatnya maka dari itu kita harus berusaha mencari obat tersebut dan atas izin-Nya akan disembuhkan dari penyakit tersebut, kecuali satu yaitu penyakit tua, dan perlu diketahui bahwa obat dan dokter hanya saran kesembuhan, sedangkan yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah swt (Quraish. M Shihab 2002)

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia seperti tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Asy-syu'ara (26) ayat: 7:

أَوَلَمْ يَخْلُقْنَا وَإِنَّا لَكَارِهُونَ
رَلَىٰ أَنْزَلْنَا مِنْ سَمَوَاتِنَا
ط

Terjemahannya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Departemen.,Kementrian Agama 2014).

Ayat diatas dijelaskan pada tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat yang dapat dijadikan sebagai tanaman obat atau obat tradisional bagi manusia (Quraish. M Shihab 2002)

Dan ayat pun diatas juga menjelaskan bahwa banyak sekali tanaman yang diciptakan oleh Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai makanan maupun obat yang dapat digunakan oleh masyarakat banyak, sehingga dalam penggunaan tanaman sebagai obat dapat meminimalisir efek samping yang lebih sedikit

dibandingkan dengan obat yang diresepkan oleh dokter, sehingga tanaman yang ada di muka bumi ini perlu di jaga, dilestarikan dan dibudidayakan oleh masyarakat banyak supaya nantinya dapat digunakan sebagai pengobatan dan dapat juga sebagai obat tradisional.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen laboratorium yang merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas imunostimulan ekstrak daun seribu (*Achillea millefolium L.*).

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia organik FMIPA Univesitas Pancasakti Makassar yang dilaksanakan pada bulan Mei – Juli, 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif yaitu analisis data berupa angka atau bilangan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan adalah tanaman daun seribu (*Achillea millefolium L.*).

2. Sampel

Sampel yang digunakan adalah daun seribu (*Achillea millefolium L.*) sebanyak 850gram yang diperoleh dari Kota Batu, Desa Sidomulyo, Jawa Timur.

D. Instrumen Penelitian / Pengumpulan Data

1. Alat-Alat Yang Digunakan (Erjon.,2020)

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat destilasi, cawan penguap, kaca arloji, neraca analitik, pipet tetes, pipa kapiler, pipet mikro, rotary evaporator, spektrofotometri, tabung Eppendorf, vial, wadah maserasi.

2. Bahan-Bahan Yang Digunakan (Erjon.,2020)

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun seribu, aquadest, *Natrium Carboxy Methyl Cellulose* (NaCMC) (PT. Brataco), etanol 96% (PT. Brataco), karbon aktif, asam asetat 1%, NaCl fisiologis 0,9% (Widatra®),

E. Teknik Pengolahan Sampel

1. Penyiapan Sampel (Ekstrak *Achillea millefolium*)

a. Pengambilan Sampel

Sampel daun seribu (*Achillea millefolium* L.) yang digunakan, diperoleh dari Kota Batu, Desa Sidomulyo, Jawa Timur

b. Pengolahan Sampel

Sampel daun seribu (*Achillea millefolium* L.) yang diperoleh ditimbang, kemudian dilakukan sortasi basah dengan cara sampel dibersihkan dan dicuci, setelah itu dilakukan sortasi kering, lalu dilakukan perajangan pada sampel tersebut, kemudian dikeringkan didalam lemari pengering

c. Ekstraksi Sampel (Erjon.,2020)

Sampel daun seribu (*Achillea millefolium* L.) ditimbang sebanyak 850 gram, dimaserasi dengan etanol 96%, selanjutn

ya maserat diupakan dengan destilasi vakum dan dilanjutkan dengan *rotary evaporator* hingga didapatkan ekstrak kental.

2. Perlakuan Pada Hewan Coba (Havizur., 2016)

Hewan dibagi atas empat kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari lima ekor, yaitu:

- Kelompok 1 yaitu kelompok mencit kontrol negatif hanya diberi larutan NaCMC 0,5%.
- Kelompok 2 yaitu kelompok mencit yang diberikan ekstrak etanol daun seribu dosis 10 mg/ kgBB secara oral 1 kali sehari selama 6 hari.

- c. Kelompok 3 yaitu kelompok mencit yang diberikan ekstrak daun seribu dosis 50 mg/ KgBB secara oral 1 kali sehari selama 6 hari.
- d. Kelompok 4 diberikan ekstrak etanol daun seribu dosis 100 mg/ KgBB secara peroral 1 kali sehari selama 6 hari.
- e. Kelompok 5 diberikan kontrol positif stimuno forte 50 mg secara peroral 1 kali sehari selama 6 hari.

3. Penyiapan Suspensi Karbon (Havizur., 2016)

Sebanyak 1,6gram karbon aktif yang telah dikeringkan, suspensikan dengan NaCMC 0,5% dalam 25 mL larutan NaCl fisiologis 0,9%, sampai didapatkan konsentrasi larutan 64 mg/mL.

4. Perencanaan Dosis Sediaan Uji (Havizur., 2016)

Dosis yang digunakan mengacu pada penelitian sebelumnya (Sapri dkk, 2017) ekstrak daun seribu (*Achillea millefolium L*) yang digunakan pada mencit dengan dosis 10 mg, 50mg dan 100mg.

5. Pengujian Efektivitas Imunostimulan

Uji aktivitas imunostimulan dilakukan dengan metode bersihan karbon. Pada pengujian ini tiap tiap hewan percobaan diberikan sediaan uji satu kali sehari secara per oral selama 6 hari. Pada hari ke 7 mencit di injeksi dengan suspensi karbon 0,2 ml/ gBB, kemudiaan darah diambil pada menit ke 3,6,9,12 dan 15 dan di lisis dengan asam asetat 1% dan di ukur serapannya dengan spektrofotometer UV-Vis dengan Panjang gelombang 638nm.

- a. Perhitungan konstanta fagositas (Havizur., 2016)

Perhitungan konstanta fagositas dengan rumus sebagai berikut:

$$(K) = \frac{\ln OD1 - \ln OD2}{t2 - t1}$$

Keterangan:

K = Konstanta fagositosis

In O_{D1} = Absorban menit ke 3

In O_{D2} = Absorban menit ke 15

t_1 = Waktu awal

t_2 = waktu akhir

b. Perhitungan indeks fagositas

Perhitungan indeks fagositas dengan rumus:

$$(IF) = \frac{\text{Konstanta fagositas mencit}}{\text{konstanta fagositas rata-rata kontrol}}$$

Keterangan:

IF = Indeks fagositas

6. Analisis data (Erjon.,2020)

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan metode *Anova dua arah* dilanjutkan dengan *Uji Duncan*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Determinasi

Determinasi tumbuhan daun seribu dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNM, Hasil determinasi tanaman dapat dilihat pada lampiran 2.

2. Rendamen Ekstrak

Tabel 1. Rendamen Ekstrak Daun Seribu

Jenis Ekstrak	Jenis Pelarut	Berat Simplisia	Berat Ekstrak	% Rendamen
Daun seribu	Etanol 96%	850 gr	2,343 g	0,27

3. Hasil Uji Imunostimulan Dengan Metode Carbon Clearance

Tabel 2. Nilai Absorban Dari Darah Mencit Putih Jantan Yang Mengandung karbon Setelah Pemberian Ekstrak Etanol Daun seribu (*Achillea millefolium* L.)

Kelompok Perlakuan	Nilai Absorban darah mencit				
	3	6	9	12	15
Kelompok 1 (Na-CMC 0,5%)					
Perlakuan 1	0,586	0,547	0,579	0,479	0,423
Perlakuan 2	0,571	0,566	0,472	0,416	0,389
Perlakuan 3	0,604	0,526	0,472	0,438	0,383
Perlakuan 4	0,641	0,582	0,531	0,446	0,407
Perlakuan 5	0,516	0,469	0,448	0,382	0,336
Rata-rata	0,5836	0,538	0,5004	0,4322	0,3876
Kelompok 2 (10 mg/kgBB)					
Perlakuan 1	0,375	0,36	0,316	0,288	0,265
Perlakuan 2	0,512	0,485	0,455	0,385	0,316
Perlakuan 3	0,42	0,401	0,372	0,344	0,322
Perlakuan 4	0,487	0,475	0,437	0,432	0,446
Perlakuan 5	0,421	0,379	0,368	0,367	0,355
Rata-rata	0,443	0,42	0,389	0,363	0,34

Kelompok Perlakuan	Nilai Absorban darah mencit				
	3	6	9	12	15
Kelompok 3 (50 mg/kgBB)					
Perlakuan 1	0,375	0,36	0,316	0,288	0,265
Perlakuan 2	0,512	0,485	0,455	0,385	0,316
Perlakuan 3	0,42	0,401	0,372	0,344	0,322
Perlakuan 4	0,487	0,475	0,432	0,432	0,446
Perlakuan 5	0,421	0,379	0,367	0,367	0,355
Rata-rata	0,443	0,42	0,389	0,363	0,34
Kelompok 4 (100 mg/kgBB)					
Perlakuan 1	0,367	0,334	0,334	0,327	0,308
Perlakuan 2	0,503	0,454	0,454	0,444	0,415
Perlakuan 3	0,388	0,305	0,305	0,307	0,217
Perlakuan 4	0,423	0,373	0,373	0,317	0,304
Perlakuan 5	0,37	0,351	0,351	0,326	0,303
Rata-rata	0,41	0,367	0,367	0,344	0,309
Kelompok 5 (<i>Phyllanthus niruri</i>)					
Perlakuan 1	0,389	0,336	0,281	0,201	0,172
Perlakuan 2	0,578	0,502	0,446	0,373	0,327
Perlakuan 3	0,438	0,382	0,347	0,289	0,212
Perlakuan 4	0,517	0,439	0,341	0,306	0,242
Perlakuan 5	0,453	0,427	0,357	0,321	0,265
Rata-rata	0,475	0,417	0,354	0,298	0,243

Ket. 3 = waktu pengambilan darah mencit menit ke 3

6 = waktu pengambilan darah mencit menit ke 6

9 = waktu pengambilan darah mencit menit ke 9

12 = waktu pengambilan darah mencit menit ke 12

15 = waktu pengambilan darah mencit menit ke 15

M A K A S S A R

Table 2. Harga Konstanta Fagositasi Dari Darah Mencit Putih Sebelum Pemberian Ekstrak Etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L.) Selama 6 hari

Kelompok	Kostanta Fagositosis					Rata-rata
	Menit ke-3	Menit ke-6	Menit ke-9	Menit ke-12	Menit ke-15	
I	0,020	0,009	0,010	0,006	0,009	0,010
II	0,020	0,010	0,006	0,004	0,006	0,009
III	0,016	0,032	0,005	0,004	0,004	0,012
IV	0,034	0,005	0,006	0,002	0,005	0,010
V	0,016	0,009	0,006	0,007	0,003	0,008

Keterangan :

I : NaCMC 0,5%

II : Ekstrak Daun Seribu 10 mg/kgBB

III : Ekstrak Daun Seribu 50 mg/kgBB

IV : Ekstrak Daun Seribu 100 mg/kgBB

V : Meniran (*Phyllanthus niruri*)

Table 3. Harga indeks Fagositasi Dari Darah Mencit Putih Sebelum Pemberian Ekstrak Etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L.) Selama 6 hari

Kelompok	Indeks Fagositosis					Rata-rata
	Menit ke-3	Menit ke-6	Menit ke-9	Menit ke-12	Menit ke-15	
I	0,49	0,23	0,24	0,14	0,22	0,26
II	0,49	0,24	0,14	0,09	0,14	0,23
III	0,39	0,76	0,12	0,09	0,09	0,30
IV	0,84	0,13	0,14	0,05	0,13	0,25
V	0,39	0,21	0,14	0,18	0,09	0,20

Keterangan :

I : NaCMC 0,5%

II : Ekstrak Daun Seribu 10 mg/kgBB

III : Ekstrak Daun Seribu 50 mg/kgBB

IV : Ekstrak Daun Seribu 100 mg/kgBB

V : Meniran (*Phyllanthus niruri*)


Tabel 4. Harga Konstanta Fagositasi Dari Darah Mencit Putih Setelah Pemberian Ekstrak Etanol daun seribu (*Achillea millefolium L.*) Selama 6 hari.

Kelompok	Konstanta Fagositosis Mencit				
	Menit ke-3	Menit ke-6	Menit ke-9	Menit ke-12	Menit ke-15
I	0,078	0,044	0,033	0,03	0,027
II	0,117	0,062	0,045	0,036	0,031
III	0,107	0,063	0,050	0,043	0,04
IV	0,129	0,070	0,048	0,038	0,034
V	0,135	0,084	0,049	0,039	0,033

Keterangan :

- I : NaCMC 0,5%
- II : Ekstrak Daun Seribu 10 mg/kgBB
- III : Ekstrak Daun Seribu 50 mg/kgBB
- IV : Ekstrak Daun Seribu 100 mg/kgBB
- V : Meniran (*Phyllanthus niruri*)

Gambar 4. diagram konstanta fagositasi dari darah mencit putih jantan dan betina setelah pemberian ekstrak etanol daun seribu (*Achillea millefolium L.*) selama 6 hari.



Berdasarkan gambar diatas konstanta fagositasi dapat dihitung dari nilai absorban yang didapatkan. Konstanta fagositasi merupakan parameter yang menunjukkan kecepatan proses fagositasi yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai konstanta fagositasi maka semakin tinggi kecepatan bersihan karbon. Nilai konstanta pada mencit jantan yang didapatkan yaitu pada kontrol positif 0,068 dosis 100mg/kgBB 0,063 dosis 50mg/kgBB 0,060 dosis 10 mg/kgBB 0,058 dan

kontrol negatif 0,042. Hal ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan aktivitas fagositosis pada masing-masing kelompok variasi dosis.

Tabel 5. Waktu paruh eliminasi karbon dari darah mencit putih jantan setelah

Kelompok	Waktu Paruh Eliminasi Karbon					Rata-rata
	Menit ke-3	Menit ke-6	Menit ke-9	Menit ke-12	Menit ke-15	
I	8,884	15,750	21,000	31,100	25,666	20,48
II	5,923	11,117	15,400	19,250	22,354	14,8088
III	6,476	11,000	13,860	16,116	17,325	12,9554
IV	5,372	9,900	14,437	18,238	20,382	13,6658
V	5,133	8,250	14,142	17,769	21,000	13,2588

pemberian ekstrak etanol daun seribu (*Achillea Millefolium L.*) selama 6 hari

Keterangan :

- I : NaCMC 0,5%
- II : Ekstrak Daun Seribu 10 mg/kgBB
- III : Ekstrak Daun Seribu 50 mg/kgBB
- IV : Ekstrak Daun Seribu 100 mg/kgBB
- V : Meniran (*Phyllanthus niruri*)


Tabel 6. Nilai indeks fagositosis dari darah mencit jantan dan mencit betina setelah pemberian ekstrak etanol daun seribu (*Achillea-millefolium L.*) Selama 6 hari.

Kelompok	Indeks Fagositosis					Rata-rata
	Menit ke-3	Menit ke-6	Menit ke-9	Menit ke-12	Menit ke-15	
I	0,78	0,04	0,78	0,71	0,64	0,99
II	2,78	1,47	1,07	0,85	0,73	1,38
III	2,54	1,5	1,19	1,02	0,95	1,44
IV	3,07	1,66	1,14	0,9	0,8	1,51
V	3,21	2	1,16	0,92	0,78	1,61

Keterangan :

- I : NaCMC 0,5%
- II : Ekstrak Daun Seribu 10 mg/kgBB
- III : Ekstrak Daun Seribu 50 mg/kgBB
- IV : Ekstrak Daun Seribu 100 mg/kgBB
- V : Meniran (*Phyllanthus niruri*)

Gambar 5. Diagram indeks fagositosis dari darah mencit putih jantan dan betina setelah pemberian ekstrak etanol daun seribu (*Achillea millefolium L.*) selama 6 hari.



Tabel 3. Uji Anova Dua Arah Konstanta Fagositas.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: konstanta

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	.023 ^a	8	.003	35.565	.000
Intercept	.086	1	.086	1039.964	.000
perlakuan	.002	4	.000	5.784	.004
waktu	.022	4	.005	65.346	.000
Error	.001	16	8.255E-5		
Total	.111	25			
Corrected Total	.025	24			

a. R Squared = .947 (Adjusted R Squared = .920)

Berdasarkan uji ANOVA dua arah dapat dilihat bahwa pemberian ekstrak etanol daun seribu selama 6 hari dapat mempengaruhi konstanta fagositas secara signifikan ($p < 0,05$) artinya konstanta fagositas kelompok kontrol berbeda nyata dengan konstanta fagositas kelompok uji.

Tabel 4. Uji Anova Dua Arah Indeks Fagositas

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: indeks

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	13.193 ^a	8	1.649	31.847	.000
Intercept	48.136	1	48.136	929.595	.000
perlakuan	1.141	4	.285	5.507	.006
waktu	12.052	4	3.013	58.186	.000
Error	.829	16	.052		
Total	62.157	25			
Corrected Total	14.021	24			

a. R Squared = .941 (Adjusted R Squared = .911)

Berdasarkan uji ANOVA dua arah dapat dilihat bahwa pemberian ekstrak etanol daun seribu selama 6 hari dapat mempengaruhi indeks fagositas secara signifikan ($p < 0,05$) artinya indeks fagositas kelompok kontrol berbeda nyata dengan indeks fagositas kelompok uji.

Tabel 5. Uji Anova Dua Arah Waktu Eliminasi Karbon

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: waktu_paruh

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	995.987 ^a	8	124.498	31.564	.000
Intercept	5650.348	1	5650.348	1432.536	.000
perlakuan	195.268	4	48.817	12.377	.000
waktu	800.719	4	200.180	50.752	.000
Error	63.109	16	3.944		
Total	6709.444	25			
Corrected Total	1059.095	24			

a. R Squared = .940 (Adjusted R Squared = .911)

Berdasarkan uji ANOVA dua arah dapat dilihat bahwa pemberian ekstrak etanol daun seribu selama 6 hari dapat mempengaruhi waktu eliminasi karbon secara signifikan ($p < 0,05$) artinya waktu eliminasi karbon kelompok kontrol berbeda nyata dengan waktu eliminasi karbon kelompok uji.

Tabel 6. Uji Lanjutan Duncan Konstanta Fagositas

Duncan^{a,b}

perlakuan	N	Subset	
		1	2
kontrol -	5	.0424	
10 mg/kgBB	5		.0582
50 mg/kgBB	5		.0606
100 mg/kgBB	5		.0638
kontrol +	5		.0680
Sig.		1.000	.135

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 8.255E-5.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

b. Alpha = .05.

Berdasarkan uji lanjut Duncan Anova dua arah terhadap kelompok dosis kontrol dan perlakuan. Hasil menunjukkan bahwa kelompok dosis kontrol negatif tidak berbeda nyata dengan kelompok perlakuan dan kontrol lainnya. Selain itu, perlakuan dosis 10 mg tidak berbeda nyata dengan perlakuan 50 mg, perlakuan dosis 100 mg, dan kontrol. Ditunjukkan dengan p-value sebesar 0.135 pada subset 2 yang lebih besar dari pada alpha sebesar 0,05. Sehingga secara keseluruhan

disimpulkan bahwa perlakuan yang paling efektif adalah kontrol positif karena memiliki nilai rata rata terbesar.

Tabel 7. Uji Lanjutan Duncan Indeks Fagosit

Duncan^{a,b}

perlakuan	N	Subset	
		1	2
kontrol -	5	.9900	
10 mg/kgBB	5		1.3800
50 mg/kgBB	5		1.4400
100 mg/kgBB	5		1.5140
kontrol +	5		1.6140
Sig.		1.000	.153

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .052.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

b. Alpha = .05.

Berdasarkan uji lanjut Duncan Anova dua arah terhadap kelompok dosis kontrol dan perlakuan. Hasil menunjukkan bahwa kelompok dosis kontrol negatif tidak berbeda nyata dengan kelompok perlakuan dan kontrol lainnya. Selain itu, perlakuan dosis 10 mg tidak berbeda nyata dengan perlakuan 50 mg, perlakuan dosis 100 mg, dan kontrol. Ditunjukkan dengan p-value sebesar 0.135 pada subset 2 yang lebih besar dari pada alpha sebesar 0,05. Sehingga secara keseluruhan disimpulkan bahwa perlakuan yang paling efektif adalah kontrol positif karena memiliki nilai rata rata terbesar.

M A K A S S A R

Tabel 8. Uji Lanjutan Duncan Waktu Eliminasi Karbon

Duncan ^{a,b}			
perlakuan	N	Subset	
		1	2
50 mg/kgBB	5	12.9554	
kontrol -	5	13.2588	
100 mg/kgBB	5	13.6658	
10 mg/kgBB	5	14.8088	
kontrol +	5		20.4800
Sig.		.193	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3.944.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

b. Alpha = .05.

Berdasarkan uji lanjut Duncan Anova dua arah terhadap kelompok dosis kontrol dan perlakuan. Hasil menunjukkan bahwa kelompok dosis kontrol negatif tidak berbeda nyata dengan kelompok perlakuan dan kontrol lainnya. Selain itu, perlakuan dosis 10 mg tidak berbeda nyata dengan perlakuan 50 mg, perlakuan dosis 100 mg, dan kontrol. Ditunjukkan dengan p-value sebesar 0.135 pada subset 2 yang lebih besar dari pada alpha sebesar 0,05. Sehingga secara keseluruhan disimpulkan bahwa perlakuan yang paling efektif adalah kontrol positif karena memiliki nilai rata rata terbesar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

B. Pembahasan

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah daun seribu (*Achillea millefolium L.*). Tanaman ini tersebar luas di wilayah pulau Jawa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Kota Batu, Desa Sidomulyo Jawa Timur.

Hewan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah mencit putih jantan. Alasan pemilihan hewan percobaan mencit putih karena mencit mempunyai fisiologis yang mirip dengan manusia. Hewan percobaan ini diaklimatisasikan selama enam hari agar mencit beradaptasi terhadap lingkungan percobaan serta menghindari stress selama perlakuan berlangsung.

Metode *Carbon Clearance* merupakan metode untuk pengujian kemampuan fagosit dengan cara mengukur darah hewan percobaan pada menit ke 3,6,9,12 dan 15 menggunakan spektrofotometri. Karbon sebagai benda asing akan difagosit oleh sel-sel fagosit seperti neutrofil, monosit, makrofag dan eosinofil (Baratawidjaya, 2018). Karbon yang digunakan adalah karbon aktif karena ukuran partikel lebih kecil sehingga tidak terjadi penyumbatan pada pembuluh darah dan paru-paru. Pembuatan suspensi karbon dilakukan dengan penambahan NaCMC 0,5% dengan konsentrasi 6,4% dan pelarut yang digunakan adalah NaCl fisiologis yang bertujuan agar kondisi sediaan suspensi karbon sama dengan kondisi tubuh mencit.

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode *Carbon Clearance* dapat dilihat nilai absorbansi pada semua kelompok dosis yaitu dosis 10mg/kgBB, 50 mg/kgBB dan 100 mg/kgBB bahwa ekstrak etanol daun seribu memberikan penurunan terhadap jumlah atau kadar karbon yang mengindikasikan bahwa adanya respon imun dari tubuh terhadap masuknya zat asing. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Baratawidjaya (2018) yang menyatakan bahwa sistem

imun nonspesifik maupun spesifik berfungsi untuk melindungi antigen yang masuk kedalam tubuh oleh semua sel sistem imun berasal dari sumsum tulang seperti neutrofil, basofil, eosinofil, makrofag dan sel limfoid seperti limfosit B, T dan NK yang dapat meningkatkan aktivitas fagositosis secara cepat dan efisien dalam menyingkirkan antigen.

Konstanta fagositosis dapat dihitung dari nilai absorban yang didapatkan. Konstanta fagositosis merupakan parameter yang menunjukkan kecepatan proses fagositosis yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai konstanta fagositosis maka semakin tinggi kecepatan bersihan karbon. Rata-rata konstanta yang didapatkan yaitu pada kontrol positif 0,068 dosis 100mg/kgBB 0,063 dosis 50mg/kgBB 0,060 dosis 10 mg/kgBB 0,058 dan kontrol negatif 0,042. Hal ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan aktivitas fagositosis pada masing-masing kelompok variasi dosis. Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Erjon 2020) didapatkan hasil pengukuran rata-rata nilai konstanta fagositosis dapat diurut dari yang terkecil ke yang terbesar adalah dari kelompok kontrol negatif, diikuti oleh kelompok perlakuan dosis 125 mg/kgbb, 250 mg/kgbb, 500 mg/kgbb, dan kelompok kontrol positif yaitu berturut-turut 0,013/menit, 0,015/menit, 0,031/menit, 0,064/menit dan 0,076/menit. Peningkatan nilai konstanta fagositosis menunjukkan peningkatan kemampuan untuk melakukan fagositosis. Dengan demikian ekstrak daun seribu dengan dosis 10, 50, 100 mg/kgbb mempunyai kemampuan untuk melakukan fagositosis.

Dari nilai konstanta fagositosis dapat dihitung waktu paruh eliminasi karbon. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data rata-rata nilai waktu eliminasi karbon (Tabel 8). Dari table tersebut dapat diurut dari yang terbesar ke yang terkecil kelompok kontrol negative (NaCMC) Kelompok perlakuan dengan dosis 10, 50, 100 mg/kgBB dan kontrol positif (Stimuno forte) yaitu 20,480 menit,

14,808 menit, 12,955, 13,665 menit, 13,258 menit. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Erjon, 2020) Penurunan waktu eliminasi karbon didalam darah menunjukkan peningkatan kemampuan fagositosis. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data rata-rata nilai waktu eliminasi karbon dapat diurut dari yang terbesar ke yang terkecil kelompok kontrol negatif, kelompok perlakuan dengan dosis 125 mg/kgbb, 250 mg/kgbb, 500 mg/kgbb dan kontrol positif yaitu berturut-turut 60,105 menit, 46,856 menit, 22,680 menit, 10,968 menit dan 9,398menit. Penurunan waktu eliminasi karbon di dalam darah menunjukkan peningkatan kemampuan untuk melakukan fagositosis.

Nilai indeks fagositosis dapat dihitung setelah diketahui nilai konstanta fagositosis. Nilai konstanta fagositosis berbanding lurus dengan nilai indeks fagositosis dimana semakin besar nilai konstanta fagositosis dan nilai indeks fagositosis yang dihasilkan maka semakin cepat pula sel fagositik melakukan proses fagositosis. Rata-rata indeks fagositosis yang didapat yaitu kelompok kontrol, kelompok kontrol positif dosis 100 mg/kgBB, kelompok dosis 50 mg/kgBB kelompok dosis 10 mg/kgBB dan kontrol negatif secara berturut-turut adalah 0,99; 1,38; 1,44; 1,51; 1,61 Pada penelitian yang dilakukan oleh (Erjon, 2020) Nilai indeks fagositosis dari ekstrak 125, 250 dan 500 mg/kgbb serta kontrol positif adalah 1,25 ; 2,58 ; 5,00 ; dan 6,25. dari hasil tersebut menunjukkan bahwa zat uji bersifat immunostimulant karena indeks fagositosis besar dari satu ($IF > 1$). Artinya ada hubungan peningkatan dosis dengan nilai indeks fagositosis, yaitu semakin besar peningkatan dosis maka nilai indeks fagositosis semakin tinggi dan nilai indeks fagositosis yang didapatkan menunjukkan bahwa adanya aktivitas fagositosis sel-sel fagositik terhadap karbon yang dijadikan sebagai marker akibat dari pengaruh pemberian ekstrak daun seribu.

Berdasarkan uji ANOVA dua arah dapat dilihat bahwa pemberian ekstrak etanol daun seribu selama 6 hari dapat mempengaruhi indeks fagositasi secara signifikan ($p < 0,05$) artinya indeks fagositasi kelompok kontrol berbeda nyata dengan indeks fagositasi kelompok uji (Lampiran 6).

Berdasarkan uji lanjut duncan ANOVA dua arah terhadap kelompok dosis diperoleh hasil bahwa indeks fagositasi kelompok kontrol tidak berbeda nyata dengan indeks fagositasi kelompok dosis 10 mg/kgBB tetapi berbeda nyata dengan indeks fagositasi kelompok dosis 100 mg/kgBB dan kelompok dosis 50 mg/kgBB. Indeks fagositasi kelompok dosis 10 mg/kgBB tidak berbeda nyata dengan indeks fagositasi kelompok kontrol tetapi berbeda nyata dengan indeks fagositasi kelompok dosis 50 mg/kgBB dan kelompok dosis 100 mg/kgBB. Indeks fagositasi kelompok dosis 50 mg/kgBB berbeda nyata dengan indeks fagositasi kelompok kontrol, kelompok dosis 10 mg/kgBB dan kelompok dosis 50 mg/kgBB. Indeks fagositasi kelompok dosis 50 mg/kgBB berbeda nyata dengan dengan indeks fagositasi kelompok kontrol, kelompok 10 dosis mg/kgBB dan kelompok dosis 50 mg/kgBB. Berdasarkan uji duncan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak etanol daun seribu selama 6 hari pada dosis 50 mg/kgBB dan dosis 100 mg/kgBB mempengaruhi indeks fagositasi karena berbeda nyata dengan kelompok kontrol (Lampiran 6). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dosis dapat mempengaruhi indeks fagositasi dan dosis yang paling efektif adalah dosis 100 mg/kgBB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ekstrak etanol daun seribu dengan dosis 10 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB memiliki efek imunostimulan dengan indeks fagositas 1,51, 1,44, 1,38 yang artinya dapat digunakan sebagai imunostimulan karena nilai rata-rata indeks fagositas lebih besar dari 1 (IF>1).
2. Variasi dosis ekstrak etanol daun seribu yang diberikan terhadap mencit putih jantan dapat meningkatkan efek imunostimulan secara signifikan dan dosis yang paling efektif adalah dosis 100 mg/KgBB dengan nilai indeks fagositas 1,51.

B. Saran

Disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan uji aktivitas imunomodulasi terhadap fraksi-fraksi dari ekstrak daun seribu


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. Abdul K, dan Andrew H. (2016) *Litchman, Basic Immunology 2nd Edition*. Elsevier Health Sciences, Div.
- Anonim, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 6-7, 93-94, 265, 338-339, 691.
- Ali, S. I., Gopalakrishnan, B., & Venkatesalu, V. (2017). Pharmacognosy, Phytochemistry and Pharmacological Properties of *Achillea millefolium* L.: A Review. June.
- Akrom, Fatimah. 2016. *Ekstrak heksan biji jintan hitam (Nigella sativa L) meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag mencit berina galur SD yang diinduksi DMBA secara in vitro*. Bagian farmakologi dan farmasi klinik. Fakultas farmasi UAD. Pusat informasi dan kajian obat Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.
- Antasari, A. L. (2017). *Imunologi Dasar*. Budi Utama.
- Depkes RI. (2000). *Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I)*. Jilid II. Jakarta: Departemen Kesehatan RI dan Kesejahteraan Sosial RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Halaman 163-164.
- Depkes RI. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 2000.
- Departemen, A. R. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Eghdami, A., Fateh, V., Asli, D. E., & Houshmandfar, A. (2011). Antioxidant activity, total phenolic and flavonoids contents in methanolic and aqueous extract of *Achillea millefolium* L. *Advances in Environmental Biology*, 5(5), 929–932.
- Erjon. Rani Jovanka. Sari Meisyayati (2020). *Efek Immunostimulan Ekstrak Etanol Daun Seledri Terhadap Mencit Putih Jantan*. Jurnal penelitian farmasi indonesia. Sekolah tinggi ilmu farmasi Bhakti pertiwi Palembang.
- Havizur Rahman. (2016). *Aktivitas Immunomodulator dan Jumlah Sel leukosit dari ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus lemairei (Hook.)) pada mencit putih jantan*. Jurnal farmasi higea, Vol. 8, No. 1. Fakultas Farmasi Universitas Adalad Padang.
- Ijaz, F., Nawaz, H., Hanif, M. A., Michel, P., & Ferreira, P. (2020). *Yarrow*. 685–697.
- Ipin Arifin. (2019). Pendidikan nilai pada materi konsep sistem imun. *Jurnal Bio Educatio*, Volume 4, Nomor 01. Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Majalengka.

- Jumiarni, W. O., & Komalasari, O. (2017). Eksplorasi Jenis Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Suku Muna Di Permukiman Kota Wuna. *Traditional Medicine Journal*, 22(1), 45–56.
- Kementrian Agama RI. 2015. Al-qur'an dan terjemahnya. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Kemenkes RI. Farmakope Indonesia. Edisi Ke-3. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 2010.
- Kumolosasi, E., Ibrahim, S. N. A., Shukri, S. M. A., & Ahmad, W. (2018). Immunostimulant activity of standardised extracts of mangifera indica leaf and curcuma domestica rhizome in mice. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*,
- Pertiwi, R., Notriawan, D., & Wibowo, R. H. (2020). Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Meningkatkan Imunitas Tubuh sebagai Pencegahan COVID-19. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 18(2), 110–118. <https://doi.org/10.33369/dr.v18i2.12665>
- Rosnizar. R. kartini eriani. Iskandar muda ramli. Fajar muliani (2015). *Uji Efek Immunostimulan Buah Kurma (Phoenix Dactylifera) Pada Mencit Jantan (Mus Musculus)*. Jurusan MIPA Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Rahmi Muthia, Karunita Ika Astuti. (2018) *Efek Immunomodulator Infusa Umbi Bawang Dayak (Eleutherina palmifolia L. Merr) Dengan Metode Bersihan Karbon*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
- Sarah Chairunnisa, Ni Made Wartini, Lutfi Suhendra. Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana* L.) sebagai Sumber Saponin. *Teknologi Industri Pertanian*, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Badung. 2019.
- Siti Nuari. Syariful anam. Akhmad khumiadi (2017). *Isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid ekstrak etanol buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)*. Jurusan farmasi fakultas MIPA. Universitas tadulako. Palu.
- Skerfving S, Bergdahl I. 2015. *Handbook on The Toxicology of Metals*. 4th ed. London: Elsevier.
- Stewart, J. (2012). Innate and acquired immunity. *Medical Microbiology: Eighteenth Edition*, 109–135.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-misba: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Trumbeckaite, S., Benetis, R., Bumblauskiene, L., Burdulis, D., Janulis, V., Toleikis, A., Viškelis, P., & Jakštas, V. (2011). *Achillea millefolium* L. s.l. herb extract: Antioxidant activity and effect on the rat heart mitochondrial functions. *Food Chemistry*, 127(4), 1540–1548.

- Verawati, Dedi Nofiandi, Petmawati. Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Kadar Fenolat Total Dan Aktivitas Antioksidan Daun Salam (*Syzygium Polyanthum* (Wight) Walp. STIFI Perintis Padang. 2017.
- Wahyuni, D. kusuma, Ekasari, W., Witono, J. R., & Purnobasuki, H. (2016). Toga Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN**Lampiran 1. Skema Kerja**


a. Penyiapan bahan

**Gambar 6.** Skema kerja pengolahan ekstrak etanol daun seribu

b. Ekstraksi


**Gambar 7.** Skema kerja pengolahan ekstrak etanol daun seribu

c. Pengujian Imunostimulan




Gambar 8. Skema kerja uji imunostimulan dengan metode *carbon clearance*

d. Analisis Data



Gambar 9. skema kerja pengolahan data



Lampiran 2. perhitungan dosis

1. Perhitungan dosis

a. NaCMC 0,5 % $= \frac{0,5 \text{ g}}{100 \text{ ml}}$

$$= \frac{500 \text{ mg}}{100 \text{ ml}}$$

$$= 5 \text{ mg/ml}$$

b. Dosis 10 mg/ kgBB

$$10 \text{ mg/ kgBB} = \frac{10 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 20 \text{ g}$$

$$= 0,2 \text{ mg}$$

Untuk mencit 20 g volume pemberian PO 1 ml

$$\text{Untuk mencit } 20 \text{ g} = \frac{20}{20} \times 1 \text{ ml}$$

$$= 1 \text{ ml}$$

c. Dosis 50 mg/ kgBB

$$50 \text{ mg/ kgBB} = \frac{50 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 20 \text{ g}$$

$$= 1 \text{ mg}$$

Untuk mencit 20 g volume pemberian PO 1 ml

$$\text{Untuk mencit } 20 \text{ g} = \frac{20}{20} \times 1 \text{ ml}$$

$$= 1 \text{ ml}$$

d. Dosis 100 mg/ kgBB

$$100 \text{ mg/ kbBB} = \frac{100 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 20 \text{ g}$$

$$= 2 \text{ mg}$$

Untuk mencit 20 g volume pemberian PO 1 ml

$$\text{Untuk mencit } 20 \text{ g} = \frac{20}{20} \times 1 \text{ ml}$$

$$= 1 \text{ ml}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. Stimuno forte} &= 50 \times 0,0026 = 0,13 \text{ mg/KgBB} \\
 &= 0,13 \times \frac{1000}{20} \\
 &= 6,5 \text{ mg dilarutkan dalam 1 ml}
 \end{aligned}$$

Larutan stok 14 ml

$$\text{Untuk dosis 0,2 mg} = \frac{0,2 \text{ mg}}{1 \text{ ml}} \times 14 \text{ ml}$$


$$\text{Untuk 14x} = 2,8 \text{ mg/ml}$$

$$\text{Untuk dosis 1 mg} = \frac{1 \text{ mg}}{1 \text{ ml}} \times 14 \text{ ml}$$

$$= 14 \text{ mg/ml}$$

$$\text{Untuk dosis 2 mg} = \frac{2 \text{ mg}}{1 \text{ ml}} \times 14 \text{ ml}$$

$$= 28 \text{ mg/14 ml}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Karakteristik Ekstrak Etanol daun seribu
(*Achillea Millefolium* L).

Tabel 9. Tabel perhitungan rendamen ekstrak etanol daun seribu

Jenis ekstrak	Jenis Pelarut	Berat simplisia	Berat ekstrak	% rendamen
Daun seribu	Etanol 96%	850 gr	2,343 g	0,27

Perhitungan rendamen

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Berat ekstrak kental}}{\text{berat sampel segar}} \times 100\% \\ &= \frac{2,343 \text{ g}}{850 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,27 \% \end{aligned}$$

Lampiran 4. Perhitungan harga konstanta fagositas

1. NaCMC 0,5%

- a. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 3

$$\begin{aligned} K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\ &= \frac{\text{Log } 0,583(1) - \text{Log } 0,583(1-1)}{3(1-1) - 3(1)} \\ &= \frac{-0,234 - 0}{0 - 3} \\ &= 0,078 \end{aligned}$$

- b. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 6

$$\begin{aligned} K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\ &= \frac{\text{Log } 0,538(1) - \text{Log } 0,538(1-1)}{6(1-1) - 6(1)} \\ &= \frac{-0,269 - 0}{0 - 3} \\ &= 0,044 \end{aligned}$$

c. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 9

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,500(1) - \text{Log } 0,500(1-1)}{9(1-1) - 9(1)} \\
 &= \frac{-0,301 - 0}{0 - 9} \\
 &= 0,033
 \end{aligned}$$

d. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 12

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,432(1) - \text{Log } 0,432(1-1)}{12(1-1) - 12(1)} \\
 &= \frac{-0,364 - 0}{0 - 12} \\
 &= 0,030
 \end{aligned}$$

e. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 15

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,382(1) - \text{Log } 0,382(1-1)}{15(1-1) - 15(1)} \\
 &= \frac{-0,417 - 0}{0 - 15} \\
 &= 0,027
 \end{aligned}$$

2. 10 mg/kgBB

a. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 3

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,420(1) - \text{Log } 0,420(1-1)}{3(1-1) - 3(1)} \\
 &= \frac{-0,376 - 0}{0 - 3} \\
 &= 0,117
 \end{aligned}$$

b. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 6

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,389(1) - \text{Log } 0,389(1-1)}{6(1-1) - 6(1)}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{-0,410-0}{0-6}$$

$$= 0,068$$

c. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 9

$$K = \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)}$$

$$= \frac{\text{Log } 0,363(1) - \text{Log } 0,363(1-1)}{9(1-1) - 9(1)}$$

$$= \frac{-0,440-0}{0-9}$$

$$= 0,048$$

d. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 12

$$K = \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)}$$

$$= \frac{\text{Log } 0,340(1) - \text{Log } 0,340(1-1)}{12(1-1) - 12(1)}$$

$$= \frac{-0,468-0}{0-12}$$

$$= 0,039$$

e. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 15

$$K = \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)}$$

$$= \frac{\text{Log } 0,475(1) - \text{Log } 0,475(1-1)}{15(1-1) - 15(1)}$$

$$= \frac{-0,-0}{0-15}$$

$$= 0,117$$

3. 50 mg/kgBB

a. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 3

$$K = \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)}$$

$$= \frac{\text{Log } 0,420(1) - \text{Log } 0,420(1-1)}{3(1-1) - 3(1)}$$

$$= \frac{-0,376-0}{0-3}$$

$$= 0,117$$

b. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 6

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,379(1) - \text{Log } 0,379(1-1)}{6(1-1) - 6(1)} \\
 &= \frac{-0,379 - 0}{0 - 6} \\
 &= 0,063
 \end{aligned}$$

c. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 9

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,450(1) - \text{Log } 0,450(1-1)}{9(1-1) - 9(1)} \\
 &= \frac{-0,450 - 0}{0 - 9} \\
 &= 0,063
 \end{aligned}$$

d. Konstanta fagositas mencit pada menit ke 12

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,354(1) - \text{Log } 0,354(1-1)}{9(1-1) - 9(1)} \\
 &= \frac{-0,450 - 0}{0 - 9} \\
 &= 0,050
 \end{aligned}$$

e. Konstanta fagositas mencit di menit ke 15

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,243(1) - \text{Log } 0,243(1-1)}{15(1-1) - 15(1)} \\
 &= \frac{-0,614 - 0}{0 - 15} \\
 &= 0,040
 \end{aligned}$$

4. 100 mg/kgBB

a. Konstanta fagositas mencit menit ke 3

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,410(1) - \text{Log } 0,410(1-1)}{3(1-1) - 3(1)}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{-0,387-0}{0-6}$$

$$= 0,0129$$

b. Konstanta fagositas mencit menit ke 6

$$K = \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)}$$

$$= \frac{\text{Log } 0,380(1) - \text{Log } 0,380(1-1)}{6(1-1) - 6(1)}$$

$$= \frac{-0,420-0}{0-6}$$

$$= 0,070$$

c. Konstanta fagositas mencit menit ke 9

$$K = \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)}$$

$$= \frac{\text{Log } 0,363(1) - \text{Log } 0,363(1-1)}{9(1-1) - 9(1)}$$

$$= \frac{-0,440-0}{0-9}$$

$$= 0,048$$

d. Konstanta fagositas mencit menit ke 12

$$K = \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)}$$

$$= \frac{\text{Log } 0,344(1) - \text{Log } 0,344(1-1)}{12(1-1) - 12(1)}$$

$$= \frac{-0,463-0}{0-12}$$

$$= 0,038$$

e. Konstanta fagositas mencit menit ke 15

$$K = \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)}$$

$$= \frac{\text{Log } 0,309(1) - \text{Log } 0,309(1-1)}{6(1-1) - 6(1)}$$

$$= \frac{-0,510-0}{0-6}$$

$$= 0,034$$

5. Stimuno Forte

a. Konstanta fagositas mencit menit ke 3

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,392(1) - \text{Log } 0,392(1-1)}{3(1-1) - 3(1)} \\
 &= \frac{-0,406 - 0}{0 - 3} \\
 &= 0,135
 \end{aligned}$$

b. Konstanta fagositas mencit menit ke 6

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,375(1) - \text{Log } 0,375(1-1)}{6(1-1) - 6(1)} \\
 &= \frac{-0,425 - 0}{0 - 6} \\
 &= 0,166
 \end{aligned}$$

c. Konstanta fagositas mencit menit ke 9

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,357(1) - \text{Log } 0,357(1-1)}{9(1-1) - 9(1)} \\
 &= \frac{-0,447 - 0}{0 - 9} \\
 &= 0,049
 \end{aligned}$$

d. Konstanta fagositas mencit menit ke 12

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,338(1) - \text{Log } 0,338(1-1)}{12(1-1) - 12(1)} \\
 &= \frac{-0,471 - 0}{0 - 12} \\
 &= 0,039
 \end{aligned}$$

e. Konstanta fagositas mencit menit ke 15

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{Log } A(n) - \text{Log } A(n-1)}{t(n-1) - t(n)} \\
 &= \frac{\text{Log } 0,317(1) - \text{Log } 0,317(1-1)}{15(1-1) - 15(1)}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{-0,498-0}{0-15}$$

$$= 0,033$$

Lampiran 5. Hasil Pemeriksaan Uji Imunostimulan Dengan Menggunakan Metode Bersihan Karbon.


Tabel 10. Nilai Absorban Dari Darah Mencit Putih Jantan dan berina Yang Mengandung karbon Setelah Pemberian Ekstrak Etanol Daun seribu (*Achillea millefolium* L.).

Waktu	ABSORBAN					Rata-rata
	1	2	3	4	5	
3	0,586	0,571	0,604	0,641	0,516	0,5836
6	0,547	0,566	0,526	0,582	0,469	0,538
9	0,579	0,472	0,472	0,531	0,448	0,5004
12	0,479	0,416	0,438	0,446	0,382	0,4322
15	0,423	0,389	0,383	0,407	0,336	0,38275
3	0,375	0,512	0,42	0,487	0,421	0,443
6	0,36	0,485	0,401	0,475	0,379	0,42
9	0,316	0,455	0,372	0,437	0,368	0,3896
12	0,288	0,385	0,344	0,432	0,367	0,3632
15	0,265	0,316	0,322	0,446	0,355	0,3408
3	0,389	0,578	0,438	0,517	0,453	0,475
6	0,336	0,502	0,382	0,439	0,427	0,4172
9	0,281	0,446	0,347	0,341	0,357	0,3544
12	0,201	0,373	0,289	0,306	0,321	0,298
15	0,172	0,327	0,212	0,242	0,265	0,2436
3	0,367	0,503	0,388	0,423	0,37	0,4102
6	0,347	0,476	0,322	0,384	0,372	0,3802
9	0,334	0,454	0,305	0,373	0,351	0,3634
12	0,327	0,444	0,307	0,317	0,326	0,3442
15	0,308	0,415	0,217	0,304	0,303	0,3094
3	0,377	0,513	0,331	0,443	0,3	0,3928
6	0,347	0,446	0,322	0,431	0,332	0,3756
9	0,334	0,434	0,315	0,393	0,311	0,3574
12	0,327	0,424	0,307	0,317	0,316	0,3382
15	0,318	0,415	0,227	0,314	0,313	0,3174

Tabel 11. Harga Konstanta Fagositas Dari Darah Mencit Putih Setelah Pemberian Ekstrak Etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L) Selama 6 hari.

Konstanta Fagositas Mencit					
Waktu	NaCMC	10 mg/kgBB	50 mg/kgBB	100 mg/kgBB	Stimuno forte
3	0,078	0,117	0,107	0,129	0,135
6	0,044	0,062	0,063	0,07	0,084
9	0,033	0,045	0,05	0,048	0,049
12	0,03	0,036	0,043	0,038	0,039
15	0,027	0,031	0,04	0,034	0,033
Rata rata	0,0424	0,0582	0,0606	0,0638	0,068


Gambar 10. Harga Konstanta Fagositas Dari Darah Mencit Putih Setelah Pemberian Ekstrak Etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L) Selama 6 hari.



Tabel 12. Indeks Fagositasi Dari Darah Mencit Putih Setelah Pemberian Ekstrak Etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L) Selama 6 hari.

INDEKS FAGOSITAS					
Waktu	Kontrol -	10 mg/kgBB	50 mg/kgBB	100 mg/kgBB	Kontrol +
3	0,78	2,78	2,54	3,07	3,21
6	0,04	1,47	1,50	1,66	2,00
9	0,78	1,07	1,19	1,14	1,16
12	0,71	0,85	1,02	0,90	0,92
15	0,64	0,73	0,95	0,80	0,78
Rata-rata	0,99	1,38	1,44	1,51	1,61

Gambar 11. Indeks Fagositasi Dari Darah Mencit Putih Setelah Pemberian Ekstrak Etanol daun seribu (*Achillea millefolium* L) Selama 6 hari.



Lampiran 6. Dokumentasi penelitian



Gambar 12. Gambar daun seribu (*Achillea millefolium* L.)



Gambar 13. Gambar suspensi ekstrak etanol daun seribu




Gambar 14. Suspensi karbon aktif



Gambar 15. penimbangan karbon aktif



Gambar 16. Darah mencit setelah dilisis dengan asam asetat 1%



Gambar 17. Pengukuran nilai absorbansi dengan menggunakan spektrofotometri UV-VIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No. A.064/KEPK/FKIK/VIII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Tiwi Bahar
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Name of the Institution

Dengan judul:
 Title

**"UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN SERIBU (*Achillea millefolium* L.)
 SEBAGAI IMUNOSTIMULAN PADA MENCIT JANTAN DAN MENCIT BETINA (*Mus musculus*) DENGAN MENGGUNAKAN METODE CARBON CLEARANCE"**

"Test the effectiveness of the ethanolic extract of achillea millefolium L as immunostimulant in male and female mus musculus using the carbon clearance method"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021

This declaration of ethics applies during the period August 10, 2021 until August 10, 2022

August 10, 2021

Supervisor and Chairperson,

 Dr. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes.



JURUSAN FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)
UNIVERSITAS PANCASAKTI

Jl. Andi Mangerangi No. 73 Tlp. (0411) 871306 / 837247 Makassar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 416 /05.01-A1/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Laboratorium Penelitian Jurusan Farmasi F-MIPA Universitas Pancasakti Makassar menerangkan bahwa benar mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Tiwi Bahar
Stambuk	: 70100117070
Jurusan	: Farmasi
Judul	: Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Seribu Sebagai Imunostimulan Pada Mencit Jantan Putih Dengan Metode <i>Carbon Clearance</i>

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Laboratorium Farmasi F-MIPA UNPACTI dan telah menyelesaikan segala administrasi yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas laboratorium.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi Farmasi

Supranto Prayitno, S.Si, M.Si, Apt

Makassar, 21 Oktober 2021

Laboran

Sudirman, S.Si

JURUSAN FARMASI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)

UNIVERSITAS PANCASAKTI

n. Andi Mangerangi No. 73 Tip. (0411) 871306 / 837247 Makassar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 416 /05.01-AID</2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Laboratorium Penelitian Jurusan Farmasi FMIPA Universitas Pancasakti Makassar menerangkan bahwa benar mahasiswa tersebut di bawah

Nama : Tiwi Bahar
 Stambuk : 70100117070
 Jurusan : Farmasi
 Judul : Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Seribu Sebagai Imunostimulan Pada Mencit Jantan Putih Dengan Metode Carbon Clereance

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Laboratorium Farmasi F-MIPA UNPACTI dan telah menyelesaikan segala adminstrasi yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas laboratorium.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Makass , 21 Oktober

Makassar, 21 Oktober 2021

Mengetahui
Ketua Prodi Farmasi

Laboran

Suprpto Prayitno, S

Sudirman, S.Si

.Si. M.Si.A t



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI FARMASI

Kampus I : Jl. Soebsa Alauddin No.63, Makassar
 Kampus II : Jl.H.M.Yasin Lingko No.36, Romangpetong-Gowa, Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281450

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 18 Juni 2021

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Universitas Pancasakti Makassar
 Di
 Tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Tiwi Bahar
 NIM : 70100117070
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jln. Kejayaan Selatan Blok K Nomor 185

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Seribu (*Achillea millefolium* L.) Sebagai Immunostimulan Pada Mencit Jantan dan Mencit Betina dengan Menggunakan Carbon Clearance",

Dengan Dosen Pembimbing : 1. apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.
 2. apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Balai Besar Laboratorium Kesehatan, terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 s/d 31 Juli 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Pembimbing 1

apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.
 NIP. 19860917 201503 2 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tiwi Bahar, atau biasa disapa tiwi merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Baharuddin SE dan Hj. Rakhmah, S.Pd. yang lahir di Bulukuma 08 Mei 2000. Saat ini penulis berdomisili di Desa Tambangan Kec. Kajang Kab.Bulukumba

Pada tahun 2004 penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 103 Kalimporo pada tahun 2006. Setelah menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2012 penulis kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 20 Bulukumba Setelah lulus pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 5 Bulukumba hingga tahun 2017. Dan pada tahun itu juga, penulis melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama berkuliah, penulis pernah aktif dalam lembaga kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2018/2019.