

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA YANG
MENGALAMI *IMMOBILITY* DENGAN MASALAH NYERI
MENGUNAKAN INTERVENSI KOMPRES SERAI
HANGAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
PACELLEKANG**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

ULFA WILDANA HASAN

70900120032

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA YANG
MENGALAMI *IMMOBILITY* DENGAN MASALAH NYERI
MENGUNAKAN INTERVENSI KOMPRES SERAI
HANGAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
PACELLEKANG**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ULFA WILDANA HASAN

70900120032

**PRODI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Wildana Hasan
NIM : 70900120032
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 03 Agustus 1998
Jurusan : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Nusa Indah D 10 No. 21
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia yang Mengalami *Immobility* dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kompres Serai Hangat di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa KTI ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Samata, 28 Januari 2022

Penyusun,



ULFA WILDANA HASAN
NIM : 70900120032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Ulfa Wildana Hasan, NIM: 70900120032, mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia yang Mengalami *Immobility* dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kompres Serai Hangat di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 28 Januari 2022



Ns. Aidah Fitriani, S.Kep., M.Kep
Pembimbing I



Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ners yang berjudul "*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia yang Mengalami Immobility dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kompres Serai Hangat di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang*" yang disusun oleh **ULFA WILDANA HASAN** NIM: 70900120032, Mahasiswa Jurusan Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 28 Januari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi Profesi Ners.

Gowa, 28 Januari 2022 M
26 Jumadil Akhir 1443

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Aisyah Arsyad. M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur kehadiran Allah swt. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia yang Mengalami *Immobility* dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kompres Serai Hangat di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang”. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan tugas akhir ners ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program Ners Jurusan Profesi Ners di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021/2022.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ners ini, peneliti menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai peneliti mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda tercinta Alm. Hasan dan Ibunda tercinta Ernawati Ar Hasan atas kasih sayang, doa dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga peneliti dapat berada ditahap ini untuk meraih gelar sarjana keperawatan. Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep dan Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku Ketua sekaligus pembimbing II dan Sekretaris Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ns. Aidah Fitriani, S.Kep., M.Kep selaku pembimbing I yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penelitian tugas akhir ners, motivasi yang membangun sehingga peneliti bisa ketahap ini serta informasi terbaru.
5. Ns. Eny Sutria, S.Kep, M.Kes selaku Penguji I dan Dr. Hj. Aisyah Arsyad, M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada kakek dan nenek yang tersayang, Alm. Drs. H. Abd Rahman Ibrahim dan H. Nurhayati Djafar yang tidak henti-hentinya menyalurkan doa beserta nasihat yang begitu berarti bagi peneliti.
7. Kepada kakak dan adik tercinta, Hardiyanti Ade Ahsana, Ahsan Taqwin dan Muflih Gunawan Ahsana yang senantiasa memberi semangat dan menghibur peneliti.
8. Kepada keluarga besar tercinta yang selalu menemani, memberikan motivasi, semangat, dukungan baik moril maupun materil selama hidup peneliti.
9. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners khususnya angkatan 18 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Akhir kata, peneliti memohon maaf atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan

banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih.

Samata, 28 Januari 2022

Peneliti,



Ulfa Wildana Hasan

NIM: 70900120032



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Konsep <i>Immobility</i> dengan Masalah Nyeri	6
B. Konsep Keperawatan	25
C. Pendekatan Keperawatan	41
D. <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> (EBPN).....	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Rancangan Studi Kasus.....	48
B. Subjek Studi Kasus	48
C. Fokus Studi Kasus.....	48
D. Instrumen Studi Kasus	49
E. Prosedur Pengambilan Studi Kasus	49
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Studi Kasus	49
G. Analisis dan Penyajian Data.....	50
H. Etika Studi Kasus	50
BAB IV LAPORAN KASUS.....	52
A. Pengkajian	52
B. Diagnosa Keperawatan.....	80
C. Intervensi Keperawatan.....	81
D. Implementasi Keperawatan.....	86
E. Evaluasi Keperawatan	93
BAB V ANALISA KASUS	104
A. Analisa Kasus.....	104
B. Analisis Intervensi.....	110

C. Keterbatasan.....	114
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	121



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan nyeri akut dan nyeri kronis	10
Tabel 2.2 SOP Pemberian Kompres Serai Hangat Menurut Adelina.....	44
Tabel 2.3 SOP Pemberian Kompres Serai Hangat Menurut Prasetyo	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skala VDS	15
Gambar 2.2 Skala NRS	16
Gambar 2.3 Skala Analog Visual.....	17
Gambar 2.4 Skala Wajah Wong Baker	17



ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA YANG MENGALAMI *IMMOBILITY* DENGAN MASALAH NYERI MENGGUNAKAN INTERVENSI KOMPRES SERAI HANGAT

Ulfa Wildana Hasan^{1*}, Aidah Fitriani², Patima³, Eny Sutria⁴

¹Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alaluddin Makassar, Indonesia

^{2,3,4}Dosen Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alaluddin Makassar, Indonesia

* E-mail: ulfawildana@gmail.com

ABSTRAK

Lansia sebagai populasi rentan cenderung mengalami beberapa penyakit akibat dari menurunnya fungsi di dalam tubuh. Salah satu penyakitnya adalah stroke dengan efek jangka panjang membuat penderita menjadi kesulitan untuk bergerak secara bebas (gangguan mobilitas). Salah satu intervensi mandiri perawat yang bersifat nonfarmakologi untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik khususnya dengan masalah nyeri yaitu pemanfaatan tanaman serai. **Tujuan:** untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai hangat. **Metode Penelitian:** Metode yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian di lakukan pada 28 September - 26 November 2021. Jumlah sampel penelitian sebanyak 1 orang yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri. **Hasil:** setelah dilakukan implementasi keperawatan selama 6x kunjungan, terjadi penurunan skala nyeri yang signifikan yang mulai terlihat di hari pertama implementasi dari skala nyeri 6 menjadi skala nyeri 5, hingga hari terakhir implementasi menjadi skala nyeri 1. **Implikasi penelitian:** pemanfaatan tumbuhan serai dapat digunakan sebagai salah satu intervensi nonfarmakologi yang bisa dilakukan secara mandiri oleh perawat maupun masyarakat untuk diaplikasikan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri. **Rekomendasi:** Penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian untuk penelitian selanjutnya seperti penelitian yang bersifat menindaklanjuti dari intervensi yang telah diberikan.

Kata kunci: *Immobility; Kompres Serai Hangat; Lansia; Nyeri.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan muskuloskeletal merupakan ancaman global yang terjadi pada saat penuaan dan menjadi penyebab kecacatan kedua yang paling umum. Studi dari *Global Burden of Disease* (GBD, 2015) melaporkan bahwa penyakit muskuloskeletal menyumbang 19,2% dari semua *years lived with disability* (YLDs). Kecacatan akibat gangguan muskuloskeletal meningkat selama satu dekade terakhir sebesar 45% (Storheim & Zwart, 2014).

Data dari *World Population Ageing* (2019) menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 703 juta orang yang berusia ≥ 65 tahun. Jumlah ini akan diprediksikan meningkat menjadi 1,5 milyar pada tahun 2050. Populasi lansia di dunia yang berusia 65 tahun atau lebih, meningkat dari 6% pada tahun 1990 menjadi 9% pada tahun 2019. Data dari Kementerian Kesehatan RI, (2016), jumlah lansia diperkirakan pada tahun 2020 akan meningkat dari 28.800.000 (11,34%) menjadi 80.000.000. Data dari Badan Pusat Statistik (2020), di Sulawesi selatan jumlah lansia pada tahun 2020 yaitu 9.830.000 jiwa yang diantaranya sejumlah 110.000 jiwa mengalami *immobility* dan di Kabupaten Gowa jumlah lansia mencapai 891.000 jiwa

Lansia sebagai populasi rentan cenderung akan mengalami beberapa penyakit akibat dari menurunnya fungsi di dalam tubuh. Salah satunya adalah penyakit stroke dengan efek jangka panjang membuat penderita menjadi kesulitan untuk bergerak secara bebas (imobilisasi). Berdasarkan pengkajian di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang khususnya di Dusun Pa'bundukang RW 2 di dapatkan hasil, 1 dari 76 orang pernah mengalami stroke dengan komplikasi jangka panjang yaitu mengalami keterbatasan pergerakan (imobilisasi) akibat rasa nyeri pada sendinya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Elmasry et al., (2015), "*Assessment of Musculoskeletal complications for Immobilized Stroke Patients at Assiut University Hospital,*" didapatkan hasil bahwa dari 30 pasien stroke yang

mengalami imobilisasi seluruhnya mengalami nyeri sendi, keterbatasan ROM dan kekakuan sendi 100%, 24 pasien mengalami atrofi otot (80%), 22 pasien mengalami spasme otot (73,3%), 29 pasien mengalami nyeri bahu hemiplegia (96,7%), 27 pasien mengalami kontraktur fleksi lutut (93,3%), kelemahan otot dan *footdrop* (40%), *toe curling* (30%) and *finger curling* (26.7%). .

Lansia yang mengalami imobilisasi termasuk di dalam salah satu 14 sindrom geriatrik yaitu *Immobility*. *Immobility* (imobilisasi) adalah keadaan dimana seseorang mengalami keterbatasan pergerakan. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mengalami imobilisasi pada penderita stroke yaitu gangguan muskuloskeletal seperti atrofi pada otot, kekakuan serta nyeri sendi. Hal ini dikarenakan hilangnya suplai saraf ke otot yang akan menyebabkan otot tidak lagi menerima sinyal kontraksi yang dibutuhkan untuk mempertahankan ukuran otot yang normal sehingga terjadi atropi. Atropi otot akan menyebabkan penurunan aktivitas pada sendi sehingga sendi akan mengalami kehilangan cairan sinovial dan akan menyebabkan kekakuan sendi. Kekakuan sendi dan kecenderungan otot untuk memendek yang akan menyebabkan penurunan rentang gerak sendi (Mukhtarom, 2016). Perubahan ini akan mempengaruhi struktur fisik maupun mentalnya (psikologi). Sehingga dengan adanya perubahan tersebut mobilisasi penderita stroke akan mengalami kemunduran aktivitas seperti kelemahan dan nyeri menggerakkan kaki, kelemahan menggerakkan tangan, ketidakmampuan bicara dan ketidakmampuan fungsi motorik lainnya (Rahayu, 2015).

Salah satu intervensi mandiri perawat yang bersifat nonfarmakologi untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik khususnya dengan masalah nyeri yaitu pemanfaatan tanaman serai. Dalam buku Herbal Indonesia disebutkan bahwa tanaman serai mengandung minyak atsiri yang bersifat kimiawi dan efek farmakologi yaitu rasa pedas dan bersifat hangat sehingga berkhasiat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, anti radang (anti inflamasi) serta melancarkan sirkulasi darah (Heming, 2007 dalam Yanti, 2018).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Barus (2020) dengan judul “Pengaruh Kompres Serai Hangat Terhadap Pengurangan Rasa Nyeri Pada Penderita Rematik Di Panti Jompo Babussalam Nurul Hikmah Kecamatan Batang Kuis”, menunjukkan hasil ada pengaruh kompres serai hangat terhadap pengurangan rasa nyeri pada penderita rematik di Panti Jompo Babussalam Nurul Hikmah Kecamatan Batang Kuis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana (2021) yang berjudul, “Intervensi Kompres Hangat Serai Pada Lansia Yang Mengalami Sindrom Geriatri *Immobility* Dengan Masalah Nyeri” menunjukkan hasil bahwa setelah dilakukan selama 3 hari berturut-turut ada penurunan skala nyeri yang dirasakan ketika sudah diberikan kompres hangat serai.

Berdasarkan fenomena dan data di atas, dapat dilihat bahwa dampak dari imobilisasi yang sebagian besar dialami oleh lansia dapat merugikan banyak pihak baik dari lansia itu sendiri bahkan Negara. Berdampak positif, apabila penduduk lansia berada dalam keadaan sehat, aktif dan produktif. Disisi lain, besarnya jumlah penduduk lansia menjadi beban jika lansia memiliki masalah penurunan kesehatan yang berakibat pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapatan/penghasilan, peningkatan disabilitas, tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah terhadap penduduk lansia (Milana et al., 2020) Dengan adanya salah satu bentuk intervensi mandiri nonfarmakologi yang bisa dilakukan oleh perawat, maka penulis tertarik untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai hangat di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai hangat di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang?”

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai hangat di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian pada lansia yang *immobility* dengan masalah nyeri.
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri.
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri.
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri.
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatrik *immobility*.
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai hangat.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan terapi nonfarmakologi berupa kompres serai hangat.

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai salah satu intervensi nonfarmakologi yang bisa dilakukan secara mandiri oleh perawat maupun

masyarakat untuk diaplikasikan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Immobility* dengan Masalah Nyeri Pada Lansia

1. Konsep *Immobility*

a. Definisi

Gangguan mobilitas fisik (*immobility*) didefinisikan oleh *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA) sebagai suatu keadaan ketika individu mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan gerak fisik (Nasrullah, 2021)

Immobility atau imobilisasi merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menggerakkan badannya secara bebas karena adanya yang mengganggu pergerakan (aktivitas), misalnya mengalami trauma tulang belakang, trauma kapitis berat disertai fraktur pada ekstremitas dan sebagainya. Perubahan dalam tingkat mobilitas fisik dapat mengakibatkan pembatasan gerak dalam bentuk tirah baring, pembatasan gerak fisik selama penggunaan alat bantu eksternal (mis. Gips atau traksi rangka), pembebasan gerak volunter atau kehilangan fungsi motorik (Nasrullah, 2021).

b. Etiologi

Berbagai faktor fisik, psikologis serta lingkungan dapat menyebabkan imobilisasi pada lansia. Penyebab utama dari imobilisasi yaitu adanya rasa nyeri, lemah dan kekakuan pada otot. Faktor-faktor yang memperberat imobilisasi adalah penyakit yang mempengaruhi kemampuan mobilisasi serta pemakaian obat-obatan tertentu (Widiantari, 2019).

c. Manifestasi Klinis

Menurut Nasrullah (2021), terjadinya imobilisasi dalam tubuh dapat berpengaruh pada sistem tubuh, seperti :

1) Perubahan Metabolik

Sistem endokrin berpengaruh dalam mempertahankan homeostasis ion. Dimana sistem endokrin berperan dalam pengaturan lingkungan eksternal dengan mempertahankan keseimbangan natrium, kalium, air dan keseimbangan asam-basa.

2) Perubahan sistem respirasi

Klien yang mengalami imobilisasi, berisiko tinggi terjadinya komplikasi paru-paru. Komplikasi paru-paru yang paling umum adalah atelektasis dan pneumonia hipostatik.

3) Perubahan sistem kardiovaskular

Ada tiga perubahan utama yang dapat terjadi pada klien imobilisasi terkait sistem kardiovaskuler, yaitu :

- a) Hipotensi ortostatik adalah penurunan tekanan darah sistolik 25 mmHg dan diastolik 10 mmHg ketika klien bangun dari posisi berbaring atau duduk ke posisi berdiri.
- b) Peningkatan beban kerja jantung.
- c) Pembentukan thrombus

4) Perubahan sistem muskuloskeletal

Pengaruh imobilisasi pada sistem muskuloskeletal meliputi gangguan imobilisasi permanen. Keterbatasan mobilisasi mempengaruhi otot klien karena kehilangan daya tahan, penurunan massa otot, atrofi dan penurunan stabilitas.

5) Perubahan sistem integumen

Perubahan sistem integumen yang terjadi berupa penurunan elastisitas kulit. Menurunnya sirkulasi darah akibat imobilisasi dan terjadinya iskemia serta anoksia jaringan mengakibatkan jaringan akan tertekan, darah membelok dan konstiksi kuat pada pembuluh darah. Hal ini menyebabkan tekanan persisten pada kulit dan struktur di bawah kulit, sehingga respirasi selular terganggu dan sel menjadi mati.

6) Perubahan eliminasi urine

Pada keadaan imobilisasi, klien dalam posisi rekumben atau datar, ginjal atau ureter membentuk garis datar seperti membentuk urine harus masuk ke dalam kandung kemih melawan gravitasi. Akibat kontraksi peristaltik ureter yang tidak cukup kuat melawan gaya gravitasi, pelvis ginjal menjadi terisi sebelum urine masuk ke dalam ureter. Kondisi ini disebut stasis urine dan meningkatkan risiko infeksi saluran perkemihan dan batu ginjal.

d. Patofisiologi

Mobilisasi sangat dipengaruhi oleh sistem neuromuskular, meliputi sistem otot, skeletal, sendi, ligamen, tendon, kartilago dan saraf. Otot skeletal mengatur gerakan tulang karena adanya kemampuan otot berkontraksi dan relaksasi yang bekerja sebagai sistem pengungkit. Ada dua tipe kontraksi otot: isotonik dan isometrik. Pada kontraksi isotonik, peningkatan tekanan otot menyebabkan otot memendek. Kontraksi isometrik menyebabkan peningkatan tekanan otot atau kerja otot tetapi tidak ada pemendekan atau gerakan aktif dari otot, misalnya, menganjurkan klien untuk latihan kuadrisep. Gerakan volunter adalah kombinasi dari kontraksi isotonik dan isometrik. Meskipun kontraksi isometrik tidak menyebabkan otot memendek, namun pemakaian energi meningkat. Perawat harus mengenal adanya peningkatan energi (peningkatan kecepatan pernafasan, fluktuasi irama jantung, tekanan darah) karena latihan isometrik. Hal ini menjadi kontra indikasi pada klien yang sakit (infark miokard atau penyakit obstruksi paru kronik). Postur dan gerakan otot merefleksikan kepribadian dan suasana hati seseorang dan tergantung pada ukuran skeletal dan perkembangan otot skeletal. Koordinasi dan pengaturan dari kelompok otot tergantung dari tonus otot dan aktivitas dari otot yang berlawanan, sinergis, dan otot yang melawan gravitasi. Tonus otot adalah suatu keadaan tegangan otot yang seimbang.

Ketegangan dapat dipertahankan dengan adanya kontraksi dan relaksasi yang bergantian melalui kerja otot. Tonus otot mempertahankan posisi fungsional tubuh dan mendukung kembalinya aliran darah ke jantung. Imobilisasi menyebabkan aktivitas dan tonus otot menjadi berkurang. Skeletal adalah rangka pendukung tubuh dan terdiri dari empat tipe tulang: panjang, pendek, pipih, dan ireguler (tidak beraturan). Sistem skeletal berfungsi dalam pergerakan, melindungi organ vital, membantu mengatur keseimbangan kalsium, berperan dalam pembentukan sel darah merah. Kartilago permanen tidak mengalami osifikasi kecuali pada usia lanjut dan penyakit, seperti osteoarthritis (Nasrullah, 2021).

e. Penatalaksanaan Sindrom Geriatri *Immobility*

Adapun penatalaksanaan sindrom geriatri *Immobility* yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya nonfarmakologis dan nonfarmakologis, sebagai berikut :

1) Tatalaksana nonfarmakologis

Tatalaksana nonfarmakologis yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan beberapa terapi fisik serta latihan jasmani seperti latihan ROM (*Range Of Motion*) secara rutin dan teratur untuk meningkatkan kekuatan otot, mencegah terjadinya kekakuan sendi serta memperlancar sirkulasi darah khususnya pada lansia yang mengalami tirah baring lama. Pada klien lansia yang sedang mengalami tirah baring lama dapat dilakukan mobilisasi dini sesuai dengan kemampuan klien secara rutin dan bertahap seperti melatih berpegangan pada pinggiran tempat tidur, melatih turun dari tempat tidur, melatih berpindah tempat dari tempat tidur ke kursi roda, melatih berjalan secara perlahan. Selain itu untuk mencegah terjadinya decubitus pada pasien yang mengalami tirah baring lama dapat dilakukan perubahan posisi secara teratur, melakukan latihan di tempat tidur, memberikan kasur khusus decubitus serta menggunakan bantal

berongga. Tindakan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengontrol tanda-tanda vital klien dan penggunaan obat-obatan yang dikonsumsi klien, serta memantau asupan cairan dan nutrisi klien.

2) Tatalaksana Farmakologis

Tatalaksana yang dapat dilakukan pada pasien dengan gangguan mobilisasi adalah dengan pemberian antikogulan seperti LDG (*Low dose heparin*) dan LMWH (*low molecular weight heparin*) yaitu profilaksis yang efektif untuk klien gangguan mobilisasi (Stanley & Mickey, 2006)

2. Konsep Nyeri

a. Definisi

Nyeri diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh ke otak dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis dan emosional (Hidayat & Uliyah, 2016).

b. Klasifikasi Nyeri

Nyeri secara umum dibagi menjadi dua, yakni nyeri akut dan kronis. Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat menghilang, tidak melebihi enam bulan dan ditandai adanya peningkatan tegangan otot. Nyeri kronis merupakan nyeri yang timbul secara perlahan-lahan biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari enam bulan.

Tabel 2.1
Perbedaan nyeri akut dan nyeri kronis (Hidayat & Uliyah, 2016)

Karakteristik	Nyeri Akut	Nyeri Kronis
Pengalaman	Suatu Kejadian	Satu situasi, status eksistensi
Sumber	Sebab eksternal atau penyakit dari dalam	Tidak diketahui atau pengobatan yang terlalu lama
Serangan	Mendadak	Bisa mendadak, berkembang dan

		terselubung
Waktu	Sampai 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai bertahun-tahun
Pernyataan nyeri	Daerah nyeri tidak diketahui dengan pasti	Daerah nyeri sulit dibedakan intensitasnya, sehingga sulit dievaluasi (perubahan perasaan)
Gejala-gejala klinis	Pola respons yang khas dengan gejala yang lebih jelas	Pola respons yang bervariasi dengan sedikit gejala (adaptasi)
Pola	Terbatas	Berlangsung terus, dapat dievaluasi
Perjalanan	Biasanya berkurang setelah beberapa saat	Penderitaan meningkat setelah beberapa saat

c. Etiologi

- 1) Adanya trauma pada jaringan tubuh, misalnya karena bedah akibat terjadinya kerusakan jaringan.
- 2) Gangguan pada jaringan tubuh, misalnya karena edema akibat terjadinya penekanan pada reseptor nyeri.
- 3) Tumor, dapat juga menekan pada reseptor nyeri.
- 4) Iskemia pada jaringan, misalnya terjadi blokade pada arteria koronaria yang menstimulasi reseptor nyeri akibat tertumpuknya asam laktat.
- 5) Spasme otot, dapat menstimulasi mekanik (Hidayat & Uliyah, 2016).

d. Fisiologi Nyeri

Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat empat proses tersendiri: transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi.

- 1) Transduksi adalah suatu proses dimana akhiran saraf aferen menerjemahkan stimulus (misalnya tusukan jarum) ke dalam impuls nosiseptif. Ada tiga tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses

ini, yaitu serabut A-beta, A-delta, dan C. Serabut yang berespon secara maksimal terhadap stimulasi non noksius dikelompokkan sebagai serabut penghantar nyeri, atau nosiseptor. Serabut ini adalah A-delta dan C. *Silent nociceptor*, juga terlibat dalam proses transduksi, merupakan serabut saraf aferen yang tidak berespon terhadap stimulasi eksternal tanpa adanya mediator inflamasi.

- 2) Transmisi adalah suatu proses dimana impuls disalurkan menuju kornu dorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Neuron aferen primer merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya berakhir di kornu dorsalis medula spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal.
- 3) Modulasi adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri (pain related neural signals). Proses ini terutama terjadi di kornu dorsalis medula spinalis, dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Serangkaian reseptor opioid seperti *mu*, *kappa*, dan *delta* dapat ditemukan di kornu dorsalis. Sistem nosiseptif juga mempunyai jalur descending berasal dari korteks frontalis, hipotalamus, dan area otak lainnya ke otak tengah (midbrain) dan medula oblongata, selanjutnya menuju medula spinalis. Hasil dari proses inhibisi desendens ini adalah penguatan, atau bahkan penghambatan (blok) sinyal nosiseptif di kornu dorsalis.
- 4) Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga Nociseptor.

Secara anatomis, reseptor nyeri (nociceptor) ada yang bermielin dan ada juga yang tidak bermielin dari syaraf aferen (Tansumri, 2007).

e. Teori Nyeri

Terdapat beberapa teori tentang terjadinya rangsangan nyeri, diantaranya sebagai berikut.

1) Teori Spesivitas (*Specivity Theory*)

Teori ini digambarkan oleh Descartes pada abad ke 17. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat organ tubuh yang secara khusus mentransmisi rasa nyeri. Syaraf ini diyakini dapat menerima rangsangan nyeri dan mentransmisikannya melalui ujung dorsal dan substansia gelatinosa ke talamus, yang akhirnya akan dihantarkan pada daerah yang lebih tinggi sehingga timbul respon nyeri. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana faktor-faktor multi dimensional yang dapat mempengaruhi nyeri.

2) Teori Pola (*Pattern Theory*)

Teori ini menerangkan bahwa ada dua serabut nyeri yaitu serabut yang mampu menghantarkan rangsang dengan cepat dan serabut yang mampu menghantarkan dengan lambat. Dua serabut syaraf tersebut bersinaps pada medula spinalis dan meneruskan informasi ke otak mengenai sejumlah intensitas dan tipe input sensori nyeri yang menafsirkan karakter dan kualitas input sensasi nyeri.

3) Teori Gerbang Kendali Nyeri (*Gate Control Theory*)

Tahun 1959, Milzack dan Wall menjelaskan teori gerbang kendali nyeri, yang menyatakan terdapat semacam pintu gerbang yang dapat memfasilitasi transmisi sinyal nyeri. *Gate Control Theory* merupakan model modulasi nyeri yang populer. Teori ini menyatakan eksistensi dari kemampuan endogen untuk mengurangi dan meningkatkan derajat perasaan nyeri melalui modulasi impuls yang masuk pada kornu dorsalis melalui “gate” (gerbang).

Berdasarkan sinyal dari sistem asendens dan desendens maka input akan ditimbang. Integrasi semua input dari neuron sensorik, yaitu pada level medulla spinalis yang sesuai, dan ketentuan apakah gate akan menutup atau membuka, meningkatkan atau mengurangi intensitas nyeri asendens. *Gate Control Theory* ini mengakomodir variabel psikologis dalam persepsi nyeri, termasuk motivasi untuk bebas dari nyeri dan peranan pikiran, emosi dan reaksi stress dalam meningkatkan atau menurunkan sensasi nyeri. Melalui model ini, dapat di mengerti bahwa nyeri dapat dikontrol oleh manipulasi farmakologis maupun intervensi psikologis (Hartwig & Wilson, 2006).

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri

Pengalaman nyeri pada seseorang dapat di pengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah:


- 1) Arti Nyeri. Nyeri bagi seseorang memiliki banyak perbedaan dan hampir sebagian arti nyeri merupakan arti yang negatif, seperti membahayakan, merusak, dan lain-lain. Keadaan ini di pengaruhi lingkungan dan pengalaman.
- 2) Persepsi Nyeri. Persepsi nyeri merupakan penilaian yang sangat subjektif dari seseorang yang merasakan nyeri. Hal ini dikarenakan perawat tidak mampu merasakan nyeri yang dialami oleh pasien.
- 3) Toleransi Nyeri. Toleransi ini erat hubungannya dengan intensitas nyeri yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang menahan nyeri. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan toleransi nyeri antara lain alcohol, obat-obatan, hipnotis, gerakan atau garakan, pengalihan perhatiannya, kepercayaan yang kuat dan sebagainya. Sedangkan faktor yang menurunkan toleransi antara lain kelelahan, rasa marah, bosan, cemas, nyeri yang kunjung tidak hilang, sakit, dan lain-lain.

- 4) Reaksi Terhadap Nyeri. Reaksi terhadap nyeri merupakan bentuk respon seseorang terhadap nyeri, seperti ketakutan, gelisah, cemas, menangis dan menjerit. Semua ini merupakan bentuk respon nyeri yang dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti arti nyeri, tingkat persepsi nyeri, pengalaman masa lalu, nilai budaya, harapan sosial, kesehatan fisik dan mental, rasa takut, cemas, usia, dan lain-lain (Hidayat & Uliyah, 2016).

g. Instrumen Pengkajian Nyeri

1) Skala Pendeskripsi Verbal (*Verbal Descriptor Scaler/VDS*)

VDS merupakan sebuah garis yang terdiri atas tiga sampai lima kata pendeskripsian yang tersusun dengan harak yang sana di sepanjang garis. Pendeskripsi ini diranking dari tidak terasa nyeri sampai sangat nyeri. Pengukur menunjukkan kepada pasien skala tersebut dan memintanya untuk memilih intensitas nyeri yang dirasakannya. Alat VDS ini memungkinkan pasien memilih sebuah kategori untuk mendeskripsikan nyeri.




Gambar 2.1 Skala VDS

2) Skala Penilaian Numerik (*Numerical Rating Scale/NRS*)

NRS lebih digunakan sebagai pengganti atau pendamping VDS. Dalam hal ini, klien memberikan penilaian nyeri dengan menggunakan skala 0 sampai 10. Skala paling efektif digunakan dalam mengkaji intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi terapeutik. Penggunaan skala NRS biasanya dipakai patokan 10 cm ntuk menilai nyeri pasien. Nyeri yang dinilai pasien akan dikategorikan menjadi:

- a) Skala 0. Tidak ada nyeri;


- b) Skala 1-3. Nyeri ringan, secara objektif klien dapat berkomunikasi dengan baik;
- c) Skala 4-6. Secara objektif klien mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan baik;
- d) Skala 7-9. Secara objektif klien terkadang tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respons terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi napas panjang dan dsitraksi.
- e) Skala 10. Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi, memukul.



Gambar 2.2 Skala NRS

3) Skala Analog Visual (*Visual Analog Scale/VAS*)

Menurut McGuire dalam Potter & Perry (2006), VAS merupakan pengukur tingkat nyeri yang lebih sensitif karena pasien dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian angka yang menurut mereka paling tepat dapat menjelaskan tingkat nyeri yang dirasakan pada satu waktu. VAS tidak melabelkan suatu definisi, melainkan hanya terdiri atas sebuah garis lurus yang dibagi secara merata menjadi 10 segmen dengan angka 0 sampai 10 dan memilikialat pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya (Hidayat & Uliyah, 2016).



Gambar 2.3 Skala Analog Visual

4) Skala Wajah Wong-Baker

Skala wajah pada umumnya digunakan pada anak-anak yang berusia kurang dari tujuh tahun. Pada pengukuran skala wajah, pasien diminta untuk memilih gambar wajah yang sesuai dengan nyeri yang dirasakan. Pilihan ini kemudian diberikan skor angka. Skala wajah Wong-Baker menggunakan enam kartun wajah yang menggambarkan wajah senyum, sedih, sampai menangis. Pada setiap gambar kartun wajah diberikan skor 0 sampai dengan 5 (Wong, 1998 dalam Ramadhani, 2014).



Gambar 2.4 Skala Wajah Wong Baker

h. Pentatalaksanaan nyeri

Strategi penatalaksanaan nyeri adalah suatu tindakan untuk mengurangi nyeri yaitu :

- 1) Strategi penatalaksanaan nyeri secara farmakologi dengan menggunakan analgesik yaitu non narkotik dan obat anti inflamasi non steroid (NSAID), analgesic narkotik atau opiate, dan obat tambahan.
- 2) Strategi penatalaksanaan nyeri secara non farmakologi, seperti :
 - a) Terapi panas atau kompres hangat
 - b) Stimulasi saraf elektrik transkutan atau TENS (*Transcutaneous electrical nerve stimulation*)
 - c) Distraksi

- d) Relaksasi otot
- e) Imajinasi terbimbing atau *guided imagery*
- f) *Hypnosis*
- g) Akupuntur
- h) *Massase* (Devi, 2017)

3. Konsep Lansia

a. Definisi

Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Secara global, populasi lansia diprediksi terus mengalami peningkatan. Populasi lansia di Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi dari pada populasi lansia di dunia setelah tahun 2100 (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2016). Menurut WHO dan UU No 12 tahun 1998 lanjut usia secara umum merupakan individu yang telah memasuki usia 60 tahun (Surtati, 2014).

Batasan usia lansia menurut WHO, meliputi;

- 1) Usia pertengahan (*middle age*), yaitu suatu kelompok dari usia 45 sampai dengan usia 59 tahun.
- 2) Lanjut usia (*elderly*), yaitu usia 60 tahun sampai 74 tahun.
- 3) Lanjut usia tua (*old*), kisaran 60-75 tahun dan 90 tahun.
- 4) Usia sangat tua (*very old*), > 90 tahun (Rusli, 2012).

Dalam Islam menjelaskan bahwa sejak manusia lahir hingga hari tuanya ada tiga fase utama dalam perkembangan hidup mereka yang membentuk kurva normal, fase bayi, dewasa, dan usia lanjut. Masa bayi adalah masa lemah, masa dewasa adalah masa perkasa, dan masa tua kembali pada masa lemah. Istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk

menunjuk pada kondisi kembali ke titik lemah seperti diawal kehidupan sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum/30:54.

خَبْرَكَ رَبِّي ُ
 ۞ ضَعْفَ لَأ ُ ۞ ضَع ُ
 ۞ ف لَئِنَّ لَأ ُ
 ۞ ج ع و ُ ۞ ج ع و ُ
 بعد ُ ۞ ض ع ُ لَأ ُ
 و ۞ ل ُ ۞ لَئِنَّ لَأ ُ
 ۞ ق ُ و ۞ ل ُ ۞ لَئِنَّ لَأ ُ
 ۞ ۞

Terjemahan: ٤٥

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Quraish Syihab menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia dari keadaan lemah lalu tahap demi tahap meningkat kepada tahap bayi, kanak-kanak dan remaja, memiliki kekuatan sehingga menjadi dewasa dan sempurna umur, masa ini berlangsung cukup lama, kemudian melewati usia kematangan dan menyandang kekuatan, lalu menderita kelemahan kembali dengan hilangnya sejumlah potensi. Inilah tahapan manusia secara umum, apapun yang dialami manusia menurut kadar kekuatan dan kelemahan masing-masing, semua akan kembali kepada Allah swt. Setelah puncak kedewasaan yang mempresentasikan kekuatan fisik, akal, dan kejiwaan berlalu, maka muncul fase lain ketika manusia kembali yang sangat lemah akibat dari usia lanjut (pikun) sehingga dalam banyak hal mirip apa yang terjadi pada masa bayi. Kerusakan yang terjadi pada sel-sel tubuh akibat proses penuaan secara biologis menyebabkan fungsi organ-organ tumbuh menurun dan lemah. Tanda-tanda perubahan yang terjadi secara fisik pada usia lanjut sangat mudah dikenali, mulai dari perubahan fisik seperti rambut beruban, keriput di kulit, gaya bicara, prilaku khas dalam mengindra, sampai pada aktivitas atau gerakan dan kecepatan (*speed*) dalam memberi respon terhadap suatu hal. Mobilitas

menjadi sangat lamban dan banyak pekerjaan yang tak lagi mampu dilakukan (Shihab, 2002).

Kondisi-kondisi seperti disebutkan diatas oleh para lansia yang menyadari dan menerima kodrat (Sunnatullah) boleh jadi tidak menjadi masalah besar yang sangat mengganggu bagi kelangsungan dan kualitas kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi, sulit menerima kenyataan maka boleh jadi memunculkan persoalan baru menyangkut kejiwaan, kesehatan fisik, hubungan interpersonal, dan akselerasi pada kepikunan (Mutaqin, 2017).

Masalah penyakit pada usia lanjut usia, selain karena proses fisiologis yang menuju ke arah degeneratif, juga dapat ditemukan antara lain infeksi, jantung, dan pembuluh darah, penyakit metabolik (osteoposit), kurang gizi, penggunaan obat dan alkohol, penyakit saraf (stroke), serta gangguan jiwa. Utamanya depresi dan kecemasan. Juga terdapat potensi mengidap osteomalasia, dementea, penyakit alzhaimer, katarak dan otosklerosis (Mutaqin, 2017).

b. Karakteristik Lansia

Karakteristik lansia sebagai populasi rentan mencakup rentan secara fisiologis, psikologis sosial dan ekonomi dalam mengatasi masalah kesehatannya

1) Rentan secara fisiologis

Rentan secara fisiologis pada lansia semakin meningkat sesuai dengan usia kronologis (Miller, 2012). Lansia sebagai individu yang sangat tua atau lebih dari 65 tahun dikategorikan termasuk dalam populasi rentan (Maurer & Smith, 2005). Lansia mengalami proses menua atau *aging*. Proses menua yaitu terjadinya suatu perubahan fisiologis sebagai konsekuensi fungsional berupa proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mempertahankan struktur dan fungsi normalnya

sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita, sehingga masalah kesehatan pada lansia banyak yang bersifat kronik yang berhubungan dengan genetik dan gaya hidup (Miller, 2012).

2) Rentan secara psikologis

Lansia mengalami kemunduran fungsi psikologi berupa perubahan fungsi psikososial. Lansia dihadapkan pada berbagai peristiwa dan kejadian kehidupan yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang berpotensi menimbulkan stres. Stres yang berkepanjangan dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan lansia (Miller, 2012).

3) Rentan secara sosial

Menurut teori Cumming dan Henry (1961 dalam Miller, 2012) menyatakan bahwa semakin tua seseorang akan semakin tidak terlibat secara emosional dengan dunia sekitar, sehingga lansia akan melepaskan diri dari berbagai ikatan. Lansia juga menjadi rentan secara sosial karena dapat mengalami stres sosial dan hal ini akan mempengaruhi kesehatan lansia. Stres sosial dapat disebabkan oleh adanya diskriminasi ras, budaya atau yang lainnya (Stanhope & Lancaster, 2010).

4) Rentan secara ekonomi

Proses penuaan atau kondisi kesehatan yang kurang baik pada lansia dapat menimbulkan lansia tidak dapat beraktivitas secara optimal, sehingga bagi lansia yang semula bekerja, harus berhenti bekerja atau lansia yang harus memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut membuat lansia mengalami penurunan penghasilan (Miller, 2012). Keterbatasan dana berdampak pada lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk untuk kesehatannya karena

mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan yang optimal (Allender et al., 2010).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerentanan

Menurut Stanhope & Lancaster (2010), lansia masuk dalam populasi rentan dan sering memiliki faktor risiko yang lebih banyak daripada populasi yang lain. Kerentanan bersifat multidimensi yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkontribusi.

1) Faktor keterbatasan sumber daya

Kurangnya sumber daya sosial, pendidikan dan ekonomi yang memadai merupakan faktor seseorang menjadi rentan. Kemiskinan adalah penyebab utama terhadap kerentanan. Kemiskinan menyebabkan kerentanan karena membuat seseorang sulit berfungsi atau mengakses sumber daya untuk hidup atau untuk perawatan kesehatan. Kondisi lansia tidak memiliki penghasilan kecil berkontribusi besar pada kondisi kerentanan pada masalah kesehatan karena pensiun sering diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, kegiatan status dan harga diri (Miller, 2012).

2) Faktor perubahan status kesehatan

Perubahan status fisiologi mempengaruhi individu untuk menjadi rentan akibat dari proses penyakit seperti individu dengan satu atau lebih penyakit kronis. Menurut Allender et al., (2010), populasi yang dipertimbangkan masuk dalam populasi rentan adalah populasi yang mengalami kecacatan, penyakit kronik (misalnya hipertensi, kanker, artritis, diabetes mellitus, dll), penyakit mental dan penyalahgunaan obat terlarang.

Menurut teori konsekuensi fungsional, kesehatan lansia adalah kemampuan lansia untuk berfungsi secara optimal meskipun dalam situasi perubahan yang berkaitan dengan penuaan dan faktor risiko

(Miller, 2012). Proses penuaan yang terjadi pada lansia tersebut dapat mempengaruhi status kesehatannya karena memiliki keterbatasan akibat kemunduran berbagai sistem dalam tubuh. Lansia yang disertai dengan penyakit kronik dan kurangnya dukungan mengakibatkan lansia dengan depresi masuk dalam kelompok rentan.

3) Faktor risiko kesehatan

Populasi rentan tidak hanya mengalami beberapa risiko kumulatif, tetapi populasi tersebut juga sangat sensitif terhadap efek dari risiko tersebut. Risiko yang berasal dari bahaya lingkungan (paparan zat adaktif) atau bahaya sosial (kejahatan, kekerasan dan pengabaian/ penyalahgunaan), dalam perilaku pribadi (diet dan kebiasaan olahraga) atau susunan biologis atau genetik (bawaan atau status kesehatan). Populasi rentan sering memiliki komorbiditas atau penyakit multiple dengan masing-masing mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Lansia juga merupakan individu yang mempunyai kondisi fisik, psikologi dan sosial yang lemah, sehingga masalah kesehatan mudah berkembang dan mengalami kondisi kesehatan yang buruk (Pender et al., 2002).

d. Tugas Perkembangan Lansia

Kesiapan lanjut usia untuk beradaptasi terhadap tugas perkembangan dipengaruhi oleh proses tumbuh dan berkembang pada tahap yang sebelumnya. Adapun tugas perkembangan pada lanjut usia adalah sebagai berikut;

- 1) Mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi menurun.
- 2) Mempersiapkan diri untuk pensiun.
- 3) Membentuk hubungan yang baik kepada masyarakat, terutama dengan seusianya (Padila, 2013).

Mulyonno & Ahmad (2015) membagi tugas perkembangan lanjut usia sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan dimasa tua.
- 2) Menyesuaikan diri saat masa pensiun dengan berkurangnya pemasukan atau penghasilan.
- 3) Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup kelak.
- 4) Membentuk silaturahmi yang baik dengan teman sebaya atau orang-orang yang seusia.
- 5) Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan.
- 6) Menyesuaikan dengan peran sosial secara pantas.

e. Program Kesehatan Pada Lansia

Tujuan umum kebijakan pelayanan kesehatan lansia adalah meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai lansia sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. Sementara tujuan khususnya adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan santun lansia; meningkatkan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya; meningkatnya ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lansia; meningkatnya peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat dan lansia dalam upaya peningkatan kesehatan lansia; meningkatnya peran serta lansia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2016).

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka dikembangkan program kesehatan lansia sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan bagi lansia di Fasyankes Primer dengan cara Puskesmas menyelenggaraan pelayanan santun.
- 2) Peningkatan dan pemantapan upaya rujukan bagi lansia melalui pengembangan poliklinik geriatrik terpadu di Rumah Sakit.

- 3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan lanjut usia melalui Posyandu lansia.
- 4) Pengembangan pemberdayaan lansia dalam kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- 5) Peningkatan mutu perawatan kesehatan bagi lanjut usia dalam keluarga melalui *home care* dan *long term care*.
- 6) Perlambatan proses degeneratif melalui penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan lansia (fisik dan kognitif).
- 7) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor, profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan penelitian (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2016).

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

Pengkajian keperawatan pada lansia merupakan pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh seperti pada aspek biologis, psikologis, sosial dan spiritual lansia. Data pengkajian dapat diperoleh dari data subyektif maupun data obyektif (Damanik & Hasan, 2019).

Adapun hal-hal yang perlu dikaji pada pengkajian asuhan keperawatan adalah:

a. Data Demografi :

Hal yang perlu dikaji dalam pengkajian data demografi adalah identitas klien seperti nama, usia, jenis kelamin, agama dan alamat klien. Kemudian data jumlah keturunan klien seperti jumlah anak dan cucu klien. Selanjutnya data terkait nama suami/istri dan umurnya.

b. Riwayat Keluhan

1) Keluhan utama

Keluhan utama yang sering ditemukan pada klien dengan sindrom imobility adalah klien mengeluh nyeri pada persendian, adanya keterbatasan gerak yang menyebabkan keterbatasan mobilitas.

2) Riwayat penyakit sekarang

Keluhan nyeri dan kekakuan pada tangan atau kaki, perasaan tidak nyaman dalam beberapa waktu sebelum mengetahui dan merasakan adanya perubahan pada sendi.

3) Pemeriksaan Fisik

Data yang dapat dikaji melalui wawancara yaitu :

- a) Pandangan lanjut usia terkait kesehatannya
- b) Kegiatan yang masih mampu dilakukan lanjut usia
- c) Kebiasaan lansia dalam melakukan perawatan dirinya
- d) Kemampuan kekuatan fisik lansia
- e) Kebiasaan lanjut usia terkait makan, minum. Istirahat/tidur, buang air besar/buang air kecil
- f) Kebiasaan lanjut usia dalam melakukan gerak badan/olahraga/senam
- g) Perubahan-perubahan pada fungsi tubuh yang paling bermakna pada lanjut usia
- h) Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatannya serta kebiasaannya dalam penggunaan obat-obatan
- i) Pengkajian masalah seksual lansia

Data yang dapat dikaji melalui pemeriksaan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi yaitu sebagai berikut

a) Sistem persarafan :

Kesimetrisan raut wajah, tingkat kesadaran : apakah lansia mengalami pikun atau terjadi penurunan data ingat.

- (1) Mata : pergerakan, penglihatan, dan penyakit penyerta
- (2) Pupil : kesamaan; isokor/anisokor
- (3) Ketajaman penglihatan : jangan diuji didepan jendela, penggunaan gambar dan tangan, cek kondisi kacamata
- (4) Mengkaji adanya gangguan sensorik

- (5) Ketajaman pendengaran : apakah menggunakan alat bantu dengar, tunitus, dan serumen
- (6) Mengkaji rasa sakit atau nyeri : Palliatif (P), Quality (Q), Regio (R), Symtom (S), Time (T)
- b) Sistem kardiovaskuler :
- (1) Sirkulasi perifer: warna dan kehangatan, pembengkakan vena jugularis, pusing, edema, denyut nadi apical, nyeri dada
- c) Sistem gastrointestinal :
- Status gizi, inkontinensia alvi, diare, konstipasi, keadaan perut, bising usus, rongga mulut, rahang, keadaan gigi, mengunyah, dan menelan, mual dan muntah, anoreksia, pemasukan diet
- d) Sistem genitourinarius :
- Mengkaji warna dan bau urine, pemasukan cairan, pengeluaran cairan, tekanan/desakan, frekuensi buang air kecil, inkontinensia urine, distensi kandung kemih, mengkaji seksualitas klien terkait minat melakukan hubungan seksual, dan berapa kali frekuensinya.
- e) Sistem kulit :
- Mengkaji keadaan kulit; temperature, pigmen, turgor kulit, kaji ada tidaknya luka terbuka dan luka robekan, tingkat kelembapan kulit. Mengkaji keadaan kuku, adanya tidaknya jaringan parut, keadaan rambut, serta gangguan-gangguan umum yang terjadi
- 4) Psikologis :
- Mengkaji pengenalan masalah-masalah utama lansia, sikapnya terhadap proses penuaan yang dialami, perasaan dibutuhkan, harapan saat ini dan harapannya yang akan datang, kegagalan lansia yang pernah dialami, penyesuaian diri terhadap perubahan yang dialami, koping stressor, pandangan lansia terhadap kehidupan, serta mengkaji adanya perubahan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat, proses

piker, orientasi waktu, alam perasaan yang dirasakan dan kemampuan lansia dalam menyelesaikan masalahnya.

5) Sosial Ekonomi :

Mengkaji sumber keuangan, hubungan dengan orang lain di lingkungan sekitar, pandang terhadap lingkungannya, kegiatan organisasi, penyaluran hobi/keinginan sesuai fasilitas yang ada, kesibukan lansia dalam mengisi waktu luang, mengkaji teman tinggal lansia

6) Spiritual :

Mengkaji terkait kegiatan ibadah lansia, agama yang dianut, kegiatan keagamaan yang dilakukan, cara lanjut usia dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, serta mengkaji terkait bagaimana penampilan lansia.

7) Psikososial :

Mengkaji tingkat ketergantungan lansia terhadap orang lain, bagaimana fokus diri, serta perhatian dan rasa kasih kasih sayang yang dirasakan.

8) Pengkajian status fungsional dengan menggunakan Indeks Katz adalah Pemeriksaan kemandirian lansia

9) Pengkajian status kognitif dan afektif dengan *Short Portable Mental Status Questionnaire* (SPMSQ) adalah penilaian fungsi intelektual lansia

10) Pengkajian skala depresi geriatric (GDS) dengan *Short Form*

11) Pengkajian skala jatuh morse (*Morse Fall Scale/MFS*)

12) Pengkajian status social dengan menggunakan APGAR keluarga

13) Pengkajian Barthel Indeks

14) Pengkajian penilaian potensi dekubitus (Skor Norton)

15) Pengkajian aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE (*Mini Mental Status Exam*)

16) Pengkajian Keseimbangan

2. **Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis Keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yangalaminya baik yang berlangsung actual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan

Adapun Diagnosis Keperawatan yang dapat terjadi pada lansia dengan sindrom geriatric *Immobility*, yaitu :

a. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)

1) Definisi : Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih

2) Penyebab :

a) Kerusakan integritas struktur tulang

b) Nyeri

c) Perubahan metabolisme

d) Ketidakbugaran fisik

e) Penurunan kendali otot

f) Penurunan massa otot

g) Gerakan terbatas

h) Penurunan kekuatan otot

3) Kondisi klinis terkait

a) Cedera medulla spinalis

b) Trauma

c) Fraktur

d) Osteoarthritis

e) Keganasan

b. Nyeri Kronik (D.0078)

1) Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak

atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung

2) Penyebab :

- a) Kondisi muskuloskeletal kronis
- b) Kerusakan sistem saraf
- c) Penekanan saraf
- d) Gangguan fungsi metabolik
- e) Kondisi pasca trauma

3) Kondisi klinis terkait

- a) Kondisi kronik (mis. Arthritis reumatoid)
- b) Infeksi
- c) Cedera medulla spinalis
- d) Kondisi pasca trauma
- e) Tumor
- f) Gangguan muskuloskeletal
- g) Penyakit katup jantung
- h) Aritmia
- i) Gangguan metabolic

c. Intoleransi aktivitas (D.0056)

1) Definisi : ketidakcukupan energy untuk melakukan aktivitas sehari-hari

2) Penyebab :

- a) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
- b) Tirah baring
- c) Kelemahan
- d) Imobilitas
- e) Gaya hidup monoton

3) Kondisi klinis :

- a) Anemia
- b) Gagal jantung kongestif

- c) Penyakit jantung koroner
 - d) Aritmia
 - e) Penyakit katup jantung
 - f) Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK)
 - g) Gangguan muskuloskeletal
- d. Defisit Perawatan Diri (D.0109)
- 1) Definisi : Tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri
 - 2) Penyebab :
 - a) Gangguan muskuloskeletal
 - b) Gangguan neuromuskuler
 - c) Kelemahan
 - d) Gangguan psikologi dan/atau psikotik
 - e) Penurunan motivasi/minat
 - 3) Kondisi klinis terkait :
 - a) Stroke
 - b) Cedera medulla spinalis
 - c) Depresi
 - d) Arthritis reumatoid
 - e) Demensia
 - f) Delirium
 - g) Retardasi mental
- e. Risiko Jatuh (D.0143)
- 1) Definisi : Berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh
 - 2) Faktor risiko
 - a) Umur \geq 65 tahun
 - b) Riwayat jatuh
 - c) Gangguan neuromuskuler

- d) Kelemahan
 - e) Penggunaan alat bantu berjalan
 - f) Gangguan pendengaran
 - g) Gangguan keseimbangan
 - h) Kekuatan otot menurun
- 3) Kondisi klinis terkait :
- a) Osteoporosis
 - b) Kejang
 - c) Penyakit serebrovaskuler
 - d) Katarak
 - e) Demensia
 - f) Amputasi (SDKI, 2017)



3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat berdasarkan pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan klien individu, keluarga dan komunitas (SIKI, 2018).

No.	Diagnosa Keperawatan	Kriteria Evaluasi	Intervensi Keperawatan	Rasional
1.	Gangguan mobilitas fisik	Setelah dilakukan asuhan keperawatan maka diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil : 1. Pergerakan ekstremitas atas dan bawah meningkat 2. Rentang gerak ROM meningkat	Dukungan Ambulasi <i>Observasi</i> 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik dalam melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi dan tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan mobilisasi 4. Monitor keadaan umum klien selama melakukan mobilisasi <i>Terapeutik</i> 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu	Dukungan Ambulasi <i>Observasi</i> 1. Mengetahui keluhan lain pasien dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan 2. Mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait latihan/gerak yang akan dilakukan berikutnya 3. Mengetahui adanya perubahan status kerja frekuensi tekanan darah pasien 4. Mengetahui kondisi terkini pasien dan perubahan yang dapat terjadi selama melakukan mobilisasi <i>Terapeutik</i> 1. Memberikan bantuan kepada pasien saat akan

			<p>2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu</p> <p>3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Jelaskan tujuan dan Prosedur Tindakan</p> <p>2. Anjurkan mobilisasi dini</p> <p>3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. Duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur</p>	<p>melakukan mobilisasi dan mengurangi risiko jatuh/sakit saat berpindah</p> <p>2. Meningkatkan status mobilitas fisik pasien</p> <p>3. Keluarga dapat secara mandiri membantu pasien melakukan latihan pergerakan</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan</p> <p>2. Untuk mengurangi risiko kekakuan dan kelemahan otot yang berkepanjangan</p> <p>3. Melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi</p>
2.	Nyeri Kronik	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pemenuhan kebutuhan pasien tercukupi dengan ekspektasi Nyeri kronik menurun dengan kriteria hasil:	<p>Manajemen Nyeri</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri</p> <p>2. Identifikasi skala nyeri</p> <p>3. Identifikasi faktor yang</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>1. Untuk mengetahui tingkat nyeri</p> <p>2. Mengetahui skala/tingkat nyeri</p> <p>3. Meminimalkan gerakan</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis dapat menurun 3. Gelisah menurun 4. Tekanan darah membaik 	<p>memperberat dan memperingan nyeri</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 2. Menjelaskan strategi mengatasi nyeri 	<p>yang memperberat nyeri</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi nyeri <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi terkait nyeri 2. Untuk memandirikan pasien
3.	Intoleransi Aktivitas	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan Respon fisiologis terhadap aktivitas yang membutuhkan tenaga dapat meningkat dengan kriteria hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat 2. Kekuatan tubuh bagian atas meningkat 3. Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat 4. Keluhan lelah 	<p>Manajemen Energi</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan 2. Monitor kelelahan fisik dan emosional 3. Monitor pola dan jam tidur 4. Monitor lokasi dan ketidaknyamana selama melakukan aktivitas <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. 	<p>Manajemen Energi</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pencetus terjadinya kelelahan dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan 2. Untuk mengetahui koping klien 3. Menghindari kelelahan akibat kurang istirahat 4. Mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait aktivitas yang akan dilakukan <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien

		<p>menurun</p>	<p>Cahaya, suara, kunjungan).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Lakukan latihan rentang gerak pasif/aktif (ROM) 3. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 4. Fasilitasi duduk disisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan. <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring 2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang 4. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan <p><i>Kolaborasi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu meningkatkan rentang gerak klien dalam beraktivitas 3. Memberikan rasa nyaman pada klien 4. Mengurangi risiko jatuh/sakit pada klien <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istirahat yang lebih dan mengurangi aktivitas dapat memulihkan energi kembali 2. Melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi 3. Untuk mengidentifikasi rencana tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perawat 4. Memiliki kemampuan mengatasi masalah (<i>coping skill</i>) bermanfaat untuk mencegah komplikasi kesehatan yang mungkin nantiakan timbul. <p><i>Kolaborasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian gizi yang
--	--	----------------	--	--

			1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan	cukup dapat meningkatkan energi klien
4.	Defisit Perawatan Diri	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan perawatan diri klien membaik, dengan kriteria hasil : 1. Kemampuan mandi meningkat, 2. Mempertahankan kebersihan diri meningkat	Perawatan Diri <i>Observasi</i> 1. Identifikasi kebutuhan alat bantu perawatan diri <i>Terapeutik</i> 1. Siapkan keperluan pribadi (sabun mandi, sikat gigi, bedak, lotion 2. Dampingi melakukan perawatan diri hingga mandiri <i>Edukasi</i> 1. Anjurkan klien melakukan perawatan diri secara rutin dan sesuai dengan kemampuan.	Perawatan Diri <i>Observasi</i> 1. Mengetahui alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan diri <i>Terapeutik</i> 1. Memenuhi alat-alat perawatan diri 2. Membantu pemenuhan kebutuhan perawatan diri pasien <i>Edukasi</i> 1. Menjaga kebersihan diri pasien
5.	Risiko jatuh	Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan, risiko jatuh tidak terjadi dengan kriteria hasil : 1. Jatuh dari tempat tidur menurun 2. Jatuh saat berdiri menurun 3. Jatuh saat duduk	Pencegahan Jatuh <i>Observasi</i> 1. Identifikasi faktor risiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst) 2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh 3. Hitung risiko jatuh dengan	Pencegahan Jatuh <i>Observasi</i> 1. Untuk mengetahui penyebab risiko jatuh pada pasien 2. Untuk mengetahui kondisi lingkungan yang dapat membahayakan pasien 3. Mengetahui tingkat

		<p>menurun</p> <p>4. Jatuh saat berjalan menurun</p>	<p>menggunakan skala</p> <p>4. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <p>1. Orientasikan ruang pada anggota keluarga</p> <p>2. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci</p> <p>3. Pasang <i>handrail</i> tempat tidur</p> <p>4. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat/keluarga</p> <p>5. Gunakan alat bantu berjalan</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Anjurkan memanggil perawat jika dibutuhkan bantuan untuk berpindah</p> <p>2. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin</p>	<p>kemampuan atau keseimbangan pasien dalam bergerak</p> <p>4. Mengetahui kemampuan pasien dalam bergerak</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <p>1. Agar anggota mengetahui hal-hal dalam ruangan yang dapat membahayakan pasien</p> <p>2. Mencegah terjadinya cedera/jatuh pada pasien ketika berbaring atau duduk</p> <p>3. Agar pasien tidak terjatuh ketika bergerak di tempat tidur</p> <p>4. Agar pasien lebih mudah dan tetap selalu dipantau oleh perawat</p> <p>5. Mencegah pasien terjatuh saat berjalan</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Memudahkan pasien ketika membutuhkan bantuan perawat</p> <p>2. Agar klien tidak terjatuh ketika berjalan</p>
--	--	--	--	--

			3. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri	3. Untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri
--	--	--	--	---

(SLKI, 2019) (SIKI, 2018)



4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada lansia adalah tahap dimana perawat melakukan tindakan rencana keperawatan untuk mengotimalkan keadaan lansia agar mampu produktif dan mandiri dengan memperhatikan beberapa hal seperti bahaya-bahaya fisik yang kemungkinan terjadi dan memberikan perlindungan kepada lansia, menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang baik dan benar, memahami standar oprasional procedure yang benar, dan memperhatikan hak-hak lansia serta mengetahui tingkat perkembangan lanjut usia (Damanik & Hasan, 2019)

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan menurut Damanik & Hasan, (2019) terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

a. Evaluasi struktur

Evaluasi struktur adalah evaluasi yang memfokuskan pada kondisi lingkungan tempat pemberian atau peleyanan keperawatan dengan memperhatikan tata cara pemberian pelayananan keperawatan karena hal ini dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses keperawatan

b. Evaluasi proses

Evaluasi proses adalah evaluasi yang memfokuskan pada kinerja perawat dalam melakukan asuhan keperawatan baik pada saat melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan fisik, keakuratan dalam merumuskan suatu diagnose keperawatan, serta kemampuan perawat dalam melaksanakan itervensi keperawatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur

c. Evaluasi hasil

Evaluasi hasil adalah evaluasi yang berfokus pada respon klien setelah diberikan intervensi keperawatan dengan memperhatikan tujuan

pencapaian dan kriteri hasil.

Hasil evaluasi yang menentukan apakah masalah teratasi, teratasi sebagian, atau tidak teratasi, adalah dengan cara membandingkan antara SOAP (*Subjective-Objective-Assesment-Planning*) dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan.

S : (*Subjective*) adalah informasi berupa ungkapan yang didapat dari lansia setelah tindakan diberikan.

O : (*Objective*) adalah informasi yang didapat berupa hasil pengamatan, penilaian, pengukuran yang dilakukan oleh perawat setelah tindakan dilakukan.

A : (*Assesment*) adalah membandingkan antara informasi subjective dan objective dengan tujuan dan kriteria hasil, kemudian diambil kesimpulan bahwa masalah teratasi, teratasi sebagian, atau tidak teratasi.

P : (*Planning*) adalah rencana keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis.

C. Pendekatan Keperawatan

1. Teori Keperawatan Menurut Virginia Henderson

Pendekatan teori keperawatan menurut Virginia Henderson yaitu berusaha mengembalikan kemandirian, kekuatan, kemampuan, kemauan, dan pengetahuan individu tersebut. Selain itu, Virginia Henderson juga mengembangkan sebuah model keperawatan "*The Actifities of Living*". Model tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat ialah membantu individu dalam meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin (Desmawati, 2019).

Tugas unik perawat adalah membantu individu baik dalam keadaan sakit maupun sehat melalui upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai, yang dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki

kekuatan, kemampuan, kemauan atau pengetahuan untuk itu. Handerson mengemukakan teori tersebut dikarenakan keyakinan dan nilai yang dia percayai yaitu manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu dia juga mengatakan dalam mendefinisikan tentang keperawatan harus memikirkan keseimbangan fisiologisnya (Desmawati, 2019).

2. Teori Keperawatan Menurut Dorothy E. Orem

Konsep keperawatan orem mendasari peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar klien melalui peningkatan kemampuan klien dalam pemenuhan kebutuhan secara mandiri. Seni dalam keperawatan adalah melatih berbuat untuk orang-orang penderita cacat, dengan cara menolongnya untuk berbuat bagi dirinya sendiri, dan atau menolongnya untuk belajar agar dapat berbuat untuk dirinya sendiri. Orem memberi label bagi teorinya "*self care defisit theory of nursing*", yang disusun oleh 3 hal yang saling berhubungan yaitu :

- a. Teori *self care* yang menggambarkan dan menjelaskan perawatan sendiri
- b. Teori *self care* defisit yang menggambarkan dan menjelaskan mengapa manusia dapat ditolong oleh ilmu keperawatan
- c. Teori sistem keperawatan yang menggambarkan dan menjelaskan hubungan yang harus dibawa dan dipertahankan sebagai hasil keperawatan (Desmawati, 2019).

D. *Evidence Based Practice In Nursing* (EBPN)

1. Definisi

Serai adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Dalam tumbuhan serai terdapat biotik yaitu minyak serai yang dikenal dengan minyak atsiri. Minyak Atsiri yang diperoleh dengan jalan menyuling bagian atas tumbuhan tersebut. Serai bisa membantu mengurangi rasa sakit dan

ketidak nyamanan yang disebabkan oleh sakit kepala dan migrain karena sifat analgesik yang dimilikinya. Fitonutrien yang terdapat pada serai dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu mengurangi kejang, kram otot, keseleo, sakit punggung, dan dapat mengurangi rasa nyeri (Anwar & Barus, 2020)

Kompres serai hangat adalah menghangatkan persendian yang sakit dengan menggunakan campuran serai yang telah direbus untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri (Isnawati, 2018)

2. Manfaat Serai

a. Mengandung zat anti oksidan

Serai memiliki kandungan antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas yang menyebabkan penyakit. Antioksidan bekerja dengan menangkal radikal bebas yang merusak sel-sel yang sehat di tubuh manusia.

b. Memiliki zat anti inflamasi

Peradangan tubuh dapat memperburuk kondisi kesehatan, termasuk berkontribusi pada penyakit jantung dan stroke. Sementara dua senyawa utama dalam serai, yakni citral dan geranial, dapat menjadi zat antiinflamasi yang dapat mencegah proses peradangan di tubuh manusia.

c. Tanaman serai berkerja sebagai diuretik

Didunia kesehatan, tanaman serai sudah dikenal sebagai diuretik. Dalam hal ini, serai mendorong produksi air seni pada manusia dan membersihkan tubuh dari kelebihan cairan.

d. Serai dapat meringankan gejala nyeri

Teh serai dapat digunakan sebagai obat alami untuk kram menstruasi, kembung, dan meringankan panas tubuh (Adelina, 2019).

3. Kandungan Serai

Dalam buku herbal Indonesia disebutkan bahwa tanaman serai mengandung minyak astiri yang memiliki sifat kimiawi dan efek farmakologi yaitu rasa pedas dan bersifat hangat sebagai anti radang dan menghilangkan rasa sakit yang bersifat analgesik serta melancarkan sirkulasi darah, yang diindikasikan untuk menghilangkan nyeri otot, nyeri sendi, pada penderita asam urat tinggi badan pegal dan sakit kepala (Adelina, 2019)

4. SOP Kompres Serai Hangat

Tabel 2.2
SOP Kompres Serai Hangat Menurut Adelina (2019)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kompres Serai Hangat	
Pengertian	Kompres hangat serai yaitu memberikan rasa hangat pada daerah yang mengalami nyeri dengan menggunakan rebusan serai hangat. Pemberian kompres hangat serai ini dapat dilakukan pada pasien yang mengalami peradangan sendi, kekakuan otot, sakit kepala, dan lain sebagainya
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Memperlancar aliran darah2. Mengurangi rasa nyeri3. Memperlancar pengeluaran eksudat4. Menurunkan suhu tubuh5. Merangsang peristaltik usus6. Memberikan rasa nyaman dan hangat pada klien
Indikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Klien dengan suhu tubuh yang rendah2. Klien yang mengalami perut kembung atau masuk angin3. Terjadi spasme otot/ kejang otot4. Klien yang mengalami peradangan misalnya radang sendi
Alat Dan Bahan	<ol style="list-style-type: none">1. Waslap atau handuk kecil2. Baskom3. Air hangat 38-40 C4. Serai 7 batang
Prosedur tindakan	<ol style="list-style-type: none">1. Handuk atau waslap dibasahi dengan air rebusan

	<p>serai</p> <ol style="list-style-type: none"> Handuk atau waslap yang telah dibasahi diletakkan pada anggota tubuh yang mengalami nyeri selama 15-20 menit Ulangi tindakan diatas beberapa kali hingga nyeri yang dirasakan meredah atau berkurang Jika telah selesai keringkan bagian tubuh yang telah dikompres Lakukan kembali tindakan diatas jika nyeri kembali muncul
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> Respon pasien Perasaan pasien setelah tindakan dilakukan
Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> Catat waktu pelaksanaan Catat hasil evaluasi setelah tindakan yang dilakukan Tuliskan nama perawat yang melakukan tindakan

Tabel 2.3
SOP Pemberian Kompres Serai Hangat Menurut Prasetyo et al., (2019)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kompres Serai Hangat	
Pengertian	Kompres hangat serai yaitu salah satu teknik non farmakologi yang memiliki sensasi rasa pedas dan bersifat hangat.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi rasa nyeri Menyebabkan pelebaran pembuluh darah Menurunkan kekentalan darah, menurunkan ketegangan otot Meningkatkan metabolisme jaringan dan meningkatkan permeabilitas kapiler Memberikan rasa nyaman dan hangat pada klien
Alat Dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> Waslap atau handuk kecil Baskom Air 600 cc Serai 5 batang

Prosedur tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Handuk atau waslap dibasahi dengan air rebusan serai 2. Handuk atau waslap yang telah dibasahi diletakkan pada anggota tubuh yang mengalami nyeri selama 20 menit 3. Ulangi tindakan diatas beberapa kali hingga nyeri yang dirasakan meredah atau berkurang 4. Lakukan kembali tindakan diatas jika nyeri kembali muncul 5. Tindakan ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 5. Respon subjektif dan objektif pasien 6. Perasaan pasien setelah tindakan dilakukan
Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catat waktu pelaksanaan 2. Catat hasil evaluasi setelah tindakan yang dilakukan 3. Tuliskan nama perawat yang melakukan tindakan

4. Pengaruh Kompres Serai Hangat Terhadap Nyeri

Pada lansia, pengobatan kimia jarang digunakan dan lebih mengutamakan pengobatan-pengobatan tradisional dengan menggunakan bahan-bahan yang alami seperti jamu dari rempah-rempah tradisional, kompres menggunakan rebusan jahe, rebusan serai dan lain-lain karena mampu meminimalisir efek samping dan risiko terjadinya komplikasi. Pengobatan untuk meredakan nyeri sendi salah satunya yaitu dengan menghangatkan sendi yang sakit, atau kompres hangat. Pada kompres hangat terdapat banyak campuran herbal yang digunakan agar proses penyembuhannya juga maksimal seperti contohnya kompres hangat serai (Adelina, 2019).

Pemberian kompres serai hangat yang dilakukan untuk mengurangi nyeri dapat terjadi karena terjadinya pemindahan panas dari kompres kedalam tubuh sehingga akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah, dan akan terjadi penurunan ketegangan sehingga nyeri sendi yang dirasakan pada penderita arthritis rheumatoid dapat berkurang bahkan menghilang. Dan kompres serai

hangat berfungsi untuk mengatasi atau mengurangi nyeri, dimana panas dapat meredakan iskemia dengan menurunkan kontraksi otot dan melancarkan pembuluh darah sehingga dapat meredakan nyeri dengan mengurangi ketegangan dan meningkatkan perasaan nyaman, meningkatkan aliran darah pada persendian (Adelina, 2019).

Para ilmuwan dari Universitas Gorin di Israil pada tahun 2006 telah menemukan bahwa di dalam serai ada senyawa yang dapat meringankan peradangan, iritabilitas serta senyawa yang dapat mematikan kanker. Dalam tanaman serai terkandung minyak atisiri yang digunakan sebagai salah satu obat alternative untuk bahan pijat rematik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *The Science and Technology* yang dikutip dalam *livestrong.com* yang mengatakan bahwa serai memiliki manfaat antioksidan yang dapat membantu mencegah kanker, terdapat kandungan zat anti-mikroba dan anti bakteri yang berguna sebagai obat infeksi serta mengandung senyawa analgetik yang membantu menghilangkan rasa sakit atau nyeri seperti nyeri otot dan nyeri sendi.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et al., (2019) dengan judul penelitian, “Upaya Menurunkan Intensitas Nyeri Melalui Kompres Serai Hangat Pada Asuhan Keperawatan Gerontik.” Hasil yang didapatkan adalah setelah diberikan kompres serai hangat selama 7 hari berturut-turut, ada perubahan penurunan skala nyeri pada asuhan keperawatan gerontik. Penelitian lain oleh Lestari (2018) menjelaskan bahwa dengan menggunakan kompres serai hangat masalah keperawatan nyeri dapat teratasi sesuai dengan kriteria hasil. Skala nyeri klien berkurang dari skala 6 menjadi skala 3 dan klien tidak menunjukkan ekspresi nyeri. Masih sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Syafitri (2020) yang menunjukkan bahwa kompres serai hangat mampu menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh lansia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus. Studi kasus menurut Rahardjo (2017) adalah serangkaian pada kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga maupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam terkait peristiwa tersebut. Peristiwa yang dijadikan penelitian studi kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*) yang sedang berlangsung, bukan tentang sesuatu yang sudah lewat.

B. Subjek Studi Kasus

Subjek dalam penelitian studi kasus ini adalah individu atau klien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu lansia dengan rentang umur 60-80 tahun yang mengalami masalah nyeri sendi sehingga terjadi keterbatasan aktivitas, mampu diajak berkomunikasi serta kesediaannya menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah lansia dalam kondisi yang sehat, tidak mengonsumsi obat-obatan seperti obat anti nyeri ataupun obat anti inflamasi non-steroid.

C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan proses asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai hangat.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan gerontik untuk melakukan tahapan-tahapan pada asuhan keperawatan dan instrumen pengkajian nyeri dengan menggunakan skala penilaian *numeric/numbering rating scale* (NRS) untuk menilai skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan intervensi.

E. Prosedur Studi Kasus

1. Persiapan

Pada tahap ini, penulis mencari literatur-literatur terkait masalah apa yang sering dialami oleh lansia. Setelah masalah didapatkan, penulis mencari solusi yang mampu meminimalisir komplikasi yang dapat terjadi. Sehingga hasil akhir yang didapatkan, kemudian diajukan yaitu memberikan intervensi kompres serai hangat pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri.

2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penulis melakukan *screening* pada lansia yang sesuai dengan subjek penelitian kriteria inklusi. Penulis melakukan pendekatan studi kasus selama 1 minggu dengan 6x kunjungan. Kemudian pengolahan data dengan melihat respon klien serta keluarga sebelum dan sesudah diberikan intervensi yang kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang relevan.

F. Tempat dan Waktu Studi Kasus

Tempat dilakukan studi kasus yaitu di Desa Pacellekang Dusun Pa'bundukang RW 2 dengan waktu pengambilan data dilakukan pada Selasa, 28 September 2021-26 November 2021.

G. Analisis dan Penyajian Data

Analisis dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif.

H. Etika Studi Kasus

Prinsip etika studi kasus menurut Nursalam (2015) dalam penelitian dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Prinsip manfaat
 - a. Bebas dari penderitaan.
 - b. Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus.
 - c. Bebas dari eksploitasi.
 - d. Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindarkan dari keadaan yang tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan, tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk apa pun.
 - e. Risiko (*benefits ratio*).
 - f. Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan.
2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (*respect human dignity*).
 - a. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (*right to self determination*)

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak, tanpa adanya paksaan dari siapapun atau akan berakibat terhadap kesembuhannya jika mereka seorang klien.
 - b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)

Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek.

c. *Informed consent*

Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Perlu dicantumkan di dalam lembaran *Informed consent* bahwa data yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu.

3. Prinsip keadilan (*right to justice*)

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (*anonymity*) dan rahasia (*confidentiality*).

BAB IV
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

Tanggal pengkajian : Selasa, 28 September 2021

1. Data Demografi

Nama Lansia : "Tn.N"
Umur : 70 tahun
Alamat : Dusun Pa"bundukang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jumlah Keturunan
Anak : Klien mengatakan mempunyai 3 anak.
Cucu : Klien mengatakan memiliki cucu berjumlah 10 orang.
Nama Suami/Istri : "Almh. Ny. S"
Umur : -

2. Pengkajian

Keluhan Utama : Nyeri pada lutut-kaki
Riwayat Keluhan Utama : Klien mengatakan mengalami stroke 3 tahun yang lalu. Dampak dari stroke tersebut mengakibatkan klien merasakan nyeri pada lutut klien sehingga klien tidak dapat menggerakkan lututnya secara bebas.
P = Nyeri dirasakan ketika beraktivitas
Q = Tertusuk-tusuk
R = Nyeri pada lutut sebelah kiri
S = Skala nyeri 6 (sedang)

T = Hilang timbul, durasi 1-5 menit.

a. Fisik

Wawancara

- 1) Pandangan lanjut usia tentang kesehatannya : Klien mengatakan dirinya sudah tua dan menerima kondisinya saat ini.
- 2) Kegiatan yang mampu dilakukan *lanjut usia* : Klien mengatakan masih mampu berpakaian, makan, minum, BAB dan BAK sendiri.
- 3) Kebiasaan lanjut usia merawat diri sendiri : Klien mengatakan mandi 1x sehari ketika di pagi hari. Jika di sore hari, klien hanya mewashlap badannya menggunakan air hangat. Klien mengganti pakaiannya secara mandiri
- 4) Kekuatan fisik lanjut usia: otot, sendi, penglihatan dan pendengaran :
 - a. Kekuatan otot :
$$\begin{array}{r} 5 \ 5 \\ \hline 5 \ 3 \end{array}$$
 - b. Penglihatan : Klien mengatakan penglihatannya sudah menurun.
 - c. Pendengaran : Klien tidak bisa mendengar dengan baik.
- 5) Kebiasaan makan, minum, buang air besar/kecil :
 - a. Kebiasaan makan : Klien mengatakan makan 3x/hari, dengan menghabiskan porsi makanan yang telah disediakan
 - b. Kebiasaan minum : Klien mengatakan minum >3 gelas perhari sehingga sering BAK.
 - c. Kebiasaan BAB/BAK : Klien mengatakan BAK >4x/hari dan

BAB tidak lancar hsnys 1-2x
seminggu.

- 6) Perubahan-perubahan : Klien mengatakan perubahan pada fungsi tubuh yang tubuh yang sangat bermakna dirasakan sangat bermakna yaitu pergerakannya karena klien tidak dirasakan mampu beraktivitas berlebihan dan berjalan secara normal.
- 7) Kebiasaan *lanjut* : Klien mengatakan meminum obat tiap *usia* dalam hari yaitu ambloodipine dengan dosis 10 memelihara mg. kesehatan dan kebiasaan dalam minum obat

Pemeriksaan Fisik

1. Temperatur : 36,5°C
Tempat Pengukuran : Axilla
2. Pulse (denyut nadi) : 90 x/menit
Kecepatan : Normal
Irama : Reguler (teratur)
Volume :
Tempat pengukuran : Radialis
3. Respirasi (Pernafasan) : 20x/menit
Kecepatan : Normal
Irama : Teratur
Kedalaman : -
Bunyi : Vesikuler
4. Tekanan darah : 150/90 mmHg

- Posisi pengukuran : Lengan bagian atas kiri diatas arteri brachialis
5. Berat dan tinggi badan : BB = 51 kg
terakhir TB = 171 cm
6. Tingkat orientasi :
Waktu : Klien tidak mengetahui jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ini.
Tempat : Klien mengetahui tempatnya berada sekarang.
Orang : Klien mampu mengenali orang-orang yang berada disekitarnya
7. Memori (Ingatan) : Klien tidak mampu mengingat memori jangka panjang dengan baik, namun masih mampu mengingat memori jangka pendek.
8. Tidur
Kuantitas (Lama tidur) : Malam : Klien mengatakan terkadang terbangun pada malam hari dan sulit untuk tertidur kembali.
Siang : Klien mengatakan tidur siang selama ± 1 jam.
Kualitas : Kurang
Pola : Tidak Teratur
9. Istirahat
Kuantitas (Lama tidur) : Malam : Klien mengatakan tidurnya baik..
Siang : Klien mengatakan tidur siang

- selama ±2 jam.
- Kualitas : Klien mengatakan istirahatnya cukup
- Pola : Tidak teratur
10. Penyesuaian Psikososial : Klien mengatakan sering berjalan di depan rumah untuk duduk-duduk.

Sistem Persyarafan

1. Kesimetrisan raut wajah : Simetris kiri dan kanan
2. Tingkat kesadaran : Composmentis
 - Snile (Pikun) : Tidak
 - Daya ingat : Menurun
3. Mata
 - Pergerakan : Baik kiri dan kanan, klien dapat mengerakkan bola mata ketika disuruh
 - Penglihatan : Klien tidak dapat melihat dengan baik
 - Penyakit penyerta : Riwayat stroke dan hipertensi
4. Pupil : Isokor
5. Ketajaman penglihatan : Klien tidak mampu melihat dengan jelas > 1-2 meter
6. Ketajaman pendengaran : Pendengaran berkurang.
 - Apakah menggunakan alat bantu dengar : Ya
 - Tinitus : Tidak ada
 - Serumen : Serumen tidak ada
7. Rasa sakit atau nyeri : Ada

Sistem Kardiovaskuler

1. Sirkulasi perifer : < 3 detik

- Warna : Merah muda pucat
- Kehangatan : Hangat
2. Pembengkakan vena jugularis : Tidak ada
3. Pusing : Tidak ada
4. Nyeri dada : Tidak ada
5. Edema : Tidak ada

Sistem Gastrointestinal

- Status gizi : Baik
- Pemasukan diet : Ada, makan makanan yang bergaram.
- Anoreksia : Tidak
- Mual : Klien mengatakan tidak mual
- Muntah : Klien mengatakan tidak pernah muntah
- Mengunyah dan menelan : Klien mengatakan sudah kurang mampu untuk mengunyah dan menelan dengan baik karena gigi yang tidak lengkap.
- Kedaaan gigi : Gigi tidak lengkap
- Rahang : Simetris
- Rongga mulut : Bersih
- Bising usus : 8x/menit
- Kedaaan perut : Rata, tidak ada massa dan tidak ada nyeri tekan
- Konstipasi (sembelit) : Klien mengatakan BAB hanya 1-2x seminggu dengan pengeluaran feses yang lama dan sedikit sulit
- Diare : Tidak ada

Inkontinesia alvi : Tidak pernah

Sistem Genitourinarius

Warna dan bau urine : Klien mengatakan urinenya berwarna kekuning-kuningan

Distensi kandung kemih : Tidak

Inkontinensia : Tidak

Frekuensi : >4 kali dalam sehari

Pemasukan cairan : Klien mengatakan sering minum dengan menghabiskan >3 gelas air putih perhari.

Pengeluaran cairan : Klien mengatakan BAK >4x/hari

Disuria : Tidak ada

Seksualitas : Tidak dikaji

Sistem Kulit

1. Kulit

Temperatur : 36,4°C

Tingkat kelembaban : Lembab

Keadaan luka : Tidak ada luka

Turgor : Keriput

Pigmen : Sama dengan warna tubuh yang lain

2. Jaringan parut : Bersih

3. Keadaan kuku : Panjang

4. Keadaan rambut : Rambut tampak bersih, panjang dan beruban

5. Gangguan-gangguan umum : Tidak ada

Sistem Muskuloskeletal

1. Kontraktur : Klien tidak mengalami kontraktur.
- Otot : Tidak mampu menahan beban secara maksimal.
- Tendon : Normal
2. Tingkat mobilisasi
- Ambulasi : Klien mengatakan mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Ketika klien duduk di lantai dan ingin berdiri, klien nampak memegang benda di sekitarnya terlebih dahulu kemudian mampu berdiri.
- Gerakan : Terbatas dalam pergerakan akibat nyeri pada lutut sebelah kiri.
- Kekuatan otot : $\begin{array}{r|l} 5 & 5 \\ \hline 5 & 3 \end{array}$
- Kemampuan melangkah : Klien mampu melangkah namun nampak menyeret kaki kirinya.
3. Gerakan sendi : Terbatas. Ketika klien diminta untuk melakukan ekstensi dan fleksi pada ekstremitas bawah sebelah kiri, klien nampak meringis.
4. Paralisis : Tidak
5. Kifosis : Tidak
6. Hemiparesis : Tidak

b. Psikologis

1. Pengenalan masalah-
Masalah utama : Klien mengatakan sedih karena aktivitasnya terbatas
2. Sikap terhadap proses : Klien mengatakan menerima penuaan keadaannya seperti saat ini
3. Perasaan dibutuhkan : Klien mengatakan bersyukur karena lingkungannya tetap merawat klien.
4. Pandangan terhadap kehidupan : Klien mengatakan harus tetap menjalani hidupnya dan harus bersyukur karena masih diberikan umur panjang.
5. Koping stressor : Klien mengatakan jika ia sedang memiliki masalah atau memikirkan sesuatu, klien bercerita pada keluarga
6. Penyesuaian diri : Sebelum terkena stroke dan pernah jatuh sekitar 3 bulan yang lalu, klien sering bersosialisasi ke tetangganya dan aktif ikut kegiatan masyarakat. Namun, saat ini klien hanya beraktivitas di dalam dan halaman rumah.
7. Kegagalan : Klien mengatakan tidak memiliki kegagalan.
8. Harapan saat ini dan yang akan datang : Klien mengatakan semoga dirinya tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Allah swt
9. Fungsi kognitif
Daya ingat : Menurun

Proses pikir	:	Klien mampu berbicara dengan jelas dan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan jika suara sedikit dibesarkan
Alam perasaan	:	Klien merasa baik-baik saja saat dilakukan pengkajian.
Orientasi		
Waktu	:	Klien tidak mengetahui jam, hari, tanggal, bulan serta tahun saat dilakukan pengkajian
Tempat	:	Klien mengetahui tempatnya berada sekarang
Orang	:	Klien mampu mengenali orang-orang disekitarnya
Kemampuan penyelesaian Masalah	dalam	: Klien mengatakan shalat, berdoa, berdzikir, ketika sedang ada masalah atau banyak pikiran.

c. Sosial Ekonomi

- 1) Sumber keuangan : Klien mengatakan sumber keuangan yang didapatkan dari jualan baju anaknya dan hasil kelolaan dari sawah.
- 2) Kesibukan dalam mengisi waktu luang : Klien mengatakan mengisi waktu luang dengan tidur atau duduk sambil berdzikir.
- 3) Teman tinggal : Klien tinggal bersama anak, menantu dan cucunya
- 4) Kegiatan organisasi : Tidak ada

- 5) Pandangan terhadap lingkungan : Klien merasa bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya.
- 6) Hubungan dengan orang lain di luar rumah : Baik.
- 7) Yang biasa mengunjungi : Anak klien
- 8) Penyaluran hobi/keinginan sesuai fasilitas yang ada : Klien mengatakan sekarang lebih suka beraktivitas ringan seperti membakar sampah.

d. Spiritual

- 1) Agama : Klien mengatakan beragama islam
- 2) Kegiatan ibadah : Klien mengatakan rajin sholat 5 waktu
- 3) Kegiatan keagamaan : Klien mengatakan rutin sholat
- 4) Cara lanjut usia : Dengan shalat, bertawakkal, berdzikir menyelesaikan masalah kepada Allah swt
- 5) Penampilan lansia : Klien nampak memakai baju, sarung-sarung. Nampak rapi dan bersih.

e. Psikososial

- 1) Tingkat ketergantungan : Klien mampu melakukan aktivitas secara mandiri seperti makan, minum, berpakaian dan mandi
- 2) Fokus diri : Klien memahami kondisi yang dialaminya.
- 3) Perhatian : Klien mengatakan mendapat perhatian dari orang sekitarnya..

PENGAJIAN STATUS FUNGSIONAL

INDEKS KATZ	
SCORE	Kriteria
✓ A	Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi
B	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi Tersebut
C	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu Fungsi tambahan
D	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, Berpakaian dan satu fungsi tambahan
E	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, Berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan
F	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, Berpakaian, berpindah dan satu fungsi tambahan
G	Ketergantungan pada enam fungsi tersebut

Interpretasi :

Beri tanda (√) pada point yang sesuai kondisi klien

Analisis hasil :

- a) **Mandiri dalam makan, kontinensia (bak dan bab), menggunakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah, dan mandi.**
- b) Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas
- c) Mandiri, kecuali mandi dan satu lagi fungsi yang lain
- d) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi yang lain
- e) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, dan satu fungsi yang lain
- f) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah, dan satu fungsi yang lain.
- g) Ketergantungan untuk semua fungsi di atas
- h) Lain-lain (minimal ada 2 ketergantungan yang tidak sesuai dengan kategori di atas)

Keterangan :

Mandiri berarti pengawasan, pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. Seseorang yang menolak untuk melakukan suatu fungsi dianggap tidak melakukan fungsi, meskipun ia anggap mampu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGKAJIAN STATUS KOGNITIF DAN AFEKTIF

<i>Short portable mental status questionnaire (spmsq)</i>				
Score		No	Pertanyaan	Jawab
+	-			
	1	1	Tanggal berapa hari ini ?	-
	1	2	Hari apa sekarang ini ? (hari, tanggal, tahun)	-
1		3	Apa nama tempat ini ?	Pa“bundukang
		4a	Berapa nomor telpon anda ?	-
1		4b	Dimana alamat anda ? (tanyakan hanya bila klien tidak Mempunyai no.telepon)	Desa Pacellekang, Dusun Pa“bundukang
	1	5	Berapa umur anda ?	-
	1	6	Kapan anda lahir ?	-
1		7	Siapa presiden sekarang ?	Jokowi
1		8	Siapa presiden sebelumnya ?	SBY
1		9	Siapa nama kecil Ibu anda ?	“S”
	1	10	Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, Semua secara menurun	-
Skor : 5				

Penilaian :

- Kesalahan 0 – 2 fungsi intelektual utuh
- Kesalahan 3 – 4 fungsi intelektual ringan
- Kesalahan 5 – 7 fungsi intelektual sedang**
- Kesalahan 8 – 10 fungsi intelektual berat

SKALA DEPRESI GERIATRIK (GERIATRIC DEPRESSION SCALE GDS)

(Short Form)

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda ?	<input checked="" type="checkbox"/>	1
2	Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan Minat/kesenangan anda?	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani Saat ini?	1	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Apakah anda sering bosan ?	1	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	1
6	Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda ?	1	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	1
8	Apakah anda merasa tidak berdaya?	1	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, Daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru ?	<input checked="" type="checkbox"/>	0
10	Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat Dibandingkan kebanyakan orang	<input checked="" type="checkbox"/>	0
11	Apakah anda berfikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini?	<input checked="" type="checkbox"/>	1
12	Apakah anda merasa saya sangat tidak berharga/ berguna?	1	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	<input checked="" type="checkbox"/>	1
14	Apakah anda merasa tidak memiliki harapan?	1	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda?	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Skor :		2

Penilaian :

- 0 – 5 : Normal**
- 6 – 10 : Kemungkinan depresi
- >10 : Depresi

SKALA JATUH MORSE (MORSE FALL SCALE / MFS)

No.	Item	Skala		Skor
1	Riwayat jatuh Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?	Tidak	0	25
		Ya ✓	25	
2	Diagnosis sekunder Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit?	Tidak	0	15
		Ya ✓	15	
3	Alat bantu pergerakan <i>Bed rest/</i> dibantu perawat			
	Walker/kruk/tongkat		15	0
	Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, lemari)		30	0
4	Terapi intravena: Apakah saat ini lansia terpasang infus?	Tidak ✓	0	0
		Ya	20	
5	Gaya berjalan/cara berpindah			
	Normal		0	10
	Lemah		10	
Gangguan/ tidak normal		20		
6	Status mental			
	Lansia menyadari kondisinya		0	0
	Lansia mengalami keterbatasan Daya ingat		15	
Total nilai : Risiko rendah				50

Keterangan :

Tingkat Risiko	Nilai MPS	Tindakan
Tidak berisiko	0-24	Perawatan dasar
Risiko rendah	25-50	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar
Risiko tinggi	≥ 51	Pelaksanaan intervensi jatuh risiko tinggi

PENGKAJIAN STATUS SOSIAL

Apgar keluarga					
No	Fungsi	Uraian	Selalu	Kadang	Hampir tidak Pernah
			2	1	0
1	Adaptasi	Saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga (teman-teman) saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya	✓		
2	Hubungan	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya	✓		
3	Pertumbuhan	Saya puas bahwa keluarga (teman-teman) saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas atau arah baru		✓	
4	Afeksi	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya mengekspresikan afek dan berespons terhadap emosi-emosi saya, seperti marah, sedih atau mencintai		✓	
5	Pemecahan	Saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama		✓	
Skor:			7		

Penilaian :

0 – 5 fungsi sosial kurang

6 – 10 fungsi sosial baik

BARTHEL INDEKS

No	Kriteria	Dengan Bantuan	Mandiri	Keterangan
1	Makan	5	10 ✓	Frekuensi : 3x/hari Jumlah : 1 porsi jenis : nasi, sayur dan ikan
2	Minum	5	10 ✓	Frekuensi : sering minum Jumlah : >3 gelas jenis : air putih
3	Berpindah dari kursi roda ke Tempat tidur dan sebaliknya	5 – 10	15 ✓	Klien mampu berdiri secara mandiri
4	Personal toilet (cuci muka, Menyisir rambut, gosok gigi)	0	5 ✓	Frekuensi : 2x/sehari
5	Keluar masuk toilet (membuka pakaian, Menyeka tubuh, menyiram)	5	10 ✓	Klien mandiri dalam melakukan <i>personal hygiene</i>
6	Mandi	5	15 ✓	Frekuensi : 1x sehari
7	Jalan di permukaan datar	0	5 ✓	Mandiri
8	Naik turun tangga	5 ✓	10	Klien bisa namun berpegangan.
9	Mengenakan pakaian	5	10 ✓	Mandiri
10	Kontrol bowel (bab)	5	10 ✓	Frekuensi : 1-2x seminggu Konsistensi : sulit dikeluarkan dan seperti kelereng.
11	Kontrol bladder (bak)	5	10 ✓	Frekuensi : >5x/hari Warna : kekuningan
12	Olahraga/latihan	5	10 ✓	Klien terkadang berjalan-jalan di depan rumahnya.
13	Rekreasi/pemanfaatan waktu Luang	5	10 ✓	-
Skor :		125		

Keterangan :

130 : Mandiri
 60 – 125 : Ketergantungan sebagian
 55 : Ketergantungan total

PENILAIAN POTENSI DEKUBITUS (SKOR NORTON)

Kondisi fisik umum :

- a. Baik : **4**
- b. Lumayan : 3
- c. Buruk : 2
- d. Sangat buruk : 1

Mobilitas :

- a. Bergerak bebas : 4
- b. Sedikit terbatas : **3**
- c. Sangat terbatas : 2
- d. Tidak bisa bergerak : 1

Kesadaran :

- a. Komposmentis : **4**
- b. Apatis : 3
- c. Sopor : 2
- d. Koma : 1

Inkontinen

- a. Tidak : **4**
- b. Kadang-kadang : 3
- c. Sering inkontenensia urin : 2
- d. Inkontinensia alvi dan urin : 1

Aktivitas :

- a. Ambulan : **4**
- b. Ambulan dengan bantuan : 3
- c. Hanya bisa duduk : 2
- d. Tiduran : 1

Total skor : 19

Keterangan ;

15-20 : Kecil sekali/tak terjadi

12-20 : Kemungkinan kecil terjadi

<12 : Kemungkinan besar terjadi

**IDENTIFIKASI ASPEK KOGNITIF DAN FUNGSI MENTAL DENGAN
MENGUNAKAN MMSE (*Mini Mental Status Exam*)**

- a. Orientasi - Registrasi - Mengingat kembali
b. Perhatian - Kalkulasi

No.	Aspek Kognitif	Nilai Maks	Nilai Klien	Kriteria
1	Orientasi waktu	5	0	Menyebutkan dengan benar : (nilai 1 untuk tiap jawaban) <input type="checkbox"/> Tahun : - <input type="checkbox"/> Bulan : - <input type="checkbox"/> Hari : - <input type="checkbox"/> Musim : - <input type="checkbox"/> Tanggal : -
	Orientasi tempat	5	5	Dimana kita sekarang berada? (nilai 1 untuk setiap jawaban) <input type="checkbox"/> Kota : Makassar <input type="checkbox"/> Propinsi/kabupaten/kecamatan : Kab. Gowa <input type="checkbox"/> Di ruangan mana: Keluarga <input type="checkbox"/> Di lantai berapa : - <input type="checkbox"/> Nama wisma : -
2	Registrasi	3	3	Sebutkan nama 3 obyek/benda (oleh pemeriksa), 1 detik untuk menyebutkan masing-masing obyek. Kemudian tanyakan kepada klien ketiga obyek yang disebutkan tadi. (nilai 1 untuk setiap jawaban) <input type="checkbox"/> Obyek: Pulpen <input type="checkbox"/> Obyek: Baju <input type="checkbox"/> Obyek : Buku
3	Perhatian dan kalkulasi	5	0	Minta klien mengeja 5 kata dari belakang, misal “bapak” <ul style="list-style-type: none"> • K • A • P • A • B Minta klien hitung mundur dari 100 ke

				bawah dengan pengurangan 5. Berhenti setelah mendapat nilai 75. (nilai 1 setiap jawaban benar)
4	Mengingat	3	3	Minta klien untuk mengulangi ketiga obyek pada no.2 (registrasi) tadi. Bila benar, 1 poin untuk masing-masing obyek. <ul style="list-style-type: none"> • Pulpen • Baju • Buku
5	Bahasa (9) menamai	2	2	Tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan namanya pada klien. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hp <input type="checkbox"/> Cincin
	Pengulangan	1	1	Minta klien untuk mengulang kata berikut : “tak ada jika, dan, atau,tetapi.” Bila benar, nilai satu poin. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pernyataan benar 2 buah (contoh : tak ada, tetapi)
	Pemahaman	3	3	Minta klien untuk mengikuti perintah berikut yang terdiri dari 3 langkah : ambil kertas di tangan anda, lipat dua, dan taruh di lantai.” <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ambil kertas di tangan anda <input type="checkbox"/> Lipat dua <input type="checkbox"/> Taruh di lantai
	Membaca	1	1	Perintahkan pada klien untuk hal berikut (bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 point) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> “tutup mata anda”
	Menulis	1	0	Perintahkan pada klien untuk menulis satu kalimat dan menyalingambar. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tulis satu kalimat
	Menggambar	1	0	Perintahkan klien untuk menggambar, gambar dibawa ini : 
	SKOR		18	

Interpretasi hasil

- 26-30 : Aspek kognitif dan fungsi mental baik
21-25 : Aspek kognitif dari fungsi mental ringan
11-20 :Kerusakan aspek fungsi mental sedang
0-10 : Terdapat kerusakan aspek fungsi mental berat



PENGKAJIAN KESEIMBANGAN

Komponen Utama Dalam Bergerak	Langkah-Langkah	Kriteria	Nilai
Perubahan posisi atau gerakan keseimbangan	1. Bangun dari tempat duduk dengan mata terbuka	1. Tidak bangun dari tempat duduk dengan satu gerakan, tetapi mendorong tubuhnya keatas dengan tangan atau bergerak kedepan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali.	1
	2. Duduk ke kursi dengan mata terbuka	2. Menjatuhkan diri ke kursi, duduk ditengah kursi	1
	3. Bangun dari tempat duduk dengan mata tertutup	3. Tidak bangun dari tempat duduk dengan satu gerakan, tetapi mendorong tubuhnya keatas dengan tangan atau bergerak kedepan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali.	0
	4. Duduk ke kursi dengan mata tertutup	4. Menjatuhkan diri kekursi, duduk ditengah kursi	0
	5. Menahan dorongan pada sternum dengan mata terbuka	5. Periksa mendorong sternum (perlahan-lahan sebanyak 3 kali). Klien menggerakkan kaki memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya.	0
	6. Menahan dorongan pada sternum dengan mata tertutup	6. Periksa mendorong sternum (perlahan-lahan sebanyak 3 kali). Klien menggerakkan kaki memegang objek untuk dukungan, kaki	0

		tidak menyentuh sisi-sisinya.	
	7. Perputaran leher sambil berdiri	7. Menggerakkan kaki, memegang obyek untuk dukungan kaki tidak menyentuh sisi-sisinya, keluhan vertigo, pusing atau keadaan tidak stabil.	0
	8. Gerakan menggapai sesuatu	8. Tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi max, sementara berdiri pada ujung-ujung jari kaki tidak stabil, memegang sesuatu untuk dukungan.	0
	9. Membungkuk	9. Tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek-objek kecil dari lantai, memegang objek untuk bisa berdiri, memerlukan usaha-usaha multiple untuk bangun.	0
Gaya berjalan/bergerak	1. Minta klien untuk berjalan ketempat yang ditentukan	1. Ragu-ragu, tersandung, memegang objek untuk dukungan	0
	2. Ketinggian langkah kaki (saat berjalan)	2. Kaki tidak naik dari lantai secara konsisten (menggeser atau menyeret kaki), mengangkat kaki terlalu tinggi (>5 cm)	1
	3. Kontinuitas langkah kaki (diobservasi dari samping klien)	3. Setelah langkah-langkah awal, langkah menjadi tidak konsisten, memulai mengangkat satu kaki sementara yang lain	1

		menyentuh lantai.	
	4. Kesimetrisan langkah (diobservasi dari samping klien)	4. Tidak berjalan pada garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi.	0
	5. Penyimpangan jalur pada saat berjalan (diobservasi dari belakang klien)	5. Tidak berjalan pada garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi.	0
	6. Berbalik	6. Berhenti sebelum berbalik, jalan sempoyongan, bergoyang, memegang objek untuk dukungan.	0
SKOR			4

Interpretasi hasil

0-5 = risiko jatuh rendah

6-10 = risiko jatuh sedang

11-15 = risiko jatuh tinggi

WAKTU DUDUK DAN BERDIRI KLIEN

No	Langkah
1.	Posisi klien duduk di kursi
2.	Minta klien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah (3 meter), kembali ke kursi, ukur waktu dalam detik

Interpretasi :

≤ 10 detik : Risiko jatuh rendah

11-19 detik : Risiko jatuh sedang

20-29 detik : Risiko jatuh tinggi

≥ 30 detik ; Gangguan mobilitas dan Risiko jatuh tinggi

ANALISA DATA

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengeluh lututnya nyeri sejak 3 tahun yang lalu - P: Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri S : Skala nyeri 6 (Sedang) T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien terlihat meringis saat bergerak - Klien bergerak tampak menyeret kakinya - Klien tampak memegang lututnya 	<p>Gangguan muskuloskeletal</p>	<p>Nyeri kronik</p>
2.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan tidak mampu beraktivitas berlebihan karena rasa nyeri yang ada pada lutut-kakinya - Klien mengatakan nyeri ketika dilakukan ekstensi dan fleksi pada ekstremitas bawah 	<p>Nyeri</p>	<p>Gangguan Mobilitas Fisik</p>

	<p>kirinya.</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nampak berjalan dengan menyeret kaki kirinya - Klien tidak mampu menahan beban secara maksimal. - Nampak meringis ketika ingin duduk dilantai - Nampak memegang benda di sekitarnya jika ingin berdiri - Kekuatan otot $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{3}$ 		
3.	<p>Faktor Risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> - > 65 tahun - Riwayat jatuh dalam kurun waktu 3 bulan. - Klien mengalami gangguan pendengaran - Klien mengalami penurunan penglihatan - Penilaian barbel indeks 125 yang berarti klien mengalami ketergantungan sebagian. - Pengkajian keseimbangan : 4, yang berarti risiko jatuh rendah - Penilaian skala jatuh morse 50 yang berarti klien memiliki intervensi pelaksanaan risiko 	<p>Usia > 65 tahun dan memiliki riwayat jatuh</p>	<p>Risiko Jatuh</p>

	jatuh yang sedang - Kekuatan otot menurun $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{3}$		
4.	Faktor Risiko : - Ketidacukupan asupan serat - Perubahan kebiasaan makanan (mis.jenis makanan) - Ketidakaturan kebiasaan defekasi - Penurunan fungsi mengunyah - Riwayat stroke	Ketidacukupan asupan serat	Risiko Konstipasi

B. Diagnosa Keperawatan

1. Nyeri kronik b/d gangguan muskuloskeletal
2. Gangguan mobilitas fisik b/d nyeri
3. Risiko jatuh dengan faktor risiko usia ≥ 65 tahun dan riwayat jatuh
4. Risiko konstipasi dengan faktor risiko ketidacukupan asupan serat

C. Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosa Keperawatan	Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan	Rasional
1.	Nyeri kronik b/d gangguan muskuloskeletal	Setelah dilakukan asuhan keperawatan 6 x 24 jam, maka diharapkan perasaan nyeri terkontrol dengan kriteria hasil: - Keluhan nyeri menurun - Meringis dapat menurun	<p>Manajemen Nyeri</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 2. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 	<p>Manajemen Nyeri</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui tingkat nyeri 2. Mengetahui skala/tingkat nyeri 3. Meminimalkan gerakan yang memperberat nyeri <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan penghilangan nyeri yang non invasif dan nonfarmakologi memungkinkan klien untuk memperoleh rasa kontrol terhadap nyeri <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi terkait nyeri 2. Untuk memandirikan pasien

2.	Gangguan mobilitas fisik b/d nyeri	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan 6 x 24 jam maka diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan terbatas meningkat 2. Keluhan nyeri menurun 3. Melaporkan nyeri terkontrol 4. Kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis meningkat 	<p>Dukungan Ambulasi</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan tubuh <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 2. Anjurkan mobilisasi dini 3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 	<p>Dukungan Ambulasi dan Manajemen Nyeri</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui keluhan lain klien dan rencana tindakan berikutnya yang dapat dilakukan 2. Mengetahui kemampuan dan batasan klien terkait latihan/gerak yang akan dilakukan berikutnya <p><i>Terapeutik.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan harapan klien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari klien <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan 2. Untuk mengurangi risiko kekakuan dan kelemahan otot yang berkepanjangan 3. Melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi.
----	------------------------------------	--	--	---

3.	<p>Risiko jatuh dengan faktor risiko usia ≥ 65 tahun dan riwayat jatuh</p>	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan 6 x 24 jam, maka diharapkan risiko jatuh menurun dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jatuh saat membungkuk 2. Jatuh saat berjalan 	<p>Pencegahan Jatuh <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi faktor risiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst) 2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh 3. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasikan ruang pada anggota keluarga 2. Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko 3. Pasang <i>handrail</i> tempat tidur 4. Tempatkan klien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat/keluarga 5. Gunakan alat bantu berjalan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan memanggil 	<p>Pencegahan Jatuh <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui penyebab risiko jatuh pada klien 2. Untuk mengetahui kondisi lingkungan yang dapat membahayakan klien 3. Mengetahui tingkat kemampuan atau keseimbangan klien dalam bergerak <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar anggota mengetahui hal-hal dalam ruangan yang dapat membahayakan klien 2. Mencegah terjadinya cedera/jatuh pada klien ketika berjalan 3. Agar klien tidak terjatuh ketika bergerak di tempat tidur 4. Agar klien lebih mudah dan tetap selalu dipantau oleh perawat 5. Mencegah klien terjatuh saat berjalan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan klien ketika
----	--	---	--	---

			<p>perawat jika dibutuhkan bantuan untuk berpindah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin 3. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri 	<p>membutuhkan bantuan perawat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Agar klien tidak terjatuh ketika berjalan 3. Untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri
4.	Risiko konstipasi dengan faktor ketidakcukupan asupan serat	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan 6 x 24 jam maka diharapkan eliminasi fekal membaik dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan defekasi lama dan sulit menurun 2. Konsistensi feses membaik 	<p>Pencegahan Konstipasi</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Asupan serat tidak adekuat, asupan cairan tidak adekuat, kelemahan otot abdomen, aktivitas fisik kurang) 2. Identifikasi penggunaan obat-obatan yang menyebabkan konstipasi <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas minuman yang mengandung kafein dan alcohol <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab dan faktor risiko konstipasi 2. Anjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan (1500 mL-2000 ml/hari) 	<p>Pencegahan Konstipasi</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi penyebab/faktor pemberat dan intervensi yang tepat 2. Mengidentifikasi pbat-obatan yang menurunkan motilitas usus <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan distress gastrik dan distensi abdomen <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengetahuan pada klien 2. Untuk melunakkan eliminasi feses

			3. Anjurkan mengonsumsi makanan yang berserat (25-30 gram/hari)	3. Nutrisi serat tinggi melancarkan eliminasi fekal
--	--	--	---	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

D. Implementasi Keperawatan

Kode Diagnosa	Tgl/Jam	Implementasi Keperawatan
01	Sabtu, 20 November 2021 10.25	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri S : Skala nyeri 6 (Sedang) T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit
	10.25	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : Skala nyeri 6
	10.29	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil : Nyeri bertambah setelah beraktivitas dan berkurang saat istirahat (berbaring)
	10.32	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dan mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri Hasil : mengajarkan serta memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh klien (lutut-klien)
	10.45	<ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri Hasil : klien mampu memonitor nyerinya secara mandiri
	Senin, 22 November 2021 13.10	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri S : Skala nyeri 5 (Sedang)

	13.22	<p>T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit</p> <p>- Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh klien (lutut-klien)</p>
	<p>Selasa, 23 November 2021</p> <p>14.00</p>	<p>- Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas</p> <p>Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk</p> <p>R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri</p> <p>S : Skala nyeri 4 (Sedang)</p> <p>T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit</p>
	14.10	<p>- Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh klien (lutut-klien)</p>
	<p>Rabu, 24 November 2021</p> <p>14.30</p>	<p>- Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas</p> <p>Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk</p> <p>R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri</p> <p>S : Skala nyeri 4 (Sedang)</p> <p>T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit</p>
	14.45	<p>- Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh klien (lutut-klien)</p>
	<p>Kamis, 25 November 2021</p> <p>13.10</p>	<p>- Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p>

	13.23	<p>Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri S : Skala nyeri 3 (ringan) T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit</p> <p>- Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh klien (lutut-klien)</p>
	<p>Jum'at, 26 November 2021 14.12</p> <p>14.20</p>	<p>- Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri S : Skala nyeri 3 (Sedang) T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit</p> <p>- Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh klien (lutut-klien)</p>
02	<p>Sabtu, 20 November 2021 10.25</p> <p>10.30</p> <p>10.34</p>	<p>- Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</p> <p>Hasil : Klien hanya mengeluh nyeri di lutut-kakinya</p> <p>- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan.</p> <p>Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri namun hanya ketika berjalan, klien nampak menyeret kaki kirinya karena rasa nyeri yang dirasakan.</p> <p>- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan</p> <p>Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi</p>

	10.40	- Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan Hasil : klien nampak faham
	10.42	- Menganjurkan mobilisasi dini Hasil : Mengajarkan ROM aktif
	10.45	- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah
	Senin, 22 November 2021	
	13.12	- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri namun hanya ketika berjalan, klien masih nampak menyeret kaki kirinya karena rasa nyeri yang dirasakan.
	13.22	- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi
	13.35	- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah
	Selasa, 23 November 2021	
	14.02	- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri namun hanya ketika berjalan, klien masih nampak menyeret kaki kirinya karena rasa nyeri yang dirasakan.
	14.10	- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi
	14.25	- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah
	Rabu, 24 November 2021	
	14.31	- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan.

		<p>Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri namun hanya ketika berjalan, klien masih nampak menyeret kaki kirinya karena rasa nyeri yang dirasakan.</p> <p>14.46 - Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan</p> <p>14.55 Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi</p> <p>- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan.</p> <p>Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah</p>
	Kamis, 25 November 2021	
	13.11	- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri. Klien nampak berjalan dengan normal
	13.24	- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi
	13.45	- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah
	Jum'at, 26 November 2021	
	14.13	- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri, klien nampak berjalan dengan normal
	14.22	- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi
	14.46	- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah
03	Sabtu, 20 November 2021	
	10.27	- Mengidentifikasi faktor risiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst)

	10.31	<p>Hasil : klien berusia 70 tahun, memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran, berjalan dengan cara menyeret kaki kirinya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh <p>Hasil : Tidak ada faktor lingkungan yang menjadi faktor risiko jatuh</p>
	10.57	<ul style="list-style-type: none"> - Memodifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko <p>Hasil : Mengedukasi keluarga tentang lap kering yang digunakan setelah dari WC</p>
	11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri <p>Hasil : Klien faham</p>
	Rabu, 24 November 2021	
	14.33	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor risiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst) <p>Hasil : klien berusia 70 tahun, memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran, berjalan dengan normal</p>
04	Senin, 22 November 2021	
	13.41	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Asupan serat tidak adekuat, asupan cairan tidak adekuat, kelemahan otot abdomen, aktivitas fisik kurang) <p>Hasil : klien mengatakan jarang memakan sayur-sayuran dan hanya beberapa kali saja memakan buah-buahan</p>
	13.45	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi penggunaan obat-obatan yang menyebabkan konstipasi <p>Hasil : klien mengatakan saat ini hanya mengonsumsi obat penurun tekanan darah yaitu amlodipine</p>
	13.50	<ul style="list-style-type: none"> - Membatasi minuman yang mengandung kafein dan alkohol <p>Hasil : klien mengatakan sudah tidak pernah meminum yang mengandung kafein dan alkohol.</p>
	13.55	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan penyebab dan faktor risiko konstipasi

	13.58	<p>Hasil : klien nampak faham</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan (1500 mL-2000 ml/hari)
	14.00	<p>Hasil : Klien mengatakan sering meminum air putih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan mengonsumsi makanan yang berserat <p>Hasil : Klien mengatakan memakan makanan yang sudah disiapkan oleh anaknya namun sayuran sangat jarang disediakan.</p>
	Rabu, 24 November 2021	
	14.40	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Asupan serat tidak adekuat, asupan cairan tidak adekuat, kelemahan otot abdomen, aktivitas fisik kurang) <p>Hasil : klien mengatakan salah satu faktor penyebab konstipasi yaitu klien jarang mengonsumsi sayur-sayuran</p>
	14.42	<ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan (1500 mL-2000 ml/hari)
	14.57	<p>Hasil : Klien mengatakan sering meminum air putih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan mengonsumsi makanan yang berserat <p>Hasil : Klien mengatakan memakan makanan yang sudah disiapkan oleh anaknya dan mulai mengonsumsi sayur-sayuran.</p>

E. Evaluasi Keperawatan

Kode Diagnosa	Tgl/Jam	Evaluasi Keperawatan
01	Sabtu, 20 November 2021 11.30	<p><i>Subjektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, nyerinya berkurang dari skala 6 ke skala 5 dan merasa lebih nyaman ketika sudah dikompres - <p><i>Objektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat - <p><i>Assesment :</i> Masalah belum teratasi</p> <p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri <p><u>Terapeutik</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
	Senin, 22 November 2021 14.10	<p><i>Subjektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, nyerinya berkurang dari skala 5 ke skala 4 dan merasa lebih nyaman ketika sudah dikompres <p><i>Objektif :</i></p>

		<p>- Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat</p> <p><i>Assessment :</i> Masalah belum teratasi</p> <p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p><u>Terapeutik</u> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p>
	<p>Selasa, 23 November 2021 14.30</p>	<p><i>Subjektif :</i></p> <p>- Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, nyerinya tidak berkurang, masih skala nyeri 4</p> <p><i>Objektif :</i></p> <p>- Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat</p> <p><i>Assessment :</i> Masalah belum teratasi</p> <p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p><u>Terapeutik</u></p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 2. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan
	<p>Rabu, 24 November 2021 15.00</p>	<p><i>Subjektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, nyerinya berkurang dari skala 4 ke skala 3 dan merasa lebih nyaman ketika sudah dikompres <p><i>Objektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat <p><i>Assessment :</i> Masalah teratasi</p> <p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri <p><u>Terapeutik</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 2. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan
	<p>Kamis, 25 November 2021 14.00</p>	<p><i>Subjektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, nyerinya tidak berkurang, masih skala nyeri 3

		<p><i>Objektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat <p><i>Assessment :</i></p> <p>Nyeri kronik b/d gangguan muskuloskeletal teratasi</p> <p><i>Planning :</i></p> <p>Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u></p> <p>1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p><u>Terapeutik</u></p> <p>1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p>
	<p>Jum'at, 26 November 2021 15.00</p>	<p><i>Subjektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, nyerinya berkurang dari skala 3 ke skala 1 dan merasa nyaman ketika sudah dikompres <p><i>Objektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat <p><i>Assessment :</i></p> <p>Masalah teratasi</p> <p><i>Planning</i></p> <p>1. Pertahankan intervensi</p>
02	<p>Sabtu, 20 November 2021 11.10</p>	<p><i>Subjektif :</i></p> <p>Klien mengatakan masih kesulitan dalam beraktivitas</p>

		<p><i>Objektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan otot : $\frac{5 \text{ } \cancel{5}}{5 \text{ } \cancel{3}}$ - Klien nampak berjalan sambil menyeret kaki kirinya <p><i>Assesment :</i> Masalah belum teratasi</p> <p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u> 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan._</p> <p><u>Terapeutik</u> 1. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan tubuh</p> <p><u>Edukasi</u> 1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan.</p>
	<p>Senin, 22 November 2021 14.10</p>	<p><i>Subjektif :</i> Klien mengatakan masih kesulitan dalam beraktivitas / berjalan</p> <p><i>Objektif :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan otot : $\frac{5 \text{ } \cancel{5}}{5 \text{ } \cancel{3}}$ - Klien nampak berjalan sambil menyeret kaki kirinya <p><i>Assesment :</i> Masalah belum teratasi</p>

		<p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u> 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan._</p> <p><u>Terapeutik</u> 1. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan tubuh</p> <p><u>Edukasi</u> 1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan.</p>
	<p>Selasa, 23 November 2021 14.30</p>	<p><i>Subjektif :</i> Klien mengatakan masih kesulitan dalam beraktivitas / berjalan</p> <p><i>Objektif :</i> - Kekuatan otot : $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{3}$</p> <p>- Klien nampak berjalan sambil menyeret kaki kirinya</p> <p>-</p> <p><i>Assesment :</i> Masalah belum teratasi</p> <p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u> 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan._</p> <p><u>Terapeutik</u> 1. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan tubuh</p>

		<u>Edukasi</u> 1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan.
	Rabu, 24 November 2021 15.00	<i>Subjektif :</i> Klien mengatakan masih kesulitan dalam beraktivitas / berjalan <i>Objektif :</i> - Kekuatan otot : $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{4}$ - Klien mulai nampak berjalan dengan normal dengan sesekali menyeret kakinya <i>Assesment :</i> Masalah teratasi <i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi <u>Observasi</u> 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. <u>Terapeutik</u> 1. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan tubuh <u>Edukasi</u> 1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan.
	Kamis, 25 November 2021 14.00	<i>Subjektif :</i> Klien mengatakan saat ini pergerakannya sudah membaik. <i>Objektif :</i>

		<p>- Kekuatan otot : $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{4}$</p> <p>- Klien nampak berjalan dengan normal</p> <p><i>Assesment :</i> Masalah teratasi</p> <p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><u>Observasi</u> 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan.</p> <p><u>Terapeutik</u> 1. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan tubuh</p> <p><u>Edukasi</u> 1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan.</p>
	<p>Jum'at, 26 November 2021 15.00</p>	<p><i>Subjektif :</i> Klien mengatakan saat ini pergerakannya sudah membaik.</p> <p><i>Objektif :</i></p> <p>- Kekuatan otot : $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{4}$</p> <p>- Klien nampak berjalan dengan normal</p> <p><i>Assesment :</i> Masalah teratasi</p> <p><i>Planning :</i></p>

		Pertahankan intervensi
03	Sabtu, 20 November 2021 11.10	<p><i>Faktor Risiko :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> > 65 tahun Riwayat jatuh dalam kurun waktu 3 bulan. Klien mengalami gangguan pendengaran Klien mengalami penurunan penglihatan Penilaian bartel indeks 125 yang berarti klien mengalami ketergantungan sebagian. Pengkajian keseimbangan : 4, yang berarti risiko jatuh rendah Penilaian skala jatuh morse 50 yang berarti klien memiliki intervensi pelaksanaan risiko jatuh yang sedang Kekuatan otot menurun $\frac{55}{53}$ <p><i>Assesment :</i> Masalah belum teratasi</p> <p><i>Planning :</i></p> <p><i>Observasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi faktor risiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst)
	Rabu, 24 November 2021 15.00	<p><i>Faktor Risiko :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> > 65 tahun Riwayat jatuh dalam kurun waktu 3 bulan. Klien mengalami gangguan pendengaran Klien mengalami penurunan penglihatan Penilaian bartel indeks 125 yang berarti klien mengalami ketergantungan sebagian. Pengkajian keseimbangan : 4, yang berarti risiko jatuh rendah

		<p>7. Penilaian skala jatuh morse 50 yang berarti klien memiliki intervensi pelaksanaan risiko jatuh yang sedang</p> <p>8. Kekuatan otot menurun $\frac{5}{5}$ 5 4 </p> <p><i>Assesment :</i> Masalah tidak terjadi</p> <p><i>Planning :</i> Pertahankan intervensi</p>
04	<p>Senin, 22 November 2021 14.10</p>	<p><i>Faktor Risiko :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidacukupan asupan serat - Perubahan kebiasaan makanan (mis.jenis makanan) - Ketidakaturan kebiasaan defekasi - Penurunan fungsi mengunyah - Riwayat stroke <p><i>Assesment :</i> Masalah belum teratasi</p> <p><i>Planning :</i> Lanjutkan intervensi</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>1. Identifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Asupan serat tidak adekuat, asupan cairan tidak adekuat, kelemahan otot abdomen, aktivitas fisik kurang)</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Anjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan (1500 mL-2000 ml/hari)</p>

	<p>Rabu, 24 November 2021 15.00</p>	<p>2. Anjurkan mengonsumsi makanan yang berserat</p> <p><i>Faktor Risiko :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidacukupan asupan serat - Perubahan kebiasaan makanan (mis.jenis makanan) - Ketidakaturan kebiasaan defekasi - Penurunan fungsi mengunyah - Riwayat stroke <p><i>Assesment :</i> Masalah tidak terjadi</p> <p><i>Planning :</i> Pertahankan intervensi</p>
--	--	--

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisa Kasus

1. Pengkajian

Studi kasus ini dilakukan pada rentan waktu 20-26 November 2021 pada lansia „Tn. N“ dengan umur 70 tahun yang bertempat di Desa Pacellekang Dusun Pa“bundukang RW 2. Berdasarkan hasil pengkajian, klien mengalami salah satu sindrom geriatric yaitu *immobility* atau keterbatasan pergerakan akibat rasa nyeri yang dirasakan. Dari hasil wawancara, klien mengatakan mulai merasakan nyeri pada lutut-kaki bagian kiri setelah terkena stroke sejak 3 tahun yang lalu. Selain itu, klien mengatakan memiliki riwayat jatuh 3 bulan yang lalu yang memperburuk kondisi klien. Klien juga mengatakan bahwa dengan kondisinya saat ini, aktivitas klien menjadi berkurang. Dahulu, klien senang bekerja di Sawah, sekarang klien hanya di Rumah dan hanya sesekali berjalan-jalan di depan Rumahnya. Selanjutnya, hasil observasi yang didapatkan, klien nampak berjalan dengan cara yang tidak normal yaitu menyeret kaki kirinya. Setelah menghitung kekuatan otot klien, didapatkan hasil hanya ekstremitas bawah sebelah kiri yang memiliki skor 3 yaitu klien mampu mengangkat kakinya namun tidak mampu untuk menahannya lebih lama (terjatuh). Sedangkan, hasil uji kekuatan otot pada ekstremitas atas kanan dan kiri serta ekstremitas bawah sebelah kanan didapatkan skor 5 yaitu, mampu menahan beban secara maksimal.

Kasus yang dialami oleh Tn. N sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinzon & Zalukhu (2016) yang mengatakan bahwa nyeri merupakan keluhan tersering yang terjadi pada pasien pasca-stroke. Nyeri dapat berasal dari otot, sendi, visera, ataupun dari sistem saraf pusat. *Post-stroke pain* (PSP) atau nyeri pasca-stroke merupakan kondisi klinis yang lebih luas yang memicu terjadinya nyeri pasca-stroke. Penelitian yang sama yang

dilakukan oleh Anita et al., (2018) yang menyatakan bahwa pasien pasca stroke pada umumnya mengalami kelemahan otot pada bagian anggota gerak tubuh, gangguan postural dan adanya atrofi otot. Atrofi otot menyebabkan penurunan aktivitas pada sendi sehingga sendi mengalami kehilangan cairan sinovial dan menyebabkan kekakuan sendi. Kekakuan sendi menyebabkan penurunan rentang gerak pada sendi. Kelemahan pada satu sisi anggota tubuh penderita stroke atau yang biasa disebut Hemiparese mengakibatkan penurunan tonus otot sehingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya (imobilisasi). Imobilisasi yang tidak diberikan penanganan dalam waktu yang lama akan menimbulkan komplikasi, salah satunya adalah kontraktur. Kontraktur adalah hilangnya atau menurunnya rentang gerak sendi, Kontraktur menyebabkan terjadinya gangguan fungsional, gangguan mobilisasi dan gangguan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Hasil pengkajian selanjutnya yang didapatkan adalah klien memiliki riwayat jatuh dalam kurun waktu 3 bulan yang lalu. Selain itu, fungsi pendengaran maupun penglihatan pada klien telah menurun. Berdasarkan hasil perhitungan bartel indeks dengan total skor 125, klien mengalami ketergantungan sebagian. Begitu juga dengan penilaian skala jatuh morse pada klien yaitu 50, yang berarti klien seharusnya mendapatkan intervensi dengan pelaksanaan risiko jatuh yang sedang. Selanjutnya, hasil pengkajian yang didapat yaitu, klien mengalami kesulitan dalam eliminasi fekal. Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan serat yang dikonsumsi oleh klien. Setelah dilakukan wawancara, anak klien mengatakan bahwa hanya sesekali memasak sayur-sayuran karena ada beberapa faktor yang membuat klien menjadi sibuk sehingga tidak sempat untuk memasak sayur-sayuran. Selain itu, fungsi mengunyah pada mulut klien juga telah terjadi penurunan karena adanya beberapa gigi yang sudah tanggal.

2. Diagnosa Keperawatan

Keluhan utama yang dialami pada Tn. N yaitu nyeri kronik dari lutut-kaki yang dirasakan sejak 3 tahun lalu. Menurut SDKI (2017) nyeri kronik merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan, yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah nyeri kronik. Masalah ini ditemukan sejak hari pertama pengkajian, klien mengatakan nyeri pada lutut-kakinya bagian sebelah kiri dengan skala nyeri 6 dirasakan seperti tertusuk-tusuk, durasi yang dirasakan 1-5 menit dengan frekuensi hilang timbul. Hal inilah yang menyebabkan klien menjadi lebih sulit beraktivitas (imobilitas) ditandai dengan cara berjalan yang tidak normal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Rasa nyeri yang dirasakan oleh klien, mengakibatkan adanya penurunan aktivitas mobilitas fisik pada klien. Sehingga, diagnosa keperawatan yang muncul adalah gangguan mobilitas fisik. Kemudian, klien memiliki riwayat jatuh dan pengukuran skala jatuh morse yang memerlukan intervensi pencegahan jatuh sedang, maka diagnosa keperawatan yang muncul yaitu risiko jatuh. Yang terakhir, akibat ketidakcukupan asupan serat yang dikonsumsi oleh klien, sehingga pola eliminasi fekal menjadi tidak teratur, maka perlu adanya edukasi terkait dengan pola makan yang baik, sehingga muncul diagnosa keperawatan risiko konstipasi.

3. Intervensi Keperawatan

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis keperawatan nyeri kronik adalah mengajarkan salah satu manajemen nyeri terapi nonfarmakologis kompres serai hangat dengan kriteria hasil keluhan nyeri dan ekspresi meringis menurun. Pemberian intervensi ini dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Lestari (2018) yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan kompres serai hangat masalah keperawatan nyeri dapat teratasi sesuai dengan kriteria hasil skala nyeri klien berkurang dari skala 6 menjadi skala 3 dan klien tidak menunjukkan ekspresi nyeri.

Intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah gangguan mobilitas fisik adalah melatih klien untuk melakukan ROM aktif atau mobilisasi sederhana. Asumsi dari penulis, dengan melakukan ROM akan membantu meminimalisir terjadinya kontraktur ataupun ketegangan pada otot. Selanjutnya, intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah risiko jatuh dengan melakukan edukasi untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Melalui edukasi-edukasi tersebut, pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mencegah terjadinya risiko jatuh akan meningkat sehingga tercipta lingkungan yang aman bagi lansia. Intervensi terakhir yang dilakukan adalah pencegahan terjadinya konstipasi.

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan yang diberikan untuk diagnosa utama nyeri kronik dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Pada hari pertama implementasi, terjadi penurunan skala nyeri dari skala nyeri 6 menjadi skala nyeri 5. Sejalan Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Barus, (2020) yang melakukan kompres serai hangat pada lansia untuk menurunkan intensitas nyeri yang dilakukan hanya 1 hari. Hasilnya adalah sebelum dilakukan kompres serai hangat, rata-rata lansia mengalami nyeri sedang dan setelah dilakukan pemberian kompres serai hangat, terjadi penurunan skala nyeri menjadi skala nyeri ringan. Menurut asumsi peneliti, minyak atsiri yang terkandung di dalam serai memiliki sensasi rasa panas dan hangat sehingga terjadinya vasodilatasi pada pembuluh darah. Hal inilah yang menyebabkan suplai darah menjadi lancar di dalam jaringan sehingga terjadi

penurunan ketegangan otot yang menyebabkan nyeri dapat berkurang ataupun menghilang.

Pemberian implementasi keperawatan selain manajemen nyeri untuk mengatasi nyeri yaitu melibatkan serta mengajarkan kepada klien dan keluarga tentang tahapan-tahapan dalam melakukan salah satu terapi nonfarmakologis dalam mengatasi nyeri dengan kompres serai hangat. Hal ini sesuai dengan teori keperawatan Virginia Henderson "*the activities of living*" yang diharapkan agar klien dan keluarga menjadi lebih mandiri dalam mengatasi kasus imobilitas dengan masalah nyeri.

Implementasi keperawatan untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Implementasi hari pertama dilakukan setelah pemberian kompres serai hangat yaitu melakukan mobilisasi sederhana untuk ekstremitas bagian bawah. Hasilnya, belum ada perubahan kekuatan otot yang terjadi. Namun, akhir implementasi untuk masalah gangguan mobilitas fisik terjadi peningkatan otot dari 5,5,5,3 menjadi 5,5,5,4 yang ditandai dengan perubahan cara berjalan serta keluhan nyeri dari klien menurun.

Implementasi masalah risiko jatuh dan risiko konstipasi dilakukan selama 2 hari dengan memberikan edukasi kepada klien dan keluarga terkait dengan modifikasi lingkungan serta pemberian asupan makanan yang berserat kepada klien. Akhir implementasi, keluarga klien nampak memahami dan segera melakukan hal-hal yang mencegah terjadi faktor risiko tersebut terjadi.

5. Evaluasi Keperawatan

Hasil evaluasi keperawatan untuk masalah nyeri kronik pada hari pertama yaitu klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, nyerinya berkurang dari skala 6 ke skala 5 dan merasa lebih nyaman ketika sudah dikompres. Selanjutnya, evaluasi hari kedua dan sampai akhir

implementasi juga terjadi penurunan skala nyeri yang signifikan menjadi skala nyeri 1 dan tidak ada ekspresi meringis pada klien. Sehingga data disimpulkan bahwa pemberian kompres serai hangat dalam mengatasi *immobility* dengan masalah nyeri efektif untuk dilakukan.

Hasil evaluasi keperawatan untuk masalah gangguan mobilitas fisik yaitu pada hari pertama Sabtu, 20 November 2021, kekuatan otot klien 5,5,5,3 dengan cara berjalan nampak tidak normal yaitu dengan menyeret kaki kirinya. Setelah dilakukan mobilisasi sederhana untuk mengurangi kekakuan pada sendi secara berturut-turut, pada implementasi hari Rabu 24 November 2021, kekuatan otot klien meningkat menjadi 5,5,5,4 dan cara berjalan klien sudah mulai normal dengan tidak meyeret kakinya. Sehingga evaluasi keperawatan hari terakhir pada Jumat, 26 November 2021, masalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri teratasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindawi et al., (2020) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kekuatan otot kaki pada lansia dengan melakukan latihan ROM aktif.

Hasil evaluasi keperawatan untuk masalah risiko jatuh dengan melakukan edukasi kepada klien dan keluarga untuk memodifikasi lingkungan yang dilakukan selama 2 hari yaitu keluarga dengan cepat memahami dan segera mencegah hal-hal yang membuat risiko tersebut terjadi. Sehingga, hasil evaluasi terakhir yang dilakukan pada Rabu, 24 November 2021, masalah tidak terjadi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subianto et al., (2019) yang menyatakan bahwa dengan melakukan manajemen lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan bagi keluarga untuk menurunkan risiko cedera demi keselamatan pada lansia.

Hasil evaluasi keperawatan untuk masalah risiko konstipasi dengan melakukan edukasi kepada keluarga untuk memberikan asupan makanan cukup serat kepada klien yaitu di hari pertama implementasi Senin, 22

November 2021, anak dari klien menyadari bahwa ia jarang menyiapkan sayur-sayuran ataupun makanan berserat lainnya untuk klien karena faktor kesibukan. Namun, setelah diberikan edukasi tentang pentingnya memakan sayur-sayuran ataupun makan-makanan yang berserat, di hari terakhir implementasi Rabu, 24 November 2021, anak dari klien sudah nampak menyiapkan makanan yang berserat untuk mencegah risiko konstipasi pada klien. Sehingga hasil evaluasi terakhir yang didapatkan yaitu masalah faktor risiko tidak terjadi.

B. Analisis Intervensi

Tindakan keperawatan utama yang dilakukan oleh penulis untuk mengatasi masalah utama nyeri kronik adalah menggunakan manajemen nyeri (SIKI, 2018). Salah satu bentuk manajemen nyeri yaitu teknik nonfarmakologis dengan memberikan kompres serai hangat. Tindakan ini selain mencegah komplikasi lebih lanjut, alat dan bahan yang digunakan serta prosedur tindakan yang mudah untuk dilakukan secara mandiri baik oleh perawat maupun pasien dan keluarganya.

Pemberian kompres serai hangat dilakukan selama 6 hari yang dimulai pada tanggal 20-26 November 2021 di rumah Tn. N Desa Pacellekang Dusun Pa^obundukang RW 2. Implementasi pada hari pertama dilakukan pada hari Sabtu, 20 November 2021. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air 600mL yang direbus dengan serai yang telah digeprek sebanyak 5-7 batang. Setelah mendidih, diamkan terlebih dahulu sampai suhu air menjadi 35°-40°C, lalu dikompres pada daerah yang terasa nyeri yaitu pada bagian lutut-kaki. Hasil evaluasi yang didapatkan yaitu klien mengatakan merasa nyaman setelah diberikan kompres serai hangat dan rasa nyeri yang dirasakan menurun dari skala 6 ke skala 5. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Barus, (2020) yang melakukan kompres serai hangat pada lansia untuk menurunkan intensitas nyeri yang dilakukan hanya 1 hari. Hasilnya adalah sebelum dilakukan kompres serai

hangat, rata-rata lansia mengalami nyeri sedang dan setelah dilakukan pemberian kompres serai hangat, terjadi penurunan skala nyeri menjadi skala nyeri ringan.

Implementasi hari kedua dilakukan pada hari Senin, 22 November 2021. Alat dan bahan serta prosedur pemberian kompres serai hangat sama dengan hari pertama. Hasil evaluasi yang didapatkan yaitu terjadi penurunan skala nyeri yang dirasakan klien dari skala nyeri 5 menjadi skala nyeri 4. Selain itu, klien juga mengatakan sangat nyaman ketika diberikan kompres karena memberikan sensasi rasa panas yang membuat nyerinya menjadi menurun. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hannan (2019) yang menyebutkan bahwa kompres hangat sebagai metode yang sangat efektif untuk mengurangi nyeri atau kejang otot. Panas dapat melebarkan pembuluh darah dan dapat meningkatkan aliran darah.

Secara biologi efek pemberian terapi kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus dirangsang, sistem efektor mengeluarkan sinyal yang memulai berkeringat dan vasodilatasi perifer. Perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat vasomotor pada medulla oblongata dari tangkai otak, dibawah pengaruh hipotalamus bagian anterior sehingga terjadi vasodilatasi. Terjadinya vasodilatasi ini menyebabkan aliran darah ke setiap jaringan dan akan terjadi penurunan ketegangan otot sehingga nyeri sendi yang dirasakan dapat berkurang bahkan menghilang.

Kompres hangat juga berfungsi untuk melancarkan pembuluh darah sehingga dapat meredakan nyeri dengan mengurangi ketegangan, menurunkan kontraksi otot, meningkatkan aliran darah daerah persendian dan meningkatkan rasa nyaman. Panas dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan sirkulasi darah. Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas yaitu pelebaran pembuluh darah, menurunkan suhu tubuh, menurunkan kekentalan darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan meningkatkan permeabilitas kapiler.

Implementasi hari ketiga dilakukan pada Selasa, 23 November 2021. Hasil evaluasi yang dirasakan klien yaitu tidak ada perubahan nyeri yang dirasakan masih berada di skala 4. Asumsi dari peneliti mengapa tidak terjadi penurunan nyeri karena suhu air pada saat melakukan kompres sudah tidak sesuai standar operasional prosedur yang menyatakan kisaran suhu 35°-40° C. Sehingga, sensasi rasa panas dan hangat tidak tersalurkan dengan baik melalui kulit. Implementasi hari keempat dilakukan pada Rabu, 24 November 2021 dengan menggunakan alat dan bahan serta prosedur tindakan kompres serai hangat sesuai SOP. Hasil evaluasi yang dirasakan klien yaitu terjadi penurunan skala nyeri dari skala 4 menjadi skala 3 dan klien merasa nyaman ketika sudah diberikan kompres serai hangat. Hingga akhir implementasi dilakukan pada Jumat, 26 November 2021, terjadi penurunan skala nyeri hingga ke skala nyeri 1.

Dapat disimpulkan bahwa selama melakukan implementasi sejak hari ke-1 sampai hari ke-6, terdapat penurunan skala nyeri yang signifikan dari skala nyeri 6 (sedang) menjadi skala nyeri 1 (ringan). Hal ini membuktikan bahwa ada efektivitas pemberian terapi nonfarmakologis kompres serai hangat dalam menurunkan intensitas nyeri pada klien dengan gangguan *immobility*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Syafitri (2020) yang menunjukkan kompres serai hangat mampu menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh lansia. Masih sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnawati (2018) yang mengatakan bahwa ada efektivitas terapi kompres serai hangat untuk menurunkan skala nyeri yang dirasakan pada lansia di Posyandu lansia Mawar Indah Dusun Janggan Desa Janggan Kecamatan Pancol Kabupaten Magetan dibuktikan dengan hasil analisis $p(0,00) < \alpha(0,05)$.

Asumsi dari penulis, kompres serai hangat bersifat sebagai pereda nyeri dengan cara merelaksasi otot, ber vasodilatasi dan meningkatkan aliran darah. Hal ini dikarenakan serai mengandung minyak atsiri yang memiliki sensasi rasa pedas dan hangat ketika diberikan pada anggota tubuh yang mengalami nyeri. Sensasi

mereka yang lanjut usia diterangkan dalam al-Qur'an, terutama tentang dari anak

1. Pemberian intervensi kompres serai hangat sudah seharusnya mengikuti standar operasional prosedur yang ada, sehingga hasil yang didapatkan juga sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pemberian intervensi kompres serai hangat bukan hanya menjadi satu-satunya terapi nonfarmakologis yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah nyeri. Tentunya masih banyak intervensi terapi nonfarmakologis yang bisa dijadikan perbandingan dalam menurunkan intensitas nyeri seperti pemberian kompres jahe hangat yang dilakukan oleh Radharani (2020), pemberian kompres parutan jahe merah terhadap nyeri pada lansia yang dilakukan oleh Handayani (2020), pemberian kompres air garam Epsom hangat untuk menurunkan nyeri sendi yang dilakukan oleh Jauhar et al., (2022).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengkajian yang dilakukan pada Tn. N di Desa Pacellekang Dusun Pa'bundukang RW 2 didapatkan bahwa Tn. N mengalami salah satu dari 14 sindrom geriatri yaitu *immobility* yang disebabkan oleh nyeri pada lutut-kakinya yang menyebabkan adanya penurunan mobilitas fisik. Selanjutnya, klien memiliki riwayat jatuh <3 bulan dengan penilaian skala jatuh morse yang membutuhkan pencegahan jatuh sedang. Selain itu, klien memiliki kesulitan untuk melakukan eliminasi fekal akibat ketidakcukupan asupan serat yang dikonsumsi.
2. Diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus Tn. N dengan sindrom geriatrik *immobility* adalah nyeri kronik b/d gangguan muskuloskeletal, gangguan mobilitas fisik b/d nyeri, risiko jatuh dengan faktor risiko usia ≥ 65 tahun dan riwayat jatuh serta risiko konstipasi dengan faktor risiko ketidakcukupan asupan serat
3. Intervensi keperawatan pada kasus Tn.N adalah manajemen nyeri dengan teknik nonfarmakologi kompres serai hangat untuk mengatasi nyeri, dukungan mobilisasi untuk mengatasi masalah gangguan mobilitas fisik, pencegahan jatuh untuk masalah risiko jatuh dan pencegahan konstipasi untuk masalah risiko konstipasi.
4. Implementasi keperawatan pada Tn. N dilakukan selama 6x24 jam untuk mengatasi masalah nyeri dan imobilisasi. Untuk implementasi pencegahan jatuh dan pencegahan konstipasi dilakukan selama 2x24 jam. Semua implementasi telah terlaksana.

5. Evaluasi keperawatan pada Tn. N untuk diagnosa keperawatan nyeri kronik dan gangguan mobilitas fisik, teratasi. Sedangkan untuk diagnosa keperawatan risiko jatuh dan risiko konstipasi tidak terjadi.
6. Hasil pemberian intervensi terapi nonfarmakologis menggunakan kompres serai hangat untuk mengatasi *immobility* dengan masalah nyeri pada Tn. N yang dilakukan selama 6 hari adalah terjadinya penurunan skala nyeri yang signifikan yang mulai terlihat di hari pertama implementasi dari skala nyeri 6 menjadi skala nyeri 5, hingga hari terakhir implementasi menjadi skala nyeri 1. Hal ini membuktikan bahwa kompres serai hangat efektif dalam mengurangi masalah nyeri pada klien *immobility*.

B. Saran

1. Bagi Penulis dan Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya seperti penelitian yang bersifat menindaklanjuti dari intervensi yang telah diberikan

2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya pelayanan kesehatan khususnya dibidang keperawatan untuk memberikan edukasi terkait dengan pemberian kompres serai hangat.

3. Bagi Masyarakat

Lansia atau pasien yang mengalami nyeri sendi diharapkan mampu menerapkan secara mandiri pemberian kompres serai hangat setelah diberikan pelayanan asuhan keperawatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, S. (2019). *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Terapi Kompres Hangat Rebusan Serai untuk Mengurangi Nyeri Pada Ny.L dengan Arthritis Reumathoid Di Jorong Solok Baruah Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam*. STIKES Perintis Padang.
- Affairs, D. of E. and S. (2019). *World Population Ageing 2019*. United Nations.
- Allender, J. ., Rector, C., & Warner, K. . (2010). *Community Health Nursing: Promoting & Protecting The Public's Health*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Amelia, S., & Syafitri, A. R. (2020). *Efektifitas Kompres Hangat Rebusan Air Serai Terhadap PenurunanIntensitas Nyeri Arthritis Reumatoid Pada Lansia di Puskesmas Deli Tua Tahun 2020*.
- Anita, F., Pongantung, H., Ada, P. V., & Hingkam, V. (2018). PENGARUH LATIHAN RANGE OF MOTION TERHADAP RENTANG GERAK SENDI EKSTREMITAS ATAS PADA PASIEN PASCA STROKE DI MAKASSAR. *Journal of Islamic Nursing, Vol. 3 No.*
- Anwar, S., & Barus, R. R. (2020). Pengaruh Kompres Serei Hangat Terhadap Pengurangan Rasa Nyeri pada Penderita Rematik Di Panti Jompo Babussalam NurulHikma Kecamatan Batang Kuis. *Penelitian, Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan, 1 No. 1*, 61–67.
- Collaborators., G. B. of D. (2015). *Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013*. 743–800.
- Damanik, & Hasan. (2019). *Modul Bahan Ajar Keperawatan Gerontik. Bmp.Uki : Smd-36-Kg-Pk-Iv-2019*. Universitas Kristen Indonesia.
- Desmawati. (2019). *Teori Model Konseptual Keperawatan*.
- Devi, S. (2017). *Pengaruh Kompres Hangat Terhadap Penurunan Nyeri Rheumathoid Arthritis*.
- Elmasry, M. A., Mohammad, Z. A. E.-L., Shehat, G. A., & Mohammed.Ghanem, H. (2015). Assessment of Musculoskeletal complications for Immobilized Stroke Patients at Assiut University Hospital. *Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), Volume 4(Issue 6 Ver. V)*.
- Handayani, I. (2020). Pengaruh Kompres Parutan Jahe Merah Terhadap Nyeri Sedni

- pada Lansia Penderita Rheumatoid Arthritis Kecamatan Sendana. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 3 No. 1.
- Hannan, M. (2019). PENGARUH TERAPI KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN NYERI SENDI OSTEOARTHRITIS PADA LANSIA DI POSYANDU LANSIA PUSKESMAS PANDIAN SUMENEP. *Jurnal Kesehatan Wiraraja Medika*, Vol. 1 No.
- Hartwig, & Wilson. (2006). *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. EGC.
- Hidayat, A. A. A., & Uliyah, M. (2016). *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar*. Salemba Medika.
- Isnawati, F. N. I. (2018). *Efektifitas Terapi Kompres Air Hangat Terhadap Intensitas Nyeri Pada Lansia Mawar Indah Dusun Janggan Desa Janggan Kecamatan Pancol Kabupaten Magetan*. STIKES Bakti Husada Mulia Madiun.
- Iversen, M. D., Hammond, A., & Betteridge, N. (2010). *Self-Management of Rheumatic Disease: State of The Art and Futurre Perspective*. 69, 955–963.
- Jauhar, M., Ulisetiani, N., & Widiyati, S. (2022). Studi Literatur : Kompres Air Garam Epsom Hangat Menurunkan Nyeri Sendi pada Klien Arthritis Gout. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 13 No. 1, 284–293.
- Katsīr, I. bin. (2000). *Tafsīr Al-Qur'an Al-Azim*.
- Lestari, L. A. (2018). *PENERAPAN KOMPRES HANGAT REBUSAN SERAI PADA NY. S DENGAN GANGGUAN NYERI KRONIS DI TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Maurer, F. A., & Smith, C. M. (2005). *Community/Public Health Nursing Practice: Health for Families and Populations*. Elsevier Saunders.
- Milana, R., Novlinda, Ardiani, & Andreas. (2020). *SOSIALISASI RISIKO STROKE PADA LANSIA KELURAHAN CILILITAN*.
- Miller, C. A. (2012). *Nursing for Wellness in Older Adults: Theory and Practice*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Mulyonno, & Ahmad, D. M. (2015). Faktor-Faktor Psikologi yang Mempengaruhi Kebahagiaan pada Lanjut Usia Suku Jawa Klaten. *Psikopedagogia*. *Psikopedagogia*, 4 No.1.
- Mutaqin, J. Z. (2017). *LANSIA DALAM AL-QUR'AN KAJIAN TERM (TAFSIR ASY-SYAIKH, AL-KIBAR, AL-AJUZ, ARDZAL AL-UMUR)*. Universitas Islam negeri

Walisongo.

- Nasrullah, D. (2021). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik Edisi I: dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA 2015-2017*. CV. Trans Info Media.
- Nindawi, Susilawati, E. F., & Iszakiyah, N. (2020). Efektifitas Latihan Range Of Motion (ROM) Aktif terhadap Tonus Otot Ekstrimitas bawah dan Rentang Gerak Sendi pada Lansia. *Wiraraja Medika : Jurnal Kesehatan, Vol. 11 No.*
- Nurdiana. (2021). *INTERVENSI KOMPRES HANGAT SERAI PADA LANSIA YANG MENGALAMI SINDROM GERIATRI IMMOBILITY DENGAN MASALAH NYERI*.
- Nursalam. (2015). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika. Salemba Medika.
- Padila. (2013). *Asuhan Keperawatan Penyakit Dalam*. Nuha Medika.
- Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2002). *Health Promotion in Nursing Practice*. Prentice Hall.
- Pinzon, R., & Zalukhu, M. (2016). Nyeri Sentral Pasca Stroke. *Kedokteran Indonesia, NO. 10 TAH*, 560–562.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2006). *Fundamental of Nursing : Concepts, Process, and Practice* (4th ed.). Mosby-Year Book Inc.
- Prasetyo, D. A., Untari, I., & Kusuma, I. (2019). UPAYA MENURUNKAN INTENSITAS NYERI MELALUI KOMPRES SERAI HANGAT PADA ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK. *Media Publikasi Penelitian*.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Situasi Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia*.
- Radharani, R. (2020). Kompres Jahe Hangat dapat Menurunkan Intensitas Nyeri pada Pasien Gout Arthritis. *Jurnal Ilmah Kesehatan Sandi Husada, 9 No 1*.
- Rahardjo, M. (2017). *STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Rusli. (2012). Olahraga Lanjut Usia. *ILARA, 3 No. 1*, 11–19.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- SIKI, T. P. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus

Pusat PPNI.

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2010). *Community and Public Health Nursing (Six ed.)*. Mosby.

Storheim, K., & Zwart, J.-A. (2014). The Global Burden of Disease Study. *Ann Rheum Dis*, 73(6).

Subianto, Sudaryanto, & Wibawa, A. S. (2019). MANAJEMEN LINGKUNGAN: KESELAMATAN DALAM MENGURANGI RISIKO CEDERA PADA ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DENGAN LANSIA. *Jurnal Keperawatan : CARE*, Vol. 9 No.

Surtati, E. (2014). *Menuju Lansia Paripurna*. BKKBN.

Tansumri, A. (2007). *Konsep dan Penatalaksanaan Nyeri*. EGC.

Tim Pokja SDKI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat PPNI.

Tim Pokja SLKI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat PPNI.

Widiantari, R. (2019). *Asuhan Keperawatan Pada Klien Ny.D Dengan Sindrom Geriatri + Anoreksia Di Ruang Rawat Inap Interne Ambun Suri Lantai 3 Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi*. Stikes Perintis Padang.



LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP




Ulfa Wildana Hasan, dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 3 Agustus 1998. Yang merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara dan dilahirkan dari pasangan Bapak Alm. Hasan dan Ibu Ernawati.

Peneliti yang akrab dipanggil Ulfa, mengawali pendidikan di TK Ash-Safaat pada tahun 2003-2004, Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Bontokamase pada tahun 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sungguminasa pada tahun 2010-2013, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pallangga pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di bangku perkuliahan dengan mengambil jurusan S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016-2020. Syukur Alhamdulillah, Peneliti masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan Profesi Ners di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021-2022.

Alhamdulillah, Alhamdulillah rabbil ‘alamin berkat pertolongan Allah swt perjuangan keras yang disertai dengan iringan doa dari kedua orang tua, keluarga, serta rekan-rekan yang membantu peneliti dalam menyelesaikan pendidikan, banyak pelajaran serta pengalaman yang Peneliti petik saat melakukan praktek baik di Rumah Sakit, Puskesmas maupun yang bersentuhan langsung di masyarakat. Salah satu pengalaman serta pembelajaran tersebut, Peneliti berhasil menuang dalam sebuah Tugas Akhir Ners yang berjudul, “**Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia yang Mengalami *Immobility* dengan Masalah Nyeri Menggunakan Intervensi Kompres Serai Hangat di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang.**”

Beberapa pengalaman organisasi yang Peneliti bisa ceritakan yaitu saat masih duduk di bangku SMA, Peneliti sudah aktif dalam beberapa organisasi seperti menjadi Bendahara OSIS pada tahun 2013-2015 dan menjadi Ketua Divisi Bidang

Penelitian dan Pengembangan FK2A pada tahun 2014-2016. Saat memasuki jenjang S1 Keperawatan, Peneliti masih tetap aktif terlibat dalam beberapa organisasi seperti menjadi Anggota Dana dan Usaha HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016-2017, Bendahara Umum HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017-2018 dan menjadi Pengurus DEMA UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018-2019. Kemudian saat melanjutkan pendidikan di Profesi Ners, Peneliti sudah tidak terlalu aktif dalam berorganisasi dikarenakan banyaknya tugas dan praktek yang harus diselesaikan. Sehingga, peneliti ingin lebih fokus dalam melaksanakan pendidikan di Profesi Ners UIN Alauddin Makassar.



RevV_KTI Gerontik_Ulfa Wildana Hasan

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	5%
2	www.scribd.com Internet Source	5%
3	eprints.umpo.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	2%
7	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%
8	janthorahan.blogspot.com Internet Source	1%
9	belajarbiarpintar12.blogspot.com Internet Source	1%

10	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
11	www.dictio.id Internet Source	1 %
12	ejournalwiraraja.com Internet Source	1 %
13	jurnalp3k.com Internet Source	1 %
14	www.slideshare.net Internet Source	1 %
15	alukma.blogspot.com Internet Source	1 %
16	es.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off