

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY "I"
AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI PROGESTERON
ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TAHUN 2023**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Diploma Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
ALAUDDIN
CINDI AOLIA
70400120004
M A K A S S A R

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindi Aolia
Nim : 7400120004
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 11 Juni 2002
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma
Alamat : Jl. Pendidikan Bontolebang, Galesong Utara
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "I" Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar hasil karya tulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Desember 2023

Penyusun

Cindi Aolia

70400120004


PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Cindi Aolia
Nim : 70400120004
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny
"I" Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron
Asetat (DMPA) Dengan Amenorhea Di Puskesmas
Jumpandang Baru Tahun

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, Desember 2023

Pembimbing I



Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb
NIP : 19870924 201903 2012

Pembimbing II



Firdayanti, S.St.T, M.Keb
NIP : 19751113 200604 2001

Diketahui Oleh:

Ketua Prodi Kebidanan,



Anieq mumthi'ah Al kautzar, S.ST., M.Keb
NIP: 198901162019032009

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah berjudul **"Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "I" Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) Dengan Amenorhea Di Puskesmas Jumpang Baru Tahun 2023"**, yang disusun oleh saudari Cindi Aolia, Nim: 70400120004 mahasiswi Program Sru di Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumaidil Akhir 1445 H, Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan pada Jurusan Kebidanan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 29 Desember 2023

DEWAN PENGUJI:

Nomor SK 6298 Tahun 2023

Ketua	:	Dr. dr. Dewi Setiawati., Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	:	Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S. ST., M. Keb	(.....)
Pembimbing i	:	Ferawati Taherong, S. ST., M. Keb	(.....)
Pembimbing II	:	Firdayanti, S. Si. T, M. Keb	(.....)
Penguji I	:	Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha S. Si. T., SKM., M. Keb	(.....)
Penguji II	:	Dr. Nurkhalis A Gaffar, M. Hum	(.....)

Oleh:
Bekas Dekan UIN Alauddin Makassar

Dewi Setiawati., Sp. OG., M. Kes
NIM: 19810621 2006040005

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencan Pada Ny “I” Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) Dengan Amenorhea Di Puskesmas Jumpang Baru Tahun 2023”** Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dijumpai dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian, namun berkat bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga Karya Tulis ini dapat diselesaikan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengarahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
2. Ibunda Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibunda Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Ibunda Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb selaku pembimbing I saya yang telah membimbing, menuntun, dan mendidik serta senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan. Tak pernah berhenti memberikan motivasi kepada penulis sehingga Karya Ilmiah ini bisa selesai.
5. Ibunda Firdayanti, S.Si.T, M.Keb selaku pembimbing II yang telah menuntun, mendidik, mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb selaku penguji I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing

dengan sabar dan ikhlas serta telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah ini.

7. Bapak Dr. Nurkhalis A Gaffar, M.Hum selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah khususnya dibidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan kebidanan.
9. Direktur dan petugas kesehatan Puskesmas Jumpang Baru yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
10. Ucapan yang tak ternilai untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Abdul Muis dan almarhumah Ibunda Hj. Suhartini yang telah berusaha membesarkan, mengasuh, mendidik, dan membina penulis dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah serta kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam shalat beliau untuk penulis dan dukungan serta pengorbanannya yang telah memberikan bantuan dukungan baik secara material maupun moral. Demikian pula kepada seluruh keluarga besar yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga Allah SWT

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.

11. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya Cefa20lin angkatan 2020 serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Meskipun penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna untuk kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata, 29 Desember 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Cindi Aolia
70400120004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntikan DMPA.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Menurut Pandangan Islam.....	51
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	65

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	73
BAB III STUDI KASUS	
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	75
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	82
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	85
D. Langkah IV : Tindakan Segera Atau Kolaborasi.....	91
E. Langkah V : Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	92
F. Langkah VI : Implementasi.....	104
G. Langkah VII : Evaluasi.....	106
H. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP).....	107
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	174
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	185
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	191
D. Langkah IV : Tindakan Segera Atau Kolaborasi.....	196
E. Langkah V : Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	197
F. Langkah VI : Implementasi.....	217
G. Langkah VII : Evaluasi.....	218
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	208
B. Saran.....	211
DAFTAR PUSTAKA.....	217

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang Lalu.....	78
TABEL 2.1 Matriks Kunjungan.....	161



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Surat Keterangan Layak Etik Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru.
Lampiran 2:	Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru.
Lampiran 3:	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
Lampiran 4:	Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Balitbangda Kantor Walikota Makassar.
Lampiran 5:	Surat Permohonan Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Walikota Ke Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Lampiran 6:	Surat Permohonan Izin Penelitian Atau Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Kesehatan Ke Puskesmas Jumpandang Baru.
Lampiran 7:	Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Puskesmas Jumpandang Baru.
Lampiran 8:	Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, NOVEMBER 2023

Cindi Aolia, 70400120004

Pembimbing I : Ferawati Taherong

Pembimbing II : Firdayanti

“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “I” Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) Dengan Amenorhea Di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023”

Menurut WHO jumlah penggunaan KB suntik di seluruh dunia berkisar 455%, di Indonesia tahun 2011 sebesar 46,47%, Sulawesi Selatan tahun 2015 sebanyak 532%, dan di Puskesmas Jumpandang Baru jumlah akseptor KB suntik metode DMPA di 5 kelurahan pada tahun 2021 sebanyak 35,4%, maka pada tahun 2022 sebanyak 30,9% . Masalah yang sering timbul akibat kontrasepsi suntik DMPA yaitu: amenorhea 60%, oligomenore 20%, dan polimenore 20%.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “I” Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) Dengan Amenorhea Di Puskesmas Jumpandang Baru sesuai dengan metode 7 langkah varney dan SOAP.

Studi kasus yang dilakukan pada Ny “I” akseptor lama suntik metode DMPA dengan amenorhea, yaitu dengan melakukan pendekatan, memberikan konseling agar ibu tidak merasa khawatir dengan keadaannya, memantau pola keseimbangan makanan, melakukan pemeriksaan TD, BB, LILA yang dilakukan setiap 1 minggu sebanyak 12 kali kunjungan selama 12 pekan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akseptor KB Suntik DMPA mengalami efek samping yaitu *amenorhea* dan pada pemantauan lanjutan ditemukan efek samping lain berupa *spotting* yang hanya berlangsung 2 hari, kemudian adanya perubahan pada berat badan, merasakan sakit kepala, serta mengalami keputihan yang berlebihan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah telah dilakukan pengumpulan data dasar, identifikasi diagnosa dan tindakan untuk Ny “I” sesuai dengan kasus akseptor lama suntik metode DMPA dengan *amenorrhea*. Ibu tetap melanjutkan pemakaian suntik DMPA untuk 1 tahun kedepan. Hal lain yang penting adalah ibu memahami bahwa Islam menganjurkan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui KB.

Kata Kunci : Akseptor DMPA, Amenorhea, 7 langkah varney

ABSTRACT

DEPARTMENT OF MIDWIFERY

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

ACADEMIC WRITING, NOVEMBER 2023

Name : Cindi Aolia, 70400120004

Supervisor I : Ferawati Taherong

Supervisor II : Firdayanti

“Management OF Family Planning Midwifery Care for Mrs. “I” An Old Acceptor of Depo medroxy Progesterone Acetate (DMPA) Injection Method with Amenorrhea at Community Health Centre (PUSKESMAS) Jumpandang Baru in 2023”

According to WHO, the use of injections for family planning worldwide was around 455%, In Indonesia in 2011, it was 46.47%. In South Sulawesi in 2015, it was 532%, and at Puskesmas Jumpandang Baru, the acceptors of the DMPA Injection Method with Amenorrhea in 5 villages was 35.4% in 2021 and 30.9% in 2022. The effects that often occur of DMPA Injection contraception include *amenorrhea* (60%), *oligomenorrhea* (20%), and *polymenorrhea* (20%).

This research aimed to apply the management of family planning midwifery care for Mrs. "I," an Old Acceptor of Depo Medroxy Progesterone Acetate (DMPA) Injection Method with Amenorrhea by following the 7-step Varney and SOAP methods at Jumpandang Baru Community Health Center (Puskesmas Jumpandang Baru).

The case study of Mrs. "I," an old acceptor of the DMPA injection method with amenorrhea, was carried out by approaching, counseling the mother not to worry about her condition, monitoring her food balance, checking her blood pressure, body weight, and LILA for 12 visits every week and carried out for 12 weeks.

The results of this research revealed that the acceptor of the DMPA injection Method (KB) had suffered side effects, namely *amenorrhea*. In the monitoring, other effects were also found, spots that appeared for two days, body weight changes, the acceptor felt headaches, and got excessive vaginal discharge.

The conclusion was that the primary data had been collected, identification of diagnoses, and actions for Mrs “I” had been carried out based on the acceptor's case of DMPA injection method with amenorrhea. Mrs “I” continued to receive DMPA injections for the following years. She also understood that Islam recommended strengthening family quality through family planning.

Keywords: DMPA acceptor, Amenorrhoea, 7-step Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara non-industri dengan penambahan penduduk yang tinggi. Berdasarkan sebaran Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2017, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 261.890.872 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 131.579.184 jiwa dan perempuan sebanyak 130.311.688 jiwa dengan laju perkembangan penduduk sebesar 1,5% pertahunnya. Perkembangan jumlah penduduk ini tentu akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan Negara (Septiana, 2019: 1).

Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mengalahkan kemajuan pembangunan kependudukan dimulai pada tahun 1968 dengan berdirinya LKBN yang kemudian berubah pada tahun 1970 dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menciptakan keluarga yang ceria serta sejahtera. Penopang serta penguat pengakuan terhadap KB adalah dengan adanya pemberian kontrasepsi (Pratiwi, 2014: 366).

Visi KB Nasional adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas tahun 2015. Keluarga yang berkualitas merupakan keluarga yang sejahtera, sehat, maju,

mandiri, mempunyai jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis serta bertakwa pada Allah swt (Saleha, 2010: 432).

Pemerintah menjabarkan kebijakan Keluarga Berencana (KB) untuk membantu pasangan yang akan segera menikah dalam mengejar pilihan yang dapat mewujudkan hak reproduksi dalam hal: usia kehamilan yang ideal, jumlah untuk memiliki anak yang ideal, serta pemisahan kelahiran ideal. Tertuang pada UU RI No. 52 Tahun 2009 mengenai Peningkatan penduduk dan Pemajuan Keluarga, dengan tujuan mencapai pertumbuhan penduduk yang layak dan keluarga yang berkualitas (Yulianti, 2017: 2).

Kontrasepsi suntik merupakan salah satu jenis kontrasepsi hormonal yang terbagi menjadi dua jenis. yaitu DMPA dan kombinasi. Suntik DMPA mengandung depo medroksi progesterone asetat yang diberikan secara Intramuscular setiap 3 bulan sekali dengan dosis 150 mg/ml. Dampak dari pemakaian suntikan DMPA yaitu gangguan mesnstruasi, penambahan berat badan, kekeringan pada vagina, berkurangnya libido, gangguan pada emosi, sakit kepala, serta menyebabkan timbulnya jerawat. Gangguan menstruasi yang biasanya ditemukan antara lain siklus menstruasi yang memendek/memanjang, perdarahan banyak atau sedikit, perdarahan yang tidak teratur atau bercak (spotting), dan tidak menstruasi sama sekali (amenorhea) (Susilowati, 2011: 2).

DMPA adalah 6- alfa medroksiprogesterone yang bertujuan untuk kontrasepsi parenteral, memiliki efek progesterone yang kuat serta sangat efektif. Mekanisme kerja DMPA yaitu mencegah ovulasi, mengentalkan lendir servik, membuat endometrium menjadi kurang baik untuk berimplantasi dari ovum yang telah dibuahi dan mempercepat transpor ovum didalam tuba fallopi (Setyaningrum, 2008: 152).

Permasalahan yang sering muncul akibat kontrasepsi suntik 3 bulan yaitu: amenorhea 60%, oligomenore 20%, dan polimenore 20%, sedangkan suntikan 1 bulan 85%, dari akseptor KB tidak mengalami permasalahan atau gangguan pada siklus menstruasi (Lesmana, 2012: 94).

Pemberian suntik KB paling sering menyebabkan amenore. Masalah kewanitaan tersebut biasanya tidak permanen dan tidak terlalu mengganggu kesehatan. Amenore bisa terjadi karena berbagai kondisi. Penilaian yang efisien diantaranya riwayat pasti, hasil pemeriksaan pada fisik, serta penilaian hasil laboratorium pada kadar kimia serum yang di pilih pada umumnya dapat mengenali alasan mendasar. Amenore primer menurut definisi merupakan ketidakmampuan untuk mencapai menarche dimana dalam banyak kasus disebabkan akibat dari distorsi kromosom yang mengakibatkan insufisiensi ovarium primer (gangguan *Turner*) atau misalnya kelainan pada fisik (*Miillerian agnesis*). Amenore sekunder, ditandai dengan terhentinya siklus haid normal yang biasa terjadi dalam jangka waktu yang signifikan atau terhentinya siklus

menstruasi yang tidak dapat diprediksi dalam jangka waktu yang lama (6 bulan) (Klein, 2019: 40).

Amenorhea dapat terjadi karena penggunaan alat kontrasepsi suntik yang mengandung DMPA. Menurut penelitian Setyaningrum, ada hubungan antara lama penggunaan suntik KB DMPA dengan siklus haid serta kejadian spotting. Penggunaannya yang lebih lama mengakibatkan darah haid menjadi lebih sedikit bahkan sampai terjadi *amenorhea* (Sety, 2014: 61).

World Health Organization (WHO), memperkirakan ada sekitar 4.000.000 penggunaan KB suntik di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, jumlah KB suntik yang digunakan adalah 30%, di Indonesia KB suntik adalah KB yang paling terkenal. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah DMPA, dimana 61,4% masyarakat Indonesia menggunakan alat kontrasepsi, 31,6% memilih alat kontrasepsi suntik (Selfi, 2013: 2).

Jumlah akseptor KB di Indonesia pada tahun 2011 dari 45.905.815 Pasangan Usia Subur (PUS), sebanyak 34.872.054 (75,96%) menjadi akseptor KB aktif. Jumlah akseptor KB jangka panjang, misalnya IUD hanya sebesar 11,28%, Implant 8,82%, MOW 3,49%, dan jumlah akseptor KB yang paling banyak adalah akseptor KB suntik yaitu sebesar 46,47% (Rahayu, 2017: 33).

Data BKKBN tahun 2018, menyebutkan bahwa sebagian besar akseptor KB aktif memilih suntik dan pil sebagai alat kontrasepsinya dan bahkan lebih dominan (80%) dibandingkan dengan metode lain yaitu, metode suntik

(63,71%) dan pil (17,24%) (Catur Setyorini, 2020: 126). Berdasarkan informasi SDKI terkait penggunaan kontrasepsi, ditemukan bahwa tingkat penggunaan kontrasepsi hormonal suntik meningkat setiap tahunnya, dimana merupakan metode kontrasepsi yang digunakan secara luas, yaitu sekitar setengah (50%) dari seluruh metode yang ada (Yustiari, 2019: 139).

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, pertimbangan keluarga berencana di Makassar pada tahun 2015 menunjukkan bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak dipilih adalah suntik KB sebanyak 53.200 akseptor, Pil KB sebanyak 30.288 akseptor, pemasangan Implant sebanyak 14.709 akseptor, IUD sebanyak 13.492 akseptor, dan kondom sebanyak 5.235 akseptor. Sementara teknik yang paling banyak tidak terpilih adalah MOP sebanyak 614 akseptor, Cut sebanyak 4.354 akseptor (Anieq, 2019: 102).

Berdasarkan informasi di Puskesmas Jumpandang Baru menunjukkan bahwa jumlah akseptor KB suntik metode DMPA di 5 kelurahan (Wala-Walaya, Rappojawa, La'latang, Kalukuang, dan Lakkang) di Tahun 2021 sebanyak 1.959 akseptor (35,4%), maka pada tahun 2022 sebanyak 1.414 akseptor (30,9%).

Berdasarkan informasi diatas, penulis merasa berminat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan *Amenorhea* di Puskesmas Jumpandang Baru.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ibu Akseptor KB Lama Suntik Metode DMPA dengan keluhan *Amenorhea* di Puskesmas Jumpandang Baru dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisis data Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.
- b. Dirumuskannya diagnosa aktual/masalah aktual Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.

- c. Dirumuskannya diagnosa potensial/masalah potensial Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.
- d. Diidentifikasinya perlu tindakan segera dan kolaborasi/emergency Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.
- e. Ditetapkan rencana tindakan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.
- f. Dilaksanakan tindakan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.
- g. Diketuainya hasil tindakan yang telah dilakukan pada Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.

- h. Didokumentasikannya semua tindakan yang telah diberikan pada Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor KB Lama Suntik Metode Depo Medroksiprogesterone Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi untuk para pembuat strategi dan pelaksana program di Puskesmas Jumpandang Baru dalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan program KB.

2. Manfaat Institusi

Sebagai data atau pemikiran bagi mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar dalam melaksanakan asuhan kebidanan keluarga berencana suntik DMPA dengan amenore.

3. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan dijadikan sebagai sumber data serta bahan referensi bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan tersebut merupakan pengalaman logis yang bermakna buat penulis sebab membangun pengetahuan yang sudah ada dan memperkenalkan informasi baru tentang keluarga berencana.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai sumber data serta informasi tambahan untuk para pembacanya mengenai KB.

E. Metode Penulisan

1. Studi Kepustakaan

Peneliti berkonsentrasi pada buku, literature serta media website berkaitan sehubungan tentang keluarga berencana, terutama ibu yang merupakan pengguna lama kontrasepsi suntik DMPA dengan keluhan *amenorhea*.

2. Studi Kasus

Peneliti mengarahkan eksplorasi ini dengan menerapkan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 tahapan, yaitu: Identifikasi data dasar, Identifikasi diagnosa aktual/masalah aktual, Identifikasi diagnosa potensial/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, Implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti memfokuskan pada catatan status pasien terkait pertimbangan dan tindakan yang perlu diterapkan pada akseptor lama kontrasepsi suntik metode DMPA dengan *amenorhea*.

4. Diskusi

Peneliti melaksanakan percakapan terhadap klien, keluarga klien serta berdiskusi dengan dosen baik dilahan maupun diinstitusi sehingga dapat mendukung agar pembuatan karya tulis ilmiah tersebut berjalan dengan lancar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah: Latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan yang semuanya akan dibahas pada bab I pendahuluan.

Tinjauan teoritis yang termuat dalam bab II, nantinya akan memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Umum tentang Keluarga Berencana, Tinjauan Umum tentang Kontrasepsi Suntikan DMPA, Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Menurut Pandangan Islam, Proses Manajemen Asuhan Kebidanan, serta Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).

Pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnose aktual/masalah aktual, identifikasi diagnose potensial/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, dan melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan dibahas mengenai hubungan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu *amenorhea* karena akibat efek samping dari suntik DMPA.

Pada bagian penutup dari bab V, semua informasi dan temuan yang diperoleh dari hasil asuhan akan diberikan kesimpulan serta saran. Selanjutnya adalah daftar pustaka, yaitu daftar literature ilmiah yang sudah dievaluasi serta dimanfaatkan sebagai referensi penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Keluarga Berencana

1. Pengertian tentang Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah sebuah upaya pasangan suami istri guna mengatur jumlah serta jarak kelahiran jarak yang diinginkan. Antisipasi dan perencanaan kehamilan merupakan salah satu contoh upaya tersebut. Standar penting dari KB yaitu untuk mencegah sperma pria menggapai serta membuahi sel telur wanita (fertilisasi) ataupun menghalangi sel telur yang sudah terbuahi agar tidak menempel (berimplimentasi) dan kemudian berkembang didalam rahim (Endang W . E., 2015).

Secara garis besar, keluarga berencana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membatasi jumlah kehamilan sehingga mempengaruhi ibu, anak, ayah dan keluarga yang bersangkutan secara langsung serta tidak membahayakan akibat dari kehamilan tersebut. Dipercaya bahwa pengaturan keluarga yang hati-hati, kehamilan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan sehingga mengakhiri kehamilan dengan aborsi akan terhindarkan (Yulianti, 2017: 14).

Kontrasepsi menurut WHO *Expert Commite* adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk:

- a. Memperoleh objek-objek tertentu
- b. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
- c. Memperoleh kelahiran yang ideal
- d. Mengatur jarak antar kehamilan
- e. Mengontrol perencanaan kelahiran dalam berhubungan intim
- f. Menentukan jumlah anak dalam keluarga

Keluarga Berencana (KB) adalah layanan kesehatan preventif yang sangat mendasar serta penting untuk perempuan, meningkatkan dan memperluas layanan KB adalah upaya untuk mungurangi angka kesakitan dan kematian yang dirasakan para perempuan. Kebanyakan wanita perlu mengambil keputusan mengenai KB yang sulit untuk dipilih, tidak selalu karena jumlah metode yang tersedia terbatas melainkan bisa jadi karena metode tertentu mungkin tidak dapat sesuai dengan pendekatan pengaturan nasional keluarga berencana, kesehatan idividu atau seksualitas wanita serta biaya untuk mendapatkan KB (Frisca, 2013).

Di Indonesia, lembaga yang menaungi program Keluarga Berencana (KB) adalah BKKBN. BKKBN sendiri berdiri tahun 1969. Dengan visi lembaga yaitu keluarga berkualitas 2015 dan misi yang dimiliki BKKBN adalah membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat,

berpendidikan, sejahtera, berketahanan, dan terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitas, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring KB (Novini, 2022: 10).

2. Jenis Akseptor Keluarga Berencana (KB)

a. Akseptor Baru

Pasangan subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat kontrasepsi atau pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kembali salah satu metode atau alat kontrasepsi setelah kehamilannya berakhir (baik kelahiran yang berakhir dengan keguguran, lahir mati, atau lahir hidup) (Hartono, 2004).

b. Akseptor Lama

Pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi tetapi kemudian beralih ke metode atau alat kontrasepsi yang lain atau berpindah-pindah klinik baik dengan metode yang sama maupun metode yang berbeda (Hartono, 2004).

c. Akseptor Aktif (*Current Use-CU*)

Pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan satu metode kontrasepsi (Hartono, 2004).

d. Akseptor Aktif Kembali

Pasangan usia subur (PUS) yang sudah berhenti memakai suatu metode kontrasepsi dalam jangka waktu yang sangat lama atau yang tidak disertai dengan kehamilan dan kembali menggunakan kontrasepsi baik dengan metode yang sama maupun berganti-ganti metode kontrasepsi setelah berhenti atau beristirahat selama tiga bulan berturut-turut dan tidak disertai kehamilan (Hartono, 2004).

3. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi terdiri dari kata “konta” artinya menghalangi atau mencegah dan “konsepsi” yang berarti bertemunya sel telur dan sel sperma yang telah matang, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kehamilan. Tindakan ini bersifat sementara, juga bisa sangat bertahan lama. Kontrasepsi sangat penting untuk layanan kesehatan dalam mencegah kehamilan, dan merupakan hak setiap individu sebagai makhluk seksual (Asia, 2017: 14).

Kontrasepsi adalah berbagai metode ataupun teknik yang dipakai oleh salah satu pihak ataupun keduanya guna menjauhi maupun mencegah terjadinya kehamilan karena bertemunya sel telur dan sel sperma yang telah matang. keuntungannya antara lain menghindari kehamilan yang tidak direncanakan, menurunkan angka kesakitan ibu maupun anak, merencanakan kelahiran sesuai dengan yang diinginkan, dan mencegah kematian ibu dan anak (Elma, 2017: 14).

4. Tujuan Kontrasepsi

a. Tujuan Umum

- 1) Mengupayakan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui kontrasepsi dan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia.
- 2) Menciptakan penduduk yang berkualitas, SDM yang bermutu dan memajukan kesejahteraan keluarga.
- 3) Mengupayakan kesejahteraan ibu dan anak agar memahami standar Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang merupakan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui kontrasepsi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

b. Tujuan Khusus

- 1) Memperluas pemanfaatan alat kontrasepsi dan kesejahteraan keluarga berencana melalui pengendalian jarak kelahiran (Purwoastuti Endang, 2015).
- 2) Menurunkan angka kelahiran untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dibagi menjadi tiga tahap guna melaksanakan pelayanan tersebut antara lain:
 - Tahap penundaan/pencegahan kehamilan, dimana tahap penundaan ditujukan pada PUS yang pasangannya berusia

dibawah 20 tahun dan disarankan untuk menjarangkan kehamilan.

- Masa menjarangkan kehamilan, yaitu antara rentang usia pasangan diantara 20-35 tahun adalah rentang usia terbaik untuk memiliki keturunan sebanyak 2 anak serta jarak antar kehamilan 2-4 tahun, hal tersebut dinamakan dengan istilah catur warga.
- Masa berhenti/berakhirnya kehamilan atau kesuburan, dimana pada masa ini usia pasangan berada di antara 30 tahun, khususnya 35 tahun, lebih baik mengakhiri masa subur setelah mempunyai 2 orang anak (Asia, 2017: 15).

5. Syarat-syarat Kontrasepsi

Menurut (Handayani, 2010) , syarat kontrasepsi adalah:

- 1) Dapat diandalkan serta aman digunakan
- 2) Tidak ada efek samping yang merugikan
- 3) Durasi kerja yang dapat disesuaikan dengan keinginan
- 4) Tidak mengganggu aktivitas seksual
- 5) Tidak memerlukan bantuan medis atau kontrol ketat selama penggunaan
- 6) Cara pemakaian yang sederhana atau tidak rumit
- 7) Terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat umum

6. Faktor-faktor yang Berperan Dalam Pemilihan Kontrasepsi

Menurut Varney, dkk (2006) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih kontrasepsi, yaitu:

a. Faktor Sosial-Budaya

Trend yang pesat berkembang selama ini di tengah-tengah masyarakat tentang jumlah keluarga seperti dampak jumlah keluarga tempat individu tumbuh dan berkembang terhadap individu tersebut, pentingnya memiliki anak laki-laki yang menurut masyarakat merupakan penerus nama keluarga, atau anggapan laki-laki dikatakan jantan apabila seorang memiliki banyak anak dan anggapan bahwa seseorang wanita dikatakan “wanita” apabila ia memberikan anak kepada pasangannya.

b. Faktor Pekerjaan dan Ekonomi

Pengaruh faktor pekerjaan pada pemilihan alat-alat kontrasepsi adalah mengenai kewajiban untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi untuk keperluan pendidikan atau dalam hal baru memulai sebuah usaha. Faktor ini sangat berkaitan dengan peran seorang ayah atau suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya baik untuk menyediakan calon anak-anaknya dengan makanan, pakaian, tempat berlindung, perawatan medis, maupun pendidikan di masa depan.

c. Faktor Agama

Terdapat pembenaran terhadap prinsip-prinsip pembatasan keluarga dan konsep dasar tentang KB oleh semua agama, termasuk islam.

d. Faktor Hukum

Peniadaan semua hambatan hukum untuk pelaksanaan KB. Di Indonesia sendiri, landasan hukum KB diatur dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menyatakan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya untuk mewujudkan keluarga kecil yang dan sejahtera, dan keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur jarak kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. UU ini mendukung program KB sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Pengaturan kehamilan dalam program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi (Irianto 2014).

e. Faktor Fisik

Kondisi-kondisi yang membuat wanita tidak bisa hamil karena alasan kesehatan, usia dan waktu “jam biologis” yang akan habis, gaya

hidup tidak sehat seperti alkoholisme, penyalahgunaan obat, bulimia, anoreksia, dan obesitas atau penggunaan obat-obat teratogenik.

f. Faktor Hubungan

Stabilitas hubungan, masa krisis dan penyesuaian hubungan dengan hadirnya anak. Hubungan yang baik antara suami-istri juga menentukan pemilihan kontrasepsi dengan adanya suami sebagai *decision maker* atau pembuat keputusan di dalam keluarga.

g. Faktor Psikologis

Kebutuhan pasangan untuk memiliki anak untuk dicintai dan mencintai orang tuanya, pemikiran bahwa kehamilan dianggap sebagai bukti bahwa kita dicintai, kemudian adanya keyakinan yang keliru bahwa anak akan menyatukan kembali hubungan yang retak antara pasangan suami istri, dan perasaan takut atau cemas untuk mengasuh dan membesarkan anak karena dianggap sebagai ancaman terhadap gaya hidup yang dijalani orang tua anak.

h. Faktor Kesehatan Saat Ini dan Riwayat Genetik

Adanya keadaan atau kemungkinan munculnya kondisi atau penyakit yang akan atau dapat ditularkan kepada bayi misalnya HIV/AIDS, Tay-sachs, Huntington, anemia sel sabit atau penyakit keturunan lainnya dapat menyebabkan seseorang memutuskan ber-KB.

7. Macam-macam Alat Kontrasepsi

a. Kontrasepsi Sederhana

1) Metode Amenore Laktasi (MAL)

Metode Amenore Laktasi (MAL) merupakan kontrasepsi yang bergantung pada pemberian ASI tanpa makanan atau minuman tambahan selama setengah tahun. Jika digunakan, laktasi bisa dianggap sebagai salah metode KB. Metode ini bekerja dengan membatasi ovulasi dengan asumsi semua aturan berikut terpenuhi, yaitu:

- a) Menyusui secara penuh dengan ≤ 8 menyusui setiap hari
- b) Ibu tidak mendapatkan haid
- c) Usia bayi ≤ 6 bulan

Metode tidak diterapkan jika salah satu standar ini tidak terpenuhi, misalnya, ibu tidak sepenuhnya menyusui, ibu bekerja serta berjauhan dengan anak selama ≥ 6 jam, anak berusia lebih dari setengah tahun atau ibu sudah haid. Yang terbaik adalah mendorong klien memilih satu jenis metode KB lainnya (Lucky Taufik 2015).

2) Metode Kontraspsi Alamiah

Metode kontrasepsi alamiah adalah metode untuk memeriksa kehamilan dengan normal, tanpa memakai alat apapun. Teknik tersebut dikerjakan setelah memastikan masa subur dimana umumnya berlangsung mendekati 14 hari, sebelum siklus haid yang lalu dengan mempertimbangkan umur sperma didalam vagina (48-72 jam), umur sel telur (12-24 jam), dan tidak melakukan hubungan seks sekitar $\geq 7-18$ hari dengan mempertimbangkan masa subur setiap siklusnya. Metode kelender, metode suhu basal (ternal), metode lendir serviks (billing), strategi indikatif, dan sanggama terhalang (koitus interruptus) adalah bentuk-bentuk kontrasepsi alami (Yuhedi, 2015).

3) Merode kelender (ognio-knaus)

Metode kelender (pantang berkala) diciptakan oleh Ognio serta Herman Knaus tahun 1930. Knaus menyatakan bahwa kebanyakan wanita berovulasi pada hari ke-15 sebelum haid berikutnya. Sementara itu, Ognio mengakui ovulasi tidak akan berlangsung pada hari ke-15 sebelum haid.

Siklus menstruasi bulanan 28 hari tidak biasanya dimiliki oleh kebanyakan perempuan. Dengan demikian, permulaan masa subur ditentukan dengan cara mengurangi 18 hari dari siklus haid

terpendek serta berakhirnya masa subur ditentukan dengan mengurangi 11 hari dari siklus haid terpanjang (Lucky Taufik, 2015).

4) Metode Suhu Basal (Ternal)

Jenis kontrasepsi tersebut bergantung pada perubahan tingkat panas dalam tubuh. Perhitungan dibuat dengan memperkirakan suhu basal (perkiraan suhu didasarkan sebelum bangun dari tempat tidur). Alasan ini untuk menentukan jangka waktu ovulasi. Perkiraan waktu tersebut sebaiknya setiap hari dan setelah istirahat yang cukup selama $\pm 3 - 15$ jam namun dalam kondisi istirahat. Penilaian harus dilaksanakan secara oral (3 menit), rektal (1 menit) serta pervaginam. Tingkat panas dalam basal dapat meningkat $0,2 - 0,5^{\circ}\text{C}$ selama ovulasi karena meningkatnya hormon progesteron (Kurnia, 2013).

5) Metode Lendir Serviks (*Billings*)

Teknik pencegahan tersebut bergantung pada perubahan siklus lendir serviks yang berulang-ulang terjadi karena perubahan kadar estrogen. Dalam setiap siklus haid, sel serviks menghasilkan dua jenis lendir serviks, berupa lendir estrogenik dan gestagenik.

- a) Lendir estrogenik tipe E. Lendir semacam ini dibuat pada tahap terakhir menjelang ovulasi serta pada tahap ovulasi.

Sifat-sifat lendir ini bermacam-macam, tipis, seperti air (jernih/bening) dan kekentalan yang rendah, keserbagunaannya luar biasa, ketika dikeringkan akan berbentuk penampakan menyerupai daun pakis (*ferlike patterns, ferning, aborization*).

- b) Lendir gestagenik tipe G. Jenis lendir semacam ini dibuat dalam tahap awal menjelang ovulasi serta sesudah ovulasi. Gambaran lendir ini adalah kental, konsistensi tinggi dan berwarna keruh.

6) Metode Coitus Interuptus/ 'Azl

Kemaluan laki-laki (zakar) dilepaskan terlebih dahulu sebelum menjelang ejakulasi agar sel sperma tidak bisa masuk ke dalam vagina sehingga mencegah terjadinya kehamilan (Sulistyawati, 2013).

Dalam usaha menunda kelahiran anak, bisa dengan 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina). Hukum pemakaian kontrasepsi berupa 'azl yaitu boleh tidak menyebabkan kemandulan secara permanen. Ada sebuah hadits shahih yang membolehkan hukum 'azl, riwayat Muslim dari Jabir:

Islam membolehkan mengatur kelahiran melalui jalan 'azl seperti dalam Hadis yang dijabarkan dari Jabir ra :

فَبَلَّغَ وَسَلَّمَ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
نَبِيِّ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمْ يَنْهَنَا ذَلِكَ

Artinya : "Dari jabir, beliau berkata : Kami pernah melakukan 'azl (Coitus Interruptus) pada zaman Rasulullah saw. Kemudian pada saat itu, kabar tersebut sampai kepada Nabi. berita itu sampai kepada Nabi saw. Namun Nabi saw. Tidak mencegah kami." (HR.Muslim, no. 3634).

Ada juga hadis yang melarang 'azl yaitu hadits riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Artinya: Dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan 'azl kepada wanita yang telah dimerdekakan selain dengan persetujuannya.

Dalam menjelaskan kedua hadits tersebut Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa larangan itu bersifat makruh tanzih (makruh yang cenderung kepada hukum boleh), bukan haram.

ثُمَّ هَذِهِ الْوَحَايِدُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَا

وَرَدَ فِي النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَمَا
 وَرَدَ فِي الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ
 وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْكِرَاهَةِ

Artinya: *Hadits-hadits ini dan yang lainnya digabung dengan maksud bahwa sesungguhnya inti hadits yang melarang 'azl itu diarahkan ke hukum makruh tanzih. Sedangkan hadits yang membolehkan 'azl itu diarahkan bahwa sesungguhnya hukum 'azl tidaklah haram. Dan pemahamannya tidak menjadikan hilangnya hukum makruh 'azl.*

Jadi karena hukum makruh tanzih inilah sebaiknya tidak perlu melakukan 'azl ketika ingin memiliki anak karena mengeluarkan sperma di dalam vagina akan memberi kenikmatan lebih bagi suami istri sehingga terciptalah kepuasan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Septianingrum, 2020: 92-93).

b. Kontrasepsi dengan Alat

1) Kondom

Kondom merupakan selubung/ sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan seperti latex (karet), plastic (vinil) atau bahan alami (produksi hewan) di pasang pada penis pada saat hubungan seksual. Cara kerjanya menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma diujung selubung

karet, hal ini untuk menghalangi tertularnya mikroorganisme IMD serta HIV/AIDS melalui satu pasangan ke pasangan lainnya (Handayani, 2012: 11).

2) Diafragma

Diafragma adalah kup berbentuk bulat cebung terbentuk dari lateks (karet) yang di insersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Cara kerjanya menahan sperma agar tidak mendapat akses, mencapai saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba fallopi) dan sebagai alat tempat spermisida (Handayani, 2012).

3) Spermisida Vaginal

Spermisida vaginal adalah bahan kimia yang digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam genitalia internal (Saifuddin, 2006).

c. Kontrasepsi Hormonal

1) Pil KB

a) Pil Kombinasi

Pil oral kombinasi merupakan pil pencegahan dimana mengandung hormone estrogen dan progesteron yang biasanya diproduksi secara teratur teratur oleh wanita. Pil tersebut dapat mengganggu produksi estrogen dan progesterone yang

biasanya sehingga dapat menghambat produksi FSH dan LH, membuat ovarium dalam keadaan istirahat, akibatnya menghambat proses *realizing factor* dalam otak sehingga menghambat terjadinya ovulasi. Oleh karena itu, progesteron membuat leher rahim menebal dan menyulitkan spermatozoa untuk masuk, sehingga endometrium menjadi tidak responsif untuk implantasi blastosis (Kurniawati, 2015).

b) Mini Pil

Kontrasepsi mini pil sangat sesuai bagi ibu menyusui jika perlu menggunakan pil kontrasepsi, cocok digunakan selama menyusui, memiliki dosis yang rendah, tidak mengurangi jumlah produksi ASI, tidak menimbulkan dampak estrogen, dampak utama diantaranya masalah perdarahan berupa flek, atau perdarahan tidak alternatif. KB mini pil dibedakan ke dalam 2 macam, diantaranya satu paket berisi 35 pil mengandung 300 μg noretindron, serta satu paket berisi 28 pil yang mengandung 75 μg desogesteral. KB mini pil terbilang efektif (98,5%), dalam penggunaan mini pil tidak boleh lupa atau terlewatkan satu tablet pun, tablet dikonsumsi secara bersamaan (sekitar malam hari), dimana hubungan intim

hendaknya dilaksanakan 3 – 20 jam sesudah menggunakan mini pil dari biasanya (Prawihardjo, 2014).

2) Kontrasepsi Suntik

a) KB suntik yang mengandung hormon estrogen dan progesterone dikenal sebagai kontrasepsi suntik kombinasi. Pemakaian KB suntik berpengaruh pada pusat saraf (hipotalamus) serta hipofisis yang menyebabkan penurunan FSH dan LH sehingga tidak terjadinya ovulasi. Pemakaian kontrasepsi dapat mengentalkan lendir serviks sehingga jalan masuk sperma menjadi terhambat, mengganggu implantasi karena adanya perubahan endometrium dan menekan transportasi pada gamet tuba.

b) Kontrasepsi suntik hormon progestin hanya mengandung hormon progesterone saja. KB ini sangatlah ampuh, aman dan bisa dipakai oleh semua wanita usia subur. Meskipun tidak mencegah produksi ASI, KB ini juga sangat cocok untuk ibu menyusui. Namun datangnya kesuburan membutuhkan waktu rata-rata 4 bulan (Lucky Taufik, 2015).

3) Implant/susuk

Implant adalah metode kontrasepsi yang menggunakan dua buah implan seukuran batang korek api yang dimasukkan di bawah

kulit pada lengan atas. Implan merupakan batang kecil mengandung hormon yang dibuat dari plastik lentur (fleksibel). Seperti halnya KB pil, implan secara terus mengeluarkan sebagian kecil hormon selama 3 tahun. Dengan asumsi dua atau tiga kali pemakaian, implan dapat dilepas sehingga wanita yang menggunakan kontrasepsi tersebut akan menjadi subur kembali setelah 1 bulan berikutnya (Maritalia Dewi, 2012).

d. Kontraspsi Non Hormonal

1) AKDR/ IUD

AKDR atau biasa di sebut juga dengan KB spiral merupakan sebuah alat kontrasepsi kehamilan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita. IUD berdampak pada pertumbuhan dan daya tahan sel sperma dalam di rahim dengan tujuan agar sel sperma tidak bisa sampai ke sel telur untuk membuahnya. IUD dapat merubah *endometrium* sehingga tidak baik untuk kehamilan dan pertumbuhan janin. Efektivitas IUD sebanyak 98%, secara praktis setara dengan KB pil. Dengan asumsi bahwa 1 hari atau 3 hari menginginkan terjadinya kehamilan, IUD bisa segera dilepas. Kesuburan bisa diperoleh kembali segera sesudah IUD dilepaskan (Maritalia Dewi, 2012).

2) Kontrasepsi Mantap

a) Tubektomi

Tubektomi adalah suatu tindakan pembedahan yang disengaja untuk mengakhiri kesuburan seorang wanita untuk selamanya dengan cara menyumbat tuba fallopi (mengikat serta memutuskan atau memasang cincin), agar sel sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur (Handayani, 2012: 15).

b) Vasektomi

Vasektomi merupakan suatu tindakan medis untuk mengakhiri konsepsi pria dengan cara menghambat keluarnya oklusi vasa deferensia sehingga perkembangan transpor sperma terganggu dan proses fertilisasi (pertemuan dengan ovum) tidak terjadi (Handayani, 2012: 15).

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntikan DMPA

1. Pengertian Kontrasepsi Suntikan DMPA


Kontrasepsi suntik DMPA adalah KB suntik yang hanya mengandung hormon progesterone saja. Jenis kontrasepsi ini sangat ampuh, aman serta bisa digunakan oleh semua wanita usia reproduksi. KB ini sangat sesuai pada ibu menyusui karena tidak menghambat produksi ASI. Namun, datangnya masa subur membutuhkan jangka waktu sangat lama, tepatnya 4 bulan (Yuhedi, 2015).

Kontrasepsi suntikan DMPA adalah kontrasepsi hormonal yang berisi komponen progesterone yang diberi secara Intramuscular (IM) pada muskulus gluteus maximus (bokong) dalam jangka waktu 12 minggu, mengandung 3 ml jika menggunakan spuit 3 ml dengan dosis 150 mg (Wanti, 2012: 21).

KB suntik adalah jenis kontrasepsi yang berbentuk cairan dimana mengandung hormon progesterone kemudian disuntikkan ke dalam tubuh wanita secara berkala (3 bulan), jenis suntik 3 bulan adalah DMPA, yang diberikan 3 bulan sekali secara IM dengan dosis 150 mg (Astuti, 2015).

Akseptor KB suntik dikatakan baru adalah dengan masa pemakaian kontrasepsi suntik selama 0-3 bulan atau 1-2 kali suntik, pemakaian sedang selama >3 bulan – 1 tahun, pemakaian lama selama >1 – 5 tahun. Pemakaian kontrasepsi DMPA yang lebih dari 1 tahun, akan sering menimbulkan efek samping yaitu amenorea. Hal itu disebabkan karena hormon yang terdapat di dalam kontrasepsi DMPA hanya terdapat progestin saja sehingga terjadi ketidak seimbangan hormon esterogen dan progesterone (Juniastuti et al, 2023: 100).

2. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Suntik DMPA



- 1) Mencegah ovulasi, bekerja dengan menghalangi pengeluaran FSH dan LH sehingga tidak terjadi pelepasan ovum.
- 2) Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, karena sperma sulit menembus kanalis servikalis.
- 3) Perubahan pada endometrium sehingga implantasi terganggu
- 4) Membuat selaput rahim tipis dan antropi
- 5) Menghambat transportasi gamet karena terjadi perubahan peristaltic tuba fallopi (Septiana, 2019: 15).

3. Efektifitas Kontrasepsi DMPA

Kontrasepsi suntik tersebut memiliki efektivitas yang tinggi 0,3 kehamilan per 100 wanita per tahun, asalkan penyuntikannya dilakukan secara konsisten sesuai jadwal yang telah ditentukan (Wanti, 2012: 22).

4. Indikasi dan Kontraindikasi Kontrasepsi DMPA

a. Indikasi

- 1) Dalam usia masa subur
- 2) Menyusui dan memerlukan KB yang pas/cocok
- 3) Membutuhkan KB dalam jangka waktu yang lama serta mempunyai viabilitas tinggi
- 4) Nulipara atau wanita yang sudah mempunyai anak
- 5) Sesudah mengandung anak dan tidak menyusui
- 6) Sesudah abortus
- 7) Memiliki banyak anak, namun tidak memerlukan tubektomi
- 8) TD < 180/100 mmHg, dengan masalah pembekuan darah atau anemia
- 9) Tidak bisa memakai kontrasepsi yang memiliki kandungan estrogen
- 10) Sering lalai menggunakan pil kontrasepsi (Nurhayati, 2013).

b. Kontraindikasi

- 1) Mengalami kehamilan atau dicurigai hamil
- 2) Terjadinya perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya
- 3) Ketidakmampuan untuk menerima adanya gangguan menstruasi, khususnya amenorea
- 4) Penderita kanker payudara maupun memiliki riwayat kanker payudara
- 5) Diabetes mellitus dengan berbagai komplikasi (Nurhayati, 2013).

5. Keuntungan Kontrasepsi DMPA

- a. Sangat efektif
- b. Tidak berdampak terhadap hubungan pasangan
- c. Tidak mengandung estrogen, akibatnya tidak terlalu mempengaruhi penyakit jantung, serta masalah pembekuan darah
- d. Tidak berdampak pada produksi ASI
- e. Ibu tidak usah menyimpan obat suntik
- f. Bisa dipakai wanita yang berusia >35 tahun hingga perimenopause
- g. Mencegah berkembangnya kanker endometrium serta kehamilan ektopik
- h. Mengurangi terjadinya penyakit payudara (Septiana, 2019: 17).

6. Kekurangan

- 1) Sering ditemukan gangguan haid
 - a) Siklus haid yang memendek atau memanjang
 - b) Perdarahan yang banyak atau sedikit
 - c) Perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak (spotting)
 - d) Tidak haid sama sekali
- 2) Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan (harus kembali untuk disuntik)
- 3) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikut
- 4) Penambahan berat badan ± 2 kg merupakan hal biasa
- 5) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B virus, atau infeksi virus HIV
- 6) Penundaan untuk kembali subur setelah penghentian penggunaan. Hal ini terjadi karena obat suntik belum keluar dari deponya (tempat suntikan)
- 7) Pemakai jangka panjang dapat mengakibatkan kepadatan tulang berkurang
- 8) Pemakaian jangka panjang menyebabkan vagina mengalami kekeringan, berkurangnya nafsu seksual, masalah emosi, sakit kepala (migran), ketakutan serta jerawat (Affandi, 2012).

7. Cara penggunaan

Kontrasepsi suntik DMPA disuntikkan secara IM pada bokong setiap 3 bulan sekali. Dengan asumsi suntik yang dilakukan terlampaui dangkal, maka keberhasilan KB menjadi melambat sehingga tidak akan langsung berhasil. Suntik diberikan 90 hari atau diberikan setiap 12 minggu. Kemudian bersihkan kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol yang menyerap *etil/isopropyl* alkohol 60-90%, biarkan kulit mengering sebelum disuntik. Setelah kulit kering baru disuntik, kocok dengan baik, jauhkan dari terjadinya gelembung-gelembung udara. Kontrasepsi suntik tidak perlu disimpan dipendingin. Bila terdapat endapan putih di bagian bawah/dasar ampul, cobalah menghilangkannya dengan menghangatkannya (Afandi, 2013).

Penggunaan DMPA dalam jangka panjang akan mempengaruhi estradiol sehingga kadarnya bisa lebih rendah atau berada pada kisaran kadar pada fase folikuler awal. Setelah obat habis di dalam tubuh, ovulasi dan pembuahan dapat terjadi dan endometrium dapat kembali ke fungsi normal (Taherong et al. 2021: 475).

8. Waktu Pemberian Kontrasepsi DMPA

- a. Setiap saat selama siklus haid, asal ibu tersebut tidak hamil
- b. Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid

- c. Pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama dapat diberikan setiap saat, asalkan saja ibu tersebut tidak hamil. Selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual.
- d. Ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan. Bila ibu telah menggunakan kontrasepsi hormonal sebelumnya secara benar, dan ibu tersebut tidak hamil, suntikan pertama dapat segera diberikan. Tidak perlu menunggu sampai haid berikutnya datang.
- e. Bila ibu sedang menggunakan metode kontrasepsi jenis lain dan ingin menggantinya dengan jenis kontrasepsi suntikan yang lain lagi, kontrasepsi suntikan yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi suntikan yang sebelumnya.
- f. Ibu yang menggunakan kontrasepsi non hormonal dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama kontrasepsi hormonal yang akan diberikan dapat segera diberikan, asal saja ibu tersebut tidak hamil. Dan pemberiannya tidak perlu menunggu haid berikutnya datang. Bila ibu disuntik setelah hari ke-7 haid maka ibu tersebut selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual.
- g. Ibu ingin menggantikan AKDR dengan kontrasepsi hormonal. Suntikan pertama dapat diberikan pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus

haid, atau dapat diberikan setiap saat setelah hari ke-7 siklus haid, jika yakin ibu tersebut tidak hamil.

- h. Ibu tidak haid atau perdarahan tidak teratur. Suntikan pertama dapat diberikan setiap saat, asal saja ibu tersebut tidak hamil, dan selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual (Sarwono, 2005).

9. Efek Samping

a. Amenorhea

1) Pengertian Amenorhea

Berhentinya siklus menstruasi seorang wanita secara total atau tidak biasa selama masa subur dikenal sebagai amenorhea. Terdapat 3 keadaan amenorhea dipandang sebagai hal yang fisiologis: pada saat hamil, menyusui serta menopause. Terlepas dari itu, amenorhea adalah tidak datangnya haid selama tidak kurang dari 3 bulan berturut-turut (90 hari) berturut-turut diakibatkan oleh kandungan hormone progesterone didalam KB suntik (Asia, 2017: 27).

Amenorhea digolongkan menjadi primer dan sekunder pada saat *menarche*, amenorhea primer ditandai apabila *menarche* tidak berlangsung saat berusia 16 tahun pada seorang wanita muda disertai perubahan seksual sekunder yang sempurna. Amenorhea

tergolong sekunder apabila haidnya hilang hingga 6 bulan berurutan pada remaja putri dengan haid yang normal (Yulianti, 2017: 26).

2) Pengaruh KB suntik DMPA terhadap Amenorhea

Amenorhea dapat terjadi karena adanya hormon progesterone seperti DMPA sehingga menimbulkan umpan balik pada ovarium, hipotalamus dan hipofisis mengakibatkan tidak ada FSH yang dihasilkan sehingga tidak dapat menggerakkan ovarium pada proses *steroidogenesis* dan *oogenesis*, akibatnya perkembangan estrogen dan endogen (E2) sangat sedikit sehingga tidak terjadi pembesaran endometrium. Oleh karena itu, haid tidak terjadi dan cenderung disimpulkan bahwa jangka waktu penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan mempunyai dampak *amenorhea* (Asia, 2017: 28).


KB suntik DMPA menyebabkan berkurangnya perdarahan secara progresif di setiap siklus haid. Siklus menstruasi berakhir atau amenorhea terjadi jika suntik ini digunakan jika lebih dari 2 tahun. Kadar estrogen yang menurun dapat menghalangi perkembangan endometrium. Kondisi *hipoestrogen* yang terus berlangsung membuat endometrium jadi dangkal dan *atrofi* dengan kelenjar hingg menyebabkan menganggur. Penggunaan dalam jangka waktu yang sangat lama bisa menurunkan endometrium hingga hanya sebagian jaringan yang tidak ditemukan saat dilakukan biopsy, mengakibatkan

terjadinya amenorhea. Namun kondisi ini, bisa kembali normal sekitar kurang waktu 90 hari sesudah suntik DMPA yang sebelumnya (Trisnawati, dkk. 2014: 51-52).

3) Etiologi

Amenorhea adalah keadaan ketika menstruasi berhenti sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Etiologi *amenorhea* antara lain adanya kelainan kongenital, kelainan genetik, gangguan gizi, laktasi yang berkaitan pada pemberian ASI eksklusif (metode *amenorhea* laktasi), tumor. Selain itu *amenorhea* bisa terjadi jika kehamilan, menopause, pemakaian kontrasepsi hormon, stress emosional, obesitas dan adanya gangguan sistem endokrin (Handayani, dkk. 2014: 51).

4) Fisiologi Menstruasi



Gambar 1.1 proses terjadinya menstruasi

(Sumber: <https://images.app.goo.gl/gCgczMN2hjSyodvp7>)

Pada awal siklus, kelenjar di dalam otak kemudian melepaskan hormone yang disebut *Follicle Stimulating Hormone (FSH)* ke dalam sistem peredaran darah, membuat sel telur menjadi lebih cepat tumbuh dibandingkan sel telur yang lain dan mendominasi sampai mereka memulai kembali untuk menghasilkan hormon estrogen dimana disalurkan ke dalam sistem peredaran darah.

Hormone estrogen serta hormone FSH membantu sel telur yang lebih menonjol untuk berkembang dan selanjutnya memberikan sinyal pada uterus agar bersiap membuahi ovum. Selain itu, hormone estrogen membantu produksi sperma berhubungan seks dengan menciptakan lebih banyak cairan/lendir divagina. Pada saat sel telur telah berkembang, suatu hormone dikeluarkan dari otak kecil yang biasanya disebut *Luteinizing Hormone (LH)*. Hormone tersebut menyebabkan sel telur yang sudah matang bergerak dari ovarium ke tuba fallopi ketika sel telur tersebut dilepaskan dalam jumlah yang banyak.

pada saat sperma memasuki tuba fallopi, kemungkinan besar sel telur sedang dipersiapkan saat pembuahan. Dibutuhkan beberapa hari bagi sel telur yang telah disiapkan untuk mencapai rahim melalui tuba fallopi sebelum akhirnya menempel pada rahim. Kemudian sel telur akan terpisah dan menghasilkan hormone *Human Chorionic*

Gonadotropin (HCG). Hormone ini membantu perkembangan di dalam rahim. Apabila sel telur yang sudah dikeluarkan tidak dibuahi, akibatnya endometrium akan membusuk dan terjadilah siklus haid.

Cara kerja KB suntik depo progestin adalah kandungan perogestin didalam sirkulasi darah sangat meningkat hingga menyebabkan kadar FSH dan LH berkurang maka tidak menimbulkan lonjakan LH. Dalam kondisi tertentu, terjadinya kenaikan sekresi LH dalam siklus, yang mengakibatkan keluarnya sel telur dari folikel. Sementara itu, berkurangnya kadar LH tidak menyebabkan terjadinya lonjakan di folikel dan pembentukan sel telur pun menjadi berkurang akibatnya sel telur tidak dapat dikeluarkan dari folikel dan ovulasi tidak terjadi.

Begitu pula dengan kandungan hormone progesterone yang menghambat perubahan fisiologis pada endometrium yang memperlambat kadar FSH serta LH, walaupun produksi progesterone terjadi di korpus luteum, namun hal ini membuat endometrium dalam kondisi istirahat akibatnya terjadi pembusukan (atropi) hingga mengakibatkan terhambatnya proses produksi.

b. Perubahan Berat Badan

Perubahan berat badan merupakan salah satu efek yang sering dikeluhkan pada akseptor KB suntik. Gejala dan keluhan yang dialami yaitu berat badan bertambah, kenaikan berat rata-rata 3 kg tiap tahun.

Kenaikan berat badan kemungkinan terjadi disebabkan Karena hormon progesterone mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunnya aktifitas fisik, akibatnya dapat menyebabkan berat badan bertambah (Farida, 2017).

c. Hematoma

Hematoma adalah bengkak pada bekas suntik dan bewarna biru pucat disertai rasa sakit di daerah suntik karena kebocoran/perdarahan di bawah kulit dan bisa juga karena penggunaan jarum suntik yang berulang atau kesalahan teknik suntik (Marfuah, 2012).

d. Spotting

Spotting merupakan pengeluaran flek di luar siklus menstruasi yang terjadi pada saat akseptor sedang mengikuti program keluarga berencana. Suntik DMPA umumnya menyebabkan ketidakseimbangan hormonal, khususnya peningkatan hormone progesterone sementara estrogen menurun. Menurutnya estrogen menghambat perkembangan folikel serta mencegah penebalan pada dinding endometrium, menyebabkan keluarnya flek dengan jangka waktu yang panjang (Suratun, 2013).

e. Metrorrhagie

Metrorrhagie merupakan perdarahan berlebihan diluar periode menstruasi. Perdarahan ini bisa terjadi karena rendahnya kadar hormone estrogen sementara hormone progesterone masih dalam tahap pembentukan. Selama menstruasi dan pembentukan korpus luteum, ovulasi tidak terjadi karena kerja keras folikel yang tidak pecah. Pada keadaan tertentu, terjadi hiperplasia endometrium atau endometrium mengalami penebalan, menyebabkan perdarahan yang ekstrim di luar siklus bulanan. Biasanya pengguna kontrasepsi suntik DMPA dapat merasakan metrorrhagie pada masa awal-awal penggunaan, hal ini sebagai komponen dari adaptasi diri kepada hormone (Suratun, 2013).

f. Menometorrhagie

Menometorrhagie yaitu munculnya jumlah darah menstruasi yang berlebihan namun pada saat yang sama masih dalam periode menstruasi. *Menometorrhagie* terjadi karena ketidakseimbangan hormonal. Secara umum, akseptor kontrasepsi suntik DMPA akan merasakan ini pada awal-awal pemakaian, yaitu sebagai komponen/mechanisme penyesuaian diri terhadap hormone (Suratun, 2013).

g. Sakit Kepala

Sakit kepala sebelah atau migrain yaitu hanya mengenai satu sisi kepala, atau seluruh kepala. Tingkat sakit kepala pada akseptor DMPA terjadi pada sekitar 1-17%, hal ini karena meningkatnya hormone progesterone yang memberikan pengaruh pada sirkulasi darah diantaranya pembuluh darah vena yang bergerak ke saraf, mengakibatkan masalah sakit kepala (Ayu, 2014).

h. Keputihan

Efek samping dan keluhan: keluarnya cairan putih yang berlebih dari vagina dan mengganggu. Hal tersebut biasanya jarang ditemukan, tidak beresiko jika mengeluarkan bau, terasa panas maupun mengganggu, penilaian yang menyeluruh dapat menentukan kemungkinannya ada penyakit/infeksi, parasit atau kandida (Suratun, 2013).

i. Hiperpigmentasi

Kontrasepsi suntik DMPA dapat menyebabkan hiperpigmentasi disekitar daerah wajah. Hal tersebut didasarkan pemakaian alat kb suntik dalam jangka waktu yang cukup panjang sekitar ≥ 2 tahun, menyebabkan hormone progesterone menumpuk didalam tubuh hingga berdampak pada terjadinya hiperpigmentasi di daerah wajah (Firdayanti, 2012).

j. Risiko penurunan densitas mineral tulang

Disamping menekan ovulasi, kontrasepsi suntik DMPA dapat menurunkan pembentukan estradiol ovarium sehingga menyebabkan berkurangnya ketebalan (densitas) tulang.

k. Galaktorea

Pada DMPA tidak ditemukan efek terhadap laktasi, malah mungkin dapat memperbaiki kuantitas ASI (memperbanyak produksi ASI), DMPA tidak merubah komposisi ASI.

10. Penatalaksanaan

a. Amenorea

1) Konseling

a) Menjelaskan alasan terjadinya *amenorea*

b) Memberitahukan bahwa efek samping atau keluhan ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh, sifatnya hanya sebentar dan bersifat perorangan.

c) Menyarankan klien untuk tetap menggunakan kb suntik DMPA (Firdayanti, 2012).

2) Tindakan medis

a) Tindakan yang diambil adalah memberi pengarahan/penyuluhan kepada pengguna suntik DMPA.

- b) Jika ibu tidak dapat menerima masalahnya, suntikan jangan diteruskan, sarankan penggunaan alat kontrasepsi lain.
- c) Direncanakan pemberian pil KB 3×1 tablet mulai hari III, 1×1 tablet pada hari ke IV sampai 4-5 hari (Firdayanti, 2012).

b. Perubahan Berat Badan

1) Konseling

- a) Memberikan penjelasan penyebab perubahan BB agar klien tidak memiliki kecemasan terhadap keadaan yang dialami. Kenaikan BB sifatnya hanya sebentar serta individual tidak dialami oleh semua akseptor suntik DMPA, bergantung pada respon setiap tubuh terhadap metabolisme progesterone.
- b) Menjelaskan efek samping atau keluhan tersebut adalah hal biasa ditimbulkan oleh hormon yang terkandung dalam suntik DMPA.
- c) Menghimbau klien untuk tetap menggunakan kontrasepsi suntik (Firdayanti, 2012).

2) Tindakan Medis

- a) Tindakan yang akan dilaksanakan yaitu memberi bimbingan kepada pengguna kontrasepsi suntik.
- b) Menganjurkan untuk mengatur pola makan serta aktivitas relative untuk mengimbangi BB.

c) Apabila ibu tidak dapat menerima keadaannya, maka jangan melanjutkan pemberian suntikan, sarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain (Firdayanti, 2012).

c. Hematoma

1) Konseling

Memberitahukan pada calon akseptor tentang dampak yang mungkin terjadi (Nur Qadariyah, 2012).

2) Pengobatan

Menganjurkan ibu untuk kompres dingin pada area yang membiru selama kurang lebih 2 hari, lalu ganti dengan kompres yang hangat samapi rona biru atau kuning menghilang (Marfuah, 2012).

d. Spotting

1) Konseling

Informasikan bahwa perdarahan ringan sering dijumpai, tetapi hal ini bukanlah masalah serius, dan biasanya tidak memerlukan pengobatan. Bila klien tidak dapat menerima perdarahan tersebut dan ingin melanjutkan suntikan, maka dapat disarankan 2 pilihan pengobatan (Asia, 2017: 25).

2) Pengobatan

Menjelaskan untuk satu siklus pil KB kombinasinya yaitu (30-35 μ g *etinilestradiol*), ibuprofen (800 mg, 3×/hari selama 5 hari), serta

jenis obat yang lainnya. Perlu diingatkan setelah diberikan pil KB kombinasi dapat menyebabkan bercak. Dengan asumsi mengakibatkan perdarahan berat pada penggunaan suntik, maka diobat dengan pemberian 2 tablet pil kontrasepsi kombinasi/hari selama 3-7 hari diikuti dengan 1 siklus pil kontrasepsi hormonal atau pemberian 50 μg *etinilestradiol* atau 1,25 mg *estrogen equin konjugasi* selama 14-21 hari (Affandi, 2012).

e. Sakit kepala

1) Konseling

Memberikan edukasi pada klien bahwasanya dampak ini kemungkinan terjadi atau jarang serta berlangsung secara singkat (Asia, 2017: 26).

2) Pengobatan

Memberikan asam mefenamat 500 mg 3 \times 1 agar dapat mengurangi keluhan klien (Nur Qadariyah, 2012: 23).

f. Keputihan

1) Konseling

Menjelaskan kepada akseptor bahwa kontrasepsi suntikan jarang terjadi keputihan. Bila hal ini terjadi juga harus dicari penyebabnya dan segera diberikan pengobatan (Nur Qadariyah, 2012: 22).

2) Pengobatan

Pengobatan medis biasanya tidak diperlukan pada kasus dimana cairan berlebihan dapat diberikan preparat anti cholonergis seperti extra belladonna 10 mg dosis 2×1 tablet untuk mengurangi cairan yang berlebihan, perubahan warna dan biasanya disebabkan oleh adanya infeksi (Nur Qadariyah, 2012: 22).

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Menurut Pandangan Islam

KB merupakan inisiatif dimana didukung oleh pemerintah yang kelayakannya masih jauh dari kebenaran didalam Islam. Faktanya kelompok-kelompok Islam yang berlebihan pun beranggapan KB sebagai dakwah orientalisme sehingga umat Islam tidak berkembang jumlahnya dan semakin kokoh serta menantang untuk diatasi. Oleh karena itu, tidak sedikit umat Islam beranggapan KB sebagai sesuatu yang diharam dalam bentuk apa pun (Yulianti, 2017: 30).

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacukan dan memperbudak wajah Islam dan umat Islam. Seperti banyak umat Islam yang berada pada kebodohan, kemiskinan dan kemeralatan. Diantara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia yang semakin banyak tanpa diiringi dengan kualitas. Sehingga negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendidikan,

pekerjaan dan kesehatan masyarakatnya. Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun psikis, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak-anak terjamin sampai hari tuanya (Handayani, 2012: 24).

Dalam sejarah Islam tasawuf mengacu pada perilaku Rasulullah Muhammad Saw dan sahabat-sahabatnya. Apabila merujuk dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dijadikan dasar untuk menjalani hidup sebagai sufi, antara lain bahwa Allah itu dekat dengan manusia (Q.S. Al-Baqarah/2: 86) dan Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat nadi manusia itu sendiri (Q.S. Qaf/50: 16) (Ghaffar, 2015).

Al-Qur'an serta Hadits adalah sebuah peraturan Islam sebagai kaidah kehidupan umat Islam yang dengan tegas membatasi atau mengatur untuk terlaksananya KB. Selanjutnya, pengaturan KB seharusnya disesuaikan berdasarkan standar hukum Islam (*qaidah fiqhiyah*). Selain diarahkan oleh standar hukum Islam yang disebutkan diatas, umat Islam juga bisa mencari berbagai bait ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tanda-tanda bahwasanya Islam memperbolehkan bagi para umatnya untuk ber-KB. Seperti halnya hukum pernikahan muslim, hukum keluarga berencana dapat berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Bagaimanapun, hukum mubah tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan masing-masing umat Islam yang bersangkutan dan terlebih lagi dengan mempertimbangkan

perubahan zaman/waktu, tempat dan kondisi masyarakat atau negara (Thahir, 2013).

Kontrasepsi dalam bahasa arab memiliki dua makna yaitu *tahdidun nasli* dan *tandzimun nasli*. *Tahdidun nasli* berarti membatasi keturunan atau membatasi kehamilan yang mana disini hukumnya diharamkan, sedangkan *tandzimun nasli* artinya menunda keturunan atau menunda kehamilan dan keberadaan hukumnya diperbolehkan. Membatasi kehamilan berarti mencegah untuk selama-lamanya tidak memiliki keturunan (permanen) atau sering dikenal dengan sebutan operasi vasektomi/tobektomi dan hal ini hukumnya sangat diperjelas yakni diharamkan oleh semua ulama begitupun haram menurut Sunnah Nabi karena di anggap mendahului kehendak/takdir Allah SWT. Baik membatasi kehamilan dengan cara mensterilisasi rahim, pengangkatan rahim, pemotongan saluran sperma agar tidak membuahi sel telur dan sebagainya yang bersifat pemandulan permanen tanpa sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Karena dengan keadaan begini manusia akan lebih mudah terjebak dalam perangkap setan dan dapat terjerumus kedalam dosa besar seperti terjebak kedalam zina.

Selain menambah hasrat nafsu pria dan wanita pemandulan juga dapat menimbulkan rasa aman dalam diri manusia dari kehamilan sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan seks dengan wanita atau pria lain yang jelas-jelas bukan muhrimnya. Kecuali pada keadaan dimana wanita dalam keadaan

dzorurot atau adanya udzur syar'i yang mewajibkan wanita tersebut harus mengangkat rahimnya (operasi tobektomi) karena di khawatirkan jika tidak dilakukan hal tersebut akan membahayakan nyawanya seperti adanya kista yang membahayakan dalam rahim, kanker rahim dan lain sebagainya, maka hal ini diperbolehkan atau bahkan diwajibkan didalam syari'at. Dan jika pemakaian KB tersebut memiliki alasan takut jatuh miskin, takut tidak bisa menghidupi keluarga jika anggota keluarga terlalu banyak dan sebagainya, maka hal ini pun juga dihukumi haram secara mutlak. Karena di anggap berprasangka buruk terhadap Allah SWT dan tidak meyakini bahwa Allah SWT yang maha memberi rezeki dan maha kaya (Septianingrum, 2020: 100).

Sedangkan *Tandzimun nasli* yang artinya menunda kehamilan hal ini diperbolehkan dalam Agama Islam. Karena hal ini bertujuan untuk pemberian pengaturan jarak kelahiran dan kehamilan yang terlalu dekat dan akan berakibat buruk bagi anak serta ibu. Selain nantinya anak akan kekurangan ASI karena wanita yang sedang hamil produksi ASI berkurang, kondisi sang ibu juga belum pulih betul jika harus sering melahirkan, karena setelah 9 bulan mengandung ibu memerlukan waktu untuk tubuhnya kembali fit. Karena dalam Islam juga di ajarkan bahwasanya *wafisoluhu fi 'amain* (dan menyusui selama dua tahun penuh). Dan jika semua ini dikiaskan dengan alat lain seperti alat kontrasepsi supaya diatur jarak kelahirannya maka diperbolehkan selagi sifatnya tidak permanen (pemandulan selama-lamanya). Dan perlu diperhatikan

juga, untuk pemasangan alat kontrasepsi pada wanita hendaknya dipasangkan oleh suaminya sendiri (jika memang mampu/bisa karena seorang dokter) atau seorang dokter wanita yang solikhah/terhormat karena pemasangan alat kontrasepsi ini akan mengakibatkan tersentuhnya kulit antara satu sama lain oleh karena itu di anjurkan untuk memilih dokter yang sesama jenis agar tidak menimbulkan madzoret (Septianingrum, 2020: 101).

Pelaksanaan keluarga berencana tidak hanya dibolehkan secara klinis namun juga diperbolehkan terlepas dari hal-hal di atas, ada juga keputusan Islam tentang kesehatan, ekonomi serta pendidikan. Hal tersebut didasarkan dalam QS An-Nisa' / 4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ۙ

Terjemahannya:

“Dan hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka tinggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar” (Kementrian Agama, 2015).

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam bahwa Allah SWT ingin agar mereka tidak meninggalkan keturunan yang setelah orang tuanya meninggalkan dunia ini menjadi umat dan bangsa yang lemah. Ayat diatas juga memberikan

pedoman kepada masing-masing keluarga atau orang tua untuk senantiasa memperhatikan masa depan yang mendatang dan kehidupan anak serta cucunya. Menjauhkan dari zaman yang lemah, baik secara fisik atau jasmani maupun rohani karena kurang mendapat perawatan fisik yang sempurna dan pendidikan rohani yang baik.

Pelaksanaan KB diperdebatkan oleh kalangan ulama, diantaranya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Ulama yang memperbolehkan antara lain:

1. Imam Ghazali

Imam al-Ghazali dalam kitabnya, "*Ihya 'Ulu muddin*" menyatakan bahwa *'azal* tidak dilarang, dikarenakan kesusahan yang di alami ibu terus menerus saat melahirkan. Motifnya yaitu: untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak, dan untuk menjaga kecantikan si ibu.

2. Syekh al-Hariri (mufti besar Mesir)

Syekh al-Hariri memberikan ketentuan bagi individu dalam pelaksanaan KB, diantaranya:

- a. Untuk menjarangkan anak
- b. Untuk menghindari penyakit, bila ibu mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis).

- c. Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandungan).
- d. Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit menular seksual.

3. Syekh Mahmud Syaltut

Syekh Mahmud Syaltut membedakan konsep pembatasan keluarga (*tahdiid al-nasl*) dan pengaturan atau perencanaan berketurunan (*tandzhim an-nasl*). *Tandzim an-Nasl* diumpamakan dengan menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan maupun dengan masyarakat dan Negara.

4. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah juga membolehkan seseorang untuk melaksanakan KB dengan alasan sang ayah adalah seorang faqir, tidak mampu memberikan pendidikan pada anak-anaknya, dan sang ibu adalah orang yang *dha'if* (lemah) jika terus menerus melahirkan (Fauzi, 2017: 12-13).

Ada beberapa ulama-ulama yang mengharamkan ber-KB adalah sebagai berikut:

1. Madkour guru besar hukum Islam di fakultas hukum, dalam karyanya: "Islam and Family Planning" menyatakan "bahwasanta ia tidak mendukung KB dengan asumsi tidak ada penjelasan yang membenarkan perbuatan tersebut.

Beliau berpegang teguh pada aturan, hal-hal yang mendesak untuk membenarkan perbuatan terlarang”.

2. Abu 'Ala al-Maududi ia adalah salah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Dikatakannya: “barangsiapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan”. Menurut al-Maududi salah satu tujuan pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab (Fauzi, 2017: 13-14).

Di samping pendapat-pendapat di atas, ada juga para ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak KB, di antaranya QS Al-An'am / 6: 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

١٥١

Terjemahannya:

“Katakanlah (Muhammad), “Izinkan aku menyampaikan kepadamu apa yang diharamkan Allah kepadamu. Janganlah mempersekutukan-Nya, jagalah baik-baik orang tuamu, jangan bunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi makan kepadamu dan kepada mereka; berusaha untuk

tidak bergerak mendekati perbuatan yang keji, baik yang nyata maupun yang disembunyikan, jangan kamu membunuh orang-orang yang haram di sisi Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan agar kamu mengerti” (Kementrian Agama, 2015).

Maksud dari ayat tersebut adalah tidak memberi kesempatan untuk hidup sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung, alasannya karena takut melarat (miskin). Padahal Allah telah menjamin rizki hamba-hamba-Nya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jika KB bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tidak benarkan menurut syariat Islam. Oleh karena itu niat untuk menggunakan alat kontrasepsi KB harus terlebih dahulu diluruskan. KB bukan untuk membatasi kelahiran tetapi dititikberatkan kepada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya. Dengan demikian hukum menggunakan alat kontrasepsi KB dibolehkan.

Islam memberikan arahan kepada manusia tentang cara terbaik untuk mempunyai anak sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera serta membina anak cucu. Hal ini diungkapkan di dalam QS Al-Baqarah / 2: 233

❁ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahannya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi mereka yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (Kementrian Agama, 2015).

Ayat ini dengan tegas memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya mereka sejak lahir hingga 2 tahun penuh, yang merupakan batas maksimal dalam proses menyusui. Menyusui cukup lama yaitu selama dua tahun meskipun diperintah, bukanlah sebuah kewajiban. Hal ini terlihat dari adanya larangan bagi mereka yang ingin menyudahi masa menyusui. Dengan begitu, ini merupakan saran yang digaris bawahi seolah-olah perintah yang diwajibkan. Asalkan suami istri setuju untuk mengurangi jangka waktunya, maka boleh saja, namun tidak boleh lebih dari 2 tahun dikarenakan 2 tahun sudah dianggap sempurna oleh Allah SWT. Dalam penggalan bait tersebut ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh, artinya sampai selesai menyusui. Kalimat ini secara tidak langsung memberi arti bahwa pemberian ASI secara rutin dapat mencegah kehamilan.

Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi

perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemadhratan, maka tidak diragukan lagi kebolehnya dalam Islam (Sari, 2019).

Allah SWT berfirman di dalam QS Al-Isra' /17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka suatu dosa yang besar” (Kementrian Agama, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam adalah agama penuh rahmat. Allah sangat peduli dengan kondisi sosial manusia begitupun dalam masalah yang berkaitan dengan keturunan karena itu Allah swt tidak ingin manusia tersiksa dan terbebani karena keturunannya.

Selain itu KB yang tidak diperbolehkan dalam Islam, apabila hal tersebut membuat orang tidak dapat memiliki keturunan untuk selama-lamanya. Selain itu, hal tersebut juga mengubah ciptaan Allah serta keluar dari tujuannya untuk menciptakan keturunan. Prosedur ini dilakukan dengan teknik pembedahan mengganggu tubuh karena alasan yang tidak tepat.

Pengaturan KB dalam perspektif Islam boleh-boleh saja jika dilaksanakan sesuai dengan aturan Islam, bertujuan untuk mengatur keturunan bukan

membatasi, dan dilaksanakan bila mana dalam keadaan darurat sehingga dapat membahayakan keamanan diri sendiri.

Menurut Yusuf Qaradhawi, mengapa begitu pentingnya umat Islam mempelajari manajemen waktu, adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Ajaran Islam begitu besar perhatiannya terhadap waktu, baik yang diamanatkan dalam Al Qur'an maupun As Sunnah;
2. Dalam sejarah orang-orang Muslim generasi pertama, terungkap, bahwa mereka sangat memperhatikan waktu dibandingkan generasi berikutnya, sehingga mereka mampu menghasilkan sejumlah ilmu yang bermanfaat dan sebuah peradaban yang mengakar kokoh dengan panji yang menjulang tinggi;
3. Kondisi real, kaum Muslimin, belakangan ini justru berbalikan dengan generasi pertama dahulu, yakni cenderung lebih senang membuang-buang waktu, sehingga kita tidak mampu berbuat banyak dalam menyejahterakan dunia sebagaimana mestinya, dan tidak pula berbuat untuk akhirat sebagaimana harusnya, dan yang terjadi adalah sebaliknya, kita meracuni kehidupan dunia dan akhirat sehingga tidak memperoleh kebaikan dari keduanya (Ritonga 2019: 53).

Terdapat keterkaitan KB dengan manajemen waktu dimana memiliki artian sama-sama mengatur serta mengontrol. Jika disadari akan pentingnya manajemen waktu dalam pelaksanaan keluarga berencana (KB).

Di samping itu perlu kita sadari, bahwa Allah SWT telah bersumpah dengan menggunakan waktu untuk menegaskan pentingnya waktu dan keagungan nilainya, seperti yang tersurat dan tersirat dalam:

QS Al-Lail/92:1-3

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۙ ١ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۙ ٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۙ ٣

Terjemahannya:

1. Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
2. demi siang apabila terang benderang,
3. demi penciptaan laki-laki dan perempuan,

QS Al-Fajr/89:1-2

وَالْفَجْرِ ۙ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ ٢

Terjemahannya:

1. Demi fajar,
2. demi malam yang sepuluh,

QS Adh-Dhuha/93:1-2

وَالضُّحَىٰ ۙ ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۙ ٢

Terjemahannya:

1. Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggal),
2. dan demi malam apabila telah sunyi,

QS Al-'Ashr/103:1-2

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲

Terjemahannya:

1. Demi masa,
2. sungguh, manusia berada dalam kerugian,

Pada ayat-ayat di atas menjelaskan mengenai manajemen waktu dalam artian yang sederhana adalah “mengatur waktu”. Manajemen dalam pengertian yang sesungguhnya, tentu ada yang disebut dengan perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol. Hal ini berkaitan dengan konsep keluarga berencana dimana KB bertujuan untuk perencanaan dalam keluarga guna mengukur jumlah dan jarak kehamilan yang diinginkan.

Oleh karena itu, harus kita sadari betapa pentingnya mempelajari manajemen waktu bagi seorang Muslim. Namun sebelum kita mempelajari manajemen waktu, maka perlu kita sadari terlebih dahulu beberapa tabiat waktu agar kita benar-benar dapat memahami esensi dari waktu tersebut, yakni: *cepat berlalu; tidak mungkin kembali; harta termahal*. Berdasarkan ini pula, maka muncul berbagai ungkapan bijak, seperti “*alwaqtu ka as-saif*” (waktu itu ibarat pedang/pisau). Sebuah pedang/pisau akan sangat berguna jika pandai memanfaatkannya, sebaliknya akan membahayakan bukan saja orang lain, tetapi juga diri sendiri, jika tidak pandai-pandai memanfaatkannya. Keinginan awal untuk mempermudah sesuatu sehingga bermanfaat bagi manusia, akan sia-sia

dan bahkan merugikan jika salah mempergukannya. Demikianlah pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga memberikan kemanfaatan baik bagi diri maupun orang lain (Ritonga 2019: 53).

Hadis-hadis Rasulullah Saw juga banyak memperingatkan betapa pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Misalnya ketika Nabi Saw. memperingatkan akan perlunya persiapan menghadapi waktu senggang, waktu muda, waktu kaya, waktu sehat, dan akhirnya selagi masih hidup, sehingga tidak menyesali ketika sudah sibuk, tua, miskin, sakit, dan bahkan sesudah mati. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa waktu adalah modal yang paling unik yang tidak mungkin dapat diganti dan tidak mungkin dapat disimpan tanpa digunakan, serta tidak mungkin mendapatkan waktu yang dibutuhkan meskipun dengan mengeluarkan biaya (Ritonga 2019: 54).

Mengelola waktu berarti menata diri dan merupakan salah satu tanda keunggulan dan kesuksesan. Oleh karena itu, bimbingan untuk mendalami masalah ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semua, apapun jabatan dan profesi kita serta tidak memandang tinggi rendahnya kedudukan seseorang (Ritonga, 2019: 54).

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan

Manajemen asuhan kebidanan merupakan metodologi biasanya dipergunakan oleh para bidan untuk menerapkan strategi berfikir kritis secara metadis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen asuhan kebidanan mencakup atas 7 langkah yang diurutkan di mana pada tiap langkahnya disusun secara bertahap (Nur Qadariyah, 2012: 24).

2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Proses manajemen 7 langkah menurut verney (2003), antara lain:

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Langkah tersebut meliputi kegiatan mengumpulkan, pengelolaan, menganalisis data dalam merumuskan permasalahan. Langkah tersebut adalah sudut pandang yang ditunjukkan oleh bidan melalui tindakan yang dapat memunculkan perumusan masalah sehubungan dengan masalah yang dialami oleh klien.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi dibantu lewat sesi tanya jawab, mengumpulkan setiap informasi diharapkan dapat menilai kondisi umum pasien secara spesikit, diantaranya:

Pada data subjektif dapat mengajukan Tanya jawab untuk mendapatkan data antara lain: menanyakan identitas meliputi: Nama, Umur, Nikah/Lamanya, Suku, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Alamat. Menanyakan HPHT. Menanyakan keluhan contohnya: selama menggunakan KB ibu mengatakan mengalami masa menstruasi yang tidak teratur, ibu tidak haid selama 3 bulan berturut-turut bahkan lebih dari 3 bulan. Riwayat keluhan meliputi: sejak kapan ibu menjadi akseptor suntik DMPA, menanyakan sudah berapa lama tidak mengalami menstruasi sejak menggunakan suntikan DMPA, menanyakan apakah ada keluhan lain yang menyertai selama menjadi akseptor suntik DMPA serta apakah ada usaha untuk mengatasi keluhan yang dialami.

Menanyakan informasi mengenai riwayat kesehatan yang lalu antara lain: apakah klien pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, DM, penyakit menular, penyakit menurun, riwayat alergi, serta ketergantungan obat-obatan. Riwayat keluarga meliputi: hipertensi, asma, DM, kanker, serta penyakit jantung. Riwayat menstruasi meliputi: Menarche, Siklus haid, Lamanya, dan Dismenorea. Riwayat obstetric meliputi: riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat KB meliputi: menanyakan sudah berapa lama ibu menggunakan kontrasepsi suntik DMPA, menanyakan apakah ibu pernah memakai

metode KB yang lain. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: pola nutrisi, personal hygiene, pola istirahat, pola eliminasi. Data psikologi dan spiritual meliputi: menanyakan apakah klien merasa khawatir dengan kondisinya, menanyakan pada ibu siapa yang mengambil keputusan dalam keluarga, apakah ibu yakin bahwasanya tidak terdapat larangan dalam Islam untuk menggunakan KB, menanyakan apakah klien senantiasa mengerjakan shalat 5 waktu sehari.

Seorang akseptor biasanya akan mengeluh tentang *Amenorhea* setelah 1 tahun penggunaan. Saat awal-awal penggunaan, beberapa klien memiliki keluhan tentang perdarahan tidak menentu serta tidak dapat bayangkan berupa flek biasanya berlangsung ≥ 7 hari bahkan bisa terjadi perdarahan berat pada periode awal setelah menggunakan DMPA. Kejadian tersebut semakin berkurang berturut-turut dengan rentang waktu semakin terbatas hingga klien mengalami *amenorhea*. Ibu akan mengeluh karena tidak haid dalam waktu lama (3 bulan) atau lebih.

Data objektif, bisa dilihat pada kartu KB yang menyatakan ibu menggunakan suntik DMPA, dilakukan pemeriksaan umum, keadaan umum ibu, TTV dan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan secara head to toe serta melakukan pemeriksaan laboratorium bila diperlukan.

Tahap ini adalah penentu untuk langkah selanjutnya. Terpenuhinya informasi sesuai kasus saat ini akan mempengaruhi apakah kerangka sistem pemahaman sudah tepat pada tahap berikutnya, sehingga pendekatan tersebut harus mencakup data objektif serta hasil pemeriksaan yang dilakukan agar bisa menjabarkan keadaan pasien yang sesungguhnya.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada tahap tersebut, melakukan pengidentifikasian secara tepat pada diagnosa atau permasalahan dan kondisi pasien diselesaikan sehubungan dengan interpretasi yang tetap atau informasi dasar yang telah dikumpulkan, diuraikan sehingga dapat ditemukan permasalahan atau diagnosa yang tepat.

Masalah mengenai amenorhea dapat diselesaikan dengan memahami informasi penting yang telah didapatkan bahwasanya calon pengguna tidak mendapat haid sekitar 3 bulan berturut-turut atau bahkan bisa lebih semenjak menggunakan suntik DMPA.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Dalam permasalahan ini, kita mengetahui kemungkinan adanya permasalahan atau diagnosa potensial lainnya, yang bergantung pada susunan permasalahan dan diagnosa yang telah diketahui. Langkah tersebut membutuhkan antisipasi jika dimungkinkan, sementara kita

memperhatikan pasien, bidan diharap dapat bersiap bila diagnosa/masalah potensial ini betul-betul terjadi untuk mempertimbangkan tindakan yang tepat. Permasalahan yang mungkin timbul setelah penggunaan KB suntik DMPA meliputi: sakit kepala bahkan hematoma, serta permasalahan lain yang dapat muncul akibat penggunaan suntik DMPA dengan *amenorhea* khususnya *drop out*.

d. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi

Tindakan segera atau kolaborasi untuk keadaan yang dianggap dapat membahayakan pasien. Tindakan tersebut harus dilakukan secara kolaborasi berdasarkan keadaan pasien.

Pada kasus *amenorhea* biasanya tidak memerlukan untuk dilaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, tindakan harus dilakukan berdasarkan kondisi pasien.

e. Langkah V : Intervensi/Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Rencana tindakan saat mengatasi permasalahan dipisahkan berdasarkan tujuan, rencana serta penilaian. Rencana tersebut dibuat didasarkan pada keadaan pasien (meliputi diagnosa aktual serta potensial) yang berhubungan pada seluruh bagian asuhan. Rencana yang dibuat diharuskan rasional dan valid dengan mempertimbangkan informasi serta teori terkini sesuai dengan *evidence* terhadap hal yang ingin dikerjakan oleh pasien.

Pada penatalaksanaan *amenorhea* yaitu untuk memberitahukan pada ibu tentang yang bisa menyebabkan terjadinya *amenorhea*, bahwasanya *amenorhea* bisa muncul akibat salah satu dampak dari penggunaan suntik DMPA yang menghambat ovulasi. Dengan adanya perubahan dinding rahim serta lapisan rahim semakin berkurang, mengakibatkan rahim tidak menebal sehingga membuat pasien tidak mengalami siklus menstruasi dalam kurung waktu yang lama. Adalah hal yang normal bagi pasien untuk mengalami bercak, *metrorrhagia*, atau *menometrorrhagia* saat awal penggunaan kontrasepsi kemudian terus-menerus menderita *amenorhea* yang berkepanjangan.

Mengajarkan pada ibu tentang perubahan fisik yang bisa terjadi setelah penyuntikan misalnya: perubahan berat badan, perubahan pada siklus menstruasi dimana bisa terjadi (*amenorhea*, *spotting*, *metrorrhagie*, *menometrorrhagie*), hematoma, sakit kepala, keputihan, serta hiperpigmentasi pada wajah.

Apabila terjadi komplikasi (Infeksi dan Abses) pada tempat bekas suntik sebaiknya diberikan antibiotik, dengan asumsi dibuat sayatan pada abses kemudian tampon dan drainase dapat diterapkan jika abses berfluktuasi. Berikan kompres hangat pada bagian yang berwarna biru sampai warna birunya hilang.

Integrasi keislaman pada ibu KB DMPA dengan amenorhea yaitu: memberikan motivasi agama pada klien, menjelaskan mengenai KB dalam pandangan islam, menjelaskan pentingnya ber KB terkhusus ibu dengan multipara, menjelaskan upaya penyuntikan dengan dosis yang benar, menjelaskan bahwasanya kemungkinan kegagalan yang terjadi akibat suntik DMPA yaitu sekitar di bawah 1%.

f. Langkah VI : Implementasi

Memastikan keselamatan pasien dan melaksanakan rencana asuhan secara efisiensi. Bidan sapat melakukan implementasi secara keseluruhan dengan tim kesehatan lainnya. Dengan pelaksanaan yang telah disusun, bidan seharusnya bisa melaksanakan implementasi secara efisien baik dari segi waktu, biaya, dan kualitas pelayanan dengan pelaksanaan yang telah diatur khususnya memberikan penjelasan tentang manfaat, keterbatasan, maupun dampak suntik DMPA yang meliputi: apakah berat badan ada peningkatan yang signifikan atau terjadi penurunan, tidak ada perubahan TD setelah 2 bulan penggunaan suntik DMPA, tidak ada keluhan sakit kepala yang hebat, apakah ada perubahan pada siklus haid (siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak/spooting, tidak haid sama sekali), serta tidak ada keluhan bengkak pada daerah bekas suntikan disertai nyeri.

g. Langkah VII : Evaluasi

Langkah ini diselesaikan untuk memutuskan kelayakan pertimbangan yang telah dilakukan. Pada hasil evaluasi berupa penilaian agar dapat menerapkan diagnosa serta asuhan lebih lanjut. Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan apakah ibu memahami penyebab amenorhea yang merupakan salah satu akibat dari pemberian suntik DMPA, apakah ibu masih mau menjadi pengguna kontrasepsi suntik DMPA, serta apakah klien masih bisa datang untuk mendapatkan suntik ulang.

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Terdapat 4 langkah dokumentasi yang dikenal sebagai SOAP digunakan sebagai penatalaksanaan asuhan kebidanan guna mencatat hasil pemeriksaan pasien pada rekam medik untuk pencatatan progress. Pendokumentasian SOAP meliputi:

1. Subjektif (S)

Berikut ini adalah rangkuman pada langkah I yang diperoleh berdasarkan dari apa yang dikatakan, serta keluhan yang dirasakan pasien.

2. Objektif (O)

Berikut ini adalah rangkuman pada langkah I berdasarkan hasil inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi serta hasil pemeriksaan lainnya.

3. Assesment (A)

Berikut ini adalah rangkuman pada langkah II, III, dan IV yang di buat berdasarkan informasi pada data subjektif serta objektif terhadap hasil pengembalian pilihan klinis pasien.

4. Planning (P)

Berikut ini adalah rangkuman pada langkah V, VI, dan VII berdasarkan perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kesimpulan serta evaluasi pada pilihan pasien dimana diambil untuk menangani permasalahan pasien serta mencukupi kebutuhannya.

SOAP tersebut dilaksanakan pada pengguna keluarga berencana selanjutnya, atau dilakukan setiap 4 kali kunjungan untuk membantu pemantauan pasien dan melakukan kunjungan kerumah untuk tindakan yang lebih baik.

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY "I"
AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI PROGESTERON
ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 28 AGUSTUS 2023

No Register : 523xxx

Tanggal Kunjungan : 28 Agustus 2023

Pukul : 11.49 WITA

Tanggal Pengkajian : 28 Agustus 2023

Pukul : 11.49 WITA

Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"

Umur : 24 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya : 1x / ± 6 tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMK / SMK

Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Juanda II

2. Data Biologis / Fisiologis

a. Alasan berkunjung

Klien datang ke puskesmas agar mendapatkan suntik ulang berdasarkan dengan jadwal yang telah ditentukan dan ibu merasa khawatir karena tidak mengalami haid (amenorhea) semenjak menggunakan suntik DMPA.

b. Riwayat KB

- 1) Ibu telah menjadi akseptor suntik DMPA sejak pada tanggal 14 Desember 2022.
- 2) Ibu menggunakan KB suntik DMPA \pm 1 tahun.
- 3) Ibu mengatakan bahwa sesudah melahirkan anak pertama tanggal 14 Oktober tahun 2018, ibu mulai menggunakan kontrasepsi pil kombinasi pada tanggal 23 November 2018 berkisar 2,9 tahun, alasannya ingin berhenti memakai KB karena berencana mempunyai anak ke-2.
- 4) Setelah 4 bulan melepaskan KB pil, ibu hamil anak ke 2 pada tanggal 7 Februari 2022 dan melahirkan pada tanggal 15 November 2022. Pada tanggal 14 Desember 2022 ibu kembali menggunakan kontrasepsi suntikan 3 bulan alasannya mengingat klien hanya memakai alat kontrasepsi 1 kali dalam 3 bulan karena ibu sedang menyusui.

- 5) Ibu mengatakan masa nifasnya berakhir pada tanggal 27 Desember 2022.
- 6) Ibu mengatakan setelah suntikan KB yang pertama pada tanggal 14 Desember 2022, ibu mengalami bercak (spooting) selama 2 hari kemudian setelahnya sudah tidak mengalami haid (amenorhea).
- 7) Ibu mengatakan akan mengalami bercak-bercak (spooting) setiap kali selesai suntikan dan berlangsung selama 2-3 hari.
- 8) Ibu mengatakan pada suntikan KB yang ke 2-3 ibu tidak mengalami haid, mengalami penurunan berat badan dengan alasan menjaga pola makan (diet) dan melakukan senam sore 1-2 kali seminggu.
- 9) Selama menggunakan KB ibu mengatakan mengalami masa menstruasi yang tidak beraturan, klien tidak menstruasi sekitar 3 bulan berurutan bahkan bisa lebih. Klien mengatakan belum memiliki rencana untuk hamil lagi.

➤ Tinjauan pada kartu KB ibu

Suntik I : Tanggal 14 Desember 2022

Suntik II : Tanggal 9 Maret 2023

Suntik III : Tanggal 3 Juni 2023

c. Riwayat Reproduksi

- 1) Menarche : 14 tahun
- 2) Siklus : 28-30 hari
- 3) Lamanya : 5-7 hari
- 4) Dismenorhea : Tidak ada

d. Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang lalu

Anak ke	Kehamilan			Persalinan							Nifas		
	Tahun	Gestasi	Komp	JP	P	TL	BBL	PB	JK	Komp	Lama Menyusui	Hal Ihwal	Komp
I	2018	Aterm	-	N	Bidan	RS	2900	49	L	-	8 Bulan	Hidup	-
II	2022	Aterm	-	SC	Dokter	RS	3100	53	L	-	9 Bulan	Hidup	-

e. Riwayat Kesehatan Sekarang

- 1) Keluhan Amenorhea dirasakan sejak ibu menggunakan KB suntik 3 bulan, dimana ibu belum mengalami siklus haid sampai sekarang.
- 2) Penurunan berat badan dirasakan ibu semenjak dilakukan kunjungan ulang untuk mendapatkan suntikan ke-2 dimana telah dilakukan penimbangan didapatkan hasil terjadi penurunan berat badan sampai suntikan ke-4 alasannya ibu mengatakan memang sengaja

mau menurunkan berat badan dimana selain menjaga pola makan ibu juga melakukan senam sore 1-2 kali seminggu.

- 3) Ibu mengatakan tidak mengalami hematoma, metrorrhagie, menometorrhagie, hiperpigmentasi, resiko penurunan densitas tulang, dan galaktorea selama menggunakan KB suntik DMPA.
- 4) Ibu mengatakan mengalami sakit kepala sehabis setiap kali disuntik.

f. Riwayat Kesehatan yang lalu

Klien mengatakan tidak pernah mengalami penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus maupun penyakit lain, tidak ada penyakit menular, penyakit turunan, alergi atau ketergantungan pada obat.

g. Riwayat Kesehatan Keluarga

- 1) Klien serta keluarganya tidak mempunyai riwayat penyakit asma, DM, jantung, hipertensi, dan sebagainya.
- 2) Klien serta keluarganya tidak mempunyai riwayat penyakit menular atau menurun.

h. Riwayat Ginekologi

Ibu mengatakan tidak pernah mengalami kelainan pada payudaranya, misalnya; kanker pada payudara, tidak mengalami keluarnya cairan yang berlebihan pada vagina yang tidak diketahui alasannya, ibu mengatakan mengalami keputihan berlebihan setelah di suntik sebagai penyesuaian hormone dalam tubuh dan lama kelamaan hanya

mengalami keputihan yang fisiologis, tidak adanya penyakit kelamin, serta kanker rahim.

i. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- 1) Pola makan/nutrisi: kecenderungan klien untuk makan yaitu 2x perhari menggunakan porsi sedang dimana mengurangi karbohidrat, lauk pauk 1 potong, biasanya sayuran serta buah-buahan, makanan yang tinggi protein, minum 7-8 gelas/hari berupa air putih, dan menghindari mengkonsumsi minuman yang berkarbonasi.
- 2) Pola eliminasi: kecenderungan buang air besar sekali perhari dimana konsistensinya lunak serta memiliki warna kuning, selanjutnya buang air kecil 5-6x perhari memiliki warna kuning jernih.
- 3) Pola istirahat: kecenderungan tidur siang 1-2 jam setiap harinya, serta 6-8 jam saat malam.
- 4) Personal hygiene: mandi 2x perhari, membersihkan gigi 2x perhari, keramas 2-3x perminggu, mengganti pakaian 2x perhari, mengganti pakaian dalam 2-3x sehari.
- 5) Pola aktivitas: melakukan pekerjaan rumah tangga misalnya masak, cuci baju, bersih-bersih rumah, serta melakukan senam sore 1-2 kali seminggu.

3. Riwayat Psikologis, Spritual, Sosial Ekonomi

- 1) Ibu mengatakan ini adalah pernikahan pertama sama pasangannya \pm 6 tahun
- 2) Klien melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri
- 3) Suaminya adalah orang yang mengambil keputusan didalam keluarga
- 4) Ibu belum merencanakan agar hamil kembali, klien serta suami sama-sama yang mengambil keputusan agar ber-KB, klien menerima bahwasnya tidak terdapat larangan pada agama dalam ber-KB, klien senantiasa shalat 5 waktu setiap hari.

4. Pemeriksaan Fisik

1) Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 51 kg
- d. BB sebelumnya : 55 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV:
TD : 100/73 mmHg
N : 80 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2) Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma, tidak adanya oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

5. Pemeriksaan Laboratorium

Tidak di lakukan

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Akseptor lama suntik metode DMPA dengan Amenorhea

a. Data Subjektif

- Klien datang ke puskesmas agar mendapatkan suntik ulang berdasarkan dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan klien merasa khawatir karena tidak mengalami haid (amenorhea) semenjak menggunakan suntik DMPA.

- Ibu menjadi akseptor suntik DMPA sejak tanggal 14 Desember 2022.
- Ibu menggunakan KB suntik DMPA ± 1 tahun.
- Setelah 4 bulan melepaskan KB pil, ibu hamil anak ke 2 pada tanggal 7 Februari 2022 dan melahirkan pada tanggal 15 November 2022. Pada tanggal 14 Desember 2022 ibu kembali menggunakan kontrasepsi suntikan 3 bulan alasannya mengingat klien hanya memakai alat kontrasepsi 1 kali dalam 3 bulan karena ibu sedang menyusui.
- Ibu mengatakan masa nifasnya berakhir pada tanggal 27 Desember 2022.
- Ibu mengatakan setelah suntikan KB yang pertama pada tanggal 14 Desember 2022, ibu mengalami bercak (spotting) selama 2 hari kemudian setelahnya sudah tidak mengalami haid (amenorhea).
- Ibu mengatakan pada suntikan KB yang ke 2-3 ibu tidak mengalami haid, mengalami penurunan berat badan dengan alasan menjaga pola makan (diet) dan melakukan senam sore 1-2 kali seminggu.

b. Data Objektif

- Berat badan sekarang : 51 kg
- Berat badan sebelumnya : 55 kg

c. Analisa dan interpretasi Data

- Pada awalnya hormon progesterone dan estrogen seimbang, setelah dilakukan penyuntikan DMPA maka kadar perogestin didalam

sirkulasi sangat berlebihan mengakibatkan kadar FSH serta LH berkurang sehingga tidak adanya lonjakan pada LH. Dengan berkurangnya kadar LH, sehingga tidak bisa membuat lonjakan pada folikel menyebabkan sel telur menurun untuk memproduksi akibatnya sel telur tidak dapat keluar pada folikel serta mengakibatkan tidak terjadinya ovulasi. Dengan demikian, tidak terjadi siklus haid dan cenderung diasumsikan bahwa rentang penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan dalam jangka waktu yang sangat lama mempunyai dampak *amenorhea* (Asia, 2017: 28).

- Perubahan pada berat badan adalah salah satu dampak yang sering dikeluhkan pada akseptor KB suntik. Selain faktor internal yaitu hormon, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan berat badan di mungkinkan pola makan, kepekaan terhadap penyakit, lingkungan, emosional, dan diet. Namun, hal itu juga bergantung pada faktor genetik pada masing-masing akseptor suntik. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. Fisik seseorang juga mempengaruhi terhadap perubahan berat badan karena aktifitas fisik yang berlebihan akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak tubuh (Mukrimaa, 2016: 155).

- Spotting berkaitan erat dengan pemakaian alat kontrasepsi suntik 3 bulan selama kurang dari 1 tahun atau setara dengan 1 tahun dan semakin lama akseptor memakai kontrasepsi suntik 3 bulan maka semakin besar kemungkinannya untuk tidak mengalami haid sama sekali (amenorrhoe).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah Potensial : Mengantisipasi terjadinya Sakit Kepala, Keputihan, Drop Out, Hiperpigmentasi, Metrorrhagie, Menometorrhagie, Risiko penurunan densitas mineral tulang, Galaktorea.

1. Sakit kepala

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan mengalami sakit kepala sehabis setiap kali disuntik.

b. Data Objektif

Kartu KB klien, disebutkan bahwasanya klien merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Menurut Suratun (2008) yang mengungkapkan bahwa sakit kepala saat menggunakan KB Suntik 3 bulan dalam jangka waktu yang lama, dapat disebabkan oleh respon tubuh terhadap progesteron sehingga hormon estrogen fluktuatif (mengalami penekanan) dan progesteron

dapat mengikat air sehingga sel-sel dalam tubuh mengalami perubahan sehingga menyebabkan penekanan pada syaraf otak (Purnama Sari, 2022: 130).

2. Keputihan

a. Data Subjektif

Klien berkata menderita keputihan berlebihan setelah di suntik sebagai penyesuaian hormone dalam tubuh dan lama kelamaan hanya mengalami keputihan yang fisiologis.

b. Data Objektif

Hasil kartu KB klien, disebutkan bahwasanya klien merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Hormon progesterone pada KB suntik 3 bulan mengubah flora vagina sehingga memudahkan jamur untuk tumbuh di vagina. Hal ini menimbulkan keluhan keputihan yang patologis ditandai dengan timbulnya gatal-gatal. Ini berarti dengan pemberian 3-4x kontrasepsi suntik 3 bulan seseorang masih dalam tahap penyesuaian dengan hormone progesteron yang diberikan secara rutin dari suntik KB 3 bulan (Wahyuni, dkk. 2019: 154).

3. Drop Out

a. Data Subjektif

Ibu datang ke puskesmas agar bisa mendapat suntik ulang berdasarkan dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan klien merasa khawatir karena tidak mengalami haid (amenorhea) semenjak menggunakan suntik DMPA. Ibu menjadi akseptor suntikan DMPA sejak tanggal 14 Desember 2022. Ibu memakai kontrasepsi suntikan 3 bulan dengan alasan menjarangkan kehamilannya.

b. Data Objektif

Kartu KB klien, disebutkan bahwasanya klien merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Dengan asumsi jika ibu merasa cemas terhadap masalah ini, ia bisa menghentikan pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan kemudian pindah ke alat kontrasepsi jenis lainnya (Titin, 2015). Amenorhea bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh para akseptor kontrasepsi DMPA, dikarenakan tidak berbahaya bagi kesehatan serta sama sekali tidak bersifat permanen. Pada saat suntik diberhentikan, masa subur bisa kembali dengan sendiri.

4. Hiperpigmentasi

a. Data Subjektif

Ibu menggunakan KB suntik DMPA.

b. Data Objektif

Pemeriksaan fisik tidak terdapat cloasma pada wajah

c. Analisa dan Interpretasi Data

Efek yang ditimbulkan pada sistem integumen, yaitu timbulnya melasma atau hiperpigmentasi kulit wajah. Salah satu alasan munculnya kondisi ini saat menggunakan KB hormonal adalah akibat peningkatan kadar hormon progesterone. Meningkatnya hormon ini dapat memicu produksi melanin, sehingga kulit akan terlihat menjadi lebih gelap dan muncul bercak-bercak berwarna hitam atau coklat (Jannah, 2018: 34).

5. Metrorrhagie

a. Data Subjektif

Ibu pengguna kontrasepsi suntik DMPA.

b. Data Objektif

Kartu akseptor klien, disebutkan bahwasanya klien merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Suratun (2008) mengatakan bahwa alat kontrasepsi suntik mengandung hormone progesteron yang tidak sesuai dengan kondisi dinding uterus (endometrium). Ketidakseimbangan hormone estrogen dan progesterone yang menyebabkan endometrium memproduksi lebih banyak volume menjadi penyebab utama gangguan pola menstruasi seperti metrorrhagie (Purnama Sari, 2022: 129).

6. Menometorhagie

a. Data Subjektif

Ibu pengguna kontrasepsi suntik DMPA.

b. Data Objektif

Kartu akseptor klien, disebutkan bahwasanya klien merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Menometoragia disebabkan karena ketidakseimbangan hormone yang mempengaruhi siklus haid, sebab-sebab organis perdarahan dari uterus, tuba, dan ovarium. Menometoragia yang dialami akseptor kontrasepsi suntik maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kontrasepsi suntik terhadap gangguan siklus haid yakni Menometoragia. Menometroragia adalah salah satu efek samping suntik DMPA (Oktaviana, 2015: 42-43).

7. Risiko penurunan densitas mineral tulang

a. Data Subjektif

Ibu pengguna kontrasepsi suntik DMPA.

b. Data Objektif

Kartu akseptor klien, disebutkan bahwasanya klien merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Kontrasepsi DMPA mengandung 150 mg Depo Medroxyprogesterone Acetate bisa mempengaruhi suasana tubuh menjadi kekurangan estrogen sehingga mempengaruhi densitas mineral tulang. Pengguna DMPA memiliki kadar E2 serum yang lebih rendah secara signifikan dibanding pengguna kontrasepsi non hormonal. Hal ini mengakibatkan terjadinya suasana hipoestrogenik yang pada akhirnya berdampak negatif pada absorpsi kalsium di tulang. Resorpsi tulang melampaui proses pembentukan sehingga pembentukan mineral tulang terganggu dan terjadi penurunan densitas mineral tulang. Penggunaan DMPA akan mengakibatkan osteopenia atau penurunan densitas mineral tulang bila digunakan dalam jangka panjang yakni lebih dari dua tahun. Sehingga akseptor jangka panjang akan mengalami osteoporosis lebih cepat (Peni, dkk. 2015: 40).

8. Galaktorea

a. Data Subjektif

Ibu pengguna kontrasepsi suntik DMPA

b. Data Objektif

Kartu akseptor klien, disebutkan bahwasanya klien merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Penggunaan KB suntik DMPA dapat menyebabkan terjadinya galaktorea karena adanya peningkatan hormone progesterone sehingga menyebabkan peningkatan laktosa dan merangsang laktasi (Amalia, 2020: 22).

D. LANGKAH IV TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Tidak adanya data untuk menunjang agar dilakukan tindakan segera atau kolaborasi. Namun bila ibu mengalami *metrorrhagie*, *menometorhagie*, atau keputihan yang berlebihan, sebaiknya segera dilakukan tindakan.

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Diagnosa : Akseptor Lama suntik DMPA

Masalah Aktual : Amenorhea

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya Sakit Kepala, Keputihan, Drop Out, Hiperpigmentasi, Menometorhagie, metrorrhagie, Risiko penurunan densital mineral tulang, Galaktorea.

1. Tujuan

a. Supaya klien tetap menjadi akseptor kontrasepsi suntik DMPA.

2. Kriteria

a. Keadaan umum baik.

b. TTV ibu berada dalam batas normal.

c. Klien mendapat suntikan KB dengan teratur.

d. Klien kembali untuk suntik ulang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pada tanggal 21 November 2023.

3. Rencana Tindakan

Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul: 11.52 WITA

1) Sambut ibu dengan (5S) yaitu: senyum, salam, sapa, sopan dan santun.

Rasional : Dengan 5S, hubungan yang baik akan terjalin antara klien dan petugas kesehatan serta ibu akan merasa nyaman.

2) Tanyakan keluhan yang dirasakan oleh ibu

Rasional: klien diberikan penjelasan sehubungan dengan keluhan yang diraskaan serta memberikan tindakan yang sesuai.

3) Berikan pemahaman pada klien mengenai dampak yang dapat ditimbulkan penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA.

Efek Samping

a. Amenorhea

Amenorhea dapat terjadi karena adanya hormon progesterone seperti DMPA yang dapat menyebabkan gangguan pada ovarium, hipotalamus dan hipofisis menyebabkan hampir tidak ada FSH sehingga tidak dapat menggerakkan ovarium pada proses *steroidogenesis* serta *oogenesis*, dampaknya estrogen dan endogen (E2) diproduksi sangat sedikit mengakibatkan endometrium tidak dapat melakukan poliferasi. Oleh karena itu, siklus haid tidak terjadi dan cenderung beralasan bahwa jangka waktu yang lama dalam penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan mempunyai efek *amenorhea* (Asia, 2017: 28).

b. Perubahan Berat Badan

Perubahan pada berat badan adalah salah satu dampak yang biasanya dikeluhkan pada para akseptor kontrasepsi suntik DMPA. Selain faktor internal yaitu hormon, faktor eksternal juga

mempengaruhi perubahan berat badan Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Depkes RI (2001) bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan berat badan di mungkinkan pola makan, kepekaan terhadap penyakit, lingkungan, emosional, dan diet. Namun, hal itu juga bergantung pada faktor genetik pada masing-masing akseptor suntik. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. Fisik seseorang juga mempengaruhi terhadap perubahan berat badan karena aktifitas fisik yang berlebihan akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak tubuh (Mukrimaa,2016: 155).

c. Hematoma

Hematoma merupakan bengkak pada tempat bekas suntikan dan bewarna kebiruan disertai rasa sakit akibat perdarahan di bawah kulit dan bisa juga karena penggunaan jarum suntik yang berulang atau kesalahan teknik penyuntikan (Marfuah, 2012).

d. Spotting

Menurut pendapat Hartanto (2005) yang menyatakan bahwa perdarahan atau spotting terjadi karena menurunnya hormon estrogen dan kelainan atau terjadinya gangguan hormon. Orang yang menggunakan alat kontrasepsi khususnya KB suntik sering mengalami hal ini (Purnama Sari, 2022: 130).

e. Metrorrhagie

Suratun (2008) mengatakan bahwa alat kontrasepsi suntik mengandung hormone progesteron yang tidak sesuai dengan kondisi dinding uterus (endometrium). Ketidakseimbangan hormone estrogen dan progesterone yang menyebabkan endometrium memproduksi lebih banyak volume menjadi penyebab utama gangguan pola menstruasi seperti metrorrhagie (Purnama Sari, 2022: 129).

f. Menometorhagie

Menometoragia disebabkan karena ketidakseimbangan hormone yang mempengaruhi siklus haid, sebab-sebab organis perdarahan dari uterus, tuba, dan ovarium. Menometoragia yang dialami akseptor kontrasepsi suntik maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kontrasepsi suntik terhadap gangguan siklus haid yakni Menometoragia. Menometoragia adalah salah satu dari efek samping kontrasepsi suntik DMPA (Oktaviana, 2015: 42-43).

g. Sakit Kepala

Menurut Suratun (2008) yang mengungkapkan bahwa sakit kepala saat menggunakan KB Suntik 3 bulan dalam jangka waktu yang lama, dapat disebabkan oleh respon tubuh terhadap

progesteron sehingga hormon estrogen fluktuatif (mengalami penekanan) dan progesteron dapat mengikat air sehingga sel-sel dalam tubuh mengalami perubahan sehingga menyebabkan penekanan pada syaraf otak (Purnama Sari, 2022: 130).

h. Keputihan

Hormon progesterone pada KB suntik 3 bulan mengubah flora vagina sehingga memudahkan jamur untuk tumbuh di vagina. Hal ini menimbulkan keluhan keputihan yang patologis ditandai dengan timbulnya gatal-gatal. Ini berarti dengan pemberian 3-4x kontrasepsi suntik 3 bulan seseorang masih dalam tahap penyesuaian dengan hormone progesteron yang diberikan secara rutin dari suntik KB 3 bulan (Wahyuni, dkk. 2019: 154).

i. Hiperpigmentasi

Salah satu efek yang ditimbulkan pada sistem integumen, yaitu timbulnya melasma atau hiperpigmentasi kulit wajah. Salah satu alasan munculnya kondisi ini saat menggunakan KB hormonal adalah akibat peningkatan kadar hormon estrogen. Meningkatnya hormon ini dapat memicu produksi melanin, sehingga kulit akan terlihat menjadi lebih gelap dan muncul bercak-bercak berwarna hitam atau cokelat (Jannah, 2018: 34).

j. Risiko penurunan densitas mineral tulang

Kontrasepsi DMPA mengandung 150 mg Depo Medroxyprogesterone Acetate bisa mempengaruhi suasana tubuh menjadi kekurangan estrogen sehingga mempengaruhi densitas mineral tulang. Pengguna DMPA memiliki kadar E2 serum yang lebih rendah secara signifikan dibanding pengguna kontrasepsi non hormonal. Hal ini mengakibatkan terjadinya suasana hipoestrogenik yang pada akhirnya berdampak negatif pada absorpsi kalsium di tulang. Resorpsi tulang melampaui proses pembentukan sehingga pembentukan mineral tulang terganggu dan terjadi penurunan densitas mineral tulang. Penggunaan DMPA akan mengakibatkan osteopenia atau penurunan densitas mineral tulang bila digunakan dalam jangka panjang yakni lebih dari dua tahun. Sehingga akseptor jangka panjang akan mengalami osteoporosis lebih cepat (Peni, dkk. 2015: 40).

k. Galaktorea

Penggunaan KB suntik DMPA dapat menyebabkan terjadinya galaktorea karena adanya peningkatan hormone progesterone sehingga menyebabkan peningkatan laktosa dan merangsang laktasi (Amalia, 2020: 22).

Rasional : Sehingga ibu tidak merasa khawatir bila timbul efek samping

lainnya.

4) Beritahu klien mengenai prosedur asuhan sebelum memulai tindakan apa pun.

Rasional: Sehingga ibu bisa bekerja sama dengan semua tindakan yang akan dilakukan.

5) Beri penjelasan kepada klien mengenai sebab terjadinya amenorhea

Rasional: Amenorhea disebabkan karena adanya hormone progesterone seperti DMPA bisa mengakibatkan gangguan pada ovarium, hipotalamus serta hipofisis sehingga hampir tidak ada FSH saat dihasilkan sehingga tidak dapat menggerakkan ovarium pada proses steroidogenesis serta oogenesis. Jadi dampaknya tidak banyak memproduksi E2 hingga endometrium menyebabkan tidak adanya proses proliferasi. Mengakibatkan siklus haid tidak terjadi serta cenderung dianggap bahwasanya penggunaan kontrasepsi suntikan tiga bulan dalam jangka waktu yang lama mempunyai efek samping berupa *amenorhea*.

6) Anjurkan ibu untuk datang jika terdapat masalah pada kesehatan yang berhubungan pada kontrasepsi.

Rasional: Supaya pasien mendapat bantuan sedini mungkin.

7) Minta persetujuan langsung pada klien sebelum memberikan suntik.

Rasional : Supaya klien merasakan aman.

- 8) Beri suntik DMPA 150 mg di bokong klien pada 1/3 SIAS dengan IM berdasarkan standar prosedur.

Rasional: Supaya keperluan pasien dipenuhi untuk kelancaran pelayanan KB.

- 9) Ajarkan pada ibu tentang perubahan fisik yang bisa terjadi setelah penyuntikan.

Rasional: Perubahan fisik yang bisa terjadi setelah penyuntikan misalnya: misalnya: perubahan pada berat badan, perubahan pada siklus menstruasi dimana bisa terjadi (*amenorhea, spotting, metrorrhagie, menometorrhagie*), hematoma, sakit kepala, keputihan, serta hiperpigmentasi pada wajah.

- 10) Jelaskan bahwasanya kemungkinan kegagalan yang terjadi akibat suntik DMPA yaitu sekitar di bawah 1%.

Rasional: Kontrasepsi suntik tersebut memiliki efektivitas yang tinggi 0,3 kehamilan per 100 perempuan-tahun, asal penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- 11) Jelaskan pada ibu mengenai KB dalam pandang Islam

Rasional: Kontrasepsi dalam bahasa arab memiliki dua makna yaitu

tahdidun nasli dan *tandzimun nasli*. *Tahdidun nasli* berarti membatasi keturunan atau membatasi kehamilan yang mana disini hukumnya diharamkan, sedangkan *tandzimun nasli* artinya menunda keturunan atau menunda kehamilan dan keberadaan hukumnya diperbolehkan. Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila di lihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemadhratan, maka tidak diragukan lagi kebolehan nya dalam Islam.

12) Jelaskan pada ibu mengenai penanganan dari efek samping KB suntik DMPA.

Rasional : a. Amenorhea

Menjelaskan bahwa efek samping atau keluhannya bersifat sementara serta anjurkan ibu untuk tetap melanjutkan penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan (Firdayanti, 2012).

b. Perubahan berat badan

Menjelaskan bahwa yang mempengaruhi penurunan

berat badan di mungkinkan pola makan, kepekaan terhadap penyakit, lingkungan, emosional, dan diet. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan (Mukrimaa,2016: 155).

c. Hematoma

Kompres dingin pada area yang membiru selama 2 hari, kemudian ganti dengan kompres hangat samapi warnanya mulai menghilang (Marfuah, 2012).

d. Spooting

Jelaskan bahwa perdarahan ringan adalah hal yang normal, hal tersebut bukan permasalahan besar, serta umumnya tidak diperlukan untuk diobati (Asia, 2017: 25).

e. Metrorrhagie dan Menometorhagie

Bila tidak menimbulkan kegelisahan tidak perlu pengobatan. Bila menimbulkan kegelisahan dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Suntikan dihentikan bila perdarahan hebat.

f. Sakit kepala

Menjelaskan pada akseptor bahawa efek samping tersebut mungkin ada tetapi jarang terjadi dan biasanya

bersifat sementara. Pemberian asam mefenamat 500 mg 3×1 untuk mengurangi keluhan (Nur Qadariyah, 2012: 23).

g. Keputihan dan Hiperpigmentasi

Menjelaskan kepada akseptor bahwa kontrasepsi suntikan jarang terjadi keputihan dan hiperpigmentasi. Bila keputihan terjadi juga harus dicari penyebabnya dan segera diberikan pengobatan. Bila hiperpigmentasi menimbulkan kegelisahan akibat efek samping dari suntik KB maka suntikan dihentikan dan flek hitam pada wajah bisa memudar dengan sendirinya tanpa pengobatan. Namun agar bisa cepat memudar dan tidak mengganggu penampilan dapat menggunakan cara alami seperti mengoleskan lidah buaya, serta mengonsumsi makanan yang mengandung B3.

h. Risiko penurunan densitas mineral tulang

Upaya agar penurunan densitas mineral tulang dapat dicegah yaitu akseptor yang secara teratur berusaha mempertahankan konsumsi kalsium, mengurangi konsumsi kafein, dan menambah kegiatan olahraga sekali dalam seminggu dapat mencegah penurunan

densitas mineral tulang. Selain upaya tersebut, akseptor dapat mengganti metode kontrasepsi yang mengandung hormon esterogen, atau yang bukan merupakan KB hormonal seperti IUD. Selain upaya tersebut, akseptor dapat memeriksakan kepadatan tulangnya secara berkala agar dapat mengetahui sejak dini penurunan densitas tulang tersebut.

i. Galaktorea

Pada akseptor yang sedang menyusui dapat tetap menyusui bayinya, sedangkan pada akseptor yang tidak menyusui konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan hormon prolaktin, bila terdapat hormon prolaktin pemberian suntikan dihentikan.

13) Ingatkan klien agar kembali sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanggal 21 November 2023.

Rasional : Pemberian suntik diperbolehkan secara berkala tiap 90 hari ataupun 12 minggu agar bisa menghambat terjadinya kehamilan karena keterlambatan di beri suntik.

F. LANGKAH VI IMPLEMENTASI

Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul: 11.58 WITA

1. Menyambut klien dengan (5S) yaitu: senyum, salam, sapa, sopan serta santun.

Hasil: Sudah dilakukan

2. Menanyakan keluhan yang dirasakan oleh klien

Hasil: Klien mengeluh tidak menstruasi selama menggunakan KB suntik DMPA.

3. Memberikan pemahaman pada klien mengenai dampak yang dapat ditimbulkan penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA.

Hasil: Ibu mengerti setiap penjelasan yang telah diberikan.

4. Memberitahukan klien mengenai prosedur asuhan sebelum memulai tindakan apa pun.

Hasil: Sudah di lakukan

5. Memberikan penjelasan kepada klien mengenai sebab terjadinya amenorhea.

Hasil: Klien paham mengenai penyebab amenorhea dan sudah tidak terlalu khawatir dengan hal itu.

6. Menganjurkan ibu untuk datang jika terdapat masalah pada kesehatan yang berhubungan pada kontrasepsi.

Hasil: Klien telah bersedia

7. Meminta persetujuan secara langsung pada klien sebelum memberikan suntikan.

Hasil: Telah dilakukan

8. Memberikan suntik DMPA 150 mg di bokong ibu pada 1/3 SIAS dengan IM berdasarkan standar prosedur.

Hasil: Sudah diberikan suntikan DMPA pada bokong ibu sesuai dengan prosedur.

9. Mengajarkan pada ibu tentang perubahan fisik yang bisa terjadi setelah penyuntikan

Hasil : Telah di jelaskan

10. Menjelaskan bahwasanya kemungkinan kegagalan yang terjadi akibat suntik DMPA yaitu sekitar di bawah 1%.

Hasil : Ibu telah paham

11. Menjelaskan pada ibu mengenai KB dalam pandang Islam

Hasil : Ibu telah mengeti mengenai penjelasan KB dalam pandangan Islam

12. Menjelaskan pada ibu mengenai penanganan dari efek samping KB suntik DMPA.

Hasil : Ibu telah paham mengenai penanganan dari efek samping suntik DMPA

13. Mengingatkan klien agar kembali sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanggal 21 November 2023.

G. LANGKAH VII EVALUASI

28 Agustus 2023, Pukul: 12.00 WITA

1. Klien telah memahami setiap penjelasan.
2. Klien telah memahami hal yang menyebabkan amenorhea serta sudah tidak memiliki kekhawatiran.
3. Klien mengatakan tetap mau menggunakan kontrasepsi suntikan DMPA.
4. Klien mau datang kembali tanggal 21 November 2023 untuk mendapatk suntik berikutnya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 28 AGUSTUS 2023**

No Register : 523xxx

Tanggal Kunjungan : 28 Agustus 2023 Pukul : 11.49 WITA

Tanggal Pengkajian : 28 Agustus 2023 Pukul : 11.49 WITA

Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"

Umur : 24 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMK / SMK

Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien datang ke puskesmas agar mendapatkan suntik ulang berdasarkan dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan klien merasa khawatir karena tidak mengalami haid (amenorhea) semenjak menggunakan suntik DMPA.
2. Ibu menjadi akseptor suntikan DMPA sejak tanggal 14 Desember 2022.
3. Ibu menggunakan KB suntik DMPA \pm 1 tahun.
4. Ibu mengatakan setelah suntikan KB yang pertama pada tanggal 14 Desember 2022, ibu mengalami bercak (spooting) selama 2 hari kemudian setelahnya sudah tidak mengalami haid (amenorhea).
5. Ibu mengatakan akan mengalami bercak-bercak (spooting) setiap kali selesai suntikan dan berlangsung selama 2-3 hari.
6. Selama menggunakan KB ibu mengatakan mengalami masa menstruasi yang tidak beraturan, klien tidak menstruasi sekitar 3 bulan berurutan bahkan bisa lebih. Klien mengatakan belum memiliki rencana untuk hamil lagi.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum
 - a. KU : Baik
 - b. Kesadaran : Composmentis
 - c. BB sekarang : 51 kg
 - d. BB sebelum : 55 kg

- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV

TD : 100/73 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul: 11.58 WITA

1. Menyambut ibu dengan (5S) yaitu: senyum, salam, sapa, sopan serta santun.

Hasil: Sudah dilakukan

2. Menanyakan keluhan yang dirasakan oleh klien

Hasil: Klien mengeluh tidak mengalami menstruasi selama menggunakan kontrasepsi suntik DMPA.

3. Memberikan pemahaman pada klien mengenai dampak yang dapat ditimbulkan penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA.

Hasil: Ibu mengerti setiap penjelasan yang telah diberikan.

4. Memberitahukan klien mengenai prosedur asuhan sebelum memulai tindakan apa pun.

Hasil: Sudah di lakukan

5. Memberikan penjelasan kepada klien mengenai sebab terjadinya amenorhea.

Hasil: Klien sudah paham mengenai penyebab amenorhea dan sudah tidak terlalu khawatir dengan hal itu.

6. Menganjurkan ibu untuk datang jika terdapat masalah pada kesehatan yang berhubungan pada kontrasepsi.

Hasil: Klien telah bersedia

7. Meminta persetujuan secara langsung pada klien sebelum memberikan suntikan.

Hasil: Telah dilakukan

8. Memberikan suntik DMPA 150 mg di bokong ibu pada 1/3 SIAS dengan IM berdasarkan standar prosedur.

Hasil: Sudah diberikan suntikan DMPA pada bokong ibu sesuai dengan prosedur.

9. Memberitahukan pada ibu tentang perubahan fisik yang bisa terjadi setelah penyuntikan

Hasil : Telah di jelaskan

10. Menjelaskan bahwasanya kemungkinan kegagalan yang terjadi akibat suntik DMPA yaitu sekitar di bawah 1%.

Hasil : Ibu telah paham

11. Menjelaskan pada ibu mengenai KB dalam pandang Islam

Hasil : Ibu telah mengeti mengenai penjelasan KB dalam pandangan Islam

12. Menjelaskan pada ibu mengenai penanganan dari efek samping KB suntik DMPA.

Hasil : Ibu telah paham mengenai penanganan dari efek samping suntik DMPA

13. Mengajukan klien agar kembali sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanggal 21 November 2023

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023**

No Register : 523xxx

Tanggal Kunjungan : 1 September 2023

Pukul : 12.27 WITA

Tanggal Pengkajian : 1 September 2023

Pukul : 12.27 WITA

Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"

Umur : 24 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMK / SMK

Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien berkata sudah lama memakai kontrasespsi suntikan 3 bulan

2. Klien mengatakan cukup lama ± 1 tahun menggunakan alat kontrasepsi suntikan 3 bulan.
3. Klien berkata sampai sekranag menyusui anaknya
4. Ibu mengatakan adanya bercak (*spotting*) selama 2 hari setelah suntikan ke-4 pada tanggal 28 Agustus 2023, tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai seterusnya setelah 2 hari mengalami spotting, mengalami kenaikan berat badan 1 kg setelah kunjungan terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023, merasakan sakit kepala tiap awal-awal sehabis di suntik, tidak adanya flek hitam pada wajah, tidak mengalami bengkak atau nyeri pada bekas suntikan (Hematoma), adanya keputihan yang berlebihan.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 52 kg
- d. BB sebelumnya : 51 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 81 cm

h. TTV

TD : 104/70 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 1 September 2023, Pukul: 12.28 WITA

1. Melakukan pendekatan terhadap ibu, suami serta keluarga dengan selalu memperhatikan apakah ibu bersedia memberikan waktunya, menyapa

serta memperkenalkan dirinya dengan maksud memberikan pemahaman seputar kontrasepsi suntikan DMPA.

Hasil : Klien beserta keluarganya menyambut dengan sangat baik.

2. Memberitahukan pada klien mengenai kunjungan terakhir bahwasanya pengguna kontrasepsi suntikan DMPA mungkin bisa mengalami dampak yang lainnya, misalnya bercak (spotting) serta perubahan BB yang dirasakan klien pada sampai sekarang.

Hasil : Klien telah paham.

3. Memberitahukan kepada klien bahwasanya keluhan amenorhea yang dirasakan adalah hal biasa terjadi pada pengguna kontrasepsi suntian DMPA serta tidak usah dikhawatirkan dikarenakan hal tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya.

Hasil : Klien mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

4. Menyelidiki permasalahan yang dirasakan klien, khususnya mencari tahu apa bila klien tidak merasakan sakit kepala, spotting, perdarahan, bertambahnya BB, berubahnya warna kulit serta munculnya jerawat ataupun masalah lain.

Hasil : Klien mengungkapkan bahwa sejak menggunakan suntik DMPA, terkadang mengalami haid sedikit-sedikit bahkan tidak mengalami haid sama sekali.

5. Menyarankan klien agar menyusui setidaknya selama dua tahun.

Hasil : Klien mengatakan akan menyusui anaknya selama dua tahun.

6. Menjelaskan kepada ibu bahwa sakit kepala merupakan salah satu dari efek samping suntik KB DMPA, hal ini dapat ditimbulkan akibat respon tubuh pada progesterone hingga hormone estrogen fluktuatif (terjadi tekanan).

Hasil : Ibu memahami penjelasan yang telah diberikan

7. Menyarankan pada ibu untuk datang ke layanan kesehatan terdekat, jika ada gangguan kesehatan atau permasalahan yang berhubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Klien akan datang apabila timbul permasalahan.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2023**

No Register : 523xxx
Tanggal Kunjungan : 10 September 2023 Pukul : 11.06 WITA
Tanggal Pengkajian : 10 September 2023 Pukul : 11.06 WITA
Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"
Umur : 24 Tahun / 29 Tahun
Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMK / SMK
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta
Alamat : Jl. H Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien berkata BB turun 1 kg setelah dilakukan penimbangan pada kunjungan pertama tanggal 1 September 2023, karena alasannya ibu mau

menurunkan berat badan (diet) dengan menjaga pola makan ibu dan melakukan senam sore 1-2 kali seminggu.

2. Ibu mengatakan sudah lama tidak menstruasi dan merasa khawatir dengan keadaanya.
3. Sudah tidak adanya bercak (*sputing*).
4. Klien menyampaikan sampai sekarang sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam.
5. Ibu mengatakan masih mengalami keputihan yang berlebihan.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 51 kg
- d. BB sebelumnya : 52 kg
- e. Tinggi badan : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV

TD : 110/80 mmHg

N : 82 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 10 September 2023, Pukul: 11.13 WITA

1. Mendekati ibu serta keluarga dengan bersikap ramah dan penuh perhatian.

Hasil : Ibu serta keluarga menyambut dengan baik.

2. Memberitahukan pada ibu mengenai hasil pemeriksaan.

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: Composmentis, tanda-tanda vital meliputi

TD: 110/80 mmHg, N: 82 x/menit, S: 36,5 °C, P : 20 x/menit.

Hasil pemeriksaan fisik normal.

3. Memberikan kesempatan kepada ibu agar menyampaikan permasalahannya bahwa klien merasakan gelisah dikarenakan tidak mendapat menstruasi, klien khawatir darah menstruasi yang tidak keluar bisa berubah jadi tumor serta penyakit di dalam rahim.

Hasil : Telah diberikan.

4. Menjelaskan kepada ibu bahwasanya dampak dari pemakaian kontrasepsi suntikan selama 3 bulan yaitu amenorhea. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progesterone, yang mencegah ovulasi, mengubah dinding rahim dan menipiskan selaput rahim. Hal ini mencegah rahim menebal serta adanya kemungkinan ibu tidak mengalami menstruasi.

Hasil : Klien sudah paham mengenai apa yang dijelaskan.

5. Memberitahukan klien bahwasanya kondisi ini disebabkan oleh dampak dari penggunaan suntik hormonal serta tidak berbahaya bagi kesehatan.

Hasil : Klien telah paham apa yang dijelaskan, serta kekhawatirannya menurun.

6. Menjelaskan pada klien bahwasanya penurunan berat badan kemungkinan kecil bisa terjadi pada akseptor lama KB suntik dimana faktor yang mempengaruhi penurunan berat badan di mungkinkan pola makan,

kepekaan terhadap penyakit, lingkungan, emosional, dan diet. Namun, hal itu juga bergantung pada faktor genetik pada masing-masing akseptor suntik. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. Fisik seseorang juga mempengaruhi terhadap perubahan berat badan karena aktifitas fisik yang berlebihan akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak tubuh.

Hasil : Ibu memahami penjelasan yang diberikan.

7. Menyarankan pada klien agar mencuci vaginanya secara benar dimulai ke depan sampai belakang, basuhlah menggunakan air yang bersih setelah BAB/BAK serta mandi.

Hasil: Klien bersedia

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2023**

No Register : 523xxx
Tanggal Kunjungan : 17 September 2023 Pukul : 11.25 WITA
Tanggal Pengkajian : 17 September 2023 Pukul : 11.25 WITA
Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"
Umur : 24 Tahun / 29 Tahun
Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMK / SMK
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta
Alamat : Jl. H Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien berkata tidak lagi merasa kekhawatiran karena tidak mendapat menstruasi.

2. Ibu mengatakan akan tetap memberikan ASI pada anaknya yang di selingi dengan makanan tambahan.
3. Ibu mengatakan berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 10 September 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam.
4. Ibu mengatakan tetap mengalami keputihan tetapi masih dalam batas yang wajar.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 51 kg
- d. BB sebelumnya : 51 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV

TD : 120/85 mmHg

N : 81 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, puting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 17 September 2023, Pukul: 11.28 WITA

1. Memberikan salam serta sapaah klien dengan tujuan untuk kunjungan ulang.

Hasil : Klien menyambut dengan sangat ramah.

2. Memberitahukan pada ibu mengenai hasil pemeriksaan

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-tanda vital meliputi

TD: 120/85 mmHg, N: 81 x/menit, S: 36,5 °C, P : 20 x/menit.

Hasil pemeriksaan fisik normal.

3. Memberitahukan informasi kepada ibu keuntungan dari ASI, meliputi :
 - a. Sebagai penambah gizi
 - b. Ketahanan pada tubuh
 - c. Menambah kepandaian dan pengetahuan
 - d. Menghemat pengeluaran
 - e. Menjadikan penerus yang bermutu.

Hasil : Klien telah paham

4. Menganjurkan kepada klien agar terus memperhatikan kebersihannya dengan berganti CD kira-kira 3x perhari ataupun saat merasakan lembab, menghindari pemakaian pembersih vagina yang terlalu banyak dikarenakan bisa mengakibatkan iritasi, serta cobalah mencuci menggunakan gerakan yang benar dimulai ke depan sampai belakang gunakanlah air mengalir.

Hasil : Klien telah mengerti.

5. Menganjurkan klien untuk tidak memakai terlalu banyak produk pembersih vagina karena dapat merusak flora normal di vagina.

Hasil : Ibu memahami penjelasan yang telah di berikan.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2023**

No Register : 523xxx

Tanggal Kunjungan : 24 September 2023 Pukul : 13.23 WITA

Tanggal Pengkajian : 24 September 2023 Pukul : 13.23 WITA

Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"

Umur : 24 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMK / SMK

Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien mengatakan mengatur pola makannya yang seimbang

2. Klien masih tetap melakukan senam 1 kali dalam seminggu untuk mempertahankan dietnya.
3. Ibu mengatakan tidak adanya bercak (*sputing*)
4. Ibu mengatakan tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang.
5. Berat badan ibu masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 17 September 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, tidak adanya keputihan yang berlebihan hanya mengalami keputihan yang wajar atau fisiologis.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 51 kg
- d. BB sebelumnya : 51 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV

TD : 120/83 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 24 September 2023, Pukul: 13.26 WITA

1. Memberikan salam pada ibu serta menyapa dengan cara yang ramah untuk untuk follow up kembali.

Hasil : Klien menyambut dengan hangat

2. Memberitahukan pada ibu mengenai hasil pemeriksaan

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-tanda vital meliputi

TD: 120/83 mmHg, N: 80 x/menit, S: 36,5 °C, P : 20 x/menit.

Hasil pemeriksaan fisik normal.

3. Mengedukasi ibu mengenai :

a. Gizi

Agar memenuhi kebutuhan gizi ibu pada masa menyusui, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayur, buah, ikan, dan susu.

b. Pola istirahat

Anjurkan ibu agar beristirahat dengan cukup melalui cara tidur ± 2 jam saat siang hari serta ± 6-8 jam saat malam.

Hasil: Ibu memahami penjelasan yang diberikan

4. Menghimbau klien agar selalu bertakwa pada Allah supaya senantiasa diberi kesehatan.

Hasil : Klien bersedia.

5. Memberitahukan ibu bahwa jadwal penyuntikan ulang pada tanggal 21 November 2023.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang kembali.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 1 OKTOBER 2023**

No Register : 523xxx

Tanggal Kunjungan : 1 Oktober 2023

Pukul : 12.26 WITA

Tanggal Pengkajian : 1 Oktober 2023

Pukul : 12.26 WITA

Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"

Umur : 24 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMK / SMK

Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien mengatakan tidak adanya bercak (*sputing*)
2. Ibu mengatakan tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang.

3. Berat badan ibu mengalami kenaikan 1 kg dengan kunjungan terakhir pada tanggal 24 September 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam.
4. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami keputihan yang berlebihan dan masih dalam batas wajar.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 52 kg
- d. BB sebelumnya : 51 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV
TD : 107/70 mmHg
N : 80 x/menit
S : 36,5 °C
P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 1 Oktober 2023, Pukul: 12.30 WITA

1. Memberikan salam pada ibu untuk melakukan follow up kembali.

Hasil : Disambut dengan ramah oleh ibu.

2. Hasil pemeriksaan perlu dijelaskan kepada ibu

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-tanda vital meliputi

TD: 107/70 mmHg, N: 80 x/menit, S: 36,5 °C, P : 20 x/menit.

Hasil pemeriksaan fisik normal.

3. Menanyakan pada ibu apakah masih mengalami efek samping akibat suntik DMPA.

Hasil : Ibu mengatakan setelah suntik kb yang ke empat ibu masih tidak mengalami haid (amnorhea).

4. Memastikan klien tetap menggunakan kontrasepsi suntikan DMPA, dan akan kembali untuk suntik ulang.

Hasil : Klien tetap ingin akan menggunakan suntikan DMPA dan akan kembali untuk suntik ulang.

5. Jika ada yang kurang dipahami, berikan kesempatan pada ibu untuk bertanya.

Hasil : Telah dilakukan

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 9 OKTOBER 2023**

No Register : 523xxx
Tanggal Kunjungan : 9 Oktober 2023 Pukul : 12.05 WITA
Tanggal Pengkajian : 9 Oktober 2023 Pukul : 12.05 WITA
Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"
Umur : 24 Tahun / 29 Tahun
Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMK / SMK
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien tetap mengontrol keseimbangan makanannya

2. Klien mengatakan tetap melakukan senam 1 kali dalam seminggu untuk mempertahankan dietnya.
3. Ibu mengatakan tidak adanya bercak (*sputting*)
4. Ibu mengatakan tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang.
5. Berat badan ibu menurun 1 kg dengan kunjungan terakhir pada tanggal 1 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas wajar.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 51 kg
- d. BB sebelumnya : 52 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV

TD : 90/63 mmHg

N : 72 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 9 Oktober 2023, Pukul: 12.07 WITA

1. Memberikan salam serta menyapa ibu melakukan kunjungan kembali.

Hasil : Ibu menyambut dengan ramah

2. Memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-tanda vital meliputi

TD: 90/63 mmHg, N: 72 x/menit, S: 36,5 °C, P : 20 x/menit. Hasil


pemeriksaan fisik normal.

3. Memastikan kembali apakah ibu masih menjaga keseimbangan pola makan

Hasil : Ibu mengatakan masih menjaga pola makannya.

4. Menganjurkan ibu datang kembali untuk dilakukan penyuntikan ulang berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan pada tanggal 21 November 2023.

Hasil : Ibu bersedia.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 15 OKTOBER 2023**

No Register : 523xxx

Tanggal Kunjungan : 15 Oktober 2023 Pukul : 11.10 WITA

Tanggal Pengkajian : 15 Oktober 2023 Pukul : 11.10 WITA

Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"

Umur : 24 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMK / SMK

Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien akan selalu mengatur pola makanan yang seimbang
2. Klien berkata tidak adanya bercak (*sputing*)

3. Ibu mengatakan tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang.
4. Ibu mengatakan berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 9 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 51 kg
- d. BB sebelumnya : 51 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV
TD : 93/63 mmHg
N : 75 x/menit
S : 36,5 °C
P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 15 Oktober 2023, Pukul: 11.15 WITA

1. Melakukan follow up kembali serta menyapa ibu dengan ramah

Hasil : Telah dilakukan

2. Memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-tanda vital meliputi

TD: 93/63 mmHg, N: 75 x/menit, S: 36,5 °C, P : 20 x/menit. Hasil


pemeriksaan normal.

3. Mengevaluasi sejauh mana pengetahuan ibu mengenai penjelasan tentang KB suntik DMPA beserta efek sampingnya

Hasil : Ibu sudah dapat menjelaskan mengenai efek samping kb suntik DMPA salah satunya efek samping mengapa terjadi amenorhea.

4. Mengingatkan ibu untuk suntik ulang pada tanggal 21 November 2023.

Hasil : Ibu bersedia.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 22 OKTOBER 2023**

No Register : 523xxx
Tanggal Kunjungan : 22 Oktober 2023 Pukul : 13.20 WITA
Tanggal Pengkajian : 22 Oktober 2023 Pukul : 13.20 WITA
Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"
Umur : 24 Tahun / 29 Tahun
Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMK / SMK
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien berkata akan selalu mengatur keseimbangan makannya
2. Klien tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang.

3. Ibu mengatakan berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 15 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 51 kg
- d. BB sebelumnya : 51 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25cm
- g. LP : 79 cm
- h. TTV

TD : 105/70 mmHg

N : 72 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 22 Oktober 2023, Pukul: 13.25 WITA

1. Melakukan kunjungan rumah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hasil : Telah dilakukan

2. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada klien

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-tanda vital meliputi

TD: 105/70 mmHg, N: 72 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20 x/menit.


Hasil pemeriksaan normal.

3. Memastikan kembali apakah ibu paham dengan penjelasan-penjelasan mengenai suntik DMPA yang kemarin saya jelaskan.

Hasil : Klien sudah paham

4. Mengingatkan klien agar datang suntik ulang dan tetap mau menjadi akseptor suntik DMPA.

Hasil : Klien bersedia.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 29 OKTOBER 2023**

No Register : 523xxx
Tanggal Kunjungan : 29 Oktober 2023 Pukul : 13.10 WITA
Tanggal Pengkajian : 29 Oktober 2023 Pukul : 13.10 WITA
Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"
Umur : 24 Tahun / 29 Tahun
Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMK / SMK
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien mengatakan tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang.

2. Ibu mengatakan berat badannya naik 2 kg dari kunjungan terakhir pada tanggal 22 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 53 kg
- d. BB sebelumnya : 51 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 26 cm
- g. LP : 83 cm
- h. TTV

TD : 118/104 mmHg

N : 75 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera

berwarna putih.

- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul: 13.15 WITA

1. Menciptakan lingkungan menyenangkan dengan 5s

Hasil : Sudah menerapkan 5s

2. Menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan

Hasil : KU: Baik, Kesadaran composmentis, tanda-tanda vital meliputi
TD: 118/104 mmHg, N: 75 x/menit, S: 36,5 °C, P : 20 x/menit.

Hasil pemeriksaan fisik normal.

3. Mengingatkan ibu mengenai dampak ditimbulkan penggunaan suntik DMPA bukan hanya amenorhea.

Hasil : Klien sudah paham.

4. Menanyakan pada klien mengenai pola makan, apakah nafsu makannya sudah tidak sama dengan pola makan sebelumnya.

Hasil : Ibu merasa nafsu makannya mengalami peningkatan.

5. Memberitahukan pada klien bahwasanya apa yang dialami adalah wajar serta tidak usah dikhawatirkan.

Hasil : Klien paham mengenai apa yang dijelaskan.

6. Biar BB klien selalu optimal, anjurkan klien makan teratur serta rutin berolahraga.

Hasil : Klien telah paham serta mau melakukan apa yang dianjurkan.

7. Jika klien mengalami gangguan kesehatan atau masalah pada alat kontrasepsinya, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.

Hasil : Jika terdapat masalah, ibu bersedia datang.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 6 NOVEMBER 2023**

No Register : 523xxx
Tanggal Kunjungan : 6 November 2023 Pukul : 12.05 WITA
Tanggal Pengkajian : 6 November 2023 Pukul : 12.05 WITA
Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"
Umur : 24 Tahun / 29 Tahun
Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMK / SMK
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

Ibu mengatakan tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang. Ibu mengatakan berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada

tanggal 29 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 53 Kg
- d. BB sebelumnya : 53 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 26 cm
- g. LP : 83 cm
- h. TTV

TD : 110/83 mmHg

N : 73 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.

- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 6 November 2023, Pukul: 12.10 WITA

1. Melakukan kunjungan rumah sesuai tanggal yang telah disepakati.

Hasil : Telah dilakukan.

2. Informasikan mengenai hasil pemeriksaan kepada ibu

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-randa vital meliputi yaitu TD: 110/83 mmHg, N: 73 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik normal.

3. Melakukan konseling mengenai perubahan BB

Hasil : Klien sudah paham.

4. Jika ada permasalahan pada kesehatan yang sehubungan dengan KB klien, anjurkan ibu untuk mengunjungi penyedia layanan kesehatan terdekat.

Hasil: Klien bersedia datang bila terdapat gangguan.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 13 NOVEMBER 2023**

No Register : 523xxx

Tanggal Kunjungan : 13 November 2023 Pukul : 10.25 WITA

Tanggal Pengkajian : 13 November 2023 Pukul : 10.25 WITA

Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"

Umur : 24 Tahun / 29 Tahun

Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun

Suku : Makassar / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMK / SMK

Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

Ibu mengatakan tidak mengalami haid (*amenorhea*), berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 6 November 2023, sudah tidak

merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas wajar. Serta ibu mengatakan ingin tetap melanjutkan pemakaian suntik DMPA untuk 1 tahun ke depan.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 53 kg
- d. BB sebelumnya : 53 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 26 cm
- g. LP : 83 cm
- h. TTV

TD : 120/90 mmHg

N : 85 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 13 November 2023, Pukul: 10.30 WITA

1. Melakukan follow up sesuai dengan jadwal asuhan

Hasil : Telah dilakukan

2. Memberitahukan hasil pemeriksaan

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-tanda vital meliputi

TD: 120/90 mmHg, N: 85 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20 x/menit.

Hasil pemeriksaan fisik normal.

3. Mengevaluasi apakah klien sudah tidak merasa khawatir mengenai keadannya dimana tidak mengalami haid dikarenakan efek samping dari kontrasepsi suntik DMPA.

Hasil : Ibu sudah tidak merasa cemas dan khawatir.

4. Agar berat badan ibu tidak terus naik, anjurkan ibu untuk menjaga pola makan yang sehat dan rutin berolahraga

Hasil : Ibu memahami penjelasan yang diberikan dan akan melakukannya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "I" AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI
PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 21 NOVEMBER 2023**

No Register : 523xxx
Tanggal Kunjungan : 21 November 2023 Pukul : 08.50 WITA
Tanggal Pengkajian : 21 November 2023 Pukul : 08.50 WITA
Nama Pengkaji : Cindi Aolia

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "I" / Tn "M"
Umur : 24 Tahun / 29 Tahun
Nikah/Lamanya: 1x / ± 6 tahun
Suku : Makassar / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMK / SMK
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Juanda II

B. Subjektif (S)

1. Klien datang ke puskesmas Jumpandang Baru agar mendapatkan suntik ulang sesuai jadwal yang ditentukan.

2. Tujuan ibu dalam menggunakan KB adalah untuk menjarangkan kehamilannya.
3. Ibu tetap melanjutkan pemakaian kontrasepsi suntik DMPA untuk 1 tahun ke depan.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum

- a. KU : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. BB sekarang : 53 kg
- d. BB sebelumnya : 53 kg
- e. TB : 160 cm
- f. LILA : 25 cm
- g. LP : 80 cm
- h. TTV

TD : 105/90 mmHg

N : 75 x/menit

S : 36,5 °C

P : 20 x/menit

2. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Wajah : Simetris, tidak pucat, tidak adanya cloasma serta oedema.
- b. Mata : Simetris, konjungtiva bewarna merah muda, sklera bewarna putih.
- c. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe, serta vena jugularis.
- d. Payudara : Simetris, adanya hyperpigmentasi pada areola, tidak adanya benjolan dan nyeri tekan, putting susu menonjol.

D. Assesment (A)

Ny "I", 24 tahun, P₂A₀, Akseptor KB Suntik DMPA dengan *Amenorhea*.

E. Planning (P)

Tanggal 21 November 2023, Pukul: 08.55 WITA

1. Memberitahukan pada ibu mengenai hasil pemeriksaan

Hasil : KU: Baik, Kesadaran: composmentis, tanda-tanda vital meliputi
TD: 105/90 mmHg, N: 75 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20 x/menit.

Hasil pemeriksaan fisik normal.

2. Melakukan pemberian suntikan DMPA dengan intramuskular

Hasil : Sudah dilakukan.

3. Memberitahukan kembali pada klien mengenai dampak yang dirasakan sejak menggunakan suntikan 3 bulan.


Hasil : Klien menerima serta memahami keadaannya saat ini.

4. Memberitahukan pada ibu untuk tidak cemas dengan keadaan yang dialami.

Hasil : Ibu tidak lagi merasa khawatir dan cemas

5. Menganjurkan ibu untuk terus beribadah kepada Allah demi selalu diberikan kesehatan.

Hasil : Klien bersedia.



MATRIKS KUNJUNGAN

No	Hari/Tanggal	Masa Kunjungan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1.	1 September 2023, Pukul 12.27 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (1)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan adanya bercak (<i>spotting</i>) selama 2 hari setelah suntikan ke-4 pada tanggal 28 Agustus, tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>) sampai seterusnya setelah 2 hari mengalami spotting, mengalami kenaikan berat badan 1 kg setelah kunjungan terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023, merasakan sakit kepala tiap awal-awal sehabis di suntik, tidak adanya flek hitam, tidak mengalami bengkak atau nyeri pada bekas suntikan (Hematoma), adanya keputihan yang berlebihan. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> BB sekarang: 52 kg BB sebelumnya: 51 kg Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➢ TD: 104/70 mmHg ➢ Nadi: 80 x/menit ➢ Suhu: 36,5 °C ➢ P: 20 x/menit Pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberitahukan kepada ibu mengenai kunjungan terakhir bahwasanya pengguna kontrasepsi suntikan DMPA mungkin bisa saja mengalami dampak lain, misalnya bercak (<i>spotting</i>) serta perubahan BB dimana klien mengalaminya. Menyelidiki permasalahan yang dirasakan klien, khususnya mencari tahu apa klien tidak merasakan sakit kepala, bercak, perdarahan, penambahan BB, perubahan warna kulit ataupun munculnya jerawat serta keluhan lainnya. Menjelaskan kepada klien bahwa sakit kepala merupakan salah satu dari efek samping suntik KB DMPA, hal ini dapat diakibatkan oleh respon tubuh pada progesterone hingga hormon estrogen fluktuatif (mengalami tekanan). 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu memahami penjelasan yang diberikan. Ibu mengungkapkan bahwa sejak menggunakan suntik DMPA, terkadang mengalami haid sedikit-sedikit bahkan tidak mengalami haid sama sekali. Ibu memahami penjelasan yang telah diberikan.

2.	10 September 2023, Pukul 13.10 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (2)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan berat badannya menurun 1 kg setelah dilakukan penimbangan pada kunjungan pertama tanggal 1 September 2023, karena alasannya ibu mau menurunkan berat badan (diet) dengan menjaga pola makan ibu dan melakukan senam sore 1-2 kali seminggu. Ibu mengatakan sudah lama tidak menstruasi dan merasa khawatir dengan keadaanya. Klien berkata tidak adanya bercak (<i>sputing</i>). Klien berkata sampai sekarang sudah tidak merasakan sakit kepala, serta tidak adanya flek hitam. Ibu mengatakan mengalami keputihan yang berlebihan <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> BB sekarang: 51 kg BB sebelumnya: 52 kg Tinggi badan: 160 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 100/83 mmHg ➤ Nadi: 82 x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit Pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan pada klien bahwasanya dampak menggunakan kontrasepsi suntikan tiga bulan yaitu amenorhea. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progesterone, yang mencegah, mengubah dinding rahim dan menipiskan selaput rahim. Hal ini mencegah rahim menebal serta bisa membuat pasien tidak mengalami menstruasi. Menjelaskan pada ibu bawasanya penurunan berat badan kemungkinan kecil bisa terjadi pada akseptor lama KB suntik dimana faktor yang mempengaruhi penurunan berat badan di mungkinkan pola makan, kepekaan terhadap penyakit, lingkungan, emosional, dan diet. Namun, hal itu juga bergantung pada faktor genetik pada masing-masing akseptor suntik. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu sudah memahami apa yang dijelaskan, serta kekhawatiran klien pun menurun. Klien paham mengenai penjelasan.
----	--	------------------------	---	---	---

3.	17 September 2023, Pukul 11.25 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (3)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan tidak lagi merasakan kekhawatiran karena tidak mendapat menstruasi. Klien mengungkapkan akan terus memberi ASI pada anaknya yang dibarengi sama makan tambahan. Ibu mengatakan berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 10 September 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam. Klien mengatakan masih mengalami keputihan tetapi masih dalam batas yang wajar. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 51 kg BB sebelumnya: 51 kg Tinggi badan: 160 cm LILA: 25 cm LP: 80 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 120/85 mmHg ➤ Nadi: 81 x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit Pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberitahukan pada klien tentang hasil pemeriksaan. Memberikan informasi pada klien mengenai keuntungan dari ASI, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penambah gizi • Ketahanan pada tubuh • Menambah kepandaian dan pengetahuan • Menghemat pengeluaran • Menjadikan penerus yang bermutu. Menganjurkan kepada klien untuk mengganti pakaian dalam setidaknya tiga kali sehari ataupun terasa lembab, hindarilah penggunaan sabun vagina yang terlalu berlebih sebab bisa mengakibatkan Iritasi, serta berusaha untuk mencuci membasuh dengan benar dimulai depan lalu belakang dengan air mengalir. Menganjurkan klien untuk tidak memakai pembersih vagina yang berlebih mengingat bisa membunuh mematikan bakteri baik dalam vagina. 	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah : 120/85 mmHg, nadi : 81 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Ibu mengerti dan mengetahui manfaat ASI. Ibu telah mengerti. Ibu telah paham.
----	--	------------------------	--	---	--

4.	24 September 2023, Pukul 13.23 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (4)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan mengatur pola makan yang seimbang. 2. Ibu mengatakan masih tetap melakukan senam 1 kali dalam seminggu untuk mempertahankan dietnya. 3. Ibu mengatakan tidak adanya bercak (<i>sputting</i>) 4. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>) setelah sampai sekarang. 5. Berat badan ibu masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 17 September 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, tidak adanya keputihan yang berlebihan hanya mengalami keputihan wajar atau fisiologis. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 51 kg BB sebelumnya: 51 kg Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 120/83 mmHg ➤ Nadi: 80 x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit 2. Pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pada ibu mengenai hasil pemeriksaan. 2. Mengedukasi ibu tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Nutrisi • Pola istirahat 3. Menghimbau klien agar selalu bertkwa pada Allah biar senantiasa di berikan kesehatan. 4. Ingatkan pada ibu untuk kembali adalah tanggal 21 November 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah : 120/83 mmHg, nadi : 80 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 2. Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 3. Ibu selalu berserah diri dan bertaubat dengan berdoa kepada Allah swt. 4. Ibu mengerti.
----	--	------------------------	---	--	---

5.	1 Oktober 2023, Pukul 10.26 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (5)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan tidak adanya bercak (<i>spotting</i>) 2. Ibu mengatakan tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>) sampai sekarang. 3. Berat badan ibu mengalami kenaikan 1 kg dengan kunjungan terakhir pada tanggal 24 September 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam. 4. Ibu mengatakan sudah tidak adanya keputihan yang berlebihan dan masih dalam batas wajar. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 52 kg BB sebelumnya: 51 kg TB: 160 cm LILA: 25 cm LP: 80 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 107/70 mmHg ➤ Nadi: 80x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit 2. Pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan perlu dijelaskan kepada ibu. 2. Menanyakan pada ibu apakah ibu masih mengalami efek samping dari kontrasepsi suntikan DMPA. 3. Memastikan klien tetap menggunakan kontrasepsi suntikan DMPA, dan akan kembali untuk suntik ulang. 4. Jika ada yang kurang dipahami, berikan kesempatan pada ibu untuk bertanya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TTV serta pemeriksaan fisik normal. 2. Ibu mengatakan setelah suntik KB yang ke-4 ibu masih tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>). 3. Klien tetap akan menggunakan suntik DMPA dan akan kembali untuk suntik ulang. 4. Telah dilakukan.
----	--	---------------------	--	---	---

6.	9 Oktober 2023, Pukul 12.05 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (6)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu tetap mengatur keseimbangan makanannya 2. Ibu mengatakan tetap melakukan senam 1 kali dalam seminggu untuk mempertahankan dietnya. 3. Ibu mengatakan tidak adanya bercak (<i>spotting</i>) 4. Ibu mengatakan tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>) sampai sekarang. 5. Berat badan ibu menurun 1 kg dengan kunjungan terakhir pada tanggal 1 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas wajar. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 51 kg BB sebelumnya: 52 kg Tinggi badan: 160 cm LILA: 25 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 90/63 mmHg ➤ Nadi: 72 x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit 2. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu. 2. Memastikan kembali apakah ibu masih menjaga keseimbangan pola makannya. 3. Mengajukan ibu datang kembali untuk dilakukan penyuntikan ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 21 November 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah : 90/63 mmHg, nadi : 72 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 2. Ibu mengatakan masih menjaga pola makannya. 3. Ibu bersedia.
----	--	---------------------	--	--	---

7.	15 Oktober 2023, Pukul 11.10 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (7)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien akan selalu mengatur pola makan yang seimbang. 2. Klien berkata tidak adanya bercak (<i>spooting</i>) 3. Ibu mengatakan tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>) sampai sekarang. 4. Ibu mengatakan berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 9 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 51 kg BB sebelumnya: 51 kg Tinggi badan: 160 cm LILA: 25 cm LP: 80 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 93/63 mmHg ➤ N: 75 x/menit ➤ S: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit 2. Pemeriksaan fisik normal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan 2. Mengevaluasi sejauh mana pengetahuan ibu mengenai penjelasan tentang KB suntik DMPA beserta efek sampingnya. 3. Mengingatkan ibu untuk suntik ulang pada tanggal 21 November 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah : 93/63 mmHg, nadi : 75 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 2. Ibu sudah dapat menjelaskan mengenai efek samping kb suntik DMPA salah satunya efek samping mengapa terjadi amenorhea. 3. Ibu bersedia.
----	--	------------------------	---	---	--

8.	22 Oktober 2023, Pukul 13.20 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (8)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan tetap mengatur keseimbangan makanannya 2. Ibu tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>) sampai sekarang. 3. Ibu mengatakan berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 15 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 51 kg BB sebelumnya: 51 kg Tinggi badan: 160 cm LILA: 25 cm LP: 80 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 105/70 mmHg ➤ Nadi: 72 x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit 2. Pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada klien. 2. Memastikan kembali apakah klien paham dengan penjelasan-penjelasan mengenai suntik DMPA yang kemarin saya jelaskan. 3. Mengingatkan ibu agar datang untuk suntik ulang dan tetap mau menjadi akseptor suntik DMPA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KU: baik, TTV serta pemeriksaan fisik normal. 2. Ibu telah paham. 3. Ibu bersedia.
----	--	------------------------	--	--	---

9.	29 Oktober 2023, Pukul 14.10 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (9)	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>) sampai sekarang. Ibu mengatakan berat badannya naik 2 kg dari kunjungan terakhir pada tanggal 22 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 53 kg BB sebelumnya: 51 kg TB: 160 cm LILA: 26 cm LP: 83 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 118/90 mmHg ➤ Nadi: 75 x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberitahukan mengenai hasil pemeriksaan. Mengingatkan klien mengenai dampak ditimbulkan penggunaan suntik DMPA bukan hanya amenorhea. Menanyakan pada klien mengenai pola makannya, apakah nafsu makan ibu tidak sama dengan pola makan sebelumnya. Memberitahukan pada klien bahwasanya apa yang dialami adalah wajar serta tidak usah dikhawatirkan. Biar BB klien selalu optimal, anjurkan klien makan teratur serta rutin berolahraga. Jika ibu mengalami gangguan kesehatan atau masalah pada alat kontrasepsinya, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. 	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah : 118/104 mmHg, nadi : 75 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Telah dijelaskan dan ibu mengerti. Ibu merasa nafsu makannya mengalami peningkatan. Klien paham mengenai apa yang dijelaskan. Klien telah paham serta mau melakukan apa yang dianjurkan. Jika terdapat masalah, ibu bersedia datang.
----	--	------------------------	---	---	--

10.	6 November 2023, Pukul 12.05 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (10)	<p>DS:</p> <p>Ibu mengatakan tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>) sampai sekarang. Ibu mengatakan berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 29 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas wajar.</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 53 kg BB sebelumnya: 53 kg TB: 160 cm <p>LILA: 26 cm LP: 83 cm TTV:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 110/83 mmHg ➤ N: 73 x/menit ➤ S: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasikan mengenai hasil pemeriksaan kepada ibu. 2. Melakukan konseling mengenai perubahan berat badan. 3. Jika ada kendala atau gangguan kesehatan pada alat kontrasepsi ibu, anjurkan ibu untuk mengunjungi penyedia layanan kesehatan terdekat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah : 110/83 mmHg, nadi : 73 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 2. Klien sudah paham 3. Klien bersedia datang bila terdapat gangguan.
-----	--	-------------------------	---	--	--

11.	13 November 2023, Pukul 10.25 WITA Di Jl. Juanda II	Kunjungan Rumah (11)	<p>DS:</p> <p>Ibu mengatakan tidak mengalami haid (<i>amenorhea</i>), berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 6 November 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar.</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU: baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 53 kg BB sebelumnya: 53 kg TB: 160 cm LILA: 26 cm LP: 83 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 120/90 mmHg ➤ Nadi: 85 x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit 2. Pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan hasil yang sudah diperiksa. 2. Mengevaluasi apakah klien sudah tidak merasa khawatir mengenai keadannya yang tidak mengalami haid dikarenakan salah satu efek samping kb suntik DMPA. 3. Agar berat badan ibu tidak terus naik, anjurkan ibu untuk menjaga pola makanyang sehat dan rutin berolahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah : 120/90 mmHg, nadi : 85 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 2. Ibu sudah tidak lagi merasa cemas dan khawatir. 3. Ibu memahami apa yang telah dijelaskan serta mau melakukan.
-----	---	-------------------------	---	--	--

12.	20 November 2023, Pukul 08.50 WITA Di Puskesmas Jumpandang Baru	Kunjungan Akhir	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien datang ke puskesmas Jumpandang Baru untuk mendapatkan suntikan ulang sesuai jadwal yang ditentukan 2. Tujuan ibu dalam menggunakan KB adalah untuk menjarangkan kehamilannya. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum baik Kesadaran: Composmentis BB sekarang: 53 kg BB sebelumnya: 53 kg Tinggi badan: 160 cm LILA: 26 cm LP: 83 cm Tanda-tanda vital: <ul style="list-style-type: none"> ➤ TD: 105/90 mmHg ➤ Nadi: 75 x/menit ➤ Suhu: 36,5 °C ➤ P: 20 x/menit 2. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat kelainan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan pada ibu mengenai hasil pemeriksaan 2. Memberikan suntikan DMPA secara IM. 3. Menjelaskan kepada ibu mengenai efek samping yang dirasakan ibu sejak menjadi akseptor kb suntik 3 bulan. 4. Memberitahukan pada ibu untuk tidak cemas dengan keadaan yang dialaminya. 5. Menganjurkan ibu untuk terus beribadah kepada Allah demi selalu diberikan kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah : 105/90 mmHg, nadi : 75 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. 2. Suntikan telah diberikan. 3. Ibu menerima dan memahami keadaanya saat ini. 4. Ibu sudah tidak cemas lagi. 5. Ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan.
-----	--	--------------------	---	--	--

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab tersebut akan menjadi subjek pembahasan terkait ketidaksesuaian antara teori dengan hasil implementasi serta perencanaan asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny "I" akseptor lama suntik metode depo medroksi progesterone asetat (DMPA) dengan amenorhea di puskesmas Jumpandang Baru tanggal 28 Agustus – 21 November 2023.

Studi kasus tersebut dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru dalam jangka waktu 12 pekan dimulai tanggal 28 Agustus – 21 November 2023. Asuhan tersebut dimulai ketika klien berkunjung ke puskesmas pada tanggal 28 Agustus 2023 untuk suntik ulang yang ke-4. Setelah itu dilakukan kunjungan rumah sebanyak 12 kali yaitu mulai pada tanggal 1 September, 10 September, 17 September, 24 September, 1 Oktober, 9 Oktober, 15 Oktober, 22 Oktober, 29 Oktober, 6 November, 13 November, dan 21 November.

Dalam pembahasan tersebut peneliti akan melaksanakan asuhan sehubungan dengan manajemen asuhan kebidanan berdasarkan 7 langkah Varney secara teoritis diawali dengan membedakan identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa aktual/masalah aktual, merumuskan diagnosa /masalah potensial, tindakan segera atau kolaborasi, rencana asuhan, implementasi, serta evaluasi yang telah diberikan pada kasus Ny "I".

A. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Menurut teori, bahwa langkah pertama dalam proses manajemen asuhan kebidanan adalah mengidentifikasi data dasar, yang mencakup dilakukannya pengkajian dan memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi situasi dengan menyeluruh, terfokus serta lengkap seperti menanyakan riwayat kesehatan pasien.

Suatu proses dalam manajemen asuhan kebidanan yang disebut identifikasi data dasar tujuannya yaitu memperoleh semua data spiritual, psikososial, dan informasi baik secara fisik. Wawancara secara langsung kepada ibu serta keluarga dapat memberikan beberapa informasi yang digunakan dalam data ini. Informasi lain dapat diperoleh dari pemeriksaan penunjang dan laboratorium serta pemeriksaan fisik seluruh tubuh (Mangkuji, dkk. 2012).

Terdapat KB suntik 3 bulan dimana berisi hormone progesteron atau progestin dan diberikan tiap tiga bulan. Mengandung 150 mg DMPA dimana disuntikkan ke bokong secara IM (Sulistyawati, 2013).

Kontrasepsi suntik yang berlangsung selama 3 bulan ini sangatlah efisien, serta sesuai bagi seluruh ibu jika ingin mengatur atau menjarakkan kehamilan mereka selama 12 minggu. Indikasi untuk suntik KB 3 bulan adalah klien yang memerlukan KB dalam jangka waktu yang lama serta mempunyai kesuksesan tinggi, wanita usia subur, ibu pasca

mengandung/melahirkan serta menyusui, tidak memiliki riwayat kanker payudara, tidak memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, DM, penderita hipertensi $\pm 180/110$ mmHg, tidak terdapat pendarahan vagina yang tidak diketahui sebabnya (Yuhedi, 2015).

Dalam studi kasus Ny "I" mengumpulkan data awal mulai dengan data subjektif dan objektif. Data subjektif antara lain identitas istri/ suami, alasan berkunjung, riwayat KB dan tinjauan kartu KB, riwayat reproduksi, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat ginekologi, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar seperti: pola nutrisi, pola eliminasi, pola istirahat, personal hygiene dan pola aktivitas, riwayat psikologis, spiritual, dan sosial ekonomi. Data subjektif yang diperoleh pada saat melakukan sesi tanya jawab mengenai identitas klien didapatkan nama Ny "I", usia 24 tahun, pekerjaan sebagai IRT, pendidikan terakhir SMK, serta alamat di Jl. Juanda II.

Hasil pengkajian data awal didapatkan data bahwa asuhan manajemen dimulai saat ibu datang ke puskesmas Jumpadang Baru tanggal 28 Agustus 2023 dengan maksud agar mendapat suntik ulang sebagaimana dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan klien merasa khawatir karena tidak mengalami menstruasi (amenorhea) sejak menggunakan alat kontrasepsi suntik DMPA. Selama menggunakan KB ibu mengatakan mengalami masa menstruasi tidak beraturan, dimana klien tidak menstruasi

lebih dari 3 bulan. Klien menggunakan suntikan DMPA sejak tanggal 14 Desember 2022. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa ibu mengalami amenorhea.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan data objektif dimana pada Ny "I" ditemukan bahwasanya KU: baik, kesadaran: composmentis, BB klien pada saat pertama kali menggunakan KB suntik DMPA yaitu 58 kg, berat badan ibu pada suntikan keempat yaitu 51 kg.

Hasil Pemeriksaan TTV ibu didapatkan tekanan darah 100/73 mmHg, denyut nadi teratur 80 x/menit, suhu tubuh 36,5°C, dan pernafasan 20 x/menit. Hasil pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa wajah tidak mengalami oedema, tidak pucat atau tidak terdapat kelainan. Mata tampak kongjungtiva merah serta sklera tidak mengalami ikterus. Pembesaran kelenjar tiroid, limfe, dan vena jugularis pada leher tidak teraba. Tidak terdapat benjolan, puting menonjol, terdapat pengeluaran ASI, serta dada simetris kanan dan kiri. Ekstermitas atas serta bawah tidak mengalami kecacatan, tidak ada oedema atau varises.

Berdasarkan teori alat kontrasepsi hormonal DMPA mengandung 150 mg progesteron yang disuntikkan secara intramuscular (IM) pada bokong ibu setiap 3 bulan sekali. Penerima KB Suntik DMPA sering kali mengalami gangguan menstruasi, antara lain amenorhea (suatu keadaan ketika akseptor tidak memperoleh menstruasi tiga bulan) dan Spotting (bercak darah).

Endometrium menyebabkan sekretorik akibat hormon progesterone pada KB suntik 3 bulan sehingga menimbulkan spotting pada akseptor. Makin lamanya memakai suntikan 3 bulan semakin sedikit mendapatkan flek, namun cenderung tidak memperoleh siklus menstruasi (Catur Setyorini, 2020: 131).

Ny"l" baru hanya mengalami lima efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi suntik DMPA dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari sedikit efek samping yang disebabkan oleh gangguan haid mulai dari spotting hingga ke amenorhea, perubahan berat badan, keputihan dan sakit kepala. Sedangkan menurut (Suratun, 2013), dampak yang disebabkan dari penggunaan KB suntik DMPA yaitu, amenorhea, spotting, hematoma, perubahan berat badan, metrorrhagie, menometorrhagie, sakit kepala, keputihan, hiperpigmentasi, galaktorea, resiko penurunan densitas mineral tulang, serta Drop Out.

Hematoma adalah pembengkakan disertai nyeri berwarna kebiruan pada bekas suntikan yang disebabkan oleh perdarahan dibawah kulit. Bisa juga disebabkan oleh teknik penyuntikan yang tidak tepat atau penggunaan jarum suntik yang berulang-ulang. (Marfuah, 2012).

Hematoma sendiri mempunyai pengertian adalah kumpulan darah tidak normal di luar pembuluh darah. Kondisi ini dapat terjadi saat dinding pembuluh darah arteri, vena, atau kapiler mengalami kerusakan sehingga menyebabkan darah bocor ke jaringan tubuh lainnya dan darah akan keluar

menuju jaringan yang bukan tempatnya. Kumpulan darah ini bisa terjadi pada bagian tubuh mana pun, dari yang berukuran kecil hingga besar. Orang awam mengenal kondisi ini sebagai lebam, memar, atau biru pada kulit. hematoma digunakan untuk menggambarkan kondisi yang lebih serius saat penumpukan darah meliputi area yang lebih besar, sedangkan lebam, memar, atau biru pada kulit cenderung mengarah pada kondisi yang lebih ringan. Hematoma biasanya ditandai dengan pembengkakan pada area tubuh, perubahan warna kulit (menjadi biru keunguan), kulit terasa hangat dan nyeri (Dewi Anggraheni, dkk. 2021: 3).

Penelitian yang dilakukan Purnama Sari (2022) menyatakan 78% pengguna KB suntik menderita gangguan haid. Temuan ini sejalan dengan pendapat ini Suratun (2008) yang menyatakan bahwa kadar progesteron pada KB suntik terkadang tidak sesuai dengan kondisi endometrium. Ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan endometrium memproduksi lebih banyak volume sehingga menjadi penyebab utama terjadinya gangguan pola menstruasi metrorrhagie (Purnama Sari, 2022: 129).

Berdasarkan penelitian Ernawati, dkk (2010) yang telah dilakukan di Puskesmas Bontomarannu, peneliti memperoleh informasi bahwa selama menggunakan KB suntik 3 bulan akseptor cenderung mengalami gangguan haid. Menometorrhagie adalah kluarnya darah haid yang terlalu banyak di luar

siklus menstruasi (Ernawati et al. 2010: 74).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Lamongan pada bulan Januari-Desember 2014 yakni dari 7.419 PUS Di tentukan bahwa orang yang menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan sebanyak 2.231 orang (30%). Kemudian yang mengalami efek samping dari penggunaan suntik 3 bulan dengan Menometroragia sejumlah 45 orang (2,01%). Sedangkan pada bulan Januari-juni 2015 jumlah akseptor aktif suntik 3 bulan 1.115 orang (15,0%) dengan kejadian menometroragia sebanyak 15 orang (1,3%) (Oktaviana 2015: 42).

Faktor-faktor yang menyebabkan Menometroragia diantaranya adalah pengaruh hormon, penyakit dan pemakaian kontrasepsi. Dalam hal ini adalah wajar dan biasanya terjadi pada pengguna kontrasepsi suntik dan berhenti pada suntikan ke 2-3 dan ini juga bisa mengganggu kondisi akseptor antara lain cemas takut gagal, dan gangguan pola hubungan seksual. Beberapa buku menyatakan bahwa Menometroragia adalah salah satu dampak dari alat kontrasepsi suntik (Prawihardjo, 2014).

Berdasarkan penelitian Priyanti (2016) menjelaskan bahwa sebagian besar responden tidak mengalami melasma yaitu sebanyak 20 responden (52,6%). Yang tidak mengalami melasma ini adalah ibu yang pemakaian alat kontrasepsi suntik kurang dari 5 tahun sedangkan ada 18 responden mengalami melasma hal ini disebabkan selain usia hormone juga sangat

berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan tabulasi silang antar lama pemakaian terhadap kejadian melasma pada pengguna kontrasepsi suntik 3 bulan yaitu sebagian besar terjadi pada lama pemakaian ≥ 5 tahun yaitu sebanyak 17 responden sedangkan pada pemakaian kurang dari < 5 tahun banyak yang tidak mengalami kejadian melasma yaitu 11 responden.

Kontrasepsi suntik 3 bulan dapat menyebabkan hyperpigmentasi pada wajah yang merupakan hal dilematis pada penggunaannya. Hal ini disebabkan penggunaan alat kontrasepsi suntik lebih dari 3 bulan atau ≥ 2 tahun akibatnya hormone progesterone pada tubuh menumpuk hingga menyebabkan hyperpigmentasi wajah (Priyanti, 2016: 80-85).

Adanya suatu pengaruh lama pemakaian dan kejadian melasma pada akseptor KB ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah usia, dimana semakin usia bertambah tua maka kadar hormonal dalam tubuh pun semakin berkurang. Pemakaian alat kontrasepsi yang lama ini juga mempengaruhi sirkulasi hormone di dalam tubuh, karena penumpukan hormone ini akan mempengaruhi kerja dari hormone melanosit. Melasma ini disebabkan oleh meningkatkan kadar DMPA dalam serum, khususnya peningkatan progesterone akibatnya merangsang pembentukan melanosit, melanosom mengandung biokrom coklat yang disebut melamin, banyaknya melamin menentukan warna kulit dan didukung oleh sinar matahari yang memperluas produksi melanosom dan melanin. (Jacoeb, 1994).

Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan Setyowati (2018) pemakaian kontrasepsi suntik jangka panjang mempunyai efek terhadap tingkat kepadatan tulang yaitu lama pemakaian kontrasepsi suntik 2-3 tahun sebagian responden 59 orang (30%) mengalami osteopenia, begitu juga pada lama pemakaian kontrasepsi suntik > 3 tahun sebagian besar 69 orang (42%) mengalami osteopenia. Pada hasil tabulasi tersebut, sebagian besar responden 90 orang (54,87%) menggunakan KB suntik DMPA lebih dari 3 tahun, dikarenakan akseptor KB telah nyaman menggunakan metode tersebut, dapat mencegah kehamilan jangka panjang, dan aman.

Setiap alat kontrasepsi memiliki efek samping, namun setiap individu tidak selalu akan mengalami efek samping yang ditimbulkan. Hal tersebut karena masing-masing individu memiliki adaptasi terhadap pemberian hormon progesteron. Apabila efek samping itu masih dianggap wajar oleh akseptor maka akan memengaruhi lama penggunaan KB suntik DMPA. Lama penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang khususnya DMPA karena memiliki tingginya kandungan progesterone sehingga dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh (Setyowati, 2018: 122).

Dari hasil penelitian (Peni, 2015) didapatkan bahwa untuk seluruh responden yang lama pemakaian DMPA < 3 tahun sebagian besar densitas mineral tulang responden (77,27%) berada dalam kategori normal dan sebagian kecil densitas mineral tulang responden (22,73%) berada dalam

kategori osteopenia. Sedangkan yang lama pemakaian DMPA ≥ 3 tahun, seluruh densitas mineral tulang responden (100%) berada dalam kategori osteopenia. Artinya adanya keterkaitan diantara lama penggunaan KB suntik DMPA dengan densitas tulang di RW 3 Lesanpuro wilayah kerja Puskesmas Gribig Kota Malang. Hal ini menjelaskan bahwa lama pemakaian kontrasepsi Depo Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) menunjukkan ada keterkaitan dengan densitas tulang seorang wanita (Peni, dkk. 2015: 39).

Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang yang utamanya hanya mengandung progestin, dapat mengakibatkan penurunan pada densitas tulang atau kepadatan mineral tulang. Hal ini dikarenakan mekanisme DMPA menekan ovulasi mengakibatkan gangguan siklus haid bahkan amenorea sehingga estrogen menurun produksinya. Hormon estrogen yang sangat rendah akan meningkatkan kerja osteoklas sehingga remodelling tidak seimbang dan lebih banyak ke proses resorpsi tulang sehingga ancaman terjadinya osteoporosis atau bahkan osteopenia (Peni, dkk. 2015: 40).

Penggunaan KB suntik DMPA dapat menyebabkan terjadinya galaktorea karena adanya peningkatan hormone progesterone sehingga menyebabkan peningkatan laktosa dan merangsang laktasi (Amalia, 2020: 22).

Menurut Sigurdsson (200) Pada DMPA tidak ditemukan efek terhadap laktasi, malah mungkin dapat memperbaiki kuantitas ASI (memperbanyak produksi ASI). DMPA tidak merubah komposisi dari ASI (Sigurdsson H. 2000: 20).

Fakta bahwa alat kontrasepsi suntik aman, sederhana, dan efektif, serta dapat digunakan setelah melahirkan, telah memicu banyak minat untuk menggunakannya. Penggunaan alat KB suntik menimbulkan dampak misalnya perubahan BB.

Menurut Vera (2012), setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap hormon progesterin pada suntikan kontrasepsi DMPA, sehingga ibu tidak mengalami efek samping lain. Selain itu, usia klien tergolong sangat muda meskipun masih dalam usia reproduksi membuat hormon dalam tubuh belum menumpuk secara berlebihan.

Pada riwayat KB, klien menyatakan bahwa sesudah melahirkan anak pertama tanggal 14 Oktober tahun 2018, ia mulai menggunakan kontrasepsi pil kombinasi pada tanggal 23 November 2018 hingga 2,9 tahun, alasannya ia berhenti memakai kontrasepsi tersebut dikarenakan berencana ingin mempunyai anak ke-2. Menurut hasil penelitian Andi Cahaya (2018), menemukan bahwa orang yang berumur antara 25 – 35 tahun yaitu masa untuk menjarakkan kehamilan, umur diatas 35 tahun yaitu masa tidak ingin terjadinya kehamilan kembali. Ketika perempuan berhenti minum pil KB,

setengah dari mereka dapat hamil lagi dalam tiga bulan pertama, serta mayoritas dari mereka sesudah satu tahun.

Kesuburan ibu dapat kembali dengan cepat karena masih dalam tahap usia reproduksi, ibu melahirkan anak ke-2 pada tanggal 15 November 2022. Pada tanggal 14 Desember 2022 ibu kembali menggunakan kontrasepsi suntikan 3 bulan karena mengingat klien hanya harus memakai alat kontrasepsi satu kali selama 3 bulan karena ibu sedang menyusui.

Menurut Sulistyawati (2013), indikasi ini efektif serta tidak berpengaruh pada produksi ASI. klien tidak mempunyai riwayat penyakit diantaranya hipertensi, asma, DM, kanker payudara serta penyakit jantung, tidak ada riwayat dirawat di rumah sakit atau puskesmas, dan tidak memiliki alergi pada makanan atau obat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Ny "I" diperoleh hasil pengkajian bahwa ibu merasa khawatir dengan kondisinya karena sudah 9 bulan tidak menstruasi sejak menggunakan alat kontrasepsi suntik DMPA. Ibu juga mengatakan penurunan berat badan terjadi karena melakukan diet dengan menjaga pola makan di sertai melakukan senam sore 1-2 kali seminggu, ibu berusia 24 tahun dimana termasuk usia reproduksi, ibu mengatakan masih menyusui bayinya dengan diselingi pemberian makanan tambahan, tidak memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti hipertensi, dimana tekanan darah normal 100/73 mmHg. Ibu juga tidak mempunyai

riwayat penyakit kanker payudara, penyakit jantung, serta DM.

Berdasarkan kesimpulan diatas, kekhawatiran serta kegelisahan klien berkurang dengan selalu bertawakal pada Allah SWT, sehingga ia selalu diberi kesehatan serta dalam lindungan-Nya. Berkenaan dengan uraian di atas, pada temuan studi kasus dengan konsep dasar menunjukkan bahwa secara garis besar tidak ada kesenjangan.

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian tersebut, peneliti tidak menjumpai ada kesenjangan diantara teori serta kenyataan yang ditemukan.

B. Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Masalah aktual adalah permasalahan sebenarnya dimana terletak pada interpretasi dari data yang sudah disatukan agar dapat mengidentifikasi diagnosis atau masalah kebidanan. Pada tahap ini informasi yang diuraikan akan menjadi penentu diagnosa kebidanan serta permasalahannya, dua-duanya diperlukan dikarenakan ada sejumlah permasalahan yang belum belum bisa diputuskan misalnya diagnosa namun memerlukan penyelesaian yang direncanakan terhadap asuhan pada pasien (Nurhayati, 2013).

Seperti yang dikemukakan oleh Purwoastuti, dkk (2015), kontrasepsi merupakan upaya suami istri dalam mengontrol jumlah serta menjarakkan anaknya yang mereka inginkan dimana kontrasepsi suntikan 3 bulan sangat mempan, berhasil dalam jangka waktu yang lama serta dapat diterapkan pada hampir semua orang. Dimana harus mengulur waktu serta membatasinya

kontrasepsi suntik 3 bulan dihadirkan untuk memberikan perlindungan yang sangat sukses/efektif selama 12 minggu (Purwoastuti, dkk. 2015).

Seperti terlihat pada pembahasan sebelumnya, penggunaan alat kontrasepsi adalah untuk mengatur jarak kehamilan dimana merupakan pilihan yang baik karena diperintahkan dalam Islam dengan tujuan agar para ibu tetap memelihara kesejahteraan anak hingga menjadi takwa terhadap Allah swt.

Berdasarkan Tresnawati F (2013), indikasi pengguna kontrasepsi suntikan 3 bulan adalah perempuan yang memerlukan KB dalam waktu yang lama serta mempunyai pengaruh tinggi, perempuan dalam masa subur, perempuan sesudah mengandung serta menyusui, tidak memiliki riwayat kanker payudara, penyakit jantung, hipertensi, DM, perempuan dengan TD dibawah 180/110 mmHg, tidak mengalami keluar darah pada vagina tanpa sebab jelas, kemudian kontra indikasinya untuk suntikan 3 bulan adalah terjadinya kehamilan serta diduga hamil, keluar darah di vagina yang penyebabnya tidak jelas, tidak adanya riwayat kanker payudara, mampu menyetujui keadaan yang berubah pada siklus menstruasi misalnya spotting serta amenorhea (Tresnawati F 2013).

Terdapat dua perubahan berat badan yaitu penambahan dan penurunan berat badan, maka Data Subjektif mengungkapkan bahwa ibu mengalami penurunan berat badan. Menurut penelitian Depo Provera, rata-rata

penambahan berat badan pertahun antara 2,3 kg – 2,9 kg dan menurunnya berat badan pertahun kira-kira 1,6 kg – 1,9 kg (Amalia, 2020: 23).

Dampak yang biasanya dikeluhkan pengguna kontrasepsi suntik adalah perubahan BB. Selain faktor internal yaitu hormon, faktor eksternal juga mempengaruhi perubahan berat badan. Hal ini sesuai yang diungkapkan Depkes RI (2001) bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan berat badan di mungkinkan pola makan, kepekaan terhadap penyakit, lingkungan, emosional, dan diet. Namun, hal itu juga bergantung pada faktor genetik pada masing-masing akseptor suntik. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. Fisik seseorang juga mempengaruhi terhadap perubahan berat badan karena aktifitas fisik yang berlebihan akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak tubuh (Mukrimaa, 2016: 155).

Dari penjelasan tersebut selain faktor internal yaitu hormon, faktor eksternal juga mempengaruhi perubahan berat badan. Hal yang memungkinkan terjadinya penurunan berat badan di mungkinkan pola makan dan diet. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. Aktifitas fisik yang berlebihan juga akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak pada tubuh.

Rosmala (2016) mengatakan bahwa penting untuk memperhatikan berat badan guna melihat apakah status gizi berubah atau Anda memiliki masalah

kesehatan. Pengendalian berat badan diharapkan mencapai kesuksesan jangka panjang bila orang tersebut bisa memperoleh BB yang sesuai umurnya. Dengan berat badan ideal, maka status gizi dan tingkat kesehatan seseorang dapat diketahui.

Menurut Depkes RI (2012), masa subur perempuan terbagi 3: masa reproduksi muda berusia diantara 15 sampai 19 tahun, yaitu masa penundaan kehamilan, masa reproduksi sehat diantara usia 20 sampai 35 tahun adalah masa menjarakkan kehamilan di mana pemakaian alat kontrasepsi semakin meninggi saat masih berusia muda, dan masa reproduksi tua diantara usia 36 sampai 45 tahun, yaitu masa berakhirnya reproduksi. Selain perubahan pada berat badan, ibu juga mengalami kecemasan tidak menstruasi (amenorhea).

Pengguna KB suntik yang mengalami amenorhea disebabkan oleh ketidakseimbangan hormone yang mengakibatkan endometrium berubah menjadi histologis seperti atropi. Amenorhea adalah masalah haid yang biasa dikeluhkan oleh pengguna suntikan DMPA. Keadaan amenorhea tersebut diperkirakan biasanya terjadi sesudah 3 bulan menggunakan suntik sebanyak 30%, sedangkan berubah 55% satu tahun penggunaan, serta terakhir berjumlah 68% selama 2 tahun menggunakan kontrasepsi suntikan tiga bulan (Andriyati, 2014).

Suntikan tiga bulan adalah KB hormonal dimana terkandung hormone progesterone yang mempunyai dampak, misalnya masalah pada masa haid serta perubahan pada BB. Durasi penggunaan KB suntik mempengaruhi dampaknya terhadap siklus haid. Amenorhe merupakan salah satu gangguan siklus haid yang sering menyerang wanita yang menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan (Lucky Taufik 2015).

Menurut Fitria, dkk (2012), gangguan siklus haid pada seorang wanita dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, anantara lain gangguan psikologis, gangguan makan, dan aktifitas berlebihan. Pada gangguan psikologis menyebabkan keluarnya GnRH, mengakibatkan hormone gonadotropin menurun, sehingga mengakibatkan keluarnya FSH serta LH pada hipofisis terhenti. Gangguan siklus haid seperti amenorhea dapat terjadi pada pengguna KB suntik DMPA karena adanya paparan hormon progesteron yang terlalu lama menyebabkan endometrium menjadi tipis dan atrofi.

Secara teori, kontrasepsi Suntik DMPA sering kali menyebabkan gangguan menstruasi seperti bercak darah (spotting) dan amenorhea yaitu kondisi di mana seorang wanita tidak mengalami menstruasi minimal 3 bulan berturut-turut. Endometrium menyebabkan sekretorik karena akibat dari hormon progesterone pada KB suntik 3 bulan sehingga dapat menimbulkan spotting. Makin sering lama memakai KB suntikan tiga bulan, akibatnya semakin lama tidak mendapatkan bercak dan semakin kecil kemungkinan mengalami

menstruasi (amenorhea) (Catur Setyorini, 2020: 131).

Dari penjelasan tersebut KB suntik DMPA menyebabkan efek samping berupa gangguan haid dimana salah satunya yaitu spotting (perdarahan bercak-bercak). KB suntik DMPA mengandung hormon progesterone yang tinggi sehingga endometrium mengakibatkan sekretorik, yang menyebabkan bercak (spotting).

Berdasarkan data objektif didapatkan bahwa kondisi ibu baik, Kesadaran: komposmentis, tanda-tanda vital: 100/73 mmHg, Nadi: 80 x/menit, Suhu: 36,6°C, Pernafasan: 20 x/menit, BB 51 kg, TB: 160 cm, LILA 25 cm.

Dengan menerapkan teori serta studi kasus pada Ny "I", hasil keseluruhan ternyata terdapat kemiripan dengan diagnosa aktual pada Ny "I" pengguna kontrasepsi suntikan 3 bulan yang mengeluh tidak haid serta mengalami penurunan berat badan. KU: baik, Kesadaran: komposmentis, tanda-tanda vital normal, pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Akibatnya diagnosa actual dapat ditegakkan bahwa pada Ny "I" Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorea. Disimpulkan bahwasanya apa yang dijabarkan pada tinjauan pustaka dengan studi kasus menunjukkan bahwa tidak ada celah antara kesenjangan teori serta studi kasus.

C. Langkah III: Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, masalah potensial yaitu untuk mengidentifikasi sertaantisipasi terhadap semua permasalahan yang kemungkinan bisa terjadi (Nurhayati, 2013). Langkah tersebut, penulis diharuskan dapat mengenali permasalahan atau melakukan identifikasi diagnosa potensial lainnya berdasar pada serangkaian kesimpulan serta permasalahan yang telah diidentifikasi. Bidan harus bersiap dengan temuan ini jika didapatkan masalah diagnosa (Mangkuji, dkk. 2012).

Berdasarkan penelitian Dian Purnama Sari (2022), 37% wanita yang menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan akan mengalami sakit kepala. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Suratun (2008) yang menyatakan bahwa sakit kepala biasa terjadi pada pengguna suntik 3 bulan karena merupakan reaksi tubuh terhadap progesterone yang menyebabkan hormon estrogen berfluktuasi (terjadi penekanan) dan progesteron mampu mengikat air, dapat menyebabkan perubahan pada sel didalam tubuh hingga memberi tekanan kepada syaraf di otak (Purnama Sari, 2022: 130).

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa akseptor KB suntik DMPA dapat menyebabkan sakit kepala dikarenakan respon tubuh terhadap progesteron sehingga hormon estrogen fluktuatif (terjadi penekanan).

Dari hasil penelitian mengenai faktor penyebab drop out pemakai KB suntikan tiga bulan di Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang

tahun 2013 pada tanggal 21-23 April 2014 didapatkan bahwa hampir setengah ibu yang drop out dari peserta KB suntik 3 bulan karena alasan ingin hamil atau ingin mempunyai anak segera (35,13%), dan sebagian kecil karena efek samping (24,32%), ganti cara (16,21%), suami meninggal atau bercerai (8,10%), menopause (8,10%), jarang berhubungan seksual (5,40%), dan suami tidak setuju (2,70%) (Ariska, dkk. 2016: 4).

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa akseptor drop out adalah akseptor yang keluar dari cara atau alat kontrasepsi (Sofian, 2013). Ada beberapa faktor yang menyebabkan drop out peserta KB, hal ini diantaranya disebabkan oleh kegagalan, komplikasi, ingin hamil atau ingin mempunyai anak segera, ganti cara, efek samping, biaya serta aksesibilitas, akseptor bercerai atau suami meninggal, suami tidak setuju, frekuensi hubungan seksual yang jarang, dan menopause.

Pemberian hormon progesteron pada pengguna KB suntik 3 bulan membuat flora vagina berubah. Hal ini memudahkan jamur tumbuh pada vagina sehingga menimbulkan keluhan keputihan yang secara patologi ditandai dengan munculnya rasa gatal. Ini berarti seseorang masih dalam tahap penyesuaian terhadap hormon progesteron yang diberikan secara rutin sejak suntik KB 3 bulan dengan pemberian sebanyak 3-4 kali (Luluk, 2014: 112-113).

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemakaian kontrasepsi dalam jangka panjang atau waktu yang lama akan menyebabkan dosis hormon progesteron menjadi lebih tinggi didalam tubuh. hal ini akan menyebabkan wanita mengalami efek samping yang ditimbulkan hormon progesteron diantaranya adalah keputihan atau fluor albus.

Melasma ini disebabkan oleh peningkatan kadar DMPA dalam serum, khususnya peningkatan konsentrasi progesterone yang merangsang terbentuknya melanosit, melanosom mengandung biokrom coklat yang disebut melamin, banyaknya melamin menentukan warna kulit dan didukung oleh sinar matahari yang memperluas produksi melanosom dan melanin (Jacoeb, 1994).

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KB suntik 3 bulan tepatnya diatas 2 tahun, menyebabkan produksi hormon progesteron dalam tubuh menumpuk sehingga berdampak adanya hyperpigmentasi pada wajah.

Penelitian yang dilakukan Purnama Sari (2022) mengungkapkan bahwa progesteron yang terkandung dalam kontrasepsi suntik, terkadang tidak sesuai dengan kondisi dinding uterus (endometrium). Ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan endometrium memproduksi lebih banyak volume merupakan penyebab utama terjadinya gangguan pola menstruasi misalnya metrorrhagie (Purnama Sari, 2022: 129).

Dari penjelasan tersebut KB suntik DMPA menyebabkan efek samping berupa gangguan haid dimana salah satunya yaitu metrorrhagie yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesterone.

Berdasarkan penelitian Ernawati, dkk (2010) yang telah dilakukan di Puskesmas Bontomarannu, peneliti mendapat data bahwa pada akseptor KB suntik 3 bulan lebih besar kemungkinannya mengalami gangguan menstruasi. Menometorhagie yaitu keluarnya darah haid yang terlalu banyak di luar siklus menstruasi (Ernawati et al. 2010: 74).

Dari penjelasan tersebut, wanita yang menggunakan KB suntik 3 bulan lebih besar kemungkinannya mengalami gangguan menstruasi. Menurut sejumlah buku, terdapat dampak dari KB suntik DMPA yaitu menometroragia.

Penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang yang utamanya hanya mengandung progestin, dapat mengakibatkan penurunan pada densitas tulang atau kepadatan mineral tulang. Hal ini dikarenakan mekanisme DMPA menekan ovulasi mengakibatkan gangguan siklus haid bahkan amenorea sehingga estrogen menurun produksinya. Hormon estrogen yang sangat rendah akan meningkatkan kerja osteoklas sehingga remodelling tidak seimbang dan lebih banyak ke proses resorpsi tulang sehingga ancaman terjadinya osteoporosis atau bahkan osteopenia (Peni, dkk. 2015: 40).

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan pada densitas

tulang atau kepadatan mineral tulang. Dikarenakan lama penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang khususnya DMPA memiliki tingginya kandungan progesterone sehingga dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh.

Penggunaan KB suntik DMPA dapat menyebabkan terjadinya galaktorea karena adanya peningkatan hormone progesterone sehingga menyebabkan peningkatan laktosa dan merangsang laktasi (Amalia, 2020: 22).

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KB suntik DMPA kandungan dalam suntik DMPA memiliki progesterone yang sangat tinggi sehingga memicu meningkatnya laktosa dan merangsang ASI. Akan tetapi pada DMPA tidak ditemukan efek terhadap laktasi, malah mungkin dapat memperbaiki kualitas ASI (memperbanyak produksi ASI).

Berdasarkan data pada studi kasus Ny "I" mengeluhkan mengalami spotting (bercak-bercak) selama beberapa hari setelah di suntik kemudian tidak mengalami haid setelahnya sampai suntikan berikutnya, mengalami penurunan berat badan, keputihan yang berlebihan, serta sakit kepala. Kesimpulannya adalah teori serta manajemen asuhan kebidanan studi kasus Ny "I" ternyata mempunyai kesamaan dan tidak ditemukan kesenjangan.

D. Langkah IV: Tindakan Segera Atau Kolaborasi

Seperti diungkapkan Mangkuji dkk (2012), pentingnya untuk mengambil tindakan yang cepat dan melakukan kolaborasi apabila pasien menderita dampak serta keluhan yang dapat menakuti, tindakan segera atau kolaborasi bersama nakes lain diharapkan dapat mengatur pengguna kontrasepsi suntikan. Belum terdapat data dimana menunjukkan adanya indikasi yang perlu dilakukan untuk segera menyelamatkan nyawa klien, seperti bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lebih berpengalaman berdasarkan keadaan klien atau berkonsultasi pada dokter.

Dalam kasus Ny "I" mendapat amenorhea sejak memakai kontrasepsi suntikan tiga bulan serta menyebabkan penurunan BB yang mungkin terjadi karena menjaga pola makan dan diet serta di tunjang dengan aktifitas fisik yang berlebihan sehingga dapat membakar lemak dalam tubuh, ini adalah salah satu dampak hormone yang tersimpan pada kontrasepsi suntikan tiga bulan dan ini normal terjadi, dimana tidak memerlukan tindakan segera atau kolaborasi.

Hasilnya pada studi kasus Ny "I" dengan penerapan tinjauan pustaka secara umum tampak serupa, yaitu tidak memerlukan tindakan kolaborasi bila tidak terdapat dampak yang menakutkan. Dapat disimpulkan bahwa pada ditinjauan pustaka serta studi kasus tidak tampak adanya kesenjangan antara teori dengan studi kasus.

E. Langkah V: Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Berdasarkan manajemen asuhan kebidanan, rencana tindakan yang komprehensif diselesaikan berdasarkan indikasi apa yang muncul sehubungan dengan kondisi klien, rencana tindakan harus didukung klien dan semua tindakan yang dilakukan harus didasarkan dengan rasional yang relevan dan dianggap kebenarannya (Nurhayati, 2013). Menurut HPTM (2011), mengungkapkan bahwa salah satu syarat untuk mencegah terjadinya kehamilan adalah dengan adanya persetujuan suami istri, agar tidak mendapatkan mudarat baik segi jasmani dan rohani.

Tujuan dan kriteria harus dibuat berdasarkan rencana tindakan asuhan. Rencana dibuat berdasarkan keadaan klien meliputi diagnosa masalah aktual serta masalah potensial.

Berdasarkan teori penanganan amenorhea sangatlah berpengaruh. Ibu harus bisa mengetahui bahwasanya keluhan ini tidak harus dikhawatirkan. Mereka juga perlu mengetahui apa penyebab amenorhea. Bila pasien tidak bisa menyetujui dalam kondisi tertentu, disarankan agar klien mencoba metode kontrasepsi lain.

Berdasarkan kasus pada Ny "I" merupakan pengguna alat kontrasepsi suntikan metode DMPA dengan amenorea disertai perubahan BB, peneliti membuat manajemen asuhan kebidanan atas dasar penemuan diagnosa masalah aktual yang ditegaskan. Menurut Saifuddin (2010), mengatakan

mendekati ibu/klien, pasangan dan keluarga, menawarkan kesempatan kepada ibu agar bisa menyampaikan masalah, serta memberitahukan mengenai kontrasepsi suntikan tiga bulan yang meliputi: pengertian, cara kerja, kontraindikasi serta indikasi, keuntungan maupun kekurangan, serta dampak lain dari KB suntikan tiga bulan. Meminta persetujuan untuk bukti bahwasanya klien serta pasangan menyetujui segala tindakan, menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien.

Dalam kasus Ny "I" tujuannya yang perlu dicapai adalah agar ibu tetap menjadi pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA. Kriterianya antara lain KU: klien baik, TTV normal, klien mendapat suntik kontrasepsi rutin, serta klien menghadiri kunjungan selanjutnya sesuai jadwal yang ditetapkan. Rencana asuhan yang perlu dilaksanakan untuk Ny "I" pengguna kontrasepsi suntikan DMPA dengan amenorhea adalah : dilakukannya pendekatan kepada pasien, suami serta keluarganya, memberikan kesempatan kepada ibu untuk mengemukakan permasalahannya, dan menginformasikan pada ibu mengenai dampak yang bisa ditimbulkan dari penggunaan kontrasepsi suntik DMPA.

Berikan informed consent untuk bukti bahwasanya ibu dan suami menyetujui prosedur tindakan yang akan dilakukan, informasikan hasil pemeriksaan kepada klien, jelaskan penyebab amenore, jelaskan pada klien perubahan fisik yang bisa terjadi setelah penyuntikan, jelaskan pada klien bahwasanya kemungkinan kegagalan yang terjadi akibat suntik DMPA yaitu

sekitar di bawah 1%, Jelaskan pada ibu mengenai KB dalam pandang Islam, jelaskan pada ibu mengenai penanganan dari efek samping KB suntik DMPA.

Rencana tindakan asuhan diantaranya dilakukan kunjungan di rumah ibu agar bisa meninjau kondisi klien sesudah pemakaian kontrasepsi suntikan DMPA serta memberikan asuhan sesuai yang dikeluhkan oleh klien.

1. Kunjungan pertama tanggal 1 September 2023

Ny "I" mengatakan \pm 1 tahun menggunakan suntik 3 bulan dan masih menyusui bayinya. Ibu mengatakan adanya bercak (*spotting*) selama 2 hari setelah suntikan ke-4 pada tanggal 28 Agustus 2023, tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai seterusnya setelah 2 hari mengalami spotting, mengalami kenaikan berat badan 1 kg setelah kunjungan terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023, merasakan sakit kepala tiap awal-awal sehabis di suntik, tidak adanya flek hitam pada wajah, tidak mengalami bengkak atau nyeri pada bekas suntikan (Hematoma), adanya keputihan yang berlebihan. Keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, berat badan: 52 kg, LILA 25 cm, tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik tidak ada kelainan.

Merencanakan tindakan asuhan yang segera dilaksanakan antara lain: melakukan pendekatan pada ibu dan suami serta keluarga, memberitahukan pada ibu mengenai kunjungan sebelumnya bahwasanya pengguna kontrasepsi suntikan DMPA mungkin akan mengalami dampak yang lain

berupa bercak (spotting) serta perubahan BB yang mana dirasakan oleh klien. Menyelidiki permasalahan serta keluhan, khususnya mencari tahu klien tidak mengeluh sakit kepala, flek (spotting), perdarahan, BB bertambah, berubahnya warna kulit ataupun munculnya jerawat, serta keluhan lain. Dijelaskannya, bahwa keluhan amenorhea merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap pengguna kontrasepsi suntik DMPA dan tidak perlu dikhawatirkan karena tidak mempengaruhi kesehatan.

Menyarankan ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun. Menjelaskan kepada ibu bahwasanya sakit kepala merupakan salah satu dari efek samping suntik KB DMPA, hal ini disebabkan oleh respon tubuh pada progesteron yang menyebabkan hormon estrogen berfluktuatif (terjadi tekanan). Menyarankan pada ibu ke layanan kesehatan bila terdapat permasalahan ataupun masalah kesehatan yang berkaitan pada KB tersebut.

Proverawati (2012), mengatakan ibu menyusui sebaiknya mendapat tambahan makan sebanyak 800 kkal, 600 kkal diperuntukkan pada produksi ASI dan 200 kkal bagi fungsi tubuh klien. Ibu menyusui memiliki kebutuhan energi serta protein yang cukup tinggi dari pada ibu hamil, dengan demikian ibu hamil mungkin memiliki kebutuhan vitamin dan mineral yang sama. Air hangat juga sangat penting bagi ibu menyusui untuk menghindari dehidrasi.

Berdasarkan analisis jurnal ditemukan secara garis besar bahwa umumnya seseorang yang menggunakan KB Suntik dalam jangka waktu lama

akan mengalami spotting setelah tahun pertama. Setelah melewati 1 Tahun mayoritas responden akan mengalami Amenorrhoe. Suntikan yang sering digunakan adalah jenis DMPA. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat para ahli bahwa suntik progestin seringkali mengakibatkan masalah menstruasi berupa siklus menstruasi yang pendek atau panjang, keluar darah banyak atau sedikit, mengalami siklus menstruasi tidak beraturan atau berupa flek (spotting), atau bahkan tidak mengalami menstruasi. Gangguan menstruasi biasanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan resiko sedikit kesehatan apa pun (Affandi, 2015).

Teori tersebut sejalan dengan penelitian kejadian spotting terjadi terkait erat dengan saat pemakaian alat kontrasepsi suntik 3 bulan kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Selain itu, peneliti menunjukkan bahwa kemungkinannya wanita untuk tidak mengalami haid sama sekali (amenorrhoe) jika klien memakai KB suntik selama tiga bulan. Penelitian lain menemukan bahwa lama penggunaan KB suntik 3 bulan, semakin besar kemungkinan kejadian spotting semakin berkurang dan lebih besar mendapatkan amenorrhoea (Wahyuni, dkk. 2022: 46).

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan (Setyaningrum, 2008), terdapat hubungan antara frekuensi amenorrhoea dan spotting dengan lama penggunaan alat kontrasepsi suntik DMPA. Dari 25 akseptor yang menggunakan DMPA \leq 1 tahun terdapat 8 akseptor yang mengalami bercak,

sedangkan hanya 1 akseptor yang memakai DMPA ≥ 1 tahun mengalami bercak (spotting). Akseptor mengalami spotting lebih dari 7 setelah tidak mengalami menstruasi ≥ 90 hari, kemudian berangsur-angsur mengalami spotting ≤ 7 hari sampai akhirnya tidak mengalami menstruasi.

Menurut (Glasier, dkk. 2006) Gangguan haid berupa amenorea disebabkan karena progesteron dalam komponen DMPA menekan LH sehingga endometrium menjadi lebih dangkal dan atropis dengan kelenjar- kelenjar yang tidak aktif. Amenorea berkepanjangan pada pemberian progesteron tidak diketahui membahayakan, dan banyak wanita dapat menerima dengan baik. Bagi mereka yang merasa bahwa amenorea tidak alamiah, dapat diambil analogi yang masuk akal dengan amenorrea laktasi.

Mengenai penambahan berat badan klien, menjelaskan pada klien bahwa hal ini adalah kondisi fisiologis diakibatkan hormone dimana terkandung pada suntikan tiga bulan. Berdasarkan Chatarina (2016), efek samping utama dari KB suntikan dimana suntikan satu bulan bahkan tiga bulan memiliki dampak yang seperti berubahnya BB. Akibatnya berpengaruh terhadap BB dikarenakan ada hormone progesterone, bisa menstimulasi rasa lapar dimana terdapat dihipotalamus. Hormon progesterone akan mengubah kelebihan nutrisi menjadi lemak dan menyimpannya di bawah kulit jika ibu makan lebih banyak dari biasanya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mentari Moloku (2016), tentang hubungan lama pemakaian lama kontrasepsi suntik 3 bulan dengan perubahan berat badan di Puskesmas Ranomuut Manado diperoleh hasil bahwa berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji chi-square, pada tingkat kemaknaan 95% ($\alpha \leq 0,05$) menunjukkan nilai $value=0,004$, nilai ini lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Sehingga diduga ada hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi suntik DMPA dengan perubahan berat badan pada ibu di Puskesmas Ranomuut Manado (Septiyani, dkk. 2019: 35-36).

Pada penelitian yang dilakukan Dian Purnama Sari (2022) terdapat 37% wanita yang menggunakan kontrasepsi suntik selama 3 bulan mengalami sakit kepala. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Suratun (2008) yang menyatakan bahwa sakit kepala pada akseptor pengguna KB Suntik dalam jangka waktu yang lama disebabkan karena adanya respon tubuh terhadap progesteron sehingga hormon estrogen fluktuatif (mengalami penekanan) dan hormon progesteron dapat mengikat air menyebabkan sel-sel di dalam tubuh mengalami perubahan hingga terjadi penekanan pada syaraf otak. Sakit kepala yang dialami oleh akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan mungkin disebabkan karena penyakit bawaan yang pernah di derita seperti migren. Seorang wanita yang mulai menggunakan Depo Provera harus mendapatkan informasi tentang kemungkinan timbul sakit kepala (Purnama, 2022: 130).

Pemakaian kontrasepsi dalam jangka panjang atau waktu yang lama akan menyebabkan dosis hormon progesteron menjadi lebih tinggi didalam tubuh wanita yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal suntik, dan hal ini akan menyebabkan wanita mengalami efek samping yang ditimbulkan hormon progesteron diantaranya adalah keputihan atau fluor albus. Keputihan yang kadang-kadang ditemukan pada pengguna kontrasepsi hormonal dengan progesteron dosis tinggi, diakibatkan oleh meningkatnya infeksi dengan candida albicans (Farahdiba, 2017: 69).

Menurut Supartini (2015) bahwa dari lama pemakaian suntik 3 bulan dapat menyebabkan *flour albus* patologis karena adanya kandungan estrogen dan progesterone di dalamnya, hormon estrogen dapat meningkatkan kadar glukosa, glukosa diubah menjadi glikogen. Hormon progesterone merangsang penyimpanan glukosa sebagai glikogen. Glikogen di ubah laktobasilus menjadi asam laktat sehingga lingkungan semakin asam yang merupakan tempat tumbuh jamur candida albican yang menyebabkan terjadinya *flour albus* patologis (Supartini, 2015: 74).

Rasionalnya agar ibu mudah memahami dan menyadari dampak yang bisa ditimbulkan dengan menggunakan alat kontrasepsi suntik DMAP.

2. Kunjungan ke-2 pada tanggal 10 September 2023

Pada kasus Ny "I" ibu mengatakan berat badannya menurun 1 kg setelah dilakukan penimbangan pada kunjungan pertama tanggal 1 September 2023,

karena alasannya ibu mau menurunkan berat badan (diet) dengan menjaga pola makan ibu dan melakukan senam sore 1-2 kali seminggu. Ibu mengatakan sudah lama tidak menstruasi dan merasa khawatir dengan keadaannya, sudah tidak adanya bercak (*sputing*), sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, masih mengalami keputihan yang berlebihan. Pada hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, berat badan: 51 kg, LILA 25 cm, tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik normal.

Rencana tindakan asuhan yang dilakukan antara lain melakukan pendekatan pada ibu dan keluarga, memberitahukan pada ibu tentang hasil pemeriksaan, dan memberi kesempatan kepada ibu untuk mengungkapkan permasalahannya bahwa ibu merasa khawatir darah haidnya tidak keluar dan berubah menjadi tumor serta kanker di dalam rahim karena khawatir tidak mendapatkan haid sesering dulu. Berikan penjelasan pada ibu sehubungan dengan permasalahan yang di rasakan bahwa salah satu dampak dari pemakaian kontrasepsi suntik DMPA yaitu amenorhea dimana alat kontrasepsi suntikan tiga bulan didalamnya terkandung hormone progesterone yang menekan ovulasi serta menyebabkan adanya perubahan terhadap dinding uterus serta lapisan rahim menjadi lebih tipis, akibatnya membuat uterus tidak terjadi penebalan sehingga membuat ibu tidak mengalami menstruasi.

Memberitahu kepada klien bahwa kondisi ini merupakan salah satu dampak penggunaan kontrasepsi suntikan hormonal dimana tidak mengganggu kesehatan klien, memberikan penjelasan kepada klien bawasanya penurunan berat badan kemungkinan kecil bisa terjadi pada akseptor lama KB suntik dimana faktor yang mempengaruhi penurunan berat badan di mungkinkan pola makan, kepekaan terhadap penyakit, lingkungan, emosional, dan diet. Namun, hal itu juga bergantung pada faktor genetik pada masing-masing akseptor suntik. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. Fisik seseorang juga mempengaruhi terhadap perubahan berat badan karena aktifitas fisik yang berlebihan akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak tubuh.

Anjurkan klien agar mencuci vaginanya secara keseluruhan, meliputi mulai depan kemudian belakang, basuh menggunakan air yang bersih tiap BAB/BAK serta mandi, usahakan untuk membasuh tangannya sebersih mungkin setelah dipakai.

Menurut asumsi Afrizalaila (2018) terhadap hubungan antara lama pemakaian alat kontrasepsi suntik 3 bulan dengan amenorea, ini merupakan suatu hal yang wajar dikarenakan salah satu dampak dari pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan yang merupakan gangguan menstruasi diantaranya amenorea. Terjadinya amenorea setelah pemakaian suntik KB 3 bulan di sebabkan oleh kadar progesterin yang tinggi sehingga sangat menekan

lonjakan LH sehingga tidak terjadi ovulasi dan kadar FSH serta LH menurun akibatnya tidak ada peningkatan LH, hal ini menyebabkan folikel dan mencegah ovulasi, dengan tidak terjadinya ovulasi maka terjadi amenorea (Afrizalaila, 2018: 44).

Perubahan berat badan yang terjadi ada dua yaitu penambahan dan penurunan berat badan. Rata-rata pertambahan berat badan setiap tahunnya berkisar antara 2,3 sampai 2,9 kg dan penurunan berat badan rata-rata yaitu 1,6 sampai 1,9 kg (menurut penelitian Depo Provera) (Amalia, 2020: 23).

Menurut Supartini (2015) bahwa lama penggunaan KB suntik 3 bulan dapat menyebabkan *flour albus* patologis karena adanya kandungan estrogen dan progesterone di dalamnya, hormon estrogen dapat meningkatkan kadar glukosa, glukosa diubah menjadi glikogen. Hormon progesterone merangsang penyimpanan glukosa sebagai glikogen. Glikogen di ubah laktobasilus menjadi asam laktat sehingga lingkungan semakin asam yang merupakan tempat tumbuh jamur candida albican yang menyebabkan terjadinya *flour albus* patologis (Supartini, 2015: 74).

Rasionalnya agar klien semakin memahami dan mengenai penyebab amenorhea, penurunan BB, dan keputihan yang berlebihan karena akibat pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan.

3. Kunjungan ke 3-4 pada tanggal 17-24 September 2023

Ny "I" tidak lagi merasakan kekhawatiran karena tidak mendapat menstruasi, tetap memberikan ASI pada anaknya yang selingi dengan makanan tambahan, berat badan masih sama dengan kunjungan terakhir pada tanggal 10 September 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, mengatakan tetap mengalami keputihan tetapi masih dalam batas yang wajar. Pada hasil pemeriksaan di dapatkan keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, berat badan 51 kg, LILA 25 cm, tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik normal.

Rencana tindakan asuhan adalah menjelaskan informasi mengenai manfaat ASI, menganjurkan kepada klien agar terus memperhatikan kebersihan diri dengan selalu ganti CD minimal 3 kali perhari ataupun tiap merasa lembab, hindarilah pembersih vagina terlalu berlebihan hal ini bisa mengakibatkan iritasi, mengusahakan mencuci sesuai yang dianjurkan dimulai depan terus sampai belakang dengan air yang mengalir, menganjurkan klien untuk tidak memakai sabun vagina secara berlebihan karena menggunakan pembersih vagina berlebihan akibatnya flora normal yang terdapat pada vagina bisa mati, menghimbau klien agar selalu takwa pada Allah swt yang senantiasa memberikan kita kesehatan.

Perubahan berat badan adalah salah satu efek samping yang sering dikeluhkan pada akseptor pengguna KB suntik. Selain faktor internal yaitu

hormon, faktor eksternal juga mempengaruhi perubahan berat badan. Menurut pernyataan Depkes RI (2001) bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan berat badan di mungkinkan pola makan, kepekaan terhadap penyakit, lingkungan, emosional, dan diet. Namun, hal itu juga bergantung pada faktor genetik pada masing-masing akseptor suntik. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. Fisik seseorang juga mempengaruhi terhadap perubahan berat badan karena aktifitas fisik yang berlebihan akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak tubuh (Mukrimaa, 2016: 155).

Menjelaskan pada klien mengenai masalah yang dirasakan bahwasanya efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi suntik 3 bulan salah satunya yaitu amenorhea, kontrasepsi suntik tiga bulan memiliki kandungan hormone progesterone yang mencegah ovulasi serta akibatnya terjadi berubahnya dinding uterus serta lapisan rahim menjadi tipis hingga rahim tidak terjadi tebal sert membuat ibu tidak mengalami siklus menstruasi (Rosmala, 2015).

Pemakaian kontrasepsi dalam jangka panjang atau waktu yang lama akan menyebabkan dosis hormon progesteron menjadi lebih tinggi didalam tubuh wanita yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal suntik, dan hal ini akan menyebabkan wanita mengalami efek samping yang ditimbulkan hormon progesteron diantaranya adalah keputihan atau fluor albus. Fluor albus terkadang ditemukan pada pengguna kontrasepsi hormonal dengan

progesteron dalam dosis tinggi, disebabkan karena meningkatnya infeksi candida albicans (Farahdiba, 2017: 69).

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa ibu hendaknya menyusui anaknya dalam jangka waktu 2 tahun, terutama bagi mereka yang mau menyempurnakan penyusuannya. Untuk situasi tersebut mengingatkan klien agar terus takwa terhadap Allah SWT.

Rasionalnya agar klien bisa mengontrol pola makan yaitu mengonsumsi makan yang tinggi gizinya dikarenakan klien selama ini menyusui anaknya.

4. Kunjungan ke-5 pada tanggal 1 Oktober 2023

Ny "I" mengatakan tidak adanya bercak (*sputing*), tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang, berat badan ibu mengalami kenaikan 1 kg dengan kunjungan terakhir pada tanggal 24 September 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, sudah tidak mengalami keputihan yang berlebihan dan masih dalam batas wajar. Pada hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, berat badan: 52 kg, LILA 25 cm, tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik normal.

Menurut (Viandika, dkk. 2017) gangguan menstruasi merupakan efek samping yang paling umum terjadi. Perubahan siklus haid adalah alasan mendasar yang menyebabkan ibu berhenti menggunakan suntik DMPA. Dampak yang tidak dapat diantisipasi membuat ibu resah, sebagian ibu

khawatir tentang kemungkinan mereka tidak mengalami haid maka hal tersebut bisa saja menandakan bahwasanya terjadi kehamilan atau bahkan penyakit. Di sisi lain klien mengapresiasi bahwasanya dirinya mendapati amenorhea, dimana melambangkan kesempatan yang tidak didapatkan kembali hingga mereka mencapai menopause.

Perubahan berat badan yang terjadi ada dua yaitu penambahan dan penurunan berat badan. Rata-rata penambahan berat badan pertahun antara 2,3 kg - 2,9 kg dan penurunan berat badan rata-rata yaitu 1,6 kg - 1,9 kg (Amalia, 2020: 23).

Kejadian keputihan dipengaruhi oleh lama pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan karena ketidak seimbangan hormon dalam tubuh wanita, faktor lain yang mempengaruhi timbulnya Leukorea/keputihan fisiologis adalah terjadi karena rangsangan seksual (mendekati ovulasi), menjelang dan sesudah menstruasi. Reaksi Estrogen pada epitel vagina, produksi glikogen, lactobacillus (Doderlein) dan produksi asam laktat menghasilkan pH vagina yang rendah sampai 3,8 - 4,5 dan pada level ini dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi dengan pemberian hormon progesteron pada akseptor suntik 3 bulan menyebabkan flora vagina berubah sehingga memudahkan jamur tumbuh di vagina. Hal ini menimbulkan keluhan keputihan patologis yang ditandai dengan munculnya rasa gatal. Hal ini menandakan seseorang masih dalam tahap penyesuaian terhadap hormon

progesteron yang diberikan secara rutin sejak menggunakan suntik KB 3 bulan dengan pemberian sebanyak 3-4 kali.

Rencana tindakan asuhan yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu, menanyakan kepada ibu apakah masih mengalami efek samping kontrasepsi suntikan DMPA, pastikan klien tetap memakai alat kontrasepsi suntikan DMPA dan akan kembali untuk suntik ulang, jika ada yang kurang dipahami berikan kesempatan pada ibu untuk bertanya.

5. Kunjungan ke 6-8 pada tanggal 9-22 Oktober 2023

Ny "I" mengatakan mengatur pola keseimbangan makanannya, melakukan olahraga senam 1 kali dalam seminggu untuk mempertahankan dietnya, tidak adanya bercak (*sputing*), tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang, berat badan ibu menurun 1 kg dengan kunjungan terakhir pada tanggal 1 Oktober 2023, sudah tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas wajar. Pada hasil pemeriksaan diperoleh keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, berat badan: 52 kg, LILA 25 cm, tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik normal.

Rencana tindakan asuhan yaitu memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu, memastikan kembali apakah ibu masih menjaga keseimbangan pola makannya, mengevaluasi sejauh mana pengetahuan ibu mengenai penjelasan tentang KB suntik DMPA beserta efek sampingnya, memastikan kembali

apakah ibu paham dengan penjelasan-penjelasan mengenai suntik DMPA yang kemarin saya jelaskan, dan mengingatkan kembali kepada ibu untuk suntik ulang tanggal 21 November 2023.

Menurut Magas, dkk (2016) pada suntik 3 bulan terdapat kandungan progesterone yang bertanggung jawab pada perubahan endometrium pada siklus menstruasi dalam serviks serta vagina. Sehingga pada saat pemberian suntikan DMPA, pada fase luteal kadar hormone progesteron tetap tinggi dan hormone esterogen menurun sehingga tidak terjadi pelepasan lapisan uterus (endometrium) yang mengakibatkan sering terjadinya gangguan pola haid amenorhea (tidak haid) (Magas, dkk. 2016: 6).

Suntikan KB menurut teori, sering kali mengakibatkan masalah menstruasi (amenorhoe). Masalah menstruasi tersebut biasanya berlangsung singkat dan hampir tidak mengancam kesehatan seseorang. Perempuan yang menggunakan KB suntik selama lebih dari 1 tahun kerap kali tidak mendapatkan menstruasi (Febria, dkk. 2014).

Seseorang yang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat badan. Fisik seseorang juga mempengaruhi terhadap perubahan berat badan karena aktifitas fisik yang berlebihan akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak tubuh (Mukrimaa, 2016: 155).

Kejadian keputihan dipengaruhi oleh lama pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan karena ketidak seimbangan hormon dalam tubuh wanita. Reaksi Estrogen pada epitel vagina, produksi glikogen, lactobacillus (Doderlein) dan produksi asam laktat menghasilkan pH vagina yang rendah sampai 3,8 – 4,5 dan pada level ini dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi dengan pemberian hormon progesteron pada pengguna suntik 3 bulan mengakibatkan flora vagina berubah sehingga memudahkan jamur tumbuh di vagina yang menimbulkan keluhan keputihan yang patologis dengan ditandai timbul rasa gatal. (Luluk, 2014: 112-113).

6. Kunjungan ke 9-12 pada tanggal 29 Oktober – 21 November 2023

Ny "I" mengatakan tidak mengalami haid (*amenorhea*) sampai sekarang, berat badannya naik 2 kg dari kunjungan terakhir pada tanggal 22 Oktober 2023 sampai suntikan ke-5 tanggal 20 November 2023, tidak merasakan sakit kepala, tidak adanya flek hitam, adanya keputihan tapi masih dalam batas yang wajar. Pada hasil pemeriksaan diperoleh keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, berat badan: 53 kg, LILA 26 cm, tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik normal.

Rencana asuhan yang diberikan adalah menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan, mengingatkan ibu mengenai efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan suntik DMPA selain amenorhea, menanyakan pada ibu mengenai pola makannya apakah nafsu makan ibu tidak sama

dengan pola makan sebelumnya, memberitahukan pada ibu bahwa apa yang dialami adalah hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan, pastikan BB klien selalu sesuai anjurkan untuk makan secara teratur serta rutin berolahraga, memberikan konseling mengenai perubahan berat badan, mengevaluasi apakah ibu sudah tidak khawatir dengan keadaannya yang tidak mengalami haid dikarenakan efek samping dari kontrasepsi suntik DMPA, jika ibu mengalami gangguan kesehatan atau masalah pada alat kontrasepsinya segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.

Ny "I" datang ke Puskesmas Jumpandang Baru agar dapat suntik berikutnya berdasarkan jadwal. Tujuan ibu dalam menggunakan KB adalah untuk menjarangkan kehamilannya. Ibu tetap melanjutkan pemakaian kontrasepsi suntik DMPA untuk 1 tahun ke depan

Rencana tindakan asuhan yang dilakukan saat kunjungan ulang pada tanggal 21 November 2023 adalah menyampaikan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan, memberikan suntikan DMPA secara IM, menjelaskan pada ibu mengenai dampak yang dirasa memakai suntikan tiga bulan, memberitahu klien untuk tidak cemas lagi dengan keadaannya, menyarankan klien ibu agar terus beribadah pada Allah.

Berdasarkan sebagian besar responden (68%) mengalami peningkatan berat badan sedangkan 32% mengatakan tidak mengalami perubahan berat badan. Penambahan berat badan dapat dipengaruhi oleh usia, hampir setengahnya (43,47%) akseptor KB di BPS Hj. Yuni Sri Rahayu berusia 20- 35 tahun (Azizie, dkk. 2020: 10).

Selain itu Saifuddin, (2006) menyatakan bahwa hormone progesterone yang mengubah karbohidrat serta gula menjadi lemak, yang menyebabkan peningkatan lemak kulit. Kemudian, suntikan dapat membuat peningkatan berat badan karena hormone progesterone membuat orang makan lebih banyak serta membuat mereka kurang aktif.

Hasil uji statistik Diperoleh p-value = 0, 016 ($< \alpha$ 0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh KB suntik 3 bulan terhadap pertambahan berat badan ibu di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung tahun 2020. Rata-rata pertambahan berat badan ibu s untik 3 bulan sebesar 3,70 kg, dan rata-rata pertambahan berat badan akseptor suntik 1 bulan sebesar 1,80 kg (Fenniokha, dkk. 2022: 108).

Kontrasepsi DMPA berpotensi untuk mempengaruhi pusat kendali dihipotalamus yang mengontrol nafsu makan sehingga mengakibatkan pengguna mengonsumsi lebih banyak makanan, hal inilah menjadi efek dari penambahan berat badan. Hormone progesterone memungkinkan untuk mengubah karbohidrat serta gula menjadi lemak, hal ini menyebabkan

peningkatan lemak dibawah kulit bertambah. Kemudian, penggunaan suntik DMPA suntikan mengakibatkan kenaikan BB karena hormone progesterone meningkatkan nafsu makan serta menurunkan aktifitas fisik (Fenniokha, dkk. 2022: 108).

Berdasarkan tindakan asuhan kebidanan yang dilakukan pada kasus Ny "I" tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dengan studi kasus.

F. Langkah VI: Implementasi

Berdasarkan manajemen asuhan kebidanan, pelaksanaan rencana tindakan harus efektif serta menjamin rasa aman bagi klien. Implementasi dapat dilakukan sepenuhnya oleh bidan atau sampai batas tertentu diselesaikan oleh ibu dalam upaya bekerja dengan tim medis lain berdasarkan tindakan diaman sudah diatur (Mangkuji, dkk. 2012).

Berdasarkan tindakan manajemen asuhan dilakukan rancangan asuhan kebidanan yang telah di buat, terlaksana dengan baik di puskesmas jumpandang baru tahun 2023.

Dapat disimpulkan bahwa penulis tidak mengalami kendala yang besar berkat partisipasi serta diterimanya peneliti dengan sangat baik oleh klien serta keluarganya. Demikian juga didapatkan arahan pembimbing lahan praktek.

Setelah memberikan penjelasan mengenai alat kontrasepsi suntik DMPA terdapat salah satu efek samping berupa amenorea yaitu suatu keadaan normal yang disebabkan oleh kandungan hormon pada suntik KB 3 bulan serta penurunan berat badan karena disebabkan oleh ibu yang memang sengaja menjaga pola makan dan melakukan diet.

Tindakan asuhan kebidanan yang telah diberi sudah diselesaikan berdasarkan rencana. Penulis memberitahu kembali klien ibu bersyukur pada Allah berkat nikmat yang di beri. Karena terdapat sarana serta fasilitas yang membantu terlaksananya asuhan, serta kerja sama dan diterimanya peneliti dengan baik oleh ibu serta keluarganya sangat mendukung, maka peneliti tidak menemukan kendala yang berarti.

G. Langkah VII: Evaluasi

Wildan, dkk (2013), menyatakan bahwa evaluasi adalah langkah terakhir dari proses manajemen asuhan kebidanan, dimana tahap ini menilai apakah ada kemajuan dan hasil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi klien.

Pada kasus Ny "I" dilakukan evaluasi yaitu:

- a. Ibu tidak lagi merasa khawatir atas amenorhea yang dialaminya serta penurunan berat badan disebabkan karena ibu menjaga pola makan dengan baik tidak lalai berolahraga, ibu tetap ingin melanjutkan pemakaian suntik DMPA untuk 1 tahun ke depan.
- b. Ibu telah paham dengan setiap penjelasan yang diberikan kepadanya.

- c. Ibu telah mengetahui efek samping apa saja yang dapat ditimbulkan dari penggunaan suntik DMPA.
- d. Ibu tetap mau menjadi akseptor suntik DMPA.
- e. Ibu bersedia kembali untuk menerima suntikan ulang pada tanggal yang ditentukan.
- f. Ingatkan ibu untuk senantiasa bertawakal kepada Allah swt serta selalu berdoa kepada-Nya.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tinjauan pustaka tidak ditemukan hal yang berbeda dengan kasus pada Ny "I" akseptor kontrasepsi suntikan metode DMPA. Dengan demikian, jika diperbandingkan pada tinjauan pustaka serta studi kasus pada Ny "I" keseluruhan tidak ditemukannya kesenjangan.

BAB V

PENUTUP

Setelah peneliti mempelajari tinjauan pustaka, teori, serta konsep diperoleh pengkajian hasil manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny "I" akseptor lama suntik metode depo medroksi progesterone asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru pada tanggal 28 Agustus 2023 s/d 21 November 2023, selanjutnya peneliti bisa membuat kesimpulan serta saran pada bab ini.

A. Kesimpulan

1. Hasil Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny "I" Akseptor Lama suntik metode DMPA dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023. Pada asuhan tersebut dilakukan menggunakan prosedur pendekatan berdasarkan manajemen asuhan kebidanan mulai dari melakukan pengkajian data dasar untuk mendapatkan informasi. Studi kasus Ny "I" diperoleh data dasar bahwa ibu merasa berat badannya turun sejak pemakaian suntik yang ke-2 serta merasasakan kekhawatiran dikarenakan tidak kunjung menstruasi.
2. Pada Ny "I" Akseptor Lama Suntik Metode DMPA dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2023, diagnosa dapat ditegakkan berdasarkan keluhan bahwa ibu sudah tidak menstruasi \pm 9 bulan

menggunakan kontrasepsi suntik DMPA. Ibu mengalami penurunan berat badan di mulai saat suntikan ke 2-4 dikarenakan sengaja melakukan diet dengan mengatur pola makan.

3. Studi kasus pada Ny "I", masalah potensial yang dapat terjadi antara lain sakit kepala, keputihan, drop out, hiperpigmentasi, metrorrhagie, menometorrhagie, risiko penurunan densitas mineral tulang, atau galaktorea yang disebabkan oleh tingginya hormon progesteron yang terkandung dalam kontrasepsi suntik DMPA.
4. Studi kasus Ny "I" tidak memerlukan untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi. Namun bila ibu mengalami *metrorrhagie*, *menometorrhagie*, serta keputihan berlebihan tindakan segera harus dilakukan.
5. Pada studi kasus tersebut, peneliti melakukan rencana tindakan asuhan yang dibuat pada Ny "I" untuk memastikan bahwasanya tetap menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan. Rencana asuhan dibuat setelah dilakukan kunjungan rumah selama 12 pekan, menjelaskan pada ibu apa yang menyebabkan terjadinya amenorhea, menjelaskan kepada ibu bahwa penurunan berat badan pada akseptor lama suntik DMPA jarang terjadi dimana selain faktor internal yaitu hormon, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan berat badan. Jika seseorang semakin sedikit makan maka akan terjadi penurunan berat

badan. Fisik seseorang juga mempengaruhi terhadap perubahan berat badan karena aktifitas fisik yang berlebihan akan membuat seseorang kelebihan energi yang dapat membakar lemak tubuh. Memberikan pemahaman pada ibu bahwa keluhan amenorhea yang dialaminya adalah hal yang wajar terjadi pada pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA, serta alasan kuat yang perlu ditekankan untuk tidak perlu merasa khawatir karena tidak mempengaruhi kesehatan dan menghimbau ibu untuk senantiasa beribadah pada Allah SWT agar selalu diberi kesehatan.

6. Semua tindakan asuhan telah dilakukan untuk Ny "I" berdasarkan intervensi, khususnya memberi wawasan tentang apa yang menyebabkan terjadinya amenorea dan penurunan BB, menyarankan ibu agar tetap menjaga pola kesimbangan makanannya.
7. Pada evaluasi Ny "I" telah memberikan asuhan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan rencana asuhan, dan komplikasi dapat teratasi. Ibu secara umum sudah tidak merasa khawatir atas kondisinya serta bersedia untuk mendapat suntik selanjutnya.

B. Saran

1. Bagi klien

- a. Diharapkan ibu mampu menjaga pola keseimbangan makannya dengan terus mengonsumsi makan-makanan yang bergizi tinggi serta berolahraga.
- b. Jika ibu mendapatkan keluhan yang menghambat aktivitas sehari-hari, maka disarankan ibu ke pusat pelayanan kesehatan terdekat agar segera ditangani.
- c. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 2/233, yang berbunyi untuk memerintahkan agar ibu menyusui anaknya mulai lahir hingga mencapai usia dua tahun. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya ASI untuk tumbuh kembang anaknya. Memberikan ASI kurang lebih dari 6 bulan hingga dua tahun adalah salah satu metode kontrasepsi dimana bisa mencegah wanita untuk hamil jika dia belum mendapatkan menstruasi.
- d. Memahami serta melakukan instruksi yang telah di jelaskan.

2. Bagi pelaksana pelayanan kesehatan

- a. Bidan merupakan salah satu pelaksana yang utama untuk memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat setempat, terkhusus keluarga berencana sehingga dapat mengasah wawasan

serta keterampilan dengan memperbanyak baca buku dan ikut serta dalam kegiatan pelatihan, seminar-seminar seiring majunya ilmu pengetahuan.

- b. Pada setiap penyelenggaraan keluarga berencana, bidan dapat melakukan tindakan menyuntik KB sesuai standar dengan mengikuti langkah-langkah penyuntikan terkini.
- c. Bidan diharuskan dapat menawarkan jenis bantuan yang menyeluruh dan bermanfaat, serta bersedia membantu keseluruhan klien dengan tidak mempedulikan status ekonomi dan sosialnya.
- d. Sebagai umat Islam yang baik, ketika akan melakukan pelayanan serta tindakan hendaknya selalu melibatkan Allah SWT dalam segala hal. Mengingat semua yang dilakukan sebenarnya tidak lepas dapat dilihat oleh Allah swt.

3. Bagi institusi

Dalam menerapkan manajemen asuhan kebidanan mengenai pemecahan masalah diharapkan dapat di tingkatkan serta di kembangkan, mengingat proses ini sangatlah bermanfaat dalam menciptakan para bidan yang professional sehingga menjadikan SDM mempunyai potensi yang mempuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Anieq, dkk. 2019. "Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada NY" F" Akseptor KB Suntik Dmpa Dengan Peningkatan Berat Badan Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 07 Juli- 04 Agustus Tahun 2018." *Jurnal Midwifery* 1 (2): 100–109.
- Andryani, Zelna Yuni, Ferawati Taherong, Firdayanti, dkk. 2021. "The Relation of Estradiol Conditions and Usage Length to Sexual Dysfunction in Progesterone Acetate Medroxyprogestone Acceptories at Bara-Baraya Public Health Center of Makassar." *Gaceta Sanitaria* 35: S475–78.
- Afrizalaila, A. 2018. "Hubungan Penggunaan Suntik Kb 3 Bulandengan Amenorea Di Klinik Nis'an Fauziah Kabupatenceh Barat Tahun 2018."
- Ariska, Puput, dkk. 2016. "Faktor Penyebab Drop Out Peserta Kb Suntik 3 Bulan Di Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang." *Kebidanan* 1: 8.
- Azizie, Qorie Maulia, dkk. 2020. "Hubungan Pemakaian KB Sutik 3 Bulan Dengan Penambahan Berat Badan Di BPS HJ . Yuni Sri Rahayu Desa Pagendingan Variabel Dependen Dalam Penelitian Ini Adalah Penambah Berat Badan . Sebagian Akseptor KB Suntik Di BPS Hj . Yuni Sri Rahayu 115 Orang Peneliti." *Jurnal Satuan Bakti Bidan Untuk Negeri* 3 (2): 7–12.
- Asia, Nur. 2017. "Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "M" Akseptor Lama Depo Progestin Dengan Amenorhea Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2017 Karya." *Jurnal Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang* 4 (1): 724–32, 2017.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Bab II Tinjauan Pustaka," no. July: 1–23.
- Astuti, Titi, dkk. 2015. "Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik Dmpa Dengan Siklus Haid." *Jurnal Keperawatan XI* (1): 118–22.
- Affandi, Biran. 2013. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Edisi 3.* Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Anisa, dkk. 2015. Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik DMPA Dengan Siklus Haid. *Jurnal Keperawatan*: 118-112.

- Ayu, dkk. 2014. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB. Edisi 2*. Jakarta: EGC.
- Affandi. 2012. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Andriyati. 2014. *Tingkat Kejadian Amenorhea Sekunder Pada Ibu KB Suntik 3 Bulan Di RB BM Pgedangan Tangerang*. Tangerang: EGC.
- Catur Setyorini, Anita Dewi Lieskusumastuti. 2020. "Lama Penggunaan Kb Suntik 3 Bulan Dengan Kejadian." *Jurnal Kebidanan Indonesia* 11 (1): 124-33.
- Chatarina, dkk. 2016. "hubungan penggunaan alat kontrasepsi kb suntik dengan gangguan siklus haid di wilayah kerja Puskesmas Pugung kabupaten Tanggamus.
- Dewi Anggraheni, Tr Dr. Poerwaningsih S. Legowo, dkk. 2021. "Analisis Risiko Hematoma Pada Pengambilan Darah (Studi Kasus : Klinik 'P')." In *Jurnal Manajemen Risiko*, 2:1-34.
- Endang, W. E. 2015. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ernawati, N P E, dkk. 2010. "Hubungan Antara Lama Pemakaian Kb Suntik 3 Bulan Dengan Gangguan Menstruasi," 36-41.
- Farahdiba, Idha. 2017. "Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Dengan Kejadian Keputihan Pada Akseptor Keluarga Berencana Di Puskesmas Batua Makassar." *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia* 1 (1): 65-70.
- Fenniokha, Nabela Gyandra, Devi Kurniasari, and Yulistiana Evayanti. 2022. "Kontrasepsi Suntik 3 Bulan Mempengaruhi Kenaikan Berat Badan Ibu." *Midwifery Jurnal Kebidanan* 2 (3): 103-11.
- Farida. 2017. "Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik Dan Pil Terhadap Peningkatan Berat Badan Pada Ibu Pasangan Usia Subur." *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan* 6 (2): 53-58.

- Firdayanti. 2012. *Unmeet Need For Family Planning (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Frisca, T. 2013. *Asuhan Kebidanan*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Fauzi, Al. 2017. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *Keilmuan Dan Teknologi* 3 (1): 92-108.
- Glasier, dkk. 2006. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: EGC.
- Ghaffar, Nurkhalis A. 2015. "Tasawuf Dan Penyebaran Islam Di Indonesia." *Jurnal Rihlah* 3 (1): 68-79.
- Handayani, A. 2012. "Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntik Depo Progestin Di Puskesmas Mamajang Makassar Tahun 2012." *Karya Tulis Ilmiah*, no. Kolisch 1996: 49-56.
- Handayani, Sri. 2010. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Hartono, Hanafi. 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irianto, Koes. 2014. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Bandung: Alfabeta.
- Jannah, Fauqo Wilsatil. 2018. "Hubungan Kejadian Melasma Dengan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Suntik Kombinasi Dan Pil Kombinasi Di Bidan Praktik Mandiri Dwi Astutik, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang." : 1-13.
- Juniastuti, Vicky, Anggit Eka Ratnawati, and Margiyati Margiyati. 2023. "Lama Pemakaian Kontrasepsi Suntik Dmpa (Depo Medroksiprogesteron) Dengan Gangguan Menstruasi Pada Aseptor Kb Suntik 3 Bulan." *Jurnal Ilmu Kebidanan* 9 (2): 97-101.
- Klein, David A, Scott L. Paradise, dkk. 2019. "Amenorrhoea: A Systematic Approach to Diagnosis and Management." *American Family Physician* 100 (1): 39-48.

- Kurniawati. 2015. *Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015.
- Kurnia. 2013. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: CV. Trand Info Media Cetakan Pertama.
- Lesmana, Vera, dkk. 2012. "Hubungan Penggunaan Alat Kontrasepsi KB Suntik Dengan Gangguan Siklus Haid Di Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2012." *Jurnal Dunia Kesmas* 1 (2): 93-98.
- Lucky, Taufik. 2015. *Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC.
- Luluk, fakhidah. 2014. "Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan Dengan Kejadian Keputihan Di Bidan Praktek Swasta Fitri Handayani Cemani Sukoharjo." *Journal of Chemical Information and Modeling* 10 (9): 106-15
- Lucky Taufik. 2015. *Asuhan Kebidanan Panduan Lengkap Menjadi Bidan Professional*. Jakarta: EGC.
- Marfuah. 2012. *KTI Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Klien Akseptor Suntikan Progesterin dan Kenaikan Berat Badan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Manguji, dkk. 2012. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta: EGC.
- Maritalia, Dewi. 2012. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Magas, Maria Magdalena, dkk. 2016. "E-Journal Keperawatan (e-Kp) Volume 4 Nomor 1, Mei 2016 Perbedaan Siklus Menstruasi Ibu Pengguna Kontrasepsi Suntik." *E-Journal Keperawatan* 4 (1).
- Mukrimaa, dkk. 2016. "Pemakaian Kontrasepsi Suntik Akan Mempengaruhi Berat Badan Akseptor KB Suntik Di Kota Baru Driyorejo." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6 (August): 128.
- Novini, Tri. 2022. "Gambaran Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Sopir Angkutan Umum Di Kampus UIN Alauddin Makassar Tentang Partisipasi Suami

Dalam Mendukung Penggunaan Alat Kontrasepsi Istri.” *Karya Tulis Ilmiah*, 8-11.

Nur Qadariyah. 2012. “Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "N" Akseptor Suntikan Depo Progestin Dengan Efek Samping Di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 16 Agustus 2012 Karya.” *Karya Tulis Ilmiah*, no. Kolisch 1996: 49-56.

Nurhayati, dkk. 2013. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.

Oktaviana, Triana Riski. 2015. *Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny "D" Akseptor Aktif Suntik 3 Bulan Dengan Menometroragia Di Puskesmas Lamongan Tahun 2015*. Vol. 7.

Peni, Esti Mustika, dkk. 2015. “Lama Pemakaian KB Suntik DMPA Dan Densitas Tulang.” *Kebidanan 1 (1)*: 34-41.

Purnama Sari, Dian. 2022. “Efek Samping Pemakaian Kb Suntik 3 Bulan Pada Akseptor Di Bidan Praktik Swasta (Bps) Hj. Norhidayati Banjarmasin.” *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi) 6 (2)*: 127-31.

Pratiwi, Dhania, dkk. 2014. “Hubungan Antara Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Suntik DMPA Dengan Peningkatan Berat Badan Di Puskesmas Lapai Kota Padang.” *Jurnal Kesehatan Andalas 3 (3)*: 365-69.

Purwoastuti, dkk. 2015. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Priyanti, S. 2016. “Lama Pemakaian Kontrasepsi Suntik 3 Bulan Terhadap Kejadian Melasma Di Desa Karangjeruk Kecamatan Jatirejo Kabupaten” *Hospital Majapahit (JURNAL ILMIAH ... 8 (2)*: 76-86.

Prawihardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka.

Purwoastuti, Endang. 2015. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Rahayu, Tri Budi, dkk. 2017. “Efek Samping Akseptor KB DMPA Setelah 2 Tahun Pemakaian” *08 (01)*: 32-38.

Ritonga, Hasnun Jauhari. 2019. “Manajemen Waktu Dalam Islam.” *Al-Idarah : Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen 7 (1)*: 50-55.

- Saleha, Sitti. 2010. "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor Memilih Alat Kontrasepsi Suntik Di Puskesmas Batua Makassar Tahun 2015" 7 (1).
- Sari, Emilia. 2019. "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6 (1): 55-70.
- Selfi, Rina, dkk. 2013. "Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) Dengan Perubahan Fisiologis Pada Wanita Usia Subur (WUS) Di Puskesmas Ranomuut Kota Manado." *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 3: 12-26.
- Septiana, Syeva. 2019. *Asuhan Kebidanan Pada Akseptor Kb Suntik 3 Bulan Dengan Spotting Di BPM Agustina Sri Wahyuni Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Society. Vol. 2.*
- Septianingrum, Dyna Prasetya. 2020. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama" 1: 85-103.
- Septiyani, Eristia, Hardono, and Siti Maesaroh. 2019. "Pengaruh Lama Pemakaian Kb Suntik 3 Bulan Dmpa Terhadap Berat Badan Pada Akseptor Di Pmb Hj.Ernawati,S.St Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019." *Jurnal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH)*, 33-41.
- Setyaningrum, Agustina Catur. 2008. "Hubungan Lama Pemakaian Depo Medroksiprogesteron Asetat Dengan Gangguan Menstruasi Di Perumahan Petragriya Indah Purwodadi Tahun 2008," 151-56.
- Susilowati, Endang. 2011. "KB Suntik 3 (Tiga) Bulan Dengan Efek Samping Gangguan Haid Dan Penanganannya." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 3 (1): 1-11.
- Saifuddin, Abdul Bari. 2006. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiharjo.
- Setyowati, dkk. 2018. "The Effect Of Long-Term Contraception Of Contraception Against Bone Density Levels Anis." *Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4 (2): 120-24.
- Sigurdsson H., Houghton B McNutt S Rymer H y Stix J. 2000. "Bab 2 Tinjauan Pustaka." *Encyclopedia of Volcanoes.*, no. 1995: 662.

- Supartini. 2015. "Hubungan Antara Lama Pemakaian KB Suntik 3 Bulan (DPMA) Dengan Kejadian Flour Albus Patologis Di BPS Endang, Amd.Keb." *Embrio* 7: 72-75.
- Sarwono. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Sulistiyawati. 2013. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Nuha Medica.
- Suratun, dkk. 2013. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: TIM, 2013.
- Trisnawati, Yeti, dkk. 2014. "Tinjauan Lama Pemakaian Kontrasepsi Depo Medroxy Progesterone Acetate Berdasarkan Kejadian Amenorea." *Gaster/ Jurnal Ilmu Kesehatan* 11 (1): 49-59.
- Thahir. 2013. *Ar-Radha'ah Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Titin, Windi. 2015. *Gambaran Lama Penggunaan KB Suntik Depo Progestin Dengan Kejadian Amenorhea Sekunder*. *Midwiferia/Vol.1;No.1/April 2015*.(diakses Kamis 11 Mei 2017)
- Tresnawati F. 2013. *Asuhan Kebidanan Panduan Lengkap Menjadi Bidan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Varney, Helen, dkk. 2006. *Buku Ajar: Asuhan Kebidanan Edisi 4 Volume 1*. Jakarta: EGC.
- Viandika, Nurya, and Nurfitriya Dara Latuconsina. 2017. "Kejadian Amenore Sekunder Pada Akseptor Suntik Dmpa." *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu Dan Anak (Maternal and Neonatal Health Journal)*, 71-75.
- Wanti, Sry. 2012. "Gambaran Pengetahuan Akseptor Kb Suntik Tentang Efek Samping Depo Medroxy Progesteron Asetat (Dmpa) Di Puskesmas/Rsp Vi Kassi-Kassi Makassar Tahun 2012." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689-99.
- Wahyuni, Widya Nengsih, dkk. 2019. "Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Keputihan Pada Akseptor KB Suntik 3 Bulan." *Maternal Child Health Care* 1: 153-59.

- Wahyuni, Desi Saryani, dkk. 2022. "Hubungan Penggunaan Kb Suntik 3 Bulan Dengan Kejadian Peningkatan Berat Badan Dan Kejadian Spotting Pada Akseptor Kb Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022." *Jurnal Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan (Journal of Midwifery Science and Health)* 13 (2): 43–47.
- Yulianti, Elma. 2017. "Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu Akseptor Kb Suntik Depo Medroksiprogesteron Asetat (Dmpa) Dengan Amenorhea Di Bpm Srikandi Gowa Tahun 2017." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Yustiari. 2019. "Pemakaian Kontrasepsi Suntik DMPA Dan Kejadian Amenoa Sekunder Di Wilayah Kerja Puskesmas Lepo-Lepo," 138–44.
- Yuhedi , LT. Kurniawati, T. 2015. *Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC.



PENDOKUMENTASIAN

Tanggal 28 Agustus 2023



Tanggal 1 September 2023



Tanggal 10 September 2023



Tanggal 17 September 2023



Tanggal 24 September 2023



Tanggal 1 Oktober 2023



Tanggal 9 Oktober 2023



Tanggal 15 Oktober 2023



Tanggal 22 Oktober 2023



Tanggal 29 Oktober 2023



Tanggal 6 November 2023



Tanggal 13 November 2023



Tanggal 21 November 2023





UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No: B.006/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Cindi Aolia
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny "X" Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorhea Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar"


"Management of Family Planning Midwifery Care for Ny. "X" Old Acceptor Injects Depo Medroxy Progesterone Acetate (DMPA) Method With Amenorrhea at Jumpandang Baru Health Center Makassar"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2024.

This declaration of ethics applies during the period September 5, 2023 until September 5, 2024.

September 5, 2023
Professor and Chairperson.

DR. Hj. Gotmy Nasuti Handayany, M.Si., Apt.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-8920 / Un.06/FKIK/PP.00.9/11/ 2022 Gowa, 2/ November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Yth . Kepala Puskesmas Jumpandang Baru
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Cindy Aolia**
N I M : 70400120004
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : V (Lima)
Data : Asuhan Kebidanan KB Pada Akseptor Lama Suntik Metode DMPA

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor Lama Suntik Metode DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat)."

Dengan Dosen Pem bimbing : 1. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.
2. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil **data awal** .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,

Syatirah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 01291/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Cindi Aolia
 NIM : 70400120004
 Semester/T.A. : VI (Enam)/T.A. 2023-2024
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Kebidanan
 Alamat : Bontolebang kec. Galesong Utara
 No. HP. : 088245667329

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor Lama Suntik Metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) Dengan Amenorhea Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2023.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Puskesmas Jumpandang Baru Makassar** dari tanggal **08 Agustus - 02 Oktober** .

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 08 Agustus 2023

 Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
 NIP. 196006051987031004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 23056/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-01194/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: CINDI AOLIA	
Nomor Pokok	: 70200120004	
Program Studi	: Kebidanan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun KARYA TULIS, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY "... " AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO EDROKSI PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA DI PUSKESMAS JUMPANG BARU MAKASAAR TAHUN 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Agustus s/d 02 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpmsp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/139/SKP/SB/DPMPMTPSP/8/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/139/SKP/SB/DPMPMTPSP/8/2023, Tanggal 08 Agustus 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 070/135/SKP-SB/BKBP/8/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	CINDI AOLIA
NIM / Jurusan	:	70400120004 / Kebidanan
Pekerjaan	:	Mahasiswa (D3)
Alamat	:	Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa
Lokasi Penelitian	:	Terlampir-,
Waktu Penelitian	:	08 Agustus 2023 - 02 Oktober 2023
Tujuan	:	Karya Tulis Ilmiah
Judul Penelitian	:	"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA AKSEPTOR LAMA SUNTIK METODE DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT (DMPA) DENGAN AMENORHEA DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR TAHUN 2023"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-08-10 10:59:31



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

No : 440/209/PSDK/ VIII /2023

Lamp : -

Perihal : Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Puskesmas Jumpandang Baru

Di -

Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/732/SKP/DPMPTSP/VI/2023 tanggal 12 Agustus 2023, maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Cindi Aolia
 NIM : 70400120004
 Jurusan : D3 Kebidanan
 Institusi :
 Tanggal Penelitian : 8 Agustus 2023 - 2 Oktober 2023
 Judul : Manajemen asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Akseptor lama suntik metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2023

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin.

Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 21 Agustus 2023
 Kepala Dinas kesehatan
 Kota Makassar

dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes
 Pangkat Pembina TK I/IV B
 NIP : 19730112 2006042 012



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JUMPANG BARU



Jalan Ir. H. Juanda No. 01 KodePos 90121
Telp. (0411) 448359 Fax. (0411) 412154. Email pkmjumandangbarutallo@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 340 / PKM-JB/ XI / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **drg. Fauziah Bakhtiar**
NIP : 19731231 200501 2 023
Pangkat / Gol : Pembina Tk.1 / IV- B
Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Jumpandang Baru

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Cindi Aolia
NIM : 70400120004
Jurusan : D3 **Kebidanan**
Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar telah selesai melaksanakan penelitian di Puskesmas Jumpandang Baru. dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kampus yang dil mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 21 November 2023 . Dengan judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny. I Akseptor lama suntik metode Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorhea di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2023".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 November 2023

Plt Kepala Puskesmas Jumpandang Baru

drg. Fauziah Bakhtiar

Nip. 19731231 200501 2 023

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Cindi Aolia
NIM : 70400120004
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 11 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl Pendidikan Bontolebang
2. Nama Orang Tua
Ayah : H. Abdul Muis Tombong
Ibu : Hj. Suhartini

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 118 Inpres Bontolebang 2009-2014
2. SMP Negeri 1 Galesong Utara 2014-2017
3. SMA Negeri 4 Takalar 2017-2020
4. Tahun 2020 melanjutkan Studi Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan