

**UJI KADAR SENYAWA FLAVANOID, FENOLIK, KAROTENOID EKSTRAK
METANOL UMBI TALAS JEPANG (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*)**



1965
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

HARDIYANTI
NIM. 70100111030

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Kadar Senyawa Flavanoid, Fenolik dan Karotenoid Ekstrak Metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*)” yang disusun oleh Hardiyanti, NIM : 70100111030, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari, Jum’at tanggal 12 Juni 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1436 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 12 Juni 2015 M
25 Sya’ban 1435 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr.Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Prof.Dra.Hj.Sitti Aisyah Kara, M.A., Ph.D.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hardiyanti
NIM : 70100111030
Tempat/TanggalLahir : Ujung Pandang, 25 Juli 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : JL. Karaeng Makkawari (Samata)
Judul : Uji Kadar Senyawa Flavanoid, Fenolik dan Karotenoid
Ekstrak Metanol Umbi Talas Jepang (*Colocasia esculenta*
Var antiquorum)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Gowa, 12 Juni 2015

Penyusun,

HARDIYANTI
NIM. 70100111030

KATA PENGANTAR

Maha Besar Allah swt. yang telah memberikan kemudahan bagi umat manusia untuk menguak misteri dalam setiap rahasia yang diciptakan-Nya guna menunjukkan betapa kuasanya Allah swt. terhadap segala jenis makhluk-Nya. Segala puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Uji Kadar senyawa, Flavanoid, Fenolik dan Karotenoid Ekstrak Metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang menjadi panutan bagi umat di dunia. Dialah Nabi akhir zaman, revolusioner dunia yang mampu merubah kejahilaaan menuju *sirathal mustaqim*, yakni agama Islam.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, bapak Djamaluddin dan ibu Hasnah, S.Sos yang tiada henti-hentinya mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu memberikan nasehat, semangat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama kuliah di UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dra. Hj. Sitti Aisyah Kara, M.A., Ph. D. selaku penguji agama yang telah memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
4. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Juga selaku penguji kompetensi yang telah memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
6. Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
8. Mukhriani, S.Si, M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.
9. Afrisusnawati Rauf, S.Si, M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu,

tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.

10. Bapak/Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Seluruh laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi ilmu pengetahuan. Amin.




Gowa, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman	9
B. Uraian Senyawa Fitokimia.....	10
C. Metode Penyarian.....	19
D. Spektofotometer	22
E. Tinjauan Islam.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Instrumen Penelitian.....	33

D. Sampel.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Validasi dan Rehabilitasi Penelitian.....	38
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Implikasi Penelitian.....	46
KEPUSTAKAAN	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Klasifikasi senyawa fenolik berdasarkan jumlah atom karbon	11
2. Ciri spektrum golongan flavanoid	14
3. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer	23
4. Hasil Uji Pendahuluan Ekstrak Metanol umbi talas jepang (<i>Colocasia Esculenta Var Antiquorum</i>)	40
5. Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (<i>Colocasia Esculenta Var Antiquorum</i>)	40
6. Kadar Flavanoid Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (<i>Colocasia Esculenta Var Antiquorum</i>)	41
7. Kadar Karotenoid Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (<i>Colocasia Esculenta Var Antiquorum</i>)	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja ekstraksi	51
2. Skema kerja uji pendahuluan	52
3. Skema kerja Pembuatan Larutan Standar	54
4. Skema kerja Penentuan Kadar Total	57
5. Gambar Talas Jepang (<i>Colocasia Esculenta Var Antiquorum</i>)	60
6. Gambar hasil ekstraksi talas jepang (<i>Colocasia Esculenta Var Antiquorum</i>)	61
7. Gambar Hasil Uji Pendahuluan.....	62
8. Panjang gelombang maksimum pada spektrofotometri uv-vis.....	63
9. Hasil Pengukuran Serapan Sampel	66
10. Pengukuran Absorbansi Larutan Standar dan Kurva Baku	68
11. Pembuatan Larutan dan pereaksi	71
12. Perhitungan Kadar Total	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rumus struktur fenol.....	10
2. Rumus struktur Asam galat dan vanilin.....	13
3. Rumus struktur flavanoid.....	15
4. Rumus struktur kuersetin.....	16
5. Rumus struktur kerangka karotenoid.....	17
6. Rumus struktur β -karoten.....	19
7. Bagian instrumen spektrofotometer.....	24
8. Tanaman Umbi talas jepang (<i>Colocasia esculenta</i> Var <i>antiquorum</i>).....	60
9. Hasil ekstraksi umbi talas jepang (<i>Colocasia esculenta</i> Var <i>antiquorum</i>).....	61
10. Hasil uji pendahuluan.....	62
11. Panjang gelombang maksimal asam galat.....	63
12. Panjang gelombang maksimal kuersetin.....	64
13. Panjang gelombang maksimal β -karoten.....	65
14. Hasil pengukuran serapan senyawa fenolik.....	66
15. Hasil pengukuran serapan senyawa flavanoid.....	66
16. Hasil pengukuran serapan senyawa karotenoid.....	67
17. Kurva Baku Asam Galat.....	68
18. Kurva Baku Kuersetin.....	69
19. Kurva Baku β -karoten.....	70

ABSTRAK

Nama Penyusun : Hardiyanti
NIM : 70100111030
Judul Skripsi : Uji Kadar Senyawa Flavanoid, Fenolik dan Karotenoid Ekstrak Metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*)

Telah dilakukan penelitian tentang penentuan kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*). Talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) merupakan tanaman yang ditanam di Indonesia lalu diekspor ke Jepang yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid dalam ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).

Ekstraksi kandungan kimia dari talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) dilakukan dengan metode maserasi menggunakan metanol hingga filtrat jernih. Penentuan kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid dilakukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Kandungan flavanoid total diuji menggunakan standar kuersetin, kandungan fenolik total diuji menggunakan standar asam galat, dan kandungan karotenoid total diuji menggunakan standar β -karoten.

Dari hasil penelitian diperoleh kadar flavanoid total sebesar 4,54%, fenolik total sebesar 35,6% dan kadar karotenoid total sebesar 8%. Nilai ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) memiliki potensi sebagai antioksidan yang baik.

Kata kunci : flavanoid, fenolik dan karotenoid, umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).

ABSTRACT

Name : Hardiyanti
NIM : 70100111030
Title : Assay Test Of Flavanoid Compounds, Phenolic and Carotenoid of Methanolic Extracts Japanese taro (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) tuber

A study about determination of flavanoid compounds, phenolic and carotenoid of methanolic extracts Japanese taro (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) tuber using Uv-Vis Spectrophotometer has been conducted. Japanese taro (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) is a plant grown in Indonesia and exports to Japan which are known to have antioxidant activity.

This study aims to determine the levels of total flavanoids, phenolics and carotenoids in the methanol extract of Japanese taro (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) tuber.

The procedure begins with sample extraction by maceration. Determination of total flavanoids, phenolics and carotenoids was done using UV-Vis spectrophotometry. Total flavanoid content was tested using standard quercetin, total phenolic content was tested using standard gallic acid, and total carotenoid content was tested using standard β -carotene.

The results showed flavanoid total is 4.54%, phenolic total is 35.6% and carotenoid total is 8%. This value indicates that the leaf of Japanese taro (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) has potential as a good antioxidant.

Keywords: flavanoid, phenolic, carotenoid, Japanese taro (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) tuber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan tumbuh-tumbuhan tertentu sebagai tanaman obat untuk pengobatan penyakit tertentu merupakan warisan turun – temurun dari dahulu sampai sekarang. Penggunaan tumbuhan tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan mengingat di dalam tumbuhan tersebut terdapat kandungan senyawa-senyawa kimia berkhasiat. Hal ini juga yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menyelidiki kandungan senyawa kimia apa saja yang mungkin terdapat dalam tumbuhan obat tersebut (Wijayakusuma 1998).

Allah SWT. menumbuhkan di bumi beraneka ragam tanaman untuk kebutuhan makhluk hidup. Hal ini disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Q.S. al-An'am : 99 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
مُخْرَجٌ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ^{٩٩} أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ^{١٠٠} إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-

tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Departemen Agama RI).

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah swt. menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satu tumbuhan yang perlu diteliti dan bisa diketahui manfaatnya adalah umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* *Var antiquorum*) sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan.

Dunia kesehatan saat ini semakin menaruh perhatian terhadap radikal bebas. Hal ini dikarenakan semakin banyak bukti ilmiah yang mengindikasikan bahwa radikal bebas dapat menimbulkan kerusakan DNA (Desmarchlier *et al.*, 1998). Reaksi radikal bebas secara umum dapat dihambat oleh antioksidan tertentu baik alami maupun sintesis. Sebagian besar antioksidan alami berasal dari tanaman, antara lain berupa senyawa tokoferol, karotenoid, asam askorbat, fenol dan flavanoid. Beberapa studi menunjukkan bahwa beberapa tanaman dan buah-buahan terbukti bermanfaat melindungi tubuh manusia terhadap bahaya radikal bebas. Hal ini dikarenakan potensi antioksidan yang terdapat dalam tanaman dan buah buahan tersebut, seperti karoten, flavanoid dan komponen fenolik lain, juga vitamin C dan E (Pratimasari. 2009:2).

Ada sebuah desa di Jepang yang disebut Yuzuri Hara, dimana penduduk disana hidup hingga usia lebih dari sembilan puluh tahun, dengan kondisi yang masih

luar biasa, bugar dan sehat. Selain itu mereka terlihat muda pada usia 50 tahun, meskipun pada umumnya mereka bekerja di luar di bawah sinar matahari sepanjang hari. Penyakit seperti kanker dan Alzheimers hampir tidak dikenal di daerah ini, bahkan dikalangan perokok berat. Setelah diselidiki rahasia sehat dan awet muda sepanjang umur para penduduk di desa Yuzuri Hara, ternyata mereka mengkonsumsi Tanaman Herbal Satoimo atau talas jepang (Cahya ilmi, 2014:23)

Talas jepang (*Colocasia esculenta*) merupakan salah satu tanaman yang umumnya dikenal sebagai taro, digunakan sebagai makanan selama 9000 tahun, termasuk makanan tertua. Talas digunakan sebagai sumber protein, pati, dan vitamin. Talas dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan, dahulu dapat ditemukan di Asia selatan namun sekarang telah tersebar luas di dunia. Talas menjadi tanaman yang sangat penting di Asia, Pasifik, Afrika dan Karibian. (V. Ramanatha, 2010:9).

Adapun jenis-jenis talas yaitu : talas bogor, talas belitung (kimpul), talas padang dan talas jepang. Talas jepang atau satoimo adalah satu tanaman yang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun demikian di beberapa daerah seperti kabupaten Bantaeng, menjadikannya sebagai salah satu tanaman komoditi ekspor non migas. Kendati hanya dikenal dan dijadikan sebagai tanaman ekspor, masyarakat setempat kurang mengkonsumsinya karena tidak mengetahui kandungan dan manfaat talas yang ternyata dapat dijadikan makanan diet kaya serat yang dapat mencegah penyakit kanker usus dengan kemampuannya mengikat mutagen yang bersifat karsinogenik (Fergusson LR:1992), selain itu laporan terdahulu mengemukakan bahwa umbi *C. esculenta* memiliki aktivitas α -amilase

inhibitor sehingga kemungkinan dapat dijadikan antidiabetes. (Mc.Ewan *et al*, 2010: 224). Adapun kandungan Talas jepang yaitu Kalori (kal) : 92,30, Protein (gram) : 2,38, Lemak (gram) : 0,17, Karbohidrat (gram) : 16,33, Kalsium (mg) : 9,00, Phospor (mg) : 5,00, Serat (cf) : 16,18 (Cahaya Nur,2014: 25)

Menurut Pratt dan Hudson serta Shahidi dan Naczk, senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavanoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional.

Flavanoid merupakan senyawa polifenol yang tersebar luas di alam terutama dalam jaringan tanaman dalam konsentrasi yang relatif tinggi sebagai konjugat gula (Harborne, 1994) yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Flavanoid dapat berfungsi sebagai antivirus, antialergi, antimikroorganisme, dan antioksidan untuk mengendalikan radikal bebas yang dapat menyebabkan tumor (Middleton *et al*, 1998: 676).

Karotenoid adalah pigmen berwarna kuning, orange dan orange kemerahan yang terlarut dalam lipid meliputi kelompok hidrokarbon yang disebut karoten dan derivat oksigasinya xantofil.

Dari penelusuran literatur, sedikit sekali diperoleh informasi ilmiah tentang bioaktivitas talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*), padahal secara tradisional telah digunakan sebagai bahan obat. Pada penelitian sebelumnya (Reski Amalia, 2013) telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antioksidan ekstrak

metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) sehingga diketahui bahwa umbi talas jepang memiliki aktivitas antioksidan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid dari umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) yang berfungsi sebagai antioksidan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa :

1. Bagaimana Kandungan senyawa flavanoid, fenolik dan karotenoid ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*)?
2. Berapa kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid pada ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

- a. Ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) adalah sampel yang dibuat dengan mengekstraksi talas jepang dengan menggunakan pelarut metanol dengan metode maserasi, lalu pelarutnya diuapkan dan didapatkan ekstrak yang kental.
- b. Kadar total flavanoid dalam penelitian ini adalah kadar total senyawa flavanoid dalam ekstrak yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm. Hasil yang diperoleh dikalibrasi menggunakan kurva standar kuersetin.

- c. Kadar total fenolik dalam penelitian ini adalah kadar total senyawa fenolik dalam ekstrak yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm. Hasil yang diperoleh dikalibrasi menggunakan kurva standar asam galat
- d. Kadar total karotenoid dalam penelitian ini adalah kadar total senyawa karoten dalam ekstrak yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm. Hasil yang diperoleh dikalibrasi menggunakan kurva standar β -karoten.

2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah penentuan kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid yang menggunakan pembanding masing-masing asam galat, kuersetin, dan β -karoten.

D. Kajian Pustaka

1. Abdi redha (2010) dikatakan bahwa Flavanoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik yang banyak terdapat pada jaringan tanaman dapat berperan sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidatif flavanoid bersumber pada kemampuan mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa flavanoid mempunyai aktivitas antioksidan yang beragam pada berbagai jenis sereal, sayuran dan buah-buahan. Penelitian-penelitian mengenai peranan flavanoid pada tingkat sel, secara in vitro maupun in vivo, membuktikan pula adanya korelasi negatif antara asupan flavanoid dengan resiko munculnya penyakit kronis tertentu, salah satunya diduga karena flavanoid memiliki efek kardioprotektif dan aktivitas antiproliferatif.

2. Susila kristianingrum (2010) dikatakan bahwa sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau atau kuning biasanya banyak mengandung karoten. Dalam tanaman terdapat beberapa jenis karoten, namun yang lebih banyak ditemukan adalah alpha, beta dan gamma karoten. Dalam wortel ditemukan β -karoten yang mempunyai peranan sebagai antioksidan. Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk menganalisis kandungan β -karoten dalam berbagai bahan pangan yang ternyata memberikan hasil yang bervariasi satu dengan yang lain. Hasil dari jurnal ini adalah metode spektrofotometri dapat memberikan hasil seoptimal mungkin untuk menentukan karoten.

3. Yanita (2011) telah dilakukan penelitian tentang penetapan kadar fenolik total dan aktivitas antioksidan buah anggur merah (*Vitis vinifera* Linn. Var. Red Globe) dan anggur hijau (*Vitis vinifera* Linn. Var. Chinsiang). Kadar fenolik total ditetapkan dengan metode Folin-Ciocalteu menggunakan spektrofotometer dengan menggunakan spektrofotometer sinar tampak. Penentuan kadar senyawa fenolik sampel menggunakan metode Folin-Ciocalteu dan pengujian aktivitas antioksidannya menggunakan metoda DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Hasil penentuan kadar senyawa fenolik menunjukkan bahwa dalam tiap 100 g buah anggur merah mengandung 14,9797 g senyawa fenolik, sedangkan pada anggur hijau mengandung 12,1568 g senyawa fenolik. Pada uji aktivitas antioksidan didapatkan pada anggur merah 5,763 $\mu\text{g/mL}$, sedangkan pada anggur hijau 5,026 $\mu\text{g/mL}$.

4. Reski amalia, 2013 telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var. *antiquorum*) diketahui

bahwa umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) memiliki aktivitas antioksidan. Pada penelitian tersebut menggunakan metanol dalam proses ekstraksinya dan hanya sampai pada aktivitas antioksidannya dan belum sampai pada golongan senyawa antioksidan yang terkandung dalam sampel.

5. Suatu tanaman dapat memiliki aktivitas antioksidan apabila mengandung senyawa yang mampu menangkal radikal bebas seperti fenol, flavanoid, dan karotenoid (Ari, 2013). Oleh karena itu penulis melakukan penelitian lanjutan dengan menentukan kadar total fenolik, flavanoid, dan karotenoid ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui adanya kandungan senyawa flavanoid, fenolik dan karotenoid dalam ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).
- b. Menentukan kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid dalam ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai sumber data ilmiah atau rujukan bagi peneliti lanjutan tentang kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).
- b. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid yang terdapat pada umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) yang mampu melawan radikal bebas.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Talas Jepang

1. Klasifikasi (Gembong Tjitrosoepomo, 2013 : 463)

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Monocotyledoneae

Ordo : Arecales

Famili : Araceae

Genus : Colocasia

Species : *Colocasia esculenta* Var *antiquorum*

2. Nama Daerah

Keladi (Batak), Talo (Nias), Taleh (Minangkabau), Talos (Lampung), Kujang (Dayak), Taleus (Sunda), Tales (Jawa), Kaladi (Madura), Tales (Bali), Paco (Makassar), Aladi (Bugis), Bete (Maluku utara) (Syamsul Hidayat & Rodame, M. Napitupulu, 2015: 319).

3. Morfologi

Habitus: semak, tinggi 1-1,5. Batang: semu, silindris, batang di dalam tanah membentuk umbi, lunak, coklat muda. Daun: tunggal, lonjong, tepi rata, ujung runcing, pangkal berlekuk, panjang 40-60 cm, lebar 20-30 cm, 1 tangkai silindris, panjang 50-60 cm, hijau, pertulangan menyirip, permukaan halus, hijau. Bunga:

tunggal, diketiak daun, kelopak lonjong, putih, benang sari dan putik bentuk gada, panjang 4-7 cm, kuning, tangkai silindris, panjang 20-30 cm, mahkota lonjong, satu helai, putih. Buah: buni, bulat, kuning. Biji: Bulat, kecil, beralur, hijau. Akar: serabut, putih kecoklatan (Widyaningrum, 2011: 1087).

B. Uraian Senyawa Fitokimia

1. Fenolik

Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel di cincin aromatik. Dengan kata lain, senyawa fenolik adalah senyawa yang sekurang-kurangnya memiliki satu gugus fenol.



Gambar 1. Struktur fenol (Seafast Centre, 2012: 1)

Senyawa fenolik terdiri atas molekul-molekul besar dengan beragam struktur, karakteristik utamanya adalah adanya cincin aromatik yang memiliki gugus hidroksil. Kebanyakan senyawa fenolik termasuk ke dalam kelompok flavanoid (Ningsih, 2007: 60).

Produk yang mula-mula terbentuk pada biosintesis senyawa fenolik adalah shikimat. Fenol bersifat asam, karena sifat gugus -OH yang mudah melepaskan diri. Karakteristik lainnya adalah kemampuan membentuk senyawa kelat dengan logam,

mudah teroksidasi dan membentuk polimer yang menimbulkan warna gelap. Timbulnya warna gelap pada bagian tumbuhan yang terpotong atau mati disebabkan oleh reaksi ini, hal ini sekaligus menghambat pertumbuhan tanaman. Di antara turunan fenilpropanol yang berbobot molekul rendah, terdapat golongan coumarin, asam sinamat, asam sinapinat, alkohol coniveril dan sebagainya. Zat-zat tersebut beserta turunannya juga merupakan senyawa perantara dalam biosintesis lignin (Pratt dan Hudson, 1990).

Banyaknya variasi gugus yang mungkin tersubstitusi pada kerangka utama fenol menyebabkan kelompok fenolik memiliki banyak sekali anggota. Terdapat lebih dari 8.000 jenis senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Salah satu metode klasifikasi adalah berdasarkan jumlah karbon pada molekul (Seafast Centre, 2012: 2).

Tabel 1. Klasifikasi senyawa fenolik berdasarkan jumlah atom karbon (Vermerris dan Nicholson, 2006).


Struktur	Kelas
C ₆	Fenolik sederhana
C ₆ -C ₁	Asam fenolat dan senyawa yang berhubungan lainnya
C ₆ -C ₂	Asetofenon dan asam fenilasetat
C ₆ -C ₃	Koumarin, isokoumarin, dan kromon
C ₁₅	Kalkon, auron, dihidrokalkon
C ₁₅	Flavan
C ₁₅	Flavon

C ₁₅	Flavanon
C ₁₅	Flavanonol
C ₁₅	Antosianidin
C ₁₅	Antosianin
C ₃₀	Biflavonil
C ₆ -C ₁ -C ₆ , C ₆ -C ₂ -C ₆	Benzofenon, xanton, stilben
C ₆ , C ₁₀ , C ₁₄	Kuinon
C ₁₈	Betasianin
Lignan, neolignan	Dimer atau oligomer
Lignin	Polimer
Tanin	Oligomer atau polimer
Phlobaphene	Polimer

Semua senyawa fenol berupa senyawa senyawa aromatik sehingga semuanya menunjukkan serapan kuat di daerah spektrum UV. Selain itu, secara khas senyawa fenol menunjukkan geseran batokrom pada spektrumnya bila ditambahkan basa. Karena itu, cara spektrometri penting, terutama untuk identifikasi dan analisis kuantitatif senyawa fenol (Harborne, 1987: 49).

Senyawa fenolik dari golongan asam fenolat adalah fenol yang tersubstitusi oleh gugus karboksil. Contoh asam fenolat adalah asam galat (Gambar 2a). Asam galat merupakan trifenol yang biasa terdapat di daun teh dalam bentuk teresterifikasi bersama dengan katekin. Selain gugus karboksil, gugus lainnya seperti aldehid juga

dapat terdistribusi di gugus fenol. Contoh senyawa dari jenis ini adalah vanilin (Gambar 2). (Seafast Centre, 2012: 4).



Gambar 2. Struktur (Vermerris dan Nicholson, 2006)

2. Flavanoid

Flavanoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Flavanoid termasuk dalam golongan senyawa fenolik dengan struktur kimia $C_6-C_3-C_6$ (White dan Y. Xing, 1951). Flavanoid mempunyai kerangka dasar dengan 15 atom karbon, dimana dua cincin benzen (C_6) terikat pada satu rantai propan (C_3) sehingga membentuk suatu susunan ($C_6-C_3-C_6$) dengan struktur 1,3-diarilpropan. Senyawa-senyawa flavanoid terdiri dari beberapa jenis, bergantung pada tingkat oksidasi rantai propan dari sistem 1,3-diarilpropan (Agustina, 2011). Sistem penomoran digunakan untuk membedakan posisi karbon disekitar molekulnya (Cook dan S. Samman, 1996).

Tabel 2. Ciri spektrum golongan flavanoid utama


λ maksimum utama (nm)	λ maksimum tambahan (nm) (dengan intensitas nisbi)	Petunjuk
475-560	± 275 (55%)	Antosianin
390-430	240-270 (32%)	Auron
365-390	240-260 (30%)	Khalkon
350-390 } 250-270 }	± 300 (40%)	Flavonol
330-350 } 250-270 }	Tidak ada	Flavon dan biflavonil
275-290 } ± 225 }	310-330 (30%)	Flavonon dan flavonol
225-265	310-330 (25%)	Isoflavon

Flavanoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi dan karena itu menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum UV dan spektrum tampak (Harborne, 1987: 71).

Berbagai jenis senyawa, kandungan dan aktivitas antioksidatif flavanoid sebagai salah satu kelompok antioksidan alami yang terdapat pada sereal, sayur-sayuran dan buah, telah banyak dipublikasikan. Flavanoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui

kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon (Cuppett *et al*, 1954).

Flavanoid sebagai antioksidan membantu menetralkan dan menstabilkan radikal bebas sehingga tidak lagi merusak sel-sel dan jaringan sehat. Pada gilirannya, flavanoid memberikan perlindungan terhadap sejumlah penyakit termasuk kanker, penyakit jantung, diabetes, tumor, dan lain-lain. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa flavanoid seperti quercetin dan epicatechin memiliki efek antidiare. Flavanoid diyakini pula mampu meningkatkan respon kekebalan alami tubuh untuk melawan penyebab alergi dan juga karsinogen (Amazine, 2013.)



Gambar 3. Struktur flavanoid (Redha, 2010: 197)

Fakta menunjukkan bahwa hampir semua komponen nutrisi yang diidentifikasi berperan sebagai agen protektif terhadap penyakit-penyakit tertentu dalam survei/penelitian mengenai diet, sejauh ini mempunyai beberapa sifat antioksidatif (Deshpande *et al*, 1985).

Flavanoid memiliki sifat antioksidan. Senyawa ini berperan sebagai penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Karena bersifat

sebagai reduktor, flavanoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap radikal bebas. Senyawa flavanoid seperti kuersetin, morin, mirisetin, kaemferol, asam tanat, dan asam elagat merupakan antioksidan kuat yang dapat melindungi makanan dari kerusakan oksidatif (Silalahi, 2006: 54).

Kuersetin adalah molekul flavonol dimana merupakan salah satu jenis flavanoid yang aktif sebagai antioksidan. Sifat antioksidan dari senyawa kuersetin mampu menghibisi proses karsinogenesis. Senyawa karsinogen merupakan senyawa yang mampu mengoksidasi DNA sehingga terjadi mutasi. Kuersetin sebagai antioksidan dapat mencegah terjadinya oksidasi pada fase inisiasi maupun propagasi (Winarsi, 2007: 192).




Gambar 4. Struktur kuersetin (Silalahi, 2006: 55)

Dilihat dari struktur kimianya, kuersetin memiliki aktivitas kuat sebagai pemberi hidrogen karena kandungan hidroksilasi yang cukup, yakni 5 gugus OH dan lokasi gugus hidroksilnya terdapat pada sisi aktif (C5, C7, C3', dan C4'). Kuersetin oleh sejumlah ahli kesehatan dipertimbangkan sebagai fitoestrogen yang memiliki fungsi yang sama dengan estrogen yang diyakini memiliki efek antiestrogenik untuk mengurangi resiko kanker (Silalahi, 2006: 55).

3. Karotenoid

Secara umum karotenoid di bahan pangan merupakan tetraterpenoid dengan jumlah atom karbon 40 terdiri atas delapan unit isoprenoid C_5 (ip). Rantai lurus karotenoid C_{40} menjadi kerangka dasar karotenoid. Unit ip tersusun dalam dua posisi arah yang berlawanan pada pusat rantainya sehingga berbentuk molekul yang simetris (Seafast Centre, 2012: 70) merupakan golongan pigmen yang larut lipid dan tersebar luas, terdapat dalam semua jenis tumbuhan, mulai dari bakteri sederhana sampai ke Compositae yang berbunga kuning (Harborne, 1987: 158).



Gambar 5. Rumus struktur kerangka karotenoid (Seafast Centre, 2007: 71)

Cara ekstraksi karotenoid sangat efisien karena sifat komponen yang akan dipisahkan sensitif terhadap panas, mempunyai titik didih yang berdekatan, dan mempunyai sifat penguapan yang relatif rendah.


Karotenoid terdapat dalam kloroplas (0,5 %) bersama-sama dengan klorofil (9,3 %), terutama pada bagian permukaan atas daun. Pada dedaunan hijau selain klorofil terdapat juga karotenoid. Karotenoid juga terdapat dalam buah pepaya, kulit pisang, tomat, mangga, wortel, ubi jalar, dan pada beberapa bunga yang berwarna kuning dan merah. Diperkirakan lebih dari 100 juta ton karotenoid diproduksi setiap

tahun di alam. Beberapa jenis karotenoid yang terdapat di alam dan bahan makanan adalah *β-karoten* (berbagai buah-buahan yang kuning dan merah), *likopen* (tomat), dan biksin (annatis) (Winarno, 2002: 110).

Karotenoid berperan penting dalam pencegahan penyakit degeneratif dengan cara mempertahankan fungsi sistem imun dan antioksidan. Asupan β -karoten dalam jumlah memadai diyakini dapat mencegah angina pectoris, penyakit kardiovaskuler, dan kanker terutama kanker paru-paru dan kanker lambung.

β -karoten merupakan salah satu dari 600 komponen karotenoid yang banyak ditemukan dalam tanaman. β -karoten biasanya digunakan sebagai suplemen nutrisi maupun prekursor vitamin A. Salah satu peran β -karoten adalah meningkatkan efikasi kemoterapi dan radiasi pada kultur sel kanker manusia. Banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran dengan kandungan β -karoten tinggi memiliki resiko rendah terkena berbagai jenis kanker dan penyakit kardiovaskuler (Winarsih, 2007).

β -karoten merupakan kristal berwarna merah, titik lebur $183\text{ }^{\circ}\text{C}$, sedikit larut dibandingkan α -karoten. Larut dalam karbon disulfide, benzene dan kloroform, eter, petroleum eter, dan minyak-minyak, tidak larut dalam air, asam, dan basa. Larutannya berwarna kuning, mengabsorpsi oksigen dari udara yang mempercepat terjadinya yang tidak aktif. β -karoten mempunyai panjang gelombang maksimum $447,0\text{ nm}$ dalam petroleum eter (Allianger, 1976: 725)



Gambar 6. Rumus struktur β -karoten

β -karoten juga memiliki kemampuan untuk memproteksi sel normal dari sel mutan (yang telah mengalami perubahan) pemicu pertumbuhan kanker. Mekanisme yang ditempuh β -karoten adalah dengan mendepresi gen yang menjadi “tumor maker”. β -karoten memiliki unsur penting penangkal radikal bebas yang merusak jaringan tubuh. Dengan demikian, kalau konsumsi β -karoten itu cukup maka resiko terkena serangan jantung dan penyakit sistem kardiovaskuler lainnya dapat diminimalkan (Listya 2010).

C. Metode Penyarian

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995: 7).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel,

mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Dirjen POM, 2000 dan Harborne 1987: 6-8).

Menurut Harborne (1987), metode maserasi digunakan untuk mengekstrak jaringan tanaman yang belum diketahui kandungan senyawanya yang kemungkinan bersifat tidak tahan panas sehingga kerusakan komponen tersebut dapat dihindari. Kekurangan dari metode ini adalah waktu yang relatif lama dan membutuhkan banyak pelarut. Ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan prinsip kelarutan. Prinsip kelarutan adalah *like dissolve like*, yaitu (1) pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, demikian juga sebaliknya pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar, (2) pelarut organik akan melarutkan senyawa organik. Ekstraksi senyawa aktif dari suatu jaringan tanaman dengan berbagai jenis pelarut pada tingkat kepolaran yang berbeda bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimum, baik jumlah ekstrak maupun senyawa aktif yang terkandung dalam contoh uji.

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu maserasi dan perkolasi, dan secara panas yaitu refluks, soxhlet, digesti, infus, dan dekok (Dirjen POM, 2000: 82).

Ada beberapa metode ekstraksi yang digunakan yaitu :

1. Cara dingin (Depkes RI, 2000: 82-84)

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penayarian maserat pertama, dan seterusnya.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstrak dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan perkolasi pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

2. Cara panas

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

a) Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu 40-50⁰C.

b) Infus

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90°C) selama 15 menit.

c) Dekok

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit.

d) Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) didalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995: 570).

D. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini didasarkan pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi (cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari cahaya diserap oleh molekul – molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya mempunyai perbedaan energi antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi yang mengenai cuplikan, maka elektron – elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi ke tingkatan

terekstasi, dan sebagian energi cahaya yang sesuai diserap dengan panjang gelombang ini. Elektron yang terekstasikan melepaskan tenaga melalui proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan energi antara tingkat dasar dengan tingkat terekstasi yang spesifik untuk tiap – tiap bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda – beda (Sastrohamidjojo, 2001).

Pendeteksian senyawa dengan cara sederhana menggunakan spektrofotometer ultraviolet dilakukan pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Radiasi senyawa pada panjang gelombang 254 nm menunjukkan radiasi gelombang pendek, sedangkan pada panjang gelombang 366 nm menunjukkan radiasi panjang gelombang. Bila senyawa menyerap sinar UV, maka akan tampak sebagai bercak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi (Stahl, 1985: 15).

Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk UV dan panjang gelombang 380 – 780 nm untuk visible. Cahaya yang dapat dilihat oleh manusia disebut cahaya tampak/visibel. Biasanya cahaya terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm hingga 750 nm.

Tabel 3. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer (Underwood, 2001; 396).

Panjang gelombang (nm)	Warna	Warna komplementer
400-435	Violet	Kuning-hijau
435-480	Biru	Kuning
480-490	Hijau-biru	Orange

490-500	Biru-hijau	Merah
500-560	Hijau	Ungu
560-580	Kuning-hijau	Violet
580-595	Kuning	Biru
595-610	Orange	Hijau-biru
610-750	Merah	Biru-hijau

Instrumen yang digunakan untuk mempelajari serapan atau emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang disebut spektrometer atau spektrofotometer. Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis berupa susunan peralatan adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Bagan instrumen spektrofotometer UV-Vis

1. Sumber radiasi

Beberapa sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hydrogen dan lampu deuterium (D_2). Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti lampu deuterium. Lampu deuterium dapat dipakai pada panjang gelombang 180 nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat).

Lampu tungsten merupakan campuran dari filament tungsten gas iodine (halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungstein-iodin pada panjang spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak dengan rentangan panjang gelombang 380-900 nm.

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

2. Monokromator

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit) masuk-filter-prisma-kisi(grating)-celah keluar.

a. Celah (slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang.

b. Filter optik

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya

dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lamber-Beer pada analisis kuantitatif.

c. Prisma dan Kisi (grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

3. Kuvet

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk biasanya terbuat dari quartz atau leburan silika dan ada yang dari gelas dengan bentuk tabung empat persegi panjang 1x1 cm, dengan tinggi kurang lebih 5 cm. Pada pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quartz atau leburan silika, sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorpsi sinar ultra lembayung.

4. Detektor

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer adalah merubah signal elektronik.

5. Amplifier

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur (Mulja, 1995: 13).

Prinsip penentuan spektrofotometer UV-Vis merupakan aplikasi dari Hukum Lambert Bert. Hukum ini menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi kuvet (Rohman, 2007). Kesalahan-kesalahan secara sistematis dalam penggunaan spektrofotometer seringkali terjadi. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut adalah (Tahir, 2008):

- a. Serapan oleh larutan. Kesalahan seperti ini dapat diatasi dengan penggunaan blanko. Blanko adalah larutan yang berisi matrik selain komponen yang dianalisis.
- b. Serapan oleh kuvet. Bahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan kuvet adalah kuarsa (silika) dan gelas. Kuvet dari bahan kuarsa memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan dari bahan gelas. Kesalahan ini dapat diatasi dengan

penggunaan jenis, ukuran dan bahan kuvet yang sama untuk tempat blanko dan sampel.

c. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran absorbansi yang sangat rendah atau sangat tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan konsentrasi, sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan. Kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer UV-Vis dapat diatasi dengan dilakukannya proses kalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan blanko, yaitu setting nilai absorbansi = 0 dan nilai transmitansi = 100%.

E. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan yang Diolah Menjadi Obat

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. asy-Syu'ara : 26/ 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi berbagai macam pasang (tetumbuhan) yang baik?”(Departemen Agama RI)

Lebih lanjut disebutkan pula dalam al-Qur'an Q.S. al-An'am : 99 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 خُجْرًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Departemen Agama RI)

Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah Swt memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.

Konsep pengobatan Islam adalah menggunakan obat yang halal dan baik. Ada hal yang penting dari apa yang disampaikan Rasulullah Saw, bahwa tidak mungkin obat-obat yang digunakan seseorang adalah sesuatu yang haram, karena pastinya ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, namun

karena Allah Maha Suci (Al-Quddus), tidaklah mungkin Allah akan menurunkan penawarnya dari benda yang haram.

Hal ini patut menjadi perhatian, karena perihal halal haram menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Islam yang bisa membuat amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Swt karena permasalahan obat yang diminum.

Dalam pengobatan Islam, dianjurkan untuk tidak melakukan pengobatan yang membawa keburukan dan menimbulkan masalah baru seperti merusak tubuh. Terlebih bila pengobatan tersebut bisa mengakibatkan pelakunya jatuh dalam jurang kekafiran. Oleh karena itu, di kitab Thibbun Nabawi diajarkan semampu mungkin umat manusia menjaga tubuh kesehatan secara jasadi dan rohani dengan tetap berpegang teguh pada tuntunan syariat Islam dan landasan normatif (Zaidul Akbar, 2011).

Dalam sebuah hadis Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Terjemahnya:

(Hadis) dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya” (H.R. al-Bukhari, VII: 12).

Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah swt. turunkan obatnya. Kadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga orang yang belum bisa menemukannya. Oleh

karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menimpanya.

Namun sangat disayangkan, di masa sekarang terkadang seorang terjatuh pada kesalahan dalam mencari obat. Itu semua disebabkan karena lemahnya kesabaran dan kurangnya ilmu pengetahuan, baik ilmu tentang agamanya maupun ilmu tentang pengobatan. Padahal Allah swt. Tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan juga obatnya.

Dalam Al-Quran Allah SWT. banyak menyebutkan tentang tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Diantaranya ayat yang mencantumkan tentang tanaman-tanaman yang terdapat di muka bumi ini, yakni:

Allah SWT. berfirman dalam QS Lukman/31 :10

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi agar ia (bumi) tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Departemen Agama RI, 2005: 411).

Ayat tersebut menyatakan: *Dia menciptakan langit yang demikian tinggi dan besar tanpa tiang yang kamu melihatnya dengan mata kepala seperti itu, dan Dia meletakkan di permukaan bumi yang merupakan hunian kamu gunung-gunung yang sangat kukuh sehingga tertancap kuat supaya ia, yakni bumi itu, tidak guncang bersama kamu, kendati ia lonjong dan terus berputar; dan Dia mengembangbiakkan*

di sana segala jenis binatang yang berakal, menyusui, bertelur, melata, dan lain-lain, dan Kami turunkan air hujan dari langit, baik yang cair maupun yang membeku, lalu Kami tumbuhkan padanya, setelah percampuran tanah dengan air yang turun itu, segala macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik (Shihab, 2009: 286).

Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional (Abd ush shamad, 2002: 141).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui kadar total, flavanoid, fenolik dan karotenoid dalam ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Kimia Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

C. Instrumen Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah aluminium foil, bejana maserasi, bola hisap, cawan porselin, corong pisah, erlenmeyer, gelas ukur, *hairdryer*, klem, kuvet, labu takar, neraca analitik, pipet tetes, pipet volume, statif, spektrofotometer UV-Vis, vial.

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air suling, aluminium (III) klorida, asam galat, asam klorida, asam sulfat, etanol, eter, kuersetin, metanol, metanol p.a natrium asetat, natrium karbonat, Folin Ciocalteu, serbuk talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) β -karoten.

D. Sampel

Sampel yang digunakan adalah umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) diambil di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa timur.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Pengolahan Sampel

Sampel umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) yang telah diambil dicuci bersih menggunakan air mengalir kemudian ditiriskan lalu dirajang dan dikeringkan dalam oven suhu 40°C. Setelah kering disimpan dalam wadah tertutup.

2. Ekstraksi Sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Sampel umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) ditimbang sebanyak 300 gram kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi. Ditambahkan metanol hingga sampel terendam. Wadah maserasi ditutup dan didiamkan selama 3×24 jam, sambil berkali kali diaduk. Setelah itu ampas diperas. Maserasi tetap berlanjut sampai filtrat jernih. Pemisahan ekstrak dan residu dilakukan menggunakan vakum. Ekstrak yang diperoleh disimpan dalam deksikator sampai diperoleh ekstrak kering.

3. Uji Pendahuluan

a. Identifikasi senyawa fenolik (Depkes RI, 1979)

Ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok dengan sedikit eter. Lapisan eter dikeringkan pada plat tetes, ditambahkan larutan FeCl_3 . Terbentuk warna hijau kehitaman menandakan adanya senyawa fenol.

b. Identifikasi senyawa flavanoid (Mojab *et al*, 2003)

Ekstrak ditambahkan beberapa tetes HCl pekat dan 0,1 gram logam magnesium. Adanya flavanoid, diindikasikan dari terbentuknya warna merah magenta selama 3 menit.

c. Identifikasi senyawa karotenoid (Kristani *et al*, 2008)

Ekstrak yang diperoleh diambil sedikit dan dikeringakan di atas plat tetes, ditambahkan 3 tetes asam asetat anhidrat dan kemudian 1 tetes asam sulfat pekat. Adanya senyawa golongan karotenoid ditandai dengan timbulnya warna merah.

4. Penetapan Kadar Fenolik

a. Pembuatan larutan standar asam galat (Pourmorad, 2006)

Penetapan kadar fenolik total dilakukan dengan menggunakan pembanding asam galat dan pereaksi Folin Ciocalteu yang berisi campuran natrium tungstat, natrium molibdat, litium sulfat, asam klorida pekat, asam fosfat 85%, bromin, dan air suling.

Dibuat larutan asam galat dengan konsentrasi 1000 ppm dengan cara menimbang 50 mg asam galat dan dilarutkan dengan methanol p.a hingga 100 ml. Larutan stok kemudian diencerkan sehingga diperoleh larutan pembanding asam galat dengan konsentrasi 250, 300, 350, 400, 450 ppm.

Sebanyak 0,5 ml larutan pembanding ditambah dengan 5 ml pereaksi Folin Ciocalteu dan 4 ml natrium karbonat 1 M. Campuran dibiarkan selama 15 menit. Diambil salah satu konsentrasi larutan baku, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm.

Diambil masing-masing konsentrasi larutan pembanding, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 412 nm. Masing-masing larutan pembanding diukur tiga kali.

b. Pembuatan kurva baku asam galat

Kurva baku dibuat dengan menghubungkan konsentrasi larutan pembanding dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 412 nm.

c. Penetapan kadar fenolik total dalam sampel

Sampel uji dilarutkan dalam metanol dengan konsentrasi 20.000 ppm. Sebanyak 0,5 ml sampel uji ditambahkan dengan 5 ml pereaksi Folin Ciocalteu dan 4 ml natrium karbonat 1 M. Campuran dibiarkan selama 15 menit kemudian absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 412 nm.

Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali. Fenol total dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi asam galat yang telah diukur sebelumnya.

5. Penetapan Flavanoid Total dalam Ekstrak

a. Pembuatan larutan standar kuersetin (Chang, 2002)

Sebanyak 50 mg kuersetin ditimbang dan dilarutkan dalam 50 ml methanol sebagai larutan stok 1000 ppm. Kemudian dibuat pengenceran kuersetin dengan konsentrasi 30, 40, 50, 60 dan 70 ppm sebagai larutan kuersetin pembanding. Sebanyak 0,5 ml larutan pembanding diencerkan dengan 1,5 ml metanol p.a

kemudian ditambahkan 0,1 ml aluminium (III) klorida 10%, 0,1 ml natrium asetat 1 M dan 2,8 ml air suling. Diambil salah satu konsentrasi larutan baku, diukur absorbansinya pada panjang 400-800 nm.

b. Pembuatan kurva baku kuersetin

Kurva baku dibuat dengan cara menghubungkan konsentrasi larutan standar dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 439 nm.

c. Penetapan kadar flavanoid total dalam ekstrak

Sebanyak 30 mg sampel ditimbang dan dilarutkan dalam 10 ml methanol p.a sebagai konsentrasi 10.000 ppm. Sebanyak 0,5 ml sampel uji ditambahkan dengan 1,5 ml metanol kemudian ditambahkan 0,1 ml aluminium (III) klorida 10%, 0,1 ml natrium asetat 1 M dan 2,8 ml air suling. Setelah diinkubasi selama 30 menit, absorbansi dari larutan pembanding diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 439 nm.

Flavanoid total dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi kuersetin yang telah diukur sebelumnya.

6. Penetapan Karotenoid Total dalam Ekstrak

a. Pembuatan larutan standar β -karoten (Thaipong, 2006)

Sebanyak 10 mg β -karoten ditimbang dan dilarutkan dalam metanol hingga 100 ml untuk mendapatkan konsentrasi 100 ppm. Larutan stok kemudian diencerkan sehingga diperoleh larutan pembanding β -karoten dengan konsentrasi 15, 20, 25, 30 dan 35

Diambil salah satu konsentrasi larutan baku, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800.

b. Pembuatan kurva baku β -karoten

Kurva baku dibuat dengan cara menghubungkan konsentrasi larutan standar dengan hasil hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 449 nm.

c. Penetapan kadar karotenoid total dalam sampel

Sebanyak 30 mg sampel uji dilarutkan dengan 10 ml methanol p.a sebagai konsentrasi 10.000 ppm. sebanyak 2 ml sampel uji diukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum 449 nm. Pengukuran dilakukan tiga kali. Karoten total dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi β -karoten yang telah diukur sebelumnya.

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

Alat ukur yang digunakan untuk penentuan kadar adalah spektrofotometer UV-Vis. Validasi dijaga dengan cara menggunakan instrumen yang terkalibrasi.

Reliabilitas dijaga dengan replikasi 3 kali pada tiap uji.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer, yang didapatkan dari absorbansi masing-masing larutan pembanding asam galat, kuersetin, dan β -karoten, dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linier.

Kadar total dari senyawa dihitung dengan memasukkan ke dalam persamaan regresi linier $y = ax + b$, yang diperoleh dari kurva kalibrasi masing-masing pembanding. Hasil dinyatakan dalam satuan mg dalam 100 gram (mg/100 gram).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Hasil maserasi dari 300 gram Ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) adalah sebanyak 7,5 gram.

1. Uji kualitatif

Tabel 4 . Hasil Uji Pendahuluan Ekstrak umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*).

Uji Golongan	Warna	Kesimpulan
Fenolik	Hijau kehitaman	+
Flavanoid	Merah magenta	+
Karotenoid	Biru dan endapan coklat	+

2. Uji kuantitatif

Tabel 5. Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*).

Berat ekstrak (gram)	Absorbansi	Absorbansi Rata-rata	Kadar ekivalen (ppm)	Kadar Fenolik Total (%)
0,05	0.549 0,555 0,554	0,553	356	35,6

Tabel 6. Kadar Flavanoid Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).

Berat ekstrak (gram)	Absorbansi	Absorbansi Rata-rata	Kadar ekivalen (ppm)	Kadar Flavanoid Total (%)
0,05	0.448 0,448 0,447	0,448	45,44	4,54

Tabel 7. Kadar Karotenoid Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).

Berat ekstrak (gram)	Absorbansi	Absorbansi Rata-rata	Kadar ekivalen (ppm)	Kadar Karotenoid Total (%)
0,0125	0.485 0,491 0,494	0,49	20,13	8

B. Pembahasan

Reaksi radikal bebas secara umum dapat dihambat oleh antioksidan tertentu baik alami maupun sintesis. Sebagian besar antioksidan alami berasal dari tanaman, antara lain berupa senyawa tokoferol, karotenoid, asam askorbat, fenol dan flavanoid. Beberapa studi menunjukkan bahwa beberapa tanaman dan buah-buahan terbukti bermanfaat melindungi tubuh manusia terhadap bahaya radikal bebas. Hal ini

dikarenakan potensi antioksidan yang terdapat dalam tanaman dan buah buahan tersebut, seperti karoten, flavanoid dan komponen fenolik lain, juga vitamin C dan E. (Pratimasari. 2009:2).

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*). Talas jepang yang diambil adalah yang telah berumur 5-6 bulan dan siap dipanen, pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggali umbi talas, lalu pohon talas dicabut dan pelapahnya dipotong sepanjang 20-30 cm dari pangkal umbi, serta akarnya dibuang dan umbinya dibersihkan dari tanah yang melekat (Cahya Nur, 2014 :75). Setelah itu sampel dikeringkan lalu diserbukkan sehingga dapat diekstraksi. Adapun tujuan dari proses ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam sampel.

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. Pemilihan metode ini karena merupakan metode yang sederhana yang dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam penyari pada jangka waktu tertentu. Selain itu, metode maserasi tidak ada pemanasan dalam proses penyarian, sehingga kemungkinan rusaknya komponen kimia yang dikandung oleh sampel dapat dihindari.

Penyari yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metanol. Metanol digunakan sebagai penyari karena memiliki sifat semipolar, dan dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar. Metanol bersifat mudah menguap sehingga akan mudah dipisahkan dari filtrat.

Uji pendahuluan pada ekstrak dilakukan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*). Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang dilakukan, ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) secara kualitatif positif mengandung senyawa fenolik, flavanoid, dan karotenoid.

Uji golongan senyawa fenolik dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan larutan FeCl_3 1%. FeCl_3 akan bereaksi dengan gugus fenolik yang berada pada sampel membentuk warna hijau kehitaman menunjukkan adanya senyawa fenolik (Harborne, 1987).

Penetapan kandungan fenolik total dapat dilakukan dengan menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu. Metode ini berdasarkan kekuatan mereduksi dari gugus hidroksi senyawa fenolik. Semua senyawa fenolik termasuk fenol sederhana dapat bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteu walaupun bukan penangkap radikal bebas efektif. Adanya inti aromatis pada senyawa fenol dapat mereduksi fosfomolibat fosfotungstat menjadi molybdenum yang berwarna biru (Lee et al, 2003).

Asam galat digunakan sebagai pembanding karena merupakan senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat (Lee et al, 2003). Asam galat merupakan turunan dari asam hidroksibenzoat yang secara umum digunakan sebagai pembanding selain asam klorogenat. Selain itu, didasarkan atas ketersediaan substansi yang stabil dan murni (Riaji, 2014 :44).

Uji golongan senyawa flavanoid dilakukan dengan penambahan HCl dan logam magnesium. Larasati dan Fauzia (2008) menjelaskan bahwa tujuan

penambahan logam magnesium dan HCl untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat dalam struktur flavanoid sehingga terjadi perubahan warna menjadi jingga atau merah. Sedangkan menurut Harborne (1987) perubahan warna yang terjadi yaitu kuning, orange, dan merah.

Penentuan kadar flavanoid total menggunakan metode Chang *et al.* (2002). Prinsip dari metode $AlCl_3$ yaitu pembentukan kompleks yang stabil dengan C-4 gugus keto, serta pada C-3 atau C-5 gugus hidroksil dari flavon dan flavonol. Dalam penambahannya, aluminium klorida membentuk kompleks asam yang stabil dengan gugus ortohidroksil pada cincin A- atau B- dari senyawa-senyawa flavanoid.

Kuersetin dipilih sebagai larutan pembanding karena merupakan salah satu senyawa golongan flavanoid yang dapat bereaksi dengan $AlCl_3$ membentuk kompleks (Chang *et al.*, 2002). Selain itu, kuersetin dipilih sebagai standar karena termasuk senyawa flavanoid yang paling efektif menangkap radikal bebas (radikal hidroksil, superoksida, dan peroksida) serta menghambat berbagai reaksi oksidasi karena dapat menghasilkan radikal fenoksil yang terstabilkan oleh efek resonansi dari cincin aromatis (Sri, 2008).

Uji golongan senyawa karotenoid menggunakan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat untuk membentuk turunan asetil dari karotenoid. Senyawa karotenoid akan mengalami dehidrasi dengan penambahan asam kuat dan membentuk garam yang memberikan warna merah disebabkan reaksi oksidasi melalui pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi (Sriwahyuni, 2010).

Penetapan kadar karotenoid total dilakukan dengan metode Thaipong (2006). Pembanding dan sampel uji dilarutkan dalam metanol p.a, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 449 nm. β -karoten digunakan sebagai pembanding karena mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi yang mampu menangkal radikal bebas (Charles, 2013).

Dari hasil penelitian diperoleh, kadar total flavanoid = 4,54 %, kadar total fenolik 35,6 % dan kadar total karotenoid 8 % dari Ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*)

Seperti yang telah kita ketahui, Allah SWT berkali-kali menegaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan bumi beserta isinya tanpa sia-sia, begitupun pada tumbuh-tumbuhan. Allah SWT juga telah berfirman dalam Q.S Luqman tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan yang baik, yang artinya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia di muka bumi salah satunya untuk menjaga kesehatan. Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) adalah salah satu tumbuhan baik yang dimaksud karena telah banyak digunakan sebagai obat herbal baik untuk menyembuhkan luka dan mencegah kanker usus

Penelitian ini memberikan bukti bahwa umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*) mengandung senyawa fenolik, flavanoid, dan karotenoid dengan kadar yang tinggi sehingga berpotensi sebagai antioksidan yang baik bagi kesehatan. Hal ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang yang berpikir tentang kebesaran Allah SWT atas makhluk ciptaan-Nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) mengandung golongan senyawa flavanoid, fenolik dan karotenoid.
2. Ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*) memiliki kadar total flavanoid sebesar 4,54 %, kadar total fenolik sebesar 35,6 %, dan kadar total karotenoid sebesar 8 %.

B. Implikasi Penelitian

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variasi pelarut untuk dapat mengetahui pelarut terbaik yang dapat menarik masing-masing senyawa fenolik, flavanoid, dan karotenoid lebih banyak..

KEPUSTAKAAN

- Abdushshamad, M.K. *IMukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2002
- Al- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah bin Bardazba. *Sahih Al- Bukhari Jilid VII*, Bairut: Dar Al- Kutu Allmiyah.
- Allianger, N Cava, M. *Organic Chemistry*, second edition. New York: Worth Publishier, 1976.
- Amazine. “Khasiat Antioksidan: Manfaat Flavanoid untuk Kesehatan”. *Situs Resmi Amazine*. <http://www.amazine.co/18672/khasiat-antioksidan-manfaat-flavanoid-untuk-kesehatan>.
- Andarwulan, Nuri, R.H., Fitri Faradilla. “Senyawa Fenolik pada Beberapa Sayuran Indigenous dari Indonesia”. *Situs Resmi Seafast*. <http://seafast.ipb.ac.id/tpc-project/wp-content/uploads/2012/03/1-senyawa-fenolik.pdf>.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2008
- Chang, C.C., Yang, M.H., Wen, H.M., Chern, J.C. “Estimation of Total Flavanoid Content in Propolis by Two Complementary Colorimetric Methods”. *Journal of Food and Drug Analysis* 10 (2002): 178-182.
- Cook, N. C. and S. Samman. “Review Flavanoids-Chemistry, Metabolism, Cardioprotective Effect, And Dietary Sources”. *J. Nutr. Biochem* 7 (1996): 66-76.
- Cuppett, S., M. Schrepf and C. Hall III. *Natural Antioxidant-Are They Reality*. Dalam Foreidoon Shahidi, *Natural Antioxidants, Chemistry, Health Effect and Applications*. Champaign, Illinois: AOCS Press, 1954.
- Depkes RI. *Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I)*. Jilid II. Jakarta: Departemen Kesehatan RI dan Kesejahteraan Sosial RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Depkes RI, 1979.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Materia Medika Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Depkes RI. 1989.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Sediaan Galenika*. Jakarta: Depkes RI. 1986.
- Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000.
- Ferguson, L.R., A.M. Robortson., R.J. Mc Kenzie., M.E. Watson P.J Harri. *Adsorption Of Hidriphobic Mutagen Of Dietary Fiber From Taro (Colocasia esculenta) An Important Food Plant Of The Southpasific Nutrition And Cancer*. 1992. Vol 17(1) hal 85-95.
- Hilmi Nur Cahya. *Budidaya & Cara Olah Talas Untuk Makanan & obat*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press.2014
- Hidayat syamsul & Napitupulu Rodame. *Kitab Tumbuhan Obat*. Jakarta : AgrIFlo (Penebar Swadaya Grup). 2015
- J. B. Harborne. *The Flavanoids, Advances in Research Since 1987*. London: Chapman and Hall, 1994.
- Kristanti, A. N., N S. Aminah., M. Tanjung dan B. Kurniadi. *Buku Ajar Fitokimia, Jurusan Kimia Laboratorium Kimia Organik*. FMIPA Universitas Airlangga, 2008.
- Listya, Ana, Sinly dan Satuhu S. *Aktivitas Antiradikal Bebas serta Kadar β -karoten pada Madu Randu dan Madu Kelengkeng*. Bukit Jimbaran: Universitas Udayana, 2010.
- M. B. Narkhede *et al.* *Invitro Antidiabetic Activity Of Caesalpina digna (R) Methanol Extract*. *Asian Journal Science And Research*. 2011 Vol 1(2) hal 101-106
- McEwan R, Madivha RP, Djarova T, Oyedeji OA, Opoku AR. *Alpha-amylase inhibitor of amadumbe (Colocasia esculenta): Isolation, purification and selectivity toward α - amylases from various sources Afr J Bioch Res* 2010. vol 4 (2), 220-224).
- Middleton EC, Kandaswami, TC Theoharides. "The Effects of Plant Flavanoids on Mammalian Cells: Implications for Inflammation, Heart Disease, and Cancer". *Pharmacological Reviews* 52 (1998): 673-751.
- Mulja, M, Suharman. *Analisis Instrumental*. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.


- Mojab F, Kamalinejad M, Naysaneh G. & Hamid RV. 2003. "Phytochemical Screening of Some Species of Iranian Plants". *Iranian Journal of Pharmaceutical Research* (2003): 77-82.
- Ningsih, Widia. "Evaluasi Senyawa Fenolik (Asam Ferulat dan Asam p-Kumarat) pada Biji, Kecambah dan Tempe Kacang Tunggak (*Vigna unguiculata*)". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian ITB, 2007.
- Ohazurike, N.C and A. E. Arinze. *Change In Phenol oxidase and peroxidase level in Cocoyan Tuber of Different Postharvest Ages infected of Sclerotium Rosli Sacc.* Nahrung. 1996.
- Pratimasari, D, 2009. *Uji Aktivitas Penangkap Radikal Buah Carica papaya L. Dengan Metode DPPH dan Penetapan Kadar Fenolik Serta Flavanoid Totalnya*, Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Pourmorad, F., Hosseinimehr, S.J., Shahanimajd, N. "Antioxidant Activity, Phenol and Flavanoid Content of Some Select Iranian Medicinal Plants". *African Journal of Biotechnology* vol. 5, no. 11 (2006): 1142-1145.
- Partt & Hudson. "Antioxidan : Jenis, Sumber, Mekanisme Kerja dan Peran Terhadap Kesehatan", 1990.
- Redha, Abdi. "Flavanoid: Struktur, Sifat Antioksidatif dan Peranannya dalam Sistem Biologis". *Jurnal Belian* vol. 9 no. 2 (2010): 196-202.
- Rohman, Abdul. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Rossidy, I. *Fenomena Flora dan Fauna dalam Perspektif Al-Qur'an*. Malang: UIN Press, 2008.
- Sandi, Evika Savitri. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sastrohamidjojo, H. "Dasar-dasar Spektroskopi". Yogyakarta: *Liberty*. [org/artikel_kimia/berita/antioksidan_dan_radikal_bebas/](http://artikel_kimia/berita/antioksidan_dan_radikal_bebas/).
- Seafast Centre. "Pewarna Alami untuk Pangan: Kuning-Merah Karotenoid: *Situs Resmi Seafast*. <http://seafast.ipb.ac.id/tpc-project/wp-content/uploads/2013/03/10-kuning-merah-karotenoid.pdf>.
- Shahidi, F. dan M. Naczk. *Food Phenolics*. Lancaster-Basel: Technomic pub. Co. Inc., 1995.

- Shihab, M.Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Vol. 10. 2009.
- Silalahi, Jansen. *Makanan Fungsional*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Susilowati. "Isolasi dan Identifikasi Senyawa Karotenoid dari Cabai Merah (*Capsicum annuum* Linn.)". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN, 2008.
- Tahir, M. Indariani dan M. Sitanggang. *165 Sansevieria Eksklusif*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2008.
- Thaipong.K., Boonprakob.U., Crosby.K.M, Zevallos.L.C., Byrne.D.H. "Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC Assay for Estimating Antioxidant Activity from Guava Fruit Extract". *Journal of Food Composition and Analysis* (2006): 670-671.
- Tjitrosoepomo Gembong. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. UGM Press. Yogyakarta. 2013.
- Underwood, A.L. *Analisa Kimia Kuantitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- V. Ramanatha et al. *The Global Diversity Of Taro Ethnobotany And Conversation*. Bioversuty International: Italy. 2010.
- Vermeris dan Nicholson. *Pewarna Alami untuk Pangan: Kuning-Merah Karotenoid*. *Situs Resmi Seafast*. <http://seafast.ipb.ac.id/tpc-project/wp-content/uploads/2013/03/10-kuning-merah-karotenoid.pdf>.
- Voigt, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*, Diterjemahkan oleh Soendani N. S., UGM Press, Yogyakarta, 1995.
- White, P.J. and Y. Xing. "Antioxidants from Cereals and Legumes" dalam Foreidoon Shahidi. *Natural Antioxidants, Chemistry, Health Effect and Applications*. Champaign, Illinois: AOCS Press, 1954.
- Widyaningrum, Herlina. *Kitab Tanaman Obat*. Yogyakarta. Media Presindo. 2011
- Widyastuti, N. "Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Metode CUPRAC, DPPH, dan FRAP serta Korelasinya dengan Fenol dan Flavanoid pada Enam Tanaman". *Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Wijayakusuma, H, et al. 1998. *Tanaman Berkhasiat Obat Di Indonesia*. Jilid IV. Cetakan ke-4. Jakarta

Winarno, F.G. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.


Winarsi, Hery. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.




Lampiran 1. Ekstraksi umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta Var Antiquorum*)

Lampiran 2. Uji Pendahuluan


a. Identifikasi senyawa fenolik



b. Identifikasi senyawa flavanoid




c. Identifikasi senyawa karotenoid





Lampiran 3. Pembuatan Larutan Standar

a. Pembuatan larutan standar asam galat




b. Pembuatan larutan standar kuersetin




c. Pembuatan larutan standar β -karoten

Lampiran 4. Penentuan Kadar Total


a. Penentuan kadar fenolik total




b. Penentuan kadar flavanoid total



c. Penentuan kadar karotenoid total



Lampiran 5. Gambar talas jepang (*Colocasia Esculenta* Var *Antiquorum*)



*Gambar 8. Tanaman Umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta* Var *Antiquorum*).*

Ket. A : daun

B : tangkai


C : umbi

Lampiran 6. Gambar Hasil ekstraksi talas jepang (*Colocasia Esculenta* Var *Antiquorum*)



*Gambar 9. Hasil ekstraksi Umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta* Var *Antiquorum*).*



Lampiran 7. Gambar Hasil Uji Pendahuluan

Gambar 10. Hasil Uji Pendahuluan

Keterangan :

- (a) Hasil identifikasi senyawa fenolik
- (b) Hasil identifikasi senyawa flavanoid
- (c) Hasil identifikasi senyawa karotenoid

Lampiran 8. Panjang Gelombang Maksimum pada Spektrofotometri Uv-VIS




Scanning
Test Name: AB
11:41 27Feb15
Cell # 1

Wavelength	Abs
410.0	0.690
411.0	0.680
412.0	0.680
413.0	0.680
414.0	0.678
415.0	0.678
416.0	0.678
417.0	0.677
418.0	0.675
419.0	0.673

ID#: 1
Baseline collected 27Feb15

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline	Data	Sample	

Gambar 11. Panjang gelombang maksimal asam galat



Scanning
Test Name: KIMIA
12:57 13Mar15
Cell # 1


Wavelength	Abs
435.0	0.855
435.5	0.856
436.0	0.856
436.5	0.857
437.0	0.857
437.5	0.857
438.0	0.857
438.5	0.856
439.0	0.855
439.5	0.855

ID#: 1
Baseline collected 13Mar15

Collect	Tabular	Exit	Measure
Baseline		Data	Sample

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar 12. Panjang gelombang maksimal kuersetin



Gambar 13. Panjang gelombang maksimal β -karoten

Lampiran 9. Hasil Pengukuran Serapan Sampel



Advanced A-2T-C
Test Name: KIMIA
17:03 28Feb15
Cell # 1

ID#	Abs
1	0.549
2	0.555
3	0.554

Page 1, Samples 1 - 3
Measure Blank Save Data Measure Sample

Gambar 14. Hasil pengukuran serapan senyawa fenolik



Advanced A-2T-C
Test Name: KIMIA
17:28 4Mar15
Cell # 1

ID#	Abs
1	0.448
2	0.448
3	0.447

Page 1, Samples 1 - 3
Measure Blank Save Data Measure Sample

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar 15. Hasil pengukuran serapan senyawa flavanoid



Advanced A-T-C
Test Name: KIMIA
15:23 5Mar15
Cell 1 1

ID#	Abs
1	0.485
2	0.491
3	0.494

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Blank	Save Data	Measure Sample
---------------	-----------	----------------

Gambar 16. Hasil pengukuran serapan senyawa karotenoid




Lampiran 10. Pengukuran Absorbansi Larutan Standar dan Kurva Baku

a. Pengukuran absorbansi larutan standar dan kurva baku asam galat

Tabel 8. Hasil pengukuran absorbansi asam galat

Konsentrasi	250	300	350	400	450
Absorbansi	0,403	0,470	0,537	0,617	0,672
	0,403	0,473	0,538	0,618	0,678
	0,402	0,474	0,539	0,619	0,682
Rata-rata	0,403	0,472	0,538	0,618	0,678




Gambar 17. Kurva Baku Asam Galat

b. Pengukuran absorbansi larutan standar dan kurva baku kuersetin

Tabel 9. Hasil pengukuran absorbansi kuersetin

Konsentrasi	30	40	50	60	70
Absorbansi	0,294	0,396	0,484	0,614	0,670
	0,298	0,394	0,491	0,594	0,672
	0,297	0,396	0,512	0,561	0,675
Rata-rata	0,296	0,395	0,496	0,590	0,672



Gambar 18. Kurva Baku Kuersetin

c. Pengukuran absorbansi larutan standar dan kurva baku β -karotenTabel 10. Hasil pengukuran absorbansi β -karoten

Konsentrasi	15	20	25	30	35
Absorbansi	0,430	0,477	0,531	0,602	0,660
	0,439	0,492	0,542	0,607	0,665
	0,441	0,495	0,544	0,613	0,672
Rata-rata	0,436	0,488	0,539	0,607	0,665

Gambar 19. Kurva Baku β -karoten

Lampiran 11. Pembuatan Larutan dan pereaksi

a. Pembuatan Larutan Induk

Larutan induk baku dibuat dengan melarutkan masing-masing 50 mg asam galat, 50 mg kuersetin, dan 10 mg β -karoten dalam labu tentukur 50 ml lalu dicukupkan volumenya dengan pelarut metanol p.a hingga 50 ml. kemudian dilakukan pengenceran dengan menggunakan rumus $V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$

Larutan induk sampel dibuat dengan melarutkan 50 mg sampel ke dalam labu tentukur 50 ml lalu dicukupkan volumenya dengan metanol p.a hingga 50 ml.

b. Pereaksi FeCl₃ 1%

FeCl₃ 1% dibuat dengan melarutkan 1 gram FeCl₃ dengan air suling hingga volume 100 ml.

c. Pereaksi H₂SO₄ 85%

H₂SO₄ 85% dibuat dengan melarutkan 8,7 ml H₂SO₄ murni (98%) dengan air suling hingga volume 10 ml.

d. Pereaksi Folin-Ciocalteu 1%

Folin-Ciocalteu 1% dibuat dengan melarutkan 1 ml pereaksi Folin-Ciocalteu 1% ke dalam air suling hingga volume 100 ml.

Komposisi Pereaksi Folin-Ciocalteu

sodium tungstat (Na ₂ WO ₄ .2H ₂ O)	100 g
sodium molibdat (Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O)	25 g
Asam fostat 85%	50 ml
HCl Pekat	100 ml
Litium sulfat (Li ₂ SO ₄ .H ₂ O)	150 g
Bromin	qs
Air suling	ad. 1 L

Pembuatan : larutkan 100 g sodium tungstat dan 25 g sodium molibdat dalam 700 ml air suling. Tambahkan 50 ml asam fosfat 85% dan 100 ml HCl pekat. Didihkan dan refluks selama 10 jam. Kemudian tambahkan 150 g litium sulfat, lalu didihkan selama 15 menit. Dinginkan, kemudian cukupkan volumenya dengan air suling hingga 1 L (Compendium of International methods of Analysis-OIV Folin-CiocalteuIndex.<http://www.oiv.int/oiv/files/6%20%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-41/EN/OIV-MA-AS2-10.pdf>).

e. Pereaksi AlCl_3 10%

AlCl_3 10% dibuat dengan melarutkan 10 gram AlCl_3 dengan air suling hingga volume 100 ml.

f. Natrium karbonat 1 M

$$M = \frac{\text{mol zat terlarut}}{\text{volume larutan}} \qquad \text{mol} = \frac{\text{massa zat terlarut}}{Mr \text{ zat dalam } g/mol}$$

$$1 \text{ M} = \frac{x}{0,05 \text{ l}}$$

$$x = 1 \times 0,05 = 0,05 \text{ mol} \longrightarrow 0,05 \text{ mol} = \frac{x \text{ gram}}{124 \text{ g/mol}}$$

$$x = 0,05 \text{ mol} \times 124 \text{ g/mol}$$

$$= 6,2 \text{ gram}$$

Natrium karbonat 1 m dibuat dengan melarutkan 6,2 gram Na_2CO_3 dengan air suling hingga volume 50 ml.

g. Natrium Asetat 1 M

$$\begin{aligned}x &= 1 \times 0,05 = 0,05 \text{ mol} \longrightarrow 0,05 \text{ mol} = \frac{x \text{ gram}}{106 \text{ g/mol}} \\x &= 0,05 \text{ mol} \times 106 \text{ g/mol} \\&= 5,3 \text{ gram}\end{aligned}$$

Natrium karbonat 1 m dibuat dengan melarutkan 6,2 gram Na_2CO_3 dengan air suling hingga volume 50 ml.



Lampiran 12. Perhitungan Kadar Total

a. Perhitungan Kadar Total Flavanoid

Kadar ekivalen flavanoid :

$$y = 0,0095x + 0,0163$$

$$0,448 = 0,0095x + 0,0163$$

$$0,0095x = 0,448 - 0,0163$$

$$x = \frac{0,4317}{0,0095} = 45,44 \text{ ppm}$$

Kadar flavanoid total (%) :

$$= \frac{45,44 \text{ mg /L} \times 0,05 \text{ L}}{0,05 \text{ g}}$$

$$= \frac{2,27 \text{ mg}}{0,05 \text{ g}}$$

$$= 45,4 \text{ mg/g}$$

$$= 0,0454 \text{ g/g}$$

$$= 4,54 \%$$

b. Perhitungan Kadar Total Fenolik

Kadar ekivalen fenolik :

$$y = 0,0014x + 0,0546$$

$$0,553 = 0,0014x + 0,0546$$

$$0,0014x = 0,553 - 0,0546$$

$$x = \frac{0,4984}{0,0014} = 356 \text{ ppm}$$

Kadar fenolik total (%) :

$$= \frac{356 \text{ mg /L} \times 0,05 \text{ L}}{0,05 \text{ g}}$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{17,38 \text{ mg}}{0,05 \text{ g}} \\
 &= 356 \text{ mg/g} \\
 &= 0,356 \text{ g/g} \\
 &= 35,6 \%
 \end{aligned}$$

c. Perhitungan Kadar Total Karotenoid

Kadar ekivalen karotenoid :

$$y = 0,0115x + 0,2585$$

$$0,49 = 0,0115x + 0,2585$$

$$0,0115x = 0,49 - 0,2585$$

$$x = \frac{0,2315}{0,0115} = 20,13 \text{ ppm}$$

Kadar karotenoid total (%) :


$$= \frac{20,13 \text{ mg/L} \times 0,05 \text{ L}}{0,0125 \text{ g}}$$

$$= \frac{1 \text{ mg}}{0,0125 \text{ g}}$$

$$= 80 \text{ mg/g}$$

$$= 0,08 \text{ g/g}$$

$$= 8 \%$$



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



HARDIYANTI dilahirkan di Ujung Pandang 25 Juli 1993 merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Djamaluddin dan Hasnah Pendidikan formal yang telah dilalui yaitu menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di SDN. III sungguminasa pada tahun 2005. Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah menengah pertama di SMPN. 1 Sungguminasa pada tahun 2005-2008. Kemudian menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Pratidina Makassar 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Strata I di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di jurusan Farmasi Fakultas Ilmu kesehatan. Pengalaman Organisasi penulis yaitu aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2012-2013.

