

**UJI AKTIVITAS EKSTRAK DAUN PUTRI MALU (*Mimosa pudica* L.)
SEBAGAI PENYEMBUH LUKA SAYAT PADA KELINCI JANTAN
(*Oryctolagus cuniculus*)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SITI NURMILA PUTRI
NIM. 70100119073

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurmila Putri

Nim : 70100119073

Tempat/Tgl Lahir : Sorobaya, 22 September 2001

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Sorobaya

Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Daun Putri malu (*Mimosa pudica* L)
Sebagai Penyembuh Luka Sayat Pada Kelinci
(*Oryctolagus cuniculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa ini skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Desember 2023
Penulis,

SITI NURMILA PUTRI
NIM. 70100119073

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Uji Aktivitas Ekstrak Daun Putri malu (*Mimosa pudica* L.) Sebagai Penyembuh Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)" yang disusun oleh Siti Nurmila Putri Nim: 70100119073, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Desember 2023 yang bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1445 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 28 Desember 2023
15 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm., Klin.	(.....)
Penguji II	: Dr. Muhammad Shuhufi, S.Ag, M.Ag.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alauddin Makassar



Dewi Setiawati, Sp.Og., M.Kes
NIP: 19810621 100604 2 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terlaksana.

Skripsi yang disusun dengan judul Uji Aktivitas Ekstrak Daun Putri malu (*Mimosa pudica* L) Sebagai Penyembuh Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)" ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berkat kesabaran dan kemauan yang keras dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun material. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Teristimewa yang sangat saya cintai, untuk kedua insan yang paling berjasa di hidup saya yaitu kedua orang tua saya. Bapak saya Dirwan Pato dan Ibu saya Kurniati, terimakasih telah memupukku tumbuh tertata dengan cara yang biasa dan dengan cinta yang luar biasa, terimakasih selalu mempercayai segala proses yang kujalani selama hidup saya. Terimakasih karena telah senantiasa bersenandika dalam sujud dan do'a-do'a panjang yang dilangitkan serta selalu mengingatkan hal-hal kebaikan dan berusaha menjadikan saya anak yang peduli dan anak rendah hati, terimakasih telah mengasihi tanpa batas, sehingga saya sampai hari ini masih bertahan dan mampu berjuang dalam menapaki perjalanan kerasnya dunia dan saya juga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. Andi Aderus, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Muhammad Khalifa Mustami, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof. Muhammad Amry, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og.,M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Ibu Dr. Patimah S.Kep.,Ns, M.Kes., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Bapak Apt. Muh Rusdi S.Si., M.Si, selaku ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Apt. Khaerani, S. Farm., M.Farm., Klin., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Sekaligus penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

12. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Dr. Muhammad Shuhufi, S.Ag., M.Ag., selaku penguji agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Samata, Desember 2023

Penulis



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Uraian Tanaman Putri Malu	10
B. Uraian Kulit	13
C. Uraian Luka	17
D. Uraian Hewan Coba.....	26
E. Simplisia	29
F. Uraian Tentang Ekstraksi	32
G. Metode Maserasi.....	33
H. Uraian Tentang Pelarut.....	35
I. Tinjauan Tentang Pengobatan Islam.	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
D. Sampel	42
E. Instrumen Penelitian	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58
KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perlakuan Luka Sayat Setiap Kelompok Kelinci.....	45
Tabel 2. Hasil Rendeman dari Proses Ekstraksi.....	46
Tabel 3. Hasil Uji Skrining Fitokimia.....	47
Tabel 4. Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat (cm).....	47
Tabel 5. Rata-Rata Waktu (hari) Efek Penyembuhan Luka Sayat.....	48
Tabel 6. Hasil Ouput SPSS.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tumbuhan Putri Malu (<i>Mimosa pudica</i> L)	10
Gambar 2. Histologi Kulit.....	16
Gambar 3. Contoh Luka Sayat	23
Gambar 4. Aktivitas Bioseluler dan Biokimia Tubuh Terhadap Respon Luka ...	24
Gambar 5. Kelinci	27
Gambar 6. Sebuk Simplisia.....	67
Gambar 7. Ekstrak Kental Daun Putri Malu	68
Gambar 8. Hasil Uji Identifikasi Kimia	69
Gambar 9. Foto Sediaan Larutan Ekstrak Daun Putri Malu	70
Gambar 10 Foto Saat Kelinci Disayat.....	70
Gambar 11. Foto Pengukuran Panjang Luka Sayat	70
Gambar 12. Hari Pertama Luka Sayat Pada Kelinci	71
Gambar 13. Luka Dibalut Kain Kasa	71
Gambar 14. Luka Membentuk Keropeng.....	71
Gambar 15. Luka Menutup Sempurna.....	71
Gambar 16. Luka hari ke 8 tanpa perlakuan	71
Gambar 15. Luka hari ke 8 diberi ekstrak	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Etik Hewan	64
Lampiran 2. Peta Pengambilan Sampel	65
Lampiran 3. Skema Kerja	66
Lampiran 4. Perhitungan Rendeman Ekstrak.....	69
Lampiran 5. Gambar Serbuk Simplisia.....	70
Lampiran 6. Gambar Hasil Maserasi	71
Lampiran 7. Hasil Identifikasi Uji Kandungan Senyawa.....	72
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....	73
Lampiran 9. Hasil Output Data SPSS	75



ABSTRAK

Nama : Siti Nurmila Putri

NIM : 7010019073

Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Daun Putri malu (*Mimosa pudica* L) Sebagai Penyembuh Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)

Daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) merupakan salah satu jenis tanaman obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka sayat, karena mengandung senyawa seperti flavonoid, tanin, dan saponin. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak aktivitas ekstrak metanol dari daun putri malu terhadap penyembuhan luka sayatan serta untuk menentukan konsentrasi ekstrak metanol daun putri malu yang memberikan hasil penyembuhan yang optimal. Variasi konsentrasi yang diuji dalam penelitian ini yaitu 5%, 10%, dan 15%. Metode penelitian mencakup ekstraksi sampel dan pembuatan luka pada tiga konsentrasi tersebut. Selain itu, penelitian juga menggunakan kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan dan kelompok kontrol positif yang diberi perlakuan betadin. Hasil analisis statistik menggunakan uji Anova satu arah, diikuti dengan uji lanjutan Duncan, menunjukkan bahwa ekstrak daun putri malu memiliki aktivitas penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Konsentrasi ekstrak metanol daun putri malu yang memberikan aktivitas penyembuhan luka sayat optimum pada kelinci adalah 15%.

Kata Kunci: Luka Sayat, Ekstark Daun Putri Malu



ABSTRACT

Name : Siti Nurmila Putri

NIM : 7010019073

Title : *Activity Test of Putri malu (Mimosa pudica L) Leaf Extract As Healer of Cuts in Rabbits (Oryctolagus cuniculus)*

The shame princess leaf (Mimosa pudica L.) is one type of medicinal plant that can be used to heal incisions, as it contains compounds such as flavonoids, tannins, and saponins. This study aims to evaluate the impact of methanol extract from shame princess leaves on the healing of incisions and to determine the concentration of shame princess leaf methanol extract that provides optimal healing results. The concentrations tested in this study include 5%, 10%, and 15%. The research methods include sample extraction and creating wounds at these three concentrations. In addition, the study also involves a negative control group without treatment and a positive control group treated with betadine. The results of statistical analysis using a one-way Anova test, followed by the Duncan post hoc test, indicate that the shame princess leaf extract has healing activity on incisions in rabbits (Oryctolagus cuniculus). The concentration of shame princess leaf methanol extract that provides optimum healing activity on rabbit incisions is 15%.

Keywords: *Cut Wounds, Putri Malu Leaf Extract*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbuhan obat adalah semua jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai ramuan obat baik secara tunggal maupun campuran yang dianggap dan dipercaya dapat menyembuhkan suatu penyakit atau dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan. Alam telah menjadi sumber dari agen obat selama ribuan tahun. Berbagai tumbuhan obat telah digunakan selama bertahun-tahun dalam kehidupan sehari-hari untuk mengobati penyakit di seluruh dunia. Obat herbal merupakan tumbuhan yang mengandung zat alami yang dapat meningkatkan kesehatan dan mengurangi penyakit (Lengkong et al., 2021).

Banyak tumbuhan di sekitar kita belum dimanfaatkan dengan baik bahkan ada tumbuhan yang dianggap tidak bermanfaat. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan informasi kepada masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengembangan penelitian ilmiah terhadap tumbuhan obat tradisional, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesehatan masyarakat (Lengkong et al., 2021).

Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah putri malu (*Mimosa pudica* L.). Secara tradisional putri malu digunakan dalam pengobatan sakit kepala, migrain, insomnia, diare, disentri, dan demam. Masyarakat Bantaran Kali Surabaya telah memanfaatkan ramuan akar putri malu sebagai obat rematik dengan cara mengompres bagian sendi yang sakit juga digunakan oleh penderita penyakit jantung. Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau yang telah menggunakan ramuan tumbuhan putri malu untuk pemakaian luar dengan cara tumbuhan segar digiling sampai halus lalu

dibubuhkan pada bagian tubuh yang sakit, seperti luka, memar, dan radang kulit bernanah (pioderma) (Lengkong et al., 2021).

Daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) mengandung senyawa mimosin, asam pipokolinat, tannin, alkaloid, dan saponin. Selain itu, juga mengandung triterpenoid, sterol, polifenol dan flavonoid (Nafilah & Azrul Zuniarto, 2022). Daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup/layu dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah suku polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula (Wulan, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu dilaporkan bahwa ekstrak daun putri malu mempunyai khasiat sebagai transquilizer, ekspektoran, diuretik, antitusif, antipiretik, dan antiinflamasi. Tumbuhan putri malu mempunyai potensi untuk pengobatan antiradang karena adanya kandungan flavonoid. Flavonoid adalah golongan senyawa yang diketahui mempunyai berbagai khasiat, seperti antiradang, memperlancar pengeluaran air seni, antivirus, antijamur, antibakteri, antihipertensi, mampu menjaga dan meningkatkan kerja pembuluh darah kapiler (Lengkong et al., 2021).

Kulit merupakan perlindungan pertama pada tubuh. Fungsi kulit yaitu melindungi tubuh dari gangguan cuaca, mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus dan zat-zat kimia. Kulit mempunyai fungsi yang begitu penting sehingga sering kali kulit mudah terkena luka. Luka merupakan pemisahan jaringan kulit, selaput lendir, atau permukaan suatu organ secara *traumatic*. Bentuk dari luka berbeda-beda tergantung penyebabnya, ada luka yang terbuka dan tertutup. Salah

satu contoh luka terbuka adalah insisi/luka sayat dimana terdapat robekan linier pada kulit dan jaringan yang berada di bawahnya (Wardani, 2018).

Luka merupakan suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, sehingga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari. Terapi luka melalui pemberian topikal dengan ekstrak herbal menjadi salah satu pilihan terapi yang dianggap ekonomis dan efektif. Terapi topikal dinilai efektif dalam mengatasi komplikasi luka karena mudah diserap oleh kulit dan dapat mempertahankan kelembaban kulit lebih lama (Hertian et al., 2021).

Derajat kedalaman dan luas luka sayatan pada stadium I: luka superfisial (*non-blanching erythema*) merupakan luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit. Ukuran epidermis pada kulit manusia sekitar 75-150 μm pada kulit tipis dan 400-1400 μm pada kulit tebal. Stadium II: luka (*partial thickness*) yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis, merupakan luka superfisial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal. Ukuran dermis pada kulit manusia paling tebal adalah 4 mm. Stadium III: luka (*full thickness*) yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya. Ukuran epidermis dan dermis pada kulit manusia adalah bervariasi, misalnya pada kulit punggung sekitar 4 mm dan pada kulit kepala sekitar 1,5 mm. dan Stadium IV : luka (*full thickness*) yaitu yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas (Hutabarat, 2022).

Proses penyembuhan luka secara umum merupakan suatu mekanisme seluler yang kompleks dan berfokus pada pengembalian kontinuitas jaringan yang rusak. Terdapat empat tahap penting yang terjadi secara terus-menerus seperti hemostatis, inflamasi proliferasi, dan diferensiasi atau *remodeling*. Hemostasis terjadi segera pada awal terjadinya cedera yang bertujuan untuk menghentikan perdarahan dengan adanya agregasi platelet dan vasokonstriksi yang dimediasi trombosit. Pada tahap inflamasi, sel-sel disekitar jaringan yang cedera akan mengaktifasi pelepasan sitokin yang menginduksi fagositosis dan memulai perbaikan jaringan yang luka. Tahap proliferasi dimulai dengan proses epitalisasi dan granulasi yang baru pada permukaan jaringan luka serta pembentukan vaskularisasi di sekitar jaringan yang berguna untuk memperbaiki cedera sebelumnya. Tahap terakhir yaitu diferensiasi atau *remodeling* bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kembali antara sintesis kolagen yang baru dan proses degradasi atau pergantian jaringan yang telah rusak (M. Fauziah & Soniya, 2020).

Penggunaan obat-obatan medis yang digunakan hingga jangka panjang akan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh sehingga diperlukan alternatif lain dengan menggunakan pengobatan tanaman herbal (Dewi & Wicaksono, 2020). Penggunaan obat-obatan untuk penyembuhan luka dapat dilakukan dengan berbagai macam dan jenis, salah satunya adalah obat tradisional. Penggunaan atau pengobatan secara tradisional semakin disukai karena pada umumnya kurang menimbulkan efek samping seperti halnya pada obat-obatan dari bahan kimia karena obat-obatan kimia sering kali mengandung bahan aktif yang dapat menyebabkan reaksi alergi atau efek samping yang lain dan tidak diinginkan, terutama jika tidak digunakan dengan benar (Lengkong et al., 2021).

Ekstrak metanol *Mimosa pudica* L. mempunyai aktivitas antiinflamasi yang sangat signifikan. Hasil penapisan simplisia dan ekstrak putri malu menunjukkan adanya golongan senyawa lain selain flavonoid diantaranya tanin, polifenol, monoterpenoid, seskuiterpenoid, steroid, saponin dan kuinon. Sebuah penelitian yang telah berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa yang terkandung dalam putri malu (*Mimosa pudica* L.), yaitu senyawa flavonoid dalam ekstrak metanol daun putri malu. Seperti diketahui bahwa flavonoid adalah golongan senyawa yang mempunyai berbagai khasiat, seperti antiradang, antidiuretik, antivirus, antijamur, antibakteri, antihipertensi, mampu menjaga dan meningkatkan kerja pembuluh darah kapiler (Lengkong et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Daun Putri Malu (*Mimosa pudica* L.) sebagai Penyembuh Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ekstrak metanol daun putri malu memiliki aktivitas terhadap penyembuhan luka sayatan pada kelinci jantan (*Oryctolagus cuniculus*)?
2. Berapakah konsentrasi ekstrak metanol putri malu (*Mimosa pudica* L.) terhadap aktivitas penyembuhan luka yang optimum pada kelinci jantan (*Oryctolagus cuniculus*)?

C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a) Daun putri malu (*Mimosa Pudica* L.) adalah tumbuhan yang mengandung senyawa flavonoid, tanin dan saponin. Daun putri malu diperoleh dengan bentuk simplisia kering.
- b) Dosis perlakuan yaitu berupa jumlah dosis dari ekstrak daun kitolod yang diberikan pada masing-masing perlakuan terhadap luka sayat yang ada di punggung kelinci dengan 3 konsentrasi ekstrak yang berbeda yaitu konsentrasi 5%,10%, dan 15%.
- c) Ekstrak adalah hasil dari ekstraksi yang berasal dari bahan alam atau sel dengan menggunakan cara yang sesuai dan ekstrak bisa berupa sediaan kering, kental ataupun cair. Ekstraksi diproses dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol dan hasil dari ekstraksi berupa ekstrak kental.
- d) Luka sayat adalah suatu kerusakan yang terjadi pada jaringan kulit akibat trauma benda tajam seperti pisau, silet , dan pedang. Ketika jaringan tubuh mengalami luka maka terdapat beberapa efek yang ditimbulkan seperti pendarahan dan pembekuan darah, hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ kontaminasi bakteri, serta kematian sel.
- e) Kelinci adalah hewan mamalia dari *famili Leporidae*, yang mudah ditemukan. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar dan salah satu hewan percobaan yang sering dipakai dalam suatu penelitian.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium farmasi, yaitu mengetahui adanya aktivitas dari ekstrak daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci jantan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Meilina et al., 2022). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 70% Kulit Pisang Ambon Kuning (*Musa Acuminata Colla*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Kelinci (*Oryctolagus Cuniculus*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak dan konsentrasi ekstrak yang memberikan efek penyembuhan luka sayat lebih cepat. Penelitian eksperimental laboratorium dengan 5 perlakuan yaitu P1 (konsentrasi 5%), P2 (konsentrasi 10%), P3 (konsentrasi 15%), K+, dan K-. Uji aktivitas dilakukan pengamatan kriteria makroskopis modifikasi Nagaoka dan persentase penyembuhan. Sampel positif terdapat senyawa flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, kuinon, dan terpenoid. Data skoring makroskopis di uji Kruskal-Wallis hasil yang didapatkan secara statistik tidak bermakna ($P = 0,567$) pada semua kelompok. Data pengukuran persentase penyembuhan luka sayat di uji Post-hoc LSD hasil yang didapatkan berbeda bermakna ($P < 0,05$) antara K+, P2, P3 terhadap K-, P3 terhadap P1 dan P2. P3 menunjukkan aktivitas penyembuhan luka sayat lebih cepat dibanding P1 dan P2.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lengkong dkk,2021) ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sari daun putri malu sebagai penyembuh luka bakar derajat 2 pada tikus putih. Daun putri malu yang telah dikumpulkan, dicuci, kemudian ditimbang dan diblender . Selanjutnya sari yang telah diperoleh diujikan pada luka bakar pada tikus putih dengan konsentrasi yang berbeda-beda, dimana untuk perlakuan 1 sebagai kontrol negatif (aquadestilata), perlakuan 2 sebagai perlakuan untuk konsentrasi 15%, perlakuan 3 sebagai perlakuan untuk konsentrasi 20% , dan perlakuan 4 sebagai perlakuan untuk konsentrasi 25% sari daun putri malu. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dari 3 konsentrasi sari daun putri malu yang digunakan, konsentrasi 25% lebih efektif dibandingkan dengan konsentrasi 15% dan 20%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hertian et al.,2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak daun ekor naga terhadap penyembuhan luka sayat (*Rapidhophora pinnata* L) pada mencit jantan. Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Terdiri dari kelompok perlakuan salep povidone iodine 10%, kelompok kontrol pembanding vaselin flavum, dan ekstrak daun ekor naga konsentrasi 5%, 10% dan 15% di ad kan dalam vaselin flavum 10g. Parameter pengamatan terhadap penyembuhan luka sayat pada penenlitian ini berupa lama waktu hilangnya kemerahan, pembengkakan dan krusta diukur setiap hari sampai luka sembuh sempurna dan pengukuran panjang luka selama 14 hari. Diukur menggunakan jangka sorong. Hasil yang didapatkan dianalisis menggunakan One Way ANOVA uji lanjut Duncan. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun ekor naga memiliki efektifitas terhadap penyembuhan luka pada konsentrasi 10%, 15% dan 5% dengan penurunan persentasi panjang luka 46,57% , 40.24% dan 32.87%.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan untuk penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas ekstrak metanol daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) terhadap penyembuhan luka sayatan.
2. Untuk mengetahui manakah konsentrasi ekstrak metanol daun putri malu (*Mimosa Pudica* L.) dengan aktivitas penyembuhan luka yang optimum.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi serta penjelasan tentang aktivitas luka sayatan dari ekstrak metanol daun putri malu (*Mimosa pudica* L.)



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Putri Malu (*Mimosa pudica* L.)

1. Klasifikasi

- Kingdom : *Plantae*
Divisi : *Magnoliophyta*
Kelas : *Magnoliopsida*
Ordo : *Fabales*
Familia : *Mimosaceae*
Sub family: *Mimosoideae*
Genus : *Mimosa*
Spesies : *Mimosa pudica*, L.



Gambar 1. Tumbuhan Putri Malu (Dokumentasi Pribadi).

2. Nama Daerah

Jabe-jabe (Bugis dan Makassar), daun kaget-kaget (Manado), rondo kagit (Sunda), todusan (Madura), kucingan (Jawa), sihirput, sikerput (Batak) dan rebah bangun (Minangkabau) (Wahyuni et al., 2017).

3. Morfologi

Berdasarkan hasil penelitian tumbuhan putri malu merupakan tumbuhan semak dengan tinggi 0,3-1 m, dengan arah tumbuh batang yang merayap. Akarnya akar tunggang, bentuk batang bulat dan berwarna hijau keunguan, berambut dan berduri tempel bengkok yang tersebar. Memiliki daun penumpu berbentuk lanset, panjang 1 cm. Daunnya saat disentuh melipatkan diri atau mempunyai sifat tidur atau pemalu maka dari itu masyarakat Makassar biasa menyebutnya dengan sebutan jabe-jabe. Daunnya merupakan daun majemuk menyirip rangkap/genap ganda dua yang sempurna atau biasa disebut dengan daun majemuk campuran (*digitatopinnatus*). Hasil pengamatan bahwa bentuk buah dalam satu tangkai membentuk seperti kipas dan pada saat buah tersebut telah masak atau tua maka biji-biji akan keluar dengan sendirinya hal tersebut dikarenakan pada kulit buah tersebut mudah rontok dan biji yang ada di dalamnya sangat ringan sehingga mudah tertiuip angin (Wahyuni et al., 2017).

4. Kandungan Kimia

Daun putri malu mengandung banyak senyawa kimia, diantaranya flavonoid, tanin dan saponin yang mempunyai aktivitas sebagai anti mikroba dan antiseptik yang dapat membantu dalam penyembuhan luka (Sari, 2019).

1. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman hijau, kecuali alga. Tanaman yang mengandung flavonoid sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Ini dikarenakan flavonoid memiliki beragam aktivitas, term asuk sebagai antifungi, diuretik, antihistamin, antihipertensi, insektisida, bakterisida, antivirus, dan memiliki kemampuan menghambat kerja enzim. (Risa, 2018).

Penelitian terbaru membuktikan bahwa flavonoid mempunyai efek antiinflamasi, antioksidan, kandungan flavonoid juga diyakini mempunyai manfaat dalam penyembuhan luka. Flavonoid dalam penyembuhan luka mempunyai mekanisme menghambat pendarahan dengan meningkatkan jumlah trombosit, ketika tubuh mengalami pendarahan maka trombosit akan pecah yang mengakibatkan enzim trombokinase, selanjutnya akan bekerja sebagai enzim untuk mengaktifkan fibrinogen membentuk monomer fibrin yang dibantu oleh ion Ca dan vitamin k yang terdapat pada plasma darah. (Risa, 2018).

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri dengan cara denaturasi protein yang menyebabkan gangguan dalam pembentukan sel, sehingga merubah komposisi komponen protein yang mengakibatkan fungsi membrane sel yang diikuti terjadinya kerusakan sel bakteri sehingga sel bakteri akan mati (Risa, 2018). Aktivitas farmakologi dari flavonoid adalah sebagai antiinflamasi, analgesi, antioksidan. Mekanisme antiinflamasi terjadi melalui efek penghambatan pada jalur metabolisme asam arakidonat, pembentukan prostaglandin, pelepasan histamine pada radang (Rahman, 2017).

2. Tanin

Tanin berfungsi sebagai adstringen yang dapat menyebabkan penciutan pori-pori kulit, memperkeras kulit, menghentikan eskudat dan pendarahan yang ringan, sehingga mampu menutupi luka dan mencegah pendarahan yang biasa timbul pada luka (Risa, 2018).

Mekanisme kerjanya adalah dengan cara menghambat enzim reserve transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak terbentuk, tanin memiliki aktivitas antibakteri dengan menginaktifkan adhesi sel mikroba, meningkatkan enzim dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel.

Tanin juga menyebabkan pembentukan dinding sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik dan sel bakteri akan mati (Risa, 2018).

3. Saponin

Saponin adalah suatu senyawa yang memiliki bobot molekul tinggi atau besar, tersebar dalam beberapa tumbuhan, merupakan bentuk glikosida dengan molekul gula yang terikat dengan aglikol triterpen atau steroid (Risa, 2018).

Saponin yang bekerja sebagai antibakteri mempunyai mekanisme kerja yaitu menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam sel, karena tumbuhan zat aktifnya mirip deterjen sehingga saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membrane, membrane sel yang rusak mengganggu kelangsungan hidup bakteri, sehingga bakteri akan mati (Hanani, 2016).

Adapun mekanisme kerja dari saponin adalah protein akan membentuk unsur utama dari jaringan ikat dan tulang, kemudian memberikan kekuatan kulit sehingga dapat membantu proses penyembuhan luka (Risa, 2018).

5. Manfaat

Ekstrak herba daun putri malu mempunyai khasiat sebagai ekspektoran, diuretik, antitusif, antipiretik, dan antiinflamasi. Manfaat lain dari tanaman ini digunakan dalam dunia pengobatan untuk terapi antidiabetes, antitoksin, antihepatotoksin, antioksidan, dan penyembuh luka (Jayani, 2007).

B. Uraian Kulit

Kulit merupakan suatu jaringan yang melapisi seluruh permukaan luar tubuh. Struktur kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Kedua lapisan ini bersatu membentuk membran yang kuat, melekat erat di atas lapisan

jaringan ikat longgar, yaitu lapisan subkutaneum yang kaya akan lemak dan menghubungkan kulit dengan struktur yang lebih dalam (Perdanakusuma, 2007).

1. Epidermis

Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang tipis dan avaskuler. Terdiri dari epitel berlapis gepeng, bertanduk, mengandung sel melanosit, keratinosit dan sel Langerhans. Fungsi utamanya adalah sebagai proteksi barrier, organisasi sel, sintesis vitamin D dan sitokin, pembelahan dan mobilisasi sel, pigmentasi (melanosit) dan pengenalan allergen (sel Langerhans). Epidermis mempunyai *melanocytes* yang membuat melanin dan memberikan warna pada kulit. Fungsi pada lapisan epidermis adalah melindungi dari masuknya bakteri, toksin, untuk keseimbangan cairan yaitu menghindari pengeluaran cairan secara berlebihan. Epidermis dapat berperan dalam mekanisme penyembuhan karena epidermis pada lapisan luar membentuk selaput yang terdiri atas sel-sel mati, lapisan tanduk atau stratum korneum, yang berisi protein keratin dan campuran kompleks lipid (Perdanakusuma, 2007).

Epidermis yang lebih tebal dapat ditemui pada telapak tangan dan kaki, mengalami pembagian menjadi 5 lapisan yaitu:

- a. Stratum basalis adalah lapisan tunggal sel-sel yang melekat pada jaringan ikat dari lapisan kulit dibawah dermis. Pembelahan yang cepat berlangsung pada lapisan ini, dan sel yang baru didorong masuk ke lapisan berikutnya.
- b. Stratum spinosum adalah lapisan sel spina atau tanduk, disebut demikian karena sel-sel tersebut disatukan oleh tonjolan yang berupa spina. Spina adalah penghubung intraseluler yang disebut desmosome.
- c. Stratum granulosum terdiri dari tiga atau lima lapisan atau barisan sel dengan granula-granula keratohialin yang merupakan *precursor* pembentukan keratin.


- 1) Keratin adalah protein keras dan resilien, anti air serta melindungi permukaan kulit yang terbuka.
 - 2) Keratin pada lapisan epidermis merupakan keratin lunak yang berkadar sulfur rendah, berlawanan dengan keratin yang ada pada kuku dan rambut.
 - 3) Saat keratohialin dan keratin berakumulasi, maka nucleus sel berdisintegrasi, menyebabkan kematian sel.
- d. Stratum lusidum adalah lapisan jernih dan tembus cahaya dari sel-sel gepeng tidak bernukleus yang mati atau hampir mati dengan ketebalan empat sampai tujuh lapisan sel.
 - e. Stratum korneum adalah lapisan epidermis teratas, terdiri dari 25 sampai 30 lapisan sisik tidak hidup yang sangat terkeratinisasi dan semakin gepeng saat mendekati permukaan kulit.
- 1) Permukaan terbuka dari stratum korneum mengalami proses pergantian ulang yang konstan.
 - 2) Ada pembaharuan yang konstan pada sel yang terdeskuamasi melalui pembelahan sel di lapisan basalis. Sel tersebut bergerak ke atas, ke arah permukaan, mengalami keratinisasi, dan kemudian mati. Dengan demikian, seluruh permukaan tubuh terbuka ditutup oleh lembaran sel epidermis mati.
 - 3) Keseluruhan lapisan epidermis akan diganti dari dasar ke atas setiap 15 sampai 30 hari

2. Dermis

Dermis atau korium adalah lapisan tebal jaringan ikat tempat melekatnya epidermis dan lapisan terdalamnya melanjutkan diri ke jaringan subkutan yang berisi lemak tanpa suatu batas yang jelas. Dermis terletak di bawah epidermis dan dibatasi oleh lamina basalis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Lapisan dermis lebih tebal dari pada lapisan epidermis. Fungsi

utamanya sebagai penyokong epidermis. Lapisan dermis strukturnya lebih kompleks dan terdapat dua lapisan bagian *superficial papillary* dan bagian dalam *reticular dermis*. Regenerasi merupakan proses penyembuhan dari sel parenkim terjadi dengan mengganti sel yang rusak dengan sel yang baru dan sama sehingga fungsi tubuh atau jaringan akan pulih kembali dengan sempurna.

Sedangkan regenerasi secara fisiologi disebut juga dengan sel labil karena pada proses ini sel yang pada saat tertentu mengalami nekrosis tetapi akan mengalami pembaharuan yang terjadi secara periodik dan sel akan terganti dengan sel yang sama. (Perdanakusuma, 2007).



Gambar 2. Histologi kulit (Perdanakusuma, 2007)

Fungsi proteksi kulit adalah melindungi dari kehilangan cairan dari elektrolit, trauma mekanik, ultraviolet dan sebagai barrier dari invasi mikroorganisme pathogen. Kulit berperan pada pengaturan suhu keseimbangan cairan elektrolit. Termoregulasi dikontrol oleh *hypothalamus*. Temperatur perifer mengalami proses keseimbangan melalui keringat, paru-paru dan mukosa bukal. Temperature kulit dikontrol dengan dilatasi atau kontriksi pembuluh darah kulit. Bila temperature meningkat terjadi vasodilatasi pembuluh darah, kemudian tubuh akan mengurangi temperature dengan melepas panas dari kulit dengan cara mengirim sinyal kimia yang dapat meningkatkan aliran darah di kulit. Pada temperature yang menurun,

pembuluh darah kulit akan vasokonstriksi yang kemudian akan memertahankan panas (Perdanakusuma, 2007).

3. Subkutan

Subkutan adalah lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Pada lapisan ini, terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit dengan jaringan di bawahnya secara longgar. Jumlah ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah tubuh dan keadaan nutrisi individu. Fungsi subkutan atau hypodermis yaitu isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh dan *mechanical shock absorber*. Lapisan subkutan terdiri dari jaringan ikat longgar yang mengikat kulit secara longgar pada organ organ dibawahnya, yang memungkinkan kulit bergeser diatasnya. Lapisan subkutan mengandung sel-sel lemak yang jumlahnya bervariasi (Perdanakusuma, 2007).

C. Uraian Luka

Luka adalah hilangnya atau rusaknya jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma tajam atau tumpul, perubahan suhu, paparan zat kimia, ledakan, sengatan listrik, maupun gigitan hewan. Luka dapat menyebabkan kerusakan fungsi perlindungan kulit akibat hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa kerusakan jaringan lain, seperti, otot, tulang dan saraf. Luka dibagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Luka tertutup merupakan luka tanpa robekan pada kulit. Luka ini terjadi karena adanya bagian tubuh yang terpukul benda tumpul, terpelintir, keseleo, daya deselerasi kearah tubuh seperti fraktur tulang, robekan pada organ dalam.
- 2) Luka terbuka merupakan luka yang melibatkan robekan pada kulit atau membrane mukosa. Luka ini dapat disebabkan oleh benda tajam atau tumpul

(insisi, bedah, fungsi vena, luka tembak). Robekan kulit memudahkan masuknya mikroorganisme, kehilangan darah dan cairan tubuh melalui luka.

Luka dibagi menjadi 2 berdasarkan lama waktu penyembuhannya, yaitu:

- 1) Luka akut merupakan luka yang mengalami proses perbaikan integritas dan anatomi secara terus menerus sesuai dengan tahap dan waktu yang normal. Luka ini dapat diakibatkan oleh trauma akibat benda tajam. Luka biasanya mudah dibersihkan dan diperbaiki. Bagian pada tepi luka bersih dan utuh.
- 2) Luka kronik atau luka yang gagal melewati proses untuk mengembalikan fungsi integritas dan anatomi sesuai dengan dan waktu yang normal. Penyebabnya dapat diakibatkan oleh ulkus, luka akibat gesekan, sekresi, tekanan. Terpaparnya tubuh terdapat tekanan, gesekan dan sekresi yang terus menerus akan mengganggu penyembuhan luka. Tepi luka dapat mengalami nekrotik dan mengeluarkan drainase.

Luka memiliki berbagai jenis, dan salah satunya adalah luka sayat. Luka sayat (*vulnus scissum*) adalah jenis luka yang memiliki bentuk garis lurus dan teratur, ditandai dengan tepi luka yang terdefinisi. Biasanya, luka sayat terjadi akibat trauma atau kontak langsung dengan benda tajam yang mengenai tubuh. Kejadian luka sayat seringkali terkait dengan aktivitas sehari-hari manusia, dan kurangnya kehati-hatian terhadap benda-benda tajam di sekitarnya menjadi salah satu faktor penyebabnya. (Nonci, 2017).

Luka dapat diklasifikasikan kedalam tiga cara yaitu sesuai dengan mekanisme cedera, tingkat kontaminasi luka, kedalaman dan luasnya luka.

- 1) Berdasarkan mekanisme cedera
 - a. Luka sayat dibuat dengan potongan bersih menggunakan instrumen tajam.

- b. Luka kontusi dibuat dengan dorongan tumpul dan ditandai dengan cedera berat bagian yang lunak, hemoragi dan pembengkakan.
 - c. Luka laserasi adalah luka dengan tepi bergerigi dan tidak teratur seperti goresan kaca.
 - d. Luka tusuk disebabkan oleh bukan benda kecil pada kulit sebagai contoh luka oleh peluru atau tusukan pisau.
- 2) Berdasarkan tingkat kontaminasi
- a. Luka bersih yaitu luka bedah tidak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan (inflamasi) dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, genital dan urinari tidak terjadi.
 - b. Luka bersih terkontaminasi merupakan luka pembedah di mana seluruh saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemihan dalam kondisi terkontrol, kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi luka adalah 3%-11%.
 - c. Luka terkontaminasi termasuk dalam luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik kontaminasi dari saluran cerna, pada kategori ini juga termasuk insisi akut, inflamasi nonpurulen. Kemungkinan infeksi luka 10%-17%.
- 3) Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka
- a. Stadium I : Luka Superfisial "*Non-Blanching Erythema*" : yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit.
 - b. Stadium II : Luka "*Partial Thickness*" : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.
 - c. Stadium III : Luka "*Full Thickness*" : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai

bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya.

- d. Stadium IV : Luka “*Full Thickness*” yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas.

Pengobatan luka menjadi hal yang cukup penting. Seseorang yang terkena luka akan terhambat dalam aktivitasnya karena terganggunya fungsi kulit dan jaringan. Kita ketahui bahwa kulit merupakan organ terbesar dari tubuh, luas permukaan kulit adalah sekitar 15 % dari total berat badan orang dewasa. Kulit juga memiliki berbagai fungsi vital, termasuk perlindungan terhadap lingkungan eksternal baik lingkungan fisik, kimia, dan biologis. Kulit juga mencegah kehilangan air yang berlebihan dari tubuh serta berperan dalam termoregulasi. Ketika kulit kehilangan kontinuitasnya, maka fungsi-fungsi tersebut tidak dapat berjalan normal sebagaimana seharusnya. Pengobatan luka yang tidak tepat dapat menghambat proses penyembuhan luka, ataupun menyebabkan area luka menjadi terinfeksi dan pada akhirnya menimbulkan luka kronik (Nonci, 2017).

Secara singkat, proses penyembuhan luka dibagi menjadi 3 fase, yaitu:

- 1) Fase inflamasi

Fase ini berlangsung saat terjadi luka sampai hari ke-5. Pada fase ini terjadi pendarahan, kemudian pembekuan/pengehentian pendarahan akibat kontraksi otot polos dinding pembuluh darah oleh thrombin dan fibrin. Ikut keluarnya bahan pertahanan tubuh berupa sel-sel leukosit dan antibodi. Disini terjadi vasodilatasi pembuluh darah, edema.

2) Fase poliferasi


Fase ini berlangsung dari hari ke-6 sampai hari akhir minggu ke 3. Terjadi poliferasi sel-sel fibroblast yang berasal dari sel-sel mesensim yang belum berdiferensiasi. Terjadi pembentukan jaringan granulasi yang terdiri dari sel-sel fibroblast, serta kolagen yang dihasilkan oleh fibroblast, deposit sel-sel-sel radang, kapiler baru, hasil angiogenesis. Terjadi penciutan luka akibat kontraksi serat-serat kolagen yang mempertautkan tepi luka. Terjadi epitelisasi akibat proses migrasi dan proses mitosis sel-sel stratum basal dan keratinosit lain yang terpapar luka (sel-sel kelenjar sebaceous, kelenjar keringat, dan akar rambut) ke tengah luka. Semua proses ini akan berhenti bila seluruh permukaan luka sudah tertutup epitel. Orang awam mengatakan luka telah sembuh/telah kering. Sebaliknya, proses akan berjalan terus bila permukaan luka belum tertutup epitel.

3) Fase maturasi

Disaat semua bentukan-bentukan baru akibat proses penyembuhan akan mengkerut menjadi matur. Hal ini berlangsung selama 2 bulan atau lebih bahkan bisa sampai 1 tahun. Tanda-tanda yang menunjukkan fase ini sudah berakhir, semua tanda radang hilang, pucat, tak ada rasa sakit/gatal, lemas tak ada indurasi, pembengkakan sudah hilang. Luka sayat merupakan luka yang terjadi karena teriris oleh suatu instrumen yang tajam. Adapun ciri-ciri luka sayat diantaranya luka terbuka, nyeri, panjang luka lebih besar daripada dalamnya luka. Pentingnya penanganan luka secara optimal telah mendorong pesatnya perkembangan ilmu tentang luka, penyembuhan, dan penanganan luka. Saat ini penggunaan bahan herbal untuk penggantian obat-obat kimia telah banyak dilakukan (Wardani, 2018).

Luka sayat adalah luka akibat sayatan yang mengenai kulit karena benda tajam seperti logam, kayu dll. Dalam mengobati luka, *antibiotic*. Selain itu,

penggunaan antiseptik seperti povidone iodine (betadin) mampu menghambat fibrolas sehingga sintesis kolgane yang berperan penting dalam penyembuhan luka menjadi berkurang (Meilina et al., 2022).




Gambar 3. Contoh Luka sayat kelinci (*Oryctolagus Cuniculus*) a. fase inflamasi, b. fase proliferasi, dan c. fase maturasi

Parameter penyembuhan luka sayat yang diamati pada penelitian ini adalah berkurangnya panjang luka, hilangnya eritema atau kemerahan pada area luka, hilangnya edema atau pembengkakan, hilangnya granulasi dan luka yang sudah menutup. Parameter pertama ialah panjang luka, di mana akan diamati lama waktu berkurangnya panjang luka sampai luka tersebut sembuh. Pada saat berkurangnya ukuran panjang luka terjadi suatu proses kontraksi. Kontraksi ialah suatu tahap penyempitan ukuran luka kearah tengah untuk mengurangi ukuran luka. Parameter kedua ialah eritema atau kemerahan pada area luka. Eritema termasuk ke dalam fase inflamasi dimana akan muncul pada saat terbentuknya luka sampai hari kelima. Jaringan tubuh yang mengalami akan melepaskan histamine dan sel mast yang menyebabkan vasodilatasi, di mana vasodilatasi ini

mengakibatkan peningkatan aliran darah dan penyumbatan lokal sehingga menyebabkan timbulnya warna kemerahan pada luka (Arisanty, 2013).

Parameter ketiga ialah edema atau pembengkakan pada area luka. Edema atau pembengkakan pada area luka sayat akan berlangsung pada hari ke 3 sampai hari ke 14 setelah terbentuknya luka sayat. vasodilatasi arteriol pada fase inflamasi akan menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga terjadinya peningkatan eksudat tinggi protein yang menimbulkan edema atau pembengkakan di daerah perlukaan. Parameter keempat yang diamati pada penelitian ini ialah granulasi. Munculnya granulasi merupakan salah satu tanda kemajuan penyembuhan luka yang terlihat pada fase proliferasi. Pada fase proliferasi terjadi mekanisme angiogenesis, deposisi jaringan kolagen, migrasi sel epitel, dan pembentukan jaringan granulasi. Fase proliferasi akan berlangsung pendek apabila tidak ada kontaminasi atau infeksi bakteri yang bermakna (Arisanty, 2013).

Parameter yang terakhir ialah luka yang sudah menutup. Luka yang sudah menutup termasuk kedalam fase maturasi atau remodelling. Fase maturasi berlangsung pada hari ke 10 setelah terbentuknya luka dimana permukaan luka telah tertutup sempurna dan hanya menyisakan bekas luka. Aktivitas yang terjadi pada fase ini adalah sintesis matriks ekstraseluler, degradasi sel dan proses remodeling (aktivitas seluler dan aktivitas vaskuler menurun). Penguatan jaringan pada bekas luka dilakukan dengan cara remodeling kolagen dan elastin sehingga menyebabkan tekanan ke atas permukaan kulit yang mengalami luka, serta akan diikuti rasa gatal dan munculnya penonjolan epitel (keloid) (Arisanty, 2013).



Gambar 4. Aktivitas Bioseluler dan Biokimia Tubuh Terhadap Respon Luka (Arisanty, 2013)

Faktor penyembuhan luka menurut (Arisanty, 2013) pada umumnya luka dapat sembuh dengan sendirinya. Luka mengalami kegagalan penyembuhan jika faktor yang menghambat sehingga luka yang awalnya biasa jadi luar biasa sulit untuk sembuh. Faktor yang berperan dalam mendukung penyembuhan luka, yaitu faktor lokal dan umum.

1) Faktor lokal

a. Hidrasi luka

Kondisi kelembaban pada luka yang seimbang yang sangat mendukung penyembuhan luka. Luka yang terlalu kering atau terlalu basah kurang mendukung penyembuhan luka. Luka yang terlalu kering menyebabkan luka membentuk fibrin yang mengeras, terbentuk *scab* (keropeng), atau nekrosis kering. Luka yang terlalu basah menyebabkan cenderung rusak dan merusak sekitar luka.

b. Penatalaksanaan luka

Penatalaksanaan luka yang tidak tepat menghambat penyembuhan luka. kebersihan luka dan sekitar luka harus diperhatikan, kumpulan lemak dan kotoran pada sekitar luka harus selalu dibersihkan. Pemilihan balutan harus disesuaikan dengan fungsi dan manfaat balutan terhadap luka.

c. Benda asing

Benda asing pada luka dapat menghambat proses granulasi dan epitelisasi, bahkan dapat menyebabkan terjadinya infeksi.

2) Faktor umum

a. Usia

Pada usia lanjut terjadi penurunan fungsi tubuh sehingga dapat memperlambat waktu penyembuhan luka. Jumlah dan ukuran fibroblas menurun, begitu pula kemampuan proliferasi sehingga terjadi penurunan terhadap *growth factor* dan hormone- hormone yang dihasilkan selama penyembuhan luka, jumlah dan ukuran sel mast juga menurun, kondisi luka yang keriput dan tipis sangat mudah mengalami luka karena gesekan dan tekanan.

b. Nutrisi

Asupan makanan sangat mempengaruhi penyembuhan luka. nutrisi yang buruk akan menghambat proses penyembuhan luka bahkan menyebabkan infeksi luka. nutrisi yang dibutuhkan dan penting adalah asam amino (protein), lemak, energi sel (karbohidrat), vitamin zink, zat besi dan mineral.

c. Gangguan sensasi dan pergerakan

Gangguan sensasi dapat memperburuk kondisi luka karena tidak ada rasa sakit atau terganggu terhadap luka tersebut, begitupula gangguan pergerakan dapat menghambat aliran dari darah ke perifer.

d. Terapi radiasi

Terapi radiasi hanya merusak sel kanker, tetapi juga merusak sel-sel disekitarnya. Komplikasi yang sering muncul adalah penurunan asupan nutrisi karena mual dan muntah dan kerusakan / efek lokal (kulit rentan, kemerahan dan panas) pada daerah sekitar luka.

D. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Kelinci

Kingdom	: <i>Animalia</i>
Phylum	: <i>Chordata</i>
Sub phylum	: <i>Vertebrata</i>
Kelas	: <i>Mammalia</i>
Ordo	: <i>Lagomorpha</i>
Family	: <i>Leporidae</i>
Genus	: <i>Oryctogalus</i>
Species	: <i>Oryctogalus cuniculus</i>



Gambar 5. Kelinci (*Oryctogalus cuniculus*) (Dokumentasi Pribadi)

2. Karakteristik

Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae, yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Bagian tubuh kelinci di selimuti dengan bulu yang halus tetapi lebat, memiliki warna yang bermacam-macam mulai dari warna hitam, abu-abu, kecoklatan, hitam putih, dan lain-lain. Bagian mata pada kelinci memiliki warna kemerahan, berbentuk bulat kelonjongan. Bagian hidung pada kelinci berbentuk

silindris, mempunyai gigi seri di bagian depan yang digunakan kelinci untuk memotong atau mengunyah rumput (Mu'nisa et al, 2022).

Secara makroskopis, lidah kelinci berbentuk pipih memanjang dengan puncak dan tepi bulat, panjangnya mencapai sekitar 5,3 cm, lebar 4,5 cm pada bagian bebas, 5 cm pada tonjolan lingual dan mencapai 4,8 cm pada akar lidah. Lidah terbagi menjadi tiga bagian; bagian anterior, tengah dan posterior (Mu'nisa et al, 2022).

Kelinci juga mampu melakukan *caecotrophy* atau *coprophage*, yaitu proses memakan kembali faeces di pagi atau malam hari. Umur hidup kelinci dapat mencapai lima sampai sepuluh tahun dengan umur produktif dua hingga tiga tahun dan memiliki kemampuan beranak sepuluh kali per tahun. Kelinci beraktivitas secara umum pada 25 tengah malam di kala hari mulai senja dan dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan luar (Mu'nisa et al, 2022).

Kelinci yang digunakan pada penelitian ini adalah kelinci lokal (*Oryctogalus cuniculus*), *all variant* sebanyak 15 ekor kelinci jantan sehat dewasa yang berumur 4-5 bulan. Hewan yang digunakan berasal dari Kasih Karunia Rabbitry, jl. Lamputang. Jenis kelamin dipilih kelinci jantan karena kelinci jantan mempunyai biologis yang lebih stabil daripada kelinci betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi oleh masa siklus, masa kehamilan dan masa menyusui. Berat hewan yang ditentukan sekitar 1,2-1,5 kg guna mengurangi variabilitas efek pengaruh perbedaan berat badan (Mu'nisa et al, 2022). Berat hewan kelinci ditentukan sekitar 1,2-1,5 kg. Adapun berat kelinci yang digunakan dalam penelitian ini adalah seberat 1,5 kg.

3. Teknik Pemeliharaan

Faktor-faktor yang memengaruhi pemeliharaan kelinci diuraikan sebagai berikut :

a. Kandang

Kandang yang digunakan kelinci biasanya dibuat dalam bentuk panggung dengan ketinggian kandang 75 cm dari tanah. Rangka kandang terbuat dari kayu ukuran 4 cm x 6 cm, kayu 3 cm x 5 cm dan kayu reng. Sisi samping kandang ditutup dengan anyaman kawat dan bagian bawah kandang terbuat dari anyaman kawat dengan diameter 1cm agar kotoran dan air kencing ternak dapat terbang dengan mudah. Setiap petak kandang berukuran panjang 70 cm, lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. Tempat pakan dan air minum yang diletakkan di dalam bilik kandang dan digantung pada pinggir kandang. Suhu udara dalam kandang selama penelitian cukup ideal untuk pemeliharaan ternak kelinci yaitu berkisar antara 25-26oC. Kelinci dapat hidup dan berkembang baik pada suhu ideal 15-20oC dan kelembaban ideal 60- 90%. Kelembaban udara dalam kandang selama penelitian termasuk ideal yaitu 80-82%. Kelembaban ideal untuk ternak kelinci adalah 60-90% dimana kelembaban udara maksimum terjadi pada waktu pagi hari dan minimum pada sore hari (Mu'nisa et al, 2022).

b. Pakan

Kelinci merupakan hewan herbivora non ruminansia yang sebagian besar kebutuhan pakannya berasal dari hijauan. Pakan hijauan yang diberikan untuk pakan kelinci antara lain rumput lapangan, limbah sayuran (kangkung, sawi, wortel, caisim, kol, daun singkong), daun turi, daun lamtoro, daun kembang sepatu, daun kacang panjang, daun ubi jalar, daun kacang tanah, daun dan batang jagung, daun pepaya, talas 27 dan lain-lain. Selain itu kelinci juga biasanya diberikan pellet, yaitu campuran beberapa bahan pakan yang diproses secara

mekanik dengan tekanan tertentu melalui die sehingga akan terbentuk pakan yang kompak. Konsumsi pellet pada kelinci adalah sebanyak 5% dari berat badan (Mu'nisa et al, 2022).

Selama proses penelitian, pembersihan kandang rutin dilakukan tiap hari untuk tetap menjaga agar hewan coba merasa tenang dan tidak stress. memberikan pakan juga rutin dilakukan pada pagi dan sore hari yaitu berupa pelet dan sayuran segar seperti wortel dan kangkung

E. Simplisia

Simplisia merupakan bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan apapun, kecuali dinyatakan lain umumnya merupakan bahan yang telah dikeringkan (Anonim, 2014).

1) Penggolongan simplisia

Menurut (Ditjen POM,1995), simplisia dapat digolongkan dalam 3 kategori yaitu:

a. Simplisia nabati

Simplisia yang berupa tanaman utuh dan bagian tanaman. Bagian tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia.

b. Simplisia hewani

Simplisia yang berupa hewan atau bagian hewan zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni.

c. Simplisia mineral

Simplisia yang berupa bahan-bahan mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia.

Adapun tahap pembuatan simplisia yaitu: Tahapan proses pembuatan simplisia meliputi pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, pengeringan, pengayakan atau penghalusan dan penyimpanan. Proses pengumpulan bahan baku dilakukan dengan cara memanen atau mengumpulkan bahan segar langsung dari tanamannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan antara lain umur, waktu pemanenan dan habitat. Waktu pemanenan erat kaitannya dengan pembentukan kandungan senyawa aktif di dalam tanaman tersebut, waktu pemanenan yang tepat secara umum pada saat senyawa yang terbentuk dalam jumlah besar dengan rentang umur tertentu. Misalnya pemanenan umbi lapis bawang dilakukan pada saat akhir pertumbuhan (Lady Yunita Handoyo & Pranoto, 2020).

Proses selanjutnya yaitu sortasi, proses ini dilakukan pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar dengan cara memisahkan tanah, kerikil, rumput liar dan bahan tanaman lainnya yang tidak diinginkan, selain itu juga bisa memisahkan bagian tanaman yang cacat atau rusak dimakan ulat. Pada tahap pencucian bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing lainnya yang menempel pada bahan. Proses pencucian biasanya menggunakan air bersih dan beberapa bahan yang mengandung senyawa atau zat mudah larut dalam air agar dilakukan dengan waktu secepat mungkin. Beberapa bahan membutuhkan perajangan supaya memperluas permukaan dan proses pengeringannya berlangsung relative cepat (Lady Yunita Handoyo & Pranoto, 2020).

Tahap yang utama yaitu proses pengeringan, pada proses ini terjadi pengeluaran air dari sampel secara termal sehingga menghasilkan produk kering. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengeringan adalah suhu, kelembaban, tekanan udara dan kecepatan, sedangkan faktor internal yang berpengaruh antara lain kadar air, bentuk, luas permukaan dan kondisi fisik

sampel. Pengeringan dapat dilakukan secara tradisional dengan hanya dijemur dibawah sinar matahari dengan kisaran waktu 2-3 hari, sedangkan pengeringan yang modern sudah menggunakan bantuan alat seperti oven, rak pengering atau *fresh dryer* dengan kisaran waktu sekitar 6-8 jam saja dan suhu dapat di atur sesuai kebutuhan. Penurunan kualitas mutu simplisia yang disebabkan oleh kadar air sampel dapat dicegah dengan proses pengeringan, sehingga reaksi enzimatik tidak akan berlangsung. Kadar air yang ada dalam sampel supaya tidak terjadi proses reaksi enzimatik harus kurang dari 10% (Lady Yunita Handoyo & Pranoto, 2020).

Tahapan selanjutnya setelah dihaluskan dengan mesin penggiling supaya memudahkan dalam proses selanjutnya yaitu proses pengayakan. Proses pengayakan bertujuan bahan supaya mendapatkan sebuk dengan luas permukaan bahan dengan pelarutnya lebih cepat larut dan senyawa yang diharapkan dapat terserap dengan baik. Tahapan terakhir yaitu penyimpanan simplisia, hal ini dilakukan untuk mempertahankan mutu simplisia dalam kurun waktu tertentu sebelum akhirnya dilakukan untuk proses selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyimpanan antara lain oksidasi, cahaya, kelembaban, reaksi internal bahan, dehidrasi, kontaminasi, kapang dan serangga (Lady Yunita Handoyo & Pranoto, 2020).

F. Uraian Tentang Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan sifat tertentu, terutama kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Pada umumnya ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Bahan yang akan diekstrak biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk atau simplisia (Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019).

Ekstraksi secara umum digolongkan menjadi dua yaitu ekstrak padat cair dan ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, senyawa yang dipisahkan terdapat dalam campuran yang berupa cairan, sedangkan ekstraksi padat-cair adalah suatu metode pemisahan senyawa dari campuran yang berupa padatan (Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019).

Ekstraksi disebabkan oleh gelombang kejut dari meletusnya kavitasi gelembung yang dihasilkan dari gelombang *ultrasonic*. Hal ini yang menyebabkan reduksi ukuran partikel atau rusaknya permukaan molekul atau dinding sel dari sampel sehingga senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam dapat terekstrak. Proses ekstraksi lebih efektif karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dan tidak memerlukan suhu tinggi (Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019).

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi berlangsung, pelarut akan dipisahkan dengan menggunakan penyaringan. Adapun kekurangan pada metode maserasi waktu yang lama, pelarut yang akan digunakan cukup banyak, kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu beberapa senyawa mungkin saja sulit untuk diekstraksi pada suhu

kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi ini dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019).

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi ekstraksi diantaranya ukuran partikel, jenis pelarut, suhu serta pengadukan. Pemilihan jenis pelarut yang perlu diperhatikan antara lain daya melarutkan oleoresin, titik didih, sifat racun, mudah tidaknya terbakar dan pengaruh terhadap alat peralatan ekstraksi yang akan digunakan. Pada umumnya metode maserasi menggunakan pelarut non air dan non-polar (Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019).

Tujuan dari ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Pemisahan secara ekstraksi didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Purwandari et al., 2018).

G. Metode Ekstraksi

1. Maserasi

Maserasi adalah salah satu teknik ekstraksi yang umum dilakukan dengan cara menggabungkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai dalam wadah inert yang rapat pada suhu kamar. Namun, terdapat beberapa kekurangan utama dari metode ini, termasuk waktu ekstraksi yang lama, penggunaan pelarut yang cukup banyak, dan kemungkinan kehilangan beberapa senyawa. Selain itu, pada suhu kamar, beberapa senyawa mungkin sulit diekstraksi. Meskipun demikian, metode maserasi juga memiliki keunggulan dalam menghindari risiko kerusakan senyawa-senyawa dalam tanaman yang bersifat mudah terurai oleh panas (Badaring et al., 2020).

Keuntungan dari proses ekstraksi dengan teknik perendaman adalah untuk menjamin kelestarian zat aktif yang diekstraksi tanpa mengalami kerusakan. Pada

proses ini, dekomposisi terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar sel. Akibatnya, metabolit sekunder dalam sitoplasma dipecah menjadi fragmen dan dihancurkan dalam zat terlarut alami yang digunakan. (Chairunnisa et al., 2019).

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam ekstraksi adalah waktu maserasi. Semakin lama waktu perendaman, semakin besar kontak antara zat terlarut dengan zat yang akan meningkatkan jumlah sel yang rusak dan bahan aktif yang dihancurkan. Kondisi ini akan terus berlanjut sampai tercapai keadaan setimbang antara konsentrasi campuran dalam bahan dan konsentrasi campuran dalam zat terlarut (Chairunnisa et al., 2019).

2. Perkolasi

Perkolasi merupakan metode ekstraksi dengan bahan yang disusun secara unggul dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai prosesnya sempurna dan umumnya dilakkan pada suhu ruangan. Prosedur metode ini yaitu bahan direndam dengan pelarut, kemudian pelarut baru dialirkan secara terus menerus sampai warna pelarut tidak lagi berwarna atau tetap bening yang artinya sudah tidak ada lagi senyawa yang terlarut. Kelebihan dari metode ini yaitu tidak diperlukan proses tambahan untuk memisahkan padatan dengan ekstrak, sedangkan kelemahan metode ini adalah jumlah pelarut yang dibutuhkan cukup banyak dan proses juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta tidak meratanya kontra antara padatan dengan pelarut (Susanty, 2019).

3. Refluks

Ekstraksi refluks merupakan metode yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut, selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik (kondensor). Pada umumnya dilakukan tiga sampai lima kali pengulangan proses pada rafinat pertama. Kelebihan metode ini yaitu padatan yang memiliki

tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat di ekstrak dengan metode ini. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang banyak (Susanty, 2019).

4. Soxhletasi

Ekstraksi dengan alat soxhletasi merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru, umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik (kondensor). Pada metode ini, padatan disimpan dalam alat soxhlet dan dipanaskan, sedangkan yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut terdinginkan dalam kondensor, kemudian mengekstraksi padatan. Kelebihan metode soxhlet adalah proses ekstraksi berlangsung secara kontinu, memerlukan waktu ekstraksi yang lebih sebentar dan jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan metode maserasi atau perkolasi. Kelemahan dari metode ini adalah dapat menyebabkan rusaknya solute atau komponen lainnya yang tidak tahan panas karena pemanasan ekstrak yang dilakukan secara terus menerus (Susanty, 2019).

H. Uraian Tentang Pelarut

Pelarut organik yang dipilih untuk ekstraksi adalah pelarut yang mempunyai kelarutan rendah dalam air (<10%), dapat menguap sehingga memudahkan penghilangan pelarut organik setelah dilakukan ekstraksi, dan mempunyai kemurnian yang tinggi untuk meminimalkan adanya kontaminasi sampel (Gandjar, 2007).

Pelarut merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses ekstraksi, sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut. Tersapat dua pertimbangan utama dalam memilih jenis pelarut, yaitu pelarut harus mempunyai daya larut yang tinggi dan pelarut tidak berbahaya atau tidak beracun. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dapat melarutkan ekstrak yang

diinginkan saja, mempunyai kelarutan yang besar, tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen ekstrak dan titik didih kedua bahan tidak boleh terlalu dekat (Gandjar,2007). Berkaitan dengan polaritas dari pelarut, terdapat tiga golongan pelarut yaitu:

1. Pelarut polar

Memiliki tingkat kepolaran yang tinggi, cocok untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang polar dari tanaman. Pelarut polar cenderung universal digunakan karena biasanya walaupun polar, tetap dapat menyari senyawa-senyawa dengan tingkat kepolaran lebih rendah. Salah satu contoh pelarut polar adalah; air, metanol, etanol dan asam asetat.

2. Pelarut semipolar

Pelarut semipolar memiliki tingkat kepolaran yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut polar. Pelarut ini baik untuk mendapatkan senyawa-senyawa semipolar dari tumbuhan. Contoh pelarut ini adalah: aseton, etil asetat dan kloroform.

3. Pelarut nonpolar

Pelarut nonpolar, hampir sama sekali tidak polar. Pelarut ini untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang sama sekali tidak larut dalam pelarut polar. Senyawa ini baik untuk mengekstrak berbagai jenis minyak. Contoh pelarut ini adalah: heksana, dan eter.

1. Tinjauan Tentang Mengenai Pemanfaatan Tanaman

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penduduk di negara kita yang mengalami berbagai penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kendala-kendala ini dianggap sebagai ujian dari Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, namun Allah dalam segala kasih-Nya turut memberikan penyakit sekaligus obatnya. Obat tersebut menjadi rahmat dan kebaikan bagi hamba-hamba Allah, baik yang mukmin maupun yang kafir. Rasulullah saw. bersabda dalam hadist Abu Hurairah radiallahu'anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً
(رواه البخارى)

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi saw. bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali dia juga yang menurunkan obatnya. (H.R. Al-Bukhari) (Shihab 1996).

Dari hadist di atas jelaslah bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah memberikan penyakit tanpa memberikan obatnya. Di sisi lain, Allah juga melimpahkan karunia berupa akal pikiran kepada manusia, memungkinkan mereka untuk berpikir dan menemukan obat untuk berbagai macam penyakit yang Allah turunkan.

Setiap ciptaan Allah pasti memiliki penawarnya. Oleh karena itu, setiap penyakit selalu memiliki obatnya yang berfungsi sebagai penawar untuk menyembuhkannya. Hal ini lebih dari sekadar keberadaan obat itu sendiri. Namun, penting untuk memberikan obat dengan cara yang tepat, dengan dosis yang sesuai dengan stadium penyakit, dan jumlah yang sesuai. Jika tidak, bisa muncul penyakit lain sebagai efek samping. Sebaliknya, jika dosisnya kurang, pengobatan tidak akan efektif, dan pengobatan tersebut tidak akan sempurna. Jika

orang yang diobati tidak menerima obat atau obatnya tidak tepat untuk penyakitnya, kesembuhan tidak akan terjadi.

Hanya mereka yang memiliki keahlian di bidang pengobatan yang mengetahui obat untuk setiap penyakit, sementara orang yang bukan ahlinya tidak memahaminya. Allah menginginkan agar pengobatan dipelajari oleh para ahli sehingga dapat disesuaikan dengan jenis penyakit yang akan diatasi, sehingga hal ini dapat mendukung proses kesembuhan.. Hal tersebut dijelaskan dalam hadist yang berasal dari sahabat Jabir ra bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya: "Karena setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya itu akan segera diberi kesembuhan oleh Allah swt.". (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ النَّاسِ بَرَأُوا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Jabir dari Rasulullah saw. bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah 'Azza wajallah (HR. Muslim)

Firman Allah swt. Q.S. Asy-Syu'Ara / 26:80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku (Kementerian Agama 2022)

Dari hadis dan ayat di atas, dapat dipahami bahwa kita disarankan untuk terus berusaha, namun hasil akhirnya tetaplah menjadi keputusan dari Allah swt.

Analoginya, dalam konteks kesehatan, ketika menghadapi penyakit, disarankan untuk mencari pengobatan, baik melalui metode tradisional maupun menggunakan obat sintetis. Penggunaan obat merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan, tetapi akhirnya, segala hasil tetaplah ditentukan oleh kehendak Allah.

Umumnya, setelah menjalani pengobatan, ada yang segera pulih, sementara ada yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa proses kesembuhan suatu penyakit bergantung pada ketentuan dan izin Allah swt.

Saat ini, masyarakat menggunakan berbagai metode pengobatan, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuhan. Hal ini dipilih karena selain harganya terjangkau, efek sampingnya pun sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, para peneliti mulai aktif dalam melakukan penelitian terhadap manfaat obat dari tumbuhan, terutama mengingat kekayaan sumber daya alam di negara kita.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita disarankan untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dan hal ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan ciptaan-Nya, termasuk tumbuh-tumbuhan yang khusus diciptakan oleh Allah untuk keperluan manusia. Selain itu, Allah juga menentukan bentuk tumbuhan sesuai dengan rancangan penciptaan dan kondisi habitat alamnya.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-quran Q.S. Taha/20:53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ
شَتَّى ۝٥٣

Terjemahnya:

(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan. (Kementerian Agama, 2022)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di bumi ini, terdapat berbagai jenis tumbuhan yang dapat tumbuh, terutama dengan adanya air hujan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berbagai jenis tumbuhan dapat dikategorikan sebagai tumbuhan tingkat rendah, yang struktur akar, batang, dan daunnya tidak terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, terdapat kelompok tumbuhan yang lebih berkembang, yaitu tumbuhan tingkat tinggi, yang memiliki struktur daun, batang, dan akar yang dapat dibedakan dengan jelas.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S.Asy-Syu'ara'/62:7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementrian Agama RI. 2013).

Dalam kitab Tafsir *al-Mishbah* (2002) halaman 186 sampai 190 diuraikan penjelasan tentang ayat ini, dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan-melalui uraiannya-keniscayaan ke-Esaan Allah swt. Karena, aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna namun keadaanya konsisten. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada Penciptanya Yang Maha Esa lagi Maha kuasa. Disisi lain, tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan-Nya menumbuhkan tumbuhan tumbuhanNya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhanNya. Tumbuh-tumbuhan ini diciptakan guna pertumbuhan

dan perkembangannya hingga dapat dikatakan menjadi sesuatu yang baik dalam hal ini subur dan bermanfaat (Shihab, 2009).

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa Allah swt. menciptakan tumbuh-tumbuhan bukan tanpa alasan melainkan agar menjadi sesuatu yang baik dalam hal ini tumbuh subur dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti halnya tumbuhan buni yang dimanfaatkan sebagai makanan dan pewarna makanan (buahnya), daun dan beberapa bagian lainnya juga dapat dimanfaatkan salah satunya dengan menjadikannya sebagai bahan baku obat. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, yang senantiasa tumbuh di permukaan bumi hanya untuk kelangsungan hidup bagi khalifah dimuka bumi, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain.

Seperti halnya putri malu yang dikenal dengan tumbuhan liar. Tumbuhan putri malu ini tumbuh di pinggir jalan, pinggir selokan dan tumbuh di sela-sela bebatuan dan sering dianggap sebagai tanaman yang berbahaya karena terdapat duri pada batangnya. Namun demikian, tumbuhan putri malu ini memiliki potensi sebagai tanaman obat, dan daun dari putri malu ini memiliki khasiat untuk pengobatan luka kelinci.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah eksperimental kuantitatif yang melibatkan penggunaan kelinci sebagai subjek uji, dengan pemberian ekstrak daun putri malu (*Mimosa pudica* L.).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental laboratorium yang dilakukan dengan berbagai tahap yaitu ekstraksi, maserasi dan pengujian aktivitas ekstrak daun putri malu untuk penyembuhan luka sayat pada kelinci.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Farmakologi di Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 – Juni 2023.

D. Sampel

Sampel penelitian ini adalah daun tanaman Putri Malu (*Mimosa pudica* L.) yang digunakan sebagai sampel.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini berupa pisau bedah steril, handscon, kapas, spidol warna, blender, jangka sorong, botol maserasi, timbangan analitik, *rotary evaporator*, corong kaca, kertas saring, erlenmeyer, gelas beaker, batang pengaduk, botol gelap dan aluminium foil, tabung reaksi, gelas ukur 10 mL serta rak tabung, kandang hewan, tempat pakan dan minum hewan, timbangan hewan, gunting dan alat cukur.

2. Bahan

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah ekstrak daun Putri Malu (*Mimosa Pudica* L.) hewan uji (kelinci jantan) betadin, metanol, etil klorida semprot, kasa, kapas dan plester.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengambilan Sampel

Sampel diambil di Desa Bontosunggu, Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontonompo Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian yang digunakan dari tumbuhan ini adalah daun.

2. Pengolahan Sampel

Daun putri malu (*Mimosa Pudica* L.) yang telah dipetik, dicuci, dikeringkan di lemari pengering. Setelah kering, daun putri malu dirajang lalu disimpan pada wadah tertutup untuk dipakai pada perlakuan selanjutnya. Selanjutnya dilakukan pembuatan ekstrak daun putri malu. Digunakan metode maserasi dalam pembuatan ekstrak dan menggunakan pelarut metanol. Serbuk simplisia dimasukkan kedalam bejana, kemudian tambahkan pelarut metanol sampai serbuk terendam sempurna, lalu ditutup dan dibiarkan selama lima hari terlindung dari

cahaya sambil diaduk aduk. Maserat lalu dipekatkan dengan bantuan alat *rotary evaporator* pada temperature tidak lebih dari 40oC dan diperoleh ekstrak kental.

3. Uji Golongan Kandungan Senyawa

Setelah diperoleh ekstrak kental, kemudia dilakukan uji golongan kandungan senyawa berupa uji flavonoid, tanin dan uji saponin.

Uji Flavonoid

Pemeriksaan flavonoid dilakukan dengan cara yaitu ekstrak dan hasil maserasi sampel diambil sepucuk spatula, kemudian ditambahkan sepucuk spatula serbuk Mg dan empat tetes HCl. Keberadaan flavonoid akan ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna filtrate menjadi jingga-merah (Komang, 2016).

Uji Tanin

Ekstrak daun putri malu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1-2 tetes FeCl₃. Keberadaan tanin akan ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna filtrate menjadi hijau atau biru kehitaman (Komang, 2016)

Uji Saponin

Ekstrak daun putri malu dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan aquadest, didinginkan, kemudian dikocok selama 10 detik. Setelah itu diamati perubahan yang terjadi. Kemudian ditambahkan kembali 1 tetes HCl pekat dan diamati kembali perubahan yang terjadi. Hasil positif apabila muncul busa selama 10 menit (Komang, 2016).

4. Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah kelinci dengan bobot badan 1,3-1,5 kg yang diaklimatisasi selama 14 hari, diberikan minum dan pakan sesuai dengan kebutuhan. Diberikan perlakuan luka sayat pada setiap kelinci. 15 ekor kelinci terbagi dalam 5 kelompok yang kelompok terdiri dari 9 ekor kelinci untuk

kelompok perlakuan dan 6 ekor kelinci untuk kelompok kontrol (Meilina et al., 2022).

Tabel 1. Perlakuan Luka Sayat Setiap Kelompok Kelinci

Kelompok	Perlakuan
P1	Ekstrak daun putri malu 5%
P2	Ekstrak daun putri malu 10%
P3	Ekstrak daun putri malu 15%
K+	Betadin
K-	Tanpa Perlakuan

5. Pembuatan Larutan Ekstrak Daun Putri Malu 5%, 10%, 15%


Ekstrak sebanyak 0,05g, 0,1g dan 1,5g disiapkan dalam wadah terpisah. Tiap wadah dicukupkan dengan 10 mL aquadest lalu dihomogenkan hingga diperoleh larutan ekstrak 5%, 10% dan 15% (Meilina et al., 2022).

6. Pengujian Aktivitas Ekstrak Daun Putri Malu Terhadap Luka Sayat

Rambut atau bulu kelinci dicukur diarea punggung dan diberi tanda di daerah yang akan disayat. Kemudian dianastesi menggunakan etil klorida semprot, mencuci tangan, mengenakan sarung tangan, dan mengaplikasikan alkohol pada kulit. yang akan disayat, Selanjutnya, luka diinsisi menggunakan pisau bedah dengan panjang sekitar 2 cm dan mencapai kedalaman hingga lapisan dermis, yaitu sekitar 2 mm dari permukaan kulit. Setelah itu pada masing-masing luka sayat kelinci dioleskan perlakuan satu kali sehari kemudian ditutup dengan kasa, kapas dan plester, luka diberikan 0,1 mL kelompok kontrol dan diberikan perlakuan selama 15 hari (Meilina et al., 2022)

7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara statistik menggunakan aplikasi *SPSS*. Data yang diperoleh berupa pengukuran panjang luka dan waktu penyembuhan luka sayatan yang kemudian uji statistik *One Way ANOVA* (*Analysis Of Variance*) dengan melihat adanya penutupan luka. Sebelum itu, dilakukan uji Kategori senyawa untuk menentukan ada tidaknya kandungan senyawa pada tumbuhan.(Meilina et al., 2022).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil ekstrak kental didapatkan dalam proses ekstraksi kemudian dihitung rendemennya. Rendemen ekstrak daun putri malu yang diperoleh dari proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol terdapat pada tabel 2. sedangkan untuk perhitungan rendeman dapat dilihat pada lampiran 3.

1. Proses Ekstraksi

Tabel 2. Hasil rendemen dari proses ekstraksi

Simplisia	Pelarut	Warna ekstrak kental	Berat ekstrak kental (gram)	rendemen
300 gram	3000 mL	Hijau pekat	52,90 gram	17,63%

Setelah hasil perhitungan rendemen diketahui maka dilakukan identifikasi fitokimia. Hasil identifikasi fitokimia dapat dilihat pada tabel 3.



Keterangan:

P1: Ekstrak daun putri malu 5%

P2: Ekstrak daun putri malu 10%

P3: Ekstrak daun putri malu 15%

K+: Betadin

K-: Tanpa perlakuan

 : Fase Inflamasi

 : Fase Poliferasi

 : Luka Tertutup

Tabel 5. Rata-rata waktu (hari) efek penyembuhan luka sayat kelinci

Perlakuan	P1	P2	P3	K +	K-
1	12	12	10	12	15
2	13	12	10	9	15
3	13	13	11	9	15
Rata-rata hari ke-n	12,6	12,3	10,3	10	15

Tabel 6. Hasil Output SPSS

Kelompok	Mean	Standar Deviasi (SD)	Waktu Penyembuhan Luka (Hari)
P1	0,90	0,75	12,6
P2	0,87	0,70	12,3
P3	0,76	0,62	10,3
K+	0,98	0,77	10
K-	1,05	0,66	15

B. Pembahasan

Luka adalah rusak atau hilangnya jaringan tubuh yang terjadi karena adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. Faktor tersebut seperti trauma, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sangatan listrik, atau gigitan hewan. Bentuk dari luka itu sendiri tergantung pada penyebabnya, ada yang terbuka dan tertutup. Salah satu contoh luka terbuka yaitu luka insisi atau biasa disebut dengan luka sayat dimana terdapat robekan linier pada kulit dan jaringan dibawahnya (Amfotis et al., 2022).

Ditinjau dari penyebabnya, ada dua jenis luka yang dapat dibedakan, yaitu luka iris dan luka bakar. Luka iris disebabkan oleh benda tajam dan memiliki tepi-tepi luka yang licin, tanpa hubungan antara jaringan dan tanpa adanya jaringan nekrotik. (Suwiti, 2010).

Luka sayat merujuk pada luka yang timbul akibat irisan oleh instrumen tajam, seperti yang mungkin terjadi selama prosedur pembedahan. Ciri-ciri luka sayat melibatkan luka yang terbuka, rasa nyeri, dengan panjang luka yang lebih besar daripada kedalaman luka. Beberapa karakteristik khusus dari luka sayat termasuk: garis luka sejajar, absennya memar di sekitar tepi kulit, serta ketiadaan jaringan yang membentang dari satu sisi ke sisi lain dalam luka (*bridging*). (Lestari, 2020).

Pada penelitian ini menggunakan ekstrak daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) yang diekstraksi menggunakan penyari metanol. Metanol dipertimbangkan sebagai penyari karena termasuk dalam kelompok pelarut polar. Ini berarti bahwa metanol dapat melarutkan senyawa-senyawa polar, seperti flavonoid, tanin dan saponin yang umumnya terkandung dalam daun putri malu.

Metanol adalah pelarut yang tersedia secara komersial dengan harga yang relatif terjangkau (Prajapati, 2013). Metanol memiliki kemurnian yang tinggi dan stabilitas yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Ini memungkinkan

ekstraksi yang konsisten dan pengujian yang andal terhadap senyawa-senyawa aktif dari daun putri malu, serta memiliki kemampuan yang baik untuk melarutkan berbagai senyawa organik, termasuk senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam daun putri malu. Senyawa-senyawa seperti flavonoid, tanin dan saponin yang dapat memiliki aktivitas biologis terlarut dalam metanol (Uddin dkk, 2012).

Proses pengambilan sampel bahan dilakukan secara acak kemudian daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau benda asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan simplisia (Ningsih, 2017).

Diketahui bobot simplisia awal keseluruhan sebanyak 300 gram lalu didapatkan bobot total ekstrak kering daun putri (*Mimosa pudica* L.) sebanyak 52,90 gram. Dalam penelitian ini, digunakan metode maserasi sebagai metode ekstraksi. Pada metode ini, serbuk tanaman dan pelarut yang cocok dimasukkan ke dalam suatu wadah yang rapat, kemudian ekstraksi berlangsung pada suhu ruangan.. Ekstraksi berlangsung hingga tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman, dan pada titik ini proses ekstraksi dihentikan. Simplisia yang telah mengering kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. (Mukhriani,2014).

Serbuk daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) yang didapat kemudian dilanjutkan dengan proses maserasi, dimana sampel yang digunakan sebanyak 200 gram dan pelarut metanol. Metode maserasi dipilih karena pengerjaan serta peralatan yang digunakan sederhana dan kerusakan pada komponen kimia sangat minimal (Departemen Kesehatan RI,1977).

Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah metanol. Pemilihan metanol sebagai pelarut karena metanol memiliki daya larut yang tinggi terhadap senyawa-senyawa yang polar dan nonpolar. Hal ini memungkinkan metanol untuk

mengekstraksi berbagai jenis senyawa aktif dengan efisiensi yang baik, termasuk senyawa polar seperti flavonoid, saponin dan tanin.

Setelah proses maserasi selesai, dilakukan penyaringan untuk memisahkan larutan maserat dari residu, selanjutnya, maserat yang telah terpisah tersebut dipisahkan menggunakan alat *rotary evaporator* agar diperoleh ekstrak dengan konsistensi yang lebih kental (Aini,2017).

Ekstrak kental daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) kemudian dibuat menjadi larutan. Penggunaan larutan ini dipilih karena dalam hal kemudahan pemberian dibandingkan dengan bentuk sediaan lain, seperti krim atau salep. Larutan ekstrak dapat dengan mudah diterapkan langsung ke area luka dengan luka sehingga memudahkan penanganan luka (Kumar dkk, 2021).

Identifikasi senyawa adalah langkah awal dalam penelitian fitokimia yang bertujuan untuk mengetahui jenis senyawa yang terdapat dalam tanaman yang sedang diteliti. Metode uji kandungan senyawa dilakukan dengan mengamati reaksi pengujian warna menggunakan suatu pereaksi tertentu (Fadlilaturrahmah et al., 2021). Identifikasi senyawa yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi identifikasi senyawa flavonoid, saponin dan tannin. Hasil identifikasi fitokimia dapat dilihat pada lampiran tabel 3.

Uji golongan flavonoid dilakukan untuk mengetahui keberadaan senyawa flavonoid dalam ekstrak daun putri malu. Uji flavonoid dilakukan dengan mengambil ekstrak sebanyak 1 mg ekstrak metanol daun putri malu, dilarutkan dengan metanol kemudian ditambahkan serbuk Mg dan HCl pekat. Hasil yang terlihat yaitu terjadi perubahan warna merah atau jingga yang menunjukkan bahwa ekstrak daun putri malu tersebut mengandung senyawa flavonoid. Reaksi dugaan flavonoid dengan serbuk Mg ditunjukkan pada gambar 8.

Uji golongan saponin yang hasil positifnya akan menimbulkan busa ketika dikocok dengan aquadest/air, busa merupakan bukti adanya senyawa saponin dalam sampel pada penelitian dilakukan yaitu ekstrak daun putri malu dilarutkan dengan aquades dan dikocok selama 30 detik, dimana hasil menunjukkan bahwa busa setinggi ± 1 cm dan tetap stabil setelah didiamkan selama 10 menit. Hasil adanya buih setinggi 1 cm hal ini menunjukkan bahwa uji saponin pada ekstrak daun putri malu adalah positif. Hasil uji saponin dapat dilihat pada lampiran gambar 8.

Uji golongan senyawa tanin pada penelitian ini yaitu menggunakan FeCl_3 . Hasil yang terlihat yaitu terbentuknya warna hijau kehitaman yang menunjukkan bahwa ekstrak daun putri malu positif mengandung senyawa tanin. Hasil uji tanin dapat dilihat pada lampiran gambar 8.

Tabel 3. menunjukkan hasil identifikasi senyawa dari daun putri malu terbukti memiliki kandungan flavonoid, saponin dan tanin. Penggunaan pelarut polar dan nonpolar sering digunakan untuk ekstraksi simplisia. Pelarut polar dan nonpolar seperti metanol yang digunakan pada uji ekstraksi mampu menarik senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin dan tannin. Menurut Singhai 2012, senyawa-senyawa yang memiliki peran penting dalam proses penyembuhan luka yaitu, flavonoid, saponin dan tanin. Menurut Lengkong 2021, senyawa yang terkandung pada daun putri malu seperti flavonoid, saponin dan tanin dapat membantu penyembuhan luka dengan meningkatkan pembentukan kolagen, menurunkan makrofag dan edema jaringan serta meningkatkan jumlah fibroblas. Dan menurut Hertian 2021 flavonoid, tanin dan saponin yang terdapat dalam daun putri malu dapat membantu proses penyembuhan luka melalui peningkatan jumlah pembentukan pembuluh darah kapiler dan sel-sel fibroblast. Dan dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan yang memiliki sifat

mengendapkan (*precipitating*) dan mengumpulkan (*coagulating*) sel darah merah dan dapat memacu pertumbuhan kolagen dalam proses penyembuhan luka

Pada penelitian ini digunakan zat aktif dalam ekstrak daun putri malu yang diekstraksi menggunakan pelarut metanol. Zat aktif yang dikandung dalam tanaman kitolod berperan sebagai penyembuh luka diantaranya yaitu flavonoid, saponin dan tanin. Pemberian ekstrak daun putri malu terhadap penyembuhan luka sayat dilakukan berdasarkan parameter pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun putri malu terhadap penurunan panjang luka. Pengujian dilakukan secara laboratorium eksperimental dengan menggunakan hewan uji yaitu kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

Variasi kelompok perlakuan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu konsentrasi masing-masing 5%, 10% dan 15%, kontrol negatif tidak diberikan perlakuan dan kontrol positif diberikan betadin.

Langkah perlakuan dalam pembuatan luka sayat pada kelinci yaitu dibuat luka sayat sepanjang 2 cm ke punggung kelinci dengan menggunakan scapel yang telah disterilisasi menggunakan alkohol. Sebelum luka sayat dibuat, kelinci dianestesi terlebih dahulu menggunakan etil klorida spray.

Pada penelitian ini kontrol negatif tidak diberikan perlakuan. Di samping itu juga digunakan betadin sebagai kontrol positif agar dapat mengetahui perbandingan efek penyembuhan luka dari bahan atau sediaan yang diuji (Khanna, 2020).

Penyembuhan luka adalah mekanisme tubuh untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan membentuk struktur baru dan fungsional. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi proteksi dan fungsi penting lain dari kulit. Luka yang mengalami komplikasi akan menghambat proses penyembuhan luka dan bahkan memperburuk kondisi luka (Laut et al., 2019).

Penyembuhan luka berlangsung dalam 3 fase utama yaitu: fase inflamasi, fase proliferasi dan fase maturasi atau remodelling. Fase inflamasi terjadi segera setelah perlukaan dan mencapai puncaknya pada hari ketiga. Fase proliferasi berlangsung pada hari keempat hingga hari ketujuh ditandai dengan adanya fibroblas yang jumlahnya terus meningkat selama fase ini berlangsung. Fibroblas merupakan faktor utama yang mendominasi kesembuhan luka sekaligus sebagai rangka atau struktur dasar untuk menghasilkan kolagen. Fase maturasi merupakan fase kesembuhan luka yang berlangsung dalam jangka waktu lama (3-6 bulan bahkan sampai tahun) (Laut et al., 2019).

Pengobatan luka sayat dengan menggunakan ekstrak metanol daun putri malu dilakukan secara topikal dengan frekuensi satu kali hingga kesembuhan luka pada luka sayat. Terjadinya penyembuhan pada luka sayat ditandai dengan merapatnya kulit, kekeringan luka dan keropeng di sekitar luka tekelupas dengan sendirinya. Pada penelitian, pengamatan dilakukan hingga luka tertutup sempurna.

Berdasarkan hasil penelitian untuk luka tertutup 100% pada penggunaan masing masing konsentrasi menunjukkan perbedaan waktu. Dimana rata-rata penyembuhan luka untuk konsentrasi 5% yaitu 12 hari, untuk 10% yaitu 13 hari, untuk 15% yaitu 10 hari dan untuk kontrol negatif 15 hari, sedangkan untuk kontrol positif yaitu betadin masih lebih cepat dibandingkan dengan ekstrak daun putri malu yaitu 10 hari.

Pada tabel 5. Didapatkan penyembuhan luka paling cepat adalah kontrol positif (betadin) yaitu dengan rata-rata hari penutupan luka adalah 10 hari. Mekanisme dari betadin (*Povidone iodine*) itu dimulai setelah kontak langsung dengan jaringan, maka *iodine* akan dilepaskan secara perlahan-lahan dengan aktivitas menghambat metabolisme enzim bakteri sehingga mengganggu multifikasi bakteri yang mengakibatkan bakteri menjadi lemah (Hertian et al.,

2021). Urutan kedua dan ketiga penyembuhan luka tercepat adalah ekstrak 15% (P3) dengan rata-rata 10,3 hari dan ekstrak 10% yaitu dengan rata-rata 12,3 hari sedangkan untuk ekstrak maserasi yang paling lambat dalam penyembuhan luka pada konsentrasi 5% yaitu dengan rata-rata hari 12,6 hari. Dan untuk urutan terakhir adalah kontrol negatif (tanpa perlakuan) dengan lama rata-rata hari penutupan luka adalah 15 hari, hal ini terjadi karena kontrol negatif tidak diberikan perlakuan yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka, sehingga pada kontrol negatif terjadi penyembuhan yang alami atau secara alami.

Penyembuhan pada kelompok perlakuan (diberikan ekstrak daun putri malu) lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini terjadi karena ekstrak daun putri malu mengandung senyawa flavonoid tanin dan saponin, sedangkan penyembuhan luka pada tiap kelompok perlakuan (diberi ekstrak daun putri malu) didapat konsentrasi 15% merupakan tingkat konsentrasi yang mempercepat proses penyembuhan luka.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh (Rahman, 2017) pada efek salep ekstrak daun krinyuh terhadap penyembuhan luka sayat pada ayam petelur dengan konsentrasi 20%, 10% dan 5% dengan metode yang sama dengan jenis sediaan yang berbeda didapatkan bahwa salep ekstrak daun krinyuh yang paling cepat dalam penyembuhan luka sayat adalah pada konsentrasi daun krinyuh 20%. Hal ini terjadi dikarenakan semakin besar konsentrasi ekstrak maserasi maka semakin banyak kandungan metabolit sekunder.

Berdasarkan hasil output spss pada tabel 6 yaitu:

1. Hasil Uji Deskriptif

Tabel deskriptif terlihat nilai rata-rata hari penyembuhan luka sayat pada konsentrasi 5% (P1) memiliki rata-rata 0,90 dengan standar deviasi 0,75, konsentrasi 10% (P2) memiliki rata-rata 0,87 memiliki standar deviasi 0,70, dan

Konsentrasi 15% (P3) memiliki rata-rata 0,76 memiliki standar deviasi 0,62. Jadi, ekstrak daun putri malu yang memiliki aktivitas penyembuhan luka sayat paling cepat adalah pada konsentrasi 15% hal ini dikarenakan semakin kecil rata-rata hari penyembuhan luka maka semakin cepat penyembuhan luka (Nasution & Muslimdjias, 2021).

2. Hasil Uji Homogenitas

Berdasarkan output SPSS diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan variable hari penyembuhan luka sayat berdasarakan variabel perlakuan adalah sebesar $0,490 > 0,05$, yang artinya variable hari penyembuhan luka berdasarakan variable perlakuan mempunyai varian yang sama atau homogen (Nasution & Muslimdjias, 2021)

3. Hasil Uji ANOVA

Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari *output test of homogeneity of variances* dengan nilai sig 0,490 dimana lebih besar dari 0,05. Perhitungan hasil uji statistik ANOVA terhadap penyembuhan luka pada kelinci dengan ekstrak metanol daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) dimana $F_{hitung} 0,323 > F_{tabel} 4,67$. Oleh karena itu, konsentrasi ekstrak maserasi daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) memiliki potensi untuk berperan dalam proses penyembuhan luka sayat pada kelinci jantan (*Oryctolagus cuniculus*) (Nasution & Muslimdjias, 2021).

4. Hasil Uji Duncan

Berdasarkan uji lanjutan yaitu uji Duncan yang terdapat pada lampiran 8 diketahui bahwa pada rata-rata waktu penyembuhan luka sayat perlakuan betadin (K+) memiliki aktivitas yang tidak berbeda nyata ($P < 0,05$) dibandingkan dengan perlakuan ekstrak daun putri malu 15% (P3), ditunjukkan dengan rata-rata (K+; 10,00) dan (P3; 10,33).

Pada rata-rata waktu penyembuhan sayat pada perlakuan ekstrak daun putri malu 10% (P2) memiliki aktivitas yang tidak berbeda nyata ($P < 0,05$) dibandingkan dengan perlakuan ekstrak daun putri malu 5% (P1) ditunjukkan dengan rata-rata (P2; 12,33) dan (P1; 12,66).

Pada rata-rata waktu penyembuhan sayat yang tidak diberikan perlakuan yaitu pada kontrol negatif (K-) memiliki aktivitas yang berbeda nyata ($P < 0,05$) paling lama dibandingkan dengan pemberian perlakuan ekstrak daun putri malu dan betadin.

Jadi, ekstrak daun putri malu 15% (P3) juga menunjukkan rata-rata waktu penyembuhan paling cepat diantara perlakuan lain. Hal ini berarti ekstrak daun putri malu 15% (P3) memberikan hasil rata-rata penutupan panjang luka lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan lainnya. (Nasution & Muslimdjas, 2021).

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak metanol dari daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) memiliki aktivitas penyembuhan luka sayat pada kelinci. Efek penyembuhan luka sayat yang optimal dicapai dengan menggunakan konsentrasi ekstrak metanol daun putri malu sebanyak 15%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ekstrak daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) memiliki aktivitas dalam menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
2. Konsentrasi 15% dari ekstrak daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) telah terbukti sebagai konsentrasi optimal yang mampu menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait aktivitas pemberian daun putri malu (*Mimosa pudica* L.) terhadap jenis perlakuan yang berbeda seperti luka bakar untuk menambah referensi terkait pemanfaatan ekstrak daun putri malu (*Mimosa pudica* L.)



KEPUSTAKAAN

- Amfotis, M. L., Suarni, N. M. R., & Arpiwi, N. L. (2022). *Wound Healing Of Cuts in the Skin of White Rat (Rattus norvegicus) Is Given Kirinyuh (Chromolaena odorata) Leaf Extract. Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*, 9(1), 139. <https://doi.org/10.24843/metamorfosa.2022.v09.i01.p14>
- Anonim. (2014). *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Arisanty, I. P. (2013). *Konsep manajemen perawatan luka*. Jakarta: EGC.
- Badaring, D. R., Sari, S. P. M., Nurhabiba, S., Wulan, W., & Lembang, S. A. R. (2020). Uji Ekstrak Daun Maja (*Aegle marmelos* L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Indonesian Journal of Fundamental Sciences*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.26858/ijfs.v6i1.13941>
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana* L.) sebagai Sumber Saponin. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(4), 551. <https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i04.p07>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1977). *Materia Medika Indonesia Jilid I*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan.
- Dewi, A. U., & Wicaksono, I. A. (2020). Review Artikel: Tanaman Herbal yang Memiliki Aktivitas Penyembuhan Luka. *Farmaka*, 18(2), 191–207.
- Fadlilaturrahmah, F., Putra, A. M. P., Rizki, M. I., & Nor, T. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan dan Antitirosinase Fraksi n-Butanol Daun Sungkai (*Peronema canescens* Jack.) Secara Kualitatif Menggunakan Kromatografi Lapis Tipis. *Jurnal Pharmascience*, 8(2), 90. <https://doi.org/10.20527/jps.v8i2.11160>
- Fauziah, L., & Wakidah, M. (2019). *Extraction of Papaya Leaves (Carica papaya L.) Using Ultrasonic Cleaner*. *EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis*, 19 (November), 35–45. <https://doi.org/10.20885/eksakta.vol19.iss1.art4>
- Gandjar, I. G. dan Rohman, A., 2007, *Kimia Farmasi Analisis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hanani, E. (2016). *Analisis Fitokimia. Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung. ITB.
- Hertian, R., Muhaimin, & Sani K, F. (2021). Uji Efektivitas Ekstrak Daun Ekor Naga (*Rhaphidohora pinnata* (L.f) Schott) terhadap Penyembuhan Luka

- Sayat pada Mencit Putih Jantan. *Indonesian Journal of Pharma Science*, 1(1), 5–24.
- Khanna P, Vahdani G, Reid R, Chin P. A (2020) *Randomized Controlled Trial Comparing Iodine and Chlorhexidine Solutions for Surgical Site Antisepsis in Emergency Caesarean Section. Surg Infect (Larchmt).*;21(8):663-667. doi:10.1089/sur.2019.174
- komang Mirah Meigaria, I. W. (2016). Skiring Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Aseton Daun Kelor (*Moringa oliefera*). *Jurnal Wahana Matematika dan Sains*, Vol 10 No. 2.
- Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins (2021) *Basic Pathology*, 10th edition, Elsevier.
- Lady Yunita Handoyo, D., & Pranoto, M. E. (2020). Pengaruh Variasi Suhu Pengeringan Terhadap Pembuatan Simplisia Daun Mimba (*Azadirachta Indica*). *Jurnal Farmasi Tinctura*, 1(2), 45–54.
- Laut, M., Ndaong, N., Utami, T., Junersi, M., Bria Seran, Y., Farmakologi dan Toksikologi FKH Undana Jl Adisucipto, B., -Kupang, P., Bedah dan Radiologi FKH Undana Jl Adisucipto -Penfui, B., & Kedokteran Hewan Jl Adisucipto -Penfui, F. (2019). Efektivitas Pemberian Salep Ekstrak Etanol Daun Anting-Anting (*Acalypha Indica Linn.*) Terhadap Kesembuhan Luka Insisi Pada Mencit (*Mus musculus*) (*The Effectiveness of Topical Ointment Containing Ethanolic Extract of Acalypha Indica Leaves on Wound Healing*. *Jurnal Kajian Veteriner*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.35508/jkv.v7i1.01>
- Lengkong, J., Haryadi, H., Tompodung, H., & Pareta, D. N. (2021). Uji efektivitas sari daun putri malu mimosa pudica l. Sebagai penyembuh luka bakar pada tikus putih *Rattus norvegicus*. *Majalah INFO Sains*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55724/jis.v2i1.18>
- Lestari, P. (2020). Penyuluhan Tentang Khasiat Bawang Dayak Terhadap Penyembuhan Luka Di Desa Candirejo. *Counseling About the Efficacy of Dayak Onions on Wound Healing in Candirejo Village*, 1(1), 49–54.
- Megawati, S. (2020). Formulasi Dan Uji Efektivitas Penyembuhan Luka Sayat Salep Ekstrak Metanol Bunga Ginje (*Thevetia Peruviana*) Terhadap Kelinci Jantan New Zealand White. *Jurnal Farmasi Udayana*, 180. <https://doi.org/10.24843/jfu.2020.v09.i03.p06>
- Meilina, A., Nindita, Y., & Sunarsih, E. S. (2022). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 70% Kulit Pisang Ambon Kuning (*Musa acuminata Colla*) terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). *Generics: Journal of Research in Pharmacy*, 2(2), 119–126. <https://doi.org/10.14710/genres.v2i2.15612>.

- Mu'nisa et al. (2022). *Percobaan Memahami Perawatan Dan Kesejahteraan Hewan Percobaan*.109
- Nafilah, N., & Azrul Zuniarto, A. (2022). Uji Efektivitas Sedatif Serbuk Instan Ekstrak Kering Daun Putri Malu (*Mimosa Pudica Linn.*) Pada Mencit Putih Jantan. *Praeparandi : Jurnal Farmasi Dan Sains*, 5(2), 112–120. <http://jurnal.stfypibcirebon.ac.id/index.php/ojs/article/view/176>
- Nasution, M. F. W., & Muslimdjas, Y. (2021). Uji Efektivitas Madu Konsentrasi 50% Dan 100% Dibandingkan Dengan Povidone Iodine Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Mencit (*Mus Musculus*). *JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia*, 8(3), 47–53. <https://doi.org/10.53366/jimki.v8i3.237>
- Ningsih, I. Y. (2017). Modul Sainifikasi Jamu Penanganan Pasca Panen. In *Petrus* (Vol. 53, Issue 4).
- Nonci, F. Y. (2017). Penentuan Aktivitas Minyak Daun Nilam (*Pogostemon Cablin Benth*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat. *Jurnal kesehatan* 10(2), 76-81.
- Perdanakusuma, D. S. (2007). *Anatomi Fisiologi Kulit dan Penyembuhan Luka*. Surabaya : Ailangga university School of medicine.
- Prajapati, R., Kalariya, M., & Umbarkar, R. (2013). *Effect of different solvents in extraction of medicinal plants. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 4(10), 3860-3864.
- Purwandari, R., Subagiyo, S., & Wibowo, T. (2018). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Jambu Biji. *Walisongo Journal of Chemistry*, 1(2), 66. <https://doi.org/10.21580/wjc.v2i2.3104>
- Puspita, D. E. N. E. I. M. T. (2020). Isolasi, Identifikasi dan Uji Produksi Yeast yang Diisolasi Dari Nira Kelapa. *Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi*, 5(1), 1–5. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/biosfer/article/view/2395>
- Rahman, A. (2017). Efek Salep Ekstrak Daun Kirinyuh (*Euphorium odatarum*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Ayam Petelur (*Gallus leghorn*). Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Risa, A. (2018). Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Mangga (*Mangifera indica L.*) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*). Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Riskiana, N. A., dkk. 2020. Efektivitas Penggunaan Laboratorium Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Pada Materi Bakteri Di Kelas X Sma Negeri 1 Batang Onang. *Jurnal Edugenesi* 2, no.2

- Sari, Y. N. (2019). Ekstrak Daun Putri Malu Terhadap Kadar Gula Darah Diabetes Melitus . *journal of Holistic and Traditional Medicine*, 3(03), 316-320.
- Suparyanto dan Rosad (2020). Pengaruh Penggunaan Tepung Daun Belimbing Manis (*Averrhoa Carambola* L.) Sebagai Substitusi Pakan Kelinci Terhadap Performa Kelinci Hyla Hycle. *Suparyanto Dan Rosad* 5(3), 248–253.
- Susanty, Y. dll. (2019). Metode Ekstraksi untuk Perolehan Kandungan Flavanoid Tertinggi dari Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam). *Jurnal Konversi*, 8(2), 31–36.
- Suwiti, N. K. (2010). Deteksi Histologik Kesembuhan Luka Pada Kulit Pasca Pemberian Daun Mengkudu (*Morinda Citrifolia* Linn). *Veteriner Udayana*, 2(1), 1–9.
- Syukri, Y. (2022). Pengobatan islam serta teknologi terkini yang digunakan untuk Pengembangan Tanaman Obat yang Disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. *Univesritas Islam Indonesia*.
- Uddin, M. Z., Rahman, M. M., Kabir, A. K. M. S., Al-Amin, M., Reza, M. S., & Das, A. K. (2012). *Comparative study of phytochemical screening, antioxidant and antimicrobial capacity of crude extracts of Vitex negundo and Vitex trifolia leaves. BMC Research Notes*, 5(1), 1-8.
- Wahyuni, A. S., Syamsiah, & Wahidah, B. F. (2017). Identifikasi Jenis-Jenis Tumbuhan Semak di Area Kampus 2 UIN Alauddin dan Sekitarnya. *Agroprimatech*, 1(1), 32–39.
- Wardani, I. G. (2018). penaguruh pemberian ekstrak daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap penyembuhan luka sayat pada mencit jakantan (*Mus mucusulus* L). . *jurnal ilmiah medicamento*, 4(1).
- Wulan, W. Y. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Etanol Daun . *Pharmacoon– Program Studi Farmasi, Fmipa, Universitas Sam Ratulangi*.

Lampiran 1. Kode Etik Hewan



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kep_kfkk@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION"

No: A.009/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Siti Nurmila Putri
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul
Title

" Uji Aktivitas Ekstrak Daun Putri Malu (*Mimosa pudica* L) Sebagai Penyembuh Luka Sayat Terhadap Kelinci Jantan (*Oryctolagus cuniculus*)"
" Antimicrobial Test, Healing of Cuts and Burns From Botto-Botto Leaf Extract (*Chromolaena Odorata* L.)"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024.


This declaration of ethics applies during the period October 2, 2023 until October 2, 2024.



October 2, 2023
Chairperson,
Siti Nurmila Putri, M.Si., Apt.

Lampiran 2. Peta Pengambilan Sampel

Desa Bontosunggu, kec. Bontonombo Selatan Kab. Gowa



Lampiran 3. Skema Kerja

1. Preparasi Sampel




2. Ekstraksi Sampel




3. Uji Flavonoid




4. Uji Saponin



5. Uji Tanin



6. Uji aktivitas ekstrak daun putri malu pada luka sayatan



Lampiran 4. Perhitungan rendemen ekstrak metanol daun putri malu

Diketahui : berat ekstrak kental daun putri malu = 52,90 gram

: berat simplisia daun putri malu = 300 gram

$$\begin{aligned}\% \text{ rendemen} &= \frac{\text{berat ekstrak kental}}{\text{berat simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{52,90 \text{ gram}}{300 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 17,63\%\end{aligned}$$



Lampiran 5. Gambar serbuk simplisia daun putri malu (*Mimosa pudica* L.)



Gambar 6. Serbuk simplisia daun putri malu (*Mimosa pudica* L.)




Lampiran 6. Gambar hasil maserasi tanaman putri malu (*Mimosa pudica* L.)




Gambar 7. Ekstrak kental daun putri malu (*Mimosa pudica* L.)



Lampiran 7. Gambar hasil identifikasi fitokimia

Gambar 8 . a). Hasil uji fitokimia flavonoid daun putri malu, b). Hasil uji fitokimia saponin dan c). Hasil uji fitokimia tanin

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian



Gambar 9. Foto ekstrak daun putri malu a). Ekstrak daun putri malu 5%, b). Ekstrak daun putri malu 10% dan c). Ekstrak daun putri malu 15%



Gambar 10. Foto saat kelinci disayat



Gambar 11. Foto pengukuran panjang luka sayat



Gambar. 12. Dokumentasi Luka Sayat a. Hari pertama luka sayat pada kelinci
b. luka dibalut kain kasa c. Luka membentuk keropeng d. Luka menutup
sempurna e. Luka hari ke 8 tanpa perlakuan f. Luka hari ke 8 diberi ekstrak

Lampiran 9. Hasil Output SPSS

Descriptives

Nilai

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
P1	15	.9067	.75542	.19505	.4883	1.3250	.00	2.00	
P2	15	.8733	.70556	.18217	.4826	1.2641	.00	2.00	
P3	15	.7667	.62606	.21329	.3092	1.2241	.00	2.00	
K+	15	.9867	.77170	.19925	.5593	1.4140	.00	2.00	
K-	15	1.0533	.66426	.17151	.6855	1.4212	.00	2.00	
Total	75	.9173	.73289	.08463	.7487	1.0860	.00	2.00	
Model			.74668	.08622	.7454	1.0893			
Fixed Effects									
Random Effects				.08622 ^a	.6780 ^a	1.1567 ^a			-.02515

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure.

Test of Homogeneity of Variances

Nilai

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.864	4	70	.490

ANOVA

Nilai

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.721	4	.180	.323	.862
Within Groups	39.027	70	.558		
Total	39.747	74			

DUNCAN

Perlakuan	N	Subset for $\alpha = 0,05$		
		1	2	3
K+	3	10.0000		
P3	3	10.3333		
P2	3		12.3333	
P1	3		12.6667	
K-	3			15.0000
Sig.		.658	.658	1.000



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mahasiswa bernama lengkap Siti Nurmila Putri, lahir di Sorobaya pada tanggal 22 September 2001, merupakan anak pertama dari pasangan Dirwan Pato dan Kurniati. Ia memiliki dua orang adik. Dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) tepatnya di TK Paud Karebitte Bontosunggu. Lalu, melanjutkan ke pendidikan dasarnya di SD Inpres Pa'bundukang dan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Kemudian, ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Takalar. Penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi dan memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurusan Farmasi menjadi pilihannya, dan setelah lulus melalui jalur UM-PTKIN, ia resmi menjadi mahasiswa Farmasi di UIN Alauddin Makassar angkatan 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R