

**UJI EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK ETANOL
DAUN SAMBILOTO (*Andrographis paniculata* Ness) PADA MENCIT
JANTAN (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi Jurusan
Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

**ALAUDDIN
MAKASSAR**

OLEH :

ENDANG LESTARI
NIM. 70100109026

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2013

Penyusun,

Endang Lestari

NIM: 70100109026

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi banyak berkah kepada penulis, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam senantiasa mengalir indah dan tulus terucap kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan menuntun manusia dari jalan yang penuh dengan fenomena-fenomena duniawi yang penuh dengan kegelapan menuju jalan yang lurus dan penuh cahaya keindahan yang di ridhoi Allah SWT yaitu jalan menuju surga-Nya yang penuh dengan rahmat.

Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik karena dukungan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus kepada orang tuaku tercinta, ayahanda Tatmono Tasman, SH dan ibunda Nur Tati Djuraedjo beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan berupa materi, nasehat, dan doa yang tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Bapak Dr. H. Ahmad Sewang, M.Ag selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Drs. Wahyuddin G, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, sekaligus dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan masukan, kritik dan saran yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Drs. Dudung Abdullah selaku Dewan Penguji Agama yang banyak memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Muh. Fitrah, S.Si, Apt selaku Dewan penguji kompetensi, yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi apa-apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
10. Dosen Farmasi UIN Alauddin Makassar yang telah berbagi ilmu pengetahuan tak henti-hentinya selama ini.

11. Segenap Laboran Farmasi UIN Alauddin Makassar yang memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan Farmasi 09 Hidr09enasi, terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehingga saran dan kritik yang membangun sangatlah diperlukan, mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa bernilai ibadah disisi Allah SWT.



Makassar,

Agustus 2013

Endang Lestari

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
<i>A. Latar Belakang</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	4
<i>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i>	4
<i>D. Manfaat Penelitian</i>	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
<i>A. Uraian Demam</i>	6
1. Definisi Demam	6
2. Penyebab Demam.....	11



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3. Suhu Tubuh	12
4. Obat Antipiretik.....	15
B. <i>Uraian Obat Paracetamol</i>	20
C. <i>Tanaman Obat</i>	21
1. Klasifikasi Tumbuhan	21
2. Nama Daerah.....	21
3. Morfologi Tumbuhan.....	21
4. Kandungan Kimia	22
5. Kegunaan.....	22
D. <i>Hewan Uji</i>	23
1. Taksonomi Hewan Uji	23
2. Karakteristik Hewan Uji.....	23
3. Nilai Fisiologis Mencit.....	24
E. <i>Ekstraksi</i>	24
F. <i>Tinjauan Islam Tentang Penelitian Tanaman Obat</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. <i>Alat dan Bahan</i>	34
1. Alat yang Digunakan.....	34
2. Bahan yang Digunakan	34
B. <i>Metode Kerja</i>	34
1. Penyiapan Sampel	34
2. Pembuatan Ekstrak.....	34
3. Pembuatan NaCMC 1%.....	35
4. Pembuatan Larutan Pepton 5%.....	35
5. Pembuatan Suspensi Paracetamol.....	36

6. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Uji.....	36
7. Perlakuan Terhadap Hewan Uji	36
8. Pengamatan Hasil Pengujian.....	37
9. Analisa Hasil.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Hasil Penelitian</i>	38
1. Hasil ekstraksi daun sambiloto	38
2. Hasil perlakuan hewan uji	38
B. <i>Pembahasan</i>	39
BAB V PENUTUP	
A. <i>Kesimpulan</i>	45
B. <i>Saran</i>	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48
BIOGRAFI.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Suhu tubuh berdasarkan umur	13
2. Indeks tubuh	24
3. Hasil ekstraksi daun sambiloto	38
4. Hasil pengukuran penurunan suhu rektal mencit yang diberi ekstrak daun sambiloto dan kontrol	39
5. Perhitungan RAK antara NaCMC, ekstrak daun sambiloto, dan suspensi Paracetamol terhadap penurunan suhu rektal mencit	53
6. Sidik ragam hasil analisis data	60
7. Uji BNJ perlakuan	61
8. Uji BNJ kelompok	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar skema kerja ekstraksi daun sambiloto	48
2. Gambar skema kerja uji efek antipiretik.....	49
3. Gambar daun sambiloto.....	65
4. Gambar ekstraksi daun sambiloto.....	66
5. Gambar pembuatan ekstrak etanol daun sambiloto dengan menggunakan rotavapor	66
6. Gambar ekstrak kental daun sambiloto	67
7. Gambar hewan uji mencit.....	68
8. Gambar termometer digital.....	69
9. Gambar pemberian ekstrak dan kontrol secara oral	70
10. Gambar pengukuran suhu rektal mencit.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pengolahan sampel.....	48
2. Uji efek antipiretik	49
3. Perhitungan dosis	50
4. Perhitungan statistik RAK	53
5. Perhitungan RAK.....	55
6. Sampel.....	65
7. Ekstraksi sampel	66
8. Hewan uji	68
9. Alat pengujian.....	69
10. Perlakuan uji	70



ABSTRAK

Nama Penyusun : ENDANG LESTARI
Nim : 70100109026
Judul Skripsi : "Uji Efek Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*)"

Telah dilakukan uji efek antipiretik ekstrak etanol daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) pada mencit jantan (*Mus musculus*). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data ilmiah tentang pengaruh ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) terhadap penurunan suhu rektal mencit pada menit ke 30 hingga menit ke 120. Ekstraksi daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Hewan coba yang digunakan sebanyak 18 ekor mencit (*Mus musculus*) dibagi dalam 6 kelompok perlakuan dan masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit. Ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) diberikan secara oral pada hewan coba mencit (*Mus musculus*) dengan berbagai macam dosis yaitu 5 mg/30 gram BB mencit, 10 mg/30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, dan 20 mg/30 gram BB mencit dengan menggunakan pembanding suspensi parasetamol 1,95 mg/30 gram BB mencit dan NaCMC. Terlebih dahulu diukur suhu awal rektal mencit, setelah itu mencit didemamkan dengan menyuntikkan larutan pepton 5% secara intraperitoneal 1 ml/30 gram BB mencit. Kemudian setelah 60 menit suhu rektal kembali diukur dan mencit sudah mengalami demam, selanjutnya mencit diberi perlakuan dengan bahan uji ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness), NaCMC, dan parasetamol. Diukur suhu rektal mencit dengan interval 30 menit setelah penyuntikan pepton hingga menit ke-120. Data penurunan suhu rektal mencit diolah secara statistik menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK), dilanjutkan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dan kelompok tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) dengan dosis 5 mg/30 gram BB mencit, 10 mg/30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, dan 20 mg/30 gram BB mencit mempunyai efek antipiretik. Efek antipiretik ekstrak daun sambiloto yang paling efektif digunakan untuk menurunkan suhu rektal mencit demam yaitu pada dosis 10 mg/30 gram BB mencit karena tidak berbeda nyata dengan parasetamol.

Kata Kunci : Antipiretik, *Andrographis paniculata* Ness, *Mus musculus*

ABSTRACT

Name : ENDANG LESTARI

Reg. No. : 70100109026

Title of Thesis : “*Effects Test Antipyretics Sambiloto Leaves Ethanol Extract (Andrographis paniculata Ness) in Mice Males (Mus musculus)*”

Test have been conducted antipyretic effect of ethanol extract of sambiloto leaves (*Andrographis paniculata* Ness) in male mice (*Mus musculus*). This study aimed to obtain scientific data on the effects of bitter leaf extract (*Andrographis paniculata* Ness) to decrease rectal temperature of mice at minute 30 to minute 120. Extraction of bitter leaf (*Andrographis paniculata* Ness) is by maceration using 70% ethanol. Experimental animals used were 18 male mice (*Mus musculus*) were divided into 6 groups and each treatment consisted of 3 mice. Extract of bitter leaf (*Andrographis paniculata* Ness) was administered orally in animals mice (*Mus musculus*) with various doses of the 5 mg/30 g mice BB, BB 10 mg/30 g mice, 15 mg/30 g mice BB, and 20 BB mg/30 g mice by using a comparison of paracetamol suspension of 1.95 mg/30 g BB mice and NaCMC. First initial rectal temperature of mice was measured, after which have a fever mice by injecting a solution of 5% peptone intraperitoneal 1 ml/30 gram BB mice. Then after 60 minutes the rectal temperature was again measured and mice have a fever, then mice were treated with the test material extract of bitter leaf (*Andrographis paniculata* Ness), NaCMC, and paracetamol. Rectal temperature of mice was measured at intervals of 30 min after injection of peptone up to minute 120. Decreased rectal temperature of mice were statistically processed using the method Randomized Design (RBD), followed HSD test to determine differences between the treatments.

Results of this study showed that the extract of bitter leaf (*Andrographis paniculata* Ness) at a dose of 5 mg/30 g mice BB, BB 10 mg/30 g mice, 15 mg/30 g mice BB, and 20 mg/30 g mice BB has antipyretic effects . Antipyretic effects of bitter leaf extract most effectively used to reduce fever is a rectal temperature of mice at a dose of 10 mg/30 g BB mice was not significantly different due to paracetamol.

Key Word : Antipyretics, Andrographis paniculata Ness, *Mus musculus*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ilmiah tentang obat-obatan tradisional di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Korea, Cina, dan India. Akibatnya, perkembangan obat tradisional ditinjau air tidak terlampau pesat. Pemakainya hanya terbatas kalangan tertentu. Selain itu, obat tradisional juga belum bisa sepenuhnya diterima oleh kalangan medis. Ada perbedaan mendasar yang melatarbelakangi pemakaian ramuan tradisional zaman dulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, obat tradisional dikonsumsi dalam kondisi segar dan masih diolah secara sangat sederhana. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat terhadap ramuan tradisional juga masih tinggi karena saat itu belum banyak obat-obatan kimia yang diproduksi seperti sekarang. Sementara itu, alasan pemakaian obat tradisional saat ini lebih disebabkan semakin tingginya harga obat buatan pabrik yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat (Prapanza, Ivan 2011 : 1).

Sambiloto adalah tanaman obat yang khasiatnya sudah dikenal turun-temurun. Bahkan telah terkenal sebagai herba ajaib hingga ke seluruh pelosok dunia. China, Korea, Jepang, dan beberapa negara sudah melakukan penelitian tentang khasiat tumbuhan super pahit ini. Daun sambiloto memang terkenal khasiatnya sejak dulu. Ini terbukti dengan relief daun sambiloto ada di Candi Borobudur serta di Kitab Serat Rama

dalam bahasa Jawa Kawi di sekitar abad 18. Disebutkan sambiloto berkhasiat untuk mengobati prajurit Hanoman yang terluka ketika perang melawan Rahwana (Yuliatin, 2012 : 7).

Secara turun-temurun masyarakat menggunakan rebusan dari daun sambiloto untuk mencegah masuk angin atau influenza, menurunkan demam, dan mengobati luka.. Adapun kandungan sambiloto mengandung laktone yang terdiri dari deoksiandrografolid, dan homoandrografolid, 14-deoksi-11, 12-didehidroandrografolid, dan homoandrografolid. Selain itu, terdapat flavonoid, alkane, aldehyd, mineral (kalium, kalsium, dan natrium), asam kersik, dan damar (Yuliatin, 2012: 2).

Penelitian tentang sambiloto telah dilakukan yaitu dilakukan penelitian uji antimalaria dari ekstrak sambiloto terstandar (parameter kadar andrografolida) terhadap pertumbuhan *Plasmodium berghei* secara *in vivo* pada mencit dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak sambiloto terstandar dengan kadar andrografolida 10,82%, $\pm 0,37\%$ memiliki aktivitas antimalaria terhadap pertumbuhan *Plasmodium berghei* secara *in vivo* pada mencit dilihat dari harga ED50-nya sebesar 12,2223 mg ekstrak sambiloto terstandar/kg BB yang setara dengan 1,3200 mg senyawa andrografolida (Dwi Kusumawardhani, 2005).

Dalam sudut pandangan agama, bahwa meneliti bukan hanya sekedar anjuran semata tetapi dalam agama Islam juga menganjurkan untuk melakukan penelitian tentang tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Asy-Syu'ara'/26 : 7

كِرِيمٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا أَنْبَتْنَا كَرَّمًا لَأَرْضٍ إِلَى يَوْمِ الْوَأُولَم

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik. (Departemen Agama RI, 2002 : 513)

Oleh karena itu, Penelitian tentang khasiat tanaman obat khususnya sambiloto perlu dilakukan untuk menunjang penggunaan secara empiris masyarakat dengan data-data ilmiah. sehingga penggunaannya dapat lebih dipertanggungjawabkan.



B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) dapat berefek antipiretik pada mencit (*Mus musculus*) yang telah diinduksi dengan pepton
2. Berapakah dosis efektif ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) yang berefek antipiretik sebanding dengan parasetamol
3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap pengelolaan tumbuh-tumbuhan menjadi obat

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efek antipiretik ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) pada mencit (*Mus musculus*)
2. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) yang berefek antipiretik sebanding dengan parasetamol
3. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap pengelolaan tumbuh-tumbuhan menjadi obat

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang penggunaan ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) sebagai obat antipiretik (demam)
2. Diharapkan dengan hasil penelitian ini masyarakat dapat menyadari penggunaan ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness)

sebagai obat selain penggunaan obat sintesis, khususnya dalam menurunkan demam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Demam

1. Definisi Demam

Demam adalah kenaikan suhu tubuh diatas variasi sirkadian yang normal sebagai akibat dari perubahan pada pusat termoregulasi yang terletak dalam hipotalamus anterior. Suhu tubuh normal berkisar antara 36-37,2°C. Suhu tubuh normal dapat dipertahankan, ada perubahan suhu lingkungan, karena adanya kemampuan pada pusat termoregulasi untuk mengatur keseimbangan antara panas yang diproduksi oleh jaringan, khususnya oleh otot dan hati, dengan panas yang hilang. Dalam keadaan demam, keseimbangan tersebut bergeser hingga terjadi peningkatan suhu dalam tubuh. Hipertemia merupakan kenaikan suhu tubuh di atas titik penyetelan (set point) hipotalamus sebagai akibat dari kehilangan panas (Harrison, 1995 : 97).

Demam adalah peningkatan titik patokan (set point) suhu dihipotalamus. Dengan meningkatkan titik patokan tersebut, maka hipotalamus mengirim sinyal untuk meningkatkan suhu tubuh. Tubuh berespon dengan menggigil dan meningkatkan laju metabolisme basal. Demam timbul sebagai respon terhadap pembentukan sitokin tertentu, termasuk interleukin-1, interleukin-6, dan faktor nekrosis tumor. Sitokin ini disebut pirogen endogen (penghasil panas). Sitokin

pirogen dilepaskan oleh beberapa sel berbeda, termasuk monosit, makrofag, sel T helper, dan fibroblas dalam berespon terhadap infeksi atau cedera jaringan. Pirogen endogen menyebabkan demam dengan menghasilkan prostaglandin yang meningkatkan titik patokan termoregulasi hipotalamus. Apabila sumber pirogen dihilangkan (misalnya setelah sistem imun berhasil mengatasi mikroorganisme), maka kadarnya turun. Hal ini akan mengembalikan titik patokan suhu ke normal. Untuk jangka waktu yang singkat, suhu tubuh akan tertinggal dari pengembalian titik patokan tersebut dan hipotalamus akan menganggap bahwa suhu tubuh terlalu tinggi. Sebagai akibatnya, hipotalamus akan merangsang berbagai respon misalnya berkeringat untuk mendinginkan tubuh. Meskipun fungsi pirogen endogen telah dikenali selama lebih dari 30 tahun, bagaimana pirogen endogen mentransfer pesan infeksi dari perifer ke sistem saraf pusat (SSP) masih belum diketahui pasti. Hipotesis utama yang bertujuan menjelaskan proses di atas adalah bahwa interleukin-1 yang dihasilkan lokal merangsang pengaktifan saraf vagus yang kemudian menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat. Setelah sinyal mencapai sistem saraf pusat, terjadi pembentukan prostaglandin otak dan meningkatkan titik patokan termoregulasi hipotalamus. Hipotesis lain adalah bahwa interleukin dapat menembus sendiri sawar darah otak dan secara langsung merangsang pembentukan PGE hipotalamus. (Corwin, 2007: 160).

Fungsi pengaturan adalah untuk memelihara temperatur pusat (suhu dalam bagian tubuh dan dalam kepala) tetap pada nilai ambang rata-rata 37°C walaupun terjadi kerja simpangan pembentukan panas, penerimaan, dan pengeluaran panas. Nilai sebenarnya dicatat oleh reseptor suhu dalam hipotalamus dan disampaikan ke pusat-pusat temoregulasi (pusat panas) yang juga terletak dalam hipotalamus. Ini selanjutnya menerima impuls-impuls dari reseptor dingin dan reseptor panas dari kulit dan dengan demikian dalam kondisi untuk bereaksi dengan cepat terhadap beban panas dan dingin. Pada keadaan beban panas (misalnya pada kerja beban jasmani), banyak panas dikeluarkan melalui peningkatan pembedakan keringat dan melalui peningkatan aliran darah kulit. Pada keadaan beban dingin, tidak hanya pembebasan panas ditekan (terutama melalui vasokonstriksi perifer), tapi juga produksi panas ditingkatkan. Demam adalah gejala yang menyertai hampir semua infeksi, tapi juga terdapat pada penyakit-penyakit lain seperti beberapa bentuk tumor. Bahan-bahan bakteri dan virus dapat menyebabkan demam yang disebut demam pirogen eksogen. Pirogen eksogen tampaknya bekerja sebagai berikut, pirogen mula-mula merangsang fagosit untuk membentuk pirogen tubuh sendiri yang kemudian melalui melalui peningkatan sintesis prostaglandin mengatur nilai ambang suhu tubuh dalam pusat pengatur suhu ke suhu lebih tinggi. Segera setelah pengaturan nilai ambang pada tingkat yang lebih tinggi, suhu tubuh normal 37°C

bekerja sebagai suatu suhu pada keadaan dingin. Ini menyebabkan vasokonstriksi pembuluh kulit, gemetar karena dingin dan rasa dingin yang subjektif. Demam memiliki tiga fase yaitu: fase kedinginan, fase demam, dan fase kemerahan. Fase pertama yaitu fase kedinginan merupakan fase peningkatan suhu tubuh yang ditandai dengan vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan aktivitas otot yang berusaha untuk memproduksi panas sehingga tubuh akan merasa kedinginan dan menggigil. Fase kedua yaitu fase demam merupakan fase keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas di titik patokan suhu yang sudah meningkat. Fase ketiga yaitu fase kemerahan merupakan fase penurunan suhu yang ditandai dengan vasodilatasi pembuluh darah dan berkeringat yang berusaha untuk menghilangkan panas sehingga tubuh akan berwarna kemerahan. Pada penurunan demam (kembali pada nilai ambang normal), suhu pusat sebaliknya dirasakan sebagai terlalu tinggi. Pengeluaran keringat, vasodilatasi pembuluh-pembuluh darah di kulit dan rasa panas subjektif menandai fase penurunan demam (Mutschler, 1991: 193).

Beberapa tipe demam yang mungkin dijumpai antara lain:

1. Demam septik

Pada tipe demam septik, suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Sering disertai keluhan menggigil dan

berkeringat. Bila demam yang tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal dinamakan juga demam hektik.

2. Demam remiten

Pada tipe demam remiten, suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu normal. Perbedaan suhu mungkin tercatat dapat mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam septik.

3. Demam intermiten

Pada demam intermiten, suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam suatu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam diantara dua serangan demam disebut kuartana.

4. Demam kontinyu

Pada tipe demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari satu derajat. Pada tingkat demam yang terus menerus tinggi sekali disebut hiperpireksia.

5. Demam siklik

Pada tipe demam siklik terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti lagi oleh kenaikan suhu seperti semula (Harrison, 1995 : 101).

2. Penyebab Demam

Demam dapat disebabkan oleh faktor infeksi ataupun faktor non infeksi. Demam akibat infeksi bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Infeksi bakteri yang pada umumnya menimbulkan demam pada anak-anak antara lain pneumonia, bronkitis, osteomyelitis, appendisitis, tuberculosis, bakteremia, sepsis, bakterial gastroenteritis, meningitis, ensefalitis, selulitis, otitis media, infeksi saluran kemih, dan lain-lain. Infeksi virus yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain viral pneumonia, influenza, demam berdarah dengue, demam chikungunya, dan virus-virus umum seperti. Infeksi jamur yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain *coccidioides immitis*, *criptococcosis*, dan lain-lain. Infeksi parasit yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain malaria, toksoplasmosis, dan helminiasis. Demam akibat faktor non infeksi dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor lingkungan (suhu lingkungan yang eksternal yang terlalu tinggi, keadaan tumbuh gigi, dll), penyakit autoimun (arthritis, *systemic lupus erythematosus*, vaskulitis, dll), keganasan (Penyakit Hodgkin, Limfoma non-hodgkin, leukemia, dll), dan pemakaian obat-obatan (antibiotik, difenilhidantoin, dan antihistamin). Selain itu anak-anak juga dapat mengalami demam sebagai akibat efek samping dari pemberian imunisasi selama $\pm 1-10$ hari. Hal lain yang juga berperan sebagai faktor non infeksi penyebab demam adalah gangguan sistem saraf

pusat seperti perdarahan otak, status epileptikus, koma, cedera hipotalamus, atau gangguan lainnya (Nelwan, 1996:200).

3. Suhu Tubuh

Suhu tubuh merupakan hasil keseimbangan antara produksi panas dan hilangnya panas dari tubuh ke lingkungan. Produksi panas yang dihasilkan tubuh antara lain berasal dari:

- a. Metabolisme makanan (Basal Metabolic Rate)
- b. Olahraga
- c. Shivering atau kontraksi otot skeletet
- d. Peningkatan produksi hormon tiroksin (meningkatkan metabolisme seluler)
- e. Proses penyakit infeksi
- f. Termogenesis kimiawi (rangsangan langsung dari norepinefrin dan efinefrin atau dari rangsangan langsung simpatetik)

Sedangkan hilangnya panas tubuh terjadi melalui beberapa proses yaitu :

- a. Radiasi adalah pemindahan panas dari satu benda ke benda lain tanpa melalui kontak langsung, misalnya orang berdiri di depan lemari es yang terbuka
- b. Konduksi adalah pemindahan panas dari satu benda lainnya melalui kontak langsung, misalnya kontak langsung dengan es

- c. Konveksi adalah pemindahan panas yang timbul akibat adanya pergerakan udara, misalnya udara yang berdekatan dengan badan akan menjadi hangat
- d. Evaporasi adalah pemindahan panas yang terjadi melalui proses penguapan, misalnya pernapasan dari kulit. Sebagai contoh keringat meningkatkan pengeluaran panas tubuh. Suhu tubuh terjaga konstan meskipun adanya perubahan kondisi lingkungan. Hal ini disebabkan karena adanya proses pengaturan suhu melalui negatif *feedback* sistem (mekanisme umpan balik). Organ pengatur suhu yang utama adalah hipotalamus.

Tabel 1. Suhu tubuh berdasarkan umur (Asfuah, 2012 : 3)

Umur	Suhu (Celcius)	Suhu (Fahrenheit)
Bayi baru lahir	36,1 – 37,7	97 – 100
3 bulan	37,5	99,5
1 tahun	37,7	99,86
2 tahun	37,2	98,9
3 tahun	37,2	98,96
5 tahun	37,0	98,6
7 tahun	36,8	98,24
9 tahun	36,7	98,06
12 tahun	37	98,6
13 tahun	36,6	97,88
Dewasa	36	96,8

Sedangkan menurut Anas 2007 suhu tubuh dibagi menjadi :

- a. Hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36°C
- b. Normal, bila suhu tubuh berkisar antara $36 - 37,5^{\circ}\text{C}$
- c. Febris / pireksia, bila suhu tubuh antara $37,5 - 40^{\circ}\text{C}$

Ada beberapa lokasi pemeriksaan suhu tubuh diantaranya yaitu :

- a. Oral

Suhu dapat diambil melalui mulut baik menggunakan termometer kaca klasik atau yang lebih modern termometer digital yang menggunakan probe elektronik untuk mengukur suhu tubuh

- b. Dubur

Suhu yang diambil melalui dubur (menggunakan termometer gelas atau termometer digital) cenderung $0,5-0,7$ derajat lebih tinggi daripada ketika diambil oleh mulut

- c. Aksilia (ketiak)

Temperatur dapat diambil dibawah lengan dengan menggunakan termometer gelas atau termometer digital. Suhu yang diambil oleh rute ini cenderung $0,3-0,4$ derajat lebih rendah daripada suhu yang diambil oleh mulut

- d. Telinga

Termometer khusus dengan cepat dapat mengukur suhu gendang telinga yang mencerminkan suhu inti tubuh (suhu dari organ-organ internal). Mungkin suhu tubuh abnormal karena demam (suhu tinggi) atau hipotermia (suhu rendah). Demam ditandai

ketika suhu tubuh meningkat di atas 37°C secara oral atau $37,70^{\circ}\text{C}$ melalui dubur menurut American Medical Association. Hipotemia didefinisikan sebagai penurunan suhu tubuh dibawah 35°C (Asfuah, 2012 : 3).

4. Obat Antipiretik

Antipiretik merupakan golongan obat yang dipergunakan untuk menurunkan suhu tubuh bila demam. Cara kerja antipiretik antara lain dengan melebarkan pembuluh darah di kulit, sehingga terjadi pendinginan darah oleh udara luar. Sebagian obat antipiretik juga merangsang berkeringat. Penguapan keringat turut menurunkan suhu badan. Kerja obat antipiretik adalah mempengaruhi bagian otak yang mengatur suhu badan. Bagian ini terletak di dasar otak. Antipiretik bekerja dengan merangsang reseptor nyeri yang letaknya pada ujung syaraf bebas di kulit, selaput lendir dan jaringan lain. Dari tempat ini rangsangan dialirkan melalui syaraf sensorik ke susunan syaraf pusat melalui sumsum tulang belakang ke hipotalamus tepatnya optikus kemudian ke pusat nyeri dalam otak besar, dimana rangsang terasa sebagai nyeri. Obat antipiretik bersifat analgesik oleh karena itu biasa disebut golongan obat analgesik-antipiretik. Analgesik adalah golongan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri seperti nyeri kepala, nyeri gigi, nyeri sendi, dan lain-lain. Contoh obat analgesik misalnya aspirin, parasetamol, antalgin, dan lain-lain. Ada juga analgesik potent yang biasanya termasuk golongan opium seperti morfin, pethidin, fentanil, dan lain-lain. Obat antipiretik pada umumnya dipergunakan untuk mengobati

penyakit dengan gejala demam dan nyeri seperti influenza dan salesma. Obat analgesik-antipiretik terdiri atas empat golongan yaitu golongan salisilat (aspirin, asetosal), golongan paraaminofenol (parasetamol), golongan pirazolon (metamizol), dan golongan asam mefenamat (Anief, 2004 : 20).

a. Salisilat

Salisilat merupakan prototipe AINS yang sampai sekarang masih digunakan. Termasuk salisilat adalah Na-salisilat, aspirin (asam asetil salisilat), salisilamid, dan metil salisilat. Metil salisilat bersifat toksik jika tertelan. Oleh karena itu, hanya dipakai topikal untuk menghangatkan kulit dan antigatal. Efek antipiretik dan anti inflamasi salisilat terjadi karena penghambatan sintesis prostaglandin di pusat pengatur panas dalam hipotalamus dan perifer di daerah target. Lebih lanjut, dengan menurunkan sintesis prostaglandin, salisilat juga mencegah sensitisasi reseptor rasa sakit terhadap rangsangan mekanik dan kimiawi. Salisilat menurunkan suhu tubuh penderita demam dengan jalan menghalangi sintesis dan pelepasan PGE₂. Aspirin mengembalikan termostat kembali ke normal dan cepat menurunkan suhu tubuh penderita demam dengan meningkatkan pengeluaran panas sebagai akibat vasodilatasi perifer dan berkeringat. Aspirin tidak mempunyai efek pada suhu tubuh normal (Mycek, 1995: 407).

Golongan salisilat dapat mengiritasi lapisan mukosa lambung. Orang yang peka pada efek ini akan mengalami mual setelah minum aspirin. Dalam lambung, prostaglandin berperan serta dalam

mekanisme perlindungan mukosa dari asam lambung atau gastrin. Prostaglandin berfungsi meningkatkan sekresi mukus dan bikarbonat yang berfungsi meningkatkan daya tahan membran mukosa lambung (Priyanto, 2008:117).

b. Asetaminofen (Parasetamol)

Obat ini bermanfaat untuk analgetik dan antipiretik. Efek antipiretiknya terjadi karena langsung mempengaruhi pusat pengatur panas dihipotalamus. Parasetamol efektif untuk nyeri kepala karena kemampuannya menghambat sintesis prostaglandin di susunan saraf pusat, tetapi tidak dapat menghambat sintesis prostaglandin di perifer, sehingga tidak efektif untuk radang, nyeri otot, dan arthritis (Priyanto, 2008: 118).

Efek antipiretik paracetamol ditimbulkan oleh gugus aminobenzen, mekanismenya berdasarkan aksi sentral pada pusat pengaturan suhu dihipotalamus, sehingga terjadi vasodilatasi perifer yang menyebabkan naiknya aliran darah pada kulit, berkeringat dan berkurangnya panas. Aksi sentral tersebut akibat penghambatan sintesis prostaglandin pada hipotalamus. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam ½-1 jam dan waktu paruh ($t_{1/2}$) sekitar 2 jam. Obat tersebar ke seluruh cairan tubuh. Terikat 20-50% pada protein plasma. Metabolisme di hati *Glucuronide conjugates*(60%), *sulfuric acid conjugates* (35%), dan ekskresi ginjal dalam bentuk terkonjugasi.

Parasetamol lebih diakui keampuhannya sebagai anti nyeri dan antipiretik daripada sebagai anti inflamasi. Kira-kira sudah 30 tahun parasetamol bertahan sebagai obat yang paling dicari. Parasetamol dapat digunakan oleh segala umur juga aman digunakan oleh ibu hamil dan menyusui dengan konsultasi ke dokter atau apoteker sebelum penggunaannya. Obat ini jarang menyebabkan iritasi lambung dan tidak menyebabkan penggumpalan darah, oleh karena itu bisa digunakan oleh pasien dengan gangguan lambung. Selain itu, pasien yang alergi terhadap aspirin juga dapat menggunakan obat ini. Namun perlu diperhatikan apabila penggunaan obat ini bersamaan dengan analgesik lain seperti aspirin atau yang lain, dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada hati dan ginjal. Dikatakan pula bahwa penggunaan parasetamol yang berlebihan juga dapat menyebabkan efek samping pada hati. Penggunaan parasetamol bersamaan dengan kolestiramin dapat mengurangi penyerapan parasetamol sebaliknya apabila digunakan bersamaan dengan metoklopramid dan domperidon, penyerapan parasetamol justru meningkat. Penggunaan parasetamol dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan efek antikoagulan (anti penggumpalan darah) dari golongan obat antikoagulan. Karena itu penggunaan bersamaan ini harus dalam pengawasan dokter karena kemungkinan terjadinya pendarahan. Apabila anda sedang dalam

perawatan menggunakan parasetamol, hindari konsumsi alkohol, antikoagulan oral, aspirin, pil tidur atau tranquilizer dan obat yang berkaitan dengan penyakit hati. Parasetamol memiliki efek samping yang akan membahayakan dalam hal kelainan darah, pankreatitis akut dan kerusakan hati setelah over dosis dan kelainan kulit. Mekanisme parasetamol sama dengan aspirin karena kesamaan dalam struktur. Parasetamol bekerja mengurangi produksi prostaglandin yang terlibat dalam proses nyeri dan edema, dengan menghambat enzim cyclooxygenase (COX). Meski demikian, ada perbedaan penting antara efek keduanya. Seperti diketahui, prostaglandin berpartisipasi terhadap respon inflamatori, sebaliknya parasetamol tidak memperlihatkan efek anti inflamasi. Parasetamol menghambat prostaglandin yang memegang peranan sebagai pelindung saluran cerna (Nelwan, 1996: 145).

c. Turunan Pirazolon

Aminofenazon yang memiliki sifat analgetika, antipiretik, dan antiinflamasi yang baik, dahulu selama waktu yang lama merupakan obat yang banyak digunakan. Akan tetapi setelah diketahui bahwa dengan adanya nitrit (kebanyakan berasal dari makanan) dalam cairan lambung yang asam setelah penguraian gugus dimetilamino dalam hewan percobaan dapat terbentuk dimetilnitrosamina yang dikenal sebagai karsinogen maka aminofenazon telah ditarik dari perdagangan (Mutschler, 1991 : 202).

d. Asam mefenamat

Asam mefenamet digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi. Asam mefenamet kurang efektif dibandingkan aspirin. Asam mefenamet terikat sangat kuat pada protein plasma (Ganiswarna, 2007: 240).

B. Uraian obat

1. Paracetamol (Dirjen, POM. FI edisi III, : 37)

Nama resmi	: ACETAMINOPHENUM
Nama lain	: Asetaminofen, Parasetamol
Rumus molekul	: $C_8H_9NO_2$
Berat molekul	: 151,16
Pemerian	: Hablur, atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit
Kelarutan	: Larut dalam 70 bagian air, dalam 70 bagian etanol (95%) p, dalam 13 bagian aseton p, dalam 40 bagian gliserol p, dan dalam 9 bagian propilenglikol p, larut dalam larutan alkali hidroksida
Kegunaan	: Analgetik dan Antipiretik
Penyimpanan	: Wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya.

C. *Tanaman Obat*

1. **Klasifikasi tumbuhan** (Widyaningrum, 2011: 1022)

Divisi : Angiospermae
 Kelas : Dicotyledonae
 Subkelas : Gamopetalae
 Ordo : Personales
 Famili : Acanthaceae
 Subfamili : Acanthoidae
 Genus : *Andrographis*
 Spesies : *Andrographis paniculata* Ness

2. **Nama daerah**

Pagaga (Makassar), sambiloto (Sulawesi tengah), sambilata (Melayu), ampadu tanah (Sumatera Barat), sambiloto, ki pait, bidara, andiloto (Jawa Tengah), ki oray (Sunda), dan pepaitan (Madura) (Widyaningrum, 2011: 1023).

3. **Morfologi tumbuhan**

Sambiloto tumbuh liar ditempat terbuka, seperti dikebun, tepi sungai, tanah kosong yang agak lembap, atau dipekarangan. Tumbuh didataran rendah sampai ketinggian 700 meter diatas permukaan laut. Merupakan terna semusim, tinggi 50-90 cm, batang disertai banyak cabang berbentuk segi empat (kwadrangularis) dengan nodus yang membesar. Daun tunggal, bertangkai pendek, letak berhadapan bersilang, bentuk lanset, pangkal runcing, ujung meruncing, tepi rata,

permukaan atas hijau tua, bagian bawah hijau muda, panjang 2-8 cm , lebar 1-3 cm. Perbungaan rasemosa yang bercabang, membentuk malai, keluar dari ujung batang atau ketiak daun. Bunga berbibir berbentuk tabung, kecil-kecil, warnanya putih bernoda ungu. Buah kapsul berbentuk jorong, panjang sekitar 1,5 cm, lebar 0,5 cm, pangkal dan ujung tajam, bila masak akan pecah membujur menjadi 4 keping. Biji gepeng kecil-kecil, warnanya cokelat muda. Perbanyakkan dengan biji atau setek batang (Widyaningrum, 2011 : 1022).

4. Kandungan Kimia

Sambiloto mengandung laktone yang terdiri dari deoksiandrografolid, andrografolid, neoandrografolid, 14-deoksi-11-12-didehidroandrografolid, dan homoandrografolid. Juga terdapat flavonoid, alkane, keton, aldehid, mineral (kalium, kalsium, dan natrium), asam kersik, dan damar. Flavonoid diisolasi terbanyak dari akar, yaitu polimetoksisflavon, androgravin, pan ikulin, mono-O-metilwithin, dan apigenin-7,4-dimetileter (Widyaningrum, 2011: 1025).

5. Kegunaan

Sambiloto ini berkhasiat untuk mengatasi beberapa penyakit, baik penyakit yang ringan, sampai penyakit paling ganas sekaligus. Penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan sambiloto antara lain: hepatitis, infeksi saluran empedu, disentri basiler, tifoid, diare, influenza, radang amandel, abses paru, radang paru, radang saluran

nafas, radang ginjal akut, radang telinga tengah, radang usus buntu, sakit gigi, demam, malaria, kencing nanah, diabetes melitus, TB paru, batuk rejan, asma, dan hipertensi (Yuliatin, 2012 : 8).

D. Hewan Uji

1. Taksonomi hewan uji (Malole, 1989 : 5)

Kingdom : Animalia
Divisi : Vertebrata
Kelas : Mammalia
Subkelas : Theria
Ordo : Rodentia
Famili : Muridae
Genus : Mus
Spesies : *Mus Musculus*

2. Karakteristik hewan uji

Mencit/*Mus musculus* adalah hewan pengerat (Rodentia) yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik.

3. Nilai fisiologis menciit

Tabel 2. Indeks Tubuh (Malole,1989 : 6)

Kriteria	Nilai
Berat badan : - Jantan	20 – 30 g
Luas Permukaan tubuh	20 g: 36 cm ²
Harapan hidup	1,5 – 3,0 tahun
Konsumsi makanan	15 g/100 g/hari
Konsumsi air minum	15 ml/100 g/hari
Waktu pemeliharaan	7– 9 bulan/6 – 10
Detak jantung	76 – 80 mg/kg

E. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995 : 7).

Penyaringan (ekstraksi) adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang disaring mengandung zat aktif yang dapat larut dan juga zat yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidat, protein, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi kecepatan penyaringan adalah kecepatan difusi zat yang terdapat dalam berbagai

simplisia dapat digolongkan ke dalam alkaloid, glikosida, flavonoid (Ditjen POM, 1986 : 89).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harbone, J. B. 1987 : 200).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dibagi ke dalam 2 cara yaitu :

1. Cara dingin

- a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapakali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang terus-menerus. Remaserasi

berarti dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama dan seterusnya

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan (kamar). Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak) terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan.

2. Cara Panas

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik

b. Soxlet

Soxlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) yaitu secara umum dilakukan pada temperatur $40^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$

d. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98⁰C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Dirjen POM, 2000 : 7).

F. Tinjauan Islam tentang penelitian tumbuhan obat

Manusia sebelum memenuhi kewajiban memenuhi hak-hak orang lain dan menjaga lingkungannya, manusia wajib terlebih dahulu memenuhi menjaga hak-hak tubuh diri sendiri. Termasuk dalam hal ini mengobati badan ketika sakit. Allah telah menciptakan berbagai hal yang luar biasa di muka bumi ini, Allah menciptakan suatu di alam semesta ini pasti terdapat suatu manfaat di baliknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di dunia seharusnya mencari makna dari rahasia yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16 : 11

رَاتِ كُلِّ وَمِنَ وَالْأَعْنَبِ وَالنَّخِيلِ وَالزَّيْتُونَ الزَّرْعَ بِهِ لَكُمْ يُنْبِتُ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّآيَةَ ذَٰلِكَ فِي إِنْ أَلْتُمْ

Terjemahnya :

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (Departemen Agama RI, 2002 : 365)

Dengan ilmu yang telah dimiliki dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju manusia harus menggali rahasia-rahasia tersebut. Banyak tanaman obat yang telah Allah tumbuhkan di atas muka bumi yang telah Allah ciptakan begitu indah dan penuh manfaat. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan maksud yang luar biasa bagi orang yang ingin mengetahui kebesaran Allah. Salah satu tanaman obat tersebut yaitu daun sambiloto. Meskipun berasa sangat pahit namun memiliki banyak macam manfaat dalam pengobatan. Hamparan hijau dipelapak mata manusia harus dimengerti dan diperhatikan. Allah menciptakan semua itu demi kesejahteraan manusia. Allah menciptakan begitu banyak tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini dengan segala macam kebaikannya yang dapat kita manfaatkan dengan kebaikan pula. Dalam hal ini pemanfaatan tumbuhan yang baik yang telah Allah ciptakan salah satunya adalah untuk kesehatan. Begitu banyak tumbuhan yang baik telah Allah ciptakan di muka bumi ini dan bermanfaat dan manusia wajib mensyukurinya atas nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Sebagaimana Dalam firman Allah Q.S. Al-Hajj/22 : 65

بِالْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ سَخَّرَ اللَّهُ أَنْ تَرَأَوْا

Terjemahnya :

“Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi “. (Departemen Agama RI, 2002 : 472)

membantu dan melengkapinya. Ilmu pengetahuan mengungkapkan keajaiban yang terdapat di dalam alam dunia yang diciptakan Allah, dan mengisi hati mereka dengan rasa kagum dan takut, sedangkan agama menarik perhatian orang mukmin serta mengundangnya untuk mengamati apa yang di sekelilingnya, mencari dan memikirkan tentang keajaiban Maha Penciptanya (Rahman Afzalur, 1989 : 145-146).

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan (Rahim, 2007 : 5).

Demikian arahan berfikir akan ciptaan Allah swt yang berguna bagi manusia, tumbuhan setidaknya memiliki fungsi sebagai obat yang dengan khasiat yang berbeda dan beraneka macam mulai dari akar, batang, dan daun seperti halnya daun sambiloto yang memiliki berbagai macam manfaat sebagai obat dan memiliki banyak kandungan zat kimia. Hal ini juga mengajak agar kita berfikir optimis bahwa penyakit akan sembuh dengan izin Allah swt. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S. Asy-Syu'ara'/26 : 80

يَشْفِينِ فَهُوَ مَرَضٌ وَإِذَا

Terjemahnya :

“Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku,”.(Departemen Agama RI, 2002 : 520)

Kutipan ayat di atas menjelaskan firman-Nya: (وَإِذْ مَرَضْتُ) *wa izda maridhtul/dan apabila aku sakit*. Penggunaan kata *izdal/apabila* dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ini merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Pernyataan “Apabila aku sakit” bukan ”Apabila Allah menjadikan aku sakit”. Namun demikian, dalam penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan, dan minum secara tegas beliau mengatakan bahwa Yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam itu (Shihab, 2002 : 25).

Allah SWT menciptakan segala yang ada di bumi tidaklah percuma melainkan ada hikmah dan manfaat yang dapat dipetik. Ilmu pengetahuan yang telah kita pelajari ada karena Tuhan menginginkan hamba-Nya berpikir untuk membuat perubahan yang bermanfaat dan mampu mengatasi hambatan dan ujian yang diberikan dengan berpikir dan berusaha, sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. Yunus/10 : 57

الْصُّدُورِ فِي لَمَّا وَشَفَاءَ رَبِّكُمْ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَتْكُمْ قَدْ آتَىٰهَا

لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً وَهُدًى ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Departemen Agama RI, 2002 : 289)

Islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir, atau pengobatan yang mengarah kemusyrikan. Sebaliknya Islam sangat menghargai bentuk – bentuk pengobatan yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan. Penelitian, eksperimen ilmiah, dan hukum sebab – akibat.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam Bersabda :

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Artinya :

“Barang siapa yang mengobati, namun ia tidak menguasai ilmu pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab” (Al – Mundziri, Imam. 2003 : 220).

Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam dengan ucapan, tindakan, dan keputusannya merupakan teladan yang menunjukkan kepada kita bagaimana pengobatan yang baik. Pengobatan versi Beliau adalah pengobatan yang merujuk pada ilmu pengetahuan dan eksperimen, bukan pada perkiraan ataupun fatamorgana belaka.


Ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk menelusuri tanaman yang baik (thayyib) dan dibolehkan (halal). Menurut syariat Islam sebagaimana terkandung dalam dalam Q.S. An-Nahl/16 : 114

كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ نِعْمَتًا وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا أَلَّهِ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ

Terjemahnya :

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.(Departemen Agama RI, 2002 : 381).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan antara lain gelas piala (*Pyrex*[®]), gelas ukur (*Pyrex*[®]), timbangan analitik (*AND*[®]), lumpang dan alu, kompor listrik, termometer digital, spuit (*One Med*[®]), vial dan jarum oral (kanula)

2. Bahan yang digunakan

Bahan-bahan penelitian berupa daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness), tablet parasetamol, pepton, API (Air Pro Injeksi), air suling dan NaCMC

B. Metode Kerja

1. Penyiapan sampel

Sampel yang digunakan adalah daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) diperoleh dan dikumpulkan di Kabupaten Poso.

Daun sambiloto yang telah dikumpul, dicuci bersih lalu dipotong-potong kecil, kemudian dikeringkan di udara terbuka, terlindung dari sinar matahari langsung, setelah kering selanjutnya diserbukkan.

2. Pembuatan ekstrak

Serbuk 400 gram daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) dimasukkan ke dalam bejana maserasi lalu ditambahkan pelarut etanol 70% 1000 ml hingga terbasahi, selanjutnya ditambahkan etanol 70% 1500 ml hingga seluruh sampel terendam. Dibiarkan selama 1 hari

dalam bejana tertutup dan terlindung cahaya sambil diaduk sesering mungkin. Setelah 1 hari, kemudian disaring ke dalam wadah penampung dan ampasnya selanjutnya dimaserasi kembali dengan cairan penyari etanol yang baru. Maserasi ini dilakukan selama 3 kali penyarian. Etanol 70% yang digunakan selama maserasi sebanyak 6500 ml. Hasil penyarian yang diperoleh kemudian dirotavapor dan diletakkan di dalam wadah selama beberapa hari hingga diperoleh ekstrak etanol kental. Ekstrak kental dibebaskan dengan cara ekstrak ditambahkan dengan 5 tetes air suling kemudian dipanaskan di atas penangas sampai menguap. Hingga diperoleh ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness). Ekstrak yang diperoleh ditimbang, sehingga didapatkan berat ekstrak daun sambiloto.

3. Pembuatan NaCMC 1%

Sebanyak 1 gram NaCMC dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam 50 ml air suling panas (suhu 70⁰ C) sambil diaduk hingga terbentuk larutan koloidal dan dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 100 ml.

4. Pembuatan larutan pepton 5%

Larutan pepton 5% dibuat dengan menimbang 5 g pepton, dilarutkan dalam 100 ml air untuk injeksi.

5. Pembuatan suspensi parasetamol

Tablet paracetamol ditimbang sebanyak 20 tablet, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet dan didapatkan rata-ratanya yaitu 603,5 mg. Dimasukkan semua tablet paracetamol di dalam lumpang dan digerus hingga halus dan homogen. Kemudian ditimbang tablet paracetamol yang telah dihaluskan sebanyak 235,365 mg yang disuspensikan hingga 100 ml menggunakan NaCMC

6. Pemilihan dan penyiapan hewan uji

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) yang dewasa dan sehat, dengan berat badan 20-30 gram

Hewan uji yang digunakan sebanyak 18 ekor, dibagi dalam 6 kelompok perlakuan dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor mencit

7. Perlakuan terhadap hewan uji

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan dikelompokkan menjadi 6 kelompok perlakuan yang masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit. Pertama-tama diukur suhu rektal awal mencit. Kemudian diinduksi demam menggunakan pepton 5% 1 ml/30 gram BB mencit secara intraperitoneal. Setelah 1 jam diukur kembali suhu rektalnya, kemudian masing-masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut

- a. Kelompok 1 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun sambiloto per oral, dosis 5 mg/30 gram BB mencit

- b. Kelompok 2 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun sambiloto per oral, dosis 10 mg/30 gram BB mencit
- c. Kelompok 3 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun sambiloto per oral, dosis 15 mg/30 gram BB mencit
- d. Kelompok 4 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun sambiloto per oral, dosis 20 mg/30 gram BB mencit
- e. Kelompok 5 : kontrol negatif NaCMC dengan perlakuan pemberian per oral dosis 0,1 mg/30 gram BB mencit
- f. Kelompok 6 : kontrol positif Paracetamol dengan perlakuan pemberian per oral dosis 1,95 mg/30 gram BB mencit

8. Pengamatan hasil pengujian

Pengamatan dilakukan dengan mengukur suhu rektal hewan percobaan tiap 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit setelah pemberian ekstrak daun sambiloto dan kontrol

9. Analisa Hasil

Data hasil pengamatan dikumpulkan dan dilakukan analisis data secara statistika dengan menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Hasil Ekstraksi Daun Sambiloto

Ekstraksi 400 gram simplisia daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) yang dimaserasi menggunakan larutan etanol 70% hingga diperoleh ekstrak kental sebanyak gram. Data dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 : Hasil Ekstraksi daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness).

No	Jenis Ekstrak	Pelarut	Bobot (gram)	Rendamen
1.	Ekstrak Kental	Etanol 70%	65,7338 gram	16,43%

2. Hasil Perlakuan Uji

Mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian sediaan uji ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) secara oral menunjukkan perubahan suhu yang berbeda-beda dan dibandingkan dengan perlakuan kontrol positif dan negatif. Hasil pengukuran rata-rata penurunan suhu mencit yang diberi perlakuan tersebut disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengukuran penurunan suhu rektal mencit yang diberi pemberian ekstrak daun sambiloto dan kontrol

Perlakuan	Replikasi	Suhu Awal	Suhu Setelah P.Pepton	Penurunan suhu rektal mencit setelah pemberian ekstrak dan kontrol pada menit ke			
				suhu 30 menit	suhu 60 menit	suhu 90 menit	suhu 120 menit
NaCMC	1	37	38	37,9	38	37,9	37,9
	2	36,9	37,9	37,9	37,8	37,9	37,8
	3	36,5	37,9	37,8	37,8	37,7	37,7
5 mg/30 gram BB mencit	1	36,5	37,8	37,5	37,3	37	36,9
	2	36,6	37,9	37,2	37,2	37,5	37
	3	36,2	37,9	37,3	37	37,2	36,9
10 mg/30 gram BB mencit	1	36,7	38,1	37	36,9	36,8	36,7
	2	36,9	38,2	37,1	36,9	36,8	36,8
	3	36,7	38	37	36,8	36,7	36,6
15 mg/30 gram BB mencit	1	37	38,3	37,8	37,1	37,3	36,9
	2	36,6	38	37,2	37,2	36,9	36,6
	3	37	38	37,7	37,3	36,5	36,5
20 mg/30 gram BB mencit	1	36,5	37,9	37,7	37,1	37,5	36,9
	2	36,9	38	37,9	37	37,5	37
	3	36,5	37,8	37,6	37,3	37,1	36,9
Paracetamol	1	36,5	38,1	37,5	36,7	36,5	36,5
	2	36,5	37,9	36,9	36,6	36,4	36,4
	3	36,2	38	37,1	36,8	36,4	36,3

B. Pembahasan

Antipiretik merupakan golongan obat yang dipergunakan untuk menurunkan suhu tubuh bila demam. Demam didefinisikan suatu keadaan. Ketika suhu tubuh meningkat melebihi suhu normal. Demam terjadi ketika ada stimulasi pada monosit makrofag yang sesuai, sel-sel ini menghasilkan sitokin pirogenik, yang menyebabkan peningkatan set point lewat efeknya di hipotalamus (Corwin, 2007 : 162).

Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antipiretik yaitu sambiloto. Pemanfaatan daun sambiloto sebagai obat penurun panas masih secara empiris sehingga perlu dilakukan penelitian yang bersifat ilmiah dalam hal ini efek antipiretiknya untuk menurunkan suhu tubuh sehingga dapat dibuktikan keamanan dan pemanfaatannya. Secara turun-temurun masyarakat menggunakan rebusan daun sambiloto untuk mencegah masuk angin atau influenza, menurunkan demam, dan mengobati luka (Yuliatin, 2012: 2).

Ekstraksi daun sambiloto dilakukan secara maserasi menggunakan cairan penyari etanol 70%. Ekstraksi dilakukan untuk menyari senyawa yang bersifat polar sehingga digunakan cairan penyari etanol 70%. Ekstraksi dengan metode maserasi merupakan ekstraksi secara dingin, metode ini tidak perlu pemanasan dalam proses ekstraksinya yang diperkirakan nantinya akan merusak senyawa kimia yang terdapat dalam sampel. Maserasi juga dilakukan dalam ruangan tertutup untuk menghindari pengaruh cahaya matahari terhadap stabilitas senyawa-senyawa yang akan diambil. Ekstrak yang diperoleh setelah pemekatan kemudian disimpan dalam eksikator untuk menghindari kerusakan senyawa kimia. Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak kental daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) sebanyak 65,7338 gram dan rendamennya 16,43%.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) dibagi dalam 6 kelompok pengujian yaitu pengujian terhadap

ekstrak daun sambiloto secara oral dengan dosis 5 mg, 10 mg, 15 mg, dan 20 mg masing-masing per 30 gram BB mencit, sebagai kontrol positif digunakan paracetamol 1,95 mg/ 30 gram BB mencit dan kontrol negatif digunakan NaCMC 0,1 mg/30 gram BB mencit. Mencit dibuat demam dengan pemberian larutan pepton 5% secara intraperitoneal 1 ml/30 gram BB mencit. Pemberian bahan uji berupa ekstrak daun sambiloto dan kontrol pada mencit adalah 60 menit sesudah penginjeksian pepton.

Pepton merupakan protein digunakan sebagai inducer demam yang akan menyebabkan demam pada mencit. Protein yang berlebih pada tubuh mencit akan menyebabkan toksik sehingga mencit akan mengalami demam, hal ini disebabkan karena alat-alat tubuh pada mencit tidak dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi. Pemberian protein berupa pepton yang berlebih pada mencit ini juga dapat merubah keseimbangan protein dalam darah sehingga akan menyebabkan demam. Pepton menginduksi terjadinya demam pada mencit melalui reaksi tubuh. Sesaat setelah penyuntikan pepton ± 5 menit mencit mengalami berbagai hal yaitu menggigil, peningkatan rasa haus, peningkatan denyut jantung dan mengantuk. Pengukuran suhu demam pada mencit yang dilakukan pada rektal optimal pada waktu 1 jam sesudah penyuntikan. Pada waktu tersebut mencit mengalami demam yang optimal. Protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Kelebihan asam amino dapat memberatkan ginjal dan hati yang harus memetabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Kelebihan protein akan menyebabkan

dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum darah, asidosis dan demam.

Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit jantan dengan berat badan 20-30 gram. Alasan pemelihan mencit jantan karena mencit jantan tidak mengalami siklus hormonal seperti mencit betina. Hewan sebagai model atau sarana percobaan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain persyaratan genetis atau keturunan dan lingkungan yang memadai dalam pengelolaannya, di samping faktor ekonomis, mudah tidaknya diperoleh, serta mampu memberikan reaksi biologis yang mirip kejadiannya pada manusia (Lisdiyanti, 2008 : 82).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan rata-rata selisih penurunan suhu rata-rata antar waktu terhadap suhu demam dari menit ke 30 hingga menit ke 120 menit. Untuk dosis 5 mg/30 gram, 10 mg/ 30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, 20 mg/30 gram BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 30 masing-masing berturut-turut sebesar 0,54, 1,07, 0,54, 0,17, 0,07, dan 0,84⁰C. Untuk dosis 5 mg/30 gram, 10 mg/ 30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, 20 mg/30 gram BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 60 masing-masing berturut-turut sebesar 0,7, 1,24, 0,9, 0,77, 0,07, dan 1,3⁰C. Untuk dosis 5 mg/30 gram, 10 mg/ 30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, 20 mg/30 gram BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 90 masing-masing berturut-turut sebesar 0,64, 1,34, 1,2, 0,54,

0,1, dan 1,57⁰C. Untuk dosis 5 mg/30 gram, 10 mg/ 30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, 20 mg/30 gram BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 120 masing-masing berturut-turut sebesar 0,94, 1,4, 1,44, 0,97, 0,14, dan 1,6⁰C. Penurunan suhu yang hampir sama dengan kontrol positif Paracetamol yaitu pada dosis 10 mg/30 gram BB mencit.

Hasil analisa statistik dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pengaruh sediaan terhadap suhu tubuh dan pengaruh lama pemberian (onset) terhadap suhu tubuh mencit menunjukkan hasil bahwa pemberian beberapa dosis ekstrak daun sambiloto memberikan antipiretik yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel Anava dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf 5 dan 1%. Dari hasil analisis statistik juga diperoleh koefisien keseragaman (KK) sebesar 1,40%. Sehingga dengan nilai KK dibawah 10% maka dilanjutkan uji BNJ (Beda Nyata Jujur). Pada uji lanjutan BNJ perlakuan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata antara perlakuan ekstrak 10 mg/30 gram BB mencit dengan suspensi parasetamol yaitu dengan kata lain memiliki efek yang hampir sama dengan parasetamol. Sedangkan ekstrak 5 mg/30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, dan 20 mg/30 gram BB mencit mempunyai perbedaan yang sangat nyata dengan kontrol NaCMC . Jadi, dosis 5 mg/30 gram BB mencit, 10 mg/30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, dan 20 mg/30 gram BB mencit dapat memberikan efek antipiretik terhadap mencit. Pada uji lanjutan BNJ kelompok suhu awal,

suhu demam, suhu setelah pemberian ekstrak menit ke 30, 60, 90, dan 120 menit pada dosis ekstrak 5 mg/30 gram BB mencit menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata pada menit ke 120 menit dengan suhu awal sebelum didemamkan. Artinya terjadi penurunan suhu kembali ke suhu awal menit ke 120. Dosis ekstrak 10 mg/30 gram BB mencit menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata pada menit ke 60, 90, dan 120 menit dengan suhu awal sebelum didemamkan. Artinya terjadinya penurunan suhu kembali ke suhu awal mulai dari menit ke 60. Dosis ekstrak 15 mg/30 gram BB mencit menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata pada menit ke 90, dan 120 menit dengan suhu awal sebelum didemamkan. Artinya terjadinya penurunan suhu kembali ke suhu awal mulai dari menit ke 90. Dosis ekstrak 20 mg/30 gram BB mencit menunjukkan perbedaan yang nyata pada menit ke 120 dan sangat nyata pada menit ke 30, 60, dan 90 dengan suhu awal sebelum didemamkan. Jadi, pada dosis ekstrak 20 mg/30 gram BB mencit tetap terjadi penurunan suhu yang demam tetapi tidak mencapai suhu awal sebelum didemamkan.

Penentuan efek penurunan demam dengan mengukur suhu setelah pemberian obat hingga rentang waktu 2 jam. Kondisi demam pada mencit ditentukan dengan mengukur suhu melalui rektal menggunakan termometer digital.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Ekstrak daun sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) dengan dosis 5 mg, 10 mg, 15 mg, dan 20 mg masing-masing per 30 gram BB mencit dapat memberikan efek antipiretik pada mencit.
2. Efek antipiretik ekstrak daun sambiloto yang paling efektif digunakan untuk menurunkan suhu rektal mencit demam yaitu pada dosis 10 mg/30 gram BB mencit.
3. Setiap penyakit ada obatnya begitupun dengan demam sebagai reaksi tubuh yang menandakan adanya suatu gejala penyakit, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka telah ditemukan lagi salah satu obat yang diciptakan oleh Allah swt yaitu daun sambiloto sebagai tumbuhan yang bisa dijadikan obat sebagai penurun demam. Islam membolehkan penggunaan obat-obatan selama halal, baik, dan bermanfaat (halalan-thayyiban).

B. Saran

1. Perlu penambahan variasi dosis dan waktu dalam pengamatan
2. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bermanfaat bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya

Anief. 2004. Mohammad. *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Asfuah, Siti. 2012. *Buku Saku Klinik*. Yogyakarta : Nuha Medika

Corwin, Elizabeth J. 2007. *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC

Dirjen POM. 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI

Ditjen, POM. 1986. *Sediaan Galenik*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Dirjen, POM. 2000. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Ganiswarna, Sulistia G. 1995. *Farmakologi dan Tetapi*. Edisi 4. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran. Jakarta : Universitas Indonesia

Harborne, J.B. 1987. *Metode Fitokimia*. Terjemahan Kosasih Padmawinata dan Iwang soediro. Penerbit Institut Teknologi Bandung. Bandung

Harrison. 1995. *Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: EGC

Lisdiyanti, *Uji Daya Antipiretik Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa blimbi L.) Terhadap Penurunan Suhu Rektal Mencit Betina (Mus musculus)*, Skripsi Sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008. Vol : 82

Malole, M.B.M dan Pramono, C.S.U. 1989. *Penggunaan Hewan-Hewan Percobaan di Laboratorium*. Bogor : IPB


Mutschler, Ernst. 1991. *Dinamika Obat*. Bandung : ITB

Mycek, Mary J. 1995. *Farmakologi Ulasan Bergambar*. Jakarta : Widya Medika

Nelwan, R.H. 1996. *Demam Dalam Ilmu Penyakit Dalam*. Edisi tiga Jilid ke I. Jakarta: FK UI


- Prapanza, Ivan dan Lukito Adi Mariyanto. 2012. *Khasiat dan Manfaat Sambiloto*. Jakarta : Agromedia
- Priyanto. *Farmakologi Dasar*. 2008. Depok : Lembaga Studi dan Konsultasi Farmakologi
- Rahim. A., Naid. Tadjuddin., Abu Nawas Kamaluddin. 2007. *Farmakognosi I*, Makassar : Penerbit Aluddin Press
- Rahman. Afzalur. 1989. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Terjemahan Arifin., H., M., Drs., M.Ed., Jakarta : Penerbit Bina Aksara
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Penerbit lentera hati: Jakarta
- Widyaningrum, Herlina. 2002. *Kitab Tanaman Obat Nusantara*. Yogyakarta : Medpress
- Yuliatin, Indah Sri. 2011. *Khasiat sambiloto*. Jakarta: Tibbun Media



Lampiran 1. Pengolahan Sampel**SKEMA KERJA**

Gambar 1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Sambiloto

Lampiran 2. Uji Efek Antipiretik



Gambar 2. Skema Kerja Uji Efek Antipiretik

Lampiran 3. Perhitungan Dosis

PERHITUNGAN

1. Perhitungan Dosis dan Pemberian Paracetamol

a. Konversi dosis mencit dan manusia

- Dosis lazim untuk manusia : 500 mg
- Faktor konversi untuk mencit : 0,0026
dengan bobot 20 g
- Dosis untuk mencit 20 g : $500 \text{ mg} \times 0,0026 = 1,3 \text{ mg}$

b. Penyediaan Sediaan Paracetamol

- Volume pemberian untuk : 1 ml untuk 30 g BB mencit
- Dosis untuk mencit 30 g : $\frac{30 \text{ g}}{20 \text{ g}} \times 1,3 \text{ mg} = 1,95 \text{ mg}$
- Dibuat stok sebanyak 100 ml : 100 ml
- Jumlah Paracetamol yang dibuat: $1,95 \text{ mg} \times 100 \text{ ml} = 195 \text{ mg}$

Jadi, stok Paracetamol yang dibuat 195 mg dalam 100 ml

c. Perhitungan tablet Paracetamol

- Berat rata-rata 20 tablet : 603,5 mg
- Berat yang ditimbang : $\frac{195 \text{ mg}}{500 \text{ mg}} \times 603,5 \text{ mg} =$

235,365 mg

Jadi untuk mendapatkan Paracetamol 195 mg ditimbang bobot tablet sebanyak 235,365 mg yang disuspensikan hingga 100 ml menggunakan NaCMC.

2. Perhitungan Volume Pemberian

- a. Mencit berat badan 21,49 gram

$$\frac{21.49 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.71 \text{ ml}$$

- b. Mencit berat badan 27,80 gram

$$\frac{27.80 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.92 \text{ ml}$$

- c. Mencit berat badan 24,90 gram

$$\frac{24.90 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.83 \text{ ml}$$

- d. Mencit berat badan 22,43 gram

$$\frac{22.43 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.74 \text{ ml}$$

- e. Mencit berat badan 25,06 gram

$$\frac{25.06 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.83 \text{ ml}$$

- f. Mencit berat badan 23,84 gram

$$\frac{23.84 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.79 \text{ ml}$$

- g. Mencit berat badan 28,92 gram

$$\frac{28.92 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.96 \text{ ml}$$

- h. Mencit berat badan 23,52 gram

$$\frac{23.52 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.78 \text{ ml}$$

- i. Mencit berat badan 27,53 gram

$$\frac{27.53 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.91 \text{ ml}$$

j. Mencit berat badan 23,01 gram

$$\frac{23.01 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.76 \text{ ml}$$

k. Mencit berat badan 27,34 gram

$$\frac{27.34 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.91 \text{ ml}$$

l. Mencit berat badan 25,50 gram

$$\frac{25.50 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.85 \text{ ml}$$

m. Mencit berat badan 28,26 gram

$$\frac{28.26 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.94 \text{ ml}$$

n. Mencit berat badan 22,97 gram

$$\frac{22.97 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.76 \text{ ml}$$

o. Mencit berat badan 25,32 gram

$$\frac{25.32 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.84 \text{ ml}$$

p. Mencit berat badan 23,68 gram

$$\frac{23.68 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.79 \text{ ml}$$

q. Mencit berat badan 25,54 gram

$$\frac{25.54 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.85 \text{ ml}$$

r. Mencit berat badan 24,12 gram

$$\frac{24.12 \text{ gram}}{30 \text{ gram}} \times 1 \text{ ml} = 0.80 \text{ ml}$$

Lampiran 4. Perhitungan statistik Rancangan Acak kelompok (RAK)

Tabel 5. Perhitungan RAK antara NaCMC , ekstrak daun sambiloto dosis 5 mg/30 gram BB mencit, 10 mg/30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, 20 mg/30 gram BB mencit, dan suspensi Paracetamol terhadap penurunan suhu rektal mencit

Perlakuan	Replikasi	Suhu Awal (°C)	Suhu Setelah P. Pepton (°C)	Penurunan Suhu Rektal Mencit Setelah Pemberian ekstrak dan kontrol pada menit ke				Jumlah	Rata-rata
				suhu 30 menit	suhu 60 menit	suhu 90 menit	suhu 120 menit		
NaCMC	1	37	38	37,9	38	37,9	37,9	226,7	37,68
	2	36,9	37,9	37,9	37,8	37,9	37,8	226,2	
	3	36,5	37,9	37,8	37,8	37,7	37,7	225,4	
Jumlah		110,4	113,8	113,6	113,6	113,5	113,4	678,3	
Rata-rata		36,8	37,94	37,87	37,87	37,84	37,8		
5 mg/30 gram BB mencit	1	36,5	37,8	37,5	37,3	37	36,9	223	37,16
	2	36,6	37,9	37,2	37,2	37,5	37	223,4	
	3	36,2	37,9	37,3	37	37,2	36,9	222,5	
Jumlah		109,3	113,6	112	111,5	111,7	110,8	668,9	
Rata-rata		36,44	37,87	37,34	37,17	37,24	36,94		
10 mg/30 gram BB mencit	1	36,7	38,1	37	36,9	36,8	36,7	222,2	37,04
	2	36,9	38,2	37,1	36,9	36,8	36,8	222,7	
	3	36,7	38	37	36,8	36,7	36,6	221,8	
Jumlah		110,3	114,3	111,1	110,6	110,3	110,1	666,7	
Rata-rata		36,77	38,1	37,04	36,87	36,77	36,7		
15 mg/30 gram BB mencit	1	37	38,3	37,8	37,1	37,3	36,9	224,4	37,21
	2	36,6	38	37,2	37,2	36,9	36,6	222,5	
	3	37	38	37,7	37,3	36,5	36,5	223	
Jumlah		110,6	114,3	112,7	111,6	110,7	110	669,9	
Rata-rata		36,87	38,1	37,57	37,2	36,9	36,67		
20 mg/30 gram BB mencit	1	36,5	37,9	37,7	37,1	37,5	36,9	223,6	37,27
	2	36,9	38	37,9	37	37,5	37	224,3	
	3	36,5	37,8	37,6	37,3	37,1	36,9	223,2	
Jumlah		109,9	113,7	113,2	111,4	112,1	110,8	671,1	
Rata-rata		36,64	37,9	37,74	37,14	37,3	36,94		
Paracetamol	1	36,5	38,1	37,5	36,7	36,5	36,5	221,8	36,85
	2	36,5	37,9	36,9	36,6	36,4	36,4	220,7	
	3	36,2	38	37,1	36,8	36,4	36,3	220,8	
Jumlah		109,2	114	111,5	110,1	109,3	109,2	663,3	

Rata-rata	36,4	38	37,17	36,7	36,43	36,4	4018,2
Jumlah	659,7	683,7	674,1	668,8	667,6	664,3	
Rerata	36,65	37,98	37,51	37,15	37,08	36,90	



Lampiran 5. Perhitungan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

1. Perhitungan

Metode Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Menghitung Derajat Bebas (DB) Total dengan rumus

$$DB_{TOTAL} = r \times t \times k - 1$$

$$DB_{Total} = (3 \times 6 \times 6) - 1$$

$$DB_{Total} = 107$$

Menghitung Derajat Bebas (DB) Perlakuan dengan rumus

$$DB_{Perlakuan} = t - 1$$

$$DB_{Perlakuan} = 6 - 1$$

$$DB_{Perlakuan} = 5$$

Menghitung Derajat Bebas (DB) Kelompok dengan rumus

$$DB_{kelompok} = k - 1$$

$$DB_{kelompok} = 6 - 1$$

Menghitung Derajat Bebas (DB) Galat dengan rumus

$$DB_{Galat} = DB_{Total} - DB_{Perlakuan} - DB_{kelompok}$$

$$DB_{Galat} = 107 - 5 - 5$$

$$DB_{Galat} = 97$$

Menghitung Faktor Koreksi (FK) dengan rumus

$$FK = \frac{Y_{..}^2}{r \cdot t \cdot k}$$

$$FK = \frac{4018.2^2}{3 \times 6 \times 6}$$

$$FK = \frac{16145931}{(108)}$$

$$FK = 149499.36$$

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) Total dengan rumus

$$JK_{Total} = Yik^2 - FK$$

$$JK_{Total} = 149532.74 - 149499.36$$

$$JK_{Total} = 33,38$$

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) Perlakuan dengan rumus

$$JK_{Perlakuan} = \frac{Yi^2}{r \times t} - FK$$

$$JK_{Perlakuan} = \frac{2691115}{3 \times 6} - 149499.36$$

$$JK_{Perlakuan} = \frac{2691115}{18} - 149499.36$$

$$JK_{Perlakuan} = 7.02$$

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) Kelompok dengan rumus

$$JK_{Kelompok} = \frac{Yi^2}{r \times k} - FK$$

$$JK_{Kelompok} = \frac{2691338.28}{3 \times 6} - 149499.36$$

$$JK_{Kelompok} = \frac{2691338.28}{18} - 149499.36$$

$$JK_{Kelompok} = 19.43$$

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) Galat dengan rumus

$$JK_{Galat} = JK_{Total} - JK_{Perlakuan} - JK_{Kelompok}$$

$$JK_{Galat} = 33.38 - 7.02 - 19.43$$

$$JK_{Galat} = 6.93$$

Menghitung Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan dengan rumus

$$KT_{Perlakuan} = \frac{JK_{Perlakuan}}{DB_{Perlakuan}}$$

$$KT_{Perlakuan} = \frac{7.02}{5}$$

$$KT_{Perlakuan} = 1.40$$

Menghitung Kuadrat Tengah (KT) Galat dengan rumus

$$KT_{Galat} = \frac{JK_{Galat}}{DB_{Galat}}$$

$$KT_{Galat} = \frac{6.93}{97}$$

$$KT_{Galat} = 0.07$$

Menghitung Kuadrat Tengah (KT) Kelompok dengan rumus

$$KT_{Kelompok} = \frac{JK_{Kelompok}}{DB_{Kelompok}}$$

$$KT_{Kelompok} = \frac{19.43}{5}$$

$$KT_{Kelompok} = 3.88$$

Menghitung F Hitung (FH) Perlakuan dengan rumus

$$FH_{Perlakuan} = \frac{KT_{Perlakuan}}{KT_{Galat}}$$

$$FH_{Perlakuan} = \frac{1.40}{0.07}$$

$$FH_{Perlakuan} = 20$$

Menghitung F Hitung (FH) Kelompok dengan rumus

$$FH_{Kelompok} = \frac{KT_{Kelompok}}{KT_{Galat}}$$

$$FH_{Kelompok} = \frac{3.88}{0.07}$$

$$FH_{Kelompok} = 55.42$$

$$\text{Kuadrat Tengah Galat} = \frac{JK_{Galat}}{Vg}$$

$$= \frac{6.93}{97}$$

$$= 0.07$$

$$\hat{Y} = \frac{\text{Total Hasil Data}}{\text{Jumlah data}} = \frac{4018.2}{108} = 37.20$$

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Keseragaman} &= \frac{\sqrt{KTG}}{\hat{y}} \times 100\% \\ &= \frac{\sqrt{0.07}}{37.20} \times 100\% = 1.40\% \end{aligned}$$

Analisis Tukey HSD (Uji Beda Nyata Jujur / BNJ)


Hitung Nilai Tukey HSD (ω) :

Untuk Tabel 5%

$$\begin{aligned} \omega &= q\alpha (p.v) \sqrt{\frac{KT_{Galat}}{\tau}} \\ &= q0.05 (6.97) \sqrt{\frac{KT_{Galat}}{\tau}} \\ &= 2.19 \sqrt{\frac{0.07}{6}} \\ &= \mathbf{0,22 (BNJ 0,05)} \end{aligned}$$

Untuk Tabel 1%

$$\begin{aligned} \omega &= q\alpha (p.v) \sqrt{\frac{KT_{Galat}}{\tau}} \\ &= q0.01 (6.97) \sqrt{\frac{KT_{Galat}}{\tau}} \\ &= 2.99 \sqrt{\frac{0.07}{6}} \\ &= \mathbf{0,32 (BNJ 0,01)} \end{aligned}$$



Tabel 6. Sidik Ragam Hasil Analisis Data

Sumber variasi	JK	DB	KT	F Hitung	F Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	7,02	5	1,40	20**	2,30	3,20
Kelompok	19,43	5	3,88	55,42**	2,30	3,20
Galat	6,93	97	0,07			
Total	33,38	107				

Keterangan :

** SANGAT SIGNIFIKAN

Kesimpulan :

F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 99%, artinya minimal terdapat satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya (signifikan)

F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 99%, artinya minimal terdapat satu kelompok yang berbeda dengan yang lainnya (signifikan)

Tabel 7. Uji BNJ Perlakuan

Perlakuan	Rata-rata	Beda Perlakuan					NaCMC
		PCT	10 mg	5 mg	15 mg	20 mg	
PCT	36,85	0					
10 mg	37,04	0,19 ^{Ns}	0				
5 mg	37,16	0,31*	0,12 ^{Ns}	0			
15 mg	37,21	0,36**	0,17 ^{Ns}	0,05 ^{Ns}	0		
20 mg	37,27	0,42**	0,23*	0,11 ^{Ns}	0,07 ^{Ns}	0	
NaCMC	37,68	0,83**	0,65**	0,52**	0,47**	0,41**	0

Tabel 8. Uji BNJ Kelompok

5 mg/30 gram BB mencit

Kelompok	Rata-rata	Beda Kelompok					Suhu P.Pepton
		Suhu awal	Suhu 120 menit	Suhu 60 menit	Suhu 90 menit	Suhu 30 menit	
Suhu awal	36,44	0					
Suhu 120 menit	36,94	0,5 ^{Ns}	0				
Suhu 60 menit	37,17	0,73**	0,23*	0			
Suhu 90 menit	37,24	0,80**	0,3*	0,07 ^{Ns}	0		
Suhu 30 menit	37,34	0,90**	0,4**	0,17 ^{Ns}	0,1 ^{Ns}	0	
Suhu P. Pepton	37,87	1,43**	0,93**	0,70**	0,63**	0,53**	0

10 mg/30 gram BB mencit

Kelompok	Rata-rata	Beda Kelompok					Suhu P.Pepton
		Suhu 120 menit	Suhu awal	Suhu 90 menit	Suhu 60 menit	Suhu 30 menit	
Suhu 120 menit	36,7	0					
Suhu awal	36,77	0,07 ^{Ns}	0				
Suhu 90 menit	36,77	0,07 ^{Ns}	0 ^{Ns}	0			
Suhu 60 menit	36,87	0,17 ^{Ns}	0,1 ^{Ns}	0,1 ^{Ns}	0		
Suhu 30 menit	37,04	0,34**	0,27*	0,27*	0,17 ^{Ns}	0	
Suhu P. Pepton	38,1	1,4 **	1,33**	1,33**	1,23**	1,06**	0

15 mg/30 gram BB mencit

Kelompok	Rata-rata	Beda Kelompok					Suhu P.Pepton
		Suhu 120 menit	Suhu awal	Suhu 90 menit	Suhu 60 menit	Suhu 30 menit	
Suhu 120 menit	36,67	0					
Suhu awal	36,87	0,20 ^{Ns}	0				
Suhu 90 menit	36,9	0,23*	0,03 ^{Ns}	0			
Suhu 60 menit	37,2	0,53**	0,33**	0,3*	0		
Suhu 30 menit	37,57	0,90**	0,7**	0,67**	0,37**	0	
Suhu P. Pepton	38,1	1,43**	1,23**	1,2**	0,9**	0,53**	0

20 mg/30 gram BB mencit

Kelompok	Rata-rata	Beda Kelompok					Suhu P.Pepton
		Suhu awal	Suhu 120 menit	Suhu 60 menit	Suhu 90 menit	Suhu 30 menit	
Suhu awal	36,64	0					
Suhu 120 menit	36,94	0,30*	0				
Suhu 60 menit	37,14	0,50**	0,2*	0			
Suhu 90 menit	37,30	0,66**	0,36**	0,16 ^{Ns}	0		
Suhu 30 menit	37,74	1,1**	0,8**	0,6**	0,44**	0	
Suhu P. Pepton	37,9	1,26**	0,96**	0,76**	0,6**	0,16 ^{Ns}	0

NaCMC

Kelompok	Rata-rata	Beda Kelompok					Suhu P.Pepton
		Suhu awal	Suhu 120 menit	Suhu 90 menit	Suhu 60 menit	Suhu 30 menit	
Suhu awal	36,8	0					
Suhu 120 menit	37,8	1**	0				
Suhu 90 menit	37,84	1,04**	0,04 ^{Ns}	0			
Suhu 60 menit	37,87	1,07**	0,07 ^{Ns}	0,03 ^{Ns}	0		
Suhu 30 menit	37,87	1,07**	0,07 ^{Ns}	0,03 ^{Ns}	0 ^{Ns}	0	
Suhu P. Pepton	37,94	1,14**	0,14 ^{Ns}	0,1 ^{Ns}	0,07 ^{Ns}	0,07 ^{Ns}	0

Paracetamol

Kelompok	Rata-rata	Beda Kelompok					Suhu P.Pepton
		Suhu awal	Suhu 120 menit	Suhu 90 menit	Suhu 60 menit	Suhu 30 menit	
Suhu awal	36,4	0					
Suhu 120 menit	36,4	0 ^{Ns}	0				
Suhu 90 menit	36,43	0,03 ^{Ns}	0,03 ^{Ns}	0			
Suhu 60 menit	36,7	0,3*	0,3*	0,27*	0		
Suhu 30 menit	37,17	0,77**	0,77**	0,74**	0,47**	0	
Suhu P. Pepton	38	1,6**	1,6**	1,57**	1,3**	0,83**	0

Lampiran 6. Sampel

Gambar 3. Daun Sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness)

Lampiran 7. Ekstraksi Sampel



Gambar 4. Ekstraksi Daun Sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness)



Gambar 5. Pembuatan ekstrak etanol Daun Sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness) dengan rotavapor



Gambar 6. Ekstrak kental Daun Sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness)



Lampiran 8. Hewan Uji



Gambar 7. Hewan uji Mencit (*Mus musculus*)

Lampiran 9. Alat pengujian



Gambar 8. Termometer digital

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 10. Perlakuan uji



Gambar 9. Pemberian ekstrak dan kontrol secara oral



Gambar 10. Pengukuran suhu rektal mencit (*Mus musculus*)

BIOGRAFI



Disebuah kota kecil bernama Poso tepatnya di provinsi Sulawesi Tengah lahirlah seorang bayi berjenis kelamin perempuan. Bayi itu bernama Endang Lestari yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1991 tepatnya dihari jumat yang merupakan anak dari pasangan suami istri Tatmono Tasman, SH dan Nur Tati Djuraedjo. Endang lestari merupakan anak pertama sekaligus cucu pertama. Endang mengenyam pendidikan dimulai dari sekolah kanak-kanak Aisyah selama 2 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah dasar di SDN palupi selama 6 tahun, SMP Negeri 2 Poso selama 3 tahun, dan SMA Negeri 3 Poso selama 3 tahun. Setelah tamat dari SMA pada tahun 2009, kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih jurusan Farmasi.

