

**PENGARUH JENIS DAN KONSENTRASI BASIS SEDIAAN GEL
SARI BUAH BELIMBING WULUH (*Avherroa bilimbi* L) TERHADAP
AKTIVITAS PENGHAMBATAN BAKTERI PENYEBAB JERAWAT**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
ALAUDDIN
MAKASSAR
ABDUL MUTADIR
NIM. 70100108005

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Basis Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi* L) Terhadap Aktivitas Penghambatan Bakteri Penyebab Jerawat” yang disusun oleh Abdul Mutadir, NIM: 70100108005, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin 18 Februari 2013 M yang bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 18 Februari 2013 M
07 Rabiul Awal 1435 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes. (.....)
Sekretaris : Fatmawaty Mallapiang, SKM.,M.Kes (.....)
Pembimbing I : Isriany Ismail, S.Si.,M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing II: Hj.Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)
Penguji I : Surya Ningsi, S.Si., M,Si., Apt. (.....)
Penguji II : Drs. H. Azman Arsyad, M. Ag. (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.PH.,MH.Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 18 Februari 2013

Penulis,

Abdul Mutadir
NIM. 70100108005

PENGESAHAN SKRIPSI



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan segala pemilik ilmu karena atas berkat hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan kepada kita, menjadi pembaharu dan menjadi cahaya hingga saat ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul “Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Basis Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi* L) Terhadap Aktivitas Penghambatan Bakteri Penyebab Jerawat”, untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ayahanda Abdul Rasyid dan Ibunda Hj. Muliana yang tercinta dan Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi yang penuh kesabaran dan tidak henti-hentinya memberikan segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga jasanya dibalas surga oleh Allah SWT kelak.

Terima kasih pula kepada Bapak/ Ibu :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT,MS. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas dukungannya dan arahnya.
3. Fatmawaty Mallapiang, SKM, MKes. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Wahyuddin G, M.Ag. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. sebagai Pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

8. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. Sebagai penguji kompetensi yang senantiasa memberikan arahannya.
9. Drs. H. Azman Arsyad, M.Ag. Penguji agama yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
10. Haeria S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi senantiasa memberikan arahannya.
11. Dosen, serta seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku dan laboran, atas masukan dan bantuannya dalam melaksanakan penelitian. Kakak-kakak mahasiswa Farmasi angkatan 05, 06, 07, saudara(i)ku Emulsi 08, sahabat Barsa atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melaksanakan pendidikan.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, olehnya itu penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Amin ya Rabbal A'lamin.

Makassar, 18 Februari 2013

Penulis,

Abdul Mutadir
NIM. 70100108005

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| ABSTRACK..... | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. <i>Latar Belakang</i> | 1 |
| B. <i>Rumusan Masalah</i> | 5 |
| C. <i>Tujuan Penelitian</i> | 5 |
| D. <i>Manfaat Penelitian</i> | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. <i>Uraian Tentang Tanaman</i> | 7 |
| a. <i>Klasifikasi Tanaman</i> | 7 |
| b. <i>Deskripsi Tanaman</i> | 7 |
| c. <i>Kandungan Kimia</i> | 9 |
| B. <i>Jerawat</i> | 11 |
| C. <i>Kulit</i> | 14 |
| a. <i>Fungsi Kulit Secara Umum</i> | 14 |
| b. <i>Anatomi Fisiologi Kulit</i> | 16 |
| c. <i>Absorpsi Perkulatan</i> | 17 |
| D. <i>Uraian Bakteri</i> | 19 |
| a. <i>Klasifikasi</i> | 19 |
| E. <i>Gel</i> | 20 |
| a. <i>Defenisi Gel</i> | 20 |

| | |
|---|--------|
| b. Basis Gel..... | 20 |
| F. <i>Uraian Basis</i> | 23 |
| G. <i>Uraian Bahan Tambahan</i> | 24 |
| H. <i>Antimikroba</i> | 26 |
| a. Mekanisme Kerja Antimikroba..... | 26 |
| b. Pengujian Aktivitas Mikroba..... | 27 |
| c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Mikroba..... | 29 |
| I. <i>Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat</i> | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| A. <i>Alat dan Bahan</i> | 35 |
| B. <i>Prosedur Kerja</i> | 35 |
| 1. Penyiapan Sampel..... | 35 |
| 2. Sterilisasi Alat..... | 36 |
| 3. Uji Daya Hambat Sari Buah Belimbing Wuluh..... | 37 |
| 4. Pembuatan Sediaan Gel..... | 39 |
| 5. Pengujian Aktivitas Sediaan Gel..... | 40 |
| C. <i>Pengumpulan dan Analisis Data</i> | 41 |
| BAB IV HASIL PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. <i>Hasil Penelitian</i> | 43 |
| B. <i>Pembahasan</i> | 43 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 52 |
| A. <i>Kesimpulan</i> | 52 |
| B. <i>Saran</i> | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |
| LAMPIRAN..... | 56 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Rancangan Formula Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa Bilimbi</i> L) dengan Variasi Jenis dan Konsentrasi Basis | 39 |
| 2. Hasil Uji Hambat Sari Buah Belimbing Wuluh | 42 |
| 3. Hasil Uji Aktivitas Antimikroba Sediaan Gel | 43 |
| 4. Hasil Aktivitas Sari Buah Belimbing Wuluh | 61 |
| 5. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel | 62 |
| 6. RAL, Hubungan antara Sari Buah Belimbing Wuluh dan Daya Hambat .. | 63 |
| 7. Hasil Pengamatan Uji Aktivitas Antimikroba Sediaan Gel | 64 |
| 8. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel | 66 |
| 9. RAL, Hubungan antara Formula dan Daya Hambat | 67 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Skema Kerja Sari Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa Bilimbi L</i>)..... | 56 |
| 2. Skema Kerja Uji Aktivitas Penghambatan Sari Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa Bilimbi L</i>) | 57 |
| 3. Skema kerja Pembuatan Gel Basis Na CMC | 58 |
| 4. Skema kerja Pembuatan Gel Basis Karbopol | 59 |
| 5. Skema Kerja Uji Aktivitas Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa bilimbi L</i>) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat | 60 |
| 6. Foto Pohon dan Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa bilimbi L</i>) | 68 |
| 7. Foto Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa bilimbi L</i>) dan Kontrol Positif..... | 69 |
| 8. Foto Uji Daya Hambat Sari Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa bilimbi L</i>) | 71 |
| 9. Foto Uji Daya Hambat Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa bilimbi L</i>) Basis Karbopol | 73 |
| 10. Foto Uji Daya Hambat Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (<i>Avherroa bilimbi L</i>) Basis Na CMC | 75 |

ABSTRACT

Author Name : Abdul Mutadir
NIM : 70100108005
Thesis title : The Influence of sort and base concentration of star fruit concentrate (*Avherroa blimbi* L) gel product to the bacteriostatic activities that cause acne

Researched about the influence of sort and base concentration of star fruit concentrate (*Avherroa blimbi* L) gel product to the bacteriostatic activities that cause acne. This research suppose to know the star fruit (*Avherroa blimbi* L) concentration that optimally block the growth of *Propionibacterium acnes* bacteriostatic, and obtain the sort and base concentrate gel product that effectively in star fruit (*Avherroa blimbi* L) concentrate anti acne gel product formula

The 30 % concentrate obtained by juicer device tested optimal block content to *Propionibacterium acnes* bacteriostatic with concentration variation 10%, 20%, 30% with diffusion method in order to optimal concentration obtained in gel formula with karbopol base 940 concentration 0,5%, 1%, 2% and NaCMC base with concentration 3%, 4%, 5%.

The Result of research show that the group who given the gel with concentrate content 30 %, karbopol base 0,5 % the block zone about 20,07 mm, karbopol base 1 % the block zone about 13,16 mm, karbopol base 2 % the block zone 14,16 mm, while the gel with concentrate content 30 %, NaCMC base 3 % the block zone about 29,29 mm, NaCMC base 4 % the block zone about 28,91 mm, NaCMC base 5 % the block zone about 24,26 mm.

From the result of statistic test Complete Random Plan (RAL) and Smaller real different test can concluded that the gel with karbopol base and NaCMC give the effect of *Propionibacterium acnes*. The best closure affect was given by basis karbopol konsentrasi 0,5% and basis Na.CMC konsentrasi 3%.

ABSTRAK

Nama Penulis : Abdul Mutadir
NIM : 70100108005
Judul Skripsi : Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Basis Pada Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi* L) Terhadap Penghambatan Bakteri Penyebab Jerawat

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh jenis dan konsentrasi basis pada sediaan gel sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) terhadap aktivitas penghambatan bakteri penyebab jerawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) yang optimum menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes*, dan untuk mendapatkan jenis dan konsentrasi basis pembentuk gel yang efektif dalam formula sediaan gel anti jerawat sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L).

Sari buah belimbing wuluh 30% diperoleh dengan alat juicer diuji kadar hambat optimum terhadap bakteri *propionibacterium acnes* dengan variasi konsentrasi 10%, 20%, 30% dengan metode difusi agar pada konsentrasi optimum yang di peroleh di formula gel dengan basis karbopol 940 konsentrasi 0,5%, 1%, 2% dan basis NaCMC dengan konsentrasi 3%, 4%, 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang diberi gel dengan kandungan sari 30%, basis karbopol 940 0,5% zona hambatannya rata-rata 20,07 mm, basis karbopol 940 1% zona hambatannya rata-rata 13,16 mm, basis karbopol 2% zona hambatannya 14,75 mm, sedangkan gel dengan kandungan sari 30%, basis NaCMC 3% zona hambatannya rata-rata 29,29 mm, basis NaCMC 4 % zona hambatannya rata-rata 28,91 mm, basis NaCMC 5 % zona hambatannya rata-rata 24,26 mm.

Dari hasil uji statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNJ) dapat disimpulkan bahwa gel dengan basis karbopol 940 dan NaCMC memberikan efek anti jerawat terhadap aktivitas penghambatan *Propionibacterium acnes*. Efek penghambatan terbaik diberikan oleh basis karbopol 940 konsentrasi 0,5% dan basis NaCMC konsentrasi 3%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jerawat adalah penyakit kulit peradangan kronik folikel pilosebacea yang umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, pustul, nodus dan kista pada permukaan luar kulit yaitu muka, bahu, leher, dada, punggung bagian atas dan lengan bagian atas. Bentuknya seperti bisul berisi dan kadang-kadang berubah jadi keras. Pada kulit terutama wajah terdapat benjolan-benjolan kecil, berkepala kuning, berisi nanah, terasa gatal dan sedikit nyeri (Galuh P.Y.R, 2009: 2). Jerawat terjadi karena penyumbatan pada pilosebaceus dan peradangan yang umumnya dipicu oleh bakteri *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Staphylococcus aureus* (Ardina, 2007).

Secara empiris masyarakat menggunakan bahan dari alam untuk mengatasi jerawat. Salah satu bahan dari alam yang berfungsi sebagai anti jerawat adalah buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L). Buah belimbing wuluh mengandung banyak vitamin C alami yang berguna sebagai penambah daya tahan tubuh dan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Belimbing wuluh yang mengandung unsur kimia yang disebut asam oksalat dan kalium (Lathifah, 2008: 22). Hasil pemeriksaan kandungan kimia buah belimbing wuluh yang dilakukan Herlih (1993) menunjukkan bahwa buah belimbing wuluh mengandung golongan

senyawa oksalat, minyak menguap, fenol, flavonoid, saponin dan pektin. Flavonoid diduga merupakan senyawa aktif antibakteri yang terkandung dalam buah belimbing wuluh (Zakaria *et al.*, 2007:56). Beberapa saponin bekerja sebagai anti mikroba, saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih sehingga efektif untuk luka terbuka. (Robinson, 1995:157).

Penggunaan buah belimbing sebagai obat jerawat di masyarakat belum maksimal, karena penggunaannya yang kurang praktis jika harus disiapkan dan dioleskan langsung dengan buah belimbing. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu formula yang dapat memudahkan penggunaannya seperti sediaan gel. Selain itu gel mempunyai sifat yang menyejukkan, melembabkan, mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan.

Bentuk sediaan gel lebih mudah digunakan dan penyebarannya di kulit juga mudah, dilihat juga dari warna yang bening, sehingga banyak pasien yang lebih memilih menggunakan produk kosmetik dalam bentuk gel dibandingkan sediaan lainnya. Zat aktif dalam sediaan gel masuk ke dalam basis atau pembawa yang akan membawa obat untuk kontak dengan permukaan kulit. Bentuk gel mempunyai beberapa keuntungan diantaranya tidak lengket, gel mempunyai aliran tiksotropik dan pseudoplastik yaitu gel berbentuk padat apabila disimpan dan akan segera mengalir jika diberi gaya, konsentrasi bahan pembentuk gel yang dibutuhkan hanya sedikit untuk membentuk massa gel yang baik, viskositas gel tidak mengalami perubahan yang berarti pada suhu penyimpanan (Lieberman, 1998).

Bahan pembawa yang digunakan untuk sediaan topikal akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap absorpsi obat dan memiliki efek yang menguntungkan jika dipilih secara tepat (Lieberman, 1998). Secara ideal, basis (pembawa) harus mudah diaplikasikan pada kulit, tidak mengiritasi dan nyaman digunakan pada kulit, serta dapat melepaskan bahan aktif ke sisi aksi dengan segera. Basis yang sering digunakan dalam sediaan gel adalah NaCMC, karbopol, HPMC, dan lain-lain. Tiap bahan tergantung jenis dan konsentrasi yang digunakan dapat membentuk gel dengan konsistensi yang berbeda yang selanjutnya dan mempengaruhi kemampuan berdifusi bahan aktif menuju sisi aksi dan akan mempengaruhi aktivitas terapeutik. Suatu sediaan harus dapat menjamin stabilitas bahan aktif dalam sediaan tetapi harus dapat melepaskan bahan aktif dibasis untuk segera memberi efek.

Basis gel sebaiknya menghasilkan gel yang bening dan mudah larut dengan air. NaCMC adalah pembentuk gel golongan selulosa berupa garam natrium dari asam selulosaglikol dengan demikian berkarakter ionik (Lieberman H. A,1998). NaCMC sering dijadikan pilihan utama untuk formulasi sediaan oral dan sediaan topikal karena dapat meningkatkan viskositas. NaCMC dapat digunakan sebagai *gelling agent* dalam sediaan gel dengan stabilitas yang baik pada suasana asam maupun basa (pH 2-10) (Suartiningsih, 2011). HPMC termasuk basis gel golongan polimer semi sintetik sedangkan karbopol 940 termasuk basis gel golongan sintetik (Puryanto, 2009:3). Karbopol adalah polimer akrilik dengan polialkenil ether. Karbopol digunakan dalam bentuk cairan atau setengah padat pada sediaan farmasi

sebagai bahan pensuspensi atau bahan peningkat viskositas. Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan karbopol sebagai basis gel dengan konsentrasi 0,5% dan 2% (Galuh Putri Y.R. 2009 ; Rahman, 2010). Basis karbopol termasuk dalam kelompok basis yang hidrofilik dengan daya sebar yang baik pada kulit, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit khususnya respirasio sensibilis oleh karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit. Gel dengan basis karbopol mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya baik (Ansel, 1989:335). Viskositas sediaan gel tergantung dari jenis dan konsentrasi basis gel. Viskositas ini mempengaruhi kemampuan zat aktif dalam sediaan berpenetrasi dari sediaan ke kulit serta mempengaruhi efektivitas penghambatannya pada kulit.

Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Sajadah ayat 27 menjelaskan bahwa berbagai tumbuhan diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Manusia tidak dibenarkan hanya menikmati apa yang diciptakan oleh Allah tanpa mau berfikir dan berusaha untuk meningkatkan nilai tambah ciptaan-Nya serta mengembangkannya menjadi suatu ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian diatas, akan dilakukan penelitian tentang “Pengaruh jenis dan konsentrasi basis terhadap aktivitas penghambat bakteri penyebab jerawat pada sediaan gel ekstrak belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi L*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa konsentrasi optimum sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* ?
2. Bagaimanakah pengaruh jenis dan konsentrasi basis dalam formula sediaan gel yang mengandung sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) terhadap aktivitas penghambat bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acnes* ?
3. Bagaimana pemanfaatan belimbing wuluh dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsentrasi ekstrak buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) yang optimum menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes*.
2. Mendapatkan jenis dan konsentrasi basis pembentuk gel yang efektif dalam formula sediaan gel anti jerawat sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L).
3. Mengetahui tanaman obat yang bermanfaat dalam Islam untuk menunjang kesehatan.

D. Manfaat penelitian

1. Pemanfaatan buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) sebagai obat jerawat yang diharapkan dapat menjadi alternatif obat kulit, khususnya terhadap infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri penyebab jerawat.

2. Dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan herbal, terutama meminimalisir efek samping yang dapat memicu timbulnya penyakit baru yang serius dibanding penyakit yang akan diobati itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Tanaman

1. Klasifikasi tanaman (Dalimartha, 2008:6).

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah belimbing wuluh

(*Avherroa bilimbi* L)

Regnum : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Kelas : Dicotyledoneae
Ordo : Oxalidales
Famili : Oxalidaceae
Genus : *Averrhoa*
Spesies : *Averrho bilimbi* L

2. Nama daerah (Dalimartha, 2008: 6)

Sumatera : limeng, selimeng, thlimeng (Aceh), selemeng (Gayo), asom, belimbing, balimbingan (Batak), malimbi (Nias), balimbieng (Minangkabau), belimbing asam (Melayu), balimbing (Lampung), Jawa : balimbing wuluh, balimbing, blimbing (Jawa), calincing, calincing wulet, balingbing (Sunda), bhalingbhing bulu (Madura). Nusa tenggara : blimbing buloh (Bali), limbi (Bima), libi (Sawu), balimbeng (Flores), belerang (Sangi). Sulawesi : limpias, rumpeasa during wulidan, lopies, lembetue (Gorontalo),

lombituko (Buol), tangkurera (Baree), bainang (Makassar), calene (Bugis). Maluku : ninilu dae lok (Roti), kerbol (Timor, kai), takurela (Ambon), balimbi (Ulias), taprera (Buru), malimbi (Halmahera), miri-miri (Kapaur). Irian Jaya : uteke.

3. Morfologi tanaman (Dalimartha, 2008: 7)

Belimbing wuluh ditanam sebagai pohon buah, kadang ditemukan tumbuh liar. Pohon yang berasal dari Amerika tropis ini menyukai tempat tumbuh yang tidak ternaungi dan cukup lembab. Belimbing wuluh bisa ditemukan dari dataran rendah sampai 500 m dipermukaan laut.

Pohon kecil, tinggi mencapai 10 m dengan batang yang tidak begitu besar dan bergaris tengah sekitar 30 cm, batang kasar berbenjol-benjol, percabangan sedikit, arah condong ke atas. Cabang muda berambut halus seperti beledu dan berwarna coklat muda. Daun majemuk menyirip ganjil dengan 21-45 pasang anak daun. Anak daun bertangkai pendek, berbentuk bulat telur sampai jorong, ujung runcing, pangkal membulat, tepi rata, panjang 2-10 cm, lebar 1-3 cm, berwarna hijau, permukaan bawah hijau muda. Perbungaan majemuk tersusun dalam malai, berkelompok, keluar dari batang atau percabangan yang besar, bunga kecil-kecil berbentuk bintang berwarna ungu kemerahan. Buah berupa buni, bentuk bulat lonjong bersegi, panjang 4-6,5 cm, berwarna hijau kekuningan, berair banyak jika masak, rasa asam. Bentuk biji bulat telur, gepeng.

Rasa buah asam, bisa dibuat sebagai sirop, bahan penyedap masakan, pembersih noda pada pakaian, pengkilap barang-barang yang terbuat dari kuningan, pembersih tangan yang kotor, atau sebagai bahan obat tradisional. Perbanyakkan dengan biji dan cangkok.

4. Kandungan Kimia Belimbing Wuluh.

Belimbing wuluh memiliki rasa asam dan bersifat sejuk. Pada bagian batang mengandung saponin, tannin, asam format, glukosida, kalsium oksalat, sulfur, dan peroksida. Pada bagian daun mengandung tarlin, sulfur, asam format, peroksidase, kalsium oksalat, dan kalium sitrat (Hariana, 2004: 36).

Buah belimbing wuluh mengandung banyak vitamin C alami yang berguna sebagai penambah daya tahan tubuh dan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Belimbing wuluh mempunyai kandungan unsur kimia yang disebut asam oksalat dan kalium (Lathifah, 2008: 22). Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan kimia buah belimbing wuluh yang dilakukan Herlih (1993) menunjukkan bahwa buah belimbing wuluh mengandung golongan senyawa oksalat, minyak menguap, fenol, flavonoid dan pektin. Flavonoid diduga merupakan senyawa aktif antibakteri yang terkandung dalam buah belimbing wuluh (Zakaria *et al.*, 2007: 56).

Flavanoid terutama berupa senyawa yang larut air. Mereka dapat diekstraksi dengan etanol 70 % dan tetap ada dalam lapisan air setelah ekstrak ini dikocok dengan eter minyak bumi. Flavanoid berupa senyawa fenol, karena itu warnanya berubah bila ditambahkan basa atau ammonia, jadi

mereka sudah terdeteksi pada kromatogram atau dalam larutan (Harborn,1984:70).

Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi yang rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah merah. Beberapa saponin bekerja sebagai anti mikroba, saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih sehingga efektif untuk luka terbuka. Kelarutan saponin dalam air dan etanol tetapi tidak larut dalam eter (Robinson, 1995: 157).

5. Sifat dan khasiat (Dalimartha, 2008: 7-12)

Rasa asam, bersifat sejuk dan astringen. Berkhasiat meredakan nyeri (analgesik), melancarkan keluarnya empedu, antiradang, dan meluruhkan kencing (diuretik).

Bunga digunakan untuk pengobatan :

Batuk dan sariawan (stomatitis)

Daun digunakan untuk mengatasi :

- a. Perut sakit,
- b. Gondongan (parotitis),
- c. Tekanan darah tinggi, dan
- d. Rematik.

Buah digunakan untuk pengobatan :

- a. Batuk rejan,
- b. Gusi berdarah, sariawan,

- c. Sakit gigi brelubang,
- d. Jerawat,
- e. Panu,
- f. Tekanan darah tinggi,
- g. Kelumpuhan,
- h. Memperbaiki fungsi pencernaan, dan
- i. Radang rectum.

B. Jerawat

Jerawat (*acne*) adalah kelainan atau penyakit kulit yang termasuk gangguan pada kelenjar lemak di muara kandung rambut (infundibulum), atau muara pori-pori. Jerawat ini tidak boleh diabaikan begitu saja, sebab merupakan kerusakan pertama pada kulit muka maupun pada kulit yang lain di tubuh kita. Biasanya jerawat tumbuh diwajah, leher dan punggung bagian atas. (Rostamailis; 2005: 108). untuk mengeluarkan sebum yang diproduksi oleh kelenjar minyak rambut pada lapisan dermis tersumbat. Dalam keadaan normal, sel-sel folikel rambut dapat keluar. Akan tetapi jika terjadi jerawat sel-sel folikel rambut bersama dengan sebum akan menggumpal dan menyumbat saluran folikel rambut pada lapisan epidermis kulit sehingga membentuk komedo yang menonjol dipermukaan kulit. Komedo ini akan berkembang menjadi inflamasi (*inflammatory acne*) apabila terinfeksi bakteri, terutama bakteri *Propionibacterium acnes* membentuk asam lemak bebas dari sebum, yang menyebabkan sel-sel neutrofit menunjukkan respon untuk mengeluarkan enzim

yang dapat merusak dinding folikel rambut. Keadaan ini dapat menyebabkan inflamasi sehingga timbul postula dan papula pada kulit. (Radji, 2010: 205)

Faktor-faktor penyebab jerawat ada beberapa macam, antara lain :

1. Kulit kotor, misalnya pada kulit muka, bila tidak bersih tentu debu akan bertambah tebal, apalagi kotoran tersebut dibawa tidur. Dengan debu yang mengandung bakteri, jelas akan mengganggu kesehatan dan kecantikan kulit.
2. Makanan yang merangsang, misalnya makanan yang pedas-pedas, berlemak, coklat, susu, dan es krim.
3. Genetik (keturunan), secara umum keluarga yang banyak jerawat, anak-anaknyapun berjerawat pula.
4. Kekurangan vitamin C, bila tubuh kekurangan vitamin C akan berkurang terhadap kekebalan (daya tahan tubuh) sehingga kesehatan mudah terganggu.
5. Kesalahan dalam penggunaan kosmetik, penggunaan kosmetik yang menyalahi aturan pakai, misalnya tidur tanpa membersihkan make up, perawatan yang tidak sesuai dengan jenis kulit atau memang tidak cocok dengan kulit.
6. Peralihan usia remaja, biasanya pada saat ini produksi hormone sedang diseimbangkan dengan perkembangan tubuh. Disebabkan hal ini jerawat jadi tumbuh.

7. Menstruasi (haid), pada waktu menstruasi dating biasanya fungsi hormone tidak seimbang, sehingga jerawat tumbuh.
8. Mekanis, yaitu kebiasaan yang tidak disadari suka mengorek-ngorek kulit muka dengan kuku, sehingga menyebabkan nitiasi (luka) kulit, infeksi dan abses (bengkak).
9. Gangguan pencernaan atau lambung, biasanya kalau pencernaan terganggu buang air besar tidak lancar dan menyebabkan jerawat tumbuh.
10. Gangguan metabolisme, adalah pertukaran zat tubuh, menyebabkan peredaran darah dan getah bening kurang lancar, sehingga sel-sel tidak mendapat makanannya yang cukup dan tidak mampu melancarkan pengeluaran sisa-sisa zat pembakaran.
11. Alergi terhadap makanan, bila kulit alergi terhadap makanan atau zat protein, karbohidrat, dan lemak, maka akan memperburuk kondisi kulit, sehingga timbul peradangan atau abses.
12. Iklim tropis, iklim tropis yang panas merangsang kegiatan yang berlebihan dari kelenjar lemak dalam jumlah yang berlebihan bila tidak cepat dirawat menyebabkan kulit jadi kotor dan jerawat mudah tumbuh.
13. Gangguan psikis (jiwa), ketegangan pikiran yang terus menerus dan penderitaan batin yang berlarut-larut menyebabkan kehilangan gairah hidup, kulit muka tidak tampak bersih, sehingga jerawat mudah tumbuh.
(Rostamailis; 2005; 109-110)

C. Kulit

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, selain peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan infeksi dari luar. Kulit merupakan kelenjar holokrin yang besar (Tranggono, 2007: 11).

a. Fungsi kulit secara umum (Galuh, 2009 :13)

1). Fungsi proteksi

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.

2). Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitu pun yang larut lemak.

3). Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan amonia.

4). Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin oleh badan krause. Rabaan diperankan oleh taktil meissner. Terhadap tekanan diperankan oleh badan *vates paccini*.

5). Fungsi pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit.


6). Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi syaraf.

7). Fungsi keratinisasi

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama yaitu keratinosit, sel langerhans dan melanosit.

b. Anatomi fisiologi kulit.



Gambar 1. Struktur Kulit (Galuh, 2009:14)

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas 3 lapisan yaitu:

1). Lapisan epidermis atau kutikula (Tranggono, 2007: 12)

Bagian-bagian epidermis dapat dilihat dengan mikroskop yaitu terdiri dari:

- a) *Stratum corneum* (lapisan tanduk), selnya tipis, datar seperti sisik dan terus menerus dilepaskan.
- b) *Stratum lucidum* (lapisan jernih), selnya mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intinya.
- c) *Stratum granulosum* (lapisan berbutir-butir), selapis sel yang jelas tampak berisi inti dan juga granulosum.
- d) *Stratum spinosum* (lapisan *malphigi*), yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel yang satu dengan yang lainnya di dalam lapisan ini, sehingga setiap sel seakan-akan berduri.
- e) *Stratum germinativum* (lapisan basal), yaitu sel yang terus menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel ini disusun dengan teratur,

berderet dengan rapat dan membentuk lapisan pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang duduk di atas papilla dermis.

2). Lapisan dermis.

Corium atau dermis tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastik. Pada permukaan dermis tersusun papil-papil kecil yang berisi rantingranting pembuluh darah kapiler. Ujung akhir syaraf sensorik yaitu puting peraba yang terletak di dalam dermis.

3). Lapisan subkutis

Lapisan subkutis terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh trabekula fibrosa.

c. Absorpsi perkutan

Kulit karena impermeabilitasnya dapat dilewati oleh sejumlah senyawa kimia dalam jumlah sedikit. Bila suatu sistem obat digunakan secara topikal, maka obat akan keluar dari pembawanya dan berdifusi ke permukaan jaringan kulit. Obat dapat berdifusi ke jaringan kulit melalui daerah kantung rambut, melalui kelenjar keringat atau di antara kelenjar keringat dan kantung rambut.

Ada 4 jenis kulit wajah, yakni kulit kering, berminyak, normal dan kombinasi:

a. Kulit kering

Pada jenis kulit kering, kelenjar sebacea dan keringat hanya dalam jumlah sedikit. Jenis kulit kering mempunyai ciri-ciri penampakan kulit terlihat kusam.

b. Kulit berminyak

Pada jenis kulit berminyak, kelenjar sebacea dan keringat terdapat dalam jumlah banyak. Jenis kulit berminyak mempunyai ciri kulit wajah mudah berjerawat.

c. kulit normal

Pada jenis kulit normal, jumlah sebacea dan keringat tidak terlalu banyak karena tersebar secara merata. Ciri jenis kulit normal : kulit tampak lembut, cerah dan jarang mengalami masalah.

d. kulit kombinasi

Pada jenis kulit kombinasi, penyebaran kelenjar sebacea dan keringat tidak merata. Jenis kulit kombinasi mempunyai ciri kulit dahi, hidung dan dagu tampak mengkilap, berjerawat, tetapi kulit dibagian pipi tampak lembut (Galuh, 2009: 16).

D. Uraian Tentang Bakteri *Propionibacterium acnes*

Klasifikasi

Dalam penelitian ini bakteri yang digunakan adalah *Propionibacterium acne*. *Propionibacterium acne* adalah organisme yang pada umumnya memberikan kontribusi terhadap terjadinya jerawat. Adapun klasifikasi secara ilmiah dari *Propionibacterium acne* adalah sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria
 Phylum : Actinobacteria
 Family : Propionibacteriaceae
 Genus : Propionibacterium
 Species : *Propionibacterium acnes*

Propionibacterium acnes adalah termasuk gram-positif yang paling umum, tidak berspora, tangkai anaerob, ditemukan dalam spesimen-spesimen klinis *P.acnes* pada umumnya tumbuh sebagai anaerob obligat, bagaimanapun beberapa strain/jenis adalah aerotolan, tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan lebih baik sebagai anaerob (Galuh. P; 2009). Spesies *Propionibacterium* adalah anggota flora normal yang terdapat pada kulit dan menyebabkan penyakit kulit ketika mereka menginfeksi “*Junctional*” dan “*Organel*” kulit. Hasil metaboliknya termasuk asam propionate, dimana nama genusnya diturunkan. Pada metode pewarnaan gram, mereka sangat pleomorfik, berbentuk kurva batang atau titik, panjang dengan “*beaded uneven staining*”. Dan terkadang berbentuk cocoid atau bulat. *Propionibacteria* turut berperan

dalam terbentuknya jerawat. Karena bagian dari flora normal pada kulit, terkadang *Propionibacterium acnes* mengkontaminasi darah atau kultur cairan cerebrospinal yang didapat dengan cara menembus kulit. Oleh karena itu penting untuk membedakan kultur yang terkontaminasi dari yang positif dan mengindikasikan adanya infeksi (Jawetz, Meldick, 2005: 437).

E. Gel

a. Defenisi Gel

Gel merupakan suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu *disperse* yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau organik yang besar dan saling diserap cairan (Ansel, 1989: 390).

Idealnya pemilihan *gelling agent* dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan *gelling agent* dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian topical. Beberapa gel terutama polisakarida alami peka terhadap derajat mikrobial. Penambahan bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya mikrobial (Libierman, 1996).

b. Basis Gel

Berdasarkan komposisinya, basis gel dapat dibedakan menjadi basis gel hidrofobik dan gel hidrofilik (Ansel, 1989: 392).

1. Basis gel hidrofobik

Basis hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana ada hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus (Ansel, 1989; 392-393).

Basis gel hidrofobik antara lain petrolatum, *mineral oil*/gel polyethilen, plastibase, aluminium stearat, carbowax.

2. Basis Gel hidrofilik

Basis gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada umumnya karena daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik, sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel, 1989:392). Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, air, penahan lembab dan bahan pengawet (Voigt, 1995:335).

Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai pembuat lunak harus memenuhi berbagai hal. Pertama, harus mampu meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua melindungi dari kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat digunakan

gliserol, sorbitol, etilen glikol dan propilen glikol dalam konsentrasi 10-20% (Voigt, 1995).

Disebabkan oleh tingginya kandungan air, sediaan ini dapat mengalami kontaminasi mikrobial, yang secara efektif dapat dihindari dengan penambahan bahan pengawet. Untuk upaya stabilisasi dari segi mikrobial disamping penggunaan bahan-bahan pengawet seperti dalam balsam, khususnya untuk basis ini sangat cocok pemakaian metil dan propil paraben yang umumnya disatukan dalam bentuk larutan pengawet. Upaya lain yang diperlukan adalah perlindungan terhadap penguapan, untuk menghindari mengeringnya. Oleh karena itu untuk menyimpannya lebih baik menggunakan *tube*. Pengisian ke dalam botol, meskipun telah tertutup baik tetap tidak menjamin perlindungan yang memuaskan (Voigt, 1995: 335).

Keuntungan gel hidrofilik antara lain : daya sebar pada kulit baik, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit khususnya respirasio sensiblis oleh karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya baik (Voigt, 1995: 335).

F. Uraian Basis

Uraian basis yang digunakan untuk membuat sediaan gel sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L).

a. Karbopol (Kibbe, 2000: 79-81)

Karbopol merupakan kelompok *acrylic polimer crosslinked* dengan polialkenil ether. Nama lain karbopol adalah *acritamer, acrylic acid polymer, carbopol, carboxyvinyl polymer, carboxy polymethylene, polyacrylic acid*. Karbopol digunakan dalam bentuk cairan atau setengah padat pada sediaan farmasi sebagai bahan pensuspensi atau bahan peningkat viskositas. Digunakan pada formulasi krim, gel dan salep mata untuk digunakan pada sediaan *ophthalmic, rectal*, dan sediaan topikal lain.

Pemerriannya serbuk putih, higroskopik, bersifat asam dan berbau khas. Dapat larut dalam air, etanol (95%) dan gliserin. Karbopol digunakan sebagai bahan pengemulsi pada konsentrasi 0,1-0,5%; pembawa gel pada konsentrasi 0,5-2,0%; bahan pensuspensi pada konsentrasi 0,5-1,0% dan pengikat tablet 5-10%. Fungsinya adalah : sebagai bahan pembawa gel.

b. NaCMC (Kibbe, 2000: 87-89; FI IV,1995)

Natrium carboximethylcellulosa (NaCMC) umumnya digunakan pada sediaan oral dan topikal sebagai peningkat viskositas. NaCMC juga dapat digunakan sebagai bahan peningkat tablet dan penstabil emulsi. Konsentrasi tertinggi biasanya 3-6 % digunakan sebagai pembawa pasta dan gel.

Pemerian: serbuk atau granul, putih sampai krem, higroskopik. Kelarutan: mudah larut dalam etanol, dalam eter dan dalam pelarut organik lain.

G. Uraian Bahan Tambahan

a. Gliserin (Gennaro, 1990 & Kibbe, 2000: 220)

Rumus struktur gliserol adalah $C_3H_8O_3$ dan berat molekulnya 92,10. Pemerian cairan seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis diikuti rasa hangat, higroskopik jika disimpan beberapa lama pada suhu rendah dapat memadat membentuk massa hablur tidak berwarna yang dapat melebur hingga suhu mencapai kurang lebih 20°C . Konsentrasi gliserin sebagai humektan dan emulient 30 % serta antimikroba $> 20 \%$. Kelarutan dapat campur dengan air dan dengan etanol (95%)P, praktis tidak larut dalam kloroform p, dalam eter p dan dalam minyak lemak.

Gliserin digunakan dalam oral, optalmik, topical, dan parenteral. Juga digunakan dalam kosmetik dan tambahan makanan. Pada sediaan farmasi berfungsi sebagai humectants serta sebagai pelembut pada sediaan obat kulit serta menjaga kelembaban kulit dalam periode waktu tertentu. Fungsinya adalah sebagai humectant, antimikroba.

b. Trietanolamin (TEA) (Kibbe, 2000: 372-373 & FI IV, 1995)

Trietanolamina adalah campuran dari trietanolamina, dietanolamina dan monoetanolamina. Rumus molekulnya CCO,CH_2CH_3 dan berat molekulnya 149,1. Mengandung tidak kurang dari 99,0 % dan tidak lebih dari 107,4 % dihitung terhadap zat anhidrat sebagai trietanolamina. $N(C_2H_4OH)_3$.

Pemerian cairan kental; tidak berwarna hingga kuning pucat; bau lemah mirip amoniak; higroskopik. Kelarutan mudah larut dalam air dan dalam etanol (95%) P; larut dalam kloroform. Incompabilitasnya adalah TEA akan bereaksi dengan asam untuk TEA bereaksi dengan tembaga untuk membentuk garam.

Konsentrasi yang digunakan sebagai pengemulsi 2-4% trietanolamin dan 2-5 kali pada asam lemak. Fungsinya : zat tambahan dan membantu stabilitas gel dengan basis karbopol.

c. Metil paraben (Kibbe, 2000: 343)

Metil paraben mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,0% $C_8H_8O_3$. Rumus meolekulnya : $C_8 H_{18} O_3$ dan berat meolekulnya 76,09. Pemerian serbuk hablur halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol (95%) P dan dalam 3 bagian aseton p, mudah larut dalam eter p dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol p panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas, jika didinginkan larutan tetap jernih. Range metil paraben sebagai pengawet antiseptic dan sediaan farmasi lainnya adalah 0,02-0,3%. Metil paraben disimpan dalam wadah , larutan berair pada pH 3-6, dapat disterilkan pada $120^{\circ} C$ selama 20 menit mengubah posisinya. Fungsinya adalah preservatif dan zat pengawet.

H. Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotika, antiseptika, desinfektansia, dan preservatif.

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relative tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes. (Djide M.N, 2005: 339)

a. Mekanisme kerja Antimikroba

1. Penginaktifan enzim tertentu

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan desinfektansia, seperti turunan aldehida, amida, karbanilida, etilen-oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa ammonium kuarternar.

2. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen, dan halogenator, senyawa merkuri, per-oksida, turunan fenol dan senyawa ammonium kuarternar bekerja sebagai antiseptika dan desinfekstan dengan cara denaturasi dan konjugasi protein sel bakteri.

3. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri.

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang essential, sehingga bakteri mengalami kematian.

4. Interkalasi ke dalam DNA

Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan turunan akridin, bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesa DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein.

5. Pembentukan khelat

Beberapa turunan fenol, seperti heksokloroform dan oksikuinolin dapat membentuk khelat dengan ion Fe dan Cu, kemudian bentuk khelat tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim, sehingga mikroorganismenya mengalami kematian. (Djide M.N, 2005: 340-341).

b. Pengujian aktifitas Antimikroba (Djide, 2005)

Dikenal beberapa cara pemeriksaan dan pengujian secara mikrobiologi terhadap kemampuan antimikroba dari bahan-bahan kemoterapeutika seperti antibiotik. Walaupun pada umumnya pengujian dilakukan terhadap kebanyakan antibiotik, namun ada juga bahan-bahan lain yang diduga mempunyai daya hambat mikroba.

Secara umum dilakukan dengan cara:

1. Metode Difusi (Penyerapan)

Pada metode ini kemampuan antimikroba ditentukan berdasarkan hambatan yang terjadi. Beberapa modifikasi metode ini adalah :

a. Cara Difusi dengan Lempeng Silinder

Cara ini berdasarkan difusi antibiotik dari silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan petri atau lempeng, sehingga mikroba yang ditambahkan dihambat pertumbuhannya pada daerah berupa lingkaran atau zona disekeliling silinder yang berisi antibiotik.

b. Cara difusi dengan kertas saring atau Kirby-Bauer

Cara ini menggunakan kertas saring dengan bentuk dan ukuran tertentu, biasanya berbentuk bulat dengan diameter 0,7-1,0 cm, yang akan dicelup pada larutan sampel dan larutan pendamping. Kertas saring tersebut di keringkan dan diletakkan diatas media agar yang telah ditanam mikroba uji. Setelah diinkubasi akan terlihat daerah hambatan yang terbentuk.

2. Metode Dilusi

Pada metode ini yang biasa disebutkan dengan turbidimetri atau tabung, menggunakan pengenceran secara seri dari antimikroba dalam media broth dengan konsentrasi yang ebrbeda-beda, kemudian ditanami dengan mikroba uji pada konsentrasi tertentu.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba yaitu:

1. pH Lingkungan
2. Komponen-komponen perbenihan
3. Stabilitas obat
4. Besarnya inokulum bakteri
5. Masa pengeraman
6. Aktivitas metabolik mikroorganisme (Jawetz, 1996)

I. Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga di hamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya musibah itu bermanfaat bagi manusia, dan Allah menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dan kesalahan mereka.

Rasulullah SAW bersabda, dalam hadits Abu Hurairah Ra.:

أَنْزَلَ اللَّهُ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ (رواه البخاري)

Artinya:

Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obat (H.R. Al-Bukhari).

Setiap ciptaan Allah itu pasti ada penawarnya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya yang menjadi anti penawarnya agar penyakit itu sembuh (As-Suyuthy, 1997).

Pengobatan dengan mencari saripati tumbuh-tumbuhan yang ada sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah swt. Hingga saat ini banyak pengobatan herbal dan mencari tumbuh-tumbuhan sebagai bahan utama pembuatan obat-obatan.

Sebagaimana pada Firman Allah SWT pada surat Q.S.*An-Nahl* 11:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahnya:

Dengan (air hujan) itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir (Departemen Agama RI,2005:403)

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah swt., *menumbuhkan bagi kamu dengannya*, yakni dengan air hujan itu, *tanaman-tanaman*; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan *zaitun*, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga *kurma*, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik,

dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga *anggur* yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram, *dan dari segala* macam atau sebagian *buah-buahan*, selain disebut itu. *Sesungguhnya pada yang demikian*, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu, *benar-benar ada tanda* yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Mahakuasa. Tanda itu berguna *bagi kaum yang memikirkan*. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda (Shihab, 2002:543).

Dari tafsiran diatas dikatakan bahwa Allah menumbuhkan tanaman-tanaman mulai dari yang paling cepat layu, panjang usianya dan banyak manfaatnya. Salah satu tanaman yang relevan dengan tafsiran tersebut adalah tanaman Buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L). Buah belimbing wuluh mengandung banyak vitamin C alami yang berguna sebagai penambah daya tahan tubuh dan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Belimbing wuluh yang mengandung unsur kimia yang disebut asam oksalat dan kalium (Lathifah, 2008: 22). Hasil pemeriksaan kandungan kimia buah belimbing wuluh yang dilakukan Herlih (1993) menunjukkan bahwa buah belimbing wuluh mengandung golongan senyawa oksalat, minyak menguap, fenol, flavonoid, saponin dan pektin. Flavonoid diduga merupakan senyawa aktif antibakteri yang terkandung dalam buah belimbing wuluh (Zakaria *et al*, 2007:56). Beberapa saponin bekerja sebagai anti mikroba, saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih sehingga efektif untuk luka terbuka. (Robinson, 1995:157).

Al-Qur'an telah menyebutkan sejumlah buah-buahan yang oleh ilmu pengetahuan modern ditegaskan memiliki khasiat untuk mencegah beberapa jenis penyakit. Allah memerintahkan manusia supaya memperhatikan keberagaman dan keindahan ciptaan-Nya disertai seruan agar merenungkan ciptaan-ciptaan-Nya yang amat menakjubkan. Allah berfirman dalam Surat QS. Al-An'am: 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
 مِنْهُ خَضِرًا خُجْرًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ أَنْظِرُوا إِلَىٰ
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

"Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula)kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman". (Departemen Agama RI, 2005: 203).

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab *al-muntakhab fi at- Tafsir* yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: Ayat tentang tumbuhan-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang

melalui beberapa fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidat, dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan kebagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah (Shihab, 2002; 574).

Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan organik yang dibentuknya (Shihab, 2002; 574-575).

Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah. Zat hemoglobin yang diperlukan untuk pernapasan manusia dan sejumlah besar jenis hewan, berkaitan sekali dengan zat hijau daun. Atom karbon, hydrogen, oksigen, dan nitrogen mengandung atom zat besi didalam molekul hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri mengandung atom magnesium dalam molekul klorofil. Di dunia kedokteran ditemukan bahwa klorofil, ketika diasimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Pencampuran itu kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri penyakit. Dengan demikian dia berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari serangan segala macam penyakit (Shihab, 2002; 575).

Salah satu ilmu itu adalah mengenai ilmu tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan mengandung banyak vitamin dan mineral serta unsur-unsur penyusun alamiah yang merupakan bahan kimia alamiah ciptaannya dan memungkinkan bagi tubuh untuk memanfaatkannya kembali. Unsur-unsur yang terkandung dalam tumbuhan sangat banyak dan kompleks seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Pengaruh tumbuhan sangat selektif, karena mengandung zat-zat penting bagi pertumbuhan manusia (*As-Sayyid*, 2006).

Salah satu tanaman yang relevan dengan penelitian ini adalah buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L). Tanaman ini merupakan tanaman buah yang biasa digunakan sebagai campuran bumbu makanan oleh manusia, karena banyak mengandung berbagai zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Ternyata setelah diteliti, ternyata buah Belimbing wuluh ini dapat dimanfaatkan kembali dalam dunia pengobatan salah satunya sebagai obat jerawat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan bahan

1. Alat

Alat-alat gelas, bejana maserasi, penangas air, timbangan analitik (*Presica*), cawan petri (*Normax*), erlenmeyer (*Iwaki Pyrex*), juicer, tabung reaksi (*Iwaki Pyrex*), ose bulat, ose lurus, autoklaf (*Memmert*), oven (*Memmert*), inkubator (*Memmert*), Viskometer (*Brookfield*), laminar Air Flow (LAF), lampu spiritus, disk blank, gelas kimia (*Iwaki Pyrex*) dan pinset.

2. Bahan

Nutrient Agar (NA), Nutrient Broth (NB), NaCMC, etanol 96%, karbopol 940, buah belimbing wuluh, metil paraben, air suling, gliserin, TEA dan kultur murni *Propionibacterium acnes*.

B. Prosedur Kerja

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel buah belimbing wuluh diperoleh di kecamatan Manggala Kelurahan Antang, Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. Buah yang di ambil adalah buah yang matang,

sehat dan tidak berjamur dari tanaman belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L).

b. Pengolahan sampel

Buah belimbing wuluh yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir, ditiriskan kemudian dipotong-potong kecil. Sari buah belimbing wuluh dibuat dengan konsentrasi 10%, 20% dan 30%, sari buah belimbing wuluh konsentrasi 30% dibuat dengan cara ditimbang buah belimbing wuluh yang telah dipotong-potong sebanyak 500 gram kemudian dihaluskan dengan juicer lalu disaring dan diambil sarinya lalu dipanaskan pada suhu 40°C selama 15 menit (dipertahankan) selama berlangsungnya proses pemanasan.

2. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan sabun, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180⁰C selama 2 jam dan alat plastik yang tidak tahan pemanasan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit, sedangkan jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

3. Uji Daya Hambat Sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi L*)

a. Pembuatan Medium (Djide, 2007: 21)

1) Medium Glukosa Nutrient Agar (NA)

| | |
|----------------|---------|
| Ekstrak daging | 3 gram |
| Agar | 15 gram |
| Pepton | 5 gram |
| Air suling | 1000 ml |

Cara pembuatan:

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan air suling hingga 800 ml, lalu dipanaskan sampai larut. Kemudian dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit.

2) Medium Nutrient Broth (NB)

| | |
|----------------|----------|
| Ekstrak daging | 5 gram |
| NaCl | 2,5 gram |
| Pepton | 10 gram |
| Air suling ad | 1000 ml |

Cara pembuatan:

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dengan air suling sampai 800 ml, kemudian di panaskan

sampai larut, lalu dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml. Selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Penyiapan Mikroba Uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Propionibacterium acnes*, yang kemudian diremajakan dalam medium Nutrien Agar (NA) miring lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C .

c. Pembuatan suspensi bakteri uji

Kultur bakteri berumur 1 x 24 jam yang telah diremajakan dalam medium Nutrien Agar (NA) miring disuspensikan dengan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) kemudian diukur kekeruhannya 25% T pada spektrofotometer UV-Vis panjang gelombang 580 nm.

d. Uji Aktivitas Penghambatan Sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L)

Sari buah belimbing wuluh dibuat dalam beberapa konsentrasi yaitu: 10%, 20%, dan 30% dengan menggunakan air steril, Medium NA steril kemudian didinginkan hingga suhu $40 - 45^{\circ}\text{C}$. Sebanyak 10 ml medium NA yang telah di campur dengan 1 ml suspensi biakan bakteri yang telah disiapkan dalam botol dituang ke dalam cawan petri, dihomogenkan dan dibiarkan hingga memadat.

Kemudian diletakkan blank disk ke dalam cawan petri yang berisi medium NA tadi, di mana *disk blank* tersebut terlebih dahulu dijenuhkan

dengan sari buah belimbing wuluh dengan masing-masing konsentrasi 10%, 20%, dan 30% secara aseptik. Kemudian cawan petri tersebut ditutup dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37 °C, kemudian diukur diameter hambatannya.

4. Pembuatan Sediaan Gel

a. Rancangan Formula Gel Belimbing Wuluh

| No. | Nama bahan | Formula | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | Konsentrasi (%) | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | Sari buah belimbing Wuluh | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | Carbopol 940 | 0,5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 3 | NaCMC | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | 5 |
| 4 | Metil paraben | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | TEA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Gliserin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Air suling hingga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

b. Pembuatan sediaan gel

Sediaan gel dengan basis karbopol dikerjakan dengan cara basis karbopol ditambahkan dengan air suling 20 ml dalam gelas kimia, didiamkan hingga mengembang selama 1 x 24 jam. Kemudian TEA dicampurkan ke dalam basis lalu dihomogenkan, ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan air suling panas suhu

90⁰C dihomogenkan. Dimasukkan gliserin dan sari buah belimbing wuluh lalu dihomogenkan, selanjutnya ditambahkan sisa air ke dalam basis, dan dihomogenkan kembali.

Sediaan gel dengan basis NaCMC dikerjakan dengan cara basis NaCMC ditambahkan dengan air suling 20 ml dalam gelas kimia, didiamkan hingga mengembang selama 1 x 24 jam. Kemudian ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan 15 ml air suling panas suhu 90⁰ C dihomogenkan. Dimasukkan gliserin dan sari buah belimbing wuluh lalu dihomogenkan, selanjutnya ditambahkan sisa air ke dalam basis, dan dihomogenkan kembali.

5. Uji Aktivitas Sediaan Gel Buah Belimbing Wuluh Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

a. Pembuatan suspensi Mikroba Uji

Hasil peremajaan bakteri *Propionibacterium acnes*, disuspensikan dengan larutan NaCl 0,9% dan diukur transmittannya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nm pada 25% T, dan sebagai blanko larutan NaCl 0,9%.


b. Pengujian daya hambat sediaan gel sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L)

Medium GNA steril sebanyak 10 ml dicampur dengan 1 ml suspensi bakteri uji yang telah disiapkan. Setelah itu dituang secara aseptik ke dalam cawan petri steril. Medium dibiarkan memadat,

selanjutnya dibuat sumuran pada medium tersebut. Ke dalam lubang tersebut diisi dengan gel untuk masing-masing formula untuk tiap lubang, kemudian diinkubasikan pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam, lalu diukur diameter daerah hambatannya.

C. Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil pengamatan dari penelitian yang telah dilakukan meliputi pengamatan daya hambat sari buah belimbing wuluh, dan daya hambat pada sediaan gel dengan basis karbopol 940 dan basis NaCMC adalah sebagai berikut:

1. Daya Hambat Sari Buah Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi L*)

Tabel 1. Hasil uji daya hambat sari buah belimbing wuluh

| Konsentrasi Sari buah Belimbing Wuluh (%) | Diameter daerah hambatan(mm) | | | | Rata-rata |
|---|---|--------------|-------------|--------------|-----------|
| | Replikasi | | | | |
| | I | II | III | Jumlah | |
| 10 | 7 | 6,88 | 7,1 | 20,98 | 6,99 |
| 20 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 25,5 | 8,5 |
| 30 | 11,28 | 10,7 | 11,3 | 33,28 | 11,09 |
| Jumlah | 26,98 | 26,08 | 26,7 | 79,76 | |
| Hasil Statistik RAL | Fhitung > Ftabel 5% dan 1 % | | | | |
| BNJ | Aktivitas penghambatan terhadap <i>Propionibacterium acnes</i> tiap konsentrasi berbeda sangat signifikan | | | | |

2. Uji Aktivitas Antimikroba Sediaan Gel Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

Tabel 2. Hasil Pengamatan Uji Aktivitas Antimikroba Sediaan Gel

| Formula | Diameter Daerah Hambat (mm) | | | Jumlah | Rata-rata |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | Perlakuan | | | | |
| | I | II | III | | |
| I (Karbopol 0,5%) | 10,86 | 22,19 | 27,18 | 60,23 | 20,07 |
| II (Karbopol 1%) | 11,02 | 12,55 | 15,92 | 39,49 | 13,16 |
| III (Karbopol 2%) | 16,02 | 13,43 | 14,81 | 44,26 | 14,75 |
| IV (NaCMC 3%) | 26,85 | 30,47 | 30,55 | 87,87 | 29,29 |
| V (NaCMC 4%) | 15,02 | 36,84 | 34,87 | 86,73 | 28,91 |
| VI (NaCMC 5%) | 13,02 | 32,24 | 27,53 | 72,79 | 24,26 |
| VII Kontrol (Karbopol 2%) | 7,23 | 6,39 | 5,71 | 19,33 | 6,44 |
| VIII Kontrol (NaCMC 5%) | 6,2 | 7,06 | 8,03 | 15,09 | 5,03 |
| Jumlah | 100,02 | 161,17 | 164,6 | 425,79 | 141,91 |

B. Pembahasan

Jerawat adalah penyakit kulit peradangan kronik folikel polisebasea yang umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, pustul, nodus dan kista pada tempat permukaannya yaitu muka, bahu, leher, dada, punggung bagian atas dan lengan bagian atas.

Bentuknya seperti bisul berisi dan kadang-kadang berubah jadi keras. Pada kulit terutama wajah menjadi merah dan membengkak (inflamasi), terdapat benjolan-benjolan kecil, berkepal kuning, berisi nanah, terasa gatal dan sedikit nyeri (Galuh, 2009: 2).

Buah belimbing wuluh mengandung banyak vitamin C alami yang berguna sebagai penambah daya tahan tubuh dan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Belimbing wuluh mempunyai kandungan unsur kimia yang disebut asam oksalat dan kalium (Lathifah, 2008; 22). Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan kimia buah belimbing wuluh yang dilakukan Herlih (1993) menunjukkan bahwa buah belimbing wuluh mengandung golongan senyawa oksalat, minyak menguap, fenol, flavonoid dan pektin. Flavonoid diduga merupakan senyawa aktif antibakteri yang terkandung dalam buah belimbing wuluh (Zakaria *et al.*, 2007: 56).

Pada penelitian uji aktivitas daya hambat sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) terhadap bakteri penyebab jerawat dengan konsentrasi sari 10%, 20% dan 30% menunjukkan bahwa terjadi aktivitas penghambatan terhadap *Propionibacterium acnes* dengan mengikuti konsentrasi sari buah belimbing wuluh. Hasil statistik analisis RAL menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penghambatan *Propionibacterium acnes* antara berbagai konsentrasi dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ 5% dan 1% dan hasil Uji BNP menunjukkan bahwa konsentrasi sari buah belimbing yang paling baik

menghambat bakteri penyebab jerawat adalah 30% dengan diameter hambatan 11,09 mm.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) pada kulit sebagai anti acne, maka dibuat formulasi sediaan topikal dalam bentuk gel. Sediaan gel dengan kandungan air yang tinggi memiliki efek mendinginkan, dan melembabkan sehingga dapat meredam reaksi inflamasi. Selain bentuk sediaan ini mudah digunakan dan penyebarannya dikulit lebih cepat dan mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan yang baik (Ansel, 1989).

Secara ideal, basis dan pembawa harus mudah diaplikasikan pada kulit, tidak mengiritasi dan nyaman digunakan pada kulit. Basis yang digunakan pada pembuatan gel sari buah belimbing wuluh ini adalah karbopol 940 dan NaCMC karena basis ini tergolong basis hidrofilik yang mempunyai daya sebar cukup baik pada kulit, tidak menyumbat pori-pori, mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya yang baik. Sediaan topikal yang diaplikasikan harus memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5-6,5 agar sediaan tidak mengiritasi kulit(Tranggono, 2007: 21).

NaCMC sering digunakan karena menghasilkan gel yang bersifat netral, viskositas stabil, resisten terhadap pertumbuhan mikroba, gel yang jernih, dan menghasilkan film yang kuat pada kulit ketika kering.

Karbopol merupakan polimer dari selulosa yang ditaut silang dengan alilsukrosa. Diperoleh dari sintesa asam akrilat yang mengandung tidak kurang dari 56-68% gugus asam karboksilat, serta memiliki bobot molekul yang tinggi. Bersifat koloidal hidrofilik yang membentuk massa mengental yang lebih baik dari *gelling agent* alam. Untuk gel lubrikan diperlukan 0,3-1%. Untuk gel sediaan farmasi diperlukan 0,5-2%.

Ada beberapa jenis karbopol antara lain karbopol 934 (pH 5,5 - 11), karbopol 940 (pH 3 - 11), dan karbopol 941 (pH 3,5 - 11). Berdasarkan penelitian, diantara ketiga jenis karbopol tersebut yang paling stabil adalah karbopol 940. Karbopol jenis ini merupakan campuran resin akrilik larut air, yang mempunyai sifat membentuk kekentalan sempurna karena memiliki viskositas yang tinggi antara 40.000 – 60.000 cP meskipun konsentrasi yang digunakan kecil dengan penetralan menggunakan basa yang cukup, larut dalam air dan alkohol, bersifat tiksotropik, membentuk sediaan yang transparan dan bekerja efektif pada rentang pH yang luas (Anah Shad, 2012: 53). Karbopol 940 digunakan sebagai basis gel karena bersifat non toksik dan tidak menimbulkan reaksi hipersensitif ataupun reaksi-reaksi alergi terhadap penggunaan secara topikal (Rowe, 2006: 112).

Metil paraben yang terdapat dalam formula berfungsi sebagai pengawet yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme sebab sediaan mempunyai

kadar air relatif tinggi yang merupakan medium untuk pertumbuhan mikroorganisme.

Penggunaan TEA sebagai pengalkali bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan menghilangkan kekeruhan sebab karbopol yang terdispersi dalam air akan membentuk larutan asam keruh. Gliserin dan propilen glikol dapat berfungsi sebagai peningkat kestabilan gel, pelembab, mampu melarutkan zat aktif yang tak larut dalam air dan meningkatkan penyebaran obat serta memberikan tampilan yang lebih jernih dan transparan pada gel. Terakhir, masukkan ethosom nifedipin, aduk hingga homogen.

Pada pengujian aktivitas sediaan gel sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) diperoleh hasil bahwa seluruh formula sediaan gel sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) dengan konsentrasi bahan aktif 30% dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Hasil statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) terhadap daya hambat gel diperoleh bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ 5% dan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa daya hambat gel dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi basis. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dilakukan untuk mengetahui Formula yang berbeda daya hambatnya. Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) menunjukkan bahwa Formula I dengan konsentrasi basis karbopol 0,5% dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* dengan karbopol 1% sangat signifikan dibanding formula II, formula III dengan karbopol 2% dan formula VII, sedangkan formula II dengan basis konsentrasi karbopol 1% dan formula III dengan

konsentrasi basis karbopol 2% non signifikan terhadap formula VII kontrol dengan konsentrasi basis karbopol 2%, ini menunjukkan bahwa formula I dengan konsentrasi basis 0,5% lebih efektif dalam memberikan aktivitas hambatan.

Sedangkan pada formula IV dengan konsentrasi basis NaCMC 3%, formula V dengan konsentrasi basis NaCMC 4% dan Formula VI dengan konsentrasi basis NaCMC 5% Sangat Signifikan terhadap formula VIII kontrol dengan konsentrasi 5%. Formula IV dengan konsentrasi basis NaCMC 3% memberikan aktivitas hambatan diatas rata-rata dibanding dengan formula V dan VI.

Di dalam hasil penelitian jenis basis NaCMC dengan perbandingan konsentrasi tidak mempengaruhi aktivitas penghambatan antara formula IV,V dan VI. Sedangkan dengan jenis basis karbopol 940 dengan perbandingan konsentrasi mempengaruhi aktivitas penghambatan pada formula I dibandingkan dengan formula IV,V dan IV. Hal ini berarti gel yang mengandung sari buah belimbing wuluh 30% dengan konsentrasi basis terendah basis karbopol 0,5 % lebih efektif dalam memberikan aktivitas penghambatan terhadap *Propionibacterium acnes* ini di bandingkan dengan basis NaCMC.

Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang indah, hijau dan banyak memberi manfaat serta kenikmatan kepada manusia. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk berfikir dan menyelidiki tumbuh-tumbuhan agar mendapat manfaat yang lebih banyak. Allah berfirman dalam surah Q.S.

An-Nahl ayat 11:

يُنْبِتْ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Departemen Agama RI, 2005: 403).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah-lah yang menumbuhkan tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan buah-buah lain dengan air yang diturunkan dari langit sebagai rizki dan makanan pokok bagi manusia. Allah menumbuhkan semua itu dengan maksud agar menjadi nikmat dan tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang mau mengambil pelajaran dan memikirkannya. Orang yang berfikir tentang hal ini akan mengetahui bahwa Tuhan yang mempunyai kekuasaan seperti ini tidak mungkin ada sesuatu pun yang menyerupai dan menyekutui-Nya (Al-Maraghi, 1992). Pemanfaatan

tanaman sebagai obat merupakan salah satu sarana untuk mengambil pelajaran dan memikirkan tentang kekuasaan Allah.

Belimbing wuluh merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian uji efektifitas senyawa aktif antibakteri pada buah belimbing wuluh ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sari buah belimbing wuluh mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Propionibacterium acnes* penyebab jerawat.

Pemanfaatan buah belimbing wuluh sebagai obat bukanlah sesuatu yang melanggar syariat Islam, bahkan hal ini merupakan suatu upaya untuk mengikuti sunah Nabi. Kita dianjurkan untuk mengamalkan pengobatan, sesuai sabda Rasulullah SAW: *“Wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian karena tidaklah Allah Azza wa jalla menimpakan suatu macam penyakit kecuali telah Dia ciptakan obat untuknya, kecuali satu macam penyakit.”* Mereka bertanya: *“Apa penyakit itu?”* jawab Beliau: *“Penyakit tua (pikun)”*. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At- Tirmizi).

Semenjak zaman Rasulullah telah banyak dipraktikkan terapi dengan tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat atau dikenal dengan terapi herba. Pada zaman Rasulullah belimbing wuluh belum dikenal dan ditemukan, sehingga belum dimanfaatkan sebagai obat. Pemanfaatan tanaman obat itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya industri jamu atau obat tradisional, farmasi, kosmetik, makanan dan minuman. Terapi herba memiliki

banyak kelebihan dibandingkan obat-obatan kimiawi, sehingga pemanfaatan tumbuhan sebagai obat seharusnya lebih diutamakan sebelum beralih kepada obat-obatan kimiawi yang ada di masa sekarang ini. Ibnu Qayyim berkata:

“ Sungguh para tabib telah sepakat bahwa ketika memungkinkan pengobatan dengan bahan makanan maka jangan beralih kepada obat-obatan kimiawi” (Anonymous, 2007^b).

Pemanfaatan buah belimbing wuluh sebagai obat merupakan ikhtiyar untuk memperoleh kesembuhan dari Allah Yang Maha Penyembuh, karena merupakan kewajiban kita untuk berikhtiyar mengobati penyakit. Sungguh tidak ada yang dapat memberikan kesembuhan kecuali Allah SWT semata. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80:



وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِدْتُ لِي شِفَاءً

Terjemahnya:

”Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku”.
(Departemen Agama RI, 2005: 579).

Sesungguhnya kesehatan merupakan suatu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia, akan tetapi nikmat tersebut kadang kurang disyukuri. Sakit merupakan musibah dan ujian yang ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, apabila jatuh sakit manusia hendaknya berfikir tentang makna yang terkandung dari musibah itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) dapat menghambat pertumbuhan *Propionibacterium acnes* secara optimum pada konsentrasi 30%.
2. Jenis dan konsentrasi basis dalam formula sediaan gel sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi* L) berpengaruh terhadap aktivitas penghambatan *Propionibacterium acnes*. Efek penghambatan terbaik diberikan oleh basis karbopol konsentrasi 0,5% dan basis NaCMC konsentrasi 3%.
3. Islam mengajarkan bahwa tanaman diciptakan oleh Allah Swt, untuk dipetik pelajaran di dalamnya seperti pemanfaatannya sebagai obat.

B. Saran


Disarankan untuk pengujian stabilitas kimia dan upaya untuk menghilangkan warna ekstrak sediaan agar lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. 2005. Departemen Agama RI, Bandung; CV. Penerbit J-ART
- As-Suyuthy, J., Abd., Rahman*. 1987. *Pengobatan Cara Nabi*, Pustaka Hidayah; Bandung
- As-Sayyid, A. B. M*. 2006. *Pola Makan Rasulullah; Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Almahira; Jakarta
- Anah Shad, Ray. 2012. *Studi Penetrasi Perkuatan Ethosome Nifedipin dengan Variasi Konsentrasi Basis dalam Bentuk Sediaan Gel Secara Invitro*. UIN Alauddin Makassar; Makassar
- Ardina. Yustine. 2007. *Pengembangan Formulasi Sediaan Gel Antijerawat Serta Penentuan Kontentrasi Hambat Ekstrak Daun Pepaya (Carica Papaya A Linn.)*. ITB; Bandung
- Ansel. C. Howard. 1989. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Universitas Indonesia; Jakarta
- Anonymous, 2007^a, *Vegetation: Belimbing Wuluh*, (Online), (<http://blog.360.yahoo.com/blog-jlVAipecqhja6.QsE5bEBdhcQ--?cq=1&p=190>, diakses 17 Mei 2007).
- Anonim, 2007^b, *Terapi Herba dan Bekam sebagai Solusi*, (Online), (http://klik-brc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32, diakses 4 Januari 2008).
- Dalimartha S. 2008. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 5*. Pustaka Bunda, Jakarta
- Djide, M. Natsir, 2005, *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudddin (lephas); Makassar
- Djide, M. Natsir, 2007, *Penuntun Praktikum Mikrobiologi Farmasi Dasar*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudddin (lephas); Makassar


- Depertemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Farmakope Indonesia, Edisi IV*, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan makanan; Jakarta
- Depertemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979. *Farmakope Indonesia, Edisi III*, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan makanan; Jakarta
- Galuh. Putri. Y. 2009. *Formulasi Gel Obat Jerawat Minyak Atsiri Dauk Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia, Swingle)*. Muhammadiyah; Surakarta
- Gennaro AR Lund, Walter. 1990. *Remington Pharmaceutical Sciences, eighteenth edition*, Mack Publishing Compan; Easton Pennsylvania
- Harborne JB. 1984. *Metode Fitokimia Edisi II*. Penerbit ITB, Bandung.
- Hariana Arief. 2004. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Herlih, 1993, *Pengaruh Air Perasan Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap Kadar Kolesterol Serum Darah Tikus Putih*, (Online), (http://warintek.ristek.go.id/pangan_kesehatan/tanaman_obat/pt/buku08.pdf),
- Jawetz, E., Melnick, J. L., Adelberg, and E. A., 1996, “*Mikrobiologi Kedokteran*”, Alih bahasa : Nugroho, E., dan Maulany, Penerbit EGC; Jakarta.
- Kibbe, Arthur .H. 2000. *Handbook Of Pharmaceutical Exipients.3th Edition*. University Of Pharmacy; Pennsylvany.
- Lierbermen, HA.,Lachman L., Schwarziz. 1998. *Pharmaceutical Dosage Form: Dispersi System. Volume I*. Marcel Dekker, Inc.; New York.
- Latifah. Qurrotu Ayunin.,2008. Uji Efektifitas Ekstrak Kasar Senyawa Antibakteri Pada Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi L*) Dengan Variasi Pelarut. Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang; Malang.
- Pasya, A.F., 2004, *Dimensi Sains Al-Qur'an Menggali Ilmu Pengetahuan dari Al-Qur'an*, Tiga Serangkai, Solo, hal 174-175

- Puryanto, kelik. 2009. Uji Aktivitas Gel Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Tenore) Steen.) Sebagai Penyembuh Luka Bakar Pada Kulit Punggung Kelinci. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rahman, H., 2010. *Formulasi Sediaan Gel Luka Bakar Ekstrak Daun Jambu Mete (Anacardium occidentale) dan Uji Stabilitas Fisik*. UIN Alauddin Makassar
- Radji. Maksum. 2010. "*Buku ajar Mikrobiologi*". Buku Kedokteran EGC; Jakarta
- Rostamailis. 2005. "*Perawatan Badan, Kulit, dan Rambut*". Rineka Cipta; Jakarta
- Robinson, T. 1995. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Edisi ke-4 Terjemahan Kosasih Padmawinata. ITB Press. Bandung.
- Rowe, Raymond C. 2006. *Handbook of Pharmaceutical Excipients e-book*. Pharmaucetical Press and American Pharmacists Association.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati; Jakarta
- Suartiningsih, Anik. 2011. *Formulasi Sediaan Gel Lendir Bekicot (Achatina fulica) Dengan Natrium Carboxymethyl Cellulose Sebagai Gelling Agent Untuk Penyembuhan Luka Bakar Pada Kelinci Jantan*, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Tranggono, I. R. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT Gramedia Pustaka Utama; Jarkata
- Voigth, R. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi farmasi*. Edisi V., Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Zakaria, Z.A., Zaiton, H., Henie, E.F.P., Jais, A. M.M., and Zainuddin, E.N.H., 2007, *In Vitro Antibacterial Activity of Averrhoa bilimbi L. Leaves and Fruits Extracts*, International Journal of Tropical Medicine, (Online), 2(3):96-100.

Lampiran 1. Sari Buah Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi* L)**Gambar 2. Skema Kerja Sari Buah Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi* L)**


Lampiran 2. Uji Aktivitas Penghambatan Sari Buah Belimbing Wuluh

(Avherroa bilimbi L)




Gambar 3. Skema Kerja Uji Aktivitas Penghambatan Sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi L*)

Lampiran 3. Skema kerja pembuatan Gel Sari Buah belimbing wuluh*(Avherroa bilimbi L)*



Gambar 4. Skema Perja Pembuatan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi L*)

**Lampiran 4. Uji Aktivitas Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh
(*Avherroa bilimbi* L) Terhadap Bakteri Penyebab jerawat**



**Gambar 5. Skema Uji Aktivitas Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh
(*Avherroa bilimbi* L) Terhadap Bakteri Penyebab jerawat.**

Lampiran 5. Tabel 2. Aktivitas Sari Buah Belimbing Wuluh (*Avherroa bilimbi* L)

| Konsentrasi Sari buah Belimbing Wuluh (%) | Diameter daerah hambatan(mm) | | | | Rata-rata |
|--|------------------------------|-------|------|--------------|--------------|
| | Replikasi | | | | |
| | I | II | III | Jumlah | |
| 10 | 7 | 6,88 | 7,1 | 20,98 | 6,99 |
| 20 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 25,5 | 8,5 |
| 30 | 11,28 | 10,7 | 11,3 | 33,28 | 11,09 |
| Jumlah | 26,98 | 26,08 | 26,7 | 79,76 | |

Perhitungan RAL , daya hambat formula

$$\text{Faktor Koreksi (FK)} = \frac{(\text{jumlah})^2}{\text{diameter hambatan} \times \text{perlakuan}} = \frac{(79,76)^2}{3 \times 3}$$

$$= 706,85$$

$$\text{Jumlah Kuadrat Total (JKT)} = \sum Y_{ij}^2 - \text{FK}$$

$$= ((7)^2 + (6,88)^2 + (7,1)^2 + (8,7)^2 + (8,5)^2 + (8,3)^2 + (11,28)^2 + (10,7)^2 + (11,3)^2) - \text{FK}$$

$$= 26,13$$

$$\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} = \frac{y_j^2}{\text{jumlah h kelompok}} - \text{FK}$$

$$= \frac{(20,98)^2 + (25,5)^2 + (33,28)^2}{3} - 706,85$$

$$= 25,8$$

$$\text{Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} = \text{JKT} - \text{JKP}$$

$$= 26,13 - 25,8$$

$$= 0,33$$

Tabel 3. Analisis Ragam dg Nilai F Tabel

| Sumber Keragaman (SK) | Jumlah Kuadrat (JK) | Derajat Bebas (db) | Kuadrat Tengah (KT) | F-Hitung | F-Tabel | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|-------|
| | | | | | 0,05 | 0,01 |
| Perlakuan | 25,8 | 2 | 12,9 | 322,5** | 5,14 | 10,92 |
| Galat | 0,33 | 6 | 0,04 | | | |
| Total | 26,13 | 8 | | | | |

$$F(0,05; 2,7) = 5,14$$

$$F(0,01; 2,7) = 10,92$$

Kesimpulan :

Fhitung > Ftabel 5% dan 1 % pada taraf kepercayaan 95%, artinya minimal terdapat satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya (Signifikan)

Uji Nyata Jujur (BNJ)

$$BNJ_{0,05} = q(p.dbgalat, \alpha) \times \frac{\sqrt{KT_{galat}}}{\text{jumlah kelompok}}$$

$$= q(3.6.0.05) \times \frac{\sqrt{0,04}}{3}$$

$$= 0,9 \times \frac{\sqrt{0,04}}{3}$$

$$= 0,06$$

$$BNJ_{0,01} = q(p.dbgalat, \alpha) \times \frac{\sqrt{KT_{galat}}}{\text{jumlah kelompok}}$$

$$= q(5.10.0.01) \times \frac{\sqrt{0,091}}{3}$$

$$= 0,18 \times \frac{\sqrt{0,04}}{3}$$

$$= 0,012$$

Tabel 4. RAL, BNT Hubungan antara sari buah belimbing wuluh dan daya hambat.

| Perlakuan | | 10% | 20% | 30% |
|------------|------------------|-------------|------------|--------------|
| | Rata-rata | 6,99 | 8,5 | 11,09 |
| 10% | 6,99 | 0 | | |
| 20% | 8,5 | 1,51** | 0 | |
| 30% | 11,09 | 4,1** | 2,59** | 0 |

BNJ/LSD 0,05 : 0,06

BNJ/LSD 0,01 : 0,012

Keterangan * = Signifikan (Berbeda nyata)
 ** = Sangat Signifikan (Sangat berbeda nyata)
 Ns = Non Signifikan

Kesimpulan :

Konsentrasi 30% memberikan daya hambat terbaik dari semua perlakuan.



Lampiran 6. Tabel 5. Uji Aktivitas Antimikroba Sediaan Gel Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat

| Formula | Diameter Daerah Hambat (mm) | | | Jumlah | Rata-rata |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | Perlakuan | | | | |
| | I | II | III | | |
| I (Karbopol 0,5%) | 10,86 | 22,19 | 27,18 | 60,23 | 20,07 |
| II (Karbopol 1%) | 11,02 | 12,55 | 15,92 | 39,49 | 13,16 |
| III (Karbopol 2%) | 16,02 | 13,43 | 14,81 | 44,26 | 14,75 |
| IV (NaCMC 3%) | 26,85 | 30,47 | 30,55 | 87,87 | 29,29 |
| V (NaCMC 4%) | 15,02 | 36,84 | 34,87 | 86,73 | 28,91 |
| VI (NaCMC 5%) | 13,02 | 32,24 | 27,53 | 72,79 | 24,26 |
| VII Kontrol (Karbopol 2%) | 7,23 | 6,39 | 5,71 | 19,33 | 6,44 |
| VIII (Kontrol NaCMC 5%) | 6,2 | 7,06 | 8,03 | 15,09 | 5,03 |
| Jumlah | 100,02 | 161,17 | 164,6 | 425,79 | 141,91 |

Lampiran 7. Perhitungan RAL , daya hambat formula

a. Faktor koreksi

$$FK = \frac{\gamma_{..}^2}{rt} = \frac{431,99^2}{24} = 7775,64$$

b. Jumlah kuadrat total

$$JKT = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r \gamma_{ij}^2 - FK$$

$$\begin{aligned} JK \text{ Total} &= (10,86^2 + 22,19^2 + 27,18^2 + 11,02^2 + 12,55^2 + 15,92^2 + 16,02^2 + 13,43^2 + \\ & 14,81^2 + 26,85^2 + 30,47^2 + 30,55^2 + 15,02^2 + 36,84^2 + 34,87^2 + 13,02^2 + \\ & 32,24^2 + 27,53^2 + 7,23^2 + 6,39^2 + 5,71^2 + 6,2^2 + 7,06^2 + 8,03^2) - 7775,64 \\ &= 2388,76 \end{aligned}$$

c. Jumlah kuadrat perlakuan

$$\begin{aligned} JKP &= \sum_{l=1}^t \frac{\gamma_{l.}^2}{r} - FK \\ &= \frac{(60,23^2 + 39,49^2 + 44,26^2 + 87,87^2 + 87,06^2 + 72,79^2 + 19,33^2 + 21,29^2)}{3} - 7775,64 \\ &= 1748,32 \end{aligned}$$

d. Jumlah kuadrat galat

$$\begin{aligned} JKG &= JKT - JKP \\ &= 640,44 \end{aligned}$$

Tabel 6. Analisis Ragam dg Nilai F Tabel

| Sumber Keragaman (SK) | Jumlah Kuadrat (JK) | Derajat Bebas (db) | Kuadrat Tengah (KT) | F-Hitung | F-Tabel | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|---------|-------|
| | | | | | 0,05 | 0,01 |
| Perlakuan | 1748,32 | 7 | 249,76 | 6,24** | 2,657 | 4,025 |
| Galat | 640,44 | 16 | 40,02 | | | |
| Total | 2388,76 | 23 | | | | |

$$F(0,05; 7,16) = 2,657$$

$$F(0,01; 7,16) = 4,025$$

Koefisien Keseragaman : $\frac{\sqrt{KTG}}{Y} \times 100\%$

$\frac{\sqrt{40,02}}{17,74} \times 100\%$

$\frac{6,326}{17,74} \times 100\%$: 35,659 %

Perhitungan Nilai LSD/ BNT 0,05

$$\begin{aligned} \text{LSD} &= t(0,05) ; 16 \sqrt{\frac{2KTG}{r}} \\ &= 1,745 \sqrt{\frac{80,04}{3}} \\ &= 1,745 \times 5,165 \\ &= 9,012 \end{aligned}$$

Perhitungan Nilai LSD/ BNT 0,01

$$\begin{aligned} \text{LSD} &= t(0,01) ; 16 \sqrt{\frac{2KTG}{r}} \\ &= 2,583 \sqrt{\frac{80,02}{3}} \\ &= 2,583 \times 5,165 \\ &= 13,341 \end{aligned}$$

Tabel 7. RAL, BNT Hubungan antara formula dan daya hambat.

| Perlakuan | VII | VIII | II | III | I | VI | V | IV | |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Rata-rata | 6,44 | 7,09 | 13,16 | 14,75 | 20,07 | 24,26 | 28,91 | 29,29 | |
| VII | 6,44 | 0 | | | | | | | |
| VIII | 7,09 | 0,65 ^{Ns} | 0 | | | | | | |
| II | 13,16 | 6,72 ^{Ns} | 6,07 ^{Ns} | 0 | | | | | |
| III | 14,75 | 8,31 ^{Ns} | 7,66 ^{Ns} | 1,59 ^{Ns} | 0 | | | | |
| I | 20,07 | 13,65** | 12,98* | 6,91 ^{Ns} | 5,32 ^{Ns} | 0 | | | |
| VI | 24,26 | 17,82** | 17,17** | 11,1* | 9,51* | 4,19 ^{Ns} | 0 | | |
| V | 28,91 | 22,47** | 22,82** | 15,75** | 14,16** | 8,84 ^{Ns} | 4,65 ^{Ns} | 0 | |
| IV | 29,29 | 22,85** | 22,2** | 16,13** | 14,54** | 9,22* | 5,03 ^{Ns} | 0,38 ^{Ns} | 0 |

BNT/LSD 0,05 : 9,012


BNT/LSD 0,01 : 13,341

Keterangan * = Signifikan (Berbeda nyata)
 ** = Sangat Signifikan (Sangat berbeda nyata)
 Ns = Non Signifikan

Lampiran 8. Gambar buah Belimbing Wuluh dan hasil Pengamatan




Gambar 6. Foto Pohon (A) dan Buah (B) belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L)

Lampiran 9. Gambar Formula Gel

A = Formula I (basis karbopol) B = Formula II (basis karbopol)



C = Formula III (basis karbopol) D = Formula VII (kontrol karbopol)




A = Formula IV (basis CMC Na) B = Formula V (basis CMC Na)



C = Formula VI (basis CMC Na) D = Formula VIII (kontrol CMC Na)

Gambar 7. Foto Sediaan Gel Sari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L)




Gambar 8. Uji daya hambat sari buah belimbing wuluh (*Avherroa bilimbi L.*)


Keterangan


- A = konsentrasi sari 10%
- B = konsentrasi sari 20%
- C = konsentrasi sari 30%
- D = control

Perlakuan I



Perlakuan II




Perlakuan III

Gambar 9. Uji daya hambat sediaan gel sari buah belimbing wuluh basis karbopol (*Avherroa bilimbi* L)


Keterangan

- A = Formula I konsentrasi basis karbopol 0,5%
- B = Formula II konsentrasi basis karbopol 1%
- C = Formula III konsentrasi basis karbopol 2%
- D = Formula VII kontrol basis karbopol 2%


Perlakuan I



Perlakuan II



Perlakuan III



Gambar 10. Uji daya hambat sediaan gel sari buah belimbing wuluh basis CMC Na (*Avtheroa bilimbi* L)

Keterangan

- A = Formula IV konsentrasi basis CMC Na 3%
- B = Formula V konsentrasi basis CMC Na 4%
- C = Formula VI konsentrasi basis CMC Na 5%
- D = Formula VIII kontrol basis CMC Na 5%

RIWAYAT HIDUP



Abdul Mutadir, Lahir di Koroha, 07 November 1990. Anak kelima dari lima bersaudara ini adalah anak kandung dari pasangan H. Abd. Rasyid dan Hj. Muliana. Dan bertempat tinggal diajalan Prapat No. 06 Bukit Baruga Antang Makassar.

Penulis mengawali pendidikan dari sekolah Dasar selama 6 tahun sejak tahun 1996 – 2002 di SDN I Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara dan melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama di MTs Koroha dan tamat pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 19 Makassar dan tamat pada tahun 2008.

Pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi (S1).

Selama berstatus mahasiswa, penulis pernah aktif di sebuah lembaga Organisasi kemahasiswaan yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (BEM) FIKES dan Organisasi Ekstra kampus yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi (ISMAFARSI) Wilayah Indonesia Timur dan mengikuti banyak kegiatan dan Pelatihan Penelitian bagi Mahasiswa (S1) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2011.

Setiap kejadian merupakan pengalaman hidup yang tak terlupakan bagi penulis dan kenangan bersama *Emulsi 08'* tak akan pernah terlupakan. Penulis berharap bisa bermanfaat bagi semua orang. Aamiin ya Allah..