

**EFEKTIVITAS PERAWATAN TALI PUSAT DENGAN  
MENGUNAKAN ANTARA BETADINE DAN NaCl  
DI RUMAH SAKIT BERSALIN  
MATTIRO BAJI GOWA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
Uin Alauddin Makassar**

**Oleh :**

**DINIANTI**

**NIM : 70300111016**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dinianti  
NIM : 70300111016  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/ 02 Mei 1992  
Jurusan : Ilmu Keperawatan  
Fakultas : Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Pelita Taeng, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa  
Judul : Efektifitas Pelepasan Tali Pusat dengan Menggunakan antara Betadine dan NaCl Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Gowa, Juli 2015

Penyusun,



**Dinianti**

NIM:70300111016

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Efektifitas Perawatan Tali Pusat dengan Menggunakan antara Betadine dan NaCl di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa” yang disusun oleh Dinianti, NIM: 70300111016, mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 28 Agustus 2015 M, bertepatan dengan 12 Dzulqaidah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Ilmu Keperawatan.

Gowa, 28 Agustus 2015 M.  
13 Dzulqaidah 1436 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Risnah, SKM., S.Kep.Ns., M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: dr. Azizah Nurdin, S.Ked., M.Sc	(.....)

Diketahui oleh:

 Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc  
NIP. 19530903 198312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinianti  
NIM : 70300111016  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/ 02 Mei 1992  
Jurusan : Ilmu Keperawatan  
Fakultas : Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Pelita Taeng, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa  
Judul : Efektifitas Pelepasan Tali Pusat dengan Menggunakan antara Betadine dan NaCl Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juli 2015


Penyusun,

**Dinianti**  
NIM:70300111016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Puji dan Syukur hanya pantas bermuara pada-Nya, pada Allah SWT, yang maha Agung. Dzat yang telah menganugerahkan securah rahmat dan berkah-Nya kepada makhluk-Nya. Dan telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektifitas Pelepasan Tali Pusat dengan Betadine dan Nacl Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa”. skripsi ini selain membahas secara konsep juga membahas terhadap pandangan islam. Sehingga, tentunya dengan sistem ini dapat membantu para pembaca yang budiman agar dapat mengintegrasikan disiplin ilmu kesehatan dengan Islam. Sejuta shalawat dan salam dengan tulus kami haturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir masa.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Ayahanda **Bado Tinri** dan Ibundaku **Nur Jania Dg Ngai** sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidupku menggapai cita, sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan sejak awal sampai terselesainya penelitian ini, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan

hati, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M. Ag. selaku Pgs Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
2. Dr. dr. Andi Armyn Nurdin. M,Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Keperawatan.
3. DR. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang selalu memberikan motivasi dan pengajaran akan wawasan keilmuan yang luas kepada kami selaku anak didiknya dan bimbingan yang tiada henti bagi peneliti dari Ibu selaku pembimbing akademik.
4. Risnah, SKM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dari persiapan proposal sampai akhir penulisan skripsi ini agar cepat selesai.
5. dr. Azizah Nurdin, S.Ked.,M.Sc selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Hasnah.,S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Dr. Saleh Ridwan., S.Ag.,M.Ag selaku penguji I dan penguji II atas pengajaran ilmu yang tiada henti, pengarahan dan bimbingan selama berlangsungnya penelitian serta telah banyak memberikan masukan baik, kritik yang membangun dan berbagai saran dan solusi dalam perbaikan dan

penyempurnaan dari pada skripsi ini. Ucapan terima kasih sekali lagi penulis haturkan.

7. Para dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang membantu dan mengajar serta mendidik penulis hingga penyelesaian studi dan skripsi ini.
8. Pihak RS Bersalin Mattiro Baji terkhusus kepada Kepala Rumah Sakit dan bagian DIKLAT serta para Bidan ruang rawat inap Post Natal Care yang telah memberikan kemudahan peneliti dalam melakukan penelitian.
9. Kepada saudaraku Jabir Bado, Edo dan Diana Bado yang telah memberikan do'a dan perhatiannya, serta keluarga besarku yang lainnya. Tiada sesuatu yang berharga dapat kupersembahkan kecuali skripsi ini sebagai wujud bakti kecintaanku yang tulus.
10. Terimah kasih kepada Ns. Ramlan yang slalu memberikan *support* dan slalu ada waktunya untuk membantu selama penulis penyelesaian skripsi ini. Terukir sebuah sejarah dan semoga sejarah itu merupakan langkah awal yang baik.
11. Kepada sahabatku (Helmi, Juwita, Fatma, Enita, Uni, Dewi, Marlianti, Hartina dan Aulia Rahma), beserta teman-teman KKN terimah kasih atas bantuan, masukan, kritik, motivasi dan doanya selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terukir sebuah sejarah dan semoga sejarah itu merupakan langkah awal yang baik.
12. Terima kasih kepada kawan-kawanku Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, kawan-kawan seperjuangan Jurusan Keperawatan OKSIGENASI khususnya keperawatan A, yang selalu memberikan *support* kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan



kritik dari para pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2015

Penulis

**Dinianti**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif .....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum Bayi Baru lahir.....	9
1. Sistem pernapasan.....	9
2. Sistem peredaran darah .....	10

B. Tinjauan umum tentang tali pusat	
1. Defenisi dan struktur tali pusat.....	20
2. Pengertian Perawatan Tali pusat .....	22
3. Pemotongan, pengikatan dan penjepitan tali pusat .....	22
4. Perawatan Tali Pusat .....	24
C. Tinjauan Umum tentang Mekanisme dan waktu pelepasan tali pusat .....	30
D. Tinjauan Islam tentang Perawatan tali pusat.....	31
E. Kerangka Konsep .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain penelitian.....	34
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	34
C. Pendekatan Penelitian .....	34
D. Populasi dan sampel.....	35
E. Metode pengumpulan data .....	37
F. Instrumen penelitian.....	37
G. Teknik pengumpulan data.....	37
H. Analisa data.....	38
I. Etika penelitian.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Hasil penelitian.....	41
B. Pembahasan.....	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Responden ibu di Rumah sakit Bersalin Mattiro Baji.....	41
Tabel 4.2 Distribusi Karakteristik Bayi.....	41
Tabel 4.3 uji normalitas.....	45
Tabel 4.4 uji Homogenitas .....	46
Tabel 4.7 Uji Hipotesis (Efektivitas Perawatan tali pusat) .....	47



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Distribusi frekuensi waktu pelepasan tali pusat dengan perawatan Nacl.....	43
Grafik 4.2 Distribusi frekuensi waktu pelepasan tali pusat dengan perawatan Nacl.....	44



## ABSTRAK

Nama : Dinianti  
NIM : 70300111016  
Judul) : Efektifitas Pelepasan Tali Pusat dengan Menggunakan antara Betadine dan Nacl Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa

---

Perawatan tali pusat sangat penting bagi bayi baru lahir untuk mengurangi infeksi tali pusat, walaupun demikian, hal tersebut masih lazim di negara-negara berkembang karena tingginya praktek perawatan tali pusat yang tidak higienis. Penggunaan bahan dalam perawatan tali pusat pun menjadi perhatian, karena akan mempengaruhi waktu pelepasan tali pusat dan kejadian infeksi tali pusat. Desain penelitian menggunakan jenis penelitian *Quasi Eksperimen* dengan rancangan *one sample pre test post test*. Populasi diambil dari bayi baru lahir di RS bersalin Mattiro Baji, sedangkan sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel adalah 20 orang yang terbagi menjadi kelompok perawatan tali pusat dengan NaCl (10 bayi) dan kelompok dengan betadine (10 bayi). Data hasil penelitian diuji normalitas menggunakan uji *Shapiro-Wilk* dengan *p value* 0,074 (perawatan dengan NaCl) dan 0,191 (perawatan dengan Betadine), kemudian dilakukan uji kebermaknaan dengan menggunakan *independent t test* dengan *p value* 0,673 ( $\alpha=0,05$ ) maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara teknik perawatan tali pusat dengan NaCl dan betadine terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas metode perawatan tali pusat dengan menggunakan NaCl dan Betadine. Kedua bahan tersebut teliti pada masing-masing kelompok bayi dengan mengusapkan bahan tersebut, lalu membiarkannya kering dan membungkus dengan kasa steril secara renggang sehingga memungkinkan tali pusat terpapar udara. Saran untuk penelitian ini bagi dunia keperawatan agar menggunakan metode perawatan tali pusat dengan prinsip bersih dan kering, baik dengan bahan betadine maupun NaCl 0,9% serta tidak menutup rapat tali pusat setelah diberikan bahan tersebut.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal di seluruh wilayah Indonesia (Ahnaf AF, 2010). Menurut *World Health Organization* (WHO) hampir 90% dari 5 juta kematian neonatal terjadi di negara berkembang terutama di Indonesia dibandingkan dengan negara Asia dan negara maju lainnya. Sementara tingkat *Association Of South East Asia Nations* (ASEAN) dari hasil survey angka kematian bayi di Indonesia 35/1000 kelahiran hidup yaitu hampir lima kali lipat dibandingkan dengan kematian di Malaysia hampir dua kali lipat dibandingkan dengan Thailand dan 1,3 kali lipat dibandingkan dengan Filipina (Admin, 2012).

Pada era globalisasi yang semakin maju diharapkan bangsa Indonesia dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya dalam bidang kesehatan bayi dan anak. Pemberian asuhan bayi dan anak yang tidak terpecahkan dari keluarga dan masyarakat. Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga adalah peranan ayah, ibu dan anak, dimana fungsi pokok keluarga adalah terhadap anggota keluarganya adalah asah, asih, & asuh. Sehingga dibutuhkan peranan ibu dalam pengasuhan dan perawatan yang baik untuk bayinya. Kebanyakan perawatan bayi baru lahir yang dialami masyarakat adalah kurangnya pengetahuan dalam perawatan bayi baru lahir terutama tali pusatnya. Terutama di daerah pelosok yang merawat bayinya dengan menggunakan cara tradisional serta pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah. Selain itu juga dipengaruhi oleh

kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pelayanan neonatal atau bayi baru lahir (Depkes RI, 2009).

Menurut The World Health Report 2008, AKB di Indonesia mencapai 20/1000 kelahiran hidup (SDKI 2007/2008). Berarti setiap jam terdapat 10 bayi baru lahir meninggal, setiap hari ada 246 bayi meninggal dan setiap tahun ada 89.770 bayi baru lahir yang meninggal. Kematian bayi lahir sebesar 79% terjadi setiap minggu pertama kelahiran terutama pada saat persalinan. Sebanyak 54% terjadi pada tingkatan keluarga yang sebagian besar disebabkan tidak memperoleh layanan rujukan dan kurangnya pengetahuan keluarga akan kegawatdaruratan pada bayi. Penyebab utama kematian bayi baru lahir adalah prematuritas dan BBLR (29%), asfiksia (gangguan pernapasan) bayi baru lahir (27%), tetanus neonatorum (10%) dan masalah pemberian ASI (10%). Sedangkan jumlah angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2005-2008 adalah 1.162 (18,5%) bayi. Dan untuk Kabupaten pada tahun 2006-2008 terdapat 187 bayi meninggal atau 9/1000 kelahiran hidup (Dinkes, 2009)

Pada penyediaan pelayanan maternal dan neonatal berkualitas yang *Cost-Effective* yang tertuang dalam tiga pesan kunci, yaitu :

1. Setiap kehamilan diberikan Toksoid Tetanus yang sangat bermanfaat untuk mencegah tetanus neonatorum.
2. Hendaknya sterilitas harus diperhatikan benar pada waktu pemotongan tali pusat demikian pula perawatan tali pusat selanjutnya.
3. Penyuluhan mengenai perawatan tali pusat yang benar pada masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan ketiga pesan kunci tersebut dan pencapaiannya, target yang telah ditetapkan untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2010 adalah 16/1000 kelahiran hidup (Depkes RI, 2009).



Tali pusat atau *umbilical cord* adalah saluran kehidupan bagi janin selama di dalam kandungan dikatakan saluran kehidupan karena saluran inilah yang selama 9 bulan 10 hari menyuplai zat-zat gizi dan oksigen ke janin.

Telah menjadi penyebab kesakitan dan kematian secara terus menerus di berbagai negara setiap tahunnya sekitar 500.000 bayi meninggal karena Tetanus Neonatorum (Sodikin, 2009). Sisa tali pusat biasanya jatuh sekitar 5-7 hari setelah lendir saat tali pusat terlepas. Ini normal-normal saja, namun jika ternyata masih keluar banyak darah atau muncul nanah, segera minta bantuan medis (Soleha, 2009).

Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2007 angka kematian bayi yang disebabkan infeksi pada tali pusat di rumah sakit besar di Indonesia sebesar 29%. Data dari profil kesehatan Propinsi Jambi pada tahun 2009, jumlah lahir hidup sekitar 62.295, jumlah lahir mati 307 dan jumlah bayi mati 346. Sedangkan angka kematian bayi di Kota Jambi, jumlah lahir hidup 11.502, jumlah lahir mati 32, dan jumlah bayi mati 20. (Profil Kesehatan Kota Jambi, 2009). Masih tingginya angka kematian bayi di Kota Jambi (0 – 11 bulan) umumnya terjadi selama bayi tersebut menjalani masa perawatan bayi baru lahir. (Dinkes Jambi 2009)

Dari survey awal yang dilakukan Pada Tanggal 24 April 2011 di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura kota Jambi, didapatkan dari 10 ibu, 70% (7 orang) ibu tidak mengetahui perawatan tali pusat yang bersih dan steril, serta 30% (3 orang) ibu masih menggunakan cara tradisional seperti obat-obatan tradisional dalam merawat tali pusat bayinya. Hal ini juga dikarenakan di Kelurahan Legok masih banyak ditemukan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun. (Dinkes Jambi 2009)

Dengan pengetahuan yang praktis tentang perawatan tali pusat diharapkan orang tua atau profesional kesehatan (bidan atau perawat) yang terlibat dalam perawatan tali pusat dapat memahami prinsip perawatan tali pusat. Tenaga kesehatan dapat memberi pendidikan kesehatan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama merawat tali pusat. Pengetahuan ibu tentang perawatan tali pusat meliputi pengertian, tujuan, cara perawatan tali pusat dan tanda-tanda infeksi tali pusat. Tenaga kesehatan dapat memberikan pendidikan kesehatan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama merawat tali pusat dan menambah suatu tingkah laku atau kebiasaan sehat dalam diri ibu maupun bayinya (Sodikin, 2009).

Plasenta dan tali pusat dua organ yang memiliki peranan penting selama proses kehamilan berlangsung, berperan sebagai penghubung sirkulasi darah ibu dan bayi serta tempat transportasi nutrisi atau zat-zat penting yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi disamping itu terdapat fungsi lain fungsi pernafasan, kekebalan tubuh, ekskresi zat-zat yang tak berguna bagi bayi serta beberapa fungsi lain yang penting.

Setelah bayi dilahirkan, penghubung ini tidak diperlukan lagi dan dilakukan pemotongan, pengikatan atau penjepitan, serta melakukan perawatan lebih lanjut sampai tali pusat pupus dan lepas dari pangkal pusar bayi. Di Indonesia dikenal berbagai metode perawatan tali pusat modern yang mengacu pada penatalaksanaan dan penyembuhan luka tali pusat modern, yang tujuan utamanya adalah tali pusat bebas dari infeksi serta tali pusat tetap bersih dan mengering lebih cepat sampai pada akhirnya pupus, diantara penatalaksanaan yang sering digunakan diantaranya penggunaan antiseptik Betadinee dan NaCl untuk mencegah infeksi dan komplikasi lanjutan dari proses pemotongan tali pusat, walaupun sampai sekarang masih dijumpai beberapa perbedaan mengenai

metode tepat penatalaksanaan perawatan tali pusat disamping penggunaan antiseptik, namun pada dasarnya semua pengacu pada prinsip utama yaitu tali pusat bebas dari infeksi dan komplikasi lanjutan, berdasarkan fenomena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas antara penggunaan Betadine dan NaCl terhadap penyembuhan luka tali pusat bayi baru lahir di rumah sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa 2015.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 21 Januari 2015 di Rumah sakit Bersalin Mattiro Baji Kab. Gowa, diperoleh data bahwa jumlah persalinan selama tahun 2014 adalah sebanyak 707 orang. Jumlah kelahiran bayi perempuan sebanyak 315 orang dan laki-laki 392 orang. Dengan kelahiran hidup sebanyak 705, BBLN (Berat Badan Lahir Normal) Sebanyak 655 Bayi, dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebanyak 59 Bayi selama 2014. Berdasarkan data diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang efektivitas perawatan tali pusat dengan Kasa NaCl dan Betadinee (RB Mattiro Baji 2015).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana efektivitas perawatan tali pusat dengan Kasa NaCl dan Betadinee terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab. Gowa?

### **C. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (Nursalam,2008). Dalam penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa :

1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )

Tidak ada perbedaan signifikan antara pengaruh teknik perawatan tali pusat dengan Kasa NaCl dan Betadinee terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa.

## 2. Hipotesis alternatif (Ha)

Ada perbedaan signifikan antara pengaruh teknik perawatan tali pusat dengan Kasa NaCl dan Betadinee terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa.

### **D. Defenisi Operasional**

Definisi operasional adalah batasan untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati atau diteliti (Nursalam, 2008).

#### **1. Variabel Independen (Variabel Bebas)**

- a. Perawatan tali pusat adalah perawatan tali pusat 2 kali sehari menggunakan Kasa NaCl kemudian dibungkus dengan Kasa steril (protap perawatan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji).
- b. Perawatan tali pusat adalah perawatan tali pusat 2 kali sehari menggunakan Betadinee kemudian dibungkus dengan Kasa steril (protap perawatan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji).

#### **2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)**

Waktu pelepasan tali pusat adalah waktu lepasnya tali pusat dari pangkal *umbilicus* secara fisiologi.

Kriteria Objektif:

1. Cepat apabila tali pusat puput <5 hari, dihitung dari hari pertama tali pusat diikat sampai tali pusat lepas dari pangkal *umbilicus*
2. Normal apabila tali pusat puput jika antara 5-7 hari, dihitung dari hari pertama tali pusat diikat sampai tali pusat terlepas dari pangkal *umbilicus*

3. Lambat apabila tali pusat puput >7 hari terhitung dari hari pertama tali pusat diikat sampai tali pusat lepas dari pangkal *umbilicus*

#### **E. Kajian Pustaka**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ari Yunanto, dkk. Tentang peran Alkohol 70%, Povidon-Iodine 10% dan Kasa kering steril dalam pencegahan infesi pada perawatan tali pusat. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran alkohol 70%, povidon-iodine 10% dan Kasa kering steril dalam pencegahan infeksi pada perawatan tali pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga jenis perlakuan tidak didapatkan tanda-tanda adanya infeksi tali pusat demikian pula lama lepasnya tali pusat tidak terdapat perbedaan yang bermakna (alkohol 70 %: 7,33 hari, povidon-iodine: 10 %: 7,25 hari, dan Kasa kering steril: 6,42 hari). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perawatan tali pusat dengan menggunakan alkohol 70%, povidone-iodine 10% dan Kasa kering steril dapat mencegah terjadinya infeksi tali pusat dan tidak berpengaruh terhadap lama lepasnya tali pusat. Namun bila dipandang dari segi ekonomi perawatan tali pusat dengan Kasa kering steril dinilai lebih ekonomis dibandingkan perawatan tali pusat dengan menggunakan alkohol 70% dan povidone-iodine 10%. Sisa air yang menempel pada tali pusat dapat dikeringkan dengan menggunakan kain Kasa steril atau Kasa. Setelah itu kering, anginkan tali pusat.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Zuniati (2009) yang mengemukakan bahwa Tali pusat harus dibersihkan sedikitnya dua kali dalam sehari. Tali pusat juga tidak boleh ditutup rapat dengan apapun, karena akan membuatnya menjadi lembab. Selain memperlambat lepasnya tali pusat, juga menimbulkan resiko infeksi. Kalaupun terpaksa ditutup,

tutup atau ikat dengan longgar pada bagian atas tali pusat dengan kain Kasa steril. Pastikan bagian pangkal tali pusat dapat terkena udara dengan leluasa (Zuniati, 2009).

## ***F. Tujuan Penelitian***

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui efektifitas Perawatan Tali Pusat Pada Bayi Dengan Menggunakan Kasa NaCl dan Betadine terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa.

### **2. Tujuan Khusus**

1. Mengetahui pengaruh perawatan tali pusat pada bayi yang diberikan Kasa NaCl terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa.
2. Mengetahui pengaruh perawatan tali pusat pada bayi yang diberikan Kasa Betadinee terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa.

## ***G. Manfaat Penelitian***

### **1. Bagi Peneliti atau Mahasiswa**

Proses penelitian ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat menambah wawasan berfikir dan meningkatkan pengetahuan tentang perawatan tali pusat dengan Kasa NaCl dan Betadinee.

### **2. Bagi Institusi Pendidikan**

Dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya atau hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan ibu tentang perawatan tali pusat.

### **3. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan**

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan masukan bagi pengelola program kesehatan untuk mengembangkan pendidikan kesehatan (penyuluhan) bagi masyarakat sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

#### **4. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perawatan tali pusat bayi dengan menggunakan Kasa NaCl dan Betadinee yang benar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Tinjauan Tentang Bayi Baru Lahir**

Masa neonatus adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran. *Neonatus* adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan usia 1 bulan sesudah lahir. *Neonatus* dini adalah bayi berusia 0-7 hari. *Neonatus* lanjut adalah bayi berusia 7-28 hari (Muslihatun,U,W 2010).

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 sampai 42 minggu, memiliki berat 2500 gram sampai 4000 gram. Pada waktu kelahiran, tubuh bayi baru lahir mengalami sejumlah adaptasi psikologi. Bayi memerlukan pemantauan ketat untuk menentukan masa transisi kehidupannya ke kehidupan luar uterus berlangsung baik. Bayi baru lahir juga membutuhkan asuhan yang dapat meningkatkan kesempatan untuknya menjalani masa transisi dengan baik (Indra dkk, 2010).

Perubahan fisiologis pada bayi baru lahir merupakan suatu proses adaptasi dengan lingkungan luar atau dikenal dengan kehidupan ektrauteri. Sebelumnya bayi cukup hanya beradaptasi dengan kehidupan ektrauteri.

Perubahan fisiologis bayi baru lahir, diantaranya sebagai berikut (Michael, 2010).

#### 1. Sistem pernapasan

Penurunan sistem ini diawali dari perkembangan organ paru itu sendiri dengan perkembangan struktur *brounkus*, *bronkiolus*, serta *alveolus* yang dibentuk dalam proses pematangan dalam sistem pernapasan. Proses perubahan bayi baru lahir adalah dalam hal bernapas yang dapat dipengaruhi oleh keadaan *hipoksia* pada lahir persalinan dan rangsangan fisik (lingkungan) yang merangsang pusat



pernapasan *medulla oblongata* di otak. Selain itu, juga terjadi tekanan rongga merangsang masuknya udara ke dalam paru, kemudian timbulnya pernapasan dapat terjadi akibat interaksi sistem pernapasan itu sendiri dengan sistem *kardiovaskular* dan susunan saraf pusat. Selain itu adanya surfaktan dan upaya respirasi dalam bernafas dapat berfungsi untuk mengeluarkan cairan dalam paru serta mengembangkan jaringan alveolus paru agar dapat berfungsi. Surfaktan tersebut dapat mengurangi tekanan permukaan paru dan membantu menstabilkan dinding alveolus untuk mencegah kolaps (Dewi, 2010)

## 2. Sistem peredaran darah

Pada sistem peredaran darah, terjadi perubahan fisiologis pada bayi baru lahir, yaitu setelah bayi itu lahir akan terjadi proses pengantaran oksigen ke seluruh jaringan tubuh, maka terdapat perubahan, yaitu penutupan *foramen ovale* pada atrium jantung dan penutupan *duktus arteriosus* antara arteri paru dan aorta. Perubahan ini terjadi akibat adanya tekanan pada seluruh sistem pembuluh darah, dimana oksigen dapat menyebabkan sistem pembuluh darah mengubah tenaga dengan cara meningkatkan atau mengurangi resistensi. Perubahan tekanan sistem pembuluh darah dapat terjadi saat tali pusat dipotong, resistensinya akan meningkat dan tekanan atrium berkurang yang dapat menyebabkan volume dan tekanan atrium kanan juga menurun. Proses tersebut membantu darah mengalami proses oksigenasi ulang, serta saat terjadi pernapasan pertama dapat menurunkan resistensi dan meningkatkan tekanan atrium kanan. Kemudian oksigen pada pernafasan pertama dapat menimbulkan relaksasi dan terbukanya sistem pembuluh darah paru yang dapat menurunkan resistensi pembuluh darah paru. Terjadinya peningkatan sirkulasi paru mengakibatkan peningkatan volume darah dan tekanan pada atrium kanan, dengan meningkatkan tekanan pada atrium kanan akan terjadi penurunan atrium kiri, *foramen ovale* akan menutup, atau dengan

pernapasan kadar oksigen dalam darah akan meningkat yang dapat menyebabkan duktus arteriosus mengalami kontriksi dan menutup. Perubahan lain adalah menutupnya vena umbilikus, duktus venosus, dan arteri *hipogastrika* dari tali pusat menutup secara fungsional dalam beberapa menit setelah tali pusat diklem dan penutupan jaringan *fibrosa* membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan diluar uterus (Betz dan Sowden dalam Aziz, 2008).

### 3. Perubahan sistem pernapasan

Selama dalam uterus, janin mendapat O<sub>2</sub> dari pertukaran gas melalui plasenta setelah bayi baru lahir pertukaran gas harus melalui plasenta setelah bayi baru lahir pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi.

Rangsangan untuk gerakan pernafasan pertama bagi bayi.

- a. Perkembangan normal pada neonatus pertama kali bernafas 30 detik sesudah kelahiran .
- b. Upaya pernafasan seorang bayi berfungsi untuk mengeluarkan cairan dalam paru-paru untuk pertama kali.
- c. Tekanan mekanis pada toraks sewaktu melalui jalan lahir .Tekanan rongga dada bayi pada saat melalui jalan lahir per vagina mengakibatkan cairan paru-paru (pada bayi normal jumlahnya 80-100 ml) kehilangan  $\frac{1}{2}$  dari jumlah cairan tersebut, sehingga cairan yang hilang ini di ganti dengan udara, paru-paru berkembang dan rongga dada kembali pada bentuk semula.
- d. Pernafasan yang terjadi sebagai akibat adanya aktifitas normal dari susunan saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh beberapa rangsangan.
- e. Penurunan tekanan O<sub>2</sub> (hipoksia) dan kenaikan tekanan CO<sub>2</sub> (rangsangan fisik luar rahim) yang terletak disinus korotis.

- f. Rangsangan dingin di daerah muka dapat merangsang permulaan gerakan pernafasan.
- g. Interaksi antara sistem pernafasan, kardiovaskular dan susunan saraf pusat menimbulkan pernafasan teratur dan berkesinambungan.
- h. Sistem pengaruh tubuh, metabolisme glukosa, gastrointestinal, dan kekebalan tubuh. Perubahan pada tubuh, metabolisme glukosa, gastrointestinal, dan kekebalan tubuh (Syarudin & Hamidah, 2010).

Pelayanan/perawatan bayi baru lahir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari asuhan persalinan. Aspek yang harus diperhatikan dalam asuhan persalinan (wahyuni, 2012).

1. Penilaian keadaan bayi

Penilaian awal pada bayi segera setelah lahir adalah :

- a. Kemampuan bernafas dengan ekspresi menangis kuat
- b. Aktivitas / pergerakan
- c. Warna kulit

2. Pencegahan kehilangan nafas

Mekanisme pengaturan temperatur tubuh pada bayi baru lahir belum berfungsi sempurna. Oleh karena itu, jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas tubuh maka bayi baru lahir dapat mengalami *hipertermi*. *Hipertermi* mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada dalam ruangan yang relatif hangat, dengan meletakkan bayi ke dada ibunya dengan posisi tengkurap segera setelah lahir paling sedikit satu jam dan tetap menutup badan bayi dengan kain dan memasang topi di kepala, hasil studi juga mendukung bahwa suhu pada dada ibu satu derajat lebih tinggi dari pada

bagian dekat tubuh lainnya. Dengan posisi *skin to skin*, maka itu dapat mengalami bayinya dan langsung merasakan kasih sayang secara psikologis.

Bayi baru lahir dapat kehilangan panas tubuhnya melalui cara-cara berikut:

- a. Evaporasi adalah jalan utama kehilangan panas. Kehilangan panas dapat terjadi karena penguapan cairan pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri setelah lahir karena tubuh bayi tidak segera dikeringkan.
- b. Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin.
- c. Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan didekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi (Suriani dkk, 2009).

### 3. Pemeriksaan fisik pada bayi

Merupakan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh bidan, perawat, atau dokter untuk menilai status kesehatan yang dilakukan pada saat bayi baru lahir, 24 jam setelah lahir, dan pada waktu pulang dari rumah sakit. Tujuan pemeriksaan fisik secara umum pada bayi adalah menilai status adaptasi atau penyesuaian kehidupan intrauteri kedalam kehidupan ekstrauteri serta mencari kelainan pada bayi. Adapun pemeriksaan fisik dapat dilakukan pada bayi antara lain sebagai berikut.

#### a. Hitung frekuensi napas

Pemeriksaan frekuensi napas ini dilakukan dengan menghitung rata-rata pernapasan dalam satu menit. Pemeriksaan ini dikatakan normal pada bayi baru lahir apabila frekuensinya antara 30-60 kali/menit, tanpa adanya retraksi dada dan suara merintih saat ekspirasi, tetapi apabila bayi dalam keadaan lahir kurang dari 2.500 gram atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu, kemungkinan terdapat

adanya retraksi dada ringan. Jika pernapasan berhenti beberapa detik secara periodik, maka masih dikatakan dalam batas normal.

b. Lakukan inspeksi pada warna bayi

Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada warna pucat, *ikterus*, *sianosis sentral*, atau tanda lainnya. Bayi dalam keadaan *aterm* umumnya lebih pucat dibandingkan bayi dalam keadaan *preterm*, mengingat kondisi kulitnya lebih tebal.

c. Hitung denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop

Pemeriksaan denyut jantung untuk menilai apakah bayi mengalami gangguan yang menyebabkan jantung dalam keadaan tidak normal, seperti suhu tubuh yang tidak normal, perdarahan, atau gangguan napas. Pemeriksaan denyut jantung ini dikatakan normal apabila frekuensinya antara 100-160 kali per menit, dalam keadaan normal apabila diatas 60 kali/menit dalam jangka waktu yang relatif pendek, beberapa kali perhari, dan terjadi selama beberapa hari pertama jika bayi mengalami stres.

d. Ukuran suhu aksila

Lakukan pemeriksaan suhu melalui aksila untuk menentukan apakah bayi dalam keadaan hipo atau hipertermi. Dalam kondisi normal suhu bayi antara 36,5-37,5°C.

e. Kaji postur dan gerakan

Pemeriksaan ini untuk menilai ada atau tidaknya *epistotonus/hiperekstensi* tubuh melengkung ke depan ,adanya kejang/*spasme*, serta *tremor*. Pemeriksaan postur dalam keadaan normal apabila dalam keadaan istirahat kepala dan tangan longgar dengan lengan panggul dan lutut semi fleksi. Selanjutnya pada bayi berat kurang dari 2.500 gram atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu ekstremitasnya dalam keadaan sedikit ekstensi. Apabila bayi letak sungsang,

didalam kandungan bayi akan mengalami fleksi penuh pada sendi panggul atau lutut/sendi lutut ekstensi penuh, sehingga kaki bisa mencapai mulut, selanjutnya gerakan ekstremitas bayi harusnya terjadi secara spontan dan simetris disertai dengan gerakan sendi penuh dan pada bayi normal dapat sedikit gemetar.

f. Periksa tonus atau kesadaran bayi

Pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat adanya letergi, yaitu penurunan kesadaran dimana bayi dapat bangun lagi dengan sedikit kesulitan, ada tidaknya tonus otot yang lemah, mudah terangsang, mengantuk, aktivitas berkurang, dan sadar (tidur yang dalam tidak merespon terhadap rangangan). Pemeriksaan ini dalam keadaan normal dengan tingkat kesadaran mulai dari diam hingga sadar penuh serta bayi dapat dibangunkan jika sedang tidur atau dalam keadaan diam.

g. Pemeriksaan ekstremitas

Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai ada tidaknya gerakan ekstremitas abnormal, asimetris, posisi dan gerakan yang abnormal (menghadap ke dalam atau ke luar garis tangan), serta menilai kondisi jari kaki, yaitu jumlahnya berlebih atau saling melekat.

h. Pemeriksaan kulit

Pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya kemerahan pada kulit atau pembengkakan, postula (kulit kepala), luka atau trauma, bercak atau tanda abnormal pada kulit, elastisitas kulit, serta ada tidaknya main popok (bercak merah terang di kulit daerah popok pada bokong). Pemeriksaan ini normal apabila tanda seperti *eritema toksikum* (titik merah dan pusat putih kecil pada muka, tubuh, dan punggung) pada hari kedua atau selanjutnya, kulit tubuh yang terkelupas pada hari pertama.

i. Pemeriksaan tali pusat

Pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada kemerahan, bengkak, bernanah, berbau, atau lainnya pada tali pusat. Pemeriksaan ini normal apabila warna tali pusat putih kebiruan pada hari pertama dan mulai mengering atau mengecil dan lepas pada hari ke-7 hingga ke-10.

j. Pemeriksaan abdomen dan punggung

Pemeriksaan pada abdomen ini meliputi pemeriksaan secara inspeksi untuk melihat bentuk dari abdomen, apabila didapatkan abdomen membuncit dapat diduga kemungkinan disebabkan *hepatosplenomegali* atau cairan didalam rongga perut. Pada peradaban, limfa teraba 1cm di bawa arkus kosta kiri. Pada palpasi ginjal dapat dilakukan dengan pengaturan posisi terlentang dan tungkai bayi dilipat agar otot-otot dinding perut dalam keadaan relaksasi, batas bawah ginjal dapat diraba setinggi umbilikus di antara garis tengah dan tepi perut. Bagian-bagian ginjal dapat diraba sekitar 2-3 cm. Adanya pembesaran pada ginjal dapat disebabkan oleh *neoplasma*, kelainan bawaan, atau trombosis vena renalis. Untuk menilai daerah punggung atau tulang belakang, cara pemeriksaannya adalah dengan meletakkan bayi dalam posisi tengkurap. Raba sepanjang tulang belakang untuk mencari ada atau tidaknya kelainan seperti *spina bifida* atau *mielomeningeal* (defek tulang punggung, sehingga medula spinalis dan selaput otak menonjol).

k. Pengukuran antropometri

Pada bayi baru lahir, perlu dilakukan pengukuran antropometri seperti berat badan, dimana berat badan yang normal adalah sekitar 2500-4000 gram, apabila ditemukan berat badan kurang dari 2500 gram, akan tetapi, apabila ditemukan bayi dengan bayi memiliki berat badan lahir rendah (BBLR). Akan tetapi, apabila ditemukan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4000 gram, maka bayi

dimasukkan dalam kelompok *makrosomia*. Pengukuran antropometri lainnya adalah pengukuran panjang badan secara normal, panjang badan bayi baru lahir adalah 45-50 cm, pengukuran lingkar dada normalnya adalah 33-35 cm, pengukuran lingkar dada normalnya adalah 30-33 cm. Apabila ditemukan diameter kepala lebih besar 3 cm dari lingkar dada, maka bayi mengalami *hidrosefalus* dan apabila ditemukan diameter kepala lebih besar 3 cm dari lingkar dada, maka bayi mengalami *mikrosefalus*.

#### 1. Pemeriksaan genetalia

Pemeriksaan genetalia ini untuk mengetahui keadaan labium yang tertutup oleh labia mayor, lubang uretra dan lubang maka didapatkan terjadinya kelainan dan apabila ada sekret pada lubang vagina, hal tersebut karena pengaruh hormon. Pada bayi laki-laki sering didapatkan *fimosis*, secara normal panjang penis pada bayi adalah 3-4 cm dan 1-1,3 cm untuk lebarnya, kelainan yang terdapat pada bayi adalah *hipospadia* yang merupakan defek dibagian ventral ujung penis atau defek sepanjang penusnya. Epispadia merupakan kelainan defek pada *dorsin penis*.

#### m. Pemeriksaan urine dan tinja

Pemeriksaan urine dan tinja bermanfaat untuk menilai ada atau tidaknya diare serta kelainan pada daerah anus. Pemeriksaan ini normal apabila bayi mengeluarkan feses cair antara 6-8 kali per menit, dapat dicurigai apabila frekuensi meningkat serta adanya lendir atau darah. Adanya perdarahan pervaginam pada bayi baru lahir dapat terjadi selama beberapa hari pada minggu pertama kehidupan (alimul Azis, 2008).

#### 4. Perencanaan infeksi bayi baru lahir

Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikro-organisme selama proses persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah lahir. Resiko yang paling sering



terjadi akibat kebersihan yang tidak mendukung adalah ekses *neonatorum*. Sepsis *neonatorum* adalah sindrome klinik dari penyakit infeksi yang disertai bakteremia yang terjadi pada neonatus.

Tali pusat merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan pada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir kurang lebih dua menit akan segera dipotong tali pusatnya kira-kira dua sampai tiga sentimeter yang hanya tinggal pada pangkal pusat (*umbilicus*), dan sisi potongan inilah yang sering terinfeksi *Staphylococcus aureus*. Pada ujung tali pusat akan mengeluarkan nanah dan pada sekitar pangkal tali pusat akan memerah dan disertai edema (Musbikin, 2006). Pada keadaan infeksi berat, infeksi dapat menjalar hingga ke hati (*hepar*) Melalui ligamentum (*falsiforme*) dan menyebabkan abses yang berlipat ganda. Pada keadaan menahun dapat terjadi *granuloma* pada *umbilicus* (prawirohardjo, 2008). Infeksi tali pusat adalah suatu penyakit toksemik akut yang disebabkan oleh *Clostridium tetani* dengan tanda utama kekakuan otot (*spasme*) tanpa disertai gangguan kesadaran (Suriani dkk, 2009).

#### 5. Tanda – tanda infeksi tali pusat

- a. Bayi terlihat gelisah dan rewel
- b. Terlihat adanya tanda kemerahan disekitar pangkal tali pusat dan perut bayi.
- c. Daerah sekitar tali pusat tercium aroma atau bau dan mengeluarkan nanah.
- d. Suhu tubuh bayi meningkat melebihi ( $38^{\circ}\text{C}$ ), tubuh terasa hangat dan panas.  
( Riksani R,2009)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya infeksi tali pusat pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut (wahyuni, 2012).

a. Faktor kuman

*Staphylococcus aureus* ada dimana-mana dan dapat pada masa awal kehidupan hampir semua bayi, saat lahir atau selama masa perawatan. Biasanya *Staphylococcus aureus* sering dijumpai pada kulit, saluran pernafasan, dan saluran cerna terkolonisasi. Untuk pencegahan terjadinya infeksi tali pusat sebaiknya tali pusat tetap dijaga kebersihannya. Upayakan tali pusat agar tetap kering dan bersih pada saat memandikan. Di minggu pertama sebaiknya jangan merendam bayi langsung ke dalam air mandinya karena akan menyebabkan basahya tali pusat dan memperlambat proses pengeringan tali pusat. Dan masih banyak penyebab lain yang dapat memperbesar peluang terjadinya infeksi pada tali pusat seperti penolong persalinan yang kurang menjaga kebersihan terutama pada alat-alat yang digunakan pada saat menolong persalinan dan khususnya pada saat pemotongan tali pusat, biasakan mencuci tangan untuk pencegahan terjadinya infeksi.

b. Proses persalinan

yang tidak sehat atau yang dibantu oleh tenaga nonmedis. Kematian bayi yang diakibatkan oleh tetanus ini terjadi saat pertolongan persalinan oleh dukun pandai, terjadi pada saat memotong tali pusat menggunakan alat yang tidak steril dan tidak diberikan obat antiseptik.

c. Faktor tradisi

Untuk perawatan tali pusat juga tidak lepas dari masih adanya tradisi yang berlaku di sebagian masyarakat misalnya dengan memberikan berbagai ramuan-ramuan atau serbuk-serbuk yang dipercaya bisa membantu mempercepat kering dan lepasnya potongan tali pusat. Ada yang mengatakan tali pusat bayi itu harus diberi bau-bau. Pandangan seperti inilah yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena justru dengan diberikannya berbagai ramuan tersebut kemungkinan terjangkitnya tetanus lebih besar, biasanya penyakit tetanus neonatorum ini cepat

menyerang bayi, pada keadaan infeksi berat hanya beberapa hari setelah persalinan jika tidak ditangani biasa mengakibatkan meninggal dunia (Wahyuni, 2012).

Sebelum menangani bayi baru lahir, pastikan penolong persalinan telah melakukan upaya pencegahan infeksi berikut:

- a. Cuci tangan dengan seksama sebelum dan setelah bersentuhan dengan bayi.
- b. Pakai sarung tangan bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan.
- c. Pastikan semua peralatan dan bahan tidak digunakan untuk lebih dari satu bayi, terutama klem, gunting dan pengisap lendir yang digunakan harus yang baru dan bersih. Pastikan semua handuk, pakaian, selimut dan kain yang digunakan untuk bayi dalam keadaan bersih. Demikian pula halnya timbangan, pita pengukur, thermometer, stetoskop dan benda-benda lain yang bersentuhan dengan bayi, juga harus bersih. Dekontaminasi dan cuci setiap kali setelah digunakan. (Suriyani dkk, 2009).

## **B. Tinjauan Tentang Perawatan Tali Pusat**

### 1. Definisi dan struktur tali pusat (*funiculus umbilicalis*)

Tali pusat dalam istilah medisnya disebut dengan *umbilical cord* merupakan saluran kehidupan bagi janin selama di dalam kandungan, sebab selama di dalam kandungan tali pusat inilah yang menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta ke janin yang berada di dalamnya. Begitu janin dilahirkan, ia tidak lagi membutuhkan oksigen dari ibunya, karena bayi sudah dapat bernafas sendiri melalui hidungnya. Karena sudah tak diperlukan lagi maka saluran ini harus dipotong dan dijepit, atau diikat (Suriyani, 2012).

Diameter tali pusat antara 1-2,5 cm, dengan rentang panjang antara 30-100 cm, rata-rata 55 cm, terdiri atas *alantoin* yang rudimenter, sisa-sisa

omfalo *mesenterikus*, dilapisi membrana mukosa yang tipis, selebihnya terisi oleh zat seperti agar-agar sebagai jaringan penghubung mukoid yang disebut *Jeli Wharton*. Setelah tali pusat lahir akan segera berhenti berdenyut, pembuluh darah tali pusat akan menyempit tetapi belum obliterasi. Karena itu tali pusat harus segera dipotong dan diikat kuat-kuat supaya pembuluh darah tersebut oklusi serta tidak perdarahan (Wijaya R, 2006).

Pembuluh darah umbilikal is tertanam dalam substansi gelatinosa yang dikenal dengan nama *Jeli Wharton*. Jeli ini melindungi pembuluh darah *arteri umbilikal is* dan *vena umbilikal is* terhadap kompresi (tekanan) dan membantu pencegahan penekanan tali pusat. *Jeli Wharton* akan mengembang jika terkena udara. Kekuatan aliran darah ( $\pm 400$  ml per menit) lewat tali pusat membantu mempertahankan tali pusat dalam posisi relatif lurus dan mencegah terbelitnya tali pusat tersebut ketika janin bergerak-gerak (Sodikin, 2009).

Tali pusat dikelilingi oleh *Jeli Wharton* yang sebagian besar terdiri atas air. Permukaan tali pusat berwarna putih kusam, lembab, dan tertutup amnion. *Jeli Wharton* ini merupakan substansi tebal, sebagai bantalan fisik, mencegah tertekuknya tali pusat dan gangguan pembuluh darah. *Arteri umbilikal is* membawa darah yang banyak mengandung oksigen. Darah dari janin mengalir melalui *arteri umbilikal is* ke plasenta, selanjutnya karbondioksida dan sisa metabolisme dibuang. Vena tali pusat membawa oksigen dan makanan ke janin. *Arteri umbilikal is* mempunyai kontraksi yang kuat sedangkan *vena umbilikal is* kemampuan kontraksinya lebih kecil, sehingga setelah lahir *vena umbilikal is* tetap mempunyai lumen yang cukup besar (Ratri Wijaya, 2006).

Tempat letak tali pusat pada plasenta normalnya adalah sedikit diluar titik tengah (*insetion paracentral*), lebih keluar sedikit mendekati tepi plasenta (*insertion lateral*), tetap pada tepi plasenta (*insertion marginal*). Tempat-tempat lekat tersebut tidak mempunyai arti klinis atau tanda adanya kelainan, tapi pada kehamilan kembar atau ganda tempat lekat tali pusat biasanya adalah *insertion velamentosa*, tali pusat dihubungkan dengan plasenta oleh pembuluh-pembuluh darah yang berjalan dalam selaput janin. Bila pembuluh darah tersebut berjalan didaerah *ostium uteri internum* disebut dengan istilah *vasa previa*. Gejala yang akan terlihat adalah perdarahan segera setelah ketuban pecah (Sodikin, 2009).

## 2. Pengertian perawatan tali pusat

- a. Perawatan tali pusat adalah upaya yang dilakukan upaya untuk membersihkan elemen (bagian) yang sangat penting pada bayi (Kusuma N, 2011).
- b. Perawatan tali pusat adalah perawatan yang dilakukan pada tali pusat untuk mencegah infeksi. (Depkes, RI,2007)

## 3. Pemotongan, pengikatan dan penjepitan tali pusat

Pada persalinan kala III, selama tali pusat masih berdenyut, 75-125 ml darah masih dapat dialirkan dari plasenta ke bayi. Darah tambahan ini diperlukan untuk sirkulasi paru yang baru terbentuk. Pengkleman tali pusat yang terlalu cepat akan mengurangi jumlah darah yang dialirkan ke bayi, sehingga dapat menimbulkan *hipovolemi*. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya sindrom distress pernapasan dan memburuknya kondisi bayi baru lahir dengan Hb rendah. Kinmond et al. (1993) menemukan bahwa memperlambat penjepitan tali pusat memungkinkan terjadinya aliran darah ke bayi, dan memperbaiki kondisi bayi *preterm* (Rukiyah, dkk. 2009).

Selama dalam kandungan, bayi menerima makanannya melalui tali pusat. Tali pusat terdiri dari pembuluh darah arteri dan satu pembuluh darah baluk atau vena. Darah yang kaya nutrisi dan oksigen masuk ke pembuluh darah bayi melalui pembuluh darah vena plasenta dan melalui kedua pembuluh darah arteri. Dengan demikian, tali pusat merupakan saluran kehidupan janin selama 9 bulan. Setelah lahir, saluran ini tidak lagi diperlukan. Untuk itu ia akan dipotong dan diikat atau dijepit dengan alat khusus (Wahyuni, 2010).

Cara pengkleman dan pemotongan tali pusat :

- a. Klemlah tali pusat dengan dua buah klem pada titik kira-kira 2 dan 3 cm dari pangkal pusat bayi (tinggalkan kira-kira satu cm diantara klem-klem tersebut).
- b. Potonglah Tali pusat diantara kedua klem sambil melindungi bayi dari gunting dengan tangan kiri anda.
- c. Pertahankan kebersihan pada saat memotong tali pusat. Ganti sarung tangan anda bisa ternyata sudah kotor. Potonglah tali pusatnya dengan pisau atau gunting yang steril atau desinfeksi tingkat tinggi (DTT).
- d. Periksa tali pusat setiap 15 menit. Apabila terjadi perdarahan, lakukan pengikatan ulang yang kuat (Prawirohardjo, 2010).

Pemotongan dan pengikatan tali pusat menyebabkan pemisahan fisik terakhir antara ibu dengan bayi, Waktu pemotongan tali pusat tergantung dari pengalaman seorang ahli kebidanan. Pemotongan sampai denyut nadi tali pusat terhenti dapat dilakukan pada bayi normal, sedangkan pada bayi gawat pemotongan tali pusat secepat mungkin agar dapat dilakukan resusitasi sebaik-baiknya.

Setelah tali pusat dipotong dilakukan pengikatan tali pusat dengan beberapa cara seperti dibawah ini :

- a. Alat penjepit yang kusus dibuat untuk tali pusat dan dapat dibuang kemudian (*disposable*), dipasang 1 cm dibawah alat penjepit yang sudah dipasang lebih dahulu. Alat penjepit plastik ini tetap memberi tekanan pada tali pusat walaupun selesai wharton (*Wharton Jelly*) mengkerut dan kemudian dibuang bersama lepasnya tali pusat.
- b. Pita dari bahan nilon yang sangat kuat dan yang disimpan dalam bungkus plastik steril diikatkan rangkap pada tali pusat seeratnya sehingga tidak mudah lepas dan terus menekan tali pusat, walaupun selai wharton sudah kering. Pita ini dibuang bersamaan dengan lepasnya tali pusat.
- c. Benang diikat kuat dengan ikatan rangkap pada tali pusat. Pengikatan dengan benang katun steril ini tidak menjamin tekanan yang terus menerus pada tali pusat. Walaupun pada ikatan menjadi longgar dan memungkinkan dilakukan observasi yang berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu selama 48 jam. Perdarahan tidak mungkin terjadi pada pemakaian alat penjepit plastik dan pita dari nilon oleh karena terjadi tekanan yang terus menerus pada tali pusat (Winkjosastro, 2005)

#### 4. Perawatan tali pusat

Perawatan tali pusat adalah melakukan pengobatan dan pengikatan tali pusat yang menyebabkan pemisahan fisik ibu dengan bayi. Kemudian tali pusat dirawat dalam keadaan steril, bersih dan terhindar dari infeksi tali pusat (Sarwono, 2010).

Perawatan tali pusat mempunyai tujuan:

- a. Mencegah terjadinya infeksi
- b. Mempercepat proses pengeringan tali pusat

c. Mempercepat lepasnya tali pusat (Wahyuni, 2011).

Perawatan tali pusat secara intensif diperkenalkan pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, dimana pada saat itu angka infeksi pada proses kebidanan sangat tinggi. Akan tetapi pada beberapa negara berkembang masih sering dijumpai terjadinya infeksi tali pusat walaupun antiseptik jenis baru telah diperkenalkan. Selain infeksi, pendarahan pada tali pusat juga dapat berakibat fatal. Akan tetapi pendarahan dapat dicegah dengan melakukan penjepitan tali pusat dengan kuat dan pencegahan infeksi. Peralatan yang digunakan dalam pemotongan tali pusat juga sangat berpengaruh dalam timbulnya penyulit pada tali pusat. Saat dipotong tali pusat terlepas dari suplai darah dari ibu. Tali pusat yang menempel pada pusat bayi lama kelamaan akan kering dan terlepas. Pengeringan dan pemisahan tali pusat sangat dipengaruhi oleh aliran udara yang mengenainya. Jaringan pada sisa tali pusat dapat dijadikan tempat koloni oleh bakteri terutama jika dibiarkan lembab dan kotor. Sisa potongan tali pusat menjadi sebab utama terjadinya infeksi pada bayi baru lahir. Kondisi ini dapat dicegah dengan membiarkan tali pusat kering dan bersih (Wahyuni, 2012).

Infeksi tali pusat pada dasarnya dapat dicegah dengan melakukan perawatan tali pusat yang baik dan benar, yaitu dengan prinsip perawatan kering dan bersih. Pemakaian antimikrobal topikal pada perawatan tali pusat dapat mempengaruhi waktu pelepasan tali pusat, yaitu merusak flora normal sekitar tali pusat sehingga memperlambat pelepasan tali pusat (Wijaya, 2006).

Rekomendasi WHO, cara perawatan tali pusat yaitu cukup membersihkan bagian pangkal tali pusat, ujungnya dibersihkan menggunakan air dan sabun, lalu anginkan hingga benar-benar kering. Untuk membersihkan pangkal tali pusat dengan sedikit diangkat (bukan ditarik) (Wahyuni, 2012).

Perawatan tali pusat menurut asuhan persalinan normal (2008):



- a. Jangan membungkus puntung tali pusat atau perut bayi, mengoleskan cairan atau bahan apapun kepuntung tali pusat.
- b. Mengoleskan alkohol atau Betadine (terutama jika pemotongan tali pusat tidak terjamin DTT atau steril) masih diperkenankan tetapi tidak dikompreskan karena menyebabkan basah/lembab.
- c. Lipat popok dibawah putung tali pusat
- d. Jika putung tali pusat kotor, bersihkan (hati-hati) dengan air DTT/steril dan sabun kemudian segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih.
- e. Segera mencari bantuan jika pusat menjadi merah,bernanah/berdarah, atau berbau (JNPK-KR, 2008).

### **C. Tinjauan Umum tentang Mekanisme Dan Waktu Pelepasan Tali Pusat**

Setelah bayi baru lahir tali pusat dipotong secara mendadak tali pusat tidak mendapat aliran darah dan akan menjadi kering. Pengeringan dan pelepasan tali pusat dipermudah karena terpapar udara. Hilangnya air dari Jeli Wharton menyebabkan mumifikasi tali pusat menghilang dan berubah menjadi kuning kecoklatan dan mengering atau kehitaman, kering dan kaku (ganggren kering). Jaringan tali pusat yang mengalami devitalisasi merupakan medium yang baik untuk pertumbuhan kuman-kuman,terutama bila tali pusat dalam keadaan lembab dan perawatannya tidak bersih (Wijaya, 2006).

Ketika neonatus pertama kali tiba diruang perawatan, sekitar 5 cm tali pusat biasanya masih terdapat pada abdomen dengan beberapa tipe penjepitan. Setelah beberapa hari tali pusat mengkerut dan menghitam. Kemudian setelah beberapa hari atau minggu tali pusat akan lepas dengan sendirinya, meninggalkan area kecil yang bergranulasi, dan biasanya menghilang. Jaringan perut yang kecil dan kontraktur disebut umbilikalis (Sodikin, 2009).

Pemisahan yang terjadi antara pusat dan tali pusat dapat disebabkan oleh keringnya tali pusat atau diakibatkan oleh terjadinya inflamasi karena terjadi infeksi bakteri. Pada proses pemisahan secara normal jaringan yang tinggal sangat sedikit, sedangkan pemisahan yang diakibatkan oleh infeksi masih menyisakan jaringan dalam jumlah banyak yang disertai dengan timbulnya distensi abdomen pada kulit.

Lama penyembuhan tali pusat dikatakan cepat jika kurang dari 5 hari, normal jika antara 5 sampai dengan 7 hari, dan lambat jika lebih dari 7 hari (Paisal, 2008). Lepasnya tali pusat selain dipengaruhi oleh perawatan tali pusat dengan menjaga agar tali pusat tetap bersih kepatuhan ibu untuk membersihkan tali pusat setiap hari. Kebersihan saat merawat tali pusat dan frekuensi mengganti popok setiap kali popok kotor dan basah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lama pelepasan tali pusat yaitu:

- a. Cara perawatan tali pusat. Penelitian menunjukkan bahwa tali pusat yang dibersihkan dengan air, sabun dan ditutup dengan Kasa steril cenderung lebih cepat puput (lepas) dari pada tali pusat yang dibersihkan dengan alkohol.
- b. Kelembaban tali pusat. Tali pusat juga tidak boleh ditutup rapat dengan apapun, karena akan menimbulkan resiko infeksi.
- c. Kondisi sanitasi lingkungan sekitar neonatus *Spora C. Tetani* yang masuk melalui luka tali pusat, karena tindakan atau perawatan yang tidak memenuhi syarat kebersihan.
- d. Timbulnya infeksi pada tali pusat karena tindakan atau perawatn yang tidak memenuhi syarat kebersihan, misalnya pemotongan tali pusat dengan bambu/gunting yang tidak steril, atau setelah dipotong tali pusat dibubuhi abu, tanah, minyak daun-daunan, kopi dan sebagainya (Paisal, 2008).
- e. Hal – hal yang perlu menjadi perhatian ibu dan keluarganya

- 1) Lihat popok dibawah puntung tali pusat
- 2) Jika puntung tali pusat kotor, cuci secara hati-hati dengan air matang (DTT/Desinfeksi tingkat tinggi) dan sabun. Keringkan secara seksama dengan air bersih.
- 3) Jika tali pusat menjadi merah atau mengeluarkan nanah atau darah, harus segera bawa bayi tersebut fasilitas yang mampu memberikan perawatan secara lengkap. Menurut penelitian serta rekomendasi WHO, cara merawat tali pusat yaitu : cukup membersihkan pangkal tali pusat menggunakan air dan sabun, kemudian biarkan terlebih dahulu diudara terbuka hingga benar-benar kering. Penelitian menunjukkan bahwa tali pusat yang dengan air sabun cenderung lebih cepat pupus (lepas) dari pada tali pusat yang dibersihkan menggunakan alkohol. Meski demikian, praktek membersihkan tali pusat dengan alkohol juga tidak sepenuhnya dilarang karena bahkan di beberapa negara maju pun masih ditetapkan pertimbangannya, tali pusat yang dirawat tanpa menggunakan alkohol terkadang menimbulkan aroma yang menyengat.

Bagian yang harus selalu dibersihkan adalah bagian pangkal tali pusat bukan atasnya. Sisa air yang menempel pada tali pusat dapat dikeringkan dengan menggunakan kain kasa steril atau Kasa. Setelah itu angin-anginkan agar cepat kering. Tali pusat harus dibersihkan sedikitnya dua kali sehari selama pembalut tali pusat tidak dalam keadaan kotor atau basah.

Tali pusat juga tidak boleh ditutup rapat dengan apapun, karena akan membuatnya menjadi lembab. Selain memperlambat pupusnya tali pusat, juga dapat menimbulkan resiko infeksi. Kalaupun terpaksa ditutupi, tutup atau ikat pada bagian pangkal tali pusat dapat leluasa mendapat udara. Intinya adalah

mempertahankan tali pusat terkena udara agar cepat mengering dan terlepas. (Sodikin, 2009).

Tali pusat atau umbilical cord adalah saluran kehidupan bagi janin selama di dalam kandungan. Dikatakan saluran kehidupan karena saluran inilah yang selama 9 bulan 10 hari mempunyai zat-zat gizi dan oksigen ke janin. Tetapi, saat bayi lahir, saluran ini sudah tidak di perlukan lagi, sehingga harus dipotong, tindakan berikutnya adalah perawatan pada tali pusat yang telah dipotong. Sisa potongan tali pusat pada bayi inilah yang harus dirawat. Sebab, jika tidak dirawat maka dapat menyebabkan infeksi. Perawatan adalah proses perbuatan, cara merawat, pemeliharaan, dan penyelenggaraan. Perawatan tali pusat tersebut sebenarnya sangat sederhana. Adapun yang paling penting, pastikan tali pusat dan area disekelilingnya selalu bersih dan kering. Selalu cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun sebelumnya membersihkan tali pusat. Selama ini, standar perawatan tali pusat yang diajarkan oleh tenaga medis (perawat) kepada orang tua baru adalah membersihkan atau membasuh pangkal tali pusat dengan alkohol (Wahyuni, 2012).

#### **D. Tinjauan Islam Tentang Perawatan Tali Pusat**

Mencegah infeksi dari tali pusat kedaerah lain dari satu neonatus ke neonatus lainnya, maka penghambatan dan pertumbuhan kuman pada tali pusat sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perawatan tali pusat yang baik dan benar, yaitu dengan prinsip perawatan kering dan bersih (Sodikin, 2009).

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang cara kita menjaga kesehatan, misalnya saja untuk kesehatan fisik, sebagaimana firman Allah swt.

Dalam QS. Al-Muddatsir/74:4-5.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

*“Dan pakaianmu bersihkanlah [4] dan perbuatan dosa tinggalkanlah [5]”.*

Ungkapan “Bersih Pangkal Sehat” mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan Manusia, baik perorangan kekeluargaan, masyarakat maupun lingkungan.

Bertaubat sebagaimana dikemukakan pada ayat tersebut diatas akan menghasilkan kesehatan mental, sedangkan kebersihan lahiriah menghasilkan kesehatan fisik. Dalam Islam kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan adalah pangkal kesehatan, sedangkan kesehatan merupakan modal utama untuk dapat hidup produktif dan melaksanakan peribadatan, Rasulullah saw. Bersabda dalam *Hadis HR. Muslim* yang bunyinya:

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير

Artinya:

*“mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada mukmin yang lemah”.*

Dengan demikian, rendahnya kesadaran terhadap kebersihan akan megancam kesehatan yang akhirnya akan berdampak pada tingginya angka kejadian infeksi atau kematian.

Ajaran kebersihan dalam agama Islam merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah SWT. Orang Islam membersihkan diri untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Orang Islam membersihkan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral (wahyuni, 2012).

Ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang

masa bahkan dikembangkan dalam hukum Islam. Dalam angka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah seperti wudhu, tayammum, mandi dan pembersihan gigi (Prodjokusumo dkk, 1992).

Kebersihan menurut *syara'* mencakup kebersihan badan, pakaian dan tempat. Kata *at-Thaharah* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak lebih dari tiga puluh kali, diantaranya tercantum di dalam Q.S. al-Maidah/5:6 yang berbunyi:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ مِنْهُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾


Terjemahnya:

*“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.*


Makna *‘Thaharah’* mencakup aspek bersih lahir artinya terhindar dari segala kotoran hadas dan najis. Sedangkan bersih batin artinya terhindar dari sifat tercela (Prodjokusumo dkk, 1992).

Penjelasan ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa menjaga kebersihan sangatlah penting karena dengan menjaga kebersihan akan terhindar dari kotoran yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti halnya dengan menjaga kebersihan tali pusat. Dengan melakukan perawatan tali pusat yang baik dan benar yaitu dengan menjaga tali pusat agar tetap bersih dan kering dapat mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat yang menyebabkan kesakitan kematian (Wahyuni, 2012).

### E. Kerangka Konsep



Ket:



#### 1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel independent disebut juga variabel sebab karena karakteristik dari subjek yang dengan keberadaannya menyebabkan perubahan pada variabel lainnya (Dharma, 2011). Variabel independennya adalah perawatan tali pusat dengan Kasa NaCl dan Betadinee.

#### 2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel dependen adalah variabel akibat atau variabel yang akan berubah akibat pengaruh atau perubahan yang terjadi pada variabel independent (Dharma, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah waktu pelepasan tali pusat.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian Quasi eksperimen dengan *one sample post-test* yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas perawatan tali pusat dengan Menggunakan antara Betadine dan NaCl terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa.

#### ***B. Lokasi Dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa yang merupakan salah satu rumah sakit bersalin dengan jumlah pasien partus yang banyak setiap bulannya. Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji merupakan satu-satunya rumah sakit bersalin yang berada di wilayah Kab. Gowa.

##### **2. Waktu penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2015.

#### ***C. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini mencari efektivitas perawatan tali pusat antara menggunakan NaCl dan Betadin.



## ***D. Populasi Dan Sampel***

### **1. Populasi**

Populasi subjek (misalnya manusia, klien ) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah kelahiran bayi hidup yang ada di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab. Gowa.

### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 2010). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah suatu teknik penerapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2008). Dimana jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 20 bayi yaitu kelompok perawatan tali pusat dengan Kasa NaCl sebanyak 10 bayi dan kelompok perawatan tali pusat dengan Kasa Betadinee sebanyak 10 bayi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

- a. Kriteria Inklusi adalah karakteristik subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan yang akan diteliti (Nursalam, 2008).

Kriteria inklusi penelitian ini yaitu :

- 1) Bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji yang tali pusatnya telah setelah mendapatkan perawatan tali pusat 2 kali sehari dengan membersihkan tali pusat menggunakan Kasa NaCl kemudian dibungkus dengan Kasa steril (perawatan dengan NaCl).

- 2) Bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji yang tali pusatnya telah puput setelah mendapatkan perawatan tali pusat 2 kali sehari dengan membersihkan tali pusat menggunakan Betadine kemudian dibungkus dengan Kasa steril (perawatan dengan Betadine).
  - 3) Orang tua bersedia anaknya menjadi responden, dengan penggunaan salah satu jenis antiseptik tersebut dan bersedia diobservasi sampai beberapa hari sampai luka tali pusat sembuh (pupus)
  - 4) Tali pusat bayi baru lahir sehat, tanpa komplikasi lain.
- b. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi (Nursalam, 2008).

Kriteria eksklusi penelitian ini antara lain :

- 1) Memiliki kelainan sewaktu lahir atau bayi dengan komplikasi tali pusat.
- 2) Pernah terjadi infeksi pada tali pusat selama perawatan tali pusat dengan Kasa NaCl/Betadinee.
- 3) Tali pusat pernah diberikan obat-obat yang lain / tidak merawat tali pusat sesuai petunjuk di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji.

#### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner observasi yang dibagikan kepada ibu nifas pada saat melakukan penelitian di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa.

#### ***F. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner. Kuesioner disini diartikan sebagai daftar pertanyaan yang sudah

tersusun dengan baik, sudah matang, dimana responden (objek penelitian) tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu (Notoadmodja, 2005). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data demografi pasien dan lembar observasi pada penggunaan Nacl dan bethadine.

### ***G. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data***

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

#### **1. Editing**

Meliputi kelengkapan pengisian, kesalahan pengisian dan konsistensi dari setiap pengamatan / observasi.

#### **2. Koding**

Mengelompokkan hasil observasi responden berdasarkan 2 metode pemberian desinfeksi.

#### **3. Tabulasi data**

Setelah dilakukan kegiatan editing dan koding dilanjutkan dengan mengelompokkan data kedalam suatu tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel.

### ***H. Analisa Data***

Setelah dilakukan tabulasi data, kemudian data diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows 18 melalui tahap-tahap kemudian data dianalisis dengan metode uji statistik yaitu analisis *univariat* dan *bivariat*.

#### **1. Analisis univariat**

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini akan menghasilkan distribusi frekuensi.

## 2. Analisis bivariat

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas komputerisasi dengan SPSS. Analisa bivariat menggunakan uji statistik *Independen T-Test*.

### **I. Etika Penelitian**

Menurut Nursalam (2008), ada tiga bagian yang menjadi prinsip etis dalam penelitian (pengumpulan data), yaitu:

#### 1. Prinsip Manfaat

##### a. Bebas dari penderitaan

Penelitian menjelaskan prosedur perawatan yang akan dijalankan dan meyakinkan responden intervensi yang diberikan tidak menyakiti responden. Jika responden merasa ada ketidak nyamanan dalam memberikan intervensi, responden akan dieksklusikan.

##### b. Bebas dari eksploitasi

Peneliti menjelaskan secara jelas manfaat dan tujuan penelitian untuk perkembangan ilmu keperawatan. Sehingga responden mengerti dan yakin bahwa informasi yang diberikannya untuk peneliti digunakan untuk tujuan dan kepentingan penelitian dan tidak akan salah gunakan untuk kepentingan lainnya.

##### c. Resiko (benefits rasio)

Peneliti menjelaskan secara terbuka manfaat penelitian yang akan diperoleh oleh pasien dan juga menjelaskan resiko-resiko apa saja yang akan mungkin didapatkan oleh responden terkait kesediannya berparti sipasi dalam penelitian ini.

##### d. Prinsip menghargai hak asasi manusia (*respect human dignity*)

- a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (*right to self determination*)

Peneliti memberikan hak yang terbuka kepada responden bahwa responden dapat memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian atau tidak.

- b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)

Peneliti menjelaskan secara terbuka semua informasi penelitian kepada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, keuntungan dan risiko penelitian, intervensi dan prosedur yang dipakai, serta semua informasi yang terkait kepada responden.

- c. *Informed consent*

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hak bebas apakah responden ini menandatangani *informed consent* atau tidak. Jika responden menandatangani *informed consent* itu berarti responden setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

- e. Prinsip keadilan (*right to justice*)

- a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Peneliti memperlakukan semua responden secara adil perawatan yang diberikan pada responden. Meskipun intervensi perawatan tali pusat dengan Kasa Betadinee dan NaCl diberikan pada kelompok perlakuan yang diberikan pada kelompok control. Peneliti berlaku adil terhadap pemberian intervensi tersebut.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden dengan cara menyamarkan setiap nama responden dengan menggantinya dengan kode responden dimana hanya peneliti yang mengetahui kode responden tersebut. Selain itu, semua data terkait informasi responden disimpan oleh peneliti dan tidak akan disebarluaskan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di RS Bersalin Mattiro Baji yang beralamat di Jl. Syamsuddin Tunru, No. 115, Gowa Kecamatan Makassar dan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei sampai dengan 18 Juni 2015 dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang terdiri dari 10 orang untuk kelompok intervensi berupa pemakaian Betadine dan 10 orang pada kelompok untuk pemakaian NaCl. Hasil penelitian diuraikan secara analitik yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan naskah sebagai berikut:

#### 1. Analisa Univariat

##### a. Karakteristik Responden

Responden yang terdiri atas responden Ibu beserta bayinya. Responden ibu, dibagi berdasarkan karakteristik responden yaitu umur, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden Ibu Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji**  
**Tahun 2015**

Distribusi Responden	Frekuensi	%
<b>Umur</b>		
20-24 tahun	10	50
25-29 tahun	7	35
30-35 tahun	3	15

<b>Pendidikan</b>		
SD	1	5
SLTP/Sederajat	5	25
SLTA/Sederajat	11	55
D3	3	15
<b>Pekerjaan</b>		
Wiraswasta	6	30
IRT	11	55
Pegawai	3	15
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2015

Distribusi responden berdasarkan umur dapat diketahui umur 20–24 tahun 10 orang (50%), umur 25–29 tahun sebanyak 7 orang (35%), umur 30-35 tahun sebanyak 3 orang (15%). Distribusi responden berdasarkan pendidikan yaitu tingkat Sekolah dasar (SD) hanya 1 orang (5%), tingkat SLTP 5 orang (25%), tingkat SLTA sebanyak 11 orang (55%) sedangkan tingkat D3 sebanyak 3 orang (15%). Adapun pekerjaan responden yaitu terdiri dari wiraswasta 6 orang (30%), IRT sebanyak 11 orang (55%) dan pegawai hanya 3 orang (15%).

Adapun responden bayi, dibagi berdasarkan karakteristik responden yaitu Berat badan lahir, Jenis Kelamin dan umur lahir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Karakteristik Bayi Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Tahun 2015**

Distribusi Responden	Frekuensi	%
<b>Berat Badan Lahir</b>		
Rendah	3	15
Normal	17	85



<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki- laki	8	40
Perempuan	12	60
<b>Umur Lahir</b>		
Cukup Bulan	18	90
Tidak Cukup Bulan	2	10
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2015*

Tabel 4.2 di atas, menjelaskan tentang karakteristik bayi. Karakteristik bayi berdasarkan Berat badan lahir yaitu terdiri dari berat badan rendah 3 orang (15%) sedangkan berat badan normal sebanyak 17 orang (85%). Distribusi bayi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 8 orang bayi laki-laki (40%), dan 12 orang (60%) bayi perempuan. Adapun distribusi responden berdasarkan umur lahir terbagi menjadi cukup bulan sebanyak 18 orang (90%) sedangkan bayi yang lahir tidak cukup bulan yaitu 2 orang (10%).

**b. Waktu Pelepasan Tali Pusat dengan Perawatan menggunakan NaCl dan betadine**

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Waktu Pelepasan Tali Pusat dengan Perawatan menggunakan NaCl di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa Tahun 2015**

<b>Waktu Pelepasan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>Cepat</b>	1	10
<b>Normal</b>	9	90
<b>Lambat</b>	0	0
<b>Total</b>	10	100

*Sumber: Data Primer 2015*

Tabel 4.3 di atas menunjukkan tentang waktu pelepasan tali pusat bayi dengan perawatan menggunakan NaCl di RS Bersalin Mattiro Baji. Berdasarkan data yang disajikan terlihat bahwa mayoritas bayi mengalami pelepasan dalam batas waktu normal yaitu antara 5 sampai 7 hari. Adapun selengkapnya tentang waktu pelapasannya yaitu: pada hari ke 4 hanya 1 bayi yang mengalami pelepasan tali pusat (10%) dan tergolong waktu pelepasan yang cepat, pada hari ke-5 2 bayi (20%) mengalami pelepasan tali pusat, hari ke-6 3 bayi (30%) mengalami pelepasan tali pusat, hari ke-7 sebanyak 4 bayi (40%) mengalami pelepasan tali pusat sedangkan pada hari ke 8 observasi tidak ada bayi lagi yang mengalami pelepasan tali pusat pada perawatan dengan NaCl.

**c. Waktu Pelepasan Tali Pusat dengan Perawatan menggunakan Betadine**

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Waktu Pelepasan Tali Pusat dengan Perawatan menggunakan NaCl di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa Tahun 2015**

Waktu Pelepasan	Frekuensi	%
Cepat	1	10
Normal	9	90
Lambat	0	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2015*

Grafik 4.2 di atas menunjukkan tentang waktu pelepasan tali pusat bayi dengan perawatan menggunakan Betadine di RS Bersalin Mattiro Baji. Berdasarkan data yang disajikan terlihat bahwa mayoritas bayi mengalami pelepasan dalam batas waktu normal yaitu antara 5 sampai 7 hari. Adapun selengkapnya tentang waktu pelapasannya yaitu: pada hari ke 4 hanya 1 bayi yang mengalami pelepasan tali pusat (10%) dan tergolong waktu pelepasan yang cepat,

sedangkan antara hari ke-5 sampai hari ke-7 masing-masing 3 bayi (30%) mengalami pelepasan tali pusat, adapun pada hari ke 8 observasi tidak ada bayi lagi yang mengalami pelepasan tali pusat pada perawatan dengan Betadine.

## 2. Analisa Bivariat

Untuk melihat efektivitas perawatan tali pusat pada bayi dengan menggunakan NaCl dan betadine terhadap waktu pelepasan tali pusat dilakukan dengan *Independent t test*. Sebelum dilakukan analisis *Independent t test*, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji *shapiro-wilk* karena termasuk penelitian uji parametrik yang memiliki sampel kecil.

Tabel 4.3  
Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Variabel	Shapiro-Wilk		
	Statistic	Sig.	$\alpha$
Perawatan dengan NaCl	0,859	0,074	0,05
Perawatan dengan Betadine	0,895	0,191	0,05

*Uji Normalitas Shapiro-Wilk*

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai  $p = 0,074$  untuk waktu pelepasan tali pusat dengan perawatan menggunakan NaCl, dan  $p = 0,191$  untuk waktu pelepasan tali pusat dengan perawatan menggunakan betadine, karena kedua nilai  $p > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui kesamaan varian dari dua kelompok sampel sebagai syarat sebelum uji *independent t test*.

**Tabel 4.4**  
**Uji Homogenitas**

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
0,023	1	18	0,880

*Uji Homogenitas*

Berdasarkan hasil uji tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi variabel waktu pelepasan tali pusat dengan perawatan Betadine berdasarkan perawatan dengan betadine adalah  $0,880 > 0,05$ , artinya data variabel waktu pelepasan tali pusat dengan NaCl dan Betadine memiliki varian yang sama (homogenitas) sehingga uji yang digunakan untuk melihat efektivitas perawatan tali pusat dengan menggunakan NaCl dan Betadine terhadap waktu pelepasan tali pusat adalah uji T Independent (*Independent T Test*).

**Tabel 4.7**  
**Efektivitas Perawatan Tali Pusat dengan Menggunakan NaCl dan Betadine terhadap Waktu Pelepasan Tali Pusat Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa Tahun 2015**

Kelompok	Levene's test (homogenitas)		Mean	Nilai t	perbedaan rerata (CI 95%)		P value*
	F	Sig.			Lower	Upper	
Nacl	0,023	0,880	6	0,429	-0,780	1,180	0,673
Betadine			5,8				

\*Uji *independent t test*

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *independent t test* didapatkan hasil yaitu *levене test* untuk homogenitas tampak bahwa  $F=0,023$  ( $p=0,880$ ) karena  $p>0,05$  maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan varians pada data kelompok Nacl dan kelompok Betadine (data *equal/homogen*),

selanjutnya nilai mean terlihat bahwa kelompok NaCl lebih tinggi dari kelompok Betadine ( $6 > 5,8$ ) dengan nilai  $t = 0,429$ . Taraf kepercayaan 95%, jadi dengan menggunakan taraf kepercayaan 95% rentang selisih pengetahuan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dari 5,8 sampai 6. Adapun analisis uji statistik tabel dengan independent t-test tersebut dengan tingkat kemaknaan  $\alpha = 0.05$  diperoleh nilai signifikansi  $p = 0.673$  dimana lebih besar dari nilai  $\alpha = 0.05$  yang berarti  $H_0$  diterima, tidak ada perbedaan signifikan antara pengaruh teknik perawatan tali pusat dengan Kassa NaCl dan betadine terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab.Gowa.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSB Mattiro Baji Gowa diketahui bahwa umur ibu yang melahirkan didominasi pada usia dewasa madya antara 20-24 tahun sebanyak 50%, pendidikan mayoritas yaitu SLTA sebanyak 55% dan mayoritas ibu adalah ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 55%. Adapun bayi yang dijadikan sampel penelitian terdiri dari 60% perempuan, dengan berat badan lahir normal sebanyak 85% dan umur lahir cukup bulan sebanyak 90%. Selama proses penelitian, peneliti mengobservasi pelepasan tali pusat mulai saat persalinan di Rumah sakit sampai bayi dan orang tua pulang dari rumah sakit. Adapun waktu observasi setiap bayi kurang lebih selama 1 minggu. Perubahan waktu pelepasan tali pusat baik antara perawatan menggunakan NaCl maupun Betadine yaitu masing-masing 90% berada dalam batas waktu normal antara 5 sampai 7 hari.

Perawatan tali pusat dengan NaCl pada hari ke 4 hanya 1 bayi yang mengalami pelepasan tali pusat sebanyak 10% dan tergolong waktu pelepasan yang cepat, pada hari ke-5 2 bayi mengalami pelepasan tali pusat, hari ke-6 3 bayi mengalami pelepasan tali pusat, hari ke-7 sebanyak 4 bayi mengalami pelepasan

tali pusat, sedangkan perawatan tali pusat dengan betadin pada hari ke-4 hanya 1 bayi mengalami pelepasan tali pusat dan pada hari ke-5 sampai hari ke-7 masing-masing 3 bayi mengalami pelepasan tali pusat, dan tidak ada bayi yang mengalami pelepasan tali pusat secara lambat (hari ke-8).

Untuk mengetahui efektivitas perawatan tali pusat baik dengan menggunakan NaCl maupun dengan betadine dilakukan analisis dengan *Independent t test* yang sebelumnya telah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan *Shapiro wilk* dan didapatkan hasil bahwa data terdistribusi normal yaitu dengan nilai  $p = 0,074$  untuk waktu pelepasan tali pusat dengan perawatan menggunakan NaCl, dan  $p = 0,191$  untuk waktu pelepasan tali pusat dengan perawatan menggunakan betadine, karena kedua nilai  $p > 0,05$ . Setelah dilakukan uji normalitas, maka dilakukan analisis dengan SPSS dan didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pengaruh teknik perawatan tali pusat dengan NaCl dan betadine terhadap waktu pelepasan tali pusat di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kab. Gowa, dengan tingkat kemaknaan  $\alpha = 0.05$  diperoleh nilai signifikansi  $p = 0.673$  dimana lebih besar dari nilai  $\alpha = 0.05$  yang berarti  $H_0$  diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Pada penelitian yang dilakukan oleh Ari Yunanto, dkk. Tentang peran Alkohol 70%, Povidon-Iodine 10% dan Kasa kering steril dalam pencegahan infeksi pada perawatan tali pusat. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran alkohol 70%, povidon-iodine 10% dan Kasa kering steril dalam pencegahan infeksi pada perawatan tali pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga jenis perlakuan tidak didapatkan tanda-tanda adanya infeksi tali pusat demikian pula lama lepasnya tali pusat tidak terdapat perbedaan yang bermakna (alkohol 70 %: 7,33 hari, povidon-iodine: 10 %: 7,25 hari, dan Kasa kering steril: 6,42 hari).

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perawatan tali pusat dengan menggunakan alkohol 70%, povidone-iodine 10% dan Kassa kering steril dapat mencegah terjadinya infeksi tali pusat dan tidak berpengaruh terhadap lama lepasnya tali pusat. Namun bila dipandang dari segi ekonomi perawatan tali pusat dengan Kasa kering steril dinilai lebih ekonomis dibandingkan perawatan tali pusat dengan menggunakan alkohol 70% dan povidone-iodine 10%. Sisa air yang menempel pada tali pusat dapat dikeringkan dengan menggunakan kain Kassa steril atau Kassa. Setelah itu kering, anginkan tali pusat.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Zuniati (2009) yang mengemukakan bahwa Tali pusat harus dibersihkan sedikitnya dua kali dalam sehari. Tali pusat juga tidak boleh ditutup rapat dengan apapun, karena akan membuatnya menjadi lembab. Selain memperlambat lepasnya tali pusat, juga menimbulkan resiko infeksi. Kalaupun terpaksa ditutup, tutup atau ikat dengan longgar pada bagian atas tali pusat dengan kain Kassa steril. Pastikan bagian pangkal tali pusat dapat terkena udara dengan leluasa.

Masa bayi merupakan masa yang sangat penting dan sangat membutuhkan perhatian penuh mengingat bayi membutuhkan ketergantungan penuh terhadap orang disekitarnya. Begitu pula dengan penyakit dan ancaman yang senantiasa dapat menghampiri bayi. Menurut Kementerian Kesehatan RI pada Buletin eliminasi tetanus maternal dan neonatal (2012) mengungkapkan bahwa angka kematian bayi (AKB) di Indonesia tahun 2007 adalah 34 kematian per 1000 kelahiran hidup dan kematian tertinggi pada masa neonatal akibat Tetanus neonatorium. Tetanus neonatorium (tetanus pada masa neonatal) dan tetanus maternal merupakan penyebab kematian paling sering terjadi akibat persalinan dan penanganan tali pusat tidak bersih. Tetanus ditandai dengan kaku otot yang nyeri yang disebabkan oleh neurotoxin yang dihasilkan oleh *Clostridium tetani*

pada luka anaerob (tertutup). Tetanus neonatorium (TN) adalah tetanus pada bayi usia hari ke 3 – 28 setelah kelahiran sedangkan tetanus maternal adalah tetanus pada kehamilan dan dalam 6 minggu setelah melahirkan. Bila tetanus terjadi angka kematian sangatlah tinggi terutama bila pelayanan kesehatan tidak tepat tersedia. Maternal dan neonatal dapat dengan mudah dicegah dengan persalinan dan penanganan tali pusat yang higienis, dan atau dengan imunisasi dan vaksin tetanus (Kemenkes RI, 2012).

Melihat manfaat dan pengaruh yang positif dari perawatan tali pusat terhadap pencegahan Tetanus Neonatorium yang dapat mengakibatkan kematian pada bayi, maka dalam penelitian ini telah dilakukan pembuktian selama 1 bulan dengan penelitian yang dilakukan secara bertahap mulai dari penelian menggunakan kuesioner sampai penelitian dengan melakukan observasi langsung kepada bayi mulai setelah kelahiran sampai terlepasnya tali pusat bayi yang berkisar sampai 8 hari untuk menunggu proses pelepasan tali pusat.

Perawatan tali pusat secara intensif diperkenalkan pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an dimana pada saat itu angka infeksi pada proses kebidanan sangat tinggi. Akan tetapi pada beberapa Negara berkembang masih sering dijumpai terjadinya infeksi tali pusat walaupun antiseptik jenis baru telah diperkenalkan. Perawatan tali pusat adalah perawatan atau pemeliharaan pada tali pusat bayi setelah tali pusat dipotong atau sebelum putus. Perawatan tali pusat yaitu pemisahan fisik tali pusat bayi, kemudian tali pusat dirawat dalam keadaan steril, bersih, kering dan terhindar dari infeksi (Paisal, 2008). Perawatan tali pusat merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan yang merawatnya baik bidan maupun perawat dan tak terlepas dari dukungan ibu atau orang terdekat bayi. Hasil penelitian dalam karya tulis ilmiah St. Suhurah (2010) tentang gambaran pengetahuan ibu nifas tentang perawatan tali pusat di Puskesmas Mamajang



Makassar, mengungkapkan bahwa semua (100%) responden mengetahui tentang pengertian perawatan tali pusat serta sebanyak 25 (83,4%) cukup mengetahui tentang cara perawatan tali pusat (Suhurah, 2010).

Berdasarkan Riskesdas tahun 2007, yang diungkapkan pada Buletin eliminasi tetanus maternal dan neonatal (2012) sebagian besar (78,5%) kematian neonatus terjadi pada minggu pertama kehidupan (0-6 hari). Terkait hal tersebut, tahun 2008 ditetapkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan neonatus dari semula 2 kali (satu kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari), menjadi 3 kali (dua kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari). Dengan perubahan ini, jadwal kunjungan neonatus dilaksanakan pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari. Pelayanan kesehatan neonatal ini diantaranya adalah untuk perawatan tali pusat yang dapat bermanfaat untuk mencegah tetanus neonatorum digambarkan dengan indikator cakupan kunjungan neonatal (Kemenkes RI, 2012).

Tingginya angka kematian bayi ini dapat menjadi petunjuk bahwa pelayanan maternal dan neonatal kurang baik, untuk itu dibutuhkan upaya menurunkan angka kematian bayi tersebut. Masa bayi merupakan masa yang perlu mendapatkan perhatian dan perawatan yang ekstra karena pada masa ini angka mortalitas paling tinggi. Pada masa ini terjadi proses penyesuaian sistem tubuh bayi dari kehidupan intrauteri ke ekstrauteri. Hari-hari setelah bayi sangat penting karena menentukan perkembangan bayi (Sodikin, 2009).

Pentingnya merawat bayi juga digambarkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hajj/22:5.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُم مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ  
 ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ  
 نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُوهُنَّ أَشَدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ  
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ  
 وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

*"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah".*

Berdasarkan ayat tersebut di atas, mengandung arti bahwa sesungguhnya Allah SWT, menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna kemudian karena kuasa-Nya menetapkan bagi mudgah yang tidak sempurna kajadiannya itu gugur dan Allah SWT tetapkan dalam rahim bagi mudgah yang sempurna kejadiannya kemudian berlanjut proses kejadiannya sesuai dengan yang Allah hendaki (Shihab, 2009).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menafsirkan bahwa ayat tersebut di memberikan pandangan kepada kita bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, kemudian dalam masanya ketika bayi mendapat masalah

dalam hidupnya ataupun terkena oleh suatu penyakit tidak terlepas dari kehendak-Nya, oleh karena itu sebagai manusia kita hanya dapat berusaha yang terbaik seperti mengusahakan agar perawatan tali pusat dilakukan sebaik-baiknya.

Rasulullah SAW melalui hadisnya telah mengingatkan bahwa ada dunia nikmat yang sangat besar yang seringkali dilupakan atau kurang diperhatikan oleh mayoritas manusia yaitu kesehatan dan kesempatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:

Artinya:

*“Dari Ibn Abbas ra. Berkata “Nabi Muhammad SAW, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh mayoritas manusia, kesehatan dan kesempatan” (HR. Al- Bukhari).*

Kemampuan hidup sehat dimulai sejak bayi, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang menentukan kualitas hidup saat dewasa. Supaya terciptanya bayi yang sehat maka dalam perawatan bayi seperti perawatan tali pusat perlu dilakukan sesuai pedoman kesehatan.

Infeksi tali pusat pada dasarnya dapat dicegah dengan melakukan perawatan tali pusat yang baik dan benar, yaitu dengan prinsip perawatan kering dan bersih. Perawatan tali pusat yang benar dan lepasnya tali pusat pada minggu pertama bermakna mengurangi insiden infeksi pada neonatus (Prawirohardjo, 2008). Setelah bayi lahir tali pusat dipotong. Secara mendadak tali pusat tidak mendapat aliran darah dan akan menjadi kering. Pengeringan dan pelepasan tali pusat dipermudah karena terpapar udara. Hilangnya air dari jeli Wharton menyebabkan mumifikasi tali pusat segera setelah bayi lahir. Dalam 24 jam warna putih tali pusat menghilang dan berubah menjadi kuning kecoklatan dan mengering kemudian menjadi kehitaman kering dan kaku (Wijaya, 2006).

Mencegah infeksi tali pusat bayi dapat dilakukan dengan cara perawatan tali pusat yang baik dan benar dengan prinsip kering dan bersih (Sodikin, 2009).

Islam mengajarkan umat manusia untuk selalu menjaga kebersihan Allah SWT berfirman dalam QS. Al-mudatsir /74:4-5.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۖ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۖ

Terjemahnya:

*“Dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah”.*

Ungkapan “bersih pangkal sehat” menjadi landasan kita untuk selalu mementingkan kebersihan untuk mencegah penyakit. Pencegahan penyakit dapat dilakukan baik secara perseorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi pelepasan tali pusat diantaranya adalah : Timbulnya infeksi pada tali pusat, karena tindakan atau perawatan yang tidak memenuhi syarat kebersihan, misalnya pemotongan tali pusat dengan bambu/gunting yang tidak steril, atau setelah dipotong tali pusat dibubuhi abu, tanah, minyak daun-daunan, kopi dan sebagainya. Cara perawatan Tali pusat, penelitian menunjukkan bahwa tali pusat yang dibersihkan dengan air dan sabun dan dibiarkan terbuka cenderung lebih cepat puput (lepas) dari pada tali pusat yang dibersihkan dengan Kasa steril dan alcohol. Serta kelembaban tali pusat, tali pusat juga tidak boleh ditutup rapat dengan apapun, karena akan membuatnya menjadi lembab. Selain memperlambat puputnya tali pusat, juga menimbulkan resiko infeksi. Begitu pula dengan kondisi sanitasi lingkungan sekitar neonatus, Spora C. tetani yang masuk melalui luka tali pusat, karena tindakan atau perawatan yang tidak memenuhi syarat kebersihan (Ellen, 2008).

Selain dari faktor perawatan tali pusat langsung setelah kelahiran, ada faktor lain yang menyebabkan waktu pelepasan tali pusat yaitu seperti metode persalinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lia ratnasari (2013) tentang pengaruh persalinan *Lotus Birth* terhadap lama pelepasan plasenta, lama pelepasan tali pusat dan keberhasilan *bounding attachmanet*, mengemukakan ada

perbedaan yang signifikan antara metode *Lotus Birth* dengan metode *Konvensional* terhadap lama pelepasan tali pusat (Ratnasari, 2013).

Ibu dan perawat bayi tidak diperbolehkan membubuhkan apapun pada tali pusat dan tali pusat dibiarkan terbuka agar tetap kering. Ibu bayi perlu mendapatkan pemahaman tentang hal ini karena ibu bayi umumnya tidak suka melihat jika tali pusat bayi menjadi kering, sehingga mereka memilih untuk membungkus tali pusat atau membubuhkan segala sesuatu yang mereka anggap dapat membantu penyembuhan tali pusat (Sodikin, 2009).

Berbagai antimikrobal topikal telah digunakan oleh banyak peneliti dalam melakukan perawatan tali pusat. Namun *World Health Organization* (WHO) belum sepenuhnya merekomendasikan penggunaan secara terus menerus disebabkan pertimbangan kekurangan dan efek yang diakibatkan dan biaya (Sodikin, 2009). Hal ini didukung oleh Zupan (2009), dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa sebagian besar yang berasal dari negara-negara berpenghasilan tinggi, menunjukkan bahwa tidak ada infeksi sistemik atau kematian yang diamati dalam studi ulasan. Tidak ada perbedaan ditunjukkan antara tali pusat diobati dengan antiseptik dibandingkan dengan perawatan tali pusat kering atau plasebo. Ulasan ini tidak memberikan rekomendasi bahan atau antiseptik apa yang baik digunakan untuk perawatan tali pusat.

Berbagai antiseptik yang digunakan di masyarakat saat ini menggunakan Kasa alkohol untuk melilit tali pusat. Alkohol sendiri banyak dilaporkan menyebabkan tali pusat menjadi basah dan lembab sehingga tidak direkomendasikan lagi. Alkohol menurut penelitian di Rumah sakit, kurang efektif dalam mengontrol kolonisasi pada tali pusat dan infeksi kulit dibandingkan antimikrobal lainnya, seperti Klorheksidin. Alkohol juga menyebabkan lambatnya pemisahan tali pusat. Meskipun secara teori alkohol menyebabkan

pengeringan, observasi klinis telah membuktikan bahwa pembersihan tali pusat menggunakan alkohol menyebabkan tali pusat menjadi lembut dan lembap. Sedangkan Silver sulfadiazin efektif dalam mengurangi kolonisasi pada tali pusat seperti halnya *triple dye*, bacitrim dan povidion iodine (Betadine). Silver sulfadiazin lebih efektif melawan streptokokus grup B dan organisme gram negatif melawan *S. Aureus* (Sodikin, 2009). Hal ini berbeda oleh penelitian yang dilakukan Safique, M. S., et all (2006) yang berjudul “*Alcohol Application versus Natural Drying of Umbilical Cord*”. Penelitian ini untuk membandingkan pemisahan tali pusat dengan tingkat infeksi dengan menggunakan alkohol terhadap pengeringan tali pusat. Hasil penelitian didapatkan perbedaan waktu pemisahan tali pusat antara alkohol dengan non antiseptik yaitu 1,71 hari lebih cepat alkohol (Safique, 2006).

Hasil penelitian Permanasari (2009) menunjukkan bahwa lama pelepasan tali pusat pada bayi dengan perawatan Kassa kering lebih cepat dibandingkan dengan bayi dengan perawatan Kassa alkohol 70% (150,4 205,7) dengan selisih waktu 55,3 jam. Untuk perawatan tali pusat dengan menggunakan Kassa kering dibandingkan dengan perawatan tali pusat terbuka, tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada perawatan alkohol 70% dibandingkan dengan perawatan terbuka, lama pelepasan tali pusat lebih cepat pada perawatan yang terbuka (129 205,7) dengan selisih waktu 76,2 jam; sehingga dari ketiga perawatan tersebut lama pelepasan tali pusat ditinjau dari rata-ratanya yang paling cepat adalah perawatan tali pusat terbuka, kemudian perawatan tali pusat dengan Kassa kering dan yang paling lama adalah perawatan tali pusat dengan Kassa alkohol (Permanasari, 2009).

Meskipun pada kesepakatan umum dilakukan teknik steril untuk memotong tali pusat menggunakan alat steril (pisau atau gunting) dan tangan yang bersih untuk

menghindari infeksi, harus dilakukan cara perawatan yang terbaik dari sisa tali pusat. Praktik modern yang sering digunakan adalah menerapkan agen antiseptik untuk tali pusat (biasanya alkohol, sulfadiazin perak, betadine atau klorheksidin) (Zupan, 2009).

Faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan infeksi pada tali pusat adalah teknik *aseptik* pada saat persalinan, rawat gabung, dan menyusui. WHO merekomendasikan persalinan yang aseptik, pemotongan tali pusat dengan instrumen yang steril, menjaga kebersihan dan kekeringan tali pusat dan daerah sekitar tali pusat sampai tali pusat lepas. Tanda dan gejala terjadinya infeksi lokal pada tali pusat adalah *eritema*, kemerahan, *oedema*, dan *tenderness* serta munculnya cairan *purulen* yang berbau menyengat dan adanya perdarahan pada tali pusat (Mullany *et al*, 2003 dalam Sumiyati, 2009).

Penjagaan diri pada waktu sehat, lebih baik dari pada pengobatan pada waktu sakit. Allah SWT. Melarang manusia membiarkan dirinya binasa. Berbagai upaya untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit seperti di nyatakan dalam Al-Quran. Allah swt berfirman dalam Q.S Ar- r'ad :11

لَهُر مَعَقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَہُمْ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, mengajarkan kepada umat manusia agar selalu berusaha menjadi yang lebih baik, karena Allah swt tidak mengubah kita

selain kita tidak mengiringinya dengan usaha. Begitu juga halnya dengan perawatan tali pusat pada bayi, bayi akan mengalami infeksi tali pusat yang dapat berakibat fatal apabila perawat/ bidan ataupun orang tua tidak berusaha untuk menjaga tali pusat tersebut agar dalam kondisi bersih dan sehat.

Menurut peneliti fenomena perawatan tali pusat pada bayi masih beragam dalam penggunaan bahan. Ada yang menggunakan Betadine, Kasa alkohol dan ada yang menggunakan Kassa steril. Penggunaan Kassa yang dibasahi dengan alkohol dan melilitkannya pada tali pusat memiliki kekurangan yaitu dapat mengakibatkan luka basah dan lembab yang menyebabkan luka menjadi lama untuk kering dan pelepasan tali pusat yang menjadi lama, sehingga dapat beresiko mengalami Tetanus neonatorium dan dapat berakibat kematian. Adapun penelitian ini menggunakan betadine dan Nacl. Bahan tersebut dioleskan ketali pusat dan dibiarkan kering terlebih dahulu, setelah itu dililit dengan Kassa steril.

Penelitian ini tidak menyebabkan tali pusat menjadi lembab sehingga dapat merangsang tali pusat untuk cepat kering dan pelepasan tali pusat menjadi cepat. pada hasil penelitian didapatkan tidak ada perbedaan signifikan antara kedua bahan ini, namun penelitian ini menunjukkan penggunaan Betadine dan Nacl pada perawatan tali pusat menyebabkan tali pusat putus dalam waktu normal dan tidak mengalami tanda-tanda infeksi. Walaupun peneliti belum mendapatkan laporan tentang penggunaan Nacl untuk perawatan tali pusat, namun Nacl sendiri telah lama digunakan sebagai pencuci luka karena merupakan cairan fisiologis yang cocok untuk tubuh, namun yang harus diperhatikan dalam perawatan tali pusat adalah tali pusat tidak boleh basah atau lembab. Hal ini berlawanan dengan perawatan luka secara umum yang memegang prinsip *moisture balance* (luka harus lembab).



Berbagai referensi dan laporan penelitian mengemukakan bahwa Povidine iodine (Betadine) masih diperkenankan untuk digunakan dalam perawatan tali pusat sepanjang tidak menyebabkan tali pusat basah atau menjadi sangat lembab (Sodikin, 2009). Hal ini didukung oleh penelitian Sumiyati (2009). Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari 20 bayi yang menggunakan Kassa povidon-iodine 10 % dalam perawatan tali pusat ternyata waktu pelepasan tali pusat tercepat memerlukan waktu 71 jam 40 menit, terlama memerlukan waktu 293 jam 10 menit dan nilai rata-rata pelepasan tali pusat 138 jam 25 menit. Rerata waktu pelepasan tali pusat menggunakan Kassa kering yaitu 131 jam 27 menit. 2. Rerata waktu pelepasan tali pusat menggunakan Kassa alkohol 70 % yaitu 174 jam 43 menit (Sumiyati, 2009).

Selain bahan yang digunakan pada perawatan tali pusat, metode perawatan tali pusat juga mempengaruhi, misalnya apakah tali pusat di bungkus (tertutup) atau terbuka. Penelitian Permanasari (2009) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pelepasan tali pusat pada bayi baru lahir yang paling cepat adalah pada perawatan tali pusat terbuka dengan kassa kering dan paling lama adalah perawatan dengan kassa alkohol. Namun penelitian ini berbeda dengan peneliti terdahulu oleh Sumaryati, (2006) yang menunjukkan bahwa rerata waktu pelepasan tali pusat yang dirawat dengan ASI 5,32 hari, kassa Alkohol 70% 6,87 hari, sedangkan kassa kering terbuka 6,75 hari (Sumaryati, 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan Sri Masyita Wahyuni (2013), menunjukkan bahwa pada perawatan tali pusat tertutup waktu pelepasan tali pusat lebih lama dibandingkan waktu pelepasan tali pusat yang terbuka, selain itu perawatan tali pusat yang dibiarkan terbuka dapat menghemat biaya karena tidak membutuhkan bahan terlalu banyak (Wahyuni, 2013). Hasil penelitian didukung oleh Evi Hasnita (2011), dalam penelitiannya juga melaporkan bahwa rata-rata

lama waktu lepasnya tali pusat dengan perawatan tali pusat tertutup adalah 8,2 hari (Lambat) sedangkan perawatan tali pusat terbuka adalah 4,3 hari (cepat) (Hasnita, 2011).

Secara umum dari hasil penelitian yang telah diungkapkan diatas menyatakan betadine masih berpengaruh terdapat waktu pelepasan tali pusat, namun bahan lainnya seperti alkohol yang sudah tidak direkomendasikan lagi mendorong peneliti sehingga menggunakan bahan lain yang mudah dijumpai dan sudah digunakan selama ini sebagai pencuci luka yaitu cairan NaCl. Dibeberapa pelayanan kesehatan, masih banyak yang menerapkan perawatan tali pusat dengan menggunakan alkohol, yang secara teori menyebabkan tali pusat menjadi basah. Namun dalam penelitian ini NaCl digunakan dengan mengoleskan pada tali pusat dan dibiarkan kering kemudian dililit dengan Kassa steril dan membuat ikatan yang renggang sehingga memungkinkan udara dapat masuk sehingga tidak menyebabkan kelembaban pada tali pusat.

Akhirnya, penelitian yang dilakukan selama 1 bulan dengan judul “Efektifitas Pelepasan Tali Pusat dengan Betadine dan NaCl Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa” dapat diselesaikan tepat waktu. Penelitian ini memberikan gambaran kepada kita semua baik masyarakat maupun mahasiswa sebagai pelopor peningkatan derajat kesehatan khususnya keperawatan UIN Alauddin Makassar secara universal bahwa metode perawatan tali pusat dapat menggunakan kedua bahan dalam penelitian ini.

Berkat bantuan dan kerjasama berbagai pihak, berbagai macam hambatan selama proses penelitian yang ditemui dalam penelitian ini dapat teratasi dengan baik, banyaknya aktivitas peneliti maupun para responden terkadang menjadi suatu alasan tidak tetapnya waktu pertemuan peneliti dengan responden yang telah disepakati, disamping itu waktu pelaksanaan penelitian ini terbagi menjadi dua

sesi yaitu di Rumah sakit dan saat responden sudah berada dirumah sehingga peneliti harus berbagi waktu dengan responden lain agar penelitian ini tetap berjalan baik hingga selesai.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Waktu pelepasan tali pusat dengan menggunakan Nacl yaitu relatif lebih tinggi pada hari ke-7 sebanyak 4 bayi (40%) mengalami pelepasan tali pusat.
2. Waktu pelepasan tali pusat dengan menggunakan Betadine yaitu relatif konstan pada waktu normal (hari ke 5, 6, dan 7) masing-masing 3 bayi (30%) mengalami pelepasan tali pusat.
3. Hasil analisis dengan *independent t test* didapatkan hasil yang tidak signifikan yaitu tidak ada perbedaan antara penggunaan Nacl maupun Betadine terhadap waktu pelepasan tali pusat di RS Bersalin Mattirobaji Makassar.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang dibuat, beberapa saran dari peneliti terkait efektivitas pelepasan tali pusat antara menggunakan Betadin dan NaCl Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa adalah:

##### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian selanjutnya, diharapkan menggali lebih dalam mengenai penggunaan Nacl maupun betadine secara mikroskopis mulai perawatan pertama sampai lepasnya tali pusat sebagai metode dalam perawatan tali pusat.

## 2. Bagi Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk menggambarkan peranan bahan yang digunakan dalam perawatan tali pusat yaitu Nacl dan Betadine.

## 3. Bagi Insititusi

Institusi Rumah sakit terkait diharapkan mampu menanggapi hasil penelitian ini dengan memasukkan metode ini sebagai salah satu prosedur perawatan tali pusat dan dapat mengembangkan penelitian ini lagi untuk diaplikasikan dalam hal perawatan tali pusat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan penelitian lanjutan dengan mengamati secara makroskopis dan mikroskopis perawatan tali pusat dengan Nacl atau betadin maupun bahan lain yang direkomendasikan dan menilai waktu pelepasan tali pusat dari waktu ke waktu dengan hitungan jam dan menit, bukan dengan hitungan hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- AL- 'Alim Al-Quran & Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan. 2010. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Ai Yeye Rukiyah dkk. 2009. *Asuhan Kebidanan II Persalinan*. Jakarta : TIM
- Anik Maryunani. 2011. *Perencegahan Infeksi dalam Kehamilan*. Jakarta: CV Trans Info.
- Asrul . 2011. <http://id.scribd.com/doc/72540191/Perawatan-Tali-Pusat-Leflet>. Diakses tanggal 5 januari 2015
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ari Yunanto, dkk. <http://www.idai.or.id/saripediatri/pdf/7-2-1.pdf>. Diakses tanggal 7 januari 2015
- Ellen. 2008. *Bayi Neonatus Paling Rawan Tetanus*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hasnita, Evi. 2011. *Perbedaan waktu pelepasan tali pusat antara perawatan tali pusat tertutup dan perawatan tali pusat terbuka*. <http://jurnal.stikesfdk.ac.id/jurnal.php?dho=detail&id=29>. Diakses tanggal 23 Juli 2015.
- Hidayat, Aziz Alimul. 2008. *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Indra dkk. 2010, *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*. Yogyakarta: Fitramaya
- JNPK-KR, 2008. *Asuhan Persalinan Normal*. Cetakan III. Revisi, Jakarta.
- Manuaba, I.B.G 1998. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Cetakan I. Jakarta: EGC.
- Musbikin. 2006. *Persiapan Menghadapi Persalinan*. Edisi 1. Yogyakarta: Mitra pustaka.
- Nur Muslihatun, Wafi. 2010. *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*. Yogyakarta: Fitrahmaya.
- Nursalam. 2008. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Paisal. 2008. Perawatan Tali Pusat. Available at <http://ereasoftware.files.wordpress.com>. Diakses tanggal 7 januari 2015
- Permanasari, D. 2009. Perbedaan lama pelepasan tali pusat antara perawatan tertutup dengan yang dibiarkan terbuka. Fakultas Kedokteran UNY, terdapat pada : <http://awanwati./2008/10/Tian-Tali-PusaUMateri.html>. diakses pada tanggal 20 juli 2015.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2008. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Prawirohardjo S. 2010. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta : Sarwono Prawirohardjo
- Prawirohardjo, S. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Meternal dan Neonatal*. Jakarta: EGC.

- Ratnasari, Lia dkk. 2013. Pengaruh Persalinan Lotus Birth Terhadap Lamanya Pelepasan Plasenta. *Jurnal Akademi Kebidanan*, Esti Utama Boyolali, 2013.
- Rizal Yefri, dkk. 2010. [www.idai.or.id/saripediatri/pdf/11-5-6.pdf](http://www.idai.or.id/saripediatri/pdf/11-5-6.pdf). Diakses tanggal 5 januari 2015
- Saifuddin, Abdul Bari. 2010. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Shihab, M Quraish. 2009. *Tafsir Al- Mishbah: pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur''an* Vol. IV, Vol. VII, dan Vol. VIII. Jakarta: Lentera Hati.
- Sri zuniyati, dkk. (2009). *Perawatan Waktu Pelepasan Tali Pusat Berdasarkan Jenis Perawatan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir*. Purwokerto: Skripsi, Akademi Kebidanan YLPP.
- Sodikin. 2009. *Buku Saku Perawatan Tali Pusat*. Jakarta : ECG.
- Soleh dkk. 2005. *Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir Untuk Dokter, Bidan, dan Perawatan di Rumah Sakit*.
- Sugeng Jitowiyono. 2010. *Asuhan Keperawatan Neonatus dan Anak*. Penerbit: Nuha Medika.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* . Bandung: Alfabetha. 2012.
- Suhurah, St. 2010. *Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Perawatan Tali Pusat Di Puskesmas Mamajang Makassar*. KTI.UIN Alauddin Makassar.
- Sumaryani, S. 2006. Perbedaan waktu pelepasan tali pusat dan kejadian ompalitis pada perawatan tali pusat dengan ASI, alkohol 70% dan kering terbuka. Fakultas Kedokteran UI, Tesis S2, [http://ebursa.depdiknas.go.id/pusataka/harvester/index.php/record /view/ 87343](http://ebursa.depdiknas.go.id/pusataka/harvester/index.php/record/view/87343). diakses pada tanggal 20 juli 2015
- Suriani dkk. 2009. *Dasar-Dasar Asuhan Kebidanan Komunitas*. Yogyakarta: Titi Publishar.
- Sumiyati, Siti. 2009. *Rerata waktu pelepasan tali pusat berdasarkan jenis perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di kecamatan patikraja*. Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article> diakses pada tanggal 20 juli 2015
- Syarudin dan Hamidah. 2011. *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita: Penuntun Belajar Praktek Klinik*. Jakarta: EGC.
- Utami, deffi Gita. 2010. *Perbedaan lama lepas tali pusat perawatan dengan menggunakan kasa steril dibandingkan kasa alkohol di desa Bowan kecamatan delanggu*. <http://eprints.ums.ac.id/10389/1/J210060007.pdf> diakses tanggal 23 Juli 2015.
- Verney, Helen, Jan M. Kriebs, dan Carolyn L. Gregor. 2006. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Vol 1*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Wahyuni, Sri Masyita. 2013. *Gambaran perbedaan waktu pelepasan tali pusat antaraperawatan tertutup dengan terbuka di Puskesmas Bara-barayya dan di Puskesmas Batua raya*. KTI, UIN Alauddin Makassar.
- Wijaya, R. 2006. *Perbedaan Lama Pelepasan Tali Pusat Pada BBLR yang Dirawat Menggunakan Air Steril dibandingkan dengan alkohol 70 %*. Yogyakarta, RSUP Dr. Sardjito. Disertasi.

Wiknjosastro, Hanifa, Dkk. 2005. *Ilmu Kebidanan*, Cet IX. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Wahyuni Sri M, 2012. *Gambaran Waktu Pelepasan Perawatan Tali Pusat antara Perawatan Terbuka dan Tertutup*. Makassar: Skripsi, UIN Alauddin Makassar.

Zupan, J. 2009. *Topical Umbilical Cord at Birth*. Published by John Willey & Sons, Ltd. Diakses pada tanggal 23 Juli 2015.





**LAMPIRAN III**

**Koesioner Efektifitas Perawatan Tali Pusat dengan Menggunakan Antara Kapas Betadin dan NaCl Di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa 2015**


No Responden : .....

Tanggal Pengisian : .....

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

**1. Identitas Orang Tua (Ibu/Ayah)**

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :



**2. Identitas bayi**

Nama :  
Tempat/Tanggal lahir :  
Berat badan lahir :



Jenis Kelamin : LK  PR

Lahir : cukup bulan

Tidak cukup bulan

Memiliki kelainan/masalah

Tidak memiliki kelainan/masalah

## B. KUESIONER

### Petunjuk Pengisian !

Berilah tanda check (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban yang anda anggap benar!

NO	PERTANYAAN TENTANG PERAWATAN TALI PUSAT	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah tali pusat bayi anda selalu dibungkus dengan kasa yang bersih setelah dibersihkan?		
2	Apakah tali pusat bayi anda tidak pernah dibungkus setelah dibersihkan?		
3	Apakah tali pusat bayi anda dibersihkan 2 kali sehari menggunakan kapas NaCl?		
4	Apakah tali pusat bayi anda dibersihkan 2 kali sehari menggunakan kapas Betadin?		
5	Apakah tali pusat bayi anda pernah berwarna merah, bengkak, keluar nanah, berbau busuk, dan suhu tubuh bayi panas selama tali pusatnya dirawat dengan Betadin dan NaCl?		

**Petunjuk Pengisian !**

Beri lingkaran pada jawaban 1, 2, dan 3 yang anda anggap benar!  
Dan beri tanda check (√) pada kolom dengan jawaban hari keberapa tali pusat bayi anda lepas.

Berapa lama tali pusat bayi anda lepas dari pangalnya?

		Jam Pelepasan	
1. Kurang dari 5 hari			
➤ Hari pertama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Hari kedua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Hari ketiga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Hari keempat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Antara 5 sampai 7 hari			
➤ Hari kelima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Hari keenam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Hari ketujuh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Lebih dari 7 hari			
➤ Hari kedelapan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Hari kesembilan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Hari kesepuluh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Lainnya sebutan: hari ke.....			

## SURAT PERMOHONAN KE RESPONDEN

Kepada Yth :

Saudara calon responden

Di RSB. Mattiro Baji

Dengan hormat,

Saya mahasiswa prodi SI keperawatan UIN alauddin makassar, saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul “efektifitas perawatan tali pusat dengan Menggunakan antara Betadin dan NaCl”. Sehubungan dengan judul tersebut diatas saya datang dihadapan saudara guna mengajukan berbagai pertanyaan. Sekiranya saya mohon kesediaan untu meluangkan waktu mengisi kuesioner dengan menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan sejujurnya.

Saya menjamin kerahasiaan jawaban saudara dan tidak akan saya gunakan di luar kepentingan penelitian ini dan hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaan saudara saya ucapkan terima kasih.

Makassar,

Responden

( )

Penulis

( )

Foto Kegiatan Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR









MASTER TABEL HASIL PENELITIAN

No. Resp.	Inisial	Jenis Perawatan												
		NaCl					Betadine							
		Cepat	Normal			Lambat	Cepat	Normal			Lambat			
		4	5	6	7	8	4	5	6	7	8			
1	Ny.N				√									
2	Ny.S				√									
3	Ny.N			√										
4	Ny.N			√										
5	Ny.R				√									
6	Ny.I			√										
7	Ny.S		√											
8	Ny.K		√											
9	Ny.N				√									
10	Ny.A	√												
11	Ny.N									√				
12	Ny.N								√					
13	Ny.F									√				
14	Ny.N											√		
15	Ny.C											√		
16	Ny.F									√				
17	Ny.I								√					
18	Ny.R							√						
19	Ny.R								√					
20	Ny.H											√		

## T-Test

### Group Statistics

	Perawatan	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pelepasan	NaCl	10	6,0000	1,05409	,33333
	Betadine	10	5,8000	1,03280	,32660

### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
		F	Sig.	t	df
Pelepasan	Equal variances assumed	,023	,880	,429	18
	Equal variances not assumed			,429	17,993

### Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means			
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference
					Lower
Pelepasan	Equal variances assumed	,673	,20000	,46667	-,78043
	Equal variances not assumed	,673	,20000	,46667	-,78046

### Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means
		95% Confidence Interval of the Difference
		Upper
Pelepasan	Equal variances assumed	1,18043
	Equal variances not assumed	1,18046

## Explore Perawatan

**Case Processing Summary**

Perawatan		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pelepasan	NaCl	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%
	Betadine	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%

**Descriptives**

Perawatan		Statistic	Std. Error	
Pelepasan	NaCl	Mean	6,0000	,33333
		95% Confidence Interval for Lower Bound	5,2459	
		Mean Upper Bound	6,7541	
		5% Trimmed Mean	6,0556	
		Median	6,0000	
		Variance	1,111	
		Std. Deviation	1,05409	
		Minimum	4,00	
		Maximum	7,00	
		Range	3,00	
		Interquartile Range	2,00	
		Skewness	-,712	,687
		Kurtosis	-,450	1,334
		Mean	5,8000	,32660
Pelepasan	Betadine	95% Confidence Interval for Lower Bound	5,0612	
		Mean Upper Bound	6,5388	
		5% Trimmed Mean	5,8333	
		Median	6,0000	
		Variance	1,067	
		Std. Deviation	1,03280	
		Minimum	4,00	
		Maximum	7,00	
		Range	3,00	
		Interquartile Range	2,00	

Skewness	-,272	,687
Kurtosis	-,896	1,334

#### Tests of Normality

Perawatan		Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pelepasan	NaCl	,229	10	,148	,859	10	,074
	Betadine	,181	10	,200*	,895	10	,191

\*. This is a lower bound of the true significance.



a. Lilliefors Significance Correction

#### Test of Homogeneity of Variance



		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Pelepasan	Based on Mean	,023	1	18	,880
	Based on Median	,000	1	18	1,000
	Based on Median and with adjusted df	,000	1	18,000	1,000
	Based on trimmed mean	,007	1	18	,933

**Pelepasan**

**Histograms**




## Stem-and-Leaf Plots





## Detrended Normal Q-Q Plots

Detrended Normal Q-Q Plot of Pelepasan  
for Perawatan= NaCl



Detrended Normal Q-Q Plot of Pelepasan  
for Perawatan= Betadine





Spread vs. Level Plot of Pelepasan by Perawatan



\* Plot of LN of Spread vs LN of Level



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**DINIANTI BADO** Lahir di ujung pandang 02 Maret 1992. Anak Bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bado Tindri dan Nur Janiah Dg.Ngai. mulai mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di SD Inpres Bontoala II Kabupaten Gowa pada tahun 1999 dan taman pada tahun 2004. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan lanjutan pertama di SMP Negeri 24 Makassar dan selesai tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 08 Makassar dan selesai pada tahun 2010. Setelah lulus dari SMA di tahun 2010, saya bekerja di suatu perusahaan swasta selama setahun sambil mencari pengalaman kerja, Masuk di 2011 saya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan Memilih UIN Alauddin Makassar Fakultas Kesehatan Jurusan Keperawatan sebagai tempat terbaik untuk menimbah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, motifasi belajar baik, serta restu dari orang tua dan keluarga, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Perawatan Tali Pusat Antara Betadine dan NaCl di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2015.

