


**STUDI ETNOBOTANI TANAMAN REMPAH-
REMPAH OLEH MASYARAKAT DI KELURAHAN
SUKAMAJU KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

ALDA RAMADANI A. SOFYAN
NIM. 60300118021

JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alda Ramadani A. Sofyan
Nim : 60300118021
Tempat/Tgl lahir : Balete, 10-12-1999
Jurusan/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Persimpangan Jl. Pramuka Sukamaju
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
Judul Skripsi : Studi Etnobotani Tanaman Rempah-rempah oleh
Masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju,
Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 18 Agustus 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Penyusun.

MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Alda Ramadani A. Sofyan

Nim: 60300118021

MAKASSAR

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Studi Etnobotani Tanaman Rempah-rempah oleh Masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara**”, yang disusun oleh Alda Ramadani A. Sofyan, NIM: 60300118021, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 M, bertepatan dengan Muharram - Shafar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 18 Agustus 2023

Muharram - Shafar 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Khalifah, M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Kurnia Makmur, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Masriany, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Irfan, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar.

Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.

NIP: 197104122000031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudara Alda Ramadani A. Sofyan, NIM: 60300118021, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan sesama proposal skripsi berjudul, "Studi Etnobotani Tanaman Rempah-rempah oleh Masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata-Gowa, 18 Agustus 2023

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.
NIP. 198211102009122005



Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc.
NIP: 198407262019032008



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Etnobotani Tanaman Rempah-rempah Oleh Masyarakat Suku Jawa di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”. Salam serta shalawat selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tiada hentinya kepada Ayahanda Andi Sofyan, Ibunda tercinta Halija yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis baik secara moril dan materil sejak awal masuk perguruan tinggi dan kasih sayang saudara-saudara saya yang selalu membantu dalam berbagai hal sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Demikian, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.

3. Dr. Masriany, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, dan Hasyimuddin, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc., sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberikan nasehat-nasehat yang membangun.
5. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si., sebagai Pembimbing I dan Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan dan segala arahnya selama penyusunan skripsi.
6. Dr. Masriany, S.Si., M.Si., sebagai Penguji I dan Irfan, S.Ag., M.Ag., sebagai Penguji II. Terima kasih atas kritikan dan masukan yang membangun.
7. Rusmadi Rukmana, S.Si., M.Pd., sebagai ketua dan Kurnia Makmur, S.Si., M.Si., sebagai sekretaris yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama skripsi.
8. Seluruh Staf Jurusan, Staf Akademik, terkhusus Dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara khususnya responden yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis selama penelitian.
10. Keluarga besar penulis khususnya yang senantiasa menemani kegiatan wawancara dan sahabatku yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga.


11. Kakak yaya, Kakak Ferdiansyah, Eka dan Teman-teman seperjuangan Bicuspidal18 (Biologi Angkatan 2018), terima kasih atas segala canda tawa, bantuan, semangat dan doa yang kalian berikan.
12. Teman-teman sewaktu Magang di Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah II yang selalu bekerjasama serta teman PKL di Balit Sereal Maros yang selalu memberi dukungan dan semangat.
13. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 69/70 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar yang selalu membantu dan pengertian.
14. Serta teman-teman lainnya yang tidak sempat penulis sampaikan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan motivasi yang telah kalian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi penulisan, maupun ruang lingkup pembahasannya. Maka dengan kerendahan hati, segala bentuk koreksi, kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sekaligus menjadi bahan acuan mahasiswa Biologi, serta bagi pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR ILUSTRASI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTARK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D.Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12
A.Rempah-Rempah dalam Perspektif Islam.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Etnobotani	15
C. Tinjauan Umum Tanaman Rempah-rempah	21
E. Tinjauan Umum Sukamaju.....	34
F. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A.Jenis dan pendekatan penelitian	39
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
C.Populasi dan Sampel	39
D.Variabel Penelitian	40
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	41

G.Prosedur Penelitian.....	41
H.Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A.Hasil Penelitian	44
B.Pembahasan.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	123
A.Kesimpulan	123
B.Saran.....	124
KEPUSTAKAAN	125
LAMPIRAN	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	172



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Inventarisasi Tanaman Rempah-rempah yang Terdapat di Kelurahan Sukamaju, Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu utara	48
Table 4.2 Data Senyawa Bioaktif Tanaman Rempah di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara	53
Tabel 4.3 Pengelompokan Senyawa Bioaktif tanaman rempah di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara	67



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1 Struktur Senyawa Flavanoid	31
Gambar 2.2 Struktur Senyawa Alkaloid	32
Gambar 2.3 Struktur Senyawa Terpenoid	33
Gambar 2.4 Peta Wilayah Kecamatan Sukamaju.....	37
Gambar 2.5 Peta Kelurahan Sukamaju	37
Gambar 4.1 Diagram Persentase Jumlah Tanaman Berdasarkan Familia yang Digunakan Dalam pengobatan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara	50
Gambar 4.2 Diagram Persentase Organ Tanaman Rempah yang Digunakan Dalam pengobatan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara	51
Gambar 4.3 Diagram Persentase Teknik Pengolahan Tanaman Rempah yang Digunakan Dalam pengobatan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara	52
Gambar 4.4 Diagram Persentase Berdasarkan Pengelompokan Senyawa	72
Gambar 4.5 Diagram Persentase Berdasarkan Pendidikan	73
Gambar 4.6 Diagram Persentase Berdasarkan Usia	74
Gambar 4.7 Diagram Persentase Berdasarkan Pekerjaan	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Wawancara.....	140
Lampiran 2 Foto-Foto Spesies Tanaman Rempah-rempah.....	140
Lampiran 3 Foto Kegiatan Penelitian/Wawancara	149
Lampiran 4 Hasil Wawancara oleh Masyarakat di Kelurahan Sukamaju	150
Lampiran 5 Tampilan Kanaya	152
Lampiran 6 Tampilan PubChem	153



ABSTARK

Nama : Alda Ramadani A. Sofyan
NIM : 60300118021
Judul Skripsi : Studi Etnobotani Tanaman Rempah-rempah Oleh Masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara

Sebagian besar penduduk Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, tempat Desa Sukamaju berada, merupakan masyarakat asli Luwu yang teguh menjunjung adat istiadat dalam memanfaatkan rempah-rempah sebagai obat tradisional atau bumbu masakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tumbuhan, komposisi kimianya, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, cara pengolahan tumbuhan dalam pengobatan tradisional, serta pemahaman dan penerimaan masyarakat Sukamaju terhadap pemanfaatan tumbuhan obat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan database (database tanaman dari website *Kanaya and PubChem*) serta metode survei dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 25 spesies tanaman rempah-rempah yang digunakan dalam pengobatan tradisional dan juga sebagai bumbu masakan, 20 spesies tanaman yang berpotensi sebagai pemanfaatan. Organ tanaman yang digunakan meliputi daun, rimpang, buah, biji, daun, batang dan umbi. Teknik pengolahan tanaman obat yang digunakan yaitu teknik direbus, ditumbuk, diblender, diparut, dihaluskan, diiris, diperas, digebrek, diremas dan tanpa diramu. Penerimaan dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan memanfaatkan tanaman rempah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai bumbu masakan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor umur responden, pendidikan responden dan pekerjaan responden. Dengan demikian, senyawa yang ada pada 20 spesies tanaman tersebut dapat menjadi dasar untuk dilakukan uji potensi secara *in vitro* sehingga nantinya dapat dirujuk sebagai khasiat obat.

Kata kunci: Tanaman rempah, Senyawa bioaktif, Kelurahan Sukamaju

ABSTRACT

Nama : Alda Ramadani A. Sofyan
NIM : 60300118021
Judul Skripsi : **Ethnobotanical Study of Spice Plants in Sukamaju Village, Sukamaju District, North Luwu Regency**

Most of the residents of Sukamaju District, North Luwu Regency, where Sukamaju Village is located, are native Luwu people who firmly uphold their customs of using spices as traditional medicine or cooking seasoning. The aim of this research is to determine the types of plants, their chemical composition, the parts of plants used in traditional medicine, how to process plants in traditional medicine, and the understanding and acceptance of the Sukamaju community towards the use of medicinal plants. This research is a qualitative descriptive study that uses a database (the plant database from the Kanaya and PubChem websites) as well as survey and interview methods. The results of this research show that of the 25 spice plant species used in traditional medicine and as cooking spices, 20 have potential for use. Plant organs used include leaves, rhizomes, fruit, seeds, leaves, stems, and tubers. The medicinal plant processing techniques used are boiling, pounding, blending, grating, mashing, slicing, squeezing, crushing, kneading, and mixing without mixing. Community acceptance and understanding of the use of medicinal herbs to increase immunity and as a cooking spice This is influenced by the respondent's age, education, and occupation. Thus, the compounds present in these 20 plant species can be the basis for in vitro potency testing so that later they can be referred to as having medicinal properties.

Kata kunci: Herbs, bioactive compounds, Sukamaju village



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai porsi keanekaragaman hayati dunia yang cukup besar. Lebih dari 2.039 jenis tumbuhan berpotensi sebagai obat dan memiliki manfaat untuk kesehatan manusia, yang merupakan hotspot keanekaragaman hayati dengan lebih dari 239 jenis tanaman pangan (Anggraini, 2016). Masyarakat Indonesia memanfaatkan beragam tanaman, termasuk tanaman rempah-rempah, sebagai obat alami. Jauh sebelum layanan medis profesional dengan obat-obatan sintesis, masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan menggunakan tanaman obat dan rempah-rempah untuk mengendalikan penyakit. (Anggraini, 2016).

Masyarakat Indonesia mendapat manfaat besar dari tingginya keanekaragaman hayati di negara ini dalam hal makanan, pakaian, bahan bangunan, pengobatan tradisional, perlengkapan kerajinan, persyaratan budaya, dan aspek kehidupan sehari-hari lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga tidak hanya kaya akan biodiversitas, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut antara lain tercermin dari 700 bahasa lokal (Hiwasaki *et al.*, 2014). Keanekaragaman bahasa atau lingustik dan keanekaragaman budaya ini, menurut para ahli etnobotani juga memiliki kaitan erat dengan keanekaragaman hayati (Maffi *et al.*, 2014).

Budaya berperan penting dalam melandasi hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk jenis-jenis tanaman (Milton, 2010). Lebih lanjut, bentuk interaksi masyarakat dengan tanaman dapat dilihat melalui cara masyarakat

memanfaatkan dan mengelola sumber daya tanaman dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Iskandar (2018), Cara kelompok etnis tertentu memandang dunia dan norma, nilai, dan hukum yang berlaku dalam komunitas sosialnya memberikan wawasan tentang bagaimana kelompok tersebut berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengetahuan lokal pada akhirnya dihasilkan sebagai hasil interaksi masyarakat dengan lingkungannya dalam kurun waktu yang panjang. Di dalam kehidupan sehari-hari, tanaman paling umum dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Tanaman pangan merujuk pada jenis tumbuhan berbatang, berakar, berdaun, yang dikonsumsi manusia (Apriliani et al., 2014). Tanaman pangan biasanya dikonsumsi dengan cara diolah atau dimakan mentah. Pengolahan tanaman dengan cara dimasak biasanya menggunakan rempah sebagai bumbu. Di pekarangan, kebun, dan hutan berbagai tanaman rempah yang digunakan untuk memasak dapat ditemukan. Rempah juga diperjual belikan di pasar-pasar tradisional

Pasar tradisional, selain menjadi salah satu tempat berbelanja kebutuhan pangan, juga menjadi penyedia rempah untuk berbagai keperluan. Pasar tradisional juga berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi pengetahuan lokal antar pedagang, antar pembeli, dan antar pembeli dan pedagang (Silalahi et al., 2015). Oleh karena itu, penurunan jumlah pasar tradisional di Indonesia, dapat mempengaruhi hilangnya sumber pengetahuan yang disimpan secara lokal (Sujarwo et al., 2014). Di Jawa Barat misalnya, jumlah pasar-pasar desa mengalami penurunan drastis karena munculnya minimarket yang juga

menawarkan bahan kebutuhan masyarakat (Iskandar et al., 2020). Hal ini mengancam kelestarian kearifan lokal mengenai etnobotani.

Kajian etnobotani adalah metode untuk mencatat kearifan masyarakat tradisional atau masyarakat umum yang mengandalkan tumbuhan berbeda untuk menopang cara hidup mereka (Mutaqin et al., 2016). Penelitian ini berupaya menggambarkan peran pasar tradisional, tidak hanya sebagai penyedia rempah tetapi juga sebagai pelestari pengetahuan masyarakat tentang rempah, dengan menggunakan kajian etnobotani.

Tumbuhan rempah adalah tumbuhan yang salah satu atau lebih komponennya, misalnya daun, batang, akar, atau bunga, mengandung zat aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai ramuan, bahan obat, atau bahan makanan. Tiga kategori tanaman obat tradisional, tanaman terapi kontemporer, dan tanaman dengan dukungan ilmiah digunakan untuk mengkategorikan tanaman tersebut. Tanaman obat tradisional adalah tanaman yang mempunyai reputasi mempunyai manfaat terapeutik dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai landasan pengobatan tradisional. Terdapat tumbuhan yang mempunyai potensi sebagai obat, yaitu jenis tumbuhan yang belum diketahui pemanfaatannya secara ilmiah atau medis dan masih sulit dilacak pemanfaatannya sebagai obat tradisional, namun mengandung komponen aktif yang berkhasiat sebagai obat dan kegunaannya. dapat diterima secara medis.

Meski rempah-rempah diakui memberikan beragam manfaat, namun kini masih kurang apresiasi terhadapnya. Generasi muda saat ini umumnya masih asing dengan banyaknya jenis rempah-rempah. Kelangsungan hidup rempah-

rempah sangat terancam oleh modernisasi dan perubahan pola makan sehari-hari. Para peneliti mengingatkan bahwa cepatnya perubahan adat dan budaya masyarakat Indonesia akan mengakibatkan hilangnya pengetahuan tentang rempah-rempah serta jarangya penggunaan rempah-rempah tertentu. Hal ini sungguh paradoks mengingat Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah yang sangat melimpah yang dimanfaatkan dalam berbagai cara oleh banyak suku di Indonesia. Pelestarian rempah-rempah sangat diperlukan, khususnya di daerah yang dapat tumbuh secara alami (Hakim, 2015). Jauh sebelum pengobatan modern masuk ke Indonesia, nenek moyang kita sudah mengetahui pemanfaatan tanaman rempah sebagai obat tradisional atau jamu (Hakim, 2015).

Kajian etnobotani memiliki dua keuntungan karena melindungi jenis tumbuhan yang dimanfaatkan, Selain membantu masyarakat dan lingkungan. Walaupun nama etnobotani mengacu pada studi tentang bagaimana berbagai masyarakat di seluruh dunia memanfaatkan tanaman, pada kenyataannya, etnobotani adalah studi tentang bagaimana populasi lokal atau tradisional memanfaatkan tanaman. Etnobotani mempelajari hubungan antara berbagai komunitas (etnis), termasuk bagaimana mereka memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan tumbuhan. Kajian interaksi sering kali fokus pada tradisi, legenda, dan budaya yang sudah mengakar dalam komunitas lokal (etnis) tertentu (Efremila, 2015).

Menurut Chandur (2010), etnobotani merupakan cabang studi yang menyelidiki bagaimana komunitas lokal dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik, termasuk pengetahuan asli tentang sumber daya tanaman. Etnobotani

merupakan cara lain suatu kelompok masyarakat untuk mengekspresikan pengetahuan tradisionalnya mengenai keanekaragaman sumber daya hayati, konservasi, dan budaya. Hal ini disebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang sangat beragam (Rahmah, 2021).

Karena banyaknya keragaman peradaban Indonesia, beberapa pengetahuan dan budaya tradisional ada di sana (Verma, 2011). Kajian etnobotani sangat berharga bagi masyarakat karena dapat memanfaatkan berbagai tanaman rempah yang digunakan sebagai obat herbal atau tradisional sesuai pengetahuan lokal masyarakat. Menurut Holilah (2015), kearifan lokal adalah cara pandang terhadap kehidupan, pengetahuan, dan strategi hidup yang digunakan kelompok lokal untuk beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah disebut dengan kearifan lokal. Hal ini berkaitan dengan kearifan kolektif lingkungan sekitar. Pengetahuan lokal yang digunakan dalam konteks ini mengacu pada pengetahuan budaya, kepercayaan, dan adat istiadat setempat yang berasal dari cara masyarakat setempat berinteraksi dengan tanaman yang digunakan dalam pengobatan herbal atau tradisional (Utomo, 2018).

Dalam hal ini, penting untuk memahami tanaman apa saja yang dimanfaatkan warga Desa Sukamaju sebagai bumbu tradisional dan cara pemanfaatannya. Desa dan kecamatan Sukamaju dijadikan sebagai lokasi penelitian ini. Sukamaju, Luwu Utara, merupakan tempat yang kaya akan rempah-rempah meski setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan tanaman untuk membuat rempah-rempah tradisional. Dengan menggunakan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun temurun, tanaman yang

berasal dari sumber daya alam daerah tersebut dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, pengawet, pewarna, penambah rasa, dan aromatik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa saja jenis tanaman rempah-rempah yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat kelurahan sukamaju, Kabupaten Luwu Utara?
2. Organ apa saja dari tanaman rempah-rempah yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat kelurahan sukamaju, Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana cara pemanfaatan tanaman rempah-rempah sebagai obat oleh masyarakat kelurahan sukamaju, Kabupaten Luwu Utara?
4. Apa saja kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tanaman rempah-rempah di kelurahan sukamaju?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini keanekaragaman jenis rempah-rempah di alam khususnya pada kawasan kelurahan, kec. sukamaju, luwu utara. Proses penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung, di lakukan pada zona pemanfaatan yang akan dilakukan pengamatan secara langsung ke perkebunan atau lahan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

1. Tambaru, (2017) dengan judul “Keragaman Jenis Tumbuhan Obat Indigenous Di Sulawesi Selatan”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan jenis-jenis tanaman obat yang ada di Sulawesi selatan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sebanyak 9 spesies tanaman indigenous Sulawesi Selatan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional yaitu bandotan (*Ageratum conyzoides* L.), kirinyu (*Eupatorium odoratum* L), insulin (*Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray), hiptis (*Hyptis capitata* Mart. & Gal), patikan kebo (*Euphorbia hirta* L.). tembelekan (*Lantana camara* L), senggani (*Melastoma malabathricum* L.), sirih-sirihan (*Peperomia pellucida* L. Kunth), dan ketepeng cina (*Cassia alata* L).
2. Wahidah and Husain, (2018) dengan judul “Etnobotani Tumbuhan Obat Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Desa Samata”. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Samata kerap memanfaatkan 26 jenis tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit, Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa yaitu bandotan (*Ageratum conyzoides*), cocor bebek (*Kalanchoe blossfeldiana*), kemangi (*Ocimum basilicum*), putri malu (*Mimosa pudica*), pala (*Myristica fragrans*), kelor (*Moringa oleifera*), merica (*Piper betle* L), salam (*Eugenia aperculata*), lengkuas merah (*Alpinia purpurata*), jahe (*Zingiber officinale*), Kencur (*Kaempferia galanga* L), pisang (*Musa paradisiaca* L), mentimun (*Cucumis sativus* L), pepaya (*Carica papaya*), dan mengkudu (*Morinda citrifolia*), pare (*Momordica charantia*), jambu biji (*Psidium Guadjava*), jarak pagar (*Jatropha curcas*), jeruk nipis (*Citrus aurantifolia* Swingle), sirsak (*Anona muricata*), lidah buaya (*Aloe vera*), temu putih (*Curcuma zedoaria*), kunyit

(*Curcuma domestica*), kelapa (*Cocos nucifera*), bawang putih (*Allium sativum*) dan bawang merah (*Allium cepa*).

3. Robi (2019) dengan judul “Etnobotani Rempah Tradisional Di Desa Empoto Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat”. Penelitian ini mengkaji rangkaian rempah-rempah tradisional di Desa Empoto, Sanggau Distrik, Kalimantan Barat. Penelitian tersebut dilakukan dengan mewawancarai, mengamati dan membuat spesimen bariumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mencatat tumbuhan spesies gunakan sebagai rempah-rempah tradisional, dan jelajahi pola penggunaan tanaman sebagai rempah-rempah tradisional oleh pople di desa Empoto, Kecamatan Sanggau, Kalimantan Barat. Sebanyak 59 spesies tanaman dari 27 famili sebanyak 59 spesies tradisional digunakan oleh masyarakat di desa Empoto sebagai rempah-rempah tradisional. Yang paling banyak digunakan untuk keluarga tumbuhan adalah *Zingiberaceae* (8 spesies). Pemanfaatan tanaman sebagai rempah-rempah tersebut yang berasal dari suku Dayak, diikuti oleh suku Melayu dan pemanfaatan simultan dari kedua ini suku, (100%, 28% dan 28% respectively). Pola pemanfaatan rempah-rempah yang digunakan oleh people di Desa Empoto, Kecamatan Sanggau, Kalimantan Barat dikelompokkan menjadi 7 pola yaitu rempah-rempah sebagai rempah-rempah, penambah rasa, aromatik, pengawet, naturalizers, melunak dan pewarna.
4. Suminto (2018) dengan judul “Kandungan Aflatoksin Pada Lada (*Piper nigrum* L.) Indonesia Dalam Pengembangan Standar Internasional Codex”.

Salah satu tanaman rempah yang dihasilkan dari perkebunan adalah lada (*Piper nigrum* L.). Produk berbahan dasar lada dari Indonesia diekspor ke negara lain. Rempah-rempah yang mengandung aflatoksin saat ini menjadi topik perdebatan di sidang Codex. Untuk membantu pembuatan standar Codex, penelitian ini mencoba menentukan konsentrasi aflatoksin pada lada. Dalam penyelidikan ini, total 26 sampel lada digunakan. Pusat Pengujian Mutu Barang Kementerian Perdagangan, sebuah laboratorium yang bekerja sama, menguji sampel lada yang dikumpulkan. Metode pengujian yang digunakan dalam analisis data aflatoksin lada adalah Metode Resmi AOAC 991.31.2005. Aflatoksin B1 memiliki LOQ 1,07 ppb, Aflatoksin B2 memiliki LOQ 0,39 ppb, Aflatoksin G1 memiliki LOQ 1,35 ppb, dan Aflatoksin G2 memiliki LOQ 0,48 ppb dari 26 sampel lada yang diperiksa.

5. Hakim (2015) dengan judul “Etnobotani Rempah-Rempah di Dusun Kopen Dukuh, Kabupaten Banyuwangi”. Di Dusun Kopen Dukuh, Kabupaten Banyuwangi, masyarakat Osing melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis rempah-rempah yang ditanam di kebun tradisional. Masyarakat Osing di Kopen Dukuh menggunakan total 27 jenis tanaman rempah dalam kehidupan sehari-harinya, menurut penelitian ini. Sembilan dari spesies tumbuhan ini tidak tumbuh di kebun, sementara 18 spesies tumbuhan ditemukan tumbuh di pekarangan dan pemukiman. Di bawah ketiga spesies tersebut adalah lengkuas, jahe, kunyit, cabai, kencur, dan serai, yang semuanya berperan penting dalam penyiapan makanan dan

kehidupan masyarakat. Bumbu basah dan bumbu kering adalah dua cara berbeda dalam menggunakan bumbu dalam masakan. Bumbu keringnya juga mengandung cengkeh, ketumbar, jinten, merica, dan pala. Bumbu basah tersebut adalah jahe, serai, bawang bombay, kencur, temu kunci, kunyit, cabai, dan daun bawang.

6. Titdoy (2021) dengan judul “Analisis Kadar Serat Pada Nugget Batang Lengkuas Muda (*Alpinia Galanga* L) Sebagai Penunjang Sumber Belajar Mata Kuliah Etnobotani”. Indonesia adalah rumah bagi berbagai jenis tanaman, termasuk rempah-rempah. Salah satunya adalah lengkuas, bumbu masakan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tanaman yang termasuk dalam famili *Zingiberaceae* ini mengandung bahan aktif yang dapat menyembuhkan gangguan pencernaan, meredakan sakit perut, dan sebagai penangkal keracunan. , mencegah kejang, dan memiliki khasiat anti rematik Ekstrak rimpang lengkuas selain itu juga mengandung sifat anti tuberkulosis dan anti kanker Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui jenis tanaman rempah-rempah yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat sukamaju, kabupaten luwu utara.

2. Untuk mengetahui bagian organ dari tanaman rempah-rempah yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat sukamaju, kabupaten luwu utara.
3. Untuk mengetahui cara pemanfaatan tanaman rempah-rempah sebagai obat oleh masyarakat kelurahan sukamaju, kabupaten luwu utara.
4. Untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tanaman rempah-rempah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat di lakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk pemanfaatan tanaman rempah-rempah sebagai obat oleh masyarakat dapat dikaji secara ilmiah, sebagai data penunjang konservasi tanaman.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang etnobotani.
3. Kearifan lokal pemanfaatan tanaman rempah-rempah oleh masyarakat dapat terdokumentasikan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Rempah-Rempah dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama agung yang diturunkan Allah SWT untuk membantu umat manusia mengolahnya demi kemaslahatan dirinya dan lingkungannya. Salah satu ciptaan Allah SWT, tumbuhan memiliki berbagai manfaat bagi seluruh makhluk hidup, khususnya manusia. Manusia sering kali memanfaatkan rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memanfaatkannya dalam masakan untuk menambah cita rasa makanan. Allah Swt juga telah menyampaikan penciptaan rasa yang telah dilakukan terhadap berbagai tumbuhan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Qs. Qaf/ 50: 7-8 yang berbunyi :


وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali (tunduk kepada Allah swt.) (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat di atas yang berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Kami membentangkan bumi, yaitu kata lain yang mengembang dan

merenggangkan, agar bumi dan penghuninya tidak miring dan goyang. Gunung-gunung ini tegak di atas tanah dan dikelilingi air di semua sisinya. Kami membudidayakan berbagai tanaman, buah-buahan, tumbuhan, dan lain-lain di air ini, sehingga menciptakan pemandangan yang indah. Dengan melihat langit dan bumi terbentuk, serta bukti-bukti luar biasa akan kekuasaan-Nya yang Dia tempatkan di antara keduanya, sebagai saksi, bukti, dan teguran bagi setiap orang yang tunduk, gemetar, dan bertakwa kepada Allah SWT.

Ayat dan penjelasan di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan manusia untuk mempertimbangkan dan merenungkan bukti kekuasaan-Nya di dunia, salah satunya adalah Dia menciptakan berbagai tumbuhan dengan kemaslahatan yang berlimpah untuk umatnya dan kedua makhluk tersebut juga saling bergantung satu sama lain. Sebagai gambaran, misalnya suatu wilayah yang mayoritas masyarakat adatnya masih memanfaatkan tanaman rempah-rempah secara rutin. Penggunaan rempah-rempah oleh suku Jawa selama ini menjadi model bagaimana kelompok tradisional memanfaatkan tumbuhan. Hal ini membuktikan bahwa Allah swt. telah mengatur potensi, ukuran dan porsi dari setiap makhluknya dengan begitu rapi sesuai dengan fungsinya. Manusia diperintahkan untuk mengambil setiap pelajaran pada tumbuhan agar dapat meningkatkan rasa syukur dan keimanan manusia kepada Allah swt.

Bukti kebesaran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan seisinya adalah kesanggupan-Nya menghasilkan makhluk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Segala sesuatu yang ada di planet kita ini mempunyai kelebihan karena Allah swt. yang menciptakan semuanya. Al-Qur'an menjelaskan bagaimana segala

sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan termasuk bagaimana tanaman dibuat dapat dicapai di bumi ini. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS Asy-Syu'araa'/26:07 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementerian Agama RI, 2012).

Adapun menurut Tafsir Al-Misbah Menurut ayat di atas dikatakan bahwa mereka akan terus mempercayai kebohongan, menolak memikirkan dan mengamati sebagian dari karya tangan Allah di muka bumi. Faktanya, individu pasti akan menemukan indikasinya jika terbuka untuk melakukan refleksi dan observasi. Kamilah yang mengekstraksi dari bumi berbagai macam tanaman bermanfaat. Dan hanya Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Kuasa yang mampu melakukan semua itu (Shihab, 2010).

Itulah sebabnya Allah swt., sesuai dengan hubungan antara kitab dan tafsir. Dia telah menghasilkan berbagai tanaman bermanfaat di bumi yang dibutuhkan umat manusia, menurut Al-Qur'an berabad-abad yang lalu. Tumbuhan yang tepat adalah yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi manusia sebagai sumber pangan. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia, berbagai jenis tumbuhan memiliki warna dan rasa yang beragam, rempah-rempah dapur, Hal ini dikarenakan pada setiap jenis tanaman terdapat

senyawa alami yang terkandung didalam bagian (organ) tanaman tersebut. Semuanya telah tercipta dengan serapi-rapinya dan sebaik-baiknya, tinggal bagaimana manusia mengolah dan mempelajarinya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan secara tradisional maupun modern. Sungguh Maha besar Allah swt. atas segala kuasanya untuk orang-orang yang berfikir.

B. Tinjauan Umum Tentang Etnobotani

2.1. Pengertian Etnobotani

Kata etnologi dan botani merupakan cikal bakal dari etnobotani. Botani mempelajari tumbuhan, sedangkan etnologi adalah ilmu yang menyelidiki suku dan budaya yang ada di daerah tertentu. Menurut Iswandono dkk. (2015), ilmu etnobotani menyelidiki bagaimana manusia berinteraksi dengan tumbuhan dan sumber daya yang mereka gunakan secara rutin. Etnobotani adalah suatu bidang penelitian yang mengkaji hubungan antara kebudayaan manusia dengan tumbuhan asli yang ada di lingkungan terdekatnya tanpa merugikan atau memanfaatkannya. Pemanfaatan tumbuhan sebagai makanan, obat-obatan, kosmetik, objek ritual, dan sumber daya manusia lainnya tersebar luas. Enam kajian yang membentuk penelitian etnobotani adalah kajian botani, kajian etnofarmakologi, kajian etnoekologi, kajian etnoantropologi, kajian etnoekonomi, dan kajian etnolinguistik. Memahami etnobotani sangat penting untuk menentukan bagaimana manusia dan ekosistem yang berubah berinteraksi secara ekologis. Oleh karena itu, etnobotani juga berperan dalam konservasi tumbuhan, pengamanan persediaan pangan seseorang, pemajuan identitas etnis dan

nasionalisme, peningkatan ketahanan fungsi pertanian, dan pencarian obat-obatan baru. Karena adanya keterkaitan etnobotani dengan kehidupan desa setempat dan tanaman yang biasa ditemukan di sana, maka diperlukan penelitian (Rahmah, 2021).

Ilustrasi hubungan antar kelompok etnis dan pemanfaatan tumbuhan praktis diberikan oleh etnobotani. Masyarakat dari berbagai suku di Indonesia telah lama memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai macam ritual dan perayaan, antara lain upacara keagamaan, perkawinan adat, upacara pertunangan, upacara kematian, perayaan kehamilan, dan perayaan kelahiran, serta untuk makanan (sebagai bahan utama pembuatan kue). Makanan sehari-hari dan sebagai bumbu masakan, sandang (sebagai bahan pakaian jadi), dan papan (sebagai bahan bangunan, perabot, dan perumahan).

Manusia secara tradisional memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber daya hayati di seluruh belahan bumi. Karena betapa pentingnya interaksi kita dengan tanaman, minat untuk meneliti tanaman semakin meningkat sepanjang sejarah bumi. Botani adalah sebutan untuk cabang ilmu tumbuhan yang mencakup berbagai topik, antara lain asal usul, keanekaragaman, dan kategorisasi tumbuhan serta kegunaannya dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan meningkatnya ketergantungan manusia pada tanaman, maka kebutuhan akan pemahaman ini semakin meningkat. Menemukan pengobatan baru untuk berbagai penyakit baru yang membahayakan kelangsungan hidup manusia adalah salah satu contohnya.. Perawatan ini harus ditemukan di antara banyak zat yang ditemukan pada tumbuhan. Pada kenyataannya, krisis yang terjadi saat ini telah menargetkan

tanaman sebagai penghasil bahan bakar fosil yang potensial (Isna Rasdianah, 2018).

Etnobotani adalah ilmu yang mengkaji tentang tumbuhan dan suku (suku), menurut Hakim (2014). Berbeda dengan Ifandi (2016) yang mengartikan etnobotani sebagai studi tentang etnisitas di lokasi tertentu dan pemanfaatannya, etnobotani sudah lama dikenal dan dijadikan sebagai ilmu dalam bidang pendidikan. Namun penerapannya tidak didokumentasikan secara luas. Tumbuhan digunakan dalam mitologi dan ritual serta untuk makanan, obat-obatan, warna, bahan bangunan, dan kebutuhan hidup lainnya. Etnobotani menurut Warit (2019) merupakan bidang studi yang melihat bagaimana masyarakat memandang sumber daya nabati di lingkungannya. Hal ini memerlukan pembelajaran tentang bagaimana masyarakat manusia yang berbeda berinteraksi dengan tanaman yang ada di lingkungan mereka dan digunakan untuk berbagai kebutuhan spiritual dan budaya serta kebutuhan dasar yang bermanfaat. Selain dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan ekonomi dan spiritual, pemanfaatannya juga berfungsi sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Seorang ahli etnobotani dari Amerika Serikat menciptakan istilah “etnobotani” pada tahun 1895.

Sebelum istilah etnobotani diciptakan, pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan untuk pengobatan sudah ada. Pada tahun 77 M, dokter Yunani Dioscorides menerbitkan "*de Materia Medica*", yang menjelaskan penggunaan lebih dari 600 tanaman di wilayah Mediterania. Purwanto (2011) menyatakan bahwa istilah “etnobotani” berakar pada “*aboriginally botanical*” yang pertama

kali diperkenalkan oleh Power pada tahun 1875 dengan pembatasan penggunaan berbagai jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal sebagai bahan bangunan, bahan makanan, obat-obatan, dan tujuan lainnya. Ungkapan “etnobotani” kemudian pertama kali muncul dalam tulisan yang ditulis oleh Evening Telegram pada tanggal 5 Desember 1895. Tujuan etnobotani dibahas pada konferensi tahun berikutnya oleh arkeolog J. W. Harsbeger. Topik yang dibahas mencakup (a) konteks budaya suatu kelompok etnis yang bergantung pada tumbuhan untuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya; (b) memahami sejarah sebaran jenis tumbuhan; dan (c) mengungkap berbagai macam tanaman yang bermanfaat.

2.2. Peran dan Manfaat Etnobotani

Etnobotani menyelidiki bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan pemahaman kita tentang cara bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dalam kaitannya dengan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan, alam pada dasarnya menawarkan kekayaan yang dapat dimanfaatkan manusia demi bertahan hidup. Etnobotani merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menyoroti peran pola budaya dalam cara manusia berinteraksi dengan tumbuhan di sekitar mereka. Interaksi ini mewakili pandangan masyarakat dalam mendeskripsikan, mengategorikan, dan memanfaatkan tumbuhan (Nasution, 2020).

Ada dua keuntungan dari peran dan pemanfaatan etnobotani, antara lain keuntungan finansial dan keuntungan dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Manfaat konservasi sumber daya hayati diperoleh dari pemeliharaan dan perlindungan suatu spesies tertentu beserta habitatnya agar tidak rusak, sedangkan

manfaat ekonomi diperoleh dari penelitian tanaman obat yang memiliki potensi komersial yang besar (Purwanto, 2011).

Masyarakat Desa Empoto di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terus memanfaatkan tanaman untuk pembuatan rempah-rempah tradisional, seperti bumbu penyedap rasa, pengawet, pewarna, penambah rasa, dan penyedap rasa, berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara turun temurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis tumbuhan dan kebiasaan penggunaan yang masyarakat Desa Empoto manfaatkan sebagai bumbu tradisional (Robi Yohanes, 2019).

Tanaman herbal dan rempah-rempah dapat digunakan sebagai sumber pendidikan untuk mendorong kegiatan pembelajaran karena bersifat kontekstual atau dapat diterapkan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Proses belajar siswa tentunya akan terpengaruh oleh penggunaan bumbu dan rempah sebagai alat pengajaran. Siswa akan lebih memahami isi kursus jika varietas bumbu dan rempah lokal digunakan sebagai sumber pengajaran. Siswa pada akhirnya akan dapat menghubungkan informasi yang dipelajarinya dengan skenario yang benar-benar ada di dunianya. Hal ini sejalan dengan (Supriadi, 2017), yang menyatakan jika seluruh media belajar termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan belajar berfungsi sebagai sumber bantuan bagi kegiatan pendidikan.

Guru dapat membantu siswa mengembangkan cita-cita moral dengan memasukkan berbagai bumbu dan rempah ke dalam pelajaran mereka. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan pembelajaran akan meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan menjaga lingkungan,

siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang senantiasa apresiatif. Kunjungan langsung ke daerah tempat tumbuhnya tanaman tersebut merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan bumbu dan rempah sebagai sumber belajar (Robi, 2019).

Organ biji tanaman lada dan kemiri digunakan sebagai bumbu masakan daerah Buton. Masakan asli Buton menggunakan lebih banyak variasi organ tumbuhan sebagai bumbu. Rimpang tanaman seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan lengkuas merupakan bagian yang dimanfaatkan sebagai bumbu. Tomat, cabai, mangga, jeruk nipis, tanaman kelapa, asam jawa, kecap, dan asam patikala termasuk tanaman yang memanfaatkan organ buahnya sebagai bumbu masakan. Organ umbi ketupat/dayak, bawang merah, dan bawang putih digunakan sebagai bumbu masakan. *Jatropha* menggunakan organ daun dalam masakan lokal. Belimbing, kecap, asam jawa, asam patikala, kedondong hutan, tomat, mangga, dan jeruk nipis termasuk di antara bumbu pedas yang sering digunakan dalam masakan tradisional masyarakat Buton. Saus asam ini mengubah rasa ikan dan menghilangkan bau amis. Salah satu bumbu dan rempah pedas yang sering digunakan dalam masakan asli masyarakat Buton adalah jahe, lengkuas, cabai, dan merica.

Selain meningkatkan rasa, rempah-rempah memberikan rasa pedas yang menggugah selera. Bumbu dan rempah tambahan seperti kemiri, kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan kelapa digunakan untuk menambah cita rasa masakan. Jika ikan sudah layu (tidak segar), maka ditambahkan jarak pada masakan yang dimasak dengan ikan pindang dalam hal ini. Biasanya daging sapi

atau ayam direbus dengan ketupat/bohlam bawang Dayak untuk mempercepat proses pelunakan daging. Karena masyarakat Buton tinggal di sekitar pantai, maka masakan daerahnya mayoritas bercirikan asam dan pedas. Mereka lebih sering mengonsumsi makanan laut dalam kesehariannya, antara lain ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, dan lain-lain. Makanan laut ini memiliki bau amis yang menyengat. Masakan lokal Buton sering kali menggunakan rempah-rempah yang rasanya asam untuk menutupi rasa amis dan memberikan rasa segar saat dicerna. Selain itu, masakan asli Buton menggunakan bumbu dan bumbu yang rasanya pedas untuk menambah nafsu makan (Prameshti Dyah, 2020).

C. Tinjauan Umum Tanaman Rempah-rempah

3.1. Pengertian Rempah-rempah

Rempah-rempah merupakan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi manusia. Selain sebagai pemberi aroma dan citarasa khas, rempah-rempah dapat dimanfaatkan dalam jumlah kecil sebagai pengawet makanan, penambah rasa, pengharum, dan penyedap masakan. Diketahui bahwa batang, daun, kulit kayu, umbi-umbian, rimpang, akar, biji, bunga, atau bagian lain dari tubuh tumbuhan merupakan sumber rempah-rempah yang digunakan dalam seni kuliner (Robi Yohanes, 2019).

Bagian tubuh tumbuhan mengandung zat fitokimia yang dibuat oleh tumbuhan sebagai bagian dari proses metabolisme, menurut De Guzman dan Siemonsma (2015). Beberapa tumbuhan, seperti adas, jintan, dan ketumbar, memanfaatkan bijinya sebagai bumbu; lainnya, seperti jahe, kunyit, lengkuas,

jahe, dan kapulaga, menggunakan rimpangnya; dan yang lainnya lagi, seperti daun jeruk, daun salam, seledri, dan bawang bombay, menggunakan daunnya sebagai bumbu masakan. Aplikasi rempah dapat dibagi menjadi dua kategori: aplikasi basah dan aplikasi kering. Lada, pala, jinten, ketumbar, dan cengkeh termasuk dalam kategori bumbu kering. Kunyit, lengkuas, jahe, serai, bawang bombay, cabai, dan bumbu basah lainnya termasuk dalam kelompok ini. Cengkih, merica, kayu manis, dan pala adalah beberapa rempah yang paling terkenal. Sebelum kelahiran Kristus, cengkeh telah dimanfaatkan selama ratusan tahun sebagai bumbu dan bahan wewangian (Nasution, 2020).

3.2. Sejarah Rempah-rempah

Perdagangan rempah-rempah telah menjadi komponen perekonomian global sejak abad kedua Masehi karena adanya jalur sutra yang menghubungkan Asia dan Eropa. Saat ini ekspor utama banyak negara adalah rempah-rempah. Banyak negara mengandalkan penjualan rempah-rempah sebagai sumber pendapatan karena nilai ekonominya yang signifikan. Eksportir utama rempah-rempah yang penjualannya cukup besar adalah yang berasal dari daerah tropis. Berbagai macam rempah-rempah dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia. Rempah-rempah menjadi pelengkap bahan dapur, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pangan, berbagai jenis sengaja ditanam. Kegunaan utama rempah-rempah adalah sebagai penyedap rasa, penambah rasa, pewangi, dan dalam beberapa kasus sebagai pewarna makanan alami. Keberagaman rempah-rempah yang subur di tanah Indonesia, secara teori, tidak lepas dari kekayaan dan kekhasan masakan Indonesia. Selain memberikan cita rasa yang nikmat pada

makanan, banyak rempah-rempah yang terbukti efektif dalam pengobatan komunitas berbasis herbal. Salah satu topik yang kini banyak mendapat perhatian dalam kemajuan ilmu kesehatan manusia adalah kandungan antioksidan pada tumbuhan rempah. Bahkan rempah-rempah telah menjadi komponen kunci dalam industri kuliner modern dan wisata kesehatan. Salah satu sumber daya hayati yang mempunyai dampak signifikan terhadap sejarah manusia adalah rempah-rempah. Manusia kebanyakan memanfaatkan rempah-rempah untuk berbagai keperluan (Suminto, 2018). Serta sektor paket spa dan layanan kesehatan di lokasi wisata merupakan dua tanda berkembangnya pasar aromaterapi dan terapi kesehatan herbal. Pesatnya perkembangan pemanfaatan tumbuhan rempah akan menjadi prototype peningkatan permintaan pasar tumbuhan rempah (Supriadi, 2017).

Meski rempah-rempah memiliki sejumlah keunggulan, namun komplimen masih kurang, hal ini terbukti dengan minimnya pengetahuan tentang rempah-rempah. Generasi muda saat ini umumnya masih asing dengan banyaknya jenis rempah-rempah. Kelangsungan hidup rempah-rempah sangat terancam oleh modernisasi dan perubahan pola makan sehari-hari yang mengikuti trend hidangan ala eropa yang tidak identik dengan rempah-rempah. Menurut para ahli, menurunnya penggunaan rempah-rempah dan hilangnya pengetahuan tentang rempah-rempah di Indonesia akan dipengaruhi oleh perubahan tradisi dan budaya yang sangat cepat. Hal ini sungguh aneh mengingat banyaknya rempah-rempah di Indonesia, dimana suku-suku yang berbeda memanfaatkannya untuk tujuan yang berbeda-beda. Pelestarian tanaman rempah-rempah sangatlah penting, terutama di daerah yang paling banyak terdapat tanaman rempah-rempah. Sudah tidak banyak

daerah yang mayoritas masyarakat tradisionalnya masih memanfaatkan tanaman rempah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi desa Sukamaju di Kabupaten Luwu yang menjadi rumah bagi suku Jawa masih menanakan kearifan lokal mengenai pemanfaatan tumbuhan rempah. Pelestarian rempah-rempah di Kabupaten Luwu Utara akan meningkatkan daya saing wisata kuliner khas dan memperluas potensi atraksi agrowisata di wilayah tersebut, yang kini mengalami pertumbuhan industri pariwisata yang pesat (Hakim Luchman, 2015).

D. Famili dari Tanaman Rempah-rempah

4.1. Famili *Zingiberaceae*

Tanaman keluarga jahe (*Zingiberaceae*) mencakup sekitar 1300 spesies yang tersebar terutama di Asia Tenggara dan memiliki sifat aromatik dan obat yang kuat. Tanaman jahe juga terkenal dengan kualitas minyak atsiri dan oleoresinnya yang bernilai ekspor ekonomis. Analisis metabolomik anggota *Zingiberaceae* terutama difokuskan pada genus *Curcuma* dan *Zingiber*, meskipun beberapa catatan merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut terhadap genera lain dalam famili ini. Tumbuhan yang termasuk dalam famili *Zingiberaceae* memiliki batang semu yang terbuat dari batang sukulen dengan daun yang rapat. Berbentuk roset dengan akar lanset, tulang sejajar, atau akar menyirip, daunnya diletakkan bergantian pada batang. Rimpang tanaman yang berbentuk umbi besar dengan akar yang besar ini mengandung minyak atsiri. Hanya satu dari 3-5 benang sari pada bunga banci majemuk asimetris pada tanaman ini yang dapat bertahan; yang lainnya steril. Ovariumnya menukik, mempunyai tiga bakal biji,

banyak bakal biji tetapi sedikit berbiji, tidak ada endosperma, dan endospermanya tampak seperti tepung (Sudarsono, 2016).

Komunitas tersebut mengacu pada famili tumbuhan *Zingiberaceae* yang mencakup 8 varietas tanaman obat yang banyak digunakan, seperti empon-empon dan temu-temuan. Rimpang tanaman ini digunakan sebagai bumbu dan obat. Temulawak, lempuyang gajah, jahe, lempuyang wangi, kencur, kunyit, lengkuas, dan banglai merupakan delapan jenis tumbuhan yang berbeda. Salah satu ramuan yang paling populer dalam pengobatan tradisional adalah kunyit dan temulawak dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengobati pilek, sakit perut, dan mengurangi pembengkakan. Rimpang jahe dan kunyit banyak dikonsumsi dalam pengobatan tradisional dan industri makanan, serta banyak laporan mengenai sifat antikanker, anti-oksidatif, anti-inflamasi, antiplatelet, anti-maag, dan analgesik (Apriliani *et al.*, 2018).

4.2. Famili Piperaceae

Ciri-ciri anggota famili *Piperaceae* ini adalah memiliki daun tunggal, berurat bersirip, berkayu, batang basah, berbintil, akar menanjak menempel pada batang ortotropik, bunga berkelamin tunggal tersusun dalam bulir kecil, dan berkayu, batang basah berbintil. Buahnya merupakan buah batu, bijinya bersel minyak serta memiliki perisperm dan endosperma. Minyak atsiri terdapat di setiap bagian tumbuhan dalam keluarga Piperaceae. (Warit 2019).

Terdapat sekitar 40 spesies Piper di Indonesia dari 600 spesies yang termasuk dalam famili *Piperaceae*. Cabai jawa (*Piper retrofractum* Vahl.), lada (*Piper nigrum* L.), sirih (*Piper betle* L.), sirih merah (*Piper crocatum*), dan

kemukus (*Piper cubeba* L.) merupakan beberapa jenis tanaman piper yang dibudidayakan di Indonesia. Jawa adalah rumah asli tanaman cabai Jawa, *Piper retrofractum* Vahl. *Piper guineense*, tanaman asli Afrika Barat yang digunakan sebagai pengganti lada hitam, juga dikenal sebagai lada hitam Afrika. Banyak varietas piper, terkadang dikenal sebagai cabai panjang, ditanam di India, termasuk *Piper longum*, *Piper sylvaticum*, *Piper attenuatum*, dan *Piper officinarum* (Melly, 2018).

4.3. Famili *Myrtaceae*

Tanaman keluarga *Myrtaceae*, menurut Pramesthi (2020), meliputi pepohonan dan perdu dengan bunga khas berbentuk jambu biji dan dedaunan beraroma harum. Sering kali anggota genus ini dimanfaatkan menjadi ramuan tradisional seperti juwet (*Eugenia cumini*), cengkeh (*Syzygium aromaticum* L. syn. *Eugenia aromatica* O.K.), kayu putih (*Melaleuca leucadendron* L.), salam (*Eugenia polyantha*), jambu biji (*Psidium guajava* L.).

Budidaya komersial tanaman ini melalui kehutanan dan perkebunan, serta pembibitan dari stek atau pucuk akar. Tumbuhan ini memiliki habitat yang beragam, antara lain dataran rendah, rawa, dan dataran beriklim sedang (Pramesthi, 2020).

4.4. Famili *Lamiaceae*

Lamiaceae merupakan famili yang mencakup tumbuhan dengan batang berkayu berbentuk persegi panjang, daun hijau dengan tepi bergerigi, bunga majemuk tampak bergerombol di ujung pucuk atau ketiak daun, serta daun yang mengandung minyak atsiri. Selain daun jintan (*Coleus amboinicus* Lour.) yang

sering menjadi komponen obat dan bumbu masakan, genus lain dari family ini adalah kemangi (*Ocimum*), yang juga banyak dimanfaatkan sebagai obat, penyedap rasa, dan pengharum (Efremila, S. 2015).

4.5. Famili Apiaceae

Batang tanaman herba berumur pendek dalam famili *Apiaceae* atau *Umbelliferae* ini berlubang di bagian dalam dan beralur serta bergerigi di bagian luar. Tanaman ini memiliki siri khas lima bunga kecil berbentuk payung majemuk, yang sebagian besar merupakan bunga banci dan memiliki lima bunga. Karena mengandung minyak atsiri, kulit buah banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Spesies yang umum dimanfaatkan dari familif ini antara lain dengan ketumbar (*Coriandrum sativum* L.), seledri (*Apium graviolens* L.), adas (*Foeniculum vulgare* Mill.) dan pegagan (*Centella asiatica*) (Ifandi, 2016). Tumbuhan seledri (*Apium graviolens* L.) salah satu Famili *Apiaceae* atau famili *Umbelliferae*.

4.6 Fitokimia Tumbuhan Rempah-rempah

Bidang ilmu fitokimia mengkaji zat metabolisme sekunder yang ada dalam jaringan tanaman. Kehadiran metabolit sekunder dalam tubuh tumbuhan sangat penting baik untuk pertahanan diri terhadap makhluk hidup lain maupun untuk memikat serangga yang membantu penyerbukan. Metabolit sekunder ini melayani berbagai organisme lain selain tubuh tumbuhan. Tumbuhan berfungsi sebagai sumber makanan bagi berbagai mikroorganisme, termasuk manusia, hewan, dan manusia itu sendiri. Keberadaan fitokimia tersebut juga dipengaruhi oleh

persaingan tanaman. Perebutan terhadap zat pertumbuhan yang memadai bagi kehidupan tumbuhan antar spesies (Julianto T, 2019).

Tumbuhan menciptakan bahan kimia berupa metabolit sekunder untuk perlindungan, sehingga tumbuhan dapat menargetkan pertumbuhan sel berbahaya. Zat-zat ini mempunyai aktivitas umum atau tertarget terhadap hal yang dapat membahayakan tumbuhan, yang meliputi bakteri, virus, jamur, dan kanker (Julianto T, 2019).


Tujuan metabolisme adalah untuk mempertahankan kehidupan suatu organisme melalui interaksi yang teratur dan tepat antar molekul dalam lingkungan sel yang disertai dengan perubahan. Jalur metabolisme adalah nama jalur yang terlibat. protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat adalah biomolekul penting. Gula menghasilkan karbohidrat, asam nukleat menghasilkan nukleotida, asam amino menghasilkan protein, dan gliserol menghubungkan tiga rantai asam lemak untuk menghasilkan lipid.

Metabolit sekunder adalah zat yang dihasilkan melalui jalur metabolisme yang berbeda dan diperkirakan memiliki peranan yang kurang penting dalam pertumbuhan tanaman dibandingkan metabolit primer, yaitu zat yang terlibat langsung dalam pertumbuhan tanaman. Sekitar 200.000 senyawa yang dihasilkan oleh metabolit sekunder memiliki kegunaan bagi tanaman dalam jangka panjang, terutama sebagai bentuk pertahanan dan pemberian sifat khas berupa senyawa warna. Warna metabolit sekunder berfungsi sebagai ilustrasi sistem keseimbangan karena memungkinkan tanaman mempertahankan diri dari serangga serta menarik mereka untuk tujuan penyerbukan. Selain itu, mereka berfungsi sebagai pengatur

dan penanda metabolit utama, membantu tanaman dalam menjaga keseimbangan sistem ekologi yang rumit (Julianto T, 2019).

Alkaloid, poliketida terpenoid, dan fenolat adalah beberapa contoh metabolit sekunder yang dapat ditemukan pada tumbuhan. senyawa fenolik adalah bahan kimia dengan karakteristik cincin aromatik yang terdapat pada tumbuhan dan mengandung 1-2 gugus hidroksi (OH), menurut Markham K.R. di Shabur (2019). Senyawa fenolik ini mempunyai sifat mudah larut dalam pelarut polar, mudah teroksidasi oleh basa kuat, dan mempunyai efek penggelapan akibat oksidasi udara. Zat-zat tersebut dipecah menjadi berbagai kelas, antara lain fenilpropanoid, fenol sederhana, asam fenolik, flavonoid, dan tanin.

Sekitar 2000 jenis flavonoid telah ditemukan, termasuk senyawa flavonol, flavon, dan antosianin. Menurut Evizal R. (2013), flavonoid adalah golongan metabolit sekunder yang keberadaannya melimpah dan digunakan tumbuhan untuk pertahanan dan pengelolaan. Tanaman rempah seperti sirih, jahe, jahe, cengkeh, daun salam, kemangi, dan pala mengandung flavonoid. 15 atom karbon membentuk struktur dasar flavonoid, yang memiliki susunan C₆-C₃-C₆ seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Kerangka Dasar Karbon Flavonoid
(sumber : Julianto T, 2019)


Desmiati dkk. (2008) menggambarkan tanin sebagai bahan kimia yang rasanya pahit dengan efek antidiare, antibakteri, astringen, dan antioksidan. Tanin terdiri dari banyak bahan kimia fenolik yang sulit dipisahkan dan dikristalkan. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengendapkan protein dari larutan, yang kemudian dapat digabungkan dengannya.

Menurut Hagerman (2002), tanin dipisahkan menjadi dua kategori yakni tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terkondensasi lebih tahan terhadap reaksi hidrolisis dibandingkan tanin tidak terkondensasi. Selain itu, tanin ini berasal dari molekul yang disebut katekin, flavonoid, dan flavan-3,4-diol. Dengan adanya enzim atau asam, molekul ini dapat terurai menjadi plobapen. Istilah "tanin terhidrolisis" mengacu pada tanin yang dipecah oleh asam atau enzim untuk membentuk asam ellagic dan gallic. Daun tanaman kayu putih mengandung asam elagat, sedangkan tanaman rempah cengkeh mengandung asam galat.

Selain manfaat yang telah dijelaskan, tanin berperan sebagai antioksidan. Banyak tanaman rempah, termasuk salam (*Syzygium polyanthum*), pala (*Myristica fragrans* Houtt), dan kunyit (*Curcuma longa* L.), mengandung tanin. Markham K.R. dalam Shabur (2019) menjelaskan bahwa fenol sederhana mendorong sekaligus menghambat perkecambahan. Beberapa tanaman rempah-rempah, contohnya asam jawa (*Tamarindus indica* L.), mengandung bahan kimia ini. Struktur kimia asam ellagic dan asam galat pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Asam Elagat
(Sumber : Julianto T, 2019)



Gambar 3. Asam Galat
(Sumber : Julianto T, 2019)


Kelas metabolit sekunder tertentu adalah alkaloid. Alkaloid biasanya ditemukan di alam sebagai kombinasi alkaloid utama dan beberapa alkaloid basa yang lebih kecil, menurut Shabur (2019). Alkaloid biasanya menunjukkan ciri-ciri seperti bentuk padat amorf dalam bentuk kristal, rasa pahit, dan kemampuan larut dalam pelarut organik non-polar seperti kloroform, dieter, dan lain-lain. Semua alkaloid, kecuali kafein dan strychnine, berwarna kuning dan akan terurai jika dipanaskan. Alkaloid secara luas dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: heterosiklik dan non-heterosiklik (Gambar 4 dan 5).

Werdhany dkk. (2008) mengklaim bahwa alkaloid memiliki sifat antineoplastik yang memungkinkannya menekan proliferasi sel kanker. Banyak tanaman rempah-rempah, seperti pala (*Myristica fragrans* Houtt.) dan lada (*Piper nigrum* L.), juga mengandung alkaloid.


Menurut Shabur (2019), terpenoid merupakan salah satu golongan bahan kimia hidrokarbon organik yang dihasilkan oleh tumbuhan yang mempunyai sifat memiliki bau yang menyengat sehingga berfungsi sebagai pencegah predator. Bahan utama dalam minyak esensial banyak tanaman termasuk terpenoid. Monoterpenoid metil jasmonat, ditunjukkan pada Gambar 6, adalah terpenoid

paling umum yang diidentifikasi pada tanaman melati, khususnya pada kelopaknya.


Gambar 4 dan 5 masing-masing menunjukkan kerangka karbon alkaloid heterosiklik dan non-heterosiklik.



Gambar 4. Alkaloid Heterosiklik
(Sumber : Julianto T, 2019)




Gambar 5. Alkaloid Non Heterosiklik
(Sumber : Julianto T, 2019)



Gambar 6. Mentil Jasmonat dari Kelopak Melati
(Sumber : Julianto T, 2019)

Menurut Guenter dalam Hanief M., dkk. (2013), minyak nabati termasuk minyak atsiri yang disebut juga minyak eterik, yang mudah menguap pada suhu kamar dan mengeluarkan aroma harum yang khas. Minyak atsiri berbentuk cairan kental pada suhu kamar. Minyak atsiri terdapat pada berbagai tanaman herbal, antara lain kencur, jahe, temulawak, temugiring, temu Kunci, lengkuas, kapulaga, kunyit putih, kunyit, dan cengkeh. Minyak atsiri biasanya dimanfaatkan dalam aromaterapi dan pengharum parfum, menurut Julianto T. (2016).

Kurkuminoid merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada temulawak dan kunyit yang berwarna kuning, menurut Nirmala A, 2016. Sebagai antioksidan, spasmolitik, antiinflamasi, antihepatotoksik, dan koleretik, kurkumin bermanfaat. Kadar kurkumin pada temulawak adalah 1,6-2,2%, dibandingkan 10% pada kunyit. Ilustrasi susunan kimia kurkuminoid ditunjukkan pada Gambar 7.




Gambar 7. Curcumis
(Sumber : Setyowati A dan Lilis CS, 2013)

E. Tinjauan Umum Sukamaju

Kecamatan Sukamaju di selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke dan di timur dengan Kabupaten Bone. Koordinat tepatnya adalah 2 0 25' 40" - 2 0 45' 40" Lintang Selatan dan 120 23' 45" - 120 33' 23" Bujur Timur. Bone di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng dan di sebelah utara dengan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Sukamaju memiliki luas sekitar 19.934,65 km². Dengan luas wilayah 8.992,43 km² atau sekitar 45,11 persen dari total luas seluruh desa di Kecamatan Sukamaju, Lampuawa menjadi desa dengan luas wilayah terluas. Sebaliknya, Desa Wonosari yang luasnya sekitar 902,9 persen dari total luas wilayah Kecamatan Sukamaju memiliki luas wilayah paling kecil. Luas wilayahnya 179,99 km².



Gambar. 1. Peta Wilayah Desa Sukamaju (Dokumentasi pribadi, 2023)



Gambar. 2. Peta Kependudukan Sukamaju (Dokumentasi pribadi, 2023)

Kepadatan penduduk Kecamatan Sukamaju masih tergolong rendah hingga tahun 2020. Dengan jumlah penduduk sebanyak 27.965 jiwa dan luas wilayah 19.934,65 km², kabupaten ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah yaitu sekitar 134 jiwa per km². Dengan kata lain, biasanya hanya ada 4 orang

yang tinggal dalam satu km² di Kecamatan Sukamaju. Jumlah penduduk Kecamatan Sukamaju mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Penduduk Kecamatan Sukamaju berjumlah 27.965 pada tahun 2020 dan penduduk pendatang sebanyak 134 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 berjumlah 14.099 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan mencapai 13.866 jiwa.

Meski fasilitas pendidikan di Kecamatan Sukamaju masih minim, namun dapat diakses sepenuhnya mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas. Pada tahun 2020 akan terdapat 2 TK Negeri dan 13 TK Swasta di fasilitas pendidikan TK tersebut. Terdapat 4 SMP, 3 (tiga) SMP negeri dan 1 (satu) SMP swasta, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Desa Sukadamai, Sukamaju, dan Katulungan masing-masing mempunyai satu atau lebih SMP Negeri. *Sementara itu*, SMP swasta tersebar di desa Sukamaju. Dua sekolah menengah negeri dan dua sekolah menengah swasta masing-masing terletak di desa Sukamaju dan Minanga Talu, dan keduanya merupakan fasilitas pendidikan sekolah menengah atas di komunitas tersebut.

Kecamatan Sukamaju memiliki keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu hanya memiliki satu unit puskesmas dan dua puskesmas pembantu. Tenaga medis tersebut meliputi empat orang dokter, 14 orang bidan, dan lima orang dukun terlatih. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung puskesmas meningkat menjadi 20.337 orang dengan cakupan imunisasi 100%.

Kesehatan lingkungan Kecamatan Sukamaju berada dalam kondisi baik. Mayoritas masyarakat di 14 komunitas memiliki jamban sendiri. Namun, mayoritas penduduk setempat masih terus membakar sampah rumah tangga

sebagai salah satu cara pemusnahan sampah. 8.317 rumah tangga akan menjadi pengguna listrik PLN pada tahun 2020.

Terdapat rumah ibadah di Kecamatan Sukamaju, antara lain masjid (42), musala (36), gereja Protestan (12), gereja Katolik (3), dan kelenteng (16), untuk meningkatkan kehidupan beragama.

Pertanian di Kecamatan Sukamaju cukup menjanjikan. Pendapatan asli daerah Sukamaju diharapkan dapat meningkat dengan pengelolaan sektor pertanian yang sebaik-baiknya. Di lahan seluas 2.214,48 Ha, produksi padi sawah di kecamatan ini pada tahun 2020 berjumlah 12.662.536 ton. Selain itu, 122,50 hektar jagung digunakan untuk menghasilkan 829.325 ton gabah. Sedangkan produksi tanaman hortikultura seperti durian, mangga, dan rambutan masing-masing berjumlah 22.430 ton, 2.329 ton, dan 4.639 ton.

Perikanan dan Peternakan banyak dimiliki masyarakat di Kecamatan Sukamaju terutama peternakan sapi. Jumlah sapi potong akan bertambah menjadi 4.934 ekor pada tahun 2020. Selain itu juga terdapat babi sebanyak 4.955 ekor, kambing 2.449 ekor, dan kerbau 217 ekor. Serta jenis unggas yang terbanyak adalah ayam kampung sebanyak 116.842 ekor, ayam petelur sebanyak 11.097 ekor, ayam broiler sebanyak 346.500 ekor, dan itik sebanyak 18.589 ekor.

Untuk pelayanan pasar, terdapat enam minimarket, empat pasar tanpa bangunan, dan satu pasar dengan bangunan semuanya mendukung operasional perdagangan di Kecamatan Sukamaju. Selain itu, kecamatan ini memiliki 1 hotel yang melayani wisatawan (BPS Luwu Utara, 2021)

F. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini mengkaji tanaman rempah dari sudut pandang etnobotani. Ini dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif tertentu, yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif, atau penelitian yang mengolah data. Strategi PEA, atau *Participatory Ethnobotanical Appraisal*, serta berbagai metodologi wawancara, digunakan untuk melakukan penelitian ini. Strategi PEA melibatkan peneliti untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat yang memanfaatkan tanaman, khususnya rempah-rempah, di Kecamatan Sukamaju.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2023 dan lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat dusun bali purwa, dusun kesuma dan dusun mataram, di kelurahan sukamaju, kecamatan sukamaju kab. Luwu utara.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat kelurahan sukamaju, kecamatan sukamaju kab. Luwu utara dan sampel penelitian yaitu masyarakat biasa, tokoh masyarakat, dukun (sanro), jenang (chef daerah), individu (orang)

tertua yang sudah berpengalaman dalam hal memanfaatkan tanaman rempah serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Pemanfaatan pengolahan rempah tersebut.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah pengetahuan lokal masyarakat tentang tanaman rempah-rempah meliputi jenis tanaman, bagian/organ tanaman yang dimanfaatkan, persentase jenis dan persentase bagian/organ tanaman rempah yang dimanfaatkan, serta cara pemanfaatan dan perolehannya. Tanaman rempah dan kandungannya menjadi faktor dalam penelitian ini. bahan yang berasal dari tanaman rempah-rempah.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah rempah-rempahan yang mencakup beberapa jenis tumbuhan, bagian dan organ tumbuhan, serta penduduk Desa Sukamaju Kec. Masyarakat Sukamaju beranggapan bahwa keanekaragaman tanaman dapat meningkatkan cita rasa makanan dan senyawa yang terdapat pada tanaman rempah-rempah. Tanaman ini digunakan sebagai bumbu obat tradisional.

F. Instrumen Penelitian

1. Alat

Adapun alat-alat yang digunakan yaitu Alat tulis menjadi alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari informan, pedoman wawancara, Kamera untuk proses dokumentasi wawancara.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tanaman rempah-rempah yang dimanfaatkan oleh masyarakat kelurahan sukamaju, kecamatan sukamaju.

G. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada saat penelitian yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui tahap observasi dan wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan teknik *snowball sampling* atau pemilihan sampel secara bergulir yakni teknik pemilihan sampel yang telah diwawancarai sebelumnya untuk mendapatkan informasi dari informan. Melalui teknik *snowball sampling*, sampel ditentukan dari saran atau rekomendasi dari satu responden ke responden lainnya yang memenuhi kriteria yang sudah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh peneliti. Observasi dalam penelitian ini perlu dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran tentang responden yang akan menjadi informan tepat dan sesuai dengan kriteria yang diperlukan peneliti. Observasi yang akan dilakukan di suku jawa adalah mencari informasi mengenai

masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang tua yang mempunyai pengetahuan tentang tanaman rempah-rempah.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi terstruktur berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan yang berfungsi sebagai petunjuk wawancara untuk mengumpulkan data lisan dari responden. Responden dipilih dengan cara *snowball sampling* dengan kriteria responden masyarakat yang pernah menggunakan tanaman rempah untuk pemanfaatan dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tumbuhan rempah dan penggunaannya. Data yang diperlukan dalam wawancara meliputi: (1) pemanfaatan responden mengenai tanaman rempah; (2) jenis tanaman rempah apa saja yang informan gunakan; (3) Bagian/ organ apa yang dimanfaatkan dan tanaman rempah. Selain itu diajukan juga pertanyaan untuk data pendukung seperti: (1) nama responden; (2) umur responden; (3) pekerjaan responden; dan (4) tingkat pendidikan responden. Selanjutnya, hasil wawancara dicatat pada lembar data wawancara dan direkam dengan menggunakan alat perekam.

2. Skrining Tanaman Rempah-rempah

a. Pengumpulan Data Senyawa Bioaktif Tanaman Rempah

Tanaman Rempah-rempah hasil identifikasi diketahui kandungan senyawa bioaktif nya dengan memasukkan setiap nama ilmiah dari tanaman tersebut pada situs http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/top.html. Pada situs tersebut diperoleh data senyawa bioaktif yang terkandung dalam semua bagian tanaman, dengan senyawa bioaktif tanaman yang didapatkan dicari data canonical SMILESnya pada situs "<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>".

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Tabel dan gambar digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pemeriksaan tanaman rempah. Berdasarkan data hasil wawancara responden dianalisis tingkat pemanfaatan dan penerimaan masyarakat Kelurahan sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam penggunaan tanaman rempah-rempah. Berikut merupakan rumusan yang digunakan dalam penentuan persentase familia, habitus, bagian yang digunakan serta teknik yang digunakan.

- a. Persentase Familia tanaman yang digunakan

$$\frac{\Sigma \text{ spesies familia tertentu}}{\Sigma \text{ seluruh spesies}} \times 100\%$$

- b. Persentase bagian tanaman yang digunakan

$$\frac{\Sigma \text{ bagian yang digunakan}}{\Sigma \text{ seluruh spesies bagian yang digunakan}} \times 100\%$$

- c. Persentase teknik pengolahan tanaman yang digunakan

$$\frac{\Sigma \text{ teknik yang digunakan}}{\Sigma \text{ seluruh teknik yang digunakan}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Secara geografis kelurahan sukamaju desa sukamaju terletak pada koordinat 120° , $465' 97''$ BT, $-2,607' 84''$ LS, dimana kelurahan sukamaju berbatasan : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaluku, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tolangi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salulemo, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaluku. Luas Wilayah Desa Sukamaju sekitar $4,73 \text{ KM}^2$ terdapat 4 (empat) Dusun dengan jumlah penduduk sampai pada pertama Tahun 2021 adalah Laki-laki 2.173 jiwa dan Perempuan 2.274 jiwa dengan jumlah total penduduk sebanyak 1.359 KK. Dimana memiliki potensi pada sector pertanian, perkebunan, perindustrian dan perdagangan.

Adapun Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai responden terdiri dari 100 responden meliputi 30 orang tua, 30 tokoh masyarakat, 15 orang dukun desa dan 25 orang masyarakat biasa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pemanfaatan tanaman rempah. Profesi sebagai responden bervariasi, di antaranya ketua RT/RW, guru SD, guru SMA, petani, pegawai kesehatan perawat/bidan, petugas pegawai kantor lurah, wiraswasta, satpam, tukang urut, peternak, pedagang, buruh harian dan tukang penjahit.

1. Hasil Inventarisasi Tanaman Rempah-rempah di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju


Masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara memberikan informasi saat wawancara yang mengarah pada koleksi 25 jenis tanaman rempah yang digunakan baik dalam kuliner maupun pengobatan tradisional. Hasilnya ditampilkan pada tabel di bawah ini (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Hasil Inventarisasi Tanaman Rempah-rempah yang Terdapat di Kelurahan Sukamaju, Kec. Sukamaju Kab. Luwu utara, 2023.

N o.	Nama Umum	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Familia	Habit us	Organ	Teknik Pengolahan
1.	Kunyit	Kunyit bulawan	<i>Curcuma Longa</i>	Zingiberaceae	Terna	Rimpang	Direbus/Diblender/Tanpa diramu/Diremas
2.	Kunyit putih	Kunyit mabusa	<i>Curcuma zedoaria</i>	Zingiberaceae	Terna	Rimpang	Direbus/Diparut/Diblender/Diremas/Tanpa diramu
3.	Jahe	Passalalia	<i>Zingiber officinale</i>	Zingiberaceae	Terna	Rimpang	Direbus/Ditumbuk/Diblender/Diremas
4.	Kencur	Sa'ku	<i>Kaempferia galanga</i>	Zingiberaceae	Terna	Rimpang	Direbus/Diparut/Diblender
5.	Temulawak	Kunyit tammu	<i>Curcuma zanthorrhiza</i>	Zingiberaceae	Terna	Rimpang	Direbus/Ditumbuk/diparut/diblender
6.	Kapulaga	Kapulaga	<i>Elettaria cardamomum</i>	Zingiberaceae	Terna	Buah	Ditumbuk
7.	Lempuyang	Limpujang	<i>Zingiber zerumbet</i>	Zingiberaceae	Terna	Rimpang	Direbus/diparut/diblender
8.	Lengkuas	Likku	<i>Alpinia galangal</i>	Zingiberaceae	Terna	Rimpang	Direbus/Ditumbuk/Diblender
9.	Temukunci	Kunci	<i>Boesenbergia rotunda</i>	Zingiberaceae	Terna	Rimpang	Direbus/Ditumbuk/Diblender
10.	Lada	Merica	<i>Piper nigrum L.</i>	Piperaceae	Terna	Biji	Dihaluskan/Direbus
11.	Kemangi	Cemangi	<i>Ocimum basilicum</i>	Lamiaceae	Perdu	Daun	Ditumbuk


12	Ketumbar	Ketumbara	<i>Coriandrum sativum</i>	Apiaceae	Terna	Biji	Ditumbuk/Dihaluskan/Direbus
13	Seledri	Daun so'	<i>Apium graveolens</i>	Apiaceae	Herba	Daun/Batang	Diiris
14	Jintan	Jinten	<i>Cuminum cyminum</i>	Apiaceae	Terna	Biji	Dihaluskan
15	Pala	Buah pala	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristiaceae	Perdu	Buah	Ditumbuk
16	Kemiri	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Euphorbiaceae	Pohon	Buah	Dihaluskan
17	Kayu manis	Kajucanning	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Lauraceae	Pohon	Batang	Dimasak
18	Keluak	Kalao	<i>Pangium edule</i>	Achariaceae	Pohon	Buah	Dimasak
19	Bawang merah	Lassunamararang	<i>Allium cepa</i> L.	Amaryllidaceae	Herba	Umbi	Dihaluskan
20	Bawang putih	Lassunamabusa	<i>Allium sativum</i> L.	Amaryllidaceae	Herba	Umbi	Dihaluskan
21	Cabai rawit	Ladalondong	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae	Perdu	Buah	Diblender/Dihaluskan
22	Pandan	Daunpandan	<i>Pandanus amaryllifolius</i>	Pandanaceae	Perdu	Daun	Diblender/Diremes
23	Sereh	Daunsarre'	<i>Cymbopogon citratus</i>	Foaceae	Herba	Batang	Direbus/Digebrek/Diblender
24	Jeruk Purut	Lemopurut	<i>Citrus hystrix</i>	Rutaceae	Perdu	Daun/Buah	Diiris/Diperas
25	Jeruk nipis	Lemonipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Rutaceae	Perdu	Buah	Diiris/Diperas

Merujuk pada hasil tabel 4.1, maka disimpulkan bahwa persentase terbanyak yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju dalam pengobatan tradisional yaitu tanaman yang berasal dari familia *Zingiberaceae* dengan jumlah 34% (9 spesies) dan *Apiaceae* 11% (3 spesies)




Gambar 4.1 Diagram Persentase Jumlah Tumbuhan Rempah Berdasarkan Familia yang digunakan dalam Pengobatan Tradisional oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, dan Kabupaten Luwu Utara mengenai pemanfaatan bagian tumbuhan dalam pengobatan tradisional, terdapat enam organ tumbuhan dari 25 jenis tumbuhan berbeda yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan. Adapun bagian (organ) tanaman dengan persentase paling banyak digunakan adalah pada bagian rimpang sejumlah 8 spesies (30%), bagian buah sejumlah 6 spesies (19%) dan yang paling sedikit digunakan adalah pada bagian biji berjumlah 3 spesies, daun berjumlah 4 spesies, batang berjumlah 2 spesies dan umbi berjumlah 2 spesies seperti yang terlihat pada diagram gambar 4.2.



Gambar 4.2 Diagram Persentase Organ Tanaman Rempah yang digunakan dalam Pengobatan Tradisional oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara

Berlandaskan informasi yang didapatkan saat wawancara terhadap masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara tentang teknik pengolahan tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional, maka diperoleh hasil yaitu terdapat 10 teknik pengolahan dengan persentase paling banyak digunakan yaitu direbus sejumlah 11 spesies (11%) dan yang paling sedikit digunakan yaitu ditumbuk, dihaluskan, diiris, diparut, diremas dan tanpa diramu sejumlah 2% (masing-masing 1 spesies) seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.4.



Gambar 4.3 Teknik Pengolahan Tanaman yang digunakan dalam Pengobatan Tradisional oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara

2. Skrining Senyawa Bioaktif Tanaman rempah di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara

Berdasarkan hasil skrining senyawa bioaktif pada setiap spesies tanaman rempah yang digunakan oleh masyarakat Sukamaju dalam pengobatan tradisional diperoleh 20 spesies dari 25 spesies tumbuhan yang berpotensi sebagai kandungan senyawa tersebut memiliki aktivitas yang tinggi.

Tabel 4.2 Data Senyawa Bioaktif Tanaman rempah sebagai berikut.

No	Nama Tumbuhan	Nama Senyawa	Rumus Molekul
1	Kunyit (<i>Curcuma longa</i>)	1,8-Cineole	$C_{10}H_{18}O$
		Espatulenol	$C_{15}H_{24}O$
		beta-Eudesmol	$C_9H_8O_3$
		beta-Pinene	$C_{10}H_{16}$
		(+)-Camphor	$C_{10}H_{16}O$
		Limonene	$C_{10}H_{16}$
		3-Carene	$C_{10}H_{16}$
		beta-Myrcene	$C_{10}H_{16}$

	Alpha terpinolene	$C_{10}H_{16}$
	alpha-Phellandrene	$C_{10}H_{16}$
	beta-Caryophyllene	$C_{15}H_{24}$
	alpha-Cedrene	$C_{15}H_{24}$
	E-beta-farnesene	$C_{15}H_{24}$
	alpha-Caryophyllene (obsol.)	$C_{15}H_{24}$
	Thujopsene	$C_{15}H_{24}$
	alpha-Zingiberene	$C_{15}H_{24}$
	Cholesterol	$C_{15}H_{24}$
	(-)-beta-Sitosterol	$C_{27}H_{46}O$
	beta-Sesquiphellandrene	$C_{15}H_{24}$
	beta-Phellandrene	$C_{10}H_{16}$
	[1S-[1alpha,2beta,5beta(R*)]]-5-	$C_{15}H_{26}O_2$
	(1,5-Dimethyl-4-hexenyl)-2-	$C_{15}H_{24}$
	methyl-3-	
	cyclohexene-1,2-diol	$C_{15}H_{24}$
	(R)-(-)-alpha-Curcumene	$C_{15}H_{22}$
	(-)-Curcuphenol	$C_{15}H_{22}O$
	(R)-(-)-Xanthorrhizol	$C_{15}H_{22}O$
	(+)-ar-Turmerone	$C_{15}H_{20}O$
	beta-Curcumene	$C_{15}H_{24}$
	alpha-Turmerone	$C_{15}H_{22}O$
	Curhone	$C_{15}H_{22}O$
	Turmerone	$C_{15}H_{22}O$
	(+)-alpha-Atlantone	$C_{15}H_{22}O$
	(Z)-alpha-Atlantone	$C_{15}H_{22}O$
	(+)-beta-Atlantone	$C_{15}H_{22}O$
	(-)-Germacrene D	$C_{15}H_{24}$
	Germacrene	$C_{15}H_{22}O$
	Curdione	$C_{15}H_{24}O_2$
	Dehydrocurdione	$C_{15}H_{22}O_2$
	(E,E,E)-2-(4,8-Dimethyl-10-oxo-	$C_{15}H_{20}O_2$
	3,7-	
	cyclodecadien-1-ylidene)-	$C_{15}H_{20}O_2$
	propanal	
	delta-Elemene	$C_{15}H_{24}$

		(-)-gamma-Elemene	$C_{15}H_{24}$
		alpha-Elemene	$C_{15}H_{24}$
		(+)-Germacrone-4,5-epoxide	$C_{15}H_{22}O_2$
		alpha-Guaiene	$C_{15}H_{24}$
		Procurcumenol	$C_{15}H_{22}O_2$
		alpha-Himachalene	$C_{15}H_{24}$
		1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-	$C_{21}H_{22}O_4$
		1,4,6-heptatrien-3-one	$C_{21}H_{22}O_4$
		1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4,6-heptatrien-3-one	$C_{21}H_{24}O_6$
		beta-Turmerone	$C_{15}H_{22}O$
2	Kunyit putih (<i>Curcuma zedoaria</i>)	1,8-Cineole	$C_{10}H_{18}O$
		Espatulanol	$C_{15}H_{24}O$
		beta-Eudesmol	$C_9H_8O_3$
		alpha-Pinene	$C_{10}H_{16}$
		beta-Pinene	$C_{10}H_{16}$
		(+)-Camphor 152.23	$C_{10}H_{16}O$
		Curcumin 368.4	$C_{21}H_{20}O_6$
		Camphene 136.23	$C_{10}H_{16}$
		E-beta-farnesene 206.37	$C_{15}H_{24}$
		trans,trans-Farnesol (222.37)	$C_{15}H_{26}O$
		beta-Eudesmene 204.35	$C_{15}H_{24}$
		alpha-Zingiberene 204.35	$C_{15}H_{24}$
		(+)-ar-Turmerone 216.32	$C_{15}H_{20}O$
		13-Hydroxygermacrone 234.33	$C_{15}H_{22}O_2$
		Curdione 236.35	$C_{15}H_{24}O_2$
		Dehydrocurdione 234.33	$C_{15}H_{22}O_2$
		Curzerenone 230.30	$C_{15}H_{18}O_2$
		(-)-Elemol 22.37	$C_{15}H_{26}O$
		(-)-gamma-Elemene 204.35	$C_{15}H_{24}$
		beta-Dictyopterol (220.35)	$C_{15}H_{24}O$
		Curcolone (246.30)	$C_{15}H_{18}O_3$
		(-)-alpha-Cadinol (222.37)	$C_{15}H_{26}O$
		alpha-Calacorene (200.32)	$C_{15}H_{20}$
		(+)-Curzeone (228.29)	$C_{15}H_{16}O_2$

		Pyrocurzerenone (212.29)	$C_{15}H_{16}O$
		Curcumenol 234.33	$C_{15}H_{22}O_2$
		Zedoarondiol 252.35	$C_{15}H_{24}O_3$
		Cucumadiol 238.37	$C_{15}H_{26}O_2$
		Procurcumenol 234.33	$C_{15}H_{22}O_2$
		Oxycurcumenol 250.33	$C_{15}H_{22}O_3$
		Zedoarol 246.30	$C_{15}H_{18}O_3$
		Isosparthulenol 220.35	$C_{15}H_{24}O$
		beta-Himachalene 204.35	$C_{15}H_{24}$
		Guaidiol 238.37	$C_{15}H_{26}O_2$
		2-Nonanone 142.24	$C_9H_{18}O$
		calarene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		Curcarabranol B (252.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}O_3$
		Curcumadione (234.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O_2$
		Curcumenolactone A (248.32 g/mol)	$C_{15}H_{20}O_3$
		Curcumenolactone B (248.32 g/mol)	$C_{15}H_{20}O_3$
		Curcumenolactone C (264.32 g/mol)	$C_{15}H_{20}O_4$
		Curcumenone (234.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O_2$
		Furanodiene (216.32 g/mol)	$C_{15}H_{20}O$
		Zedoalactone B (280.32 g/mol)	$C_{15}H_{20}O_5$
		Zedoarofuran (264.32 g/mol)	$C_{15}H_{20}O_4$
		Zedoarolide A (296.31 g/mol)	$C_{15}H_{20}O_6$
		Zedoarolide B (282.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O_5$
		Isofuranodiene (216.32 g/mol)	$C_{15}H_{20}O$
		12-hydroxycurcumenol (250.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O_3$
		beta-Elemenone (218.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O$
		5-epi-Curzerenone (230.30 g/mol)	$C_{15}H_{18}O_2$
		Curcumanolide B (234.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O_2$
		Curcolonol (264.32 g/mol)	$C_{15}H_{20}O_4$
		Zedoalactone C (266.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O_4$
		Eudesmol (222.37 g/mol)	$C_{15}H_{28}O$
3	Jahe (<i>Zingiber officinale</i>)	(-) Champhor (152.23)	$C_{10}H_{16}O$

		1,8-Cineole (154.25)	$C_{10}H_{18}O$
		Espatulanol (220.35)	$C_{15}H_{24}O$
		alpha-Eudesmol (222.37)	$C_{10}H_{16}$
		beta-Eudesmol (222.37)	$C_{10}H_{16}$
		gamma-Eudesmol (222.37)	$C_{15}H_{26}O$
		alpha-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		(-)-beta-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		beta-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Limonene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		3-Carene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		cis-beta-Ocimene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Citronellol (156.26 g/mol)	$C_{10}H_{20}O$
		(E)-geraniol (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		(+)-Borneol (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		(-)-Borneol (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		Zingiberenol (222.37 g/mol)	$C_{15}H_{26}O$
		(R)-(-)-alpha-Curcumene (202.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}$
		alpha-Guaiene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		(-)-Globulol (222.37 g/mol)	$C_{15}H_{26}O$
		Viridiflorol (222.37 g/mol)	$C_{15}H_{26}O$
		alpha-Gurjunene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		allo-Aromadendrene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		alpha-Panasinsene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		10-epi-gamma-Eudesmol (222.37 g/mol)	$C_{15}H_{26}O$
		2-Carene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
4	Kencur (<i>Kaempferia galangal</i>)	Kaempferide (300.26 g/mol)	$C_{16}H_{12}O_6$
		Kaempferol (286.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_6$
		beta-Phellandrene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Car-3-en-5-one (150.22 g/mol)	$C_{10}H_{14}O$
5	Temulawak (<i>Curcuma zanthorrhiza</i>)	Curcumin (368.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_6$
		Monodemethoxycurcumin (338.4 g/mol)	$C_{20}H_{18}O_5$
6	Lempuyang (<i>Zingiber</i>)	(-)-Camphor (152.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$

	<i>zerumbet</i>	alpha-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		beta-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		3-Carene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Farnesyl pyrophosphate (382.33 g/mol)	$C_{15}H_{28}O_7P_2$
		Camphene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		alpha-Caryophyllene (obsol.) (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		All-trans-squalene (410.7 g/mol)	$C_{30}H_{50}$
		(+)-Humulenol II (220.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}O$
		Zerumbone (218.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O$
		(-)-beta-Caryophyllene epoxide (220.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}O$
		Zerumboneoxide (234.33 g/mol)	$C_{15}H_{24}O_2$
		5-Hydroxyzerumbone (234.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}O_2$
		DMAPP (246.09 g/mol)	$C_5H_{12}O_7P_2$
		8-hydroxy-alpha-humulene (220.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}O$
7	Kapulaga (<i>Elettaria cardamomum</i>)	alpha-Terpinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
8	Temukunci (<i>Boesenbergia rotunda</i>)	(E)-geraniol (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		Dihydrochrysin (256.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_4$
		Sakuranetin (286.28 g/mol)	$C_{16}H_{14}O_5$
		Isopimaric acid (302.5 g/mol)	$C_{20}H_{30}O_2$
		2',6'-Dihydroxy-4'-methoxychalcone (270.28 g/mol)	$C_{16}H_{14}O_4$
		Cardamomin (270.28 g/mol)	$C_{16}H_{14}O_4$
		Flavokawin A (316.3 g/mol)	$C_{18}H_{18}O_5$
		Boesenbergin A (404.5 g/mol)	$C_{26}H_{28}O_4$
		Rubranine (390.5 g/mol)	$C_{25}H_{26}O_4$
		(+)-Panduratin A (406.5 g/mol)	$C_{26}H_{30}O_4$
		(-)-Alpinetin (270.28 g/mol)	$C_{16}H_{14}O_4$
		(2S)-Pinocembrin (256.25 g/mol)	$C_{16}H_{14}O_4$
		5,7-Dihydroxy-8-C-geranylflavanone (392.5 g/mol)	$C_{25}H_{28}O_4$

		(-)-7,4'-Dihydroxy-5-methoxyflavanone (756.7 g/mol)	$C_{16}H_{14}O_5$
		2,4-Dihydroxy-6-phenethylbenzoic acid methyl ester (272.29 g/mol)	$C_{16}H_{16}O_4$
		(+)-Zeylenol (384.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_7$
		Crotopoxide (362.3 g/mol)	$C_{18}H_{18}O_8$
9	Lada (<i>Piper nigrum</i> L.)	(-)-beta-Sitosterol (414.7 g/mol)	$C_{29}H_{50}O$
		Stigmasterol (412.7 g/mol)	$C_{29}H_{48}O$
		Pipnoohine (361.6 g/mol)	$C_{24}H_{43}NO$
		Pipyahyine (383.5 g/mol)	$C_{24}H_{33}NO_3$
		Sarmentine (221.34 g/mol)	$C_{14}H_{23}NO$
		[(2E,4E)-Dodecadienoyl]-pyrrolidine (249.39 g/mol)	$C_{16}H_{27}NO$
		Hexadecanoylpyrrolidine (309.5 g/mol)	$C_{20}H_{39}NO$
		(3beta,5alpha)-Stigmastan-3-ol (416.7 g/mol)	$C_{29}H_{52}O$
10	Kemangi (<i>Ocimum basilicum</i>)	1,8-cineole (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		Espatulanol (220.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}O$
		Methyl jasmonate (224.30 g/mol)	$C_{13}H_{20}O_3$
		Luteolin (286.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_6$
		cis-Sabinene hydrate (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		Menthyl acetate (198.30 g/mol)	$C_{12}H_{22}O_2$
		Genkwanin (284.26 g/mol)	$C_{16}H_{12}O_5$
		Nevadensin (344.3 g/mol)	$C_{18}H_{16}O_7$
		Borneol (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		trans-Citral (152.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		Fenchone (152.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		Acacetin (284.26 g/mol)	$C_{16}H_{12}O_5$
		Ladanein (314.29 g/mol)	$C_{17}H_{14}O_6$
		Salvigenin (328.3 g/mol)	$C_{18}H_{16}O_6$
		Xanthomicrol (344.3 g/mol)	$C_{18}H_{16}O_7$
		Gardenin B (358.3 g/mol)	$C_{19}H_{18}O_7$
		Hirsutrin (464.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{12}$

		Cyanidin (287.24 g/mol)	$C_{15}H_{11}O_6$
		(-)-beta-Caryophyllene epoxide (220.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}O$
		1-Epibicyclosiquiphellandrene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		alpha-Guaiene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		(-)-Globulol (222.37 g/mol)	$C_{15}H_{26}O$
		Ocimol (620.9 g/mol)	$C_{39}H_{56}O_6$
		Cadinol (222.37 g/mol)	$C_{15}H_{28}O$
11	Ketumbar (<i>Coriandrum sativum</i>)	linalool (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		alpha-Terpinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		gamma-Terpinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Platanoside (724.7 g/mol)	$C_{39}H_{32}O_{14}$
		delta-Tocopherol (402.7 g/mol)	$C_{27}H_{46}O_2$
		(+)-Limonene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
12	Seledri (<i>Apium graveolens</i>)	Syringin (372.4 g/mol)	$C_{17}H_{24}O_9$
		Espatulenol (220.35)	$C_{15}H_{24}O$
		alpha-Eudesmol (222.37)	$C_{15}H_{26}O$
		beta-Eudesmol (222.37)	$C_{15}H_{26}O$
		alpha-Thujene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Luteolin (286.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_6$
		alpha-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		beta-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		(+)-Camphor (152.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		Limonene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		3-Carene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		cis-beta-Ocimene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		beta-Myrcene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		alpha-Terpinolene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		trans-beta-Ocimene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		(+)-Catechin (290.27 g/mol)	$C_{15}H_{14}O_6$
		(-)-Epicatechin (290.27 g/mol)	$C_{15}H_{14}O_6$
		Apigenin 7-O-beta-D- glucopyranoside (432.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{10}$
		Apiin (564.5 g/mol)	$C_{26}H_{28}O_{14}$

		Chrysoeriol (300.26 g/mol)	$C_{16}H_{12}O_6$
		beta-Cubebene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		alpha-Ylangene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
13	Jintan (<i>Cuminum cyminum</i>)	alpha-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		beta-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Limonene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Cuminal (148.20 g/mol)	$C_{10}H_{12}O$
		p-Cymene (134.22 g/mol)	$C_{10}H_{14}$
		linalool (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		alpha-Terpinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		gamma-Terpinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		beta-Caryophyllene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		beta-Elemene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		(-)-Carene(-)-3-Carene (272.5 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		alpha-Terpineol (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		Cuminoside A 410.5 g/mol)	$C_{21}H_{30}O_8$
14	Pala (<i>Myristica fragrans</i> Houtt.)	Fragransin D1 (388.5 g/mol)	$C_{22}H_{28}O_6$
		Fragransin D2 (388.5 g/mol)	$C_{22}H_{28}O_6$
		Fragransol A (374.4 g/mol)	$C_{21}H_{26}O_6$
		Fragransol B (374.4 g/mol)	$C_{19}H_{22}O_5$
15	Kemiri (<i>Aleurites moluccana</i>)	Linoleic acid (280.4 g/mol)	$C_{18}H_{32}O_2$
		Palmitic acid (256.42 g/mol)	$C_{16}H_{32}O_2$
16	Kayu manis (<i>Cinnamomum zeylanicum</i>)	linalool (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		beta-Caryophyllene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
17	Illicium verum	Schizandronic acid (454.7 g/mol)	$C_{30}H_{46}O_3$
		Verimol E (318.4 g/mol)	$C_{18}H_{22}O_4$
18	Kluwak (<i>Pangium edule</i>)	Gynocardin (303.26 g/mol)	$C_{12}H_{17}NO_8$
19	Bawang merah (<i>Allium cepa</i>)	Gibberellin A1 (348.4 g/mol)	$C_{19}H_{24}O_6$
		Gibberellin A4 (332.4 g/mol)	$C_{19}H_{24}O_5$
		Gibberellin A9 (316.4 g/mol)	$C_{19}H_{24}O_4$
		Gibberellin A12 (332.4 g/mol)	$C_{20}H_{28}O_4$
		Gibberellin A20 (332.4 g/mol)	$C_{19}H_{24}O_5$
		Gibberellin A24 (346.4 g/mol)	$C_{20}H_{26}O_5$

		Gibberellin A34 (348.4 g/mol)	$C_{19}H_{24}O_6$
		Gibberellin A51 (332.4 g/mol)	$C_{19}H_{24}O_5$
		Dihydroquercetin (304.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_7$
		Lunularin (214.26 g/mol)	$C_{14}H_{14}O_2$
		Kaempferol (286.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_6$
		Quercetin (302.23 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_7$
		Hirsutrin (464.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{12}$
		Quercetin 3-O-L-rhamnoside (448.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{11}$
		Spiraeoside (464.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{12}$
		Quercetin 3-sophoroside-7-glucoside (788.7 g/mol)	$C_{33}H_{40}O_{22}$
		Isorhamnetin 3-O-beta-D-glucopyranoside (478.4 g/mol) Isorhamnetin 3,4'-diglucoside (640.5 g/mol)	$C_{22}H_{22}O_{12}$
		Delphinidin chloride (338.69 g/mol)	$C_{15}H_{11}C_{10}Cl$
20	Bawang putih (<i>Allium sativum</i>)	Luteolin (286.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_6$
		alpha-Pinene ((136.23 g/mol))	$C_{10}H_{16}$
		Limonene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		alpha-Terpinolene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Farnesyl pyrophosphate (382.33 g/mol)	$C_{15}H_{28}O_7P_2$
		(+)-Catechin (290.27 g/mol)	$C_{15}H_{14}O_6$
		(-)-Epicatechin (290.27 g/mol)	$C_{15}H_{14}O_6$
		Hesperidin (610.6 g/mol)	$C_{28}H_{34}O_{15}$
		Naringenin (272.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_5$
		Flavone (222.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_2$
		Myricetin (318.23 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_8$
		Biochanin A (284.26 g/mol)	$C_{16}H_{12}O_5$
		Formononetin (268.26 g/mol)	$C_{16}H_{12}O_4$
		Nerolidol (222.37 g/mol)	$C_{15}H_{26}O$
		All-trans-squalene (410.7 g/mol)	$C_{30}H_{50}$
		Apigenin (270.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_5$

		Kaempferol (286.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_6$
		Quercetin (302.23 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_7$
		Hyperin (464.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{12}$
		Rutin (610.5 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{16}$
		Citral (152.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		1,1-Dimethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene(198.30 g/mol)	$C_{12}H_{22}O_2$
21	Cabai rawit (<i>Capsicum annuum</i>)	Luteolin (286.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_6$
		Dihydroquercetin (304.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_7$
		beta-Citraurin (432.6 g/mol)	$C_{30}H_{40}O_2$
		Geranylgeranyl diphosphate (450.4 g/mol)	$C_{20}H_{36}O_7P_2$
		Lycopene (536.9 g/mol)	$C_{40}H_{56}$
		Neurosporene (538.9 g/mol)	$C_{40}H_{58}$
		15-cis-Phytofluene (542.9 g/mol)	$C_{40}H_{62}$
		beta-Carotene (536.9 g/mol)	$C_{40}H_{56}$
		Canthaxanthin (564.8 g/mol)	$C_{40}H_{52}O_2$
		Zeaxanthin (568.9 g/mol)	$C_{40}H_{56}O_2$
		Ampelopsin (320.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_8$
		(+)-Catechin (290.27 g/mol)	$C_{15}H_{14}O_6$
		Eriodictyol (288.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_6$
		Fustin (288.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_6$
		Hesperetin (302.28 g/mol)	$C_{16}H_{14}O_6$
		Hesperidin (610.6 g/mol)	$C_{28}H_{34}O_{15}$
		Liquiritigenin (256.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_4$
		Naringenin (272.25 g/mol)	$C_{15}H_{12}O_5$
		Naringin (580.5 g/mol)	$C_{27}H_{32}O_{14}$
		Sakuranetin (286.28 g/mol)	$C_{16}H_{14}O_5$
22	Pandan (<i>Pandanus ammaryllifolius</i>)	6E-Pandanamine (317.4 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		Pandamarilactonine E (323.4 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
23	Sereh (<i>Cymbopogon citratus</i>)	Orientin (448.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{11}$
		Swertiajaponin (462.4 g/mol)	$C_{22}H_{22}O_{11}$
		TriacBiochanin A (284.26 g/mol)ontane (422.8 g/mol)	$C_{22}H_{22}O_{11}$
		Genistein (270.24 g/mol)	$C_{15}H_{10}O_5$

Genistein 7-O-glucoside (432.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{10}$
Prunetin (284.26 g/mol)	$C_{16}H_{12}O_5$
trans-Citral (152.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
cis-Citral (152.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
p-Cymene (134.22 g/mol)	$C_{10}H_{14}$
linalool (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
Phytol (296.5 g/mol)	$C_{20}H_{40}O$
Cinaroside (448.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{11}$
Lonicerin (594.5 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{15}$
Astragalin (448.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{11}$
Nicotiflorin (594.5 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{15}$
Hirsutrin (464.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{12}$
Rutin (610.5 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{16}$
Isorhamnetin 3-O-rutinoside (624.5 g/mol)	$C_{22}H_{22}O_{12}$
Genistein 8-C-glucoside (432.4 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{10}$
Carlinoside (580.5 g/mol)	$C_{26}H_{28}O_{15}$
Isorientin 2''-O-rhamnoside (594.5 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{15}$
Perillene (150.22 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
Carveol (152.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
(-)-beta-Caryophyllene epoxide (220.35 g/mol)	$C_{10}H_{14}$
Cassiaoccidentalin B (576.5 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
Heptadecane (240.5 g/mol)	$C_{20}H_{40}O$
Nonadecane (268.5 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{11}$
Octadecane (254.5 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{15}$
Tetracosane (338.7 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{11}$
Citral (152.23 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{15}$
Citronellal (154.25 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{12}$
2-Tridecanone (198.34 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{16}$
Myrtenol (152.23 g/mol)	$C_{22}H_{22}O_{12}$
Myrtanal (152.23 g/mol)	$C_{21}H_{20}O_{10}$

		Photocitral A (152.23 g/mol)	$C_{26}H_{28}O_{15}$
		trans-Carveol (152.23 g/mol)	$C_{27}H_{30}O_{15}$
		alpha-Camphorene (272.5 g/mol)	$C_{10}H_{14}O$
		Cymbopogone (426.7 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		Cymbopogonol (426.7 g/mol)	$C_{15}H_{24}O$
		Gomphrenin III (726.6 g/mol)	$C_{27}H_{28}O_{14}$
		Gomphrenin II (696.6 g/mol)	$C_{17}H_{36}$
		Isogomphrenin II (696.6 g/mol)	$C_{19}H_{40}$
		Isogomphrenin III (726.6 g/mol)	$C_{18}H_{38}$
24	Jeruk purut (<i>Citrus hystrix</i>)	alpha-Thujene (136.23 g/mol)	$C_{24}H_{50}$
		alpha-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		beta-Pinene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		Limonene (136.23 g/mol)	$C_{13}H_{26}O$
		beta-Myrcene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		alpha-Terpinolene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		n-Pentadecane (212.41 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		Indole (117.15 g/mol)	$C_{10}H_{16}O$
		p-Cymene (134.22 g/mol)	$C_{20}H_{32}$
		linalool (154.25 g/mol)	$C_{30}H_{50}O$
		alpha-Terpinene (136.23 g/mol)	$C_{30}H_{50}O$
		alpha-Copaene (204.35 g/mol)	$C_{34}H_{34}N_2O_{16}$
		beta-Bisabolene (204.35 g/mol)	$C_{33}H_{32}N_2O_{15}$
		beta-Elemene (204.35 g/mol)	$C_{33}H_{32}N_2O_{15}$
		(-)-S-Citronellal (154.25 g/mol)	$C_{34}H_{34}N_2O_{16}$
		delta-Elemene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		Calamenene (202.33 g/mol)	$C_{15}H_{22}$
		4(10)-Thujene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		(E)-Ocimene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Citronellal (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$
		2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		alpha-Bergamotene (204.35 g/mol)	$C_{15}H_{24}$
		alpha-Myrcene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Neo-allo-ocimene (136.23 g/mol)	$C_{10}H_{16}$
		Sabinene hydrate (154.25 g/mol)	$C_{10}H_{18}O$

25	Jeruk nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>)	alpha-Thujene (136.23 g/mol)	C ₁₀ H ₁₆
		cis-3-Hexen-1-ol (100.16 g/mol)	C ₆ H ₁₂ O
		alpha-Pinene (136.23 g/mol)	C ₁₀ H ₁₆
		beta-Pinene (136.23 g/mol)	C ₁₀ H ₁₆
		Limonene (136.23 g/mol)	C ₁₀ H ₁₆
		Citronellol (156.26 g/mol)	C ₁₀ H ₂₀ O
		(E)-geraniol (154.25 g/mol)	C ₁₀ H ₁₈ O
		beta-Myrcene (136.23 g/mol)	C ₁₀ H ₁₆
		beta-Nerol (154.25 g/mol)	C ₁₀ H ₁₈ O
		alpha-Terpinolene (136.23 g/mol)	C ₁₀ H ₁₆

Tabel 4.3 Pengelompokan Senyawa Bioaktif tanaman rempah di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara

No.	Golongan Senyawa	Nama Senyawa
1.	Tepenoid	1,8-Cineole Espatulenol p-Coumaric acid Alpha-pinene (R)-(-)-alpha-Curcumene (-)-Curcuphenol (+)-ar-Turmerone beta-Curcumene alpha-Turmerone. Curcarabranol B Curcumadione Curcumenolactone A Curcumenolactone B Curcumenolactone C Curcumenone Furanodiene Zedoalactone B Zedoarofuran Zedoarolide A Zedoarolide B Isofuranodiene 12-hydroxycurcumenol

		beta-Elemenone 5-epi-Curzerenone Curcumanolide B Curcolonol Zedoalactone C Eudesmol beta-Phellandrene Car-3-en-5-one 3-Carene (E)-geraniol Sakuranetin 2',6'-Dihydroxy-4'-methoxychalcone Cardamomin Boesenbergin A (-)-beta-Sitosterol Stigmasterol Pipnoohine Pipyahyine Sarmentine [(2E,4E)-Dodecadienoyl]-pyrrolidine Hexadecanoylpyrrolidine Gardenin B (-)-beta-Caryophyllene epoxide alpha-Guaiene linalool alpha-Terpinene gamma-Terpinene Platanoside delta-Tocopherol (+)-Limonene Apigenin 7-O-beta-D-glucopyranoside p-Cymene Fragnasol B Linalool beta-Caryophyllene Gibberellin A1 Gibberellin A4
--	--	---

		<p>Gibberellin A9 Gibberellin A12 Gibberellin A20 Gibberellin A24 Gibberellin A34 Gibberellin A51 1,1-Dimethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene Citronellol Beta-Carotene Beta-Cryptoxanthin Pandamarilactonine E alpha-Thujene beta-Nerol alpha-Terpinolene beta-Myrcene Sabinene hydrate alpha-Bergamotene n-Pentadecane Indole p-Cymene linalool alpha-Terpinene alpha-Copaene beta-Bisabolene beta-Elemene (-)-S-Citronellal delta-Elemene Calamenene 4(10)-Thujene (E)-Ocimene Citronellal 2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene</p>
2.	Flavanoid	<p>Cinnamaldehyde Stigmasterol beta-Sesquiphellandrene. Galangin</p>

		<p>Quercetin</p> <p>5-Hydroxy-3,7,3',4'-tetramethoxyflavone</p> <p>3,5,7,3',4'-Pentamethoxyflavone</p> <p>(+)-Dihydrokaempferol</p> <p>3,5,7,4'-Tetramethoxyflavone.</p> <p>Kaempferide</p> <p>Kaempferol</p> <p>Dihydrochrysin</p> <p>(-)-Alpinetin</p> <p>(2S)-Pinocembrin</p> <p>Luteolin</p> <p>Acacetin</p> <p>Ladanein</p> <p>Salvigenin</p> <p>Xanthomicrol</p> <p>Dihydroquercetin</p> <p>Quercetin 3-O-L-rhamnoside</p> <p>Spiraeoside</p> <p>Isorhamnetin 3-O-beta-D-glucopyranoside</p> <p>Delphinidin chloride</p> <p>(+)-Catechin</p> <p>(-)-Epicatechin</p> <p>Formononetin</p> <p>Rutin</p> <p>Hyperlin</p> <p>Apigenin</p> <p>Ampelopsin</p> <p>Eriodictyol</p> <p>Fustin</p> <p>Hesperidin</p> <p>Liquiritigenin</p> <p>Naringenin</p> <p>Naringin</p> <p>Sakuranetin</p> <p>Genistein</p> <p>Genistein 7-O-glucoside</p> <p>Biochanin A</p>
--	--	---

		Prunetin
--	--	----------

Berdasarkan hasil skrining pada 22 spesies berpotensi imunostimulan dari 25 spesies tumbuhan obat tipe *Herbaceus* yang digunakan oleh masyarakat Sukamaju dalam pengobatan tradisional diperoleh 134 senyawa bioaktif yang berasal dari beberapa golongan senyawa seperti yang tertera pada tabel 4.3. Adapun hasil skrining fitokimia disasikan pada tabel 4.3, maka disimpulkan bahwa persentase terbanyak yang didapatkan yaitu dari senyawa golongan Terpenoid berjumlah 79 senyawa (79%), flavonoid berjumlah 42 senyawa (42%) dan senyawa lainnya berjumlah 13 senyawa (13%) seperti yang dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 4.4 Diagram Persentase Jumlah Senyawa Berdasarkan Kelompok Senyawa yang Diperoleh dari Hasil Skrining pada Situs PubChem

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari informan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara mengenai tingkat


pemahaman dan penerimaan masyarakat mengenai penggunaan tanaman sebagai upaya pemanfaatan diperoleh hasil bahwa penerimaan dan pemahaman masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan responden. Adapun persentase terbanyak yaitu pada responden yang tidak bersekolah berjumlah 46 orang (46%), SD berjumlah 18 orang (18%), SMP berjumlah 13 orang (13%), SMA berjumlah 15 orang (15%) dan S1 berjumlah 8 orang (8%). Seperti yang dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 4.5 Diagram Persentase Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara Berdasarkan Pendidikan Responden

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari informan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara mengenai tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara mengenai penggunaan tanaman sebagai pemanfaatan diperoleh hasil bahwa penerimaan dan pemahaman masyarakat


dipengaruhi oleh faktor pekerjaan responden. Adapun persentase terbanyak yaitu dari responden lanjut usia berjumlah 42 orang (42%) dan usia dewasa berjumlah 58 orang (58%) seperti yang dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 4.6 Diagram Persentase Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara Berdasarkan Usia Responden

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari informan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara mengenai tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat tentang penggunaan tanaman sebagai pemanfaatan diperoleh hasil bahwa penerimaan dan pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh faktor pekerjaan responden. Adapun persentase terbanyak yaitu petani berjumlah 20 orang (20%), peternak berjumlah 8 orang (8%), pegawai kesehatan berjumlah 7 orang (7%), pedagang berjumlah 29 orang (29%), tukang jahit berjumlah 3 orang (3%), tukang urut berjumlah 19 orang (19%), guru berjumlah 5 orang (5%), buruh harian berjumlah 7 orang (7%), dan satpam

berjumlah 2 orang (2%) seperti yang dapat dilihat pada diagram berikut (Gambar 8).



Gambar 4.7 Diagram Persentase Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara Berdasarkan Pekerjaan Responden

B. Pembahasan

Masyarakat memanfaatkan tanaman rempah-rempah sebagai bagian dari adat istiadat yang diwariskan nenek moyang sebagai salah satu upaya untuk memerangi penggunaan tanaman rempah sebagai bahan bumbu masakan. Pelestarian tanaman terus dilakukan masyarakat saat ini berdasarkan temuan uji coba yang dilakukan masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan penggunaan bumbu masak pada tanaman yang terdapat disekitarnya. Adapun kemampuannya dalam mengolah dan menggunakan tanaman rempah-rempah didapatkan secara langsung melalui mulut ke mulut atau dengan melalui ilham/mimpi kepada anggota keluarga atau orang tertentu yang diyakini dan dipercaya memiliki

kemampuan dan keahlian dalam melestarikan dan menjaga warisan pengetahuan tersebut.

Masyarakat di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara memanfaatkan 25 varietas tanaman rempah berbeda dari 14 famili berbeda sebagai bumbu masakan tradisional, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Temuan tersebut disajikan pada (Tabel 4.1) yang berisi daftar keanekaragaman jenis tanaman rempah dari berbagai famili, dan (Gambar 4.2) yang menunjukkan jumlah spesies dari setiap famili. Semua spesies tumbuhan yang dianggap memiliki rasa tertentu pada makanan dianggap rempah-rempah.

1. Kunyit (*Curcuma longa*)

Tanaman tahunan kunyit (*Curcuma longa*), memiliki nama lokal kunyit bulawan, tingginya mencapai 40–100 cm. Batang (*caulis*) bersifat semu berbentuk bulat (*teres*), tumbuh tegak lurus (*erectus*), berwarna hijau kekuningan, dan tersusun atas pelepah daun (*vagina*). Daun (*folium*) meliputi daun tunggal dengan bangun lanset (*lanceolatus*) panjang mencapai 10–40 cm, tekstur permukaan daun kasar (*hispidus*), pertulangan daun menyirip (*penninervis*) berwarna hijau pucat, ujung daun runcing (*apex*), pangkal daun *acutus*, dan daun merupakan jenis daun lengkap karena memiliki semua bagian-bagian daun. Bunga majemuk (*inflorescentia*), pilosus dan bersisik serta tumbuh di cabang batang semu, warnanya putih atau kekuningan, dengan mahkota bunga (*corolla*) berwarna putih. Rimpang primer, atau umbi kunyit, dan pucuk atau cabang rimpang membentuk elips. Banyak pucuk pendek, lurus atau melengkung yang tumbuh secara diagonal, horizontal, atau melengkung cenderung tumbuh melebihi

rimpang utama. Kulit rimpang kunyit berwarna kecoklatan atau hampir kuning kehitaman. Daging rimpangnya berwarna kuning sampai jingga kekuningan, mempunyai bau dan rasa yang menyengat, agak pahit dan pedas. Rimpang ranting kunyit akan terus tumbuh hingga menghasilkan cabang baru dan batang semu hingga membentuk rumpun. Akar serabut (*radix adventicia*), yang berwarna coklat muda, membentuk sistem akar (Tjitrosoepomo, 2013).

Adapun klasifikasi tanaman kunyit (*Curcuma longa*) yaitu:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Liliopsida
Ordo	: Zingiberales
Familia	: <i>Zingiberaceae</i>
Genus	: <i>Curcuma</i>
Species	: <i>Curcuma longa</i> (Stennis, 2013).

Tanaman kunyit yang juga dikenal dengan nama “Kunyit Bulawan” ini memiliki beragam kandungan kimia bermanfaat yang dapat dimanfaatkan secara medis. Sama halnya dengan warga Desa Sukamaju, Pilek, rematik, hidung tersumbat, diare, disentri, kadar lemak darah berlebih (*hyperlipidemia*), nyeri dada, asma, kembung pada perut dan dada (*dispepsia*), mati rasa pada bahu, dan menstruasi hanyalah beberapa penyakit yang bisa terjadi. diobati dengan kunyit. tidak teratur, sakit perut pasca melahirkan, radang hidung, telinga, gusi, dan rahim, keputihan, radang usus buntu, radang amandel, hepatitis, batu empedu

(*cholethiasis*), darah tinggi, sakit maag atau sariawan, penambah stamina, dan menghilangkan bau badan hanyalah beberapa kondisi yang dapat diobati.

Rimpang mengandung 2-5% minyak atsiri, termasuk turmeron, zingiberene, phellandrene, sesquiterpene alkohol, dan borneol, serta 45–55% pati, 8% protein, 10% kurkumin (pewarna kuning), desmetoxycurcumin, bidesmethoxycurcumin, tanin, resin, vitamin C, dan mineral seperti zat besi, fosfor, dan kalsium. Kunyit adalah bumbu yang ditambahkan ke berbagai makanan dan minuman, memberikan warna kuning yang menyenangkan. Sektor kosmetik, makanan, farmasi, dan konveksi memanfaatkannya sebagai pewarna. Meski digunakan sebagai pewarna pakaian, namun warnanya cepat memudar. Kunyit merupakan salah satu unsur mentah yang penting dalam produksi obat herbal.

2. Kunyit putih (*Curcuma zedoaria*)

Kunyit putih (*Curcuma zedoaria*) dikenal dengan nama daerah (Kunyi mabusa) termasuk tanaman tahunan (*perennial*) dengan pola tumbuh bercabang dengan tinggi tanaman mencapai 40-80 cm atau lebih. Batang (*caulis*) termasuk batang semu, tumbuh tegak lurus (*erectus*), bulat (*teres*) dan terasa agak lunak (*herbaceus*) karena tersusun dari pelepah daun (*vagina*) yang saling menutup satu sama lain. Daun (*folium*) termasuk daun lengkap tersusun atas pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Daun tunggal (*folium*) berbentuk bulat telur (*ovatus*) memanjang, bagian tepi daun (*margo*) rata (*integer*), ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*) dan pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*) dan memiliki tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*) berwarna

keunguan serta pada bagian lainnya berwarna hijau. Kunyit putih (*Curcuma zedoaria*) memiliki bunga majemuk yang berbentuk corong yang muncul pada bagian batangnya. Mahkota bunga (*corolla*) berwarna kuning muda atau juga hijau keputihan yang memiliki panjang 2,5 cm. Rimpang (*rhizoma*) merupakan umbi berbentuk lingkaran yang bertunas dari umbi utama dan membelah menjadi rumpun. Rimpang muda memiliki daging berwarna kuning muda, sedangkan rimpang tua memiliki daging berwarna oranye terang dengan sedikit warna kuning. Rimpangnya mempunyai rasa sedikit pahit dan harum. Sistem akar terdiri dari akar serabut seperti benang (*radix adventicia*) yang menempel pada rimpang. Akar (*radix*) berukuran panjang sekitar 22,50 cm dan berwarna coklat muda.

Adapun klasifikasi tanaman kunyit putih (*Curcuma zedoaria*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Tracheophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Ordo : Zingiberales
 Familia : Zingiberaceae
 Genus : *Curcuma*
 Species : *Curcuma zedoaria*

Kunyit putih (Kunyi mabusa) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Dapat digunakan untuk mengobati penghangat badan, tonik, penambah nafsu makan, obat luka, limpa, epilepsi, cacingan, wasir, menghilangkan bau mulut, obat pencahar, obat perangsang, dan sakit gigi, sangat mirip dengan masyarakat desa Sukamaju. Kunyit putih menurut

(Evizal, 2013) mengandung 55,5% pati, 0,9% minyak atsiri, dan 3,8% serat. Senyawa *cineole*, bersama dengan *camphene*, *zingiberene*, *borneol*, *camphor*, *curcumin*, *zedoarin*, dan resin, terdapat dalam minyak atsiri. Curcuma zedoaria mengandung 1,8 cineol (18,5%), cymene (18,42%), dan α -phellandrene (14,9%) minyak atsiri. Rimpang kunyit putih ditemukan mengandung *cyclopropanosesquiterpene*, *curcumenone*, dan dua *spirolactones* yang disebut curcumanolide A dan curcumanolide B. Tunas belum menghasilkan *C. zedoaria* mengandung (+)-germacrone-4,5-epoxide. Kunyit putih digunakan dalam pengobatan kanker serviks karena dianggap efektif antara lain sebagai antioksidan dan antikanker. Perubahan kromosom resisten terhadap efek antimutagenik dari ekstrak air *C. zedoaria*.

1. Jahe (*Zingiber officinale*)

Jahe (*Zingiber officinale*) dikenal dengan nama daerah (Passalalia) merupakan tanaman tahunan (*perennial*) yang tumbuh dengan tinggi 30 cm- 1 m. Batang (*caulis*) termasuk batang semu, tidak bercabang, tumbuh batang tegak lurus (*erectus*), bentuk batang bulat (*teres*) yang tersusun atas lembaran pelepah daun (*vagina*) berwarna hijau kemerahan. Daun (*folium*) berwarna hijau tua dikelompokkan dalam pola bergantian. Berbeda dengan bagian bawah, permukaan daun bagian atas berwarna lebih terang, mempunyai urat lanset (*penninervis*), tepi rata (*integra*), ujung daun (*apex*), dan pangkal daun runcing (*acutus*). Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk yang tampak seperti malai dan cukup berduri, tumbuh di tanah berbentuk batang ramping atau lonjong. Rimpang (*rhizoma*) umumnya mempunyai bentuk yang montok, pipih, dan seperti buku. Daging rimpangnya

dilapisi kulit agak tebal sehingga mudah dikupas. Rimpangnya berwarna merah sampai jingga muda, berbau rempah-rempah yang menyengat, dan rasanya sangat pedas. Akar berserat (*radix adventicia*), yang warnanya berkisar dari putih hingga coklat muda dan berbentuk bulat, tipis, dan berserat, merupakan bagian dari sistem akar.

Adapun klasifikasi tanaman jahe (*Zingiber officinale*) yaitu:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Monocotyledoneae
Ordo	: Zingiberales
Familia	: <i>Zingiberaceae</i>
Genus	: <i>Zingiber</i>
Species	: <i>Zingiber officinale</i>

Tanaman jahe (*Zingiber officinale*) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju, Batuk, flu, rematik pada persendian, sakit kepala, kolik pada bagal, dan penyakit lainnya semuanya bisa diobati dengan jahe sebagai obatnya. Juga menyembuhkan osteoarthritis, menurunkan kadar gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, dan menghindari masalah pencernaan. Kram menstruasi tidak terlalu menyakitkan, kanker (terutama kanker ovarium, payudara, dan pankreas) dapat dicegah, fungsi kognitif ditingkatkan, dan risiko tertular berbagai penyakit menular berkurang.

Menurut Kaban dkk. (2016), berbagai kelas bahan kimia metabolit sekunder, seperti alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid, dan saponin, terdapat dalam jahe. Flavonoid terdapat pada rimpang jahe merah, menurut Herawati dan Saptarini (2019) ditemukan kandungan flavonoid sekitar 0,0068% dan flavonoid yang ditemukan adalah 7,4'-dihidroksiflavon. Evizal (2013) menegaskan bahwa molekul zingiberene atau zingiberol yang terdapat pada rimpang jahe mengandung minyak atsiri. Gingerol, shogaol, dan resin merupakan zat yang menyebabkan rasa pedas. efek terkait obat Afrodisiak adalah zat yang meningkatkan keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Istilah lain untuk stimulan termasuk stimulan karminatif, yg mengeluarkan keringat, dan stimulan kentut.

2. Lengkuas (*Alpinia galangal*)

Lengkuas (*Alpinia galanga*) dikenal dengan nama daerah (Likku) merupakan tanaman tahunan (*perennial*) berhabitus tera atau herba (*herbaceous*) yang tumbuh dengan merumpun dan juga sangat rapat dengan tinggi tanaman mampu mencapai 2 meter dengan daun yang rimbun dan berukuran panjang. Tanaman lengkuas (*Alpinia galanga*) memiliki batang yang tumbuh dengan tegak (*erectus*), batang semu (*caulis*) berbentuk bulat (*teres*), terdiri dari beberapa pelepah daun dengan warna yang bervariasi dari hijau muda hingga hijau tua. Dari pangkal bawah hingga pangkal atas, batang muda (*caulis*) ini akan muncul tunas-tunas segar. Daun (*folium*) terdiri dari satu helai daun (*Folium simplex*), bertangkai pendek, berwarna hijau, tersusun berselang-seling, berbentuk lanset memanjang (*lanceolatus*), ujung daun (*apex*) dan pangkal daun (*basal*) berbentuk

acutus, tepi daun (*margo*) rata (*integer*), dan mempunyai jenis duri daun menyirip (*penninervis*) dengan warna daun hijau. Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk (*inflorescentia*), yang memiliki bunga berbentuk lonceng dengan wangi yang manis, berwarna putih kehijauan atau putih kekuningan, dan bertempat di gagang panjang di ujung batang. Buah buni yang berbentuk bulat dan keras penyusun buah tanaman ini (*fructus*) berwarna hijau saat muda dan merah kehitaman saat tua. Rimpang (*rhizoma*) berdaging, tebal, bercabang, dan berbentuk silinder. Seiring bertambahnya usia rimpang, bagian dalam rimpang menjadi berwarna putih kekuningan dan berserat. Bagian luar rimpang berwarna agak coklat kemerahan dengan sisik.

Adapun klasifikasi tanaman lengkuas (*Alpinia galanga*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Liliopsida
 Ordo : Zingiberales
 Familia : *Zingiberaceae*
 Genus : *Alpinia*
 Species : *Alpinia galanga* L. Swartz

Tanaman lengkuas (Likku) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Rimpang tanaman lengkuas, seperti di Kecamatan Sukamaju, dimanfaatkan untuk melancarkan haid, mengobati sariawan parah, sakit tenggorokan, nyeri otot, masuk angin, demam, diare, gangguan pencernaan, atau kolik.

Buah-buahan mengandung acetoxychavicol, acetoxyeugenol, caryophyllene oksida, caryophyllenol, pentadecane, kaempferide, galangan kapal, dan dimethoxyflavone, menurut pernyataan Evizal Rusdi tahun 2013. Minyak atsiri yang terdapat pada rimpang antara lain cineol, methylcinnamate, camphor, pinene, galangin, eugenol, camphor, galangol, sesquiterpene, cadinen, dan cadelen. Analgesik, karminatif, diuretik, antijamur, stimulan, afrodisiak, dan stomach adalah beberapa efek farmakologisnya. Fraksi metanol rimpang lengkuas dan minyak atsiri telah ditunjukkan dalam penelitian Yuharmen et al. (2012) memiliki kemampuan menekan pertumbuhan berbagai bakteri dan jamur. Lengkuas mengandung sifat antibakteri, sitotoksik, larvasida, antioksidan, dan vasodilator. Lengkuas mengandung triterpenoid/steroid, tanin, flavonoid, alkaloid, dan saponin sebagai salah satu metabolit sekundernya (Nopitasari, 2017).

3. Kencur (*Kaempferia galanga*)

Kencur (*Kaempferia galanga*) dikenal dengan nama daerah (Sa'ku) merupakan tanaman herba tahunan (*perennial*) yang memiliki batang pendek dan tumbuh dalam rumpun. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal, berwarna hijau, memiliki bentuk daun bulat telur (*ovatus*), ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*) dan tepi daun (*margo*) berombak (*repandus*). Tanaman Kencur (*Kaempferia galanga*) tumbuh mendatar, hampir rata dengan permukaan. Tanaman kencur memiliki jumlah daun maksimal 2-3 helai yang tersusun berpola saling berhadapan, dengan pelepah daun berdaging dan tersembunyi di dalam tanah. Permukaan daun bagian atas tidak mempunyai bulu, sedangkan bagian bawah mempunyai bulu-bulu halus. Bunga (*flos*) terdiri

dari satu bunga berbentuk terompet dengan benang sari kuning, putik berwarna putih agak keunguan, dan mahkota bunga (*corolla*) yang terdiri dari empat hingga dua belas kelopak berwarna putih. Mengenai rimpang (*rhizome*) berukuran kecil, berbentuk seperti jari tumpul, dan berwarna coklat. Kulit rimpangnya berwarna coklat mengkilat, dan baunya khas. Bagian dalam kencur berwarna putih dan teksturnya seperti daging dan tidak berserat. Akar serabut (*radix adventicia*) dengan rona agak coklat kekuningan merupakan bagian dari sistem perakaran.

Adapun klasifikasi tanaman kencur (*Kaempferia galanga*) yaitu:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Liliopsida
Ordo	: Zingiberales
Familia	: <i>Zingiberaceae</i>
Genus	: <i>Kaempferia</i>
Species	: <i>Kaempferia galanga</i>

Tanaman kencur (Sa'ku) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Karena rimpangnya antara lain mengandung saponin, flavonoid, fenol, dan minyak atsiri, maka tanaman kencur dimanfaatkan sebagai obat penambah nafsu makan, obat batuk, masuk angin, dan sakit perut, seperti halnya di Kecamatan Sukamaju. (Syamsuhidayat dan Johny, 2010). Metabolit sekunder suatu tumbuhan antara lain bahan kimia safonin, flavanoid, fenol, dan minyak atsiri yang terdapat pada kencur (Indrayanto, 2011).

6. Temulawak (*Curcuma zanthorrhiza*)

Temulawak (*Curcuma zanthorrhiza*) dikenal dengan nama daerah (Kunyi tammu) merupakan tanaman terna tahunan (*perennial*) yang tumbuh dengan tinggi batangnya mencapai lebih dari 1 m. Batang (*caulis*) termasuk batang semu dengan bentuk batang bulat (*teres*) berwarna hijau atau coklat gelap. Daun (*folium*) memiliki bentuk bulat telur, ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*) dan tepi daun (*margo*) rata (*integer*), tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*), sifat permukaan daun dengan warna daun berwarna keunguan pada bagian tengah daun dan pada bagian lainnya berwarna kehijauan. Bunga (*flos*) termasuk tipe bunga majemuk bentuk bulir, memiliki mahkota bunga (*corolla*) berbentuk tabung dengan kelopak bunga (*calys*) berwarna putih. Dua bentuk rimpang (*rhizoma*) yang berbeda adalah rimpang cabang dan rimpang utama (*empu*). Rimpang utama berwarna oranye kecokelatan di bagian dalam dan kuning tua di bagian luar. Rimpang utama dibelah menjadi rimpang cabang yang lebih kecil dan berwarna lebih terang. Akar rimpang (*radix*) berbentuk persis, bercabang banyak, dan berwarna hijau tua. Ujung akar temulawak berbentuk lebar.

Adapun klasifikasi tanaman temulawak (*Curcuma zanthorrhiza*) yaitu:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Monocotyledonae
Ordo	: Zingiberales
Familia	: <i>Zingiberaceae</i>

Genus : *Curcuma*

Species : *Curcuma xanthorrhiza*

Temulawak (Kunyi tammu) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di Kecamatan Sukamaju, jahe dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, antara lain demam, penyegar badan, penyakit kuning, nyeri, sembelit, nafsu makan hilang, obat setelah melahirkan/menstruasi, sembelit, jerawat, dan bau keringat. Ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan aliran ASI. Menurut (Evizal 2013), rimpang jahe kaya akan pati (60%) dan antioksidan kurkumin (1,6-2,2%) dan minyak atsiri (1,5%). Phelandren, kapur barus, turmerol, borneol, sineal, dan xanthorrhizol merupakan komponen minyak atsiri. Kombinasi xanthorrhizol dan kurkumin diyakini memiliki potensi terapeutik.

7. Temu kunci (*Boesenbergia rotunda*)

Temu kunci (*Boesenbergia rotunda*) dikenal dengan nama daerah (Kunci) merupakan tanaman tera atau herba (*herbaceus*) tahunan (*perennial*) dengan tinggi 30-80 cm. Batang aslinya (*caulis*) berupa rimpang berwarna kuning kecoklatan, aromatik, lebih tebal yang tumbuh di bawah tanah. Batang yang berada di atas tanah merupakan batang semu. Daun tegak (*folium*) tanaman ini seluruhnya berjumlah 3–7 helai, dan bagian pangkalnya ditutupi oleh pelepah daun berwarna kemerahan (*vagina*), memiliki bentuk daun yaitu bulat telur (*ovatus*), ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*), tepi daun (*margo*) rata (*integer*), sifat permukaan daun halus tetapi pada bagian bawah daunnya sedikit berambut, memiliki tipe pertulangan daun menyirip

(*penninervis*), tangkai daunnya beralur tetapi tidak berambut dengan daunnya berwarna hijau muda. Bunga (*flos*) tanaman ini berupa susunan bulir tidak terbatas, memiliki kelopak bunga, mahkota bunga (*corolla*) berbentuk tabung berwarna merah muda atau putih-kuning, memiliki benang sari, kepala sari dan putik. Rimpang bawah tanah (*rhizoma*) berdiameter hingga 2 cm, berwarna kuning cerah di bagian dalam dan kuning kecokelatan di bagian luar. Akar (*radix*) yang berdaging dan menghasilkan umbi-umbian, mempunyai bau yang khas.

Adapun klasifikasi tanaman Temu kunci (*Boesenbergia rotunda*) yaitu:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Liliopsida
Ordo	: Zingiberales
Familia	: Zingiberaceae
Genus	: <i>Boesenbergia rotunda</i>
Species	: <i>Boesenbergia rotunda</i>

Tanaman temukunci (Kunci) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Temu Kunci digunakan sebagai obat tradisional, seperti di Kecamatan Sukamaju, untuk mengobati kondisi seperti diare dan sakit lambung (Chahyadi et al., 2014). Berdasarkan skrining fitokimia yang dilakukan (Jitvaropas et al., 2012), ditemukan bahwa ekstrak jahe mengandung sejumlah besar bahan kimia flavonoid, alkaloid, dan fenolik. Kalkon, flavanon, dan flavon merupakan flavonoid utama yang terdapat pada ekstrak temu Kunci (Chahyadi et al., 2014). Zat-zat ini memiliki aktivitas antibakteri yang

tinggi dan potensi besar untuk memberikan pertahanan antioksidan terhadap kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. (Chahyadi et al., 2014; Jitvaropas et al., 2012).

8. Cabai rawit (*Capsicum annuum*)

Cabai rawit (*Capsicum annuum*) dikenal dengan nama daerah (Lada londong) merupakan tanaman semusim berhabitus perdu dengan tinggi tanaman sekitar 20-28 cm. Batang (*caulis*) utama tanaman ini tumbuh tegak, berkayu (*lignosus*), berbuku-buku, memiliki tipe percabangan menggarpu dengan jumlah cabang yang banyak berwarna hijau dan berambut halus pada cabang mudah. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal, letak daun tersebar, memiliki bentuk daun bulat telur, ujung daun (*apex*) meruncing (*acuminatus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*), tepi daun (*margo*) rata (*integer*), tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*), daun berwarna hijau tua pada bagian permukaan atas dan berwarna hijau muda pada bagian permukaan bawah daun. Bunga (*flos*) mengandung bunga lengkap, yang terdiri dari putik (*stigma*), benang sari (*semen*), mahkota bunga (*corolla*), dan kelopak bunga (*calyx*). Karena benang sari dan putik berada pada tangkai yang sama, maka kepala putik berbentuk terompet, berwarna putih, dan berwarna kuning kehijauan. Hal ini memberikan bunga penampilan berkelamin dua. Satu bunga berisi enam benang sari dan satu putik, masing-masing berwarna putih dan memiliki kepala sari berwarna biru ungu. Buah (*fructus*) bertangkai pendek, berbentuk kerucut memanjang, permukaan halus mengkilat, ujung lurus dan meruncing, serta didalamnya terdapat ari-ari (tempat biji-biji saling bertautan

secara terstruktur). Ia juga memiliki rasa pedas dan memiliki plasenta di dalamnya.

Adapun klasifikasi tanaman cabai rawit (*Capsicum frutescens*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Ordo : Solanes
 Familia : Solanaceae
 Genus : Capsicum
 Species : *Capsicum frutescens*

Tanaman cabai rawit (*Lada londong*) banyak digunakan masyarakat sukamaju untuk mengobati penyakit kulit, serta mengobati migrain (sakit kepala sebelah). Rematik, gangguan lambung, dan masuk angin semuanya dapat diobati secara eksternal dengan cabai rawit (Tjitrosoepomo, 2000). Cabai rawit memiliki beberapa keunggulan selain digunakan sebagai penghias taman, kata Hapshoh dkk. (2016), terutama bila digunakan sebagai bumbu makanan untuk menambah sensasi pedas. Selain itu, buah dari tanaman ini membantu meningkatkan nafsu makan, menguatkan tangan dan kaki yang lemah, serta meredakan hidung tersumbat akibat sinusitis. Cabai rawit juga memiliki efek antimikroba yang menjadi keunggulannya. Menurut Jawetz dkk. (2008), cabai rawit telah lama digunakan sebagai pengawet tradisional untuk mencegah kontaminasi bakteri pada makanan. Selain itu, ekstrak cabai rawit menunjukkan tindakan antibakteri terhadap bakteri Gram positif *Staphylococcus aureus*, menurut temuan penelitian

Fatmawati dkk. (2019). Buah cabai rawit diketahui mengandung sejumlah zat kimia, antara lain alkaloid capsaicin, capsanthin, karotenoid, damar, dan minyak atsiri. Selain itu, cabai rawit merupakan sumber vitamin A, B, dan C yang baik. Dianggap memiliki kualitas antimikroba adalah komponen capsaicin yang terdapat pada buah cabai rawit. Ekstrak etanol cabai rawit diketahui mengandung komponen flavonoid dan steroid atau terpenoid yang berfungsi sebagai antibakteri, menurut penelitian Elmitra et al., yang dipublikasikan pada tahun 2019.

9. Kemangi (*Ocimum basilicum*)

Tanaman kemangi (*Ocimum basilicum*) dikenal dengan nama daerah (Cemangi) merupakan tanaman tahunan (*perennial*) berhabitus semak dengan arah tumbuh tegak dengan memiliki banyak cabang. Tanaman ini memiliki batang pokok yang tidak jelas dengan bentuk batang bulat (*teres*), berkayu (*lignosus*), berwarna hijau kecoklatan dan sifat permukaan batang kasar. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal dengan letak daun berhadapan tersusun dari bawah keatas, memiliki bentuk daun bulat telur, ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*). Tepi daun (*margo*) rata (*integer*), tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*), sifat permukaan daun berambut halus dan berwarna kehijauan. Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk berkelamin ganda (*hermaphroditus*) berwarna putih dan berbau harum yang tersusun pada tangkai bunga berbentuk menegak. Ciri-cirinya yang berhubungan dengan buah antara lain kelopak berwarna hijau atau ungu, mahkota (*corolla*) putih dengan benang sari disisipkan di pangkal mahkota, dan kepala putik bercabang tetapi berbeda.

Ujung buah (*fructus*) berbentuk lingkaran berbentuk kait, berbentuk kotak tegak, cekung, berwarna coklat tua. Tiap buah mempunyai empat biji (*semen*), berukuran kecil, keras, dan berwarna coklat tua. Sistem akar primer berwarna putih dan disebut akar tunggang.

Adapun klasifikasi tanaman kemangi (*Ocimum basilicum*) yaitu:

Regnum : plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Ordo : Lamiales
 Familia : Lamiaceae
 Genus : *Ocimum*
 Species : *Ocimum basilicum*

Kemangi (Cemangi) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai obat. Mirip dengan Kecamatan Sukamaju, tanaman ini secara tradisional digunakan untuk mengobati sakit kepala, diare, sembelit, kutil, cacingan, kerusakan ginjal, penyakit kardiovaskular, dan menghilangkan stres (Maggio, 2016). Daun kemangi merupakan komponen tanaman yang paling sering dimanfaatkan (Nurmashita, 2015). Karena wanginya yang kuat, daun kemangi dapat digunakan untuk memberi rasa dan mengharumkan makanan, minuman, rempah-rempah, dan produk perawatan mulut (Abbasy, 2015). Karena sifatnya yang wangi, kemangi kadang disebut sebagai tanaman aromatik yang sering dimanfaatkan, khususnya untuk penyedap

masakan (Silva, 2015). Salah satu tanaman yang mampu membunuh kuman adalah kemangi. Menurut Elansary (2016), kemangi memiliki sifat antioksidan, antibakteri, dan antijamur serta sifat anti penuaan, antiinflamasi, dan antikarsinogenik (Guez, 2017).

Kantong Kemangi Konstituen utama minyak atsiri kemangi adalah linalool, yang kemudian diikuti oleh cineole, geraniol, germacrene D, cadinene, ecadinol, dan methyl chavicol. Selain itu mengandung Pinene, Elemene, Bulnesene, Sabinene, Bicyclogermacrene, Limonene, Fenchone, Camphor, Terpeneol, Copaene, Caryophyllene, Geranyl acetate, Bergamotene, Guaiene, Muurola-3,5-diene, Terpinen, Humulene, Ocimene, Methyl eugenol, Myrcene, Calamenene, di-epi-Cubenol, α -Cadinol (Evizal, 2013). Vitamin A dan C, serta mineral termasuk kalsium, fosfor, zat besi, dan belerang, semuanya terdapat dalam daun kemangi. Eugenol, cineol, dan metil chavicol adalah beberapa minyak atsiri yang ditemukan di daun dan batang. Bijinya mengandung pliferol, flavonoid, dan saponin (Silva, 2015).

10. Kayu Manis (*Cinnamomum burmanni*)

Kayu manis (*Cinnamomum burmanni*) dikenal dengan nama daerah (Kaju canning) merupakan tanaman berhabitus pohon dengan tinggi tanaman 5-15 m. Batang (*caulis*) termasuk batang berkayu (*lignosus*) berwarna kecoklatan, bercabang, memiliki bentuk batang bulat (*teres*), sifat permukaan batang halus dan memiliki kulit batang tebal yang memiliki bau khas. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal, kaku seperti kulit dengan letak daun berseling, bentuk daun lanset (*lanceolatus*), ujung daun (*apex*) dan pangkal daun (*basis*) runcing (*acutus*), tepi

daun (*margo*) rata (*integer*), sifat permukaan atas daun licin (*leavis*) dan pada permukaan bawah daun berwarna keabu-abuan, memiliki tipe pertulangan daun melengkung (*cervinervis*). Adapun daun yang masih muda berwarna merah pucat sedangkan daun yang sudah tua berwarna hijau. Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk yang memiliki kelamin sempurna (*flos completus*) berwarna kekuningan, berbentuk malai yang tumbuh di sela-sela daun, memiliki benang sari berambut halus, mahkota bunga (*corolla*) berwarna kuning. Kotak sari beruang empat dengan proses penyerbukan dibantu oleh serangga. Buah (*fruit*) termasuk buah buni berbiji satu dan berdaging dengan bentuk buah bulat memanjang berwarna hijau tua saat masih muda dan berwarna hitam saat tua. Biji berbentuk bulat berukuran kecil dan berwarna hijau saat masih muda dan berwarna coklat saat biji sudah tua. Sistem perakarannya yaitu akar tunggang (*radix primaria*) berpembuluh dan berwarna kecoklatan.

Adapun klasifikasi tanaman kayu manis (*Cinnamomum verum*) yaitu :

Regnum : Plantae
 Divisi : Magnoliophyta
 Kelas : Magnoliopsida
 Ordo : Laurales
 Familia : Lauraceae
 Genus : Cinnamomum
 Spesies : *Cinnamomum verum*

Kayu manis (Kaju canning) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju,

Simplisia kayu manis digunakan dalam pengobatan sakit lambung, kehilangan nafsu makan, sakit perut yang disebabkan oleh pilek, diare, muntah, sariawan, rematik kronis, sakit punggung, asma, pilek, batuk, tekanan darah tinggi, memperlancar ASI, melegakan pernapasan. , penyegar nafas, tonik otak, melancarkan haid, sakit kepala, migrain, serta meredakan nyeri otot dan sendi. Minyak atsiri, resin, asam sinamat, sinamaldehida, dan sinamat merupakan komponen kulit kayu manis. Trans-cinnamaldehyde, caryophyllene oxide, L-borneol, L-bornyl acetate, eugenol, β -caryophyllene, E-nerolidol, dan cinnamyl acetate merupakan salah satu penyusun minyak atsiri. Terpinolene, -Terpineol, -Cubebene, dan -Thujene merupakan konstituen tambahan (Evizal Rusdi, 2013). Menurut jenis, varietas, iklim, dan umur kayu, sinamaldehida yang berkisar antara 51-76% merupakan komponen utama minyak kulit kayu manis. Eugenol, sebaliknya, berkisar antara 5-18%. Eugenol, yang konsentrasinya berkisar antara 60 hingga 85%, merupakan komponen utama dalam minyak daun kayu manis, sedangkan sinamaldehida hanya berjumlah kurang dari 5%. Kamper, yang menghasilkan sekitar 60% minyak akar kayu manis, merupakan bahan utamanya. Kayu manis mempunyai efek farmakologis yang meliputi antioksidan, anti maag, antimikroba, antidiabetes, karminatif (meredakan kentut), yg mengeluarkan keringat (mengurangi keringat), antirematik, merangsang nafsu makan (stomakis), pereda nyeri (analgesik), menurunkan kolesterol, dan mencegah kanker (Evizal, 2013).

11. Kapulaga (*Amomum compactum*)

Kapulaga (*Amomum compactum*), disebut juga gandimong di negara asalnya, merupakan tanaman herba tahunan (*perennial*) yang tumbuh setinggi 1 hingga 2,5 meter. Karena adanya pelepah daun (*vagina*) berwarna hijau kemerahan yang menutupi batang (*caulis*), berbentuk batang melingkar (teres) dan tumbuh tegak, maka batang tersebut disebut batang semu. Rimpang yang tumbuh di bawah permukaan tanah merupakan sumber dari pelepah daun ini. Daun (*folium*) terdiri atas daun tunggal yang menyebar, berbentuk lanset (*lanceolatus*), ujung runcing, tepi rata (*margo*), pangkal runcing (*acutus*), tersusun dari tulang daun menyirip (*penninervis*), dan berwarna hijau. Bunga majemuk tanaman kapulaga (*Amomum compactum*) mempunyai kelopak sepanjang 12,5 cm dan berbentuk punuk pada pangkal tangkai. Stigmanya bulat dan tidak berbulu. Mahkota bunga, atau kepala bunga, berwarna putih atau putih kekuningan. Setiap tandan buah (*fructus*) mempunyai 5-8 buah yang tersusun rapat. Buahnya berbentuk bulat dan berjauhan, memiliki 14-16 biji di dalamnya, dan memiliki kulit halus berwarna putih kekuningan atau kuning keabu-abuan. Ruang buah (*fructus*) masing-masing dipisahkan oleh selaput tipis setebal kertas. Lima hingga tujuh biji kecil berwarna coklat atau hitam dengan aroma khas terdapat di setiap ruangan. Benih disebar memanjang dalam dua baris dan disatukan dalam ruangan ini.

Adapun klasifikasi tanaman kapulaga (*Amomum compactum*) yaitu:

Regnum : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Liliopsida

Ordo : Zingiberales

Familia : *Zingiberaceae*

Genus : *Amomum*

Species : *Amomum compactum*

Tanaman kapulaga (*Amomum compactum*) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai obat. Misalnya tanaman kapulaga yang dimanfaatkan sebagai obat radang amandel, gangguan pencernaan, sakit maag, sakit perut, batuk, dan gatal tenggorokan di Kecamatan Sukamaju. Rimpangnya digunakan untuk menyembuhkan sakit perut, keringat berbau, demam, dan antipiretik. Minyak atsiri kapulaga dikatakan mengandung monoterpenes, cineole, alfaterpineol, alpha-pinene, terpinyl, myrcene, sabinene, borneol, sesquiterpenes, dan camphor, menurut Evizal (2013). Secara fenomenologis, hasilnya dianggap mempunyai dampak kuratif. Dipercaya bahwa penyakit tertentu telah berkurang atau mungkin sembuh setelah menggunakan terapi buah kapulaga. Oleh karena itu, banyak masyarakat tradisional yang beranggapan bahwa buah kapulaga tidak hanya mempunyai khasiat untuk mengobati penyakit-penyakit di atas, tetapi juga berbagai macam penyakit lainnya.

12. Sereh (*Cymbopogon citratus*)

Sereh (*Cymbopogon citratus*) dikenal dengan nama daerah (Daun sarre') merupakan tanaman tahunan (*perennial*) berhabitus tera (*herbaceous*) yang tergolong suku rumput-rumputan dengan tinggi mencapai 1-1,5 m. Batang (*caulis*) tumbuh tegk (*erectus*) di atas permukaan tanah, bergerombol, berumbi (*tuber*), memiliki sifat batang kaku, mudah patah dan berongga. Umbi pada pucuk batang (*caulis*), berwarna putih kekuningan di bagian dalam dan kadang-kadang berwarna putih keunguan. Daun (*folium*) tumbuhan ini berwarna hijau, tanpa batang, berbentuk pita (*ligulatus*), dengan panjang daun mencapai 50 cm. Puncak dan pangkal daun keduanya runcing (*acutus*), dan tepinya kasar dan tajam (*margo*). Permukaan daun bagian bawah dan atas berbentuk duri daun sejajar (*rectinervis*), yang tersebar di seluruh batang, halus dan beraroma kuat. Ia juga memiliki daging daun yang tipis (*intervenium*). Bunga jarang ditemukan pada tanaman serai (*Cymbopogon citratus*). Jika ada, bunganya biasanya berwarna putih, berbentuk paku majemuk, bertangkai atau duduk, tanpa mahkota, dan mengandung bracts asli. Buah (*fructus*) dan biji hanya kadang-kadang ada, walaupun ada. Sistem perakarannya yaitu akar serabut (*radix adventicia*) yang berimpang pendek.

Adapun klasifikasi tanaman sereh (*Cymbopogon citratus*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Monocotyledonae
 Ordo : Poales

Familia : Poaceae/Graminae
 Genus : Cymbopogon
 Species : *Cymbopogon citratus*

Tanaman serih (Daun sarre') memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Mirip dengan Kecamatan Sukamaju, serai dapur digunakan untuk mengobati luka, menurunkan demam, meredakan kejang otot, meredakan sakit perut, memperlancar haid, mengobati infeksi lambung, usus, saluran kencing, dan luka, serta untuk obat kumur, obat batuk, perawatan nifas, dan untuk meredakan batuk dan gangguan pencernaan. Daun serai mengandung minyak atsiri antara lain geranial (trans-sitral, -sitral), neral (cis-sitral, -sitral), geranyl butyrate, lomonen, eugenol, metileugenol citrate, citronellol, a-pinene, kamfen, sabinen, mirsen, felandren beta, p-simen, lim Bahan yang memberi aroma unik pada serai, senyawa geranial, memiliki aroma lemon yang lebih kuat sedangkan neral memiliki aroma lemon yang kurang kuat namun lebih manis. Meskipun citral alami dapat diperoleh dari tanaman Litsea cubeba, citral digunakan dalam produksi vitamin A. Citral memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, diuretik, antikanker, dan penghambat tumor. Ini juga meningkatkan fungsi sistem saraf pusat. Serai juga memiliki sifat antioksidan, antijamur, antibakteri, antipasmodik, analgesik, dan antirematik.

13. Lempuyang (*Zingiber zerumbet*)

Lempuyang (*Zingiber zerumbet*) dikenal dengan nama daerah (Limpujang) merupakan tanaman tahunan (*perennial*) berhabitus tera atau herba (*herbaceus*) yang tumbuh dengan tinggi mencapai 1 meter. Tanaman ini memiliki batang semu

yang terbentuk dari pelepah daun (*vagina*) berwarna hijau dan batang asli berupa rimpang di bawah tanah. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal, berwarna hijau dengan letak daun berseling, bentuk daun lanset (*lanceolatus*), ujung daun (*apex*) dan pangkal daun (*basis*) runcing (*acutus*), tepi daun (*margo*) rata (*integer*), tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*), sifat permukaan daun licin (*leavis*) dan pada permukaan bawah daun berbulu. Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk tipe bulir atau bongkol berbentuk bulat, tumbuh pada bagian rimpang yang muncul di atas tanah. Memiliki mahkota bunga (*corolla*) berwarna kuning terang, memiliki benang sari, kepala sari dan putik. Buah (*fructus*) tanaman ini memiliki bentuk seperti bulat telur berwarna merah. Adapun bagian biji (*semen*) berbentuk bulat memanjang berwarna hitam. Rimpang (*rhizoma*) berukuran lebih besar, berdaging, berwarna kuning muda pada bagian dalam dan berwarna kuning pucat pada bagian luar rimpangnya serta berbau aromatik. Sistem perakarannya yaitu akar serabut (*radix adventicia*).

Adapun klasifikasi tanaman lempuyang (*Zingiber zerumbet*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Liliopsida
 Ordo : Zingiberales
 Familia : *Zingiberaceae*
 Genus : *Zingiber*
 Species : *Zingiber zerumbet*

Tanaman lempuyang (*Zingiber zerumbet*) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat tanaman obat, Tanaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Sukamaju sebagai jamu lempu yang berkhasiat mengobati kram perut, rasa tidak nyaman pada kandung empedu, menghangatkan tubuh, merangsang rasa lapar, mengobati diare dan disentri, sesak napas, kelumpuhan, dan obat cacing. Baik limonene yang memiliki efek karminatif maupun zerumbone yang memiliki efek antikonvulsan ditemukan dalam minyak atsiri Lempuyang Wangi. Menghangatkan badan, mengobati masuk angin, flu, batuk, asam urat, radang lambung, sakit perut, dan menambah nafsu makan adalah semua manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan rimpang lempuyang aromatik.

Rimpang lempuyang mengandung 60% pati, 0,8% minyak atsiri, dan 6,5% serat, menurut analisis Evizal Rusdi tahun 2013. Ini juga termasuk plavanoid dan seskuioterpen. Zerumbone, humulene, camphene, dan camphene semuanya termasuk dalam minyak esensial. Zerumbone, senyawa seskuioterpen monosiklik, memiliki efek antiinflamasi, kemoterapi, dan pencegahan kanker. Perawatan kemoterapi, anti-HIV, anti tumor, sitotoksik, dan antibakteri semuanya melibatkan ekstrak rimpang. Alkaloid, flavonoid, dan terpenoid adalah tiga kategori utama metabolit sekunder. Tumbuhan menghasilkan berbagai metabolit sekunder dengan beragam aktivitas, antara lain sebagai antifeedant, antimikroba, dan antigrazing. Di beberapa organ, tumbuhan menyimpan metabolit sekunder. Rimpang *Zingiber zerumbet* mengandung minyak atsiri dan flavonoid, seperti kaempferol, quercetin, dan kurkumin (Dung et al.1995; Yob et al. 2011).

14. Bawang merah (*Allium cepa* L.)

Bawang merah (*Allium cepa*) dikenal dengan nama daerah (Lassuna mararang) merupakan tanaman herba (*herbaceus*) yang tumbuh sebagai tanaman semusim. Tanaman ini memiliki batang (*caulis*) berbentuk cakram, beruas-ruas dan berukuran pendek dengan diameter yang bertambah seiring dengan pertumbuhan tanaman. Bagian bawah cakram adalah tempat tumbuhnya akar-akar dan pada batang semu (*pseudostem*) akan terbentuk anakan batang baru yang berasal dari pelepah-pelepah daun (*vagina*). batang semu yang tumbuh di dalam tanah akan berubah menjadi umbi lapis (*bulbus*) dan seiring pertumbuhannya tunas atau anakan baru akan terus bertambah jumlahnya sehingga umbi akan tumbuh berhimpitan dan dapat disebut dengan siung. Daun (*folium*) berbentuk bulat atau silindris kecil memanjang, berwarna hijau, berongga, melekat pada tangkai yang ukurannya relatif lebih kecil dan pada ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*). Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk (*inflorescentia*) berbentuk tandan (*racemus*), yang tumbuh dari ujung tanaman (titik tumbuh) kuntum bunga dan setiap bunga berjejer melingkar menyerupai bentuk payung, tiap kuntumnya terdiri dari terdiri atas 5-6 helai daun bunga berwarna putih, 6 benang sari (*stamen*) berwarna hijau atau kekuning-kuningan, memiliki 1 putik (*pistillum*) dengan daun bunga berwarna hijau bergaris keputihan dan bakal buah duduk di atas membentuk suatu bangunan seperti kubah. Berbentuk bulat dengan ujung tumpul, buah tanaman ini (*fructus*) mengandung dua hingga tiga biji. *Semen* adalah biji pipih berwarna putih yang jika bertambah tua akan berubah menjadi hitam. memiliki sistem perakaran pendek yang kedalamannya tidak lebih dari 30

cm di bawah permukaan tanah. Batangnya menghasilkan sejumlah akar serabut (*radix adventicia*). Akar petualang berkembang biak pada tahap awal pertumbuhan, namun seiring dengan bertambahnya usia umbi, laju kematian akar melebihi laju pertumbuhan kembali akar..

Adapun klasifikasi tanaman bawang merah (*Allium cepa*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Classis : Monocotyledoneae
 Ordo : Liliales
 Familia : Liliaceae
 Genus : Allium
 Species : *Allium cepa*

Tanaman bawang merah (*Lassuna mararang*) dimanfaatkan oleh masyarakat Sukamaju selain sebagai penyedap bumbu dapur juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit seperti demam, masuk angin, mengobati sakit gigi serta sebagai pengusir setan. Tanaman bawang merah (*A. cepa*) mengandung golongan senyawa flavonoid seperti quercetin, thiosulphinate (Kumar et al., 2010), protein, lemak, β -karoten, mineral, antosianin, sulfur, karbohidrat, niasin, kalium, asam askorbat dan serat (wiboho, 2007). *Alium cepa*, bahan aktif dalam umbi bawang merah, membantu mengeluarkan racun berbahaya dari tubuh dengan cara menetralsirnya di dalam tubuh. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa tanaman bawang merah (*A. cepa*) yang berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat mengurangi karsinogenisitas

bahan kimia radikal bebas tersebut memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan (Kuswardhani, 2016).

15. Bawang putih (*Allium sativum* L.)

Bawang putih (*Allium sativum*) dikenal dengan nama daerah (Lassuna mabusa) merupakan tanaman herba (*herbaceus*) semusim yang pertumbuhannya mirip dengan bawang merah. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal, berbentuk pita yang pipih, pelepah daun (*vagina*) yang panjang tersusun membentuk satu kesatuan menjadi batang semu. Bagian tepi daun (*margo*) rata (*integer*), ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*), beralur, pangkal daun (*basis*) menebal, berdaging, dan mengandung cadangan makanan yang disebut umbi. Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk (*inflorescentia*), bertangkai panjang membentuk payung yang muncul pada setiap siung, memiliki mahkota bunga (*corolla*) berjumlah 6 helai berwarna putih atau putih kehijauan. Umbi majemuk bawang putih yang berdiameter 4-6 cm dan berbentuk hampir bulat, masing-masing berisi 8-20 siung. Cengkih ini memiliki bagian depan bersudut, tetapi bagian belakang dan samping membulat. Tiga sampai lima lapisan selaput putih tipis mengelilingi seluruh cengkeh. Masing-masing siung kemudian sekali lagi dibungkus dengan dua lapisan selaput tipis, selaput bagian dalam berwarna merah muda keputihan yang menempel pada siung tetapi mudah dicabut. Selaput luar berwarna putih dan agak longgar. Satu tangkai vegetatif dengan satu tunas dan satu hingga dua daun terdapat pada setiap siung. Adapun tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut (*radix adventicia*).

Adapun klasifikasi tanaman bawang putih (*Allium sativum*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Classis : Monocotyledoneae
 Ordo : Liliales
 Familia : Liliaceae
 Genus : Allium
 Species : *Allium sativum*

Tanaman bawang putih (*Lassuna mabusa*) sering digunakan dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat Sukamaju untuk mengobati penyakit seperti obat menurunkan tekanan darah, mengobati infeksi telinga ringan, meringankan sakit gigi, serta mencegah flu. Menurut (Arreola et al., 2015) menyatakan bahwa umbi bawang putih (*A. sativum*) mengandung senyawa utama yakni diallyl thiosulfonate (*allicin*), diallyl sulfide, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, S-allyl-cysteine sulfoxide, ajoene, allylpropyl disulfide, vinyl dithiines, dan S-allylmercaptocystein. Allicin adalah salah satu senyawa organosulfur yang berperan penting dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Isolat murni allicin dan allin diuji, dan hasilnya menunjukkan peningkatan aktivitas makrofag dan sel T.

16. Pala (*Myristica fragrans* Houtt)

Pala (*Myristica fragrans*) dikenal dengan nama daerah (Buah pala) merupakan tanaman tahunan (*perennial*) berhabitus pohon yang tingginya mencapai 10-25 meter menjulang tinggi keatas. Batang (*caulis*) bentuknya bulat (*teres*), berkayu (*lignosus*), percabangan yang tersebar, memiliki sifat permukaan batang yang kasar dan berwarna kecoklatan. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal

dengan dedaunan yang rapat dan letak daun berselang-seling secara teratur. Helai daun berbentuk jorong (*ellipticus*), ujung daun (*apex*) meruncing (*acuminatus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*), tepi daun (*margo*) rata (*integer*), tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*), sifat permukaan daun mengkilat (*nitidus*) berwarna hijau tua. Bunga tanaman ini (*flos*) bersifat dioecious, artinya mempunyai dua rumah. Bunga jantan dan bunga betina terletak pada pohon yang berbeda. Bunga jantan mekar berwarna putih dengan semburat kekuningan dan bentuknya lebih lonjong. Bunga betina lebih berbentuk piramida dengan pangkal bunga lebar dan mempunyai kelopak serta mahkota, meskipun perkembangannya tidak sesempurna bunga jantan yang bunganya lebih banyak dan rimbun, dengan jumlah bunga 3 sampai 10 bunga per tandan bunga. mahkota bunga (*corolla*) yang menyatu dari pangkalnya, kelopak bunga yang berkembang tidak sempurna, dan benang sari berbentuk silinder menempel pada tangkai membentuk barisan 8 berpasangan. Gading yang berkisar dari putih hingga kekuningan pada bunga. Selama satu hari, bunga betina mekar dan bersifat reseptif. Bunga betina akan mengering dan rontok jika tidak diserbuki selama sehari. Tanaman ini menghasilkan buah yang beragam, ada yang berbentuk bulat dan lonjong dengan ukuran mulai dari kecil hingga besar. Buah pala berwarna kuning kemerahan dan ada yang hijau kekuningan. Pericarp buah, atau dagingnya yang tebal, sangat asam dan teksturnya kuat. Bentuknya bulat lonjong, berwarna coklat, dan bagian luarnya mengkilat terdapat bijinya (*semen*). Biji pala yang berwarna putih kehitaman menunjukkan bahwa biji pala masih muda atau belum matang, sedangkan biji pala yang berwarna hitam mengkilat menunjukkan bahwa

biji tersebut sudah matang. Akar tunggang (*radix primaria*) adalah sebutan untuk sistem akar.

Adapun klasifikasi tanaman pala (*Myristica fragrans*) yaitu:

Regnum : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Classis : Dicotyledonae
Ordo : Myristicales
Familia : Myristicaceae
Genus : Myristica
Species : *Myristica fragrans* Houtt.

Pala (Buah pala) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti halnya di Kecamatan Sukamaju, pala, khususnya bijinya, dimanfaatkan untuk obat demam, pereda nyeri, penyegar badan, masuk angin, radang, sakit maag, suara serak, kencing manis, rematik, mual dan muntah, sulit tidur, dan penambah daya ingat. Selain camphene, elemicin, eugenol, isoelemicin, isoeuglenol, dan methoxyeugenol, pala juga mengandung terpenoid, fenolik, alkaloid, saponin, antrakuinon, glikosida jantung, flavonoid, dan phlobatin. Kandungan utama minyak daun pala adalah sabinene, -pinene, 4-terpineol, limonene, dan -pinene. Bahan utama minyak biji pala antara lain asam miristat, trimiristin, gliserida, stearat, laurat, linoleat, dan asam palmitat. Menurut (Evizal, 2013), pala memiliki beragam khasiat obat, antara lain stimulan, narkotika, karminatif, astringen, afrodisiak, hipolipidemik, antitrombotik, anti

agregasi trombosit, antijamur, antidisentri, antiinflamasi, anxiogenik, obat penenang, analgesik, antimikroba, antidepresan, antidiabetes, antioksidan.

17. Seledri (*Apium graveolens*)

Seledri (*Apium graveolens*) dikenal dengan nama daerah (Daun so') merupakan tanaman dua tahunan berhabitus terna atau herba (*herbaceus*) yang tumbuh dalam pola roset dan memiliki banyak anakan. Batang (*caulis*) beralur, bercabang, tumbuh tegak dan berwarna hijau pucat. Daun (*folium*) tipe majemuk menyirip ganjil lima atau tujuh helai daun dan tangkai daun panjang berdaging yang menghubungkan batang dengan daun terdapat di antara daun. Tumbuhan ini mempunyai tepi (*margo*) daun menyirip dengan tepi bergerigi pada pangkal daun dan ujung daun runcing (*acutus*). Tangkai daunnya berwarna hijau atau kekuningan, tumbuh lurus ke atas atau ke samping. Bunga (*flos*) merupakan bunga majemuk kecil yang mempunyai lima benang sari dan dua putik, berwarna hijau kekuningan, mempunyai tangkai kelopak sepanjang 2,5 cm, berkelamin dua (*hermaphroditus*). Bunga dapat melakukan pembuahan sendiri, namun serangga penyerbuk memainkan peran utama dalam penyerbukan bunga. Buahnya sangat kecil (*fructus*) dengan diameter 1 mm. Biji kecil berbentuk lonjong disebut air mani. Sistem akar terdiri dari akar serabut berongga dan menyebar (*radix adventicia*), banyak di antaranya merupakan akar bawahan yang berada dekat dengan permukaan tanah sehingga terlihat dari luar.

Adapun klasifikasi tanaman seledri (*apium graveolens*) yaitu:

Regnum : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Classis : Dicotyledonae
Ordo : Umbelliferles
Familia : Umbelliferae (Apiaceae)
Genus : Apium
Species : *Apium graveolens* L.

Dalam pengobatan secara tradisional Tanaman seledri (Daun so') dimanfaatkan oleh masyarakat Sukamaju sebagai obat penurun tekanan darah tinggi dan penambah nafsu makan. Demam, hipertensi, penurunan kolesterol, radang sendi, rematik, asam urat, induksi menstruasi, sulit tidur, dan kecemasan adalah kondisi-kondisi yang dapat diobati dengan seledri. Glukosida apiin, apiol, dan plavanoid serta minyak atsiri hingga 3%, dengan limonena sebagai unsur utamanya, semuanya dapat ditemukan dalam buah kering tanaman *fructus apii*, yang digunakan sebagai obat. Daunnya juga mengandung minyak atsiri, vitamin A, B1, B2, dan C, serta mineral seperti kalsium, fosfat, dan zat besi (Fazal dan Singla, 2012). Seledri mengandung asam isovaleric, α -selinene, caryophyllene, epoxy limonene, dimetil styrene, sabinene, linalool, trans-dihydrocarvone, b-elemne, cis-dihydrocarvone, N-butyl phthalide, N-pertyl benzene, trepinene, sedanenolide, trans-p-menth-2,8-diene-1-ol, alphaterpineol, carvone, trans-8-diene 1-ol, perialdehyde, 1-cis-p-menth-2,8-diene -1-ol, dan timol. Afrodisiak, anthelmintik, antispasmodik, karminatif, diuretik, emenagogik, pencahar, obat penenang, stimulan, antiseptik, antijamur, antikanker, dan antiinflamasi adalah beberapa efek farmakologisnya.

18. Ketumbar (*Coriandrum sativum*)

Ketumbar (*Coriandrum sativum*) dikenal dengan nama daerah (Ketumbara) merupakan tanaman berhabitus terna (*herbaceus*) yang tumbuh dengan tinggi 35-100 cm. Batang (*caulis*) tanaman ini berbatang lunak, beralur dan penampangnya berlubang dengan warna batang ungu hingga hijau. Daun (*folium*) termasuk daun majemuk menyirip yang melekat pada batang dengan tangkai daun panjang dan berdaging. Tanaman ini memiliki tepi daun (*margo*) bergerigi, dengan tangkai daun tumbuh tegak ke atas atau kepinggir dengan daunnya berwarna hijau. Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk berbentuk seperti payung, memiliki daun pembalut berukuran kecil. Memiliki mahkota bunga (*corolla*) berwarna putih, merah muda dengan ukuran panjang bunga sekitar 3-4 mm. Buah (*fructus*) tanaman ini bergerombol, memiliki bentuk bulat berwarna hijau saat muda dan akan berubah warna menjadi cokelat muda saat sudah tua serta memiliki bau aromatik yang khas. Biji (*semen*) berukuran kecil dengan bentuknya yang bulat. Adapun sistem perakarannya yaitu akar tunggang (*radix primaria*) yang memiliki cabang.

Adapun klasifikasi tanaman ketumbar (*Coriandrum Sativum*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Tracheophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Ordo : Apiales
 Familia : Apiaceae
 Genus : Coriandrum

Species : *Coriandrum Sativum* L.

Tanaman ketumbar (Ketumbara) secara empiris Masyarakat Kecamatan Sukamaju memanfaatkan *C. sativum* sebagai obat jantung kolesterol dengan cara mencampurkan 2 sendok teh atau setara 5 gram dengan 1 gelas air. Airnya kemudian direbus hingga mendidih, dituangkan ke dalam gelas berisi *C. sativum*, dan ditunggu 15 menit sebelum disaring dan diminum selagi masih hangat.

Buah ketumbar matang mengandung serat (23-26%), karbohidrat (20%), asam lemak (16–28%), protein (11–17%), minyak atsiri (0,3-2,7%), dan komponen lain seperti mineral, menurut Evizal (2013). Hidrokarbon monoterpen (seperti cymonene, camphene, limonene atau dipentene, pinene, dan terpinene), oksida monoterpen (seperti kamper, cineole, linalol, dan carvone), alkohol monoterpen, ester monoterpen, seskuiterpen, fenol, dan bahan kimia alifatik merupakan senyawa esensial. komposisi minyak ketumbar. Tindakan farmakologis analgesik, karminatif, stomakikum, dan antimual. Momin dkk. (2012) mencantumkan efek farmakologis tambahan sebagai anti-inflamasi, anti-kanker, ansiolitik, hepatoprotektif, anti-protozoa, anti-ulkus (bisul, bisul), antifertilitas, antioksidan, antidiabetik, anti -konvulsan, diuretik, antimitagenik, sedatif-hiponetik, anti-helmitik, penurun kolesterol, serta dapat melindungi dari racun.

19. Lada (*Piper nigrum* L.)

Lada (*Piper nigrum*) dikenla dengan nama daerah (Merica) merupakan tanaman tahunan (*parennial*) yang tumbuh memanjat (*scandens*). Batang (*caulis*) tanaman ini berupa sulur memanjang berbentuk silindris dan berbuku-buku,

berwarna hijau pada batang muda sedangkan pada batang tua berkayu (*lignosus*) dengan panjang buku ruas mencapai 5-12 cm. Tanaman lada dimorfik (*Piper nigrum*) mempunyai dua sulur utama: sulur buah dan sulur memanjat. Ruas dengan ruas yang menghasilkan akar yang panjang dan lengket terdapat pada sulur yang memanjat, namun tidak dapat menghasilkan buah. Sulur buah tumbuh mendatar (*plagiotrop*) dan mempunyai struktur percabangan simpodial. Akar sulur buah tidak disatukan ke buku oleh sulur. Selain kedua varietas tersebut, tanaman cabai juga dapat menghasilkan sulur tanah dan sulur gantung. Sulur tanah tumbuh menyebar di permukaan tanah, sedangkan sulur gantung tumbuh menggantung di permukaan kanopi. Kedua tumbuhan tersebut tidak memiliki akar yang menyambung dan memiliki ruas yang relatif panjang, diameter batang yang pendek, dan helaian daun yang lebih sempit. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal, tumbuh berselang-seling pada setiap buku batang, tipe pertulangan daunnya menyirip (*penninervis*), memiliki bentuk daun bulat telur (*ovatus*), ujung daun (*apex*) meruncing (*acuminatus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*), tepi daun (*margo*) rata (*integer*), bertangkai panjang dan membentuk aluran di atasnya. Warna daunnya hijau tua dan tampak ada titik-titik kelenjar. Bunga majemuk (*flos*) yang warnanya bervariasi dari hijau muda sampai kekuningan, berbentuk malai yang rebah ke bawah, bertumpu pada batang induk tanpa terlihat tangkai bunga, dan tersusun spiral. Yang ada hanya bunga betina saja, bunga jantan saja, atau hermafrodit (biseksual) dalam istilah bunga tanaman ini (*flos*). Buahnya (*fructus*) berdaging, bulat (*teres*), dan berwarna hijau saat muda. Saat matang, kulit buahnya lembut, berair, berwarna merah jingga, dan mudah terkelupas. Biji

(*semen*) tanaman ini memiliki kulit biji halus berwarna putih kecoklatan dengan diameter 3–4 mm. Pada tanaman cabai, terdapat dua macam akar: akar yang muncul dari buku-buku tanah, menghasilkan akar lateral, dan berfungsi sebagai penyerap unsur hara, dan akar yang tumbuh di atas tanah dan berfungsi sebagai akar lengket. Akar lateral tanaman lada merupakan akar tunggang selain mempunyai pangkal batang berserat. Meski tidak menyebar dan berfungsi sebagai penahan tanaman agar tetap tegak, akar lengket yang tumbuh dari ruas batang di atas tanah tidak menyebar.

Adapun klasifikasi tanaman lada (*Piper nigrum* L.) yaitu:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Dicotyledoneae
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Species	: <i>Piper nigrum</i> L.



Tanaman lada (*Merica*) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju, Tanaman lada berkhasiat sebagai antimikroba dan antidiare selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur (Izza, 2023). Menurut Ganesh dkk. (2014). Alkaloid lada yang dikenal sebagai piperine dapat melisiskan dinding sel bakteri untuk membunuh kuman dan mengubah sifat protein. Lapisan ganda lipid pada dinding sel bakteri dapat dipecah oleh saponin, yang juga dapat menurunkan

tegangan permukaan (Hasriyana et al., 2020). Alkaloid, tanin, saponin, kumarin, fenol, glikosida, flavonoid, dan minyak atsiri merupakan komponen kimia buah lada hitam (Nahak dan Sahu, 2011; Trivedi et al., 2011). Penelitian telah dilakukan untuk mengetahui apakah zat aktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, terpenoid, minyak atsiri, dan senyawa fenolik mempunyai pengaruh terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* (Singh et al., 2011).

20. Kemiri (*Aleurites moluccanus*)

Kemiri (*Aleurites moluccanus*) dikenal dengan nama daerah (Kemiri) merupakan tanaman tahunan (*perennial*) berhabitus pohon tinggi dapat mencapai 20 m. Batang tanaman (*caulis*) berbentuk bulat (*teres*), berkayu (*lignosus*), dan permukaannya relatif halus dengan garis-garis vertikal indah berwarna abu-abu kecoklatan. Biasanya memiliki bentuk cabang yang memanjang dan bengkok yang menggantung dari cabang samping dan meliuk-liuk. Daun (*folium*), yang biasanya memiliki 3-5 helai daun dari pangkalnya, mudah dikenali dari bentuknya yang khas, tersusun secara berselang-seling, memiliki bentuk daun delta (*deltoideus*), ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*), pangkal daun (*basis*) rata (*truncatus*), tepi daun (*margo*) berombak (*repandus*), tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*), sifat permukaan daun mengkilap berwarna hijau dan pada permukaan bawah daunnya berbulu halus. Bunganya (*flos*) berwarna putih kehijauan, harum, dan hermafrodit, artinya mempunyai bunga jantan dan bunga betina pada pohon yang sama. Bunga jantannya banyak dan kecil, mengelilingi bunga betina dalam tandan yang panjangnya 10-15 cm. Lima kelopak (*kalyx*) berwarna putih kusam yang menyusun mahkota bunga (*corolla*) berbentuk

lonjong dan panjang 1,3 cm. Bentuk buah (*fructus*) berkisar dari lonjong hingga bulat dan berwarna hijau hingga kecoklatan. Satu buah kemiri biasanya mempunyai dua sampai tiga biji, namun buah kemiri jantan hanya boleh mempunyai satu biji. Jika dipanggang terlebih dahulu, bijinya (*fructus*) bisa dimakan. Kulit biji kemiri biasanya berbentuk elips, kasar, hitam, dan keras. Akar tunggang (*radix primaria*) adalah sebutan untuk sistem perakaran.

Adapun klasifikasi tanaman kemiri (*Aleurites moluccana* L) yaitu:

Regnum : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Malpighiales

Familia : Euphorbiaceae

Genus : *Aleurites*

Species : *Aleurites moluccana* L

Tanaman kemiri (Kemiri) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Daunnya digunakan untuk mengobati sakit kepala dan kencing nanah, seperti di Desa Sukamaju yang dimanfaatkan sebagai obat diare, sariawan, dan disentri. Minyak kemiri telah terbukti bekerja dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan rambut. Saponin, flavonoid, dan polifenol (kandungan senyawa pada biji), daun, dan akar *Aleurites moluccana*. Minyak lemak juga terdapat pada bijinya. Korteks memiliki tanin di dalamnya. Kegunaan dan Khasiat Kulit bijinya berfungsi sebagai anti tumor, sedangkan daging bijinya bersifat pencahar (Sulhatum, 2020).

21. Keluak (*Pangium edule*)

Keluak (*Pangium edule*) dikenal dengan nama daerah (kaloa) merupakan tanaman berhabitus pohon yang tinggi batangnya bisa mencapai puluhan meter. Batang (*caulis*) tanaman ini bentuknya bulat (*teres*), berkayu (*lignosus*), berwarna kecoklatan, sifat permukaan batangnya kasar dengan cabang dan ranting yang tidak kokoh. Daun (*folium*) termasuk daun tunggal, bertangkai panjang, berkumpul pada ujung ranting, memiliki helaian daun berlekuk tiga saat muda dan helaian daun tua berbentuk bulat telur (*ovatus*), ujung daun (*apex*) meruncing (*acuminatus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*), tepi daun (*margo*) rata (*integer*), memiliki tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*), memiliki sifat permukaan atas daun licin (*leavis*) dengan warna hijau mengkilap, Rambut coklat dan urat menonjol terdapat di permukaan bawah daun, yang sangat rapat. Tanaman ini mempunyai bunga (*flos*) berwarna coklat kehijauan yang tumbuh di ketiak daun atau praktis di ujung dahan. Bunga betina tumbuh sendiri-sendiri di ujung cabang, sedangkan bunga jantan berkumpul dalam malai. Buah (*fructus*) termasuk buah buni, bentuknya lonjong, kulitnya berwarna coklat dengan permukaan kasar, daging buahnya berwarna kuning pucat, empuk, dan setiap buahnya berbiji 18 buah. Biji (*semen*) bertekstur keras dan kulit biji yang tebal. Adapun sistem perakarannya yaitu akar tunggang (*radix primaria*) dan berbanir.

Adapun klasifikasi tanaman kluwak (*Pangium edule*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Tracheophyta
 Classis : Magnoliopsida

Ordo : Malpighiales
Familia : Archariaceae
Genus : *Pangium*
Species : *Pangium edule* Reinw.

Keluak (Kaloa) memiliki kandungan senyawa antioksidan yang berfungsi sebagai antikanker, kluwak dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju, keluak sebagai obat penyakit jantung. Menurut Mamuaja, 2017 mengatakan Sekelompok bahan kimia polifenol yang dikenal sebagai tanin memiliki sifat polar dan larut dalam gliserol, alkohol, minuman hidroalkohol, air, dan aseton. Mamuaja mengklaim bahwa tanin tidak larut dalam benzena, petroleum eter, dan kloroform. Vitamin C, ion besi, -karoten, dan senyawa flavonoid yang mempunyai sifat antibakteri seperti asam sianida, asam khaulmograte, asam hidrokarpat, asam gorlat, dan tanin semuanya terdapat pada daging biji kluwek. Zat antioksidan lain yang berfungsi sebagai agen anti kanker juga termasuk vitamin C, ion besi, dan tanin.

22. Jintan hitam (*Nigella sativa*)

Jintan hitam (*Nigella sativa*) yang umumnya disebut sebagai Jintan merupakan tanaman berhabitus herba (herbaceus) yang tumbuh tegak dengan tinggi tanaman mencapai 70 cm. Batang (*caulis*) berbentuk bulat (*teres*), berwarna hijau dan berbulu kasar serta memiliki banyak percabangan. Daun (*folium*) tersusun secara berselang-seling, helain daun berbentuk lonjong, ujung daun (*apex*) dan pangkal daun (*basis*) runcing (*acutus*), memiliki tipe pertulangan daun

menyirip (*penninervis*) dengan daun berwarna hijau. Bunga (*flos*) tanaman ini berwarna putih atau biru pucat, memiliki kelopak bunga (*calix*) berjumlah 5 helai berbentuk bulat telur, memiliki mahkota bunga (*corolla*) berjumlah 8 dengan bentuk agak memanjang serta berbulu jarang dan pendek. Buah (*fructus*) berbentuk buncung, keras seperti buah buni. Biji (*semen*) berwarna hitam, berukuran kecil, pendek dan berkelenjar. Akar tanaman ini termasuk akar tunggang (*radix primaria*).

Adapun klasifikasi tanaman jintan hitam (*Nigella sativa*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : magnoliopsida
 Ordo : Ranunculales
 Familia : Ranunculaceae
 Genus : *Nigella*
 Species : *Nigella sativa* Linn.

Jintan (Jintan) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju, mengobati sakit kepala, hidung tersumbat, sakit gigi, dan cacing usus. Menurut Claudia et al., 2010 mengatakan Kandungan kimia pada biji jintan hitam adalah minyak atsiri, minyak lemak, thymoquinone, saponin, melantin, nigellon, dithymoquinone, nigellein, hymohydroquinone, zat samak, thymol, serta komponen gizi seperti karbohidrat, protein esensial, lemak, unsur mineral, asam amino, vitamin, monosakarida berupa glukosa, arabinose, xilosa, dan rhamnosa. Thymoquinone

memainkan peran penting dalam aktivitas farmakologi jintan hitam (Mozaffari et al., 2000). Zat nonpolar yang disebut timokuinon dapat ditemukan dalam minyak esensial jintan hitam. Konsentrasi minyak atsiri biji jintan hitam menurut penelitian ElTahir dkk. (1993), sebesar 0,40-0,45%, dengan kandungan timokuinon mencapai 27,8% dan kandungan monoterpen lainnya sebesar 46%, antara lain p-cimene dan r-pinene. Menurut penelitian tambahan, kadar timokuinon minyak atsiri jintan hitam adalah 1,65%.

23. Pandan (*Pandanus amaryllifolius*)

Pandan (*Pandanus amaryllifolius*) dikenal dengan nama daerah (Daun pandan) merupakan tanaman tahunan (*perennial*) berhabitu perdu yang tumbuh dengan tinggi mencapai 2 meter. Batang (*caulis*) tanaman ini berbentuk bulat (*teres*) dengan bekas dudukan daun, bercabang, menjalar dengan akar tunjang sekitar pangkal batang dan akar udara dari cabangnya. Daun (*folium*) berbentuk pita berwarna hijau muda, tersusun spiral dengan bagian ujung daun (*apex*) runcing (*acutus*), pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*), tepi daun (*margo*) berduri dengan tipe pertulangan daun sejajar. Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk berbentuk bongkol berwarna putih, kemudian pada tongkol bunga jantan berdiri sendiri, menggantung, memiliki daun pelindung berbentuk lanset (*lanceolatus*), bertunas, berwarna putih kekuningan dan memiliki aroma yang harum. Buah (*fructus*) berbentuk buah batu, menggantung, berbentuk bola, berwarna orange-kekuningan, bagian dinding buah berserabut dengan banyak ruang. Adapun sistem perakaran tanaman ini yaitu akar tunggang (*radix primaria*).

Adapun klasifikasi tanaman pandan (*Pandanus amaryllifolius*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Classis : Monocotyledone
 Ordo : Pandanales
 Familia : Pandanaceae
 Genus : Pandanus
 Species : *Pandanus amaryllifolius* Roxb.

Daun tanaman pandan yang digunakan untuk membuat obat mengandung berbagai macam zat bermanfaat. Misalnya daun pandan yang sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional penderita diabetes di Kecamatan Sukamaju. Polifenol, tanin, alkaloid, safonin, dan flavonoid semuanya terdapat dalam daun pandan. Beberapa zat tersebut memiliki sifat anti inflamasi dan hipoglikemik (Suryani et.al, 2017).

24. Jeruk nipis

Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dikenal dengan nama daerah (Lemo nipi') merupakan tanaman berhabitus perdu dengan tinggi tanaman mencapai 3,5 m serta memiliki cabang yang lebat dan tidak beraturan. Tanaman ini memiliki bentuk batang (*caulis*) bulat (*teres*), berkayu (*lignosus*), cabang dan rantingnya berduri, keras dan berwarna putih kehijauan. Daun (*folium*) termasuk daun majemuk menyirip beranak daun satu (*unifoliolatus*), berbentuk elips dengan ujung daun (*apex*) membulat, pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*) dan tepi daun

(*margo*) beringgit serta memiliki tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*). Bunga (*flos*) termasuk bunga majemuk tipe tandan pendek yang tumbuh di ketiak daun pada pucuk yang baru merekah. Banyaknya bunga pada tiap tandan berjumlah 10 kuntum, mahkota bunga (*corolla*) berjumlah 4-6 helai, benang sari berjumlah 20-25 utas dan tangkai putiknya mudah dibedakan dengan bakal buah. Buah (*fructus*) berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan diameter 3,5-5 cm, kulit bagian luarnya berwarna hijau muda saat buah masih muda dan akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan saat buah sudah masak. Adapun sistem perakarannya yaitu akar tunggang (*radix primaria*) berwarna putih kekuningan.

Adapun klasifikasi tanaman jeruk nipis (*Citrus aurantifolio*) yaitu:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Classis : Dicotyledonae
 Ordo : Rutales
 Familia : Rutaceae
 Genus : Citrus
 Species : *Citrus aurantifolia* (Cristm.) Swingle.

Jeruk nipis (Lemo nipi') memiliki banyak kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti masyarakat kelurahan Sukamaju, Jeruk nipis bisa digunakan sebagai penambah nafsu makan, diare, antibakteri dan diet. Jeruk nipis memiliki kandungan flavonoid, saponin dan minyak atsiri (Syamsuhidayat dan Hutape, 2010). Glikosida siral, limonene,

feladren, dan hedperidin membentuk minyak atsiri. Air jeruk nipis mengandung 7% asam sitrat dan minyak esensial limonene. Bioflavonoid, pektin, enzim, protein, lipid, dan pigmen (karoten dan klorofil) semuanya ada dalam buah jeruk. Buah jeruk nipis kaya akan C atau O-glikosida yang merupakan metabolit sekunder dari flavonoid. Flavonon, flavon, dan flavonol adalah tiga jenis flavonoid jeruk (Hertog, 2010).

25. Jeruk purut (*Citrus hystrix*)

Jeruk purut (*Citrus hystrix*) dikenal dengan nama daerah (Lemo purut) merupakan tanaman berhabitus perdu dengan tinggi tanaman mencapai 3,5 m serta memiliki dahan dan ranting. Tanaman ini memiliki bentuk batang (*caulis*) bulat (*teres*), berkayu (*lignosus*), berduri, keras dan berwarna putih kehijauan. Daun (*folium*) termasuk daun majemuk menyirip beranak daun satu (*unifoliolatus*), berbentuk elips dengan ujung daun (*apex*) membulat, pangkal daun (*basis*) tumpul (*obtusus*), tepi daun (*margo*) beringgit, memiliki tipe pertulangan daun menyirip (*penninervis*), Permukaan bawah daun berwarna hijau muda atau hijau kekuningan dan berbau sangat segar, sedangkan permukaan atas licin (*leavis*). Permukaan atas daun berwarna hijau tua agak mengilap. Bunga majemuk berwarna putih kemerahan atau putih kekuningan berbentuk seperti bintang, terletak di ketiak daun atau di ujung batang. Buah (*fructus*) kecil berbentuk bulat, berkulit tebal dengan permukaan kulit luar nya berkerut, berbenjol-benjol dan berwarna hijau. Buah (*fructus*) yang masak pada bagian kulitnya akan berubah warna menjadi sedikit kekuningan, daging buah berwarna kekuningan dengan rasanya yang asam sedikit agak pahit. Biji (*semen*) berbentuk

bulat kecil, dan keras. Adapun sistem perakarannya yaitu akar tunggang (*radix primaria*) berwarna putih kekuningan.

Adapun klasifikasi tanamn jeruk purut (*Citrus hystrix*) yaitu

Regnum : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Classis : Dicotyledoneae
Ordo : Rutales
Familia : Rutaceae
Genus : Citrus
Species : *Citrus hystrix* D.C

Jeruk purut (Lemo purut) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju, Pengobatan tradisional Thailand menggunakan jeruk purut untuk menyembuhkan sejumlah penyakit, antara lain flu, demam, sakit perut, diare, dan hipertensi. Bahan kimia yang termasuk dalam daun jeruk purut antara lain terpen, minyak atsiri, flavonoid, dan saponin (Alfariq et al. 2015). Jeruk purut merupakan tanaman dengan aktivitas antioksidan yang sangat kuat sehingga berguna baik dalam industri dan obat-obatan serta untuk kebutuhan sehari-hari di rumah dan bisnis. Berdasarkan hasil uji fitokimia, jeruk purut mengandung metabolit sekunder dalam jumlah yang cukup besar. Menurutnya, antioksidan aktif pada flavonoid merupakan metabolit sekunder (Rahmi, 2013).

Berdasarkan data hasil wawancara spesies tanaman rempah-rempah yang ditemukan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh hasil sebanyak 14 familia dari 25 spesies tanaman yang digunakan sebagai Rempah oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju. Adapun spesies tanaman yang paling banyak digunakan berasal dari familia *Zingiberaceae* berjumlah 9 spesies, familia piperaceae dan lamiaceae berjumlah 1 spesies, familia Apiaceae berjumlah 3 spesies, familia Myristiaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, dan Achariaceae berjumlah 1 spesies, familia Amaryllidaceae berjumlah 2 spesies, familia Solanaceae, Pandanaceae, Foaceae masing-masing berjumlah 1 spesies, dan familia Rutaceae berjumlah 2 spesies tanaman (Gambar 1).

Famili tumbuhan terbesar dan paling banyak tersebar di Asia dengan lingkungan tropis adalah *Zingiberaceae* (Auliani, 2014). Keluarga *Zingiberaceae* secara keseluruhan lebih sering dikenal dengan sebutan jahe. Dengan lebih dari 53 genera dan lebih dari 1.500 spesies di seluruh dunia, famili ini merupakan suku terbesar dalam ordo *Zingiberales*, menurut temuan penelitian (Suriyanto dkk., 2015). Mayoritas spesies ini ditemukan di daerah tropis atau hutan.

Ciri-ciri famili *Zingiberaceae* adalah tumbuhan herba, rimpang berdaging, daun hancur harum, tidak adanya kambium, dan banyak air. Ciri pembeda lainnya adalah batangnya bertubuh pendek dan berdiameter kecil. Selain itu, rimpang akar tanaman famili *Zingiberaceae* mengandung minyak atsiri dengan aroma yang khas (Tjitrosoepomo, 2010). Karena keluarga *Zingiberaceae* tumbuh subur di daerah beriklim tropis seperti Indonesia, masyarakat Indonesia sudah lama memanfaatkannya sebagai obat. Banyak orang yang menanam jahe di pekarangan

rumah mereka karena kebutuhan pengobatan maupun kebutuhan komersial sebagai bumbu makanan (Arum et al., 2012). Tanaman yang paling umum di semua pekarangan adalah anggota keluarga *Zingiberaceae*: jahe (*Curcuma officinale*), lengkuas (*Alpinia galanga*), kunyit (*Curcuma longa*), dan jahe (*Curcuma xanthorrhiza*). Karena tanaman *Zingiberaceae* adalah jenis rimpang-rimpangan, maka tanaman ini sangat mudah tumbuh melalui pembentukan tunas baru pada rimpang sehingga sering dijumpai. Menurut Susanti (2011), kondisi lingkungan yang relatif ideal dan mempunyai habitat yang sesuai dapat menunjang produksi rimpang. Sehingga, tanaman obat yang ditanam di kebun pribadi adalah contoh tanaman yang mudah beradaptasi pada lingkungan apapun.

Masyarakat memanfaatkan tanaman jahe (*Zingiber officinale*) secara luas sebagai bumbu masakan, obat batuk, obat herbal, dan meningkatkan imunitas tubuh (Lestari et al., 2021). Pemberian madu jahe pada anak, menurut Bardan (2007), dapat mengurangi keparahan batuknya karena minyak atsiri dalam jahe mempunyai sifat anti-batuk. Selain itu, mengandung zat bioaktif termasuk antioksidan dan molekul anti-inflamasi yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Rimpang merupakan bagian tanaman *Zingiberaceae* yang paling sering dimanfaatkan sebagai komponen obat tradisional (Auliani, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan sebanyak 25 spesies tanaman rempah-rempah yang banyak dimanfaatkan masyarakat secara turun temurun di Kelurahan sukamaju dalam teknik pengobatan tradisional terhadap berbagai jenis penyakit seperti penyakit gula, sejenis kanker, penghangat badan, menurunkan batuk, asam urat, masuk angin, ginjal, sebagai nafsu makan, diabetes, pilek,

penyegaran rasa, penambah gizi, menghilangkan bau badan, penyakit saraf, demam, asam lambung, asam urat, menurunkan tekanan darah, insomnia, mengatasi sembelit, diare, perut kembung, hipertensi, anemia, rematik, radang sendi, influenza, pengusir setan, mengobati sakit gigi, menjaga kesehatan tulang, mencegah kolesterol, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mata, mengobati cacar, dan sebagai daya tahan tubuh.

Tumbuhan rempah-rempah yang tergolong rimpang-rimpangan banyak digunakan masyarakat rempah-rempah yaitu bagian rimpang berjumlah 8 spesies, bagian buah berjumlah 6 spesies, bagian umbi berjumlah 2 spesies, bagian biji berjumlah 3 spesies, bagian daun berjumlah 4 spesies, bagian batang berjumlah 2 spesies sebagaimana yang tertera pada (Gambar.2).

Berdasarkan (Gambar 3), rimpang telah menjadi bagian tanaman yang umumnya banyak dimanfaatkan untuk terapi. Menurut Farhatul (2012), organ rimpang lebih sering dimanfaatkan dalam pengobatan karena lebih mudah diperoleh, disiapkan, dan mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan bagian lainnya. Handayani (2003) menyatakan bahwa rimpang lebih sering dimanfaatkan dalam pengobatan konvensional karena berfungsi sebagai tempat penumpukan fotosintat yang mengandung komponen bahan kimia organik yang dapat mengobati penyakit. Zat-zat tersebut antara lain fenol, senyawa kalium, dan minyak atsiri. Selain itu, penggunaan sebagai bahan obat tidak menyebabkan kerusakan jaringan tanaman yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman obat tersebut (Wahidah dkk, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di Desa Sukamaju paling sering mengolah tanaman rempah dengan cara direbus, ditumbuk, diparut, diremas, dicampur, dihancurkan, dan diiris. Perebusan adalah metode pengolahan yang paling sering digunakan sebanyak 11 jenis tumbuhan menggunakannya. Sementara itu, metode pengobatan yang paling tidak populer adalah dengan menumbuk atau menumbuk ketiga spesies secara terpisah tanpa menggabungkan, memarut, mengiris, menghancurkan, atau menguleni (meremas).

Berdasarkan teknik pengolahannya, teknik direbus paling banyak digunakan dalam pengobatan yaitu berjumlah 11 spesies yaitu kemiri, pala, seledri, jintan, kemangi, ketumbar, lada, temulawak, kapulaga, kayu manis, daun pandan, jeruk purut dan jeruk nipis.

Karena perebusan merupakan cara pengolahan tanaman obat yang paling sederhana jika dibandingkan dengan cara lain, maka masyarakat lebih sering menggunakan teknik pengolahan perebusan. Menggunakan suhu dan tekanan air panas, proses perebusan melibatkan pemanasan makanan dengan adanya pelarut, biasanya air. Semakin lama Anda menunggu air mencapai suhu dan tekanan yang tepat, semakin cepat air mendidih (Pujimulyani et al., 2010). Perebusan dengan menggunakan air yang kemudian air hasil rebusan diminum sebagai minuman herbal untuk mengobati suatu penyakit. Penggunaan air sebagai pelarut dikarenakan air bersifat polar, murah, mudah diperoleh, stabil serta tidak mudah menguap yang merupakan syarat mutlak air yang dapat dikonsumsi (Pradana dan marsono, 2013).

Menurut beberapa penelitian, perebusan (pemanasan) merupakan cara yang paling umum dalam menyiapkan tanaman obat. Menurut Yowa dkk. (2019), merebus tanaman obat diduga mampu melarutkan seluruh komponen nutrisi yang dikandungnya dalam air matang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Aryadi dkk. (2014) bahwa kelompok Dayak Utara menyiapkan tanaman obat dengan cara direbus atau direndam dalam air. Menurut (Adnyana, 2012), penggunaan pengolahan dengan berbagai prosedur menghasilkan berbagai jumlah dan jenis senyawa serta berbagai akibat dalam pengobatan penyakit. Kemudian perlu diperhatikan apakah tanaman memiliki kandungan racun yang harus dipanaskan pada api sedang 3-5 jam untuk mengurangi kadar racun yang terkandung di dalamnya. Dari sisi tersebut, sebenarnya pengobatan tradisional memiliki sedikit efek negative apabila dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan pengetahuan mendalam tentang tanaman yang ingin digunakan sebagai obat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis tanaman rempah-rempah yang diperoleh dari hasil wawancara pada masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara berjumlah 25 spesies tanaman yang terdiri dari 25 familia. Jenis tanaman yang paling banyak digunakan yaitu dari familia *Zingiberaceae* dan *Apiaceae*.
2. Bagian organ tanaman yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara dalam pengobatan tradisional yaitu bagian daun, rimpang, buah, biji, daun, batang dan umbi. Bagian tanaman yang paling banyak digunakan dalam pengobatan yaitu bagian rimpang dan daun.
3. Teknik pengolahan yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara dalam pengobatan tradisional yaitu teknik direbus, ditumbuk, diblender, diparut, dihaluskan, diiris, diperas, digebrek, diremas dan tanpa diramu. Teknik pengolahan yang paling banyak digunakan yaitu teknik direbus dan diblender.
4. Hasil skrining kandungan senyawa pada setiap spesies tanaman rempah-rempah yang digunakan oleh masyarakat Sukamaju dalam pengobatan tradisional diperoleh 20 spesies dari 25 spesies tanaman yang berpotensi sebagai kandungan senyawa tersebut memiliki aktivitas yang tinggi.

B. Saran

Adapun saran penulis untuk penelitian ini adalah, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait senyawa-senyawa pada tumbuhan rempah-rempah secara *in vitro* agar diperoleh hasil data yang lebih tervalidasi.



KEPUSTAKAAN

- Abbasy, D.W., Pathare, N., Al-Sabahi, J.N., Khan, S.A. 2015. "Chemical composition and antibacterial activity of essential oil isolated from Omani basil (*Ocimum basilicum* Linn.)". *Asian Pacific J. Trop. Dis.* Vol. 5. h: 645–649, doi:10.1016/S2222-1808(15)60905-7.
- Aditya, H. (2020). *Kapulaga Ratu Rempah Pembawa Berkah Potensi Prospektif Di Era Pandemi Covid-19.* (D. Pratama, Ed.) Bogor: Pt Penerbit Ipb Press.
- Ali, RM., Zainon, A.S., Nik, M.M., dan Norhar, H. (2010). *ASEAN Herbal and Medicinal Plants.* Jakarta: ASEAN Secretariat. h: 325-326.
- Al Muhdhar, MHI, dkk. "Keanekaragaman Tumbuhan Rempah dan Pangan Unggulan Lokal". Cetakan I, Penerbit Universitas Negeri Malang, 2018 h: 1-178.
- Anderson JW, Randles KM, Kendall CWC, Jenkins DJA. "Carbohydrate and fiber recommendations for individuals with diabetes. a quantitative assessment and meta analysis of the evidence". *J Am Coll Nutr*, Vol. 23. h: 5-17, 2014.
- Anggraini R. "Studi etnobotani masyarakat subetnis Batak Toba di Desa Peadungdung, Sumatera Utara", *Indonesia. Pro-Life.* 3(2). h: 129–142, 2016.
- Apriliani A, Sukarsa, Hidayau AH. "Kajian Etnobotani Tumbuhan Bahan Tambahan Pangan Secara Tradisional Oleh Masyarakat di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumna. Fakultas Biologi, Universitas Jendral Soedirman. Vol 1. h: 76-84, 2014.
- Arista Wahyu Ningsih. et al.. "Studi Fitokimia dan Aktivitas Farmakologi pada Tumbuhan Kapulaga (*Elletaria cardamomum* (L.) Maton). *Jurnal Sains Farmasi* Volume 4 No. 1 Maret 2023 h: 42-47.
- Azam, M.; Saba, I. Phytochemical screening and antibacterial activities of essential oil , ethanolic and methanolic extracts of *Ocimum basilicum* L . *Pakistan J. Biochem. Mol. Biol.* 2016, 49, 36–39.
- Aziz Isna Rasdianah., Susilo., Puji Rahajeng Anita Restu. "Peran Etnobotani Sebagai Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati Oleh Berbagai Suku di Indonesia". Jurusan Biologi SAINTEK, Prosiding Seminar Nasional Mengabiodiversitas Indonesia. ISBN; 978-602-72245 3-7, 2018.
- BPS Kabupaten Luwu Utara. "Kecamatan Sukamaju Dalam Angka 2021". Nomor Publikasi: 73220.2112
- Chahyadi, A., Hartati, R., Wirasutisna, K. R., and Elfahmi, 2014. *Boesenbergia Pandurata Roxb., An Indonesian Medicinal Plant: Phytochemistry,*

- Biological Activity, Plant Biotechnology. *Procedia Chemistry* 13, 13–37. doi: 10.1016/j.proche.2014.12.003.
- Chandur U., Shasidhrar S., Chandrasekar S.B. and Rao, M.N. 2010 Phytochemical Evaluation and Screening of Anti-arthritic Activity of *Alpinia galanga* (Linn), *INT. J. PH. SCI.*, Vol. 2 (2). h: 539-597, 2010.
- Dalimartha S. Atlas tumbuhan obat Indonesia: jilid 4. Jakarta: Puspa Swara, Anggota Ikapi; 2006: 11-15.
- De Guzman CC & J.S Siemonsma. PROSEA-Plant Resources of South-East Asia No. 13. Spices. Backhuys Publisher, *The Leiden Rain*. h: 120-127, 2015.
- Dung, N.X., Chinh, T.D. and Leclereg, P.A. 2011. Chemichal investigation of the aerial part of *Zingiber zerumbet* (L.) Sm. From Vietnam, *Journal of Essential Oil Research* 7(2): 153-157. Somchit, M.N., Hareet, M., and Shukriyah, N.M.H. 2003. Antiinflammatory property of ethanol and water extracts of *Zingiber zerumbet*. *Indian Journal of Pharmacology* 35:181-182.
- Dyah Pramesthi, Isyana Ardyati, Agus Slamet. Potensi Tumbuhan Rempah dan Bumbu yang Digunakan dalam Masakan Lokal Buton sebagai Sumber Belajar. *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi* ISSN 2580-0922 (online), ISSN 2460-2612 (print) Volume 6, Nomor 03. h: 225-232, 2010.
- Elansary, H.O.; Yessoufou, K.; Shokralla, S.; Mahmoud, E.A.; Skalicka-Woźniak, K. Enhancing mint and basil oil composition and antibacterial activity using seaweed extracts. *Ind. Crops Prod.* 2016, 92, 50–56, doi:10.1016/j.indcrop.2016.07.048
- Elmitra, E., Apriyanti, O., & Sepriani, T. L. (2019). Uji Efektivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Cabe Rawit (*Solanum frutescens*. L) Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*) Dengan Metode Induksi Caraagenan. *Journal Academi Pharmacy Prayoga*, 4(2), 1-13.
- Efremila, Evy Wardenaar, Lolyta Sisillia. 2015. "Studi Etnobotani Tumbuhan Obat Oleh Etnis Suku Dayak Di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak". *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 3 (2). h: 234 – 246.
- Fathiah. "Identifikasi Tanaman Jahe (*Zingiber Officinale*) Berdasarkan Morfologi". *Jurnal Agrifor* Volume 21 No.2 (Oktober 2022) Pp. 341-352.
- Fazal, S.S. and R.K. Singla. 2012. Review on the pharmacognostical & pharmacological characterization of *Apium Graveolens* Linn. *Indo Global Journal of Pharmaceutical Sciences*. 2(1): 36-42.
- Fatmawati, S. M., Setiawan, I., & Saryanti, D. (2019). Formulasi Dan Uji Efektivitas Sediaan Gel Antiseptik Ekstrak Daun Cabe Rawit (*Capsicum frutescens* L) Dengan Metode Replika. *Jurnal Ilmiah Pharmacy*, 6(1), 140-148.

- Ganesh, P., Suresh Kumar, R., & Saranraj, P. (2014). Phytochemical analysis and antibacterial activity of Pepper (*Piper nigrum* L.) against some human pathogens. *Scholars Research Library Central European Journal of Experimental Biology*, 3(2), 36–41. <http://scholarsresearchlibrary.com/archive.html>
- Guez, C.M., de Souza, R.O.; Fischer, P. 2017. "Evaluation of basil extract (*Ocimum basilicum* L.) on oxidative, anti-genotoxic and anti-inflammatory effects in human leukocytes cell cultures exposed to challenging agents". *Brazilian J. Pharm. Sci.* 53, doi:10.1590/s2175-97902017000115098.
- Hasriyania, Zulfa, A., Anggun, L., & Murhayati, R. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Biji Lada Hitam (*Piper nigrum* L) terhadap Bakteri *Escherichia coli*. *Indonesia Jurnal Farmasi*, 5(2), 14–18.
- Hakim Luchman, Jati Batoro, Kurniasih Sukenti. "Etnobotani Rempah-Rempah di Dusun Kopen Dukuh, Kabupaten Banyuwangi". Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas, *Jurnal PAL*, Vol. 6, No. 2, 2015 :h. 133-142.
- Hapshoh, S., Syukur, M., & Wahyu, Y. (2016). Pewarisan Karakter Kualitatif Cabai Hias Hasil Persilangan Cabai Besar dan Cabai Rawit. *Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy)*, 44(3), 286-291.
- Harpenas, Asep & R. Dermawan. 2010. *Budidaya Cabai Unggul*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Heriyanto, N.M., Endro S. "Ekologi Pohon Kluwak/Pakem (*Pangium edule* Reinw.) di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur". *Buletin Plasma Nutfah* Vol.14 No.1 Th. 2018 h: 33-42.
- Hiwasaki, L., Luna, E., Syamsidik, dan Shaw, R. "Local & Indigenous Knowledge For Community Resilience: Hydro-meteorological Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Coastal and Small Island Communities". Jakarta: *UNESCO*, 2014.
- Ifandi, S., Jumari, & Suedy S. W. A. "Knowledge Understanding and Utilization of Medicinal Plants by Local Community Tompu District of Kaili, Sigi Biromaru, Central Sulawesi". *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*. 8 (1). h: 1-11, 2016.
- Iskandar, B.S., Iskandar, J., Irawan, B. dan Partasasmita R. "Traditional Markets And Diversity Of Edible Plant Trading: Case Study In Ujung Berung, Bandung, West Java, Indonesia". *Biodiversitas*, 19 (2). h: 437-445, 2018.
- Izza, A.R.F., et al. "Indonesian Journal of Health Science". Volume 3 No.1, 2023 h: 1-6.

- Jawetz, M., & Melnick, J. dan Adelberg. 2008. *Medical Microbiology*. Jakarta: Salemba Medika.
- Jitvaropas, R., Saenthaweesuk, S., Somparn, N., Thuppia, A., Sireeratawong, S., and Phoolcharoen, W., 2012. "Antioxidant, Antimicrobial and Wound Healing Activities of *Boesenbergia rotunda*". *Natural Product Communications* 7(7), 909–912. doi: 10.1177/1934578x1200700727.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2012.
- Krisnawati Haruni, et.al., "*Aleurites moluccana* (L.) Willd. Ekologi, Silvikultur dan Produktivitas". CIFOR Bogor Indonesia, 2011 h: 1-12. ISBN 978-602-8693-49-3
- Maggio, A., Roscigno, G., Bruno, M., De Falco, E., Senatore, F. Essential-Oil Variability in a Collection of *Ocimum basilicum* L. (Basil) Cultivars. *Chem. Biodivers.* 2016, 1357–1368, doi:10.1002/cbdv.201600069.
- Maffi, L. dan Dilts, O. "Biocultural Diversity Toolkit". *British Columbia: Terralung*, 2014.
- Mamuaja, C.F., Frans S. "Aktivitas Antimikroba Ekstrak Biji Kluwek (*Pangium Edule*) Sebagai Bahan Pengawet Alami Bakso Ikan Tuna". *Jphpi*, Volume 20 Nomor 3, 2017 h: 592-691
- Marina Silalahi. "*Rotunda Boesenbergia* (L.). Mansfeld: Manfaat dan Metabolik Sekundernya". *Jurnal EduMatSains*. Vol.1 (2), 2017. h: 107-118.
- Melly Tribudiarti., Syamsuardi., dan Nurainas. "Studi Etnobotani Jenis Rempah Yang Digunakan Dalam Bumbu Masakan Tradisional Adat Di Kerajaan Rokan Kabupaten Rokan Hulu, Riau". *LIPi Berita Biologi jurnal Ilmu-ilmu Hayati*. 17 No. (2). h: 175-182, 2018.
- Milton, K. *Environmentalism and Cultural Theory: Exploring the role of anthropology in environmental discourse*. London and New York: *Routledge*. 2010.
- Mutaqin, A. Z., Muharani, A. Z. dan Husodo, T. "Studi Etnobotani Pemanfaatan Tumbuhan Rempah-Rempah sebagai Obat oleh Masyarakat Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Seminar Nasional Biologi V UNNES. h: 288-297, 2016.
- Nahak, G. dan R.K Sahu. 2011. Phytochemical Evaluation and Antioxidant Activity of *Piper cubeba* and *Piper nigrum*. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*. Vol. 1. No. 8. pp. 153-157.
- Nurmashita, D.; Rijai, L.; Sulistiarini, R. Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum basilicum* L.) Terhadap Aktivitas Antibakteri Basis Pasta Gigi. *J. Sains dan Kesehat*. 2015, 1, 159–167, doi:10.25026/jsk.v1i4.34.

- Nasution Jamilah., Riyanto., Radiansyah Hadi Chandra. "*Kajian Etnobotani Zingiberaceae Sebagai Bahan Pengobatan Tradisional Etnis Batak Toba Di Sumatera Utara*". Media Konservasi. 25. No. 1. h: 98-102, 2020.
- Nopitasari, D., Enny, F., Pratama "Triterpenoid dan Nanopartikel Ekstrak n-Heksana dari Rimpang Lengkuas Merah (*Alpinia purpurata* (Vieill.) K. Schum) Serta Uji Sitotoksitas dengan BSLT". Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 20 (3) (2017): 117 – 122.
- Pramesthi Dyah, Isyana Ardyati, Agus Slamet. "Potensi Tumbuhan Rempah dan Bumbu yang Digunakan dalam Masakan Lokal Buton sebagai Sumber Belajar". *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*. 06. (3). h: 225-232, 2020.
- Purwanto, Y. Studi etnomedisinal dan fitofarmakope tradisional Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional II Tumbuhan Obat dan Aromatik*. LIPI, Bogor. h: 96-109, 2011.
- Rahmah Siti Muthia. "Kajian Etnobotani Tumbuhan Bungur (*Lagerstroemia speciosa*) di Kawasan Hutan Bukit Tamiang Kabupaten Tanah Laut Sebagai Buku Ilmiah Populer", dalam Jurnal *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*. Vol. 07 (1). h: 1, 2021.
- Robi Yohanes, Siti Masitoh Kartikawati, Muflihati. "Etnobotani Rempah Tradisional Di Desa Empoto Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat". *Jurnal Hutan Lestari*. 7 (1). h: 130 – 142, 2019.
- Rukmana, R. 2010. Kentang Budidaya Dan Pasca Panen. Edisi Ii. Penerbit Kanisius. Yogyakarta
- Rukmana Rahmat, Ir. 2010. Temulawak: Tanaman rempah dan obat. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Silalahi M., Nisyawati, E. B. Walujo, J. Supriatna, dan Mangunwardoyo, W. "The Local Knowledge of Medicinal Plants Trader and Diversity Of Medicinal Plants in The Kabanjahe Traditional Market, North Sumatra, Indonesia". *Journal Of Ethno pharmacology*, 175. h: 432-443, 2015.
- Silalahi Marina. "Syzygium Polyanthum (Wight) Walp. (Botani, Metabolit Sekunder Dan Pemanfaatan)". *J D P Volume 10*, Nomor 1, April 2017: 1 – 16.
- Silva, V.A.; Sousa, J.P.; Guerra, F.Q.S.; Pessôa, H.L.F.; Freitas, A.F.R.; Alves, L.B.N.; Lima, E.O. Antibacterial activity of *Ocimum basilicum* essential oil and linalool on bacterial isolates of clinical importance. *Int. J. Pharmacogn. Phytochem. Res.* 2015, 7, 1066–1071.
- Singh, D., B. Hatwar., S. Nayak. 2011. Herbal Plants and Propionibacterium acnes: An Overview. *International Journal of Biomedical Research*. Vol. 2. No. 9. pp. 486-498.

- Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta, Lentera Hati, 2011.
- Sudarsono, Pudjoarnto A., Gunawan D., Wahyuono S., Donatus I.A., Drajad M., Wibowo S. dan Ngatidjan, Tumbuhan Obat I, Edisi I Cetakan II, *Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT) Universitas Gadjah Mda, Yogyakarta*. :h 19-23, 2016.
- Sulhatum,. Et Al., “Pengaruh Temperatur Dan Waktu Pemasakan Terhadap Perolehan Minyak Kemiri Dengan Menggunakan Cara Basah”. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal* 9:2 (November 2020) 54-60.
- Siti Nuraeni., Budiawati Supangkat., Johan Iskandar. “Kajian Etnobotani Tanaman Rempah Sebagai Bumbu, Obat dan *Kias*”. *UMBARA: Indonesian Journal Of Anthoropology*. Vol. 7 (1). h: 27-38, 2022.
- Soleh, Mengantara Sandra. “Karakteristik Morfologi Tanaman Kencur (*Kaempferia Galanga L.*) Dan Aktivitas Farmakologi”. *Farmaka* 257 Volume 17 Nomor 2. H: 256-262.
- Sudirja, 2007 *Budidaya Bawang Putih, Bawang Merah, Bawang Bombay*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sujarwo, W., Arinasa I.B.K., dan Fattorini S. “Cultural Erosion Of Balinese Indigenous Knowledge of Food And Nutraceutical Plants”. *Economic Botany*. 68. h: 426–437, 2014.
- Suminto dan Reza Lukiawan. "Kandungan Aflatoksin Pada Lada (*Piper nigrum L.*) Indonesia Dalam Pengembangan Standar Internasional Codex". *Jurnal Standardisasi*, Volume 20 (2). h: 97 – 108, 2018.
- Supriadi, S. “Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran”. *Lantanida Journal*. 3 (2).h: 127–139, 2017.
- Syamsudin Raden Aldizal., Et Al.. “Temulawak Plant (*Curcuma Xanthorrhiza Roxb*) As A Traditional Medicine”. *Jurnal Farmako Bahari*, Vol. 10 ; No. 1 ; Januari 2019 Halaman 51-65.
- Trivedi, M.N., A. Khemani.,U.D. Vachhani., C.P. Shah., dan D.D. Santani. 2011. Pharmacognostic, Phytochemical Analysis and Antimicrobial Activity of Two Piper Species. *International Journal of Comprehensive Pharmacy*. Vol. 7. No. 5. pp. 1- 4. Sulhatum,. Et al., “Pengaruh Temperatur Dan Waktu Pemasakan Terhadap Perolehan Minyak Kemiri Dengan Menggunakan Cara Basah”. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal* 9:2 (November 2020) 54-60
- Tambaru, Elis.“Keragaman Jenis Tumbuhan Obat Indigenous Di Sulawesi Selatan”. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*. 8 No. 15. h: 7–13, 2017.

- Tapundu, A. S., Anam S., Pitopang R. "Studi Etnobotani Tumbuhan Obat Pada Suku Seko di Desa Tanah Harapan Kabupaten Gisi Sulawesi Tengah", *Biocelebes*, Vol. 9 (2), 2015.
- Tjitrosoepomo, G. (2000). *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada press, 480.
- Titdoy Nia Rusfita., Th. W. Watuguly., P.M.J. Tuapattinaya. "Analisis Kadar Serat Pada Nugget Batang Lengkuas Muda (*Alpinia Galanga* L) Sebagai Penunjang Sumber Belajar Mata Kuliah Etnobotani". *Jurnal Biologi Pendidikan dan Terapan (Biopendix)*. 7. Nomor 2. h: 89-94, 2021.
- Verma R. K., Mishra G., Singh P., Jha K.K. and Khosa R.L., *Alpinia galangal*, An Important Medicinal Plant: A review, *Der Pharmacia Sinica*, Vol 2 (1). h: 142-154, 2011
- Warit, S., A Wish Lish of New Anti-Tuberculous Candidate Agents, *Siriraj. Med. J.*, Vol. 61. h: 34-36, 2019.
- Wahidah, Baiq Farhatul, and Fadly Husain. "Etnobotani Tumbuhan Obat Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Desa Samata". *Life Science*. 7 (2): 56-65, 2018.
- Widjaja, E.A., Rahayuningsih, Y., Rahajoe, J.S., Ubaidillah, R., Maryanto, I., Waluyo, E.B., dan Semiadi, G. "Kekiniaan Keanekaragaman Hayati Indonesia". Jakarta: *LIPI Press*, 2014.
- Wiratno, M., et.al. "Sirkuler Informasi Teknologi Tanaman Rempah dan Obat". Penerbit Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2019 h: 1-16.
- Yudianto "Tanaman Lada Dalam Perspektif Autekologi". Cv. Anugrah Utama Raharja (Aura) Anggota Ikapi No.003/Lpu/2013.
- Yuharmen, Y., Y. Eryanti, dan Nurbalatif. 2012. Uji Aktivitas Antimikrobia Minyak Atsiri dan Ekstrak Metanol Lengkuas (*Alpinia galanga*). *Jurnal Nature Indonesia*, 4 (2): 178-183.
- Zuhud, E. A. M., Sofyan, K., Prasetyo, L. B., & Kartodihardjo, H. "Sikap Masyarakat dan Konservasi: suatu analisis kedawung (*Parkia timoriana* (DC) Merr.) sebagai stimulus tumbuhan obat bagi masyarakat, kasus di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur". *Media Konservasi*, 12 (1). h: 22-32, 2017.

LAMPIRAN

Lampiran Kisi-kisi wawancara

a. Keterangan Pengumpulan Data

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
2. Apakah Anda mengetahui tentang tanaman Rempah – rempah digunakan sebagai pengobatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
4. Jika Ya, sebutkan tanaman rempah-rempah yang Anda ketahui?
5. Apakah Anda mengetahui khasiat dari tanaman rempah obat tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
6. Jika Ya, sebutkan khasiat dari tanaman rempah-rempah tersebut?
7. Bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan tanaman rempah-rempah sebagai pengobatan?

Lampiran Foto-foto Tanaman Rempah-rempah

 <p>Kunyit (Kunyi bulawan)</p>	<p>Keterangan:</p> <p>1. Rimpang</p>
--	---


 <p>Kunyit putih (Kunyit mabusa)</p>	<p>Keterangan: 2. Rimpang</p>
 <p>Jahe (Passalalia)</p>	<p>Keterangan: 3. Rimpang</p>
 <p>Kencur (Sa'ku)</p>	<p>Keterangan: 4. Rimpang</p>

 <p>Temulawak (Kunyi tammu)</p>	<p>Keterangan: 5. Rimpang</p>
 <p>Kapulaga (Kapulaga)</p>	<p>Keterangan: 6. Buah</p>
 <p>Lempuyang (Limpulang)</p>	<p>Keterangan: 7. Rimpang</p>

 <p>Lengkuas (Likku)</p>	<p>Keterangan: 8. Rimpang</p>
 <p>Temukunci (Kunci)</p>	<p>Keterangan: 9. Rimpang</p>
 <p>Lada (Merica)</p>	<p>Keterangan: 10. Biji</p>

 <p>Kemangi (Cemangi)</p>	<p>Keterangan: 11. Daun</p>
 <p>Ketumbar (Ketumbara)</p>	<p>Keterangan: 12. Biji</p>
 <p>Seledri (Daun So')</p>	<p>Keterangan: 13. Daun</p>

 <p>Jintan (Jinten)</p>	<p>Keterangan: 14. Biji</p>
 <p>Pala (Buah pala)</p>	<p>Keterangan: 15. Buah</p>
 <p>Kayu manis (Kaju canning)</p>	<p>Keterangan: 16. Batang</p>

 <p>Keluak (Kaloa)</p>	<p>Keterangan: 17. Buah</p>
 <p>Bawang merah (Lassuna mararang)</p>	<p>Keterangan: 18. Umbi</p>
 <p>Bawang putih (Lassuna mabusa)</p>	<p>Keterangan: 19. Umbi</p>

 <p>Cabai (Lada londong)</p>	<p>Keterangan: 20. Buah</p>
 <p>Pandan (Daun pandan)</p>	<p>Keterangan: 21. Daun</p>
 <p>Sereh (Daun sarre)</p>	<p>Keterangan: 22. Batang</p>

 <p>Jeruk purut (Lemo purut)</p>	<p>Keterangan: 23. Buah</p>
 <p>Jeruk nipis (Lemo nipi')</p>	<p>Keterangan: 24. Buah</p>
 <p>Kemiri (Kemiri)</p>	<p>Keterangan: 25. Buah</p>

Lampiran Foto Kegiatan Wawancara saat Penelitian :



Tampilan situs Kanaya (Penginputan nama ilmiah dari spesies tumbuhan)



KNASAcK Core System

Link to Top page:

http://www.knapsackfamily.com/knapsack_core/top.php

Incorporation to program:

[http://www.knapsackfamily.com/knapsack_core/info.php?sname=\[item\]&word=\[keyword\]](http://www.knapsackfamily.com/knapsack_core/info.php?sname=[item]&word=[keyword])

Here, [item] must be selected from one of the following words; "organism", "metabolite", "formula", "C_ID", and "CAS_ID".

< Example 1 >

Information on the metabolite assigned to C00000001 (a C_ID) can be retrieved by

http://www.knapsackfamily.com/knapsack_core/info.php?sname=C_ID&word=C00000001

< Example 2 >

The reported metabolites in Bacillus (an organism) can be retrieved by

http://www.knapsackfamily.com/knapsack_core/info.php?sname=organism&word=bacillus

Words for organisms or metabolites can be retrieved by providing at least three characters that forward matches with their strings.

CAUTION: (C) Any content included in KNASAcK database cannot be re-distributed or used for commercial purposes by any user without contacting with KNASAcK DB group ([skanaya\[at\]gto.naist.jp](mailto:skanaya[at]gto.naist.jp)).

[Instruction Manual\(Japanese\)](#)  [Instruction Manual\(English\)](#) 

Select by ...

ALL Types Organism Metabolite Molecular formula
 C_ID CAS_ID INCHI-KEY INCHI-CODE SMILES

List

Clear

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Senyawa-senyawa bioaktif pada tumbuhan



input type = all , input word = Curcuma longa

Number of matched data :167

C_ID	CAS ID	Metabolite	Molecular formula	Mw	Organism or InChIKey etc.
C00000136	470-82-6	1,8-Cineole	C10H18O	154.1357652	Curcuma longa
C00000149	6750-60-3	Espatulenol	C15H24O	220.18271539	Curcuma longa
C00000152	7400-08-0	p-Coumaric acid	C9H8O3	164.04734412	Curcuma longa
C00000164	473-15-4	beta-Eudesmol	C15H26O	222.19836545	Curcuma longa
C00000615	501-16-6	Caffeic acid	C9H8O4	180.04226874	Curcuma longa
C00000616	127-91-3	beta-Pinene	C10H16	136.12520051	Curcuma longa
C00000819	76-22-2	(+)-Camphor	C10H16O	162.12011513	Curcuma longa
C00000823	138-86-3	Limonene	C10H16	136.12520051	Curcuma longa
C00000839	13460-70-9	3-Carene	C10H16	136.12520051	Curcuma longa
C00000853	123-35-3	beta-Myrcene	C10H16	136.12520051	Curcuma longa
C00000861	586-62-9	alpha-Terpinolene	C10H16	136.12520051	Curcuma longa
C00001209	506-30-9	Arachidic acid	C20H40O2	312.30283052	Curcuma longa
C00001224	60-33-3	Linoleic acid	C18H32O2	280.24023027	Curcuma longa
C00001232	112-80-1	Oleic acid	C18H34O2	282.25588033	Curcuma longa
C00001233	57-10-3	Palmitic acid	C16H32O2	256.24023027	Curcuma longa
C00001238	57-11-4	Octadecanoic acid	C18H36O2	284.27153039	Curcuma longa
C00002697	123-08-0	4-Hydroxybenzaldehyde	C7H6O2	122.03677944	Curcuma longa
C00002682	121-34-6	Vanillic acid	C8H8O4	168.04226874	Curcuma longa
C00002683	5463-22-9	Vanillin	C8H8O3	152.04734412	Curcuma longa
C00002725	104-55-2	Cinnamaldehyde	C9H8O	132.05751468	Curcuma longa
C00002728	458-36-6	Coniferaldehyde	C10H10O3	178.06299419	Curcuma longa
C00002731	458-37-7	Curcumin	C21H20O6	368.12598837	Curcuma longa
C00002743	1135-24-6	Ferulic acid	C10H10O4	184.05790881	Curcuma longa
C00003028	507-70-0	Borneol	C10H18O	154.1357652	Curcuma longa
C00003040	99-87-6	p-Cymene	C10H14	134.10955045	Curcuma longa
C00003046	105-87-3	Geranyl acetate	C12H20O2	196.14632988	Curcuma longa
C00003047	78-70-6	linalool	C10H18O	154.1357652	Curcuma longa
C00003051	99-83-2	alpha-Phellandrene	C10H16	136.12520051	Curcuma longa
C00003110	87-44-5	beta-Caryophyllene	C15H24	204.18780077	Curcuma longa
C00003111	469-61-4	alpha-Cedrene	C15H24	204.18780077	Curcuma longa

Activate Windows
Go to Settings to activate Wi

Tampilan situs Pubchem (Pencarian kode canonical SMILE senyawa)

The image displays two screenshots of the PubChem website. The top screenshot shows the search interface with the query "1,8-Cineole". The search results are organized into two columns: "Compound" and "Gene".

Compound	Gene
1,8-Cineole	immunity related GTPase cinema
2-Acetoxy-1,8-cineole	immunity related GTPase cinema 1
2,3-Dehydro-1,8-cineole	centriole, cilium and spindle associated protein
2-exo-hydroxy-1,8-cineole	
2-endo-hydroxy-1,8-cineole	

The bottom screenshot shows the detailed page for Eucalyptol (Compound). The page includes the following sections:

- 2.1.4 Canonical SMILES:** CC1(C2CCC(O1)(CC2)C)C
- 2.2 Molecular Formula:** $C_{10}H_{18}O$
- 2.3 Other Identifiers:**
 - 2.3.1 CAS:** 470-82-6

The right sidebar contains a "CONTENTS" menu with the following items:

- 5 Related Records
- 6 Chemical Vendors
- 7 Drug and Medication Information
- 8 Food Additives and Ingredients
- 9 Pharmacology and Biochemistry
- 10 Use and Manufacturing
- 11 Safety and Hazards
- 12 Toxicity
- 13 Associated Disorders and Diseases
- 14 Literature
- 15 Patents
- 16 Interactions and Pathways
- 17 Biological Test Results
- 18 Taxonomy
- 19 Classification
- 20 Information Sources

Lampiran Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Sukamaju

No	Nama Indonesia	Jenis Penyakit	Bagian Yang Digunakan	Takaran Ramuan		Pengelolaan		Dosis	Campuran
				Jml	Satuan	Teknik Pengelolaan	Lama Perebusan	Aturan Pakai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kunyit	Penyakit gula	Rimpang	Lima	5	Diparut	Tanpa direbus	1x sehari	Jahe, kencur, diparut lalu ditapis tambahkan telur ayam 1 biji (dibuang Putih telur) setelah itu lalu diminum
2.	Kunyit putih	Sejenis kanker	Rimpang	Tiga ruas rimpang kunyit	3	Diblender	Tanpa direbus	1x sehari	Kencur, jahe, diblender lalu ditapis tambahkan

									kuning telur lalu diminum
3.	Jahe	Penghangat badan, menurunkan batuk, masuk angin, penyakit ginjal	Rimpang	Tiga ruas jahe	3	Diblender	Tanpa direbus	2x sehari	Campurkan jahe, kunyit, lengkuas, madu dan telur lalu diblender setelah diblender ditapis lalu diminum
4.	Kencur	Sebagai nafsu makan	Rimpang	Tiga ruas	3	Diblender	Tanpa direbus	2x sehari	Kencur 3 ruas dengan tepung beras 3 sendok lalu madu 1 sendok tambahkan air hangat

									setengah gelas kemudian diblender lalu di tapis setelah itu langsung diminum
5.	Temulawa k	Diabetes	Rimpang	Tiga 3	Diblender	10 menit	2x sehari	Siapkan 3 temulawak dicampur gula aren diblender kemudian direbus lalu di minum	
6.	Kapulaga	Pilek dan diabetes	Buah	Dua buah 2	Haluskan	5 menit	1x sehari	Hancurkan/ haluskan 2 buah kapulaga, dan iris jahe 1ruas dan	

									masukkan ke dalam air mendidih. Kemudian tambahkan daun teh, madu dan susu lalu disaring kemudian di minum
7.	Lempuyang	Untuk penyegaran rasa, menambah gizi badan, menghilangkan bau badan	Rimpang	Dua rimpang	2	Diparut	Tanpa diramu	2x sehari	Kelapa muda diparut dicampur 2 rimpang lempuyang, cemangi, garam sedikit lalu dipepes ditempel di

									badan. it
8.	Lengkuas	Penyakit saraf	Rimpang	Tiga	3	Diblender	7 menit	1x sehari	Lengkuas dicampur dengan jahe merah, kunyit putih, berikan air hangat sebanyak 1 gelas lalu di blender kemudian ditapis ampas yg sdah diblender setelah itu air tapisan kita tuang ke gelas lalu di minum
9.	Temukunci	Untuk	Rimpang	Dua	2	Ditumbuk	5 menit	1x sehari	2 Rimpang


		penyegaran segar dalam apapun	umbi	rimpang				umbi ditumbuk lalu di campurkan segala macam sayur lalu kita masak	
10	Lada	Demam dan Masuk angin	Buah	5gr	5 ml	Tanpa diramu	Direbus 10 menit	2x sehari	merica 5 gram, jahe 15 gram, kayu manis 1 jari, biji pala 5 gram, cengkeh 5 butir, bangle 10 gram. cuci semua bahan tersebut sampai bersih kemudian rebus dengan

									1 liter. direbus bahan-bahan tersebut sampai mendidih dan menyisahkan sekitar 500 ml. Lalu saring dan bagi dua sama banyak, setelah dingin di minum air rebusan merica tersebut.
11	Kemangi	Menurunkan Asam lambung	Daun	Empat- Lima lembar	4-5	Tanpa diramu	Direbus 5 menit	2xsehari	Sediakan empat lembar sampai lima lembar daun

									<p>kemangi segar. Rebus daun kemangi dengan air secukupnya sampai mendidih. minum air rebusan kemangi selagi masih hangat.</p>
12	Ketumbar	Menurunkan Asam urat	Daun	Segenggam	Segenggam	Tanpa diramu	Direbus 10 menit	1x sehari	<p>ambil segenggam daun ketumbar dan masukkan ke dalam dua gelas air Rebus selama</p>

									10 menit Saring airnya sebelum dikonsumsi.
13	Seledri	Menurunkan tekanan darah	Daun/Batan g	Tiga-Lima	3-5	Diiris-iris	Direbus 10 menit	1x sehari	Siapkan 3-5 daun seledri cuci terlebih dahulu, kemudian di iris lalu rebus ke air yang sudah mendidih. Setelah itu, boleh diminum setelah dingin atau hangat.
14	Jintan	Meredakan	Daun/Biji	Lima	5	Tanpa	Direbus	2x sehari	5 daun jintan

.		Batuk		lembar		diramu	10 menit		<p>ukuran 5 - 7 cm lalu cuci hingga bersih sebelum direbus. Selanjutnya, rebus 10 menit daun jintan bersamaan dengan 2 gelas air minum hingga warnanya berubah kekuningan. Lalu, diamkan hingga suhu air berubah menjadi</p>
---	--	-------	--	--------	--	--------	----------	--	--



									hangat, selanjutnya minum sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari.
15	Pala	Mengatasi insomnia	Biji	Dua biji	2	Ditumbuk	Direbus 5 menit	1x dalam 3 hari	Siapkan dua biji pala, tumbuk hingga halus Masukan bubuk pala ke dalam gelas berisi air hangat, aduk hingga rata Diamkan kurang lebih


									selama lima menit Saring, boleh ditambahkan madu secukupnya Minum tiga jam sebelum tidur. Ramuan herbal ini hanya boleh dikonsumsi untuk tiga hari saja
16	Kemiri	Mengatasi sembelit	Buah	Satu buah	1	Dihaluskan	Direbus selama 5 menit		ambil 1 buah kemiri, 2 bawang bombay, 5 gram palasari,

									taruh di gelas. Minumlah dua kali sehari, dan minum sebanyak 200 cc sekali minum
17	Kayu manis	Maag	Batang	Dua batang	1965 2	Dihaluskan	Direbus 13 menit	2x sehari	ambil 1 buah kemiri, 2 bawang bombay, 5 gram palasari, 10 gram kayu manis, 30 gram daun urang-aring, 1/2 sdt garam, 1/2 sdt adas, 800 cc air.


										<p>Haluskan semua bahan (tanpa 800 cc air) hingga halus. Lalu rebus semua bahan dengan 800 cc air. Rebus hingga volumenya minimal 400 cc. Saring dan taruh di gelas. Minumlah dua kali sehari, dan minum sebanyak 200 cc sekali minum.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	Kluwak	Meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah hipertensi, kanker, kesehatan pencernaan, dan anemia	Buah	Satu buah	1	Ditumbuk	dimasak	15 menit	Ditumbuk, sebagai bumbu masakan rawon
19	Bawang merah	Sebagai daya tahan tubuh kuat	Umbi	Tiga siung	3	Diris-iris	Rendam 6-8 jam	2x sehari	Iris Bawang Merah lalu rendam dalam air minum sekitar 6 - 8 jam. Minum ramuan ini dengan dosis 2 x sehari dengan ukuran

									takar 2 sdm setiap minum.
20	Bawang putih	Batuk pilek dan menurunkan demam untuk anak 1-12 tahun	Umvi	Satu siung	1	Diiris-iris	8 jam	2-3 hari	Masukan bawang merah, bawang putih, dan jahe yang sudah diiris berisi madu. Masukan juga air perasan jeruk nipis. Tutup botol, kocok hingga semua bahan tercampur. Diamkan ramuan di suhu kamar



									waktu 2-3 hari.
21	Cabai rawit	Rematik	Buah	9,75 gr	15	Diblender	Dibalurkan pada bagian tubuh yang sakit	2x sehari dibalurkan	15 cabai rawit, 1/2 sendok teh kapur sirih, 1 jeruk nipis. Cabai rawit digiling hingga halus, jeruk nipis dibelah dua, ambil airnya. Campur gilingan cabai, kapur sirih, dan perasan jeruk nipis, diaduk hingga rata. Balurkan



									ramuan tersebut pada bagian tubuh yang sakit. Lakukan hingga penyakit sembuh.
22	Daun pandan	Radang sendi dan nyeri sendi	Daun	Tiga-Empat lembar	3-4 lembar	Diblender	Direbus	10 menit	Siapkan 940 ml air, 3-4 lembar daun pandan (jumlahnya boleh lebih), Cuci bersih daun pandan. Buang bagian bawah yang berwarna

										<p>putih agar tidak pahit. Ikat simpul/ blender daun pandan agar aroma dan sari-sarinya keluar. Rebus air hingga mendidih, lalu masukkan daun pandannya. Masak sekitar 5 sampai 10 menit. Istirahatkan sebentar untuk mengeluarkan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>sisa sari-sarinya.</p> <p>Saring dan dinginkan sekitar 5-10 menit.</p> <p>Kemudian rebusan daun pandan siap digunakan dan bisa meminumnya langsung atau mencampurnya dengan bahan untuk membuat kue, puding, ataupun</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


									minuman lainnya.
23	Sereh	Mengatasi perut kembung	Batang	Tiga batang	3 batang	Digebrek	Masak	1x sehari	Siapkan 3 batang serai yang sudah digeprek. Jahe seukuran jempol yang sudah digeprek atau sesuai selera, tambahkan 100 g gula aren/gula merah, 600 ml air. Masukkan semua bahan-bahan yang

									tersedia ke dalam panci. Masak hingga gula aren mencair dan air tersisa sampai 200 ml. Aduk hingga mengeluarkan wangi khas tanaman serai. Tuangkan ke dalam gelas atau cangkir teh.
24	Jeruk purut	Influenza	Buah	Satu buah	1 buah	Diiris	Air direbus	1x sehari	Siapkan satu buah jeruk purut matang.

									<p>Kemudian cuci dan potong/iris jeruk purut menjadi dua bagian. Setelah itu, peras jeruk purut dan campurkan air jeruk purut dengan 60 cc air panas lalu, minum air seduhan jeruk purut selagi hangat.</p>
25	Jeruk nipis	Obat batuk	Buah	60 gram	1 buah	Diiris	Air direbus	1-2x sehari	Peras sebagian atau setengah

									irisan jeruk nipis berukuran besar, bisa disesuaikan dengan selera. Campurkan perasan jeruk nipis ke dalam teh atau air hangat sebanyak 100 ml. Setelah tercampur, tuangkan 2 sendok makan madu ke dalamnya, lalu aduk hingga
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

									larut dan minum selagi hangat, rutin meminumnya 1-2 kali sehari selama gejala batuk berlangsung.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Alda Ramadan A. Sofyan, lahir di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Pada tanggal 10 Desember 1999. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Andi Sofyan dan Halija. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Penulis memulai Pendidikan sekolah dasar ketika beranjak umur 7 tahun di SDN 172 Sukamaju I, Selama 6 tahun dan pernah mengikuti organisasi pramuka. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sukamaju, Kelurahan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara selama 3 tahun. Seiring berjalannya waktu penulis pun melanjutkan studinya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA 2 Luwu Utara, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Selama 3 tahun. Penulis pernah mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) dalam bidang Biologi antar Kecamatan dan Alhamdulillah penulis mendapatkan juara III. Kemudian setelah satu tahun lulus Sekolah Menengah Atas, penulis lulus mendaftarkan diri di Universitas Islam Alauddin Makassar (UIN-AM), fakultas Sains dan Teknologi prodi Biologi melalui jalur SPAN-PTKIN. Jangan menyerah, menderita sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya, dan iringi segala sesuatu dengan Bismillah dan jangan lupa Doa orang tua.

aldramadani04@gmail.com