

**DETERMINAN KEJADIAN *STUNTING* PADA BALITA DI WILAYAH  
KERJA PUSKESMAS KATUMBANGAN KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**AFIFAH CAHYA IMANI ARIFIN**

**NIM: 70200118038**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa/i yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Cahya Imani Arifin  
NIM : 70200118038  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 14 April 2000  
Jurusan/ Konsentrasi : Epidemiologi  
Alamat : Jalan Tamangapa Raya 3 Perumahan Pesona Prima  
Griya blok Sun Flower No. 25  
Judul : Determinan Kejadian *Stunting* pada Balita di Wilayah  
Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali  
Mandar tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.



Gowa, 20 November 2023  
Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Afifah Cahya Imani Arifin', is written over the printed name.

Afifah Cahya Imani Arifin  
NIM. 70200118038

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Determinan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022*” yang disusun oleh Afifah Cahya Imani Arifin, NIM: 70200118038, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 11 Desember 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 22 Januari 2024  
11 Rajab 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes (.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)
Munaqisy I	: Nildawati Amir, SKM., M.Kes (.....)
Munaqisy II	: Dr. Susmihara, M.Pd (.....)
Pembimbing I	: Dr. Bs. Titi Haerana, SKM., M.Kes (.....)
Pembimbing II	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes (.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes  
NIP: 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Determinan Kejadian *Stunting* pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022”**, sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda H. Arifin Mallongi (Alm) dan Ibunda Hj. Ida Farida yang telah membesarkan, merawat serta mendidik penulis dengan rasa sabar, ikhlas, penuh cinta dan kasih sayang. Begitu pun kepada kakak-kakak, Dafrid Cahyadi Arifin, Fadil Abdillah Arifin dan Afif Wahyudi Arifin serta seluruh keluarga yang selalu menjaga, mendukung dan mendoakan penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka semua, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A., Wakil Rektor III Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd., dan Wakil Rektor IV Prof. Dr. H.

Muhammad Amri, Lc., M.Ag., yang telah membina dan memimpin UIN Alauddin Makassar sebagai tempat bagi penulis untuk memperoleh ilmu.

2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I Dr. apt. Isriani Ismail, S.Si., M.Si., Wakil Dekan II Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Dr. Patimah, S.Kep, Ns., M.Kes., yang telah membina penulis selama menempuh studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya yang telah membina, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
4. Dr. Bs. Titi Haerana, SKM., M.Kes., dan Emmi Bujawati, SKM., M.Kes., selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Nildawati Amir, SKM., M.Kes dan Dr. Susmihara, M.Pd., selaku Penguji I dan II yang telah memberi banyak saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Hj. Syarfaini, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam hal akademik.
7. Para dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangatnya bagi penulis selama menempuh studi.
8. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
9. Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018, khususnya teman-teman Kesmas A, peminatan Epidemiologi, PBL, Magang dan teman KKN yang selalu membantu dan saling mendukung.

10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan Aparat Desa Katumbangan yang telah membantu dalam hal administrasi serta telah memberikan izin untuk penelitian.
11. Kepala UPTD Puskesmas Katumbangan dan jajarannya yang telah membantu dan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
12. Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ikut membantu.

Akhirnya, skripsi ini dapat dirampungkan. Semoga kebaikan dan kemurahan hati dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, *Aamiin ya rabbal 'alamiin..*



Gowa, 20 November 2023  
Penulis,

**Afifah Cahya Imani Arifin**  
NIM: 70200118038

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-26
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	12
G. Kajian Pustaka.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27-61
A. Tinjauan tentang Stunting.....	27
B. Tinjauan tentang Balita.....	52
C. Kerangka Teori.....	60
D. Kerangka Konsep.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	62-70
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	62
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	62
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	62
D. Metode Pengumpulan Data.....	65
E. Instrumen Penelitian.....	65
F. Uji Validitas dan Reabilitas.....	66
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71-116
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
B. Hasil Penelitian.....	74
C. Pembahasan.....	92
D. Keterbatasan Penelitian.....	115
BAB V PENUTUP.....	116-117
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu Terkait Kejadian <i>Stunting</i> .....	17
Tabel 2.1	Indeks Antropometri Anak berdasarkan Tinggi/ Panjang Badan menurut Umur (TB/U atau PB/U) .....	33
Tabel 2.2	Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi .....	44
Tabel 2.3	Jadwal Pemberian Imunisasi Lanjutan pada Balita .....	44
Tabel 2.4	Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> .....	50
Tabel 2.5	Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> .....	51
Tabel 3.1	Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian .....	66
Tabel 3.2	Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian.....	67
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Karakteristik dan Faktor Sosial Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 .....	75
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Karakteristik dan Faktor Sosial Ayah di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 .....	77
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Keluarga berdasarkan Faktor Ekonomi dan Demografi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 .....	79
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Sampel berdasarkan Karakteristik Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 .....	80
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Faktor yang Memengaruhi Kejadian <i>Stunting</i> di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 .....	82
Tabel 4.6	Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian <i>Stunting</i> di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 .....	85
Tabel 4.7	Hasil Analisis Bivariat untuk Seleksi Pemodelan Multivariat .....	89
Tabel 4.8	Analisis Multivariat Regresi Logistik Ganda antara Variabel Independen terhadap Kejadian <i>Stunting</i> di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 .....	90

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Prevalensi Balita *Stunted* (Tinggi Badan menurut Umur) berdasarkan Provinsi Tahun 2021 ..... 28
- Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ..... 71



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Informed-Consent* (Pernyataan Persetujuan Ikut Penelitian)
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Keterangan Layak Etik Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Puskesmas Katumbangan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Desa Katumbangan
- Lampiran 9 Lembar Hasil Uji Similariti Skripsi
- Lampiran 10 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 11 Master Tabel
- Lampiran 12 Hasil Analisis Data



## ABSTRAK

Nama : Afifah Cahya Imani Arifin

NIM : 70200118038

Judul : Determinan Kejadian *Stunting* pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

---

*Stunting* terjadi akibat dari defisiensi zat gizi yang diterima oleh anak pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai saat anak masih berada di dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. *Stunting* berdampak pada peningkatan angka mortalitas, morbiditas dan disabilitas serta dapat menghambat proses perkembangan otak, sistem saraf dan fisik pada anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan analitik observasional dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional study*. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan sebanyak 1.353 orang dengan jumlah sampel sebanyak 309 balita menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi badan ayah ( $p=0.013$ ), panjang badan lahir ( $p=0.003$ ), pemberian ASI eksklusif ( $p=0.034$ ) dan riwayat penyakit infeksi ( $p=0.002$ ) memiliki hubungan terhadap kejadian *stunting*. Sedangkan, tinggi badan ibu ( $p=0.410$ ), berat badan lahir ( $p=0.908$ ), waktu pemberian MP-ASI ( $p=0.476$ ), status imunisasi ( $p=0.585$ ) dan pemberian vitamin A ( $p=0.145$ ) tidak memiliki hubungan terhadap kejadian *stunting*. Variabel yang memiliki hubungan yang bermakna dan paling dominan terhadap kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar adalah tinggi badan ayah dengan nilai AOR sebesar 2.375 (95% CI: 1.207 – 4.673).

Untuk mencegah terjadinya peningkatan prevalensi *stunting*, diperlukan untuk melakukan penyuluhan dan pemberian informasi secara rutin kepada remaja, calon ibu dan para ibu dalam meningkatkan pengetahuan terkait *stunting*, menumbuhkan kesadaran para ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada anak dan cara penanganan penyakit infeksi pada anak serta diperlukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala bagi kesehatan ibu hamil.

Kata Kunci: *stunting*, balita, determinan, panjang badan lahir

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Masa balita atau dikenal sebagai *golden age* adalah suatu masa dimana anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat serta penting untuk diperhatikan secara cermat agar dapat mendeteksi jika terjadi kelainan sedini mungkin. Proses tumbuh kembang anak memerlukan asupan gizi yang seimbang agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik, jika asupan gizi yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi maka proses tersebut akan terhambat sehingga masa ini dapat disebut juga sebagai periode kritis (Azrimaidaliza dkk., 2019).

Masalah gizi kronis seperti gizi buruk, *hidden hunger* dan kelebihan berat badan (*overweight*) merupakan masalah gizi kronis yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Tiga masalah gizi tersebut terjadi secara bersamaan di beberapa negara di seluruh dunia terutama di negara berkembang. Ini berarti bahwa di suatu negara mungkin sedang menghadapi tantangan untuk mengatasi tingginya angka *stunting*, defisiensi mikronutrien dan obesitas atau di suatu keluarga mungkin saja memiliki ibu yang kelebihan berat badan dan balita yang menderita *stunting*. Hal tersebut merupakan tren yang dikenal sebagai *The Triple Burden of Malnutrition* (beban rangkap tiga dari malnutrisi) yang dapat mengancam kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak serta ekonomi dan masyarakat (WHO, 2019).

*Stunting* adalah masalah kekurangan gizi kronis yang terjadi pada balita (bayi di bawah lima tahun) disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama sehingga balita mengalami gangguan pada pertumbuhannya

seperti tinggi badan yang lebih rendah atau pendek dari balita seusianya (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Kekurangan gizi terjadi pada saat bayi masih berada dalam kandungan dan pada masa awal kelahiran, akan tetapi kondisi *stunting* baru terlihat ketika bayi memasuki usia dua tahun. Status gizi buruk pada balita dapat memberikan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yang akan dialami oleh balita *stunting* adalah terhambatnya pertumbuhan fisik, mengalami gangguan perkembangan pada otak dan kecerdasan serta gangguan pada sistem metabolisme dalam tubuh. Sedangkan, dampak negatif jangka panjang yaitu perkembangan kognitif dan fisik menurun, daya tahan tubuh yang menurun sehingga mudah sakit dan berisiko terkena penyakit degeneratif, produktivitas menurun dan mengalami asfiksia saat melahirkan (Sutriyawan dkk., 2020).

Prevalensi *stunting* secara global mencapai angka 22% atau sekitar 149,2 juta anak di seluruh dunia pada tahun 2020. Sekitar 53% atau setengah dari populasi balita yang mengalami *stunting* berasal dari Asia. Dari 79 juta balita *stunting* di Asia, proporsi yang terbanyak dari Asia Selatan sebesar 30,7% atau sekitar 54,3 juta balita. Asia Tenggara menempati urutan keempat dengan proporsi sebesar 27,4% atau sekitar 15,3 juta balita. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan proporsi *stunting* yang tinggi yaitu 31,8% atau sebanyak 7.523.300 balita (WHO, 2021).

Masalah *stunting* dianggap tinggi apabila prevalensinya sebesar 20-30% dan sangat tinggi apabila prevalensinya sebesar  $\geq 30\%$  (WHO, 2021). Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi balita yang *stunting* berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) di Indonesia yaitu 24,4%. Artinya, prevalensi *stunting* di Indonesia tergolong tinggi. Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi kedua setelah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka

prevalensi sebesar 33,8%. Prevalensi *stunting* tertinggi di provinsi Sulawesi Barat berada di kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 36% (Kementerian Kesehatan RI, 2021a).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021, jumlah balita yang menderita *stunting* berdasarkan status gizi TB/U di kabupaten Polewali Mandar sebanyak 7.657 anak (23,84%) dengan kategori sangat pendek sebanyak 1.944 balita dan kategori pendek sebanyak 5.713 balita. Kejadian *stunting* tertinggi di kabupaten Polewali Mandar berada di kecamatan Campalagian sebanyak 1.364 balita (17,81%) dengan kategori sangat pendek sebanyak 329 balita dan kategori pendek sebanyak 1.035 balita.

Wilayah kerja puskesmas Katumbangan merupakan suatu wilayah yang memiliki prevalensi kejadian *stunting* tertinggi di kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 42,6% atau sebanyak 559 balita dengan kategori sangat pendek sebanyak 174 balita dan kategori pendek sebanyak 385 balita yang terdapat di kecamatan Campalagian (Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2021).

Kejadian *stunting* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu penyebab dasar, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Faktor penyebab dasar terjadinya *stunting* antara lain pendidikan, status ekonomi, faktor sosial budaya, politik, disparitas dan kebijakan pemerintah. Faktor penyebab langsung yaitu kurangnya asupan gizi seperti pemberian ASI eksklusif dan asupan energi yang tidak mendukung serta riwayat penyakit infeksi pada balita. Sedangkan, faktor penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* yaitu ketahanan pangan rumah tangga dimana anggota keluarga mendapatkan bahan makanan yang cukup dan bergizi, pola asuh dan pola makan dalam keluarga serta kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan seperti pemberian imunisasi dan vitamin A untuk balita (UNICEF, 2013).

Pemberian ASI yang dihasilkan oleh ibu mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. UNICEF dan WHO telah menetapkan bahwa pemberian ASI eksklusif yaitu pemberian ASI tanpa menambahkan minuman atau makanan lain sampai bayi berusia enam bulan. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia merekomendasikan kembali pemberian ASI eksklusif dari usia empat bulan menjadi enam bulan (Kementerian Kesehatan RI, 2014b ; Mufdlilah, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah dkk. (2020) bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* pada balita usia 1-5 tahun. Pemberian ASI sampai usia enam bulan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi.

Setelah bayi mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan, bayi memerlukan makanan pendamping untuk memenuhi kebutuhan gizinya. WHO dan UNICEF mewajibkan setiap bayi usia 6-23 bulan untuk mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat dengan ketentuan minimal empat atau lebih dari tujuh jenis makanan seperti sereal/ umbi-umbian, kacang-kacangan, produk dengan olahan susu, telur, sumber protein lainnya, sayur dan buah yang kaya akan vitamin A serta sayur dan buah lainnya (Wandini dkk., 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zogara dkk. (2021) menunjukkan bahwa waktu pemberian MP-ASI berhubungan dengan status gizi balita. Pemberian MP-ASI pada bayi usia <6 bulan dapat mengganggu proses pemberian ASI eksklusif pada bayi serta dapat memicu penyakit dikarenakan enzim pencernaan pada bayi belum mampu mencerna makanan kasar sampai bayi berusia enam bulan.

Kekurangan gizi menjadi salah satu hal yang menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu asupan makanan yang diterima oleh anak setiap harinya tidak sebanding dengan kebutuhan anak untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari (Lusiani dan Anggraeni,

2021). Balita yang menderita penyakit infeksi dalam jangka waktu yang lama dan berulang akan mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh, kehilangan energi dalam tubuh serta menghambat pertumbuhan anak sehingga anak akan memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya (Sutriyawan dkk., 2020). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamalding dkk. (2020) bahwa balita yang sering menderita penyakit seperti diare, ISPA, demam, batuk, pilek, DBD dan penyakit lainnya kemungkinan besar dapat mengalami *stunting* dan cenderung mengalami gejala sisa (sekuel) karena infeksi umum yang dapat melemahkan keadaan fisik pada anak.

Status imunisasi juga dapat memengaruhi kejadian *stunting*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mianna dan Harianti (2020) bahwa status imunisasi pada balita memiliki hubungan secara signifikan terhadap kejadian *stunting*. Balita berusia 24-59 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap memiliki risiko 2,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang mendapatkan imunisasi lengkap. Balita yang tidak memiliki imunitas terhadap suatu penyakit akan cepat kehilangan energi di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh penyakit infeksi. Manfaat dari imunisasi adalah memberikan perlindungan atau kekebalan yang efektif dalam mencegah penularan penyakit sehingga dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas yang dapat diakibatkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) (Wanda dkk., 2021).

Pemberian vitamin A pada balita merupakan salah satu program pemerintah dalam menanggulangi masalah *stunting* di Indonesia. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2009, vitamin A adalah salah satu zat gizi paling penting yang dapat larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Vitamin A dapat memengaruhi proses sintesis protein sehingga dapat memengaruhi proses pertumbuhan sel. Anak yang

mengalami kekurangan vitamin A dapat mengalami hambatan dalam proses tumbuh kembang (Syafriana dkk., 2019).

Berdasarkan WHO (2016) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *stunting*, salah satu faktor penyebab utamanya adalah faktor ibu. Faktor ibu seperti gizi buruk pada saat kehamilan, perawakan ibu pendek, infeksi, kehamilan pada usia dini, jarak kelahiran pendek, *Intra Uterine Growth Restriction* dan kelahiran prematur, kesehatan mental yang buruk serta riwayat penyakit hipertensi.

Orang tua yang memiliki tubuh pendek karena masalah patologis (defisiensi hormon pertumbuhan) dapat mewariskan sifat pendek kepada keturunannya sehingga dapat memperbesar peluang tumbuh menjadi *stunting*. Tetapi, apabila orang tua memiliki tubuh pendek dikarenakan kekurangan gizi atau terkena penyakit maka besar kemungkinan anak dapat tumbuh dengan tinggi badan normal selama anak tidak terkena faktor risiko lainnya (Noviana dan Ekawati, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andari dkk. (2020) bahwa ibu yang memiliki tinggi badan yang pendek berisiko 2,7 kali lebih besar memiliki anak *stunting* daripada ibu dengan tinggi badan normal.

Salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya *stunting* yaitu kehamilan remaja. Usia ibu memainkan peran penting dalam faktor psikologis untuk keadaan kehamilan, yang akan mempengaruhi cara anak dibesarkan. Selain itu, usia ibu juga mempengaruhi perkembangan janin, jika ibu bergizi baik maka akan berdampak baik pada janin. Faktanya, banyak perempuan menikah dini dan memiliki anak sebelum usia 19 tahun. Perempuan belum siap secara psikologis menghadapi kehamilan, persalinan dan pengasuhan anak (Permatasari, 2022).

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat dengan total penduduk sebanyak 438.706 jiwa pada tahun

2020, sedangkan jumlah penduduk dengan kategori usia 0-4 tahun sebanyak 44.397 jiwa. Terdapat 20 puskesmas yang tersebar di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, salah satunya yaitu kecamatan Campalagian (Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2020).

Di kecamatan Campalagian terdiri dari dua puskesmas yang beroperasi yaitu puskesmas Campalagian dan puskesmas Katumbangan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (2020), puskesmas Katumbangan menempati posisi ketiga di wilayah kabupaten Polewali Mandar dengan kasus BBLR sebanyak 27 kasus (7,7%). Bayi yang berusia <6 bulan di puskesmas Katumbangan sebanyak 166 bayi dengan 154 bayi (92,8%) yang diberikan ASI eksklusif.

Status imunisasi dasar lengkap pada bayi di puskesmas Katumbangan merupakan salah satu puskesmas dengan kasus paling rendah sebanyak 464 bayi (58,5%) dari total 793 bayi. Balita (usia 6-59 bulan) yang mendapatkan vitamin A sebanyak 1.232 balita (84,3%) dari total 1.462 bayi (Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2020).

Tingginya jumlah kasus *stunting* di provinsi Sulawesi Barat terutama di wilayah kabupaten Polewali Mandar serta determinan masalah gizi pada balita yang dapat menjadi penyebab terjadinya *stunting* perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua terutama ibu. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Determinan Kejadian *Stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada hubungan tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?
2. Apakah ada hubungan tinggi badan ayah dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?
3. Apakah ada hubungan panjang badan lahir dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?
4. Apakah ada hubungan berat badan lahir dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?
5. Apakah ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?
6. Apakah ada hubungan waktu pemberian MP-ASI dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?
7. Apakah ada hubungan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?

8. Apakah ada hubungan status imunisasi dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?
9. Apakah ada hubungan pemberian vitamin A dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui determinan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui hubungan tinggi badan ayah dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
- c. Untuk mengetahui hubungan panjang badan lahir dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
- d. Untuk mengetahui hubungan berat badan lahir dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
- e. Untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

- f. Untuk mengetahui hubungan waktu pemberian MP-ASI dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
- g. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
- h. Untuk mengetahui hubungan status imunisasi dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
- i. Untuk mengetahui hubungan pemberian vitamin A dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya khususnya mengenai determinan kejadian *stunting* pada balita.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat menjadi bahan masukan atau acuan khususnya bagi calon orang tua dan orang tua yang telah memiliki anak.

###### **b. Bagi Institusi Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi atau sebagai referensi bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di bidang kesehatan khususnya mengenai kejadian *stunting* pada balita.

c. Bagi Institusi Kesehatan Setempat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi kejadian *stunting* pada balita sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan melalui intervensi-intervensi terkait faktor tertentu.

***E. Hipotesis Penelitian***

1. Ada hubungan tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
2. Ada hubungan tinggi badan ayah dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
3. Ada hubungan panjang badan lahir dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
4. Ada hubungan berat badan lahir dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
5. Ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
6. Ada hubungan waktu pemberian MP-ASI dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
7. Ada hubungan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
8. Ada hubungan status imunisasi dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.
9. Ada hubungan pemberian vitamin A dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

## ***F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif***

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik tertentu yang dapat diobservasi dari suatu objek penelitian atau menerjemahkan suatu variabel ke dalam instrumen pengukuran (Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016).

### **1. *Stunting***

*Stunting* adalah status gizi pada balita berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dengan ambang batas  $<-2$  Standar Deviasi (SD) sesuai standar yang telah ditetapkan oleh WHO (**Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2020a**).

Kriteria Objektif:

*Stunting* : Jika balita memiliki panjang badan atau tinggi badan yang berada pada ambang batas (Z-Score)  $<-2$  SD.

Tidak *Stunting* : Jika balita memiliki panjang badan atau tinggi badan yang berada pada ambang batas (Z-Score)  $\geq -2$  SD (**Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2020a**).

### **2. Tinggi Badan Orang Tua**

#### **a. Tinggi Badan Ibu**

Tinggi badan ibu adalah hasil pengukuran antropometri yang dilakukan untuk menggambarkan pertumbuhan pada ibu dengan menggunakan alat bantu *microtoise*. Berikut ini kriteria objektif berdasarkan tinggi rata-rata perempuan di Indonesia.

Kriteria Objektif :

Pendek : Jika tinggi badan ibu dengan tinggi  $<154.4$  cm.

Normal : Jika tinggi badan ibu dengan tinggi  $\geq 154.4$  cm (**Sumber: Rodriguez-Martinez dkk., 2020**).

#### b. Tinggi Badan Ayah

Tinggi badan ayah adalah hasil pengukuran antropometri yang dilakukan untuk menggambarkan pertumbuhan pada ayah dengan menggunakan alat bantu microtoise. Berikut ini kriteria objektif berdasarkan tinggi rata-rata laki-laki di Indonesia.

Kriteria Objektif :

Pendek : Jika tinggi badan ayah dengan tinggi  $<166.3$  cm.

Normal : Jika tinggi badan ayah dengan tinggi  $\geq 166.3$  cm (**Sumber: Rodriguez-Martinez dkk., 2020**).

### 3. Panjang Badan Lahir

Panjang badan lahir adalah riwayat panjang badan lahir balita berdasarkan hasil pemeriksaan rekam medik di puskesmas/ catatan buku KIA/ KMS sesuai standar yang telah ditetapkan oleh WHO.

Kriteria Objektif :

Pendek : Jika balita laki-laki lahir dengan panjang badan  $<46.1$  cm dan balita perempuan lahir dengan panjang badan  $<45.4$  cm.

Normal : Jika balita laki-laki lahir dengan panjang badan  $\geq 46.1$  cm dan balita perempuan lahir dengan panjang badan  $\geq 45.4$  cm (**Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2020**).

### 4. Berat Badan Lahir

Berat badan lahir adalah riwayat berat badan lahir balita berdasarkan hasil pemeriksaan rekam medik di puskesmas/ catatan buku KIA/ KMS.

Kriteria Objektif :

BBLR : Jika balita lahir dengan berat badan  $<2500$  gram atau  $<2,5$  kg.

Tidak BBLR : Jika balita lahir dengan berat badan  $\geq 2500$  gram atau  $\geq 2,5$  kg  
(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2021).

### 5. Pemberian ASI Eksklusif

Pemberian ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai berusia enam bulan, tanpa menambahkan dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Kriteria Objektif :

Tidak ASI Eksklusif: Jika balita mendapatkan asupan makanan atau minuman lain selain ASI sampai usia enam bulan.

ASI Eksklusif : Jika balita hanya mendapatkan ASI sampai usia enam bulan tanpa menambahkan dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2012).

### 6. Waktu Pemberian MP-ASI

Waktu pemberian MP-ASI adalah usia balita saat pertama kali diberikan makanan/ minuman lain selain ASI berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Kriteria Objektif :

MP-ASI Dini : Jika balita mendapatkan makanan/ minuman lain selain ASI pada usia  $< 6$  bulan.

MP-ASI Tepat Waktu : Jika balita mendapatkan makanan/ minuman lain selain ASI pada usia  $\geq 6$  bulan.

## 7. Riwayat Penyakit Infeksi

Riwayat penyakit infeksi adalah suatu keadaan dimana anak pernah menderita penyakit infeksi (ISPA, pneumonia, diare, tuberkulosis, campak, cacangan dan lain-lain) atau pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan selama masa hidupnya berdasarkan hasil pemeriksaan buku KIA/ KMS.

Kriteria Objektif :

Ada : Jika balita pernah menderita satu penyakit infeksi atau lebih selama hidupnya.

Tidak Ada : Jika balita tidak pernah menderita penyakit infeksi selama hidupnya.

## 8. Status Imunisasi

Status imunisasi adalah suatu keadaan ketika balita telah mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan (1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio/ IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib dan 1 dosis campak serta 1 dosis DPT-HB-Hib dan 1 dosis campak untuk dosis lanjutan) sesuai dengan usia balita pada saat penelitian berdasarkan hasil pemeriksaan buku KIA/ KMS.

Kriteria Objektif :

Tidak lengkap : Jika balita tidak mendapatkan satu dosis imunisasi atau lebih yang sesuai dengan usia balita pada saat penelitian.

Lengkap : Jika balita telah mendapatkan semua dosis imunisasi sesuai dengan usia balita pada saat penelitian (**Kementerian Kesehatan RI, 2014**).

## 9. Pemberian Vitamin A


Pemberian vitamin A adalah balita mendapatkan vitamin A dosis tinggi sesuai dengan usianya (1 kali untuk anak usia 6-11 bulan dan 2 kali untuk anak usia

12-59 bulan) sesuai dengan usia balita pada saat penelitian berdasarkan hasil pemeriksaan buku KIA/ KMS.

Kriteria Objektif :

Tidak lengkap : Jika balita tidak mendapatkan satu dosis vitamin A atau lebih sesuai dengan usia balita pada saat penelitian.

Lengkap : Jika balita telah mendapatkan dosis vitamin A sesuai dengan usia balita pada saat penelitian (**Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2021**).



**G. Kajian Pustaka**

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu Terkait Kejadian *Stunting***

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	2020	Agung Sutriyawan, Ratna Dian Kurniawati, Sri Rahayu, Julius Habibi	<a href="https://repository.unar.ac.id/js-pui/bitstream/123456789/1914/1/document.pdf">https://repository.unar.ac.id/js-pui/bitstream/123456789/1914/1/document.pdf</a>	Hubungan Status Imunisasi dan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian <i>Stunting</i> pada Balita: Studi Retrospektif	Jenis penelitian ini adalah studi analitik dengan menggunakan desain <i>case-control</i> pada populasi balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas Citarip Kota Bandung. Jumlah sampel kasus sebanyak 45 responden dan sampel kontrol sebanyak 90 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan kriteria balita <i>stunting</i> dari golongan umur 24-	Variabel bebas: status imunisasi dan riwayat penyakit infeksi. Variabel terikat: kejadian <i>stunting</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Berdasarkan hasil analisis, tidak dapat dibuktikan adanya hubungan antara status imunisasi dengan kejadian <i>stunting</i> . Menurut teori, balita yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap dapat menyebabkan melemahnya sistem imun sehingga mudah terserang infeksi, apabila dibiarkan begitu saja dapat berisiko menjadi <i>stunting</i> . Pada penelitian ini, sebagian besar balita tidak memiliki riwayat infeksi penyakit

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
					59 bulan. Analisis data menggunakan uji <i>chi-square</i> .		seperti diare dan ISPA. Berdasarkan hasil analisis, terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan kejadian <i>stunting</i> . Penyakit infeksi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita sehingga balita yang kurang gizi akan memiliki daya tahan tubuh yang lemah, gampang sakit sehingga tidak kuat untuk melawan penyakit dan sebagainya.
2	2020	Dewi Purnama Windasari, Ilham Syam, dan Lilis Sarifa Kamal	<a href="https://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/an/article/view/193/149">https://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/an/article/view/193/149</a>	Faktor Hubungan dengan Kejadian <i>Stunting</i> di Puskesmas Tamalate Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan pendekatan <i>cross-sectional</i> dengan menggunakan uji <i>chi-square</i> dan uji <i>fisher's exact test</i> . Populasi sebanyak 620 balita dengan sampel sebanyak 124 balita dengan	Variabel bebas: IMD, pemberian ASI eksklusif dan BBLR. Variabel terikat: kejadian <i>stunting</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik terdapat hubungan signifikan antara IMD dengan kejadian <i>stunting</i> , ini disebabkan karena pemberian IMD dapat meningkatkan tumbuh kembang anak sehingga tidak mengalami gangguan pertumbuhan yang dapat menyebabkan <i>stunting</i> . Terdapat hubungan yang

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
					teknik <i>purposive sampling</i> .		signifikan antara ASI eksklusif dengan kejadian <i>stunting</i> , karena bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki asupan gizi yang kurang baik yang menjadi penyebab <i>stunting</i> . Sedangkan, untuk variabel riwayat BBLR tidak memiliki hubungan signifikan dengan kejadian <i>stunting</i> pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tamalate.
3	2020	Ernia Haris Himawati, Laila Fitria	<a href="https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi/article/view/5819/4848">https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi/article/view/5819/4848</a>	Hubungan Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Kejadian <i>Stunting</i> pada Anak Usia di Bawah 5 Tahun di Sampang	Penelitian ini merupakan analisis mendalam dari data Riskesdas 2018 menggunakan desain <i>cross-sectional study</i> dengan <i>total sampling</i> . Subjek penelitian adalah ibu dengan anak balita di kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang dihitung	Variabel bebas: ISPA Variabel kovariat: status gizi ibu saat hamil, riwayat Berat Badan Lahir (BBL), kelengkapan imunisasi anak, riwayat diare dan sumber air minum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian ISPA berhubungan dengan <i>stunting</i> . Namun, setelah dikontrol dengan status gizi ibu saat hamil, BBLR, kelengkapan imunisasi anak, riwayat diare dan sumber air minum maka ISPA tidak berhubungan bermakna dengan kejadian <i>stunting</i> . Akan tetapi, kejadian ISPA,

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
					menggunakan uji hipotesis beda 2 proporsi dengan hasil sampel minimal yang diteliti sebanyak 170 dan disesuaikan dengan data Riskesdas 2018 sehingga jumlah sampel penelitian keseluruhan adalah 207. Analisis data menggunakan uji <i>chi-square</i> untuk analisis bivariat dan uji regresi logistik ganda untuk analisis multivariat.	Variabel terikat: <i>stunting</i> .	diare dan BBLR pada anak berkontribusi terhadap kejadian <i>stunting</i> masing-masing sebesar 3, 2.8 dan 2.2 kali.
4	2020	Moesijanti Y. E. Soekatri, Sandjaja Sandjaja, dan Ahmad Syauqy	<a href="https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6204">https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6204</a>	<i>Stunting was Associated with Reported Morbidity, Parental Education and Socioeconomic Status in 0.5-12-Year-Old</i>	Populasi penelitian adalah bagian dari Survei Nutrisi Asia Tenggara (SEANUTS). Sebanyak 2.236 anak Indonesia berusia 0,5 sampai 12 tahun, yang telah mengikuti	Variabel bebas: laporan morbiditas anak, pendidikan orang tua dan status sosioekonomi	Hasil penelitian menunjukkan prevalensi <i>stunting</i> secara keseluruhan adalah 31,4%. HAZ pada anak <i>stunting</i> dikaitkan dengan kejadian penyakit, termasuk frekuensi, pendidikan orang tua dan pendapatan keluarga. Tidak

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				<i>Indonesian Childen</i>	SEANUTS, diikutsertakan dalam penelitian ini. <i>Stunting</i> didefinisikan sebagai tinggi badan menurut usia Z-score (HAZ) 2 menggunakan kriteria WHO dan <i>stunting</i> berat sebagai HAZ 3. Informasi tentang morbiditas, pendidikan orang tua dan SES keluarga dikumpulkan dengan kuesioner terstruktur. ANOVA digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antar kelompok, dengan atau tanpa koreksi untuk perancu	Variabel terikat: kejadian <i>stunting</i>	ada perbedaan yang signifikan dalam nilai HAZ pada anak <i>stunting</i> dengan satu atau lebih serangan penyakit infeksi, saluran pencernaan atau saluran pernapasan dibandingkan dengan anak <i>stunting</i> tanpa penyakit yang dilaporkan. Prevalensi <i>stunting</i> pada anak Indonesia tinggi dan sangat terkait dengan morbiditas anak, pendidikan orang tua dan SES.
5	2020	Shyam Sundar	<a href="https://link.springer.com/article">https://link.springer.com/article</a>	<i>Stunting among Under 5-Year-</i>	Studi ini menggunakan	Variabel bebas: faktor sosio-	Status gizi balita meningkat antara tahun 2001 dan 2016.

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		Budhathoki, Amit Bhandari, Rejina Gurung, Abhishek Gurung, Ashish KC	<a href="https://doi.org/10.1007/s10995-019-02817-1">e/10.1007/s10995-019-02817-1</a>	<i>Olds in Nepal: Trends and Risk Factors</i>	kumpulan data dari Survei Kesehatan Demografi Nepal 2001, 2006, 2011 dan 2016 untuk menggambarkan tren pengerdilan pada anak di bawah 5 tahun. Analisis regresi logistik ganda dilakukan untuk menilai faktor risiko <i>stunting</i> pada saat keempat survei. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan mengumpulkan informasi dari wanita usia 15-49 tahun	demografi, faktor ibu (tingkat pendidikan, pekerjaan, merokok dalam ruangan), faktor kehamilan (perawatan ANC, konsumsi suplemen zat besi, tempat persalinan) dan faktor neonatus (jenis kelamin anak, ukuran saat lahir, pernah menyusui atau tidak). Variabel terikat: kejadian <i>stunting</i>	Bayi yang lahir dari keluarga miskin memiliki risiko <i>stunting</i> yang lebih tinggi daripada bayi yang lahir dari keluarga kaya (AOR 1,51, CI 95% 1,23-1,87). Keluarga yang tinggal di daerah perbukitan memiliki risiko <i>stunting</i> yang lebih kecil dibandingkan dengan keluarga yang tinggal di dataran Terai (AOR 0,75, CI 95% 0,61-0,94). Bayi yang lahir dari ibu yang tidak berpendidikan memiliki risiko <i>stunting</i> yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lahir dari ibu yang berpendidikan (AOR 1,57, CI 95% 1,28-1,92)
6	2021	Dayuningsih, Tria Astika Permatasari,	<a href="http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkm">http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkm</a>	Pengaruh Pola Asuh Pemberian Makan terhadap Kejadian	Penelitian ini menggunakan desain <i>cross-sectional study</i> yang dilakukan di	Variabel bebas: pola asuh pemberian makan, tinggi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Stunting</i> dialami oleh sebanyak 31,8% (14,8%

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		dan Nana Supriyatna	<a href="#">a/article/view/527</a>	<i>Stunting</i> pada Balita	wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Senen pada bulan April 2019. Jumlah sampel sebanyak 182 ibu-balita dengan teknik <i>simple random sampling</i> yang berasal dari 5 puskesmas kelurahan. Pengukuran <i>stunting</i> menggunakan antropometri dengan indikator TB/U. Analisis data menggunakan uji regresi logistik ganda.	badan ibu, pemberian ASI eksklusif, berat badan lahir bayi, frekuensi konsumsi energi dan riwayat penyakit infeksi. Variabel terikat: kejadian <i>stunting</i>	balita sangat pendek dan 17,0% pendek). Faktor dominan yang berpengaruh terhadap kejadian <i>stunting</i> adalah pola asuh pemberian makan (OR: 6,496 95% CI: 2,486-16,974). Balita yang memperoleh pola asuh pemberian makan yang kurang berisiko 6 kali lebih tinggi mengalami <i>stunting</i> dibandingkan balita yang pola asuh makannya baik.
7	2021	Djuhadiyah Saadong, Suriani B, Nurjaya, Subriah	<a href="http://jurnal.poletekkesmamaju.ac.id/index.php/m/article/view/374/158">http://jurnal.poletekkesmamaju.ac.id/index.php/m/article/view/374/158</a>	BBLR, Pemberian ASI Eksklusif, Pendapatan Keluarga dan Penyakit Infeksi Berhubungan	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan <i>case control study</i> dengan melibatkan 30 anak <i>stunting</i> dan 30 anak	Variabel bebas: BBLR, ASI eksklusif, pendapatan keluarga, penyakit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dengan berat badan lahir rendah cenderung mengalami <i>stunting</i> 5,7 kali dibandingkan dengan berat badan lahir normal.

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				dengan Kejadian <i>Stunting</i>	<i>non-stunting</i> . Lokasi penelitian di wilayah kerja Puskesmas Mangasa.	menular (infeksi) Variabel terikat: kejadian <i>stunting</i>	Demikian pula anak dengan susu formula dan makanan campuran cenderung mengalami <i>stunting</i> 5 kali dibandingkan anak yang diberi ASI eksklusif. Pendapatan keluarga miskin dan adanya penyakit menular juga berkontribusi terhadap <i>stunting</i> (OR= 7; p= 0,025, OR= 5,7, p= 0,007, masing-masing). Kesimpulannya, variabel pendapatan keluarga merupakan variabel yang memiliki kejadian <i>stunting</i> terbanyak pada anak usia 24-59 bulan.
8	2021	Lastri Mei Winarni, Prihandini, dan Febi Ratnasari	<a href="https://www.ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kebidanan/article/view/3713/pdf">https://www.ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kebidanan/article/view/3713/pdf</a>	Hubungan antara Tinggi Badan Orang Tua dan Pemberian ASI Eksklusif terhadap Kejadian <i>Stunting</i> di	Penelitian ini menggunakan desain <i>case control</i> . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita yang ada di Puskesmas Sepatan Kabupaten Tangerang dengan	Variabel bebas: Tinggi badan orang tua (ayah dan ibu) dan pemberian ASI eksklusif Variabel terikat: <i>stunting</i> .	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tinggi badan ayah dengan kejadian <i>Stunting</i> di Puskesmas Sepatan Kabupaten Tangerang. Sedangkan, ibu dengan tinggi badan pendek

NO.	TAHUN	NAMA PENULIS	LINK AKSES	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				Puskesmas Sepatan Kabupaten Tangerang	total sampel sebanyak 120 orang, masing-masing 60 responden pada kelompok kasus dan kontrol. Teknik pengambilan sampel yaitu <i>purposive sampling</i> . Data diperoleh dengan cara menelpon orang tua balita atau kader dan menanyakan sesuai dengan kuesioner. Analisa data secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji <i>chi square</i> .		memiliki peluang 6 kali lebih besar memiliki anak yang mengalami <i>stunting</i> dibandingkan dengan balita dengan ibu tinggi badan normal. Selain itu, balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki peluang 3 kali lebih besar mengalami <i>stunting</i> dibandingkan dengan balita yang mendapatkan ASI eksklusif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel penelitian yaitu status imunisasi. Pada penelitian sebelumnya, status imunisasi yang diteliti hanya melihat kelengkapan pada status imunisasi dasar pada balita. Sedangkan, pada penelitian ini tidak hanya melihat kelengkapan status imunisasi dasar saja tetapi juga akan melihat kelengkapan status imunisasi lanjutan pada balita yang sesuai dengan usianya. Berdasarkan buku Ajar Imunisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2014 menyatakan bahwa imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan merupakan program imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan tentang Stunting***

##### **1. Definisi *Stunting***

*Stunting* adalah suatu proses gagal tumbuh kembang yang dialami anak sejak di dalam kandungan hingga tahun ketiga atau keempat kehidupan yang diakibatkan gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak didefinisikan sebagai *stunting* jika tinggi badan mereka menurut usia kurang dari minus dua standar deviasi di bawah median Standar Pertumbuhan Anak menurut WHO (Soliman dkk., 2021).


*Stunting* pada anak terjadi di awal kehidupan terutama pada 1000 hari pertama sejak pembuahan sampai usia dua tahun. Anak yang mengalami *stunting* termasuk dalam masalah gizi kronik, hal ini disebabkan karena banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu hamil, kesakitan pada bayi dan kurangnya asupan gizi pada bayi (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Faktor-faktor tersebut dalam memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak seperti perkembangan fisik, kapasitas kognitif, bahasa dan sensorik-motorik yang buruk, rendahnya angka produktivitas, meningkatnya risiko morbiditas dan mortalitas serta peningkatan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari (WHO, 2015).

##### **2. Epidemiologi *Stunting***

Di regional Asia Tenggara, prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di negara Timor Leste sebesar 48,8%. Indonesia berada di urutan kedua sebesar 31,8%, kemudian disusul negara Laos (30,2%), Kamboja (29,9%), Filipina (28,7%), Myanmar (25,2%), Vietnam (22,3%), Malaysia (20,9%), Brunei Darussalam (12,7%), Thailand (12,3%) dan Singapura (2,8%) (WHO, 2021).

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi *stunting* berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) secara nasional sebesar 24,4%. Terdapat 20 provinsi di Indonesia dengan prevalensi di atas prevalensi nasional yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Banten (dapat dilihat pada gambar 2.1).

**Gambar 2.1**  
**Prevalensi Balita *Stunted* (Tinggi Badan menurut Umur) berdasarkan Provinsi Tahun 2021**



Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2021

a. Distribusi *Stunting* menurut Orang (*Person*)

1) Distribusi menurut Umur

Hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi anak *stunting* menurut TB/U pada anak usia 0-59 bulan (balita) berdasarkan kelompok umur, untuk kategori sangat pendek, kelompok umur 0-5 bulan (11,7%), umur 6-11 bulan (9,2%), umur 12-23 bulan (15,3%), umur 24-35 bulan (13,5%), umur 36-47 bulan (10,7%) dan umur 48-59 bulan (7,7%). Untuk kategori pendek, kelompok umur 0-5 bulan (11,4%),

umur 6-11 bulan (12,3%), umur 12-23 bulan (22,4%), umur 24-35 bulan (22,1%), umur 36-47 bulan (20,9%) dan umur 48-59 bulan (19,2%). Untuk kategori normal, kelompok umur 0-5 bulan (76,8%), umur 6-11 bulan (78,6%), umur 12-23 bulan (62,3%), umur 24-35 bulan (64,5%), umur 36-47 bulan (68,4%) dan umur 48-59 bulan (73,1%) (Kementerian Kesehatan RI, 2018b).

Berdasarkan umur, prevalensi tertinggi balita *stunted* terdapat pada kelompok umur 24-35 bulan (5,6%) dan yang terendah pada kelompok umur 0-5 bulan (0,70%). Kelompok umur 6-11 bulan (1,6%), umur 12-17 bulan (2,3%), umur 18-23 bulan (3,6%), umur 36-47 bulan (6%) dan umur 48-59 bulan (4,5%) (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

## 2) Distribusi menurut Jenis Kelamin

Hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi anak *stunting* menurut TB/U pada anak usia 0-23 bulan (baduta) berdasarkan jenis kelamin untuk kategori sangat pendek, jenis kelamin laki-laki sebesar 14,3% dan perempuan sebesar 11,3%. Untuk kategori pendek, jenis kelamin laki-laki sebesar 17,8% dan perempuan sebesar 16,3%. Untuk kategori normal, baduta *stunting* yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 67,9% dan perempuan sebesar 72,3% (Kementerian Kesehatan RI, 2018b).

Sedangkan, prevalensi anak *stunting* pada usia 0-59 bulan (balita) berdasarkan jenis kelamin, untuk kategori sangat pendek yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 12,1% dan perempuan sebesar 10,8%. Untuk kategori pendek, balita *stunting* berjenis kelamin laki-laki sebesar 19,6% dan perempuan sebesar 18,9%. Untuk kategori normal, balita *stunting* yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 68,2% dan perempuan sebesar 70%.

### 3) Distribusi menurut Faktor Sosial Ekonomi

Tren balita *stunting* pada tahun 2000-2020 berdasarkan klasifikasi pendapatan negara, jumlah balita *stunting* di negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income*) telah berkurang setengah dari populasi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dari tahun 2000-2020 yaitu 42,4 juta (21,2%) menjadi 21,6 juta (10,8%). Di negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower-middle income*), jumlah balita *stunting* sebanyak 123,4 juta (44,7%) pada tahun 2000 menjadi 88,5 juta (29,1%) pada tahun 2020. Di negara berpenghasilan tinggi (*high income*), jumlah balita *stunting* sebanyak 3,2 juta (4,8%) menjadi 2,2 juta (3,4%). Sedangkan, di negara berpenghasilan rendah (*lower income*), jumlah balita *stunting* mengalami peningkatan dari 33,9 juta menjadi 36,5 juta pada tahun 2020.

Sebanyak 59% dari total populasi balita *stunting* atau lebih dari setengah populasi tinggal di negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower-middle income*). Di posisi kedua, negara berpenghasilan rendah (*lower income*) menyumbang 25% dari total populasi balita *stunting* di seluruh dunia. Sekitar 14% dari semua balita *stunting* tinggal di negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income*) dan 2% dari total populasi balita *stunting* berada di negara berpenghasilan tinggi (*high income*) (WHO, 2021).

#### b. Distribusi *Stunting* menurut Tempat (*Place*)

Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi anak *stunting* pada usia 0-23 bulan (baduta) berdasarkan tempat tinggal, untuk kategori sangat pendek yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 11,2% dan daerah pedesaan sebesar 14,7%. Untuk kategori pendek, baduta *stunting* yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 16,2% dan daerah pedesaan sebesar 18,1%. Untuk kategori normal, baduta *stunting* yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 72,7% dan daerah pedesaan sebesar 67,2% (Kementerian Kesehatan RI, 2018b).

Sedangkan, prevalensi anak *stunting* pada usia 0-59 bulan (balita) berdasarkan tempat tinggal, untuk kategori sangat pendek yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 9,9% dan daerah pedesaan sebesar 13,4%. Untuk kategori pendek, balita *stunting* yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 17,4% dan daerah pedesaan sebesar 21,5%. Untuk kategori normal, balita *stunting* yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 72,8% dan daerah pedesaan sebesar 65%.

c. Distribusi *Stunting* menurut Waktu (*Time*)

Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa prevalensi balita *stunting* di Indonesia adalah 36,8% dengan kategori sangat pendek sebesar 18,8% dan kategori pendek sebesar 18%. Prevalensi *stunting* meningkat berdasarkan hasil Riskesdas 2013 menjadi 37,2% dengan kategori sangat pendek sebesar 18% dan kategori pendek sebesar 19,2%. Angka prevalensi balita *stunting* mengalami penurunan yang cukup signifikan berdasarkan hasil Riskesdas 2018 yaitu sebesar 30,8% dengan kategori sangat pendek sebesar 11,5% dan kategori pendek sebesar 19,3%. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi balita *stunting* sebesar 27,7% dengan kategori pendek sebesar 8,3% dan kategori pendek sebesar 19,4%. Kemudian, pada tahun 2021, Kemenkes kembali melakukan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) didapatkan hasil bahwa prevalensi balita *stunting* sebesar 24,4% dengan kategori sangat pendek sebesar 5,4% dan kategori pendek sebesar 19%. Untuk provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019-2021, berdasarkan hasil SSGI 2019 menunjukkan bahwa prevalensi balita *stunting* sebesar 40,4% menjadi 33,8% pada tahun 2021.

### 3. Penilaian Status Gizi *Stunting* secara Antropometri

Antropometri berasal dari dua suku kata yaitu *anthropo* yang berarti manusia dan *metri* yaitu ukuran. Jadi, metode antropometri adalah pengukuran fisik atau bagian tubuh yang ada pada manusia. Pada penilaian status gizi secara antropometri yaitu menjadikan ukuran dan komposisi tubuh manusia sebagai indikator untuk menentukan status gizi (Harjatmo dkk., 2017).

Menurut Gibson (2005), pengukuran antropometri terdiri dari dua jenis yaitu pengukuran antropometri ukuran tubuh yang terdiri dari berat badan, tinggi/panjang badan, tinggi lutut, panjang ulna, rentang lengan, panjang kaki bawah bayi, lingkar kepala, lebar siku dan umur kehamilan serta pengukuran antropometri komposisi tubuh yang terdiri dari tebal lemak, lingkar pinggang dan pinggul, lingkar lengan atas, lingkar lengan otot lengan atas, tebal lingkar lengan atas dan *body impedance analysis* (Iqbal dan Ervira Puspaningtyas, 2018).

Indeks antropometri anak berdasarkan parameter berat badan dan tinggi/panjang badan terdiri dari empat indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi/ Panjang Badan menurut Umur (TB/U atau PB/U), Berat Badan menurut Tinggi/ Panjang Badan (BB/TB atau BB/PB) dan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U). Untuk mengetahui balita termasuk pada kategori *stunting* atau tidak, maka indeks yang digunakan adalah TB/U atau PB/U (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, indeks TB/U atau PB/U dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) berdasarkan umurnya sesuai dengan kategori status gizi pada WHO *Child Growth Standards* tahun 2006 untuk anak usia 0-5 tahun. Berikut adalah kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan TB/U atau PB/U.

**Tabel 2.1**  
**Indeks Antropometri Anak berdasarkan Tinggi/ Panjang Badan menurut Umur (TB/U atau PB/U)**

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Tinggi Badan atau Panjang Badan menurut Umur (TB/U atau PB/U) anak usia 0-60 bulan	Sangat pendek ( <i>severely stunted</i> )	<-3 SD
	Pendek ( <i>stunted</i> )	-3 SD s.d <-2 SD
	Normal	-2 SD s.d +3 SD
	Tinggi	>+3 SD

*Sumber:* Kementerian Kesehatan RI, 2020

Istilah tinggi badan digunakan pada anak berusia lebih dari 2 tahun yang diukur dengan cara berdiri menggunakan *microtoise*. Sedangkan, istilah panjang tubuh digunakan pada anak berusia 0-2 tahun menggunakan *infantometer*. Kelebihan dari alat ukur tersebut adalah memiliki ketelitian 0,1 cm, mudah digunakan, tidak memerlukan tempat khusus dan harga yang relatif terjangkau. Kelemahannya adalah setiap kali akan melakukan pengukuran harus dipasang pada permukaan atau dinding yang rata (Harjatmo dkk., 2017).

#### 4. Faktor Penyebab *Stunting*

Masalah gizi buruk atau *stunting* disebabkan oleh beberapa faktor, menurut UNICEF (2013) membagi penyebab terjadinya *stunting* menjadi tiga kategori yaitu penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan penyebab dasar.

##### a. Penyebab Langsung

##### 1) Kurangnya Asupan Gizi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dkk. (2016) menunjukkan bahwa frekuensi makan yang dilakukan oleh kelompok balita *stunting* dan non-*stunting* memiliki frekuensi yang sama, tetapi jenis makanan yang dikonsumsi berbeda. Bahan makanan yang dikonsumsi balita *stunting* adalah daging ayam, daging sapi, telur ayam, tempe, tahu, bayam dan sawi. Sedangkan, pada balita non-*stunting* lebih bervariasi seperti makan makanan laut (udang,

kerang, mujair), daging-dagingan (ayam, sapi, bebek), kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau, kacang mete), telur ayam, tahu, tempe, jamur, sawi dan bayam. Cara pengolahan makanan yang dilakukan oleh ibu cenderung kurang bervariasi, beberapa balita selalu makan telur ceplok sebagai sarapan di pagi hari karena dianggap lebih praktis. Kurangnya asupan energi yang masuk akan direspon oleh tubuh manusia, sehingga tubuh akan menghemat energi yang mengakibatkan terhambatnya kenaikan berat badan dan pertumbuhan linier.

Ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi kronis (KEK), anemia, suplai zat gizi yang tidak memadai saat kehamilan, komplikasi kehamilan, terjadi paritas dan jarak kelahiran. Dapat menyebabkan terjadinya BBLR pada anak. BBLR yaitu bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Dibutuhkan penanganan yang serius bagi bayi yang BBLR ini disebabkan karena bayi akan lebih mudah mengalami hipotermi dan pembentukan organ tubuh yang belum sempurna sehingga rawan terjadi kematian. Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan janin sehingga anak yang dilahirkan akan mengalami BBLR. Dampak jangka panjang yang dapat disebabkan oleh BBLR adalah pertumbuhan dan perkembangan menjadi terhambat (Dwijayanti dkk., 2020).

Untuk memberikan asupan gizi yang ideal maka perlu diberikan ASI (Air Susu Ibu) sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman yang lain merupakan upaya dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada balita. Balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko 3 kali lebih tinggi mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan. Pemberian ASI yang

tidak optimal merupakan salah satu pemicu terjadinya *stunting* pada balita (Savita dan Amelia, 2020).

Dalam Q.S al-Ahqaf/46: 15, Allah Swt, berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ ۱٥

Terjemahnya:

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan... (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah memerintahkan umat manusia agar taat kepada Allah sepanjang hidup serta mewasiatkan kepada manusia dengan wasiat yang baik yaitu agar berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini dikarenakan ayah yang terlibat dalam proses pembuahan telah menanamkan benih ke dalam rahim ibunya, kemudian sang ibu mengandung dengan segala kesulitan seperti muntah, gangguan fisik dan psikis serta melahirkannya dengan susah payah. Masa kehamilan dan penyapihan anak yang paling sempurna adalah selama 30 bulan, hal ini mengisyaratkan bahwa masa kehamilan minimal enam bulan karena pada Q.S al-Baqarah/2: 233 telah dinyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna selama 24 bulan (Shihab, 2002c).

‘Ali bin Abi Thalib telah menjadikan ayat ini bersamaan dengan ayat dalam surah Luqman yaitu ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ “Dan menyapihnya dalam dua tahun” (Q.S Luqman/31: 14), juga dalam firman-Nya yaitu Q.S al-Baqarah/2: 233 ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ﴾ “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Dengan ayat-ayat tersebut, ‘Ali berpendapat bahwa masa minimal menyusui adalah enam bulan.

Hal ini merupakan kesimpulan yang kuat dan shahih yang telah disetujui oleh ‘Utsman dan sekelompok Sahabat. Muhammad bin Ishaq bin Yasar

meriwayatkan dari Ma'mar bin 'Abdillah al-Juhani, ia berkata bahwa "Ada seorang laki-laki diantara kami yang telah menikahi seorang wanita dari suku Juhainah, lalu wanita itu melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan penuh. Kemudian suaminya menemui 'Utsman bin 'Affan lalu menceritakan peristiwa itu kepadanya, lalu 'Utsman mengutus seseorang kepadanya. Setelah wanita itu berdiri untuk memakai bajunya, saudara perempuannya menangis dan bertanya 'Apa yang menyebabkanmu menangis?' 'Demi Allah, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang menggauliku kecuali dia (suaminya), sehingga Allah menakdirkan (anak bagi kami) yang dikehendaki-Nya'.

'Utsman bin 'Affan memerintahkan agar wanita itu dirajam. Hingga akhirnya berita tersebut terdengar oleh 'Ali bin Abi Thalib, lalu 'Ali mendatangi 'Utsman dan berkata: 'Apa yang telah engkau lakukan?' 'Utsman menjawab: 'Ia telah melahirkan tepat enam bulan (masa kehamilan). Apa mungkin itu terjadi?' kemudian 'Ali bertanya: 'Tidakkah engkau membaca al-Quran?' 'Utsman menjawab 'Ya'. Lalu 'Ali berkata 'Tidakkah engkau pernah mendengar Allah berfirman ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ 'Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan'. Dan Allah juga berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 233 ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾ 'Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh'. Dari 30 bulan, tersisa menjadi 6 bulan jika diambil 2 tahun atau 24 bulan untuk menyusui.

Kemudian 'Utsman bin 'Affan berkata: 'Demi Allah, aku tidak memahami hal ini'. Ketika 'Utsman memerintahkan untuk membawa wanita itu kehadapannya ternyata wanita itu telah selesai dirajam. Lalu Ma'mar berkata: 'Demi Allah, tidaklah burung gagak dengan burung gagak atau telur dengan telur itu serupa melebihi keserupaannya dengan ayahnya'. Setelah ayah anak itu melihatnya (anak itu), lalu ia berkata: 'Anakku, demi Allah, aku tidak akan meragukannya lagi'.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, lalu ia berkata: “Jika seorang wanita melahirkan anak pada usia kehamilan 9 bulan, maka cukup untuk menyusui anaknya selama 21 bulan, dan jika ia melahirkan pada kehamilan 7 bulan maka cukup baginya untuk menyusui selama 23 bulan. Dan jika ia melahirkan pada kehamilan 6 bulan, maka cukup baginya menyusui selama 2 tahun penuh (24 bulan)” (Ibnu Katsir dan Ishaq Al-Sheikh, 2004).

Dari sudut pandang kesehatan, kehamilan berlangsung selama 40 minggu dengan perhitungan bahwa satu bulan berusia 28 hari. Kehamilan akan dianggap lewat bulan apabila lebih dari 42 minggu. Rumus naegle memperhitungkan bahwa umur kehamilan berlangsung selama 288 hari. Penetapan perkiraan kelahiran dapat menggunakan perhitungan secara kasar yaitu dengan menentukan hari pertama haid ditambah 288 hari. Rumus naegle dapat dihitung pada hari pertama haid ditambah tujuh dan bulannya dapat dihitung sembilan (Manuaba, 1998).

Selama kehamilan, hormon yang dapat dihasilkan oleh plasenta adalah laktogen, koriogonadotropin, esterogen dan progesteron memengaruhi perkembangan alveoli (kelenjar susu) dan duktus laktiferus (saluran susu) di dalam payudara. Hormon laktogen dari plasenta dan hormon prolaktin dari hipofisis (*glandula pituitari*) anterior dapat merangsang produksi kolostrum. Namun, produksi ASI tidak berlangsung sampai sesudah kelahiran bayi meskipun kadar prolaktin cukup tinggi karena dihambat oleh esterogen.

Ketika proses kelahiran, rahim akan melepaskan plasenta sehingga kadar hormon esterogen dan progesteron menurun. Sedangkan hormon prolaktin yang berperan untuk memproduksi ASI meningkat, hal ini disebabkan karena tidak ada lagi hambatan oleh esterogen. Saat bayi menghisap pada payudara ibu akan merangsang produksi prolaktin yang dapat mendorong sel-sel kelenjar untuk memproduksi ASI. Semakin sering bayi melakukan penyusuan maka semakin

banyak prolaktin yang akan diproduksi sehingga produksi air susu ibu akan meningkat atau disebut sebagai refleksi prolaktin. Setelah itu, terjadi refleksi pengeluaran ASI yang menandakan bahwa ASI siap untuk mengalir dan membuat proses laktasi menjadi lebih mudah bagi ibu dan bayi (Pitriani dan Andriyani, 2014).

Dari ayat dan penjelasan diatas kita menyadari bahwa menjadi seorang ibu merupakan suatu amanah yang sangat luar biasa bagi setiap perempuan yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Proses yang dilalui seorang ibu dari awal kehamilan hingga membesarkan anak bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Mengandung selama sembilan bulan dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi tetapi dijalani dengan ikhlas dan bahagia. Setelah melahirkan, tugas seorang ibu pun terus bertambah. Memberikan ASI kepada anak minimal selama enam bulan pertama hingga anak menginjak usia dua tahun. Pengorbanan seorang ibu tidak ada habisnya. Sudah sepatutnya sebagai seorang anak, kita harus patuh dan berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada ibu yang telah mencurahkan segala upaya demi memenuhi kebutuhan anaknya.

## 2) Penyakit infeksi

Penyakit infeksi atau dikenal dengan istilah penyakit menular adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh agen biologi (virus, bakteri atau parasit) yang ditularkan atau berpindah dari satu orang yang sakit ke orang yang sehat atau yang belum terkena penyakit baik secara langsung atau melalui perantara. Penularan penyakit ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

- a) *Host* (Pejamu) yaitu seluruh faktor yang ada pada manusia dan dapat memengaruhi timbulnya perjalanan suatu penyakit. Faktor-faktor tersebut ialah faktor intrinsik (genetik, umur, jenis kelamin, keadaan fisiologis, imunitas,

riwayat penyakit dan sebagainya) dan faktor ekstrinsik (gaya hidup, ras, pekerjaan dan sebagainya).

- b) *Agent* (Penyebab) yaitu makhluk hidup atau mati yang merupakan penyebab penyakit, yang dikelompokkan menjadi lima ialah virus, riketsia, protozoa, jamur dan cacing.
- c) *Environment* (Lingkungan) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang terdiri dari lingkungan abiotik/ fisik (kondisi udara, musim, cuaca, kondisi geografi dan geologi), lingkungan biotik (hewan, tumbuhan dan mikroorganisme) dan lingkungan kultur (sosial budaya, norma dan adat istiadat) (Irwan, 2017; Sumampouw, 2017).

Infeksi yang masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan seseorang mengalami kekurangan zat gizi. Kehancuran jaringan pada tubuh baik berupa bibit penyakit maupun penghancuran agar memperoleh protein untuk mempertahankan tubuh merupakan dampak yang disebabkan oleh infeksi. Jika hal ini terjadi maka dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga anak mudah terserang penyakit (Adriani dan Wirjatmadi, 2014).

Status gizi dan penyakit infeksi memiliki hubungan timbal balik. Kekurangan zat gizi dapat meningkatkan risiko pada penyakit infeksi, sedangkan infeksi dapat menyebabkan kurangnya zat gizi. Jika kejadian ini berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak cepat melakukan penanganan maka akan makanan yang masuk ke dalam tubuh mengalami penurunan dan mengganggu penyerapan zat gizi sehingga dapat meningkatkan risiko *stunting* pada balita (Sugiyanto dan Sumarlan, 2020).

Dampak yang berbahaya bagi seseorang yang mengalami kekurangan gizi adalah infeksi akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Infeksi dapat menyebabkan terjadinya jaringan tubuh yang hancur karena membawa patogen penyakit atau

untuk memperoleh protein yang dibutuhkan untuk bertahan hidup (Adriani dan Wirjatmadi, 2014).

Frekuensi dan durasi penyakit diare memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian *stunting*, hal ini dikarenakan kejadian diare yang memiliki siklus yang lama dan sering terjadi pada balita dapat memengaruhi terjadinya retardasi pertumbuhan. Sedangkan, frekuensi dan durasi penyakit ISPA memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian *stunting* karena balita yang menderita ISPA tidak memiliki nafsu makan sehingga kebutuhan nutrisi anak tidak terpenuhi (Lusiani dan Anggraeni, 2021).

#### b. Penyebab Tidak Langsung

##### 1) Ketahanan Pangan Keluarga

Ketahanan pangan keluarga adalah suatu situasi ketika rumah tangga memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota keluarga. Kemiskinan dan pendapatan keluarga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga untuk menyediakan bahan makanan yang cukup dan bergizi, sehingga hal tersebut berdampak pada status gizi anak (Aritonang dkk., 2020). Asupan gizi yang diperlukan oleh tubuh agar memperoleh gizi yang seimbang adalah dengan makan tiga kali sehari (sarapan pagi, makan siang dan makan malam) dan memenuhi zat gizi dari empat kelompok makanan yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Dengan mengonsumsi makanan yang beranekaragam setiap harinya, kekurangan zat gizi pada suatu jenis makanan akan melengkapinya zat gizi makanan yang lainnya sehingga zat gizi yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi seimbang (Wardani dkk., 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk. (2017) menunjukkan bahwa rumah tangga yang tidak memiliki ketahanan pangan disebabkan karena kekhawatiran persediaan pangan habis, tidak mampu menyediakan makanan yang

memiliki gizi seimbang dan bergantung pada orang lain untuk memperoleh makanan pokok. Berdasarkan hasil dari analisis bivariat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketahanan pangan suatu rumah tangga maka semakin tinggi juga tingkat konsumsi sumber energi dan protein pada balita.

## 2) Pola Asuh

Pola asuh adalah interaksi orang tua pada anak dalam hal mendidik, membimbing, mendisiplinkan, melindungi serta memberikan dorongan pada anak dari segi perilaku, pengetahuan, nilai-nilai kehidupan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, mandiri, memiliki rasa percaya diri, rasa ingin tahu yang tinggi, mampu beradaptasi dan berorientasi untuk menjadi sukses. Orang tua mendampingi anak-anak melalui pendidikan yang mereka tanamkan kepada anak-anaknya. Orang tua cenderung menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anaknya sehingga mereka mempertimbangkan kebutuhan dan situasi anak serta membentuk karakter anak menjadi seseorang yang lebih baik dari orang tuanya (Hidayanti dkk., 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bella dkk. (2020) menunjukkan bahwa kebiasaan pola asuh pada orang tua adalah kebiasaan pemberian makan, kebiasaan pengasuhan, kebiasaan kebersihan dan kebiasaan mendapatkan pelayanan. Pada variabel kebiasaan pemberian makan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian *stunting* seperti pemberian kolostrum pada saat bayi baru lahir, ASI eksklusif dan memberikan makanan yang bergizi dengan cara sehat dan porsi yang cukup. Kebiasaan pengasuhan memiliki hubungan signifikan terhadap kejadian *stunting* karena kebiasaan pengasuhan yang baik yaitu dilakukan oleh ibu sendiri ketika ibu yang memiliki waktu yang maksimal untuk mendampingi, mengawasi dan memberikan perhatian yang lebih pada anak.

Kebiasaan kebersihan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian *stunting* karena kebersihan diri dan lingkungan berperan penting pada tumbuh kembang anak untuk memelihara kesehatan serta dapat mencegah berbagai penyakit infeksi yang merupakan faktor penyebab *stunting*. Kebiasaan mendapatkan pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian *stunting* karena anak akan memperoleh imunisasi yang lengkap, pengobatan saat sakit dan bantuan tenaga profesional untuk menjaga kesehatan anak sehingga dapat menunjang peningkatan status gizi pada anak.

### 3) Kesehatan Lingkungan

Sanitasi lingkungan adalah suatu upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup untuk mencapai status kesehatan yang optimal. Masalah kesehatan lingkungan yang sering terjadi yaitu perumahan, pembuangan jamban, ketersediaan air bersih, pembuangan air limbah dan pengelolaan sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Abidin (2021) menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan seperti sumber air minum, jamban keluarga, saluran pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian *stunting* pada balita di desa Kurma. Kesehatan dan kualitas sanitasi lingkungan yang tidak optimal dapat mendatangkan penyakit gangguan pencernaan sehingga energi yang seharusnya digunakan oleh tubuh untuk pertumbuhan tergantikan menjadi energi untuk melawan infeksi agar tidak menyerang tubuh (Ariani, 2020 ; Hanifa dan Mon, 2021).

Oleh karena itu, orang tua perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar anak dapat mengeksplorasi diri dengan aman dan nyaman, seperti membuang sampah pada tempatnya, membuat SPAL di rumah, rutin membersihkan tempat penampungan air baik untuk mandi atau untuk dikonsumsi serta menyediakan jamban baik di dalam maupun di luar rumah. Hal tersebut dapat merusak kondisi

lingkungan apabila tidak dikerjakan dengan baik karena lingkungan itu akan menjadi tempat anak untuk bermain dan belajar (Rahmayana dkk., 2014).

#### 4) Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memelihara atau meningkatkan status kesehatan melalui upaya pencegahan seperti imunisasi, penimbangan anak, penyuluhan kesehatan dan gizi dan sebagainya.

Imunisasi berasal dari kata *imun* yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi adalah upaya yang menimbulkan/ meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila seseorang terkena penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sistem kekebalan tubuh yaitu suatu sistem yang rumit dari hubungan sel yang memiliki tujuan utama untuk mengenali adanya antigen. Antigen berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah diinaktifkan. Berikut jenis kekebalan yaitu:

- a) Kekebalan aktif adalah suatu perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh seseorang dan menetap seumur hidup.
  - (1) Kekebalan aktif alamiah yaitu kekebalan yang didapatkan ketika seseorang menderita suatu penyakit.
  - (2) Kekebalan aktif buatan yaitu kekebalan yang didapatkan dari pemberian vaksinasi.
- b) Kekebalan pasif adalah suatu perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh.
  - (1) Kekebalan pasif alamiah terbagi atas dua, yaitu:
    - (a) Kekebalan yang didapatkan dari ibu melalui plasenta pada saat masih berada di dalam kandungan.
    - (b) Kekebalan yang dapat diperoleh dengan pemberian air susu ibu yang pertama (kolostrum).

- (2) Kekebalan pasif buatan yaitu kekebalan yang dapat diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contohnya, pemberian serum antibias ular kepada orang yang telah dipatuk ular berbisa.

Dilakukan imunisasi pada anak untuk memberikan kekebalan pada suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Tujuan dari imunisasi adalah untuk menurunkan angka morbiditas, mortalitas dan disabilitas akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti difteri, pertusis, tetanus, TBC, campak, poliomielitis, hepatitis B, Hemofilus Influenza tipe B (Hib), HPV (*Human Papiloma Virus*) dan hepatitis A (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Berikut jadwal pemberian imunisasi pada balita yaitu

**Tabel 2.2**  
**Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi**

Umur	Jenis	Interval minimal untuk jenis imunisasi yang sama
0-24 jam	Hepatitis B	1 bulan
1 bulan	BCG, Polio 1	
2 bulan	DPT-HB-Hib 1, Polio 2	
3 bulan	DPT-HB-Hib 2, Polio 3	
4 bulan	DPT-HB-Hib 3, Polio 4	
9 bulan	Campak	

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2017

**Tabel 2.3**  
**Jadwal Pemberian Imunisasi Lanjutan pada Balita**

Umur	Jenis	Interval minimal setelah imunisasi dasar
18 bulan	DPT-HB-Hib	12 bulan dari DPT-HB-Hib 3
	Campak	6 bulan dari campak dosis pertama

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2017

Status imunisasi dasar yang tidak lengkap dapat menyebabkan lemahnya sistem imun pada balita sehingga penyakit infeksi akan lebih mudah masuk ke

dalam tubuh, nafsu makan menjadi berkurang, gangguan penyerapan zat gizi yang akan mengakibatkan balita membutuhkan lebih banyak zat gizi tambahan. Jika penyakit infeksi dibiarkan begitu saja pada balita maka dapat berisiko mengalami *stunting* (Sutriyawan dkk., 2020).

### c. Penyebab Dasar

#### 1) Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi dari pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari dkk. (2020) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu dapat memengaruhi kesehatan anggota keluarga terutama pada status gizinya dan penerapan pola asuh pada anak. Kemampuan serta pengetahuan ibu terhadap perawatan kesehatan anaknya dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya sehingga ibu mampu mendapatkan makanan dengan harga murah yang mengandung zat gizi seimbang dan berkualitas.

#### 2) Sosial Ekonomi

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh keluarga baik pendapatan yang berasal dari kepala keluarga ataupun dari anggota-anggota keluarga yang lainnya (Farhan, 2017). Dengan pendapatan keluarga yang rendah biasanya makanan yang dikonsumsi jauh lebih murah dan kurang bervariasi, sebaliknya apabila keluarga memiliki pendapatan yang tinggi maka dapat memilih makanan yang berkualitas. Akan tetapi, penghasilan yang tinggi tidak dapat menjamin anak memiliki gizi yang baik, karena semakin tinggi penghasilan maka

semakin tinggi pula kesempatan seseorang untuk memilih makanan yang disukai meskipun makanan tersebut tidak memiliki kandungan gizi yang tinggi (Ibrahim dan Faramita, 2015).

Bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan baik berupa barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Savita dan Amelia (2020) menunjukkan bahwa ibu yang tidak memiliki pekerjaan cenderung 5 kali lebih tinggi memiliki anak yang *stunting* dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Hal ini dikarenakan ketika seseorang memiliki pekerjaan maka pengetahuan yang mereka miliki cenderung lebih luas dan mendapatkan lebih banyak informasi dibandingkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan.

### 3) Kebijakan Pemerintah

Desa merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Indonesia baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial kemasyarakatan maupun kesehatan. Pembangunan desa di bidang kesehatan yaitu berhubungan dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian *stunting*. Dalam PERMEN PDPTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan *Stunting* pasal 6 ayat 1 berbunyi: “Peningkatan pelayanan publik di tingkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi serta pencegahan *stunting*”. Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan *stunting* yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu:

- a) Penyediaan air bersih dan sanitasi;
- b) Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- c) Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d) Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

- e) Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f) Pengembangan ketahanan pangan di desa; dan
- g) Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa (Prihatini dan Subanda, 2020).

Berdasarkan WHO (2016) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *stunting*, salah satu faktor penyebab utamanya adalah faktor ibu. Faktor ibu seperti gizi buruk pada saat kehamilan, perawakan ibu pendek (tinggi badan ibu), infeksi, kehamilan pada usia dini, jarak kelahiran pendek, *Intra Uterine Growth Restriction* dan kelahiran prematur, kesehatan mental yang buruk serta riwayat penyakit hipertensi.

Ibu yang mengalami *stunting* atau memiliki tubuh yang pendek cenderung akan melahirkan bayi dengan tinggi badan yang pendek. Tinggi badan ibu merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya *stunting* pada anak. Menurut WHO pada tahun 2013, *stunting* merupakan masalah intergenerasi atau suatu masalah yang terjadi dalam satu generasi yang sama mulai dari orang tua hingga ke anaknya. Berdasarkan 109 Survei Demografi dan Kesehatan yang telah dilakukan di 54 negara membuktikan bahwa tinggi badan ibu merupakan faktor penentu yang dapat menghambat pertumbuhan *intrauterine*, BBLR dan kejadian *stunting* (Winda dkk., 2021).

### **5. Dampak *Stunting***

Menurut UNICEF (2013), kejadian *stunting* dapat menimbulkan dampak bagi kelangsungan hidup anak. Dampak tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Dampak jangka pendek

Kejadian *stunting* dan masalah gizi lainnya merupakan faktor utama terhadap peningkatan mortalitas, morbiditas dan disabilitas. Contohnya, anak

dengan *stunting* yang parah menghadapi risiko kematian empat kali lebih tinggi dan anak yang sangat kurus memiliki risiko kematian sembilan kali lebih tinggi. Kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin A, zat besi atau kekurangan seng (*zinc*) juga dapat meningkatkan risiko kematian.

Selain itu, kekurangan gizi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kebutaan akibat kekurangan vitamin A dan dapat mengalami kecacatan tabung saraf akibat kekurangan asam folat. Dampak lainnya adalah mengalami gangguan pada perkembangan kognitif, motorik dan verbal pada anak serta dapat meningkatkan biaya kesehatan.

b. Dampak jangka panjang

Dampak jangka panjang yang disebabkan oleh kejadian *stunting* adalah menghambat perkembangan otak dan sistem saraf, menghambat perkembangan fisik, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal pada masa sekolah, menurunkan angka produktivitas dan kapasitas kerja di masa depan, menurunnya kesehatan reproduksi dan meningkatkan angka penyakit tidak menular seperti obesitas, penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, diabetes tipe 2 dan penyakit kronis lainnya.

## 6. Pengendalian dan Pencegahan *Stunting*

Menurut *Global Nutrition Report* (2016), prevalensi *stunting* di Indonesia berada di peringkat 108 dari 132 negara. Indonesia menargetkan penurunan prevalensi *stunting* disesuaikan dengan target *World Health Assembly* (WHA) yaitu menurunkan angka prevalensi *stunting* sebanyak 40% pada tahun 2025 dari kasus tahun 2013. *Stunting* merupakan salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs) yaitu dengan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030 (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan *The Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition* dari UNICEF (2013) untuk mempercepat pencegahan *stunting* maka perlu fokus pada penanganan penyebab masalah gizi secara langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung seperti masalah kurang asupan gizi dan penyakit infeksi. Sedangkan, penyebab tidak langsung mencakup ketahanan pangan (akses pangan bergizi), lingkungan sosial (pola asuh dan pola makan bayi dan anak, kebersihan, pendidikan dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses pelayanan kesehatan baik kuratif maupun preventif) dan lingkungan pemukiman (akses air bersih, air minum dan sarana sanitasi).

Upaya percepatan pencegahan *stunting* membutuhkan intervensi yang bersifat memusat seperti intervensi gizi spesifik yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab tidak langsung. Adapun upaya-upaya pencegahan *stunting* yang perlu dilakukan antara lain:

a. Intervensi gizi spesifik

Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Pada intervensi ini, terdapat tiga pembagian kelompok yaitu intervensi prioritas, intervensi pendukung dan intervensi prioritas sesuai dengan kondisi tertentu. Pembagian kelompok ini diharapkan mampu sebagai panduan bagi pelaksana program apabila terdapat kekurangan sumber daya.

- 1) Intervensi prioritas yaitu intervensi yang diketahui memiliki dampak secara langsung terhadap pencegahan *stunting* dan difokuskan dapat menjangkau semua sasaran prioritas.
- 2) Intervensi pendukung yaitu intervensi yang memiliki dampak secara tidak langsung terhadap pencegahan *stunting* melalui metode perbaikan gizi dan kesehatan, yang dapat dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.

- 3) Intervensi prioritas sesuai dengan kondisi tertentu yaitu intervensi untuk kelompok sasaran tertentu yang sesuai dengan kondisi termasuk saat terjadi bencana (program gizi darurat).

**Tabel 2.4**  
**Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan *Stunting***

<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Intervensi Prioritas</b>	<b>Intervensi Pendukung</b>	<b>Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi</b>
<b>Intervensi Gizi Spesifik – Sasaran Prioritas</b>			
Ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil yang Kurang Energi Kronik (KEK)</li> <li>b. Memberikan suplemen Tablet Tambah Darah (TTD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan suplemen kalsium</li> <li>b. Melakukan pemeriksaan kehamilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perlindungan terhadap penyakit malaria</li> <li>b. Melakukan upaya pencegahan HIV</li> </ul>
Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan promosi dan konseling tentang pemberian ASI eksklusif</li> <li>b. Melakukan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)</li> <li>c. Melakukan penatalaksanaan gizi buruk</li> <li>d. Memberikan makanan tambahan pemulihan pada anak yang memiliki gizi kurang</li> <li>e. Melakukan pemantauan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan suplemen vitamin A</li> <li>b. Memberikan suplemen bubuk tabur gizi seperti Taburia</li> <li>c. Melakukan dan memberikan imunisasi pada anak</li> <li>d. Memberikan suplemen zinc untuk mengobati penyakit diare</li> <li>e. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan upaya pencegahan kecacingan</li> </ul>

	promosi pertumbuhan		
<b>Intervensi Gizi Spesifik – Sasaran Penting</b>			
Remaja putri dan wanita subur	a. Memberikan suplemen Tablet Tambah Darah (TTD)		
Anak usia 24-59 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penatalaksanaan gizi buruk</li> <li>b. Memberikan makanan tambahan pemulihan bagi anak yang memiliki gizi kurang</li> <li>c. Melakukan pemantauan dan promosi pertumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan suplemen vitamin A</li> <li>b. Memberikan suplemen bubuk tabur gizi seperti Taburia</li> <li>c. Memberikan suplemen zinc untuk mengobati penyakit diare</li> <li>d. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan upaya pencegahan kecacingan</li> </ul>

Sumber: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019

b. Intervensi Gizi Sensitif

Sasaran dari intervensi gizi sensitif yaitu keluarga dan masyarakat umum. Intervensi gizi sensitif biasanya dilakukan di luar sektor kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi di lingkungan masyarakat.

**Tabel 2.5**  
**Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan *Stunting***

<b>Kelompok Intervensi</b>	<b>Jenis Intervensi</b>
Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan akses air bersih dan air minum</li> <li>b. Menyediakan akses sanitasi yang layak</li> </ul>
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan akses jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> <li>b. Menyediakan akses ke pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)</li> <li>c. Menyediakan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga yang kurang mampu seperti Program Keluarga Harapan (PKH)</li> </ul>
Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan serta gizi ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyebarkan informasi tentang gizi dan kesehatan melalui berbagai media</li> <li>b. Menyediakan konseling tentang perubahan perilaku antar pribadi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Menyediakan konseling pengasuhan untuk para orang tua</li> <li>d. Menyediakan akses pendidikan, promosi stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini</li> <li>e. Menyediakan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja</li> <li>f. Melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>
Peningkatan akses pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan akses bantuan pangan untuk keluarga yang kurang mampu seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</li> <li>b. Melakukan pengembangan pertanian dan peternakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga seperti program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</li> <li>c. Melakukan fortifikasi bahan pangan utama seperti garam, tepung terigu dan minyak goreng</li> <li>d. Melakukan penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.</li> </ul>

Sumber: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019

## **B. Tinjauan tentang Balita**

### **1. Definisi Balita**

Anak bawah lima tahun atau disingkat sebagai anak balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak usia 3-5 tahun (prasekolah). Pada usia ini, anak masih membutuhkan bantuan dari orang sekitarnya terutama orang tua untuk melakukan hal-hal penting seperti makan, mandi, buang air dan sebagainya.

Masa balita atau dikenal sebagai *golden age* adalah suatu masa dimana anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat serta penting untuk diperhatikan secara cermat agar dapat mendeteksi jika terjadi kelainan sesegera mungkin. Proses tumbuh kembang anak memerlukan asupan gizi yang seimbang agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik, jika asupan gizi yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi maka proses tersebut akan

terhambat sehingga masa ini dapat disebut juga sebagai periode kritis (Azrimaidaliza dkk., 2019).

## **2. Pertumbuhan dan Perkembangan**

Pertumbuhan dan perkembangan meningkat pesat pada tahun-tahun awal dari 0 sampai 5 tahun. Masa ini sering disebut “*Golden Age*”. *Golden age* atau masa keemasan merupakan masa yang penting untuk mengamati tumbuh kembang anak secara dekat dan mendeteksi adanya kelainan sedini mungkin. Selain itu, penanganan yang tepat untuk kelainan pada masa ini dapat meminimalkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak serta dapat mencegah perkembangan gangguan permanen (Chamidah, 2009).

Pemantauan tumbuh kembang anak seperti pemantauan aspek fisik, psikologis dan sosial. Orang tua dapat memantau sesegera mungkin. Istilah pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari dua peristiwa yang berbeda tetapi terkait dan sulit dipisahkan: pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses penambahan ukuran atau dimensi pada tubuh yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, dapat diketahui dengan melakukan pengukuran antropometri dan ditandai dengan penambahan ukuran fisik dan struktur tubuh. Sedangkan, perkembangan adalah suatu proses pematangan fungsi organ tubuh pada makhluk hidup yang ditandai dengan berkembangnya kemampuan, inteligensi, keterampilan, kreativitas dan perilaku. Sedangkan, pertumbuhan dan perkembangan adalah ciri alami yang ada pada seluruh makhluk hidup.

Awal mulanya, manusia merupakan satu sel yang mengalami tahap tumbuh kembang sejak berada di dalam kandungan, masa bayi, anak-anak hingga remaja. Ketika memasuki usia remaja, ukuran tubuh manusia bertambah berkali-kali lipat dibandingkan pada saat lahir serta kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik

berkembang pesat. Setiap fase kehidupan yang dilalui oleh anak memerlukan asupan gizi yang seimbang untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal (Fikawati dkk., 2017).

### **3. Ciri-Ciri Tumbuh Kembang Anak**

Menurut Darmawan (2019), tumbuh kembang pada anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Perkembangan menimbulkan perubahan

Awal mula proses perkembangan terjadi bersamaan dengan proses pertumbuhan. Setiap pertumbuhan diringi dengan perubahan fungsi, contohnya perkembangan inteligensi atau kecerdasan pada anak akan disertai dengan pertumbuhan otak serta serabut saraf di dalam tubuh.

b. Tahap awal pertumbuhan dan perkembangan anak akan menentukan tahapan selanjutnya

Satu tahapan perkembangan yang telah dilalui oleh setiap anak akan membawanya pada tahap perkembangan yang selanjutnya, contohnya seorang anak tidak akan bisa berjalan dengan lancar sebelum dia mampu berdiri terlebih dahulu. Anak tidak akan bisa berdiri dengan tegak jika pertumbuhan kaki dan bagian tubuh yang lainnya terhambat. Itu sebabnya perkembangan awal merupakan masa kritis yang dapat menentukan perkembangan yang akan terjadi selanjutnya.

c. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki durasi waktu yang berbeda

Pertumbuhan dan perkembangan memiliki durasi waktu atau kecepatan yang berbeda, baik pada pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ pada anak-anak.

d. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan

Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat begitu juga dengan perkembangan, seperti peningkatan mental, memori ingatan, inteligensi, asosiasi

dan lain-lain. Anak yang memiliki tubuh sehat akan mengalami penambahan tinggi dan berat badan serta kemampuan inteligensinya akan berkembang pesat.

e. Perkembangan memiliki pola yang tetap

Perkembangan fungsi organ tubuh dapat terjadi menurut dua yaitu:

- 1) Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke anggota tubuh yang lainnya (pola sefalokaudal).
- 2) Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal (gerak kasar) yaitu kemampuan anak untuk melakukan gerakan tubuh yang membutuhkan otot-otot besar seperti gerakan duduk, berdiri dan lain-lain kemudian berkembang ke bagian distal (gerak halus) yaitu kemampuan anak untuk melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu atau hanya menggunakan otot-otot kecil seperti gerakan menulis, menjepit dan lain-lain.

f. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan

Tahap perkembangan pada anak akan mengikuti pola yang teratur dan sistematis. Tahap-tahap tersebut tidak akan terjadi secara terbalik seperti anak mampu berlari sebelum berdiri dan berjalan serta anak mampu membaca sebelum berbicara.

#### **4. Periode Tumbuh Kembang Anak**

Tumbuh kembang pada anak akan berlangsung secara teratur, saling berhubungan dan berkelanjutan yang dimulai pada masa konsepsi sampai dewasa. Menurut Santrock (2003), Proses tumbuh kembang terbagi menjadi beberapa periode, yaitu:

- a. Masa prakelahiran atau masa prenatal. Masa ini merupakan masa dari mulai terjadinya pembuahan sperma terhadap sel telur sampai lahir, dan biasanya sesuai dengan rata-rata usia kehamilan pada umumnya, yaitu sekitar sembilan

bulan. Pada masa sembilan bulan itu dikenal sebagai waktu yang sangat menakjubkan, karena sel-sel yang disebut sperma tumbuh menjadi organisme yang sangat lengkap dan sempurna, dan diberikan otak serta kemampuan dalam berperilaku selama tahap perkembangan itu.

- b. Masa bayi atau *infacy*. Ini adalah periode perkembangan berkelanjutan dari lahir sampai sekitar usia 18-24 bulan. Pada masa ini, bayi sangat bergantung pada orang dewasa, sehingga masa ini merupakan masa-masa ekstrem yang dialami oleh bayi sendiri. Selain itu, aktivitas mental baru muncul selama periode ini, termasuk kemampuan berbicara, mengoordinasikan sensasi dan gerakan tubuh lainnya, berpikir dalam simbol, dan belajar dengan meniru aktivitas luar biasa orang lain.
- c. Masa kanak-kanak awal atau anak usia dini. Periode ini berlangsung dari akhir masa bayi sampai usia 5-6 tahun. Periode ini disebut juga tahun ajaran. Anak-anak biasanya masuk sekolah pada usia ini untuk belajar secara formal. Dari sini, anak mulai belajar mandiri dan mengurus diri sendiri. Selain belajar sendiri, anak mulai mengembangkan keterampilannya dengan mengikuti petunjuk di lingkungan sekolah, belajar mengenal huruf dan angka, serta bermain dengan teman sebaya. Konon akhir masa ini adalah ketika anak sudah duduk di bangku kelas satu sekolah dasar.
- d. Masa kanak-kanak tengah dan akhir atau *Middle and Late Childhood*. Periode ini dimulai pada akhir masa balita, atau sekitar usia 6-11 tahun. Beberapa orang mengatakan sebagai masa sekolah dasar. Pada masa ini, seseorang pada umumnya telah menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan secara formal dihadapkan pada dunia dan budaya yang lebih luas di sekitarnya. Ciri-ciri dari masa ini adalah peningkatan pengendalian diri, dengan kinerja akademik menjadi tema sentral.

- e. Masa remaja atau *adolescence*. Masa ini merupakan transisi perkembangan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, yang dimulai ketika anak berusia sekitar 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik yang cepat, peningkatan tinggi dan berat badan yang signifikan, perubahan postur, timbulnya karakteristik seksual, pertumbuhan payudara pada anak perempuan, pembesaran suara pada anak laki-laki, dan pertumbuhan rambut pada beberapa area di anak laki-laki dan anak perempuan akan muncul. Ciri utama masa ini adalah pencarian identitas dan keinginan untuk kebebasan, lebih banyak waktu di luar ruangan, dan pemikiran abstrak, idealis, dan logis (Hanafi, 2018).

Dalam Q.S al-Hajj/22: 5, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ..... ه

Terjemahnya:

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharaku) hingga kamu mencapai usia dewasa.... (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menceritakan tentang orang-orang yang menentang akan terjadinya hari kebangkitan dan mengingkari hari akhir. Allah menyebutkan lebih banyak bukti-bukti atas kekuasaan-Nya dalam menjadikan hari kiamat, sebagaimana yang dapat disaksikan pada awal penciptaan. Maka Allah berfirman, “Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan” yaitu keraguan manusia tentang hari kebangkitan yaitu berdirinya para ruh dan

jasad pada hari kiamat. “*sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah*”, yaitu asal mula manusia dari debu. Allah telah menciptakan Nabi Adam As. dari debu tersebut.

“*kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging*”, yaitu ketika air mani telah berada di dalam rahim seorang wanita, maka ia akan menetap di dalamnya selama 40 hari, demikian pula bertumpunya segala sesuatu yang bersekutu kepada air mani tersebut. Kemudian air itu akan berubah menjadi segumpal darah merah atas izin Allah Ta’ala dan berdiam di dalamnya selama 40 hari. Darah tersebut akan berkembang hingga menjadi *mudghah*, yaitu segumpal daging yang belum mempunyai bentuk dan garis-garis. Kemudian, Allah mulai membentuk dan menggarisnya dimulai dari kepala, dua tangan, dada, perut, dua paha, dua kaki dan seluruh anggota badan. Terkadang, wanita menggugurkan kandungannya sebelum atau setelah mulai terbentuknya manusia.

Seorang Mujahid berkata tentang firman Allah, “*baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna*” yaitu keguguran dapat terjadi ketika bentuknya sudah sempurna dan belum sempurna. Apabila 40 hari telah berlalu dan telah berubah menjadi segumpal daging, maka Allah mengutus Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mengokohkannya sebagaimana yang telah Allah kehendaki berupa ketampanan, kejelekan, laki-laki dan perempuan serta telah menetapkan rezeki dan kematiannya, celaka dan bahagiannya.


Firman Allah, “*Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi,*” artinya bayi yang lemah badannya, pendengaran, penglihatan, perasaan, gerak serta akal nya. Kemudian Allah akan memberikan kepadanya kekuatan sedikit demi sedikit dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang tuanya di sepanjang siang dan malam. Kemudian Allah berfirman: “*lalu (Kami memeliharamu) hingga*

*kamu mencapai usia dewasa”* yaitu kekuatan itu akan semakin bertambah sempurna sampai pada masa muda dan menjadi orang yang indah untuk dipandang (Ibnu Katsir dan Ishaq Al-Sheikh, 2003).

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah bahwa ayat ini juga menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dengan menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagi *mudghah* yang tidak sempurna untuk gugur dan Allah menetapkan di dalam rahim bagi *mudghah* yang terbentuk dengan sempurna untuk melanjutkan prosesnya sesuai dengan apa yang telah Allah kehendaki sampai pada waktu yang telah ditetapkan untuk lahir antara enam dan sembilan bulan lebih. Kemudian Allah mengeluarkan manusia dari dalam perut ibu sebagai bayi dan akan dipelihara oleh Allah secara berangsur-angsur sampai pada tahap dewasa dari segi fisik mental dan pikiran (Shihab, 2002c).




**C. Kerangka Teori**



**Kerangka Teori**

Modifikasi Teori H.L. Blum dan *The UNICEF Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition* (Blum, 1974; UNICEF, 2013b)

#### D. Kerangka Konsep



#### Keterangan:

-  : Variabel independen  
 : Variabel dependen

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan analitik observasional menggunakan pendekatan *cross-sectional study* yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen pada waktu yang sama. Variabel independen yang dimaksud yaitu usia ibu saat menikah, tinggi badan orang tua, berat badan lahir, panjang badan lahir, pemberian ASI eksklusif, waktu pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, status imunisasi serta pemberian vitamin A sedangkan variabel dependen yaitu kejadian *stunting*.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada bulan November 2022 – Juni 2023.

#### ***C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti (Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 1.353 balita (Dinkes Kab. Polewali Mandar, 2021).

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akan diteliti dianggap dapat menggambarkan atau merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Sampel dalam penelitian ini adalah balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 309 balita, dengan responden adalah ibu dari balita. Besaran sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah populasi

$e$  = batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel / tingkat signifikansi =  $0,05 = 5\%$ .

Diketahui jumlah populasi balita di puskesmas Katumbangan sebanyak 1.353 balita, maka perhitungan besar sampelnya sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1.353}{1 + 1.353 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{1.353}{1 + 1.353 (0,0025)}$$

$$n = \frac{1.353}{1 + 3,3825}$$

$$n = \frac{1.353}{4,3825}$$

$$n = 308,727895 \approx 309$$

Jadi, besar sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 309 balita.

### 3. Teknik Pengambilan *Sampling*

Teknik pengambilan *sampling* adalah suatu teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel yang akan digunakan selama penelitian (Sugiyono, 2013). Teknik pengambilan *sampling* pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara tidak acak, dimana sampel dipilih sesuai dengan karakteristik atau kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

#### a. Kriteria Inklusi (*Inclusion Criteria*)

Kriteria inklusi adalah sejumlah karakteristik yang harus dimiliki oleh responden yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga bisa dimasukkan ke dalam penelitian (Swarjana, 2022). Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Memiliki anak berusia 6-59 bulan
- 2) Ibu dari anak selaku responden tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi
- 3) Memiliki buku KIA/ KMS
- 4) Apabila responden memiliki lebih dari satu balita, maka anak terakhir yang menjadi subjek penelitian.

#### b. Kriteria Eksklusi (*Exclusion Criteria*)

Kriteria eksklusi adalah karakteristik dari sampel yang memenuhi kriteria inklusi tetapi tidak mungkin diteliti atau berpartisipasi dalam penelitian (Swarjana, 2022). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Responden menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian
- 2) Responden memiliki balita yang tidak berada pada kondisi yang sehat
- 3) Responden memiliki balita yang menderita kelainan kongenital sehingga dapat memengaruhi tumbuh kembangnya
- 4) Salah satu orang tua (ayah atau ibu) sedang berada di luar daerah selama kurang lebih satu bulan.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui kuesioner, wawancara, observasi, hasil dokumentasi dan sebagainya (Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016).

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden seperti data karakteristik sosio-demografi responden, kondisi dan status kesehatan pada balita yang diukur dengan menggunakan kuesioner serta data tinggi badan orang tua dan anak dapat diukur dengan menggunakan *microtoice*. Pada balita yang tidak dapat berdiri tegak, dapat mengukur panjang badan dengan menggunakan *infantometer*.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Puskesmas Katumbangan serta dari buku KIA/ KMS yang dimiliki oleh responden. Selain itu, data dan referensi dalam penelitian ini bersumber dari literatur, artikel penelitian dan berbagai situs internet yang relevan dengan penelitian ini.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diamati dalam penelitian (Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016). Instrumen penelitian yang digunakan yaitu buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/ KMS untuk mengetahui panjang badan dan berat badan lahir anak, data pemberian imunisasi dan vitamin A serta riwayat penyakit infeksi, kuesioner penelitian untuk mengisi data identitas orang tua dan anak yang akan didampingi

oleh peneliti pada saat pengisian serta menggunakan *microtoise* pada saat mengukur tinggi badan orang tua dan anak yang dapat berdiri tegak, menggunakan *infantometer* pada saat mengukur panjang badan pada anak yang tidak dapat berdiri tegak serta mengukur berat badan orang tua dan anak dengan menggunakan timbangan badan digital.

## F. Uji Validitas dan Reabilitas

### 1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui suatu keabsahan/ ketepatan suatu item pertanyaan dalam mengukur variabel yang diteliti dalam instrumen penelitian (Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016). Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013).

Item pada instrumen penelitian akan dikatakan valid apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sebaliknya, item dinyatakan tidak valid apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel. Nilai  $r$  tabel untuk 44 responden adalah 0.297. Uji validitas dilakukan di wilayah kota Makassar. Adapun hasil uji validitas sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian**

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
E01	0.462	0.297	Valid
E02	0.418	0.297	Valid
E03	0.657	0.297	Valid
E04	0.618	0.297	Valid
E05	0.450	0.297	Valid
F01	0.346	0.297	Valid
F02	0.378	0.297	Valid
G01	0.383	0.297	Valid
G02	0.403	0.297	Valid
H01	0.417	0.297	Valid
H04	0.406	0.297	Valid

Sumber: *Data Primer, 2022*

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kehandalan (tingkat kepercayaan) suatu item pertanyaan dalam mengukur variabel yang diteliti dalam instrumen penelitian (Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016). Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila instrumen digunakan berkali-kali untuk mengukur suatu objek yang sama tetapi data yang dihasilkan konsisten/ tetap sama (Sugiyono, 2013).

Uji reabilitas diukur dengan menggunakan alpha cronbach berdasarkan skala alpha cronbach 0 sampai 1. Ukuran kemantapan alpha cronbach dapat ditrepretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai alpha cronbach 0.00 – 0.20 maka artinya kurang reliabel
- b. Nilai alpha cronbach 0.21 – 0.40 maka artinya agak reliabel
- c. Nilai alpha cronbach 0.41 – 0.60 maka artinya cukup reliabel
- d. Nilai alpha cronbach 0.61 – 0.80 maka artinya reliable
- e. Nilai alpha cronbach 0.81 – 1.00 maka artinya sangat reliabel

**Tabel 3.2**  
**Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian**

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
	0.616	0.6	Reliabel

Sumber: *Data Primer, 2022*

## G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah salah satu tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian setelah pengumpulan data. Data yang masih perlu diolah sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang dapat menjawab tujuan dari penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program olah data

bivariat yaitu program SPSS versi 26. Adapun langkah-langkah pengolahan data yang harus dilakukan yaitu:

a. *Editing*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek jawaban dari formulir atau kuesioner yang telah diisi oleh responden sudah:

- 1) Lengkap, apabila semua pertanyaan telah terisi jawabannya.
- 2) Jelas, apabila jawaban yang diisi oleh responden cukup jelas terbaca tulisannya.
- 3) Relevan, apabila jawaban yang ditulis sesuai dengan pertanyaan yang ada di kuesioner.
- 4) Konsisten, apabila diantara beberapa pertanyaan yang berkaitan isi jawabannya konsisten. Contohnya, antara pertanyaan usia dan jumlah anak. Ketika responden mengisi form untuk usia dengan usia 15 tahun dan di pertanyaan jumlah anak bahwa memiliki 9 anak, jawaban tersebut dinilai tidak konsisten.

b. *Coding*

*Coding* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang awalnya memakai format huruf menjadi data yang berbentuk angka. Contohnya, untuk variabel kejadian *stunting* dilakukan koding 1 = *Stunting* dan 0 = Tidak *stunting*. Kegunaan dari *coding* adalah untuk mempermudah peneliti pada saat akan melakukan analisis data serta dapat mempercepat saat *entry data*.

c. *Processing*

Setelah melalui dua tahapan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar data yang telah dimasukkan dapat dianalisis. Proses data dilakukan dengan cara memasukkan data dari kuesioner ke aplikasi SPSS.

d. *Cleaning*

*Cleaning* (pembersihan data) adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengecek ulang data yang telah dimasukkan apakah terdapat kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada saat memasukkan data ke aplikasi SPSS (Hastono, 2016).

## 2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis data yang digunakan untuk mengetahui deskripsi atau gambaran dari data yang telah dikumpulkan yaitu data karakteristik orang tua dan anak seperti usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan lahir, panjang badan lahir, pemberian ASI eksklusif, waktu pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, status imunisasi, pemberian vitamin A dan usia ibu saat menikah.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yaitu determinan kejadian *stunting*. Analisis data menggunakan uji *Chi Square* dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila  $p < 0.05$  berarti  $H_a$  diterima, artinya terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan, apabila  $p > 0.05$  berarti  $H_0$  ditolak, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Odd Ratio (OR) dapat digunakan sebagai parameter adanya hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan efek. Interpretasi nilai  $OR > 1$  menunjukkan bahwa faktor yang diteliti merupakan faktor risiko, apabila nilai  $OR = 1$  atau mencakup angka 1 artinya bukan merupakan faktor. Sedangkan, apabila nilai  $OR < 1$  itu artinya faktor yang diteliti merupakan faktor protektif.

c. Analisis Multivariat

Analisis multivariat adalah suatu metode statistika untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel independen yaitu usia ibu saat menikah, tinggi badan orang tua, berat badan lahir, panjang badan lahir, pemberian ASI eksklusif, waktu pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, status imunisasi serta pemberian vitamin A terhadap variabel dependen yaitu kejadian *Stunting*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik berganda (biner).

Regresi logistik berganda untuk memprediksi variabel dependen yang berskala biner atau *dichotomous* (contohnya: *Stunting* – tidak *stunting*) dengan menggunakan data variabel independen yang berskala ukur dapat berupa ordinal atau interval. Regresi logistik digunakan untuk mengetahui variabel independen mana yang memiliki hubungan yang lebih erat dengan variabel dependen dengan nilai  $p < 0.25$ . Penilaian interaksi dilakukan terhadap variabel yang secara substansi dapat berinteraksi dengan variabel independen yang akan berpengaruh terhadap variabel dependen.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan**  
**Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar**



#### 1. Kondisi Geografis

Puskesmas Katumbangan merupakan puskesmas termuda di Kabupaten Polewali Mandar yang terletak di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian berjarak 37 km dari ibu kota Kabupaten yaitu Polewali. Luas wilayah kerja Puskesmas Katumbangan yang terdata sebesar 24,00 km<sup>2</sup>, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puskesmas Katumbangan membawahi lima desa sebagai wilayah kerjanya beserta luas wilayahnya, yaitu:

- a. Desa Katumbangan : 5,00 km<sup>2</sup>
- b. Desa Katumbangan Lemo : 4,25 km<sup>2</sup>
- c. Desa Panyampa : 6,24 km<sup>2</sup>
- d. Desa Botto : 5,73 km<sup>2</sup>
- e. Desa Gattungang : 2,77 km<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Katumbangan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Luyo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mapilli
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Parappe yaitu wilayah kerja Puskesmas Campalagian.

Dimana kondisi geografis wilayah kerja tersebut terdiri dari daerah daratan, daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai. Klasifikasi kondisi geografis dari masing-masing desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Desa Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo dan Desa Botto masuk kategori daerah daratan.
- b. Desa Gattungan masuk kategori daerah pegunungan.
- c. Desa Panyampa masuk kategori daerah pesisir pantai.

## **2. Kondisi Demografis**

- a. Penyebaran Penduduk

Jumlah penduduk yang tersebar di lima desa dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas Perawatan Katumbangan sebanyak 20.205 jiwa. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Katumbangan sebanyak 5.494 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk yang terendah adalah Desa Gattungan yaitu sebanyak 2.307 jiwa.

- b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Katumbangan tahun 2021 sebesar 842 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk antar desa bervariasi. Desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Katumbangan mencapai 1.099 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Desa Panyampa memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu 576 jiwa/km<sup>2</sup>.

c. Sosial Ekonomi

Penduduk yang tinggal di kecamatan Campalagian mempunyai mata pencaharian yang bervariasi namun sebagian besar bekerja sebagai petani dengan hasil pertanian seperti padi, kelapa, kakao dan palawija. Sebagian penduduk juga ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak, wirausaha, pegawai dan buruh.

d. Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan terbilang masih minim, terbukti hal ini dengan jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 sekolah dari lima desa, yang artinya rata-rata jumlah sekolah per desa hanya sebanyak 2 SD. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya satu yang terletak di desa Katumbangan Lemo.

Keterbatasan sarana pendidikan ini membawa dampak pada rendahnya cakupan beberapa kegiatan Puskesmas Katumbangan yang pelaksanaannya di sekolah-sekolah misalnya UKS, PHBS sekolah dan yang pasti hal ini berdampak pada tingginya angka buta aksara.

### **3. Visi dan Misi Puskesmas Katumbangan**

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan bangsa yang berdaya saing secara makro. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu arah pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana salah satu unsur penting dalam peningkatan IPM ini adalah derajat kesehatan. Dengan kata lain, derajat kesehatan pada hakikatnya adalah investasi bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut Puskesmas Katumbangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas pengabdianya kepada masyarakat telah menetapkan Visi dan Misi yang ingin dicapai, yaitu:

Visi : **“Terwujudnya Pelayanan Puskesmas Katumbangan yang Profesional, Responsible, Inovatif, Mediate, Akuntable, Menuju Masyarakat Sehat dan Mandiri Tahun 2025”**

Misi :

- a. Mewujudkan pengelolaan administrasi manajemen puskesmas yang cepat dan akurat.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan upaya puskesmas (UKM dan UKP, *service system*) yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat target.
- c. Mewujudkan pencapaian hasil kegiatan puskesmas melalui komunikasi, koordinasi dan integrasi lintas sektor dan lintas program.
- d. Mewujudkan kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga dan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

### **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan data dimulai pada tanggal November 2022 – Juni 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 309 balita.

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

## 1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran distribusi dan frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti. Kemudian, disajikan dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

### a. Karakteristik Responden (Orang Tua)

#### 1) Ibu

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Karakteristik dan Faktor Sosial Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022**

Karakteristik (N=309)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Usia Ibu</b>		
16-26 tahun	100	32.4
27-37 tahun	169	54.7
38-48 tahun	40	12.9
<b>Tinggi Badan Ibu (cm)</b>		
140.0 – 148.9	89	28.8
149.0 – 157.9	191	61.8
158.0 – 166.9	29	9.4
<b>Kategori Tinggi Badan Ibu</b>		
Pendek	232	75.1
Normal	77	24.9
<b>Berat Badan Ibu (kg)</b>		
34.0 – 50.9	148	47.9
51.0 – 67.9	137	44.3
68.0 – 84.9	24	7.8
<b>Pekerjaan Ibu</b>		
IRT	291	94.2
Honorar Guru	11	3.6
Tenaga Kesehatan	3	1.0
PNS	2	0.6
Wiraswasta	2	0.6
<b>Pendidikan Terakhir Ibu</b>		
Tidak bersekolah	16	5.2
Tamat SD/ MI	151	48.9
Tamat SMP/ MTs	55	17.8
Tamat SMA/ MA	54	17.5
Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	33	10.7
<b>Usia Menikah Ibu</b>		
<19 tahun	99	32.0
≥19 tahun	210	68.0

Sumber: *Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada variabel usia ibu dari 309 responden terdapat 100 responden (32.4%) berusia 16 – 26 tahun, 169 responden (54.7%) berusia 27 – 37 tahun dan 40 responden (12.9%) berusia 38 – 48 tahun.

Pada variabel tinggi badan ibu menunjukkan bahwa terdapat 89 responden (28.8%) memiliki tinggi badan 140.0 – 148.9 cm, 169 responden (61.8%) memiliki tinggi badan 149.0 – 157.9 cm dan 29 responden (9.4%) memiliki tinggi badan 158.0 – 166.9 cm. Untuk kategori tinggi badan ibu terdapat 232 responden (75.1%) memiliki postur tubuh yang pendek dan 77 responden lainnya (24.9%) memiliki postur tubuh yang normal.

Pada variabel berat badan ibu menunjukkan bahwa terdapat 148 responden (47.9%) memiliki berat badan 34.0 – 50.9 kg, 137 responden (44.3%) memiliki berat badan 51.0 – 67.9 kg dan 24 responden (7.8%) memiliki berat badan 68.0 – 84.9 kg.

Pada variabel pekerjaan ibu menunjukkan bahwa terdapat 291 responden (94.2%) berprofesi sebagai IRT, 11 responden (3.6%) berprofesi sebagai honorer guru, 3 responden (1%) berprofesi sebagai tenaga kesehatan, 2 responden (0.6%) yang berprofesi sebagai PNS, 2 responden (0.6%) berprofesi sebagai wiraswasta dan masing-masing 1 responden (0.3%) berprofesi sebagai aparat desa dan petani.

Pada variabel pendidikan terakhir ibu menunjukkan bahwa terdapat 16 responden (5.2%) yang tidak bersekolah, 151 responden (48.9%) yang tamat SD/MI, 55 responden (17.8%) yang tamat SMP/ MTs, 54 responden (17.5%) yang tamat SMA/ MA dan 33 responden (10.7%) yang tamat akademi/ perguruan tinggi.

Pada variabel usia menikah ibu menunjukkan bahwa terdapat 99 responden (32%) yang menikah di usia <19 tahun dan 210 responden (68%) yang menikah di usia  $\geq 19$  tahun.

## 2) Ayah

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Karakteristik dan**  
**Faktor Sosial Ayah di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan**  
**Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022**

Karakteristik (N=309)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Usia Ayah</b>		
20 – 31 tahun	130	42.1
32 – 43 tahun	140	45.3
44 – 55 tahun	35	11.3
56 – 67 tahun	4	1.3
<b>Tinggi Badan Ayah (cm)</b>		
158.0 – 164.9	232	75.1
165.0 – 171.9	77	24.9
<b>Kategori Tinggi Badan Ayah</b>		
Pendek	250	80.9
Normal	59	19.1
<b>Berat Badan Ayah (kg)</b>		
48.0 – 58.9	168	54.4
59.0 – 71.9	136	44.0
72.0 – 84.9	5	1.6
<b>Pekerjaan Ayah</b>		
Petani	176	57.0
Wiraswasta	79	25.6
Buruh	26	8.4
Nelayan	9	2.9
Honoror Guru	8	2.6
Sopir	5	1.6
PNS	3	1.0
Pelaut	1	0.3
Operator	1	0.3
Aparat Desa	1	0.3
<b>Pendidikan Terakhir Ayah</b>		
Tidak bersekolah	19	6.1
Tamat SD/ MI	169	54.7
Tamat SMP/ MTs	34	11.0
Tamat SMA/ MA	62	20.1
Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	25	8.1
<b>Usia Menikah Ayah</b>		
<19 tahun	31	10.0
≥19 tahun	278	90.0

Sumber: *Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa pada variabel usia ayah dari 309 responden terdapat 130 responden (42.1%) berusia 20 – 31 tahun, 140

responden (45.3%) berusia 32 – 43 tahun, 35 responden (11.3%) berusia 44 – 55 tahun dan 4 responden (1.3%) berusia 56 – 67 tahun.

Pada variabel tinggi badan ayah menunjukkan bahwa terdapat 232 responden (75.1%) memiliki tinggi badan 158.0 – 164.9 cm dan 77 responden (24.9%) memiliki tinggi badan 165.0 – 171.9 cm. Untuk kategori tinggi badan ayah terdapat 250 responden (80.9%) memiliki postur tubuh yang pendek dan 59 responden lainnya (19.1%) memiliki postur tubuh yang normal.

Pada variabel berat badan ayah menunjukkan bahwa terdapat 168 responden (54.4%) memiliki berat badan 48.0 – 58.9 kg, 136 responden (44.0%) memiliki berat badan 59.0 – 71.9 kg dan 5 responden (1.6%) memiliki berat badan 72.0 – 84.9 kg.

Pada variabel pekerjaan ayah menunjukkan bahwa terdapat 176 responden (57%) yang berprofesi sebagai petani, 79 responden (25.6%) berprofesi sebagai wiraswasta, 26 responden (8.4%) berprofesi sebagai buruh, 9 responden (2.9%) yang berprofesi sebagai nelayan, 8 responden (2.6%) berprofesi sebagai honorer guru, 5 responden (1.6%) yang berprofesi sebagai sopir, 3 responden (1%) yang berprofesi sebagai PNS, 1 responden (0.3%) yang berprofesi sebagai pelaut, 1 responden (0.3%) yang berprofesi sebagai operator dan 1 responden (0.3%) yang berprofesi sebagai aparat desa.

Pada variabel pendidikan terakhir ayah menunjukkan bahwa terdapat 19 responden (6.1%) yang tidak bersekolah, 169 responden (54.7%) yang tamat SD/MI, 34 responden (11%) yang tamat SMP/ MTs, 62 responden (20.1%) yang tamat SMA/ MA dan 25 responden (8.1%) yang tamat akademi/ perguruan tinggi.

Pada variabel usia menikah ayah menunjukkan bahwa terdapat 31 responden (10%) yang menikah di usia <19 tahun dan 278 responden (90%) yang menikah di usia  $\geq 19$  tahun.

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Faktor Ekonomi dan**  
**Demografi Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan**  
**Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022**

Karakteristik (N=309)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<b>Pendapatan Keluarga</b>		
< Rp 500.000	60	19.4
Rp 500.000 – Rp 2.500.000	225	72.8
Rp 2.600.000 – Rp 4.500.000	20	6.5
Rp 4.600.000 – Rp 6.500.000	4	1.3
<b>Kategori Pendapatan Keluarga</b>		
Rendah	286	92.6
Tinggi	23	7.4
<b>Jumlah Anak</b>		
1 – 2	213	68.9
3 – 4	72	23.3
5 – 6	23	7.4
7 – 8	1	0.3
<b>Kategori Jumlah Anak</b>		
Sedikit	213	68.9
Banyak	96	31.1
<b>Jarak Kelahiran Anak</b>		
Tidak ada jarak	115	37.2
1 – 5 tahun	145	46.9
6 – 10 tahun	38	12.3
11 – 15 tahun	10	3.2
16 – 20 tahun	1	0.3
<b>Kategori Jarak Kelahiran Anak</b>		
Tidak ada jarak	115	37.2
Dekat	55	17.8
Jauh	139	45.0

Sumber: *Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa pada variabel pendapatan keluarga dari 309 responden terdapat 60 responden (19.4%) yang memiliki pendapatan < Rp 500.000, 225 responden (72.8%) memiliki pendapatan Rp 500.000 – Rp 2.500.000, 20 responden (6.5%) memiliki pendapatan Rp 2.600.000 – Rp 4.500.000 dan 4 responden (1.3%) memiliki pendapatan Rp 4.600.000 – Rp 6.500.000. Untuk kategori pendapatan keluarga terdapat 286 responden (92.6%) dengan pendapatan keluarga per bulan yang berpenghasilan rendah atau < Rp

2.680.000 dan 23 responden (7.4%) dengan pendapatan keluarga per bulan yang berpenghasilan tinggi atau  $\geq$  Rp 2.680.000.

Pada variabel jumlah anak menunjukkan bahwa terdapat 213 responden (68.9%) yang memiliki 1 – 2 anak dan 1 responden (0.3%) yang memiliki 7 – 8 anak. Untuk kategori jumlah anak terdapat 213 responden (68.9%) memiliki jumlah anak yang sedikit ( $\leq 2$  anak) dan 96 responden (31.1%) memiliki jumlah anak yang banyak ( $> 2$  anak).

Pada variabel jarak kelahiran anak menunjukkan bahwa terdapat 115 responden (37.2%) yang hanya memiliki satu anak, 145 responden (46.9%) yang memiliki anak dengan jarak kelahiran 1 – 5 tahun dengan kelahiran sebelumnya dan 1 responden (0.3%) yang memiliki anak dengan jarak kelahiran 16 – 20 tahun dengan kelahiran sebelumnya. Untuk kategori jarak kelahiran anak terdapat 115 responden (37.2%) yang tidak ada jarak kelahiran (memiliki satu anak), 55 responden (17.8%) memiliki anak dengan jarak kelahiran dekat ( $\leq 2$  tahun) dengan kelahiran sebelumnya dan 139 responden (45%) memiliki anak dengan jarak kelahiran jauh ( $> 2$  tahun) dengan kelahiran sebelumnya.

b. Karakteristik Balita

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Sampel berdasarkan Karakteristik Balita**  
**di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan**  
**Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022**

<b>Karakteristik (N=309)</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Usia Balita (bulan)</b>		
0 – 11	61	19.7
12 – 23	92	29.8
24 – 35	68	22.0
36 – 47	44	14.2
48 – 59	44	14.2
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	157	50.8
Perempuan	152	49.2

<b>Tinggi Badan/ Panjang Badan Balita (cm)</b>		
59.0 – 70.9	57	18.4
71.0 – 82.9	118	38.2
83.0 – 94.9	97	31.4
95.0 – 106.9	37	12.0
<b>Berat Badan Balita (kg)</b>		
5.0 – 15.9	301	97.4
16.0 – 26.9	8	2.6

Sumber: *Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa pada variabel usia balita dari 309 balita terdapat 61 balita (19.7%) berusia 0 – 11 bulan, 92 balita (29.8%) berusia 12 – 23 bulan, 68 balita (22%) berusia 24 – 35 bulan, 44 balita (14.2%) berusia 36 – 47 bulan dan 44 balita (14.2%) berusia 48 – 59 bulan. Untuk jenis kelamin terdapat 157 balita (50.8%) berjenis kelamin laki-laki dan 152 balita (49.2%) berjenis kelamin perempuan.

Pada variabel tinggi badan/ panjang badan balita terdapat 57 balita (18.4%) memiliki tinggi badan 59.0 – 70.9 cm, 118 balita (38%) memiliki tinggi badan 61-70 cm, 104 balita (33.7%) memiliki tinggi badan 71-80 cm, 91 balita (29.4%) memiliki tinggi badan 81-90 cm, 46 balita (14.9%) memiliki tinggi badan 91-100 cm dan 11 balita (3.6%) memiliki tinggi badan 101-110 cm. Untuk berat badan balita terdapat 2 balita (0.6%) memiliki berat badan 1-5 kg, 199 balita (64.4%) memiliki berat badan 6-10 kg, 100 balita (32.4%) memiliki berat badan 11-15 kg, 7 balita (2.3%) memiliki berat badan 16-20 kg dan 1 balita (0.3%) memiliki berat badan 21-25 kg.

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Faktor yang Memengaruhi Kejadian *Stunting* di**  
**Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan**  
**Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022**

<b>Panjang Badan Lahir Balita (cm)</b>		
34.0 – 39.9	5	1.6
40.0 – 45.9	30	9.7
46.0 – 51.9	266	86.1
52.0 – 57.9	8	2.6
<b>Kategori Panjang Badan Lahir Balita</b>		
Pendek	43	13.9
Normal	266	86.1
<b>Berat Badan Lahir Balita (gram)</b>		
1200 – 2350	19	6.1
2351 – 3500	258	83.5
3501 – 4650	32	10.4
<b>Kategori Berat Badan Lahir Balita</b>		
BBLR	29	9.4
Tidak BBLR	280	90.6
<b>Pemberian ASI Eksklusif</b>		
Tidak ASI Eksklusif	72	23.3
ASI Eksklusif	237	76.7
<b>Waktu Pemberian MP-ASI</b>		
MP-ASI Dini	12	3.9
MP-ASI Tepat Waktu	297	96.1
<b>Riwayat Penyakit Infeksi</b>		
Ada	176	57.0
Tidak ada	133	43.0
<b>Kesediaan untuk Mendapatkan Imunisasi</b>		
Bersedia	290	93.9
Tidak Bersedia	19	6.1
<b>Status Imunisasi</b>		
Lengkap	96	33.1
Tidak Lengkap	194	66.9
<b>Pemberian Dosis Vitamin A</b>		
Ya	244	79.0
Tidak	65	21.0
<b>Status Pemberian Dosis Vitamin A</b>		
Lengkap	132	54.1
Tidak Lengkap	112	45.9
<b>Kategori PB/U atau TB/U (Z-Score)</b>		
Sangat Pendek (< -3 SD)	53	17.2
Pendek (-3 SD sd < -2 SD)	94	30.4
Normal (-2 SD sd +3 SD)	158	51.1
Tinggi (> +3 SD)	4	1.3

### Status Stunting Balita

<i>Stunting</i>	147	47.6
<i>Tidak Stunting</i>	162	52.4

Sumber: *Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pada variabel panjang badan lahir balita dari 309 balita terdapat 5 balita (1.6%) memiliki panjang badan lahir 34.0 – 39.9 cm, 30 balita (9.7%) memiliki panjang badan lahir 40.0 – 45.9 cm, 266 balita (86.1%) memiliki panjang badan lahir 46.0 – 51.9 cm dan 8 balita (2.6%) memiliki panjang badan lahir 52.0 – 57.9 cm. Untuk kategori panjang badan lahir terdapat 43 balita (13.9%) memiliki panjang badan lahir yang pendek dan 266 balita (86.1%) memiliki panjang badan lahir yang normal.

Pada variabel berat badan lahir menunjukkan bahwa dari 309 balita terdapat 19 balita (6.1%) yang memiliki berat badan lahir 1200 – 2350 gram, 258 balita (83.5%) memiliki berat badan lahir 2351 – 3500 gram dan 32 balita (10.4%) yang memiliki berat badan lahir 3501 – 4650 gram. Untuk kategori berat badan lahir terdapat 29 balita (9.4%) yang memiliki Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan 280 balita (90.6%) yang tidak memiliki BBLR.

Pada variabel pemberian ASI eksklusif menunjukkan bahwa dari 309 balita terdapat 72 balita (23.3%) yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (selama 6 bulan) dan 237 balita (76.7%) yang mendapatkan ASI eksklusif. Untuk waktu pemberian MP-ASI terdapat 12 balita (3.9%) yang mendapatkan MP-ASI dini (usia < 6 bulan) dan 297 balita (96.1%) yang mendapatkan MP-ASI tepat waktu (usia  $\geq$  6 bulan).

Pada variabel riwayat penyakit infeksi menunjukkan bahwa dari 309 balita terdapat 176 balita (57%) yang memiliki riwayat penyakit infeksi dan 133 balita (43%) yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi.

Pada variabel kesediaan untuk mendapatkan imunisasi menunjukkan bahwa dari 309 balita terdapat 290 balita (93.9%) yang bersedia dan 19 balita (6.1%) tidak bersedia. Untuk status imunisasi dari 290 balita yang telah mendapatkan imunisasi,

terdapat 96 balita (33.1%) yang telah mendapatkan imunisasi lengkap dan 194 balita (66.9%) yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

Pada variabel pemberian dosis vitamin A menunjukkan bahwa dari 309 balita terdapat 244 balita (79%) yang mendapatkan dosis vitamin A dan 65 balita (21%) yang tidak mendapatkan dosis vitamin A. Untuk status pemberian dosis vitamin A dari 244 balita yang mendapatkan dosis vitamin A, terdapat 132 balita (54.1%) yang mendapatkan dosis vitamin A lengkap dan 112 balita (45.9%) yang tidak mendapatkan dosis vitamin A lengkap.

Pada variabel kategori PB/U atau TB/U (Z-Score) menunjukkan bahwa dari 309 balita terdapat 53 balita (17.2%) dengan PB/U atau TB/U yang sangat pendek, 94 balita (30.4%) dengan PB/U atau TB/U yang pendek, 158 balita (51.1%) dengan PB/U atau TB/U yang normal dan 4 balita (1.3%) dengan PB/U atau TB/U yang tinggi. Untuk status *stunting* balita terdapat 147 balita (47.6%) yang dinyatakan *stunting* dan 162 balita (52.4%) yang dinyatakan tidak *stunting*.

## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada tahap ini, akan diketahui besar kekuatan hubungan atau pengaruh dari faktor risiko dengan kejadian penyakit, yang diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian *Stunting***  
**pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan**  
**Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022**

Faktor yang berhubungan	Kejadian <i>Stunting</i>				Total		P-value	OR (95% CI)
	<i>Stunting</i>		Tidak <i>Stunting</i>		N	%		
	n	%	n	%				
<b>Tinggi Badan Ibu</b>								
Pendek	114	49.1	118	50.9	232	100	0.410	1.288 (0.766 – 2.166)
Normal	33	42.9	44	57.1	77	100		
<b>Tinggi Badan Ayah</b>								
Pendek	128	51.2	122	48.8	250	100	0.013	2.209 (1.213 – 4.024)
Normal	19	32.2	40	67.8	59	100		
<b>Panjang Badan Lahir Balita</b>								
Pendek	27	62.8	16	37.2	43	100	0.047	0.487 (0.251 – 0.946)
Normal	120	45.1	146	54.9	266	100		
<b>Berat Badan Lahir Balita</b>								
BBLR	13	44.8	16	55.2	29	100	0.908	0.885 (0.411 – 1.909)
Tidak BBLR	134	47.9	146	52.1	280	100		
<b>Pemberian ASI Eksklusif</b>								
Tidak ASI Eksklusif	26	36.1	46	63.9	72	100	0.037	0.542 (0.314 – 0.934)
ASI Eksklusif	121	51.1	116	48.9	237	100		
<b>Waktu Pemberian MP-ASI</b>								
MP-ASI Dini	4	33.3	8	66.7	12	100	0.476	0.538 (0.159 – 1.827)
MP-ASI Tepat Waktu	143	48.1	154	51.9	297	100		
<b>Riwayat Penyakit Infeksi</b>								
Ada	96	55.8	76	44.2	172	100	0.002	2.130 (1.346 – 3.370)
Tidak Ada	51	37.2	86	62.8	137	100		
<b>Status Imunisasi</b>								
Tidak Lengkap	95	49.0	99	51.0	194	100	0.585	1.183 (0.724 – 1.933)
Lengkap	43	44.8	53	55.2	96	100		
<b>Status Pemberian Vitamin A</b>								
Tidak Lengkap	64	57.1	48	42.9	112	100	0.145	1.505 (0.907 – 2.499)
Lengkap	62	47.0	70	53.0	132	100		

Sumber: *Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa berdasarkan tinggi badan ibu, dari 232 ibu yang memiliki postur tubuh pendek terdapat 114 balita (49.1%) yang mengalami *stunting* dan 118 balita (50.9%) tidak mengalami *stunting*. Hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.410$  ( $p > 0.05$ ) dan nilai OR 1.288 (95% CI: 0.766 – 2.166) (OR > 1). Artinya, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Berdasarkan pada variabel tinggi badan ayah menunjukkan bahwa dari 250 ayah yang memiliki postur tubuh pendek, 128 balita (51.2%) diantaranya mengalami *stunting*. Hasil analisis uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.013$  ( $p < 0.05$ ) dan nilai OR 2.209 (95% CI: 1.213 – 4.024) (OR > 1). Artinya, terdapat hubungan yang bermakna antara tinggi badan ayah dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Pada variabel panjang badan lahir balita menunjukkan bahwa dari 43 balita yang lahir dengan panjang badan yang pendek terdapat 27 balita (62.8%) mengalami *stunting*. Hasil analisis uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.047$  ( $p < 0.05$ ) dan nilai OR 0.487 (95% CI: 0.251 – 0.946) (OR < 1). Artinya, terdapat hubungan yang bermakna antara panjang badan lahir balita dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Berdasarkan variabel berat badan lahir balita menunjukkan bahwa dari 29 balita BBLR terdapat 13 balita (44.8%) yang mengalami *stunting* dan 16 balita (55.2%) tidak mengalami *stunting*. Hasil analisis uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.908$  ( $p > 0.05$ ) dan nilai OR 0.885 (95% CI: 0.411 – 1.909) (OR < 1). Artinya, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara berat badan lahir balita

dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Pada variabel pemberian ASI eksklusif menunjukkan bahwa dari 72 balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif terdapat 26 balita (36.1%) mengalami *stunting* dan 46 balita (63.9%) tidak mengalami *stunting*. Hasil analisis dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.037$  ( $p < 0.05$ ) dan nilai OR 0.542 (95% CI: 0.314 – 0.934) (OR < 1). Artinya, terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif pada balita dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Berdasarkan variabel waktu pemberian MP-ASI menunjukkan bahwa dari 12 balita yang mendapatkan MP-ASI dini terdapat 4 balita (33.3%) yang mengalami *stunting* dan 8 balita (66.7%) yang tidak mengalami *stunting*. Hasil analisis dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.476$  ( $p > 0.05$ ) dan nilai OR 0.538 (95% CI: 0.159 – 1.827) (OR < 1). Artinya, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara waktu pemberian MP-ASI pada balita dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Pada variabel riwayat penyakit infeksi menunjukkan bahwa dari 172 balita yang memiliki riwayat penyakit infeksi terdapat 96 balita (55.8%) balita yang mengalami *stunting*. Hasil analisis dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.002$  ( $p < 0.05$ ) dan nilai OR 2.130 (95% CI: 1.346 – 3.370) (OR > 1). Artinya, terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit infeksi pada balita dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Berdasarkan variabel status imunisasi menunjukkan bahwa dari 194 balita yang tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap terdapat 95 balita (49%) yang mengalami *stunting* dan 99 balita (51%) yang tidak mengalami *stunting*. Hasil analisis uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.585$  ( $p > 0.05$ ) dan nilai OR 1.183 (95% CI: 0.724 – 1.933) (OR > 1). Artinya, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status imunisasi pada balita dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Pada variabel status pemberian vitamin A menunjukkan bahwa dari 112 balita yang tidak mendapatkan dosis vitamin A secara lengkap terdapat 64 balita (57.1%) yang mengalami *stunting*. Hasil analisis dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.145$  ( $p > 0.05$ ) dan nilai OR 1.505 (95% CI: 0.907 – 2.499) (OR > 1). Artinya, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian vitamin A pada balita dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

### 3. Analisis Multivariat

Pada analisis ini akan diketahui faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan, Kabupaten Polewali Mandar. Analisis multivariat yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik ganda (biner) karena variabel dependen bersifat kategorik. Syarat variabel dapat dimasukkan ke dalam analisis multivariat yaitu apabila variabel dapat menghasilkan  $p\text{-value} < 0.25$  pada analisis bivariat.

#### a. Pemilihan Kandidat Variabel pada Analisis Multivariat

Pada penelitian ini terdapat sembilan variabel yang diduga berhubungan dengan kejadian *stunting* pada balita yaitu tinggi badan ibu, tinggi badan ayah, panjang badan lahir, berat badan lahir, pemberian ASI eksklusif, waktu pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi, status imunisasi dan pemberian vitamin A. Hasil

analisis bivariat antara variabel independen dengan variabel dependen untuk diseleksi masuk ke pemodelan multivariat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Bivariat untuk Seleksi Pemodelan Multivariat**

No.	Variabel	<i>P-value</i>	OR
1	Tinggi Badan Ibu	0.410	1.288
2	Tinggi Badan Ayah	<b>0.013*</b>	2.209
3	Panjang Badan Lahir	<b>0.047*</b>	0.487
4	Berat Badan Lahir	<b>0.908**</b>	0.885
5	Pemberian ASI Eksklusif	<b>0.037*</b>	0.542
6	Waktu Pemberian MP-ASI	0.476	0.538
7	Riwayat Penyakit Infeksi	<b>0.002*</b>	2.130
8	Status Imunisasi	0.585	1.183
9	Status pemberian Vitamin A	<b>0.145*</b>	1.505

Keterangan:

\*  $p\text{-value} < 0.25$

\*\* kandidat substansial

Berdasarkan analisis bivariat dapat dilihat bahwa variabel yang memenuhi syarat untuk masuk ke analisis multivariat dengan  $p\text{-value} < 0.25$  adalah tinggi badan ayah, panjang badan lahir, pemberian ASI eksklusif, riwayat penyakit infeksi dan status pemberian vitamin A. Berat badan lahir tetap dimasukkan ke dalam analisis multivariat karena variabel tersebut merupakan kandidat substansial. Langkah selanjutnya adalah memasukkan variabel-variabel tersebut ke dalam uji regresi logistik berganda.

#### b. Penyusunan Model Dasar

Pada pemodelan ini, semua variabel kandidat dicobakan secara bersama-sama dengan menggunakan metode *enter*. Model yang terbaik akan mempertimbangkan pada  $p\text{ value} < 0.05$ . Pemilihan model dilakukan secara berurutan dengan cara semua variabel independen yang memenuhi syarat sebagai kandidat dimasukkan ke dalam model, kemudian variabel dengan  $p\text{ value} \geq 0.05$  dikeluarkan dari model.

Interaksi adalah suatu situasi dimana dua atau lebih faktor risiko saling memodifikasi (besar dan/ atau arah) efeknya terhadap kejadian atau *outcome* yang diteliti. Variabel yang secara substansial kemungkinan terdapat interaksi yaitu pemberian ASI eksklusif dengan umur terhadap kejadian *stunting*. Dalam hal ini, umur berpotensi dapat memodifikasi pengaruh variabel pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian *stunting*. Sehingga dapat dipertimbangkan dalam analisis multivariat seperti pada tabel di bawah.

**Tabel 4.8**  
**Analisis Multivariat Regresi Logistik Ganda antara Variabel Independen terhadap Kejadian *Stunting* pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022**

Variabel	Koef. $\beta$	<i>P value</i>	Exp(B)/ AOR	95% CI
Tinggi Badan Ayah	0.865	<b>0.012*</b>	2.375	1.207 – 4.673
Berat Badan Lahir	0.500	0.391	1.648	0.526 – 5.159
Panjang Badan Lahir	-0.535	0.234	0.586	0.243 – 1.412
Riwayat Penyakit Infeksi	0.453	0.108	1.573	0.906 – 2.731
Status Pemberian Vitamin A	0.186	0.501	1.204	0.700 – 2.070
Pemberian ASI Eksklusif x Umur	-1.205	<b>0.008*</b>	0.300	0.122 – 0.734

Dari tabel di atas, terdapat dua variabel yang secara bermakna berhubungan dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar yaitu tinggi badan ayah ( $p = 0.012$ ) dan pemberian ASI eksklusif x umur ( $p = 0.008$ ). Empat variabel lainnya yaitu berat badan lahir, riwayat penyakit infeksi dan status pemberian vitamin A memiliki nilai  $p value > 0.05$  artinya variabel tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Hasil yang tidak signifikan bukan berarti tidak terdapat asosiasi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan kesalahan/ error yang terjadi dalam penelitian ini, baik kesalahan sistematis (*systematic bias/ non random error*) dan kesalahan tidak sistematis (*random error*). Namun, nilai OR dapat dikatakan valid

karena dalam penelitian ini tidak terjadi bias seleksi, tidak terjadi misklasifikasi diferensial dan variabel *counfounding* lebih dikontrol. Hasil menunjukkan rentang CI yang cukup jauh sehingga kurang presisi yang memungkinkan *chance* / kebetulan tetap ada. Hal ini dikarenakan jumlah sampel yang sedikit, meskipun perhitungan sampel minimal sudah sesuai.

Variabel tinggi badan ayah dengan AOR 2.375 (95% CI: 1.207 – 4.673) artinya balita yang memiliki ayah dengan tinggi badan pendek memiliki OR 2.375 kali lebih tinggi mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang memiliki ayah dengan tinggi badan normal.

Variabel berat badan lahir dengan AOR 1.648 (95% CI: 0.526 – 5.159) artinya balita yang BBLR memiliki risiko 1.648 kali lebih tinggi mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang tidak BBLR.

Variabel panjang badan lahir dengan AOR 0.586 (95% CI: 0.243 – 1.412) artinya balita dengan panjang badan lahir yang pendek memiliki risiko 0.586 kali lebih tinggi mengalami *stunting* dibandingkan balita dengan panjang badan lahir normal.

Variabel riwayat penyakit infeksi dengan AOR 1.573 (95% CI: 0.906 – 2.731) artinya balita yang memiliki riwayat penyakit infeksi memiliki risiko 1.573 kali lebih tinggi mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi.

Variabel status pemberian vitamin A dengan AOR 1.204 (95% CI: 0.700 – 2.070) artinya balita yang tidak mengonsumsi vitamin A memiliki risiko 1.204 kali lebih tinggi mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang mengonsumsi vitamin A.

Terdapat interaksi antara pemberian ASI eksklusif dengan umur balita terhadap kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten

Polewali Mandar. Variabel pemberian ASI eksklusif dengan umur memiliki nilai AOR 0.300 (95% CI: 0.122 – 0.734), artinya pada usia 0 – 23 bulan dengan riwayat pemberian ASI eksklusif lebih protektif pada kejadian *stunting* dibandingkan pada usia 24 – 59 bulan dengan riwayat pemberian ASI eksklusif.

Berdasarkan hasil akhir dari analisis multivariat didapatkan bahwa variabel yang bermakna dan paling dominan berhubungan terhadap kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar adalah variabel tinggi badan ayah dengan nilai AOR paling besar yaitu 2.375 (95% CI: 1.207 – 4.673).

### **C. Pembahasan**

#### **1. Hubungan Tinggi Badan Ibu dengan Kejadian *Stunting***

Tinggi badan merupakan suatu pengukuran yang menjelaskan tentang proses pembentukan tulang. Pada kondisi normal, tinggi badan akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Menurut WHO, tinggi badan ibu merupakan faktor risiko kejadian *stunting*. Interaksi antara ibu yang pendek dengan pertumbuhan linier pada anak yang terhambat mungkin disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Kondisi lingkungan tersebut antara lain kebersihan, asupan nutrisi dan kesehatan reproduksi. Sistem anatomi dan metabolisme pada ibu yang pendek dapat memengaruhi pertumbuhan *intraurine* yang berpengaruh terhadap kejadian *stunting* (Jannah dkk., 2020; Nursyamsiyah dkk., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 232 (75.1%) dari 309 balita yang memiliki ibu dengan postur tubuh yang pendek. Hasil analisis dengan menggunakan uji *Chi Square* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* ( $p = 0.410$ ). Hal ini dikarenakan sebagian besar balita yang tidak *stunting* paling banyak ditemukan pada ibu yang memiliki postur tubuh yang pendek yaitu sebanyak 118 balita (50.9%). Nilai OR pada variabel ini

yaitu 1.288 (95% CI: 0.766 – 2.166) artinya balita yang memiliki ibu yang pendek berisiko 1.288 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang memiliki ibu dengan postur tubuh yang normal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairani dan Pawiliyah (2020) bahwa tinggi badan ibu tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian *stunting* ( $p = 0.054$ ) karena lebih dari separuh ibu memiliki postur tubuh yang pendek (60%) memiliki anak yang tidak *stunting*. Genetika tidak sepenuhnya dapat memengaruhi terjadinya *stunting*. Terdapat faktor lain selain tinggi badan orang tua yang dapat memengaruhi kejadian *stunting* seperti masalah nutrisi. Jika anak mendapatkan asupan gizi yang baik, meskipun orang tuanya memiliki postur tubuh yang pendek, maka besar kemungkinan anak tersebut dapat memiliki tinggi badan yang normal.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk. (2020) bahwa tidak ada hubungan antara tinggi badan ibu dengan kejadian *stunting* ( $p = 0,249$ ). Ibu yang memiliki postur tubuh yang pendek cenderung memiliki anak *stunting* 1.69 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang memiliki postur tubuh yang normal. Hal ini dikarenakan ibu yang pendek akibat dari kekurangan gizi, bukan karena kelainan genetik pada kromosom. Sifat pendek pada orang tua disebabkan oleh masalah gizi atau patologis, sehingga sifat pendek tersebut tidak akan diwariskan kepada anaknya, sebaliknya jika sifat pendek disebabkan oleh gen pada kromosom yang membawa sifat pendek maka ada kemungkinan sifat pendek tersebut akan diwariskan kepada anaknya.

Ibu yang memiliki postur tubuh yang pendek tidak selalu memiliki anak yang *stunting*, meskipun ibu yang pendek cenderung melahirkan yang *stunting*, namun jika pola asuhnya berjalan dengan baik terutama masalah gizi yaitu dengan mengonsumsi MP-ASI yang tepat, maka anak akan tumbuh sehat dan optimal. Pola

makan merupakan faktor penting yang mendukung proses metabolisme dalam tubuh. Semakin banyak ibu memberikan MP-ASI dengan benar, maka semakin sedikit bayi yang akan mengalami keterlambatan pertumbuhan (Hanum, 2019).

Ibu yang memiliki postur tubuh pendek yang disebabkan karena gen pada kromosomnya dapat mewariskan sifat pendek tersebut pada anaknya. Hal ini dikarenakan aliran darah pada rahim ibu dan pertumbuhan uterus, plasenta serta janin pada ibu hamil yang pendek menjadi terbatas yang dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan rendah sehingga perlu untuk melakukan tindakan terhadap peningkatan risiko retardasi pertumbuhan janin atau IUGR (*Intra Uterine Growth Retardation*) serta berat badan lahir rendah (BBLR) (Hanum, 2019; Winda dkk., 2021).

## **2. Hubungan Tinggi Badan Ayah dengan Kejadian *Stunting***

Tinggi badan adalah hasil dari interaksi antara faktor genetik, makronutrien dan mikronutrien. Tinggi badan orang tua dapat memengaruhi tinggi badan anaknya. Pengaruh faktor genetik terhadap tinggi badan anak sebesar 15%. Artinya, jika salah satu orang tua atau keduanya memiliki tubuh yang pendek karena kondisi patologis seperti kekurangan hormon pertumbuhan dan memiliki gen dengan sifat pendek yang terdapat dalam kromosom, sehingga besar kemungkinan anak akan mewarisi gen tersebut dan menjadi *stunting*. Namun, jika orang tuanya kecil karena defisiensi zat gizi atau penyakit, kemungkinan besar anak tersebut dapat tumbuh dengan tinggi badan normal (Nisa', 2020; Surmita dkk., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 250 (80.9%) dari 309 balita yang memiliki ayah dengan tubuh yang pendek. Hasil analisis multivariat dari penelitian ini menggunakan uji regresi logistik ganda diperoleh nilai  $p = 0.012 < 0.05$  artinya ada hubungan antara tinggi badan ayah dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini

dikarenakan sebagian besar balita yang *stunting* paling banyak ditemukan pada ayah yang memiliki postur tubuh yang pendek yaitu sebanyak 128 balita (51.2%). Nilai OR pada variabel ini yaitu 2.375 (95% CI: 1.207 – 4.673) artinya balita yang memiliki ayah yang pendek berisiko 2.375 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang memiliki ayah dengan postur tubuh yang normal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah dkk. (2020) bahwa tinggi badan ayah memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada balita di Kabupaten Bulukumba ( $p = 0.001$ ). Terdapat 20 responden dengan postur tubuh pendek sebanyak 3 responden (15%) yang memiliki balita pendek dan 17 responden (85%) yang memiliki balita sangat pendek. Sedangkan terdapat 18 responden dengan tinggi badan yang normal sebanyak 12 responden (66.7%) yang memiliki balita pendek dan 6 responden (33.3%) yang memiliki balita sangat pendek.

Penelitian yang dilakukan oleh Simbolon dkk. (2021) mendapatkan hasil yang sama yaitu terdapat hubungan antara tinggi badan ayah dengan kejadian *stunting* ( $p = 0.000$ ). Seorang ayah dengan postur tubuh pendek berisiko 1.59 kali lebih besar (95% OR: 1.352 – 1.87) memiliki anak *stunting* dibandingkan dengan ayah dengan postur tubuh yang normal.

### **3. Hubungan Panjang Badan Lahir dengan Kejadian *Stunting***

Panjang badan lahir menggambarkan pertumbuhan bayi secara linier selama berada di dalam kandungan. Panjang badan lahir yang pendek menandakan bahwa bayi tidak mendapatkan asupan energi dan protein yang memadai pada jangka waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena ibu kurang mengonsumsi makanan yang bergizi selama masa kehamilan sehingga mengakibatkan retardasi pertumbuhan pada janin. Namun apabila setelah bayi lahir tetap tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dalam waktu yang lama akan berdampak pada status gizi

anak berdasarkan TB/U yang dapat membuat anak berisiko mengalami stunting (Indanah dan Dewi J, 2020; Wahyuningrum, 2020).

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 43 balita yang memiliki panjang badan lahir pendek sebanyak 27 balita (62.8%) yang *stunting* dan 16 balita (37.2%) yang tidak *stunting*. Sedangkan, terdapat 266 balita yang memiliki panjang badan lahir normal sebanyak 120 balita (45.1%) yang *stunting* dan 146 balita (54.9%) yang tidak *stunting*.

Hasil dari analisis *Chi-Square* antara variabel panjang badan lahir dengan kejadian *stunting* diperoleh nilai  $p = 0.047 < 0.05$  dengan nilai OR sebesar 0.487 (95% CI: 0.251 – 0.946), artinya terdapat hubungan antara panjang badan lahir dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar serta balita yang memiliki panjang badan lahir pendek berisiko 0.487 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang memiliki panjang badan lahir normal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningrum (2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara panjang badan lahir dengan kejadian *stunting*, hal ini dapat dilihat dari hasil uji *chi square* diperoleh nilai  $p\ value = 0.035 < 0.05$ . Nilai OR yang didapatkan sebesar 0.317 (95% CI: 0.107 – 0.945), artinya anak yang memiliki panjang badan lahir yang pendek berisiko 0.317 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan anak yang memiliki panjang badan lahir normal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2021) menunjukkan bahwa dari 12 anak (11.7%) yang mengalami *stunting* terdapat 5 anak (23.8%) yang memiliki panjang badan lahir  $< 48$  cm dan 7 anak (8.5%) yang memiliki panjang badan lahir  $\geq 48$  cm. Berdasarkan uji *Chi Square* didapatkan hasil nilai  $p\ value$  sebesar  $0.000 < 0.05$  artinya terdapat hubungan antara panjang badan lahir dengan

kejadian *stunting* pada anak usia 0 – 36 bulan di Desa Jebed Utara. Nilai OR sebesar 1.56 artinya anak dengan panjang badan lahir yang pendek berisiko 1.56 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan anak dengan panjang badan lahir normal.

#### **4. Hubungan Berat Badan Lahir dengan Kejadian *Stunting***

Berat badan lahir digunakan untuk mendiagnosis apakah bayi memiliki berat badan lahir normal atau Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Apabila bayi lahir dengan kondisi BBLR dapat berisiko mengalami gagal tumbuh yang dapat menyebabkan *stunting*. Ibu hamil yang memiliki status gizi kurang, usia ibu yang terlalu tua atau terlalu muda serta penyakit yang diderita ibu pada saat hamil seperti anemia, asma, hipertensi dan lain-lain memiliki peluang yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan status gizi rendah, BBLR dan prematur (Indanah dan Dewi J, 2020).

Hasil analisis multivariat pada penelitian ini diperoleh nilai  $p = 0.308 > 0.05$  artinya tidak ada hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini disebabkan karena sebanyak 134 balita (47.9%) yang tidak BBLR lebih banyak mengalami *stunting* dibandingkan dengan anak yang BBLR sebanyak 13 balita (44.8%). Nilai OR yang diperoleh sebesar 1.733 (95% CI: 0.602 – 4.987) menunjukkan bahwa balita yang BBLR berisiko 1.733 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang tidak BBLR.

Hasil tersebut bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa anak yang BBLR dapat meningkatkan risiko kejadian malnutrisi dibandingkan dengan anak yang tidak BBLR. Hal ini dapat terjadi karena pada penelitian ini kejadian *stunting* diukur pada anak usia 6 – 59 bulan sedangkan berat badan lahir diukur pada saat anak baru lahir sehingga dalam kurun waktu tersebut, bayi yang tidak memiliki

riwayat BBLR kurang mendapatkan asupan gizi yang adekuat sebagai penunjang proses tumbuh kembangnya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andika dkk. (2021) bahwa berat badan lahir tidak berpengaruh terhadap kejadian *stunting* pada balita di Puskesmas Padang Tiji pada tahun 2020 ( $p = 0.678$ ). Balita yang memiliki berat badan lahir rendah apabila mendapatkan nutrisi yang cukup dan diberikan ASI eksklusif tanpa diberikan makanan tambahan dapat meningkatkan gizi pada balita sehingga tidak dapat mengalami *stunting*.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk. (2020) ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian *stunting* ( $p = 0.297$ ). Pada saat kehamilan, ibu yang mengalami kekurangan gizi dilakukan intervensi dengan memberikan PMT dan tablet Fe selama masa *Antenatal Care* (ANC). Tingginya kesadaran ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan dapat berjalan dengan baik serta bayi dapat lahir dengan berat badan yang normal.

Anak dengan riwayat BBLR merupakan salah satu faktor yang berpotensi dapat memengaruhi pertumbuhan anak. Pengukuran berat badan dapat digunakan untuk melihat peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh seperti tulang, otot, lemak, organ tubuh dan cairan tubuh sehingga dapat mengidentifikasi status gizi atau perkembangan anak (Noviana dan Ekawati, 2019).

Bayi yang lahir dengan BBLR akan mengalami keterlambatan pada proses tumbuh kembangnya karena bayi dengan BBLR sejak berada dalam kandungan telah melalui retardasi pada pertumbuhan *intrauterine* dan akan terus berlanjut sampai usia selanjutnya setelah bayi dilahirkan. Bayi dengan BBLR juga mengalami gangguan pada pencernaan karena saluran pencernaannya belum

berfungsi, hal ini dapat menyebabkan lemak dan protein tidak dapat terserap dan dicerna dengan baik sehingga terjadi kekurangan cadangan gizi dalam tubuhnya. Akibatnya, pertumbuhan pada bayi dengan BBLR akan terhambat jika bayi tidak mendapatkan gizi yang cukup, infeksi berulang dan perawatan kesehatan yang buruk dapat menyebabkan anak mengalami *stunting* (Rahmadi, 2017).

### **5. Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian *Stunting***

ASI merupakan cairan hidup yang mengandung zat imunitas bagi tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai macam penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan jamur. Kandungan yang ada dalam ASI lebih dari 200 elemen dasar seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, zat imun dan sel darah putih. Semua unsur ini memiliki jumlah dan proporsi yang seimbang (Nainggolan dan Sitompul, 2019).

WHO menganjurkan pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai bayi berusia enam bulan dan tetap memberikan ASI sampai anak berusia dua tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa bayi berhak mendapatkan ASI sampai usia enam bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya (Malonda dkk., 2020).

Menurut UNICEF, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa memberikan cairan tambahan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih serta tanpa makanan tambahan seperti pisang, pepaya, bubur dan lainnya. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI sejak bayi lahir sampai usia enam bulan dan tidak boleh menambahkan dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

Manfaat ASI sebagai sumber nutrisi terbaik dan ideal dengan komposisi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan bayi pada masa pertumbuhan. ASI mengandung asam lemak yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak sehingga bayi

yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki potensi untuk unggul dalam prestasi dan dapat meningkatkan kecerdasan. Selain itu, ASI sebagai makanan tunggal untuk memenuhi kebutuhan bayi pada masa pertumbuhan sampai usia enam bulan (Pangaribuan dkk., 2022).

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa 237 balita (76.7%) telah mendapatkan ASI eksklusif dan 72 balita (23.3%) tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dari 72 balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, terdapat 17 balita (23.6%) yang tidak pernah mendapatkan ASI sejak lahir, 20 balita (27.8%) tidak mendapatkan ASI yang cukup karena ibu tidak dapat memproduksi ASI dalam jumlah yang banyak dan 35 balita (48.6%) yang tidak menunjukkan kenaikan berat badan setiap bulannya yang menyebabkan berat badan anak berada di bawah batas normal untuk usianya sehingga bidan menyarankan pemberian susu formula untuk membantu menambah berat badan anak.

Dalam QS al-Baqarah/2: 233, Allah Swt, berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٣

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam ayat ini memerintahkan kepada para ibu untuk memberikan susu kepada anak-anaknya. Air Susu Ibu (ASI) baik dari ibu kandung atau bukan merupakan makanan terbaik bagi bayi hingga usia dua tahun. Dua tahun adalah batas maksimal dari penyusuan yang sempurna atau lebih dikenal dengan istilah ASI eksklusif. Pemberian ASI selama dua tahun meskipun diperintahkan tetapi bukanlah suatu kewajiban. Arti dari penggalan ayat yang menyatakan *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan* artinya anjuran ini sangat ditekankan, seakan-akan ini adalah kewajiban. Akan tetapi, apabila orang tua sepakat untuk menyapih sebelum anak berusia dua tahun dengan kerelaan hati bukan karena paksaan dari siapapun maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan anak (Shihab, 2002).

Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini merupakan petunjuk bagi Allah Ta'ala bagi para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu selama dua tahun penuh. Dan setelah itu terpenuhi, maka tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: (لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) “*yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa para ibu diperintahkan untuk memberikan ASI kepada anaknya hingga berusia dua tahun. Pemberian ASI pada hari pertama kehidupan bayi dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi untuk membantu proses tumbuh kembangnya. Kolostrum yang kaya akan protein dan laktosa ASI sebagai sumber energi bagi tubuh dapat diserap dengan baik dibandingkan susu formula. (Hegar, 2013). Akan tetapi, jika kedua orang tua sepakat untuk menyapih anaknya karena berbagai macam pertimbangan seperti produksi ASI ibu yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, maka hal tersebut diperbolehkan.

Pada analisis bivariat ditemukan bahwa terdapat 121 balita (51.1%) yang mendapatkan ASI eksklusif lebih banyak dinyatakan *stunting* dibandingkan dengan

balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 26 balita (36.1%). Hal ini dapat terjadi karena pemberian ASI eksklusif dimulai pada saat anak baru saja dilahirkan sampai usia enam bulan tanpa makanan dan minuman tambahan, sedangkan kejadian stunting pada penelitian ini diukur pada balita usia 6 – 59 bulan. Dalam hal ini, usia balita berpotensi dapat memodifikasi pengaruh variabel pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian stunting.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik ganda, terdapat interaksi antara pemberian ASI eksklusif dengan umur balita terhadap kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar ( $p = 0.011$ ) dengan nilai ORa sebesar 0.312 (95% CI: 0.126 – 0.767), artinya pada usia 0 – 23 bulan dengan riwayat pemberian ASI eksklusif lebih protektif pada kejadian *stunting* dibandingkan pada usia 24 – 59 bulan dengan riwayat pemberian ASI eksklusif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dkk. (2021) menunjukkan bahwa dari 28 balita yang mengalami *stunting* terdapat 5 balita (17.9%) yang mendapatkan ASI eksklusif dan 23 balita (82.1%) tidak mendapatkan ASI eksklusif. Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji *Chi Square* diperoleh nilai  $p\ value = 0.04 < 0.05$  artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Togo-Togo. Nilai OR sebesar  $0.29$  (95% CI:  $0.08 - 0.99$ )  $< 1$  berarti pemberian ASI eksklusif merupakan faktor protektif terhadap kejadian *stunting* pada balita.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andini (2019) bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* pada baduta usia 7 – 24 bulan di Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dengan nilai  $p\ value = 0.002 < 0.05$ . Nilai OR 8.8 menunjukkan bahwa baduta yang

tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki risiko 8.8 kali lebih besar untuk mengalami *stunting* dibandingkan dengan baduta yang mendapatkan ASI eksklusif.

#### **6. Hubungan Waktu Pemberian MP-ASI dengan Kejadian *Stunting***

Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) didefinisikan sebagai suatu proses yang dimulai ketika ASI yang diberikan kepada bayi usia enam bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya, maka diperlukan makanan atau cairan lainnya sebagai pendamping ASI untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. MP-ASI bukan sebagai pengganti ASI tetapi sebagai pelengkap ASI. ASI tetap diberikan kepada anak sampai usia dua tahun disertai dengan pemberian MP-ASI. Target rentang usia pemberian MP-ASI umumnya adalah usia 6 hingga 24 bulan, meskipun pemberian ASI dapat berlanjut hingga usia dua tahun (Dewey, 2003; Primihastuti dkk., 2022).

Pada penelitian ini, mayoritas anak yang *stunting* terjadi pada balita yang mendapatkan MP-ASI tepat waktu sebanyak 143 balita (48.1%). Hal ini dapat disebabkan karena pada praktik pemberian MP-ASI tidak hanya memperhatikan usia pertama kali saat anak mendapatkan MP-ASI tetapi juga perlu dilihat asupan zat gizi makro dan mikro pada anak. Defisiensi zat gizi pada anak tidak hanya terjadi saat anak dilahirkan hingga usia tiga tahun, tetapi ketika anak masih berada dalam kandungan ibunya yang juga dapat memengaruhi kejadian *stunting*. Kualitas makanan anak yang buruk seperti makanan yang kurang mengandung zat gizi mikro, makanan yang tidak bervariasi dan anak kurang mengonsumsi makanan hewan juga dapat memperbesar peluang anak mengalami *stunting* (Sentana dkk, 2018).

Hasil analisis dari penelitian ini menggunakan uji statistik *Chi Square* diperoleh nilai  $p = 0.476 > 0.05$  artinya tidak ada hubungan antara waktu pemberian MP-ASI dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini disebabkan karena 297 balita (96.1%) dari 309 balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan mendapatkan MP-ASI sesuai dengan waktu yang dianjurkan yaitu pada usia  $\geq 6$  bulan. Nilai OR yang diperoleh sebesar 0.538 atau  $1/0.538 = 1.859$  (95% CI: 0.159 – 1.827) menunjukkan bahwa balita yang mendapatkan MP-ASI dini memiliki peluang 1.859 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang mendapatkan MP-ASI tepat waktu.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastity dan Harleli (2021) bahwa tidak terdapat hubungan antara waktu pengenalan MP-ASI dengan kejadian *stunting* di Puskesmas Soropia ( $p = 1.000$ ). Dari 93 responden, terdapat 54 responden yang mulai memperkenalkan MP-ASI pada waktu yang tepat sebanyak 2 responden (3.7%) yang memiliki balita *stunting* dan 52 responden (96.3%) yang memiliki balita tidak *stunting*. Sedangkan terdapat 39 responden yang memperkenalkan MP-ASI pada waktu yang tidak tepat, sebanyak 1 responden (2.6%) yang memiliki balita *stunting* dan 38 responden (97.4%) yang memiliki balita tidak *stunting*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Mu'minah (2020) juga mendapatkan hasil yang sama yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat pemberian MP-ASI dengan kejadian *stunting* dengan nilai  $p = 0.823 > 0.05$ . Balita yang diperkenalkan pada MP-ASI pada usia  $< 7$  bulan memiliki peluang 0.859 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang baru diperkenalkan pada MP-ASI pada usia  $\geq 7$  bulan.

Pemberian MP-ASI pada usia dini memiliki pengaruh yang kecil terhadap pertumbuhan anak, tetapi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup anak. Pengenalan anak terhadap MP-ASI pada usia dini terutama sebelum berusia empat bulan dapat dikaitkan dengan

peningkatan risiko penyakit saluran cerna sehingga menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat, defisiensi mikronutrien dan rentan terhadap berbagai macam penyakit menular pada dua tahun pertama kehidupan (Wangiyana dkk., 2020).

Usia pemberian MP-ASI kurang dari enam bulan atau lebih dari enam bulan dapat mengakibatkan bayi mengalami kekurangan zat besi karena nutrisi yang tidak mencukupi. Gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena asupan zat besi yang kurang saat balita dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama akan menyebabkan *stunting* sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua mengenai pemberian MP-ASI (Hanum, 2019).

#### **7. Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian *Stunting***

Penyakit infeksi adalah gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur atau parasit. Penyakit ini dapat menyebar secara langsung dan tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyebaran penyakit secara langsung seperti kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, gigitan hewan atau melalui tanah dan air yang telah terkontaminasi. Sedangkan, penyebaran secara tidak langsung seperti menyentuh benda atau melalui konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri dan virus.

Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi logistik ganda diperoleh nilai  $p = 0.117 > 0.05$  dengan nilai OR sebesar 1.566 (95% CI: 0.894 – 2.744) , artinya tidak terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar serta balita yang memiliki riwayat penyakit infeksi berisiko 1.566 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi.

Balita dalam penelitian ini sebagian besar pernah memiliki riwayat penyakit infeksi. Dari 176 balita yang memiliki riwayat penyakit infeksi, sekitar 116 balita (65.9%) pernah mengalami diare, 31 balita (17.6%) pernah mengalami cacingan dan 29 balita (16.5%) pernah mengalami penyakit diare dan cacingan. Lama durasi penyakit infeksi yang dialami oleh balita juga bervariasi, terdapat 172 balita (97.7%) yang durasi sakitnya < 3 hari dan 4 balita (2.3%) yang durasi sakitnya selama  $\geq 3$  hari sampai dinyatakan sembuh.

Pengelompokan usia anak saat pertama kali terkena penyakit infeksi yaitu usia 0 – 11 bulan sebanyak 68 balita (38.6%), usia 12 – 23 bulan sebanyak 68 balita (38.6%), usia 24 – 35 bulan sebanyak 29 balita (16.5%), usia 36 – 47 bulan sebanyak 5 balita (2.8%) dan usia 48 – 59 bulan sebanyak 6 balita (3.4%). Jadi, pada penelitian ini, mayoritas anak yang pertama kali terkena penyakit infeksi terdapat pada kelompok usia 0 – 23 bulan.

Untuk pengobatannya, kebanyakan orang tua melakukan pengobatan sendiri di rumah ketika anak sakit seperti membuat ramuan herbal atau membeli obat di warung terdekat yaitu sekitar 92 balita (52.3%), hal ini disebabkan karena sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini bertempat tinggal jauh dari puskesmas atau dari jalan poros. Sedangkan 84 balita lainnya (47.7%) melakukan pengobatan di puskesmas/ RS/ pelayanan kesehatan lainnya.

Dalam Islam diyakini bahwa segala macam penyakit terutama penyakit infeksi pasti ada obatnya. Islam juga menganjurkan kepada umat manusia agar meyakini serta berusaha untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Seperti yang terdapat pada hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( رواه مسلم )

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, Abu ath-Thahir dan Ahmad bin 'Isa, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin al-Harits, dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id, dari Abu az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuh penyakit tersebut dengan izin Allah 'Azza wa Jalla" (HR. Muslim no. 4084).

Manusia tentu tidak selamanya berada dalam kondisi yang prima dan suatu saat pasti akan merasakan sakit yang merupakan akibat dari suatu penyakit baik ringan maupun berat. Salah satu upaya mendasar yang dapat dilakukan manusia ketika sakit adalah dengan melakukan pengobatan. Obat merupakan suatu campuran bahan yang digunakan untuk menetapkan suatu diagnosis, mengurangi, menghilangkan, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit atau gejala penyakit. Kemajuan teknologi menunjukkan beberapa kebenaran bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran telah melahirkan penemuan-penemuan baru, khususnya dalam sistem kesehatan, baik dari segi metode maupun obat yang digunakan. Selain pendekatan modern, cara dan bahan yang digunakan pada pengobatan tradisional juga terus berkembang (Burhan dkk., 2021 ; Putro, 2021).

Dari hadist dan penjelasan diatas kita mengetahui bahwa setiap penyakit yang ada di muka bumi ini telah Allah siapkan obatnya. Mencari pengobatan merupakan suatu bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan oleh manusia ketika merasa sakit. Di zaman ini, terdapat berbagai macam alternatif pengobatan yang tersedia mulai dari pengobatan tradisional atau herbal sampai pada pengobatan yang menggunakan peralatan modern. Di antara banyaknya pilihan tersebut, manusia

dapat memilih alternatif pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia itu sendiri. Akan tetapi, kita sebagai manusia tidak boleh menggantungkan harapan yang tinggi ataupun terlalu pasrah terhadap keputusan atau diagnosa dari manusia lainnya kecuali berharap dan meminta kesembuhan dan kemudahan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulidah dkk. (2019) menunjukkan bahwa dari 39 balita yang mengalami *stunting* sebanyak 23 balita (67.7%) yang memiliki riwayat penyakit infeksi kronis dan 16 balita (38.1%) tidak memiliki riwayat penyakit infeksi. Berdasarkan uji *Chi Square* diperoleh nilai *p value* = 0.01 < 0.05 dengan nilai OR sebesar 0.294 (95% CI: 0.11 – 0.76). artinya terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi kronis dengan kejadian *stunting*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adianta dan Nuryanto (2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* pada balita dengan korelasi positif, artinya semakin sering anak menderita penyakit infeksi maka semakin tinggi pula kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wae Nakeng tahun 2018. Hal ini disebabkan karena apabila anak terkena penyakit infeksi maka dapat memengaruhi nafsu makannya atau perutnya menjadi kosong karena muntah-muntah atau diare sehingga dapat memengaruhi proses metabolisme makanan dalam tubuh anak.

Penyakit infeksi yang diderita oleh balita dapat mengganggu penyerapan nutrisi, sehingga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh berkurang, meningkatkan kebutuhan metabolisme, dan mengurangi asupan makanan. Ada interaksi yang saling terkait antara status gizi dan penyakit infeksi. Penyakit infeksi dapat menyebabkan malnutrisi, hal ini dapat disebabkan karena terjadinya pengalihan fungsi energi yang awalnya dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, kemudian dialihkan untuk perlawanan tubuh terhadap infeksi.

Bakteri patogen yang merupakan penyebab penyakit infeksi kronis dapat memicu peradangan pada mukosa usus. Hal ini mengakibatkan kegagalan fungsi penghalang yang memungkinkan terjadinya translokasi patogen sehingga menghasilkan respon inflamasi sistemik yang menghambat hormon pertumbuhan tulang.

Selain itu, malabsorpsi nutrisi juga dapat memperburuk malnutrisi dan berkontribusi pada penghambatan hormon pertumbuhan yang dapat memperlambat proses pertumbuhan pada tulang. Sedangkan malnutrisi dapat meningkatkan risiko infeksi. Jika balita mengalami kondisi tersebut berulang kali dalam waktu yang relatif lama dan tidak segera ditangani, maka asupan makan balita dapat menurun dan mengganggu proses penyerapan nutrisinya. Hal ini dapat meningkatkan risiko stunting pada bayi (Maulidah dkk., 2019; Triana dan Haniyah, 2020).

Meskipun balita tidak memiliki riwayat penyakit infeksi, akan tetapi terdapat faktor lainnya yang dapat menyebabkan stunting pada balita. Faktor higiene dan sanitasi lingkungan juga dapat memengaruhi terjadinya penyakit infeksi seperti perilaku cuci tangan sebelum makan dan lingkungan yang kotor. Kebersihan makanan dapat memberikan dampak positif terhadap status gizi anak. Anak yang mengonsumsi makanan dengan kebersihan yang kurang baik dapat menimbulkan penyakit infeksi yang biasanya disertai dengan penurunan nafsu makan dan mengalami muntah atau mencret. Kondisi ini dapat menurunkan keadaan gizi balita dan berimplikasi buruk terhadap kemajuan pertumbuhan anak yang dapat bermanifestasi menjadi stunting (Adianta dan Nuryanto, 2019; Sutriyawan dkk., 2020).

## 8. Hubungan Status Imunisasi dengan Kejadian *Stunting*

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menginduksi atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga jika suatu saat nanti terkena penyakit tertentu tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Bagi anak yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dapat mencegah penderitaan atau rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit yang kemungkinan dapat menyebabkan kecacatan atau kematian (Indanah dan Dewi J, 2020; Pangaribuan dkk., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 290 (93.9%) dari 309 balita yang mendapatkan imunisasi. Dari 290 balita ini, terdapat 96 balita (33.1%) yang mendapatkan imunisasi lengkap, sedangkan 194 balita lainnya (66.9%) tidak lengkap. Dari 19 balita lainnya (6.1%) yang tidak mendapatkan imunisasi terdapat 18 balita (94.7%) yang tidak mendapatkan imunisasi disebabkan karena sebagian besar orang tua dan keluarga tidak setuju untuk memberikan imunisasi pada anaknya, mereka berasumsi bahwa imunisasi membuat anaknya sering sakit. Serta terdapat 1 balita (5.3%) yang tidak pernah ke posyandu dikarenakan orang tua balita berasumsi bahwa balita tersebut masih terlalu kecil untuk dibawa ke posyandu.

Hasil analisis dari penelitian ini menggunakan uji statistik *Chi Square* diperoleh nilai  $p = 0.585 > 0.05$  artinya tidak ada hubungan antara status imunisasi dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini disebabkan karena dari 290 balita yang mendapatkan imunisasi, jumlah balita yang tidak *stunting* lebih banyak pada balita yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap yaitu sebanyak 99 balita (51%). Menurut UNICEF (2013b), pelayanan kesehatan termasuk imunisasi dikategorikan sebagai penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.

Imunisasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit menular khususnya Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak belum tentu menjamin anak dapat terhindar dari penyakit. Ada beberapa hal yang dapat memengaruhi efektivitas dan kegunaan dari pemberian imunisasi yaitu kualitas atau standar vaksin yang diterima anak (Putri dkk., 2021).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Resiyanthi dan Yanti (2021) bahwa berdasarkan hasil uji statistik *Spearman Rank* menunjukkan  $p = 0.793 > 0.05$ , yang artinya tidak ada hubungan antara status imunisasi pada anak dengan kejadian *stunting* di Desa Gunaksa, Klungkung.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmayanti dan Pujonarti (2022) bahwa diketahui balita dengan imunisasi lengkap (50%) lebih banyak mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap (40.4%). Berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara imunisasi dengan kejadian *stunting* pada balita usia 0 – 59 bulan di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018. Nilai OR yang diperoleh dari uji *Chi Square* adalah 0.68 (95% CI: 0.295 – 1.554), artinya balita yang mendapatkan imunisasi lengkap merupakan faktor protektif terjadinya *stunting*.

Pemberian imunisasi secara lengkap tidak dapat menjamin anak dapat terhindar dari suatu penyakit. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi manfaat dan efektivitas dari imunisasi seperti kualitas vaksin yang diberikan kepada anak tidak memenuhi standar atau bisa dikatakan kurang baik. Artinya, anak yang mendapatkan imunisasi secara lengkap maupun yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami *stunting* (Azriful dkk., 2018).

### 9. Hubungan Pemberian Vitamin A dengan Kejadian *Stunting*

Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak yang dapat mencegah kerusakan pada mata, berperan dalam proses pembentukan, produksi dan pertumbuhan sel darah merah, limfosit, antibodi serta integritas sel epitel yang melapisi lapisan tubuh. Vitamin A dapat diperoleh dari asupan makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Apabila anak kurang mengonsumsi sayur dan buah maka asupan vitamin A yang masuk ke dalam tubuh anak akan berkurang (Putri dkk., 2021).

Salah satu program pemerintah untuk mengurangi angka defisiensi vitamin A pada anak adalah dengan memberikan vitamin A yang ditujukan untuk balita (6 – 59 bulan) yang diberikan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Bayi usia 6 – 11 bulan mendapatkan suplementasi vitamin A dengan kapsul biru (dosis 100.000 IU), sedangkan anak usia 12 – 59 bulan dengan kapsul merah (dosis 200.000 IU). Program tersebut dilaksanakan secara gratis dan data diperoleh di berbagai fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Poskesdes/ Polindes, Balai Pengobatan, praktek dokter atau bidan praktek swasta (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 244 balita (79%) yang mendapatkan dosis vitamin A sebanyak 132 balita (54.1%) yang mendapat dosis vitamin A secara lengkap dan 112 balita (45.9%) tidak mendapat dosis vitamin A secara lengkap sesuai dengan usianya serta 65 balita (21%) tidak mendapatkan dosis vitamin A. Hasil analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda pada penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian vitamin A dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai  $p = 0.497 > 0.05$ . Sedangkan, nilai OR yang diperoleh sebesar 1.209 (95% CI: 0.699 – 2.089) artinya balita yang tidak

mendapatkan dosis vitamin A lengkap berpeluang 1.209 kali lebih besar mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang mendapatkan vitamin A lengkap.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmayanti dan Pujonarti (2022) bahwa presentase kejadian *stunting* pada balita yang mengonsumsi vitamin A sebesar 45.2% dan yang tidak mengonsumsi vitamin A sebesar 44.4%. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara faktor konsumsi vitamin A dengan kejadian *stunting* pada balita usia 0 – 59 bulan di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018. Nilai OR sebesar 0.97 (0.478 – 1.965), artinya balita yang mengonsumsi vitamin A memiliki faktor protektif untuk menderita *stunting*.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dkk. (2021) bahwa ibu yang menerapkan pemberian vitamin A kepada balita dengan baik juga dapat menyebabkan *stunting* sebanyak 64%. Hasil analisis bivariat dari penelitian ini yaitu tidak ada hubungan yang berarti antara pemberian vitamin A dengan kejadian *stunting* ( $p = 0.124$ ). Nilai OR sebesar 1.56 (95% CI: 0.907 – 7.204) artinya ibu yang menerapkan pemberian vitamin A dengan tidak baik berisiko 1.56 kali dibandingkan dengan pemberian vitamin A dengan baik.

Anak yang mengalami defisiensi vitamin A akan menderita kegagalan pada pertumbuhannya. Ini disebabkan karena apabila vitamin A yang masuk ke dalam tubuh sangat kurang akan memengaruhi sintesis protein yang juga berpengaruh pada proses pertumbuhan sel. Selain itu, defisiensi vitamin A dapat memengaruhi fungsi imunitas tubuh sehingga dapat mudah terserang penyakit infeksi, misalnya apabila terjadi pada permukaan dinding usus akan mengakibatkan penyakit diare (Bahmat dkk., 2015).

#### **10. Determinan Kejadian *Stunting***

Berdasarkan hasil analisis multivariat pada penelitian ini menggunakan uji regresi logistik ganda bahwa terdapat dua variabel yang secara bermakna

berhubungan dengan kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar yaitu tinggi badan ayah ( $p = 0.012$ ) dan pemberian ASI eksklusif x umur ( $p = 0.008$ ). Sedangkan, variabel yang memiliki hubungan yang bermakna dan paling dominan terhadap kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar adalah variabel tinggi badan ayah ( $p = 0.012$ ) dengan nilai AOR paling besar yaitu 2.375 (95% CI: 1.207 – 4.673).

Penelitian yang dilakukan oleh Siswati dkk. (2020) menunjukkan bahwa tingkat ekonomi rendah (AOR 1.24, CI 95%: 1.15 – 1.33), ayah yang pendek (AOR 1.24, CI 95%: 1.18 – 1.31) dan ibu yang pendek (AOR 1.23, CI 95%: 1.17 – 1.29) merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian *stunting* di daerah perkotaan berdasarkan data Riskesdas tahun 2013. Artinya, ekonomi merupakan akar dari masalah gizi buruk. Orang tua yang berpenghasilan rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk membeli dan memilih makanan yang berkualitas baik, sarana dan prasarana kesehatan dan rekreasi, akses air dan tempat tinggal yang baik sehingga anak-anak lebih berisiko kekurangan gizi. Begitu pun dengan orang tua pendek cenderung memiliki anak *stunting* dibandingkan orang tua normal.

Ayah dengan perawakan tubuh yang pendek merupakan faktor risiko terjadinya *stunting* pada anak usia 1 – 2 tahun (AOR 2.7, CI 95%: 1.2 – 6). Tinggi badan ayah dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti faktor genetik yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah karena pembawa sifat pendek tersebut diwariskan pada keturunannya serta faktor eksternal seperti faktor penyakit dan asupan gizi sejak dini. Anak masih bisa memiliki tinggi badan yang normal selama tidak terpapar faktor risiko lain (Candra dkk., 2011).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fadlilah dan Fibriana (2023) bahwa berdasarkan hasil uji regresi logistik terdapat dua variabel yang merupakan faktor risiko terhadap kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Poncol yaitu panjang badan lahir ( $p = 0.000$ ) dan ASI eksklusif ( $p = 0.000$ ). Variabel panjang badan lahir merupakan faktor risiko paling dominan pada penelitian ini karena memiliki nilai OR sebesar 17.660 (95% CI: 4.830 – 64.578).

Sama halnya dengan hasil penelitian oleh Rangkuti dkk. (2023) bahwa terdapat tiga variabel yang berhubungan dengan kejadian *stunting* yaitu panjang badan lahir ( $p = 0.000$ ), berat badan lahir ( $p = 0.044$ ) dan status ekonomi ( $p = 0.000$ ). Sedangkan, variabel yang paling berhubungan dan dominan adalah panjang badan lahir dengan nilai OR 6.592, artinya balita yang lahir dengan panjang badan pendek lebih berisiko 6.6 kali dibandingkan balita yang lahir dengan panjang badan tidak pendek.

#### ***D. Keterbatasan Penelitian***

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional*, dimana variabel-variabel yang diteliti ditemukan pada satu waktu yang bersamaan sehingga sulit untuk mengetahui variabel mana yang terlebih dahulu menjadi penyebab atau akibat.
2. Teknik pengambilan *sampling* menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang diambil tidak menjamin dapat mewakili populasi (representatif), setiap sampel tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dalam satu populasi serta tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Distribusi kejadian *stunting* pada balita usia 6 – 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar, dari total sampel sebanyak 309 balita terdapat 147 balita (47.6%) yang mengalami *stunting*.
2. Ada hubungan antara tinggi badan ayah, panjang badan lahir, pemberian ASI eksklusif dan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Tidak ada hubungan antara tinggi badan ibu, berat badan lahir, waktu pemberian MP-ASI, status imunisasi dan pemberian vitamin A dengan kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar.
4. Variabel yang memiliki hubungan yang bermakna dan paling dominan terhadap kejadian *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar adalah tinggi badan ayah dengan nilai AOR sebesar 2.375 (95% CI: 1.207 – 4.673).

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Diharapkan kepada masyarakat terutama para ibu untuk lebih memperhatikan asupan gizi yang seimbang bagi anak serta rutin membawa balita ke Posyandu setiap bulan agar dapat dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.

### **2. Bagi Institusi-institusi Terkait**

Diharapkan Dinas Kesehatan dan instansi-instansi terkait untuk melakukan penyuluhan dan pemberian informasi secara rutin kepada remaja, calon ibu dan para ibu dalam meningkatkan pengetahuan terkait *stunting*, menumbuhkan kesadaran para ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada anak dan cara penanganan penyakit infeksi pada anak serta diperlukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala bagi kesehatan ibu hamil.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian dengan variabel yang lebih kompleks dengan menambahkan variabel yang belum diteliti oleh peneliti untuk lebih menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih mendalam dan maksimal serta dapat menggunakan teknik *simple random sampling* agar sampel yang diteliti dapat mewakili populasi (representatif).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adianta, I. Ketut Alit, dan I. Kadek Nuryanto. 2019. "Hubungan ASI Eksklusif Dan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Puskesmas Wae Nakeng Tahun 2018." *Jurnal Riset Kesehatan Nasional* 3(1):128–33. doi: 10.37294/jrkn.v3i1.152.
- Adriani, Merryana, dan Bambang Wirjatmadi. 2014. *Gizi dan Kesehatan Balita: Peranan Mikro Zinc pada Pertumbuhan Balita*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Andari, Wiwid, Tri Siswati, dan Bunga Astria Paramashanti. 2020. "Tinggi Badan Ibu Sebagai Faktor Risiko Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Kecamatan Pleret Dan Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta." *Journal of Nutrition College* 9(4):235–40. doi: 10.14710/jnc.v9i4.26992.
- Andika, Fauziah, Marniati Marniati, Nuzulul Rahmi, Chairanisa Anwar, Asmaul Husna, dan Faradilla Safitri. 2021. "The Analysis of Stunting Incidence Factors in Toddlers Aged 23-59 Months in the Work Area of the Padang Tiji Community Health Center, Pidie Regency, 2020." *International Journal of Science, Technology & Management* 2(3):642–49. doi: 10.46729/ijstm.v2i3.200.
- Andini, Virnalia. 2019. "Hubungan Panjang Badan Lahir, Berat Badan Lahir Dan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Baduta Usia 7-24 Bulan Di Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang." S1, Universitas Ngudi Waluyo, Semarang.
- Ariani, Malisa. 2020. "Determinan Penyebab Kejadian Stunting Pada Balita: Tinjauan Literatur." *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 11(1):172–86. doi: <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1>.
- Aritonang, Eta Aprita, Ani Margawati, dan Fillah Fithra Dieny. 2020. "Analisis Pengeluaran Pangan, Ketahanan Pangan Dan Asupan Zat Gizi Anak Bawah Dua Tahun (Baduta) Sebagai Faktor Risiko Stunting." *Journal of Nutrition College* 9(1):71–80. doi: 10.14710/jnc.v9i1.26584.
- Astuti, Anjar, Yanik Muyassaroh, dan Murti Ani. 2020. "The Relationship Between Mother's Pregnancy History and Baby's Birth to the incidence of stunting in infants." *Journal of Midwifery Science: Basic and Applied Research* 2(1):22–26. doi: 10.31983/jomisbar.v2i1.5934.
- Azriful, Azriful, Emmi Bujawati, Habibi Habibi, Syahratul Aeni, dan Yusdarif Yusdarif. 2018. "Determinan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59

Bulan di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.” *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*. doi: 10.24252/as.v10i2.6874.

Azrimaidaliza, Azrimaidaliza, Annisa Annisa, Yasirly Khairany, Nurul Prativa, Rahmani Adrianus, dan Mesa Putri Salmah. 2019. “Optimalisasi Tumbuh Kembang Balita Melalui Promosi Gizi Seimbang Di Kecamatan Koto Tangah Padang.” *LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2):17–26. doi: 10.25077/logista.3.2(Jul-Des).17-26.2019.

Bahmat, Dian Oktara, Herwanti Bahar, dan Idrus Jus’at. 2015. “Hubungan Asupan Seng, Vitamin A, Zat Besi Dan Kejadian Pada Balita (24-59 Bulan) Dan Kejadian Stunting Di Kepulauan Nusa Tenggara (Risikesdas 2010).” *Universitas Esa Unggul Jakarta*.

Bella, Febriani Dwi, Nur Alam Fajar, dan Misnaniarti Misnaniarti. 2020. “Hubungan Pola Asuh Dengan Kejadian Stunting Balita Dari Keluarga Miskin Di Kota Palembang.” *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)* 8(1):31–39. doi: 10.14710/jgi.8.1.31-39.

Budhathoki, Shyam Sundar, Amit Bhandari, Rejina Gurung, Abhishek Gurung, dan Ashish KC. 2020. “Stunting Among Under 5-Year-Olds in Nepal: Trends and Risk Factors.” *Maternal and Child Health Journal* 24(1):39–47. doi: 10.1007/s10995-019-02817-1.

Burhan, Adzky Al Qudsiyyah, Wahyudin Darmalaksana, Eko Prabowo Hadisantoso, dan Iu Rusliana. 2021. “Takhrij and Syarah Hadith on Chemistry: Islamic Perspective on Chemical-Based Medicines.” *Gunung Djati Conference Series* 5:16–24.

Candra, Aryu, Niken Puruhita, dan J. C. Susanto. 2011. “Risk Factors of Stunting among 1-2 Years Old Children in Semarang City.” *Media Medika Indonesiana* 45(3):206–12.

Chamidah, Atien Nur. 2009. *Pentingnya Stimulasi Dini Bagi Tumbuh Kembang Otak Anak*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Biasa UNY.

Damayanti, Retty Anisa, Lailatul Muniroh, dan Farapti. 2016. “Perbedaan Pola Konsumsi Dan Riwayat Penyakit Infeksi Pada Balita Stunting Dan Non Stunting.” *Adi Husada Nursing Journal* 2(2):61–68.

Darmawan, Anggia Chrisanti. 2019. *Pedoman Praktis Tumbuh Kembang Anak (Usia 0 - 72 Bulan)*. 1 ed. Bogor: Penerbit IPB Press.

Dayuningsih, Tria Astika Endah Permatasari, dan Nana Supriyatna. 2021. “Pengaruh Pola Asuh Pemberian Makan terhadap Kejadian Stunting pada Balita.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 14(2):3–11.

- Dewey, Kathryn. 2003. *Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child*. Washington, DC: Pan American Health Organization.
- Dewi, Sawitri, dan Ikhwah Mu'minah. 2020. "Pemberian MP-ASI Tidak Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1 - 3 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbang I Kabupaten Banyumas." *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan* 10(1):5–10. doi: 10.47701/infokes.v10i1.841.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. 2020. *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020*. Polewali Mandar: Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. 2021. "Rekap Data Status Gizi: ePPGBM Program Gizi Dinkes Tahun 2019 - 2021."
- Dwijayanti, Lina Anggaraeni, Ni Made Karlina Sumiari Tangkas, dan Kadek Dwi Arlinayanti. 2020. "Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Sawan I." *MIDWINERSLION: Jurnal Kesehatan STIKes Buleleng* 5(2):380–89. doi: 10.52073/midwinerslion.v5i2.192.
- Fadlilah, Amalia Augustina, dan Arulita Ika Fibriana. 2023. "Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Poncol." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 7(2):293–302. doi: 10.15294/higeia.v7i2.64230.
- Farhan, Dimas Abu. 2017. "Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Wanita Tani Sekarmulia, Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Fikawati, Sandra, Ahmad Syafiq, dan Arinda Veratamala. 2017. *Gizi Anak dan Remaja*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers.
- Hamalding, Hermawati, Irfan Said, dan Siti Nurmiati. 2020. "Analisis Determinan Kejadian Stunting di Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep." *Jurnal Dunia Gizi* 3(1):09. doi: 10.33085/jdg.v3i1.4646.
- Hanafi, Imam. 2018. "Perkembangan Manusia Dalam Tinjauan Psikologi Dan Al-Qur'an." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 1(01):84–99. doi: 10.37542/iq.v1i01.7.
- Hanifa, Fanni, dan Novarista Intan Mon. 2021. "Hubungan Sanitasi Lingkungan, Berat Lahir Dan Panjang Lahir Dengan Stunting Pada Anak Usia 25-72

Bulan.” *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia* 11(03):163–70. doi: 10.33221/jiki.v11i03.1335.

Hanum, Nur Hadibah. 2019. “Hubungan Tinggi Badan Ibu dan Riwayat Pemberian MP-ASI dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan.” *IAGIKMI & Universitas Airlangga* 3(2):78–84. doi: 10.20473/amnt.v3.i2.2019.78-84.

Harjatmo, Titus Priyo, Holil M. Par'i, dan Sugeng Wiyono. 2017. *Penilaian Status Gizi*. 1 ed. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Hastono, Susanto Priyo. 2016. *Analisis Data pada Bidang Kesehatan*. 3 ed. Depok: Rajawali Pers.

Hegar, Badriul. 2013. “IDAI | Mengapa ASI Eksklusif Sangat Dianjurkan Pada Usia Di Bawah 6 Bulan.” Diambil 4 Agustus 2023 (<https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/mengapa-asi-eksklusif-sangat-dianjurkan-pada-usia-di-bawah-6-bulan>).

Hidayanti, Tutik, Iis Hanifah, dan Yessy Nur Endah Sary. 2019. *Pendampingan Gizi pada Balita*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Hidayati, Novi. 2021. “Berat Badan dan Panjang Badan Lahir Meningkatkan Kejadian Stunting.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 14(1):8–17.

Ibnu Katsir, dan Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Ishaq Al-Sheikh. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 5. 1 ed. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Ibnu Katsir, dan Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Ishaq Al-Sheikh. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 7. 1 ed. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Ibrahim, Irviani Anwar, dan Ratih Faramita. 2015. “Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dengan Kejadian Stunting Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Barombong Kota Makassar Tahun 2014.” *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*. doi: 10.24252/as.v7i1.1978.

Indanah, Indanah, dan Ratna Dewi J. 2020. “Factors Related to Stunting in Toddlers.” Hlm. 190–93 dalam *Advances in Health Sciences Research*. Vol. 27. Atlantis Press.

Iqbal, Muhammad, dan Desty Ervira Puspaningtyas. 2018. *Penilaian Status Gizi: ABCD*. Jakarta Selatan: Salemba Medika.

Irwan. 2017. *Epidemiologi Penyakit Menular*. 1 ed. Yogyakarta: Absolute Media.

Jannah, Mardiatul, Fitriani Fitriani, dan Irfanita Nurhidayah. 2020. “Hubungan Tinggi Badan Orang Tua Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di

Kabupaten Bulukumba.” *Idea Nursing Journal* 11(2):12–17. doi: 10.52199/inj.v11i2.19799.

Kementerian Kesehatan RI. 2012. “Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.”

Kementerian Kesehatan RI. 2014a. *Buku Ajar Imunisasi*. 2 ed. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Kementerian Kesehatan RI. 2014b. “Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: Situasi dan Analisis ASI Eksklusif.”

Kementerian Kesehatan RI. 2017. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.” Diambil 4 Agustus 2022 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111977/permenkes-no-12-tahun-2017>).

Kementerian Kesehatan RI. 2018a. “Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi.” *Direktorat P2PTM*. Diambil 9 Juli 2022 (<http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi>).

Kementerian Kesehatan RI. 2018b. “Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018.”

Kementerian Kesehatan RI. 2020a. “Manfaat Pemberian Vitamin A Untuk Anak.” *Direktorat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*. Diambil 12 Februari 2023 (<https://promkes.kemkes.go.id/manfaat-pemberian-vitamin-a-untuk-anak>).

Kementerian Kesehatan RI. 2020b. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.”

Kementerian Kesehatan RI. 2021. “Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.” Diambil 13 Juli 2022 (<https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>).

Khairani, Nurul, dan Pawiliyah Pawiliyah. 2020. “The Relationship Between Family Characteristics With Stunting Incidence In Working Area Of Padang Serai Public Health Center.” *Nurse and Health: Jurnal Keperawatan* 9(2):184–93. doi: 10.36720/nhjk.v9i2.196.

Kurniawan, Agung Widhi, dan Zarah Puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 1 ed. Yogyakarta: Pandiva Buku.

- Latifah, Al Ma'idatul, Lina Ema Purwanti, dan Filia Icha Sukamto. 2020. "Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada Balita 1 - 5 Tahun." *Health Sciences Journal* 4(1):142. doi: 10.24269/hsj.v4i1.409.
- Lusiani, Vita Hasta, dan Atika Dhiah Anggraeni. 2021. "Hubungan Frekuensi Dan Durasi Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kebasen Kabupaten Banyumas." *Journal of Nursing Practice and Education* 2(1):1-13. doi: 10.34305/jnpe.v2i1.374.
- Malonda, Nancy Swanida Henriette, Finny Warouw, Paul Arthur Tennov Kawatu, dan Yulianty Sanggelorang. 2020. "History of Exclusive Breastfeeding and Complementary Feeding as a Risk Factor of Stunting in Children Age 36-59 Months in Coastal Areas." *Journal of Health, Medicine and Nursing* 70:52-57. doi: 10.7176/JHMN/70-07.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. 1998. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. 1 ed. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Maulidah, Wiwin Barokhatul, Ninna Rohmawati, dan Sulistiyani Sulistiyani. 2019a. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember." *Ilmu Gizi Indonesia* 2(2):89-100. doi: 10.35842/ilgi.v2i2.87.
- Maulidah, Wiwin Barokhatul, Ninna Rohmawati, dan Sulistiyani Sulistiyani. 2019b. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember." *Ilmu Gizi Indonesia* 2(2):89-100. doi: 10.35842/ilgi.v2i2.87.
- Mianna, Rika, dan Rini Harianti. 2020. "Immunization Status an Dietary Consumption Diversity to the Incidence of Stunting in Toodlers | Jurnal Kesehatan Komunitas." *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)* 6(2):225-29.
- Mufdlilah. 2017. *Buku Pedoman: Pemberdayaan Ibu Menyusui pada Program ASI Eksklusif*. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Mulyani, Itza, Marniati Marniati, dan Hanif Muchdatul Ayunda. 2020. "The Relation of LBW, Mother's Height with The Accidence of Stunting in the Children 6-24 Months in Aceh Barat Regency." *Journal of Nutrition Science* 1(2):33. doi: 10.35308/jns.v1i2.2774.
- Nainggolan, Beauty Grace, dan Monalisa Sitompul. 2019. "Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1-3 Tahun." *Nutrix Journal* 3(1):36-41. doi: 10.37771/nj.Vol3.Iss1.390.

- Nisa', Ngainis Sholihatin. 2020. "Kejadian Stunting Pada Balita Di Puskesmas." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 4(Special 3):595–605. doi: 10.15294/higeia.v4iSpecial.
- Noviana, Ulva, dan Heni Ekawati. 2019. "Analisis Faktor Berat Badan Lahir, Status Ekonomi Sosial, Tinggi Badan Ibu dan Pola Asuh Makan dengan Kejadian Stunting." *PSNKH: Prosiding Seminar Nasional Poltekkes Karya Husada* 1(1):31–45.
- Nurmalasari, Yesi, Anggunan, dan Tya Wihelmia Febriany. 2020. "Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dan Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 6 - 59 Bulan." *Jurnal Kebidanan* 6(2):205–11.
- Nursyamsiyah, Nursyamsiyah, Yulida Sobrie, dan Bani Sakti. 2021. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan." *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 4(3):611–22.
- Pangaribuan, Ingka Kristina, Faridah Mohd Said, Eva Ratna Dewi, Nadia Siahaan, dan Marlina Lasmawati Simbolon. 2022. "Factors Affecting The Event Stunting In Tolls At Sei Bamban Health Center Batang Satan District Langkat District Year 2020." *International Journal of Midwifery Research* 2(1):1–10. doi: 10.47710/ijmr.v2i1.25.
- Permatasari, Claudia. 2022. "Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 6(1). doi: 10.15294/higeia.v6i1.51282.
- Pitriani, Risa, dan Rika Andriyani. 2014. *Panduan Lengkap Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Normal (Askeb III)*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Prihatini, Dewi, dan I. Nyoman Subanda. 2020. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4(2):46–59. doi: 10.31955/mea.vol4.iss2.pp46-59.
- Primihastuti, Dianita, Shinta Wurdiana Rhomadona, dan Intiyaswati Intiyaswati. 2022. "Pemberian MP-ASI Optimal Dalam Upaya Mencegah Kejadian Stunting." *Jurnal Keperawatan* 11(2):73–79. doi: 10.47560/kep.v11i2.400.
- Putri, Melvanda, Roedi Irawan, dan Indri Mukono. 2021. "Hubungan Suplementasi Vitamin A, Pemberian Imunisasi, dan Riwayat Penyakit Infeksi Terhadap Kejadian Stunting Anak Usia 24-59 Bulan di Puskesmas Mulyorejo, Surabaya." *Media Gizi Kesmas* 10(01):72–79. doi: 10.20473/mgk.v10i1.2021.72-79.

- Putro, Bambang Dharwiyanto. 2021. "Persepsi dan Perilaku Pengobatan Tradisional Sebagai Alternatif Upaya Mereduksi Penyakit Tidak Menular." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 4(2):87. doi: 10.24843/SP.2020.v4.i02.p05.
- Rahmadi, Antun. 2017. "Hubungan Berat Badan Dan Panjang Badan Lahir Dengan Kejadian Stunting Anak 12-59 Bulan Di Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik* 12(2):209–18. doi: 10.26630/jkep.v12i2.601.
- Rahmayana, Rahmayana, Irviani Anwar Ibrahim, dan Dwi Santy Damayati. 2014. "Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Anak Usia 24-59 Bulan Di Posyandu Asoka II Wilayah Pesisir Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2014." *Al-Sihah: The Public Health Science Journal* 6(2):424–36. doi: 10.24252/as.v6i2.1965.
- Rangkuti, Juni Andriani, Anto J. Hadi, Haslinah Ahmad, Ridwan Amiruddin, dan Owildan Wisudawan. 2023. "Determinan Stunting Pada Balita Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6(4):708–13. doi: 10.56338/mppki.v6i4.3381.
- Resiyanthi, Ni Komang Ayu, dan Ni Luh Gede Puspita Yanti. 2021. "Relationship Between Exclusive Breastfeeding and Basic Immunization Status Related with Stunting in Toddlers Aged 12-24 Months." *Indonesian Journal of Global Health Research* 3(4):563–70. doi: 10.37287/ijghr.v3i4.666.
- Rodriguez-Martinez et al. 2020. "Height and Body-Mass Index Trajectories of School-Aged Children and Adolescents from 1985 to 2019 in 200 Countries and Territories: A Pooled Analysis of 2181 Population-Based Studies with 65 Million Participants." *The Lancet* 396(10261):1511–24. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31859-6.
- Rohmayanti, Agusni, dan Siti Pujonarti. 2022. "The Dominant Factors of Stunting Incidence in Toddlers (0 -59 Months) in East Lombok Regency A Riskesdas Data Analysis 2018." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 7(12):147–57. doi: 10.5281/zenodo.7470961.
- Saadong, Djuhadiyah, Suriani B, Nurjaya Nurjaya, dan Subriah Subriah. 2021. "BBLR, Pemberian ASI Eksklusif, Pendapatan Keluarga, Dan Penyakit Infeksi Berhubungan Dengan Kejadian Stunting." *Jurnal Kesehatan Manarang* 7(Khusus):52–58. doi: 10.33490/jkm.v7iKhusus.374.
- Safitri, Adelia Marista, Dina Rahayuning Pangestuti, dan Ronny Aruben. 2017. "Hubungan Ketahanan Pangan Keluarga Dan Pola Konsumsi Dengan Status Gizi Balita Keluarga Petani (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Boyolali Tahun 2017)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)* 5(3):120–28. doi: 10.14710/jkm.v5i3.17181.

- Savita, Riza, dan Fitra Amelia. 2020. "Hubungan Pekerjaan Ibu, Jenis Kelamin, dan Pemberian ASI Eksklusif Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita 6-59 Bulan di Bangka Selatan." *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang* 8(1):1. doi: 10.32922/jkp.v8i1.92.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2019. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. 2 ed. Jakarta Pusat: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Sentana, Lyana Firsta, Juraida Roito Hrp, dan Zuchrah Hasan. 2018. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan Di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6(1):01–09. doi: 10.36929/jia.v6i1.108.
- Shihab, M. Quraish. 2002a. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. 3 ed. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002b. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. 4 ed. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002c. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. 5 ed. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Simbolon, Demsa, Frensi Riastuti, Jumiyati Jumiyati, dan Desri Suryani. 2021. "Is There a Relationship Between Pregnant Women's Characteristics and Stunting Incidence In Indonesia?" *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 16(3):331–39. doi: 10.15294/kemas.v16i3.23550.
- Siswati, Tri, Trynke Hookstra, dan Hari Kusnanto. 2020. "Stunting among Children Indonesian Urban Areas : What Is the Risk Factors." *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)* 8(1):1–8.
- Soekatri, Moesijanti Y. E., Sandjaja Sandjaja, dan Ahmad Syauqy. 2020. "Stunting Was Associated with Reported Morbidity, Parental Education and Socioeconomic Status in 0.5–12-Year-Old Indonesian Children." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(17):6204. doi: 10.3390/ijerph17176204.
- Soliman, Ashraf, Vincenzo De Sanctis, Nada Alaaraj, Shayma Ahmed, Fawziya Alyafei, Noor Hamed, dan Nada Soliman. 2021. "Early and Long-term Consequences of Nutritional Stunting: From Childhood to Adulthood." *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis* 92(1):1–10. doi: 10.23750/abm.v92i1.11346.
- Sugiyanto, Sugiyanto, dan Sumarlan Sumarlan. 2020. "Analisa Faktor Yang Berhubungan Dengan Stunting Pada Balita Usia 25-60 Bulan." *Jurnal*

*Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)* 7(2):9–20. doi: 10.33653/jkp.v7i2.485.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 19 ed. 2013: Penerbit Alfabeta.

Sukmawati, Sukmawati, Urwatil wusqa Abidin Abidin, dan Hasmia. 2021. “Hubungan Hygiene Dan Sanitasi Lingkungan Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Kurma.” *Journal Pequruang* 3(2):494–502. doi: 10.35329/jp.v3i2.2553.

Sukmawati, Sukmawati, Nadimin Nadimin, dan Aprilliani War Nurhayati. 2021. “Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Kabupaten Jeneponto.” *Media Gizi Pangan* 28(2):49–56. doi: 10.32382/mgp.v28i2.2538.

Sumampouw, Oksfrian Jufri. 2017. *Pemberantasan Penyakit Menular*. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Surmita, Surmita, Ida Noparini, Maryati Dewi, Witri Priawantiputri, dan Mona Fitria. 2019. “Hubungan Tinggi Badan Orang Tua Dan Kejadian Stunting Pada Balita.” *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 11(1):387–91. doi: 10.34011/juriskesbdg.v11i1.818.

Sutriyawan, Agung, Ratna Dian Kurniawati, Sri Rahayu, dan Julius Habibi. 2020. “Hubungan Status Imunisasi Dan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita: Studi Retrospektif.” *Journal Of Midwifery* 8(2):1–9. doi: 10.37676/jm.v8i2.1197.

Swarjana, I. Ketut. 2022. *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Syafrina, Merri, Masrul Masrul, dan Firdawati Firdawati. 2019. “Analisis Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Masalah Stunting Berdasarkan Nutrition Commitment Index 2018.” *Jurnal Kesehatan Andalas* 8(2):233–44. doi: 10.25077/jka.v8i2.997.

Triana, Noor Yunida, dan Siti Haniyah. 2020. “Relationship Between Characteristics of Children, Status of Infectious Disease, and Employment Status of Mothers with Stunting Children at Karanglewas Health Center.” Hlm. 168–73 dalam. Atlantis Press.

UNICEF. 2013. “Improving Child Nutrition: The Achievable Imperative for Global Progress.” *UNICEF DATA*. Diambil 3 Juli 2022 (<https://data.unicef.org/resources/improving-child-nutrition-the-achievable-imperative-for-global-progress/>).

- Wahyuningrum, Erikawati. 2021. "Hubungan Berat Badan Lahir Panjang Badan Lahir Dan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Gatak." S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Wanda, Yosintha Dilina, Fardila Elba, Didah Didah, Ari Indra Susanti, dan Fedri Ruluwedrata Rinawan. 2021. "Riwayat Status Imunisasi Dasar Berhubungan dengan Kejadian Balita Stunting." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7(4):851–56.
- Wandini, Riska, Rilyani Rilyani, dan Eneng Resti. 2021. "Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7(2):274–78. doi: 10.33024.
- Wangiyana, Ni Komang Ayu Swanitri, Titi Pambudi Karuniawaty, Ristania Ellya John, Ratu Missa Qurani, Jeslyn Tengkawan, Ayu Anandhika Septisari, dan Zulfikar Ihyauddin. 2020. "Praktik Pemberian MP-ASI Terhadap Risiko Stunting Pada Anak Usia 6-12 Bulan Di Lombok Tengah [The Complementary Feeding Practice And Risk Of Stunting Among Children Aged 6-12 Months In Central Lombok]." *Penelitian Gizi Dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food Research)* 43(2):81–88. doi: 10.22435/pgm.v43i2.4118.
- Wardani, Dyah Wulan Sumekar Rengganis, Marita Wulandari, dan Suharmanto Suharmanto. 2020. "Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dan Ketahanan Pangan terhadap Kejadian Stunting pada Balita." *Jurnal Kesehatan* 11(2):287. doi: 10.26630/jk.v11i2.2230.
- WHO. 2015. "Stunting In a Nutshell." Diambil 13 Juli 2022 (<https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>).
- WHO. 2016. "Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences - Conceptual Framework." Diambil 24 September 2022 (<https://www.who.int/publications/m/item/childhood-stunting-context-causes-and-consequences-framework>).
- WHO. 2019. "The Changing Face of Malnutrition (The State of The World's Children 2019)." Diambil 9 Juli 2022 (<http://features.unicef.org/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/>).
- WHO. 2021. "Levels and Trends in Child Malnutrition: UNICEF/WHO/The World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates: Key Findings of the 2021 Edition."
- Widiastity, Wilda, dan Harleli Harleli. 2021. "Hubungan Pemberian MP-ASI Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Usia 6 – 24 Bulan Di Puskesmas Soropia." *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 1(2):81–86. doi: 10.56742/nchat.v1i2.13.

- Winarni, Lastri Mei, Beti Prihandini, dan Febi Ratnasari. 2021. "Hubungan antara Tinggi Badan Orang Tua dan Pemberian ASI Eksklusif terhadap Kejadian Stunting di Puskesmas Sepatan Kabupaten Tangerang." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7(4):688–96. doi: 10.33024/jkm.v7i4.3713.
- Winda, Stella Agrifa, Suhaimi Fauzan, dan Agus Fitriangga. 2021. "Tinggi Badan Ibu Terhadap Kejadian Stunting pada Balita: Literature Review." *ProNers* 6(1):1–9. doi: <http://dx.doi.org/10.26418/jpn.v6i1.48107>.
- Windasari, Dewi Purnama, Ilham Syam, dan Lilis Sarifa Kamal. 2020. "Faktor Hubungan dengan Kejadian Stunting di Puskesmas Tamalate Kota Makassar." *AcTion: Aceh Nutrition Journal* 5(1):27–34. doi: 10.30867/action.v5i1.193.
- Yuliana, Yuliana, Frida Lina Tarigan, dan Lukman Hakim. 2021. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Stunting di Puskesmas Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tahun 2020." *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat* 6(2):117–26. doi: 10.51544/jmkm.v6i2.2240.
- Zogara, Asweros Umbu, Meirina Sulastris Loaloka, dan Maria Goreti Pantaleon. 2021. "Faktor Ibu dan Waktu Pemberian MPASI Berhubungan dengan Status Gizi Balita di Kabupaten Kupang." *Journal of Nutrition College* 10(1):55–61.

**Lampiran I**

**INFORMED-CONSENT**

**(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Telah mendapat keterangan secara terperinci dan jelas mengenai:

1. Penelitian yang berjudul “Determinan Kejadian *Stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022”
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada anak sebagai objek penelitian
3. Manfaat anak ikut sebagai objek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur penelitian

Responden mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia\*) secara sukarela untuk menjadikan anak saya sebagai subjek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Polewali Mandar, 16 November 2022

Peneliti,



Afifah Cahya Imani Arifin

Responden,

.....

\*) coret salah satu

*Lampiran 2*

**KUESIONER PENELITIAN**

**DETERMINAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI PUSKESMAS  
KATUMBANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

No. Responden

(diisi oleh peneliti)

**Petunjuk Pengisian:**

1. Berilah tanda *check list* (√) pada jawaban yang paling sesuai.
2. Isilah pertanyaan di bawah ini pada tempat yang telah tersedia.
3. Jawaban yang ibu berikan **akan dijaga kerahasiaannya** maka diharapkan ibu dapat menjawab semua pertanyaan di bawah ini dengan pendapat atau keyakinan.
4. Tiap jawaban yang ibu kembalikan merupakan bantuan yang tidak ternilai bagi penelitian ini, untuk itu peneliti mengucapkan **Terima kasih**.

KODE	IDENTITAS ORANG TUA	
	A. IBU	
A01	Nama Ibu	
A02	Usia	.....tahun
A03	Tinggi Badan Ibu	..... cm
A04	Berat Badan Ibu	..... kg
A05	Pekerjaan	( ) PNS ( ) Wiraswasta ( ) IRT ( ) Lainnya,.....
A06	Pendidikan Terakhir	( ) Tidak bersekolah ( ) Tamat SD/MI ( ) Tamat SMP/MTs ( ) Tamat SMA/MA ( ) Perguruan tinggi
A07	Pada usia berapa tahun Ibu menikah?	.....tahun

<b>KODE</b>	<b>B. AYAH</b>	
B01	Nama Ayah	
B02	Usia	.....tahun
B03	Tinggi Badan Ayah	..... cm
B04	Berat Badan Ayah	..... kg
B05	Pekerjaan	( ) PNS ( ) Wiraswasta ( ) Petani ( ) Nelayan ( ) Lainnya,.....
B06	Pendidikan Terakhir	( ) Tidak bersekolah ( ) Tamat SD/MI ( ) Tamat SMP/MTs ( ) Tamat SMA/MA ( ) Perguruan tinggi
B07	Pada usia berapa tahun Ayah menikah?	.....tahun
<b>KODE</b>	<b>DATA KELUARGA</b>	
AB01	Pendapatan Keluarga	Rp...../bulan
AB02	Jumlah Anak	
AB03	Jarak Kelahiran Anak dengan Kelahiran Sebelumnya	.....tahun
<b>KODE</b>	<b>IDENTITAS DAN DATA ANTROPOMETRI ANAK</b>	
C01	Nama Balita	
C02	Tanggal Lahir	
C03	Usia	.....bulan
C04	Jenis Kelamin	( ) Laki-laki ( ) Perempuan
C05	Tinggi Badan Saat ini	..... cm
C06	Berat Badan Saat ini	..... kg
<b>KODE</b>	<b>BERAT DAN PANJANG LAHIR</b>	
D01	Berapa berat badan anak Anda pada saat dilahirkan?	.....gram
D02	Berapa panjang badan anak Anda pada saat dilahirkan?	.....cm
<b>KODE</b>	<b>PERILAKU PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF &amp; MP-ASI</b>	
E01	Kapan anak mulai disusui oleh ibu yang pertama kali sesaat setelah melahirkan?	( ) < 1 jam,.....menit ( ) <24 jam,.....jam

		( ) 24 jam atau lebih,.....hari.....jam
E02	Apakah sebelum disusui pertama kali atau sebelum ASI keluar, anak diberi minuman (cairan) atau makanan selain ASI kecuali obat?	( ) Ya, sebutkan makanan/ minuman yang diberikan..... ( ) Tidak ( ) Tidak Tahu
E03	Apakah sejak anak mendapatkan ASI pertama kali sampai usia 6 bulan, tidak pernah diberikan makanan/ minuman lain selain ASI kecuali obat?	( ) Pernah, pada usia.....bulan ( ) Tidak pernah
E04	Pada usia berapa anak Anda berhenti diberikan ASI?	.....bulan
E05	Pada usia berapa anak Anda mendapatkan MP-ASI?	.....bulan
<b>KODE</b>	<b>STATUS IMUNISASI</b>	
F01	Apakah anak Anda mendapatkan imunisasi? (Jika ya, lanjut ke pertanyaan F02)	( ) Ya ( ) Tidak
F02	Jika Ya, imunisasi apa saja yang diberikan?	( ) HB0 ( ) BCG ( ) Polio 1 ( ) DPT-HB-Hib 1 ( ) Polio 2 ( ) DPT-HB-Hib 2 ( ) Polio 3 ( ) DPT-HB-Hib 3 ( ) Polio 4 ( ) Campak ( ) DPT-HB-Hib lanjutan ( ) Campak lanjutan
<b>KODE</b>	<b>PEMBERIAN VITAMIN A</b>	
G01	Apakah anak Anda mendapatkan dosis vitamin A? (Jika ya, lanjut ke pertanyaan G02)	( ) Ya ( ) Tidak
G02	Jika Ya, berapa jumlah dosis vitamin A yang telah diberikan kepada anak Anda sampai usianya saat ini?	.....dosis

KODE	STATUS KESEHATAN BALITA	
H01	Apakah anak Anda memiliki riwayat penyakit infeksi? (Jika ya, lanjut ke pertanyaan H02)	<input type="checkbox"/> Ya* <input type="checkbox"/> Tidak
H02	Riwayat penyakit infeksi yang diderita oleh Anak	<input type="checkbox"/> ISPA <input type="checkbox"/> Pneumonia <input type="checkbox"/> Diare <input type="checkbox"/> Tuberkulosis (TB) <input type="checkbox"/> Campak <input type="checkbox"/> Cacingan <input type="checkbox"/> Lain-lain,.....
H03	Kapan pertama kali anak Anda menderita penyakit infeksi?	.....bulan
H04	Berapa lama durasi penyakit infeksi yang dialami oleh anak Anda?	<input type="checkbox"/> <3 hari sembuh <input type="checkbox"/> ≥3 hari sembuh, .....berapa hari
H05	Dimana biasanya anak Anda melakukan pengobatan ketika menderita penyakit infeksi?	<input type="checkbox"/> Pengobatan sendiri <input type="checkbox"/> Berobat ke puskesmas/ RS/ pelayanan kesehatan lainnya.

### Lampiran 3

## KETERANGAN LAYAK ETIK PENELITIAN

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK  
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.332/KEPK/FKIK/X/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Afifah Cahya Imani Arifin  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Determinan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022"**

*"Determinants of The Incidence of Stunting in Children Under Five Years in The Working Area of  
Katumbangan Public Health Center, Polewali Mandar Regency in 2022"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023.

*This declaration of ethics applies during the period October 24th, 2022 until October 24th, 2023.*

  
October 24th, 2022  
\_\_\_\_\_  
and Chairperson.  
Dr. Syatih, Sp.A., M.Kes

*Lampiran 4*

**SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA AWAL**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
Website: fkok.uin-alauddin.ac.id

---

Nomor : B-5509/ Un.06/FKIK/PP.00.9/11/ 2022 Gowa, 1 November 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Yth . Kepala Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar  
Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Afifah Cahya Imani Arifin  
N I M : 70200118038  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat  
Semester : IX (Sembilan)  
Data : Data Balita Tahun 2021-2022 dan Profil Puskesmas Katumbangan

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**" Determinan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Azriful, SKM., M.Kes.  
2. Dr. Bs Titi Haerani, SKM., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil data awal .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

Dehan,  
Syatirah



Lampiran 5

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 503/0756/IPL/DPMPTSP/XI/2022**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr AFIFAH CAHYA IMANI ARIFIN
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0756/Kesbangpol/B.1/410.7/XI/2022, Tgl.09-11-2022

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	: AFIFAH CAHYA IMANI ARIFIN
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 70200118038
Asal Perguruan Tinggi	: UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Fakultas	: KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Jurusan	: KESEHATAN MASYARAKAT
Alamat	: BANGKALA KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR

Untuk melakukan Penelitian di Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan November s/d Desember 2022 dengan proposal berjudul "DETERMINAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KATUMBANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 09 Nopember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Bra. MUJAHIDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:  
1.Unsur Forkopinda di tempat

*Lampiran 6*

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS KESEHATAN  
Jl. H.Andi Depu No.2 Telp.0428-21082 Polewali**

Polewali, 29 November 2022

Nomor : B-054/SDMKES/410.7/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a  
Yth : Ka. UPTD PKM.Katumbangan  
Di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503/0756/IPL/DPMPSTP/XI/2022, tanggal 09 November 2022, Perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan S1 Kesehatan Masyarakat, maka kami meminta kepada saudara untuk menerima mahasiswa tersebut :

Nama : Afifah Cahya Imani Arifin  
NIM : 70200118038  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Fakultas / Jurusan : S1 Kesehatan Masyarakat

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Puskesmas Katumbangan Kab. Polewali Mandar . Dengan judul penelitian " Determinan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 "

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Polewali Mandar

**H.M. Sunib Nawawi, SKM, M.Kes**  
Nip. 19630927 198311 1 001

**Tembusan :**

1. UIN Alauddin Makassar
2. Arsip

*Lampiran 7*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
DARI PUSKESMAS KATUMBANGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS KESEHATAN**

UPTD PUSKESMAS KATUMBANGAN  
Jl. Poros Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Campalagian  
email [pkm.katumbangan@gmail.com](mailto:pkm.katumbangan@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-386 /PKM-KTB/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Puskesmas Katumbangan, menerangkan bahwa :


Nama	: Afifah Cahya Imani Arifin
Nim	: 70200118038
Fakultas	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan	: Kesehatan Masyarakat
Asal Perguruan Tinggi	: UIN Alauddin Makassar
Alamat	: Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar

Benar bahwa yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian di wilayah kerja Puskesmas Katumbangan Kec. Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Novenber s/d Desember 2022, dengan Judul Proposal "**Determinan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022**"

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Katumbangan, 15 Desember 2022

An.Ka. UPTD PKM Katumbangan  
Ka.Sub. Bagian tata Usaha

  
**Nahdivati, SKM**  
Nip. 19780527 200604 2 007

*Lampiran 8*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
DARI KANTOR DESA KATUMBANGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN CAMPALAGIAN  
DESA KATUMBANGAN**

*Jln. Daenna Paliseri No. 1 Katumbangan 91353*

**SURAT HASIL SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 004/ SHSP/DKTB/XII/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NURANDA TATO. SE  
JABATAN : Kepala Desa Katumbangan

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : AFIFAH CAHYA IMANI ARIFIN  
NIM/NIDN/NIP : 70200118038  
KAMPUS : Uin Alauddin Makassar  
FAKULTAS : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
JURUSAN : Kesehatan Masyarakat  
ALAMAT : Banggala Kec Manggala Kota Makassar.

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul " **DETERMINAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KATUMBANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022** " Sejak Tanggal 16 November / sampai 01 Desember dan menganggap **TUNTAS**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Katumbangan, 06 Desember 2022

Mengetahui

Ketua Desa Katumbangan



*Lampiran 9*

**LEMBAR HASIL UJI SIMILARITI SKRIPSI**

**LEMBAR HASIL UJI SIMILARITI SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ZilFadhilah Arranury, SKM., M.Kes  
Unit : Kesehatan Masyarakat  
Telp :

Menerangkan bahwa

Nama : Afifah Cahya Imani Arifin  
NIM : 70200118038  
Judul Naskah : Determinan Kejadian *Stunting* pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022

Telah melakukan uji silimiariti naskah skripsi pada tanggal 13 September 2023 dengan tingkat similiarity sebesar 32 %.

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui.

Gowa, 02 Oktober 2023

Mengetahui

Pengelola



ZilFadhilah Arranury, SKM., M.Kes

M A K A S S A R

*Lampiran 10*

**DOKUMENTASI KEGIATAN**




**Pengisian Data Responden dan Balita serta Pengumpulan Informasi Tambahan terkait Balita**



M A K A S S A R

**Pengisian Data Responden dan Balita serta Pengumpulan Informasi Tambahan terkait Balita**



**Pengukuran Tinggi Badan dan Penimbangan  
Berat Badan Ibu (Responden)**



**Pengukuran Tinggi Badan dan Penimbangan Berat Badan Ayah**



**Pengukuran Tinggi Badan dan Penimbangan Berat Badan Balita**

Lampiran 11

MASTER TABEL

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
ID	Numeric	4	0		None	None	12	Right	Scale	Input
TanggalPe	Date	5	0	Tanggal Pengukuran	None	None	11	Right	Scale	Input
A01	String	19	0	Nama Ibu (Inisial)	None	None	19	Left	Nominal	Input
A02	Numeric	3	0	Usia Ibu (tahun)	None	None	5	Right	Nominal	Input
A02_1	Numeric	8	0	Kategori Usia Ibu	{1, 16 - 26 tahun}...	None	10	Right	Nominal	Input
A03	Numeric	5	1	Tinggi Badan Ibu (cm)	None	None	8	Right	Nominal	Input
A03_1	Numeric	8	0	Kategori Tinggi Badan Ibu	{0, Normal}...	None	10	Right	Nominal	Input
A03_2	Numeric	8	0	Interval Tinggi Badan Ibu	{1, 140.0 - 148.9}...	None	10	Right	Nominal	Input
A04	Numeric	5	1	Berat Badan Ibu (kg)	None	None	5	Right	Nominal	Input
A04_1	Numeric	8	0	Kategori Berat Badan Ibu	{1, 34 - 50 kg}...	None	10	Right	Nominal	Input
A05	Numeric	6	0	Pekerjaan Ibu	{1, Petani}...	None	12	Right	Nominal	Input
A06	Numeric	1	0	Pendidikan Terakhir Ibu	{1, Tidak Bersekolah}.	None	23	Right	Nominal	Input
A07	Numeric	3	0	Usia Ibu pada saat pertama kali menikah (tahun)	None	None	5	Right	Nominal	Input
A07_1	Numeric	8	0	Kategori Usia Ibu Menikah	{1, < 19 tahun}...	None	10	Right	Nominal	Input
A08	String	16	0	Gangguan kesehatan Ibu pada saat kehamilan	None	None	16	Left	Nominal	Input
A08_1	String	7	0	HB Ibu pada saat Kehamilan	None	None	7	Left	Nominal	Input
B01	String	20	0	Nama Ayah (Inisial)	None	None	20	Left	Nominal	Input
B02	String	3	0	Usia Ayah (tahun)	None	None	10	Right	Nominal	Input
B02_1	Numeric	8	0	Kategori Usia Ayah	{1, 20 - 31 tahun}...	None	10	Right	Nominal	Input
B03	Numeric	5	1	Tinggi Badan Ayah (cm)	None	None	7	Right	Nominal	Input
B03_1	Numeric	8	0	Kategori Tinggi Badan Ayah	{0, Normal}...	None	10	Right	Nominal	Input
B03_2	Numeric	8	0	Interval Tinggi Badan Ayah	{1, 158.0 - 164.9}...	None	10	Right	Nominal	Input
B04	Numeric	4	1	Berat Badan Ayah (kg)	None	None	5	Right	Nominal	Input
B04_1	Numeric	8	0	Kategori Berat Badan Ayah	{1, 46 - 58.9 kg}...	None	10	Right	Nominal	Input
B05	Numeric	1	0	Pekerjaan Ayah	{1, Petani}...	None	11	Right	Nominal	Input
B06	Numeric	1	0	Pendidikan Terakhir Ayah	{1, Tidak Bersekolah}.	None	22	Left	Nominal	Input
B07	String	3	0	Usia Ayah saat pertama kali menikah (tahun)	None	None	4	Left	Nominal	Input
B07_1	Numeric	8	0	Kategori Usia Ayah Menikah	{1, < 19 tahun}...	None	10	Right	Nominal	Input
AB01	Numeric	8	0	Pendapatan Keluarga (per bulan)	None	None	8	Right	Scale	Input
AB01_1	Numeric	7	0	Kategori Pendapatan Keluarga (per bulan)	{1, Rendah}...	None	10	Right	Scale	Input
AB01_2	Numeric	8	0	Interval Pendapatan Keluarga	{1, <500 ribu}...	None	10	Right	Nominal	Input
AB02	Numeric	2	0	Jumlah Anak	None	None	7	Right	Nominal	Input
AB02_1	Numeric	8	0	Kategori Jumlah Anak	{1, Sedikit}...	None	10	Right	Nominal	Input
AB03	Numeric	30	0	Jarak Kelahiran anak dengan kelahiran sebelumnya	None	None	10	Right	Nominal	Input
AB03_1	Numeric	8	0	Kategori Jarak Kelahiran	{1, Tidak ada}...	None	10	Right	Nominal	Input
AB03_2	Numeric	8	0	Interval Jarak Kelahiran Anak	{1, 0}...	None	10	Right	Nominal	Input
C01	String	25	0	Nama Anak (Inisial)	None	None	31	Left	Nominal	Input
C02	Date	10	0	Tanggal Lahir Anak	None	None	11	Right	Scale	Input
C03	String	3	0	Usia Anak (bulan)	None	None	6	Right	Nominal	Input
C03_1	Numeric	8	0	Kategori Usia Anak	{1, 0 - 11 bulan}...	None	10	Right	Nominal	Input

C03_2	Numeric	8	0	Interval Usia Anak	{1, 24 - 59 bulan}...	None	10	Right	Nominal	Input
C04	Numeric	1	0	Jenis Kelamin Anak	{1, Laki-laki}...	None	9	Left	Nominal	Input
C05	Numeric	5	1	Tinggi/ Panjang Badan Anak saat ini (cm)	None	None	5	Right	Nominal	Input
C05_1	Numeric	8	0	Kategori Tinggi Badan Anak saat ini	{1, 59 - 70.9 cm}...	None	10	Right	Nominal	Input
C06	Numeric	8	1	Berat Badan Anak saat ini (cm)	None	None	5	Right	Scale	Input
C06_1	Numeric	8	0	Kategori Berat Badan Anak saat ini	{1, 5 - 15.9 kg}...	None	10	Right	Nominal	Input
D01	Numeric	5	0	Berat Badan Lahir Anak (g)	None	None	5	Right	Nominal	Input
D01_1	Numeric	8	0	Kategori Berat Badan Lahir	{0, Tidak BBLR}...	None	10	Right	Nominal	Input
D01_2	Numeric	8	0	Interval Berat Badan Lahir	{1, 1200 - 2350 gram}	None	10	Right	Nominal	Input
D02	String	4	0	Panjang Badan Lahir Anak (cm)	None	None	4	Left	Nominal	Input
D02_1	Numeric	8	0	Kategori Panjang Badan Lahir	{0, Normal}...	None	10	Right	Nominal	Input
D02_2	Numeric	8	0	Interval Panjang Badan Lahir	{1, 34 - 39.9}...	None	10	Right	Nominal	Input
D03	Numeric	5	2	Z-Score	None	None	12	Right	Scale	Input
D03_1	Numeric	8	0	Kategori Z Score	{1, Sangat Pendek}...	None	10	Right	Nominal	Input
D03_2	Numeric	8	0	Status Stunting	{0, Tidak Stunting}...	None	10	Right	Nominal	Input
E01	Numeric	1	0	Kapan anak Ibu mulai disusui sesaat setelah dilahirkan?	{1, < 1 jam}...	None	11	Right	Nominal	Input
E02	String	5	0	Apakah sebelum disusui pertama kali atau sebelum ASI keluar,	{1, Tidak pernah}...	None	9	Left	Nominal	Input
E02_1	String	12	0	Jenis minuman (cairan) atau makanan lain yang diberikan sebe	None	None	12	Left	Nominal	Input
E03	Numeric	2	0	Apakah sejak anak mendapatkan ASI pertama kali sampai usia	{1, Tidak pernah}...	None	12	Right	Nominal	Input
E03_1	String	12	0	Jenis minuman (cairan) atau makanan lain yang diberikan sebe	None	None	12	Left	Nominal	Input
E03_2	Numeric	8	0	Kategori ASI Eksklusif	{0, ASI Eksklusif}...	None	17	Right	Nominal	Input
E03_2A	Numeric	8	0	Alasan tidak ASI Eksklusif	{1, Tidak pernah ASI}...	None	8	Right	Nominal	Input
E04	String	23	0	Usia anak Ibu berhenti mendapatkan ASI	None	None	10	Left	Nominal	Input
E05	Numeric	8	0	Kategori Waktu MPASI	{0, MP-ASI Tepat Wak	None	10	Right	Nominal	Input
F01	Numeric	1	0	Apakah Anak Ibu mendapatkan imunisasi?	{0, Ya}...	None	10	Right	Nominal	Input
F01_A	Numeric	8	0	Alasan anak tidak imunisasi	{1, Orang tua tidak set	None	8	Right	Nominal	Input
F02	Numeric	8	0	Kategori Status Imunisasi	{0, Lengkap}...	None	10	Right	Nominal	Input
G01	Numeric	1	0	Apakah anak Anda mendapatkan dosis vitamin A?	{0, Ya}...	None	10	Right	Nominal	Input
G02	String	7	0	Jumlah dosis vitamin A yang diberikan	None	None	18	Left	Nominal	Input
G03	Numeric	8	0	Kategori Pemberian Vitamin A	{0, Lengkap}...	None	10	Right	Nominal	Input
H01	Numeric	8	0	Kategori Riwayat Penyakit Infeksi	{0, Ya}...	None	10	Right	Nominal	Input
H02_1	Numeric	5	0	ISPA	{1, Tidak}...	None	8	Right	Nominal	Input
H02_2	Numeric	5	0	Pneumonia	{1, Tidak}...	None	8	Right	Nominal	Input
H02_3	Numeric	5	0	Diare	{1, Tidak}...	None	8	Right	Nominal	Input
H02_4	Numeric	5	0	Tuberkulosis	{1, Tidak}...	None	8	Right	Nominal	Input
H02_5	Numeric	5	0	Campak	{1, Tidak}...	None	8	Right	Nominal	Input
H02_6	Numeric	5	0	Cacingan	{1, Tidak}...	None	8	Right	Nominal	Input
H03	String	9	0	Kapan pertama kali Anak menderita penyakit infeksi? (bulan)	None	None	9	Right	Nominal	Input
H03_1	Numeric	8	0	Kategori usia anak pertama kali terkena penyakit infeksi	{1, 0 - 11 bulan}...	None	10	Right	Nominal	Input
H04	Numeric	19	0	Berapa lama durasi penyakit infeksi yang dialami oleh anak An	{1, < 3 hari sembuh}...	None	19	Right	Scale	Input
H05	Numeric	40	0	Dimana biasanya anak Anda melakukan pengobatan ketika me	{1, Pengobatan sendir	None	20	Right	Scale	Input

ID	TglPengukuran	A01	A02	A02_1	A03	A03_1	A03_2	A04	A04_1	A05	A06	A07	A07_1	A08	A08_1	B01	B02	B02_1	B03	B03_1	B03_2	B04	B04_1	B05	B06	B07	B07_1
1	16-Nov-22	R	34	27 - 37 tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	72.4	68 - 84 kg	IRT	Tamat SD/ MI		22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	R	35	26 - 35 tahun	165.0	Pendek	165.0 - 171	83.0	72 - 84.9 k	Buruh	Tamat SMA/ MA		23 ≥ 19 tahun	
2	16-Nov-22	D	27	27 - 37 tahun	154.0	Pendek	149.0 - 151	55.0	51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA		21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	K	33	26 - 35 tahun	167.0	Normal	165.0 - 171	52.4	46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI		28 ≥ 19 tahun	
3	16-Nov-22	M	26	16 - 26 tahun	147.0	Pendek	140.0 - 144	42.4	34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA		18 < 19 tahun	Tidak ada	A	37	36 - 45 tahun	170.0	Normal	165.0 - 171	75.0	72 - 84.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA		30 ≥ 19 tahun	
4	16-Nov-22	R	29	27 - 37 tahun	147.0	Pendek	140.0 - 144	58.2	51 - 67 kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		28 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	30	26 - 35 tahun	165.0	Pendek	165.0 - 171	72.0	72 - 84.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA		29 ≥ 19 tahun	
5	16-Nov-22	SA	23	16 - 26 tahun	149.0	Pendek	149.0 - 151	49.2	34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTS		17 < 19 tahun	Tidak ada	A	28	26 - 35 tahun	163.0	Pendek	158.0 - 166	65.0	59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		23 ≥ 19 tahun	
6	16-Nov-22	D	27	27 - 37 tahun	145.0	Pendek	140.0 - 144	43.6	34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA		22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	KP	30	26 - 35 tahun	156.0	Pendek	158.0 - 166	68.0	59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA		25 ≥ 19 tahun	
7	17-Nov-22	H	44	38 - 48 tahun	153.0	Pendek	149.0 - 151	55.2	51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTS		17 < 19 tahun	Tidak ada	B	48	46 - 55 tahun	171.0	Normal	165.0 - 171	82.0	72 - 84.9 k	Wiraswasta	Tamat SMP/ MTS		21 ≥ 19 tahun	
8	17-Nov-22	F	35	27 - 37 tahun	148.0	Pendek	140.0 - 144	59.0	51 - 67 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		33 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	35	26 - 35 tahun	159.0	Pendek	158.0 - 166	65.0	59 - 71.9 k	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		33 ≥ 19 tahun	
9	17-Nov-22	S	45	38 - 48 tahun	159.4	Normal	158.0 - 166	69.6	68 - 84 kg	IRT	Tamat SD/ MI		15 < 19 tahun	Tidak ada	AB	58	56 - 65 tahun	167.0	Normal	165.0 - 171	50.2	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		20 ≥ 19 tahun	
10	17-Nov-22	N	23	16 - 26 tahun	150.5	Pendek	149.0 - 151	47.5	34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI		17 < 19 tahun	Tidak ada	S	38	36 - 45 tahun	167.0	Normal	165.0 - 171	53.0	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		32 ≥ 19 tahun	
11	17-Nov-22	F	26	16 - 26 tahun	158.0	Normal	158.0 - 166	59.8	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		17 < 19 tahun	Hipertensi	R	30	26 - 35 tahun	157.0	Pendek	158.0 - 166	57.3	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA		21 ≥ 19 tahun	
12	17-Nov-22	R	31	27 - 37 tahun	154.0	Pendek	149.0 - 151	50.3	51 - 67 kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		29 ≥ 19 tahun	Tidak ada	AS	32	26 - 35 tahun	165.0	Pendek	165.0 - 171	65.0	59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA		30 ≥ 19 tahun	
13	17-Nov-22	NS	27	27 - 37 tahun	157.0	Normal	149.0 - 151	55.4	51 - 67 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		24 ≥ 19 tahun	Tidak ada	R	25	16 - 25 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	58.0	46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA		23 ≥ 19 tahun	
14	18-Nov-22	G	21	16 - 26 tahun	156.0	Normal	149.0 - 151	47.0	34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA		19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	AI	26	26 - 35 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	60.0	59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA		25 ≥ 19 tahun	
15	18-Nov-22	N	33	27 - 37 tahun	151.5	Pendek	149.0 - 151	48.0	34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI		25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	34	26 - 35 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	52.0	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		27 ≥ 19 tahun	
16	20-Nov-22	S	23	16 - 26 tahun	142.0	Pendek	140.0 - 144	46.0	34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTS		21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	M	23	16 - 25 tahun	167.0	Normal	165.0 - 171	58.0	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SMP/ MTS		21 ≥ 19 tahun	
17	20-Nov-22	S	27	27 - 37 tahun	144.4	Pendek	140.0 - 144	58.6	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	U	35	26 - 35 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	58.0	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		27 ≥ 19 tahun	
18	20-Nov-22	MU	27	27 - 37 tahun	153.0	Pendek	149.0 - 151	47.0	34 - 50 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	31	26 - 35 tahun	168.0	Normal	165.0 - 171	65.0	59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		27 ≥ 19 tahun	
19	20-Nov-22	M	40	38 - 48 tahun	144.0	Pendek	140.0 - 144	53.9	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	44	36 - 45 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	58.0	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		29 ≥ 19 tahun	
20	20-Nov-22	N	34	27 - 37 tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	53.1	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		17 < 19 tahun	Tidak ada	W	40	36 - 45 tahun	165.0	Pendek	165.0 - 171	57.0	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		23 ≥ 19 tahun	
21	20-Nov-22	SH	38	38 - 48 tahun	149.5	Pendek	149.0 - 151	47.5	34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI		34 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	49	46 - 55 tahun	166.0	Pendek	165.0 - 171	58.0	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		49 ≥ 19 tahun	
22	20-Nov-22	ST	29	27 - 37 tahun	157.2	Normal	149.0 - 151	46.3	34 - 50 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		28 ≥ 19 tahun	Tidak ada	MZ	39	36 - 45 tahun	163.0	Pendek	158.0 - 166	61.6	59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		38 ≥ 19 tahun	
23	20-Nov-22	N	33	27 - 37 tahun	151.8	Pendek	149.0 - 151	57.4	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	27	26 - 35 tahun	162.0	Pendek	158.0 - 166	63.0	59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		17 ≥ 19 tahun	
24	20-Nov-22	D	27	27 - 37 tahun	152.9	Pendek	149.0 - 151	51.5	51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTS		17 < 19 tahun	Tidak ada	MY	28	26 - 35 tahun	163.0	Pendek	158.0 - 166	65.0	59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		18 ≥ 19 tahun	
25	20-Nov-22	M	46	38 - 48 tahun	148.0	Pendek	140.0 - 144	61.2	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		24 ≥ 19 tahun	Tidak ada	Y	48	46 - 55 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	66.0	59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI		26 ≥ 19 tahun	
26	20-Nov-22	A	40	38 - 48 tahun	156.2	Normal	149.0 - 151	56.2	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		34 ≥ 19 tahun	Tidak ada	T	37	36 - 45 tahun	159.0	Pendek	158.0 - 166	62.2	59 - 71.9 k	Nelayan	Tamat SD/ MI		31 ≥ 19 tahun	
27	20-Nov-22	NA	31	27 - 37 tahun	162.9	Normal	158.0 - 166	61.0	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	AW	32	26 - 35 tahun	166.0	Pendek	165.0 - 171	50.0	46 - 58.9 k	Nelayan	Tamat SD/ MI		23 ≥ 19 tahun	
28	20-Nov-22	N	30	27 - 37 tahun	149.0	Pendek	149.0 - 151	64.7	51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA		20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	I	34	26 - 35 tahun	162.0	Pendek	158.0 - 166	68.0	59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SMP/ MTS		25 ≥ 19 tahun	
29	22-Nov-22	J	28	27 - 37 tahun	147.0	Pendek	140.0 - 144	53.1	51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTS		22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	N	27	26 - 35 tahun	159.1	Pendek	158.0 - 166	50.0	46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI		21 ≥ 19 tahun	
30	22-Nov-22	N	40	38 - 48 tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	53.9	51 - 67 kg	IRT	Tidak bersekolah		22 ≥ 19 tahun	Hipertensi, Asma	C	42	36 - 45 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	52.0	46 - 58.9 k	Petani	Tidak bersekolah		24 ≥ 19 tahun	
31	22-Nov-22	Kamaris	40	38 - 48 tahun	147.7	Pendek	140.0 - 144	68.5	68 - 84 kg	IRT	Tamat SD/ MI		18 < 19 tahun	Hipertensi 11	A	42	36 - 45 tahun	161.8	Pendek	158.0 - 166	67.4	59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		20 ≥ 19 tahun	
32	22-Nov-22	R	25	16 - 26 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	64.9	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		15 < 19 tahun	Tidak ada	S	46	46 - 55 tahun	168.0	Normal	165.0 - 171	62.0	59 - 71.9 k	Buruh	Tamat SD/ MI		35 ≥ 19 tahun	
33	22-Nov-22	S	37	27 - 37 tahun	157.0	Normal	149.0 - 151	76.2	68 - 84 kg	IRT	Tamat SD/ MI		25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	U	49	46 - 55 tahun	165.0	Pendek	165.0 - 171	58.9	46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA		37 ≥ 19 tahun	
34	22-Nov-22	S	25	16 - 26 tahun	152.0	Pendek	149.0 - 151	54.5	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		18 < 19 tahun	Tidak ada	F	27	26 - 35 tahun	164.0	Pendek	158.0 - 166	58.0	46 - 58.9 k	Buruh	Tamat SD/ MI		20 ≥ 19 tahun	
35	22-Nov-22	N	23	16 - 26 tahun	154.3	Pendek	149.0 - 151	48.6	34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA		21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	I	22	16 - 25 tahun	161.0	Pendek	158.0 - 166	65.0	59 - 71.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA		20 ≥ 19 tahun	
36	22-Nov-22	H	39	38 - 48 tahun	150.3	Pendek	149.0 - 151	60.9	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		16 < 19 tahun	Tidak ada	10.8	KB	47	46 - 55 tahun	153.0	Pendek	158.0 - 166	46.2	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		24 ≥ 19 tahun
37	22-Nov-22	R	24	16 - 26 tahun	147.0	Pendek	140.0 - 144	50.4	51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA		18 < 19 tahun	Tidak ada	J	30	26 - 35 tahun	161.8	Pendek	158.0 - 166	59.2	59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		24 ≥ 19 tahun	
38	22-Nov-22	I	24	16 - 26 tahun	151.0	Pendek	149.0 - 151	45.2	34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTS		19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	N	31	26 - 35 tahun	171.0	Normal	165.0 - 171	68.0	59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI		26 ≥ 19 tahun	
39	22-Nov-22	D	33	27 - 37 tahun	149.0	Pendek	149.0 - 151	67.1		4	Tamat SD/ MI		22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	U	29	26 - 35 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	52.0	46 - 58.9 k	Sopir	Tamat SMP/ MTS		25 ≥ 19 tahun	
40	23-Nov-22	R	27	27 - 37 tahun	154.3	Pendek	149.0 - 151	64.8	51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA		23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	MA	31	26 - 35 tahun	161.0	Pendek	158.0 - 166	52.0	46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA		27 ≥ 19 tahun	
41	23-Nov-22	HS	39	38 - 48 tahun	148.6	Pendek	140.0 - 144	60.8	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		33 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9	MY	36	36 - 45 tahun	158.0	Pendek	158.0 - 166	64.3	59 - 71.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA		30 ≥ 19 tahun
42	24-Nov-22	S	30	27 - 37 tahun	158.0	Normal	158.0 - 166	59.0	51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI		18 < 19 tahun	Tidak ada	10	D	35	26 - 35 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 166	70.2	59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi		25 ≥ 19 tahun
43	23-Nov-22	H	19	16 - 26 tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	45.8	34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTS		16 < 19 tahun	Tidak ada	11	S	21	16 - 25 tahun	159.0	Pendek	158.0 - 166	58.0	46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI		19 ≥

63	1-Dec-22 F	37 27 - 37 tahun	150.5 Pendek	149.0 - 151	62.8 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	37 36 - 45 tahun	159.0 Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun
64	30-Nov-22 AA	31 27 - 37 tahun	155.0 Normal	149.0 - 151	60.0 51 - 67 kg	Tenaga Kesehatan	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	31 26 - 35 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	71.0 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	25 ≥ 19 tahun
65	30-Nov-22 H	33 27 - 37 tahun	147.2 Pendek	140.0 - 141	52.6 51 - 67 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	MY	33 26 - 35 tahun	168.0 Normal	165.0 - 171	56.0 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMP/ MTs	21 ≥ 19 tahun
66	30-Nov-22 S	26 16 - 26 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	53.3 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 MD	21 16 - 25 tahun	156.0 Pendek	158.0 - 161	52.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun
67	30-Nov-22 R	20 16 - 26 tahun	155.0 Normal	149.0 - 151	57.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	S	34 26 - 35 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	32 ≥ 19 tahun
68	30-Nov-22 H	38 38 - 48 tahun	143.0 Pendek	140.0 - 141	57.4 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun	Hipertensi	I	38 36 - 45 tahun	161.0 Pendek	158.0 - 161	65.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun
69	30-Nov-22 W	29 27 - 37 tahun	157.0 Normal	149.0 - 151	60.4 51 - 67 kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	24 ≥ 19 tahun	Tidak ada	Z	31 26 - 35 tahun	165.0 Pendek	165.0 - 171	62.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	26 ≥ 19 tahun
70	1-Dec-22 F	32 27 - 37 tahun	155.0 Normal	149.0 - 151	47.4 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	16 < 19 tahun	Tidak ada	12 I	36 36 - 45 tahun	157.0 Pendek	158.0 - 161	50.8 46 - 58.9 k Petani	Tamat SMP/ MTs	18 < 19 tahun
71	1-Dec-22 A	37 27 - 37 tahun	156.2 Normal	149.0 - 151	60.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.5 J	37 36 - 45 tahun	161.0 Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SMP/ MTs	19 ≥ 19 tahun
72	1-Dec-22 H	43 38 - 48 tahun	155.0 Normal	149.0 - 151	79.9 68 - 84 kg	IRT	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	T	43 36 - 45 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	61.0 59 - 71.9 k Buruh	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
73	1-Dec-22 I	23 16 - 26 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	53.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	18 < 19 tahun	Epilepsi	10.5 A	23 16 - 25 tahun	159.0 Pendek	158.0 - 161	57.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun
74	1-Dec-22 H	28 27 - 37 tahun	162.0 Normal	158.0 - 161	56.0 51 - 67 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	24 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	29 26 - 35 tahun	168.0 Normal	165.0 - 171	72.0 72 - 84.9 k Petani	Tamat SMA/ MA	25 ≥ 19 tahun
75	2-Dec-22 S	28 27 - 37 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	48.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.5 AA	38 36 - 45 tahun	162.0 Pendek	158.0 - 161	55.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	28 ≥ 19 tahun
76	1-Dec-22 M	21 16 - 26 tahun	146.3 Pendek	140.0 - 141	42.7 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	19 ≥ 19 tahun	TB	9.5 N	20 16 - 25 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SMA/ MA	18 < 19 tahun
77	1-Dec-22 S	35 27 - 37 tahun	143.0 Pendek	140.0 - 141	51.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.3 S	45 36 - 45 tahun	159.0 Pendek	158.0 - 161	59.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	35 ≥ 19 tahun
78	1-Dec-22 M	17 16 - 26 tahun	148.0 Pendek	140.0 - 141	50.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	15 < 19 tahun	Tidak ada	11 S	22 16 - 25 tahun	163.0 Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMP/ MTs	20 ≥ 19 tahun
79	8-Dec-22 S	25 16 - 26 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	51.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12.2 J	32 26 - 35 tahun	158.0 Pendek	158.0 - 161	57.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SMP/ MTs	26 ≥ 19 tahun
80	1-Dec-22 M	22 16 - 26 tahun	143.5 Pendek	140.0 - 141	48.7 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	18 < 19 tahun	Tidak ada	14.8 R	24 16 - 25 tahun	159.0 Pendek	158.0 - 161	57.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun
81	1-Dec-22 S	37 27 - 37 tahun	163.0 Normal	158.0 - 161	59.7 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	Basri	39 36 - 45 tahun	165.0 Pendek	165.0 - 171	52.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
82	1-Dec-22 H	39 38 - 48 tahun	158.0 Normal	158.0 - 161	59.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Hipertensi	11.5 SK	41 36 - 45 tahun	163.0 Pendek	158.0 - 161	59.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun
83	1-Dec-22 ND	31 27 - 37 tahun	144.0 Pendek	140.0 - 141	49.7 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	45 36 - 45 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	59.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	30 ≥ 19 tahun
84	2-Dec-22 R	23 16 - 26 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	50.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Hipertensi	IY	28 26 - 35 tahun	162.0 Pendek	158.0 - 161	57.0 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	24 ≥ 19 tahun
85	1-Dec-22 M	21 16 - 26 tahun	145.5 Pendek	140.0 - 141	50.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	15 < 19 tahun	Tidak ada	Y	25 16 - 25 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	63.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun
86	1-Dec-22 R	40 38 - 48 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	53.6 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	H	46 46 - 55 tahun	165.0 Pendek	165.0 - 171	62.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19 tahun
87	1-Dec-22 M	41 38 - 48 tahun	142.0 Pendek	140.0 - 141	53.1 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19 tahun	Hipertensi	9.2 R	42 36 - 45 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun
88	1-Dec-22 S	24 16 - 26 tahun	149.5 Pendek	149.0 - 151	55.8 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	15 < 19 tahun	Tidak ada	10.6 Y	38 36 - 45 tahun	162.3 Pendek	158.0 - 161	60.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	29 ≥ 19 tahun
89	23-May-23 P	30 27 - 37 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	43.6 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	26 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 H	32 26 - 35 tahun	167.0 Normal	165.0 - 171	58.4 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	28 ≥ 19 tahun
90	23-May-23 P	30 27 - 37 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	43.6 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	26 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 H	32 26 - 35 tahun	167.0 Normal	165.0 - 171	58.4 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	28 ≥ 19 tahun
91	23-May-23 S	33 27 - 37 tahun	147.0 Pendek	140.0 - 141	48.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.8 AR	39 36 - 45 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	59.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SMA/ MA	25 ≥ 19 tahun
92	23-May-23 M	26 16 - 26 tahun	146.0 Pendek	140.0 - 141	49.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.7 M	29 26 - 35 tahun	162.0 Pendek	158.0 - 161	56.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun
93	23-May-23 N	21 16 - 26 tahun	154.0 Pendek	149.0 - 151	41.8 34 - 50 kg	IRT	Tidak bersekolah	17 < 19 tahun	Tidak ada	13.9 S	37 36 - 45 tahun	163.0 Pendek	158.0 - 161	52.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	33 ≥ 19 tahun
94	23-May-23 N	21 16 - 26 tahun	156.0 Normal	149.0 - 151	46.0 34 - 50 kg	IRT	Tidak bersekolah	17 < 19 tahun	Hipertensi	11.2 S	37 36 - 45 tahun	163.0 Pendek	158.0 - 161	52.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	33 ≥ 19 tahun
95	23-May-23 R	31 27 - 37 tahun	154.0 Pendek	149.0 - 151	46.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.8 S	41 36 - 45 tahun	166.0 Pendek	165.0 - 171	59.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	32 ≥ 19 tahun
96	23-May-23 S	24 16 - 26 tahun	151.0 Pendek	149.0 - 151	60.8 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.5 S	34 26 - 35 tahun	169.0 Normal	165.0 - 171	58.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	35 ≥ 19 tahun
97	23-May-23 S	30 27 - 37 tahun	151.0 Pendek	149.0 - 151	60.8 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12 A	40 36 - 45 tahun	166.0 Pendek	165.0 - 171	59.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	35 ≥ 19 tahun
98	23-May-23 S	36 27 - 37 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	55.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	26 ≥ 19 tahun	Dispepsi	10.8 U	45 36 - 45 tahun	171.0 Normal	165.0 - 171	67.1 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SD/ MI	35 ≥ 19 tahun
99	23-May-23 H	26 16 - 26 tahun	152.1 Pendek	149.0 - 151	53.9 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	8.6 T	36 36 - 45 tahun	168.0 Normal	165.0 - 171	63.0 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SD/ MI	28 ≥ 19 tahun
100	23-May-23 E	28 27 - 37 tahun	156.0 Normal	149.0 - 151	48.0 34 - 50 kg	PNS	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.2 M	27 26 - 35 tahun	163.0 Pendek	158.0 - 161	54.0 46 - 58.9 k Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	20 ≥ 19 tahun
101	23-May-23 SA	25 16 - 26 tahun	151.5 Pendek	149.0 - 151	50.6 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.9 J	28 26 - 35 tahun	165.0 Pendek	165.0 - 171	61.0 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun
102	23-May-23 H	37 27 - 37 tahun	147.0 Pendek	140.0 - 141	51.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.8 M	32 26 - 35 tahun	165.0 Pendek	165.0 - 171	59.0 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun
103	23-May-23 M	27 27 - 37 tahun	148.5 Pendek	140.0 - 141	56.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.4 J	28 26 - 35 tahun	167.0 Normal	165.0 - 171	61.0 59 - 71.9 k Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	22 ≥ 19 tahun
104	30-May-23 L	33 27 - 37 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	45.1 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	30 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.1 A	26 26 - 35 tahun	165.0 Pendek	165.0 - 171	57.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
105	23-May-23 S	19 16 - 26 tahun	146.0 Pendek	140.0 - 141	47.2 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	17 < 19 tahun	Tidak ada	A	20 16 - 25 tahun	159.0 Pendek	158.0 - 161	54.0 46 - 58.9 k Petani	Tidak bersekolah	18 < 19 tahun
106	23-May-23 A	36 27 - 37 tahun	156.6 Normal	149.0 - 151	77.0 68 - 84 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	28 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.2 S	28 26 - 35 tahun	170.0 Normal	165.0 - 171	67.7 59 - 71.9 k Petani	Tamat SMP/ MTs	20 ≥ 19 tahun
107	23-May-23 A	36 27 - 37 tahun	156.6 Normal	149.0 - 151	77.0 68 - 84 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	28 ≥ 19 tahun	Tidak ada	Hb 10.8 R	28 26 - 35 tahun	170.0 Normal	165.0 - 171	67.7 59 - 71.9 k Petani	Tamat SMP/ MTs	20 ≥ 19 tahun
108	24-May-23 S	43 38 - 48 tahun	151.2 Pendek	149.0 - 151	58.4 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	10 S	43 36 - 45 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	56.6 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun
109	24-May-23 N	41 38 - 48 tahun	153.5 Pendek	149.0 - 151	50.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	17 < 19 tahun	Tidak ada	8.8 AM	45 36 - 45 tahun	161.0 Pendek	158.0 - 161	58.6 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
110	24-May-23 R	28 27 - 37 tahun	145.0 Pendek	140.0 - 141	61.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10 A	34 26 - 35 tahun	161.0 Pendek	158.0 - 161	59.9 59 - 71.9 k Buruh	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
111	24-May-23 Y	31 27 - 37 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	52.0 51 - 67 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	28 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.4 EW	31 26 - 35 tahun	160.5 Pendek	158.0 - 161	59.3 59 - 71.9 k Honoror Guru	Tamat SMA/ MA	28 ≥ 19 tahun
112	24-May-23 S	26 16 - 26 tahun	145.0 Pendek	140.0 - 141	45.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.2 J	24 16 - 25 tahun	159.0 Pendek	158.0 - 161	50.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun
113	24-May-23 N	30 27 - 37 tahun	148.5 Pendek	140.0 - 141	50.0 34 - 50 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	27 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.4 AF	34 26 - 35 tahun	158.0 Pendek	158.0 - 161	52.0 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	31 ≥ 19 tahun
114	24-May-23 L	20 16 - 26 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	49.3 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	S	27 26 - 35 tahun	160.7 Pendek	158.0 - 161	57.4 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun
115	24-May-23 N	35 27 - 37 tahun	145.5 Pendek	140.0 - 141	56.4 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	32 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	38 36 - 45 tahun	161.0 Pendek	158.0 - 161	57.7 46 - 58.9 k Petani	Tamat SMP/ MTs	35 ≥ 19 tahun
116	24-May-23 F	26 16 - 26 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	46.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12.5 S	31 26 - 35 tahun	162.0 Pendek	158.0 - 161	54.6 46 - 58.9 k Buruh	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19 tahun
117	24-May-23 F	26 16 - 26 tahun	151.0 Pendek	149.0 - 151	45.7 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 M	31 26 - 35 tahun	161.0 Pendek	158.0 - 161	56.7 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19 tahun
118	24-May-23 SA	31 27 - 37 tahun	143.5 Pendek	140.0 - 141	40.8 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	18 < 19 tahun	Tidak ada	Basri	44 36 - 45 tahun	163.1 Pendek	165.0 - 171	60.7 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun
119	24-May-23 H	35 27 - 37 tahun	149.0 Pendek	149.0 - 151	56.2 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 AT	36 36 - 45 tahun	161.9 Pendek	158.0 - 161	59.3 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	28 ≥ 19 tahun
120	24-May-23 HT	29 27 - 37 tahun	148.0 Pendek	140.0 - 141	53.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	HY	29 26 - 35 tahun	162.2 Pendek	158.0 - 161	58.3 46 - 58.9 k Petani	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun
121	24-May-23 H	40 38 - 48 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	42.6 34 - 50 kg	IRT	Tamat									

125	25-May-23 RPK	24 16 - 26 tahun	141.0 Pendek	140.0 - 141	47.6 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.8	S	23 16 - 25 tahun	160.5 Pendek	158.0 - 161	56.7 46 - 58.9 k	Petani	Tidak bersekolah	18 < 19 tahun
126	25-May-23 R	24 16 - 26 tahun	142.5 Pendek	140.0 - 141	47.6 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.8	A	23 16 - 25 tahun	159.9 Pendek	158.0 - 161	54.9 46 - 58.9 k	Petani	Tidak bersekolah	18 < 19 tahun
127	25-May-23 N	28 27 - 37 tahun	154.0 Pendek	149.0 - 151	64.0 51 - 67 kg	IRT	Tidak bersekolah	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	H	IRT	30 26 - 35 tahun	160.9 Pendek	158.0 - 161	57.9 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun
128	25-May-23 S	24 16 - 26 tahun	142.0 Pendek	140.0 - 141	54.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	M	S	24 16 - 25 tahun	161.8 Pendek	158.0 - 161	59.5 59 - 71.9 k	Petani	Tidak bersekolah	19 ≥ 19 tahun
129	25-May-23 R	33 27 - 37 tahun	158.0 Normal	158.0 - 161	55.0 51 - 67 kg	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	30 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	IRT	33 26 - 35 tahun	160.0 Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k	Petani	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	30 ≥ 19 tahun
130	25-May-23 R	26 16 - 26 tahun	146.0 Pendek	140.0 - 141	47.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	15 < 19 tahun	Tidak ada	8.6	M	29 26 - 35 tahun	162.2 Pendek	158.0 - 161	56.3 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA	18 < 19 tahun
131	25-May-23 H	30 27 - 37 tahun	145.0 Pendek	140.0 - 141	39.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	IRT	30 26 - 35 tahun	159.0 Pendek	158.0 - 161	67.2 59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	23 ≥ 19 tahun
132	25-May-23 D	22 16 - 26 tahun	147.0 Pendek	140.0 - 141	53.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	R	MA	25 16 - 25 tahun	157.7 Pendek	158.0 - 161	52.0 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SMP/ MTs	18 < 19 tahun
133	25-May-23 B	21 16 - 26 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	40.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	11.5	MA	21 16 - 25 tahun	159.2 Pendek	158.0 - 161	55.5 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun
134	25-May-23 A	35 27 - 37 tahun	147.0 Pendek	140.0 - 141	50.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	17 < 19 tahun	Tidak ada	J	AM	37 36 - 45 tahun	160.4 Pendek	158.0 - 161	54.4 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun
135	25-May-23 P	23 16 - 26 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	60.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	16 < 19 tahun	Tidak ada	12	J	30 26 - 35 tahun	160.9 Pendek	158.0 - 161	57.7 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
136	25-May-23 T	20 16 - 26 tahun	158.0 Normal	158.0 - 161	51.4 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12	T	23 16 - 25 tahun	159.4 Pendek	158.0 - 161	53.0 46 - 58.9 k	Petani	Tidak bersekolah	20 ≥ 19 tahun
137	25-May-23 W	25 16 - 26 tahun	145.0 Pendek	140.0 - 141	34.4 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.5	T	25 16 - 25 tahun	159.9 Pendek	158.0 - 161	60.0 59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
138	25-May-23 T	20 16 - 26 tahun	147.5 Pendek	140.0 - 141	48.8 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	17 < 19 tahun	Tidak ada	12	A	20 16 - 25 tahun	161.7 Pendek	158.0 - 161	58.9 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	17 < 19 tahun
139	25-May-23 SA	31 27 - 37 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	53.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.8	A	35 26 - 35 tahun	157.8 Pendek	158.0 - 161	61.0 59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
140	25-May-23 U	28 27 - 37 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	72.4 68 - 84 kg	IRT	Tamat SD/ MI	14 < 19 tahun	Tidak ada	11.7	S	46 46 - 55 tahun	163.1 Pendek	158.0 - 161	60.5 59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SMP/ MTs	32 ≥ 19 tahun
141	25-May-23 M	26 16 - 26 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	57.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	10.8	M	35 26 - 35 tahun	159.7 Pendek	158.0 - 161	60.3 59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun
142	25-May-23 EN	28 27 - 37 tahun	154.0 Pendek	149.0 - 151	47.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	17 < 19 tahun	Tidak ada	12.8	AR	36 36 - 45 tahun	162.2 Pendek	165.0 - 171	55.4 46 - 58.9 k	Petani	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	28 ≥ 19 tahun
143	25-May-23 M	35 27 - 37 tahun	149.7 Pendek	149.0 - 151	50.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	14 < 19 tahun	Tidak ada	H	IRT	49 46 - 55 tahun	162.0 Pendek	158.0 - 161	59.0 59 - 71.9 k	Petani	Tamat SMP/ MTs	28 ≥ 19 tahun
144	26-May-23 N	21 16 - 26 tahun	148.8 Pendek	140.0 - 141	52.1 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	I	R	23 16 - 25 tahun	161.4 Pendek	158.0 - 161	58.4 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun
145	26-May-23 I	30 27 - 37 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	58.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	13	R	34 26 - 35 tahun	161.1 Pendek	158.0 - 161	57.7 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun
146	26-May-23 I	30 27 - 37 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	48.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.8	RB	34 26 - 35 tahun	160.8 Pendek	158.0 - 161	55.9 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun
147	26-May-23 S	30 27 - 37 tahun	148.0 Pendek	140.0 - 141	46.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.3	FS	32 26 - 35 tahun	160.4 Pendek	158.0 - 161	58.9 46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	22 ≥ 19 tahun
148	26-May-23 E	30 27 - 37 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	60.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	14 < 19 tahun	Tidak ada	H	H	42 36 - 45 tahun	159.4 Pendek	158.0 - 161	56.6 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19 tahun
149	26-May-23 R	36 27 - 37 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	53.4 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	8.8	MK	36 36 - 45 tahun	159.5 Pendek	158.0 - 161	57.0 46 - 58.9 k	Petani	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	23 ≥ 19 tahun
150	26-May-23 M	36 27 - 37 tahun	150.0 Pendek	149.0 - 151	59.8 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.7	A	36 36 - 45 tahun	162.6 Pendek	158.0 - 161	61.1 59 - 71.9 k	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	23 ≥ 19 tahun
151	26-May-23 S	40 38 - 48 tahun	163.0 Normal	158.0 - 161	62.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	33 ≥ 19 tahun	Tidak ada	13	T	41 36 - 45 tahun	160.7 Pendek	158.0 - 161	55.9 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	34 ≥ 19 tahun
152	26-May-23 M	45 38 - 48 tahun	151.0 Pendek	149.0 - 151	57.1 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	43 ≥ 19 tahun	Tidak ada	14	Usman	38 36 - 45 tahun	161.9 Pendek	158.0 - 161	57.9 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA	36 ≥ 19 tahun
153	26-May-23 C	33 27 - 37 tahun	147.4 Pendek	140.0 - 141	50.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	MY	33 26 - 35 tahun	159.9 Pendek	158.0 - 161	56.0 46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun
154	26-May-23 A	25 16 - 26 tahun	156.0 Normal	149.0 - 151	45.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.5	A	30 26 - 35 tahun	160.4 Pendek	158.0 - 161	55.6 46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	27 ≥ 19 tahun
155	26-May-23 M	42 38 - 48 tahun	160.0 Normal	158.0 - 161	47.5 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	31 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12	J	49 46 - 55 tahun	160.6 Pendek	158.0 - 161	57.4 46 - 58.9 k	Petani	Tidak bersekolah	42 ≥ 19 tahun
156	26-May-23 M	37 27 - 37 tahun	157.5 Normal	149.0 - 151	50.3 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	31 ≥ 19 tahun	Tidak ada	H	IRT	48 46 - 55 tahun	158.8 Pendek	158.0 - 161	55.2 46 - 58.9 k	Buruh	Tamat SMA/ MA	42 ≥ 19 tahun
157	26-May-23 M	33 27 - 37 tahun	144.0 Pendek	140.0 - 141	63.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.4	M	35 26 - 35 tahun	159.4 Pendek	158.0 - 161	57.1 46 - 58.9 k	Nelayan	Tamat SMP/ MTs	24 ≥ 19 tahun
158	26-May-23 H	22 16 - 26 tahun	144.0 Pendek	140.0 - 141	45.5 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.5	H	36 36 - 45 tahun	160.4 Pendek	158.0 - 161	58.7 46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI	32 ≥ 19 tahun
159	26-May-23 M	28 27 - 37 tahun	145.2 Pendek	140.0 - 141	35.7 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	17 < 19 tahun	Tidak ada	10.7	T	30 26 - 35 tahun	161.5 Pendek	158.0 - 161	58.3 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	30 ≥ 19 tahun
160	26-May-23 M	30 27 - 37 tahun	144.0 Pendek	140.0 - 141	52.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.6	H	35 26 - 35 tahun	162.2 Pendek	158.0 - 161	60.7 59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	28 ≥ 19 tahun
161	27-May-23 N	30 27 - 37 tahun	161.0 Normal	158.0 - 161	47.8 34 - 50 kg	IRT	Tidak bersekolah	27 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.5	A	34 26 - 35 tahun	160.3 Pendek	158.0 - 161	58.8 46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SMP/ MTs	31 ≥ 19 tahun
162	26-May-23 REP	21 16 - 26 tahun	154.0 Pendek	149.0 - 151	43.2 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.8	A	26 26 - 35 tahun	160.9 Pendek	158.0 - 161	60.2 59 - 71.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA	24 ≥ 19 tahun
163	26-May-23 M	35 27 - 37 tahun	145.5 Pendek	140.0 - 141	46.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	11.1	N	38 36 - 45 tahun	163.4 Pendek	165.0 - 171	60.8 59 - 71.9 k	Buruh	Tamat SMP/ MTs	21 ≥ 19 tahun
164	26-May-23 R	35 27 - 37 tahun	157.6 Normal	149.0 - 151	42.8 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	14 < 19 tahun	Tidak ada	11	A	36 36 - 45 tahun	162.7 Pendek	158.0 - 161	57.7 46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI	15 < 19 tahun
165	26-May-23 R	35 27 - 37 tahun	156.6 Normal	149.0 - 151	48.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	14 < 19 tahun	Tidak ada	J	J	36 36 - 45 tahun	160.3 Pendek	158.0 - 161	54.6 46 - 58.9 k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	15 < 19 tahun
166	26-May-23 M	22 16 - 26 tahun	150.3 Pendek	149.0 - 151	42.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10	S	34 26 - 35 tahun	161.9 Pendek	158.0 - 161	56.9 46 - 58.9 k	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	31 ≥ 19 tahun
167	27-May-23 S	29 27 - 37 tahun	158.0 Normal	158.0 - 161	66.1 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	12.2	H	30 26 - 35 tahun	162.5 Pendek	158.0 - 161	56.6 46 - 58.9 k	Buruh	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun
168	27-May-23 S	44 38 - 48 tahun	152.0 Pendek	149.0 - 151	51.1 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12.8	Y	60 56 - 65 tahun	158.9 Pendek	158.0 - 161	56.0 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SMP/ MTs	41 ≥ 19 tahun
169	27-May-23 H	18 16 - 26 tahun	151.5 Pendek	149.0 - 151	40.7 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	16 < 19 tahun	Tidak ada	9.5	MAG	23 16 - 25 tahun	157.9 Pendek	158.0 - 161	55.0 46 - 58.9 k	Buruh	Tamat SMA/ MA	21 ≥ 19 tahun
170	27-May-23 R	44 38 - 48 tahun	153.0 Pendek	149.0 - 151	69.7 68 - 84 kg	IRT	Tamat SD/ MI	16 < 19 tahun	Tidak ada	9	S	56 56 - 65 tahun	161.1 Pendek	158.0 - 161	59.3 59 - 71.9 k	Petani	Tamat SMA/ MA	28 ≥ 19 tahun
171	27-May-23 M	33 27 - 37 tahun	149.0 Pendek	149.0 - 151	61.3 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12.9	M	34 26 - 35 tahun	159.5 Pendek	158.0 - 161	57.2 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
172	27-May-23 S	37 27 - 37 tahun	149.5 Pendek	149.0 - 151	57.3 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	9.4	Y	36 36 - 45 tahun	160.3 Pendek	158.0 - 161	57.2 46 - 58.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
173	27-May-23 I	33 27 - 37 tahun	140.3 Pendek	140.0 - 141	65.0 51 - 67 kg	IRT	Tidak bersekolah	13 < 19 tahun	Tidak ada	U	IRT	37 36 - 45 tahun	161.3 Pendek	158.0 - 161	59.2 59 - 71.9 k	Buruh	Tamat SMP/ MTs	17 < 19 tahun
174	27-May-23 S	43 38 - 48 tahun	148.9 Pendek	140.0 - 141	52.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	S	45 36 - 45 tahun	162.3 Pendek	158.0 - 161	60.2 59 - 71.9 k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
175	27-May-23 W	21 16 - 26 tahun	154.0 Pendek	149.0 - 151	83.8 68 - 84 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	17 < 19 tahun	Tidak ada	12	S	26 26 - 35 tahun	161.9 Pendek	158.0 - 161	59.2 59 - 71.9 k	Buruh	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
176	27-May-23 N	31 27 - 37 tahun	146.4 Pendek	140.0 - 141	49.9 34 - 50 kg	IRT	Tidak bersekolah	18 < 19 tahun	Tidak ada	K	M	31 26 - 35 tahun	162.4 Pendek	158.0 - 161	58.8 46 - 58.9 k	Petani	Tidak bersekolah	18 < 19 tahun
177	27-May-23 A	33 27 - 37 tahun	151.0 Pendek	149.0 - 151	56.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	M	IRT	35 26 - 35 tahun	159.9 Pendek	158.0 - 161	57.2 46 - 58.9 k	Pelaut	Tamat SMP/ MTs	22 ≥ 19 tahun
178	27-May-23 N	30 27 - 37 tahun	145.5 Pendek	140.0 - 141	46.6 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	A	33 26 - 35 tahun	163.4 Pendek	165.0 - 171	60.8 59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
179	27-May-23 A	33 27 - 37 tahun	155.0 Normal	149.0 - 151	60.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12.2	M	38 36 - 45 tahun	161.8 Pendek	158.0 - 161	59.3 59 - 71.9 k	Petani	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun
180	27-May-23 S	31 27 - 37 tahun	149.5 Pendek	149.0 - 151	59.4 51 - 67 kg	IRT	Tidak bersekolah	12 < 19 tahun	Tidak ada	A	A							

187	28-May-23	F	26	16 - 26	tahun	149.0	Pendek	149.0 - 151	47,7	34 - 50	kg	IRT	Tamat SD/ MI	17 < 19	tahun	Tidak ada	S	34	26 - 35	tahun	159.9	Pendek	158.0 - 161	56,8	46 - 58,9	k	Buruh	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19	tahun	
188	28-May-23	Z	32	27 - 37	tahun	151.8	Pendek	149.0 - 151	49,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19	tahun	Tidak ada	9.4	A	30	26 - 35	tahun	160.4	Pendek	158.0 - 161	59,3	59 - 71,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19	tahun
189	28-May-23	Z	23	16 - 26	tahun	148.0	Pendek	140.0 - 141	48,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	19 ≥ 19	tahun	Tidak ada	8.1	A	26	26 - 35	tahun	166.6	Normal	165.0 - 171	63,5	59 - 71,9	k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	22 ≥ 19	tahun
190	28-May-23	R	27	27 - 37	tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	46,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	17 < 19	tahun	Tidak ada	11.4	A	28	26 - 35	tahun	161.5	Pendek	158.0 - 161	58,0	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	18 < 19	tahun
191	28-May-23	M	26	16 - 26	tahun	151.0	Pendek	149.0 - 151	45,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SD/ MI	16 < 19	tahun	Tidak ada	10.9	R	31	26 - 35	tahun	160.3	Pendek	158.0 - 161	56,6	46 - 58,9	k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	21 ≥ 19	tahun
192	28-May-23	K	25	16 - 26	tahun	151.0	Pendek	149.0 - 151	63,0	51 - 67	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	15 < 19	tahun	Tidak ada		FS	26	26 - 35	tahun	162.9	Pendek	158.0 - 161	59,3	59 - 71,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	16 < 19	tahun
193	28-May-23	S	25	16 - 26	tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	52,5	51 - 67	kg	IRT	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19	tahun	Tidak ada	9.2	AM	31	26 - 35	tahun	162.1	Pendek	158.0 - 161	60,0	59 - 71,9	k	Wiraswasta	Tidak bersekolah	27 ≥ 19	tahun
194	28-May-23	M	26	16 - 26	tahun	154.2	Pendek	149.0 - 151	58,0	51 - 67	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	21 ≥ 19	tahun	Tidak ada	9.8	T	26	26 - 35	tahun	162.2	Pendek	158.0 - 161	59,0	59 - 71,9	k	Nelayan	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19	tahun
195	28-May-23	N	41	38 - 48	tahun	153.0	Pendek	149.0 - 151	40,3	34 - 50	kg	IRT	Tamat SD/ MI	28 ≥ 19	tahun	Tidak ada	12	Y	45	36 - 45	tahun	157.9	Pendek	158.0 - 161	56,0	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	32 ≥ 19	tahun
196	28-May-23	I	34	27 - 37	tahun	143.5	Pendek	140.0 - 141	41,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19	tahun	Tidak ada	9.2	L	33	26 - 35	tahun	160.8	Pendek	158.0 - 161	58,8	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SMP/ MTs	19 ≥ 19	tahun
197	28-May-23	E	32	27 - 37	tahun	156.5	Normal	149.0 - 151	54,3	51 - 67	kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.1	H	29	26 - 35	tahun	161.7	Pendek	158.0 - 161	57,4	46 - 58,9	k	Buruh	Tamat SMA/ MA	18 < 19	tahun
198	28-May-23	P	20	16 - 26	tahun	142.5	Pendek	140.0 - 141	37,1	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	18 < 19	tahun	Tidak ada	11	I	25	16 - 25	tahun	166.3	Normal	165.0 - 171	60,7	59 - 71,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19	tahun
199	28-May-23	M	30	27 - 37	tahun	151.5	Pendek	149.0 - 151	47,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19	tahun	Tidak ada	15.6	A	38	36 - 45	tahun	159.9	Pendek	158.0 - 161	56,3	46 - 58,9	k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19	tahun
200	28-May-23	S	24	16 - 26	tahun	156.6	Normal	149.0 - 151	71,4	68 - 84	kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.9	I	30	26 - 35	tahun	161.1	Pendek	158.0 - 161	60,3	59 - 71,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19	tahun
201	28-May-23	NA	29	27 - 37	tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	57,4	51 - 67	kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19	tahun	Tidak ada	10.8	Y	37	36 - 45	tahun	162.8	Pendek	158.0 - 161	58,8	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19	tahun
202	28-May-23	P	28	27 - 37	tahun	157.5	Normal	149.0 - 151	49,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19	tahun	Tidak ada	9.8	S	32	26 - 35	tahun	160.2	Pendek	158.0 - 161	59,4	59 - 71,9	k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19	tahun
203	28-May-23	N	36	27 - 37	tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	65,0	51 - 67	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	30 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.4	N	40	36 - 45	tahun	157.7	Pendek	158.0 - 161	55,6	46 - 58,9	k	Buruh	Tamat SD/ MI	34 ≥ 19	tahun
204	28-May-23	N	36	27 - 37	tahun	142.5	Pendek	140.0 - 141	69,6	68 - 84	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	30 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.4	W	40	36 - 45	tahun	158.3	Pendek	158.0 - 161	59,6	59 - 71,9	k	Buruh	Tamat SD/ MI	34 ≥ 19	tahun
205	29-May-23	H	30	27 - 37	tahun	150.5	Pendek	149.0 - 151	56,9	51 - 67	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	29 ≥ 19	tahun	Hipertensi	11.2	R	32	26 - 35	tahun	161.4	Pendek	158.0 - 161	58,9	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SMA/ MA	31 ≥ 19	tahun
206	29-May-23	N	36	27 - 37	tahun	160.5	Normal	158.0 - 161	79,5	68 - 84	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	29 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.7	B	33	26 - 35	tahun	160.8	Pendek	158.0 - 161	55,9	46 - 58,9	k	Nelayan	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19	tahun
207	29-May-23	YR	21	16 - 26	tahun	152.9	Pendek	149.0 - 151	50,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	24 ≥ 19	tahun	Tidak ada		SH	27	26 - 35	tahun	162.6	Pendek	158.0 - 161	61,3	59 - 71,9	k	Wiraswasta	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	25 ≥ 19	tahun
208	29-May-23	M	33	27 - 37	tahun	148.7	Pendek	140.0 - 141	40,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19	tahun	Tidak ada	9.2	S	34	26 - 35	tahun	159.9	Pendek	158.0 - 161	56,7	46 - 58,9	k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	27 ≥ 19	tahun
209	29-May-23	R	23	16 - 26	tahun	152.0	Pendek	149.0 - 151	47,8	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19	tahun	Tidak ada		TSP	26	26 - 35	tahun	163.5	Pendek	165.0 - 171	61,1	59 - 71,9	k	Buruh	Tamat SMA/ MA	23 ≥ 19	tahun
210	29-May-23	R	23	16 - 26	tahun	153.3	Pendek	149.0 - 151	44,9	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19	tahun	Tidak ada		R	25	16 - 25	tahun	156.6	Pendek	158.0 - 161	56,9	46 - 58,9	k	Buruh	Tamat SMA/ MA	23 ≥ 19	tahun
211	29-May-23	R	33	27 - 37	tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	53,0	51 - 67	kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	27 ≥ 19	tahun	Tidak ada	12	S	37	36 - 45	tahun	159.8	Pendek	158.0 - 161	58,2	46 - 58,9	k	Wiraswasta	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	31 ≥ 19	tahun
212	29-May-23	W	25	16 - 26	tahun	156.0	Normal	149.0 - 151	69,3	68 - 84	kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.5	R	32	26 - 35	tahun	160.4	Pendek	158.0 - 161	58,8	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	28 ≥ 19	tahun
213	29-May-23	H	29	27 - 37	tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	68,7	68 - 84	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	18 < 19	tahun	Tidak ada	9.9	S	29	26 - 35	tahun	162.3	Pendek	158.0 - 161	59,5	59 - 71,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	18 < 19	tahun
214	29-May-23	N	25	16 - 26	tahun	160.0	Normal	158.0 - 161	69,0	68 - 84	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	21 ≥ 19	tahun	Tidak ada	12.2	J	32	26 - 35	tahun	161.8	Pendek	158.0 - 161	58,7	46 - 58,9	k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI	28 ≥ 19	tahun
215	29-May-23	N	25	16 - 26	tahun	158.0	Normal	158.0 - 161	65,6	51 - 67	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	21 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.9	J	32	26 - 35	tahun	161.9	Pendek	158.0 - 161	58,6	46 - 58,9	k	Wiraswasta	Tamat SD/ MI	28 ≥ 19	tahun
216	29-May-23	N	27	27 - 37	tahun	157.0	Normal	149.0 - 151	63,5	51 - 67	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	17 < 19	tahun	Tidak ada	14	S	30	26 - 35	tahun	162.4	Pendek	158.0 - 161	60,7	59 - 71,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19	tahun
217	29-May-23	TP	32	27 - 37	tahun	149.5	Pendek	149.0 - 151	48,2	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	28 < 19	tahun	Tidak ada	13.5	M	35	26 - 35	tahun	160.5	Pendek	158.0 - 161	58,5	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SMA/ MA	31 ≥ 19	tahun
218	29-May-23	SH	35	27 - 37	tahun	162.0	Normal	158.0 - 161	61,0	51 - 67	kg	Tenaga Kesehatan	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	31 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.2	T	35	26 - 35	tahun	162.4	Pendek	158.0 - 161	60,0	59 - 71,9	k	Aparat Desa	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	31 ≥ 19	tahun
219	29-May-23	P	22	16 - 26	tahun	163.5	Normal	158.0 - 161	70,0	68 - 84	kg	IRT	Tidak bersekolah	19 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.5	H	29	26 - 35	tahun	165.9	Pendek	165.0 - 171	60,5	59 - 71,9	k	Petani	Tamat SMA/ MA	26 ≥ 19	tahun
220	29-May-23	N	29	27 - 37	tahun	143.0	Pendek	140.0 - 141	53,1	51 - 67	kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	27 ≥ 19	tahun	Tidak ada	10	S	36	36 - 45	tahun	160.3	Pendek	158.0 - 161	61,1	59 - 71,9	k	Wiraswasta	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	34 ≥ 19	tahun
221	29-May-23	S	33	27 - 37	tahun	153.0	Pendek	149.0 - 151	50,0	34 - 50	kg	Tenaga Kesehatan	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	29 ≥ 19	tahun	Tidak ada		A	34	26 - 35	tahun	160.9	Pendek	158.0 - 161	59,7	59 - 71,9	k	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	30 ≥ 19	tahun
222	29-May-23	N	39	38 - 48	tahun	145.5	Pendek	140.0 - 141	50,0	34 - 50	kg	PNS	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	35 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.5	AY	36	36 - 45	tahun	160.8	Pendek	158.0 - 161	63,3	59 - 71,9	k	Honoror Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	32 ≥ 19	tahun
223	29-May-23	A	41	38 - 48	tahun	152.5	Pendek	149.0 - 151	49,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	34 ≥ 19	tahun	Tidak ada		S	46	46 - 55	tahun	167.5	Normal	165.0 - 171	58,0	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	39 ≥ 19	tahun
224	29-May-23	H	29	27 - 37	tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	41,1	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	19 ≥ 19	tahun	Tidak ada	12.4	K	31	26 - 35	tahun	161.6	Pendek	158.0 - 161	57,9	46 - 58,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19	tahun
225	29-May-23	R	27	27 - 37	tahun	156.2	Normal	149.0 - 151	53,9	51 - 67	kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	24 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.5	N	25	16 - 25	tahun	163.7	Normal	165.0 - 171	59,4	59 - 71,9	k	Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19	tahun
226	29-May-23	H	31	27 - 37	tahun	152.0	Pendek	149.0 - 151	64,1	51 - 67	kg	IRT	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19	tahun	Tidak ada	9.1	R	32	26 - 35	tahun	164.5	Pendek	158.0 - 161	62,1	59 - 71,9	k	Wiraswasta	Tamat SMP/ MTs	26 ≥ 19	tahun
227	30-May-23	M	43	38 - 48	tahun	146.2	Pendek	140.0 - 141	38,0	34 - 50	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	33 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11	E	40	36 - 45	tahun	158.8	Pendek	158.0 - 161	56,2	46 - 58,9	k	Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	30 ≥ 19	tahun
228	30-May-23	AS	29	27 - 37	tahun	159.0	Normal	158.0 - 161	61,5	51 - 67	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	23 ≥ 19	tahun	Tidak ada	11.5	MAG	40	36 - 45	tahun	160.2	Pendek	158.0 - 161	59,6	59 - 71,9	k	PNS	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	34 ≥ 19	tahun
229	30-May-23	A	29	27 - 37	tahun	160.0	Normal	158.0 - 161	71,3	68 - 84	kg	IRT	Tamat SMA/ MA	23 ≥ 19	tahun	Tidak ada	15.1	S	40	36 - 45	tahun	160.3	Pendek	158.0 - 161	59,8	59 - 71,9	k	PNS	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	27 ≥ 19	tahun
230	30-May-23	SN	32	27 - 37	tahun	143.7	Pendek	140.0 - 141	43,3	34 - 50	kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	26 ≥ 19	tahun	Tidak ada	8.7	MS	36	36 - 45	tahun	159.7	Pendek	158.0 - 161	55,9	46 - 58,9					

249	30-May-23	SF	23 16 - 26 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	42.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	AF	25 16 - 25 tahun	170.0	Normal	165.0 - 171	59.0 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun
250	30-May-23	SI	23 16 - 26 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	42.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	R	25 16 - 25 tahun	170.0	Normal	165.0 - 171	59.0 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun
251	30-May-23	H	35 27 - 37 tahun	165.5	Normal	158.0 - 161	60.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	29 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.8 H	39 36 - 45 tahun	168.0	Normal	165.0 - 171	61.0 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SD/ MI	33 ≥ 19 tahun
252	30-May-23	RAE	30 27 - 37 tahun	147.0	Pendek	140.0 - 141	50.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	18 < 19 tahun	Tidak ada	11.1 H	34 26 - 35 tahun	161.1	Pendek	158.0 - 161	58.4 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
253	30-May-23	SA	20 16 - 26 tahun	152.0	Pendek	149.0 - 151	42.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	18 < 19 tahun	Tidak ada	R	20 16 - 25 tahun	167.9	Normal	165.0 - 171	60.2 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun
254	30-May-23	N	30 27 - 37 tahun	153.5	Pendek	149.0 - 151	58.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.8 R	34 26 - 35 tahun	161.6	Pendek	158.0 - 161	60.0 59 - 71.9 k Operator	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun
255	31-May-23	H	24 16 - 26 tahun	149.0	Pendek	149.0 - 151	47.1 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12 H	31 26 - 35 tahun	164.8	Pendek	158.0 - 161	60.8 59 - 71.9 k Nelayan	Tamat SD/ MI	30 ≥ 19 tahun
256	31-May-23	A	34 27 - 37 tahun	154.0	Pendek	149.0 - 151	64.7 51 - 67 kg	IRT	Tidak bersekolah	18 < 19 tahun	Tidak ada	12.5 J	38 36 - 45 tahun	162.5	Pendek	158.0 - 161	60.3 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
257	31-May-23	M	28 27 - 37 tahun	147.0	Pendek	140.0 - 141	39.5 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	10 D	36 36 - 45 tahun	161.6	Pendek	158.0 - 161	59.9 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19 tahun
258	31-May-23	S	41 38 - 48 tahun	143.0	Pendek	140.0 - 141	42.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.2 S	41 36 - 45 tahun	164.8	Pendek	165.0 - 171	61.1 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
259	31-May-23	K	35 27 - 37 tahun	153.5	Pendek	149.0 - 151	52.1 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.4 A	36 36 - 45 tahun	162.2	Pendek	158.0 - 161	58.2 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun
260	31-May-23	E	31 27 - 37 tahun	145.0	Pendek	140.0 - 141	54.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10 A	33 26 - 35 tahun	161.9	Pendek	158.0 - 161	57.6 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun
261	31-May-23	E	31 27 - 37 tahun	145.0	Pendek	140.0 - 141	56.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.8 H	33 26 - 35 tahun	162.0	Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
262	31-May-23	N	27 27 - 37 tahun	151.3	Pendek	149.0 - 151	45.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	8.4 Udin	29 26 - 35 tahun	166.8	Normal	165.0 - 171	62.1 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun
263	31-May-23	N	40 38 - 48 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	56.6 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 M	41 36 - 45 tahun	162.0	Pendek	158.0 - 161	58.5 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun
264	31-May-23	R	32 27 - 37 tahun	143.3	Pendek	140.0 - 141	42.3 34 - 50 kg	Honorer Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	28 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.4 H	26 26 - 35 tahun	167.3	Normal	165.0 - 171	60.6 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
265	31-May-23	R	32 27 - 37 tahun	143.4	Pendek	140.0 - 141	45.4 34 - 50 kg	Honorer Guru	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	28 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12 H	26 26 - 35 tahun	167.3	Normal	165.0 - 171	60.6 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
266	31-May-23	S	20 16 - 26 tahun	150.5	Pendek	149.0 - 151	39.7 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun	Tidak ada	11 N	21 16 - 25 tahun	166.9	Normal	165.0 - 171	63.3 59 - 71.9 k Petani	Tamat SMA/ MA	19 ≥ 19 tahun
267	31-May-23	R	29 27 - 37 tahun	151.5	Pendek	149.0 - 151	44.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	17 < 19 tahun	Tidak ada	11 A	31 26 - 35 tahun	161.4	Pendek	158.0 - 161	57.5 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun
268	31-May-23	N	28 27 - 37 tahun	157.5	Normal	149.0 - 151	51.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	8.6 G	26 26 - 35 tahun	164.4	Pendek	158.0 - 161	58.8 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun
269	31-May-23	N	28 27 - 37 tahun	160.5	Normal	158.0 - 161	51.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12.1 F	26 26 - 35 tahun	164.5	Pendek	158.0 - 161	59.0 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SD/ MI	20 ≥ 19 tahun
270	31-May-23	S	29 27 - 37 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	58.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	32 26 - 35 tahun	168.0	Normal	165.0 - 171	56.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun
271	31-May-23	N	24 16 - 26 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	48.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.8 S	26 26 - 35 tahun	165.7	Pendek	165.0 - 171	59.5 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	24 ≥ 19 tahun
272	31-May-23	H	23 16 - 26 tahun	149.8	Pendek	149.0 - 151	39.5 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMP/ MTs	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	14.2 S	28 26 - 35 tahun	165.0	Pendek	165.0 - 171	51.0 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	26 ≥ 19 tahun
273	31-May-23	R	26 16 - 26 tahun	145.0	Pendek	140.0 - 141	46.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	18 < 19 tahun	Tidak ada	9.8 MA	24 26 - 25 tahun	167.4	Normal	165.0 - 171	60.1 59 - 71.9 k Petani	Tamat SMA/ MA	16 < 19 tahun
274	31-May-23	D	37 27 - 37 tahun	153.0	Pendek	149.0 - 151	59.0 51 - 67 kg	IRT	Tidak bersekolah	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	P	46 46 - 55 tahun	158.5	Pendek	158.0 - 161	55.6 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	30 ≥ 19 tahun
275	31-May-23	N	36 27 - 37 tahun	143.0	Pendek	140.0 - 141	63.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	28 ≥ 19 tahun	Tidak ada	B	31 26 - 35 tahun	161.5	Pendek	158.0 - 161	59.3 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
276	31-May-23	N	23 16 - 26 tahun	151.5	Pendek	149.0 - 151	63.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 M	30 26 - 35 tahun	162.3	Pendek	158.0 - 161	60.1 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun
277	31-May-23	M	30 27 - 37 tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	54.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun	Tidak ada	14.8 F	31 26 - 35 tahun	164.4	Pendek	158.0 - 161	58.9 46 - 58.9 k Buruh	Tamat SD/ MI	26 ≥ 19 tahun
278	31-May-23	TP	30 27 - 37 tahun	143.0	Pendek	140.0 - 141	53.4 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	10 < 19 tahun	Tidak ada	10.8 AR	28 26 - 35 tahun	166.8	Normal	165.0 - 171	60.3 59 - 71.9 k Buruh	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
279	31-May-23	E	33 27 - 37 tahun	154.0	Pendek	149.0 - 151	57.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.7 W	35 26 - 35 tahun	161.1	Pendek	158.0 - 161	57.7 46 - 58.9 k Petani	Tidak bersekolah	29 ≥ 19 tahun
280	31-May-23	E	32 27 - 37 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	63.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	38 36 - 45 tahun	162.8	Pendek	158.0 - 161	58.9 46 - 58.9 k Buruh	Tamat SMP/ MTs	29 ≥ 19 tahun
281	31-May-23	S	26 16 - 26 tahun	147.0	Pendek	140.0 - 141	47.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 M	28 26 - 35 tahun	162.2	Pendek	158.0 - 161	58.8 46 - 58.9 k Nelayan	Tamat SD/ MI	24 ≥ 19 tahun
282	31-May-23	R	35 27 - 37 tahun	145.0	Pendek	140.0 - 141	48.7 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	32 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 M	26 26 - 35 tahun	160.8	Pendek	158.0 - 161	59.8 59 - 71.9 k Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
283	31-May-23	H	41 38 - 48 tahun	145.5	Pendek	140.0 - 141	49.2 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	17 < 19 tahun	Tidak ada	12 R	46 46 - 55 tahun	157.7	Pendek	158.0 - 161	56.5 46 - 58.9 k Sopir	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun
284	31-May-23	W	24 16 - 26 tahun	151.4	Pendek	149.0 - 151	46.1 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12 Y	30 26 - 35 tahun	165.4	Pendek	165.0 - 171	61.1 59 - 71.9 k Sopir	Tamat SMA/ MA	26 ≥ 19 tahun
285	31-May-23	W	24 16 - 26 tahun	151.4	Pendek	149.0 - 151	46.1 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	12 Y	30 26 - 35 tahun	165.4	Pendek	165.0 - 171	61.1 59 - 71.9 k Sopir	Tamat SMA/ MA	26 ≥ 19 tahun
286	31-May-23	B	37 27 - 37 tahun	158.0	Normal	158.0 - 161	58.5 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun	Tidak ada	13.4 S	44 36 - 45 tahun	157.9	Pendek	158.0 - 161	54.8 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	34 ≥ 19 tahun
287	1-Jun-23	R	27 27 - 37 tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	45.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11 A	28 26 - 35 tahun	165.9	Pendek	165.0 - 171	58.2 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	21 ≥ 19 tahun
288	1-Jun-23	R	27 27 - 37 tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	43.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	20 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10.7 A	28 26 - 35 tahun	166.7	Normal	165.0 - 171	59.2 59 - 71.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	21 ≥ 19 tahun
289	1-Jun-23	D	25 16 - 26 tahun	151.0	Pendek	149.0 - 151	50.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	MA	25 16 - 25 tahun	166.6	Normal	165.0 - 171	62.3 59 - 71.9 k Petani	Tamat SMA/ MA	22 ≥ 19 tahun
290	1-Jun-23	S	27 27 - 37 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	43.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	24 ≥ 19 tahun	Tidak ada	J	27 26 - 35 tahun	160.0	Pendek	158.0 - 161	58.0 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SMA/ MA	24 ≥ 19 tahun
291	1-Jun-23	M	29 27 - 37 tahun	161.0	Normal	158.0 - 161	48.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	17 < 19 tahun	Tidak ada	11.8 S	33 26 - 35 tahun	160.4	Pendek	158.0 - 161	58.3 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun
292	1-Jun-23	EDF	37 27 - 37 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	45.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	U	41 36 - 45 tahun	161.0	Pendek	158.0 - 161	50.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
293	1-Jun-23	E	37 27 - 37 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	45.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	A	41 36 - 45 tahun	161.0	Pendek	158.0 - 161	50.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	23 ≥ 19 tahun
294	1-Jun-23	S	34 27 - 37 tahun	161.0	Normal	158.0 - 161	67.0 51 - 67 kg	IRT	Tidak bersekolah	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.9 S	31 26 - 35 tahun	162.8	Pendek	158.0 - 161	57.9 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	18 < 19 tahun
295	1-Jun-23	N	46 38 - 48 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	43.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	40 ≥ 19 tahun	Tidak ada	H	50 46 - 55 tahun	161.0	Pendek	158.0 - 161	53.0 46 - 58.9 k Buruh	Tidak bersekolah	44 ≥ 19 tahun
296	1-Jun-23	H	38 38 - 48 tahun	150.5	Pendek	149.0 - 151	41.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SMA/ MA	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.2 S	44 36 - 45 tahun	163.0	Pendek	158.0 - 161	56.0 46 - 58.9 k Wiraswasta	Tamat SD/ MI	27 ≥ 19 tahun
297	1-Jun-23	I	33 27 - 37 tahun	153.0	Pendek	149.0 - 151	56.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	K	34 26 - 35 tahun	162.3	Pendek	158.0 - 161	60.0 59 - 71.9 k Petani	Tidak bersekolah	22 ≥ 19 tahun
298	1-Jun-23	I	33 27 - 37 tahun	153.0	Pendek	149.0 - 151	56.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	H	34 26 - 35 tahun	162.6	Pendek	158.0 - 161	60.4 59 - 71.9 k Petani	Tidak bersekolah	22 ≥ 19 tahun
299	1-Jun-23	I	33 27 - 37 tahun	153.0	Pendek	149.0 - 151	56.0 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	21 ≥ 19 tahun	Tidak ada	S	34 26 - 35 tahun	162.4	Pendek	158.0 - 161	59.7 59 - 71.9 k Petani	Tidak bersekolah	22 ≥ 19 tahun
300	1-Jun-23	B	32 27 - 37 tahun	151.0	Pendek	149.0 - 151	48.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	Y	38 36 - 45 tahun	161.1	Pendek	158.0 - 161	56.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun
301	1-Jun-23	B	32 27 - 37 tahun	155.0	Normal	149.0 - 151	45.0 34 - 50 kg	IRT	Tamat SD/ MI	19 ≥ 19 tahun	Tidak ada	Y	38 36 - 45 tahun	161.1	Pendek	158.0 - 161	56.0 46 - 58.9 k Petani	Tamat SD/ MI	25 ≥ 19 tahun
302	1-Jun-23	R	48 38 - 48 tahun	150.0	Pendek	149.0 - 151	53.0 51 - 67 kg	IRT	Tidak bersekolah	24 ≥ 19 tahun	Tidak ada	11.2 AM	49 46 - 55 tahun	162.5	Pendek	158.0 - 161	53.0 46 - 58.9 k Petani	Tidak bersekolah	25 ≥ 19 tahun
303	1-Jun-23	H	23 16 - 26 tahun	160.0	Normal	158.0 - 161	61.2 51 - 67 kg	IRT	Tamat SD/ MI	22 ≥ 19 tahun	Tidak ada	10 H	25 16 - 25 tahun	165.0	Pendek	165.0 - 171	60.0 59 - 71.9 k Wiraswasta</		

AB01	AB01_1	AB01_2	AB02	AB02_1	AB03	AB03_1	C01	C02	C03	C03_1	C04	C05	C05_1	C06	C06_1	D01	D01_1	D01_2	D02	D02_1	D02_2	D03	D03_1	D03_2
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3	Banyak	9	Jauh	RAR	8-Apr-22	7	0 - 11 bulan	Perempuan	60.0 59 - 70.9 cm	6.1 5 - 15.9 kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	46	Normal	46 - 51.9 c	-3.32	Sangat Pendek	Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	4	Jauh	ANZ	14-Nov-21	12	12 - 23 bulan	Perempuan	85.0 83 - 94.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	2000	BBLR	1200 - 2350 g	46.5	Normal	46 - 51.9 c	4.23	Tinggi	Tidak Stunting		
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	4	Jauh	NAA	22-Nov-21	12	12 - 23 bulan	Perempuan	60.0 59 - 70.9 cm	7.8 5 - 15.9 kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	46.5	Normal	46 - 51.9 c	-0.69	Normal	Tidak Stunting		
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	Akiya	24-May-22	6	0 - 11 bulan	Perempuan	64.0 59 - 70.9 cm	6.7 5 - 15.9 kg	3225	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	51.6	Normal	46 - 51.9 c	-0.84	Normal	Tidak Stunting		
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2	Banyak	2	Dekat	SQ	13-May-20	54	48 - 59 bulan	Perempuan	78.5 71 - 82.9 cm	9.1 5 - 15.9 kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	46.5	Normal	46 - 51.9 c	-3.67	Sangat Pendek	Stunting		
4000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5	2	Banyak	4	Jauh	KPAZ	3-Feb-22	10	0 - 11 bulan	Perempuan	65.7 59 - 70.9 cm	8.3 5 - 15.9 kg	2900	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	47	Normal	46 - 51.9 c	-2.04	Pendek	Stunting		
3000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5	3	Banyak	19	Jauh	MRK	18-Jul-18	51	48 - 59 bulan	Laki-laki	103.5 95 - 106.9 cm	26.0 16 - 26.9 kg	3800	Tidak BBLR	3501 - 4650 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-0.64	Normal	Tidak Stunting		
2500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	ADF	26-Apr-21	22	12 - 23 bulan	Laki-laki	71.5 71 - 82.9 cm	9.5 5 - 15.9 kg	2645	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48.9	Normal	46 - 51.9 c	-4.19	Sangat Pendek	Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	6	Banyak	11	Jauh	CW	30-Oct-20	23	12 - 23 bulan	Perempuan	78.5 71 - 82.9 cm	9.8 5 - 15.9 kg	2700	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-2.59	Pendek	Stunting		
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	3	Jauh	MRK	23-Feb-21	21	12 - 23 bulan	Laki-laki	71.8 71 - 82.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	1900	BBLR	1200 - 2350 g	46	Pendek	46 - 51.9 c	-4.59	Sangat Pendek	Stunting		
3000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5	3	Banyak	4	Jauh	EPR	16-Apr-22	7	0 - 11 bulan	Perempuan	65.2 59 - 70.9 cm	7.3 5 - 15.9 kg	2800	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-0.94	Normal	Tidak Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	KAM	31-May-21	18	12 - 23 bulan	Perempuan	74.0 71 - 82.9 cm	8.5 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-2.18	Pendek	Stunting		
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MG	21-Jan-21	21	12 - 23 bulan	Laki-laki	85.5 83 - 94.9 cm	12.3 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-0.14	Normal	Tidak Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	AAG	5-Apr-22	7	0 - 11 bulan	Laki-laki	68.5 59 - 70.9 cm	8.3 5 - 15.9 kg	3300	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	51	Normal	46 - 51.9 c	-0.59	Normal	Tidak Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	6	Jauh	MF	20-Apr-21	18	12 - 23 bulan	Laki-laki	74.8 71 - 82.9 cm	8.3 5 - 15.9 kg	2600	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	46.5	Normal	46 - 51.9 c	-3.04	Sangat Pendek	Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	S	9-Jun-21	17	12 - 23 bulan	Perempuan	74.5 71 - 82.9 cm	8.8 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	47	Normal	46 - 51.9 c	-1.94	Normal	Tidak Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3	Banyak	1	Dekat	AM	30-Oct-18	49	48 - 59 bulan	Laki-laki	96.9 95 - 106.9 cm	14.2 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-1.61	Normal	Tidak Stunting		
4200000	< 2.680.000	2,6 juta - 4,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MR	29-Dec-19	35	24 - 35 bulan	Perempuan	88.9 83 - 94.9 cm	11.0 5 - 15.9 kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-1.40	Normal	Tidak Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	8	Jauh	MR	26-Sep-21	14	12 - 23 bulan	Laki-laki	74.5 71 - 82.9 cm	10.5 5 - 15.9 kg	2250	BBLR	1200 - 2350 g	45.3	Pendek	40 - 45.9 c	-1.35	Normal	Tidak Stunting		
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	6	Banyak	2	Dekat	NF	21-Aug-20	27	24 - 35 bulan	Perempuan	79.5 71 - 82.9 cm	9.1 5 - 15.9 kg	2900	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	47	Normal	46 - 51.9 c	-2.80	Pendek	Stunting		
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MA	6-Oct-21	13	12 - 23 bulan	Laki-laki	74.5 71 - 82.9 cm	9.5 5 - 15.9 kg	3700	Tidak BBLR	3501 - 4650 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-1.21	Normal	Tidak Stunting		
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	S	19-Sep-21	14	12 - 23 bulan	Laki-laki	75.1 71 - 82.9 cm	8.4 5 - 15.9 kg	2700	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-1.20	Normal	Tidak Stunting		
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2	Banyak	5	Jauh	MAF	27-Jun-21	17	12 - 23 bulan	Laki-laki	72.2 71 - 82.9 cm	8.2 5 - 15.9 kg	2900	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-3.36	Sangat Pendek	Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4	Banyak	3	Jauh	MR	27-Jan-22	9	0 - 11 bulan	Laki-laki	71.5 71 - 82.9 cm	9.4 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	51	Normal	46 - 51.9 c	-0.65	Normal	Tidak Stunting		
200000	< 2.680.000	< 500 ribu	4	Banyak	1	Dekat	NA	23-Sep-21	13	12 - 23 bulan	Perempuan	73.0 71 - 82.9 cm	6.8 5 - 15.9 kg	2650	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	46	Normal	46 - 51.9 c	-1.22	Normal	Tidak Stunting		
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	5	Banyak	2	Dekat	PW	23-Nov-21	12	12 - 23 bulan	Perempuan	72.5 71 - 82.9 cm	8.1 5 - 15.9 kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-0.54	Normal	Tidak Stunting		
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	6	Jauh	AG	25-Nov-20	23	12 - 23 bulan	Laki-laki	81.0 71 - 82.9 cm	9.9 5 - 15.9 kg	3100	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-2.09	Pendek	Stunting		
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2	Banyak	7	Jauh	N	11-Sep-21	14	12 - 23 bulan	Perempuan	69.8 59 - 70.9 cm	8.2 5 - 15.9 kg	3100	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48.8	Normal	46 - 51.9 c	-2.56	Pendek	Stunting		
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	2	Dekat	NA	19-May-22	6	0 - 11 bulan	Perempuan	70.2 59 - 70.9 cm	7.0 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	1.86	Normal	Tidak Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	5	Banyak	6	Jauh	MR	8-Mar-22	9	0 - 11 bulan	Laki-laki	67.8 59 - 70.9 cm	7.4 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-1.58	Normal	Tidak Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	5	Banyak	7	Jauh	MS	2-Nov-21	12	12 - 23 bulan	Perempuan	72.3 71 - 82.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	3800	Tidak BBLR	3501 - 4650 g	47	Normal	46 - 51.9 c	-0.96	Normal	Tidak Stunting		
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2	Banyak	8	Jauh	RS	9-Sep-21	14	12 - 23 bulan	Perempuan	74.0 71 - 82.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-1.06	Normal	Tidak Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	5	Banyak	1	Dekat	MU	2-Mar-20	33	24 - 35 bulan	Laki-laki	83.6 83 - 94.9 cm	10.3 5 - 15.9 kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-3.09	Sangat Pendek	Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	AAQ	30-Sep-20	25	24 - 35 bulan	Laki-laki	76.5 71 - 82.9 cm	10.2 5 - 15.9 kg	2800	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-4.04	Sangat Pendek	Stunting		
400000	< 2.680.000	< 500 ribu	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	NSI	19-Nov-21	12	12 - 23 bulan	Perempuan	75.0 71 - 82.9 cm	11.5 5 - 15.9 kg	3100	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	45	Pendek	40 - 45.9 c	0.34	Normal	Tidak Stunting		
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	6	Banyak	2	Dekat	M	3-Oct-20	25	24 - 35 bulan	Laki-laki	77.5 71 - 82.9 cm	8.0 5 - 15.9 kg	2400	BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-3.71	Sangat Pendek	Stunting		
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	2	Dekat	FS	5-Jun-19	41	36 - 47 bulan	Perempuan	85.6 83 - 94.9 cm	13.2 5 - 15.9 kg	3400	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48.8	Normal	46 - 51.9 c	-3.43	Sangat Pendek	Stunting		
3000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5	2	Banyak	4	Jauh	MWS	31-Mar-22	7	0 - 11 bulan	Laki-laki	68.0 59 - 70.9 cm	6.6 5 - 15.9 kg	3300	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-1.03	Normal	Tidak Stunting		
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	3	Jauh	R	28-Nov-21	11	0 - 11 bulan	Laki-laki	73.2 71 - 82.9 cm	7.6 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	47	Normal	46 - 51.9 c	-0.97	Normal	Tidak Stunting		
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	3	Jauh	TDA	28-Apr-22	6	0 - 11 bulan	Perempuan	66.7 59 - 70.9 cm	7.1 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-0.17	Normal	Tidak Stunting		
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2	Banyak	1	Dekat	PM	27-Sep-18	50	48 - 59 bulan	Perempuan	92.5 83 - 94.9 cm	13.5 5 - 15.9 kg	3500	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-2.75	Pendek	Stunting		
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4	Banyak	2	Dekat	AKF	11-Dec-19	35	24 - 35 bulan	Perempuan	85.6 83 - 94.9 cm	10.4 5 - 15.9 kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	43.3	Pendek	40 - 45.9 c	-2.39	Pendek	Stunting		
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	AAF	26-May-21	18	12 - 23 bulan	Perempuan	77.5 71 - 82.9 cm	8.7 5 - 15.9 kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49.1	Normal	46 - 51.9 c	-1.08	Normal	Tidak Stunting		
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	5	Banyak	1	Dekat	RR	13-Apr-22	7	0 - 11 bulan	Perempuan	61.3 59 - 70.9 cm	6.4 5 - 15.9 kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-2.80	Pendek	Stunting		
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4	Banyak	8	Jauh	MAA	17-Jul-20	28	24 - 35 bulan	Laki-laki	86.9 83 - 94.9 cm	12.4 5 - 15.9 kg	3300	Tidak BBLR	2351 - 350								

300000 < 2.680.000	< 500 ribu	3 Banyak	2 Dekat	N	25-Nov-20	24 24 - 35 bulan	Perempuan	80.0 71 - 82.9 cm	8.4 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.82 Normal	Tidak Stunting
600000 ≥ 2.680.000	4,6 juta - 6,5 j	2 Banyak	3 Jauh	AS	7-Sep-20	11 0 - 11 bulan	Laki-laki	88.0 83 - 94.9 cm	11.7 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49.1	Normal	46 - 51.9 c	-0.44 Normal	Tidak Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AMY	8-Dec-18	47 36 - 47 bulan	Perempuan	96.0 95 - 106.9 cm	16.3 16 - 26.9 kg	2700 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46	Normal	46 - 51.9 c	-1.53 Normal	Tidak Stunting
800000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	ANA	14-Dec-21	11 0 - 11 bulan	Laki-laki	71.0 71 - 82.9 cm	7.6 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-1.48 Normal	Tidak Stunting
200000 < 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AG	8-Apr-22	8 0 - 11 bulan	Perempuan	65.0 59 - 70.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-1.44 Normal	Tidak Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	2 Dekat	SR	7-Apr-22	8 0 - 11 bulan	Perempuan	65.0 59 - 70.9 cm	6.6 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-1.46 Normal	Tidak Stunting
1500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	2 Dekat	AAZ	27-Dec-20	23 12 - 23 bulan	Perempuan	85.5 83 - 94.9 cm	10.0 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-0.09 Normal	Tidak Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	6 Jauh	A	7-Aug-20	27 24 - 35 bulan	Perempuan	81.6 71 - 82.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.14 Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	6 Banyak	2 Dekat	N	15-Feb-21	21 12 - 23 bulan	Perempuan	79.5 71 - 82.9 cm	9.8 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.27 Normal	Tidak Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Dekat	2 Dekat	AAFR	10-Sep-19	38 36 - 47 bulan	Laki-laki	83.7 83 - 94.9 cm	10.7 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 51	Normal	46 - 51.9 c	-3.69 Sangat Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	3 Jauh	MA	3-Feb-22	9 0 - 11 bulan	Laki-laki	68.5 59 - 70.9 cm	8.0 5 - 15.9 kg	3800 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 51	Normal	46 - 51.9 c	-1.73 Normal	Tidak Stunting
2000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	AH	1-Dec-21	12 12 - 23 bulan	Perempuan	71.0 71 - 82.9 cm	8.6 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-0.90 Normal	Tidak Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	7 Jauh	NK	24-Dec-20	23 12 - 23 bulan	Perempuan	77.0 71 - 82.9 cm	10.0 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-2.52 Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	NA	30-Nov-21	13 12 - 23 bulan	Perempuan	66.3 59 - 70.9 cm	9.2 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-3.01 Sangat Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	7 Jauh	N	29-Jun-20	29 24 - 35 bulan	Perempuan	81.0 71 - 82.9 cm	9.8 5 - 15.9 kg	3600 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 48.1	Normal	46 - 51.9 c	-2.57 Pendek	Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MF	16-Sep-21	14 12 - 23 bulan	Laki-laki	73.0 71 - 82.9 cm	8.7 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-2.23 Pendek	Stunting
2500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	3 Jauh	MI	19-Oct-20	25 24 - 35 bulan	Laki-laki	94.4 83 - 94.9 cm	10.3 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	1.94 Normal	Tidak Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	A	22-Jan-20	34 24 - 35 bulan	Laki-laki	84.5 83 - 94.9 cm	10.7 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46	Pendek	46 - 51.9 c	-2.88 Pendek	Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	4 Jauh	MDA	19-Jul-19	40 36 - 47 bulan	Laki-laki	94.1 83 - 94.9 cm	13.0 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-1.23 Normal	Tidak Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	4 Banyak	4 Jauh	HA	7-Mar-21	20 12 - 23 bulan	Perempuan	80.0 71 - 82.9 cm	9.5 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-1.15 Normal	Tidak Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	4 Banyak	5 Jauh	AAB	19-Mar-22	8 0 - 11 bulan	Laki-laki	68.0 59 - 70.9 cm	7.2 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.45 Normal	Tidak Stunting
3000000 < 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	2 Banyak	2 Dekat	MAA	1-Jun-22	6 0 - 11 bulan	Laki-laki	65.5 59 - 70.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-1.00 Normal	Tidak Stunting
3000000 < 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MA	19-Feb-21	21 12 - 23 bulan	Laki-laki	77.0 71 - 82.9 cm	8.1 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.92 Pendek	Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	5 Banyak	3 Jauh	NA	30-Apr-21	19 12 - 23 bulan	Perempuan	81.5 71 - 82.9 cm	9.3 5 - 15.9 kg	3850 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-0.09 Normal	Tidak Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	11 Jauh	NM	13-Sep-19	38 36 - 47 bulan	Perempuan	86.5 83 - 94.9 cm	12.5 5 - 15.9 kg	2400 BBLR	2351 - 3500 g 44	Pendek	40 - 45.9 c	-2.63 Pendek	Stunting
3000000 ≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	2 Banyak	5 Jauh	S	15-Jan-19	46 36 - 47 bulan	Laki-laki	95.4 95 - 106.9 cm	13.1 5 - 15.9 kg	3600 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-1.71 Normal	Tidak Stunting
3000000 ≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	3 Banyak	4 Jauh	D	18-Oct-22	7 0 - 11 bulan	Laki-laki	65.7 59 - 70.9 cm	5.9 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.7	Normal	46 - 51.9 c	-1.68 Normal	Tidak Stunting
3000000 ≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	3 Banyak	1 Dekat	IM	10-Jul-19	46 36 - 47 bulan	Laki-laki	99.2 95 - 106.9 cm	13.7 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.5	Normal	46 - 51.9 c	-0.95 Normal	Tidak Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	7 Jauh	AR	14-Sep-20	32 24 - 35 bulan	Laki-laki	86.0 83 - 94.9 cm	11.1 5 - 15.9 kg	2500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46	Pendek	46 - 51.9 c	-2.34 Pendek	Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	SNA	22-Mar-21	26 24 - 35 bulan	Perempuan	82.3 71 - 82.9 cm	10.3 5 - 15.9 kg	2300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.5	Normal	46 - 51.9 c	-1.76 Normal	Tidak Stunting
350000 < 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	3 Jauh	AH	9-Dec-19	41 36 - 47 bulan	Laki-laki	96.5 95 - 106.9 cm	12.0 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.5	Normal	46 - 51.9 c	-0.94 Normal	Tidak Stunting
350000 < 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	3 Jauh	AAF	25-Oct-22	6 0 - 11 bulan	Laki-laki	66.3 59 - 70.9 cm	7.0 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.25 Normal	Tidak Stunting
350000 < 2.680.000	< 500 ribu	3 Banyak	9 Jauh	MS	11-May-20	36 36 - 47 bulan	Laki-laki	87.0 83 - 94.9 cm	10.4 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-2.50 Pendek	Stunting
700000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	1 Dekat	MS	24-Sep-19	43 36 - 47 bulan	Laki-laki	89.0 83 - 94.9 cm	10.6 5 - 15.9 kg	2370 BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.97 Pendek	Stunting
700000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	1 Dekat	AA	28-Aug-20	32 24 - 35 bulan	Perempuan	83.2 83 - 94.9 cm	10.5 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-2.61 Pendek	Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	5 Jauh	AA	3-Nov-21	18 12 - 23 bulan	Laki-laki	80.1 71 - 82.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-0.75 Normal	Tidak Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	4 Jauh	MN	22-Dec-18	52 48 - 59 bulan	Laki-laki	92.1 83 - 94.9 cm	10.5 5 - 15.9 kg	2700 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-3.20 Sangat Pendek	Stunting
2600000 < 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	3 Banyak	2 Dekat	NAM	25-Mar-22	13 12 - 23 bulan	Laki-laki	71.3 71 - 82.9 cm	8.6 5 - 15.9 kg	3600 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-2.41 Pendek	Stunting
1000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	AAR	19-Jan-20	40 36 - 47 bulan	Laki-laki	87.5 83 - 94.9 cm	10.9 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 45.7	Pendek	40 - 45.9 c	-2.88 Pendek	Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	6 Jauh	AF	28-Oct-22	6 0 - 11 bulan	Laki-laki	64.5 59 - 70.9 cm	6.8 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-2.13 Pendek	Stunting
200000 < 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AZ	21-Mar-20	26 24 - 35 bulan	Perempuan	88.6 83 - 94.9 cm	11.5 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	0.33 Normal	Tidak Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	6 Jauh	MS	4-May-21	21 12 - 23 bulan	Laki-laki	80.2 71 - 82.9 cm	11.4 5 - 15.9 kg	4000 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 57	Normal	52 - 57.9 c	-2.41 Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	2 Dekat	S	22-Feb-21	26 24 - 35 bulan	Laki-laki	86.0 83 - 94.9 cm	12.2 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.11 Normal	Tidak Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	3 Jauh	MA	12-Jul-18	58 48 - 59 bulan	Laki-laki	102.7 95 - 106.9 cm	15.2 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-1.39 Normal	Tidak Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	3 Jauh	AN	3-Sep-21	20 12 - 23 bulan	Perempuan	79.0 71 - 82.9 cm	10.4 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.8	Normal	46 - 51.9 c	-1.18 Normal	Tidak Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	6 Banyak	6 Jauh	SA	14-Aug-18	57 48 - 59 bulan	Perempuan	98.6 95 - 106.9 cm	13.1 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 45	Pendek	40 - 45.9 c	-2.01 Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	5 Banyak	6 Jauh	AI	2-Mar-19	50 48 - 59 bulan	Laki-laki	100.5 95 - 106.9 cm	16.5 16 - 26.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-1.01 Normal	Tidak Stunting
700000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	4 Jauh	ADM	17-Jan-21	28 24 - 35 bulan	Laki-laki	79.5 71 - 82.9 cm	9.9 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50.2	Normal	46 - 51.9 c	-3.34 Sangat Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	NIM	19-Sep-20	32 24 - 35 bulan	Perempuan	88.8 83 - 94.9 cm	11.1 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-0.95 Normal	Tidak Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	CR	28-Apr-21	24 24 - 35 bulan	Perempuan	77.0 71 - 82.9 cm	9.3 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-2.89 Pendek	Stunting
2000000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	ARA	15-Nov-22	6 0 - 11 bulan	Perempuan	59.5 59 - 70.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.90 Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MSA	12-Feb-22	15 12 - 23 bulan	Laki-laki	72.0 71 - 82.9 cm	8.0 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.66 Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	N	30-May-21	23 12 - 23 bulan	Laki-laki	82.8 71 - 82.9 cm	12.0 5 - 15.9 kg	3180 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49.2	Normal	46 - 51.9 c	-1.36 Normal	Tidak Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	2 Dekat	N	9-Jul-22	10 0 - 11 bulan	Perempuan	66.5 59 - 70.9 cm	7.3 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-2.25 Pendek	Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	2 Dekat	Z	11-Aug-20	33 24 - 35 bulan	Perempuan	84.5 83 - 94.9 cm	12.5 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49.4	Normal	46 - 51.9 c	-2.55 Pendek	Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	5 Jauh	F	22-Jun-18	59 48 - 59 bulan	Perempuan	97.9 95 - 106.9 cm	15.3 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-2.43 Pendek	Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	5 Jauh	Y	26-Oct-22	6 0 - 11 bulan	Laki-laki	65.5 59 - 70.9 cm	6.6 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 51	Normal	46 - 51.9 c	-1.62 Normal	Tidak Stunting
500000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	2 Dekat	HC	3-Dec-18	53 48 - 59 bulan	Perempuan	94.4 83 - 94.9 cm	11.5 5 - 15.9 kg	2500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.56 Pendek	Stunting
300000 < 2.680.000	< 500 ribu	3 Banyak	12 Jauh	K	14-Sep-21	20 12 - 23 bulan	Perempuan	78.6 71 - 82.9 cm	8.0 5 - 15.9 kg	2600 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-1.21 Normal	Tidak Stunting
700000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	A	27-Sep-22	7 0 - 11 bulan	Laki-laki	64.2 59 - 70.9 cm	7.0 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-2.81 Pendek	Stunting
900000 < 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	R	3-Feb-19	51 48 - 59 bulan	Perempuan	94.3							

500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	2 Dekat	ANR	21-Nov-21	18 12 - 23 bulan	Perempuan	71.0 71 - 82.9 cm	7.1 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-3.12	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MT	27-Dec-19	40 36 - 47 bulan	Laki-laki	85.3 83 - 94.9 cm	11.1 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-3.54	Sangat Pendek	Stunting
100000	< 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	NAA	27-Jun-22	10 0 - 11 bulan	Perempuan	68.0 59 - 70.9 cm	7.0 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-1.85	Normal	Tidak Stunting
100000	< 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	S	9-Jul-21	23 12 - 23 bulan	Perempuan	79.0 71 - 82.9 cm	9.6 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	47	Normal	46 - 51.9 c	-2.08	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AHA	5-Jun-22	11 0 - 11 bulan	Laki-laki	69.6 59 - 70.9 cm	7.7 5 - 15.9 kg	2360 BBLR	2351 - 3500 g	47	Normal	46 - 51.9 c	-2.42	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	4 Jauh	Q	5-Nov-18	54 48 - 59 bulan	Perempuan	93.9 83 - 94.9 cm	12.4 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	46	Normal	46 - 51.9 c	-2.77	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	MN	23-Nov-18	54 48 - 59 bulan	Laki-laki	96.1 95 - 106.9 cm	12.3 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-2.39	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MA	26-Mar-19	49 48 - 59 bulan	Laki-laki	90.3 83 - 94.9 cm	11.2 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-3.31	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AF	19-Jun-21	23 12 - 23 bulan	Laki-laki	79.0 71 - 82.9 cm	8.8 5 - 15.9 kg	3645 Tidak BBLR	3501 - 4650 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-2.46	Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	3 Jauh	A	6-Feb-19	51 48 - 59 bulan	Laki-laki	90.5 83 - 94.9 cm	12.5 5 - 15.9 kg	2600 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	46	Pendek	46 - 51.9 c	-3.42	Sangat Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	5 Jauh	AA	9-Sep-22	8 0 - 11 bulan	Perempuan	69.9 59 - 70.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	0.20	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AA	28-Jun-22	10 0 - 11 bulan	Perempuan	69.8 59 - 70.9 cm	7.1 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48.7	Normal	46 - 51.9 c	-1.12	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MR	9-Nov-21	18 12 - 23 bulan	Laki-laki	78.0 71 - 82.9 cm	10.2 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-1.48	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MH	31-Jul-22	9 0 - 11 bulan	Laki-laki	71.2 71 - 82.9 cm	9.3 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-0.80	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	2 Dekat	NAS	3-Jun-20	35 24 - 35 bulan	Perempuan	84.6 83 - 94.9 cm	10.0 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	47.2	Normal	46 - 51.9 c	-2.70	Pendek	Stunting
200000	< 2.680.000	< 500 ribu	4 Banyak	3 Jauh	AD	28-Dec-21	16 12 - 23 bulan	Perempuan	76.0 71 - 82.9 cm	8.9 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	47.3	Normal	46 - 51.9 c	-0.99	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	5 Jauh	AFPM	2-Dec-21	17 12 - 23 bulan	Perempuan	77.0 71 - 82.9 cm	10.3 5 - 15.9 kg	3700 Tidak BBLR	3501 - 4650 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-0.94	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	7 Jauh	AQA	23-Sep-22	8 0 - 11 bulan	Perempuan	67.5 59 - 70.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-0.54	Normal	Tidak Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	5 Banyak	3 Jauh	AH	24-Mar-20	38 36 - 47 bulan	Laki-laki	90.0 83 - 94.9 cm	12.2 5 - 15.9 kg	3800 Tidak BBLR	3501 - 4650 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-1.94	Normal	Tidak Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MAH	17-Jul-21	22 12 - 23 bulan	Laki-laki	101.9 95 - 106.9 cm	11.5 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	47.7	Normal	46 - 51.9 c	5.53	Tinggi	Tidak Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	4 Banyak	4 Jauh	MA	27-Jun-22	10 0 - 11 bulan	Laki-laki	70.1 59 - 70.9 cm	9.5 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48.7	Normal	46 - 51.9 c	-1.58	Normal	Tidak Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	3 Banyak	1 Dekat	A	21-May-19	48 48 - 59 bulan	Perempuan	101.3 95 - 106.9 cm	15.4 5 - 15.9 kg	2200 BBLR	1200 - 2350 g	42	Pendek	40 - 45.9 c	-0.35	Normal	Tidak Stunting
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	5 Jauh	AA	30-Jan-21	27 24 - 35 bulan	Laki-laki	76.0 71 - 82.9 cm	8.5 5 - 15.9 kg	3150 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	34	Pendek	34 - 39.9 c	-4.34	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	5 Jauh	R	20-Apr-22	13 12 - 23 bulan	Laki-laki	69.5 59 - 70.9 cm	8.4 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	50.7	Normal	46 - 51.9 c	-2.84	Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	3 Jauh	F	19-Feb-19	51 48 - 59 bulan	Perempuan	101.5 95 - 106.9 cm	15.6 5 - 15.9 kg	3600 Tidak BBLR	3501 - 4650 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-0.69	Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	3 Jauh	AI	29-Mar-22	13 12 - 23 bulan	Laki-laki	71.7 71 - 82.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	51	Normal	46 - 51.9 c	-2.52	Pendek	Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	4 Jauh	TTU	9-Aug-19	44 36 - 47 bulan	Perempuan	90.1 83 - 94.9 cm	10.1 5 - 15.9 kg	1200 BBLR	1200 - 2350 g	38	Pendek	34 - 39.9 c	-2.53	Pendek	Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	ND	20-Jun-22	11 0 - 11 bulan	Perempuan	70.0 59 - 70.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	50	Normal	46 - 51.9 c	-1.18	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	5 Jauh	H	4-Jul-20	34 24 - 35 bulan	Laki-laki	85.0 83 - 94.9 cm	12.0 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-2.80	Pendek	Stunting
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	NA	25-Feb-21	26 24 - 35 bulan	Perempuan	74.0 71 - 82.9 cm	8.4 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-4.21	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	3 Jauh	MFA	22-Apr-21	25 24 - 35 bulan	Laki-laki	84.1 83 - 94.9 cm	11.2 5 - 15.9 kg	3600 Tidak BBLR	3501 - 4650 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-1.27	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	3 Jauh	FMY	5-Aug-18	57 48 - 59 bulan	Perempuan	105.8 95 - 106.9 cm	18.2 16 - 26.9 kg	3600 Tidak BBLR	3501 - 4650 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-0.51	Normal	Tidak Stunting
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	7 Jauh	MRH	23-Apr-20	37 36 - 47 bulan	Laki-laki	86.2 83 - 94.9 cm	11.5 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48.2	Normal	46 - 51.9 c	-2.81	Pendek	Stunting
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MHA	21-Jun-20	35 24 - 35 bulan	Laki-laki	95.2 95 - 106.9 cm	13.1 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	46	Normal	46 - 51.9 c	-0.08	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	5 Jauh	AK	17-Oct-21	19 12 - 23 bulan	Perempuan	76.5 71 - 82.9 cm	9.5 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49.5	Normal	46 - 51.9 c	-1.60	Normal	Tidak Stunting
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	NR	7-Nov-21	18 12 - 23 bulan	Perempuan	75.8 71 - 82.9 cm	9.1 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-1.63	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	FAF	31-May-21	23 12 - 23 bulan	Laki-laki	75.3 71 - 82.9 cm	9.1 5 - 15.9 kg	2600 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-3.84	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AAR	29-Dec-21	16 12 - 23 bulan	Perempuan	75.5 71 - 82.9 cm	8.5 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	50.8	Normal	46 - 51.9 c	-1.17	Normal	Tidak Stunting
3000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	4 Banyak	5 Jauh	N	14-Oct-21	19 12 - 23 bulan	Perempuan	73.1 71 - 82.9 cm	7.2 5 - 15.9 kg	2000 BBLR	1200 - 2350 g	43	Pendek	40 - 45.9 c	-2.78	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	6 Banyak	2 Dekat	NA	12-Sep-22	8 0 - 11 bulan	Perempuan	65.6 59 - 70.9 cm	7.0 5 - 15.9 kg	2200 BBLR	1200 - 2350 g	44	Pendek	40 - 45.9 c	-1.56	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	5 Banyak	4 Jauh	N	27-Jan-21	27 24 - 35 bulan	Perempuan	74.5 71 - 82.9 cm	8.2 5 - 15.9 kg	2600 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-4.44	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MM	27-Oct-22	6 0 - 11 bulan	Perempuan	63.5 59 - 70.9 cm	6.3 5 - 15.9 kg	2500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-1.61	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	5 Jauh	A	16-Oct-20	31 24 - 35 bulan	Perempuan	83.2 83 - 94.9 cm	11.5 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-2.36	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	15 Jauh	AS	11-Mar-22	14 12 - 23 bulan	Laki-laki	73.5 71 - 82.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-1.77	Normal	Tidak Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	NH	11-Sep-21	20 12 - 23 bulan	Perempuan	76.0 71 - 82.9 cm	7.8 5 - 15.9 kg	2000 BBLR	1200 - 2350 g	44	Pendek	40 - 45.9 c	-2.13	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	6 Banyak	12 Jauh	MI	4-Jun-18	59 48 - 59 bulan	Laki-laki	98.4 95 - 106.9 cm	15.0 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-2.47	Pendek	Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2 Banyak	5 Jauh	AA	17-Jul-18	58 48 - 59 bulan	Perempuan	100.0 95 - 106.9 cm	16.0 16 - 26.9 kg	4020 Tidak BBLR	3501 - 4650 g	52	Normal	52 - 57.9 c	-1.82	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	5 Jauh	ANA	1-Sep-18	56 48 - 59 bulan	Perempuan	103.4 95 - 106.9 cm	11.3 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-0.93	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	5 Jauh	RRP	8-Jul-21	22 12 - 23 bulan	Perempuan	73.0 71 - 82.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	3800 Tidak BBLR	3501 - 4650 g	52	Normal	52 - 57.9 c	-3.63	Sangat Pendek	Stunting
600000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	6 Jauh	N	3-May-19	48 48 - 59 bulan	Perempuan	93.0 83 - 94.9 cm	12.2 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-2.35	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MZAF	12-Apr-21	25 24 - 35 bulan	Laki-laki	79.9 71 - 82.9 cm	9.2 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	51	Normal	46 - 51.9 c	-2.69	Pendek	Stunting
600000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	5 Jauh	H	24-Jun-22	11 0 - 11 bulan	Perempuan	72.5 71 - 82.9 cm	10.0 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-0.14	Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	3 Jauh	SA	10-Mar-20	38 36 - 47 bulan	Perempuan	86.7 83 - 94.9 cm	12.1 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48.2	Normal	46 - 51.9 c	-2.57	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	4 Jauh	AH	13-Jun-21	23 12 - 23 bulan	Perempuan	76.5 71 - 82.9 cm	8.4 5 - 15.9 kg	2700 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	45	Pendek	40 - 45.9 c	-2.72	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	13 Jauh	NP	4-Jun-21	23 12 - 23 bulan	Perempuan	76.7 71 - 82.9 cm	8.5 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	48	Normal	46 - 51.9 c	-2.73	Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	4 Jauh	J	20-Dec-19	41 36 - 47 bulan	Laki-laki	84.5 83 - 94.9 cm	10.0 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g	49	Normal	46 - 51.9 c	-3.78	Sangat Pendek	Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MLIR	20-Apr-20	37 36 - 47 bulan	Perempuan	78.7 71 - 82.9 cm	8.8 5 - 15.9 kg	2700 Tidak BBLR	2351 - 3						

300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2	Banyak	2	Dekat	NA	8-Sep-18	56	48 - 59	bulan	Perempuan	94.4	83 - 94.9	cm	13.0	5 - 15.9	kg	2500	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48	Normal	46 - 51.9	c	-2.85	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	5	Jauh	AAZ	16-Oct-20	31	24 - 35	bulan	Perempuan	87.8	83 - 94.9	cm	11.0	5 - 15.9	kg	3300	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	46.7	Normal	46 - 51.9	c	-1.09	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	RZ	20-Aug-21	21	12 - 23	bulan	Laki-laki	78.4	71 - 82.9	cm	10.3	5 - 15.9	kg	2300	BBLR	1200 - 2350	g	48	Normal	46 - 51.9	c	-2.16	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4	Banyak	2	Dekat	AAZ	8-Jun-20	35	24 - 35	bulan	Perempuan	81.7	71 - 82.9	cm	9.1	5 - 15.9	kg	2900	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	44.5	Pendek	40 - 45.9	c	-3.45	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	7	Jauh	ANF	22-Oct-21	19	12 - 23	bulan	Perempuan	79.6	71 - 82.9	cm	10.2	5 - 15.9	kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	47.7	Normal	46 - 51.9	c	-0.53	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	5	Jauh	R	22-Dec-20	29	24 - 35	bulan	Laki-laki	85.5	83 - 94.9	cm	10.8	5 - 15.9	kg	3500	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	49.8	Normal	46 - 51.9	c	-1.72	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	ANR	30-Apr-20	36	36 - 47	bulan	Perempuan	83.7	83 - 94.9	cm	9.7	5 - 15.9	kg	3100	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48.7	Normal	46 - 51.9	c	-3.46	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MAF	25-Jan-19	52	48 - 59	bulan	Laki-laki	102.5	95 - 106.9	cm	17.0	16 - 26.9	kg	2900	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	44	Pendek	40 - 45.9	c	-0.71	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	6	Jauh	A	14-May-19	48	48 - 59	bulan	Laki-laki	96.5	95 - 106.9	cm	13.4	5 - 15.9	kg	2800	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	47	Normal	46 - 51.9	c	-1.68	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	6	Jauh	MH	18-Dec-18	53	48 - 59	bulan	Laki-laki	96.0	95 - 106.9	cm	13.2	5 - 15.9	kg	3400	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	49	Normal	46 - 51.9	c	-2.34	Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	NKH	12-Apr-21	25	24 - 35	bulan	Perempuan	84.1	83 - 94.9	cm	12.0	5 - 15.9	kg	2900	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	47	Normal	46 - 51.9	c	-0.88	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MFA	27-Oct-22	6	0 - 11	bulan	Laki-laki	61.5	59 - 70.9	cm	6.2	5 - 15.9	kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48	Normal	46 - 51.9	c	-3.53	Sangat Pendek	Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	10	Jauh	AAZ	16-Jun-22	11	0 - 11	bulan	Perempuan	70.5	59 - 70.9	cm	8.2	5 - 15.9	kg	2700	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48.7	Normal	46 - 51.9	c	-1.36	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MH	14-Apr-20	37	36 - 47	bulan	Laki-laki	85.8	83 - 94.9	cm	12.0	5 - 15.9	kg	3700	Tidak BBLR	3501 - 4650	g	48	Normal	46 - 51.9	c	-2.97	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	9	Jauh	YR	6-Apr-22	13	12 - 23	bulan	Perempuan	71.5	71 - 82.9	cm	8.4	5 - 15.9	kg	3200	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	50.5	Normal	46 - 51.9	c	-1.44	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	A	17-Dec-19	41	36 - 47	bulan	Laki-laki	87.6	83 - 94.9	cm	10.5	5 - 15.9	kg	2800	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	46	Pendek	46 - 51.9	c	-3.01	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	2	Dekat	N	18-Dec-20	29	24 - 35	bulan	Laki-laki	73.1	71 - 82.9	cm	8.5	5 - 15.9	kg	3600	Tidak BBLR	3501 - 4650	g	49	Normal	46 - 51.9	c	-5.44	Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3	Banyak	2	Dekat	R	2-Aug-22	9	0 - 11	bulan	Laki-laki	63.1	59 - 70.9	cm	6.5	5 - 15.9	kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48.5	Normal	46 - 51.9	c	-4.37	Sangat Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	AK	5-Nov-22	6	0 - 11	bulan	Perempuan	64.5	59 - 70.9	cm	7.6	5 - 15.9	kg	2400	BBLR	2351 - 3500	g	48.2	Normal	46 - 51.9	c	-1.04	Normal	Tidak Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	2	Banyak	5	Jauh	AZK	26-Jan-21	28	24 - 35	bulan	Laki-laki	89.5	83 - 94.9	cm	6.9	5 - 15.9	kg	3045	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	50.2	Normal	46 - 51.9	c	-0.28	Normal	Tidak Stunting
3000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	HAS	8-Aug-22	9	0 - 11	bulan	Laki-laki	76.0	71 - 82.9	cm	8.4	5 - 15.9	kg	2500	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	38	Pendek	34 - 39.9	c	1.39	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	6	Jauh	AAS	22-Nov-18	54	48 - 59	bulan	Laki-laki	97.2	95 - 106.9	cm	12.8	5 - 15.9	kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	47	Normal	46 - 51.9	c	-2.15	Pendek	Stunting
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	NZ	24-Mar-21	26	24 - 35	bulan	Perempuan	88.5	83 - 94.9	cm	12.0	5 - 15.9	kg	2600	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	45	Pendek	40 - 45.9	c	0.28	Normal	Tidak Stunting
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	2	Dekat	AZK	11-Nov-22	6	0 - 11	bulan	Perempuan	60.5	59 - 70.9	cm	5.6	5 - 15.9	kg	2500	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	45	Pendek	40 - 45.9	c	-2.65	Pendek	Stunting
1800000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	3	Jauh	AR	1-Apr-22	13	12 - 23	bulan	Perempuan	71.8	71 - 82.9	cm	8.8	5 - 15.9	kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	49	Normal	46 - 51.9	c	-1.41	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	AATZ	16-Aug-20	33	24 - 35	bulan	Perempuan	84.5	83 - 94.9	cm	10.7	5 - 15.9	kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48	Normal	46 - 51.9	c	-2.36	Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	6	Jauh	NAA	21-Feb-19	51	48 - 59	bulan	Perempuan	98.9	95 - 106.9	cm	16.0	16 - 26.9	kg	3100	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	47	Normal	46 - 51.9	c	-1.28	Normal	Tidak Stunting
3000000	< 2.680.000	2,6 juta - 4,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	AZZ	14-Jul-20	34	24 - 35	bulan	Perempuan	88.4	83 - 94.9	cm	12.1	5 - 15.9	kg	2900	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48.2	Normal	46 - 51.9	c	-1.49	Normal	Tidak Stunting
3000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5	2	Banyak	2	Dekat	AKH	12-Apr-22	13	12 - 23	bulan	Perempuan	74.3	71 - 82.9	cm	9.5	5 - 15.9	kg	3400	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	50.2	Normal	46 - 51.9	c	-0.32	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	5	Jauh	MF	19-Aug-18	57	48 - 59	bulan	Laki-laki	99.3	95 - 106.9	cm	14.1	5 - 15.9	kg	3600	Tidak BBLR	3501 - 4650	g	48.8	Normal	46 - 51.9	c	-2.02	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	HI	2-Jul-20	34	24 - 35	bulan	Perempuan	84.9	83 - 94.9	cm	12.6	5 - 15.9	kg	2600	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48	Normal	46 - 51.9	c	-2.49	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	NA	18-Jan-20	40	36 - 47	bulan	Perempuan	88.0	83 - 94.9	cm	12.2	5 - 15.9	kg	3500	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	49.2	Normal	46 - 51.9	c	-2.49	Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	AAZ	31-Aug-21	20	12 - 23	bulan	Perempuan	83.0	83 - 94.9	cm	11.9	5 - 15.9	kg	3575	Tidak BBLR	3501 - 4650	g	52	Normal	52 - 57.9	c	0.04	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MA	31-Oct-22	6	0 - 11	bulan	Laki-laki	61.0	59 - 70.9	cm	6.1	5 - 15.9	kg	1835	BBLR	1200 - 2350	g	47	Normal	46 - 51.9	c	-3.70	Sangat Pendek	Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	F	27-May-20	36	36 - 47	bulan	Perempuan	91.5	83 - 94.9	cm	12.0	5 - 15.9	kg	2835	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	51	Normal	46 - 51.9	c	-0.94	Normal	Tidak Stunting
4000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MFL	31-Mar-20	37	36 - 47	bulan	Laki-laki	92.5	83 - 94.9	cm	11.9	5 - 15.9	kg	2300	BBLR	1200 - 2350	g	46	Pendek	46 - 51.9	c	-1.27	Normal	Tidak Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	3	Banyak	2	Dekat	MI	26-Aug-18	57	48 - 59	bulan	Laki-laki	100.4	95 - 106.9	cm	16.2	16 - 26.9	kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48	Normal	46 - 51.9	c	-1.76	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3	Banyak	6	Jauh	AS	9-Apr-22	13	12 - 23	bulan	Laki-laki	72.8	71 - 82.9	cm	8.3	5 - 15.9	kg	2700	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	45	Pendek	40 - 45.9	c	-1.68	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	NA	23-Jul-20	34	24 - 35	bulan	Perempuan	82.8	71 - 82.9	cm	11.6	5 - 15.9	kg	3000	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	47	Normal	46 - 51.9	c	-2.94	Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	2	Dekat	NA	9-Aug-21	21	12 - 23	bulan	Perempuan	76.5	71 - 82.9	cm	9.8	5 - 15.9	kg	3800	Tidak BBLR	3501 - 4650	g	49	Normal	46 - 51.9	c	-2.27	Pendek	Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	AR	2-Jun-18	59	48 - 59	bulan	Perempuan	101.6	95 - 106.9	cm	12.8	5 - 15.9	kg	1900	BBLR	1200 - 2350	g	42	Pendek	40 - 45.9	c	-1.63	Normal	Tidak Stunting
2500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MFA	11-Sep-18	56	48 - 59	bulan	Laki-laki	94.0	83 - 94.9	cm	13.0	5 - 15.9	kg	3360	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	48	Normal	46 - 51.9	c	-3.12	Sangat Pendek	Stunting
2500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	3	Jauh	MGAG	26-Sep-21	20	12 - 23	bulan	Laki-laki	78.2	71 - 82.9	cm	8.7	5 - 15.9	kg	3310	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	51	Normal	46 - 51.9	c	-1.90	Normal	Tidak Stunting
3000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	KFI	3-Oct-18	55	48 - 59	bulan	Perempuan	98.3	95 - 106.9	cm	13.5	5 - 15.9	kg	2100	BBLR	1200 - 2350	g	49	Normal	46 - 51.9	c	-1.93	Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2	Banyak	4	Jauh	M	7-Jan-21	28	24 - 35	bulan	Perempuan	82.4	71 - 82.9	cm	10.6	5 - 15.9	kg	3535	Tidak BBLR	3501 - 4650	g	52	Normal	52 - 57.9	c	-2.09	Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1	Sedikit	0	Tidak ada jarak	MAF	22-Apr-21	25	24 - 35	bulan	Laki-laki	80.0	71 - 82.9	cm	11.0	5 - 15.9	kg	2800	Tidak BBLR	2351 - 3500	g	45.5	Pendek					

500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AHA	11-Dec-19	41 36 - 47 bulan	Laki-laki	90.9 83 - 94.9 cm	15.0 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.21 Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	2 Dekat	IA	28-Feb-22	14 12 - 23 bulan	Laki-laki	77.7 71 - 82.9 cm	9.7 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-0.29 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	KK	6-May-20	36 36 - 47 bulan	Perempuan	90.4 83 - 94.9 cm	13.0 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.8	Normal	46 - 51.9 c	-1.35 Normal	Tidak Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	6 Jauh	RAEH	20-Oct-21	19 12 - 23 bulan	Laki-laki	73.2 71 - 82.9 cm	8.9 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-3.47 Sangat Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MAG	6-Oct-21	19 12 - 23 bulan	Laki-laki	80.2 71 - 82.9 cm	10.0 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-1.09 Normal	Tidak Stunting
5000000	≥ 2.680.000	4,6 juta - 6,5 j	2 Banyak	5 Jauh	MBA	24-Jan-22	16 12 - 23 bulan	Laki-laki	73.7 71 - 82.9 cm	13.5 5 - 15.9 kg	3400 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 38.5	Pendek	34 - 39.9 c	-2.30 Pendek	Stunting
200000	< 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	HH	4-Nov-22	6 0 - 11 bulan	Perempuan	63.0 59 - 70.9 cm	6.3 5 - 15.9 kg	1900 BBLR	1200 - 2350 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-1.75 Normal	Tidak Stunting
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	5 Banyak	3 Jauh	MI	13-Mar-22	14 12 - 23 bulan	Laki-laki	91.5 83 - 94.9 cm	13.8 5 - 15.9 kg	3500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 51.5	Normal	46 - 51.9 c	5.38 Tinggi	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	4 Jauh	A	30-Dec-18	52 48 - 59 bulan	Perempuan	96.9 95 - 106.9 cm	15.0 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.94 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	7 Banyak	3 Jauh	R	23-Dec-20	29 24 - 35 bulan	Laki-laki	78.9 71 - 82.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	2600 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 44.7	Pendek	40 - 45.9 c	-3.70 Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	A	8-Feb-21	27 24 - 35 bulan	Perempuan	74.0 71 - 82.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 38	Pendek	34 - 39.9 c	-4.34 Sangat Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	NA	6-Jun-19	47 36 - 47 bulan	Perempuan	90.8 83 - 94.9 cm	12.2 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49.2	Normal	46 - 51.9 c	-2.75 Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	MA	3-Nov-22	6 0 - 11 bulan	Laki-laki	67.0 59 - 70.9 cm	7.1 5 - 15.9 kg	3497 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 51	Normal	46 - 51.9 c	-0.91 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	AR	22-Oct-18	55 48 - 59 bulan	Laki-laki	97.1 95 - 106.9 cm	14.0 5 - 15.9 kg	2500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-2.30 Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	11 Jauh	M	11-Aug-18	57 48 - 59 bulan	Perempuan	96.7 95 - 106.9 cm	12.2 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-2.45 Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	NP	13-Jan-20	40 36 - 47 bulan	Laki-laki	87.7 83 - 94.9 cm	13.0 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-2.88 Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	2 Dekat	MLA	11-Nov-22	6 0 - 11 bulan	Laki-laki	67.6 59 - 70.9 cm	7.3 5 - 15.9 kg	3490 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 51	Normal	46 - 51.9 c	-0.45 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	M	26-Aug-22	9 0 - 11 bulan	Perempuan	66.3 59 - 70.9 cm	6.3 5 - 15.9 kg	2500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 45	Pendek	40 - 45.9 c	-1.66 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	5 Jauh	H	9-Jan-22	16 12 - 23 bulan	Laki-laki	73.0 71 - 82.9 cm	8.4 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.75 Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	W	29-Sep-18	56 48 - 59 bulan	Laki-laki	102.2 95 - 106.9 cm	15.3 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 51	Normal	46 - 51.9 c	-1.24 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	W	25-May-21	24 24 - 35 bulan	Laki-laki	85.4 83 - 94.9 cm	10.4 5 - 15.9 kg	3050 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.5	Normal	46 - 51.9 c	-0.61 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	S	14-Aug-22	9 0 - 11 bulan	Perempuan	79.9 71 - 82.9 cm	8.2 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46.9	Normal	46 - 51.9 c	3.70 Tinggi	Tidak Stunting
4500000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MWS	3-Jan-22	16 12 - 23 bulan	Laki-laki	78.1 71 - 82.9 cm	9.5 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 51	Normal	46 - 51.9 c	-0.87 Normal	Tidak Stunting
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	HA	22-Sep-22	8 0 - 11 bulan	Perempuan	67.5 59 - 70.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46.5	Normal	46 - 51.9 c	-0.67 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	ANR	4-Aug-18	57 48 - 59 bulan	Perempuan	101.4 95 - 106.9 cm	15.0 5 - 15.9 kg	2400 BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-1.47 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	4 Jauh	IA	28-Jun-19	47 36 - 47 bulan	Perempuan	85.5 83 - 94.9 cm	9.5 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46	Normal	46 - 51.9 c	-3.91 Sangat Pendek	Stunting
5000000	≥ 2.680.000	4,6 juta - 6,5 j	2 Banyak	5 Jauh	MA	21-Apr-22	13 12 - 23 bulan	Laki-laki	73.0 71 - 82.9 cm	7.3 5 - 15.9 kg	2200 BBLR	1200 - 2350 g 46	Pendek	46 - 51.9 c	-1.46 Normal	Tidak Stunting
3000000	≥ 2.680.000	2,6 juta - 4,5 j	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MNM	28-Apr-22	13 12 - 23 bulan	Laki-laki	72.0 71 - 82.9 cm	7.5 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-1.77 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	M	26-Jun-22	11 0 - 11 bulan	Perempuan	76.9 71 - 82.9 cm	7.7 5 - 15.9 kg	2530 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46.6	Normal	46 - 51.9 c	1.56 Normal	Tidak Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	7 Jauh	NDK	29-May-22	12 12 - 23 bulan	Perempuan	69.5 59 - 70.9 cm	8.4 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-1.51 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MI	23-Jul-19	46 36 - 47 bulan	Laki-laki	91.5 83 - 94.9 cm	11.7 5 - 15.9 kg	3300 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.63 Pendek	Stunting
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	4 Jauh	MFAS	29-Aug-19	45 36 - 47 bulan	Laki-laki	92.5 83 - 94.9 cm	12.0 5 - 15.9 kg	3800 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-2.24 Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MH	6-Nov-20	30 24 - 35 bulan	Laki-laki	83.0 83 - 94.9 cm	9.9 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 49	Normal	46 - 51.9 c	-2.75 Pendek	Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MF	4-Jan-20	40 36 - 47 bulan	Laki-laki	94.8 83 - 94.9 cm	13.3 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.8	Normal	46 - 51.9 c	-1.11 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	5 Banyak	11 Jauh	R	8-Aug-20	33 24 - 35 bulan	Perempuan	88.8 83 - 94.9 cm	11.9 5 - 15.9 kg	3800 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 40.7	Pendek	40 - 45.9 c	-1.25 Normal	Tidak Stunting
2500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MAK	18-Nov-19	42 36 - 47 bulan	Laki-laki	100.5 95 - 106.9 cm	15.9 5 - 15.9 kg	3700 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 51	Normal	46 - 51.9 c	0.11 Normal	Tidak Stunting
2500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	2 Dekat	MHA	27-Feb-22	15 12 - 23 bulan	Laki-laki	74.3 71 - 82.9 cm	8.7 5 - 15.9 kg	3600 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.66 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	8 Jauh	H	24-Apr-22	13 12 - 23 bulan	Perempuan	71.5 71 - 82.9 cm	8.9 5 - 15.9 kg	2200 BBLR	1200 - 2350 g 45	Pendek	40 - 45.9 c	-1.24 Normal	Tidak Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	2 Dekat	NP	16-Apr-22	13 12 - 23 bulan	Laki-laki	70.8 59 - 70.9 cm	9.9 5 - 15.9 kg	3900 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.43 Pendek	Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	3 Jauh	SA	23-Aug-20	33 24 - 35 bulan	Perempuan	92.5 83 - 94.9 cm	11.2 5 - 15.9 kg	2900 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46	Normal	46 - 51.9 c	-0.16 Normal	Tidak Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MAK	4-Apr-21	25 24 - 35 bulan	Laki-laki	84.6 83 - 94.9 cm	8.5 5 - 15.9 kg	2700 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.29 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MY	13-Sep-21	20 12 - 23 bulan	Laki-laki	85.5 83 - 94.9 cm	10.5 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	0.52 Normal	Tidak Stunting
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	3 Jauh	MA	12-Apr-20	37 36 - 47 bulan	Laki-laki	87.0 83 - 94.9 cm	11.0 5 - 15.9 kg	3050 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-2.68 Pendek	Stunting
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	3 Jauh	AR	20-Apr-21	25 24 - 35 bulan	Laki-laki	86.0 83 - 94.9 cm	10.4 5 - 15.9 kg	3200 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50.6	Normal	46 - 51.9 c	-0.73 Normal	Tidak Stunting
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	7 Jauh	BR	23-May-18	59 48 - 59 bulan	Perempuan	92.5 83 - 94.9 cm	10.6 5 - 15.9 kg	2700 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 46	Normal	46 - 51.9 c	-3.58 Sangat Pendek	Stunting
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	4 Jauh	SAP	25-Sep-20	32 24 - 35 bulan	Perempuan	89.2 83 - 94.9 cm	12.0 5 - 15.9 kg	3800 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-0.86 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	R	14-Apr-21	25 24 - 35 bulan	Laki-laki	76.7 71 - 82.9 cm	10.0 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-3.73 Sangat Pendek	Stunting
2000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	2 Banyak	12 Jauh	MR	30-Apr-20	37 36 - 47 bulan	Laki-laki	88.9 83 - 94.9 cm	10.3 5 - 15.9 kg	2500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 45.8	Pendek	40 - 45.9 c	-2.09 Pendek	Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	NAU	29-Aug-21	21 12 - 23 bulan	Perempuan	77.6 71 - 82.9 cm	10.4 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.77 Normal	Tidak Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MA	17-Aug-22	9 0 - 11 bulan	Laki-laki	68.7 59 - 70.9 cm	8.9 5 - 15.9 kg	1900 BBLR	1200 - 2350 g 45	Pendek	40 - 45.9 c	-1.72 Normal	Tidak Stunting
700000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MZAF	17-Aug-22	9 0 - 11 bulan	Laki-laki	70.2 59 - 70.9 cm	9.0 5 - 15.9 kg	2300 BBLR	1200 - 2350 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-1.05 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	2 Dekat	MR	27-May-22	12 12 - 23 bulan	Laki-laki	73.0 71 - 82.9 cm	8.2 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 50	Normal	46 - 51.9 c	-0.94 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	3 Banyak	2 Dekat	MF	7-Nov-19	42 36 - 47 bulan	Laki-laki	86.5 83 - 94.9 cm	12.5 5 - 15.9 kg	3100 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 47	Normal	46 - 51.9 c	-3.46 Sangat Pendek	Stunting
300000	< 2.680.000	< 500 ribu	4 Banyak	3 Jauh	MR	1-Oct-18	55 48 - 59 bulan	Laki-laki	95.3 95 - 106.9 cm	11.2 5 - 15.9 kg	2500 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-2.78 Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	H	10-Nov-22	6 0 - 11 bulan	Perempuan	64.3 59 - 70.9 cm	7.0 5 - 15.9 kg	3000 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	-1.08 Normal	Tidak Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	MR	21-Jun-20	35 24 - 35 bulan	Laki-laki	84.4 83 - 94.9 cm	10.2 5 - 15.9 kg	2800 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 43	Pendek	40 - 45.9 c	-3.06 Sangat Pendek	Stunting
500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	8 Jauh	N	7-Jan-22	16 12 - 23 bulan	Perempuan	80.0 71 - 82.9 cm	9.6 5 - 15.9 kg	2700 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48	Normal	46 - 51.9 c	0.45 Normal	Tidak Stunting
1000000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	1 Sedikit	0 Tidak ada jarak	AI	10-Aug-21	21 12 - 23 bulan	Laki-laki	81.1 71 - 82.9 cm	10.3 5 - 15.9 kg	3800 Tidak BBLR	3501 - 4650 g 52	Normal	52 - 57.9 c	-1.36 Normal	Tidak Stunting
1500000	< 2.680.000	500 ribu - 2,5	4 Banyak	8 Jauh	AA	17-Oct-21	19 12 - 23 bulan	Perempuan	73.2 71 - 82.9 cm	8.0 5 - 15.9 kg	2925 Tidak BBLR	2351 - 3500 g 48.3	Normal	46		













## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.616	11

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kapananakibumulaidisuisesaatsetelahdilahirkan	18.68	8.175	.320	.583
ApakahsebelumdisuipertamakaliatausebelumA Sikeluaranakdiberimin	19.57	9.228	.285	.597
ApakahsejakanakmendapatkanASIpertamakalimpausia6bulantidakper	18.14	6.307	.513	.521
Usiaanakliberhentimen dapatkanASI	20.16	8.044	.528	.544
WaktuMPASI	20.25	9.169	.365	.590
ApakahAnakbumendapatkanimunisasi	19.45	9.556	.276	.604
KategoriStatusImunisasi	19.86	9.376	.137	.617
ApakahanakAndamendapatkan dosis vitaminA	19.70	9.004	.294	.593
KategoriStatusVitaminA	19.75	8.983	.287	.593
ApakahAnakmemiliki riwayatpenyakitinfeksi	19.36	8.423	.185	.622
Berapalamadurasipenyakitinfeksiyangdialami oleh anakAnda	18.93	8.670	.134	.636

UNIVERSITY OF GUNUNG REJEN  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## B. Analisis Univariat

### Kategori Usia Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16 - 26 tahun	100	32.4	32.4	32.4
	27 - 37 tahun	169	54.7	54.7	87.1
	38 - 48 tahun	40	12.9	12.9	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Interval Tinggi Badan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	140 - 148.9 cm	89	28.8	28.8	28.8
	149 - 157.9 cm	191	61.8	61.8	90.6
	158 - 166.9 cm	29	9.4	9.4	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Tinggi Badan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	77	24.9	24.9	24.9
	Pendek	232	75.1	75.1	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Berat Badan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	34 - 50.9 kg	148	47.9	47.9	47.9
	51 - 67.9 kg	137	44.3	44.3	92.2
	68 - 84.9 kg	24	7.8	7.8	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Pekerjaan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tenaga Kesehatan	3	1.0	1.0	1.0
	Honoror Guru	11	3.6	3.6	4.5
	IRT	291	94.2	94.2	98.7
	Wiraswasta	2	.6	.6	99.4
	PNS	2	.6	.6	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Pendidikan Terakhir Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak bersekolah	16	5.2	5.2	5.2
	Tamat SD/ MI	151	48.9	48.9	54.0
	Tamat SMP/ MTs	55	17.8	17.8	71.8
	Tamat SMA/ MA	54	17.5	17.5	89.3
	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	33	10.7	10.7	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Usia Ibu Menikah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 19 tahun	99	32.0	32.0	32.0
	≥ 19 tahun	210	68.0	68.0	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Usia Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 31 tahun	130	42.1	42.1	42.1
	32 - 43 tahun	140	45.3	45.3	87.4
	44 - 55 tahun	35	11.3	11.3	98.7
	56 - 67 tahun	4	1.3	1.3	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Interval Tinggi Badan Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	158 - 164.9 cm	232	75.1	75.1	75.1
	165 - 171.9 cm	77	24.9	24.9	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Tinggi Badan Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	59	19.1	19.1	19.1
	Pendek	250	80.9	80.9	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Berat Badan Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	46 - 58.9 kg	168	54.4	54.4	54.4
	59 - 71.9 kg	136	44.0	44.0	98.4
	72 - 84.9 kg	5	1.6	1.6	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Pekerjaan Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Petani	176	57.0	57.0	57.0
	Pelaut	1	.3	.3	57.3
	Nelayan	9	2.9	2.9	60.2
	Honoror Guru	8	2.6	2.6	62.8
	Buruh	26	8.4	8.4	71.2
	Wiraswasta	79	25.6	25.6	96.8
	PNS	3	1.0	1.0	97.7
	Aparat Desa	1	.3	.3	98.1
	Sopir	5	1.6	1.6	99.7
	Operator	1	.3	.3	100.0
		Total	309	100.0	100.0

### Pendidikan Terakhir Ayah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak bersekolah	19	6.1	6.1	6.1
	Tamat SD/ MI	169	54.7	54.7	60.8
	Tamat SMP/ MTs	34	11.0	11.0	71.8
	Tamat SMA/ MA	62	20.1	20.1	91.9
	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	25	8.1	8.1	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Usia Ayah Menikah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 19 tahun	31	10.0	10.0	10.0
	≥ 19 tahun	278	90.0	90.0	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Interval Pendapatan Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 500 ribu	60	19.4	19.4	19.4
	500 ribu - 2,5 juta	225	72.8	72.8	92.2
	2,6 juta - 4,5 juta	20	6.5	6.5	98.7
	4,6 juta - 6,5 juta	4	1.3	1.3	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Pendapatan Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 2.680.000	286	92.6	92.6	92.6
	≥ 2.680.000	23	7.4	7.4	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Interval Jumlah Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2	213	68.9	68.9	68.9
	3-4	72	23.3	23.3	92.2
	5-6	23	7.4	7.4	99.7
	7-8	1	.3	.3	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Jumlah Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sedikit	115	37.2	37.2	37.2
	Banyak	194	62.8	62.8	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Interval Jumlah Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2	213	68.9	68.9	68.9
	3-4	72	23.3	23.3	92.2
	5-6	23	7.4	7.4	99.7
	7-8	1	.3	.3	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Jarak Kelahiran Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada jarak	115	37.2	37.2	37.2
	Dekat	55	17.8	17.8	55.0
	Jauh	139	45.0	45.0	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Usia Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 - 11 bulan	61	19.7	19.7	19.7
	12 - 23 bulan	92	29.8	29.8	49.5
	24 - 35 bulan	68	22.0	22.0	71.5
	36 - 47 bulan	44	14.2	14.2	85.8
	48 - 59 bulan	44	14.2	14.2	100.0
	Total		309	100.0	100.0

### Jenis Kelamin Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	157	50.8	50.8	50.8
	Perempuan	152	49.2	49.2	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Tinggi Badan Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	59 - 70.9 cm	57	18.4	18.4	18.4
	71 - 82.9 cm	118	38.2	38.2	56.6
	83 - 94.9 cm	97	31.4	31.4	88.0
	95 - 106.9 cm	37	12.0	12.0	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Berat Badan Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5 - 15.9 kg	301	97.4	97.4	97.4
	16 - 26.9 kg	8	2.6	2.6	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Interval Berat Badan Lahir Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1200 - 2350 gram	19	6.1	6.1	6.1
	2351 - 3500 gram	258	83.5	83.5	89.6
	3501 - 4650 gram	32	10.4	10.4	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Berat Badan Lahir Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak BBLR	280	90.6	90.6	90.6
	BBLR	29	9.4	9.4	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Interval Panjang Badan Lahir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	34 - 39.9 cm	5	1.6	1.6	1.6
	40 - 45.9 cm	30	9.7	9.7	11.3
	46 - 51.9 cm	266	86.1	86.1	97.4
	52 - 57.9 cm	8	2.6	2.6	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Panjang Badan Lahir Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendek	43	13.9	13.9	13.9
	Normal	266	86.1	86.1	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Z Score

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Pendek	53	17.2	17.2	17.2
	Pendek	94	30.4	30.4	47.6
	Normal	158	51.1	51.1	98.7
	Tinggi	4	1.3	1.3	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Status Stunting

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Stunting	162	52.4	52.4	52.4
	Stunting	147	47.6	47.6	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kapan anak Ibu mulai disusui sesaat setelah dilahirkan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 jam	102	33.0	33.0	33.0
	< 24 jam	158	51.1	51.1	84.1
	> 24 jam	29	9.4	9.4	93.5
	Tidak pernah ASI	20	6.5	6.5	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### Kategori ASI Eksklusif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ASI Eksklusif	237	76.7	76.7	76.7
	Tidak ASI Eksklusif	72	23.3	23.3	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Usia Anak pertama kali mendapatkan MP-ASI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	MP-ASI Tepat Waktu	297	96.1	96.1	96.1
	MP-ASI Dini	12	3.9	3.9	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Apakah Anak Ibu mendapatkan imunisasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	290	93.9	93.9	93.9
	Tidak	19	6.1	6.1	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Status Imunisasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lengkap	96	31.1	33.1	33.1
	Tidak Lengkap	194	62.8	66.9	100.0
	Total	290	93.9	100.0	
Missing	System	19	6.1		
Total		309	100.0		

### Apakah anak Anda mendapatkan dosis vitamin A?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	244	79.0	79.0	79.0
	Tidak	65	21.0	21.0	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Kategori Status Vitamin A

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lengkap	132	42.7	54.1	54.1
	Tidak Lengkap	112	36.2	45.9	100.0
	Total	244	79.0	100.0	
Missing	System	65	21.0		
Total		309	100.0		

### Apakah Anak pernah mengalami penyakit infeksi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	137	44.3	44.3	44.3
	Ya	172	55.7	55.7	100.0
	Total	309	100.0	100.0	

### Diare

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	31	10.0	17.6	17.6
	Ya	145	46.9	82.4	100.0
	Total	176	57.0	100.0	
Missing	System	133	43.0		
Total		309	100.0		

### Cacingan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	116	37.5	65.9	65.9
	Ya	60	19.4	34.1	100.0
	Total	176	57.0	100.0	
Missing	System	133	43.0		
Total		309	100.0		

**Berapa lama durasi penyakit infeksi yang dialami oleh anak Anda?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 3 hari sembuh	172	55.7	97.7	97.7
	≥ 3 hari sembuh	4	1.3	2.3	100.0
	Total	176	57.0	100.0	
Missing	System	133	43.0		
Total		309	100.0		

**Dimana biasanya anak Anda melakukan pengobatan ketika menderita penyakit infeksi?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pengobatan sendiri (di rumah)	92	29.8	52.3	52.3
	Berobat di Puskesmas/ RS/ pelayanan kesehatan lainnya	84	27.2	47.7	100.0
	Total	176	57.0	100.0	
Missing	System	133	43.0		
Total		309	100.0		

### C. Analisis Bivariat

#### Crosstab

			Status Stunting Anak		Total
			Stunting	Tidak Stunting	
Kategori Tinggi Badan Ibu	Pendek	Count	114	118	232
		% within Kategori Tinggi Badan Ibu	49.1%	50.9%	100.0%
	Normal	Count	33	44	77
		% within Kategori Tinggi Badan Ibu	42.9%	57.1%	100.0%
Total		Count	147	162	309
		% within Kategori Tinggi Badan Ibu	47.6%	52.4%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.914 <sup>a</sup>	1	.339		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.680	1	.410		
Likelihood Ratio	.917	1	.338		
Fisher's Exact Test				.359	.205
Linear-by-Linear Association	.911	1	.340		
N of Valid Cases	309				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36.63.

b. Computed only for a 2x2 table

#### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Tinggi Badan Ibu (Pendek / Normal)	1.288	.766	2.166
For cohort Status Stunting Anak = Stunting	1.147	.859	1.531
For cohort Status Stunting Anak = Tidak Stunting	.890	.706	1.122
N of Valid Cases	309		

### Crosstab

			Status Stunting		Total
			Tidak Stunting	Stunting	
Kategori Tinggi Badan Ayah	Normal	Count	40	19	59
		% within Kategori Tinggi Badan Ayah	67.8%	32.2%	100.0%
	Pendek	Count	122	128	250
		% within Kategori Tinggi Badan Ayah	48.8%	51.2%	100.0%
Total	Count	162	147	309	
	% within Kategori Tinggi Badan Ayah	52.4%	47.6%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.907 <sup>a</sup>	1	.009		
Continuity Correction <sup>b</sup>	6.166	1	.013		
Likelihood Ratio	7.057	1	.008		
Fisher's Exact Test				.009	.006
Linear-by-Linear Association	6.884	1	.009		
N of Valid Cases	309				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28.07.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Tinggi Badan Ayah (Normal / Pendek)	2.209	1.213	4.024
For cohort Status Stunting = Tidak Stunting	1.389	1.118	1.726
For cohort Status Stunting = Stunting	.629	.426	.929
N of Valid Cases	309		

### Crosstab

			Status Stunting Anak		Total
			Stunting	Tidak Stunting	
Kategori Berat Badan Lahir Anak	BBLR	Count	13	16	29
		% within Kategori Berat Badan Lahir Anak	44.8%	55.2%	100.0%
	Tidak BBLR	Count	134	146	280
		% within Kategori Berat Badan Lahir Anak	47.9%	52.1%	100.0%
Total	Count	147	162	309	
	% within Kategori Berat Badan Lahir Anak	47.6%	52.4%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.097 <sup>a</sup>	1	.756		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.013	1	.908		
Likelihood Ratio	.097	1	.756		
Fisher's Exact Test				.846	.455
Linear-by-Linear Association	.096	1	.756		
N of Valid Cases	309				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.80.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Berat Badan Lahir Anak (BBLR / Tidak BBLR)	.885	.411	1.909
For cohort Status Stunting Anak = Stunting	.937	.614	1.428
For cohort Status Stunting Anak = Tidak Stunting	1.058	.748	1.497
N of Valid Cases	309		

### Kategori Panjang Badan Lahir Anak \* Status Stunting Crosstabulation

			Status Stunting		Total
			Tidak Stunting	Stunting	
Kategori Panjang Badan Lahir Anak	Pendek	Count	16	27	43
		% within Kategori Panjang Badan Lahir Anak	37.2%	62.8%	100.0%
	Normal	Count	146	120	266
		% within Kategori Panjang Badan Lahir Anak	54.9%	45.1%	100.0%
Total	Count	162	147	309	
	% within Kategori Panjang Badan Lahir Anak	52.4%	47.6%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.638 <sup>a</sup>	1	.031		
Continuity Correction <sup>b</sup>	3.956	1	.047		
Likelihood Ratio	4.662	1	.031		
Fisher's Exact Test				.034	.023
Linear-by-Linear Association	4.623	1	.032		
N of Valid Cases	309				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.46.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Panjang Badan Lahir Anak (Pendek / Normal)	.487	.251	.946
For cohort Status Stunting = Tidak Stunting	.678	.453	1.015
For cohort Status Stunting = Stunting	1.392	1.067	1.815
N of Valid Cases	309		

### Crosstab

		Status Stunting		Total	
		Tidak Stunting	Stunting		
Kategori ASI Eksklusif	ASI Eksklusif	Count	116	121	237
		% within Kategori ASI Eksklusif	48.9%	51.1%	100.0%
	Tidak ASI Eksklusif	Count	46	26	72
		% within Kategori ASI Eksklusif	63.9%	36.1%	100.0%
Total		Count	162	147	309
		% within Kategori ASI Eksklusif	52.4%	47.6%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.945 <sup>a</sup>	1	.026		
Continuity Correction <sup>b</sup>	4.364	1	.037		
Likelihood Ratio	5.006	1	.025		
Fisher's Exact Test				.031	.018
Linear-by-Linear Association	4.929	1	.026		
N of Valid Cases	309				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.25.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori ASI Eksklusif (ASI Eksklusif / Tidak ASI Eksklusif)	.542	.314	.934
For cohort Status Stunting = Tidak Stunting	.766	.617	.952
For cohort Status Stunting = Stunting	1.414	1.015	1.970
N of Valid Cases	309		

### Crosstab

		Status Stunting Anak			
		Stunting	Tidak Stunting	Total	
Kategori MP-ASI	MP-ASI Dini	Count	4	8	12
		% within Kategori MP-ASI	33.3%	66.7%	100.0%
	MP-ASI Tepat Waktu	Count	143	154	297
		% within Kategori MP-ASI	48.1%	51.9%	100.0%
Total		Count	147	162	309
		% within Kategori MP-ASI	47.6%	52.4%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.015 <sup>a</sup>	1	.314		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.508	1	.476		
Likelihood Ratio	1.038	1	.308		
Fisher's Exact Test				.385	.240
Linear-by-Linear Association	1.012	1	.314		
N of Valid Cases	309				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.71.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori MP-ASI (MP-ASI Dini / MP-ASI Tepat Waktu)	.538	.159	1.827
For cohort Status Stunting Anak = Stunting	.692	.308	1.554
For cohort Status Stunting Anak = Tidak Stunting	1.286	.849	1.947
N of Valid Cases	309		

### Crosstab

			Status Stunting Anak		Total
			Stunting	Tidak Stunting	
Kategori Status Imunisasi	Tidak Lengkap	Count	95	99	194
		% within Kategori Status Imunisasi	49.0%	51.0%	100.0%
	Lengkap	Count	43	53	96
		% within Kategori Status Imunisasi	44.8%	55.2%	100.0%
Total	Count	138	152	290	
	% within Kategori Status Imunisasi	47.6%	52.4%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.449 <sup>a</sup>	1	.503		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.297	1	.585		
Likelihood Ratio	.450	1	.502		
Fisher's Exact Test				.534	.293
Linear-by-Linear Association	.448	1	.503		
N of Valid Cases	290				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.68.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Status Imunisasi (Tidak Lengkap / Lengkap)	1.183	.724	1.933
For cohort Status Stunting Anak = Stunting	1.093	.839	1.424
For cohort Status Stunting Anak = Tidak Stunting	.924	.737	1.160
N of Valid Cases	290		

### Crosstab

			Status Stunting Anak		Total
			Stunting	Tidak Stunting	
Kategori Status Pemberian Vitamin A	Tidak Lengkap	Count	64	48	112
		% within Kategori Status Pemberian Vitamin A	57.1%	42.9%	100.0%
	Lengkap	Count	62	70	132
		% within Kategori Status Pemberian Vitamin A	47.0%	53.0%	100.0%
Total	Count	126	118	244	
	% within Kategori Status Pemberian Vitamin A	51.6%	48.4%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.511 <sup>a</sup>	1	.113		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.120	1	.145		
Likelihood Ratio	2.516	1	.113		
Fisher's Exact Test				.124	.073
Linear-by-Linear Association	2.501	1	.114		
N of Valid Cases	244				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54.16.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Status Pemberian Vitamin A (Tidak Lengkap / Lengkap)	1.505	.907	2.499
For cohort Status Stunting Anak = Stunting	1.217	.955	1.550
For cohort Status Stunting Anak = Tidak Stunting	.808	.619	1.056
N of Valid Cases	244		

### Crosstab

			Status Stunting Anak		Total
			Stunting	Tidak Stunting	
Apakah Anak pernah mengalami penyakit infeksi?	Ya	Count	98	78	176
		% within Apakah Anak pernah mengalami penyakit infeksi?	55.7%	44.3%	100.0%
	Tidak	Count	49	84	133
		% within Apakah Anak pernah mengalami penyakit infeksi?	36.8%	63.2%	100.0%
Total		Count	147	162	309
		% within Apakah Anak pernah mengalami penyakit infeksi?	47.6%	52.4%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.781 <sup>a</sup>	1	.001		
Continuity Correction <sup>b</sup>	10.038	1	.002		
Likelihood Ratio	10.869	1	.001		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	10.746	1	.001		
N of Valid Cases	309				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 63.27.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Apakah Anak pernah mengalami penyakit infeksi? (Ya / Tidak)	2.154	1.358	3.415
For cohort Status Stunting Anak = Stunting	1.511	1.167	1.957
For cohort Status Stunting Anak = Tidak Stunting	.702	.569	.866
N of Valid Cases	309		

## D. Analisis Multivariat

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup>	Kategori Tinggi Badan Ayah	.865	.345	6.273	1	.012	2.375	1.207	4.673
	Kategori Berat Badan Lahir Anak	.500	.582	.736	1	.391	1.648	.526	5.159
	Kategori Panjang Badan Lahir Anak	-.535	.449	1.419	1	.234	.586	.243	1.412
	Apakah Anak pernah mengalami penyakit infeksi?	.453	.281	2.589	1	.108	1.573	.906	2.731
	Kategori Status Pemberian Vitamin A	.186	.276	.452	1	.501	1.204	.700	2.070
	ASI_usia2	-1.205	.457	6.948	1	.008	.300	.122	.734
	Constant	-.425	.570	.556	1	.456	.654		

a. Variable(s) entered on step 1: Kategori Tinggi Badan Ayah, Kategori Berat Badan Lahir Anak, Kategori Panjang Badan Lahir Anak, Apakah Anak pernah mengalami penyakit infeksi?, Kategori Status Pemberian Vitamin A, ASI\_usia2.



## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Afifah Cahya Imani Arifin, lahir di Palembang pada tanggal 14 April 2000. Anak keempat dari pasangan H. Arifin Mallongi (Alm) dan Hj. Ida Farida. Penulis memulai pendidikan formal di TK Kartika II-2 Palembang pada tahun 2004 – 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Inpres 6/ 75 Tellu Boccoe Kabupaten Bone pada tahun 2006 – 2012. Setelah tamat SD, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Mare pada tahun 2012 – 2013 dan berpindah sekolah di SMP Negeri 19 Makassar pada tahun 2014 – 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas di SMA Negeri 10 Makassar pada tahun 2015 – 2018. Setelah itu, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Epidemiologi pada tahun 2018 – 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R