

**Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Hasil Partisi Jamur Tiram Putih
(*Pleurotus ostreatus*) menggunakan metode DPPH (*1,1-Difenyl-2-
pikrilhidrazyl*)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi

Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

AMALIANUR NAWAWI

NIM : 70100119033

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalianur Nawawi
Nim : 70100119033
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone, 15 November 2001
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Batu Tambung, Perm.Villa Sudiang Sejahtera Blok C5/65
Judul : Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Hasil Partisi Jamur
Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) menggunakan metode
DPPH (*1,1-Difenyl-2-pikrilhidrazyl*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 30 Januari 2024
Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
AMALIANUR NAWAWI
NIM.70100119033

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman dan nikmat Kesehatan serta Rahmat-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul **“Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Hasil Partisi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) menggunakan metode DPPH (1,1-Difenyl-2-pikrilhidrazyl)”** dapat diselesaikan. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Rosulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga yang suci, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana farmasi (S.Farm) pada Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

Tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta bapak Muh.Nawawi (alm) dan ibu Kartini H yang telah merawat dan mendidik penulis hingga saat ini, memberikan limpahan kasih sayang, dorongan semangat, dukungan moril maupun materil, dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Saudara-saudara kami yang telah membantu memberikan masukan yang bermanfaat serta menyemangati dan mendoakan kelancaran skripsi penulis.

Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan serta motivasi yang telah penulis peroleh selama proses pembuatan skripsi ini, antara lain kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhanis MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Andi Aderus, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Muhammad Amry, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp.OG., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Isriyani Ismail, S.Si., M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Fais Satrianegara, SKM., Mars, selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Patimah, S.kep., Ns., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi dan Ibu apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Ibu apt. Surya Ningsih, S.Si, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dan membimbing selama proses perkuliahan penulis.
10. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si selaku pembimbing pertama dan apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan, bantuan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Ibu Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan arahnya dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
12. Ibu Dr. Asriyah, M.Pd.I selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan kontribusi berupa saran dan arahnya dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu dosen, serta jajaran pegawai di Prodi Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menghujani kita dengan Rahmat-Nya segala amal kebaikan kita. Akhir kata, kami berharap semoga skripsi ini dapat membantu memajukan penelitian, khususnya ilmu kefarmasian. Skripsi ini dapat diperbaiki dengan saran dan kritik yang bijak.

Gowa, 30 Januari 2024
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Amalianur Nawawi
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Definisi Operasional.....	2
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
E. Kajian Pustaka.....	3
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Uraian Tanaman jamur tiram putih.....	6
B. Antioksidan.....	12
C. Simplisia.....	21
D. Metode preparasi sampel.....	22
E. Tinjauan Islam.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sampel Penelitian.....	37
D. Instrumen penelitian.....	37
E. Prosedur Kerja.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41

B. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	61
RIWAYAT HIDUP PENULIS	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Ekstrak Partisi N-heksan Jamur Tiram Putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	41
Tabel 2. Hasil Ekstrak Partisi Aquadest Jamur Tiram Putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>).....	41
Tabel 3. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Fraksi Jamur Tiram Putih (<i>Pleurotus ostreatus</i>)	41
Tabel 4. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin C.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Jamur	7
Gambar 2. Tumbuhan Jamur Tiram Putih	8
Gambar 3. Reaksi Penetralan DPPH	17
Gambar 4. Struktur ABTS	18
Gambar 5. Reaksi Metode FRAP	19
Gambar 6. Reaksi Metode CUPRAC	21
Gambar 7. Prinsip Kerja spektrofotometri Uv-Vis	29
Gambar 8. Komponen dasar Spektrofotometer FTIR	32
Gambar 9. Kurva standar ekstrak n-heksan pada panjang gelombang 497 nm	46
Gambar 10. Kurva standar ekstrak n-heksan pada panjang gelombang 517nm	46
Gambar 11. Kurva standar ekstrak n-heksan pada panjang gelombang 527nm	47
Gambar 12. Kurva standar ekstrak aquadest pada panjang gelombang 497nm	47
Gambar 13. Kurva standar ekstrak aquadest pada panjang gelombang 517 nm	48
Gambar 14. Kurva standar ekstrak aquadest pada panjang gelombang 527nm	48
Gambar 15. Kurva standar Vitamin C pada panjang gelombang 497 nm	49
Gambar 16. Kurva standar Vitamin C pada panjang gelombang 517 nm	49
Gambar 17. Kurva standar Vitamin C pada panjang gelombang 527 nm	50
Gambar 18. Sampel jamur tiram putih	71
Gambar 19. Ekstrak sampel metode maserasi	72
Gambar 20. Proses evaporasi menggunakan alat rotary evaporator	72
Gambar 21. Partisi ekstrak metanol dan n-heksan	72
Gambar 22. Partisi ekstrak aquadest dan etil asetat	73
Gambar 23. Analisis aktivitas antioksidan pada ekstrak vitamin	73
Gambar 24. Proses analisis sampel uji dengan spektrofotometer Uv-vis	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan alur penelitian	61
Lampiran 2. Uji aktivitas antioksidan	61
Lampiran 3. Pembuatan larutan	62
Lampiran 4. Perhitungan rendemen ekstrak	64
Lampiran 5. Perhitungan persen inhibisi	64
Lampiran 6. Perhitungan nilai IC50	69
Lampiran 7. Gambar penelitian	71



ABSTRAK

Nama : Amalianur Nawawi
NIM : 70100119033
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Larut N-heksan dan Ekstrak Larut Aquades Pada Jamur Tiram Putih Menggunakan Metode DPPH

Penelitian ini berjudul berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Larut N-heksan dan Ekstrak Larut Aquades Pada Jamur Tiram Putih Menggunakan Metode DPPH” merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan menentukan nilai IC_{50} dari ekstrak hasil partisi Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) terhadap radikal bebas DPPH. Pada penentuan aktivitas antioksidan dengan menggunakan larutan DPPH (1-1 diphenyl-2-picrylhydrazyl) serta di ukur absorbansinya pada panjang gelombang 497nm, 517 nm, 527 nm. Pengukuran kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH ditandai dengan perubahan warna setelah inkubasi. Proses inkubasi dilakukan selama 30 menit, yang bertujuan untuk mempercepat reaksi antara menunjukkan bahwa ekstrak fraksi N-heksan memiliki pada panjang gelombang 497 nm memiliki nilai IC_{50} (6,89), panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC_{50} (6,70), panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC_{50} (6,35) dan ekstrak fraksi Aquadest pada panjang gelombang 497 nm memiliki nilai IC_{50} (1,082), panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC_{50} (1,208), dan panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC_{50} (880,09).

Kata Kunci : DPPH, antioksidan, spektrofotometer UV-Vis, Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)

ABSTRACT

Name : Amalianur Nawawi
NIM : 70100119033
Department : Pharmacy
Title : Antioxidant Activity Test of N-hexane Soluble Extract and Soluble Extract Aquades on White Oyster Mushrooms Using the DPPH Method

This research entitled "Testing the Antioxidant Activity of N-hexane Soluble Extracts and Aquades Soluble Extracts on White Oyster Mushrooms Using the DPPH Method" is a research conducted with the aim of knowing the antioxidant activity and determining the IC_{50} value of the partitioned extract of White Oyster Mushrooms (*Pleurotus ostreatus*) against DPPH free radicals. In determining antioxidant activity using DPPH (1-1 diphenyl-2-picrylhydrazyl) solution and measuring the absorbance at wavelengths of 497nm, 517nm, 527nm. Measurement of antioxidant capacity using the DPPH method is characterized by color changes after incubation. The incubation process was carried out for 30 minutes, which aims to speed up the reaction between showing that the N-hexane fraction extract has a wavelength of 497 nm has an IC_{50} value (6.890), a wavelength of 517 nm has an IC_{50} value (6.702), a wavelength of 527 nm has IC_{50} value (6.358) and the Aquadest fraction extract at a wavelength of 497 nm has an IC_{50} value (1.082), a wavelength of 517 nm has an IC_{50} value of (1.208), and a wavelength of 527 nm has an IC_{50} value (880.096).

Keywords: DPPH, antioxidant, UV-Vis spectrophotometer, White Oyster Mushroom (*Pleurotus ostreatus*)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) termasuk yang terkenal serta banyak digemari oleh warga negara Indonesia dikarenakan rasanya yang lezat serta dipenuhi dengan nutrisi, banyak protein, serta lemak yang rendah. Jamur tiram tidak hanya dikenal sebagai jamur pangan yang lezat dan bergizi tinggi. Jamur tiram dikenal sebagai bahan nutraceutical karena bersifat antimikroba dan antioksidan. Terbukti pada penelitian (Saskiawan dan Hasanah, 2015) menunjukkan penghambatan terbaik pada 9.57 mm dan 8.55 mm melawan bakteri *Bacillus subtilis* dan *E. coli*. Selain itu, kemampuan antioksidan jamur tiram putih menunjukkan hal yang positif yaitu persentase sisa pemucat warna menggunakan pemucatan senyawa polisakarida yaitu 96.43% (Saskiawan dan Hasanah, 2015). Berdasarkan manfaatnya jamur tiram berpotensi sebagai sumber bahan alam (Egra, 2018). Dari hasil riset tercatat jika jamur tiram putih mempunyai protein 19-30%, karbohidrat 50-60%, serta memiliki beberapa asam amino, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B7, vitamin C, juga terdapat mineral (Sumarsih, 2015). Selain itu jamur tiram putih juga mempunyai metabolit sekunder yang bermanfaat untuk pengobatan (Patel dkk., 2012). Kandungan metabolit sekunder jamur tiram putih yaitu dari golongan senyawa polifenol, tanin, saponin, flavonoid, dan terpenoid yang berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, antitumor, antivirus, dan antikanker (Muthukumaran P dkk., 2014). Menurut Wahyudi dkk., tahun 2020 hasil skrining fitokimia jamur tiram putih diketahui positif mengandung flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Jamur tiram putih juga merupakan sumber utama dari ergothioneine (ERG) yakni thiol yang memiliki asam amino berfungsi sebagai antioksidan sebanyak 3.78 µg/g. Tidak hanya itu, isi dari total senyawa polifenol pada jamur tiram putih yaitu 0,71 mg/g dari berat kering. Hasil penelitian Dewi dkk., tahun 2018 menunjukkan kandungan flavonoid tertinggi sebesar 1,53 mg / g dengan nilai IC50 sebesar 14,66 mg/mL.

Jamur tiram memiliki sifat yang dapat menetralkan racun dan zat-zat radio aktif dalam tanah. Manfaat jamur tiram pada kesehatan, yaitu untuk mencegah berbagai macam penyakit, diantaranya mencegah diabetes melitus dan penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolesterol darah, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, mencegah penyakit tumor dan kanker, gondok, influenza, serta memperlancar buang air besar. Selain itu, jamur tiram dapat menghentikan perdarahan dan mempercepat pengeringan luka (Suharjo, 2015: 03).

Ciri-ciri jamur berbeda dengan organisme lainnya dalam struktur tubuh, pertumbuhan, dan reproduksinya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada bermacam-macam habitatnya dan dapat berasosiasi dengan banyak organisme lain.

Antioksidan merupakan salah satu cara dalam menghambat dan mencegah reaksi radikal bebas (Olajire dan Azeez, 2011). Secara biologis antioksidan merupakan senyawa yang mampu menangkap atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh dengan cara menyumbangkan satu elektron kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa tersebut dapat dihambat (Winarsi, 2007). mempunyai potensi sebagai antioksidan sehingga mempunyai kesempatan yang baik untuk dikembangkan sebagai pangan fungsional.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian terhadap tumbuhan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) untuk mengetahui apakah jamur tiram putih memiliki aktivitas antioksidan.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa nilai IC_{50} dari ekstrak n-heksan pada jamur tiram putih ?
2. Berapa nilai IC_{50} dari ekstrak aquades pada jamur tiram putih ?

C. Definisi Operasional

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Jamur tiram putih merupakan jenis jamur kayu, karena jamur tersebut tumbuh

pada media kayu lapuk. Jamur ini tumbuh di daerah subtropis, daerah beriklim sedang dan daerah tropis dengan lingkungan yang sesuai. Jamur tiram putih banyak digemari oleh masyarakat karena cita rasanya yang khas. Kandungan di dalam jamur tiram putih pun banyak yang bermanfaat bagi tubuh kita diantaranya protein, fosfor, lemak, besi riboflavin dan lovastatin (Indah, 2013).

- b. Antioksidan adalah zat yang menghambat proses oksidasi terhadap sistem atau penyusun utama sistem.
- c. Metanol merupakan senyawa polar yang disebut sebagai pelarut universal karena selain mampu mengekstrak komponen polar juga dapat mengekstrak komponen non-polar seperti lilin dan lemak (Houghton dan Raman 1998).
- d. DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang stabil sehingga apabila digunakan sebagai pereaksi dalam uji penangkapan radikal bebas cukup dilarutkan dan bila disimpan dalam keadaan kering dengan kondisi penyimpanan yang baik dan stabil selama bertahun-tahun (Dewi Trisantini, 2016).

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratoium murni untuk menganalisis kandungan senyawa fraksi aktif antioksidan pada jamur tiram putih (*Pleourotus ostreatus*).

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya dimana ini bertujuan untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, lalu dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

- a. Vritta Amroini Wahyudi., dkk. (2020). Berdasarkan skrining fitokimia, jamur tiram putih diketahui positif mengandung flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Ekstrak kasar memiliki absorbansi sebesar 0,669 pada 274 nm, fraksi kloroform memiliki absorbansi sebesar 0,827 pada 267 nm, dan isolat murni memiliki absorbansi sebesar 0,62 pada 282 nm.

Suatu spektrum dengan panjang gelombang maksimal > 210 nm menunjukkan adanya sistem terkonjugasi. Makin panjang sistem terkonjugasi, makin tidak aktif pada daerah UV 200-360 nm (UV) namun makin aktif pada daerah 360-729 nm (Visible) (Worsfold dkk, 2019).

- b. (Chirinang & Intarapichet, 2009). Metabolit primer jamur tiram antara lain polisakarida sebanyak 68,35%, protein sebanyak 20,82%, dan lipid sebanyak 0,56%. Jamur tiram putih juga diketahui memiliki sembilan asam amino esensial yaitu, histidin, leusin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, dan triptofan (Chirinang & Intarapichet, 2009).
 - c. (Patel & Goyal, 2012). Fitokimia pada jamur tiram putih (*P. ostreatus*) dapat diidentifikasi berdasarkan bobot molekulnya untuk mempermudah kajian penelitian. Fitokimia dari jamur tiram putih dengan bobot molekul tinggi mencakup golongan polisakarida seperti β -glukan, peptida, dan protein. Fitokimia jamur tiram putih dengan bobot molekul rendah yaitu terpenoid, lipid dan turunan asam esternya, serta polifenol.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, dkk., 2014) dengan judul “ Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga Dan Daun Patikala (*Etilingera elatior* (Jack) R.S.Sm) Menggunakan Metode DPPH” menyatakan tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur aktivitas radikal bebas dalam ekstrak metanol bunga dan daun patikala. Ekstraksi bunga dan daun menggunakan metode maserasi yaitu menggunakan metanol. Analisis kuantitatif senyawa kimia dengan eluen tertentu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) untuk menentukan kelompok senyawa aktif dalam ekstrak. Uji aktivitas antioksidan menggunakan perendaman DPPH yang diukur pada panjang gelombang 517 nm dan dibandingkan dengan kekuatan quersetin antioksidan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol di 1,935% untuk bungan dan 5,17 % untuk daun. Aktivitas

antioksidan ekstrak metanol bunga patikala memiliki aktivitas antioksidan rendah dengan nilai IC_{50} 101,84 $\mu\text{g/ml}$ dan metanol ekstrak daun patikala memiliki aktivitas antioksidan yang dibuat dengan nilai IC_{50} 30,65 $\mu\text{g/ml}$. Potensi ini lebih mudah dari nilai IC_{50} quersetin 5,35 $\mu\text{g/ml}$.

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui nilai IC_{50} dari ekstrak larut n-heksan pada jamur tiram putih
- b. Untuk mengetahui nilai IC_{50} dari ekstrak larut aquades pada jamur tiram putih

G. Manfaat Penelitian

1. Untuk Institusi Pendidikan

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh UIN Alauddin Makassar sebagai tambahan pengetahuan tentang aktivitas antioksidan pada jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).

2. Untuk Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini merupakan ilmu yang diperoleh selama kuliah serta dapat menambah wawasan mahasiswa tentang jamur tiram putih memiliki aktivitas antioksidan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

*A. Uraian Tanaman Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)*


Fungi adalah organisme eukariot yang mempunyai dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini mempunyai karakteristik tumbuhan. Namun demikian fungi secara fundamental dapat dibedakan dari tumbuhan karena tidak mempunyai klorofil. Dengan demikian mereka tidak mampu melakukan proses fotosintesis menghasilkan bahan organik dari karbondioksida dan air, sehingga mereka disebut organisme yang heterotrof. Sifat heterotrof ini mempunyai sifat sel hewan (Hafsan, 2011: 29).

Jamur adalah organisme eukariot yang tersusun dari kitin. Kitin adalah polisakarida yang juga terdapat pada kulit kepiting atau udang. Jamur tidak memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Beberapa jenis jamur memiliki zat warna. Contohnya *Amanita muscaria* memiliki tubuh buah berwarna merah. Jamur multiseluler memiliki sel-sel memanjang berupa benang-benang yang disebut hifa. Beberapa jenis jamur ada yang memiliki sekat atau septa didalam hifanya. Pada setiap septa tersebut terdapat lubang- lubang halus yang kemungkinan berlangsungnya aliran sitoplasma beserta materi lainnya dari sel satu ke sel berikutnya. Setiap bagian hifa yang bersekat merupakan satu sel utuh yang didalamnya terdapat satu atau beberapa inti. Pada umumnya, hifa jamur tidak bersekat. Di dalam hifa tersebut banyak inti (multinukleus) yang menyebar dalam sitoplasma (Nadyah, 2011).

Jamur tiram putih adalah salah satu jenis jamur dari filum Basidiomycota dan genus *pleurotus*. Jamur tiram memiliki nama latin yaitu *Pleurotus* yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *pleuron* yang berarti menyamping dan *ous* yang berarti telinga. Pemberian nama ini dikarenakan Jamur tiram putih memiliki tudung tubuh yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kerang (tiram) (Winarti, 2010).

Jamur tiram putih merupakan jenis jamur kayu. Dinamakan jamur kayu

karena jamur tiram putih hidup di permukaan batang pohon yang sudah melapuk atau batang pohon yang sudah ditebang. Selain dari batang pohon yang ditebang, jamur tiram juga bisa tumbuh pada serbuk gergaji, kayu lapuk, limbah jerami dan limbah kapas (Anwar, 2012).



Gambar 1. Struktur Jamur (Kalac, 2012).

1. Klasifikasi

Menurut Tjitrosoepomo (2012:10), taksonomi jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) dapat diketahui sebagai berikut:

Divisio : Thallophyta

Sub Divisio : fungi

Klasis : Basidiomycetes

Ordo : Agarica

Familia : Pleurotaceae

Genus : *Pleurotus*

Spesies : *Pleurotus ostreatus*



(Gambar A. Bagian Depan)



(Gambar B. Bagian Belakang)

Gambar 2. Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) (Susilawati,2010)

2. Morfologi Tumbuhan

Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh menyamping pada batang kayu lapuk. Kehidupan jamur mengambil makanan yang sudah dibuat oleh organism lain yang telah mati (saprofit), karena tidak memiliki klorofil. semua jenis saprofit khususnya yang tumbuh pada kayu dapat dengan mudah dibudidayakan, meskipun dari beberapa hal jamur sulit dipasarkan dalam jumlah besar karena sifatnya mudah lunak sehingga mudah rusak (Djarajah, 2001). Menurut (Gunawan, 2004), ciri-ciri jamur tiram adalah daging tebal. Berwarna putih, kokoh, tetapi lunak pada bagian yang berdekatan dengan tangkai, bau dan rasa tidak merangsang. Tangkai tidak ada atau jika ada biasanya pendek, kokoh, panjang 0,5-4,0 cm, gemuk, padat, kuat kering, umumnya berambut atau berbulu kapas paling sedikit di dasar. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit karang (tiram). Tubuh buah jamur memiliki tudung (pileus) dan tangkai (stipes atau stalk). Pileus berbentuk mirip cangkang tiram berukuran 5-15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan lunak. Sedangkan pertumbuhan tangkainya dapat pendek atau panjang (2-6 cm). Tangkai ini menyangga tudung lateral (dibagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah) Jamur tiram bersih (*Pleurotus florida* dan *Pleurotus ostreatus*) memiliki tudung berwarna putih susu atau putih kekuning-kuningan dengan garis tengah 3-14 cm (Djarajah, 2001)

3. Aspek Lingkungan dan Media Pertumbuhan Jamur Tiram Putih

Beberapa aspek lingkungan yang harus diperhatikan untuk menentukan keberhasilan dalam berbudidaya jamur tiram menurut Widyastuti dan Donowati (2008) antara lain tingkat keasaman, suhu udara dan cahaya.

1. Tingkat Keasaman (pH)

Tingkat keasaman media sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram. Apabila pH terlalu rendah atau terlalu tinggi maka pertumbuhan jamur akan terhambat. bahkan mungkin akan tumbuh jamur lain yang akan mengganggu pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Keasaman pH media perlu diatur antara pH 6 - 7 dengan menggunakan kapur (Kalsium karbonat).

2. Suhu Udara

Pada budidaya jamur tiram suhu udara memegang peranan yang penting untuk mendapatkan pertumbuhan badan buah yang optimal. Pada umumnya suhu yang optimal untuk pertumbuhan jamur tiram, dibedakan dalam dua fase yaitu fase inkubasi yang memerlukan suhu udara berkisar antara 22-28°C dengan kelembapan 60-70 % dan fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu udara antara 16-22°C.

3. Cahaya

Pertumbuhan miselium akan tumbuh dengan cepat dalam, keadaan gelap/tanpa sinar, Sebaiknya selama masa pertumbuhan miselium ditempatkan dalam ruangan yang gelap, tetapi pada masa pertumbuhan badan buah memerlukan adanya rangsangan sinar. Pada tempat yang sama sekali tidak ada cahaya badan buah tidak dapat tumbuh, oleh karena itu pada masa terbentuknya badan buah pada permukaan media harus mulai mendapat sinar dengan intensitas penyorotan 60 - 70 %. (Widyastuti dan Donowati, 2008)

Permukaan jamur tiram licin dan agak berminyak ketika lembab sedangkan bagian tepinya mulus agak bergelombang. Daging jamur cukup tebal, kokoh tapi lunak pada bagian yang berdekatan dengan tangkai. Jika sudah terlalu tua, daging buah menjadi alot dan keras. Spora berbentuk batang berukuran 8-11×3-4µm.

Miselium berwarna putih dan bisa tumbuh dengan cepat (Gunawan, 2004)

Jamur tiram memiliki inti plasma dan spora yang berbentuk sel – sel lepas atau bersambungan membentuk hifa dan miselium. Pada titik – titik pertemuan percabangan miselium akan terbentuk bintik kecil yang disebut pin head atau calon tubuh jamur yang akan berkembang menjadi tubuh buah jamur (Parjimo dan Agus, 2007).

Permukaan bawah tudung dari tubuh buah muda terdapat bilah-bilah (lamela). Lamela tubuh menurun dan melekat pada tangkai. Pada lamela terdapat sel-sel pembentuk spora (basidium) yang berisi basidiospora. Basidiospora biasanya dibentuk pada saat tubuh buah dewasa telah mengalami kematangan). Selama tepi tudung masih berlipat-lipat, tubuh buah dikatakan belum dewasa. Tepi tudung yang merengah penuh maka tubuh buah mencapai fase dewasa dan dapat dipanen. Tubuh buah yang matang biasanya rapuh dan spora dapat dilepaskan (Anonim, 2005).

Batang atau tangkai jamur tiram tidak tepat berada ditengah tudung, tetapi agak kepinggir. Tubuh buahnya membentuk rumpun yang memiliki banyak percabangan dan menyatu dalam satu media. Jika sudah tua, daging buahnya akan menjadi liat dan keras. Warna jamur yang disebut dengan oyster mushroom ini bermacam- macam, ada yang putih, abu-abu, coklat, dan merah Di Indonesia, jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah jamur tiram putih. (Parjimo dan Agus, 2007)

4. Kandungan kimia

Jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) atau dikenal juga sebagai oyster mushroom mudah tumbuh di daerah tropis dan subtropis serta mudah dibudidayakan (Chrinang P., 2009) Jamur tiram mengandung vitamin B, vitamin C dan karbohidrat seperti β - glukukan, monoterpenoid dan diterpenoid (Iwalokun B. A., 2007) Bagian tubuh jamur merupakan sumber potensial lignin dan fenol (Fountoulakis, 2007) Ada beberapa warna pada jenis jamur tiram ini antara lain putih , kuning , merah jambu coklat dan abu - abu (Jeong– H. K, 2009). namun yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya adalah jamur tiram putih karena rasanya yang enak, kandungan nutrisinya yang tinggi dan berkhasiat

untuk pengobatan penyakit (Tjokrokusumo, 2008)

Dari segi nutrisi , jamur tiram mengandung vitamin B1 (tiamin) 0,1 IU, B2 (Riboflavin) 2,04 mg, B3 (niasin) 54,30 mg, BS (Pantothenic acid) 12,30 mg, vitamin D 116 IU (Paul Stamets, 2005), asam - asam organik seperti asam askorbat (vitamin C) , asam malat dan asam fumarat, karbohidrat seperti β -glukan , protein seperti hidrofobin serta trace element seperti selenium (Iwalokun et al, 2007) Selain itu, jamur tiram diketahui mengandung γ -amino butyric acid (GABA) yang merupakan golongan asam amino berfungsi sebagai neurotransmitter serta mengandung 9 (sembilan) macam asam amino yaitu lisin, metionin, triptofan, treonin, valin, leusin, isoleusin, histidin dan fenilalanin (Chrinang P., 2009). Bagian tubuh jamur tiram juga dikenal kaya akan lignin dan senyawa fenol (Fountoulakis, 2007). Kandungan serat jamur tiram yang kaya chiton cukup baik untuk memperbaiki kinerja metabolisme tubuh (Alam, 2010) Di samping itu dengan kandungan lemak yang rendah jamur tiram dapat membantu mengurangi kadar lemak dalam darah

5. Manfaat Jamur Tiram Putih

Menurut Susiana (2010) manfaat dari jamur tiram antara lain :

1. Meningkatkan Sel Darah Merah (Eritrosit)

Kandungan zat besi dan niasin dalam jamur tiram sangat berguna dalam pembentukan sel-sel darah merah. Kita ketahui, sel-sel darah merah merupakan komponen terbesar dalam darah, jumlahnya 45-60% dari total volume darah.

2. Menurunkan Kolesterol

Jamur tiram juga mengandung serat tinggi, sehingga bermanfaat dalam menurunkan kepekatan lemak dalam darah, dan mengeluarkan kolesterol serta mencegah penyerapan berlebih dari makanan yang kita konsumsi.

3. Mengobati Kanker

Kandungan polisakarida dalam jamur tiram dipercaya mampu menekan pertumbuhan sel-sel kanker, khususnya kanker kolon. Setidaknya 28 penderita kanker membutuhkan jamur tiram sebesar 7 kg per minggu atau 1 kg per hari selama 6 bulan untuk pengobatan.

4. Tambahan Gizi untuk Ibu Hamil

Kandungan zat gizi penting lainnya dalam jamur tiram adalah asam folat. Asam folat diperlukan dalam sintesis timidin, yaitu salah satu bagian pembentukan DNA. Karena itu, agar kandungan asam folat didalam jamur tiram tidak rusak, jamur tiram tidak boleh dimasak dalam suhu tinggi.

B. Antioksidan

1. Definisi antioksidan

Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasi molekul yang dapat menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu senyawa atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Adanya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada disekitarnya. Radikal bebas sangat berbahaya dikarenakan tingginya reaktivitasnya yang mengakibatkan terbentuknya senyawa radikal baru. Bila senyawa radikal baru tersebut bertemu dengan molekul lain, maka akan terbentuk radikal baru lagi dan seterusnya hingga terjadi reaksi berantai (Rosawanti, Mulia, & Ardhany, 2018). Senyawa antioksidan akan mendonorkan satu elektronnya pada pada radikal bebas yang tidak stabil sehingga radikal bebas ini bisa dinetralkan dan tidak lagi mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017).

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi antioksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid (Pokorni, 2011). Zat anti oksidan adalah substansi yang dapat menetralsir atau menghancurkan radikal bebas.

Di dalam tubuh, peran antioksidan berperan sebagai pertahanan pertama tubuh terhadap radikal bebas. Kadar radikal bebas yang terus meningkat ditubuh didapatkan dari rokok, polusi, stress, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan berbagai kerusakan dalam tubuh dan memicu terjadinya penuaan dan penyakit degeneratif. Antioksidan akan mengontrol proses pembentukan dan reaksi dari radikal bebas sebelum radikal bebas menyerang sel supaya tidak

berlanjut. Beberapa contoh antioksidan adalah vitamin E (tokoferol) yang larut dalam lemak dan vitamin C (asam askorbat) yang larut dalam air (Devasagayam, 2004).

Radikal bebas merupakan jenis oksigen yang memiliki tingkat reaktif yang tinggi secara alami ada didalam tubuh sebagai hasil dari reaksi biokimia di dalam tubuh. Radikal bebas juga terdapat di lingkungan sekitar kita yang berasal dari asap tembakau, penguapan alkohol yang berlebihan, bahan pengawet dan pupuk, sinar ultra Violet, X-rays, dan ozon. Radikal bebas dapat merusak sel tubuh apabila dapat menyebabkan berkembangnya sel kanker, penyakit hati, arthritis, katarak, dan penyakit degenerative lainnya, bahkan juga mempercepat proses penuaan.



Radikal bebas dapat merusak membrane sel serta merusak dan merubah DNA. Merubah zat kimia dalam tubuh dapat meningkatkan resiko terkena kanker serta merusak dan menonaktifkan protein. Antioksidan membantu menghentikan proses perusakan sel dengan cara memberikan elektron kepada radikal bebas. Antioksidan akan menetralsisir radikal bebas sehingga tidak mempunyai kemampuan lagi mencuri elektron dari sel dan DNA. Proses yang terjadi sebenarnya sangat kompleks tapi secara sederhana dapat dilukiskan seperti itu.

Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi lemak. Untuk mempermudah pemahaman tentang mekanisme kerja antioksidan perlu dijelaskan lebih dahulu mekanisme oksidasi lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tiga tahap utama yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu suatu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari hilangnya satu atom hydrogen (reaksi 1). Pada tahap selanjutnya, yaitu propagasi, radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal pereoksi (reaksi 2). Radikal pereoksi lebih lanjut akan menyerang asam lemak menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak baru (reaksi 3) (Pokorni, 2011).





Hidroperoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida dan keton yang bertanggungjawab atas flavor makanan berlemak. Tanpa adanya antioksidan, reaksi oksidasi lemak akan mengalami terminasi melalui reaksi antar radikal bebas membentuk kompleks bukan radikal (reaksi 4)



Aktivitas antioksidan dapat diketahui dengan nilai IC_{50} , semakin rendah nilai IC_{50} maka aktivitas antioksidannya semakin tinggi (Rahmi, 2017).

2. Jenis-jenis antioksidan

Antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu antioksidan primer atau alami dan antioksidan sekunder atau sintetik.

a). Antioksidan primer atau alami, Antioksidan yang paling banyak terdapat dalam buah-buahan, sayuran, tanaman polong-polongan, biji-bijian, teh, rempah-rempah dan anggur (Horubala 1999; Borowska, 2003). Berikut adalah pengelompokan antioksidan primer (Hurrell, 2003)

1. Antioksidan mineral adalah kofaktor antioksidan enzim. Keberadaannya mempengaruhi metabolisme makromolekul kompleks seperti karbohidrat. Contoh: selenium, tembaga, besi, seng dan mangan.
2. Antioksidan vitamin, dibutuhkan untuk fungsi metabolisme tubuh. Contoh: vitamin C, vitamin E, vitamin B
3. Fitokimia adalah senyawa fenolik, yang bukan vitamin maupun mineral. Senyawa yang termasuk ke dalam golongan fitokimia adalah senyawa flavonoid. Flavonoid adalah senyawa fenolik yang memberi warna pada buah, biji-bijian, daun, bunga dan kulit. Sebagai contoh katekin adalah senyawa antioksidan paling aktif pada teh hijau dan hitam, karotenoid adalah zat warna dalam buah-buahan dan sayuran, β karoten terdapat pada wortel dapat dikonversi menjadi vitamin A,

likopen banyak terdapat dalam tomat dan zeaxantin banyak pada bayam.

b). Antioksidan sekunder atau sintetis

Senyawa antioksidan sintetis memiliki fungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai. Yang merupakan contoh antioksidan sintetis di antaranya Butylated hydroxyl anisole (BHA), Butylated hydroxytoluene (BHT), Propyl gallate (PG) dan metal chelating agent (EDTA), Tertiary butyl hydroquinone (TBHQ), Nordihydro guaretic acid (NDGA). Antioksidan yang utama pada saat ini digunakan dalam produk makanan adalah monohidroksi atau polihidroksi senyawa fenol dengan berbagai substituen pada cincin. Antioksidan fenolik sintesis yang diganti oleh alkil guna untuk meningkatkan kelarutannya dalam lemak dan minyak (Irianti, dkk., 2017)

Antioksidan sintetis utama digunakan dengan batas penggunaan yaitu 0,02% dari kandungan lemak atau minyak. Antioksidan untuk minyak nabati adalah TBHQ. BHA dan BHT cukup stabil terhadap panas dan sering digunakan untuk stabilisasi lemak dalam proses pemanggangan dan penggorengan suatu produk. Antioksidan BHA dan BHT jika digunakan dalam jangka panjang akan memberikan efek pada tubuh. Penggunaan BHT dan BHA sebagai antioksidan memiliki efek toksik yaitu dengan kandungan 1% BHT atau BHA dalam makanan akan menghasilkan penurunan berat badan dan pembengkakan berat pada organ hati dan otak (Irianti, dkk., 2017)

berikut adalah contoh antioksidan sintetis: Butylated hydroxyl anisole (BHA), Butylated hydroxytoluene (BHT), Propyl gallate (PG) dan metal chelating agent (EDTA), Tertiar butylhydroquinone (TBHQ), Nordihydro guaretic acid (NDGA) (Hamid, A. et al, 2010).

3. Mekanisme kerja antioksidan

Mekanisme kerja antioksidan terbagi atas tiga macam yaitu:

a. Antioksidan primer

Antioksidan primer yang mampu mengurangi dismutase (SOD), glutathion peroksidase dan katalase stabil. Misalnya superoksida yang dapat mengubah

radikal superoksida menjadi molekul dan mengubahnya menjadi produk yang lebih. (Rahmi, 2017).

b. Antioksidan air

Antioksidan air pembentukan radikal bebas baru dengan cara memutuskan reaksi berantai dan sekunder yang berperan mengikat radikal bebas dan mencegah penyebaran senyawa radikal. (Rahmi, 2017).

c. Antioksidan tersier

Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, misalnya memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. (Rahmi, 2017).

4. Uji Aktivitas Antioksidan

a. Metode DPPH

Metode yang umum untuk mengukur aktivitas antioksidan adalah dengan DPPH, DPPH adalah 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl. Pada metode ini antioksidan (AH) bereaksi dengan radikal bebas DPPH dengan cara mendonorkan atom hidrogen, menyebabkan terjadinya perubahan warna DPPH dari warna ungu menjadi kuning, intensitas warna diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm. Pada metode ini yang diukur adalah aktivitas penghambatan radikal bebas. (Molyneux,2003).


Metode DPPH memberikan informasi reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal stabil. DPPH memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna violet gelap (Sunarni, 2005). Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk skrining aktivitas penangkap radikal beberapa senyawa, selain itu metode ini terbukti akurat dan praktis (Prakash dkk., 2001). Uji peredaman warna radikal bebas DPPH merupakan uji untuk menentukan aktivitas antioksidan dalam sampel yang akan diujikan dengan melihat kemampuannya dalam menangkal radikal bebas DPPH. Sumber radikal bebas dari metode ini adalah senyawa 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil. Prinsip dari uji ini adalah adanya donasi atom hidrogen dari substansi yang diujikan kepada radikal DPPH menjadi senyawa non radikal

difenilpikrilhidrazin yang akan ditunjukkan oleh perubahan warna (Molyneux, 2004).

Perubahan warna yang akan terjadi adalah perubahan dari larutan yang berwarna ungu menjadi berwarna kuning (Pauly, 2001). Intensitas perubahan warna ini kemudian diukur pada spektrum absorpsi antara 515-520 nm pada larutan organik (metanol atau etanol) (Molyneux, 2004). Pemilihan penggunaan metanol yang bersifat lebih polar dibandingkan etanol sebagai pelarut diharapkan lebih dapat mempertahankan kestabilan DPPH.

Kelebihan dari metode DPPH adalah secara teknis simpel, dapat dikerjakan dengan cepat dan hanya membutuhkan spektrofotometer UV-Vis (Karadag,dkk. 2009). Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah radikal DPPH hanya dapat dilarutkan dalam media organik (terutama media alkoholik), tidak pada media aqueous sehingga membatasi kemampuannya dalam penentuan peran antioksidan hidrofilik. Penentuan aktivitas antioksidan berdasarkan perubahan absorbansi DPPH harus diperhatikan karena absorbansi radikal DPPH setelah bereaksi dengan antioksidan dapat berkurang oleh cahaya, oksigen dan tipe pelarut. Telah diketahui bahwa terjadi pengurangan kapasitas antioksidan ketika kadar air pelarut melebihi batas tertentu dikarenakan terkoagulasinya DPPH (Magalhaes dkk. 2008).

Aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus berikut ini.



Gambar 3. Reaksi penetralan DPPH (Molyneux, 2003)


Berdasarkan rumus tersebut, makin kecil nilai absorbansi maka semakin tinggi nilai aktivitas penangkapan radikal. Aktivitas antioksidan dinyatakan secara kuantitatif IC_{50} . IC_{50} adalah konsentrasi larutan uji yang memberikan

peredaman DPPH sebesar 50%.

b. Metode ABTS

Metode ini menggunakan prinsip inhibisi, yaitu sampel ditambahkan pada sistem penghasil radikal bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal bebas diukur untuk menentukan total kapasitas antioksidan dari sampel (Wang dkk. 2004). Metode TEAC menggunakan senyawa 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) sebagai sumber penghasil radikal bebas. Kelebihan metode ini dibandingkan metode DPPH adalah dapat digunakan di sistem larutan berbasis air maupun organik, mempunyai absorbansi spesifik pada panjang gelombang dari region visible, dan membutuhkan waktu reaksi yang lebih sedikit (Lee dkk.2003). Selain itu, kelebihan metode ABTS dibandingkan dengan metode DPPH adalah tidak adanya intervensi warna saat mengukur sampel berantosianin (Teow dkk. 2007). Menurut MacDonald Wicks dkk. (2006) dalam Karadag dkk. (2009), kelemahan dari metode ini adalah radikal ABTS yang digunakan pada metode TEAC tidak ditemukan dan tidak serupa dalam sistem biologis (Moch. Amin Thohari, 2015).

Prinsip pada pengujian dengan metode ABTS yaitu penghilangan warna kation ABTS untuk mengukur kapasitas antioksidan yang langsung bereaksi dengan radikal kation ABTS. ABTS merupakan suatu radikal dengan pusat nitrogen yang memiliki karakteristik warna biru-hijau, yang apabila tereduksi oleh antioksidan akan berubah warna menjadi tidak berwarna. Metode ABTS sangat sensitif dengan cahaya, bahkan pembentukan ABTS, serta memerlukan waktu inkubasi selama 12-16 jam dalam keadaan gelap (Setiawan, dkk.,2018)



Gambar 4. Struktur ABTS (Moch. Amin Thohari, 2015).


c. Metode FRAP

Metode FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) merupakan metode yang

sederhana, cepat, reagen yang digunakan cukup sederhana, dan tidak menggunakan alat khusus untuk menghitung total antioksidan. Menurut Iris F. F. and J. J., (1996) metode FRAP adalah metode yang digunakan untuk menguji antioksidan dalam tumbuh-tumbuhan (Septiana, 2021). Prinsip metode ini adalah adanya reduksi ion ferri menjadi ion ferro oleh senyawa antioksidan (A) dengan reaksi pada pers.

FRAP merupakan metode yang sensitive dalam pengukuran aktivitas antioksidan total cairan biologis yang segar (sampel), seperti homogenitas tanaman dan farmakologis produk tanaman. Aktivitas antioksidan dari sampel dikonfirmasi dengan sistem vitromodel (Szollosi, 2002:125).

Beberapa metode yang dikenal untuk mengukur kapasitas antioksidan total sampel biologis, yang tergantung pada pengurangan Ferri tripyridyltriazine (Fe(III)TPTZ) kompleks untuk Ferrous tripyridyltriazine (Fe(II)TPTZ) oleh reduktan pada pH rendah. (Fe(III)TPTZ) memiliki warna biru yang intensif dan dapat dipantau 593 nm (Szollosi, 2002:125).



Gambar 5. Reaksi Metode FRAP (Munadiyah, 2017)

Penelitian ini menggunakan senyawa antioksidan sintetik berupa trolox yang digunakan sebagai kontrol positif karena di harapkan dapat memberikan aktivitas antioksidan lebih besar dibandingkan antioksidan alami (Widyastuti, 2010: 3). Troloks atau senyawa 6-hidroksi-2,5,7,8- tetrametilkroman-2-asam karboksilat dengan bobot molekul 250,32 g/mol merupakan antioksidan sintetik. Secara struktur troloks serupa dengan α -tokoferol kecuali penggantian rantai samping hidrokarbon dengan gugus COOH. Troloks berupa bubuk berwarna putih sampai kuning dan memiliki titik leleh 189-195 °C. Senyawa ini stabil selama 2 bulan pada suhu 2-8 °C dan mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi

dibandingkan α -tokoferol, BHA, serta BHT (Belitz 1999). Troloks sering dipergunakan sebagai standar dalam pengukuran antioksidan. Koefisien TEAC (troloks equivalent antioxidant capacity) adalah konsentrasi troloks yang memiliki kapasitas antioksidan yang ekuivalen dengan sampel yang dianalisis. Kapasitas antioksidan dari setiap metode dinyatakan dalam μmol troloks/g ekstrak etanol tanaman (Widyastuti, 2010).

Metode FRAP dilakukan berdasarkan kemampuan suatu senyawa dalam mereduksi kalium ferrisianida ($\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$) menjadi kalium ferrosianida ($\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$). Antioksidan dalam sampel akan mereduksi Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} dengan memberikan sebuah elektron. Jumlah kompleks Fe^{2+} dapat diketahui dengan mengukur sampel pada panjang gelombang maksimum (Magfira, 2018). Kelebihan metode FRAP ini yaitu metodenya murah, reagensinya mudah disiapkan dan cukup sederhana dan cepat (Maryam et al., 2016). Selain itu, mekanisme kerja metode FRAP seperti didalam tubuh (Yulianti, 2021)


d. . CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity).

Pada metode CUPRAC, kompleks bisneokuproin-tembaga (II) akan mengoksidasi senyawaan antioksidan dalam ekstrak tanaman dan mengalami reduksi membentuk kompleks bis-neokuproin-tembaga(I). Secara visual hal ini dapat dilihat dari perubahan warna kompleks larutan dari biru toska menjadi kuning. Pereaksi CUPRAC merupakan pereaksi yang selektif karena memiliki nilai potensial reduksi yang rendah, yaitu sebesar 0,17 V (Widyastuti, 2010). Metode CUPRAC dipilih untuk digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti selektif, peraksiannya yang lebih stabil dibandingkan pereaksi kromogenik pada metode pengukuran aktivitas antioksidan lainnya serta dapat mengukur secara simultan antioksidan hidrofilik dan lipofilik (Purwakusumah et al., 2016).

Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity (CUPRAC) merupakan pereaksi sangat selektif karena mempunyai nilai potensial reduksi yang rendah dibanding dengan metode analisis antioksidan lainnya. Menurut (Toga Nugraha, 2017) metode ini lebih disarankan untuk melihat aktivitas antioksidan yang berasal dari senyawa fenolat. Prinsip kerja dari metode ini adalah untuk menentukan adanya aktivitas dan mengukur kapasitas

antioksidan dari makroalga *Eucheuma cottonii*. Keunggulan metode ini dibandingkan metode lain yaitu lebih cepat mengoksidasi tiol jenis antioksidan. Pada penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode CUPRAC serta menetapkan kadar fenol total pada makroalga *Eucheuma cottonii*

Prinsip dari uji CUPRAC (Cupric Reducing Antioksidant Capacity) adalah pembentukan kelat oleh bis (neukuproin) besi (II) menggunakan pereaksi redoks kromogenik pada pH 7. Absorbansi dari pembentukan kelat Cu(I) merupakan hasil reaksi redoks pada panjang gelombang 450 nm. Untuk spectrum Cu (I) Ne diperoleh dengan cara mereaksikan asam askorbat bebrbagai konsentrasi dengan reagen CUPRAC.



Gambar 6. Reaksi Metode CUPRAC (Munadiyah, 2017).

Kondisi reaksi seperti konsentrasi, reagen, pH, dan waktu oksidasi pada suhu kamar dan peningkatan suhu pada percobaan dapat berasal dari sumber lain. Kelebihan dari metode CUPRAC adalah pereaksi yang digunakan cukup cepat bekerja, selektif lebih stabil mudah didapatkan dan mdah diaplikasikan (Apak, 2004).

C. Simplisia

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami pengolahan apa pun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang dikeringkan. Simplisia dibedakan menjadi simplisia nabati, hewani dan mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. (Irna rini mutia sari,2012)

Simplisia sebagai produk hasil pertanian atau pengumpulan tumbuhan liar

tentu saja kandungan kimianya tidak dapat dijamin karena disadari adanya variabel bibit, tempat tumbuh, iklim dan kondisi. Dalam hal simplisia sebagai bahan baku (awal) dan produk siap dikonsumsi langsung, dapat dipertimbangkan tiga konsep untuk menyusun parameter standar mutu yaitu sebagai berikut :

- a. bahwa simplisia sebagai bahan baku kefarmasian seharusnya mempunyai tiga parameter mutu umum suatu bahan (material), yaitu kebenaran jenis (identifikasi), kemurnian (bebas dari kontaminasi kimia dan biologis), serta aturan penstabilan (wadah, penyimpanan, dan transportasi).
- b. bahwa simplisia sebagai bahan dan produk konsumsi manusia sebagai obat tetap diupayakan memiliki tiga paradigma seperti produk kefarmasian lainnya, yaitu *Quality-Safety-Efficacy* (mutu-aman-manfaat).
- c. bahwa simplisia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap respon biologis untuk mempunyai spesifikasi kimia, yaitu informasi komposisi (jenis dan kadar) senyawa kandungan. (Irna rini mutia sari, 2012)

D. Metode Preparasi Sampel

Isolasi merupakan teknik pemisahan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu bahan alam. Isolasi senyawa pada bahan alam terdiri dari beberapa tahap mulai dari ekstraksi, fraksinasi, kemudian pemurnian dan identifikasi (Ilyas,2013)

1. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dengan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Irna Rini Mutia Sari, 2012).

Ekstraksi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh materi yang terkandung dalam makhluk hidup baik hewan, tumbuhan ataupun mikroba (Firdaus, Prihanto, & Nurdiani, 2013).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak terlarut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstraksi mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa aktif yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarutan. (Irna Rini Mutia Sari, 2012)

Prosedur ekstraksi bertujuan untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan dan untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan dari tanaman menggunakan pelarut yang selektif. Ekstrak yang diperoleh setelah distandarisasi dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan seperti dalam bentuk ekstrak cair dan dapat diproses lebih lanjut untuk dibuat dalam bentuk sediaan seperti tablet atau kapsul. Tanaman yang diekstraksi mengandung campuran kompleks dari metabolit seperti alkaloid, glikosida, terpenoid, flavanoid, dan lignan (Handa et al, 2008).

Secara umum, senyawa aktif yang terkandung dalam bahan alam dapat dikelompokkan menjadi dua yakni minyak atsiri dan non minyak atsiri (contohnya flavonoid). Tiap kelompok senyawa memiliki perbedaan struktur kimia yang mengakibatkan perbedaan dalam sifat masing-masing senyawa seperti stabilitas terhadap udara, cahaya, pemanasan serta, kelarutannya (Yasni, 2013).

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam ekstraksi, diantaranya yaitu:

a. Maserasi

Metode maserasi ialah salah satu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel ke pelarut yang sesuai. Perendaman sampel pada pelarut mengakibatkan perbedaan tekanan di dalam dan luar sel sehingga dinding sel pecah dan metabolit sekunder yang terkandung dapat terlarut di cairan penyari. Dalam maserasi, semakin lama sampel melakukan kontak dengan cairan

penyari maka semakin banyak metabolit yang terlarut akibat banyaknya dinding sel yang pecah. Proses ini akan berlanjut sampai terciptanya keseimbangan intrasel dan ekstrasel pada sampel. Metode maserasi memiliki keuntungan yaitu zat aktif yang diperoleh tidak akan rusak, namun kerugiannya yakni dibutuhkan cairan penyari yang cukup banyak dalam prosesnya (Chairunnisa, dkk., 2019).

Kelemahan utama dari maserasi adalah prosesnya cukup memakan waktu yang lama, dapat berlangsung beberapa jam sampai beberapa minggu. Ekstrak secara menyeluruh juga dapat menghabiskan sejumlah besar volume pelarut dan dapat berpotensi hilangnya metabolit. Selain itu, beberapa senyawa tidak terekstraksi secara efisien jika kurang larut dalam temperatur kamar. Di lain pihak, dikarenakan ekstraksi dilakukan pada temperatur kamar, maserasi menyebabkan degradasi metabolit yang tidak tahan panas (Parameter standar, 2000).

b. Perkolasi

Perkolasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan melewatkan cairan penyari pada sampel sehingga senyawa organik akan ikut terbawa bersama dengan cairan tersebut (Hasrianti, dkk., 2016). Proses ekstraksi dilakukan dalam perkolator, sampel dibasahi dengan perlahan dengan cairan penyari yang ditambahkan pada bagian atas sampel dan penggunaan metode ini yaitu sampel bahan alam senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area serta membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya (Mukhriani, 2014).

c. Sokletasi

Metode ekstraksi ini dilakukan dengan penempatan serbuk simplisia dalam sarung selulosa (dapat diganti dengan kertas saring) pada klonsong yang diletakkan di bagian bawah kondensor dan di bagian atas labu. Cairan penyari yang sesuai kemudian dituangkan ke dalam labu kemudian diatur suhu penangas dengan suhu yang lebih rendah dari suhu reflux. Keuntungan dari metode ini yakni proses ekstraksi yang berulang memungkinkan sampel dapat

terekstraksi oleh cairan penyari hasil kondensasi pada reflux sehingga pelarut yang digunakan lebih hemat dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya. Kerugian dari metode ini ialah senyawa yang memiliki sifat tidak stabil terhadap perubahan suhu dapat mengalami degradasi terus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).

d. Refluks

Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dalam prosesnya. Pemanasan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekstraksi dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan penyari. Prinsip dalam metode ekstraksi ini ialah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, uap dari pelarut yang mengembun pada dinding dalam kondensor akan menetes turun kembali ke wadah. Hasil ekstraksi yang didapatkan kemudian disaring dan dipisahkan menggunakan rotary evaporator (Susanty, dkk., 2016). Kelebihan yang dimiliki metode ini ialah penggunaan waktu yang singkat dan hemat dalam penggunaan pelarut. Disamping kelebihan tersebut, kekurangan yang dimiliki metode ini ialah sampel yang digunakan harus tahan pada suhu panas (Kiswandono, 2011).

e. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction

ekstraksi ini merupakan teknik yang telah dimodifikasi dengan penambahan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Penambahan ultrasound dimaksudkan untuk memberi tekanan mekanik pada sel-sel di simplisa sehingga menghasilkan ruang antar sel dan senyawa kimia pun dapat diperoleh dengan mudah. Teknik ekstraksi ini dilakukan dengan memasukkan wadah yang berisi sampel ke dalam wadah ultrasound. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014).

f. Infusa

infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih), yaitu secara umum dilakukan terukur (96°C - 98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Parameter standar, 2000).

2. Identifikasi dan Karakterisasi Senyawa

Beberapa metode digunakan dalam identifikasi senyawa dari ekstrak tumbuhan obat yang dimana metode-metode tersebut dilakukan untuk mendeteksi gugus fungsi, adanya beberapa ikatan dan cincin, hidrogen dan pengaturan karbon serta mengetahui structural dari senyawa yang diinginkan. Teknik yang digunakan antara lain spektroskopi massa (MS), spektroskopi ultraviolet (UV), spektroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR), dan spektroskopi inframerah (IR) (Rabiu, dkk., 2020).

a. Spektroskopi massa

Spektroskopi massa merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi berat molekul serta struktur kimia suatu senyawa. Teknik ini dapat diaplikasikan dalam identifikasi peptida dan oligonukleotida. Pertama-tama dilakukan penembakan elektron pada molekul organik yang kemudian mengubahnya menjadi energi ion bermuatan. Energi ionisasi elektron 70 eV pertama kali mendeteksi sinyal, selanjutnya spektrum yang tertangkap dicatat sebagai presentase puncak. Suatu senyawa yang diidentifikasi dengan memplot massa ion yang terfragmentasi terhadap muatan ion individu sehingga diketahui berat molekul dan massa relatif molekulnya. Spektroskopi massa memberikan banyak informasi khususnya terkait molekul senyawa organik (Rabiu, dkk., 2020).

Spektrometer massa dapat digunakan untuk mengukur perbandingan massa ion terhadap muatan ion dan untuk mempelajari proses ionisasi. Selain itu, juga dimungkinkan untuk mempelajari reaksi ion dalam fase gas seperti proses dekomposisi unimolekuler dan reaksi ion molekul. Spektrometer massa adalah suatu instrumen yang menghasilkan berkas ion dari suatu zat uji, memilih ion tersebut menjadi spektrum sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan (m/z) dan merekam kelimpahan relatif tiap jenis ion yang ada. Umumnya ion positif yang dipelajari, karena ion negatif yang dihasilkan dari sumber tumbukan elektron (TE) umumnya sedikit. Dengan diperkenalkannya teknik ionisasi kimia (IK) dan tembakan atom cepat (TAC) yang keduanya dapat menghasilkan ion

negatif yang banyak, maka perhatian terhadap analisis ion negatif meningkat.

Secara umum, spektrometer massa terdiri dari tiga komponen utama yaitu : Sumber ion untuk menghasilkan ion berbentuk gas dari zat uji; penganalisis untuk memisahkan ion menjadi komponen massa yang khas sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan dari ion yang ada dan sistem detektor untuk merekam kelimpahan relatif atau intensitas tiap jenis ion yang dipisahkan. Selain itu, sistem pemasukan contoh diperlukan untuk memasukkan zat uji pada sumber ion sambil tetap mempertahankan persyaratan hampa udara yang tinggi (setara 10^{-6} – 10^{-8} torr). Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kebanyakan instrumen dilengkapi suatu komputer untuk memudahkan penanganan sejumlah besar data yang dihasilkan.

b. Spektroskopi ultraviolet

Metode spektroskopi ultraviolet dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai metabolit sekunder, contohnya tannin, fenol, antosianin dan pewarna polimer yang dapat ditemukan pada frekuensi tertentu sehingga sesuai untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tumbuhan. Terdapat frekuensi-frekuensi tertentu yang dapat mendeteksi metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman yakni antosianin (520 nm), flavonoid (320 nm), fenolik (280nm), dan asam fenolik (360 nm) (Rabiu, dkk., 2020). Spektrum UV- Vis memiliki fungsi dalam penentuan struktur senyawa organik yakni menentukan jenis kromofor yang dimiliki oleh molekul yang sedang diteliti (Suhartati, 2017).


c. Spektrofotometri Uv-Vis

Spektroskopi adalah pengukuran dari interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan dengan zat-zat (Fessenden dan 28 Fessenden, 1997). Istilah spektroskopi (spektrofotometri) menyiratkan pengukuran jauhnya pengabsorbsian energi cahaya oleh suatu sistem kimia itu sebagai fungsi dari panjang gelombang radiasi, demikian pula pengukuran pengabsorbsian yang menyendiri pada suatu panjang gelombang tertentu (Day dan Underwood, 2002). Spektrofotometri UV-Vis adalah metode pengukuran jumlah radiasi

ultraviolet tampak yang diserap oleh senyawa sebagai fungsi panjang gelombang radiasi. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang 400 hingga 700 nm, sedangkan cahaya ultraviolet memiliki panjang gelombang 190 hingga 400 nm (Hardjono Sastrohamidjojo, 2007).

Prinsip dari spektroskopi UV-Vis ialah radiasi pada rentang panjang gelombang 200-700 nm dilewatkan melalui suatu larutan senyawa. Elektron-elektron pada ikatan di dalam molekul menjadi tereksitasi sehingga menempati keadaan kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses menyerap sejumlah energi yang melewati larutan tersebut. Semakin longgar elektron tersebut ditahan didalam ikatan molekul, semakin panjang gelombang (energy lebih rendah) radiasi yang diserap (Watson, 2013).

Prinsip kerja Spektrofotometri Uv-Vis yaitu Cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator pada spektrofotometer dan filter cahaya pada fotometer. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis (tunggal). Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap (diabsorpsi) dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif dengan membandingkan absorbansi sampel dan kurva standar BSA (Bovine Serum Albumine) (Rohman, 2007).



Gambar 7. Prinsip Kerja Spektrofotometri Uv-Vis (Moch. Amin Thohari,2015)

d. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir

Spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau nuclear magnetic resonance spectroscopy atau spektroskopi NMR merupakan teknik yang lebih menampakkan sifat fisik molekul bioaktif seperti jumlah dan susunan atom karbon, keberadaan isotop karbon, atom hidrogen, dan proton (Rabiu, dkk., 2020).

Spektroskopi NMR merupakan spektrometri absorpsi, sebagaimana spektrometri infra merah maupun ultraviolet. Pada kondisi yang sesuai, suatu sampel dapat mengabsorpsi radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang tergantung dari sifat-sifat sampel. Suatu plot dari frekuensi puncak-puncak absorpsi versus intensitas puncak memberikan suatu spektrum NMR. Spektroskopi NMR didasarkan pada medan magnet yang berasal dari spin inti atom yang bermuatan listrik. Spektroskopi NMR adalah suatu alat yang tersedia untuk menentukan struktur senyawa organik. NMR yang sering digunakan pada konfirmasi struktur suatu senyawa ada dua yaitu, C-Nuclear Magnetic Resonance (C-NMR) dan H-Nuclear Magnetic Resonance (H-NMR) (Fessenden et al., 1986).

Spektroskopi proton atau H, memberikan informasi struktural mengenai atom-atom hidrogen dalam sebuah molekul organik. Spektroskopi NMR karbon-13 atau C menghasilkan informasi struktur mengenai karbon-karbon dalam sebuah molekul organik (Sastrohamidjojo, 1996).

Spektroskopi H-NMR pada dasarnya merupakan sarana untuk menentukan struktur senyawa organik dengan mengukur momen magnet atom hidrogennya. Pada kebanyakan senyawa, atom hidrogen terikat pada gugus yang berlainan seperti $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_3$, $-\text{CHO}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{CHOH}-$ dan spektrum H-NMR merupakan rekaman sejumlah atom hidrogen yang berada dalam keadaan lingkungan yang berlainan tersebut. Pada spektroskopi H-NMR dapat menentukan banyaknya jenis lingkungan atom hidrogen yang berbeda yang ada dalam molekul, beberapa hidrogen pada masing-masing jenis lingkungan hidrogen, serta berapa banyak atom hidrogen yang ada pada atom karbon tetangga (Harbone, 1987)

Prinsip kerja spektroskopi $^1\text{H-NMR}$ berdasarkan pada penyerapan gelombang radio (4-600MHz) oleh inti atom hidrogen dalam molekul, saat molekul tersebut berada dalam medan magnet yang sangat kuat dan diradiasi dengan radiasi elektromagnetik maka inti atom hidrogen tersebut akan menyerap energi melalui absorpsi atau resonansi magnetik. Absorpsi radiasi akan terjadi apabila kekuatan medan magnet sesuai dengan frekuensi radiasi elektromagnetik (Pavia et al., 2009).


e. Spektroskopi inframerah

Spektroskopi inframerah merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari metabolit sekunder yang terkandung dalam senyawa. Gugus fungsi, mencakup ikatan tunggal maupun ganda yang diidentifikasi dapat mencerminkan sifat kimia dan fisika dari senyawa tersebut. Identifikasi dilakukan dengan bantuan radiasi inframerah yang kemudian diserap dalam frekuensi tertentu. Umumnya, preparasi sampel berbentuk cairan diidentifikasi menggunakan pelat NaCl, sedangkan sampel berbentuk padat ditentukan menggunakan KBr yang digiling bersama dan dikompresi menjadi pelet tipis. Hasilnya dicatat sebagai spektrum yaitu persentase transmitansi. Terakhir, spektra dianalisis; puncak yang diperoleh pada bilangan gelombang tertentu dibandingkan dengan acuan standar (Rabiu, dkk., 2020). Prinsip dari spektrofotometri inframerah yaitu rentang radiasi elektromagnetik yang berkisar antara 400 cm^{-1} dan 4000 cm^{-1} (2500 dan 20000 nm) dilewatkan pada suatu

sampel dan diserap oleh ikatan-ikatan molekul didalam sampel sehingga molekul tersebut meregang atau menekuk. Panjang gelombang radiasi yang diserap merupakan ciri khas ikatan yang menyerapnya (Watson, 2013).

Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0.75 – 1.000 μm atau pada bilangan gelombang 13.000 – 10 cm. Metode spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang meliputi Teknik serapan (absorption), teknik emisi (emission), teknik fluoresensi (fluorescence). Komponen medan listrik yang banyak berperan dalam spektroskopi umumnya hanya komponen medan listrik seperti dalam fenomena transmisi, pemantulan, pembiasan, dan penyerapan. Penyerapan gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan terjadinya eksitasi tingkat-tingkat energi dalam molekul. Dapat berupa eksitasi elektronik, vibrasi, atau rotasi (Yudhapratama, 2010).

Prinsip kerja spektrofotometer inframerah adalah fotometri. Sinar dari sumber sinar inframerah merupakan kombinasi dari panjang gelombang yang berbeda-beda. Sinar yang melalui interferometer akan difokuskan pada tempat sampel. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel difokuskan ke detektor. Perubahan intensitas sinar menghasilkan suatu gelombang interferens. Gelombang ini diubah menjadi sinyal oleh detektor, diperkuat oleh penguat, lalu diubah menjadi sinyal digital. Pada sistem optik FTIR, radiasi laser diinterferensikan dengan radiasi inframerah agar sinyal radiasi inframerah diterima oleh detektor secara utuh dan lebih baik.



Gambar 8. Komponen Dasar Spektrofotometer FTIR (Pavia et al, 2001).

E. Tinjauan Islam

Sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah swt. dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah swt. menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Berbagai macam kandungan dan manfaat yang berguna bagi tubuh manusia. Sebagai firman Allah swt. Dalam Q.S. Asy- Syu'ara/ 26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”
(Kemenag RI, 2018).

Dalam tafsir Quraish Shihab mengatakan adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran mereka padahal telah sekian banyak bukti dipaparkan dan terhampar? Apakah mereka enggan memperhatikan gugusan bintang-bintang di langit dan apakah mereka tidak melihat kebumi yakni mengarahkan pandangan sepanjang, seluas, dan seantero bumi berapa banyak kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang semuanya tumbuh subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya pada yang demikian itu hebatnya benar-benar terdapat suatu ayat yakni tanda yang membuktikan adanya pencipta yang Maha Esa, serta membuktikan pula Kuasa-Nya menghidupkan dan membangkitkan siapa yang telah mati. Dan yakni padahal sesungguhnya tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa Yang

tidak terkalahkan kehendak-Nya bahkan dapat memaksakannya lagi Maha Penyayang sehingga menghadirkan bukti itu dan melimpahkan aneka rahmat-Nya (Shihab, 2002).

Ayat ini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan serta kebutuhan manusia dan binatang. Ayat ini juga mengingatkan kepada manusia untuk selalu mensyukuri nikmat Allah swt. Dan menggunakannya dengan baik anugrah-Nya bahwasanya dia maha kuasa itulah yang telah menurunkannya dari langit. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yang berkhasiat sebagai antioksidan.

Keanekaragaman tumbuhan banyak yang dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia yang salah satunya sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. Memiliki fungsi sehingga diciptakan di bumi ini. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Namun untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Sebagai firman Allah swt. Dalam Q.S Thaha / 20: 53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya:

“Allah swt. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kemenag RI, 2018).

Dalam tafsir Quraish Shihab yang mengatakan bahwa Allah swt. telah menjadikan kamu sebagai hamparan, maknanya sebagai isyarat bahwa keberadaan manusia di bumi dalam rangka kehidupannya merupakan bagian dari hidayah Allah swt. Dikatakan dalam Firman-Nya: menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, merupakan isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh

manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya Firman-Nya: Dia meurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2015).

Segala penyakit yang diberikan Allah swt. Pasti akan ada penawarnya dan akan sembuh dengan seizin Allah swt. Yang dalam hal ini salah satu obatnya yang bisa dijadikan untuk penyembuhan penyakit yaitu jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) yang dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dengan seizin Allah swt. Maka penyakit seseorang dapat disembuhkan.

Adapun sebuah hadist dalam riwayat Imam Muslim, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu, Alaihi Wa Sallam bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit memiliki obat. Bila cocok dengan penyakitnya maka akan sembuh dengan izin Allah Ta’ala” (HR. Muslim, No. 2204).

Keterlibatan Allah swt. Dalam kesembuhan dari berbagai macam penyakit juga terdapat dalam Q.S. Asy-Syu’ara/ 26: 80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” (Kemenag RI, 2018).

Dalam tafsir Al-Misbah, “*Wa idza maridhtu*” dan apabila aku sakit yang mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya keniscayaan terhadap manusia dalam hal ini adalah sakit. Yang menginsyaratkan bahwa sakit baik berat ataupun ringan, fisik maupun mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa segala

sesuatu yang baik itu berasal dari Allah swt. Dan hal negatif atau buruk yang terjadi pada diri manusia hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri (Shihab, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah swt. berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu untuk memperoleh kesembuhan itu.

Keterlibatan ayat dan hadist diatas mengisyaratkan bahwa diizinkan nya seorang muslim mengobati penyakit yang diderita. Karena, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan sudah tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah swt. penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan.

Adapun contoh-contoh dalam pengobatan dalam islam dengan pendekatan antropologi salah satunya dengan "*Tibbun Nabawawi*". *Tibbun Nabawi* adalah tata cara pengobatan Rasulullah saw. pada masa sekarang ini telah banyak orang yang melupakan atau mengenal *Tibbun Nabawi*, hal ini disebabkan karena semakin jauhnya umat islam sendiri dari agamanya ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin modernnya teknologi pada dunia medis, padahal jika kita sebagai umat islam mau mempelajari dan memahami *Tibbun Nabawi* niscaya akan banyak hikmah dan manfaat yang akan kita dapatkan khususnya dalam dunia pengobatan. (Ihsan, 2016)

Tibbun Nabawi meliputi banyak hal, diantaranya adalah madu, jintan hitam, air mawar, cuka buah, air zam-zam, kurma dan berbagai jenis makanan dan minuman yang menyehatkan lainnya. Seperti yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ


Artinya:

Air zam-zam sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya (HR Ibnu Majah, No. 3062)

Berdasarkan hadist diatas Barangsiapa minum supaya kenyang, dia akan kenyang. Barangsiapa minum untuk menyembuhkan sakit, dia akan sembuh.

Pantaslah air zamzam begitu berkhasiat karena dia menyimpan pesan doa jutaan manusia selama ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim a.s.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadist yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Allah swt. menciptakan berbagai macam tanaman didunia untuk dimanfaatkan dan dapat pula ditanam sendiri. Yang mana dengan itu nantinya Allah swt. akan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) sebagaimana yang telah diteliti dalam penelitian ini. Dimana nantinya dapat digunakan sebagai obat dan menjadi perantara kesembuhan oleh Allah swt.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui kandungan senyawa aktif antioksidan pada fraksi metanol jamur tiram putih

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (laboratorium fitokimia dan kimia analisis) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli – November 2023

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental yang dilakukan dengan berbagai tahap yaitu preparasi, ekstraksi, partisi, uji DPPH antioksidan pada sampel jamur tiram putih

C. *Sampel*

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*)

D. *Alat dan Bahan*

1. Alat

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yakni blender, botol vial, cawan porselen, chamber, corong kaca, corong pisah, erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, lemari pengering, mangkuk kaca, oven, penangas, pengayak mesh 20, toples kaca, botol coklat, pipet mikro, spatel, GC-MS,

timbangan analitik, toples kaca, kuvet, labu tentukur, spektrofotometri Uv-Vis, vacuum rotary evaporator (rotavapor).

2. Bahan

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yakni waterone, DPPH, metanol, asam askorbat, jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), n-heksana, etil asetat

E. Cara Kerja

1. Preparasi Sampel

Jamur tiram putih dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya kemudian dicuci dengan air mengalir. Sampel dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering dan digiling hingga menjadi serbuk simplisia (Lallo, dkk., 2018). (Subositi, 2014)

2. Ekstraksi Sampel

Ekstraksi jamur tiram dilakukan dengan teknis maserasi menggunakan pelarut metanol. Pelarut metanol teknis dimurnikan terlebih dahulu dengan cara distilasi. Simplisia jamur tiram putih dimaserasi dengan metanol hasil distilasi selama 24 jam sebanyak 3 kali. Setiap 24 jam, pelarut diganti. Hasil maserasi disaring hingga diperoleh filtrat dan residu. Filtrat dipekatkan dengan rotary evaporator ($T < 50^{\circ}C$). Proses pemekatan dihentikan saat tidak ada lagi pelarut yang menetes di labu penampungan evaporator. Hasil dari pemekatan dinamakan ekstrak kasar (crude extract). (Vritta Amroini Wahyudi.,2020)

3. Partisi sampel

Filtrat yang telah pekat kemudian melewati tahap partisi. Partisi pada sampel dilakukan dengan melarutkan ekstrak metanol sebanyak 20 gram dalam 200 ml aquadest. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah lalu ditambahkan 200 ml n-heksana, dikocok secara perlahan-lahan selama 5 menit, setelah itu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara ekstrak n-

heksan dan aquadest. Ekstrak n-heksan dipisahkan dengan lapisan air kemudian dipartisi kembali hingga hasil partisi n-heksan berwarna bening (Nuari, dkk., 2017). Ekstrak n- heksan cair, dan ekstrak aquadest diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental.

Hasil partisi dirotavapor kemudian dihitung persentase rendemennya: (Fasya, dkk., 2018).

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{berat ekstrak}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

4. Uji Aktivitas Antioksidan dengan DPPH

a. Pembuatan Larutan DPPH

Larutan DPPH dibuat dengan melarutkan 0,034 g ke dalam 107 mL metanol (DPPH 0,004%). Larutan ditampung di dalam botol vial yang telah ditutup dengan kertas hitam kemudian disimpan di dalam lemari es.

b. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak dengan DPPH

Uji kuantitatif aktivitas antioksidan dengan DPPH pada penelitian dilakukan terhadap ekstrak larut n-heksan, dan ekstrak larut aquades. Sampel disiapkan dengan konsentrasi 500, 750, 1000, 1250, dan 1500 ppm. Pembuatan konsentrasi tersebut dengan cara pengenceran dari larutan induk 2000 ppm. Blanko dibuat dengan mencampurkan 0,3 mL metanol dengan 2,7 mL larutan DPPH 0,004%. Larutan uji dibuat dengan mencampurkan 0,3 mL sampel dengan 2,7 mL larutan DPPH 0,004%. Blanko dan larutan uji ditampung pada botol vial yang telah ditutup dengan kertas hitam. Pada menit ke-30, blanko dan larutan uji diukur absorbansinya pada panjang gelombang 497 nm, 517 nm, dan 527 nm. Absorbansi dicatat dan dihitung persen redamannya.

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Abs.blanko} - \text{Abs.sampel}}{\text{Abs.blanko}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh data hitungam dibuat kurva regresi antara konsentrasi sampel dengan persentase redaman. Berdasarkan hasil kurva diperoleh persamaan regresi untuk mendapat nilai IC₅₀. Variabel x sebagai

nilai IC_{50} akan diketahui dengan cara memasukkan nilai 50 ke dalam variabel y . Setelah diperoleh keseluruhan data, hasil karakterisasi dan identifikasi dihubungkan dengan data aktivitas antoksidan untuk diinterpretasikan. (Vritta Amroini Wahyudi.,2020)

c. Uji Aktivitas Antioksidan Asam Askorbat dengan DPPH

Uji kuantitatif aktivitas antioksidan dengan DPPH pada penelitian dilakukan terhadap baku pembanding asam askorbat. Sampel disiapkan dengan konsentrasi 5, 10, 15, 25, dan 30 ppm dengan pelarut metanol. Pembuatan konsentrasi tersebut dengan cara pengenceran dari larutan induk 100 ppm. Larutan uji dibuat dengan mencampurkan 0,3 mL sampel dengan 2,7 mL larutan DPPH 0,004%. Larutan uji ditampung pada botol vial yang telah ditutup dengan kertas hitam. Pada menit ke-30. larutan uji diukur absorbansinya pada panjang gelombang 497 nm, 517 nm, dan 527 nm. Absorbansi dicatat dan dihitung persen redamannya.

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Abs.blanko} - \text{Abs.sampel}}{\text{Abs.blanko}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh data hitungan dibuat kurva regresi antara konsentrasi sampel dengan persentase redaman. Berdasarkan hasil kurva diperoleh persamaan regresi untuk mendapat nilai IC_{50} . Variabel x sebagai nilai IC_{50} akan diketahui dengan cara memasukkan nilai 50 ke dalam variabel y . Setelah diperoleh keseluruhan data, hasil karakterisasi dan identifikasi dihubungkan dengan data aktivitas antoksidan untuk diinterpretasikan. (Vritta Amroini Wahyudi.,2020)

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Rendemen Ekstrak Partisi N-heksan

Tabel 1. Hasil Partisi N-Heksan Jamur Tiram Putih

Berat Ekstrak Metanol Kental	Berat Ekstrak N-Heksan Partisi	% Rendemen
40 gram	1,804 gram	4,51%

2. Rendemen Ekstrak Partisi Aquades

Tabel 2. Hasil Partisi Aquades Jamur Tiram Putih

Berat Ekstrak Metanol Kental	Berat Ekstrak Aquades Partisi	% Rendemen
40 gram	25,515 gram	63,7%

3. Hasil Pengukuran Nilai IC₅₀ Aktivitas Vitamin C, Ekstrak Fraksi Jamur Tiram Putih (*pleurotus ostreatus*)

Tabel 3. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak fraksi jamur tiram putih (*pleurotus ostreatus*)

Ekstrak Partisi	Panjang Gelombang	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi Sampel	% Inhibisi	Persamaan Garis Linear	Nilai IC ₅₀
N-heksan	497 nm	500	0,469	0,392	y = 0,0072x + 0,0389 R = 0,777	6,89
		750	0,457	0,408		
		1000	0,457	0,408		
		1250	0,443	0,426		
		1500	0,448	0,419		
	517 nm	500	0,517	0,409	y = 0,0074x + 0,4048 R = 0,865	6,70
		750	0,504	0,424		
		1000	0,504	0,424		
		1250	0,490	0,44		
		1500	0,491	0,438		
	527 nm	500	0,490	0,411	y = 0,00078x + 0,4066 R = 0,8311	6,35
		750	0,476	0,427		
		1000	0,477	0,426		
		1250	0,461	0,445		
		1500	0,465	0,441		

Ekstrak	Panjang Gelombang	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi Sampel	% Inhibisi	Persamaan Linear	Nilai IC ₅₀
Aquades	497 nm	500	0,502	0,349	y = 0,0458x + 0,4148 R = 0,7031	1.082
		750	0,544	0,295		
		1000	0,497	0,356		
		1250	0,587	0,239		
		1500	0,657	0,148		
	517 nm	500	0,515	0,411	y =0,041x + 0,4664 R = 0,7168	1.208
		750	0,563	0,356		
		1000	0,519	0,406		
		1250	0,595	0,32		
		1500	0,679	0,224		
	527 nm	500	0,481	0,421	y = 0,0562x + 0,5386 R = 0,8152	880,09
		750	0,527	0,366		
		1000	0,486	0,415		
		1250	0,557	0,330		
		1500	0,650	0,218		

Tabel 4. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin C

Ekstrak Partisi	Panjang Gelombang	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi Sampel	% Inhibisi	Persamaan Garis Linear	Nilai IC ₅₀
Vitamin C	497 nm	5	0,665	0,138	y = 0,0933x + 0,0279 R = 0,9667	535,60
		10	0,605	0,216		
		15	0,570	0,261		
		25	0,445	0,423		
		30	0,385	0,502		
	517 nm	5	0,746	0,147	y = 0,0956x + 0,0338 R = 0,9639	522,65
		10	0,678	0,228		
		15	0,638	0,27		
		25	0,491	0,438		
		30	0,420	0,52		
	527 nm	5	0,709	0,123	y = 0,1007x + 0,0149 R = 0,9729	496,37
		10	0,640	0,23		
		15	0,606	0,271		
		25	0,466	0,439		
		30	0,397	0,522		

B. Pembahasan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkap radikal bebas. Radikal bebas yang dihasilkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu debu, asap, polusi, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman cepat saji yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemaknya. Senyawa antioksidan tersebut akan mendonorkan satu elektron terhadap radikal bebas yang tidak stabil sehingga radikal bebas tersebut akan menjadi netral kembali dan tidak akan mengganggu metabolisme pada tubuh. (Hayatul,2017).

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas berperan penting dalam proses biologis yang sebagian besar berasal dari proses biologis alami yang melibatkan prooksidan ROS dan RNS (Berawi & Agverianti,2017).

Pengujian aktivitas antioksidan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar suatu senyawa tumbuhan mampu menjadi scavenger (penangkap) radikal bebas. Mekanisme penangkal radikal bebas adalah salah satu dari metode dalam menghambat oksidasi lipid yang dapat digunakan untuk menghitung aktivitas antioksidan. (Egra, dkk., 2018)

Penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada jamur tiram putih (*pleurotus ostreatus*). dengan cara dibersihkan dari kotoran yang masih menempel kemudian dicuci dengan air mengalir. Dilakukan perajangan lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa mengenai sinar matahari langsung. Sampel yang telah dikeringkan kemudian disortasi kering. Sampel diblender hingga agak halus agar mempermudah difusi senyawa aktif menuju eluen, dengan ini sudah cukup untuk memperluas permukaan dari simplisia sehingga mempermudah cairan penyari masuk ke dalam partikel. Simplisia lalu dimasukkan ke dalam toples kaca untuk selanjutnya melewati tahap ekstraksi.

Ekstraksi merupakan teknik pemisahan komponen atau senyawa dari campurannya (simplisia) menggunakan eluen/pelarut tertentu. Metode maserasi dilakukan dengan merendam simplisia dalam pelarut tanpa menggunakan pemanasan agar bahan alam yang terkandung tidak mengalami kerusakan arat terdegradasi akibat pemanasan. Pada maserasi, terjadi proses keseimbangan

konsentrasi antar larutan di dalam dan di luar sel simplisia sehingga perlu dilakukan pergantian pelarut secara berulang (Hanani, 2015). Pada saat maserasi, Pelarut yang digunakan akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan didalam sel dengan di luar sel. Larutan konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut yang digunakan dengan konsentrasi rendah (proses difusi) (Moch. Amin Thohari, 2015).

Dalam penelitian ini, eluen metanol dipilih untuk mengekstraksi simplisia. Metanol diketahui dapat melarutkan senyawa-senyawa yang berbeda kepolarannya, baik polar ataupun non-polar, sehingga cocok digunakan dalam mengekstraksi lebih banyak jenis metabolit sekunder pada sampel (Muaja, dkk., 2017). Pemilihan pelarut methanol ini juga dikarenakan metanol merupakan pelarut universal dan mampu mengikat kandungan senyawa zat aktif yang terdapat pada sampel dengan baik (Moch. Amin Thohari, 2015).

Hasil ekstraksi kemudian disaring dan dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$, penguapan pelarut dilakukan pada suhu tersebut agar mengurangi penguraian yang mungkin terjadi pada komponen kimia di dalamnya (Saputra, dkk., 2018).

Ekstrak metanol jamur tiram putih yang telah pekat diambil sebanyak 20 gram untuk dipartisi dengan menggunakan eluen n-heksan dan aquadest. Ekstrak metanol dilarutkan ke dalam 200 ml aquadest, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Sebanyak 200 ml n-heksan ditambahkan ke dalam corong pisah lalu dilanjutkan pengocokan secara perlahan selama 5 menit agar pelarut dapat menarik senyawa dengan sempurna. Metode partisi menggunakan corong pisah dengan dua pelarut yang tidak saling bercampur bertujuan agar senyawa-senyawa dalam sampel dapat terlarut pada pelarut yang sesuai dengan kepolarannya sehingga lebih mudah mengklasifikasikan metabolit sekunder yang didapatkan (Saputra, dkk., 2018). Dilakukan beberapa kali partisi dengan pergantian pelarut n-heksan secara berkala hingga pelarut n-heksan dalam corong pisah berubah warna menjadi bening yang dimana dalam penelitian ini partisi dengan pelarut n-heksan dilarutkan sebanyak 2kali. Kemudian dilanjutkan partisi dengan etil asetat, dilakukan hal yang sama seperti pada partisi n-heksan, sampai berubah menjadi bening sedangkan dengan


pelarut etil asetat dilakukan sebanyak satu kali. Hasil partisi kemudian kembali dipisahkan menggunakan rotary evaporator. Ekstrak kental yang dihasilkan kemudian dihitung hasil rendamennya untuk memastikan jumlah ekstrak yang dihasilkan. Rendamennya dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{berat ekstrak}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$


Didapatkan ekstrak pekat n-heksan hasil partisi sebanyak 1,804 gram dengan rendemen ekstrak n-heksan hasil partisi yaitu 9,02% dan ekstrak pekat aquades hasil partisi sebanyak 25,515 gram dengan rendemen ekstrak aquades hasil partisi yaitu 127,575 % (Tabel 1). Rendemen dikatakan baik jika nilainya lebih dari 10% (Wardaningrum et al., 2019).

Selanjutnya, Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) diketahui memiliki aktivitas sebagai antimikroba, kekebalan tubuh manusia dari virus HIV, antivirus, antitumor, antimutagenik, antilipidemik, antioksidan, hipotensi, hiperglikemia, antiinflamasi, hepatoprotektif, hipokolesterolemia, imunomodulator, dan juga antiaging (Alam dkk, 2009; Jayakumar dkk, 2011; Patel dkk, 2012; Wasser dkk, 2014). Pada penelitian ini, uji aktivitas antioksidan (kuantitatif) dilakukan dengan menggunakan metode DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*). Prinsip kerja pada metode DPPH yaitu adanya atom hidrogen pada senyawa antioksidan yang bergandengan dengan elektron bebas pada senyawa radikal bebas sehingga dapat terjadi perubahan dari radikal bebas yang menjadi senyawa non-radikal. Yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari ungu menjadi kuning (Setiawan, dkk., 2018).


Pengukuran kapasitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri Uv-Vis dengan panjang gelombang 497 nm, 517 nm, 527 nm yang merupakan panjang gelombang maksimum untuk DPPH. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC₅₀, yang dimana merupakan konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH.




Gambar 9. Kurva Standar Ekstrak N-heksan pada Panjang Gelombang 497 nm




Gambar 10. Kurva Standar Ekstrak N-heksan pada Panjang Gelombang 517 nm




Gambar 11. Kurva Standar Ekstrak N-heksan pada Panjang Gelombang 527 nm




Gambar 12. Kurva Standar Ekstrak Aquadest pada Panjang Gelombang 497 nm




Gambar 13. Kurva Standar Ekstrak Aquadest pada Panjang Gelombang 517 nm




Gambar 14. Kurva Standar Ekstrak Aquadest pada Panjang Gelombang 527 nm



Gambar 15. Kurva Standar Vitamin C pada Panjang Gelombang 497 nm



Gambar 16. Kurva Standar Vitamin C pada Panjang Gelombang 517 nm



Gambar 17. Kurva Standar Vitamin C pada Panjang Gelombang 527 nm

Pengujian antioksidan dilakukan dengan mekanisme penangkapan radikal bebas yang diukur pada spektrofotometer dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Kontrol positif yang digunakan adalah vitamin C. Penggunaan vitamin C sebagai kontrol positif didasarkan bahwa vitamin C merupakan salah satu antioksidan alami yang sangat baik (Kusuma, Arung dan Kim, 2014). Besarnya peredaman aktivitas radikal bebas dinyatakan sebagai persentase penghambatan yang ditandai dengan perubahan atau dekolonisasi warna DPPH. (Egra dkk, 2018). Hasil uji aktivitas masing-masing ekstrak menunjukkan bahwa ekstrak N-heksan hasil partisi yang bersifat non-polar memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat karena masing-masing memiliki nilai IC_{50} , 6,89 $\mu\text{g/mL}$ pada panjang gelombang 497 nm, pada panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC_{50} , 6,70 $\mu\text{g/mL}$, panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC_{50} 6,35 $\mu\text{g/mL}$ (Tabel 3, hal 24). Sedangkan pada ekstrak aquadest memiliki aktivitas antioksidan yang sangat lemah karena masing-masing memiliki nilai IC_{50} , pada panjang gelombang 497 nm memiliki nilai IC_{50} , 1.082 $\mu\text{g/mL}$, pada panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC_{50} 1.208 $\mu\text{g/mL}$, pada panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC_{50} , 880,09 $\mu\text{g/mL}$ (Tabel 3, hal 25) sementara vitamin C yang digunakan sebagai pembanding

memiliki aktivitas antioksidan yang sangat lemah karena memiliki nilai IC_{50} 535,60 $\mu\text{g/mL}$ pada panjang gelombang 497 nm, pada panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC_{50} 522,65 $\mu\text{g/mL}$, dan pada panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC_{50} , 496, 37 $\mu\text{g/mL}$ (Tabel 4, hal,25). Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya perubahan warna saat proses inkubasi. Selain alasan tersebut, yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah tempat penyimpanannya saat proses inkubasi berada di ruangan yang tidak gelap. Disamping itu, adanya konsentrasi vitamin C yang berlebih saat proses pembuatan pengenceran larutan induk sehingga seri konsentrasi yang dibuat kurang homogen sehingga saat dibagi ke dalam vial konsentrasi vitamin C yang diperoleh terjadi kesalahan pemipetan sehingga masih terdapat sampel vitamin C yang tertinggal didalam pipet. Nilai Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai kurang dari 50, kuat (50-100), sedang (100- 150), dan lemah (151-200).Semakin kecil nilai IC_{50} semakin tinggi aktivitas antioksidan. (Badarinath,2010). Adapun contoh senyawa non-polar yang terdapat pada jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) berdasarkan beberapa hasil penelitian yaitu Alkaloid dan Terpenoid.

Berdasarkan contoh senyawa tersebut Senyawa metabolit sekunder ini merupakan salah satu senyawa yang banyak digunakan dalam pembuatan obat-obatan , aroma parfum, bumbu masakan bahan reaksi dan relaksasi. Umumnya, senyawa metabolit sekunder yang banyak terdapat pada tumbuhan seperti alkaloid, flavoid, terpenoid, steroid, dan saponin. Senyawa metabolit sekunder ini dapat diidentifikasi dengan cara skrining fitokimia. Dari hasil skrining fitokimia beberapa penelitian, pada jamur tiram putih metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan adalah golongan alkaloid. Dari pernyataan ini, menunjukkan bahwa banyak senyawa jenis alkaloid lainnya yang terdapat pada dalam jamur tiram putih dan diperlukan karakterisasi untuk mengetahui senyawa jenis alkaloid tersebut beserta sifat-sifatnya. Alkaloid banyak dijadikan senyawa obat dan dimanfaatkan dalam bidang farmasi, karena memiliki efek farmakologi yang tinggi yaitu sebagai antiinflamasi, antimikroba, anti kanker dan meningkatkan efek antioksidan pada sel. Namun, senyawa alkaloid ini memiliki sifat non polar atau hanya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. (Intan apri resti, 2022).

Hasil skrining fitokimia ekstrak jamur tiram putih pada penelitian tersebut positif mengandung flavanoid, alkaloid, dan terpenoid. Metabolit sekunder yang telah dikemas secara komersil dari jamur tiram adalah lovastin. Lovastin merupakan senyawa dari golongan terpenoid yang memiliki aktivitas sebagai antikolestrol. (Vritta amroini wahyudi, 2020)



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu:

1. Ekstrak hasil partisi jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) memiliki aktivitas antioksidan terhadap ekstrak N-heksan dengan panjang gelombang 497 nm memiliki nilai IC_{50} 6,89 ppm, panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC_{50} 6,70 ppm, panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC_{50} 6,35 ppm; pada ekstrak aquadest dengan panjang gelombang 497 nm memiliki nilai IC_{50} 1.082 ppm, panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC_{50} 1.208 ppm, panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC_{50} 880,096 ppm.
2. Hasil uji aktivitas antioksidan pada vitamin c dengan panjang gelombang 497 nm memiliki nilai IC_{50} 535,60, panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC_{50} 522,65, dan panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC_{50} 496,37.

B. Saran

Disarankan agar penelitian ini dilanjutkan untuk mengisolasi senyawa bioaktif dari fraksi yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan paling kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apak, R, Guchu, Demirata B. 2007. *Comparative Evaluation OF Various Total Antioxidant Capacity Assays Applied To Phenolic Compounds With The CUPRAC Assays*. Molecules.
- Badarinath A, Rao K, Chetty CS, Ramkanth S, Rajan T, & Gnanaprakash K. A *Review on In-vitro Antioxidant Methods : Comparisons, Correlations, and Considerations*. *International Journal of PharmTech Research*, 2010: 1276-1285.
- Berawi, K. N., & Agverianti, T. (2017). Efek Aktivitas Fisik Pada Proses Pembentukan Radikal Bebas sebagai Faktor Risiko Aterosklerosis. *Jurnal Majority*, 6(2), 86–91. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1019>
- Cazes, Jack. 2001. *Encyclopedia of Chromatography*. Marcel Dekker Inc. New York, dikutip dari Lestari, Puji. 2008. “*Identifikasi Senyawa Nimetazepam Pada Tablet Psikotropika Secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (KG-SM)*”. Akademi Analis Kimia: Bogor.
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). *Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (Ziziphus mauritiana L .) sebagai Sumber Saponin*. *Jurnal Rekrayasa dan Manajemen Agroindustri*, 7(4), 551–560.
- Chrinang P., I. K. *Amino Acids and Antioxidant Properties of the Oyster Mushrooms, Pleurotus ostreatus and Pleurotus sajor-caju*. *Science Asia Journal*. 2009
- Dewi Trisantini, Alifah Ismawati. 2016. *Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH pada Daun Tanjung (Mimusops elengi L)*. Universitas Indonesia.
- Djarajah. *Budidaya Jamur Tiram*. Kanisius. Yogyakarta. 2001.
- Egra, S., Kusuma, I. W., & Arung, E. T. (2018). *Potensi jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) terhadap penghambatan Candida albicans dan Propionibacterium acnes*. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 2(1):
- Firdaus, M., Prihanto, A. A., & Nurdiani, R. (2013). *Tanaman Bakau : Biologi dan Bioaktivitas*. Malang: UB (Universitas Brawijaya) Press.

- Fasya, A. G., Dinasti, A. R., Shofiyah, M., Rahmawati, L. M., Millati, N., Safitri, D. A., Handoko, S., Hanapi, A., & Ningsih, R. (2018). *Ekstraksi, Hidrolisis dan Partisi Metabolit Sekunder dari Mikroalga Chlorella sp.* *Alchemy*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.18860/al.v5i1.3686>
- Fessenden, R.J., dan Fessenden, J.S. 1986. *Organic Chemistry Third Edition*. Alih bahasa Pudjaatmaka, A.H. *Kimia Organik*. Jilid 2 Edisi ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Forestryana, D., & Arnida. (2020). *Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Ekstrak Etanol Daun Jeruju (HYDROLEA SPINOSA L.)*. *Jurnal Ilmiah Farmako Bahariri*, 11(2), 113–124.
- Fountoulakis. Removal of Phenolics in Olive Mill Wastewater Using the White-rot Fungus *Pleurotus ostreatus*. *Water Res.* 2007
- Gandjar I, Wellyzar S, Oetari A. Mikologi, *Dasar Dan Terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Gandjar, I. G., & Rohman, A. (2013). *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, A. *Budidaya Jamur Tiram*. PT Agro Media Pustaka. 2004
- Hanani, E. (2015). *Analisis Fitokimia*. EGC. Jakarta
- Handayani, S., Haeria, Tahar, N., & Munadiah. (2018). *Penentuan Kadar Flavonoid Dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (Moringa Oleifera) Dengan Metode DPPH, CUPRAC dan FRAP*. 6(2), 88–9.
- Harbone, J.B. (1987). *Metode Fitokimia*. Diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro. Bandung : Penerbit ITB.
- Hermanto. (2008). *Aplikasi Alat HPTLC dan* . Jakarta.
- Ikhsan, M., & Ariani, E. (2015). *Pengaruh Molase Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) pada Media Serbuk Kayu Mahang dan Sekam Padi* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ilyas, A. (2013). *Kimia Organik Bahan Alam* (M. Baharuddin (ed.)). Alauddin University Press.
- Intan Apri Resti. (2022). *Enkapsulasi Senyawa Alkaloid Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) Dalam β -Siklodekstrin dengan Metode Kopersipitasi*. (Skripsi). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam. Universitas Negeri Padang.

- Irianti, T., Sugiyanto, Nuranto, S., & Kuswandi. (2017). *Antioksidant*. UGM Press.
- Isnaini, Biworo, A., Khatimah, H., Gufron, K. M., & Puteri, S. R. (2021). *Aktivitas Antibakteri dan Antijamur Ekstrak Galam (Melaleuca cajuputi subsp. Cuminglana (Turcz.) Barlow) terhadap Bakteri E.coli dan Jamur C. albicans*. *JOURNAL OF AGROMEDICINE AND MEDICAL SCIENCES*, 79-83.
- Iwalokun B. A., u. U. Comparative Phytochemical Evaluation, Antimicrobial and Antioxidant Properties of *Pleurotus ostreatus*. *African Journal of Biotechnology*. 2007
- Karadag, A. Ozcelik, B., Saner, S. 2009.. Review of Methods to Determine Antioxidant Capacities, *Food Analytical Methods* Vol.2:41-60
- Kemdikbud . (2018). *Buku Informasi Analisis Kromatografi*. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian.
- Kementrian Agama RI. (2018). *Al-Quran dan Terjemahannya*: CV. Penerbit Diponegoro. Bandung.
- Kiswando, A. A. (2011). *Skrining Senyawa Kimia dan Pengaruh Metode Maserasi dan Refluks Pada Biji Kelor (Moringa oleifera, Lamk) Terhadap Rendemen Ekstrak yang Dihasilkan*. *Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa*, 1(2), 126–134.
- Lallo, S., Kasim, S., Tayeb, R., Hasan, A. D., Sere, H., Ismail, I., & Arifin, T. (2018). *Analisis Zerumbone Dalam Zingiber zerumbet Dan Aktivitas Penghambatannya Terhadap Bakteri Mycobacterium tuberculosis*. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 4(2), 126– 132. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2018.v4.i2.11138>
- Lee, K. W., Kim, W J., Lee H. J., Lee, C. Y. 2003. Cocoa Has More Phenolic Phytochemicals and a Higher Antioxidat Capacity than Teas and Red Wine, *Journal of Agricultural Food Chemistry* Vol.51: 7292-7295.
- Magalhaes, L.M., Segundo, M.A., Reis, S., Lima, J.L.F.C., 2008. Methodological properties. *Analytica Chimica Acta* 613, 1-19

- Magfira. 2018. *Analisis Penghambatan Ekstrak Etanol Batang Kembang Bulan (Tithonia ediversifolia) Terhadap Reaksi Oksidasi dari Radikal Bebas Dengan Metode DPPH ABTS dan FRAP*. (Skripsi). Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Maryam, S., Baits, M., & Nadia, A. 2016. *Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera Lam.) Menggunakan Metode FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power)*. J. Fitofarmaka Indones. 2(2): 115–118
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif*. Jurnal Kesehatan UIN Alauddin, 7(2) <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24252/kesehatan.v7i2>. 55 c a n c e r proliferation accompanied by apoptosis; the α , β unsaturated carbonyl group is a prerequisite. Carcinogenesis 23(5): 798-802.
- Muaja, M. G. D., Runtuwene, M. R. J., & Kamu, V. S. (2017). *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol dari Daun Soyogik (Saurauia bracteosa DC.)*. Jurnal Ilmiah Sains, 17.
- Muhammad ihsan. (2016). *Pengobatan Ala Rasulullah SAW sebagai Pendekatan Antropologis Dalam Dakwah Islamiah*. Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Volume 4 No.2 November.
- Muthukumaran P, N. Saraswathy, R. Kogilavani, S. Udhaya Bhaskar and S. Sindhu,(2014). Preliminary Phytochemical Screening and Antimicrobial Properties of Pleurotus florida and Pleutotus eous Againts Some Human Pathogens: A Comparative Study. International Research Journal of Pharmacy, Vol. 5(2), 88-91.
- Nadyah, *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan*. Makassar: Alauddin Universty Press, 2011.
- Nuari, S., Anam, S., & Khumaidi, A. (2017). *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol Buah Naga*. Galenika Journal of Pharmacy, 2(2), 118–125. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2017.v3.i2.118>
- Patel, Y., Naraian, R., & Singh, V. K. (2012). *Medicinal properties of Pleurotus species (oyster mushroom): a review*. World Journal of Fungal and Plant Biology, 3(1), 1-12.
- Pauly, G., 2001, *Cosmetic, Dermatological And Pharmaceutical Use of An Extract*

Of Terminalia catappa, United State Patent Application no. 200100022665.

Pavia, L. D., Lampman, G.M., dan Kriz, G.S. 2009. *Introduction to Spektroskopi*, Third Edition. USA: Thomson Learning, inc.

Prakash, A., F., Rigelhof & E., Miller, 2001, *Antioxidant Activity*. http://www.medallionlabs.com/Downloads/Antiox_acti_.pdf, Diakses tanggal 11 Maret 2015.

Purwakusuma E D, Lusi R dan Mohammad R. 2016. *Evaluasi Aktivitas Antioksidan dan Perubahan Metabolit Sekunder Mayor Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) Pada Umur Rimpang Yang Berbeda* Jurnal Jamu Indonesia. 1(1):10-17.

Rabiu, A., & Haque, M. (2020). Preparation of Medicinal Plants : Basic Extraction and Fractionation Procedures for Experimental

Rahmi, H. (2017). *Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Buah-buahan di Indonesia*. 2(1), 34–38.

Sastrohamidjojo, H, 1991, *Kromatografi*, Edisi II, hal 26-36, Liberty, yogyakarta

Saskiawan, I., & Hasanah, N. (2015). *Aktivitas antimikroba dan antioksidan senyawa polisakarida jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)*. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon, 1(5), 1105-1109.

Saputra, T. R., Ngatin, A., & Sarungu, Y. T. (2018). *Penggunaan Metode Ekstraksi Maserasi dan Partisi pada Tumbuhan Cocor Bebek (Kalanchoe pinnata) dengan Kepolaran Berbeda*. Fullerene Journal of Chemistry, 3(1), <https://doi.org/10.37033/fjc.v3i1.26>

Septiana, B. 2021. *Karakteristik Simplisa dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Umbi Bawang Dayak (Eleutherine bulbosa (L.) Merr.) dengan Metode FRAP Secara Spektrofotometri Sinar Tampak*. (Skripsi).

Setiawan, F., Yunita, O., & Kurniawan, A. (2018). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan) Menggunakan Metode DPPH, ABTS, dan FRAP*. 2(2), 82–89.

Shihab, M.Q. (2015). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 3: Penerbit Lentera Hati. Jakarta

Subositi, A. P. D. (2014). *Analisis Ukuran Partikel Bahan Penyusun Ramuan Jamu*

Dan Volume Air Penyari Terhadap Mutu Ekstrak Yang Dihasilkan.
Jurnal Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik, 111–115.

Suharti, T. (2017). *Dasar-Dasar Spektrofotometer UV-VIS dan Spektrofotometri Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik.* Lampung: AURA.

Susiana. *Pengaruh Penambahan Gula (sukrosa) Terhadap Pertumbuhan Miselium Jamur Tiram Merah.* Skripsi. Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Sunarni, T., 2005, *Aktivitas Antioksidan Penangkap Radikal Bebas Beberapa Kecambah dari Biji Tanaman Familia Papilionaceae, Jurnal Farmasi Indonesia, Vol. 2, No. (2), 53-61*

Szollosi, R. 2002. *Total Antioxidant Power in Some Species of Labiatae (Adaptation of FRAP Method)* Hungarian Congress On Plant Physiology.

Teow, C.C., Truong, V., McFeeters, R.F., Thompson, R.L., Pecota, K.V., Yencho, G. C. 2007. *Antioxidant Activities, Phenolics, and β -Carotene Contents of Sweet Potato Genotypes with Varying Flesh Colours, Journal of Food Chemistry, 103:829-838*

Thohari, Moch. Amin. (2015). *Studi Kandungan Fitokimia dan Antioksidan Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) pada Media Alang-alang (Imperata cylindrica).* Skripsi.

Tjokrokusumo. *Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Rehabilitasi Lingkungan.* JRL. 2008

Toga Nugraha, A. (2017). *Profil Senyawa Dan Aktifitas Antioksidan Daun Yakon (Smallanthus Sonchifolius) Dengan Metode Dpph Dan Cuprac.* Jurnal Ilmiah Farmasi, 13(1), 15–18. <https://doi.org/10.20885/jif.vol13.iss1.art3>

Universitas Gajah Mada. (2018). *Peralatan Laboratorium.* Yogyakarta: Komite Akreditasi Nasional.

Vritta Amroini Wahyudi, Laurent Octaviana, Sutrisno. 2020. *Kajian Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus).* Universitas Negeri Malang


Wang, C. C., Chu, C. Y., Chu, K.O., Choy, K. W., Khaw, K.S., Rogers, M. S., Pang, C. P. 2004. *Trolox-Equivalent Antioxidant Capacity Assay Versus*

Oxygen Radical Absorbance Capacity Assay in Plasma, Clinical Chemistry Vol. 50 (5): 952-954

- Wardaningrum, R. Y., Susilo, J., & Dyahariesti. (2019). *Perbandingan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Terpurifikasi Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) dengan Vitamin E*. Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Ungaran: Universitas Ngudi Waluyo
- Watson, D.G., 2013. *Analisis Farmasi edisi 2*. Diterjemahkan oleh Syarif, WR. Jakarta : EGC.
- Widyastuti, Niken. 2010. *Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Metode CUPRAC, DPPH and FRAP serta Korelasinya Dengan Fenol dan Flavonoid pada Enam Tanaman*. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB.
- Yasni, S. (2013). *Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Produk Ekstraktif Rempah* (Y. HE Frandy, H. Baihaqi, & N. Tensai (ed.)). PT. Penerbit IP
- Yulianti, R. A. 2021. *Antioxidant Activity Test Of Cotton Banana Peel Extract (Musa Paradisiaca L .) Using The Frap Method And Dpph In Hand And Body Lotion*. *Media Informasi*. 17(2): 86-92.


Lampiran

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian



Lampiran 2. Uji Aktivitas Antioksidan

a. Pengujian antioksidan



Lampiran 3. Pembuatan Larutan

1. Larutan DPPH
2. Larutan Ekstrak N-heksan dan Aquadest
 - a. Larutan Induk

■ $2000 \text{ ppm} = \text{mg/ml}$

$$2000 \text{ ppm} = 40.000 \text{ mg} / 20\text{ml}$$

$$= 2.000 \text{ ml}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 2000 ppm dengan cara ditimbang ekstrak dan fraksi sebanyak 2.000 mg dan dilarutkan dengan 20 ml pelarut.

- b. Larutan Pengenceran Seri Konsentrasi

■ $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$

- 500 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$2000\text{ppm} \times V_1 = 500\text{ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{500 \times 10}{2000}$$

$$V_1 = 2,5 \text{ ml}$$

- 750 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$2000\text{ppm} \times V_1 = 750 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{750 \times 10}{2000}$$

$$V_1 = 3,75 \text{ ml}$$

- 1000 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$2000\text{ppm} \times V_1 = 1000 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{1000 \times 10}{2000}$$

$$V_1 = 5 \text{ ml}$$

- 1250 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$2000\text{ppm} \times V_1 = 1250 \text{ pm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{1250 \times 10}{2000}$$

$$V_1 = 6,25 \text{ ml}$$

- 1500 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$2000\text{ppm} \times V_1 = 1500\text{ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{1500 \times 10}{2000}$$

$$V_1 = 7,5 \text{ ml}$$

3. Larutan Vitamin C

a. Larutan Induk I

■ $100 \text{ ppm} = \text{mg/ml}$

$$100 \text{ ppm} = 5.000 \text{ mg} / 50\text{ml}$$

$$= 100 \text{ ml}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara ditimbang vitamin C sebanyak 50mg dan dilarutkan dengan 50 ml pelarut.

b. larutan pengenceran seri konsentrasi

• 5 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \text{ ppm} \times V_1 = 5 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{100 \text{ ml}}$$

$$V_1 = 0,5 \mu\text{l}$$

• 10 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \text{ ppm} \times V_1 = 10 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{10\text{ppm} \times 10 \text{ ml}}{100 \text{ ml}}$$

$$V_1 = 1 \mu\text{l}$$

• 15 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \text{ ppm} \times V_1 = 15 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{15 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{100 \text{ ml}}$$

$$V_1 = 1,5 \mu\text{l}$$

• 25 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \text{ ppm} \times V_1 = 25\text{ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{25 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{100 \text{ ml}}$$

$$V_1 = 2,5 \mu\text{l}$$

• 30 ppm

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \text{ ppm} \times V_1 = 30 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{30 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{100 \text{ ml}}$$

$$V_1 = 3 \mu\text{l}$$

Lampiran 4. Perhitungan Rendamen Ekstrak

1. Ekstrak Partisi N-heksan

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{1,804 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100 \% = 9,02 \%$$

1. Ekstrak Partisi Aquadest

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{25,515 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100 \% = 127,575\%$$

Lampiran 5. Perhitungan % inhibisi

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Abs.Blanko} - \text{Abs.Sampel}}{\text{Abs.Blanko}} \times 100\%$$

1. Ekstrak Fraksi N-heksan

a. Panjang Gelombang 497 nm

- Konsentrasi 500 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,772 - 0,469}{0,772} \times 100\% \\ = 0,392$$

- Konsentrasi 750 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,772 - 0,457}{0,772} \times 100\% \\ = 0,408$$

- Konsentrasi 1000 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,772 - 0,457}{0,772} \times 100\% \\ = 0,408$$

- Konsentrasi 1250 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,772 - 0,443}{0,772} \times 100\% \\ = 0,426$$

- Konsentrasi 1500 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,772 - 0,448}{0,772} \times 100\% \\ = 0,419$$

b. Panjang Gelombang 517 nm

- Konsentrasi 500 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,875 - 0,517}{0,875} \times 100\% \\ = 0,409$$

- Konsentrasi 750 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,504}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,424\end{aligned}$$

- Konsentrasi 100 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,504}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,424\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1250 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,490}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,44\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1500 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,491}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,438\end{aligned}$$

c. Panjang Gelombang 527 nm

- Konsentrasi 500 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,490}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,411\end{aligned}$$

- Konsentrasi 750 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,476}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,427\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1000 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,477}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,426\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1250 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,461}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,445\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1500 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,832-0,465}{0,832} \times 100\%$$

2. Ekstrak Fraksi Aquadest

a. Panjang Gelombang 497 nm

- Konsentrasi 500 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,502}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,349\end{aligned}$$

- Konsentrasi 750 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,544}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,295\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1000 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,497}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,356\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1250 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,587}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,239\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1500 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,657}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,148\end{aligned}$$

b. Panjang Gelombang 517 nm

- Konsentrasi 500 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,515}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,411\end{aligned}$$

- Konsentrasi 750 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,563}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,356\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1000 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,519}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,406\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1250 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,595}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,32\end{aligned}$$

- Konsentrasi 1500 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,679}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,224\end{aligned}$$

b. Panjang gelombang 527 nm

- Konsentrasi 500 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,481}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,421 \end{aligned}$$

- Konsentrasi 750 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,527}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,366 \end{aligned}$$

- Konsentrasi 1000 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,486}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,415 \end{aligned}$$

- Konsentrasi 1250 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,557}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,330 \end{aligned}$$

- Konsentrasi 1500 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,650}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,218 \end{aligned}$$

2. Vitamin C

a. Panjang Gelombang 497 nm

- Konsentrasi 5 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,665}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,138 \end{aligned}$$

- Konsentrasi 10 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,605}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,216 \end{aligned}$$

- Konsentrasi 15 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,570}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,261 \end{aligned}$$

- Konsentrasi 25 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,445}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,423 \end{aligned}$$

- Konsentrasi 30 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,772-0,385}{0,772} \times 100\% \\ &= 0,501\end{aligned}$$

b. Panjang gelombang 517 nm

- Konsentrasi 5 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,746}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,147\end{aligned}$$

- Konsentrasi 10 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,678}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,638\end{aligned}$$

- Konsentrasi 15 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,638}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,27\end{aligned}$$

- Konsentrasi 25 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,491}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,438\end{aligned}$$

- Konsentrasi 30 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,875-0,420}{0,875} \times 100\% \\ &= 0,52\end{aligned}$$

c. Panjang gelombang 527 nm

- Konsentrasi 5 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,709}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,123\end{aligned}$$

- Konsentrasi 10 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,640}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,23\end{aligned}$$

- Konsentrasi 15 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,606}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,271\end{aligned}$$

- Konsentrasi 25 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,466}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,439\end{aligned}$$

- Konsentrasi 30 ppm

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,832-0,397}{0,832} \times 100\% \\ &= 0,522\end{aligned}$$

Lampiran 6. Perhitungan IC_{50}

1. Perhitungan IC_{50} Sampel

Melalui persamaan Linear

- $y = ax + b$

- $ax = y - b$

- $x = \frac{y - b}{a}$

a. Ekstrak N-heksan Panjang Gelombang 497nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,0072$
 $b = 0,0389$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}x &= \frac{y - b}{a} \\ x &= \frac{50 - 0,0389}{0,0072} \\ &= 6,890 \text{ ppm}\end{aligned}$$

b. Ekstrak N-heksan Panjang Gelombang 517 nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,0074$
 $b = 0,4048$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}x &= \frac{y - b}{a} \\ x &= \frac{50 - 0,4048}{0,0074} \\ &= 6,702 \text{ ppm}\end{aligned}$$

c. Ekstrak N-heksan Panjang Gelombang 527 nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,0078$
 $b = 0,4066$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y - b}{a}$$

$$x = \frac{50 - 0,4066}{0,0078}$$

$$= 6,358 \text{ ppm}$$

d. Ekstrak Aquadest Panjang Gelombang 497 nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,0458$
 $b = 0,4148$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y - b}{a}$$

$$x = \frac{50 - 0,4148}{0,0458}$$

$$= 1,082 \text{ ppm}$$

e. Ekstrak Aquadest Panjang Gelombang 517 nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,041$
 $b = 0,4664$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y - b}{a}$$

$$x = \frac{50 - 0,4664}{0,041}$$

$$= 1,208 \text{ ppm}$$

f. Ekstrak Aquadest Panjang Gelombang 527 nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,0562$
 $b = 0,5386$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y - b}{a}$$

$$x = \frac{50 - 0,5386}{0,0562}$$

$$= 880,096 \text{ ppm}$$

2. Perhitungan IC50 Vitamin C

a. Ekstrak Vitamin C Panjang Gelombang 497 nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,0933$
 $b = 0,0279$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{y - b}{a} \\
 x &= \frac{50 - 0,0279}{0,0933} \\
 &= 535,606 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

b. Ekstrak Vitamin C Panjang Gelombang 517 nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,0956$
 $b = 0,0338$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{y - b}{a} \\
 x &= \frac{50 - 0,0388}{0,0956} \\
 &= 522,658 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

c. Ekstrak Vitamin C Panjang Gelombang 527 nm

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,1007$
 $b = 0,0149$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{y - b}{a} \\
 x &= \frac{50 - 0,0149}{0,1007} \\
 &= 496,37 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

Lampiran 7. Gambar Penelitian



Gambar 18. Sampel Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*)



Gambar 19. Ekstrak Sampel dengan Metode Maserasi



Gambar 20. Proses Evaporasi menggunakan Alat *Rotary Evaporator*



gambar 21. Proses Partisi Ekstrak Metanol dan N-heksan



Gambar 22. Partisi Ekstrak Aquades dengan Etil Asetat



Gambar 23. Analisis Aktivitas Antioksidan pada Ekstrak Vitamin C



Gambar 24. Proses Analisis Sampel Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Amalianur Nawawi akrab dipanggil amel, lahir di Watampone pada Tanggal 15 November 2001, anak kelima dari 6 bersaudara. Anak dari Ayahanda (alm) Muh. Nawawi dan Ibunda Kartini H. Penulis memulai Pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 6/79 Manurungg Tahun 2008 dan selesai pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTsN Watampone dan selesai pada tahun 2016, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Watampone, penulis mengambil Jurusan IPA dan selesai Pada Tahun 2019. Penulis Kembali melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih Jurusan Farmasi. Be your self.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R