

**ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN
KEKURANGAN ENERGI KRONIS (KEK) PADA IBU HAMIL
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI SABRINA

NIM: 70600120027

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Sabrina
NIM : 70600120027
Tempat/Tgl Lahir : Aluppage Soppeng, 11 Desember 2001
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Minasa Upa Blok M7 Nomor 23
Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Februari 2024



Andi Sabrina

NIM : 70600120027

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Andi Sabrina, NIM 70600120027, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: “Analisis Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember Tahun 2023”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 19 Februari 2024

Pembimbing I

Dr. dr. Rosdiana Rahim, M. Kes

Pembimbing II

dr. Purnamaniswaty Yunus, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Analisis Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember Tahun 2023**" yang disusun oleh Andi Sabrina, NIM 70600120027, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Februari 2024, bertepatan dengan 7 Sha'ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 16 Februari 2024

7 Sha'ban 1445 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed	(.....)
Pembimbing I	: dr. Rosdianah Rahim, M. Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Purnamaniswaty Yunus, M. Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Iip Larasati, MARS	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Abd. Rahman, M. Ag	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember Tahun 2023**” ini dengan baik dan lancar.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus terutama kepada kedua orang tua yakni ayahanda H. A. Zainuddin, S.Ip dan ibunda Hj. Halawiah, S.Pd serta semua anggota keluarga, karena telah memberikan bantuan dan dukungan selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi penelitian ini, dan secara khusus peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya.
2. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. Ibu dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Ibu dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter, serta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes. selaku pembimbing I, dan dr. Purnamaniswaty, M. Kes. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. dr. Iip Larasati selaku penguji I, dan Prof. Dr. Abd. Rahman, M. Ag selaku penguji keagamaan yang telah memberikan masukan, arahan, serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Saudara saudara peneliti, Andi Rahmadani, S.Kep., Ns. dan Andi Nurhaedah, S. Stat. yang telah mendoakan dan memberi motivasi bagi penulis sekaligus .
7. Sahabat-sahabat peneliti, Rifdha Luthfianti H, Resky Liyani Syam, Sri Deviana Kurniawati, Fakhiratunnisa Amini, Elvirazana Kurnia Sari Putri, Dina Muliana dan Nurliana sebagai sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat melalui semua tantangan dengan baik.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis mengakui masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Makassar, 12 Januari 2024

Andi Sabrina


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis.....	7
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kehamilan	17
B. Kekurangan Energi Kronik	17
C. Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik.....	28
D. Integrasi Keislaman.....	32
E. Kerangka Teori.....	36
F. Kerangka Konsep.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian.....	38
B. Waktu dan Tempat Penelitian	38

C.	Variabel Penelitian	38
D.	Populasi dan Sampel Penelitian	39
E.	Teknik Pengambilan Sampel.....	40
F.	Instrumen Penelitian.....	41
G.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
H.	Alur Penelitian	43
I.	Penyajian Data	43
J.	Etika Penelitian	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B.	Hasil Penelitian	45
C.	Pembahasan.....	52
D.	Keterbatasan Penelitian.....	65
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN.....		67

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.1 Jumlah Kasus Ibu Hamil KEK Tahun 2020-2022	4
--	---




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	8
Tabel 1.2 Kajian Teori	12
Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Karakteristik ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.....	39
Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Variabel Kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 .	40
Tabel 4.3 Analisis Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023	41
Tabel 4.4 Analisis Hubungan Pendapatan dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023	42
Tabel 4.5 Analisis Hubungan Asupan Makanan dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023	43
Tabel 4.6 Analisis Hubungan Riwayat Penyakit dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 .	43
Tabel 4.7 Analisis Hubungan Paritas Ibu dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023	44

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	36
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	37
Bagan 3.1 Alur Penelitian	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kehamilan ialah masa yang sangat krusial, karena masa ini berperan dalam menentukan kualitas anak-anak pada generasi yang akan datang. Kualitas anak di masa depan, dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak masih di dalam kandungan. Selama masa kehamilan, kebutuhan nutrisi memiliki peranan yang sangat penting, karena akan memengaruhi kondisi janin dan ibu hamil (Nurvembrianti and Purnamasari, 2021). Gizi yang cukup juga sangat diperlukan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin, perubahan metabolisme tubuh ibu hamil, persiapan persalinan, serta persiapan menyusui. Oleh karena itu, diperlukan zat gizi yang beragam dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh agar metabolisme tubuh dapat berjalan dengan baik (Ihtirami, Rahma and Tihardimanto, 2021). Pemenuhan gizi tidak hanya dilihat dari porsi saja tetapi juga dari kandungan gizi makanan yang dikonsumsi (Nurvembrianti and Purnamasari, 2021).

Ibu hamil dengan status gizi yang baik, sangat berpeluang besar melahirkan bayi yang sehat, begitu pula sebaliknya, ibu hamil dengan status gizi yang buruk berisiko menyebabkan kematian ibu saat persalinan maupun mengakibatkan kelainan pada janinnya. Buruknya status gizi karena kurangnya asupan makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh dapat disebut sebagai kekurangan energi kronik (Bela, 2019). Badan lemas, wajah pucat, serta ukuran lingkaran lengan atas (LILA) ≤ 23 cm merupakan penanda bahwa ibu hamil tersebut mengalami kekurangan energi kronis. Ibu

hamil yang mengalami KEK beresiko mengalami gangguan selama kehamilannya, yang berdampak pada kesehatan janin dan bisa memicu kelahiran bayi sebelum waktunya atau prematur (Ferawati, 2019).

Ada banyak faktor yang berkaitan dengan KEK pada ibu hamil. Faktor tersebut ialah paritas, jarak kehamilan, status ekonomi dan pendapatan keluarga, asupan gizi, pendidikan, dan pengetahuan, serta usia ibu hamil, bahkan riwayat penyakit yang pernah diderita ibu hamil juga ikut berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian KEK pada ibu hamil (Anjelika, Ihsan and Dammalewa, 2021). Berdasarkan penelitian Priska tahun 2019 menyatakan pula bahwa dukungan petugas kesehatan terhadap ibu hamil KEK turut berpengaruh sebesar 58% terhadap perbaikan gizi ibu hamil (Priska Mulyani Putri Gulo, 2019). Menurut penelitian Denilson tahun 2022 mendapatkan hasil penelitian bahwa usia, penyakit infeksi, serta jarak kelahiran terhadap Kejadian KEK, dan hanya tingkat pengetahuan ibu hamil yang berpengaruh 62% terhadap kejadian KEK pada ibu hamil. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilis dkk (2021) menyatakan bahwa paritas, serta jarak kehamilan ibu hamil berpengaruh dan berhubungan secara signifikan terhadap kejadian KEK pada ibu hamil (Suryani1 *et al.*, 2021).

Kekurangan energi kronik disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Menurut data dari World Health Organization (WHO), prevalensi kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di seluruh dunia mencapai 35-75%, dan rata rata angka kejadian kasus KEK dialami pada trimester ketiga kehamilan. WHO juga mengungkapkan bahwa 40% kekurangan energi kronik sangat berkaitan dengan kematian ibu hamil (WHO, 2018).

Jumlah kasus KEK di dunia cukup besar yakni 15-47% dinilai dari BMI < 18,5. Berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai negara, tercatat negara dengan kasus tertinggi dialami oleh Bangladesh yakni 47%, sedangkan Indonesia menjadi urutan keempat tertinggi dengan prevalensi kasus sebesar 35,5% dan yang paling rendah adalah Thailand dengan prevalensi 15-25% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018 mengungkapkan bahwa angka kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil yang ada di Indonesia cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 17,3%, angka ini menurun jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013 yang sebesar 24,2% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Meskipun mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, kejadian ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis mengalami peningkatan selama setahun terakhir (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan data laporan rutin kementerian kesehatan tahun 2020 yang terkumpul dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, menunjukkan dari 4.656.382 ibu hamil yang diukur lingkaran lengan atasnya (LILA), didapatkan sekitar 451.350 ibu hamil atau 9,7% ibu hamil mengalami KEK, sementara target tahun 2020 adalah 16%, maka persentase bumil KEK di Indonesia termasuk masalah kesehatan masyarakat kategori ringan (< 10 %). Meskipun KEK di Indonesia sudah tergolong ringan, akan tetapi KEK masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan karena KEK pada ibu hamil bisa memicu timbulnya komplikasi kehamilan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tercatat bahwa prevalensi tertinggi, kasus KEK pada ibu hamil masih dipegang oleh Nusa Tenggara

Timur yakni 24,3% kasus, kemudian Papua di urutan kedua yaitu 19,6% kasus, sedangkan Sulawesi Selatan berada di posisi kesepuluh dengan persentase kasus sebesar 13,8% atau sejumlah 62.287 jiwa (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Badan Pusat Statistik Kota Makassar melaporkan tentang jumlah ibu hamil yang mengalami KEK cenderung tidak stabil, kadang tinggi kadang pula rendah, dinilai jumlah kasus yang terjadi dalam 3 tahun terakhir sesuai uraian dalam grafik berikut.

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Ibu Hamil KEK Tahun 2020-2022



Data terbaru Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2022 mencatat, ibu hamil yang mengalami KEK di beberapa puskesmas kota Makassar cukup tinggi. Prevalensi tertinggi terdapat di Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 126 kasus, disusul oleh Puskesmas Bara-Barayya sebanyak 97 kasus dan Puskesmas Rappokalling terdapat 93 kasus ibu hamil yang menderita KEK, sehingga peneliti memilih Puskesmas Kassi-Kassi sebagai lokasi penelitian (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2022).

Ibu hamil yang mengalami KEK sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya, sehingga hal itu dapat memengaruhi “*Golden Age Periode*” yaitu 1000 hari awal kehidupan, mulai dari 270 hari

selama dalam kandungan hingga bayi lahir sampai usia 730 hari atau 2 tahun. Oleh sebab itu, upaya pencegahan sangat diperlukan untuk mengurangi kejadian KEK untuk ibu hamil agar tercipta generasi yang berkualitas, sehat lahir batin, dengan tumbuh kembang yang optimal, sehingga dapat menghindarkan kita dari keturunan yang lemah (Ramli, Alifia and Delima, 2023).

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa/4:9 yakni :

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya).” (Departemen Agama RI, 2012)

Quraish Shihab dalam *tafsir al-Misbah* menjelaskan ayat tersebut dalam konteks pemberian harta warisan kepada keturunan dengan maksud agar mencegah kondisi lemah ekonomi pada anak dan sebagai aset anak di masa yang akan datang sepeninggal orang tua. Kata ضِعْفًا pada ayat tersebut berasal dari kata ضَعْفَ yang menunjukkan makna lawan dari kata kuat, dan jika disebutkan kalimat *kaum dhuafa'* maka bermakna kaum yang lemah secara finansial, maka perlu untuk diberikan bantuan seperti sedekah (Shihab, 2005). Sementara itu, dalam kitab *Mu'jam al-Wasit* menjelaskan kata ضَعْفَ sebagai keadaan lemah dari seseorang, kurus karena penyakit, berkurangnya kekuatan dan kesehatannya (Mustafa and Dkk, no date). Dari penjelasan makna kata *lemah* tersebut, maka dapat dipahami secara kontekstual bahwa ayat tersebut juga menganjurkan kepada orang tua agar menghindari menghasilkan keturunan yang lemah, baik secara fisik maupun jiwa.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas gizi melalui “Gerakan Seribu Hari Awal Kehidupan” untuk membantu dalam perbaikan gizi dan memperbaiki kualitas anak-anak di masa yang akan datang. Dengan mencegah terjadinya kekurangan gizi pada ibu hamil, maka hal ini senada pula dengan perintah untuk mencegah keturunan yang lemah dan merupakan salah satu bentuk usaha untuk membentuk generasi umat yang kuat sesuai dalam anjuran Allah Swt. dalam QS. An-Nisa/4:9.

Berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa kasus KEK sudah tergolong ringan, akan tetapi KEK masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan, karena KEK pada ibu hamil bisa menimbulkan bahaya pada ibu hamil maupun kepada janin yang dikandung. Selain itu, masalah KEK pada ibu hamil ini masih perlu dikaji karena berdasarkan tren jumlah kasus KEK dari tahun ke tahun masih belum stabil (Badan Pusat Statistika Makassar, 2022).

Allah swt. juga telah memperingatkan kita dalam QS. An-Nisa/4:9 untuk memperbaiki keturunan dengan cara mencegah keturunan yang lemah, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan perbaikan gizi kepada ibu hamil agar janin yang dikandungnya dapat tumbuh dengan baik dan sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah besar risiko dari faktor pengetahuan ibu terhadap kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar ?

2. Bagaimanakah besar risiko dari faktor pendapatan terhadap kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar ?
3. Bagaimanakah besar risiko dari faktor asupan makanan yang masuk ke tubuh ibu terhadap kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar ?
4. Bagaimanakah besar risiko dari faktor riwayat penyakit kronik terhadap kejadian kekurangan energi kronis pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar ?
5. Bagaimanakah besar faktor risiko dari faktor paritas ibu terhadap kejadian kekurangan energi kronis pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)
 - a. Pengetahuan ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
 - b. Pendapatan bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
 - c. Asupan makanan ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
 - d. Riwayat penyakit kronik ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
 - e. Paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Variable Penelitian	Definisi operasional	Kriteria objektif	Cara Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Pengetahuan ibu hamil	Hal-hal yang diketahui oleh ibu hamil tentang Kekurangan Energi Kronik yang dinilai dari jawaban yang terdapat dalam kuesioner (Fitri, 2021).	Baik : 76-100 % benar Cukup : 56-75% benar Kurang : < 55% benar	Kuesioner	Ordinal
2.	Pendapatan	Keseluruhan pendapatan yang didapatkan dalam satu bulan yang dinilai berdasarkan standar Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 (Sulaiman, 2022).	Tinggi: >Rp 3.385.145 /bulan Rendah: < Rp 3.385.145/bulan	Kuesioner	Ordinal

No	Variable Penelitian	Definisi operasional	Kriteria objektif	Cara Ukur	Skala
Variabel Independen					
3.	Asupan makanan	Konsumsi makanan yang masuk kedalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang dinilai dari kuesioner (Nurvembrianti and Purnamasari, 2021).	Terpenuhi: Bila asupan melebihi rata rata skor FFT (560) Tidak Terpenuhi: Bila asupan kurang dari rata rata skor FFT	Kuesioner	Nominal
4	Riwayat penyakit kronik	Kondisi medis meliputi penyakit yang telah lama diderita, maupun perawatan yang diterima, dilihat dari kuesioner (Dennylson, 2022).	Ada : bila ada riwayat penyakit kronik Tidak ada : bila tidak ada riwayat penyakit kronik	Kuesioner	Nominal
5	Paritas	Jumlah kelahiran hidup seorang wanita yang dinilai dari data yg terdapat di buku KIA (Dennylson, 2022).	Berisiko : > 3 kelahiran hidup Tidak berisiko : < 3 kelahiran hidup	Buku KIA	Nominal

No	Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Cara Ukur	Skala
Variabel Dependen					
1	Kekurangan Energi Kronik pada ibu hamil	Kurang gizi ibu hamil karena kurangnya asupan nutrisi yang dinilai dari ukuran Lingkar Lengan Atas yang tertera di buku KIA (Lestari, 2021).	Kriteria objektif KEK : LILA < 23,5 cm. Tidak KEK : LILA ≥ 23,5 cm.	Pita LILA	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang faktor risiko kejadian KEK yakni pengetahuan ibu hamil, pendapatan, asupan makanan dan riwayat penyakit kronik, serta paritas terhadap kejadian KEK pada ibu hamil. Data yang digunakan meliputi data primer yang diambil melalui kuesioner serta data sekunder dari buku KIA.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil
1.	Uwu Hani, Luluk Rosida (2018)	Gambaran Umur dan Paritas pada Kejadian KEK	<i>Cross sectional</i>	72 ibu hamil yang mengalami KEK	Usia < 20 tahun dan atau > 35 tahun yaitu masuk dalam kategori usia beresiko tinggi mengalami KEK. Paritas seseorang turut berpengaruh terhadap kejadian KEK.
2.	Lilis Suryani, Riski Merisa Sari, Rini Gustina, Heru	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil	<i>cross sectional</i>	369 ibu hamil.	Hasil analisis menunjukkan bahwa jarak kehamilan dan paritas memiliki hubungan signifikan dengan

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil
	Listiono (2021)				terjadinya kekurangan energi kronik, sedangkan usia ibu hamil tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan terjadinya kekurangan energi kronik.
3.	Priska Mulyani Putri Gulo (2019)	Faktor-Faktor Terkait Kejadian Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Puskesmas Rawat Inap Moro'o Nias Barat Tahun 2019"	<i>cross sectional</i>	39 orang	Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara umur, pengetahuan, pola konsumsi, ekonomi keluarga dan petugas kesehatan dengan kejadian KEK, sedangkan

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil
					paritas tidak ada hubungan dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Non Rawat Inap Moroo tahun 2019.
4.	Nurkhaira dkk (2019)	Analisis Faktor Risiko Kekurangan Energi Kronis Ibu Hamil di Kota Pare-Pare	<i>Cross Sectional</i>	63 ibu hamil	Terdapat pengaruh antara usia ibu, jarak kehamilan, terdapat pengaruh pantang makan terhadap risiko KEK dan tidak terdapat pengaruh asupan gizi dan terhadap risiko KEK ibu hamil di Kota Parepare.

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil
5.	Ardianti Lestari (2021)	Faktor Risiko Kurang Energi Kronis Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Gunungpati	Observasional analitik dengan rancangan Case-control	Sampel yang ditetapkan Sebesar 35 kasus dan 35 kontrol dengan teknik Purposive sampling	Status gizi sebelum hamil, penyakit penyerta kehamilan tidak direncanakan, stat pekerjaan saat hamil dan Pendapatan keluarga merupakan faktor risiko KEK pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Gunungpati

F. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk menganalisis faktor risiko kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.
2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.

3. Untuk mengetahui gambaran pendapatan keluarga pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar
4. Untuk mengetahui gambaran asupan makanan pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar
5. Untuk mengetahui gambaran riwayat penyakit kronik pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar
6. Untuk mengetahui gambaran paritas pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar
7. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu hamil terhadap kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.
8. Untuk mengetahui hubungan pendapatan terhadap kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.
9. Untuk mengetahui hubungan asupan makanan terhadap kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.
10. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit terhadap kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.
11. Untuk mengetahui hubungan paritas terhadap kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman tentang alur penelitian, dan pendidikan serta dapat menerapkan ilmu ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dibidang kesehatan utamanya mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan KEK pada ibu hamil.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait kesehatan ibu dan anak.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat utamanya pada ibu hamil dan keluarganya tentang KEK, penyebab, faktor risiko KEK, gejala yang dapat timbul dan bagaimana cara mencegah KEK dan hal-hal yang berhubungan dengan KEK, dan diharapkan agar ibu hamil dapat lebih memperhatikan kondisinya.

4. Manfaat Bagi Instansi

Menambah referensi bacaan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai faktor risiko KEK pada ibu hamil, sehingga dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kehamilan

Proses kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum kemudian terjadi nidasi dan implantasi didalam rahim. Proses kehamilan secara singkatnya ialah proses pembuahan sel telur oleh spermatozoa yang kemudian bernidasi didalam rahim dan berkembang sampai janin lahir. Pada umumnya masa kehamilan berlangsung selama 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) terhitung mulai dari hari pertama haid terakhir (Prawirohardjo, 2014). Selama proses kehamilan, tubuh akan mengalami banyak perubahan, baik dari fisik maupun psikologis ibu. Keadaan kekurangan gizi pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti anemia kronik, berat badan tidak bertambah secara normal, dan rentan terkena infeksi. Gizi kurang tidak hanya berdampak selama masa kehamilan tetapi juga dapat memengaruhi proses persalinan yakni beresiko mengalami partus macet atau persalinan sulit, bayi lahir prematur, dan perdarahan hebat saat persalinan (Prawirohardjo, 2014).

B. Kekurangan Energi Kronik

1. Definisi Kekurangan Energi Kronik

Status gizi merupakan hasil dari keseimbangan gizi dari tubuh seseorang yang dinilai dari variable tertentu, atau perwujudan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh (Rahim *et al.*, 2021). Status gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehamilannya. Peran kecukupan gizi sangat penting, mulai dari trimester pertama kehamilan hingga seribu hari pertama kehidupan. Gangguan asupan nutrisi pada janin saat itu dikaitkan dengan risiko penyakit kronik di usia

dewasa. Bila ibu hamil memiliki status gizi yang baik sebelum dan selama kehamilan maka mereka cenderung melahirkan bayi yang sehat dan bugar. Seorang ibu hamil yang memiliki tingkat kesehatan dan gizi yang baik akan melahirkan bayi yang sehat dan sebaliknya seorang ibu hamil yang mengalami gangguan gizi sebelum dan selama kehamilan dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah atau disebut BBLR. Dengan kata lain, kualitas bayi yang lahir sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama kehamilan (Rosdiana, 2022). Namun sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah gizi seperti kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik adalah kondisi kekurangan gizi terutama pada energi dan protein yang berlangsung lama sehingga menimbulkan gangguan kesehatan pada Ibu hamil (Jannah and Nadimin, 2021).

Kekurangan energi kronik masih menjadi masalah kesehatan yang menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan energi kronik pada ibu hamil disebabkan oleh kurangnya asupan protein dan energi pada ibu hamil yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan janin (Suryani1 *et al.*, 2021). Seseorang dapat dikatakan menderita risiko KEK jika memiliki lingkaran lengan atas (LILA) yang kurang dari 23,5 cm. Pengukuran lingkaran lengan atas cukup mudah karena hanya memerlukan prosedur dan alat yang sederhana yakni pita LILA dan bila tidak ada pita LILA maka dapat menggunakan pita sentimeter/ metlin yang biasanya dipakai menjahit pakaian (Mulyasari and Purbowati, 2018).

2. Epidemiologi

Gizi ibu hamil merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah dalam perbaikan gizi di masyarakat karena dampaknya yang signifikan terhadap kondisi kesehatan ibu dan janin yang ada dalam kandungannya dan masalah gizi yang dimaksud adalah kekurangan energi kronik.

Kekurangan energi kronik disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Jumlah kasus KEK di dunia cukup besar yakni 15-47% dinilai dari BMI < 18,5. Dari data yang terkumpul dari berbagai negara, tercatat negara dengan kasus tertinggi dialami oleh Bangladesh yakni 47%, sedangkan Indonesia menjadi urutan keempat tertinggi dengan prevalensi kasus sebesar 35,5% dan yang paling rendah adalah Thailand dengan prevalensi 15-25% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Menurut data dari World Health Organization (WHO), prevalensi kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di seluruh dunia mencapai 35-75%, dan rata-rata angka kejadian kasus KEK dialami pada trimester ketiga kehamilan. WHO juga mengungkapkan bahwa 40% kekurangan energi kronik sangat berkaitan dengan kematian ibu hamil (WHO, 2018).

Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018 mengungkapkan bahwa angka kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil yang ada di Indonesia cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 17,3%, angka ini menurun jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013 yang sebesar 24,2% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Meskipun mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, kejadian ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis mengalami peningkatan selama setahun terakhir (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan data laporan rutin tahun 2020 yang terkumpul dari 34 provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan dari 4.656.382 ibu hamil yang diukur lingkaran lengan atasnya (LILA), didapatkan 9,7% atau sekitar 451.350 ibu hamil memiliki Lila < 23,5 cm dan mengalami KEK. Data untuk kasus KEK di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 diperoleh 13,8% atau sekitar 62.287 jiwa.

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase ibu hamil di Indonesia dengan risiko KEK tahun 2020 adalah sebesar 9,7%, sementara target tahun 2020 adalah 16%, maka persentase bumil KEK di Indonesia termasuk masalah kesehatan masyarakat kategori ringan ($< 10\%$) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, jumlah ibu hamil dengan KEK selama 3 tahun terakhir sebanyak 2330 orang pada tahun 2020, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 2221 orang, tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2022 meningkat lagi menjadi 2495 orang. Hal ini menunjukkan adanya tren naik turun dari jumlah kasus yang ada di wilayah makassar ini (Badan Pusat Statistika Makassar, 2022).

Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2022 mencatat, data mengenai ibu hamil yang mengalami KEK di beberapa puskesmas di kota Makassar cukup tinggi, prevalensi tertinggi terdapat di Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 126 kasus, disusul oleh Puskesmas Bara-Barayya sebanyak 97 kasus dan Puskesmas Rappokalling terdapat 93 kasus ibu hamil yang menderita KEK (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2022).

3. Etiologi

Malnutrisi yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu hamil ketika, kebutuhan nutrisi mereka yang meningkat selama kehamilan tidak tercukupi secara memadai. Alasan utama kekurangan energi kronis (KEK) pada wanita hamil biasanya karena kekurangan energi kronik yang dialaminya sebelum hamil. Kehamilan menyebabkan peningkatan kebutuhan metabolisme, sehingga meningkatkan kebutuhan energi dan nutrisi tambahan selama kehamilan sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekurangan energi kronik jika nutrisi tidak tercukupi (Irdayani, 2018).

Kekurangan energi kronik pada ibu hamil disebabkan oleh kurangnya asupan protein dan energi pada ibu hamil yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan janin (Suryani1 *et al.*, 2021). KEK dapat pula terjadi karena tidak terpenuhinya satu atau beberapa nutrisi penting dalam tubuh. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan kekurangan zat gizi ini antara lain asupan zat gizi yang tidak mencukupi, kualitas zat gizi yang buruk, atau kombinasi keduanya. Selain itu, tubuh juga mungkin mengalami kesulitan dalam menyerap dan memanfaatkan nutrisi yang diterimanya. (Setiarto, Karo and Tambaip, 2022).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekurangan energi kronis, seperti nutrisi yang tidak memadai, penyakit menular seperti diare, dan kebersihan lingkungan yang buruk. Ibu hamil yang memiliki asupan makanan cukup dapat mengurangi risiko mengalami gizi buruk, sedangkan ibu hamil yang tidak cukup mengonsumsi makanan akan mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu tentang gizi buruk, serta pendapatan keluarga yang rendah juga memengaruhi kemampuan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Selain itu, usia juga mempengaruhi kejadian KEK, usia ibu hamil yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun berpotensi mempengaruhi pemenuhan dan penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah kelahiran yang tinggi atau kehamilan yang terlalu sering yang dapat menguras cadangan nutrisi tubuh, jarak antar kelahiran yang terlalu dekat tidak memungkinkan bagi ibu yang memiliki bayi untuk memperbaiki gizi tubuh setelah melahirkan, ibu hamil yang bekerja membutuhkan lebih banyak energi karena energi yang tersimpan terbagi antara ibu, janin dan saat proses persalinan (Irdayani, 2018).

4. Patofisiologi

Kebutuhan nutrisi meningkat selama kehamilan sehingga ibu hamil harus meningkatkan pola hidup yang lebih sehat. Pola makan ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janinnya. Kebutuhan nutrisi saat hamil meningkat 15% daripada sebelum hamil, karena nutrisi tersebut diperlukan untuk perkembangan payudara, rahim, volume darah, plasenta, cairan ketuban, dan perkembangan janin (Fitriah *et al.*, 2018). Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan yang berbeda daripada sebelum kehamilan. Pada masa kehamilan di dalam rahim, plasenta mulai terbentuk dalam dua minggu pertama kehamilan, plasenta ini menghasilkan berbagai hormon untuk menjaga keseimbangan, pertumbuhan kehamilan, dan persiapan laktasi. Selama delapan minggu pertama kehamilan hingga tiga puluh delapan minggu kehamilan, plasenta dan janin berkembang dengan sangat cepat, sehingga masa ini dikenal sebagai periode kritis perkembangan janin. Pada periode kritis ini, pertumbuhan dan perkembangan janin sangat cepat dan pembelahan sel terjadi dengan cepat, sehingga sangat rentan terhadap makanan yang tidak sehat atau kekurangan nutrisi sehingga jika nutrisi tubuh tidak terpenuhi maka akan berpengaruh dan berpotensi mengakibatkan KEK pada ibu hamil serta gangguan kesehatan pada janin yang dikandungnya. Risiko KEK di trimester awal, malnutrisi secara signifikan mengakibatkan peningkatan kejadian kelahiran prematur, kematian janin, dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi, sedangkan pada trimester kedua dan ketiga dapat menghambat tumbuh kembang janin sehingga mengakibatkan perkembangan janin tidak sesuai dengan usia kehamilan yang diharapkan (Jannah and Nadimin, 2021). Malnutrisi pada ibu hamil dapat menyebabkan kondisi yang disebut Intrauterine Growth Retardation (IUGR) dan mengakibatkan penurunan

laju pertumbuhan janin, yang seringkali mengakibatkan berat badan lahir rendah (Sudirman, dr. Utami Murti Pratiwi and Sakinah, 2022).

Peningkatan berat badan ibu hamil dapat diukur dengan melihat perkembangan berat badannya, yang dapat berkisar antara 6,5 kg hingga 16,5 kg, dengan rata-rata 12,5 kg, selama 20 minggu terakhir kehamilan, dan apabila terjadi kekurangan gizi secara terus menerus maka hal itulah yang membuat terjadinya kekurangan energi kronik pada ibu hamil (Irdayani, 2018).

5. Penegakan Diagnosis

Diagnosis KEK pada ibu hamil biasanya melibatkan beberapa langkah dan aspek evaluasi. Kekurangan energi kronik dikenal juga dengan istilah "gizi kurang" atau "malnutrisi energi kronik" (Noor *et al.*, 2021). Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menilai kekurangan energi kronik pada ibu hamil :

a. Riwayat Kesehatan dan Gizi :

Beberapa informasi yang relevan dalam penilaian ini meliputi:

- 1) Riwayat Makanan: Pertanyaan tentang pola makan sehari-hari, frekuensi makan, dan jumlah porsi makan dapat memberikan gambaran tentang asupan energi dan nutrisi seseorang. Jika terdapat pola makan yang tidak seimbang atau asupan makanan yang terbatas, ini dapat menunjukkan risiko KEK (Noor *et al.*, 2021).
- 2) Riwayat Kehamilan: Informasi tentang jumlah kehamilan sebelumnya, berat badan pada awal kehamilan, serta penambahan berat badan selama kehamilan sebelumnya dapat membantu memahami risiko KEK pada kehamilan saat ini (Setiarto, Karo and Tambaip, 2022).
- 3) Riwayat Kesehatan dan Penyakit Terkait Gizi: Informasi tentang riwayat kesehatan, termasuk riwayat penyakit yang berhubungan dengan gizi seperti anemia, kekurangan zat besi, atau masalah penyerapan nutrisi,

dapat memberikan petunjuk tentang potensi KEK (Jannah and Nadimin, 2021).

- 4) Gejala Klinis: Pertanyaan tentang gejala-gejala yang mungkin terkait dengan KEK, seperti lelah yang berlebihan, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, kelemahan, atau masalah kesehatan lainnya, dapat membantu dalam penilaian risiko KEK. Tanda-tanda KEK menurut Saifuddin meliputi Lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, badan kurus, rambut kusam, turgor kulit kering, conjungtiva pucat, tensi kurang dari 100 mmHg, Hb kurang dari normal (Jannah and Nadimin, 2021).
 - 5) Selain itu, untuk ibu hamil, ada beberapa parameter spesifik yang menjadi perhatian dalam penilaian status gizi, seperti perubahan berat badan selama kehamilan, pertumbuhan janin, dan perubahan lingkar lengan atas. Semua informasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian awal tentang status gizi dan risiko KEK (Saifuddin *et al.*, 2005)
- b. Pengukuran Antropometri
Dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas ibu hamil. Pengukuran ini membantu mengidentifikasi apakah ada kekurangan berat badan atau gangguan pertumbuhan lainnya yang dapat menandakan KEM (CDC, 2021).
 - c. Evaluasi Asupan Gizi
Evaluasi asupan gizi ibu hamil berdasarkan konsumsi makanan sehari-hari. Informasi ini membantu mengidentifikasi apakah ada kekurangan energi atau nutrisi lainnya (India., 2017).
 - d. Pemeriksaan Fisik
Dilakukan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi gejala fisik yang mungkin terkait dengan kekurangan energi kronik (Fitriah *et al.*, 2018).

e. Pemeriksaan Tambahan (bila diperlukan)

Pemeriksaan tambahan kadang diperlukan untuk menilai KEK yang dialami, pemeriksaan tambahan yang dimaksud, seperti tes darah, untuk menilai status gizi secara lebih mendetail. Tes darah dapat membantu dalam menilai kadar zat besi, vitamin, dan nutrisi penting lainnya (Fitriah *et al.*, 2018).

f. Monitoring Pertumbuhan Janin

Selain mengamati kesehatan ibu, penting juga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan (Fitriah *et al.*, 2018)

g. Penilaian Risiko

Dokter atau petugas kesehatan akan menilai risiko ibu hamil terkait komplikasi kekurangan energi kronik dan dampaknya pada kesehatan ibu dan janin (Setiarto, Karo and Tambaip, 2022)

6. Pencegahan

KEK dapat diatasi dengan pencegahan yang tepat. Pencegahan seperti dengan memperbanyak asupan makanan kaya nutrisi. Makanan yang dimaksud ialah makanan yang kaya zat besi dari sumber hewani (seperti daging, ikan, unggas, hati, dan telur) dan sumber nabati (seperti sayuran berdaun gelap, kacang-kacangan, dan tempe) selain itu, mengonsumsi sayur dan buah yang kaya vitamin C (seperti daun katuk, singkong, bayam, jambu biji, tomat, jeruk, dan nanas) dapat meningkatkan penyerapan zat besi di usus, cara lainnya adalah meningkatkan asupan zat besi dengan mengonsumsi suplemen zat besi (Irdayani, 2018).

7. Tatalaksana

Anak perlu dipersiapkan dengan baik agar bisa berkembang serta tumbuh secara maksimal sesuai dengan perkembangan yang seharusnya. Pemenuhan nutrisi ibu hamil perlu berfokus pada makronutrien, protein, serta mikronutrien, vitamin serta mineral). Zat zat dalam makanan ini ini berperan dalam perkembangan serta pertumbuhan janin dalam kandungan ibu serta sebagai cadangan nutrisi untuk persiapan menyusui sehingga air susu ibu dapat terstimulasi dengan baik. Air susu ibu (ASI) adalah makanan yang penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. ASI jadi nutrisi yang sempurna untuk bayi kelak, karena memiliki komponen, semacam lipid, karbohidrat, protein, vitamin serta mineral (Astuti, Purnamaniswati Yunus and Faradilah, 2021). Ibu hamil yang kekurangan gizi perlu mendapatkan atensi khusus terutama selama kehamilan, semacam dengan pemberian makanan tambahan (PMT) yang diberikan dalam wujud santapan lokal serta PMT manufaktur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Produk Suplementasi Gizi, yang merekomendasikan bahwa program revisi gizi untuk ibu hamil yang mengalami KEK ialah pemberian makanan tambahan seperti berbentuk biskuit. Pilihan makanan tambahan untuk ibu hamil antara lain susu, makanan kaya protein (baik sumber hewani maupun nabati), seperti produk susu, biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang kaya vitamin C, serta sayuran hijau serta berbagai buah dan sayur lainnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan metode pengolahan makanan untuk menjaga kandungan nutrisinya seperti hindari penyimpanan makanan dalam waktu lama, dan jika menyangkut sayuran, gunakan segera setelah persiapan, hindari susu terkena cahaya secara berlebihan, karena dapat mengakibatkan hilangnya vitamin B, serta hindari mengasinkan daging atau ikan sebelum dimasak, dan untuk makanan yang mengandung protein, sebaiknya tidak terkena suhu yang terlalu tinggi selama

memasak (Kemenkes, 2020). Beberapa faktor perlu diperhatikan dalam menentukan gizi seimbang bagi ibu hamil, faktor-faktor ini mencakup kebutuhan selama kehamilan, yang dapat berbeda dari satu orang ke orang lain dan dipengaruhi oleh status gizi dan riwayat kesehatan mereka sebelumnya. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa asupan satu nutrisi dapat mempengaruhi penyerapan atau pemanfaatan nutrisi lain, dan kebutuhan nutrisi dapat berfluktuasi pada berbagai tahap kehamilan. (Ihtirami, Rahma and Tihardimanto, 2021). Selain itu, diperlukan edukasi yang adekuat kepada ibu hamil dan keluarganya agar ia dapat memahami pentingnya konsumsi makanan yang cukup serta sesuai dengan kebutuhan tubuhnya (Faradilah, Jalaluddin and Larasati, 2018).

Upaya lain untuk mengatasi dan menghindari dampak kekurangan energi kronis pada ibu hamil adalah dengan mencoba mengajak ibu hamil memeriksakan kehamilannya sesering mungkin sejak awal kehamilan untuk mengetahui sejak dini terjadinya kekurangan energi kronis (KEK) dan menentukan nutrisi yang dibutuhkan pada ibu hamil (Irdayani, 2018).

8. Komplikasi

Kekurangan energi kronis pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak meningkat secara normal, penyakit infeksi, dan menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu, sedangkan pengaruh kekurangan energi kronis pada proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan yang sulit dan lama, persalinan premature imminen (PPI), perdarahan post partum, serta peningkatan tindakan sectio caesaria. Kekurangan energi kronis pada ibu hamil juga dapat menyebabkan intrauterine growth retardation (IUGR) atau bahkan intrauterine fetal death (IUFD), kelainan kongenital, anemia serta lahir dengan berat badan lahir rendah (Utami *et al.*, 2020).

C. Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik

1. Pengetahuan

Salah satu faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil yaitu pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang zat gizi dalam makanan. Pengetahuan yang dimiliki membuat ibu hamil mampu merencanakan serta menyusun menu yang baik untuk kesehatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan persiapan makanan sehat dan seimbang untuk ibu hamil adalah kemampuan ibu dan keluarga untuk membeli makanan dan pengetahuan tentang gizi (Dafiu, 2017). Rendahnya pengetahuan menyebabkan ibu tidak memahami bagaimana pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil selama kehamilannya. Kebutuhan nutrisi selama kehamilan akan meningkat per hari, meskipun semua orang Indonesia sudah mengetahui manfaat gizi bagi ibu hamil namun sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah gizi (Dennylson, 2022). Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ibu akan memengaruhi pengambilan keputusan dan juga akan berpengaruh pada perilakunya. Ibu dengan pengetahuan gizi yang baik kemungkinan akan memberikan gizi yang cukup pada bayinya, hal ini lebih penting lagi apabila ibu memasuki masa ngidam, yang biasanya perut enggan dimasuki makanan apapun yang bergizi, karena rasa mual yang dirasakan, justru akan memilih makanan dengan rasa segar dan asam. Walaupun dalam kondisi yang demikian apabila seorang ibu memiliki pengetahuan yang baik maka ibu tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan juga bayinya (Fitrianingsih, 2018).

2. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari suatu pekerjaan atau penghargaan yang di berikan berupa material uang. Dalam hal ini, pendapatan keluarga sangat menentukan kualitas dan kuantitas makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari hari dalam keluarga.(Irdayani, 2018). Pendapatan keluarga berperan dalam menentukan status kesehatan seseorang terutama ibu hamil, karena berbanding lurus dengan daya beli keluarga. Keluarga mampu membeli bahan makanan tergantung dari besar kecilnya pendapatan perbulannya. Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi pula jumlah pembelanjannya, dan pemenuhan pangan yang bergizi juga terpenuhi (R, Mustamin and Ipa, 2019).

3. Asupan makanan

Kebutuhan nutrisi meningkat selama kehamilan maka pola makan ibu hamil sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Kebutuhan nutrisi saat hamil meningkat 15% daripada sebelum hamil, karena nutrisi dibutuhkan untuk perkembangan rahim, payudara, volume darah, plasenta, cairan ketuban dan perkembangan janin (Fitriah *et al.*, 2018). Asupan makanan yang tidak adekuat membuat kebutuhan nutrisi ibu hamil menjadi tidak terpenuhi sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekurangan energi kronik. Asupan makanan pada ibu hamil juga biasanya menurun karena kurangnya nafsu makan serta faktor lain yang mengacaukan selera makan ibu hamil seperti bermain gadget saat sedang makan sehingga mengalihkan perhatian ibu hamil untuk lebih memilih melihat gadget untuk bermain sosial media (Muhammad Qadaruddin Abdullah, Abd. Rahman, 2020).

Asupan energi yang kurang akan berdampak pada kurangnya ketersediaan zat gizi lainnya seperti lemak dan protein yang merupakan sumber energi alternatif. Apabila tubuh kekurangan kandungan energi, maka protein dan lemak akan mengalami perubahan untuk menjadi sumber energi, sehingga kedua zat ini akan menurun fungsinya. Apabila ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan terjadi perubahan berat badan dan kerusakan jaringan tubuh. Energi dalam tubuh manusia dapat timbul karena adanya pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak,

sehingga manusia membutuhkan zat-zat makanan yang cukup untuk memenuhi kecukupan energinya. Apabila asupan energi tidak adekuat, maka cadangan lemak dalam tubuh akan digunakan. Bila cadangan lemak digunakan secara terus menerus, maka protein yang terdapat pada hati dan otot akan diubah menjadi energi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya deplesi masa otot yang ditandai dengan pengukuran lingkaran lengan atas $> 23,5$ cm (Dictara *et al.*, 2020).

4. Riwayat Penyakit

Penyakit yang berlangsung lama dapat menjadi awal mula terjadinya kurang gizi akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan dan peningkatan kebutuhan zat gizi karena adanya penyakit (Fitrianingtyas, Pertiwi and Rachmania, 2018).

Malnutrisi dapat membuat tubuh lebih mudah terkena penyakit menular dan juga infeksi akan memudahkan penurunan status gizi dan mempercepat malnutrisi, mekanismenya adalah :

- a. Penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan, menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit.
- b. Peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah dan perdarahan yang terus menerus.
- c. Meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh.

Efek penyakit dengan KEK tergantung pada tingkat keparahannya, jika penyakit tersebut masih akut dan derajat keparahan penyakit masih rendah, maka itu tidak terlalu mempengaruhi status gizi ibu hamil. Sebaliknya, jika penyakit sudah kronis dan berlangsung lama, maka dapat mempengaruhi status gizi ibu (Dennylson, 2022).

5. Paritas

Ibu primipara berisiko mengalami kekurangan energi kronis dimana ibu primipara kurang memiliki pengetahuan tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan dan ibu primipara tidak memiliki pengalaman hamil (Dennylson, 2022). Ada hubungan antara paritas dengan kejadian kekurangan energi kronis jika ibu terlalu sering hamil dan melahirkan, ibu akan memiliki banyak anak, sehingga ketika ibu memiliki banyak anak, kebutuhan hidup semakin meningkat terutama dalam hal kebutuhan nutrisi. Ibu yang memiliki banyak anak dengan ekonomi kurang akan memiliki kesulitan memperhatikan dirinya sendiri, ditambah jika kesibukan yang berlebihan seperti mengurus rumah tangga dan harus berbagi makanan dengan anggota keluarga sementara ibu hamil memerlukan membutuhkan lebih banyak nutrisi (Irdayani, 2018).

6. Usia

Semakin muda dan semakin tua umur seseorang ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak karena selain digunakan pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri, juga harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung. Sedangkan untuk umur tua perlu energi yang besar juga karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal, maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung. Sehingga usia yang paling baik adalah lebih dari 20 tahun dan kurang dari 35 tahun, dengan diharapkan gizi ibu hamil akan lebih baik (Nurkhaira Mazita J, Nuddin and Henni Kumaladewi Hengky, 2019).

7. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik ialah rangkaian gerak tubuh yang menggunakan tenaga atau energi. Jenis aktivitas fisik yang sehari-hari dilakukan antara lain berjalan, berlari, olahraga, mengangkat dan memindahkan benda, mengayuh sepeda dan lain-lain. Setiap kegiatan fisik menentukan energi yang berbeda menurut lamanya intensitas dan sifat kerja otot. Aktivitas fisik menentukan kondisi kesehatan seseorang. Kelebihan energi karena rendahnya aktivitas fisik dapat meningkatkan obesitas. Oleh karena itu, angka kebutuhan energi individu disesuaikan dengan aktivitas fisik. Aktritas fisik dan Angka Vicobolime Basal (ANB) atau Basal Metabohe Rate (BMR) merupakan komponen utama yang menentukan kebutuhan energi AMB dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin BB dan TB. Namun menurut penelitian tingkat aktivitas fisik memiliki pengaruh terhadap kejadian KEK pada ibu hamil. menunjukkan bahwa ibu hamil dengan tingkat aktivitas fisik yang sedang - berat berisiko mengalami KEK. Akan tetapi Ibu hamil tetap dianjurkan untuk aktivitas fisik ringan dengan memperhatikan kondisi ibu dan janin yang dikandungnya (Rizqi Mufidah, Dina Rahayuning P, 2019).

D. Integrasi Keislaman

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah swt. kepada hambanya, sehingga ia secara langsung menjadi amanah dan titipan kepada hamba yang dianugerahi untuk menjaga keturunannya dengan baik. Dalam sebuah riwayat pada kitab *Sunan Abu Dawud* dijelaskan bahwa Rasulullah saw. menyukai ummatnya yang memiliki banyak keturunan (Dawud, no date). Namun, pada dasarnya harapan Rasulullah saw. tidak hanya seputar kuantitas keturunan, namun juga perlu memperhatikan kualitasnya baik secara fisik ataupun intelektual. Hal ini dapat diperhatikan dalam QS. al-Nisa/4:9 berikut;

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahnya;

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Departemen Agama RI, 2012)

Kitab Mu'jam al-Wasit ketika menjelaskan kata *ضَعْفٌ* suatu keadaan lemah dari seseorang, kurus karena penyakit, berkurangnya kekuatan dan kesehatannya (Mustafa and Dkk, no date). Namun, dalam hal ini konteks ayat tersebut yakni berkaitan dengan finansial memiliki hubungan erat dengan aspek fisik seorang anak yakni mayoritas anak yang memiliki kekurangan gizi ataupun seorang ibu yang secara berangsur-angsur mengalami kelemahan fisik saat mengandung disebabkan karena kurang diberikan asupan gizi seimbang. Sedangkan dengan perekonomian yang serba kekurangan secara otomatis akan berdampak pada minimnya pemenuhan gizi pada ibu hamil tersebut.

Dari penjelasan makna kata lemah tersebut, maka dapat dipahami secara kontekstual bahwa ayat tersebut juga menganjurkan kepada setiap orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah fisik dan jiwa.

Hal senada juga diungkapkan dalam sabda Nabi saw. dalam kitab Shahih Muslim, yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِخْرَصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَأَسْتَعِينَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya;

“Dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala dari pada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan: 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah: 'Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya.

Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syaitan.” (HR.Muslim)

Al-Nawawi menjelaskan hadis tersebut bahwa Allah swt. menyukai orang mukmin yang kuat (baik fisik ataupun jiwa) karena mereka akan lebih cenderung lebih bersemangat dalam melakukan segala aktifitasnya sehari-hari. Serta kuatnya kondisi seseorang akan memberikan efek lebih fokus dalam memandang terhadap musuh-musuh dalam kehidupan (Al-Huzain and Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, no date). Penulis memahami kata “musuh-musuh dalam kehidupan” yakni segala macam ancaman fisik serta ideologi buruk dalam kehidupan, sehingga perlu kekuatan fisik serta kecerdasan intelektual dalam menghadapi kondisi tersebut.

Ayat selanjutnya sebagai penekanan terkait hal tersebut adalah dalam QS. al-Baqarah/2:168, yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya;

“ Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Departemen Agama RI, 2012)


Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, baik beriman ataupun tidak beriman, baik kelompok besar atau kecil, keluarga, suku, bangsa atau wilayah. Penekanan pertama adalah perintah untuk memakan makanan halal, karena tidak semua yang ada di dunia halal untuk dikonsumsi atau dipergunakan (Shihab, 2005). Makanan halal adalah makanan yang tidak haram. Sedangkan makanan haram disebabkan karena dua macam; pertama, karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; kedua, dari asalnya seperti makanan yang dikonsumsi namun tanpa izin pemilik, atau hasil curian (Shihab, 2005).

Penekanan selanjutnya adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi, karena tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dimaksud dengan halal adalah terbagi menjadi empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh, serta tidak semua makanan halal sesuai dengan kondisi masing-masing seseorang. Ada hal yang baik untuk si A yang mempunyai kondisi kesehatan tertentu, dan ada pula yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk orang lain. Ada pula makanan yang halal tapi tidak bergizi dan saat itu ia menjadi kurang baik (Shihab, 2005).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa maksud makanan yang طَيِّبًا (baik) dalam ayat tersebut adalah makanan yang proporsional terhadap setiap individu. Ketika misalnya seseorang mengidap penyakit tekanan darah tinggi, maka baginya tidak baik memakan makanan yang menimbulkan efek buruk terhadap penyakitnya tersebut. Demikian pula kepada ibu hamil, perlu asupan makanan yang sesuai pada keperluan gizi ibu hamil, disinilah pentingnya konsultasi kepada ahli kesehatan/dokter terkait asupan gizi agar dapat mempersiapkan masa-masa kehamilan dan mengantisipasi keturunan yang lemah fisik serta intelektual (Shihab, 2005).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sebab terjadinya kelemahan ibu hamil serta keturunan yang lemah disebabkan karena kondisi finansial yang kurang memadai sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya asupan gizi seimbang seorang ibu hamil.


E. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori


Sumber : (Suryani1 et al., 2021), (Angraini and Dkk, 2021), (Ferawati, 2019)

F. Kerangka Konsep



Keterangan :

 Variabel Independen

 Variabel Dependen

 Variabel yang tidak diteliti

Bagan 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional untuk mengetahui faktor risiko kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Kassi- Kassi Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada 18 Desember 2023 – 10 Januari 2024.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini adalah kejadian KEK pada Ibu Hamil.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu hamil, pendapatan, asupan makanan, riwayat penyakit kronik dan paritas.

D. *Populasi dan Sampel Penelitian*

1. **Populasi**

Populasi merupakan seluruh objek yang ada dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang memeriksakan diri di Puskesmas Kassi- Kassi Kota Makassar tahun 2023 periode Juli-Desember. Jumlah ibu hamil di periode Juli-Desember tahun 2023 sebanyak 767 kasus.

2. **Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan pendekatan *cross sectional*, yaitu pengamatan data-data populasi hanya satu kali pada saat yang bersamaan yang dikenal sebagai data potong lintang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di Puskesmas Kassi- Kassi kota Makassar Periode Juli-Desember tahun 2023 yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Besarnya sampel ditentukan melalui rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{767}{1 + 767(0,1)^2}$$

$$n = \frac{767}{1 + 767(0,01)}$$

$$n = 88,46$$

n = 88,46 dibulatkan menjadi 88 sampel.

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat signifikan (p)

Berdasarkan hasil perhitungan sampel menggunakan rumus slovin maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 88 sampel.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan peneliti.

1. Kriteria Inklusi

Kriterian inklusi adalah kriteria atau ciri ciri yang perlu di penuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel penelitian.

Kriterian inklusi dalam penelitian ini adalah :

- a. Memiliki buku KIA
- b. Status lengkap (data ibu hamil tentang penyakit kronik/Riwayat kesehatan, riwayat pendarahan, kunjungan ibu hamil, pemberian tablet besi, LLA, hemoglobin)
- c. Usia kehamilan trimester 3

2. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kriteria atau ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel.

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :

- a. Usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun.

- b. Ibu hamil yang berdomisili diluar wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi.
- c. Tidak bersedia menjadi responden
- d. Memiliki riwayat KEK sebelum hamil

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai faktor risiko KEK yakni pengetahuan ibu hamil, pendapatan, asupan makanan dan riwayat penyakit kronik terhadap kejadian KEK pada ibu hamil. Data yang digunakan meliputi data primer berupa kuesioner dan data sekunder dari buku KIA.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan terhadap catatan hasil observasi. Peneliti harus memeriksa kelengkapan, kebenaran serta kejelasan data data yang didapatkan.

b. Coding

Tahap *coding* adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah pengolahan data.

c. Tabulating

Langkah *tabulating* adalah tahap untuk mempersiapkan informasi yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel analisis.

d. *Processing*

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk dianalisis. *Processing* dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi ke dalam *Statistical Package For The Social Sciences (SPSS)*.

e. *Cleaning*

Pembersihan data atau *cleaning* adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan.

2. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Data yang dianalisis sebagai berikut :


a. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat memperlakukan semua variabel sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis hubungan antara kedua variabel yang ada.

a. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan metode analisis yang menguji antara korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu variabel independen dengan variabel dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. Analisis data yang digunakan adalah *Chi Square* dengan bantuan *software* uji statistik.

H. Alur Penelitian



Bagan 3.1 Alur Penelitian

I. Penyajian Data

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

J. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan *ethical clearance* maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti :

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien.
3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian dalam pengambilan data.
4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu Puskesmas pemerintah Kota Makassar yakni Puskesmas Kassi – Kassi, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Makassar. Puskesmas Kassi-Kassi didirikan pada tahun 1978 sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat primer yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat, sesuai dengan visi yang menjadi pedomannya yakni “Puskesmas Kassi-Kassi Pemberi Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Nyaman Untuk Semua menuju Masyarakat sehat dan Mandiri”. Puskesmas Kassi-Kassi terletak di jalan Tamalate I No. 43 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Dinkes kota Makassar, 2021).

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar mulai tanggal 18 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di Puskesmas Kassi- Kassi Kota Makassar periode Juli-Desember tahun 2023 yang tercatat sejumlah 1504 orang. Adapun untuk sampel penelitian ini diperoleh dari ibu hamil yang sesuai kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Besarnya sampel ditetapkan berdasarkan rumus slovin dan didapatkan besarnya sampel sebanyak 88 sampel. Desain penelitian yang digunakan ialah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian KEK pada ibu hamil Periode Juli-Desember tahun 2023 di daerah penelitian.

Analisis data dalam penelitian menggunakan aplikasi SPSS, yang diuji analisis univariat kemudian diuji bivariat. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Karakteristik Sampel

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Karakteristik Ibu Hamil di Puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023

Karakteristik	Frekuensi (N)	Persen (%)
Usia Ibu		
20-24 tahun	25	28,4
25-30 tahun	29	33
31-35 tahun	34	38,6
Total	88	100
Pendidikan		
SD	7	8
SMP	9	10,2
SMA	41	46,6
D3/D4	3	3,4
S1	28	31,8
Total	88	100

Sumber : Data Penelitian Periode Juli-Desember tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi karakteristik ibu hamil di puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023, berdasarkan usia ibu hamil didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia lebih dominan didapatkan pada rentan usia 31-35 tahun sebanyak 34 orang (38,6%), kemudian ibu hamil pada rentan usia 25-30 tahun sebanyak 29 orang (33%) dan sebanyak 25 orang (28,4%) pada rentan usia 20-24 tahun. Untuk distribusi karakteristik responden berdasarkan pendidikan didapatkan frekuensi terbanyak terjadi pada ibu hamil dengan pendidikan SMA sebanyak 41 responden (46,6%), kemudian S1 sebanyak 28 orang (31,8%), SMP sebanyak 9 responden (10,2%), SD sebanyak 7 responden (8%), lalu D3/D4 sebanyak 3 orang (3,4%), dan dari data tersebut, dapat dilihat bahwa setiap responden memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi.

2. Analisis Univariat

Uji analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi dari variabel yang diteliti. Adapun hasil dari analisis univariat dari variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Variabel Kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023

Variabel	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Kejadian KEK		
KEK	33	37,5
Tidak KEK	55	62,5
Pengetahuan		
Kurang	14	15,9
Cukup	55	62,5
Baik	19	21,6
Pendapatan		
Tinggi > Rp 3.385.145 /bulan	25	28,4
Rendah < Rp 3.385.145 /bulan	63	71,6
Asupan Makanan		
Terpenuhi (FFQ > 560)	44	50
Tidak Terpenuhi (FFQ < 560)	44	50
Riwayat Penyakit		
Ada	19	21,6
Tidak Ada	69	78,4
Paritas		
Buruk (>3 kelahiran)	36	40,9
Baik (< 3 kelahiran)	52	59,1
Total	88	100%

Sumber : Data Penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tidak mengalami KEK (62,5%) namun angka kejadian KEK pada ibu hamil periode Juli-Desember tahun 2023 di Puskesmas Kassi-Kassi masih cenderung tinggi yang mencapai 37,5% atau sebanyak 33 orang dari 88 total sampel. Kemudian untuk distribusi pengetahuan responden di PKM Kassi-Kassi

Periode Juli-Desember tahun 2023 diperoleh bahwa 55 responden (62,5%) memiliki pengetahuan yang cukup, pengetahuan kurang sebanyak 14 responden (15,9%), lalu sebanyak 19 responden (21,6%) memiliki pengetahuan yang baik, hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan responden sebagian besar sudah cukup (62,5% dari 100%). Berdasarkan distribusi pendapatan ibu hamil didapatkan pendapatan tinggi sebanyak 25 responden (28,4%) sedangkan responden dengan pendapatan rendah mencapai 63 responden (71,6%), hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapatan rendah (71,6% dari 100%). Untuk distribusi data asupan makanan pada responden didapatkan, sebanyak 44 responden (50%) asupan makanannya terpenuhi dan 44 responden (50%) tidak terpenuhi yang berarti bahwa tingkat asupan makanan responden setara. Lalu untuk distribusi responden berdasarkan riwayat penyakit diperoleh hasil 19 responden (21,6%) memiliki riwayat penyakit dan 69 responden (78,4%) tidak memiliki riwayat penyakit, yang menandakan bahwa mayoritas responden tidak memiliki riwayat penyakit (76%). Kemudian untuk data mengenai paritas responden di PKM Kassi-Kassi tahun 2023 diperoleh paritas buruk sebanyak 36 responden (40,9%) sedangkan responden dengan paritas baik sebanyak 52 responden (59,1%) yang menandakan bahwa sebagian besar responden dalam kategori paritas yang baik (59,1% dari 100%).

3. Analisis Bivariat

Uji analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu pengetahuan, pendapatan, asupan makanan, riwayat penyakit, dan paritas. Adapun analisis hubungan antara variabel independen dengan kejadian KEK dilampirkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3 Analisis Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil Periode Juli-Desember tahun 2023

Pengetahuan	Kejadian KEK				Total		P-Value
	Ya		Tidak		N	%	
	N	%	N	%			
Kurang	8	9,1	6	6,8	14	15,9	0,043
Cukup	22	25	33	37,5	55	62,5	
Baik	3	3,4	16	18,2	19	21,6	
Total	33	37,5	55	62,5	88	100	

*Analisis Menggunakan *Chi-Square*
Sumber: Data Primer, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian KEK. Terdapat 8 ibu yang mengalami KEK dan 6 ibu yang tidak KEK, yang memiliki pengetahuan kurang. Terdapat 22 ibu hamil KEK dan 33 ibu yang tidak KEK, yang memiliki pengetahuan cukup. Terdapat 3 ibu hamil KEK dan 16 ibu yang tidak KEK, yang memiliki pengetahuan yang baik. Hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,043 yang berarti lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.

Tabel 4.4 Analisis Hubungan Pendapatan dengan Kejadian KEK pada Ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023

Pendapatan	Kejadian KEK				Total		P-Value	OR	CI 95%
	Ya		Tidak		n	%			
	N	%	N	%					
Tinggi	5	5,7	20	22,7	25	28,4	0,033	0,313	0,104-0,938
Rendah	28	31,8	35	39,8	63	71,6			
Total	33	37,5	55	62,5	88	100			

*Analisis Menggunakan *Chi-Square*
Sumber: Data Primer, 2023

Tabel 4.4 menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan kejadian KEK. Terdapat 5 ibu yang mengalami KEK dan 20 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Terdapat 28 ibu yang KEK dan

35 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan tingkat pendapatan rendah. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,033 yang berarti lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai *Odd Ratio (OR)* sebesar 0,313 dengan CI 95% (0,104-0,938) menunjukkan bahwa ibu dengan pendapatan rendah memiliki risiko 0,265 kali lebih besar untuk mengalami KEK dibandingkan dengan ibu yang berpendapatan tinggi di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.

Tabel 4.5 Analisis Hubungan Asupan Makanan Ibu dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023

Asupan Makanan	Kejadian KEK				Total		P-Value	OR	CI 95%
	Ya		Tidak		n	%			
	N	%	N	%					
Terpenuhi	11	12,5	33	34,0	44	50	0,015	0,333	0,135-0,822
Tidak terpenuhi	22	25	22	23,4	44	50			
Total	33	37,5	55	57,4	88	100			

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel 4.5 menunjukkan hubungan antara asupan makanan dengan kejadian KEK. Terdapat 11 ibu hamil KEK dan 33 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan asupan makanan yang terpenuhi. Terdapat 22 ibu yang KEK dan 22 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan asupan makanan yang tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,015 yang berarti lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara asupan makanan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai *Odd Ratio (OR)* sebesar 0,333 dengan CI 95% (0,135-0,822) menunjukkan bahwa ibu dengan asupan makanan yang tidak terpenuhi berisiko

0,333 kali lebih besar untuk mengalami KEK dibandingkan ibu dengan asupan makanan yang terpenuhi di Puskesmas Kassi-Kassi 2023.

Tabel 4.6 Analisis Hubungan Riwayat Penyakit Ibu dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023

Riwayat Penyakit	Kejadian KEK				Total		P-Value	OR	CI 95%
	Ya		Tidak		n	%			
	N	%	N	%					
Ada	8	9,1	11	12,5	19	21,6			
Tidak ada	25	28,4	44	50	69	78,4	0,640	1,280	0,455-3,602
Total	33	37,5	55	62,5	88	100			

*Analisis Menggunakan *Chi-Square*
Sumber: Data Sekunder, 2023

Tabel 4.6 menunjukkan hubungan antara riwayat penyakit dengan kejadian KEK pada ibu hamil, terdapat 8 ibu hamil KEK dan 11 ibu hamil yang tidak KEK, untuk ibu yang memiliki riwayat penyakit. Terdapat 25 ibu hamil KEK dan 44 ibu hamil tidak KEK, untuk ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,640 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit dengan KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 1,280 dengan CI 95% (0,455-3,602) menunjukkan bahwa ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit juga berisiko 1,167 kali lebih besar untuk mengalami KEK.

Tabel 4.7 Analisis Hubungan Paritas dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023

Paritas	Kejadian KEK				Total		P-Value	OR	CI 95%
	Ya		Tidak		n	%			
	N	%	N	%					
Baik	12	13,6	24	27,3	36	40,9	0,502	0,738	0,304-1,792
Buruk	21	23,9	31	35,2	52	59,1			
Total	33	37,5	55	62,5	88	100			

*Analisis Menggunakan *Chi-Square*
Sumber: Data Primer, 2023

Tabel 4.7 menunjukkan hubungan antara paritas dengan kejadian KEK pada ibu hamil. Terdapat 12 ibu hamil KEK dan 24 ibu hamil tidak KEK, dengan paritas yang baik. Terdapat 21 ibu hamil KEK dan 31 ibu hamil tidak KEK, untuk ibu hamil dengan paritas yang buruk. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,502 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 0,738 dengan CI 95% (0,304-1,792) menunjukkan bahwa ibu dengan paritas yang baik juga berisiko 0,738 kali lebih besar untuk mengalami KEK.

C. Pembahasan

1. Gambaran Kejadian KEK Pada Ibu Hamil

Kehamilan menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh sehingga kebutuhan energi dan zat gizi lainnya selama kehamilan meningkat. Peningkatan energi dan zat gizi tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, penambahan besarnya organ kandungan, serta perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu hamil, sehingga ibu hamil perlu memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuhnya, sebab jika tidak terpenuhi maka ibu hamil berisiko mengalami KEK (Dennylson, 2022). Kekurangan energi kronik pada ibu

hamil adalah keadaan dimana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun/kronis dan mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil. Untuk mengetahui ibu hamil mengalami KEK atau tidak, dilakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), dengan kategori KEK jika pengukuran LILA $\leq 23,5$ cm (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 dengan total sampel sebanyak 88 ibu hamil didapatkan sebagian besar responden tidak mengalami KEK (62,5%) dan yang mengalami KEK mencapai 37,5% atau sebanyak 33 orang dari 88 total sampel. Hasil tersebut menandakan bahwa kasus KEK pada ibu hamil masih cukup banyak terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa sebagian sebagian besar kasus KEK terjadi pada ibu hamil dengan usia subur (WUS). Hal ini dikarenakan wanita pada usia muda dan masih produktif cenderung lebih memilih fokus bekerja, sehingga mereka kurang memperhatikan kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya padahal WUS memerlukan zat gizi untuk perkembangan tubuhnya, pernyataan tersebut sesuai dengan teori dalam penelitian Paramata dan Sandalayuk (2019), bahwa terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi pada remaja putri (WUS) berkaitan dengan percepatan pertumbuhan yang dialaminya, dimana zat gizi yang diserap tubuh digunakan untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan, disertai dengan meningkatnya jumlah ukuran jaringan sel tubuh untuk mencapai pertumbuhan yang optimal (Paramata and Sandalayuk, 2019).

Selain itu, KEK dapat terjadi karna berbagai faktor seperti pengetahuan, paritas, jarak kehamilan, status ekonomi dan pendapatan keluarga, asupan gizi, pendidikan, usia ibu hamil, bahkan riwayat penyakit yang pernah diderita ibu hamil juga ikut berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian KEK pada ibu

hamil (Musaddik, Putri and M, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhaira Mazita J, Andi Nuddin, Henni Kumaladewi Hengky (2019) terkait Analisis Faktor Risiko Kekurangan Energi Kronis Ibu Hamil Di Kota Parepare dengan sampel penelitian berjumlah 63 sampel mengemukakan bahwa, usia Ibu $0,030 < 0,05$, Jarak Kehamilan $0,048 < 0,05$, dan Pantang Makan $0,000 < 0,05$ yang artinya bahwa faktor tersebut berpengaruh terhadap terhadap kejadian KEK ibu hamil di Kota Parepare. Disarankan pada wanita yang ingin menikah merencanakan terlebih dahulu jika ingin menikah muda dikarenakan umur yang baik untuk menikah ialah 20-35 tahun dan pada usia tersebutlah kehamilan yang baik dan bisa menurunkan risiko gangguan pada ibu maupun janin selama kehamilan. Sebaiknya ibu hamil lebih banyak mengonsumsi makanan yang diperlukan oleh janin dan memperluas pengetahuan tentang kehamilan serta makanan yang baik dikonsumsi ibu hamil untuk menghindari defisiensi energi (Nurkhaira Mazita J, Nuddin and Henni Kumaladewi Hengky, 2019).

2. Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian KEK pada ibu hamil

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun banyak terjadi kasus KEK. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan zat gizi sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan pertumbuhan tubuh baik fisik maupun mental. Salah satu faktor yang menyebabkan ibu hamil mengalami KEK adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil dalam menentukan nutrisi yang baik selama kehamilan. Asupan nutrisi pada ibu hamil sebaiknya harus mengandung energi, protein, vitamin, mineral, asam folat, zat besi, kalsium dimana hal itu sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan janin. Salah satu faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil yaitu pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang zat gizi dalam makanan (Dennylyson, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 dengan total sampel sebanyak 88 ibu hamil didapatkan 8 ibu yang mengalami KEK dan 6 ibu yang tidak KEK, yang memiliki pengetahuan kurang. Terdapat 22 ibu hamil KEK dan 33 ibu yang tidak KEK, yang memiliki pengetahuan cukup. Terdapat 3 ibu hamil KEK dan 16 ibu yang tidak KEK, yang memiliki pengetahuan yang baik. Hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,043 yang berarti lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05 yang menunjukkan hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 maka dapat dinilai bahwa pengetahuan turut berperan dalam terjadinya KEK terutama pada ibu hamil, rendahnya pengetahuan membuat ibu hamil tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi yang sesuai untuk tubuhnya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi & Kasmiati (2020) dengan *p value* = 0,001 yang berarti terdapat hubungan pengetahuan dengan dengan kejadian kurang energi kronik pada ibu hamil di Puskesmas Watampone Tahun 2020. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rika, Puji & Erika (2021) menunjukkan adanya hubungan tingkat pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian kekurangan energi kronik (kek) pada ibu hamil di puskesmas kecamatan matraman jakarta timur.dengan *p-value* 0,000 < 0,05 (Diningsih, Wiratmo and Lubis, 2021). Penelitian lain yang selaras dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Katrina Ra Mete, Eka Yuni Indah Nurmala, dan Dian Hanifah (2022) di daerah Malang yang mendapatkan Hasil uji Chi Square $p = 0,001$ ($p < 0,05$), hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang gizi dengan status gizi ibu

hamil trimester 1 di era pandemi covid-19 di Kab.Malang. Penelitian Mete dkk, juga menginformasikan bahwa pengetahuan ibu sangat berperan dalam meningkatkan asupan ibu hamil, semakin meningkatnya pengetahuan akan membantu dalam peningkatan kepedulian tentang konsumsi yang tepat pada ibu hamil yang diharapkan pada hasil akhirnya membantu dalam mencapai status gizi yang baik (Mete, Nurmala and Hanifah, 2022). Selain itu, ibu hamil dengan kurang gizi dapat meningkatkan terjadinya resiko keguguran, kematian perinatal (kematian janin usia gestasi 22 minggu sampai usia 1 minggu pascalahir) dan neonatal (bayi usia 0-28 hari). Beberapa penelitian yang dilakukan di Negara berkembang bahwa separuh dari penyebab terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) adalah status gizi ibu, termasuk tinggi badan ibu, berat badan ibu sebelum kehamilan dan penambahan berat badan selama kehamilannya (Dennylson, 2022)

3. Hubungan Pendapatan dengan Kejadian KEK pada ibu hamil

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi gizi seseorang karena pada status ekonomi yang rendah akan mengalami ketidak mampuan keluarga untuk membeli makanan yang berkualitas, dan dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut. Status sosial ekonomi seseorang dapat dinilai dari banyak indikator, baik itu dari status sosial dalam masyarakat maupun dari keadaan perkenomiannya, yang biasanya dilihat dari pendapatan perbulan yang didapatkan oleh seseorang tersebut (Musaddik, Putri and M, 2022).

Hasil penelitian ini didapatkan ibu hamil di PKM Kassi-Kassi dengan KEK sebanyak 5 responden dan 20 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Terdapat 28 ibu yang KEK dan 35 ibu

yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan tingkat pendapatan rendah. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,033 yang berarti lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai *Odd Ratio (OR)* sebesar 0,313 dengan CI 95% (0,104-0,938) menunjukkan bahwa ibu dengan pendapatan rendah memiliki risiko 0,265 kali lebih besar untuk mengalami KEK dibandingkan dengan ibu yang berpendapatan tinggi di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan faktor yang mendukung terjadinya KEK karena rendahnya pendapatan membuat ibu hamil kesulitan dalam membeli pangan bermutu, sesuai yang dibutuhkan tubuhnya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Musaddik, Putri dan Muhammad (2022) bahwa ada hubungan sosial ekonomi, pendapatan keluarga dengan kejadian kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil dengan hasil uji *chi square* nilai *p value* 0,012 (Musaddik, Putri and M, 2022). Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiki, Akmal, & Irmawati (2022) yang memperoleh hasil uji statistik *p-value* 0,044 nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapatan dengan KEK (Fazirah, Syahrudin and Irmawati, 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh dwike An, dkk (2021) yang melakukan study literatur juga memperoleh hasil yang sejalan dengan hasil penelitian ini, menyatakan bahwa penghasilan keluarga memiliki hubungan dengan KEK pada ibu hamil, dan faktor pendapatan keluarga ini mempengaruhi kejadian KEK pada ibu hamil sebesar 66,67% (An *et al.*, 2021).

Menurut teori dari penelitian Ferawati (2019) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kualitas menu. Pernyataan itu nampak logis, karena memang tidak mungkin orang makan makanan yang tidak sanggup dibelinya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli yang rendah pula, sehingga tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang dibutuhkan, sebaliknya pendapatan yang tinggi umumnya mengkonsumsi makanan yang lebih tinggi harganya (Ferawati, 2019). Namun menurut Fitriainingsih (2019) mengatakan bahwa penghasilan tinggi tidak menjamin status gizi seseorang baik, akan tetapi hal ini dapat menambah kesempatan untuk memilih bahan makanan berkualitas dan meningkatkan konsumsi makanan bergizi tinggi. Terdapat keluarga dengan pendapatan tinggi kurang baik dalam mengatur belanja keluarga, mereka membeli pangan dalam jumlah sedikit serta mutu yang kurang, sehingga dapat mempengaruhi keadaan ibu hamil (Fitriainingsih, 2019)

4. Hubungan Asupan Makanan dengan Kejadian KEK pada ibu hamil

Perilaku konsumsi makanan ialah salah satu bentuk perilaku untuk mencegah penyakit dalam artian mempertahankan dan meningkatkan kesehatan agar terhindar dari KEK, selain itu perilaku makan guna memenuhi kebutuhan makan atau rasa lapar, memperoleh gizi yang diperlukan tubuh dan untuk memenuhi kebutuhan psikologi. Keadaan kekurangan asupan gizi pada ibu hamil selama kehamilan bisa berdampak pada keadaan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), maupun gangguan kesehatan selama masa kehamilan dan persalinan (Ihtirami, Rahma and Tihardimanto, 2021).

Hasil dari penelitian yang dilakukan di puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 didapatkan bahwa 11 ibu hamil KEK dan 33 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu dengan asupan makanan yang terpenuhi. Terdapat 22 ibu yang KEK dan 22 ibu yang tidak mengalami KEK, untuk ibu

dengan asupan makanan yang tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,015 yang berarti lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara asupan makanan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 0,333 dengan CI 95% (0,135-0,822) menunjukkan bahwa ibu dengan asupan makanan yang tidak terpenuhi berisiko 0,333 kali lebih besar untuk mengalami KEK dibandingkan ibu dengan asupan makanan yang terpenuhi di Puskesmas Kassi-Kassi 2023. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023, maka dapat diketahui bahwa asupan makanan yang kurang dan tidak terpenuhi, turut berkontribusi terhadap terjadinya KEK pada ibu hamil.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjelika, Ihsan dan Dammalewa (2021) di wilayah kerja Puskesmas Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang memperoleh $p\text{ value } (0,000) < \alpha (0,05)$, yang artinya terdapat hubungan asupan energi makanan dengan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil (Anjelika, Ihsan and Dammalewa, 2021). Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari, Mardiyah, Catur, & Masdariah (2021) di Kota Mataram juga menyatakan bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh tentang KEK adalah asupan makanan (Cahaya Indah Lestari, Siti Mardiyah WD, Catur Esty Pamungkas, 2021). Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dictara, dkk (2020) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi dan protein dengan kejadian KEK dengan hasil uji *chi square* memperoleh *p-value* sebesar $0,017 < 0,05$, menurutnya asupan makanan berperan penting dalam pemenuhan nutrisi serta pembentukan energi. Apabila makanan energi tidak adekuat, maka cadangan lemak dalam tubuh akan digunakan. Bila cadangan

lemak digunakan secara terus menerus, maka protein yang terdapat pada hati dan otot akan diubah menjadi energi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya depleksi masa otot yang ditandai dengan pengukuran lingkaran lengan atas $> 23,5$ cm (Dictara *et al.*, 2020).

5. Hubungan Riwayat Penyakit dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil

Salah satu faktor tingginya angka kematian ibu melahirkan ialah adanya kehamilan resiko tinggi yaitu, kehamilan yang disertai oleh penyakit atau kondisi yang dapat berdampak tidak baik pada ibu ataupun janinnya. Adapun penyakit yang termasuk dalam kehamilan resiko tinggi ialah penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes dan anemia kronis.

Hasil dari penelitian ini didapatkan terdapat 8 ibu hamil KEK dan 11 ibu hamil yang tidak KEK, untuk ibu yang memiliki riwayat penyakit. Terdapat 25 ibu hamil KEK dan 44 ibu hamil tidak KEK, untuk ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,640 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit dengan KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 1,280 dengan CI 95% (0,455-3,602) menunjukkan bahwa ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit juga berisiko 1,167 kali lebih besar untuk mengalami KEK.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 diperoleh hasil yang tidak berhubungan antara riwayat penyakit dengan KEK, hal ini disebabkan karena sebagian besar responden ibu hamil KEK yang diperoleh peneliti tidak memiliki riwayat penyakit, kemungkinan hal tersebutlah yang mempengaruhi hasil analisis penelitian sehingga tidak didapatkan hubungan antara riwayat penyakit dengan

kejadian KEK. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa, penyakit yang diderita seseorang tidak selalu menjadi faktor kejadian KEK, namun adanya penyakit tersebut dapat mengganggu pemenuhan serta penyerapan zat gizi. Hal tersebut sesuai dengan teori Lestari bahwa penyakit dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit, namun penyakit yang ada dalam diri seseorang tidak lantas membuatnya menderita KEK (Lestari *et al.*, 2023).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolin, Siauta & Nurpadilah (2022) bahwa riwayat penyakit tidak berhubungan dengan kekurangan energi kronis dengan hasil analisis *p-value* 0,213 (Carolin, Siauta and Nurpadilah, 2022). Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Ferawati (2019) yang memperoleh *p-value* 0,926 dari riwayat penyakit dengan KEK pada ibu hamil, yang berarti bahwa riwayat penyakit tidak berkorelasi terhadap kejadian KEK. Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian Lestari, dkk (2023) bahwa riwayat penyakit tidak berhubungan dengan kekurangan energi kronis (*p-value* 1,000).

Penurunan asupan gizi akibat kurangnya nafsu makan, menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada saat sakit adalah mekanisme patologis infeksi dengan malnutrisi. Selain itu, peningkatan kehilangan cairan/zat gizi akibat penyakit diare, mual/muntah dan pendarahan terus menerus juga terjadi. Gizi kurang secara langsung disebabkan oleh makanan dan penyakit. Ibu yang mendapat cukup makanan tetapi sering menderita sakit, pada akhirnya dapat menderita gizi kurang. Demikian pula pada ibu yang tidak memperoleh cukup makan, maka daya tahan tubuhnya akan melemah dan akan mudah terserang penyakit (Ferawati, 2019).

6. Hubungan Paritas dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil

Setiap kehamilan merupakan proses alamiah, bila tidak dikelola dengan baik akan memberikan jaminan pada ibu dan janin dalam keadaan sehat dan aman. Penyebab tingginya kasus kesakitan dan kematian ibu di banyak negara berkembang yang terjadi selama proses kehamilan, persalinan dan nifas sebenarnya dapat dicegah. Melalui upaya pencegahan yang efektif sudah banyak negara berkembang dan hampir semua negara maju, berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu ke tingkat yang sangat rendah (Dennylson, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh data mengenai paritas ibu hamil di PKM Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 didapatkan 12 ibu hamil KEK dan 24 ibu hamil tidak KEK, dengan paritas yang baik. Terdapat 21 ibu hamil KEK dan 31 ibu hamil tidak KEK, untuk ibu hamil dengan paritas yang buruk. Berdasarkan hasil uji *chi-square* didapatkan *p-value* sebesar 0,502 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha* yaitu 0,05. Nilai *p-value* tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian KEK pada ibu hamil di puskesmas Kassi- Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 0,738 dengan CI 95% (0,304-1,792) menunjukkan bahwa ibu dengan paritas yang baik juga berisiko 0,738 kali lebih besar untuk mengalami KEK

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di PKM Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 maka dapat diketahui bahwa paritas buruk pada ibu hamil tidak lantas menjadikan ibu hamil itu KEK, dan dari hasil pengisian kuesioner serta wawancara singkat didapatkan hasil bahwa kebanyakan responden memiliki manajemen waktu yang baik untuk membagi urusan rumah tangga dengan perawatan diri. Hal ini sesuai dengan teori dalam penelitian Dennilson (2020) bahwa sebagian besar ibu hamil dengan jumlah paritas tinggi

sudah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang asupan yang sesuai untuk ibu hamil (Dennylson, 2022).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazirah, Akmal Syahrudin, & Irmawati (2022) bahwa paritas (p -value 0,757) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kurang energi kronik (Fazirah, Syahrudin and Irmawati, 2022). Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian Dennilson (2022) di wilayah kerja Puskesmas Toari bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian KEK pada ibu hamil. sebagian besar ibu hamil dengan jumlah paritas tinggi sudah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang asupan yang sesuai untuk ibu hamil (Dennylson, 2022).

Ibu dengan paritas primipara banyak yang mengalami KEK dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman selama dalam merawat kehamilan. Selain itu, ibu hamil KEK banyak terjadi pada kehamilan pertama hal ini lebih disebabkan karena faktor psikologis dan kesiapan mental dan fisik untuk menjadi orang tua sehingga mengabaikan asupan makanan bagi ibu hamil (Irdayani, 2018), sedangkan paritas yang tinggi akan berdampak pada kurangnya perhatian terhadap diri sendiri pada ibu hamil karena sibuknya mengurus kebutuhan rumah tangga (Faozi, 2022). Ibu hamil yang mengalami KEK juga dapat meningkatkan risiko timbulnya gangguan selama masa kehamilan maupun persalinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yaitu, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan banyak menyebabkan terjadinya komplikasi persalinan. Hal ini dikarenakan kondisi ibu yang belum pulih sepenuhnya serta pemenuhan zat gizi yang belum optimal namun harus memenuhi kebutuhan janin yang dikandungnya. Ibu memerlukan waktu 2-5 tahun antara persalinan sebelumnya dengan yang sekarang (Yohanes, 2018).

7. Integrasi Keislaman

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan ilmiah yang telah dipaparkan dalam uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa menjadi seorang ibu hamil sangatlah berisiko serta memiliki tantangan yang besar, karena menyangkut dua nyawa, yakni ibu dan janin yang dikandungnya. Hal tersebut selaras dengan kutipan ayat QS. Lukman/31:14 Allah swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفِصَالُهُ ۖ فِي عَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya;

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu” (Departemen Agama RI, 2012)

Ayat tersebut berkaitan dengan kisah Luqman yang merupakan seseorang yang diberikan hikmah dari Allah swt. sehingga dikenal sebagai pribadi yang sangat taat dan shalih. Suatu saat Luqman menasihati anaknya yang menurut riwayat bernama Sanqa, dengan anjuran dan perintah agar menyembah Allah swt. dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu. Setelah menasihati anaknya dengan tauhid, Luqman kemudian memberikan nasihat agar anaknya selalu berbakti kepada kedua orang tuanya (Ibnu Kaṣīr, no date).

Pada kalimat وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ Allah swt. memberikan tanda tentang kondisi yang dialami seorang perempuan hamil ketika mengandung yakni kelemahan secara terus menerus. Sejalan dengan makna tersebut Mujahid memaknai kata *al-wahn* dengan penderitaan mengandung anak, sedangkan Qatadah memaknainya dengan kelemahan yang berlebih-lebihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses mengandung memerlukan tenaga agar ibu hamil memiliki kekuatan dan energi ketika mengandung, sehingga seorang ibu hamil harus menjaga status gizinya

sehingga ia dapat terhindar dari KEK. Bahkan dalam kalimat *وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ* juga dijelaskan bahwa seorang ibu yang telah melahirkanpun memiliki peranan yang sangat besar dalam hal menyempihkan atau menyusui anaknya, dan diketahui bahwa dalam air susu ibu terdapat manfaat yang luar biasa untuk bayi. Hal tersebut menandakan bahwa peranan gizi serta status gizi yang dimiliki oleh ibu sangatlah penting, baik untuk kesehatan ibu maupun generasi penerus bangsa.

D. Keterbatasan Penelitian

Kendala dalam penelitian ini dalam hal pengambilan data. Penelitian ini menggunakan data primer yakni dengan pengisian kuesioner sehingga bergantung pada kejujuran serta ingatan tiap responden dalam pengisian lembar kuesioner yang diberikan. Selain itu, adanya variabel perancu juga turut mengganggu dalam proses penelitian ini sehingga untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi.



BAB 5

SARAN DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian Analisis Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Kassi-Kassi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejadian kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 dengan total sampel 88 responden diperoleh 33 responden (37,5%) mengalami KEK, dan sebanyak 55 responden (62,5%) tidak mengalami KEK.
2. Pengetahuan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023, diperoleh pengetahuan kurang sebanyak 14 responden (15,9%), pengetahuan yang cukup sebanyak 55 responden (62,5%) dan 19 responden (21,6%) memiliki pengetahuan yang baik.
3. Pendapatan ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023, sebagian besar dalam kategori rendah yaitu sebanyak 63 responden (71,6%) dan sisanya berpendapatan tinggi sebanyak 25 responden (28,4%).
4. Asupan makanan ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023, didapatkan responden dengan asupan makanan yang terpenuhi sebanyak 44 responden (50%) dan sebanyak 44 responden (50%) asupan makanannya tidak terpenuhi.
5. Riwayat penyakit ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023, diperoleh 19 responden (21,6%) memiliki riwayat penyakit dan 69 responden (78,4%) tidak memiliki riwayat penyakit.

6. Paritas ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023 diperoleh paritas buruk sebanyak 42 responden (40,9%) sedangkan responden paritas yang baik sebanyak 52 responden (59,1%).
7. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.
8. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023
9. Terdapat hubungan antara asupan makanan dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023
10. Tidak terdapat hubungan antara riwayat penyakit ibu hamil dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.
11. Tidak terdapat hubungan antara paritas ibu hamil dengan kejadian KEK pada ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Periode Juli-Desember tahun 2023.

B. Saran

Bagi Masyarakat


1. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan memperhatikan saran tenaga kesehatan demi kondisi ibu dan janin.
2. Menambah informasi dan wawasan ibu serta keluarga ibu agar dapat bersama-sama menghindari faktor risiko yang ada.

Bagi Tenaga Kesehatan

1. Petugas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan Kekurangan Energi Kronik (KEK) agar dapat menambah wawasan ibu hamil dan masyarakat.

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan KEK.
2. Diharapkan juga agar peneliti selanjutnya terkhusus dibidang ini, agar memiliki rancangan dengan melihat beberapa keterbatasan yang dapat menghambat dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Huzain, A. and Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, A.-M. al-S. al-M. bin N. al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila R.S.S. (no date) *Muslim, Juz IV, Bairu Darwah*.
- An, D. *et al.* (2021) ‘HUBUNGAN PEKERJAAN DAN PENGHASILAN KELUARGA’, pp. 115–126.
- Anggraini, L. and Dkk (2021) ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil’.
- Anjelika, Ihsan, M.H. and Dammalewa, J.Q. (2021) ‘Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kek pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kolono Kabupaten Konawe Selatan’, *Jurnal Ilmiah Karya Kesehatan*, 2(1), pp. 25–34. Available at: <https://stikesks-kendari.e-journal.id/jikk>.
- Astuti, F.N., Purnamaniswati Yunus and Faradilah, A. (2021) ‘Karakteristik Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Menyusui Anak’, *Molucca Medica*, 14(April). Available at: [https://doi.org/ISSN 1979-6358 \(print \) ISSN 25970246X](https://doi.org/ISSN 1979-6358 (print) ISSN 25970246X).
- Badan Pusat Statistika Makassar (2022) ‘Jumlah Ibu Hamil yang KEK’, in. Makassar, Sulawesi Selatan: BPS Makassar.
- Bela, M.C. (2019) ‘Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kekurangan energi kronik (KEK) pada Wanita usia subur’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Cahaya Indah Lestari, Siti Mardiyah WD, Catur Esty Pamungkas, B.M. (2021) ‘Hubungan Asupan Makanan Dan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (Kek) Pada Ibu Hamil Di Kota Mataram’, *Midwifery Journal*, Vol 6, No.
- Carolin, B.T., Siauta, J.A. and Nurpadilah (2022) ‘ANALYSIS OF FACTORS ASSOCIATED WITH CHRONIC ENERGY DEFICIENCY AMONG PREGNANT WOMEN’, 11(April).
- CDC (2021) ‘Pregnancy and Reproductive Health:Nutrition During Pregnancy’, *Centers for Disease Control and Prevention* [Preprint]. Available at: <https://www.cdc.gov/pregnancy/nutrition/index.html>.
- Dafiu, T.R. (2017) ‘Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Gizi Kehamilan dengan Kejadian Kurang Energi Kronik (KEK) Pada Kehamilan di Kota Yogyakarta Tahun 2017’, *Jurnal Kesehatan* [Preprint].

- Dawud, A. (no date) *Sunan Abū Dawūd*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Dennyson, T. (2022) 'Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya kekurangan energi kronik (kek) pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas toari kab. kolaka skripsi', *Skripsi* [Preprint].
- Dictara, A.A. *et al.* (2020) 'Hubungan Asupan Makan dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sukaraja Kota Bandar Lampung', *Majority*, 9(2), pp. 1–6.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar (2022) 'No Title', *Data dinas Kesehatan kota makassar* [Preprint].
- Diningsih, R.F., Wiratmo, P.A. and Lubis, E. (2021) 'RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT (DEC) EVENTS IN PREGNANT WOMEN', 3, pp. 8–15.
- Faozi, B.F. (2022) 'Hubungan Paritas Dengan Kejadian Kurang Energi Kronis', *Jurnal Ilmu Keperawatan Sebelas April*, 4(1), pp. 18–23.
- Faradilah, A., Jalaluddin, S. and Larasati, I. (2018) 'Tatalaksana Multidisiplin Pada Kasus Obesitas Anak Remaja', *Alami Journal. Vol. 2 No. 1, Januari 2018 hal: 15-19*, 2(1), pp. 15–19.
- Fazirah, K., Syahrudin, A.N. and Irmawati (2022) 'Fakto Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sudiang Raya Kota Makassar', *The Journal of Indonesian Community Nutrition*, 11(1), pp. 10–19.
- Ferawati (2019) 'Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil Di Kelurahan Kassi-kassi', *Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, pp. 1–121.
- Fitri, W.F. (2021) 'Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil di Praktik Mandiri Bidan Wilayah Kerja Puskesmas Jati Datar'.
- Fitriah, A. habibah *et al.* (2018) *Buku Praktis Gizi Ibu Hamil*. Media Nusa Creative. Available at: <https://www.studocu.com/id/document/politeknik-kesehatan-kemenkes-malang/gizi/buku-saku-gizi-ibu-hamil-full/15246447>.
- Fitrianingsih (2018) 'Hubungan Pola Makan Dan Status Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tompobulu'.
- Fitrianingtyas, I., Pertiwi, F.D. and Rachmania, W. (2018) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (Kek) Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Warung Jambu Kota Bogor', 6(2).

- Ibnu Kaşır (no date) 'Tafsır al-Qur'an al-'Azım, Juz 6', Cet.2;t.t., p. h. 336.
- Ihtirami, A., Rahma, A.S. and Tihardimanto, A. (2021) 'Hubungan Pola Makan Terhadap Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Trimester I Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar', *Molucca Medica*, pp. 11–21. Available at: <https://doi.org/10.30598/molmed.2021.v14.i1.11>.
- India., G. of (2017) 'Guidelines for antenatal care and skilled attendance', *Ministry of Health & Family Welfare*, [Preprint].
- Irdayani, D. (2018) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil Tm II Di Puskesmas Lingkar Barat', *Transcommunication*, 53(1), pp. 1–8. Available at: <http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0A>.
- Jannah, M. and Nadimin (2021) 'Riwayat Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Dan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale', *XVI(2)*, pp. 343–352.
- Kemenkes (2020) *Pedoman pelayanan gizi, gerakan masyarakat hidup sehat*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021) 'Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021*, pp. 1–224.
- Lestari, A. (2021) 'Faktor Risiko Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil di Puskesmas Gunungpati', *Sport and Nutrition Journal*, 3(2), pp. 1–13. Available at: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/spnj/>.
- Lestari, D.S. *et al.* (2023) 'Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja PUSKESMAS Bogor Utara Tahun 2022', 6(3), pp. 165–175. Available at: <https://doi.org/10.32832/pro>.
- Mete, K.R., Nurmala, E.Y.I. and Hanifah, D. (2022) 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Gizi Dengan Status Gizi Ibu Hamil Trimester I Di Era Pandemi Covid-19 Di Dusun Krajan Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang', *Kendedes Midwifery Journal*, 2(2), pp. 102–114.
- Muhammad Qadaruddin Abdullah, Abd. Rahman, N.H. (2020) 'Agenda Setting Corona : Analisis Penyebaran Corona', 13(2), pp. 141–155.
- Mulyasari, I. and Purbowati (2018) 'Lingkar lengan atas dan panjang ulna sebagai parameter antropometri untuk memperkirakan berat badan dan tinggi badan orang dewasa', *Jurnal Gizi Indonesia*, Vol. 7, No.

- Musaddik, Putri, L.A.R. and M, H.I. (2022) 'Hubungan Sosial Ekonomi dan Pola Makan dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Nambo Kota Kendari', *Jurnal Gizi Ilmiah*, 9(2), p. 20.
- Mustafa, I. and Dkk (no date) *Mu'jam al-Wasit*. Dar al-Da'wah.
- Noor, M.S. *et al.* (2021) *Buku ajar kekurangan energi kronik (KEK)*.
- Nurkhaira Mazita J, Nuddin, A. and Henni Kumaladewi Hengky (2019) 'Analisis Faktor Risiko Kekurangan Energi Kronis Ibu Hamil Di Kota Parepare', *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2(3), pp. 333–342. Available at: <https://doi.org/10.31850/makes.v2i3.176>.
- Nurvembrianti, I. and Purnamasari, I. (2021) 'Pendampingan ibu hamil dalam upaya peningkatan status gizi', 1(2), pp. 50–55.
- Paramata, Y. and Sandalayuk, M. (2019) 'Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo', *Gorontalo Journal of Public Health*, 2(1), p. 120. Available at: <https://doi.org/10.32662/gjph.v2i1.390>.
- Prawirohardjo, S. (2014) *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono.
- Priska Mulyani Putri Gulo (2019) "" Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kurang Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Non Rawat Inap Moro'o Kabupaten Nias Barat Tahun 2019", *Institute Kesehatan Helvetia* [Preprint]. Available at: http://repository.helvetia.ac.id/id/eprint/2557/6/SKRIPSI_PRISKA_1801032385.pdf.
- R, N.U., Mustamin, M. and Ipa, A. (2019) 'Family income with less chronic energy (LCE) in pregnant women', *Media Gizi Pangan*, 25(2), p. 57. Available at: <https://doi.org/10.32382/mgp.v25i2.391>.
- Rahim, R. *et al.* (2021) 'Analisis Faktor Risiko Kejadian Gizi Kurang Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Tahun 2020', *Al-Iqra Medical Journal: Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran*, 4(2), pp. 40–46. Available at: <https://doi.org/10.26618/aimj.v4i2.4951>.
- Ramli, T.P., Alifia, A. and Delima, A. (2023) 'Hubungan Berat Badan Lahir , Status Imunisasi , dan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar', 7. Available at: <https://doi.org/10.24252/alami.v7i2.36197>.
- Rizqi Mufidah, Dina Rahayuning P, L.W. (2019) 'Hubungan Tingkat Kecukupan Energi, Tingkat Aktivitas Fisik Dan Karakteristik Keluarga Dengan Risiko Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Dawe', 5(1), pp. 545–551.

- Rosdiana (2022) 'Pemberian, Pengaruh Biji, Biskuit Kuning, Labu Ekstrak, Kapsul Kelor, Daun Kadar, Terhadap Status, D A N Ibu, Gizi Di, Hamil Lokus, Desa Effect, T H E Giving, O F Seed, Pumpkin Leaf, Moringa Capsules, Extract Zink, O N Status, Nutritional Pregnant, O F In'.
- Saifuddin, A.B. *et al.* (2005) *Ilmu kebidanan*. Ed. 3, Cet. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Setiarto, H.B., Karo, D.M.B. and Tambaip, D. dr. T. (2022) *Buku Ajar Gizi Kesehatan Reproduksi*. Edited by R.N. Fawwazaniq. Trans Info Media, Jakarta.
- Shihab, M.Q. (2005) *Tafsir al-Misbah*. Cet.5. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudirman, N.A., dr. Utami Murti Pratiwi, M.K. and Sakinah, dr. A.I. (2022) *Hubungan ASI Eksklusif dan MP-ASI dengan Kejadian Stunting Pada Balita 6-24 Bulan, ጎጎጎጎ*. Makassar, Sulawesi Selatan: UIN Alauddin Makassar.
- Sulaiman, A.S. (2022) 'Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022', in *SK Gubernur No 2583/XI/2021*. Makassar. Available at: <https://id.scribd.com/document/553894557/UMK-MAKASSAR-THN-2022-1-dikonversi>.
- Suryani1, L. *et al.* (2021) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, pp. 311–316.
- Utami, K. *et al.* (2020) 'Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil Trimester I Berdasarkan Usia Dan Graviditas', 5(1), pp. 18–25.
- WHO (2018) 'Data dan Statistics'. Available at: <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>.
- Yohanes, M. (2018) 'Hubungan Jarak Kehamilan dengan Plasenta Previa', *Jurnal Ilmiah Obgin*, 2(2).

ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

A. PENGURUSAN ETIK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.53 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Palong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-5727/Un.06/FKIK/PP.09/11/2023 Gowa, 30 November 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

**Yth. Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
di-

Tempat

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Sabrina
Nim : 70600120027
Program Studi : Pendidikan Dokter
Judul Penelitian : Analisis Faktor Risiko Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi
Dosen Pembimbing : 1. Dr.dr. Rosdianah, M.Kes
2. dr. Purnamaniswaty, M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Isriany Ismail



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Telp. 081210016564, E-mail: kepkk.fik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.031/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Andi Sabrina
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS (KEK)
PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KASSI – KASSI KOTA MAKASSAR"

"ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR CHRONIC ENERGY DEFICIENCY (CED) IN
PREGNANT WOMEN AT KASSI-KASSI HEALTH CENTER MAKASSAR CITY"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 19, 2023 until December 19, 2024.

December 19, 2023

Chair and Chairperson,


Dr. Andi Sabrina, S.Si., M.Si., Apt.



B. PERSURATAN PENGAMBILAN DATA



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KESEHATAN Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

Nomor : 440/117/PSDK / XI /2023
Lamp :
Perihal : Izin Data Awal

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Kassi kassi

Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Program Studi Kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. No Surat : B-4749/Un.06/FKIK/PP.09/10/2023, maka disampaikan kepada saudara :

Nama : **Andi Sabrina**
NIM : 70600120027
Judul : Analisis Faktor resiko Kejadian Kekerangan Energi Kronik di Puskesmas Kassi Kassi

Bermaksud Untuk melakukan kegiatan observasi untuk Pengambilan data awal di wilayah Puskesmas yang saudara pimpin
Demikianlah disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 14 November 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Dr. Nurcahidah Sirajuddin, M.Kes
Pangkat : Pembina TK I / IV B
NIP : 19730112 2006042012



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

No : 440/93/PSDK/XII/2023

Lamp : -

Perihal : Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Puskesmas Kassi Kassi

Di -

Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/650/SKP/DPMPTSP/9/2023 tanggal 13 Desember 2024, maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Andi Sabrina
NIM : 70600120027
Jurusan : S1 Pendidikan Dokter
Institusi :
Tanggal Penelitian : 11 Desember 2023 s/d 20 Januari 2024
Judul Disertasi : Analisis Faktor Risiko kejadian Kekurangan energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas kassi Kassi

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin.
Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 18 Desember 2023
Kepala Dinas kesehatan
Kota Makassar

dr.Nursaidah Sirajuddin,M.Kes
Pangkat : Pembina TK I/IV B
NIP : 19730112 2006042012

C. DOKUMENTASI PENELITIAN



M A K A S S A R

D. LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar yang bernama Andi Sabrina dengan judul "Analisis Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi". Saya memahami dan mengerti bahwa penelitian ini tidak berdampak buruk terhadap saya, maka dari itu saya bersedia menjadi responden peneliti.

Makassar, 2023

Peneliti



Andi Sabrina

Responden

(.....)



E. KUESIONER

ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK (KEK) PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KASSI-KASSI

Tanggal :

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Pendapatan

1. Berapakah pendapatan keluarga dalam 1 bulan?

Suami : Rp.

Istri : Rp.

Total : Rp.

C. Paritas

1. Berapa kali ibu pernah melahirkan?kali.

D. Riwayat Penyakit

Apakah ibu pernah menderita penyakit yang sudah dialami sejak lama ?

E. Pengetahuan

Petunjuk :

1. Bacalah secara seksama pertanyaan di bawah ini.

2. Tuliskan “B” bila pernyataan benar dan “S” bila pernyataan salah dengan memberi tanda (√).

NO	PERTANYAAN	BENAR	SALAH
1	Lingkar lengan atas (LILA)ibu hamil yang kecil atau kurang dari 23,5 cm menggambarkan keadaan ibu hamil dengan asupan gizi tidak seimbang dan berlangsung lama	✓	
2	Ibu hamil dengan gizi tidak seimbang selama kehamilan maka bayi di dalam kandungan tidak akan menderita kekurangan gizi		✓
3	Salah satu tanda ibu hamil mengalami gizi tidak seimbang sering merasakan kelelahan dan lesu	✓	
4	Terlihat segar bugar, lingkar lengan atas lebih dari normal menandakan asupan gizi ibu hamil tidak seimbang		✓
5	Yang dapat mengalami lingkar lengan kecil atau kurang dari normal adalah ibu hamil, wanita usia subur dan termasuk remaja	✓	
6	Untuk mengetahui lingkar lengan atas kurang atau lebih adalah dengan mengukur lingkar lengan atas bagian kiri ibu hamil	✓	
7	Mengatasi gizi tidak seimbang selama kehamilan adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi dan bervariasi serta pola makan yang sehat	✓	
8	Ibu hamil yang memiliki lingkar lengan kecil dianjurkan segera ke puskesmas dan mendapatkan biskuit ibu hamil selama 90 hari	✓	

NO	PERTANYAAN	BENAR	SALAH
9	Pemenuhan gizi seimbang ibu hamil hanya untuk pertumbuhan dan perkembangan janin saja		✓
10	Sebaiknya sebelum hamil wanita mempunyai gizi yang baik dan lingkaran lengan atas tidak kecil atau tidak kurang dari normal	✓	
11	Gizi seimbang selama kehamilan sangat mempengaruhi persiapan ASI setelah melahirkan	✓	
12	Ibu hamil dengan lingkaran lengan kecil atau mengalami gizi tidak seimbang cenderung melahirkan bayi kurang bulan dan berat badan bayi kecil	✓	
13	Bahan makanan yang menjadi sumber protein adalah daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan susu	✓	
14	Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengonsumsi telur dan ikan		✓
15	Ibu hamil yang mengalami gizi tidak seimbang dan lingkaran lengan atas kurang dari normal akan melahirkan dengan aman		✓

modifikasi dari (Fitri, 2021)

F. Asupan Makanan

(Food Frequency Questionnaire)

Berilah tanda *check list* (✓) pada kolom yang sesuai dengan kebiasaan kamudalam mengonsumsi makanan (dalam 1 bulan terakhir)

No.	Bahan Makanan	>1× / hari	4-6× / minggu	3 × / minggu	<3 × / minggu	1-3 × / bulan	Tidak pernah
		50	25	15	10	1	0
1.	Makanan Pokok						
	Beras/nasi						
	Mie						
	Kentang						
	Singkong/ubi						
	Roti tawar						
	Jagung						
	Bihun						
	Lainnya, sebutkan						
2.	Lauk Hewani dan olahannya						
	Ikan segar						
	Ikan asin						
	Udang						
	Daging sapi						
	Daging kambing						
	Daging ayam						
	Telur ayam						
	Nugget						
	Sosis						
	Lainnya, sebutkan						
4.	Lauk Nabati						
	Kacang hijau						
	Kacang tanah						
	Tahu						
	Tempe						
	Lainnya, sebutkan						
5.	Sayur-sayuran						
	Bayam						
	Kangkung						

	Daun singkong						
	Sawi hijau						
	Kol						
	Kembang kol						
	Brokoli						
	Timun						
	Kacang panjang						
	Buncis						
6.	Buah-buahan						
	Jeruk						
	Pepaya						
	Apel						
	Pisang						
	Mangga						
	Lainnya, sebutkan						
7.	Susu dan hasil olahannya						
	Yoghurt						
	Susu bubuk						
	Susu UHT						
8.	Makanan jajanan						
	<i>Hamburger</i>						
	<i>Pizza</i>						
	Martabak						
	Donat						
	Bakso						
	Siomay						
	Batagor						
	Pempek						
	Gorengan						
	Kue						
	Puding/agar-agar						
	Coklat						
	Mie instan						
9.	Soft Drink						
	Minuman bersoda						
	Minuman boba						
	Thai tea						

Modifikasi : Mutia, 2021

F. MASTER TABEL

No.	Nama	Umur	LILA	Kategori	kode	Pendidikan	Kode	Penghasilan	Kategori	Kode	Paritas	Kategori	Kode	pengetahuan	Kategori	Kode	keajaiban	kode	ipn maka	kategori	kode
1	nurul fitriani	40	24	tidak kek	2	SMP	2	Rp4,000000	Tinggi	1	3	Buruk	1	11 benar	Cukup	2	ada	1	657	terpenuhi	1
2	haerunnisa	28	22,3	kek	1	D4	4	Rp3,600000	tinggi	1	1	Baik	2	9 Benar	Cukup	2	ada	1	503	tidak terpenuhi	2
3	masdah	36	21,3	kek	1	S1	5	Rp3,500000	tinggi	1	3	Buruk	1	10 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	504	tidak terpenuhi	2
4	irdayanti	31	22,7	kek	1	S1	5	Rp4,500000	Tinggi	1	1	Baik	2	9 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	532	terpenuhi	1
5	junita	32	29	tidak kek	2	S1	5	Rp4,900000	Tinggi	1	1	Baik	2	10 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	726	terpenuhi	1
6	asrawati	29	23	kek	1	S1	5	Rp3,900000	tinggi	1	1	Baik	2	11 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	526	tidak terpenuhi	2
7	ernawati	46	21,8	kek	1	SMP	2	Rp1,500000	Rendah	2	4	Buruk	1	5 Benar	Kurang	1	tidak ada	2	377	tidak terpenuhi	2
8	nurindah sari	43	22,6	kek	1	SD	1	Rp2,000000	Rendah	2	4	Buruk	1	9 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	459	tidak terpenuhi	2
9	alfiana salsabila	18	23,3	KEK	1	SMA	3	Rp2,800000	rendah	2	5	buruk	1	7 benar	Kurang	1	tidak ada	2	527	tidak terpenuhi	2
10	Tri Rahmatika	28	27,5	tidak kek	2	smk	3	Rp1,200000	rendah	2	4	buruk	1	7 benar	kurang	1	tidak ada	2	457	tidak terpenuhi	2
11	Meliska	21	26,5	tidak kek	2	SD	1	Rp1,800000	rendah	2	3	buruk	1	8 benar	kurang	1	tidak ada	2	397	tidak terpenuhi	2
12	Hajjah	33	20	kek	1	SMA	3	Rp2,700000	rendah	2	2	baik	2	9 benar	cukup	2	ada	1	671	terpenuhi	1
13	firdawati	25	22	kek	1	D3 Kep	4	Rp3,200000	Rendah	2	2	baik	2	10 benar	cukup	2	tidak ada	2	589	terpenuhi	1
14	Chaerunnisa Syamsur	25	27	tidak kek	2	sma	3	Rp5,700000	tinggi	1	3	Buruk	1	12 benar	baik	3	tidak ada	2	747	terpenuhi	1
15	suriati zainuddin	27	24	tidak kek	2	s1	5	Rp6,300000	tinggi	1	2	baik	2	12 benar	baik	3	tidak ada	2	752	terpenuhi	1
16	Tina	27	28	tidak kek	2	D3	4	Rp6,000000	tinggi	1	3	Buruk	1	13 benar	baik	3	tidak ada	2	693	terpenuhi	1
17	Purnita Octavianti	21	28	tidak kek	2	sma	3	Rp3,000000	rendah	2	2	baik	2	10 benar	cukup	2	tidak ada	2	578	terpenuhi	1
18	Andi Rauradatul jannah	19	25	tidak kek	2	sma	3	Rp3,500000	tinggi	1	3	buruk	1	11 benar	Cukup	2	tidak ada	2	582	terpenuhi	1
19	ismawati majid	34	23	KEK	1	s1	5	Rp2,900000	Rendah	2	2	baik	2	12 benar	baik	3	tidak ada	2	580	terpenuhi	1
20	nur reski awaliah	28	24	tidak kek	2	s1	5	Rp2,800000	Rendah	2	1	Baik	2	11 benar	Cukup	2	tidak ada	2	503	tidak terpenuhi	2
21	nawar	34	29	tidak kek	2	s1	5	Rp7,300000	Tinggi	1	1	Baik	2	14 Benar	baik	3	tidak ada	2	504	tidak terpenuhi	2
22	fitriani ahmad	40	31	tidak kek	2	s1	5	Rp4,000000	Tinggi	1	1	Baik	2	7 Benar	Kurang	1	tidak ada	2	592	terpenuhi	1
23	hasratang	44	21	KEK	1	smk	3	Rp2,000000	Rendah	2	4	Buruk	1	11 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	726	terpenuhi	1
24	nursahidah	20	22	kek	1	smk	2	Rp2,200000	Rendah	2	4	Buruk	1	9 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	526	tidak terpenuhi	2
25	kartini	42	16,5	kek	1	smk	2	Rp2,800000	Rendah	2	5	buruk	1	6 Benar	Kurang	1	ada	1	417	tidak terpenuhi	2
26	irnawaty	31	22	kek	1	sd	1	Rp1,800000	Rendah	2	4	buruk	1	7	Kurang	1	ada	1	459	tidak terpenuhi	2
27	elisa yuliana	23	24,5	tidak kek	2	sma	3	Rp2,300000	Rendah	2	3	buruk	1	10 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	527	tidak terpenuhi	2
28	sitti aisyah	35	26	tidak kek	2	smk	3	Rp3,300000	Rendah	2	2	baik	2	11 Benar	Cukup	2	tidak ada	2	457	tidak terpenuhi	2
29	jumiati B	36	33	tidak kek	2	smk	3	Rp1,900000	Rendah	2	2	baik	2	12 benar	baik	3	tidak ada	2	597	terpenuhi	1
30	isdiah	21	19,5	kek	1	smk	3	Rp4,000000	Tinggi	1	3	Buruk	1	13 benar	baik	3	tidak ada	2	671	terpenuhi	1
31	Dita	21	24,5	tidak kek	2	sd	1	Rp3,600000	Tinggi	1	2	baik	2	11 benar	Cukup	2	ada	1	589	terpenuhi	1
32	safitri cahyani	28	25,7	tidak kek	2	sma	3	Rp5,000000	Tinggi	1	3	Buruk	2	12 benar	baik	3	tidak ada	2	747	terpenuhi	1

ANALISIS DATA

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20.00	6	6.8	6.8	6.8
	21.00	6	6.8	6.8	13.6
	22.00	4	4.5	4.5	18.2
	23.00	3	3.4	3.4	21.6
	24.00	6	6.8	6.8	28.4
	25.00	5	5.7	5.7	34.1
	26.00	2	2.3	2.3	36.4
	27.00	7	8.0	8.0	44.3
	28.00	7	8.0	8.0	52.3
	29.00	5	5.7	5.7	58.0
	30.00	3	3.4	3.4	61.4
	31.00	9	10.2	10.2	71.6
	32.00	8	9.1	9.1	80.7
	33.00	6	6.8	6.8	87.5
	34.00	7	8.0	8.0	95.5
35.00	4	4.5	4.5	100.0	
Total		88	100.0	100.0	

KEK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KEK	33	37.5	37.5	37.5
	Tidak KEK	55	62.5	62.5	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	7	8.0	8.0	8.0
	SMP	9	10.2	10.2	18.2
	SMA/SMK	41	46.6	46.6	64.8
	D3/D4	3	3.4	3.4	68.2
	S1	28	31.8	31.8	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tinggi	25	28.4	28.4	28.4
	rendah	63	71.6	71.6	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	buruk	36	40.9	40.9	40.9
	baik	52	59.1	59.1	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	14	15.9	15.9	15.9
	cukup	55	62.5	62.5	78.4
	baik	19	21.6	21.6	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Riwayat Penyakit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ada	19	21.6	21.6	21.6
	tidak ada	69	78.4	78.4	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Asupan Makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	terpenuhi	44	50.0	50.0	50.0
	tidak terpenuhi	44	50.0	50.0	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Crosstab

		Count	KEK		Total
			KEK	Tidak KEK	
Penghasilan	tinggi	Count	5	20	25
		% within Penghasilan	20.0%	80.0%	100.0%
		% within KEK	15.2%	36.4%	28.4%
		% of Total	5.7%	22.7%	28.4%
Penghasilan	rendah	Count	28	35	63
		% within Penghasilan	44.4%	55.6%	100.0%
		% within KEK	84.8%	63.6%	71.6%
		% of Total	31.8%	39.8%	71.6%
Total		Count	33	55	88
		% within Penghasilan	37.5%	62.5%	100.0%
		% within KEK	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	37.5%	62.5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.563 ^a	1	.033		
Continuity Correction ^b	3.580	1	.058		
Likelihood Ratio	4.858	1	.028		
Fisher's Exact Test				.050	.027

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate	.313	
ln(Estimate)	-1.163	
Standard Error of ln(Estimate)	.561	
Asymptotic Significance (2-sided)	.038	
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common OddsRatio	
	Lower Bound	.104
	Upper Bound	.938
	ln(Common Odds Ratio)	
	Lower Bound	-2.262
	Upper Bound	-.064

Crosstab

		KEK	KEK Tidak KEK	Total	
Paritas	buruk	Count	12	24	36
		% within Paritas	33.3%	66.7%	100.0%
		% within KEK	36.4%	43.6%	40.9%
		% of Total	13.6%	27.3%	40.9%
	baik	Count	21	31	52
		% within Paritas	40.4%	59.6%	100.0%
		% within KEK	63.6%	56.4%	59.1%
		% of Total	23.9%	35.2%	59.1%
tal	Count	33	55	88	
	% within Paritas	37.5%	62.5%	100.0%	
	% within KEK	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	37.5%	62.5%	100.0%	

chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.451 ^a	1	.502		
Fisher's Exact Test				.655	.328
Linear-by-Linear Association	.446	1	.504		
N of Valid Cases	88				

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate	.738		
ln(Estimate)	-.304		
Asymptotic Significance (2-sided)	.502		
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.304
		Upper Bound	1.792
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	-1.191
		Upper Bound	.583

Crosstab

		KEK		Total	
		KEK	Tidak KEK		
Pengeahuan	kurang	Count	8	6	14
		% within Pengetahuan	57.1%	42.9%	100.0%
		% within KEK	24.2%	10.9%	15.9%
		% of Total	9.1%	6.8%	15.9%
	cukup	Count	22	33	55
		% within Pengetahuan	40.0%	60.0%	100.0%
		% within KEK	66.7%	60.0%	62.5%
		% of Total	25.0%	37.5%	62.5%
	baik	Count	3	16	19
		% within Pengetahuan	15.8%	84.2%	100.0%
		% within KEK	9.1%	29.1%	21.6%
		% of Total	3.4%	18.2%	21.6%
Total	Count	33	55	88	
	% within Pengetahuan	37.5%	62.5%	100.0%	

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.272 ^a	2	.043
Likelihood Ratio	6.708	2	.035
Linear-by-Linear Association	6.094	1	.014
N of Valid Cases	88		

Crosstab

			KEK		Total
			KEK	Tidak KEK	
Riwayat Penyakit	Ada	Count	8	11	19
		% within Riwayat Penyakit	42.1%	57.9%	100.0%
		% within KEK	24.2%	20.0%	21.6%
		% of Total	9.1%	12.5%	21.6%
	tidak ada	Count	25	44	69
		% within Riwayat Penyakit	36.2%	63.8%	100.0%
		% within KEK	75.8%	80.0%	78.4%
		% of Total	28.4%	50.0%	78.4%
Total	Count	33	55	88	
	% within Riwayat Penyakit	37.5%	62.5%	100.0%	
	% within KEK	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	37.5%	62.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.219 ^a	1	.640		
Continuity Correction ^b	.040	1	.841		
Likelihood Ratio	.217	1	.641		
Fisher's Exact Test				.790	.416
Linear-by-Linear Association	.217	1	.642		
N of Valid Cases	88				

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate	1.280		
ln(Estimate)	.247		
Standard Error of ln(Estimate)	.528		
Asymptotic Significance (2-sided)	.640		
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.455
		Upper Bound	3.602
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	-.788
		Upper Bound	1.281

Crosstab

		Count	KEK		Total
			KEK	Tidak KEK	
Asupan Makanan	terpenuhi	Count	11	33	44
		% within Asupan Makanan	25.0%	75.0%	100.0%
		% within KEK	33.3%	60.0%	50.0%
		% of Total	12.5%	37.5%	50.0%
	tidak terpenuhi	Count	22	22	44
		% within Asupan Makanan	50.0%	50.0%	100.0%
		% within KEK	66.7%	40.0%	50.0%
Total	Count	33	55	88	
	% within Asupan Makanan	37.5%	62.5%	100.0%	
	% within KEK	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	37.5%	62.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.867 ^a	1	.015		
Continuity Correction ^b	4.848	1	.028		
Likelihood Ratio	5.953	1	.015		
Fisher's Exact Test				.027	.013
Linear-by-Linear Association	5.800	1	.016		
N of Valid Case	88				

Riwayat Hidup



A. Biodata Penulis

1. Nama : Andi Sabrina
2. NIM : 70600120027
3. Tempat/Tgl Lahir : Aluppange Soppeng, 11 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
7. Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
8. Alamat : Minasa Upa Blok M7 Nomor 23
9. Orang Tua
 - a. Ayah : H.A.Zainuddin, S.Ip
 - b. Ibu : Hj. Halawiah, S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 41 TONRONG PEJJA
2. SMP : SMPN 2 MARIORIAWA
3. SMA : SMAN 3 SOPPENG
4. Tahun 2020 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.