

**ANALISIS *HEALTH LITERACY* IBU TERHADAP *ACCEPTANCE* TINDAKAN
SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL DI RSIA ANANDA MAKASSAR
TAHUN 2023**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

ANUGRAH AYU ALFIYAH
NIM: 70600120037

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Ayu Alfiyah

NIM : 70600120037

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 30 Maret 2002

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Maccini Raya 1 No.5

Judul : Analisis Health Literacy Ibu Terhadap Acceptance Tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Februari 2024




Anugrah Ayu Alfiyah
NIM: 70600120037

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pembimbing penulisan skripsi Anugrah Ayu Alfiyah, NIM 70600120037 mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "*Analisis Health Literacy Ibu Terhadap Acceptance Tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023*", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 17 Februari 2024

Pembimbing 1



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Pembimbing 2



dr. Saharuddin, M.Kes



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Analisis Health Literacy Ibu Terhadap Acceptance Tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023**" yang disusun oleh Anugrah Ayu Alfiah, NIM 70600120037, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Februari 2024, bertepatan dengan 6 Sha'ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 17 Februari 2024

7 Sha'ban 1445 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Pembimbing I	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Saharuddin, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rizka Anastasia, Sp.A	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar



Dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“Analisis *Health Literacy* Ibu Terhadap *Acceptance* Skrining Hipotiroid Kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023”**. Shalawat serta salam tak henti kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi Rahmatan Lil'alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orangtua ayahanda Suryadi Kadir dan ibunda Iswarty Ismail dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan proposal ini kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.

3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A, M.Kes dan dr. Saharuddin, M.Kes selaku dosen pembimbing penelitian yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, motivasi, bimbingan, dan pemberian informasi yang tepat.
5. dr. Rizka Anastasia, Sp.A sebagai penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag sebagai penguji integrasi keislaman, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat saya di bangku perkuliahan (Indirah, Irma, Wini, Chusnul, Dhila, Fira, Fadhyh, Akhdan, Amin, Aan, Gerar, Akbar, Agung dan fajrul) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan proposal ini.

8. Sahabat-sahabat saya di bangku SMA dan Tsanawiyah, yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan proposal ini.
9. Teman-teman sejawat angkatan 2020, Aponeu20sis, yang telah kebersamai hari-hari saya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Januari 2024



Penyusun

Anugrah Ayu Alfiyah
NIM :70600120037

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	15
G. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Health Literacy.....	17
1. Definisi Health Literacy	17
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Health Literacy.....	18
3. Model Health Literacy	22
4. Level Health Literacy	24
5. Dampak Health Literacy	26
B. Hipotiroid Kongenital	27
1. Definisi Hipotiroid Kongenital	27
2. Etiologi Hipotiroid Kongenital	28
3. Insidensi Hipotiroid Kongenital	31
4. Patofisiologi Hipotiroid Kongenital	32
5. Manifestasi Klinis Hipotiroid Kongenital.....	36
6. Terapi Hipotiroid Kongenital	38

7. Prognosis Hipotiroid Kongenital.....	39
C. Skrining Hipotiroid Kongenital	41
1. Definisi Skrining Hipotiroid Kongenital.....	41
2. Pengaruh Skrining Hipotiroid Kongenital.....	44
D. Penerimaan (<i>Acceptance</i>).....	47
1. Definisi Penerimaan.....	47
2. Faktor-faktor Mempengaruhi Penerimaan.....	47
E. Integrasi Keislaman	49
F. Kerangka Teori	53
G. Kerangka Konsep.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Desain Penelitian	55
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	55
C. Variabel Penelitian	55
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	56
E. Tehnik Pengambilan Sampel	57
F. Instrumen Penelitian.....	58
G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	59
H. Alur Penelitian.....	62
I. Penyajian Data.....	63
J. Etika Penelitian.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil.....	64
B. Pembahasan.....	68
C. Keterbatasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
RIWAYAT HIDUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	10
Tabel 2.1 Klasifikasi Hipotiroid Kongenital Berdasarkan Etiologinya.....	29
Tabel 2.2 Pemberian Dosis L-Tiroksin Sesuai Usia.....	39
Tabel 2.3 <i>Reference Range</i> Tes Hormon Tiroid Pada Bayi Sesuai Usia	43
Tabel 4.1 Distribusi Data Demografi Responden.....	64
Tabel 4.2 Distribusi Data Ibu Hamil Berdasarkan Health Literacy dan Tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital.....	66
Tabel 4.3 Hubungan health literacy dengan Acceptance Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023	67



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Algoritma Diagnostik Hipotiroid Kongenital.....	42
Bagan 2.2 Kerangka Teori	53
Bagan 2.3 Kerangka Konsep.....	54
Bagan 3.1 Alur Penelitian	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Patofisiologi HK..... 34




DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhānahu wata‘ālā
SAW	: Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
HK	: Hipotiroid Kongenital
SHK	: Skrining Hipotiroid Kongenital
RSIA	: Rumah Sakit Ibu dan Anak
TSH	: <i>Thyroid Stimulating Hormon</i>
TRH	: <i>Thyrotropin Releasing Hormon</i>
IQ	: <i>Intelligence Quotient</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL	: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
ANC	: <i>Antenatal Care</i>
HL	: <i>Health Literacy</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	88
Lampiran 2 Uji validitas dan Reliabilitas.....	92
Lampiran 3 Etika Penelitian	93
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi.....	94
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Meneliti.....	95
Lampiran 6 Mater Tabel.....	96
Lampiran 7 Hasil SPSS	98
Lampiran 8 Dokumentasi	102



ABSTRAK

Nama : Anugrah Ayu Alfiah

NIM : 70600120037

**Judul : Analisis Health Literacy Ibu Terhadap Acceptance Tindakan
Skrining Hipotiroid Kongenital di RSIA Ananda Makassar
Tahun 2023**

Kondisi terjadinya penurunan fungsi atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid pada bayi baru lahir dikenal sebagai hipotiroid kongenital, kondisi ini menyebabkan seorang anak akan mengalami masalah dalam masa pertumbuhannya dan besar kemungkinan mengalami retradasi mental yang akan mempengaruhi perkembangan fisik dan intelektualnya. Dilakukannya skrining pada setiap bayi baru lahir tidak terlepas dari persetujuan serta penerimaan orang tua, maka dari itu sangat perlu orang tua memiliki tingkat literasi kesehatan terhadap tindakan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara health literacy ibu dengan penerimaan tindakan skrining hipotiroid kongenital di RSIA Ananda Makassar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian *Cross Sectional* Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil Trimester III baik primigravida maupun multigravida yang melakukan *antenatal care* (ANC) di Rumah Sakit. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sample berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Besarnya sampel ditentukan berdasarkan rumus *Slovin*, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 Analisis data menggunakan *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) 26 . Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu dengan penyebaran angket. Hasil penelitian menunjukkan nilai p sebesar $0.004 < 0.05$ (nilai signifikan). Kesimpulan terdapat hubungan antara literasi kesehatan ibu dengan penerimaan tindakan skrining hipotiroid kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023.

Kata Kunci : Literasi Kesehatan, Hipotiroid Kongenital, Skrining

ABSTRACT

Name : Anugrah Ayu Alfiyah

NIM : 70600120037

Title : *Analysis of Maternal Health Literacy Towards Acceptance of Congenital Hypothyroid Screening Measures at RSIA Ananda Makassar in 2023*

The condition of decreased function or malfunction of the thyroid gland in newborns is known as congenital hypothyroidism, this condition causes a child to experience problems in their growth period and is likely to experience mental retardation which will affect their physical and intellectual development. The screening of every newborn is inseparable from the approval and acceptance of parents, therefore it is very necessary for parents to have a level of health literacy towards health actions. This study aims to determine the relationship between maternal health literacy and acceptance of congenital hypothyroid screening at RSIA Ananda Makassar. The type of research used is quantitative with a Cross Sectional research design. The population in this study were Trimester III pregnant women both primigravida and multigravida who did antenatal care (ANC) at the Hospital. The sampling technique used purposive sampling method, namely the selection of samples based on the researcher's consideration in accordance with the predetermined inclusion and exclusion criteria. The sample size was determined based on the Slovin formula, so that the number of samples in this study was 100. Data analysis using the Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) 26. Data collection techniques using primary data, namely by distributing questionnaires. The results showed a p value of 0.004 < 0.05 (significant value). There is a relationship between maternal health literacy and acceptance of congenital hypothyroid screening measures at RSIA Ananda Makassar in 2023.

Keywords : Health Literacy, Hypothyroid Congenital, Screening

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi terjadinya penurunan fungsi atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid pada bayi baru lahir dikenal sebagai hipotiroid kongenital. Hal ini dapat terjadi karena kelainan anatomi, gangguan metabolisme, atau kekurangan iodium (Kemenkes, 2014). Hipotiroid kongenital merupakan kelainan bayi sejak lahir yang disebabkan oleh kurangnya sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid dan kurangnya kerja hormon tiroid pada tingkat sel (Hiola et al., 2022). Dibandingkan dengan populasi kulit putih, kejadian hipotiroid kongenital dilaporkan lebih tinggi pada orang Asia, Amerika Asli, dan Hispanik, tetapi lebih rendah pada orang kulit hitam Amerika. Secara keseluruhan, kejadian lebih rendah pada orang kulit putih 1:1815 dan kulit hitam Amerika 1:1902, lebih tinggi pada orang Hispanik 1:1559, dan paling tinggi pada orang Asia 1:1016 (Rastogi & LaFranchi, 2010). Prevelensi kejadian hipotiroid kongenital di Indonesia antara tahun 2000 dan 2014, dari 213.699 bayi baru lahir yang diperiksa untuk hipotiroidisme kongenital, 85 di antaranya didiagnosis positif, dengan prevalensi 1:2513. Di Indonesia, prevalensi jauh lebih tinggi daripada di seluruh dunia (Setyaningsih & Wulandari, 2022). Pada penelitian tahun 2014 yang dilakukan di RSUP Wahidin Sudirohusodo didapatkan 7 kasus hipotiroid kongenital dan sebagian dari kasus ini karena keterlambatan diagnosis (Nurfadillah, 2014).

Permenkes nomor 78 tahun 2014 menyatakan bahwa dampak hipotiroid kongenital terhadap anak dapat menyebabkan kecacatan dan gangguan pertumbuhan fisik secara keseluruhan juga retardasi mental atau gangguan intelektual, yang mana akan mengakibatkan beban psikologis dan ekonomi bagi keluarga untuk merawat anak dengan gangguan fisik dan retardasi mental. Selain itu, dampaknya terhadap negara juga akan menambah beban untuk pendidikan anak yang berkebutuhan khusus dan generasi bangsa berikutnya.

Dengan angka kejadian dan dampak yang luas terhadap kejadian hipotiroid kongenital diperlukan pemeriksaan yang dapat mendeteksi dini, yaitu Skrining Hipotiroid kongenital (SHK) pada bayi baru lahir di usia 24-72 jam dengan tujuan mengklasifikasikan bayi dengan Hipotiroid Kongenital dan bayi bukan Hipotiroid Kongenital. Tindakan menjadi standar pelayanan bayi baru lahir yang disebutkan didalam peraturan kemenkes no. 78 tahun 2014. Pengobatan Hipotiroid Kongenital (HK) sebelum anak berumur satu bulan dan deteksi dini melalui skrining bayi baru lahir dan pemeriksaan laboratorium adalah kunci keberhasilan pengobatan. Gejala Hipotiroid Kongenital pada awal kehidupan sangat jarang ditemukan. Maka anak-anak yang tidak ditemukan dengan cepat dan tidak diobati akan mengalami keterbelakangan mental dengan IQ di bawah 70. Hal ini akan memengaruhi masalah sosial anak (Kemenkes, 2014).

Dilakukannya skrining pada setiap bayi baru lahir tidak terlepas dari persetujuan serta penerimaan orang tua terhadap tindakan ini, terlebih lagi skrining ini dilakukan dengan pengambilan sampel berupa Teknik pengambilan darah melalui tumit bayi (*heel prick*) (Nurfadillah, 2014). Maka dari itu sangat perlu orang tua memiliki tingkat *health literacy* terhadap tindakan kesehatan. *Health literacy* adalah pengetahuan, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan untuk membantu membuat keputusan tentang perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup (Lupita et al., 2023). Saat ini belum terdapat fakta yang akurat terkait tingkat *health literacy* masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan SHK. Data di Indonesia per september 2023 sebanyak 11,38% dari total 507.896 bayi baru lahir dilakukan tindakan SHK dan 66 diantaranya mengalami Hipotiorid kongenital (Kemenkes, 2022). Sehingga menjadi penting dilakukannya penelitian terkait hubungan antara tingkat *health literacy* khususnya orang tua dalam penerimaan dalam pelaksanaan SHK.

Kebanyakan pemeriksaan skrining bayi baru lahir menggunakan sampel darah yang diambil melalui tusukan pada tumit bayi dan dilakukan di fasilitas perawatan medis dalam beberapa jam atau hari pertama setelah kelahiran. Pentingnya orang tua untuk mendapatkan informasi yang akurat, komprehensif, dan tepat waktu mengenai skrining bayi baru lahir beserta manfaatnya. Adanya informasi mengenai skrining

bayi baru lahir membuat orang tua menyadari kemungkinan dan pentingnya menjalani pemeriksaan segera. Tingkat pengetahuan orang tua tentang pemeriksaan skrining bayi baru lahir secara konsisten dilaporkan berada di bawah rata-rata di berbagai budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Yordania tahun 2020, 5% dari sampel ibu yang memiliki bayi baru lahir melaporkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan apa pun mengenai pemeriksaan skrining bayi baru lahir maka dari itu mereka tidak menyetujui dan berpartisipasi dalam tindakan skrining (Kasem et al., 2022).

Rasulullah SAW sangat sering mengucapkan kalimat ini dalam sabdanya yaitu “Banyak manusia merugi karena dua nikmat: kesehatan dan waktu luang” (HR. Bukhori). Ajaran Islam mengajak dan menganjurkan umat untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pelenyapan penyakit atau pengobatan) dapat langkah dalam mempertahankan kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan pada tahun 2021 terdapat 116.269 angka kelahiran di kota Makassar, 5.487 diantaranya lahir di RSIA Ananda Makassar. Kemudian pada tahun 2022 terdapat angka kelahiran bayi sebanyak 116.398 dan 5.964 atau sekitar 4,5% lahir di RSIA Ananda Makassar. Rumah Sakit ini merupakan fasilitas kesehatan swasta yang tetap melayani pasien BPJS dan termasuk sebagai salah satu rumah sakit di Kota Makassar yang sejak awal telah melaksanakan skrining bayi baru lahir sesuai peraturan pemerintah

antaranya adalah SHK yang dilaksanakan tidak lama setelah sejak terbitnya peraturan sesuai undang-undang pasal 78 tahun 2014. Disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1511/2023, yang menyatakan terkait penjaminan dan pembayaran atas pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal dilaksanakannya Skrining Hipotiroid Kongenital dibayarkan satu paket dengan persalinan di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pertanggal 1 September 2023.

Sehat menurut WHO didefinisikan sebagai kondisi yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Oleh karena itu, kesehatan total adalah keadaan di mana tidak ada penyakit dan semua organ tubuh berfungsi secara normal. Dalam konteks kesehatan masyarakat, konsep kesehatan secara holistik mencakup berbagai aspek: fisik, mental, sosial, ekonomi, pendidikan, makanan dan minuman (nutrisi), kuratif, dan preventif (Elkarimah, 2016). Dalam hal ini termasuk skrining bayi baru lahir sebagai tindakan deteksi dan pengobatan dini serta mencegah terjadinya dampak jangka panjang khususnya pada insiden hipotiroid kongenital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hubungan *health literacy* ibu terhadap *acceptance* tindakan skrining hipotiroid kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

Tidak ada hubungan antara *health literacy* ibu dengan *acceptance* tindakan skrining hipotiroid kongenital di RSIA Ananda Makassar.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada hubungan antara *health literacy* ibu dengan *acceptance* tindakan skrining hipotiroid kongenital di RSIA Ananda Makassar.



D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 (Definisi Operasional)

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	<i>Health Literacy</i> Ibu	Literasi kesehatan didefinisikan sebagai pengetahuan individu, motivasi dan kemampuan untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan untuk membuat penilaian dan keputusan tentang perawatan kesehatan, penyakit pencegahan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan.	Kuesioner	➤ Parameter <i>Health literacy</i> berdasarkan HLS-EU 16 pengambilan keputusan dengan Skor akhir (Bergman et al., 2023) Status literasi tidak memadai (<i>inadequate</i>) 0-12 Status literasi memadai (<i>adequate</i>) 13-16	Ordinal

Variabel Dependen					
1.	<i>Acceptance</i> tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital	Penerimaan program skrining bayi baru lahir untuk hipotiroid kongenital yang merupakan tindakan medis diagnosis gangguan kongenital dini dan pemberian pengobatan segera. Tindakan ini untuk membantu mencegah dan menjaga kesehatan anak-anak dengan anomali kongenital. dan menyingkirkan kemungkinan anak-anak mengalami gangguan di masa yang akan datang dan mempengaruhi kehidupan baik dari segi fisik ataupun psikologi	Kuesioner	➤ Parameter Tindakan SHK (Hiola et al., 2022). Berpartisipasi Tidak berpartisipasi	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencari dan menganalisis hubungan *health literacy* ibu terhadap *acceptance* skrining hipotiroid kongenital di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar. Instrumen pada penelitian ini yaitu kuesioner atau angket yang diisi langsung dari responden dan berupa data primer.




E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 (KajianPustaka)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
1.	Nabila Rayhan Yasmin, 2022	Gambaran Hasil Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Berdasarkan Topografi Wilayah di Kota Bandar Lampung Pada Bulan Mei - Oktober Tahun 2019	Penelitian metode deskriptif dengan pendekatan cross sectional	Total sampel yaitu semua bayi berumur 24-72 jam yang lahir di Kota Bandar Lampung pada bulan Mei-Oktober tahun 2019.	Data sekunder yang diambil dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Puskesmas di wilayah kerja Kota Bandar Lampung	Gambaran hasil SHK di kota Bandar Lampung persentase paling tinggi yaitu 24% di wilayah topografi pasang sururt dan paling rendah dengan persentase 15% pada wilayah berbukit sampai pegunungan

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
2.	Resty Nofliduputri Vitri Meilinda, 2021	Analisis Evaluasi Pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada Bayi Baru Lahir	Menggunakan mixed metode dengan desain sequential explanatoy	Informan sebanyak 15 orang dan 89 bayi baru lahir	Melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan SHK atau instrumen observasi dan wawancara langsung	Disimpulkan bahwa kesesuaian cakupan tindakan SHK belum mencapai target karena disebabkan beberapa faktor baik dari pelayanan kesehatan maupun masyarakat sendiri terkait SHK.

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
3.	Charunia Anggraini Y.Budi Sarwo Hadi Sulistvanto, 2018	Peran Puskesmas Dalam Pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital Untuk Menjamin Kesehatan Anak Di Puskesmas Kabupaten Oku Timur.	Penelitian metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologi.	Yang merupakan sampel dalam penelitian ini adalah kepala Puskesmas, Kepala Bagian bidang Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala bagian Hukum dari Pemda juga ibu yang memiliki bayi yang datang ke Puskesmas.	Menggunakan data primer dengan observasi langsung melalui teknik wawancara kepada responden	Terdapat beberapa faktor mempengaruhi SHK diantara: faktor yuridis berupa dukungan pelaksanaan SHK, adanya beberapa peraturan daerah yang dibentuk. Faktor internal pelaksanaan SHK belum berjalan efektif karena kurang tenaga kesehatan yang

					<p>terlatih terkait SHK. Faktor eksternal terkait dengan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya SHK dan juga pengaruh akses ke puskesmas karena kondisi jalan yang buruk.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
4.	Nurfadillah, 2014	Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014	Penelitian metode deskriptif	Jumlah sampel diambil dari jumlah rata-rata ibu bersalin setiap bulannya di tahun 2013, sebanyak 21 orang	Data primer berupa pengisian Kuesioner	Terdapat responden dengan pengetahuan baik >50%, dibandingkan yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang Skrining hipotiroid kongenital.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan *health literacy* ibu terhadap *acceptance* tindakan skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a) Mengetahui tingkat *health literacy* Ibu tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023
- b) Mengetahui tingkat *acceptance* Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023
- c) Mengetahui Hubungan *health literacy* dengan *acceptance* Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di bidang kesehatan selama studi terkhusus terkait skrining hipotiroid kongenital dan *health literacy*.

2. Bagi pengetahuan

Hasil akhir dari penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan informasi yang menambah pengetahuan serta menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya pada penelitian yang spesifik terkait kesehatan Ibu dan Anak.

3. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan masyarakat sebagai sumber bacaan tentang pentingnya pengetahuan kesehatan dan skrining hipotiroid kongenital pada setiap bayi baru lahir.

4. Bagi instansi

- a) Memberikan informasi lebih lanjut kepada institusi bidang kesehatan ibu dan anak, terutama tentang hubungan antara literasi kesehatan ibu dengan penerimaan skrining hipotiroid kongenital.
- b) Untuk menyediakan referensi tambahan dan sekaligus berfungsi sebagai parameter dan dasar untuk penelitian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Health Literacy

1. Definisi *Health Literacy*

Health Literacy adalah pengetahuan, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan untuk membantu membuat keputusan tentang perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut WHO tahun 2013, literasi kesehatan Sebagian besar masyarakat memiliki perilaku kesehatan yang berisiko, seperti aktivitas fisik yang tidak cukup, gizi yang tidak seimbang, dan merokok. Perilaku risiko ini terkait dengan penyakit kronis seperti diabetes, yang menyebabkan lebih dari 75% kematian di seluruh dunia (Lupita et al., 2023).

Selain itu dijelaskan juga bahwa *health literacy* merupakan kemampuan dan keterampilan sosial kognitif yang dapat mendorong seseorang untuk memperoleh, mengolah, dan memahami semua informasi yang telah mereka peroleh dari layanan kesehatan primer yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk kehidupan yang sehat (Putri, 2021).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Health literacy

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *health literacy*, sebagai berikut:

a) Usia

Tingkat literasi kesehatan dipengaruhi oleh usia karena semua sistem tubuh, termasuk sistem kognitif dan sensorik, akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Penurunan kognitif akan mempengaruhi proses berpikir dan kemampuan untuk memproses informasi yang diterima, dan penurunan persepsi akan menyebabkan lebih sedikit aktivitas yang dapat dilakukan seseorang dan dapat berdampak pada literasi kesehatan seseorang tentang cara mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat (Santosa, 2012). Kelompok usia yang lebih dari 50 tahun menunjukkan tingkat literasi lebih rendah 15% dari pada kelompok usia yang lebih muda (Wahyuningsih, 2019).

b) Pendidikan

Pendidikan dapat berdampak langsung ataupun tidak langsung pada tingkat literasi kesehatan seseorang. Pendidikan langsung berdampak pada kemampuan seseorang dalam berbagai keterampilan yang mereka kuasai. Orang-orang yang berakal dan berpendidikan lebih mudah memahami informasi kesehatan yang diperlukan. Mereka memiliki kemampuan membaca, menulis, mendapatkan

informasi, dan menafsirkannya. Kemampuan seseorang akan menentukan cara mereka menerima informasi dan menemukan solusi terbaik untuk penyakit mereka. Artinya, tingkat pendidikan juga akan berkorelasi dengan pekerjaan dan pendapatan, yang berdampak pada layanan kesehatan (Santosa, 2012). Proses pembelajaran individu sejak kecil, memasuki tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas hingga jenjang universitas menjadi kesempatan individu itu sendiri dalam meningkatkan *health literacy* nya. Adanya pendidikan kesehatan harus dimulai pada usia dini dan terus meningkat secara berkelanjutan (Wahyuningsih, 2019).

c) Akses informasi kesehatan

Kemampuan mengakses informasi secara mandiri juga merupakan kemampuan yang diperlukan oleh seorang individu untuk dapat memiliki *health literacy* yang baik. Ketersediaan informasi yang bersifat mendidik, mampu menghindarkan individu dari perilaku yang tidak sehat. Salah satu cara dalam mengakses melalui media massa cetak maupun elektronik yang dapat memberikan informasi tentang pemeliharaan kesehatan. Paparan informasi terkait kesehatan yang terjadi terus menerus akan mengubah pandangan dan kebiasaan individu itu sendiri dan meningkatkan *health literacy* (Mahfudah, 2020).

Pentingnya akses informasi kesehatan yang lengkap dan mudah diakses dapat membantu pasien untuk membuat keputusan pengobatan yang tepat. Dimana dengan informasi yang mudah diakses ini juga mempengaruhi tingkat literasi kesehatan seseorang. Adapun penyebaran informasi yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti koran, televisi, buku, brosur, internet, dan media massa lainnya adalah beberapa cara di mana informasi kesehatan itu sendiri dapat disebarluaskan (Santosa, 2012).

d) Bahasa

Salah satu komponen utama literasi kesehatan adalah kemampuan untuk memahami bahasa yang menjadi bahasa nasional suatu negara. Masyarakat harus mengenal dan memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam sistem kesehatan negara mereka. Saat ini, keterampilan bahasa yang baik dan tepat sangat diperlukan untuk membaca atau mendengar berbagai macam informasi kesehatan dari berbagai sumber, seperti buku, brosur, petunjuk penggunaan obat, formulir asuransi, dan bahkan persetujuan yang diminta oleh sistem kesehatan. Jika bahasa sehari-hari seseorang bukan bahasa nasionalnya, individu dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-harinya akan mempermudahnya dalam memperoleh informasi kesehatan sedangkan mereka dengan penggunaan

bahasa daerah sesuai dengan tempatnya tinggal akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi kesehatan yang mereka butuhkan (Toar, 2020).

e) Pekerjaan dan pendapatan

Status pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan finansial mereka, serta kemampuan mereka untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan berbagai informasi kesehatan. Status pekerjaan mempengaruhi pendapatan mereka. Pasien yang memiliki pendapatan dapat membuat tabungan kesehatan atau asuransi kesehatan. Mereka ini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perawatan medis dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Semakin mudah bagi orang untuk mendapatkan atau memperoleh layanan medis, semakin mudah bagi mereka untuk mengenal sistem layanan kesehatan yang tersedia (Santosa, 2012). Pendapatan adalah indeks representatif yang sangat baik untuk menentukan status sosial ekonomi seseorang.

Mencari nafkah adalah hal pertama yang diprioritaskan oleh masyarakat berpenghasilan rendah sebelum pengelolaan kesehatan, yang menyebabkan mereka memiliki status kesehatan yang buruk. Selain itu, meskipun orang berpenghasilan rendah mencoba menjalani gaya hidup sehat, mereka biasanya tidak memiliki uang untuk membeli

makanan sehat atau waktu untuk berolahraga seperti orang kelas atas (Cho et al., 2020).

f) Etnis

Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada budaya dan keturunan mereka. Kebudayaan atau suku tertentu akan mempengaruhi tindakan dan pencarian solusi dari berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah menyelesaikan masalah kesehatan. Perbedaan budaya dari setiap ras atau suku akan mempengaruhi pandangan dan pemikiran seseorang tentang kesehatan, memutuskan masalah kesehatan, dan menafsirkan hasil konsultasi kesehatan diri mereka dengan dokter (Santosa, 2012).

3. Model *Health Literacy*

Dalam berbagai konten kesehatan, kemampuan *health literacy* yang kompleks diperlukan. Termasuk keterampilan menulis, membaca, menghitung, mendengarkan, berbicara, menggunakan teknologi dan keterampilan *rhetorical* yang mana termasuk kemampuan untuk meminta, mendukung, dan mengemukakan keluhan. Para petugas kesehatan harus mempertimbangkan penggunaan kata-kata umum untuk memberikan pelayanan dan berkomunikasi pasien. Dikarenakan sebagian besar pasien memiliki kemampuan *Health Literacy* yang berbeda-beda (Bening Alfania, 2019).

Terdapat model *health literacy* yang terdiri dari kemampuan untuk mencari dan mengakses informasi kesehatan, memahami informasi tersebut, menafsirkan dan menilai informasi tersebut, dan menerapkan informasi tersebut dengan cara yang tepat. Dalam model ini, ada empat kategori kompetensi utama untuk literasi kesehatan, yaitu:

a) *Access* (Mengakses)

Kemampuan untuk mencari, menemukan, dan memperoleh informasi kesehatan tergantung pada pemahaman, waktu, dan kepercayaan (Sørensen et al., 2012).

b) *Understand* (Memahami)

Kemampuan untuk memahami informasi kesehatan yang tersedia. Kompetensi ini bergantung pada harapan, keuntungan yang dirasakan, hasil individualisasi, dan cara menginterpretasikan informasi (Sørensen et al., 2012).

c) *Appraise* (Menilai)

Kemampuan untuk menafsirkan, menyaring, menilai, dan mengevaluasi data kesehatan. Pemrosesan dan penilaian data sangat bergantung pada seberapa kompleks dan mudah dipahami (Sørensen et al., 2012).

d) *Apply* (Menerapkan)

Kemampuan berkomunikasi dan menggunakan informasi untuk membuat keputusan dan meningkatkan kesehatan. Komunikasi yang efektif bergantung pada

pemahaman seseorang tentang bagaimana informasi diterima (Sørensen et al., 2012).

4. Level *Health Literacy*

Sebagai hasil dari berbagai penelitian, literasi kesehatan adalah salah satu prediktor terkuat untuk kesehatan seseorang. Tingkat literasi tentang kesehatan individu yang rendah dikaitkan dengan kekurangan pengetahuan tentang perawatan kesehatan yang bersifat preventif, perawatan diri, dan pengobatan. Keterbatasan informasi mulai dari pemahaman tentang demam pada anak-anak sampai kondisi yang menjadi kronis seperti penyakit metabolik (Sahroni et al., 2019).

Pengetahuan prosedural adalah pemahaman orang tentang aturan yang dapat membantu serta mendorong pilihan dalam memilih tindakan medis yang beralasan, sedangkan pengetahuan deklaratif adalah pemahaman orang tentang informasi faktual tentang kesehatan. Terdapat tiga gambaran hierarki atau tingkatan Literasi kesehatan dalam aspek fungsional, interaktif, dan kritis (Liu et al., 2020).

a) Level 1: Literasi kesehatan Fungsional

Literasi kesehatan fungsional mengacu pada kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dasar tentang kesehatan. Dengan literasi kesehatan fungsional yang baik, setiap orang dapat mendapatkan akses ke informasi kesehatan dari berbagai sumber, seperti buku

pedoman kesehatan, brosur, dan media lain, seperti televisi dan internet (Nutbeam, 2006).

b) Level 2: Literasi Kesehatan Interaktif

Berhubungan dengan manajemen perawatan diri, literasi kesehatan interaktif mengacu pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka dari berbagai sumber atau lokasi dan menggunakannya dalam proses perawatan diri mereka sendiri (Nutbeam, 2006).

c) Level 3 : Literasi Kesehatan Kritis

Literasi kesehatan sangat terkait dengan manajemen perawatan diri karena literasi kesehatan adalah konsep yang lebih luas dan spesifik mencakup keterampilan sosial dan pribadi, pengetahuan, komunikasi efektif antara pasien dan penyedia layanan, dan proses pengambilan keputusan kesehatan. Kemampuan untuk berpikir secara kritis merupakan komponen penting dari literasi kesehatan kritis. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengekstrak dan menganalisis berbagai informasi agar dapat membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka (Nutbeam, 2006).

5. Dampak *Health Literacy*

Literasi kesehatan sangat berkaitan dengan perilaku sehat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan seseorang, sehingga literasi kesehatan mempengaruhi hasil kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat. Orang yang kurang literasi kesehatan akan sulit mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan, yang berarti mereka tidak dapat menyesuaikan perawatan mereka sesuai dengan status kesehatan mereka (Putri, 2021).

Adanya tingkat *health literacy* yang sesuai dapat memperlihatkan suatu perubahan perkembangan perilaku, dimana individu mampu menunjukkan pengalaman yang dimiliki terkait aspek kesehatan dan mampu mengadakan hubungan kerja sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun golongan terkait dengan kesehatan (Pratiwi et al., 2008)

Tindakan penting untuk mengatasi masalah kesehatan adalah dengan meningkatkan literasi kesehatan. Tingkat literasi kesehatan yang rendah membuat mereka lebih sering mengunjungi dokter dan mendapat resep obat. Biaya pengobatan tahunan mereka diperkirakan empat kali lipat dari populasi umum (Santosa, 2012).

B. Hipotiroid Kongenital (HK)

1. Definisi HK

Hipotiroid kongenital (HK) adalah sebuah kondisi dimana terjadi penurunan atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium (Kemenkes, 2014).

Adanya disgenesis, dishormonogenesis dan pelepasan obat antitiroid transplasenta dari maternal selama masa kehamilan menyebabkan kondisi agensis, aplasia, ektopia atau kerusakan enzim yang dapat mempengaruhi produksi dari hormon tiroid sehingga menyebabkan terjadinya HK (Marcdante & Robert M. Kliegmen, 2019).

HK diartikan sebagai penyakit endokrinologi pada anak yang merupakan kegawatdaruratan klinis karena menyebabkan gangguan pada perkembangan anak itu sendiri, termasuk masalah perkembangan kecerdasan dan fungsi neurologis (Gultom & Vivian The, 2022).

Istilah umum untuk hipotiroidisme kongenital mengacu pada kekurangan hormon tiroid yang disebabkan oleh disfungsi kelenjar tiroid atau kelainan bentuk kelenjar tiroid yang muncul selama tahap perkembangan janin atau perinatal. Ini adalah salah satu penyakit neonatus yang paling umum yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental (Kurniawan, 2020).

2. Etiologi HK

Pada bayi baru lahir kejadian HK dapat disebabkan defek anatomik berupa disgenesis atau ektopik kelenjar tiroid, paparan dari iodida, defisiensi TSH dan TRH, serta cacat bawaan efek dari konsumsi goitrogen Ibu pada masa kehamilan (Marcdante & Robert M. Kliegmen, 2019).

Menurut LaFranchi S. (2000), hipotiroid kongenital dapat dibagi menjadi hipotiroid primer, sekunder, dan tersier berdasarkan penyebabnya. Hipotiroid primer terjadi ketika ada gangguan pada kelenjar tiroid, hipotiroid sekunder terjadi ketika ada gangguan pada kelenjar hipofisis, dan hipotiroid tersier terjadi ketika ada gangguan pada hipotalamus (Yasmin, 2022).

Menurut (Wija, 2019) terdapat tiga penyebab hipotiroid kongenital yaitu penyebab bawaan karena adanya disgenetik kelenjar tiroid seperti aplasia, ektopik, agenesis atau hipoplasia. Penyebab yang sifatnya sementara karena terdapat induksi obat-obatan, adanya antibodi maternal, dan dapatkan dari ibunya sendiri berupa pengobatan yodium radio-aktif. Hipotiroid kongenital pada anak juga dapat diperoleh akibat tiroiditis limfositik kronik yang dialami ibu dan ibu dengan riwayat tiroidektomi.

Tabel 2.1

Etiologi Hipotiroid Kongenital (Kurniawan, 2020)

A. Hipotiroid Kongenital Primer
<ol style="list-style-type: none"> 1. Disgenesis kelenjar tiroid (aplasia, hipoplasia, kelenjar ektopik) 2. Dishormonogenesis 3. Resistensi terhadap pengikatan/pesinyalan TSH
B. Hipotiroid Kongenital Sekunder (Sentral)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Defisiensi TSH terisolasi 2. Hipopituitari kongenital
C. Hipotiroid Kongenital Perifer
<ol style="list-style-type: none"> 1. Defek transpor hormon tiroid 2. Defek metabolik hormon tiroid 3. Resisten hormon tiroid
D. Hipotiroid Kongenital Transien
<ol style="list-style-type: none"> 1. Defisiensi iodin pada maternal atau neonatal. 2. Obat anti tiroid maternal atau neonatal 3. Mutasi heterozigot THOX2 atau DUOXA2 4. Hemangioma hepatik kongenital

Hipotiroidisme kongenital permanen dapat berasal dari penyebab primer atau sekunder. Dalam 85% kasus hipotiroidisme kongenital primer permanen, penyebab utamanya adalah kegagalan perkembangan kelenjar tiroid yang dikenal sebagai disgenesis tiroid. Disgenesis tiroid dapat disebabkan oleh lokasi ektopik kelenjar tiroid atau dalam sejumlah kecil kasus, aplasia atau hipoplasia kelenjar tiroid. Sementara itu, dalam hampir 15% kasus lainnya, hipotiroidisme kongenital primer permanen disebabkan oleh

dishormogenesis tiroid, yang terjadi akibat cacat dalam sintesis atau produksi hormon tiroid (Kurniawan, 2020).

Di sisi lain, hipotiroidisme kongenital sekunder, juga dikenal sebagai HK sentral, umumnya disebabkan oleh hipopituitarisme kongenital, kekurangan beberapa hormon hipofisis, atau kekurangan TSH terisolasi. Namun, pada hipotiroidisme kongenital perifer, penyebabnya dapat berupa kelainan dalam transportasi hormon tiroid (seperti transporter *monocarboxylate 8*), kelainan dalam metabolisme hormon tiroid (yang melibatkan protein yang mengikat *sequence selenocysteine insertion 2*), atau resistensi terhadap hormon tiroid (Kurniawan, 2020)

Hipotiroidisme transien kongenital dapat terjadi pada Beberapa kondisi termasuk ibu atau bayi yang mengonsumsi lebih banyak yodium daripada yang mereka butuhkan, ibu atau bayi yang mengonsumsi obat anti tiroid, antibodi ibu yang memblokir reseptor TSH, THOX2, atau DUOXA2 heterozigot, dan sebagainya (Kurniawan, 2020).

3. Insidensi HK

Sebelum dimulainya program skrining bayi baru lahir, kejadian hipotiroidisme kongenital, yang didiagnosis setelah manifestasi klinis, berkisar antara 1:7.000 hingga 1:10.000, dengan munculnya skrining populasi bayi baru lahir, kejadian awalnya dilaporkan berada di kisaran 1:3.000 sampai 1:4.000 (Rastogi & LaFranchi, 2010).

Angka kejadian di beberapa negara Asia Pasifik yang melakukan skrining neonatal HK secara nasional adalah sebagai berikut: Australia 1:2125, New Zealand 1:960, China 1:2468, Thailand 1:1809, Filipina 1:2673, Singapura 1:3500, dan Malaysia 1:3029. Di Indonesia, skrining HK neonatal pada awal hanya dilakukan secara sporadis di beberapa daerah di rumah sakit tertentu dan belum terdapat data nasional terkahit Hk di Indonesia. Program skrining pendahuluan HK neonatal di 14 provinsi di Indonesia menghasilkan insiden sementara dengan interval waktu sejak tahun 2000-2014 terdapat 85 HK positif dari 213.669 bayi baru lahir yang diskriking dengan perbandingan insiden 1:2513 persentase ini lebih tinggi dari insiden global yang dilaporkan (Yati et al., 2017) (Kurniawan, 2020). Bila angka kelahiran anak di Indonesia mencapai 5 juta/tahun, terdapat lebih dari 2000 bayi baru lahir yang menderita hipotiroid kongenital per tahun dan akan terakumulasi setiap tahunnya (Yulman, 2021)

4. Patofisiologi HK

Sistem kelenjar tiroid terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kelenjar tiroid, hipotalamus, dan hipofisis. Sistem ini mengalami perkembangan dan kematangan saat seorang bayi berkembang dalam rahim. Pada awal trimester pertama kehamilan, jaringan embrional tiroid berlokasi di pangkal lidah bayi dan kemudian berkembang menjadi dua lobus yang menyerupai sayap kupu-kupu. Selanjutnya, kelenjar tiroid mengalami perpindahan dari pangkal lidah ke lokasi terakhirnya di bawah kartilago tiroid (*Adam's Apple*) di bagian depan leher. Pada akhir trimester pertama, kelenjar tiroid bukan hanya berada di lokasi yang normal di leher, tetapi juga sudah memiliki kemampuan untuk mengambil yodium dan bahan mentah lainnya dari sirkulasi janin guna memproduksi hormon tiroid (Sherwood, 2018)(Peters & Schoenmakers, 2022).

Saat memasuki trimester kedua, hipotalamus mulai mengirimkan sinyal khusus kepada hipofisis untuk menghasilkan dan mengeluarkan hormon pengatur, yaitu TSH, ke dalam sirkulasi darah janin. Pada trimester kedua, tingkat TSH dalam darah janin meningkat, yang mengakibatkan stimulasi pertumbuhan kelenjar tiroid dan memicu produksi hormon tiroid. Prosesnya berlangsung di mana sel-sel kelenjar tiroid mengambil yodium dan bahan mentah lainnya termasuk asam amino dari sirkulasi darah janin. Selanjutnya, bahan-bahan ini mengalami transformasi melalui serangkaian reaksi


enzimatik, yang menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid dibentuk dari sebagian besar protein yang disebut tiroglobulin, yang disimpan dalam kelenjar tiroid. Melalui serangkaian reaksi enzimatik lainnya, hormon tiroid dipisahkan dari molekul tiroglobulin yang besar dan dilepaskan ke dalam aliran darah (Peters & Schoenmakers, 2022).

Setelah melewati trimester kedua dan ketiga, regulasi kompleks yang mengatur interaksi hormon antara hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid secara perlahan menjadi matang. Ketika mekanisme ini matang, sistem kelenjar tiroid menjadi semakin akurat dalam menghasilkan dan melepaskan hormon tiroid ke dalam sirkulasi darah bayi yang sedang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, ketika bayi mencapai usia kehamilan yang cukup, sistem kelenjar tiroid berfungsi secara optimal dan siap memenuhi semua kebutuhan bayi. Namun, jika ada bagian dari sistem kelenjar tiroid bayi yang mengalami gangguan dalam perkembangannya atau fungsinya, maka kondisi yang disebut sebagai hipotiroidisme kongenital dapat muncul, dan ini dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan keterbelakangan mental yang bersifat permanen pada bayi (Peters & Schoenmakers, 2022).

TSH sebagai hormon pengatur yang dihasilkan oleh sel basofil hipofisis anterior dan memiliki peran penting untuk sintesis hormon tiroid. Terdapat dua mekanisme yang mengatur sekresi dari TSH yaitu melalui rangsangan TRH dari hipotalamus dan melalui jalur umpan

balik negatif dari T3 dan T4 pada hipofisis anterior (Peters & Schoenmakers, 2022).

Gambar 2.1 Patofisiologi Hipotiroid



- Jalur 1:

Pada genesis tiroid sintesis dan sekresi hormon tiroid menurun sehingga terjadi hipotiroidisme primer.

- Jalur 2:

Pada defisiensi odium berat, sintesis dan sekresi hormon tiroid menurun, sel basofil menskresi TSH lebih banyak untuk memacu kelenjar tiroid membuat dan menskresi hormon tiroid agar dapat memenuhi kebutuhan tubuh

- Jalur 3:

Dishormonogenesis adalah keadaan yang mengganggu atau menurunkan sintesis hormon tiroid di dalam kelenjar tiroid (bahan/obat goitrogenik, tiroiditis, post tiroidektomi, post terapi radiasi dengan iodium radioaktif), dan adanya kelainan enzim pada jalur sintesis hormon tiroid.

- Jalur 4a:

Semua keadaan yang menyebabkan turunnya TSH akibat kelainan hipofise, akan mengakibatkan hipotiroidisme.

- Jalur 4b:

Semua kelainan hipotalamus yang mengakibatkan sekresi TRH menurun akan menyebabkan hipotiroidisme (Wassner, 2018).

Ibu dengan penyakit tiroid memiliki pengaruh sangat minimal terhadap fetus, namun tetap dapat mempengaruhi fungsi kelenjar fetus atau neonatus. Hormon T4 dapat melewati plasenta secara bebas, tapi tidak dengan hormon tiroid lainnya. Tiamin sebagai terapi hipertiroid dapat memblokir sintesis hormon tiroid fetal, tapi kebanyakan bersifat transien.

Hormon tiroid sangat berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme, termasuk perubahan konsumsi oksigen, metabolisme protein, karbohidrat, lipid, dan vitamin, serta diferensiasi oligodendrosit dan proses mielinisasi sistem jaringan saraf. Hipotiroid akan mempengaruhi perkembangan otak selama

beberapa minggu atau bulan setelah lahir dimana merupakan periode kritis dalam masa perkembangan otak (Moelyo, 2005).

5. Manifestasi Klinis HK

Mayoritas bayi baru lahir dengan hipotiroid kongenital tidak menunjukkan tanda dan gejala klinis yang nyata, hanya sekitar 5-10% yang menunjukkan manifestasi klinis segera setelah lahir. Bayi baru lahir akan tampak normal dan sehat sehingga dokter minim untuk mencurigai mereka menderita HK. Bayi dengan HK yang tidak mendapat perawatan dalam empat sampai enam minggu akan menunjukkan manifestasi klinis awal berupa (Kurniawan, 2020):

- Letargi
- Malas minum
- kurang aktif
- distres pernafasan
- hipotonia otot
- fontanel anterior dan posterior terbuka dan lebar
- pucat
- sianosis perifer
- suara tangis serak
- konstipasi
- hipotermi
- prolonged physiologic *jaundice*

Adapun manifestasi klinis lanjutan yang dapat ditemukan yaitu *nasal bridge*, muka yang sempit (*narrow forehead*), kelopak mata bengkak, kulit kasar tebal dan kering, rambut kasar, lidah besar, distensi abdomen, hernia umbilikalis, refleks menurun, bradikardia, kardiomegali, efusi perikardial asimtomatik, hipotensi, gangguan tekanan nadi, tuli neurosensoris, anemia tak berespon terhadap besi, dapat terjadi slipped capital femoral epiphysis (Moelyo, 2005).

Selain itu terjadinya hipotiroid kongenital tanpa pengobatan yang sesegera mungkin akan juga menimbulkan gejala terkait pertumbuhan dan perkembangan seperti retardasi mental, maturasi seksual terlambat, Kocher-Debre semeliam sindrom yang terdiri dari hipertropi seluruh otot sehingga anak seperti Herculean appearance (Moelyo, 2005).

Hipotiroid kongenital tidak hanya mempengaruhi perkembangan intelektual, fisik dan motorik pada anak, kondisi ini juga dapat menimbulkan masalah emosi dan perilaku pada dampak jangka panjangnya yaitu (Widakdo et al., 2020):

- kecemasan atau rasa khawatir terhadap sesuatu yang mengancam dirinya
- *irritability*, mudah terganggu dengan permasalahan kecil
- mengalami depresi
- masalah perilaku sosial

- fatigue yaitu perasaan lelah yang berlebihan
- keluhan somatis
- *social withdrawal*
- atensi yang kurang

6. Terapi HK

Hormon tiroid berperan dalam proses tumbuh kembang anak sehingga kondisi hipotiroid kongenital (HK) menyebabkan perlambatan proses tumbuh kembang. Kebutuhan hormon tiroid pada masa janin bersumber dari hormon tiroid ibu, maka dari itu perlu juga dilakukannya edukasi dalam masa kehamilan untuk memberi ibu pengetahuan juga sikap yang dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan pencegahan ataupun penerimaan pemeriksaan yang tepat terhadap kejadian HK (Muharram et al., 2021). Oleh karena itu, deteksi dini bayi dengan HK sebelum munculnya gejala klinis menjadi penting agar terapi dapat segera diberikan sehingga risiko kegagalan pertumbuhan dapat dihindari/diminimalisasi (Adisty et al., 2020).

Pengambilan keputusan dalam terapi berdasarkan hasil skrining kertas saring yang positif ($TSH \geq 20$ mU/L) dimana harus dikonfirmasi dengan darah serum sebelum dimulainya terapi. Terpai tersebut berupa pemberian Levotiroksin yang merupakan obat satu-satunya untuk hipotiroid kongenital.

Pemberiannya sesegera mungkin setelah diagnosis di tegakkan, Dosis awal levotiroksin adalah 10-15 μ g/kgBB/hari Dosis selanjutnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan TSH dan FT4 berkala dengan dosis perkiraan sesuai umur seperti pada tabel (Yati et al., 2017).

Tabel 2.2
Dosis L-Tiroksin (Yati et al., 2017).

Usia	Dosis L-tiroksin (μ g/kgBB/hari)
0-3 bulan	10-15
3-6 bulan	8-10
6-12 bulan	6-8
1-3 tahun	4-6
3-10 tahun	3-4
10-15 tahun	2-4
>15 tahun	2-3

7. Prognosis HK

Sebelum era skrining bayi baru lahir khususnya dalam kasus hipotiroid kongenital, maka terjadi keterlambatan diagnosis bahkan sampai perkembangan yang telah signifikan pada anak. Maka dari itu dilaporkan adanya hubungan terbalik antara usia diagnosis dan skor IQ pada anak dengan HK. Dikarenakan beberapa minggu bahkan bulan setelah kelahiran adalah periode kritis untuk hormon tiroid

bekerja menginduksi pertumbuhan dan perkembangan otak, oleh karena itu deteksi dan pengobatan sedini mungkin sangat penting (Kurniawan, 2020).

Bayi yang lahir dengan kadar T4 yang rendah dapat mengalami retardasi pertumbuhan, penurunan IQ antara 6-19 poin, dan kelainan neuropsikologis, seperti inkoordinasi, hypotoni atau hipertoni, kurang perhatian, dan kesulitan bicara. Dua puluh persen kasus mengalami kesulitan mendengar. Jika pengobatan hormon tiroid dimulai antara kelahiran dan usia tiga bulan, IQ rata-rata adalah 89, jika dimulai antara usia tiga dan enam bulan, IQ rata-rata adalah 71, dan jika tidak dimulai hingga usia enam bulan, IQ rata-rata turun menjadi 54 (Rastogi & LaFranchi, 2010).


Diagnosis seawal mungkin dan terapi yang adekuat akan memberikan hasil yang lebih baik. Namun, studi menunjukkan bahwa walaupun diterapi sedini mungkin dikatakan tetap ada kelainan intelektual meski sedikit (Moelyo, 2005).

C. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)

1. Definisi SHK

Dalam pencegahan kecatatan karena gangguan perkembangan saraf dan mengoptimalkan perkembangan bayi kedepannya, maka dilakukan SHK pada bayi baru lahir sebagai upaya mendeteksi dan dapat sesegera mungkin memberikan terapi pada bayi dengan HK. Tujuan SHK yaitu untuk mendeteksi semua bentuk HK primer baik yang ringan, sedang, dan berat. Adapun strategi yang dibentuk untuk mendeteksi sedini mungkin. Skrining dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan TSH pada bayi, dimana pemeriksaan tersebut yang paling sensitif untuk mendeteksi HK primer. Usia 24-48 jam setelah kelahiran merupakan waktu paling efektif untuk melakukan SHK. Melakukan SHK di usia 48-72 jam masi termasuk dalam waktu terbaik untuk melakukannya. Perlu diperhatikan untuk pemeriksaan yang dilakukan <48 jam memungkinkan terjadi angka positif palsu hal ini karena terjadi lonjakan TSH pada bayi baru lahir. (Yati et al., 2017).

Bagan 2.1
Algoritma Diagnostik Hipotiroid Kongenital



(Yati et al., 2017)

Catatan:

*untuk yang tidak tersedia pemeriksaan FT4 dapat dilakukan pemeriksaan T4.

**rendah dibawah nilai normal atau nilai standar laboratorium menurut umur

Bayi baru lahir dengan kadar TSH >20 mU/L dinyatakan memiliki hasil skrining HK positif. Hasil skrining positif harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan ulang serum TSH dan FT4. Jika hasil skrining pada bayi menunjukkan TSH yang tinggi disertai dengan kadar T4 atau FT4 rendah, diagnosis HK primer dapat ditegakkan dan bayi harus dirawat segera setelah dipastikan. Jika skrining tidak dilakukan, diagnosis dapat ditegakkan melalui gejala klinis dan

pemeriksaan serum TSH dan FT4. Segera berikan terapi tanpa memeriksa kadar serum TSH jika kadar serum FT4 di bawah normal (nilai rujukan berdasarkan umur). Neonatus dengan hasil pemeriksaan FT4 normal tetapi kadar serum TSH $>20 \mu\text{U/mL}$ dengan minimal dua kali pemeriksaan berjarak dua minggu disarankan untuk memulai terapi. Pemberian dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak konsultan endokrin (Yati et al., 2017) (Kemenkes,2014).

Beberapa hari awal setelah kelahiran bayi, serum TSH dapat naik hingga 39 U/mL karena adanya lonjakan TSH selama ini. Umumnya, tes konfirmasi dilakukan pada usia satu sampai dua minggu. Pada waktu tersebut kadar TSH turun sekitar 10 U/mL. Rentang usia bayi berhubungan dengan hasil tes fungsi tiroid (FT4, T4 total, TSH), dimana terdapat reference range pada bayi usia 1-4 hari dan 2-4 minggu (Rastogi & LaFranchi, 2010).



Tabel 2.3

Reference Range Tes Hormon Tiroid Pada Bayi Berdasarkan Usia

(Rastogi & LaFranchi, 2010)

Usia	Free T4 (pmol/L)	Total T4 (nmol/L)	TSH (mU/L)
1-4 hari	25-64	129-283	<39
2-4 minggu	10-26	90-206	<10

Jika kadar TSH serum meningkat dan FT4 atau T4 total rendah, diagnosis mengarah pada hipotiroidisme primer. Namun, jika kadar TSH serum meningkat tetapi FT4 atau T4 total berada di kisaran normal, kondisi bayi diklasifikasikan sebagai hipotiroidisme subklinis primer. Ini karena perkembangan otak bayi bergantung pada kadar hormon tiroid yang ideal. Bayi dengan hipotiroidisme subklinis harus dirawat. Ketika skrining dilakukan pada bayi yang lahir prematur atau bayi dengan hipotiroidisme primer akut, kadar TSH dapat meningkat atau tidak meningkat saat dilakukan SHK pertama kali. Maka perlu dilakukan skrining kedua. Pengobatan dengan levotiroksin langsung diberikan ketika diagnosis HK ditegakkan (Kurniawan, 2020).

2. Pengaruh SHK

Pentingnya memantau kesehatan anak sejak usia dini tak dapat diabaikan, mengingat peran krusialnya dalam pembentukan perkembangan individu. Proses pemantauan ini dilaksanakan mulai dari masa kehamilan hingga usia 5 tahun dengan tujuan agar anak dapat menghadapi kehidupannya dengan sikap positif dan meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mencapai perkembangan optimal (Potto et al., 2023).

Kejadian Hipotiroid Kongenital (HK) yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dapat menunjukkan berbagai tingkat retradasi mental, serta keterlambatan pematangan tulang dan pertumbuhan linier yang akan mempengaruhi perkembangan seorang anak. Penegakan diagnosis dini dan perawatan yang cukup pada

minggu-minggu pertama kehidupan dapat berpengaruh baik dalam memperoleh pertumbuhan dan tingkat kognitif yang normal, tetapi keterlambatan diagnosis dan pengobatan setelah 1 - 3 bulan pertama memungkinkan terjadi defisit neuropsikologis yang bersifat irreversible. Tingkat penurunan IQ pada anak dengan HK akan berbeda tergantung dengan seberapa dini anak tersebut mendapatkan perawatan. Anak-anak dengan mulai perawatan di bawah usia 3 tahun berkemungkinan akan mencapai IQ rata-rata 89, kemudian untuk yang dirawat pada usia 3-6 tahun mencapai IQ rata-rata 70, sedangkan anak yang memperoleh pengobatan pada usia 7 tahun mencapai IQ rata-rata 54,7 (Ihsan & Rini, 2017).

Terlambatnya diagnosis HK pada bayi baru lahir dapat berdampak negatif pada anak, keluarga, dan negara. Anak-anak yang tidak segera diidentifikasi dan diterapi akan mengalami kecacatan yang akan mengganggu kehidupan mereka. Anak dengan HK akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik secara keseluruhan, serta perkembangan retardasi mental yang tidak dapat dipulihkan. Keluarga yang memiliki anak dengan HK akan mengalami dampak secara psikososial dan ekonomi. Anak dengan retardasi mental memerlukan pendidikan, perawatan, dan perhatian khusus, sehingga beban ekonomi keluarga akan meningkat. Keluarga akan lebih merasa rendah diri dan lebih rentan terhadap stigma dalam masyarakat dan keluarga. Karena harus mengasuh anak dengan HK, produktivitas keluarga juga menurun. Jika negara tidak melakukan SHK pada

seluruh bayi baru lahir, negara akan menanggung biaya untuk pendidikan dan pengobatan kurang lebih 1600 bayi dengan hipotiroid kongenital setiap tahun, dan negara juga akan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas (Kemenkes,2014).

Adanya SHK dapat membantu dalam pengobatan secara dini pada anak dengan HK salah satu pengobatan dalam aspek nutrisi, tercukupinya nutrisi penting dalam penanganan kasus HK, karena mikronutrien yang adekuat merupakan komponen penting untuk pertumbuhan otak. Melalui pengobatan HK yang tepat, prosedur pembedahan, dan nutrisi yang tepat, pasien dapat mengejar keterlambatan pertumbuhan. Saat pasien berusia 6 bulan, mereka dapat memulai pemberian makanan pendamping ASI (Gultom & Vivian The, 2022).

Pada pasien dengan HK dapat dilihat perbaikan gizi yang bermakna melalui pemberian MPASI salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu memberi edukasi terhadap ibu tentang penanganan gizi pada tahap tumbuh kejar pada anak dengan penyakit bawaan yang bertujuan untuk mengajarkan mereka tentang hal-hal seperti jumlah kalori yang dikonsumsi, jadwal harian, dan jenis dan variasi makanan yang bergizi tinggi. Pendidikan gizi terbukti dapat membantu anak mencapai target kalori tumbuh kejar mereka (Jalaluddin & Faradilah, 2019).

D. Penerimaan (*Acceptance*)

1. Definisi Penerimaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerimaan adalah proses atau cara dalam suatu perbuatan atau penyambutan. Penerimaan adalah kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan terhadap suatu keadaan atau kondisi. Sikap penerimaan dilakukan secara realistis ditandai dengan beberapa aspek kelemahan maupun kelebihan secara objektif (Agoes, 2007).

2. Faktor yang Mempengaruhi penerimaan

Penerimaan tindakan medis seorang pasien dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor kemampuan pasien

Faktor kemampuan pasien adalah kemampuan pasien terhadap bantuan penjelasan lebih oleh tenaga medis terkait penjelasan persetujuan tindakan *informed consent* berdasarkan *health literacy* atau kemampuan pasien dalam memahami penjelasan medis (Susanto et al., 2017).

b. Faktor pra pemberian *informed consent*

Faktor pra pemberian *informed consent* merupakan pengaruh yang berfokus pada pemahaman tenaga medis dan pasien terkait arti, fungsi dan pentingnya *informed consent*. Faktor ini dapat menunjukkan pemahaman dasar pasien terkait tindakan yang akan dimintai persetujuan (Susanto et al., 2017).

c. Faktor saat pemberian *informed consent*

Faktor ini dinilai berdasarkan proses pelaksanaan *informed consent* oleh tenaga medis dan komponen-komponen dalam *informed consent* itu sendiri. Akan dilakukan *cross check* pada pasien berupa jenis tindakan, tata cara tindakan, tujuan tindakan, resiko tindakan, komplikasi tindakan, prognosa, hingga perkiraan biaya (Susanto et al., 2017).

d. Faktor setelah pemberian *informed consent*

Setelah proses *informed consent* dapat dinilai kemampuan atau persepsi pasien dalam memahami penjelasan terkait tindakan yang akan dilakukan dengan menjadikan penerimaan atau tidak menerima sebagai parameter dari faktor ini (Susanto et al., 2017).

E. Integrasi Keislaman

Pada awal abad ke 21 merupakan masa perkembangan antara pendekatan keagamaan dan pendekatan ilmu pengetahuan yang pada masa lalu terdapat pemisah di antara keduanya. Saat ini kedua pendekatan tersebut cenderung menyatu. Jika ditelaah lebih lanjut banyak ayat dan hadist dalam agama (Islam) yang menganjurkan kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual (kerohanian). Allah SWT berfirman dalam QS Ash Shu'ara/26:80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرَ اللَّهُ لِي فِي إِصْرِي وَإِذَا مَرَضْتُ فَأَسْتَشْفِي

Terjemahnya :

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”

Menurut (Jamaluddin al-Qasimi, 2018) dalam Tafsir Mahasin at-Ta'wil menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan etika seorang hamba kepada penciptanya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa dalam penyembuhan penyakit apapun yang diderita oleh seseorang. Namun, manusia juga tetap berkewajiban mencari tahu cara memperoleh kesembuhannya. Timbulnya suatu penyakit pada manusia dapat terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri seperti pola hidup yang tidak sehat, maka dari itu dijelaskan didalam ayat ini yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah SWT semata. Hikmah sakit pada seseorang yaitu ia dapat merasakan nikmat-nikmat kebesaran Allah SWT setelah ia disembuhkan dari penyakitnya.

Allah SWT berfirman dalam QS Fussilat/41:44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً

Terjemahnya :

“Katakanlah: Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan pengobatan suatu penyakit, disebutkan bahwa Al Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman yang memperoleh petunjuk dan keterangan yang terkandung didalamnya. Hal ini berkesinambungan dengan aspek kerohanian yang disebutkan

juga oleh WHO 1984 bahwa definisi sehat yang semula hanya mencakup 4 aspek yaitu sehat dalam arti fisik, psikologik, sosial, dan spiritual (Syaikh, 2017).

Dalam kitab Sirah Nabi tentang bagaimana perjalanan hidup nabi. Salah satu kejadian yang dikisahkan saat Rasulullah SAW menjenguk orang sakit dan memperhatikannya, beliau menyarankan kepada keluarga mengantarkan orang tersebut ke tabib/dokter. Mereka lalu terheran dan bertanya “engkau memerintahkan demikian wahai Rasulullah?” lalu di jawab oleh beliau “Benar. Carilah obat pada hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya”. Kisah ini berkaitan tentang bagaimana mendiagnosis dan memberikan obat sesuai dengan dosis. Dicitat dan terdapat pada H.R Muslim dan Ahmad yang berbunyi (Nurfadillah, 2014):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR
 لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya :

“Setiap penyakit pasti ada obatnya, maka apabila ditemukan obatnya, maka sembuhlah ia dengan izin Allah”

Tujuan kedua shari'at yaitu melindungi hidup salah satu caranya dengan pengobatan. Untuk perkara kematian hanya dengan kemampuan atau takdir dari Allah SWT. Pengobatan tidak dapat mencegah atau memperlambat kematian Namun, dapat mempertahankan kualitas hidup yang tinggi sampai ditetapkannya waktu kematian. Pengobatan membantu melindungi dan menjaga

kesehatan dengan fungsi tubuh yang baik. Penyakit yang melemahkan kesehatan manusia dapat dicegah dengan pengetahuan medis. Kualitas kesehatan yang lebih baik dapat dicapai melalui pengobatan dan rehabilitasi penyakit. Ilmu pengetahuan kedokteran dapat membantu melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*), disertai kepercayaan bahwa perawatan yang baik terhadap anak-anak membawa mereka tumbuh dewasa baik pula (Wati, 2019).

Hak mendapat kesehatan dan pencegahan penyakit dijelaskan oleh Allah SWT berfirman dalam QS Al An'Am/6:151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya :


“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”

Dalam tafsir Al Mishbah ayat ini berkaitan dengan jiwa manusia yang dijadikan terhormat oleh Allah SWT, karena jiwa manusia telah dianugerahkan nikmat yang tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apapun. Salah satu kehormatan dalam nikmat yang diberikan adalah kesehatan, maka wajiblah umat muslim dalam menjaga kesehatan dengan cara menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan penyakit, karena tindakan preventif lebih baik dari mengobati penyakit, dan menghindari sarang yang menimbulkan penyakit (Shihab, 2017).


Dalam islam diharapkan setiap umat tidak lemah dan kuat secara fisik, mental, sosial dan ekonomi. Anjuran dalam ajaran islam mengikutkan nilai-nilai kesehatan begitupun dalam bidang kesehatan mental yang berkaitan dengan spiritual dimana peranan agama dominan dalam hal ini. Maka dari itu keterikatan antara pendekatan spiritula dan kesehatan tidak dapat dipisahkan dan akan beriringan secara simultan.



F. Kerangka Teori




G. Kerangka Konsep



Keterangan :



Variabel Independen



Variabel Dependen



Diteliti



Tidak Diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang akan di analisis dengan prosedur analitik deskriptif dengan desain penelitian *Cross Sectional*, yaitu menganalisis hubungan *health literacy* ibu dengan *acceptance* skrining Hipotiroid Kongenital di rumah sakit pasca kelahiran bayi.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November–Desember 2023 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang diubah oleh variabel lain. Variabel terikat ini merupakan masalah utama atau *primary interest to the researcher* bagi peneliti yang kemudian dijadikan sebagai subjek penelitian. Maka variabel dependen adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh adanya variabel independen. (Purwanto, 2019) Pada penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah Penerimaan SHK.

2. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau dapat didefinisikan sebagai suatu nilai maupun kondisi yang akan mengubah kondisi atau nilai yang lainnya (Purwanto, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Health Literacy Ibu.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan komponen penelitian mencakup objek dan subjek yang memiliki karakteristik dan atribut tertentu. Maka populasi pada dasarnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama di suatu tempat secara terencana yang menjadi target kesimpulan dari hasil akhir penelitian (Amin et al., 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil Trimester III baik primigravida maupun multigravida yang melakukan *antenatal care* (ANC) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda kota Makassar pada bulan Januari-Desember tahun 2022.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk menggambarkan seluruh populasi (Amin et al., 2023). Pengambilan sampel pada

penelitian ini menggunakan pendekatan *Cross Sectional*, yaitu analisis hubungan health literacy ibu dengan penerimaan Screening Hipotiroid Kongenital. Besarnya sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\
 &= \frac{3.030}{1 + 3.030(0,1)^2} \\
 &= \frac{3.030}{1 + 3.030 (0,01)} \\
 &= \frac{3.030}{1 + 30,3} \\
 &= \frac{3.030}{31,3}
 \end{aligned}$$

$$n = 96,805 = \text{Dibulatkan menjadi } 97$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Tingkat eror

E. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sample berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan.

1. Kriteria Inklusi

- a) Ibu hamil Trimester III
- b) Ibu hamil yang bersedia menjadi responden
- c) Ibu hamil yang sehat jasmani dan rohani

2. Kriteria Eksklusi

- a) Ibu hamil dengan rencana partus *tidak* di Rumah Sakit
- b) Ibu hamil buta huruf
- c) Ibu hamil trimester III dengan janin yang mengalami kelainan kongenital yang terdeteksi saat ANC

F. Instrumen Penelitian

Dalam mengukur karakteristik variabel dibutuhkan alat ukur yang disebut dengan instrumen yang mana digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa instrumen penelitian yang digunakan dalam bentuk angket (Kuesioner). Instrumen ini berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden (Sukendra & Atmaja, 2020). Kuesioner ini ditujukan kepada para ibu hamil trimester III yang melakukan ANC di RSIA Ananda Kota Makassar dan bersedia menjadi responden.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a) Editing

Pada tahap ini peneliti melakukan peninjauan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui kelayakan dari data untuk melanjutkan ke proses selanjutnya (Yuesti, 2017).

b) Coding

Proses selanjutnya adalah coding yang bertujuan mengklasifikasikan jawaban-jawaban kedalam kategori-kategori yang penting sehingga memudahkan untuk analisis dan pembahasan hasil penelitian (Yuesti, 2017).

c) Tabulasi

Tabulasi merupakan proses perhitungan frekuensi yang dimasukkan kedalam masing-masing kategori, untuk menyajikan hasil dalam bentuk tabel (Yuesti, 2017).

d) Processing

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk dianalisis. *Processing* dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi ke dalam *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) (Rinaldi & Mujianto, 2017).

e) *Cleaning*

Pembersihan data atau *cleaning* adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan. (Rinaldi & Mujiyanto, 2017).

2. Analisis Data

Perolehan data dari hasil pengisian kuesioner oleh responden akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data akhir yang didapatkan akan dicatat kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian akan diolah menggunakan *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS) 26. Data yang dianalisis sebagai berikut :

a) Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis data yang menggunakan metode statistik deksriptif untuk menunjukkan kriteria dari masing-masing variabel. Analisis univariat memperlakukan semua variabel sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis hubungan antara kedua variable yang ada (Heryana, 2020)

b) Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang menguji relevansi kedua variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. Analisis data yang digunakan adalah *Chi-Square* dengan bantuan *software* uji statistik (Heryana, 2020).



H. Alur Penelitian



I. Penyajian Data

Pada penelitian ini data hasil akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

J. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan persetujuan etika penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti harus melakukan beberapa hal lagi, seperti:

1. Mengirimkan surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menghormati dan menjaga kerahasiaan subjek penelitian dengan tidak mengungkapkan identitas pasien saat proses pengambilan data.
3. Peneliti tidak akan memaksa subjek penelitian untuk mengambil data.
4. Memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian dilakukan di di RSIA Ananda Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 01 Desember 2023 hingga 31 Desember 2023. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS 26.0, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *Chi-Square*. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Demografi Responden

Tabel 4.1 Distribusi Data Demografi Responden

Usia	n	%
<20 Tahun	28	28.0
20-35 Tahun	55	55.0
>35 Tahun	17	17.0
Agama	n	%
Islam	98	98%
Kristen	2	2%
Suku	n	%
Bugis	54	54.0
Makassar	41	41.0
Toraja	2	2.0
Jawa	2	2.0
Sumatera	1	1.0

Pendidikan	n	%
Sekolah Dasar (SD)	3	3.0
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	4.0
Sekolah Menengah Atas (SMA)	34	34.0
Diploma	16	16.0
Sarjana	43	43.0
Pekerjaan	n	%
IRT	55	55.0
ASN	28	28.0
Karyawan Swasta	17	17.0
Status Paritas	n	100
Primigravida	42	42.0
Multigravida	58	58.0

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa distribusi data ibu hamil berdasarkan usia kategori <20 tahun sebanyak 28 orang (28.0%), usia 20-35 tahun sebanyak 55 orang (55.0%) dan >35 tahun sebanyak 17 orang (17.0%). Distribusi data ibu hamil berdasarkan agama dengan jumlah yang beragama Islam sebanyak 98 orang (98.0%) dan yang beragama Kristen sebanyak 2 orang (2.0%). Distribusi data ibu hamil berdasarkan suku diketahui bahwa suku bugis sebanyak 54 orang (54%), suku Makassar sebanyak 41 orang (41%), suku Toraja dan Jawa masing-masing sebanyak 2 orang (2%) dan terdapat 1 orang (1%) dengan suku Sumatera.

Distribusi data ibu hamil berdasarkan Pendidikan dapat diketahui bahwa tingkat SD sebanyak 3 orang (3%), SMP sebanyak 4 orang (4%), SMA sebanyak 34 orang (34%), Diploma sebanyak 16 orang (16%) dan Sarjana sebanyak 43 orang (43%). Distribusi data ibu hamil berdasarkan pekerjaan IRT sebanyak 55 orang (55.0%), bekerja sebagai Karyawan

Swasta sebanyak 28 orang (28.0%) dan bekerja sebagai ASN sebanyak 17 orang (17.0%). Distribusi data Ibu hamil berdasarkan status Paritas dapat diketahui bahwa ibu dengan Primigravida sebanyak 42 orang (42%) sedangkan ibu dengan Multigravida sebanyak 58 orang (58%).

2. Analisis Univariat

Tabel 4.2 Distribusi Data Ibu Hamil Berdasarkan *Health Literacy* dan Tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital

<i>Health Literacy</i>	n	%
<i>Adequate</i>	73	73.0
<i>Inadequate</i>	27	27.0
Tindakan Skrining	n	%
Berpartisipasi	96	96.0
Tidak Berpartisipasi	4	4.0

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa distribusi data ibu hamil berdasarkan *Health Literacy* ibu (wawasan tentang informasi kesehatan) dengan *adequate* sebanyak 73 orang (73.0%) dan kategori *inadequate* sebanyak 27 orang (27.0%). Sedangkan penerimaan program skrining bayi baru lahir untuk hipotiroid kongenital yang ikut berpartisipasi sebanyak 96 orang (96.0%) dan yang tidak ikut berpartisipasi sebanyak 4 orang (4.0%).

3. Analisis Bivariat

Tabel 4.3 Hubungan *health literacy* dengan *Acceptance* Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023

<i>Health Literacy</i>	<i>Acceptance</i> Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)		<i>P-Value</i>
	Kongenital (SHK)		
	Berpartisipasi	Tidak Berpartisipasi	
<i>Adequate</i>	73	0	0.004*
<i>Inadequate</i>	23	4	

*Fisher's Exact Test

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa terdapat 73 (100%) ibu hamil dengan *health literacy adequate* yang ikut berpartisipasi. Dari 27 ibu hamil dengan *health literacy inadequate* sebanyak 23 orang (85.2%) yang ikut berpartisipasi dan terdapat 4 orang (14.8%) yang tidak berpartisipasi dalam Skrining Hipotiroid Kongenital. Berdasarkan hasil uji statistik *Chi Square*, diketahui nilai p sebesar $0.004 < 0.05$ (nilai signifikan), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *health literacy* dengan *acceptance* Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023.

B. Pembahasan

1. Gambaran *Health Literacy*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa distribusi data ibu hamil berdasarkan *Health Literacy* ibu (wawasan tentang informasi kesehatan) dengan *adequate* sebanyak 73 orang (73.0%) dan kategori *inadequate* sebanyak 27 orang (27.0%). *Health literacy* merupakan kemampuan dan keterampilan sosial kognitif yang dapat mendorong seseorang untuk memperoleh, mengolah, dan memahami semua informasi yang telah mereka peroleh dari layanan kesehatan primer yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk kehidupan yang sehat (Putri, 2021).

Sebagai hasil dari berbagai penelitian, literasi kesehatan adalah salah satu prediktor terkuat untuk kesehatan seseorang. Tingkat literasi tentang kesehatan individu yang rendah dikaitkan dengan kekurangan pengetahuan tentang perawatan kesehatan yang bersifat preventif, perawatan diri, dan pengobatan. Keterbatasan informasi mulai dari pemahaman tentang demam pada anak-anak sampai kondisi yang menjadi kronis seperti penyakit metabolik (Sahroni et al., 2019).

Literasi kesehatan dalam hal ini memiliki peranan dan hubungan erat dengan pembangunan kesehatan. pembangunan kesehatan meliputi pencegahan penyakit, pengobatan, dan promosi kesehatan. Namun dalam hal ini pembangunan kesehatan ibu muda ditunjukkan pada kesehatan ibu muda berupa kesehatan reproduksi, gizi dan

bahaya-bahaya penyakit yang menyebabkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kelahiran Bayi (AKB).

Health literacy dapat mempengaruhi individu dalam mengambil dan menentukan keputusan kesehatan pada dirinya. Health literacy adalah kemampuan individu dalam memperoleh, mencerna dan menerapkan informasi kesehatan dalam menentukan tindakan perawatan kesehatannya. *Health literacy* yang tinggi akan menurunkan angka penyakit kronis seperti hipertensi, sedangkan apabila *health literacy* rendah akan meningkatkan peningkatan angka penyakit kronis hipertensi. *Health literacy* secara umum dapat meningkatkan pengetahuan khususnya dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kesehatan seseorang (Fauzi, 2023).

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh Soewondo et al., (2018) menyatakan bahwa *health literacy* bervariasi menurut usia, jenis kelamin, pendidikan sekolah, status ekonomi keluarga, dan lokasi tempat tinggal, dengan tingkat *health literacy* yang lebih rendah ditemukan di antara orang tua, laki-laki, mereka yang berpendidikan rendah, keluarga berekonomi rendah, dan mereka yang tinggal di luar perkotaan. *Health literacy* yang rendah di daerah terpencil dan tertinggal pantas menjadi perhatian pembuat kebijakan karena sarana kesehatan di sana terbatas. Dengan kondisi tersebut, sangatlah penting bagi masyarakat setempat untuk dapat menjaga kesehatan sendiri supaya jauh dari penyakit, serta dapat

menggunakan fasilitas kesehatan yang ada untuk mendapat pengobatan yang sesuai.

Menurut *World Health Organization* (2021) ketidakadilan kesehatan adalah endemik di setiap wilayah di dunia, dengan tingkat penyakit secara signifikan lebih tinggi di antara kelompok termiskin dan paling dikecualikan. Akibatnya, populasi yang paling tidak mampu menahan biaya penyakit multidimensi juga merupakan mereka yang paling mungkin menanggungnya. Ketidakadilan ini bukan hanya kebetulan-orang miskin lebih cenderung hidup, bekerja, belajar dan bermain di lingkungan yang tidak baik bagi kesehatan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019). Dari hasil temuan data dan setelah dilakukan penelitian hasil lapangan menunjukkan gambaran kemampuan literasi kesehatan ibu muda termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dibuktikan karena pola pemikiran dan kesadaran ibu muda saat ini telah mengalami peningkatan pengetahuan. Berdasarkan hasil rata-rata total sebesar 1,76%.

Ana (2022) juga menemukan hasil yang relevan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ibu yang disurvei memiliki tingkat literasi kesehatan yang baik. Akses yang memadai, pemahaman dan penerapan informasi kesehatan penting, terutama yang berkaitan dengan perilaku kesehatan berisiko tinggi dan dalam situasi rentan. Bagi perempuan dengan literasi kesehatan yang terbatas, informasi tertulis tentang pelayanan antenatal lebih sulit dipahami. Dengan

demikian, ibu-ibu ini cenderung membuat keputusan medis berdasarkan informasi yang didapatkan

Menurut peneliti kemampuan literasi kesehatan berupa kemampuan mengakses, memahami, menilai dan menerapkan adalah sesuatu hal yang dibuat dalam penyelesaian masalah kesehatan dengan baik apabila kebutuhan informasinya yang mampu mengetahui sumber informasi yang tepat baik melalui media cetak maupun media digital.

2. Gambaran Skrining Hipotiroid Kongenital

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan program skrining bayi baru lahir untuk hipotiroid kongenital yang ikut berpartisipasi sebanyak 96 orang (96.0%) dan yang tidak ikut berpartisipasi sebanyak 4 orang (4.0%). Hipotiroid kongenital adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium (Begum et al., 2023).

Pemeriksaan hormon tiroid ini dapat dilakukan sejak anak usia 2 hari (lebih dair 2×24 jam) dengan memeriksakan kadar TSH neonatus melalui program Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Pada pelaksanaannya, Skrining Hipotiroid Kongenital dilakukan dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi yang berusia minimal 48 sampai 72 jam dan maksimal 2 minggu oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan

Kesehatan Ibu dan Anak baik FKTP maupun FKRTL, sebagai bagian dari pelayanan neonatal esensial. Dengan adanya pemahaman pentingnya SHK ini diharapkan cakupan skrining hipotiroid kongenital akan semakin meningkat dan lebih banyak anak-anak yang mendapatkan pengobatan optimal sedini mungkin (Rochmah et al., 2023).

Pada bayi baru lahir kejadian HK dapat disebabkan defek anatomik berupa disgenesis atau ektopik kelenjar tiroid, paparan dari iodida, defisiensi TSH dan TRH, serta cacat bawaan efek dari konsumsi goitrogen Ibu pada masa kehamilan (Marcdante & Robert M. Kliegmen, 2019). Menurut (Wija, 2019) terdapat tiga penyebab hipotiroid kongenital yaitu penyebab bawaan karena adanya disgenetik kelenjar tiroid seperti aplasia, ektopik, agensis atau hipoplasia. Penyebab yang sifatnya sementara karena terdapat induksi obat-obatan, adanya antibodi maternal, dan dapatan dari ibunya sendiri berupa pengobatan yodium radio-aktif. Hipotiroid kongenital pada anak juga dapat diperoleh akibat tiroiditis limfositik kronik yang dialami ibu dan ibu dengan riwayat tiroidektomi.

Dalam pencegahan kecacatan karena gangguan perkembangan saraf dan mengoptimalkan perkembangan bayi kedepannya, maka dilakukan SHK pada bayi baru lahir sebagai upaya mendeteksi dan dapat sesegera mungkin memberikan terapi pada bayi dengan HK. Tujuan SHK yaitu untuk mendeteksi semua bentuk HK primer baik yang ringan, sedang, dan berat. Adapun strategi yang dibentuk untuk

mendeteksi sedini mungkin. Skrining dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan TSH pada bayi, dimana pemeriksaan tersebut yang paling sensitif untuk mendeteksi HK primer. Usia 24-48 jam setelah kelahiran merupakan waktu paling efektif untuk melakukan SHK. Melakukan SHK di usia 48-72 jam masi termasuk dalam waktu terbaik untuk melakukannya. Perlu diperhatikan untuk pemeriksaan yang dilakukan <48 jam memungkinkan terjadi angka positif palsu hal ini karena terjadi lonjakan TSH pada bayi baru lahir. (Yati et al., 2017).

Peneliti berasumsi bahwa tingginya responden yang menerima program skrining dan tingginya informasi tentang skrining bayi baru lahir dapat diperoleh dari berbagai media massa seperti membaca buku, majalah, brosur, dan media televisi, radio dan lain-lain. Semakin berkembangnya teknologi tentunya akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Dengan demikian informasi yang diperoleh dapat memberikan hasil yang beraneka ragam dan mempengaruhi tingkat pengetahuan responden.

3. Hubungan *Health Literacy* dengan *Acceptance* Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 73 (100%) ibu hamil dengan *health literacy adequate* yang ikut berpartisipasi. Dari 27 ibu hamil dengan *health literacy middle* dengan *inadequate* sebanyak 23 orang (85.2%) yang ikut berpartisipasi dan terdapat 4 orang (14.8%) yang tidak berpartisipasi

dalam Skrining Hipotiroid Kongenital. Walaupun secara proporsional terlihat ada hubungan antara *health literacy* dengan penerimaan Skrining Hipotiroid Kongenital yang mana ibu dengan pemahaman kesehatan yang cukup cenderung menerima dan berpartisipasi dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan hasil uji statistic *Chi Square*, diketahui nilai *p-value* sebesar $0.004 < 0.05$ (nilai signifikan), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *health literacy* dengan *acceptance* Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023., maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *health literacy* dengan *acceptance* Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Radhia, Asmawati, & Rahmawati (2023). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan adanya perbedaan pengetahuan responden sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dan menunjukkan adanya peningkatan nilai mean yaitu dari 3.10 menjadi 6.97 sedangkan nilai *std. deviasi* sebelum dan sesudah dari 2.040 menjadi 2.059. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada nya peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang Skrining Hipotiroid Kongenital sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Berdasarkan uji statistik dengan uji Wilcoxon Match Pair Test di peroleh nilai *p value* sebesar 0,000 dengan nilai $\alpha=0,05$ ($p < \alpha$), artinya

ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan responden.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Aulya, Suprihatin, & Dianovianti (2020) tentang penilaian pengetahuan, sikap dan praktik terhadap skrining bayi baru lahir untuk hipotiroid kongenital sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan pada wanita di Rumah Sakit Pakistan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada peningkatan yang signifikan dalam kesadaran wanita setelah intervensi (20% menjadi sekitar 98%). Demikian pula, 78,9% yang setuju untuk memilih tes skrining untuk bayi baru lahir mereka setelah melahirkan dibandingkan dengan sebelum dilakukan intervensi terdapat 57,7% wanita yang setuju memilih untuk tes skrining bayi baru lahir mereka.

Semua bayi yang lahir di Indonesia harus diperiksa SHK untuk menjangkir apabila ada risiko kelainan dalam tumbuh kembang anak, Ini merupakan salah satu program pemerintah dalam mengimplementasi dari transformasi layanan primer yang menekankan pada upaya promotif preventif mengingat sebagian besar kasus kekurangan Hipotiroid Kongenital tidak menunjukkan gejala, sehingga tidak disadari oleh orang tua. Gejala khas baru muncul seiring bertambahnya usia anak (Kemenkes RI, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Nida (2018) pengetahuan dan sikap ibu berdampak besar dengan pelaksanaan SHK di masyarakat jika seorang tenaga medis melakukan KIE dengan benar akan

menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dan bisa menjawab keluarga sehat.

Salah satu cara meningkatkan *acceptance* dan keberhasilan program-program kesehatan adalah dengan menjadikannya sebagai kebijakan atau ditetapkan dengan aturan tertulis berketetapan hukum, sehingga banyak melibatkan *stakeholder* dilaksanakan dengan menggunakan anggaran negara untuk menjamin keberlangsungannya dan dilakukan monitoring kemampuan literasi terkait keberhasilannya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam peraturan Nomor 78 Tahun 2014 telah mewajibkan Skrining Hipotiroid Kongenital pada setiap bayi baru lahir, kecuali dengan kondisi tertentu. Didukung juga dengan keputusan terbaru tentang pembiayaan pelaksanaan SHK dibayarkan satu paket dengan persalinan yang tertera dalam Nomor HK.01.07/MENKES/1511/2023 pertanggal 1 September 2023, hal ini tentunya dapat meningkatkan *acceptance* masyarakat terhadap SHK. Pada penelitian ini menunjukkan terdapat ibu yang tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan skrining hipotiroid kongenital ini, hal ini disebabkan ketidak tahuan akan pentingnya skrining pda bayi baru lahir untuk mencegah terjadinya keterlambatan baik fisik maupun mental pada anak. Tenaga medis perlu untuk lebih mengedukasi dan memberikan pemahaman secara dini pada setiap ibu tentang pentingnya skrining bayi baru lahir salah satunya skrining hipotiroid kongenital.

Memperkuat upaya pendidikan kesehatan dengan membudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama penerapan gizi seimbang bagi keluarga termasuk penggunaan garam beriodium mendorong masyarakat yang mempunyai bayi baru lahir untuk melakukan skrining hipotiroid kongenital sebagai upaya deteksi dini dan intervensi dini untuk mencegah timbulnya penyakit gangguan akibat tiroid (Pratama et al., 2019).

Peningkatan berupa pemberian pendidikan kesehatan mengenai skrining hipotiroid kepada ibu perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu tentang skrining hipotiroid. Dengan adanya pengetahuan dan sikap peduli pada ibu hamil mengenai pentingnya skrining hipotiroid kongenital pada bayi, diharapkan cakupan skrining hipotiroid kongenital akan semakin meningkat dan lebih banyak anak-anak yang mendapatkan pengobatan optimal sedini mungkin. Hal ini akan berdampak besar bagi tumbuh kembang seorang anak dan diharapkan kelak menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang sehat, cerdas, dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara (Damayanti, 2023).

Literasi kesehatan saat ini didefinisikan sebagai "kemampuan individu untuk memperoleh dan menerjemahkan pengetahuan dan informasi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dengan cara yang sesuai dengan konteks individu dan masyarakat". Tingkat HL yang rendah telah dikaitkan dengan kesulitan dalam memahami informasi perawatan kesehatan dan kesesuaian terapi yang buruk,

yang pada gilirannya meningkatkan biaya dan menyebabkan penggunaan sumber daya perawatan kesehatan yang tidak efisien. Demikian juga, tingkat HL perempuan juga dapat berdampak pada kesehatan anak-anak mereka selama kehamilan dan setelah kelahiran (Valero-Chillerón et al., 2022). Literasi kesehatan sangat penting bagi kesehatan anak, terkait dengan pengetahuan kesehatan orang tua dan praktik pengasuhan anak. Orang tua menghadapi kesulitan terkait kemampuan literasi kesehatan mereka dalam perawatan kesehatan untuk bayinya, oleh karena itu memahami pengasuhan bayi secara perspektif, literasi kesehatan penting bagi para profesional kesehatan (Sakai et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berasumsi bahwa dominan ibu hamil berdasarkan *Health Literacy* (wawasan tentang informasi kesehatan) dengan *adequate* atau cukup memadai sebanyak 73 orang (73.0%) dari 100 responden. Hal ini menandakan bahwa, kemampuan untuk memperoleh, memproses dan memahami informasi kesehatan untuk membuat keputusan kesehatan pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar. Saat ini *Health literacy* mempunyai andil yang besar dalam upaya meningkatkan kesehatan seseorang karena kemampuan health literacy dapat berpengaruh dalam pemilihan gaya hidup sehat, melakukan pencegahan terhadap suatu penyakit dan mencari informasi mengenai penanganan serta perawatan medis yang tepat untuk suatu penyakit, terutama dalam pencegahan kecatatan karena gangguan perkembangan saraf dan

mengoptimalkan perkembangan bayi kedepannya, maka dilakukan SHK pada bayi baru lahir sebagai upaya mendeteksi dan dapat sesegera mungkin memberikan terapi pada bayi dengan HK. Tujuan SHK yaitu untuk mendeteksi semua bentuk HK primer baik yang ringan, sedang, dan berat.

C. Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan di RSIA Ananda Makassar pada bulan Desember 2023 untuk mengetahui hubungan *health literacy* ibu dengan penerimaan skrining hipotiroid kongenital memiliki beberapa keterbatasan seperti:

1. Adanya ketetapan pemerintah dalam PERMENKES Nomor 78 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI HK.01.07/MENKES/1511/2023 terkait kewajiban dan pembiayaan pelaksanaan skrining hipotiroid kongenital yang mempengaruhi *acceptance* dan sikap orang tua terhadap prosedur tindakan skrining hipotiroid kongenital.
2. Mayoritas responden merupakan ibu dengan tingkat pendidikan tinggi, sehingga sampel penelitian cukup homogen.

3. Lokasi penelitian yang bertempat di pusat kota Makassar membuat mayoritas responden telah memiliki tingkat pengetahuan kesehatan yang menengah hingga tinggi, sehingga lokasi penelitian di daerah pedesaan lebih di sarankan untuk peneliti selanjutnya, utamanya untuk meneliti penyebaran dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan kesehatan di Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan *health literacy* ibu terhadap *acceptance* tindakan skrining hipotiroid kongenital di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023 telah dilaksanakan tanggal 01 Desember 2023 hingga 31 Desember 2023 dengan jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Mayoritas responden menunjukkan tingkat *health literacy* yang *adequate* atau memadai sebanyak 73%, untuk tingkat *health literacy middle* atau pertengahan dan *inadequate* atau tidak memadai sebanyak 27%.
2. Pada penilain sikap terkait partisipasi dalam skrining hipotiroid kongenital sebagian besar responden bersedia untuk berpartisipasi sebanyak 96.0%
3. Terdapat hubungan antara *health literacy* ibu dengan *acceptance* tindakan skrining hipotiroid kongenital di RSIA Ananda Makassar.

B. Saran

1. Bagi Pelayanan Kesehatan

- a. Tetap peka terhadap berbagai tingkat literasi kesehatan dan pemahaman informasi kesehatan.
- b. Pertimbangkan penggunaan metode mengajar kembali ketika memberikan instruksi kepada orang tua karena ini adalah

pendekatan yang mudah diterapkan oleh para dokter juga tenaga medis lainnya

- c. Pertimbangkan untuk merevisi alat pengajaran dan lembar informasi untuk menyertakan alat bantu visual.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah variabel yang mempengaruhi *health literacy* ibu seperti kepatuhan dalam program kesehatan pemerintah dan kepatuhan ANC pada ibu hamil dalam penelitian dengan topik yang sama. Diharapkan juga dapat memperoleh ruang lingkup yang lebih spesifik dan lebih membutuhkan untuk dilakukan penelitian serta lebih memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan skrining bayi baru lahir serta hasil akhir penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran Al-Karim. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id>
- Ade Heryana, SST, M. (2020). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Penerbit Erlangga, Jakarta, June, 1-188.* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31268.91529>
- Adisty, N. R., Faisal, F., & Hidayat, B. (2020). Gambaran Pertumbuhan Anak dengan Hipotiroid Kongenital Pasca-Terapi Levotiroksin di RSUP Dr. Hasan Sadikin pada Tahun 2014 sampai dengan 2018. *Sari Pediatri, 22(2)*, 98. <https://doi.org/10.14238/sp22.2.2020.98-103>
- Agoes, D. (2007). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Tiga Tahun Pertama*. PT Refika Aditama.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar, 14(1)*, 15-31.
- Ana, E. F. (2022). Tingkat Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil: Studi Literatur. *Jurnal AKRAB, 13(2)*, 88-92.
- Aulya, Y., Suprihatin, S., & Dianovianti, D. (2020). Perbedaan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital Sebelum dan Sesudah Diberikan Penyuluhan Di Puskesmas Tanah Tinggi Kota Tangerang Tahun 2019. *Journal for Quality in Women's Health, 3(2)*, 165-170.
- Begum, M. N., Mahtarin, R., Islam, M. T., Ahmed, S., Konika, T. K., Mannoor, K., Akhteruzzaman, S., & Qadri, F. (2023). Molecular investigation of TSHR gene in Bangladeshi congenital hypothyroid patients. *PloS One, 18(8)*, e0282553.
- Bening Alfania, Z. (2019). Hubungan Health Literacy Dengan Self Monitoring Blood Glucose Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di RSD dr. Soebandi Jember. *Jurnal Keperawatan, 6(3)*, 85-97.
- Bergman, L., Nilsson, U., Dahlberg, K., Jaensson, M., & Wångdahl, J. (2023). Validity and reliability of the swedish versions of the HLS-EU-Q16 and HLS-EU-Q6 questionnaires. *BMC Public Health, 23(1)*, 1-9. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15519-9>
- Cho, M., Lee, Y. M., Lim, S. J., & Lee, H. (2020). Factors associated with the health literacy on social determinants of health: A focus on socioeconomic position and work environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18)*, 1-11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186663>

- Damayanti, R. (2023). *Kombinasi Early Warning System dan Glasgow Coma Scale dalam Mengevaluasi Pasien Cedera Otak Berat di Ruang IGD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen*. UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA.
- Elkarimah, M. F. (2016). kajian Al-Qur'an dan hadist tentang kesehatan jasmani dan Rohani. *Tajdid*, 15(1), 106.
- Fauzi, A. (2023). *Hubungan Health Literacy Dengan Kepatuhan Pengobatan Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Jenggawah*. Universitas dr. SOEBANDI.
- Gultom, L. C., & Vivian The, V. (2022). Hipotiroid Kongenital dan Hypertrophic Pyloric Stenosis: Pemantauan Selama 3 Bulan. *Cermin Dunia Kedokteran*, 49(2), 94–97. <https://doi.org/10.55175/cdk.v49i2.198>
- Handayani, D. M. (2019). *Tingkat Literasi Kesehatan Ibu Muda Di Desa Manduro Manggung Gajah Ngoro Mojokerto*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Hiola, F. A. A., Hilamuhu, F., & Katili, D. N. O. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cakupan Pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUProf. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia MPPKI*. [Http://Issn.Pdii.Lipi.Go.Id/Issn.Cgi?Daftar&1504775777&1&&](http://Issn.Pdii.Lipi.Go.Id/Issn.Cgi?Daftar&1504775777&1&&), 5(4), 435–440.
- Ihsan, I., & Rini, E. A. (2017). Delayed diagnosis of congenital hypothyroidism in an adolescent results in avoidable complications: a case report. *Paediatrica Indonesiana*, 57(4), 108–116. <https://doi.org/10.14238/pi>
- Jalaluddin, S., & Faradilah, A. (2019). Laporan Kasus : Dilemma Tumbuh Kejar Nutrisi Pada Anak Dengan Penyakit Jantung Bawaan. *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.24252/alami.v3i2.9961>
- Jamaluddin al-Qasimi. (2018). *Tafsir Mahasin at-Ta'wil* (A. Muntaha (ed.)). Lirboyo Press.
- Kasem, A., Razeq, N. M. A., Abuhammad, S., & Alkhazali, H. (2022). Mothers' knowledge and attitudes about newborn screening in Jordan. *Journal of Community Genetics*, 13(2), 215–225. <https://doi.org/10.1007/s12687-021-00572-x>
- Kemenkes. (2014). In *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014*.

- Kemenkes. (2022). *Kenali Kekurangan Hormon Tiroid Bayi Baru Lahir*.
- Kemenkes RI. (2022). *Kemenkes Relaunching Skrining Hipotiroid Kongenital Untuk Kurangi Risiko Kecacatan Pada Anak*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220831/2641015/kemenkes-relaunching-skrining-hipotiroid-kongenital-untuk-kurangi-risiko-kecacatan-pada-anak/>
- Kurniawan, L. B. (2020). Congenital Hypothyroidism: Incidence, Etiology and Laboratory Screening. *Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory*, 26(3), 375–380. <https://doi.org/10.24293/ijcpml.v26i3.1527>
- Liu, C., Wang, D., Liu, C., Jiang, J., Wang, X., Chen, H., Ju, X., & Zhang, X. (2020). What is the meaning of health literacy? A systematic review and qualitative synthesis. *Family Medicine and Community Health*, 8(2), 1–8. <https://doi.org/10.1136/fmch-2020-000351>
- Lupita, M., Meo, N., Kundre, R. M., & Bidjuni, H. J. (2023). The health literacy status of pregnant women in tuminting health center, Manado. *Nursing Current*, 11(1), 18–25.
- Mahfudah, I. & Izzatul A. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Akses Informasi Kesehatan Reproduksi Daring pada Mahasiswa. *Indonesian Journal of Health Community (IJheCo)*, 1 (1)(1), 1–10.
- Marcdante, K. J., & Robert M. Kliegmen. (2019). *Nelson Essentials Of Pediatrics* (Eighth). Elsevier.
- Moelyo, A. G. (2005). Mengenal Hipotiroid Kongenital. *Skrining Dan Diagnosis Newborn Screening (NBS) - Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNS - RSUD Dr. Moewarda*.
- Muharram, I., Faradillah, A., Helvian, F. A., Sari, J. I., & Sabri, M. S. (2021). Pengaruh Edukasi Mp-Asi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 20(2), 76–90. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v20i2.109>
- Nida, F. L. K. (2018). Membangun Konsep Diri Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 2(1), 45–64.
- Nurfadillah. (2014). Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP DR.Wahidin Sudirohusudo Makassar Tahun 2014. *Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

- Nutbeam, D. (2006). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. *Health Promotion International*, 15(3), 259–267. <https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>
- Peters, C., & Schoenmakers, N. (2022). MECHANISMS IN ENDOCRINOLOGY: The pathophysiology of transient congenital hypothyroidism. *European Journal of Endocrinology*, 187(2), R1–R16. <https://doi.org/10.1530/EJE-21-1278>
- Potto, A. U., Rahim, R., Fitriani, R., & Sari, J. I. (2023). *Gambaran Tumbuh Kembang Anak Usia Prasekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Kota Makassar Tahun 2020 The Overview of Children Development in the Batua Health Center Work Area , Makassar City 2020*. 5(2), 145–149.
- Pratama, A. A., Chairulfatah, A., Novina, N., Faisal, F., & Fadlyana, E. (2019). Hubungan Awitan Pengobatan Hipotiroid Kongenital dengan Gangguan Perkembangan Anak di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. *Sari Pediatri*, 21(1), 16–23.
- Pratiwi, U., Lusmilasari, L., & Hartini, S. (2008). Hubungan Antara Kematangan Sosial Dengan Kemandirian Pemenuhan Aktivitas Dasar Penyandang Retardasi Mental. *Jurnal Ilmu Keperawatan UGM*.
- Purwanto, N. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 6115, 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>
- Putri, N. (2021). *Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan Dengan Kepatuhan Masyarakat Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan*.
- Radhia, M. Z., Asmawati, D., & Rahmawati, I. (2023). Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil tentang Skrining Hipotiroid Bayi Baru Lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Kawal. *Journal on Education*, 6(1), 3431–3440.
- Rastogi, M. V., & LaFranchi, S. H. (2010). Congenital hypothyroidism. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.1186/1750-1172-5-17>
- Rochmah, N., Hisbiyah, Y., P, R. K., & Faizi, M. (2023). *Skrining Hipotiroid Kongenital dan Optimalisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*. Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/srining-hipotiroid-kongenital-dan-optimalisasi-pertumbuhan-dan-perkembangan-anak/>
- Sahroni, S., Anshari, D., & Krianto, T. (2019). Social Determinants of the Level of Health Literacy in Hypertension Patients in the Public Health Center of the Cilegon City. *Faletahan Health Journal*, 6(3), 111–117.

- Sakai, A., Ishimaru, M., Iwata, H., Iwase, S., & Suzuki, S. (2024). Health literacy and parenting infants at home: protocol for a qualitative systematic review of parents' experiences. *JBI Evidence Synthesis*, 22(1), 90–96.
- Santosa, K. S. (2012). Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kemelekan Kesehatan Pasien Klinik Dokter Keluarga. In *Kiara Universitas Indonesia fakultas Kedokteran*.
- Setyaningsih, W., & Wulandari, R. D. (2022). The Evaluation of Congenital Hypothyroidism Screening Program in Indonesia: A Literature Review. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2), 495–502. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i2.1161>
- Sherwood, L. (2018). *Fisiologi Manusia Dari Sel ke Sistem* (Y. J. Suyono, M. Iskandar, V. Isella, & F. Susanti (eds.); 9th ed.). EGC.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Soewondo, P., Johar, M., Pujisubekti, R., & Halimah, H. (2018). Health literacy, perilaku bersih sehat, dan kesehatan balita: studi di wilayah tertinggal di Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(10), 365–370.
- Sørensen, K., Van Den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80>
- Sukendra, I. K., & Atmaja, I. K. S. (2020). Instrumen Penelitian. In *Journal Academia*.
- Susanto, D. P., Pratama, B. S., & Hariyanto, T. (2017). Analysis of Factors Affecting Patient Understanding of Informed Consent in Hospitals. *Indonesian Journal of Health Management*, 5(2), 73–81.
- Syaikh, A. bin M. A. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Toar, J. M. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Manado. *Jurnal Keperawatan*, 8(2), 1–8. <https://doi.org/10.35790/jkp.v8i2.32327>
- Valero-Chillerón, M. J., Mena-Tudela, D., Cervera-Gasch, Á., González-Chordá, V. M., Soriano-Vidal, F. J., Quesada, J. A., Castro-Sánchez, E., & Vila-Candel, R. (2022). Influence of health literacy on maintenance of exclusive breastfeeding at 6 months postpartum: a multicentre study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5411.

- Wahyuningsih, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Banguntapan I Bantul D.I.Y. *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK)*, 2(1), 26-31. <https://doi.org/10.32585/jmiak.v2i01.447>
- Wassner, A. J. (2018). Congenital Hypothyroidism. *Clin Perinatol*, 45, 1-18.
- Wati, I. (2019). Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Skripsi - Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 76.
- Widakdo, G., Rita, E., Saputri, I. N., Permatasari, T. A. E., & Kurniaty, I. (2020). Masalah Emosi dan Perilaku pada Penderita TB Anak. *Health Care : Jurnal Kesehatan*, 9(1), 43-52. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v9i1.75>
- Wija, I. B. E. (2019). Hipotiroid Kongenital. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 8(1), 1-5.
- Yasmin, N. R. (2022). Gambaran Hasil Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Berdasarkan Topografi Wilayah di Kota Bandar Lampung Pada Bulan Mei-Oktober Tahun 2019. *Skripsi - Universitas Lampung Fakultas Kedokteran*.
- Yati, N. P., Utari, A., & Tridjaja, B. (2017). Diagnosis dan Tata Laksana Hipotiroid Kongenital. Panduan Praktik Klinis Ikatan Dokter Anak Indonesia. In *Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia*.
- Yuesti, P. A. A. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In *ABpublishER*.
- Yulman, A. R. (2021). Kenali Skrining Hipotiroid Kongenital pada Bayi Baru Lahir. *Artikel Umum Rumah Sakit Universitas Indonesia. Tersedia Online : [Https://Rs.Ui.Ac.Id]*.

Lampira 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Analisis Health Literacy Ibu Terhadap Acceptance Tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSIA Ananda Makassar 2023

Nama :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Pendidikan Terakhir :
 Agama :
 Suku :
 Jumlah Anak :



KUESIONER HEALTH LITERACY

Petunjuk Pengisian

1. Terdapat beberapa pernyataan yang perlu anda tanggapi
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti kemudian tanggapilah sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya, karena tidak ada tanggapan benar ataupun salah
3. Pilihlah salah satu dari empat pilihan dengan memberikan tanda checklist (✓) pada pilihan yang tersedia, adapun pilihan yang disediakan yaitu

SS : Sangat Sesuai

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

STS : Sangat Tidak Sesuai

NO	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
A. Akses Informasi (Ability to Access Information)					
1.	Saya mudah mendapatkan buku/informasi mengenai Skrining Hipotiroid Kongenital				
2.	Saya memiliki sarana (internet, majalah, dan lain-lain) untuk mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan mengenai Skrining Hipotiroid Kongenital				
3.	Saya bisa bertanya kepada orang lain mengenai Skrining Hipotiroid Kongenital				
4.	Saya sungkan bertanya mengenai Skrining Hipotiroid Kongenital				
5.	Saya kesulitan mencari tahu informasi mengenai Skrining Hipotiroid Kongenital				
6.	Saya menggunakan internet sebagai hiburan daripada untuk mencari informasi tentang Skrining Hipotiroid Kongenital				
B. Tingkat Pemahaman Informasi (Ability to Understand Information)					
7.	Saya memahami artikel tentang Skrining Hipotiroid Kongenital yang saya baca				
8.	Saya mempraktekan informasi terkait Skrining Hipotiroid Kongenital yang saya dapatkan				
9.	Informasi tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di media massa mudah untuk diikuti				
10.	Banyak artikel tentang Skrining Hipotiroid Kongenital menggunakan bahasa yang tidak saya pahami				
11.	Saya jarang mempraktekan informasi tentang Skrining Hipotiroid Kongenital yang saya dapatkan				
12.	Saya menjalani hari-hari saya tanpa peduli dengan anjuran untuk melaksanakan Skrining Hipotiroid Kongenital				
C. Efikasi Diri (Self Efficacy)					
13.	Saya yakin dapat menerima pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital berdasarkan informasi kesehatan yang saya peroleh				

14.	Informasi kesehatan yang saya dapat membuat saya yakin untuk menerima tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital				
15.	Informasi kesehatan membuat saya tidak lagi ragu untuk menerima tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital				
16.	Saya menggunakan informasi tentang Skrining Hipotiroid Kongenital yang saya dapat untuk membuat keputusan				



Kuesioner Penerimaan Skrining Hipotiroid Kongenital

Berikut ini pernyataan yang anda diminta untuk mengisi sesuai dengan pendapat anda, dengan memilih dan memberikan tanda checklist (✓) pada pilihan yang tersedia

Partisipasi Terhadap Tindakan Skrining Hipotiroid Kongenital		
No.	Pernyataan	
1.	Saya bersedia menerima tindakan skrining hipotiroid Kongenital untuk dilakukan pada bayi saya	
2.	Saya tidak bersedia menerima tindakan skrining hipotiroid Kongenital untuk dilakukan pada bayi saya	



Lampiran 2: Uji Validitas dan Reliabilitas**UJI VALIDITAS**

Pertanyaan	R Hitung	Interpretasi
1	0,931	Valid
2	0,893	Valid
3	0,892	Valid
4	0,945	Valid
5	0,931	Valid
6	0,944	Valid
7	0,977	Valid
8	0,957	Valid
9	0,976	Valid
10	0,997	Valid
11	0,997	Valid
12	0,997	Valid
13	0,968	Valid
14	0,991	Valid
15	0,968	Valid
16	0,948	Valid

UJI RELIABILITAS

Cronbach's Alpha	N of Items
0,854	16

Lampiran 3: Etika Penelitian



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.026/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Anugrah Ayu Alfiyah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"ANALISIS HEALTH LITERACY IBU TERHADAP ACCEPTANCE TINDAKAN
SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN
2023"

"ANALYSIS OF MOTHER'S HEALTH LITERACY ON ACCEPTANCE OF
CONGENITAL HYPOTHYROID SCREENING MEASURES AT RSIA ANANDA
MAKASSAR IN 2023"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 18, 2023 until December 18, 2024.

December 18, 2023

Professor and Chairperson,



Ismail, S.Si., M.Si., Apt.

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 30375/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSIA Ananda Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5383/Un.06/LP2M/PP.00.9/11/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANUGRAH AYU ALFIYAH
Nomor Pokok	: 70600120037
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS HEALTH LITERACY IBU TERHADAP ACCEPTANCE TINDAKAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 29 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Meneliti**Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA**

Jl. Andi Djemma No. 57 (Lama : Jl. Landak Baru No.63) Makassar
Telp. +62411 – 874596, Fax : +62411 – 853694

Email : sekretariat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 006/RSIA-A/I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Divisi Tata Usaha & Diklat Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, menerangkan bahwa:

Nama : Anugrah Ayu Alfiah
NIM : 706001120037
Fakultas : FKIK/ UIN Alauddin Makassar
Jurusan : Pendidikan Dokter

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda, terhitung tanggal 1 Desember – 31 Desember 2023 guna menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS HEALTH LITERACY IBU TERHADAP ACCEPTANCE TINDAKAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2023”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Januari 2024

Divisi Tata Usaha & Diklat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Rini Safitri, SST., M.Kes

Lampiran 7: Hasil SPSS

1. Analisis Univariat

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-25 Tahun	28	28.0	28.0	28.0
	26-35 Tahun	55	55.0	55.0	83.0
	36-45 Tahun	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sekolah Dasar (SD)	3	3.0	3.0	3.0
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	4.0	4.0	7.0
	Sekolah Menengah Atas (SMA)	34	34.0	34.0	41.0
	Diploma	16	16.0	16.0	57.0
	Sarjana	43	43.0	43.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	55	55.0	55.0	55.0
	Karyawan Swasta	28	28.0	28.0	83.0
	ASN	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Gravid I	42	42.0	42.0	42.0
	Gravid II	34	34.0	34.0	76.0
	Gravid III	15	15.0	15.0	91.0
	Gravid IV	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

SUKU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bugis	54	54.0	54.0	54.0
	Makassar	41	41.0	41.0	95.0
	Toraja	2	2.0	2.0	97.0
	Jawa	2	2.0	2.0	99.0
	Sumatera	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
 AGAMA
 MAKASSAR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Islam	98	98,0	98,0	98,0
	Kristen	2	2,0	2,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Health Literacy

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Adequate	73	73.0	73.0	73.0
	Middle	23	23.0	23.0	96.0
	Inadequate	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Skrining Hipotroid

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Terima	96	96.0	96.0	96.0
	Tidak Terima	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

2. Analisis Bivariat

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.265 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	7.738	1	.005		
Likelihood Ratio	10.937	1	.001		
Fisher's Exact Test				.004	.004
Linear-by-Linear Association	11.153	1	.001		
N of Valid Cases	100				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.08.

b. Computed only for a 2x2 table

Health_Literacy * Skrining_Hipotroid Crosstabulation

		Skrining_Hipotroid		Total	
		Terima	Tidak Terima		
Health_Literacy	Adequate	Count	73	0	73
		% within Health_Literacy	100.0%	0.0%	100.0%
	Inadequate	Count	23	4	27
		% within Health_Literacy	85.2%	14.8%	100.0%
Total	Count	96	4	100	
	% within Health_Literacy	96.0%	4.0%	100.0%	



Lampiran 8: Dokumentasi



Daftar Riwayat Hidup



A. Identitas Penulis

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Nama | : Anugrah Ayu Alfiyah |
| 2. NIM | : 70600120037 |
| 3. Jurusan | : Pendidikan Dokter |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Makassar / 30 Maret 2002 |
| 5. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Alamat | : Jl. Maccini Raya 1 No.5 |
| 8. Orang Tua | |
| Ayah | : Suryadi Kadir |
| Ibu | : Iswarty Ismail |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. TK | : TK Kartika WRB XX-I Makassar |
| 2. SD | : SD Negeri Mangkura V |
| 3. SMP | : MTs Negeri 1 Kota Makassar |
| 4. SMA | : SMA Negeri 16 Makassar |