

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN
AWAR-AWAR (*Ficus septica* Burm F.) TERHADAP BAKTERI
Helicobacter pylori SECARA *IN-VITRO***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

DWI FEBRIANTY KURNIA

NIM : 70100119083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2024
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Febrianty Kurnia
Nim : 70100119083
Tempat/Tgl.Lahir : Jayapura, 22 Februari 2001
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Twin Bridge Residence Blok C/3
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm F.) Terhadap Bakteri *Helicobacter pylori* Secara *In-Vitro*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikast, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenananya batal demi hukum.

Gowa, 18 Januari 2024
Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Dwi Febrianty Kurnia
NIM. 70100119083

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm F.) Terhadap Bakteri *Helicobacter pylori* Secara *In-Vitro*” yang disusun oleh **Dwi Febrianty Kurnia**, NIM **70100119083**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 18 Januari 2024 M** yang bertepatan dengan **06 Rajab 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 18 Januari 2024 M
06 Rajab 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M. Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Muh.Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Indah, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M. Kes.
NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil ladzil kaana bi'ibaadihi khoiroom bashiir. Tabarakal ladzii ja'ala fis samaa-i buruujaw waja'ala fihaa siroojaw waqomarom muniir. Asyhadu alaa ilaaha illallaahu, wa- asyhadu anna muhammadan 'abduhu warosuuluh. Alladzii ba'atsahu bilhaqqi basyiirow wanadzirow wa daa'iyaa ilalhaqqi biidznihi wasiroojaam muniir. Allahumma sholli'alaihi wa'ala aalihii washohbihi wasallim tasliimaan katsiroo. Amma ba'du.

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., semoga mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Skripsi berjudul "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm F.) Terhadap Bakteri *Helicobacter pylori* Secara *In-Vitro*" ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, berbagai kendala teknis dan non-teknis telah dihadapi. Namun, dengan doa, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil mengatasi dan mengendalikan kendala tersebut. Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua, Ayah H. Budi Rahim dan Ibu Hj. Nuraenah, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, kasih sayang, motivasi, saran, dan dukungan penuh. Juga kepada saudara-saudara yang turut serta dalam memberikan dukungan yang berarti, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan.

Demikian pula penulis menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada :

1. Bapak Prof . H. Hamdan Juhannis , MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang diberikan selama menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Andi Aderus, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. apt. Isriyani Ismail, M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. H. M. Fais Satrianegara, Skm., Mars. selaku wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Ibu Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak apt. Muh.Rusdi, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
10. Ibu apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin selaku sekretaris jurusan sekaligus pembimbing pertama yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
11. Ibu apt. Indah, S.Si., M.Si selaku pembimbing kedua yang juga senantiasa memberi masukan, arahan, dan motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing peneliti hingga selesainya skripsi ini.

12. Ibu apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku penguji agama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu Dra. apt. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si. selaku pembimbing akademik yang banyak membantu dan memberi arahan serta motivasi dalam proses perkuliahan dan penelitian.
15. Bapak, Ibu dosen, dan seluruh staf di Jurusan Farmasi, atas kontribusi ilmu pengetahuan dan segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis sejak awal menempuh pendidikan farmasi hingga penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman sejawat yang senantiasa memberikan dukungan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Sang Pencipta Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita semua. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini, namun dengan harapan besar bahwa dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian mendatang, terutama di bidang mikrobiologi farmasi, dan semoga dianggap sebagai amal ibadah di mata Allah SWT. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 18 Januari 2024

Penulis

Dwi Febrianty Kurnia
NIM : 70100119083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS ii	ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii	iii
KATA PENGANTAR..... iv	iv
DAFTAR ISI..... vii	vii
DAFTAR TABEL..... x	x
DAFTAR GAMBAR xi	xi
DAFTAR LAMPIRAN xii	xii
ABSTRAK..... xiii	xiii
ABSTRACT..... xiv	xiv
BAB I PENDAHULUAN..... 1	1
A. Latar Belakang..... 1	1
B. Rumusan Masalah..... 3	3
C. Definisi Operasional..... 3	3
D. Ruang Lingkup Penelitian..... 4	4
E. Kajian Pustaka..... 4	4
F. Tujuan Penelitian..... 7	7
G. Manfaat Penelitian..... 8	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9	9
A. Uraian Sampel..... 9	9
1. Klasifikasi Tumbuhan..... 9	9
2. Nama Daerah..... 9	9
3. Morfologi..... 10	10
4. Ekologi dan Penyebaran..... 10	10
5. Kandungan Kimia..... 11	11
6. Manfaat Tumbuhan..... 11	11
B. Ekstraksi..... 11	11
1. Pengertian ekstraksi..... 11	11
Jenis-jenis ekstraksi..... 12	12

C. Bakteri.....	14
1. Pengertian Bakteri	14
2. Ciri- Ciri Bakteri.....	15
3. Struktur Tubuh Bakteri.....	16
D. Uraian Bakteri Uji.....	19
1. Klasifikasi.....	19
2. Defenisi.....	20
3. Faktor Resiko.....	20
4. Diagnosis	21
5. Terapi.....	22
E. Antibakteri.....	26
1. Pembagian Antibakteri	27
2. Sifat Antibakteri.....	27
3. Prinsip Kerja Antibakteri.....	28
F. Metode pengujian.....	29
1. Metode Difusi.....	30
2. Metode Dilusi	31
3. Metode Difusi-Dilusi.....	32
G. Perhitungan Zona Hambat.....	32
H. Kontrol Pemanding	33
I. Tinjauan Islam.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sampel penelitian.....	41
D. Instrumen Penelitian.....	42
E. Teknik Pengolahan.....	42
1. Pengambilan Sampel	42
2. Pengolahan Sampel	42
3. Ekstraksi Sampel	43
4. Pembuatan Variasi Konsentrasi	43
5. Sterilisasi Alat dan Bahan.....	43

6. Pembuatan Media Nutrient Agar	43
7. Pembuatan Larutan <i>Mcfarland</i>	44
8. Inokulasi bakteri	44
9. Pembuatan Suspensi Bakteri	44
10. Pengujian Antibakteri	45
11. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Pengolahan sampel	46
2. Uji aktivitas antibakteri	46
3. Diagram aktivitas antibakteri	47
4. Uji analisis statistik	47
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	66
RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Diameter Zona Hambat	33
Tabel 2. Perbandingan Jumlah Ekstrak Dan Volume Etil Asetat	43
Tabel 3. Hasil Ekstraksi Daun Awar-Awar (<i>Ficus septica</i> Burm.F).....	46
Tabel 4. Hasil Uji Aktvitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Awar-Awar (<i>Ficus septica</i> Burm.F) Terhadap Bakteri <i>Helicobacter pylori</i>	46
Tabel 5. Uji <i>One Way Anova</i>	48
Tabel 6. Uji <i>Post Hoc Games-Howell</i>	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daun Awar-Awar (<i>Ficus septica</i> Burm.F).....	9
Gambar 2. Struktur Tubuh Bakteri.....	16
Gambar 3. <i>Helicobacter pylori</i>	19
Gambar 4. Rumus Perhitungan Diameter Zona Hambat	33
Gambar 5. Struktur Kimia Kloramfenikol	33
Gambar 6. Diagram Hasil Uji Aktivitas Antibakteri.....	47
Gambar 7. Penyiapan Sampel	75
Gambar 8. Proses Ekstraksi Sampel.....	76
Gambar 9. Pembuatan Variasi Konsentrasi Ekstrak.....	76
Gambar 10. Pembuatan NaCl dan media NA	77
Gambar 11. Sterilisasi Alat dan Bahan.....	77
Gambar 12. Pembuatan Inokulasi Bakteri	77
Gambar 13. Pembuatan Suspensi Bakteri	78
Gambar 14. Proses Uji Aktivitas Antibakteri.....	78
Gambar 15. Hasil Zona Hambat Uji Aktivitas Antibakteri	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel.....	66
Lampiran 2. Skema Ekstraksi Sampel	67
Lampiran 3. Skema Pembuatan Media Nutrient Agar	68
Lampiran 4. Skema Pembuatan Larutan Standar <i>McFarland</i>	68
Lampiran 5. Skema Kultur Dan Suspensi <i>Helicobacter pylori</i>	69
Lampiran 6. Uji Aktivitas Antibakteri.....	69
Lampiran 7. Perhitungan Rendamen Ekstrak.....	71
Lampiran 8. Perhitungan Konsentrasi Dan Pengenceran Ekstrak	71
Lampiran 9. Perhitungan Diameter Zona Hambat Bakteri	71
Lampiran 10. Hasil Uji Aktvitas Antibakteri	74
Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian.....	75

ABSTRAK

Nama : Dwi Febrianty Kurnia
NIM : 70100119083
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm F.) Terhadap Bakteri *Helicobacter pylori* Secara *In-Vitro*

Salah satu penyebab infeksi yang terjadi di lambung disebabkan oleh bakteri *Helicobacter pylori*. Pencarian alternatif pengobatan infeksi terus berkembang, salah satunya berasal dari tumbuhan awar-awar (*Ficus septica* Burm.F). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) dalam menghambat bakteri *Helicobacter pylori* dengan beberapa konsentrasi menggunakan pelarut etil asetat. Konsentrasi yang digunakan yaitu 60%, 75%, dan 90%. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan kertas cakram dengan kontrol positif kloramfenikol dan kontrol negatif etil asetat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun awar-awar dapat memberikan zona penghambatan pada bakteri *Helicobacter pylori* dengan diameter rata-rata zona hambat konsentrasi 60%, 75%, dan 90% berturut-turut sebesar 11,5 mm, 13,8 mm, dan 16,1 mm. Sedangkan pada kontrol positif menghasilkan rata-rata diameter zona hambat 25 mm. Konsentrasi optimal ekstrak daun awar-awar dalam memberikan penghambatan yaitu pada konsentrasi 90%. Berdasarkan hasil uji *One Way Anova* dihasilkan $p=0,000$ ($p<0,05$) yang berarti terdapat kelompok yang mempunyai perbedaan zona hambat yang signifikan. Maka dilakukan uji *Post Hoc Games-Howell* menunjukkan kontrol positif kloramfenikol memiliki perbedaan zona hambat yang signifikan dengan ketiga konsentrasi. Namun tidak terdapat perbedaan zona hambat yang signifikan antara ketiga konsentrasi.

Kata Kunci : Daun awar-awar, Antibakteri, *Helicobacter pylori*.

ABSTRACT

Nama : Dwi Febrianty Kurnia
NIM : 70100119083
Title : Antibacterial Activity Test of Ethyl Acetate Extract of Awar-Awar Leaves (*Ficus septica* Burm F.) Against *Helicobacter pylori* Bacteria In-Vitro

One of the causes of infection in the stomach is caused by *Helicobacter pylori* bacteria. The search for alternative treatments for infections continues to grow, one of which comes from the awar-awar plant (*Ficus septica* Burm.F). This study aims to determine the antibacterial activity of awar-awar leaf extract (*Ficus septica* Burm.F) in inhibiting *Helicobacter pylori* bacteria at several concentrations using ethyl acetate solvent. The concentrations used are 60%, 75%, and 90%. The antibacterial activity test was carried out using the agar diffusion method using paper discs with a positive control of chloramphenicol and a negative control of ethyl acetate. The results of the study showed that awar-awar leaf extract could provide an inhibition zone for *Helicobacter pylori* bacteria with an average diameter of the inhibition zone concentration of 60%, 75%, and 90% respectively 11.5 mm, 13.8 mm, and 16.1mm. Meanwhile, the positive control produced an average inhibitory zone diameter of 25 mm. The optimal concentration of awar-awar leaf extract in providing inhibition is at a concentration of 90%. Based on the results of the *One Way Anova* test, $p = 0.000$ ($p < 0.05$) which means there are groups that have significant differences in inhibition zones. So the Post Hoc *Games-Howell* test was carried out showing that the positive control chloramphenicol had a significant difference in the inhibition zone with the three concentrations. However, there was no significant difference in the inhibition zone between the three concentrations.

Keywords : Awar-awar leaves, Antibacterial, *Helicobacter pylori*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu manusia ke manusia lain atau dari hewan ke manusia. Infeksi bisa sangat berbahaya jika tidak segera ditangani dengan benar, karena dapat menular terutama pada individu dengan sistem imun lemah (Bawondes dkk., 2021) Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai agen infeksi yang meliputi virus, bakteri, parasit, maupun jamur (Besung, 2009).

Salah satu jenis bakteri adalah *Helicobacter pylori*. *Helicobacter pylori* merupakan bakteri Gram negatif berbentuk spiral, memiliki flagel lopotrikus, mampu berkolonisasi pada lambung dan memicu terjadinya peradangan lokal. Infeksi lambung yang disebabkan oleh *Helicobacter pylori* apabila tidak segera diobati dapat menjadi penyakit yang lebih serius seperti gastritis atrofi, metaplasia usus, dan *noncardia gastric adenocarcinoma* (Mabeku dkk., 2018)

Helicobacter pylori dianggap merupakan infeksi bakteri yang paling sering di dunia (Olokoba dkk., 2013). Hampir 50% penduduk di dunia terinfeksi *Helicobacter pylori* (Fock & Ang, 2009) dan infeksi ini menjadi semakin tinggi pada negara belum berkembang (93,6%) dibandingkan negara berkembang (15,5%) (Eusebi dkk., 2014). Hal ini dikaitkan dengan berbagai faktor seperti umur, status sosial ekonomi, sanitasi, kepadatan tempat tinggal, merokok, penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid, golongan darah O, berat badan dan riwayat keluarga yang terjangkit tukak lambung yang dapat mentransmisikan bakteri *Helicobacter pylori* (Mabeku dkk., 2018).

Untuk pasien yang positif *Helicobacter pylori* diperlukan suatu kombinasi

terapi yang terdiri dari antibiotika yang mampu menurunkan kadar asam lambung misalnya penghambat pompa proton atau antagonis reseptor H₂ (Suhatri, Hansen, 2014). Pengobatan untuk infeksi *Helicobacter pylori* sangat sulit karena membutuhkan terapi kombinasi sedikitnya dua antibiotik dikarenakan adanya multidrug resistance (Parreira dkk., 2017). Sebuah penelitian yang dilakukan Savoldi dkk 2018 setelah mengidentifikasi 178 penelitian, yang terdiri dari 66.142 isolat *Helicobacter pylori* dari 65 negara. Menyatakan tingkat resistensi *Helicobacter pylori* terhadap klaritromisin, metronidazol, dan levofloxacin adalah $\geq 15\%$ (Savoldi dkk., 2018). Juga terdapat penelitian yang menyatakan resistensi keseluruhan terhadap klaritromisin, metronidazol, dan amoksisilin masing-masing adalah 10,1%, 36,9%, dan 1,4% (Meyer dkk., 2002).

Meningkatnya prevalensi resistensi antibiotik pada *Helicobacter pylori* merupakan masalah serius yang dalam waktu dekat dapat menjadi penyebab utama kegagalan terapi. Oleh karena itu, pencarian alternatif pengobatan terbaru berupa zat aktif dari tumbuhan mulai banyak dikembangkan karena lebih efektif, murah, mudah dalam penggunaan, aman, toksisitas rendah, dan mampu mencegah penyebaran gen resistensi antarspesies mikroorganisme (Parreira dkk., 2017).

Masyarakat Indonesia telah menggunakan tumbuhan obat sebagai salah satu upaya menanggulangi masalah kesehatan. Salah satu tumbuhan yang digunakan ialah tumbuhan Awar-awar (*Ficus septica* Burm.F). Tumbuhan ini mudah sekali ditemukan di tepi jalan, semak belukar maupun di dalam hutan terbuka (Nurvianty dkk., 2018). Tumbuhan awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) digunakan sebagai obat untuk meredakan batuk, sakit kepala, menurunkan demam, mengobati sakit perut, mencegah diare, mengobati luka dan sebagai obat untuk infeksi (Tawi dkk., 2019).

Selama berabad-abad, daunnya telah digunakan oleh masyarakat sebagai tumbuhan obat. Studi ilmiah tentang aktivitas farmakologisnya juga menggunakan

daun sebagai sumbernya (Salsabila dkk., 2021). Seperti penelitian yang dilakukan Tuna dkk 2016 mengatakan bahwa ekstrak daun awar-awar berpotensi memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Eschericia coli*. Daya hambat ekstrak daun awar-awar lebih besar pada *Staphylococcus aureus* daripada *Eschericia coli* (Tuna & Wowor, 2016) dan Fandini dkk, 2023 yang menyimpulkan bahwa konsentrasi 35% ekstrak daun awar-awar memiliki aktivitas antibakteri paling tinggi dalam menghambat aktivitas pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* (Fandini & Trisnawati, 2023). Kandungan yang berfungsi sebagai antibakteri dalam daun awar-awar yaitu alkaloid, tanin, steroid, flavonoid, dan saponin (Rahman dkk., 2013).

Penelitian tentang aktivitas antibakteri ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) telah banyak dilaporkan. Namun, sejauh ini belum ada informasi mengenai aktivitas ekstrak daun awar awar terhadap bakteri *Helicobacter pylori*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuktikan apakah senyawa metabolit ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Helicobacter pylori*?
2. Berapakah konsentrasi optimal ekstrak etil asetat daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) yang memberikan daya hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*?

C. Definisi Operasional

1. Uji aktivitas antibakteri merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri *Helicobacter pylori* terhadap zat antibakteri dari ekstrak daun awar-awar.

2. Antibakteri adalah zat atau senyawa yang diperoleh dari ekstrak daun awar-awar dengan tujuan untuk mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri *Helicobacter pylori*.
3. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia daun awar-awar dengan menggunakan pelarut etil asetat.
4. Daun Awar-awar (*Ficus septica* Burm. F.) adalah tumbuhan yang termasuk kerabat beringin, anggota famili Moraceae yang diambil bagian daunnya dari daerah Kelurahan Romang Polong.
5. Bakteri *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) adalah bakteri kultur yang diambil dari laboratorium merupakan Gram negatif berbentuk spiral dengan panjang 3 μm dan lebar 0.5 μm , memiliki flagel lopotrikus, mampu berkolonisasi pada lambung dan memicu terjadinya peradangan lokal.
6. *In vitro* adalah jenis penelitian atau eksperimen yang dilakukan di laboratorium, di mana sampel atau bahan diuji dalam kondisi terkontrol di dalam wadah atau lingkungan buatan, seperti cawan petri, tabung reaksi, atau wadah kaca lainnya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup penelitian eksperimental laboratorium, dilakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) yang memberikan daya hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.

E. Kajian Pustaka

1. Pada penelitian Tunny dkk 2020 tentang Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm) Kecamatan Kairatu Dengan Metode DPPH. Dilakukan skrining senyawa fitokimia ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F). Hasil

analisis fitokimia yang dilakukan menunjukkan ekstrak daun awar-awar positif mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid, fenol, saponin, dan tanin (Tunny dkk., 2020). Berdasarkan penelitian tersebut menjadi acuan peneliti untuk menggunakan ekstrak daun awar-awar sebagai sampel penelitian karena memiliki beberapa senyawa kimia yang berpotensi sebagai antibakteri.

2. Berdasarkan penelitian Tuna dkk 2016 tentang Uji daya hambat ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Eschericia coli* mengatakan bahwa Ekstrak daun awar-awar diperoleh dari proses maserasi dengan etanol 96%. Konsentrasi ekstrak kental yang digunakan dalam penelitian ini ialah 100 mg/ml, 50 mg/ml, 25 mg/ml, 12,5 mg/ml. Siprofloksasin sebagai kontrol positif, dan akuades sebagai kontrol negatif. Hasil penelitian mendapatkan rata-rata diameter zona hambat ekstrak daun awar-awar konsentrasi 100 mg/ml, 50 mg/ml, 25 mg/ml, 12,5 mg/ml berturut-turut ialah 27,5 mm, 24,3 mm, 22,3 mm, 21,8 mm pada bakteri *Staphylococcus aureus*, sedangkan pada bakteri *Eschericia coli* ialah 24,8 mm, 21 mm, 18,3 mm, 17 mm. (Tuna & Wowor, 2016). Berdasarkan penelitian diatas, menjadi acuan peneliti untuk menggunakan ekstrak daun awar-awar dengan berbagai konsentrasi pada jenis bakteri lain yaitu *Helicobacter pylori*.
3. Dalam penelitian oleh Atmaja 2019 tentang Aktivitas Daya Hambat Ekstrak Etil Asetat Kulit Petai (*Parkia Speciosa* Hassk) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Klebsiella Pneumoniae*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas daya hambat ekstrak etil asetat kulit petai terhadap *Klebsiella pneumoniae*. Kulit petai yang telah terkumpul dikeringkan, kemudian diblender sehingga terbentuk serbuk halus. Serbuk halus di

maserasi selama 2 hari menggunakan etil asetat, kemudian dievaporasi hingga terbentuk ekstrak kering. Ekstrak diencerkan menggunakan etil asetat dengan konsentrasi 100 mg/ml (P1), 250 mg/ml (P2), 500 mg/ml (P3), dan 1000 mg/ml (P4), selanjutnya diteteskan pada paper disc. Paper disc, kontrol positif berupa gentamicin (K2), kontrol negatif (K1) berupa etil asetat, diletakan diatas 7 cawan petri yang telah dinokulasikan *Klebsiella pneumoniae* dengan media agar. Sampel diinkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 37°C. Ekstrak etil asetat kulit petai mampu menghambat pertumbuhan *Klebsiella pneumoniae* dengan rerata zona hambat K1 = 0 mm, K2 = 20,47 mm, P1 = 6,14 mm, P2 = 9,71 mm, P3 = 12,28 mm, dan P4 = 18,00 mm (Atmaja & Hendrayana, 2019). Berdasarkan penelitian tersebut menjadi acuan peneliti untuk menggunakan pelarut etil asetat dalam proses maserasi dan pengenceran variasi konsentrasi.

4. Dalam penelitian Ridwan 2023 dengan judul Skrining Fitokimia Dan Analisis Kualitatif Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Ekstrak Daun Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm. F) Dengan Berbagai Pelarut. Pada penelitian ini *Ficus septica* Burm. F diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut air, etanol 96%, etil asetat, dan n-heksan. Hasil skrining fitokimia ekstrak air mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan saponin, ekstrak etanol 96% mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, ekstrak etil asetat mengandung senyawa tanin, sedangkan ekstrak n-heksan tidak ditemukan kandungan senyawa didalamnya. Hasil uji kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak air tidak ditemukan kandungan senyawa didalamnya, ekstrak etanol 96% mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan triterpenoid, ekstrak etil asetat mengandung senyawa flavonoid, tanin, steroid dan triterpenoid, ekstrak n-heksan mengandung senyawa tanin dan

triterpenoid (Ridwan, 2023). Berdasarkan penelitian tersebut menjadi acuan peneliti untuk menggunakan etil asetat sebagai pelarut dalam proses penyarian daun awar-awar (*Ficus septica* Burm. F).

5. Dalam penelitian Fajrina dkk 2018 yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat *Spons Aplysina aerophoba* Pada *Helicobacter pylori* dan *Shigella dysenteriae*. Penelitian ini merupakan pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat *spon Aplysina aerophoba* terhadap *Shigella dysenteriae* dan *Helicobacter pylori* menggunakan metode difusi dilakukan dengan mengukur diameter hambat di sekeliling cakram kertas, dengan menggunakan berbagai konsentrasi yaitu 7%, 5%, 3%, 1%. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat *Aplysina aerophoba* mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae* dan *Helicobacter pylori* dengan terbentuknya rata-rata diameter hambat pada masing-masing konsentrasi sebesar 10,60 mm; 9,44 mm; 8,3 mm; 5,641 mm pada bakteri *Helicobacter pylori* (Fajrina dkk., 2018). Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menjadikan acuan untuk menggunakan pelarut etil asetat sebagai pelarut ekstrak dan metode yang sama dengan satu bakteri uji yang sama yaitu *Helicobater pylori*.

Berdasarkan kajian pustaka diatas diketahui bahwa belum ada penelitian mengenai uji aktivitas antibakteri daun awar-awar (*Ficus septica* Burm. F) terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak etil asetat daun awar-awar (*Ficus septica* Burm. F) sebagai antibakteri terhadap bakteri *Helicobacter pylori*

2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak etil asetat daun awar-awar (*Ficus septica* Burm. F) dalam memberikan daya hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*

G. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui kemampuan aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun awar-awar (*Ficus septica* Burm. F) terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.
2. Menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pengembangan kesehatan khususnya mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun awar-awar (*Ficus septica* Burm. F) sebagai pengobatan penyakit akibat infeksi bakteri *Helicobacter pylori*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi Tumbuhan

Regnum : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Classis : Dicotyledonae
Ordo : Urticales
Famili : Moracea
Genus : *Ficus*
Spesies : *Ficus septica* Burm.F
(Steenis, 2008)



Gambar 1. Daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F)
(Tuna & Wowor, 2016)

2. Nama Daerah

Kiciyat (Sunda), Awar-awar (Jawa Tengah, Belitung), Barabar (Madura), Sirih popar (Ambon), Bei, Loloyan (Minahasa), Tobo-tobo (Makassar), Dausalo (Bugis), Bobulutu (Halmahera Utara), Tagalolo (Ternate) (Kinho dkk., 2011).

3. Morfologi

Pohon tegak atau perdu, tinggi 1-5 meter. Batang lengket yang bengkok, lunak, bulat, berongga, gundul, dan tembus pandang. Daun tunggal, bertangkai besar, sangat runcing dengan panjang 2,53 cm dan susunannya berselang-seling atau berlawanan. Bilahnya berbentuk bulat telur atau elips, dengan pangkal membulat, ujung menyempit, agak tumpul, dan tepi rata. Ukurannya $9-30 \times 9-16$ cm, dan berwarna hijau tua mengkilap di bagian atas dengan banyak bintik pucat dan hijau muda di bagian bawah. Sisi kiri dan kanan helaian daun bagian tengah masing-masing memiliki 6-12 helai daun samping, membuat kedua sisi pucat helaian daun menonjol

Bunga majemuk dalam susunan tembikar berpasangan, bertangkai pendek, di pangkal dengan tiga daun pelindung, berwarna hijau muda atau abu-abu kehijauan, berdiameter sekitar 1,5 cm, pada beberapa tumbuhan terdapat bunga jantan dan betina, sedangkan pada tumbuhan lain hanya terdapat bunga betina. Buah seperti periuk dengan diameter 1,5-2 cm dan berwarna abu-abu kehijauan. Januari sampai Desember adalah bulan berbunga. Tumbuhan ini biasanya ditemukan tumbuh di pinggir jalan, di semak-semak, dan di hutan terbuka di Jawa dan Madura pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut (Kinho dkk., 2011).

4. Ekologi dan Penyebaran

Tumbuhan awar-awar, kadang-kadang disebut sebagai “tobo-tobo” di Sulawesi Selatan (Makassar), dan termasuk famili Moraceae. Tumbuhan yang dapat berupa pohon maupun perdu ini dapat ditemukan di Jawa, Madura, dan Sulawesi. Tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 1-1.200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan awar-awar (*Ficus septica* Burm. F) dapat ditemukan dengan melimpah pada semak pinggir jalan dan hutan terbuka (Steenis, 2008).

5. Kandungan Kimia

Kandungan kimia dari daun, buah, dan akar *Ficus septica* adalah sebagai berikut: buahnya mengandung alkaloid dan tanin, daunnya mengandung saponin dan flavonoid, dan akarnya mengandung senyawa polifenol (Steenis, 2008). Daun awar-awar (*Ficus septica* Burm. F) juga mengandung senyawa sterol, saponin, triterpenoid, antofin, 10S, 13aR- antofin N-oksida, dehidrotilofoforin ficuseptin A, tylophorin, 2-Demetoksialofoforin, serta flavonoid genistin dan kaempferitrin (Kinho dkk., 2011).

6. Manfaat Tumbuhan

Daun awar-awar memiliki berbagai manfaat dalam terapi, seperti penggunaannya sebagai obat untuk penyakit kulit, radang usus buntu, bisul, gigitan ular berbisa, dan masalah sesak nafas. Sementara itu, akar awar-awar dapat dimanfaatkan sebagai penawar racun (untuk ikan) dan untuk mengatasi asma. Getahnya berguna dalam penanganan bengkak dan sakit kepala. Selain itu, buah Awar-awar sering digunakan sebagai pencahar (Sudarsono dkk., 2002).

B. Ekstraksi

1. Pengertian ekstraksi

Ekstrak adalah substansi kental yang dihasilkan melalui proses mengekstraksi zat aktif dari bahan tumbuhan atau hewan, menggunakan pelarut yang cocok. Setelah itu, semua atau hampir semua pelarut diuapkan, dan massa atau serbuk yang tersisa diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ekstraksi adalah metode pemisahan bahan atau komponen kimia dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuan utama ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa dengan kelarutan yang berbeda dalam pelarut organik tertentu dari komponen kimia yang terkandung dalam bahan alam, seperti tumbuhan, hewan, dan biota laut (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Khusus untuk bahan yang berasal dari tumbuhan, prosedur ekstraksi adalah sebagai berikut:

- a. Pengelompokan bagian tumbuhan (akar, batang, daun, dll), pengeringan dan penggilingan bagian tumbuhan.
 - b. Pemilihan pelarut.
 - c. Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya.
 - d. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya.
 - e. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform dan sebagainya.
- (Mukhriani, 2014)

2. Jenis-jenis ekstraksi

Beberapa jenis ekstraksi bahan alam yang sering digunakan yaitu ekstraksi secara dingin dan panas. Ekstraksi secara dingin dilakukan dengan cara soxhletasi, maserasi, dan perkolasi. Sedangkan untuk ekstraksi secara panas dapat dilakukan antara lain dengan cara infudasi, refluks, dan destilasi uap air.

- a. Ekstraksi secara dingin
 1. Maserasi

Maserasi adalah metode ekstraksi simplisia yang melibatkan penggunaan pelarut, di mana simplisia tersebut direndam dan diaduk beberapa kali pada suhu ruangan (temperatur kamar) (Depkes RI, 2000). Ekstraksi dilakukan dengan cara merendam sampel pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai, sehingga dapat melarutkan analit dalam sampel. Proses perendaman umumnya berlangsung selama 3-5 hari, dengan sesekali diaduk untuk mempercepat pelarutan analit. Tanda bahwa semua analit telah diekstraksi dengan sempurna dapat dilihat ketika pelarut yang digunakan tidak memiliki warna (Leba, 2017).

Metode ekstraksi maserasi memiliki keunggulan dalam penggunaan peralatan dan cara yang sangat sederhana, dapat diterapkan pada analit yang tahan

terhadap pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap pemanasan. Namun, kelemahan dari metode ekstraksi ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang cukup besar (Leba, 2017).

2. Perkolasi

Perkolasi merupakan metode ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu digantikan hingga mencapai ekstraksi yang menyeluruh, biasanya dilaksanakan pada suhu ruangan (Depkes RI, 2000). Metode penambahan pelarut dilakukan dengan cara meneteskan pelarut dari wadah terpisah, disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan, atau dengan cara menambahkan pelarut dalam jumlah besar secara bertahap (Leba, 2017). Ekstraksi berlanjut hingga seluruh analit dalam sampel diekstraksi secara menyeluruh. Tanda bahwa proses ekstraksi telah selesai adalah pelarut yang digunakan menjadi tidak berwarna (Leba, 2017).

b. Ekstraksi Secara Panas

1. Soxhlet

Dalam metode ini, sampel serbuk diletakkan dalam selubung selulosa, seperti kertas saring, yang ditempatkan di klonsong di bawah kondensor dan di atas labu. Kemudian, pelarut yang sesuai ditambahkan ke dalam labu, dan suhu penangas diatur di bawah suhu refluks. Keunggulan metode ini adalah ekstraksi berlangsung secara kontinu, dan sampel diekstraksi hanya melalui kondensasi, mengurangi penggunaan pelarut dan memerlukan waktu yang lebih singkat. Namun, kelemahannya terletak pada kemungkinan kerusakan bahan kimia termolabil karena ekstrak yang diperoleh berada pada suhu didih (Mukhriani, 2014)

2. Refluks dan Destilasi Uap

Sampel dan pelarut digabungkan dalam labu yang terpasang pada kondensor untuk prosedur refluks. Sampai titik didih, pelarut dipanaskan. Uap yang terkondensasi dikembalikan ke labu (Mukhriani, 2014).

Teknik serupa, seperti destilasi uap, sering digunakan untuk mengekstrak minyak esensial, yang merupakan kombinasi dari beberapa bahan kimia yang mudah menguap. Dalam sebuah wadah yang terpasang pada kondensor, uap yang terkondensasi dan hasil sulingan (dibagi menjadi 2 bagian yang tidak bercampur satu sama lain) dikumpulkan selama pemanasan. Potensi degradasi bahan kimia yang mudah menguap merupakan kelemahan dari kedua teknik tersebut (Mukhriani, 2014).

3. Infusa

Air berfungsi sebagai pelarut dalam proses ekstraksi yang dikenal sebagai infudasi. Suhu pelarut air harus 90°C selama 15 menit selama proses infudasi. Rasio berat bahan dan air adalah 1:10, sehingga jika simplisia memiliki berat 100 gram, 1000 ml air akan digunakan sebagai pelarut. Cara yang dilakukan biasanya, bahan yang sudah dihaluskan dipanaskan selama 15 menit, mulai dari suhu 90°C , di dalam panci berisi air sambil sesekali diaduk. Saring melalui kain flannel selagi masih panas, tambahkan air panas seperlunya untuk mendapatkan volume yang tepat. Setelah singin, lakukan penyaringan jika bahan tersebut mengandung minyak yang menguap (Simanjuntak dkk., 2019).

C. Bakteri

1. Pengertian Bakteri

Kata bakteri berasal dari bahasa latin yaitu "bacterium" yang merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri adalah kelompok organisme mikroskopis yang pada umumnya bersel tunggal, dan tidak memiliki membran inti sel (Febriza dkk., 2021). Bakteri biasanya berukuran beberapa mikrometer panjangnya dan mungkin berbentuk bulat, berbentuk batang, atau berbentuk spiral. Bakteri tersebut dapat tumbuh subur di tanah, air, mata air panas yang bersifat asam, limbah radioaktif, dan biosfer kerak bumi. Selain itu,

bakteri dapat hidup berdampingan secara parasit dan bersimbiosis dengan tumbuhan dan hewan. Hanya sekitar 27 persen spesies bakteri yang memiliki spesies yang dapat diproduksi di laboratorium, sedangkan sebagian besar bakteri belum dikarakterisasi.



Bakteri memiliki struktur sel yang sangat sederhana, tanpa nukleus, badan sel, atau organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Bakteri dapat ditemukan hampir di semua tempat, termasuk air, udara, tanah, serta berperan dalam simbiosis dengan organisme lain atau sebagai agen patogen dan parasit. Meskipun ukuran bakteri secara umum berkisar antara 0,5 hingga 5 μm , beberapa jenis tertentu, seperti *Thiomargarita*, dapat mencapai ukuran hingga 700 μm . Bakteri umumnya memiliki flagel yang memungkinkan mereka untuk bergerak atau bermotilitas (Effendi, 2020).

2. Ciri- Ciri Bakteri

- a. Uniseluler (bersel tunggal), prokariotik (tidak mempunyai membran inti)
- b. Ukurannya sangat kecil, lebar 0,5 – 1,0 milimikron, tetapi ada bakteri yang berukuran 100 mikron
- c. Hidupnya ada yang soliter (hidup secara sendiri-sendiri) dan ada juga bakteri yang hidup secara koloni (berkelompok) serta ada juga bakteri yang bersimbiosis, parasit, dan saprofit.
- d. Bakteri pada umumnya tidak mempunyai kloroplas, kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurin.
- e. Bakteri berkembang biak secara vegetatif dengan pembelahan biner dan generatif dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi.
- f. Bakteri memiliki distribusi geografis yang luas, yang berarti mereka dapat ditemukan di berbagai tempat. Namun, dalam kondisi ekstrem, bakteri memiliki kemampuan untuk membentuk endospora. Proses pembentukan endospora

dimulai ketika sel bakteri mulai mereplikasi DNA, dan salinan DNA yang dihasilkan dikelilingi oleh dinding sel yang tebal dan kuat. Meskipun dinding sel bagian luar rusak, endospora bakteri memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi, termasuk kekurangan makanan dan air, suhu ekstrem (panas atau dingin), serta paparan racun. Apabila lingkungan kembali normal, endospora dapat hidrasi dan kembali ke bentuk vegetatif, memungkinkan pertumbuhan dan pembentukan koloni baru (Susilowarno & Hartono, 2007).

3. Struktur Tubuh Bakteri



Gambar 2. Struktur Tubuh Bakteri (Fifendy M, 2017)

Setiap bagian tubuh pada bakteri memiliki fungsi masing-masing tiap bagian.

a. Flagela atau bulu cambuk

Flagela bakteri tersusun atas protein kontraktile sehingga dapat berkontraksi menyebabkan pergerakan ke kiri dan ke kanan sehingga bakteri dapat bergerak

dengan kecepatan sekitar 50 mm /detik atau sekitar seratus kali panjang tubuh perdetik. Flagella pada bakteri berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri.

b. Pilus atau fimbria

Bagian menonjol dari bakteri, yang muncul sebagai benang-benang kecil yang muncul dari dinding sel yang terbuat dari protein kontraktil, berfungsi sebagai mekanisme perlekatan pada bakteri lain dan juga pada organisme lain (sel inang).

c. Kapsula

Lapisan lendir yang mengelilingi sel dan merupakan kapsul, yang merupakan komponen dari bakteri, dibuat sebagai hasil dari sekresi metabolik. Bakteri ini memiliki kapsul yang berfungsi untuk terhubung ke substrat dan dapat memberikan perlindungan ekstra, termasuk meningkatkan ketahanan terhadap mekanisme pertahanan inang. Kapsul juga berfungsi sebagai pendiri koloni.

d. Dinding sel

Lapisan tubuh dinding sel terdiri dari peptidoglikan, juga dikenal sebagai murein, protein yang melekat pada rantai polimer polisakarida. Untuk bertindak sebagai bentuk sel pelindung, memberikan keamanan mekanis, dan mencegah sel pecah di lingkungan hipertonic yang lebih kental, dinding selnya tebal dan kaku.

e. Membran plasma

Molekul lipoprotein, yang terdiri dari molekul lipid (lemak) dan protein, membentuk membran plasma bakteri, yang merupakan membran tipis. Dinding sel bakteri mengandung membran plasma. Membran plasma mengontrol pertukaran zat antara sel dan lingkungannya dan berfungsi sebagai organ pelindung sel terhadap dunia luar.

f. Mesosom

Mesosom merupakan struktur seperti membran yang membentuk lipatan yang ada di sitoplasma. Mesosom berfungsi sebagai tempat segregasi (pemisahan)

DNA dan pembentukan dinding sel baru serta transpor intraseluler.

g. Sitoplasma

Cairan yang membentuk sel bakteri disebut sitoplasma. Komponen utama sel, sitoplasma, terdiri dari air dan zat organik dan anorganik. Pada bakteri, sitoplasma berfungsi baik sebagai lingkungan organel dan penghalang terhadap benturan.

h. Ribosom

Di dalam sitoplasma bakteri terdapat organel terapung yang disebut ribosom. Molekul protein dan RNA membentuk ribosom. Sintesis protein terjadi pada ribosom. Protein terstruktur, seperti membran sel, dan protein fungsional, seperti enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme, keduanya dapat diproduksi oleh ribosom.

i. Region nukleoid

Meskipun bakteri tidak memiliki nukleus sel asli, mereka memiliki area yang mirip (area nucleoid). Sitoplasma lebih padat berwarna daripada area nukleoid. Molekul DNA beruntai ganda dengan bentuk seperti cincin (melingkar) dapat ditemukan di daerah nukleoid. DNA sel prokariotik biasanya seperseribu ukuran bakteri. Struktur seperti kromosom dari DNA beruntai ganda ini terlihat pada sel eukariotik. Untuk mengontrol aktivitas seluler agar sel bakteri bereproduksi, DNA bakteri melakukan peran ini.

j. DNA sirkuler

Meskipun bakteri tidak memiliki inti sel, mereka mengandung komponen yang disebut nukleoid. Hanya ada satu molekul DNA sirkular di dalam nukleoid.

k. Lembar fotosintetik

Lembaran fotosintetik adalah lipatan membran yang terjadi pada bakteri fotosintetik yang menghadap sitoplasma. Lembar fotosintesis bertindak sebagai

katalis untuk fotosintesis.

1. Endospora


Beberapa bakteri ada yang mampu membentuk endospora. Pembentukan endospora adalah kemampuan beberapa bakteri. Bakteri dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dengan memproduksi endospora. Endospora tidak akan rusak oleh pemanasan karena tahan panas. Ketika suhu naik di atas 120°C, spora dapat mati. Namun, endospora dapat berkembang menjadi bakteri seperti sebelumnya jika keadaan atau habitat telah membaik (Susilowarno & Hartono, 2007).

D. Uraian Bakteri Uji

1. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Kelas	: Epsilonproteobacteria
Ordo	: Campylobacterales
Famili	: Helicobacteraceae
Genus	: <i>Helicobacter</i>
Spesies	: <i>Helicobacter pylori</i>

(Barry J dkk., 1985) (Goodwin dkk., 1989)



Gambar 3. *Helicobacter pylori*
(Pratama, 2016)

2. Defenisi

Helicobacter pylori adalah bakteri berbentuk spiral yang termasuk dalam kategori Gram negatif dan sering ditemukan di permukaan epitel lambung. Infeksi oleh *Helicobacter pylori* dianggap sebagai salah satu infeksi bakteri yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Dari segi klinis, individu yang terinfeksi oleh organisme ini mungkin mengalami gejala gastritis yang dapat berlangsung dalam jangka waktu bertahun-tahun dan dapat berkembang menjadi peradangan kronis. Infeksi *Helicobacter pylori* juga dikaitkan dengan risiko terjadinya gastritis kronis, penyakit ulkus peptikum (PUD) baik di lambung maupun duodenum, limfoma MALT (*mucosal-associated lymphoid tissue*) lambung, dan adenokarsinoma lambung (Olokoba dkk., 2013).

3. Faktor Resiko

Beberapa penelitian telah mengevaluasi faktor-faktor risiko terkait infeksi *Helicobacter pylori*. Faktor-faktor seperti jenis kelamin dan usia tampaknya tidak memiliki hubungan yang signifikan, karena beberapa penelitian tidak menemukan perbedaan tingkat infeksi *Helicobacter pylori* antara wanita dan pria, atau antara kelompok usia dewasa dan anak-anak. Faktor sosio ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan infeksi *Helicobacter pylori*, di mana individu dengan status sosioekonomi rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terinfeksi bakteri tersebut. Beberapa faktor terkait lingkungan juga telah diidentifikasi sebagai faktor risiko, seperti tinggal di daerah pedesaan, tingkat kepadatan hunian, dan konsumsi air minum yang terkontaminasi. Sementara itu, hubungan antara kebiasaan hidup, seperti merokok dan konsumsi alkohol, dengan risiko infeksi *Helicobacter pylori* masih menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya jelas (Eusebi dkk., 2014).

4. Diagnosis

Indikasi diagnosis *Helicobacter pylori*:

- a. Penyakit ulkus peptikum aktif (ulkus lambung atau duodenum)
- b. Riwayat konfirmasi adanya ulkus peptikum (sebelumnya belum pernah diterapi untuk *Helicobacter pylori*)
- c. Gastric MALT lymphoma
- d. Setelah reseksi endoskopi karena kanker lambung awal
- e. Dispepsia yang belum diketahui sebabnya (pada prevalensi *Helicobacter pylori* tinggi)
- f. Pasien pengguna NSAID (*nonsteroidal antiinflammatory drug*)
- g. Anemia defisiensi besi yang belum jelas
- h. Populasi risiko tinggi kanker lambung.

(Chey & Wong, 2007)

Berbagai metode digunakan untuk mendiagnosis infeksi *Helicobacter pylori*, dan pemilihan metode tersebut bergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup ketersediaan pemeriksaan diagnostik, kebutuhan untuk melakukan endoskopi, pertimbangan biaya, aksesibilitas, keuntungan, kelemahan masing-masing metode, dan juga karakteristik usia pasien (Garza-gonzález dkk., 2014). Diagnosis infeksi *Helicobacter pylori* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni metode yang melibatkan endoskopi dan metode yang tidak melibatkan endoskopi. Saat ini, belum ada metode diagnostik yang dianggap sebagai standar emas; pilihan pemeriksaan yang paling sesuai bervariasi tergantung pada kondisi klinis pasien (Chey & Wong, 2007).

Pada tingkat pelayanan primer, penyebab dispepsia seringkali tidak dapat diidentifikasi. Sebagian besar pedoman merekomendasikan pendekatan "*test-and-treat*" dalam pendekatan ini, pasien yang mengalami gejala dispepsia seharusnya

diuji untuk *Helicobacter pylori* menggunakan metode non-invasif jika mereka berusia di bawah 44-55 tahun dan tidak menunjukkan tanda bahaya atau "red flags" untuk penyakit ganas atau ulkus dengan komplikasi (seperti disfagia, cepat kenyang, muntah yang persisten, kehilangan berat badan lebih dari 10%, melena, perdarahan rektum, massa di perut, riwayat ulkus peptikum, kuning pada kulit atau mata, serta riwayat keluarga kanker lambung). Pendekatan "test-and-treat" ini lebih ekonomis, dan penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa hal ini dapat mengurangi jumlah endoskopi yang dilakukan pada pasien dengan dyspepsia (Ables dkk., 2007). Dalam pendekatan "test-and-treat," infeksi biasanya didiagnosis menggunakan tes napas urea (UBT) atau tes antigen tinja (SAT). Keberhasilan eradikasi sebaiknya selalu dikonfirmasi dengan UBT atau terapi yang berdasarkan endoskopi jika diindikasikan secara klinis. SAT merupakan alternatif untuk UBT (Olokoba dkk., 2013).

5. Terapi

A. Lini Pertama

Terapi lini pertama melibatkan penggunaan *triple therapy* yang mencakup penggunaan PPI atau ranitidine, bismuth citrate, dikombinasikan dengan clarithromycin dan amoxicillin. Jika ada alergi terhadap penicillin, alternatif antibiotik dapat menggunakan clarithromycin dan metronidazole. Pemberian PPI disesuaikan dengan jenis yang digunakan, dosis clarithromycin berkisar 250-500 mg, dan dosis amoxicillin adalah 1 g. Semua regimen tersebut diberikan dua kali sehari dan direkomendasikan untuk penggunaan selama 7-14 hari (Olokoba dkk., 2013).

Panduan internasional di Eropa dan Amerika Utara merekomendasikan triple therapy sebagai lini pertama dalam penanganan infeksi *Helicobacter pylori*. Dalam kasus resistensi terhadap clarithromycin, terapi alternatif dengan kombinasi

amoxicillin dan metronidazole dapat dipertimbangkan. Meskipun dosisnya relatif sama, durasi penggunaan *triple therapy* menurut panduan *American College of Gastroenterology* adalah 10-14 hari, sementara panduan *the Maastricht III Consensus Report* merekomendasikan durasi penggunaan selama 7 hari. (Wannmacher, 2011).

Sebagai opsi terapi alternatif, sequential regimen dapat digunakan, yang melibatkan penggunaan *proton pump inhibitor* (PPI) bersama amoxicillin 1 g dua kali sehari selama 5 hari, diikuti oleh penggunaan PPI bersama clarithromycin 500 mg dua kali sehari dan agen imidazole (seperti tinidazole 500 mg dua kali sehari) selama 5 hari berikutnya (hari ke-6 hingga ke-10). Meskipun *triple therapy* direkomendasikan, eradikasi *Helicobacter pylori* melaporkan kegagalan pada lebih dari 20% pasien (Wannmacher, 2011)

Menurut *The Asia-Pacific Consensus Conference* (2009), terapi lini pertama untuk eradikasi infeksi *Helicobacter pylori* adalah PPI, amoxicillin 1 g, dan clarithromycin 500 mg dua kali sehari. Pilihan lain adalah *bismuth-based quadruple therapy* sebagai lini pertama dengan komponen terapi PPI dua kali sehari, metronidazole 400 mg dua atau tiga kali sehari, tetracycline 500 mg empat kali sehari, dan bismuth 240 mg dua kali sehari. Meskipun regimen *bismuth-based quadruple therapy* tidak tersedia di beberapa negara seperti Jepang dan Australia, terapi tersebut direkomendasikan untuk digunakan selama 7 hari. Regimen lebih lama dianggap kurang bermanfaat, tidak efektif secara biaya, berpotensi menyebabkan efek samping, dan kurang mendukung kepatuhan pasien. Penggunaan sequential therapy selama 10 hari belum direkomendasikan sebagai lini pertama di Asia karena data yang tersedia dianggap masih kurang memadai (Fock & Ang, 2009).

B. Lini Kedua

Kegagalan terapi seringkali terkait dengan resistensi *Helicobacter pylori* terhadap clarithromycin atau metronidazole, atau keduanya. Rekomendasi untuk terapi lini kedua mencakup penggunaan *quadruple* regimen yang terdiri dari tetracycline 500 mg empat kali sehari, metronidazole 250 mg empat kali sehari, bismuth salt 120 mg empat kali sehari, dan *proton pump inhibitor* (PPI) dua kali sehari sesuai jenis yang digunakan. *Quadruple* regimen dianggap lebih efektif dibandingkan terapi lini pertama, dan dapat diaplikasikan pada pasien yang tidak merespons terhadap eradikasi menggunakan terapi lini pertama. Tantangan utama terkait dengan terapi ini termasuk keterbatasan ketersediaan bismuth salts di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Selain itu, tetracycline dan metronidazole memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menyebabkan efek samping dan interaksi dibandingkan dengan antibiotik lainnya. Jika terapi ini tidak berhasil, pasien perlu dievaluasi dengan pendekatan yang disesuaikan untuk setiap kasus (Olokoba dkk., 2013) (Wannmacher, 2011).

C. Lini Ketiga/*Rescue/Salvage Therapy*

Lini Ketiga/*Rescue/Salvage Therapy* Infeksi *Helicobacter pylori*, terapi infeksi *Helicobacter pylori* yang masih persisten setelah dua kali terapi dan tetap memerlukan upaya eradikasi, disarankan untuk mengarahkan pasien ke spesialis yang memiliki fasilitas kultur *Helicobacter pylori*. Selanjutnya, perlu dilakukan pemeriksaan sensitivitas terhadap terapi alternatif (Wannmacher, 2011).

pilihan alternatif untuk terapi lini ketiga mencakup *quinolone* (seperti levofloxacin, moxifloxacin), tetracycline, rifabutin, dan furazolidone. Penggunaan PPI dengan dosis tinggi bersamaan dengan amoxicillin dan levofloxacin atau rifabutin terkait dengan tingkat eradikasi yang signifikan. Seleksi terapi ini sebaiknya didasarkan pada hasil uji resistensi bakteri untuk memastikan keefektifan

pengobatan (Olokoba dkk., 2013) (Wannmacher, 2011).

Salvage therapy untuk eradikasi *Helicobacter pylori* termasuk:

1. *Triple therapy standar yang belum digunakan*
2. *Bismuth-based quadruple therapy*
3. *Levofloxacin-based triple therapy*
4. *Rifabutin-based triple therapy*

Karena kurangnya studi perbandingan antar terapi, belum cukup bukti untuk merekomendasikan pilihan *salvage treatment* (Fock & Ang, 2009).

Terapi eradikasi *Helicobacter pylori* yang sedang berkembang:

1. *Fluoroquinolone based therapy*

Levofloxacin-based triple therapy menjadi terapi lini kedua di beberapa negara Eropa. Dari studi perbandingan di Italia, levofloxacin based triple therapy memiliki angka eradikasi lebih tinggi dibandingkan terapi standar lini pertama. Regimen terapi dengan levofloxacin telah mulai digunakan pada terapi lini kedua dan lini ketiga untuk eradikasi *H. pylori*. (Olokoba dkk., 2013)

2. Rifabutin dan rifampicin-*based therapy*

Merupakan komponen anti-TBC, efektif dalam kombinasi dengan PPI dan amoxicillin. Namun, harus diperhatikan karena penggunaan rifabutin dapat berhubungan dengan resistensi *Mycobacteria* pada pasien terinfeksi *Mycobacteria* sebelumnya. Rifabutin juga berhubungan dengan efek samping, seperti myelotoxicity, leukopenia, dan trombositopenia (Olokoba dkk., 2013).

3. *Furazolidone-based therapy*

Furazolidone aktif terhadap bakteri gram negatif dan gram positif (termasuk *Helicobacter pylori*) dan protozoa dengan menghambat enzim bakteri. Terapi ini banyak digunakan pada populasi berpendapatan rendah. Strain resisten terhadap furazolidone jarang ditemukan (Olokoba dkk., 2013).

Quadruple regimen dengan lansoprazole, bismuth, tetracycline, dan furazolidone selama 1 minggu pada 10 pasien resisten metronidazole menunjukkan rerata eradikasi 90% sebagai terapi lini ketiga (Olokoba dkk., 2013).

4. Doxycycline-based therapy

Merupakan golongan antibiotik tetracycline yang digunakan hanya 2 kapsul sehari (100 mg dua kali sehari), sehingga kepatuhan pasien meningkat. Tidak terdapat resistensi *H. pylori* sekunder terhadap doxycycline pada pasien yang telah gagal menggunakan satu atau lebih terapi eradikasi. Pada kasus resistensi metronidazole, quadruple therapy selama 1 minggu menggunakan doxycycline, amoxicillin, omeprazole, dan bismuth salts. Terapi ini terbukti efektif sebagai terapi lini ketiga, menghasilkan rerata eradikasi 91% pada pasien yang resisten terhadap metronidazole dan clarithromycin. (Olokoba dkk., 2013)

5. Lactoferrin

Lactoferrin merupakan antibiotik pada susu sapi, memiliki efek bakteriostatik terhadap *H. pylori* secara *in vivo* dan *in vitro*. Protein susu ini mengikat besi. Efikasinya sebagai tambahan terhadap regimen terapi reguler untuk *Helicobacter pylori* dalam memperbaiki rerata eradikasi bervariasi. Modalitas terapi ini masih belum diterima secara umum. (Olokoba dkk., 2013)

6. Levofloxacin dan rifaximin-based quadruple therapy

Levofloxacin dan rifaximin-based quadruple regimen sebagai terapi lini pertama untuk terapi infeksi *Helicobacter pylori* telah diteliti oleh Choi, dkk., namun efikasinya terbatas; dibutuhkan studi dengan subjek lebih besar (Olokoba dkk., 2013).

E. Antibakteri

Kata "antibakteri" memiliki asal usul dari bahasa Yunani, dengan "Anti" yang berarti "melawan" dan "Bacteria" yang merujuk pada "tongkat." Hal ini terkait

dengan penemuan awal bakteri yang memiliki bentuk menyerupai batang (Aulia Deby Pelu, 2022). Senyawa antibakteri digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan merupakan hasil metabolit sekunder yang ditemukan pada organisme hidup. Zat antibakteri umumnya bekerja dengan cara mengganggu integritas dinding sel, mengubah permeabilitas membran, menghambat sintesis protein, dan memiliki potensi untuk menghambat aktivitas enzim. Alkaloid, flavonoid, dan fenol termasuk dalam kategori senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding sel bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri. Senyawa-senyawa ini bertindak sebagai agen antibakteri organik yang melawan mikroorganisme berbahaya seperti *Staphylococcus aureus* (Septiani, dkk, 2017).

1. Pembagian Antibakteri

Antimikroba dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatan kerja atau spektrumnya, dan dibedakan menjadi:

- a. Antimikroba spektrum sempit: Senyawa ini hanya mampu menghambat satu golongan bakteri, seperti hanya bakteri Gram negatif atau Gram positif.
- b. Antimikroba spektrum luas: Jenis ini memiliki kemampuan untuk menghambat atau membunuh bakteri dari kedua golongan, baik Gram negatif maupun Gram positif (Hafsan 2011).

2. Sifat Antibakteri

- a. Bakteriostatik: Adalah zat atau bahan yang mampu menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroba, khususnya bakteri. Dalam situasi ini, jumlah mikroorganisme mencapai fase stasioner, di mana mereka tidak dapat lagi berkembang biak atau melakukan perkembangbiakan.
- b. Bakteriosida: Adalah zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk membunuh mikroorganisme, terutama bakteri. Dalam konteks ini, jumlah mikroorganisme atau bakteri akan menurun atau bahkan habis, sehingga mereka

tidak dapat lagi melakukan pertumbuhan atau berkembang biak (Kar, 2008).

3. Prinsip Kerja Antibakteri

Antimikroba mempunyai mekanisme kerja utama ada lima cara antara lain sebagai berikut:

a. Mengganggu metabolisme sel mikroba

Secara umum, mikroba memerlukan asam folat yang disintesis dari asam amino para benzoat (PABA) untuk kelangsungan hidupnya. Antimikroba yang berperan sebagai antimetabolit bekerja dengan menghambat metabolit spesifik mikroba, seperti sulfonamida. Sulfonamida memiliki efek penghambatan terhadap pertumbuhan sel bakteri dengan menghalangi sintesis asam folat. Mekanisme kerjanya melibatkan kemiripan struktural dengan asam folat dan asam amino para benzoat (PABA), bersaing secara kompetitif dengan enzim-enzim yang memadukan PABA dan sebagian peptida menjadi asam dihidrofolat.

b. Penghambatan terhadap sintesis dinding sel

Dinding sel bakteri terdiri dari suatu kompleks polimer mukopeptida yang dikenal sebagai peptidoglikan. Beberapa antibiotik, seperti sikloserin, menghambat tahap awal dalam proses sintesis dinding sel. Reaksi berlanjut dengan penghambatan oleh basitrasin dan vankomisin, kemudian mencapai tahap akhirnya yang melibatkan antibiotik seperti penisilin dan sefalosporin, yang menghambat transpeptidasi.

c. Penghambatan terhadap fungsi membran sel

Antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel dengan mempengaruhi permeabilitasnya, yang mengakibatkan keluarnya senyawa intraseluler dari mikroorganisme. Membran sel, yang terletak di bawah dinding sel, memiliki sifat permeabilitas selektif dan bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas substansi masuk dan keluar sel, serta menjaga tekanan osmotik internal dan

proses ekskresi. Beberapa antibiotik berinteraksi dengan membran sebagai ionofor, yang berperan dalam memberikan jalur masuk bagi ion yang tidak normal. Proses ini dapat mengganggu aktivitas biokimia sel, contohnya gramicidin. Antibiotik polimiksin, khususnya aktif terhadap bakteri gram negatif, dapat merusak membran sel setelah berinteraksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel.

d. Penghambatan terhadap sintesis protein

Kelangsungan hidup suatu sel sangat bergantung pada kelestarian molekul-molekul dalam kondisi alamiahnya. Perubahan dalam kondisi ini dapat terjadi melalui proses denaturasi protein, yang menyebabkan kerusakan pada sel tanpa kemampuan untuk dipulihkan. Kondisi seperti suhu tinggi atau konsentrasi zat tertentu dapat menyebabkan koagulasi dan merusak secara total komponen seluler yang sangat penting.

e. Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat

Asam nukleat adalah elemen yang sangat penting dalam proses reproduksi sel. Pertumbuhan sebagian besar sel bergantung pada sintesis DNA, sementara RNA diperlukan untuk transkripsi dan menyimpan informasi yang terlibat dalam sintesis protein dan enzim. Kehadiran DNA dan RNA sangat vital untuk kelangsungan hidup sel, dan gangguan apa pun dalam pembentukan atau fungsi zat-zat ini dapat menyebabkan kerusakan total pada sel. Ketidaknormalan dalam metabolisme asam nukleat, seperti interaksi dengan enzim DNA-dependent RNA polymerase pada bakteri atau pemblokiran heliks DNA, dapat diinduksi oleh berbagai senyawa, termasuk antibiotik seperti kuinolon, pirimetamin, sulfonamida, trimetoprim, dan trimetrekstat. Selain itu, metronidazol juga dapat menghambat sintesis DNA (Hafsan, 2011).

F. Metode pengujian

Pada dasarnya banyak metode yang dapat digunakan untuk menganalisis

aktivitas antibakteri suatu senyawa obat.

1. Metode Difusi

Dalam metode ini, penilaian aktivitas zat antimikroba bergantung pada kemampuannya untuk difusi melalui lempeng agar yang sebelumnya telah diinokulasi dengan mikroorganisme uji. Observasi dilakukan terhadap pembentukan zona hambatan di sekitar zat antimikroba selama periode inkubasi. Metode ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan yang berbeda, yaitu:

a. Cara cakram (*Disc*)

Metode ini merupakan pendekatan yang paling umum digunakan untuk menilai sensitivitas mikroorganisme terhadap berbagai jenis obat. Dalam metode ini, digunakan sebuah cakram kertas saring sebagai wadah untuk zat antimikroba. Cakram tersebut ditempatkan di atas lempeng agar yang sebelumnya telah diinokulasi dengan mikroorganisme uji. Selanjutnya, lempeng diinkubasi pada suhu dan periode waktu tertentu, sesuai dengan kondisi optimal untuk mikroorganisme uji. Hasil observasi biasanya dapat diamati setelah inkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37°C. Evaluasi hasil dilakukan dengan melihat adanya zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram kertas, menunjukkan efek penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri. Metode cakram disk memiliki kelebihan karena mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus, dan relatif ekonomis. Namun, kekurangannya adalah bahwa ukuran zona hambat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi inkubasi, inokulum, difusi pra, dan pra-inkubasi serta ketebalan medium

b. Cara Parit (*Ditch-Plate Technique*)

Sebuah lempeng agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji dibuat dengan membentuk parit. Parit tersebut diisi dengan zat antimikroba, lalu

diinkubasi pada waktu dan suhu optimal sesuai dengan kondisi yang cocok untuk mikroba uji. Hasil observasi akan mencakup keberadaan atau ketiadaan zona hambat yang terbentuk di sekitar parit.

c. Cara Sumuran (*Cup-Plate Technique*)

Pada lempeng agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji, diciptakan lubang-lubang yang kemudian diisi dengan zat antimikroba uji. Masing-masing lubang tersebut diisi dengan zat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai dengan kondisi mikroba uji, dilakukan observasi untuk menentukan apakah zona hambatan terbentuk di sekitar lubang-lubang tersebut.

2. Metode Dilusi

Metode ini melibatkan pencampuran zat antimikroba dengan media agar, yang selanjutnya diinokulasikan dengan mikroba uji. Hasil observasi pada metode ini berkisar antara pertumbuhan atau ketiadaan pertumbuhan mikroba di dalam media. Untuk mengevaluasi aktivitas zat antimikroba, diperhatikan konsentrasi hambat minimum (KHM), yakni konsentrasi terendah dari zat antimikroba uji yang masih efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba uji.

Metode ini terdiri dari dua cara antara lain :

f. Pengenceran serial dalam tabung

Pengujian dilaksanakan melalui rangkaian tabung reaksi yang berisikan inokulum bakteri dan larutan antibakteri pada variasi konsentrasi. Zat yang akan diuji untuk aktivitas bakterinya diencerkan secara berurutan dalam media cair, lalu diinokulasikan dengan kuman dan dibiarkan menginkubasi pada waktu dan suhu yang sesuai dengan mikroba uji. Efektivitas zat diukur sebagai konsentrasi hambat minimal (KHM).

g. Penapisan lempeng agar

Zat antibakteri diencerkan dalam agar dan selanjutnya disebarkan ke dalam

cawan petri. Setelah agar membeku, dilakukan inokulasi bakteri dan proses inkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi paling rendah dari larutan zat antibakteri yang masih mampu menghambat pertumbuhan bakteri ditetapkan sebagai konsentrasi hambat minimal (KHM).


1. Metode Difusi-Dilusi

E-test, atau yang sering disebut sebagai epsilometer, adalah suatu metode pengujian antimikroba yang melibatkan simbol epsilon (ϵ). Metode ini merupakan pendekatan kuantitatif untuk menguji keefektifan suatu agen antimikroba. E-test menggabungkan karakteristik metode dilusi dan difusi antibakteri ke dalam media agar. Proses ini melibatkan penggunaan strip plastik yang telah mengandung agen antibakteri dalam konsentrasi bervariasi, mulai dari yang terendah hingga tertinggi, yang ditempatkan pada media agar yang sudah diinokulasi dengan mikroorganisme. Zona jernih yang muncul di sekitar strip tersebut dapat diamati sebagai indikator adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme. Metode E-test dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi hambat minimum (KHM) (Schwalbe dkk., 2007).

G. Perhitungan Zona Hambat

Zona hambat merujuk pada area jernih yang terlihat di sekitar perlakuan antibakteri. Ukuran zona hambat dari agen antibakteri diukur berdasarkan diameter, dan penghambatannya direpresentasikan sebagai area bebas mikroorganisme di sekitar daerah pengujian. Metode pengukuran dapat bervariasi, seperti menggunakan kertas cakram atau sumuran. Diameter diukur secara vertikal dan horizontal, termasuk juga diameter cakram uji, dan hasilnya diambil rata-rata untuk analisis lebih lanjut.

Perhitungan luas zona hambat sebagai berikut :



Gambar 4. Rumus Perhitungan Diameter Zona Hambat

(Harti, 2015)


Adapun kategori zona hambat dapat dilihat pada (Tabel 1.):

Tabel 1. Kategori Diameter Zona Hambat

Diameter	Kategori (Suriawiria, 2005)
< 5 mm	Lemah
5–10 mm	Sedang
10-19 mm	Kuat
≥ 20 mm	Sangat Kuat

H. Kontrol Pemanding

Antibiotik yang digunakan sebagai pemanding adalah kloramfenikol.



Gambar 5. Struktur Kimia Kloramfenikol

(Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Kloramfenikol mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 103,0% (Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Pemerian : Hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang; Putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan; Larutan praktis netral terhadap

lakmus P; stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam.

Kelarutan : Sukar larut dalam air; mudah larut dalam etanol, dalam propilen glikol, dalam aseton dan dalam etil asetat (Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Mekanisme aksi: Kloramfenikol adalah zat yang menghambat sintesis protein pada mikroorganisme dan memiliki sifat bakteriostatik terhadap sebagian besar organisme yang rentan. Zat ini berikatan secara reversibel dengan subunit 50S ribosom bakteri, menghambat proses pembentukan ikatan peptida. Kloramfenikol secara khusus berikatan dengan akseptor (tempat ikatan awal dari amino asil t-RNA) atau bagian peptidil, yang merupakan lokasi kritis untuk perpanjangan rantai peptide (Katzung, 2018).

Penggunaan klinik: Kloramfenikol digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh Salmonella, H. influenza, serta bakteri anaerob, termasuk infeksi yang diinduksi oleh B. fragilis. Selain itu, Kloramfenikol juga diterapkan ketika antibiotik lain tidak efektif untuk mengatasi infeksi seperti meningitis, rickettsia, dan infeksi gram negatif yang dipicu oleh bakteremia (virus yang memakan bakteri) (Kester, dkk. 2007).

I. Tinjauan Islam

Ajaran Islam diberikan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupan di dunia dan akhirat, menjalin hubungan yang terarah antara hamba dan penciptanya, yaitu Allah SWT, serta mengatur interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa Islam dianggap sebagai satu-satunya agama yang paling sempurna sariatnya.

Sebuah kelompok individu yang memiliki keahlian di bidang pengobatan telah ada sejak zaman kenabian, bahkan sebelumnya dan setelahnya. Salah satu cabang ilmu pengobatan yang sudah ada sejak waktu tersebut adalah pengetahuan

tentang obat alam, yang juga dikenal sebagai farmakognosi. Farmakognosi merupakan cabang ilmu farmasi yang fokus pada kajian tentang obat-obatan yang berasal dari alam atau tumbuhan (Sutiswa, 2023).

Banyaknya variasi tumbuhan telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber bahan pengobatan. Setiap ciptaan Allah SWT. memiliki fungsi tertentu, termasuk di antaranya adalah sebagai bahan pengobatan yang tersebar di bumi. Untuk memahami peran dari berbagai jenis tumbuhan yang telah diciptakan, diperlukan pengetahuan ilmiah untuk dapat mengambil manfaat yang tepat dari setiap tumbuhan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah swt. pada QS. As-syu'ara (26): 7 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧)

Terjemahnya:

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” (Kementerian Agama, 2019).

Pada ayat diatas, Allah Ta'ala mengingatkan- kan kebesaran kekuasaan-Nya dan keagungan kemampuan-Nya serta keadaan para pembangkang yang menyelisihi Rasul-Nya dan mendustakan Kitab-Nya. Dialah Yang Mahaperkasa, Mahaagung lagi Mahakuasa yang telah menciptakan bumi dan menumbuhkan di dalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanam-tanaman, buah-buahan dan hewan (Al-Syaikh, 2004).

Di sini keadaan mereka dipertanyakan, yakni adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran mereka padahal telah sekian banyak bukti dipaparkan dan terhampar? Apakah mereka enggan memperhatikan gugusan bintang-bintang di langit dan apakah mereka tidak melihat ke bumi yakni mengarahkan pandangan sepanjang, seluas dan seantero bumi berapa banyak Kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya

tumbuh subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya pada yang demikian itu hebatnya benar-benar terdapat suatu ayat yakni tanda yang membuktikan adanya Pencipta Yang Maha Esa, serta membuktikan pula kuasa-Nya menghidupkan dan membangkitkan siapa yang telah mati. Sayang, mereka enggan memperhatikan sehingga mereka tidak menemukan tanda itu dan tidaklah kebanyakan mereka akan termasuk orang-orang mukmin. Dan yakni padahal sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa Yang tidak terkalahkan kehendak-Nya bahkan dapat memaksakannya lagi Maha Penyayang sehingga menghidangkan bukti itu dan melimpahkan aneka rahmat-Nya (Shihab 2002).

Kata (إِلَى) *ila/* ke pada firman-Nya di awal ayat ini: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى) Apakah mereka tidak memandang ke bumi? Pertanyaan ini menyiratkan makna tentang melampaui batas akhir. Pertanyaan tersebut mengajak manusia untuk meluaskan pandangannya hingga ke batas kemampuannya, mencakup seluruh bumi dengan keberagaman tanah, tumbuhan, dan berbagai keajaiban yang terungkap di dalamnya (Shihab, 2002).

Kata (زَوْجٍ) *Zauj* artinya “pasangan.” Pasangan yang disebutkan dalam ayat ini merujuk pada pasangan-pasangan tumbuhan. Sebab, tumbuhan tumbuh di berbagai celah tanah yang terhampar di bumi. Oleh karena itu, ayat ini menyinggung fakta bahwa tumbuhan memiliki pasangan-pasangan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa tumbuhan memiliki benang sari dan putik yang menyatu dalam satu bunga, sehingga tidak memerlukan bantuan pejantan dari bunga lain dalam proses penyerbukannya. Sebaliknya, ada tumbuhan yang hanya memiliki satu di antara benang sari atau putik, sehingga membutuhkan pasangannya untuk melengkapi proses tersebut. Kesimpulannya, setiap tumbuhan memiliki pasangannya, dan fenomena ini dapat dengan mudah diamati oleh siapa pun yang menggunakan matanya. Oleh karena itu, ayat dimulai dengan pertanyaan

apakah mereka tidak melihat, menciptakan keheranan terhadap mereka yang tidak memanfaatkan kemampuan penglihatannya untuk mengamati bukti yang sangat jelas tersebut (Shihab, 2002).

Kata (كَرِيم) *karim* antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002).

Dari ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. selalu memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memperluas pengetahuan mereka, terutama dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan obat-obatan alami, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun mineral. Semua ketiganya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai mengandung zat penyembuh yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit manusia. Walaupun tidak semua tumbuhan yang Allah ciptakan di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu, namun salah satu tumbuhan yang telah banyak diyakini dapat sebagai pengobatan yaitu tumbuhan awar-awar. Kemudian dalam firman Allah swt. dalam QS. Al – Thaaha (20): 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (٥٣)

Terjemahnya:

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan.” (Kementerian Agama, 2019).

Maknanya adalah, Allah menurunkan hujan dari langit ini merupakan pemberitahuan dari Allah atas nikmat-Nya kepada para makhluk-Nya, yaitu menurunkan hujan dari langit ke bumi. Allah berfirman, “Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, yaitu berlainan warna, rupa, dan rasa.” (Ath-Thabari, 2007).

Ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah telah menciptakan sebagian besar permukaan bumi sebagai dataran yang luas untuk seluruh umat manusia. Sebagian kecil lainnya diwujudkan dalam bentuk gunung-gunung yang berperan menjaga kestabilan bumi. Allah juga memberikan kemudahan bagi manusia dengan memberikan jalanan yang mudah dilalui di atas bumi. Selain itu, Dia menurunkan air dari langit, yaitu hujan, yang menciptakan sungai-sungai dan danau. Melalui proses ini, berbagai jenis tumbuhan dengan ragam bentuk, rasa, warna, dan manfaat tumbuh dan berkembang di bumi (Shihab, 2002).

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah menurunkan beragam jenis tumbuhan ini untuk dimanfaatkan oleh manusia, baik sebagai obat tradisional maupun untuk tujuan lainnya. Penggunaan tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah menjadi umum untuk pemeliharaan pengobatan maupun kecantikan. Bidang kedokteran juga aktif mempelajari obat tradisional, dan hasilnya mendukung pandangan bahwa tumbuhan obat mengandung zat-zat yang memiliki manfaat klinis bagi kesehatan. Salah satu contohnya adalah tumbuhan awar-awar, yang telah terbukti dan diyakini oleh masyarakat memiliki khasiat sebagai antibakteri dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

Dalam ilmu pengetahuan modern disebutkan juga bahwa Al-Qur'an memiliki beberapa tumbuhan yang dapat mencegah sampai menyembuhkan penyakit. Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan keragaman dan keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaan-Nya yang menakjubkan. Rasulullah saw. bersabda, dalam hadits Abu Hurairah RA:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً" (رواي انبخاري)

Artinya :

Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad al-Zubairiy menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id bin Abi Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha' bin Abi Rabah menceritakan kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. dia bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula (H.R. Al-Bukhari: 5678).

Pernyataan "setiap penyakit pasti ada obatnya" mencerminkan konsep umum bahwa segala jenis penyakit, termasuk yang bersifat fatal dan yang sulit disembuhkan oleh tenaga medis, memiliki obat yang diciptakan oleh Allah untuk menyembuhkannya. Meskipun obat-obatan tersebut tersedia, pengetahuan manusia tentangnya terbatas pada apa yang Allah pilih untuk diajarkan. Oleh karena itu, Rasulullah menghubungkan kesembuhan dari penyakit dengan kesesuaian obat yang digunakan dengan jenis penyakit yang diobati. Konsep ini menegaskan bahwa setiap ciptaan Allah pasti memiliki penawarnya (Ar Rumaikhon, 2008).

Hadits diatas secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa semua penyakit ada obatnya. Obat itu dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan ataupun meringankan penyakit tersebut. Hadits ini juga mengandung dorongan untuk kita agar mempelajari tata cara pengobatan aneka penyakit dan mempraktikkannya (Akbar, 2023).

Sebagai manusia, sepatutnya kita berusaha seoptimal mungkin untuk menjalani pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. ketika menghadapi penyakit, baik itu melalui tindakan medis maupun non-medis seperti bekam, penggunaan herbal, ruqyah, fasdhu, madu, dan sebagainya. Tumbuhan daun awar-awar adalah salah satu ciptaan herbal Allah yang memiliki potensi memberikan manfaat bagi umat manusia. Namun, untuk memahami atau membuktikan manfaat dari daun awar-awar, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk melengkapi data ilmiah tentang tumbuhan tersebut, meskipun telah ada berbagai penelitian yang menunjukkan manfaatnya sebagai agen antibakteri.

Jadi, setiap penyakit yang Allah turunkan memiliki obatnya, dan metode pengobatan harus disesuaikan dengan jenis penyakitnya. Meskipun kesembuhan seseorang dari penyakit berasal dari Allah yang menyembuhkannya, namun Allah menghendaki agar ahli pengobatan mempelajarinya agar sesuai dengan penyakit yang hendak diobati, sehingga proses penyembuhan dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya bukti-bukti atas kekuasaan Allah dalam menyembuhkan penyakit, diharapkan dapat memperkuat iman kita kepada-Nya. Allah tidak akan menurunkan penyakit tanpa menurunkan obatnya sebagai tanda kebijaksanaan-Nya..

Berdasarkan ayat dan hadis yang disebutkan, kita dapat mengetahui bahwa Allah swt. menciptakan berbagai jenis tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia, termasuk diantaranya adalah tumbuhan Awar-awar (*Ficus septica* Burm.F). Allah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta alam dan seluruh isinya, sehingga sejauh apapun upaya manusia dalam pengobatan, tetap terdapat batasan-batasan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Allah swt. mengetahui segala hal mengenai manusia dan seluruh isi langit dan bumi. Oleh karena itu, dengan ayat dan hadis tersebut, seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan diharapkan selalu bersyukur atas nikmat-Nya, dan berharap atas ridho-Nya.

Semoga hasil usaha manusia dalam penelitian ini dapat menjadi obat yang mampu menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta, karena pada akhirnya, segala sesuatu akan kembali kepada-Nya. Seiring dengan penelitian ini, diharapkan bahwa tumbuhan Awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) dapat menjadi media pengobatan yang bermanfaat dan menjadi perantara kesembuhan, atas izin Allah swt.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan eksperimen di laboratorium. Penelitian eksperimen bertujuan untuk memahami dampak pemberian suatu perlakuan terhadap objek penelitian. Eksperimen ini dilakukan untuk menguji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun awar-awar (*Ficus septica* Burm F.) terhadap bakteri *Helicobacter pylori* secara *in-vitro*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Oktober 2023

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan desain penelitian eksperimental dengan pendekatan *posttest-only kontrol grup design*. Uji aktivitas antibakteri dari ekstrak daun awar-awar dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan kertas cakram.

B. Sampel penelitian

Sampel pada penelitian ini yaitu daun awar-awar yang diambil dari Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

C. Instrumen Penelitian

1. Alat

Gelas kimia (*pyrex*[®]), Erlenmeyer (*pyrex*[®]), batang pengaduk, tabung reaksi (*pyrex*[®]), jarum ose, spatula, mikropipet (*memmert*[®]), bunsen, timbangan analitik (*kern*[®]), autoklaf (*hirayama*[®]), oven (*memmert*[®]), inkubator (*memmert*[®]), microwave, Laminar Air flow (LAF) (*esco*[®]), lemari pendingin, vial, dan *vortex*, spuit 20 cc (*onemed*[®]), jangka sorong (*kenmaster*[®]), bunsen, cawan petri, dan *rotary evaporator*.

2. Bahan

Akuades steril, daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F), etil asetat, NaCl 0,9 %, BaCl₂ 1 %, asam sulfat (H₂SO₄), *paper disc blank*, cakram kloramfenikol 30µg (*oxoid*[®]), bakteri *Helicobacter pylori*, medium nutrisi agar, kapas, kertas saring, aluminium foil, dan plastik wrap.

D. Teknik Pengolahan

1. Pengambilan Sampel

Sampel penelitian yang digunakan adalah daun awar-awar (*Ficus septica* Burm. F), daun yang digunakan adalah daun yang tidak rusak, tidak berjamur, dan tidak berwarna kuning atau terlalu tua.

2. Pengolahan Sampel

Ditimbang sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci dengan air bersih mengalir. Sampel dikeringkan pada lemari pengering kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering hingga menjadi simplisia yang siap digunakan (Tawi dkk., 2019).

3. Ekstraksi Sampel

Simplisia daun awar-awar sebanyak 250 g diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etil asetat selama 3×24 jam kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan kemudian diuapkan dengan *rotary evaporator* sehingga menghasilkan ekstrak kental etil asetat (Bawondes dkk., 2021).

4. Pembuatan Variasi Konsentrasi

Cara pembuatan variasi konsentrasi ekstrak daun awar-awar adalah dengan mencampurkan ekstrak kering hasil maserasi dan pelarut etil asetat. Perbandingan volume ekstrak dan volume etil asetat dapat dilihat pada (Tabel 2).

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Ekstrak Dan Volume Etil Asetat

Konsentrasi (%)	Jumlah ekstrak (g)	Volume etil asetat (ml)
60 %	1,2 g	2 ml
75 %	1,5 g	2 ml
90 %	1,8 g	2 ml

5. Sterilisasi Alat dan Bahan

Alat-alat yang akan digunakan seperti cawan petri, tabung reaksi dan sebagainya disterilkan menggunakan oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat yang terbuat dari karet, plastik dan medium yang sudah dibuat di sterilisasi pakai alat Autoklaf pada suhu 121°C tekanan 15 lbs selama 15 menit (Rosmania & Yanti, 2020).

6. Pembuatan Media Nutrient Agar

Sebanyak 5 gram nutrient agar dilarutkan dengan 250 mL akuades dalam erlemeyer dan dipanaskan diatas hot plate menggunakan batang pengaduk sampai terbentuk larutan jernih. Kemudian disterilkan didalam autoklaf pada suhu 121°C tekanan 2 atm selama 15 menit. Nutrient agar kemudian dimasukkan ke dalam

beberapa tabung cawan petri. Dibiarkan agar menjadi dingin dan keras (Fajrina dkk., 2018).

7. Pembuatan Larutan Mcfarland

Pembuatan larutan BaCl_2 1 %. Ditimbang dengan teliti BaCl_2 sebanyak 1 gram. Dilarutkan kedalam labu ukur 100 ml dengan akuades sampai tanda batas lalu homogenkan. Pindahkan larutan ke dalam botol reagent yang bertutup rapat dan gelap.

Pembuatan larutan asam sulfat (H_2SO_4) 1 %. Disiapkan labu ukur 100 ml yang sudah diisi akuades sebanyak ± 50 ml. Dipipet dengan hati-hati asam sulfat pekat sebanyak 1,02 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml melalui dinding secara mengalir. Keluarkan cairan sampai habis. Paskan larutan dengan akuades sampai tanda batas. Pindahkan larutan ke dalam botol reagent yang bertutup rapat.

Pembuatan Larutan McFarland 0,5. Dipipet larutan BaCl_2 1 % sebanyak 0,05 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir. Kemudian dipipet juga larutan H_2SO_4 1 % sebanyak 9,95 ml. Dicampurkan kedalam tabung reaksi tutup ulir yang sudah berisi larutan BaCl_2 1 %. larutan ini di *vortex* sampai tercampur sempurna (Rosmania & Yanti, 2020).

8. Inokulasi bakteri

Bakteri *Helicobacter pylori* diinokulasi dengan menggunakan media *Nutrient Agar* dengan cara medium dituang kedalam cawan petri. Setelah medium memadat, diambil 1 ose isolat bakteri kemudian dilakukan teknik penggoresan (*streak plate*) lalu inkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam (Fajrina dkk., 2018).

9. Pembuatan Suspensi Bakteri

Bakteri *Helicobacter pylori* yang telah diinokulasi kemudain di inkubasi selama 24 jam diambil dengan kawat ose steril lalu disuspensikan kedalam tabung

reaksi yang berisi NaCl 0,9% kemudian di *vortex* dan disetarakan dengan standar kekeruhan larutan *Mc. Farland* 0,5 (Fajrina dkk., 2018).

10. Pengujian Antibakteri

Sebanyak 15 mL nutrien agar (NA) dimasukkan kedalam cawan petri steril, kemudian ditambahkan suspensi bakteri 100 μ L. Kemudian dihomogenkan dengan cara mengoyang-goyangkan cawan petri yang berisi media tersebut. Media kemudian dibiarkan memadat. Kertas cakram steril direndam pada larutan uji ekstrak daun awar-awar dengan konsentrasi 60%, 75%, 90%, kemudian ditempelkan ke permukaan agar. Sebagai kontrol negatif digunakan etil asetat dan kontrol positif digunakan cakram kloramfenikol 30 mcg. Perlakuan ini dibuat sebanyak 3 replikasi. Kemudian cawan petri diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam pada suhu 37°C. Aktivitas antibakteri ditetapkan dengan mengukur diameter daerah hambat yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong (Fajrina dkk., 2018). Kriteria zona hambat yang digunakan berdasarkan klasifikasi respon hambat pertumbuhan bakteri menurut Suriawiria (2005) dalam (Sriwinahyu, Sedijani, dan Zulkifli 2020) yang dikelompokkan kedalam 4 kategori yaitu sangat kuat diameter hambat ≥ 20 mm, kuat 10-20 mm, sedang 5-10 mm, dan lemah < 5 mm (Suriawiria, 2005).

11. Analisis Data

Data hasil pengujian aktivitas ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri *Helicobacter pylori*, dianalisa secara statistik menggunakan metode *One way anova* (analisa varians satu arah) dengan program *Statistical Product Services Solution* dengan taraf kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$ dilanjutkan dengan uji *Games-Howell*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

E. Hasil Penelitian

1. Pengolahan sampel

Daun awar-awar yang telah disiapkan kemudian diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etil asetat selama 3 kali 24 jam. Setelah itu, dilakukan evaporasi untuk menghilangkan pelarut yang terkandung dalam filtrat. Ekstrak kental yang dihasilkan dapat diamati pada (Tabel 3.) :

Tabel 3. Hasil Ekstraksi Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm.F)

Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen (%)	Warna
250 g	6,12 g	2,44 %	Hijau pekat

2. Uji aktivitas antibakteri

Pengujian aktivitas antibakteri dari daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) dilakukan dengan metode difusi kertas cakram secara triplo, yang menunjukkan adanya zona hambatan pada pertumbuhan bakteri *Helicobacter pylori*.

Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada (Tabel 4.):

Tabel 4. Hasil Uji Aktvitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm.F) Terhadap Bakteri *Helicobacter pylori*


Kelompok	Rata-Rata Diameter Zona Hambat \pm SD (mm)	Kategori (Suriawiria, 2005)
EDAA 60%	11,5 \pm 0,5	Kuat
EDAA 75%	13,8 \pm 0,7	Kuat
EDAA 90%	16,1 \pm 1,8	Kuat
Kontrol (+)	25 \pm 0	Sangat Kuat
Kontrol (-)	0	Tidak Menghambat

Keterangan :

- EDAA 60 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 60%
- EDAA 75 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 75%
- EDAA 90 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 90%
- K (+) = Kontrol positif cakram kloramfenikol
- K (-) = Kontrol negatif pelarut etil asetat

3. Diagram aktivitas antibakteri

Berdasarkan data aktivitas antibakteri, terdapat diagram data aktivitas antibakteri untuk mengetahui pembacaan data berdasarkan besarnya konsentrasi. Diagram dapat dilihat pada (Gambar 6.) :



Gambar 6. Diagram Hasil Uji Aktivitas Antibakteri

Keterangan :

- EDAA 60 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 60%
- EDAA 75 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 75%
- EDAA 90 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 90%
- K (+) = Kontrol positif cakram kloramfenikol
- K (-) = Kontrol negatif pelarut etil asetat

4. Uji analisis statistik

Uji analisis statistik uji *One Way Anova* digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai signifikansi sampel dalam memberikan zona hambat dan uji lanjutan dengan uji *Post Hoc Games-Howell* untuk mengetahui perbedaan zona hambat antar kelompok yang mempunyai memiliki perbedaan signifikan. Hasil analisis statistik dapat dilihat pada (Tabel 5. dan Tabel 6.)

Tabel 5. Uji *One Way Anova*

ANOVA					
DiameterZonaHambat					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	976,567	4	244,142	276,387	,000

Tabel 6. Uji *Post Hoc Games-Howell*

Dependent Variable: DiameterZonaHambat

Variabel	EDAA 75%	EDAA 90%	K.(+)	K. (-)
EDAA 60%	,065	,136	,001*	,002*
EDAA 75%		,450	,005*	,003*
EDAA 90%			,045*	,014*
K.(+)				.
K.(-)				

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

F. Pembahasan

Tumbuhan awar-awar dikenal dari suku Moraceae. Selama berabad-abad, daunnya telah digunakan oleh masyarakat sebagai media pengobatan. Daun dipilih karena kelimpahannya, waktu panen yang cepat, dan kandungan senyawa potensial yang tinggi. Daun awar-awar memiliki kemampuan untuk mengobati bisul, luka, infeksi kulit, dan gigitan hewan berbisa. Selain itu, dapat digunakan untuk mengobati radang usus buntu, dan asma. Daun awar-awar memiliki kandungan senyawa seperti flavonoid, senyawa fenolik, triterpenoid, steroid, kumarin, saponin, dan alkaloid (Salsabila dkk., 2021).

Senyawa tersebut dapat ditarik dengan melakukan penyarian menggunakan berbagai jenis pelarut, baik yang bersifat polar maupun non polar. Pemilihan metode ekstraksi juga memengaruhi jumlah metabolit yang dihasilkan. Pemilihan metode maserasi dipilih karena merupakan pendekatan yang paling sederhana dan lebih mudah dilaksanakan dengan peralatan yang mudah diakses. Metode ini juga dilakukan tanpa pemanasan, sehingga dapat menghindari kerusakan pada komponen senyawa dalam tumbuhan yang tidak tahan panas (Chairunnisa dkk.,

2019). Seperti senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tannin (Kumalasari dkk., 2020).

Perendaman sampel sebanyak 250 gram pada 4,5 liter pelarut etil asetat dilakukan dalam waktu 3 hari. Pelarut etil asetat dipilih dalam proses maserasi dan variasi konsentrasi ekstrak karena memiliki sifat yang mudah menguap, tidak menyerap air (higroskopis), dan memiliki tingkat toksisitas yang rendah. Etil asetat memiliki sifat semipolar yang diperkirakan dapat melarutkan senyawa dengan rentang polaritas dari polar hingga nonpolar seperti halnya saponin, triterpenoid memiliki bagian nonpolar dan polar (W. S. Putri dkk., 2013) dan senyawa volatil pada dinding sel seperti aglikon flavonoid (Wardhani & Sulistyani, 2012). Di samping itu, menurut Wardhani (2012). Etil asetat mampu mengekstraksi senyawa-senyawa yang memberikan aktivitas antibakteri, seperti flavonoid polihidroksi dan fenol lainnya (Wardhani & Sulistyani, 2012).

Selama proses maserasi dibantu dengan pengadukan untuk mempercepat proses ekstraksinya. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung senyawa aktif (Asworo & Widwiasuti, 2023). Pengadukan dengan menggunakan batang pengaduk selama 30 detik setiap hari pada proses maserasi agar pelarut yang ditarik lebih banyak atau untuk mempercepat kelarutan senyawa ke dalam pelarutnya (Handoyo, 2020).

Hasil dari maserasi menggunakan pelarut etil asetat yang diperoleh selanjutnya diuapkan pelarut dengan alat *rotary evaporator vaccum* pada suhu 50°C untuk mendapatkan ekstrak pekat yang akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Penguapan pelarut dilakukan pada suhu tertentu untuk menghindari kemungkinan terjadinya dekomposisi pada komponen kimianya. (Saputra dkk., 2018). Hasil rendemen yang didapatkan dari ekstraksi daun awar-awar (*Ficus*

septica Burm. F) menggunakan pelarut etil asetat sebesar 2,44% dengan karakteristik berwarna hijau kehitaman, dan pekat.

Ekstrak yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Helicobacter pylori* dengan menggunakan metode difusi kertas cakram secara triplo. Tahapan yang dilakukan terdiri dari pembuatan media nutrient agar (NA), pembuatan *McFarland* kultur bakteri, pembuatan suspensi bakteri, pembuatan seri konsentrasi ekstrak, dan pengujian antibakteri.

Media pertumbuhan bakteri menggunakan media nutrient agar (NA) karena merupakan media umum untuk menumbuhkan bakteri dan mengembangbiakkan bakteri (Kumalasari dkk., 2020). Nutrient Agar (NA) adalah suatu medium yang tidak memiliki selektivitas, sehingga memungkinkan pertumbuhan semua jenis bakteri. Hal ini konsisten dengan pandangan Pelczar dan Chan (2008) yang menyatakan bahwa Nutrient Agar mengandung nutrisi yang mendukung pertumbuhan bakteri. Nutrient Agar kaya akan sumber nitrogen, sehingga sering digunakan dalam prosedur bakteriologi untuk mengkultur sampel pada uji bakteri dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni (A. L. Putri & Kusdiyantini, 2018). Media NA dibuat dengan cara ditimbang serbuk NA sebanyak 5 g kemudian dilarutkan dengan aquades 250 mL dan sterilisasi pada autoklaf suhu 121°C selama 15 menit (Fajrina dkk., 2018). Kemudian dilakukan inokulasi bakteri *Helicobacter pylori* pada media NA. Bakteri *Helicobacter pylori* yang tumbuh pada media NA setelah inkubasi 24 jam pada suhu 37°C ditandai dengan bentuk sedang, bulat, halus dan akan tampak berwarna putih.

Tahapan berikutnya adalah pembuatan suspensi bakteri. Bakteri yang telah diinokulasi sebelumnya kemudian di suspensikan ke dalam cairan NaCl 0,9% dan di *vortex*. Larutan garam fisiologis yang terdiri dari natrium klorida (NaCl) dengan konsentrasi 0,9% memiliki peran dalam memelihara keseimbangan ion pada sel

mikroba, sehingga bermanfaat untuk memelihara keberlangsungan hidup bakteri. Selanjutnya, tingkat kekeruhan suspensi bakteri dibandingkan secara visual dengan menggunakan standar kekeruhan *McFarland* 0,5 (Kumalasari dkk., 2020). Standar *McFarland* digunakan untuk mengukur dan mengestimasi jumlah bakteri dalam suspensi cair dengan membandingkan tingkat kekeruhan suspensi uji. Dalam penelitian ini, standar *McFarland* 0,5 % digunakan, yang merupakan standar umum yang banyak diterapkan dalam skala laboratorium (Aviany & Pujiyanto, 2020).

Berdasarkan uji pendahuluan, dipilih variasi konsentrasi larutan uji ekstrak daun awar-awar dalam tiga konsentrasi yaitu 60%, 75%, dan 90% dengan menggunakan pelarut etil asetat. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang melakukan pengenceran dengan pelarut etil asetat dengan berbagai konsentrasi (Atmaja & Hendrayana, 2019).

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi kertas cakram. Pemilihan metode difusi dipilih karena melalui metode ini, bakteri dapat diamati dengan lebih jelas, mempermudah pengamatan bakteri uji. Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri ditandai oleh adanya area yang jernih di sekitar cakram, sedangkan warna keruh pada media menandakan adanya pertumbuhan bakteri (Mardiana & Handayani, 2017). Proses pengujian dimulai dengan menuangkan 15 mL nutrient agar (NA) ke dalam cawan petri steril, lalu menambahkan 100 μ L suspensi bakteri. Cawan petri tersebut kemudian dihomogenkan dengan menggoyangkan perlahan. Media dibiarkan untuk mengeras. Kertas cakram steril direndam dalam larutan uji ekstrak etil asetat dengan konsentrasi 60%, 75%, dan 90%, lalu ditempelkan ke permukaan agar. Sebagai kontrol negatif, digunakan etil asetat, dan sebagai kontrol positif, digunakan cakram kloramfenikol (30 μ g/mL). Seluruh perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Cawan petri selanjutnya diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam pada

suhu 24-27°C. Aktivitas antibakteri dinilai dengan mengukur diameter zona hambat yang terbentuk menggunakan jangka sorong (Fakhri dkk., 2013).

Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri ditunjukkan oleh adanya area yang jernih di sekitar cakram. Terbentuknya zona tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pertumbuhan bakteri pada area tersebut terhambat oleh sampel uji (Perilla, 2003). Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun awar-awar terhadap bakteri *Helicobacter pylori* secara triplo pada konsentrasi 60% menghasilkan zona hambat berturut-turut 11,5 mm, 11 mm dan 12 mm. Pada konsentrasi 75% menghasilkan zona hambat berturut-turut 13 mm, 14 mm dan 14,5 mm. Pada konsentrasi 90% menghasilkan zona hambat berturut-turut 14 mm, 17 mm dan 17,5 mm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil zona hambat masing-masing konsentrasi ekstrak daun awar-awar termasuk dalam kategori kuat. Dan konsentrasi 90% adalah konsentrasi optimal dalam menghasilkan zona hambat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak daun awar-awar, maka semakin besar pula diameter zona hambat yang dihasilkan terhadap pertumbuhan bakteri *Helicobacter pylori*. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hasil pengamatan pada kelompok perlakuan, terjadi peningkatan rata-rata diameter zona hambat seiring dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak daun awar-awar (Tuna & Wowor, 2016). Menurut Davis & Stout (1971), konsentrasi yang digunakan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi ukuran zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram. Semakin besar diameter zona jernih yang terbentuk menunjukkan tingginya potensi senyawa bioaktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Ini berarti bahwa peningkatan konsentrasi zat menyebabkan peningkatan kandungan senyawa aktif yang berperan sebagai agen antibakteri, sehingga kemampuannya dalam membunuh bakteri juga meningkat (Nita dkk., 2018).

Daun awar awar diyakini memiliki senyawa aktif yang berfungsi sebagai antibakteri. Hasil uji fitokimia ekstrak etil asetat yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa ekstrak etil asetat daun awar-awar mengandung senyawa flavonoid, tanin, steroid dan triterpenoid (Ridwan, 2023). Senyawa-senyawa tersebut memiliki mekanisme antibakteri yang beragam. Suatu senyawa yang memiliki tingkat polaritas optimal akan menunjukkan aktivitas antibakteri puncak, karena untuk berinteraksi dengan bakteri, senyawa antibakteri perlu mencapai keseimbangan antara sifat hidrofilik dan lipofilik. Sifat hidrofilik diperlukan untuk memastikan bahwa senyawa tersebut larut dalam fase air, lingkungan tempat bakteri hidup. Namun, senyawa yang berpengaruh pada membran sel yang bersifat hidrofobik juga memerlukan sifat lipofilik agar senyawa antibakteri tersebut mencapai keseimbangan optimal antara hidrofilik dan lipofilik untuk mencapai aktivitas yang optimal (Pratiwi, 2008).

Flavonoid berfungsi sebagai agen antibakteri karena kemampuannya membentuk kompleks senyawa dengan protein ekstraseluler yang larut, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada membran sel bakteri, diikuti dengan pelepasan senyawa intraseluler (Ngajow dkk., 2013). Disamping itu, flavonoid memiliki mekanisme dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah melalui penghambatan pembentukan lapisan biofilm pada bakteri (Rizky & Sogandi, 2018).

Senyawa yang memiliki peran dalam menyebabkan lisis sel bakteri adalah tannin. Tannin dapat menyebabkan kematian sel bakteri karena pembentukan dinding sel bakteri yang tidak sempurna, karena tannin mempengaruhi polipeptida pada dinding sel bakteri. Kemampuan tannin dalam menghambat *enzim reverse transcriptase* dan DNA *topoisomerase* juga berkontribusi pada efek antibakterinya, yang mengakibatkan gangguan pada pembentukan sel bakteri. Tannin juga dapat

menonaktifkan adhesin pada dinding sel bakteri dan mengganggu transportasi protein pada lapisan dalam sel bakteri (Wijaya dkk., 2022).

Mekanisme antibakteri dari steroid berkaitan dengan membran lipid dan respons terhadap komponen steroid, yang mengakibatkan kebocoran pada liposom. Steroid dapat berinteraksi dengan membran sel yang mengandung fosfolipid dan bersifat permeabel terhadap senyawa lipofilik. Hal ini menyebabkan penurunan integritas membran dan perubahan morfologi membran sel, yang pada akhirnya membuat sel menjadi rapuh dan mengalami lisis (Madduluri dkk., 2013).

Cara kerja triterpenoid sebagai antibakteri melibatkan pemecahan membran oleh komponen-komponen lipofilik, karena sifat alaminya yang bersifat hidrofobik (Wijaya dkk., 2022). Triterpenoid sebagai agen antibakteri berinteraksi dengan porin, yaitu protein transmembran pada membran luar dinding sel bakteri. Interaksi ini membentuk ikatan polimer yang kuat, menyebabkan kerusakan pada porin. Kerusakan pada porin, yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar senyawa, akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri. Hal ini mengakibatkan bakteri kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan mereka terhambat atau bahkan mati. Menurut Park (2017), mekanisme aksi triterpenoid juga melibatkan penghambatan glycolisis, sintesis asam lemak, sintesis asam amino, dan sintesis peptidoglikan (Rizky & Sogandi, 2018).

Kemudian pada kontrol negatif yang digunakan yaitu etil asetat yang berperan sebagai pelarut pengenceran ekstrak kental daun awar-awar. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa pelarut yang digunakan sebagai pengencer tidak memiliki pengaruh pada hasil uji antibakteri senyawa yang sedang diuji. (Utomo dkk., 2018). Pada penelitian ini kontrol negatif etil asetat tidak menunjukkan zona hambat sama sekali terhadap bakteri *Helicobacter pylori*. Sejalan dengan penelitian oleh Atmaja (2019) dan Tamburian dkk (2021) yang menggunakan kontrol negatif

etil asetat karena pelarut yang digunakan untuk melarutkan larutan uji adalah etil asetat. Dari data yang disajikan, mengatakan bahwa kontrol negatif tidak menunjukkan adanya zona hambat terhadap kedua jenis bakteri yang diuji. (Atmaja & Hendrayana, 2019) (Tamburian dkk., 2021). Ini menegaskan bahwa pelarut yang digunakan tidak memengaruhi terbentuknya zona hambat akibat aktivitas antibakteri dari ekstrak daun awar-awar.

Sementara itu hasil pengujian antibakteri kontrol positif cakram kloramfenikol secara triplo terhadap bakteri *Helicobacter pylori* menghasilkan rata-rata zona hambat 25 mm. Kloramfenikol efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri baik yang bersifat gram positif maupun gram negatif (Brooks dkk., 2007). Katzung (2004) menjelaskan bahwa kloramfenikol adalah antibiotik bakteristatik dengan spektrum luas yang bekerja dengan cara menghambat sintesis protein. Mekanisme kerjanya melibatkan penghambatan perpanjangan rantai protein dengan menghambat aktivitas *transferase peptidil* pada ribosom bakteri. Selain itu, kloramfenikol juga menghambat pembentukan dinding dan permeabilitas membran sel bakteri (Katzung, 2004). Kloramfenikol berinteraksi pada subunit 50S ribosom, menghambat aktivitas enzim *peptidil transferase*. Enzim ini bertanggung jawab untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino baru yang masih terlekat pada tRNA dengan asam amino terakhir yang sedang berkembang. Akibatnya, sintesis protein bakteri akan berhenti secara instan, menyebabkan kematian bakteri (Pratiwi, 2008).

Bakteri *Helicobacter pylori* memiliki bentuk spiral dan sifat Gram negatif, sering ditemukan di permukaan epitel lambung. Dinding sel bakteri Gram negatif terdiri dari peptidoglikan yang tipis, sehingga rentan terhadap kerusakan oleh senyawa-senyawa seperti alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, dan tanin. Penggunaan agen antibakteri dapat menghambat pembentukan dinding sel,

menyebabkan penggabungan rantai glikan tanpa silang terhadap peptidoglikan dinding sel. Hal ini menghasilkan struktur yang lemah dan akhirnya menyebabkan kematian bakteri. Setiap senyawa yang menghambat tahap dalam sintesis peptidoglikan akan melemahkan dinding sel bakteri, menyebabkan lisis sel. Lisis tersebut terjadi karena dinding sel tidak lagi berfungsi untuk mempertahankan bentuk dan melindungi bakteri (Kirtanayasa, 2022).

Hasil uji aktivitas antibakteri dapat dilihat bahwa ekstrak etil asetat daun awar-awar pada berbagai konsentrasi yang diujikan pada bakteri *Helicobacter pylori* memiliki rata-rata diameter hambat kategori kuat yang artinya lebih kecil dibandingkan dengan hasil zona hambat oleh kontrol positif (kloramfenikol) yang termasuk dalam kategori sangat kuat (Gambar 6). Sehingga dapat dikatakan bahwa antibiotik kloramfenikol lebih baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Helicobacter pylori* dibandingkan ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F). Ini disebabkan oleh fakta bahwa antibiotik dapat berasal dari mikroorganisme atau zat yang dihasilkan melalui sintesis kimia. Mujiasih (2001) menjelaskan bahwa antibiotik dapat berasal dari zat yang sama, sebagian atau seluruhnya diproduksi melalui proses sintesis kimia, sehingga dapat menghambat atau bahkan membunuh mikroorganisme dengan konsentrasi rendah (Rahmawati & Sudjarwo, 2011).

Pada uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa data diameter zona hambat memiliki distribusi normal ($p > 0,05$). Selanjutnya uji homogenitas Asumsi Kesamaan Varians (Uji *Levene*) didapatkan hasil data $p = 0,004$ ($p < 0,05$) maka asumsi kesamaan varians tidak dipenuhi. Andy Field dalam bukunya yang berjudul "*Discovering Statistics Using SPSS, 3rd Edition*" menyatakan uji *post hoc Games-Howell* digunakan bilamana asumsi kesamaan varians populasi tidak dipenuhi (Gio & Caraka, 2018). Maka Selanjutnya dilakukan uji parametrik *analysis of variance one-way anova* untuk mengetahui ada tidaknya

perbedaan dari berbagai konsentrasi ekstrak daun awar-awar dalam menghambat pertumbuhan *Helicobacter pylori*. Hasil uji *one-way anova* pada menunjukkan $p=0,000$ ($p < 0,05$) yang berarti terdapat kelompok yang mempunyai perbedaan rata-rata zona hambat yang signifikan (Tabel 5.). Selanjutnya, dilakukan uji *Post Hoc Games-Howell* untuk mengetahui antar kelompok mana yang mempunyai perbedaan signifikan (Tabel 6.).

Berdasarkan hasil pengujian kesamaan varians populasi dengan uji *Levene* sebelumnya, diketahui bahwa asumsi kesamaan varians populasi tidak terpenuhi ($p < 0,05$). Oleh karena itu, dilakukan uji perbandingan berganda dengan menggunakan uji *Games-Howell*. Didapatkan hasil kontrol pembanding kloramfenikol dan etil asetat memiliki perbedaan zona hambat secara signifikan dari ketiga konsentrasi uji. Namun tidak terdapat perbedaan zona hambat yang signifikan antara EDAA 60% dan EDAA 75% $p=0,065$ ($p > 0,05$). Tidak terdapat perbedaan zona hambat yang signifikan antara EDAA 60% dan EDAA 90% $p=0,136$ ($p > 0,05$). Tidak terdapat perbedaan zona hambat yang signifikan antara EDAA 75% dan EDAA 90% $p=0,450$ ($p > 0,05$).

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa ekstrak daun awar-awar dengan menggunakan pelarut etil asetat dapat memberikan zona hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring meningkatnya konsentrasi ekstrak daun awar-awar, diameter zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri *Helicobacter pylori* juga mengalami peningkatan.

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan pada tingkat fraksinasi dan isolasi senyawa ekstrak daun awar-awar untuk mengetahui secara spesifik senyawa yang berperan sebagai aktivitas antibakteri dalam menghambat bakteri *Helicobacter pylori*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) yang diuji menggunakan metode difusi agar menggunakan kertas cakram memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Helicobacter pylori*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring meningkatnya konsentrasi ekstrak daun awar-awar, diameter zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri *Helicobacter pylori* juga mengalami peningkatan.
2. Konsentrasi optimal ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) dalam menghambat bakteri *Helicobacter pylori* yaitu pada konsentrasi 90% dengan diameter rata-rata zona hambat yang dihasilkan sebesar 16,1 mm.

B. Saran

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri pada tingkat fraksinasi dan isolasi senyawa ekstrak daun awar-awar untuk mengetahui secara spesifik senyawa yang berperan sebagai aktivitas antibakteri dalam menghambat bakteri *Helicobacter pylori*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ables, A. Z., Simon, I., & Melton, E. R. (2007). Update on Helicobacter pylori Treatment. *American Family Physician*, volume 75. www.aafp.org/afp
- Akbar, Z. (2023). Resep Sehat JSR 200 Resep Menyehatkan dr.Zaidul Akbar (W. Nailatujannah Fauzi & S. Lusiana (ed.)). PT Sygma Media Inovasi.
- Al-Syaikh, A. bin M. bin A. bin I. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI (M. A. diterjemahkan oleh Ghaffar & A. I. Al-Atsari (ed.)). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Ar Rumaikhon, A. bin S. (2008). Fiqih Pengobatan Islami (Thibia (ed.)). Al-Qowam.
- Asworo, R. Y., & Widwastuti, H. (2023). Pengaruh Ukuran Serbuk Simplisia dan Waktu Maserasi terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Sirsak. *Indonesian Journal of Pharmaceutical (e-Journal)*, 3(2), 256–263. <https://doi.org/10.37311/ijpe.v3i2.19906>
- Ath-Thabari, I. (2007). Tafsir Thabari Jilid 17. In *Pustaka Azzam*.
- Atmaja, K. S., & Hendrayana, M. A. (2019). Aktivitas Daya Hambat Ekstrak Etil Asetat Kulit Petai (*Parkia Speciosa* Hassk) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Klesiella Pneumoniae*. *E-Jurnal Medika*, 8(1), 67–74.
- Aulia Deby Pelu. (2022). mikrobiologi aktvitas antibakteri (vol. I). (wiwi rumaolat, Annuha Zarkasyai, & syafri imanda, Red.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Aviany, H. B., & Pujiyanto, S. (2020). Analisis Efektivitas Probiotik di Dalam Produk Kecantikan sebagai Antibakteri terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis* Hanna. *Berkala Bioteknologi*, 3(2).
- Barry J, M., John a, A., David b, M., & Ross j, G. (1985). Attempt to Fulfil Koch's Postulates for pyloric *Campylobacter*. 142.
- Bawondes, J. N., Maarisit, W., Ginting, A., & Kanter, J. (2021). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Awar-Awar *Ficus septica* Burm.F Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Biofarmasetikal Tropis*, 4(1), 21–29. <https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v4i1.304>
- Besung, I. N. K. (2009). Pegangan (*Centella asiatica*) Sebagai Alternatif Pencegahan Penyakit Infeksi Pada Ternak. 1(2), 61–67.
- Brooks, G. F., Butel, J. S., Morse, S. A., Jawetz, M., & Adelberg, E. (2007). Mikrobiologi Kedokteran Edisi ke 23. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana* L .) sebagai Sumber Saponin. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri Vol.*, 7(4), 551–560.

- Chey, W. D., & Wong, B. C. Y. (2007). American College of Gastroenterology Guideline on the Management of Helicobacter pylori Infection. *American Journal of Gastroenterology*, 1808–1825. <https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2007.01393.x>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI). (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan.
- Effendi, P. D. I. I. (2020). Identifikasi Bakteri: Metode Identifikasi dan Klasifikasi Bakteri. Oceanum.
- Eusebi, L. H., Zagari, R. M., & Bazzoli, F. (2014). Epidemiology of Helicobacter pylori Infection. *Helicobacter*, 19(S1), 1–5. <https://doi.org/10.1111/hel.12165>
- Fajrina, A., Dinni, D., Bakhtra, A., & Irenda, Y. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Spons *Aplysina aerophoba* Pada Helicobacter pylori dan Shigella dysenteriae. *Jurnal Farmasi Higea*, 10(2), 134–142.
- Fakhri, M., Hariati, A. M., & Prajitno, A. (2013). In Vitro Antibacterial Activity of Sponge *Acanthella cavernosa* Against *Vibrio harveyi*. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, 3(3), 1–5.
- Fandini, I., & Trisnawati, E. (2023). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm . F) Dengan Penyari n-Heksana dan Air Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. 3(1), 51–57.
- Febriza, M. A., Adrian, Q. J., & Sucipto, A. (2021). Penerapan AR Dalam Media Pembelajaran Klasifikasi Bakteri. *Jurnal Program Studi Pendidikan Biologi, Vol 11 No.*, 10–18.
- Fifendy M. (2017). Mikrobiologi Edisi Pertama. kencana.
- Fock, K. M., & Ang, T. L. (2009). Epidemiology of Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Asia. *Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)*, 25(3), 479–486. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1746.2009.06188.x>
- Garza-gonzález, E., Perez-perez, G. I., Maldonado-garza, H. J., Bosques-padilla, F. J., Garza-gonzález, E., & Maldonado-garza, H. J. (2014). A review of Helicobacter pylori diagnosis , treatment , and methods to detect eradication. *World Journal Of Gastroenterology*, 20(6), 1438–1449. <https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i6.1438>
- Gio, P. U., & Caraka, R. E. (2018). Pedoman Dasar Mengolah Data Dengan Program Aplikasi Statistika Statcal (Disertai Perbandingan Hasil dengan SPSS & Minitab). USU Press.
- Goodwin, C. S., Armstrong, J. A., Chilvers, T., Peters, M., Collins, M. D., Sly, L. I., McConnell, W. J., & Harper, W. E. S. (1989). Transfer of *Campylobacter pylori* and *Campylobacter mustelae* to *Helicobacter* gen. nov. as *Helicobacter*

- pylori* comb. nov. and *Helicobacter mustelae* comb. nov., Respectively. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 39, 397–405. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:56146286>
- Hafsan. (2011). Mikrobiologi Umum. In M. K. Mustami (Ed.), *Alauddin Press* (Vol. 6). Alauddin Press.
- Handoyo, D. L. Y. (2020). Pengaruh Lama Waktu Maserasi (Perendaman) Terhadap Kekentalan Ekstrak Daun Sirih (Piper Betle) The Influence Of Maseration Time (Immeration) On The Vocity Of Birthleaf Extract (Piper Betle). *Jurnal Farmasi Tinctura*, 2(1), 34–41.
- Harti, A. S. (2015). Mikrobiologi Kesehatan : Peran Mikrobiologi Dalam Bidang Kesehatan (Erang Risanto (ed.); I).
- Kar, A. (2008). Pharmaceutical Microbiology. In *New Age International (P) Ltd., Publishers*.
- Katzung, G. B. (2004). Basic and Clinical Pharmacology. Endocrine Drugs. 9th Edition. McGraw-Hill.
- Katzung, G. B. (2018). Basic and Clinical Pharmacology. Endocrine Drugs. (P. Bertram G. Katzung, MD (ed.); Fourteenth). McGraw-Hill.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Quran dan Terjemahnya. In *Jakarta: PT. Hati Emas*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Farmakope Indoensia Edisi VI (Edisi VI). Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kester, M., V rana, K., Quraishi, S., & Dowhower Karpa, K. (2007). Elsevier's. Integrated Pharmacology. mobsy Elsevier.
- Kinho, J., Arini, D. I. D., Tabbu, S., Kama, H., Kafiar, Y., Shabri, S., & Karundeng, M. C. (2011). Tumbuhan obat tradisional di Sulawesi Utara jilid 1 (Traditional medicinal plants in North Sulawesi). Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementrian Kehutanan.
- Kirtanayasa, I. G. A. (2022). Literatur Review : Aktivitas Antibakteri Beberapa Ekstrak Tanaman Terhadap Bakteri Klebsiella Pneumonia. 27(22), 1–5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22225/ga.27.2.5389.107-111>
- Kumalasari, E., Agustina, D., & Ariani, N. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* Merr.) Terhadap *Escherichia coli*. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 3(1), 75–84. <https://doi.org/10.36387/jifi.v3i1.497>
- Leba, M. A. U. (2017). Ekstraksi dan Real Kromatografi (edisi 1). Deepublishle.
- Mabeku, L. B. K., Ngamga, M. L. N., & Leundji, H. (2018). Potential risk factors and prevalence of *Helicobacter pylori* infection among adult patients with dyspepsia symptoms in Cameroon. *BMC Infectious Diseases*, 18(1), 1–11.

<https://doi.org/10.1186/s12879-018-3146-1>

- Madduluri, S., Rao, K. B., & Sitaram, B. (2013). In vitro evaluation of antibacterial activity of five indigenous plants extract against five bacterial pathogens of human. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 5(4), 679–684.
- Mardiana, R. N., & Handayani, N. (2017). Antibacterial activity of the sambiloto leaf extracts (*Andrographis paniculata*) to *Bacillus cereus* and *Pseudomonas aeruginosa*. *Biofarmasi Journal of Natural Product Biochemistry*, 14(1), 19–24. <https://doi.org/10.13057/biofar/f140103>
- Meyer, J. M., Silliman, N. P., Wang, W., Siepmann, N. Y., Sugg, J. E., Morris, D., Zhang, J., Bhattacharyya, H., King, E. C., & Hopkins, R. J. (2002). Risk Factors for *Helicobacter pylori* Resistance in the United States: The Surveillance of *H. pylori* Antimicrobial Resistance Partnership (SHARP) Study, 1993–1999. *American College of Physicians–American Society of Internal Medicine*, 136(1), 1993–1999.
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, pemisahan senyawa, dan identifikasi senyawa aktif. *jurnal kesehatan*, VII No.2.
- Ngajow, M., Abidjulu, J., & Kamu, V. S. (2013). Pengaruh Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Matoa (*Pometia pinnata*) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* secara In vitro. *Jurnal MIPA UNSRAT*, 2(2), 128. <https://doi.org/10.35799/jm.2.2.2013.3121>
- Nita, C. N., Fembriyanto, R. K., & Hidayati, N. A. (2018). Potensi Daun Kayu Lubang (*Timonius flavescens* (Jacq.) Baker) Sebagai Alternatif Mengatasi Jerawat. *EKOTONIA: Jurnal Penelitian Biologi, Botani, Zoologi dan Mikrobiologi*, 3(2), 50–54. <https://doi.org/10.33019/ekotonia.v3i2.759>
- Nurvianty, A., Wullur, A. ., & Wewengkang, D. S. (2018). Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm.) dengan Variasi Basis HPMC dan Aktivitasnya Terhadap *Staphylococcus Epidermidis*. *Pharmakon*, 7(1), 36.
- Olokoba, A., Bojuwoye, M., & Obateru, O. (2013). *Helicobacter pylori* eradication therapy: A review of current trends . *Nigerian Medical Journal*, 54(1), 1. <https://doi.org/10.4103/0300-1652.108884>
- Parreira, P., Soares, B. I. G., Freire, C. S. R., Silvestre, A. J. D., Reis, C. A., Martins, M. C. L., & Duarte, M. F. (2017). Eucalyptus spp. outer bark extracts inhibit *Helicobacter pylori* growth: in vitro studies. *Industrial Crops and Products*, 105(December 2016), 207–214. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.05.012>
- Perilla, M. J. (2003). Manual for the Laboratory Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health Importance in the Developing World: *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis*,

Streptococcus pneumoniae, *Neisseria gonorrhoeae*. World Health Organization. World Health Organization


- Pratama, H. (2016). Eradikasi *Helicobacter Pylori*. *The Lancet*, 43 no, CDK-243. [https://doi.org/10.1016/0140-6736\(92\)90176-4](https://doi.org/10.1016/0140-6736(92)90176-4)
- Pratiwi, S. T. (2008). Mikrobiologi Farmasi. Erlangga.
- Putri, A. L., & Kusdiyantini, E. (2018). Isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat dari pangan fermentasi berbasis ikan (Inasua) yang diperjualbelikan di Maluku-Indonesia. *Jurnal Biologi Tropika*, 1(2), 6. <https://doi.org/10.14710/jbt.1.2.6-12>
- Putri, W. S., Warditiani, N. K., & Larasanty, L. P. . (2013). Skrining Fitokimia Ekstrak Etil Asetat Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L .). *Jurnal Farmasi Udayana*, 2(4), 56–60.
- Rahman, S., Kosman, R., & Mukrima, I. (2013). Efek Ekstrak Etanol Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm . F) Terhadap Kemampuan Epitelisasi Pada Tikus (*Rattus norvegicus*). *Bionature*, 14(2), 112–116. <https://ojs.unm.ac.id/bionature/article/view/1456>
- Rahmawati, N., & Sudjarwo, E. (2011). Uji aktivitas antibakteri ekstrak herbal terhadap bakteri *Escherichia coli*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, 24(3), 24–31.
- Ridwan, dwi ariqoh. (2023). Skrining Fitokimia dan Analisis Kualitatif Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Ekstrak Daun Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm. F) Dengan Berbagai Berbagai Pelarut.
- Rizky, T. A., & Sogandi. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak dan Fraksi Daun Jati (*Tectona grandis* Linn . F) Dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* Secara In Vitro. *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal*, Vo.3(No.1).
- Rosmania, & Yanti, F. (2020). Perhitungan jumlah bakteri di Laboratorium Mikrobiologi menggunakan pengembangan metode Spektrofotometri. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2), 76–84. <https://doi.org/10.56064/jps.v22i2.564>
- Salsabila, D. U., Faqiha, S. A. Z., Anggraeni, A. D., & Ikawati, M. (2021). Review Potensi Daun Awar-awar Sebagai Agen Ko-Kemoterapi Antimetastasis Kanker Payudara. *JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 6(3), 295. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v6i3.45180>
- Saputra, T. R., Ngatin, A., & Sarungu, Y. T. (2018). Penggunaan metode ekstraksi maserasi dan partisi pada tumbuhan cocor bebek (*kalanchoe pinnata*) dengan kepolaran berbeda. *Fullerene Journal Of Chemistry*, 3(1), 5–8.
- Savoldi, A., Carrara, E., Graham, D., Conti, M., & Tacconelli, E. (2018). Prevalence of Antibiotic Resistance in *Helicobacter pylori*: A Systematic Review and Meta-analysis in World Health Organization Regions. *Gastroenterology*, 155(5), 1372–1382. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.07.007>. Prevalence

- Schwalbe, R., Steele-Moore, L., & Goodwin, A. C. (2007). Antimicrobial susceptibility testing protocols. In R. Schwalbe, L. Steele-Moore, & A. C. G. Worked (Ed.), *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Nomor August). CRC Press Taylor & Francis Group.
- Septiani, S., Dewi, E. N., & Wijayanti, I. (2017). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Lamun (*Cymodocea rotundata*) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* DAN *Escherichia coli* (Antibacterial Activities of Seagrass Extracts (*Cymodocea rotundata*) Against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*). *SAINTEK PERIKANAN: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ijfst.13.1.1-6>
- Shihab, M. Q. (2002a). Tafsir Al- Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Jilid 10. In *Lentera Hati*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Jilid 8. Lentera Hati.
- Simanjuntak, P., Susanto, E., & Sulastri, L. (2019). Pengaruh Metode ekstraksi cara maserasi dan infusa daun mangrove, daun kejibeling dan batang ketuk serta kombinasinya terhadap uji bakteri *eschericia coli* dan *stphylococcus aureus*. *pros semin kim*, 1 (6).
- Steenis, V. (2008). *Flora*. PT. Pradnya Paramita.
- Sudarsono, D. G., Gunawan, D., Wahyuono, S., & Donatus, I. (2002). Tumbuhan obat II. *Universitas Gadjah Mada*.
- Suhatri, Hansen, H. (2014). Analisis Terapi Pada Pasien Tukak Peptik di SMF penyakit Dalam RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. *Jurnal B-Dent*, 1(1), 56–63. <https://jurnal.unbrah.ac.id/index.php/bdent/article/viewFile/53/40>
- Suriawiria, U. H. (2005). Mikrobiologi dasar. Papas Sinar Sinanti.
- Susilowarno, R. G., & Hartono, R. S. (2007). *Biologi*. grasindo.
- Sutiswa, S. I. (2023). Farmasetika Dasar. In *Correspondencias & Análisis*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Tamburian, V. N. M., Sumilat, D. A., Sinjal, C. A. L., Warouw, V., Rompas, R. M., & Sinjal, H. (2021). Uji Aktivitas Antibakteri dan Anti-Uv Dari Ekstrak Etil Asetat Isolat Jamur AFBK 5c Yang Bersimbio Dengan *Acidia Sigilina* sp. Dari Perairan Pulau Bangka. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 9(3), 95–103.
- Tawi, G. Y., Maarisit, W., Datu, O. S., & Lengkey, Y. K. (2019). Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Awar-awar *Ficus septica* Burm F . Sebagai Antipiretik Terhadap Tikus Putih *Rattus novergicus*. *Jurnal Biofarmasetikal Tropis*, 2(1), 1–9.
- Tuna, I. D. A., & Wowor, P. M. (2016). Uji daya hambat ekstrak daun awar-awar (*ficus septica burm . f*) terhadap pertumbuhan bakteri *staphylococcus aureus* dan *eschericia coli* Kandidat Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sam


- Ratulangi Manado Penggunaan tanaman yang diyakini di berbagai neg. *Jurnal e-Biomedik (eBm)*, 4(2), 3–6.
- Tunny, R., Pelu, A. D., & Budiman, N. (2020). Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun Awar-Awar (*Ficus Septica* Burm) Kecamatan Kairatu dengan DPPH. *Jurnal Sains dan Kesehatan (JUSIKA)*, 4(1), 16–29.
- Utomo, S. B., Fujiyanti, M., Lestari, W. P., & Mulyani, S. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa C-4-Metoksifenilkaliks[4]Resorsinarena Termodifikasi Hexadecyltrimethylammonium-Bromide Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *JKPK (Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia)*, 3(3), 201–209. <https://doi.org/10.20961/jkpk.v3i3.22742>
- Wannmacher, D. L. (2011). Review of the evidence for H . Pylori treatment regimens. 1, 1–33.
- Wardhani, L. K., & Sulistyani, N. (2012). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Binahong (*Anredera scandens* (L .) Moq .) Terhadap *Shigella flexneri* Beserta Profil Kromatografi Lapis Tipis. *Jurnal Ilmiah Kefarmasian, Vol 2 No.1*, 1–16.
- Wijaya, F., Kurnia, C., & Kurniawati, S. V. (2022). Efek Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Asam Jawa (*Tamarindus Indica* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Prevotella Intermedia*. *E-Prodenta Journal of Dentistry*, 6(2), 643–653. <https://doi.org/10.21776/ub.eprodenta.2022.006.02.4>

LAMPIRAN



Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel




Lampiran 2. Skema Ekstraksi Sampel




Lampiran 3. Skema Pembuatan Media Nutrient Agar

Lampiran 4. Skema Pembuatan Larutan Standar *Mcfarland*

Lampiran 5. Skema Kultur Dan Suspensi *Helicobacter pylori*

Lampiran 6. Uji Aktivitas Antibakteri



Lampiran 7. Perhitungan Rendamen Ekstrak

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{Bobot ekstrak kental}}{\text{Bobot simplisia}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{6,12 \text{ g}}{250 \text{ g}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Rendemen} = 2,44 \%$$

Lampiran 8. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Ekstrak

Masing-masing konsentrasi ekstrak sampel daun awar-awar dibuat dalam 2 ml pelarut.

$$1. \text{ Konsentrasi ekstrak } 60\% \text{ g/ml} = \frac{60}{100} \times 2 \text{ ml} = 1,2 \text{ g}$$

$$2. \text{ Konsentrasi ekstrak } 75\% \text{ g/ml} = \frac{75}{100} \times 2 \text{ ml} = 1,5 \text{ g}$$

$$3. \text{ Konsentrasi ekstrak } 90\% \text{ g/ml} = \frac{90}{100} \times 2 \text{ ml} = 1,8 \text{ g}$$

Lampiran 9. Perhitungan Diameter Zona Hambat Bakteri

$$\text{Rumus perhitungan zona hambat} = \frac{(Dv - Dc) + (Dh - Dc)}{2}$$

Keterangan :

- a. Dv (diameter ventrikal),
- b. Dh (diameter horizontal),
- c. Dc (Diameter *paper disk*)

1. Zona hambat bakteri *Helicobacter pylori*

a. Replikasi 1

$$60 \% = \frac{(19-6)+(16-6)}{2}$$

$$= \frac{(13)+(10)}{2}$$

$$= 11,5 \text{ mm}$$

$$75 \% = \frac{(20-6)+(18-6)}{2}$$

$$= \frac{(14)+(12)}{2}$$

$$= 13 \text{ mm}$$

$$90\% = \frac{(21-6)+(19-6)}{2}$$

$$= \frac{(15)+(13)}{2}$$

$$= 14 \text{ mm}$$

b. Replikasi 2

$$60\% = \frac{(17-6)+(17-6)}{2}$$

$$= \frac{(11)+(11)}{2}$$

$$= 11 \text{ mm}$$

$$75\% = \frac{(21-6)+(19-6)}{2}$$

$$= \frac{(15)+(13)}{2}$$

$$= 14 \text{ mm}$$

$$90\% = \frac{(24-6)+(22-6)}{2}$$

$$= \frac{(18)+(16)}{2}$$

$$= 17 \text{ mm}$$

c. Replikasi 3

$$60\% = \frac{(18-6)+(18-6)}{2}$$

$$= \frac{(12)+(12)}{2}$$

$$= 12 \text{ mm}$$

$$75\% = \frac{(21-6)+(20-6)}{2}$$

$$= \frac{(15)+(14)}{2}$$

$$= 14,5 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}90\% &= \frac{(26-6)+(21-6)}{2} \\ &= \frac{(20)+(15)}{2} \\ &= 17,5 \text{ mm}\end{aligned}$$

2. Zona hambat bakteri kontrol kloramfenikol (k+)

a. Replikasi 1

$$\begin{aligned}&= \frac{(32-6)+(30-6)}{2} \\ &= \frac{(26)+(24)}{2} \\ &= 25 \text{ mm}\end{aligned}$$

b. Replikasi 2

$$\begin{aligned}&= \frac{(31-6)+(31-6)}{2} \\ &= \frac{(25)+(25)}{2} \\ &= 25 \text{ mm}\end{aligned}$$

c. Replikasi 3

$$\begin{aligned}&= \frac{(31-6)+(31-6)}{2} \\ &= \frac{(25)+(25)}{2} \\ &= 25 \text{ mm}\end{aligned}$$

Lampiran 10. Hasil Uji Aktvitas Antibakteri

Kelompok	Replikasi			Rata-Rata Diameter Zona Hambat \pm SD (mm)	Kategori
	1	2	3		
EDAA 60%	11,5	11	12	11,5 \pm 0,5	Kuat
EDAA 75%	13	14	14,5	13,8 \pm 0,7	Kuat
EDAA 90%	14	17	17,5	16,1 \pm 1,8	Kuat
K +	25	25	25	25 \pm 0	Sangat Kuat
K -	0	0	0	0	Tidak menghambat

Keterangan :

- EDAA 60 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 60%
 EDAA 75 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 75%
 EDAA 90 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 90%
 K + = Kontrol positif cakram kloramfenikol
 K - = Kontrol negatif pelarut etil asetat

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian



Daun awar awar



Proses sortasi basah



Pencucian sampel



Proses pengeringan sampel



Proses sortasi kering sampel



Penimbangan simplisia

Gambar 7. Penyiapan Sampel



Proses maserasi sampel



Proses penyaringan sampel




Proses penguapan dengan rotary evaporator



Hasil ekstraksi (ekstrak kental)

Gambar 8. Proses Ekstraksi Sampel



Variasi konsentrasi ekstrak 60%, 75%, dan 90%

Gambar 9. Pembuatan Variasi Konsentrasi Ekstrak



Larutan NaCl dan media Na

Gambar 10. Pembuatan NaCl dan media NA



Sterilisasi bahan dengan autoklaf



Sterilisasi alat dengan oven

Gambar 11. Sterilisasi Alat dan Bahan




Proses sub kultur bakteri
H. pylori



Hasil sub kultur bakteri
H.pylori


Gambar 12. Pembuatan Inokulasi Bakteri



Suspensi bakteri
H.pylori

Penyetaraan dengan
Mcfarland

Gambar 13. Pembuatan Suspensi Bakteri



Replikasi 1
(1 : EDAA 60%, 2 : EDAA
75%, 3 : EDAA 90%)


Replikasi 2
(1 : EDAA 60%, 2 : EDAA
75%, 3 : EDAA 90%)

Replikasi 3
(1 : EDAA 60%, 2 : EDAA
75%, 3 : EDAA 90%)




Proses inkubasi uji
antibakteri 1x24 jam


Gambar 14. Proses Uji Aktivitas Antibakteri




Zona hambat Replikasi 1
(1 : EDAA 60%, 2 :
EDAA 75%, 3 : EDAA
90%)




Zona hambat Replikasi 2
(1 : EDAA 60%, 2 :
EDAA 75%, 3 : EDAA
90%)



Zona hambat Replikasi 3
(1 : EDAA 60%, 2 :
EDAA 75%, 3 : EDAA
90%)



Zona hambat kontrol positif



Zona hambat kontrol negatif

Gambar 15. Hasil Zona Hambat Uji Aktivitas Antibakteri

Lampiran 12. Hasil Uji Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		DiameterZonaHambat	Kelompok
N		15	15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	13,3000	3,0000
	Std. Deviation	8,38962	1,46385
Most Extreme Differences	Absolute	,192	,153
	Positive	,144	,153
	Negative	-,192	-,153
Test Statistic		,192	,153
Asymp. Sig. (2-tailed)		,142 ^c	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Descriptives

DiameterZonaHambat

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
EDAA 60%	3	11,5000	,50000	,28868	10,2579	12,7421	11,00	12,00
EDAA 75%	3	13,8333	,76376	,44096	11,9360	15,7306	13,00	14,50
EDAA 90%	3	16,1667	1,89297	1,09291	11,4643	20,8691	14,00	17,50
K. (+)	3	25,0000	,00000	,00000	25,0000	25,0000	25,00	25,00
K. (-)	3	,0000	,00000	,00000	,0000	,0000	,00	,00
Total	15	13,3000	8,38962	2,16619	8,6540	17,9460	,00	25,00

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
DiameterZonaHambat	Based on Mean	8,085	4	10	,004
	Based on Median	1,186	4	10	,375
	Based on Median and with adjusted df	1,186	4	2,523	,480
	Based on trimmed mean	7,100	4	10	,006

ANOVA

DiameterZonaHambat

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	976,567	4	244,142	276,387	,000
Within Groups	8,833	10	,883		
Total	985,400	14			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: DiameterZonaHambat

Games-Howell

(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
EDAA 60%	EDAA 75%	-2,33333	,52705	,065	-4,8816	,2149
	EDAA 90%	-4,66667	1,13039	,136	-12,2373	2,9040
	K. (+)	-13,50000*	,28868	,001	-15,7211	-11,2789
	K. (-)	11,50000*	,28868	,002	9,2789	13,7211
EDAA 75%	EDAA 60%	2,33333	,52705	,065	-,2149	4,8816
	EDAA 90%	-2,33333	1,17851	,450	-9,2481	4,5814
	K. (+)	-11,16667*	,44096	,005	-14,5595	-7,7739
	K. (-)	13,83333*	,44096	,003	10,4405	17,2261
EDAA 90%	EDAA 60%	4,66667	1,13039	,136	-2,9040	12,2373
	EDAA 75%	2,33333	1,17851	,450	-4,5814	9,2481
	K. (+)	-8,83333*	1,09291	,045	-17,2423	-,4244
	K. (-)	16,16667*	1,09291	,014	7,7577	24,5756
K. (+)	EDAA 60%	13,50000*	,28868	,001	11,2789	15,7211
	EDAA 75%	11,16667*	,44096	,005	7,7739	14,5595
	EDAA 90%	8,83333*	1,09291	,045	,4244	17,2423
	K. (-)	25,00000	,00000	.	25,0000	25,0000

K. (-)	EDAA 60%	-11,50000*	,28868	,002	-13,7211	-9,2789
	EDAA 75%	-13,83333*	,44096	,003	-17,2261	-10,4405
	EDAA 90%	-16,16667*	1,09291	,014	-24,5756	-7,7577
K. (+)		-25,00000	,00000	.	-25,0000	-25,0000

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.



RIWAYAT HIDUP



Dwi Febrianty Kurnia akrab dipanggil Dwi lahir di Jayapura pada 22 February 2001. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri H.Budi Rahim dan Hj.Nuraenah. Pendidikan formal peneliti dimulai dari tahun 2006 di TK Hang Tua Jayapura dan pada 2007 melanjutkan pendidikan di SDN 2 Malino. Namun berpindah ke SD Al-Ihsan hingga akhirnya menjadi lulusan sekolah dasar dari SDN V Sungguminasa pada tahun 2013. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gowa dan dilanjutkan dengan pendidikan di SMAN 1 Gowa pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk jenjang S1 pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sampai saat penulisan biografi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R