


**EFEKTIVITAS SLOW DEEP BREATHING DALAM  
PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTIVITAS  
DAN ISTIRAHAT PADA PASIEN GGK**



**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2023**

**EFEKTIVITAS SLOW DEEP BREATHING DALAM  
PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTIVITAS  
DAN ISTIRAHAT PADA PASIEN GGK**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

Khaedirnur  
70900122036

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khaedirnur  
NIM : 70900122036  
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 10 Mei 2000  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan/Ners/Keperawatan Dasar Profesi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Sungguminasa, Gowa  
Judul : Efektivitas Slow Deep Breathing Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat pada Pasien GGK.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Desember 2023

Penyusun

Khaedirnur  
70900122036

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners saudara Khaedimur, S.Kep NIM: 70900122036, mahasiswa program studi profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Aktivitas dan Istirahat Menggunakan Intervensi *Slow Deep Breathing* di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar", memaparkan bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diaminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 15 Desember 2023

 **MUSDALIRIFAH, S.Kep, Ns, M.Kes**  
Pembimbing I

 **DR. RISMAH, S.KM, S.Kep, Ns, M.Kes**  
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "*Efektifitas Slow Deep Breathing Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat*" yang disusun oleh Khaedimur, S.Kep Nim: 70900122036, Mahasiswa Jurusan Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 22 Desember 2023, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Profesi dalam Ilmu Kesehatan, program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan.

Gowa, 24 April 2024  
15 Syawal 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqasy I	: Prof. Dr. Hj. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes	(.....)
Munaqasy II	: Dr. Wahyudin G, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Musdalifah, S.Kep., Ns, M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Risnah, S.KM., S.Kep., Ns, M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh :  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes  
NIP. 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillahirabbilalamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berbagai nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Akhi ini dengan judul “Efektivitas Slow Deep Breathing Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat pada Pasien GGK”. Salam serta shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ialah nabi yang telah menjadi contoh bagi seluruh umat manusia yang telah membawa kita dari dasar kebatilan menuju puncak kebenaran.

Dalam menyelesaikan KTA ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Namun, dengan bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, serta dengan izin Allah SWT, alhamdulillah karya tulis ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Dabi dan Ayah Jusman, atas doa, dukungan, motivasi, bantuan baik secara moral maupun materiil, dan kasih sayang yang tidak terhingga, yang telah membantu penulis mencapai tahap ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar bersama dengan Staf danajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman di kampus peradaban ini.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah memberikan bantuan khususnya dalam hal administrasi hingga penulisan karya tulis ini selesai.
3. Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Jurusan Program studi Profesi Ners dan Eny Sutria., S.Kep., Ns., M.Kes selaku sekretaris jurusan Program Studi Profesi Ners serta seluruh dosen pengajar yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, saran, dan masukan kepada penulis dengan tulus dan sabar.
4. Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing I dan Dr. Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan

sabar telah memberikan bimbingan serta menghabiskan waktu untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan juga selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, yang telah membantu penulis mencapai tahap ini.

5. Prof. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku dewan penguji I dan Dr. Wahyudin G, M.Ag selaku dewan penguji II yang telah memberikan masukan yang membangun, menyediakan waktu, dan memberikan saran serta tanggapan yang membantu penulis menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Ardian Adiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan selalu membimbing selama proses perkuliahan.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang selalu kebersamai dalam menyelesaikan KTA ini. Tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dan kesalahan dalam KTA ini, oleh karena itu saya memohon maaf atas kekurangan. Serta kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan KTA ini.

Wassalamualaikum wr.wb



Gowa, 11 Desember 2023

Khaedirnur

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DATAR TABEL .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan .....	4
1.4 Manfaat .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Konsep Medis Chronic Kidney Disease (CKD) .....	7
2.2 Konsep Asuhan Keperawatan .....	21
2.3 <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> .....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	46
3.1 Rancangan Studi Kasus .....	46
3.2 Subjek Studi Kasus .....	47
3.3 Fokus Studi Kasus .....	47
3.4 Instrumen Studi Kasus .....	48
3.5 Prosedur Pengambilan Data .....	48
3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus .....	49
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data .....	49
3.8 Etika Studi Kasus .....	50
BAB IV HASIL .....	52
4.1 Asuhan Keperawatan .....	52
4.2 Diagnosis Keperawatan .....	71
4.3 Intervensi Keperawatan .....	74
4.4 Implementasi Keperawatan .....	77
4.5 Evaluasi Keperawatan .....	86

BAB V PEMBAHASAN .....	95
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan .....	95
5.2 Analisis <i>Evidence Based Practiced in Nursing</i> .....	106
5.3 Keterbatasan.....	107
BAB VI PENUTUP.....	108
6.1 Kesimpulan .....	108
6.2 Saran .....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110



## DATAR TABEL

Tabel 1 klasifikasi gagal ginjal.....	9
Tabel 2 komplikasi gagal ginjal kronik .....	13
Tabel 3 Artikel utama dan pendukung .....	45



## ABSTRAK

Nama : Khaedirnur

NIM : 70900122036

Judul : Efektivitas Slow Deep Breathing Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat pada Pasien GGK.

---

---

**Pendahuluan:** Menurut The United States Renal Data System (USRDS) pada akhir tahun 2009, lebih dari 871.000 orang di Amerika Serikat sedang menjalani perawatan untuk penyakit ginjal tahap akhir (ESRD). Menurut data dari riset kesehatan dasar (Riskesdes) tahun 2013 prevalensi gagal ginjal kronik di Indonesia sekitar 0,2%, gagal ginjal menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, sehingga akan membuat kondisi tubuh sangat lemah, sehingga efeknya pada lemahnya kondisi tubuh. Pada kondisi tersebut kebutuhan aktivitas dan istirahat, khususnya pada kasus kelelahan. **Tujuan:** Menganalisis asuhan keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat menggunakan intervensi intervensi terapi relaksasi *slow deep breathing* di ruang lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. **Metode :** yang digunakan adalah study kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Penatalaksanaan *slow deep breathing* selama 3 hari pemberian. **Hasil** analisis data menunjukkan beberapa diagnosis yaitu kelelahan, bersihan jalan nafas tidak efektif dan risiko defisit nutrisi. Pemberian *slow deep breathing* sebagai salah satu intervensi yang bisa digunakan dalam menurunkan fatigue. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan *slow deep breathing*, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan menunjukkan berkurangnya keluhan lelah pada pasien setelah pemberian, hal ini mengindikasikan bahwa *slow deep breathing* efektif dilakukan dalam membantu dalam menurunkan kelelahan Pasien CKD.

**Kata kunci:** CKD, Kelelahan, *Slow deep breathing*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gagal Ginjal Kronik (GGK) atau Chronic Kidney Disease (CKD) adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun. Ginjal merupakan organ vital yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Penurunan fungsi ginjal menyebabkan ketidakmampuan ginjal dalam mempertahankan keseimbangan metabolisme, cairan, dan elektrolit, yang dapat mengakibatkan uremia, yaitu penumpukan urea dan limbah nitrogen lainnya dalam darah (Hasanuddin, 2022).

Menurut The United States Renal Data System (USRDS) pada akhir tahun 2009, lebih dari 871.000 orang di Amerika Serikat sedang menjalani perawatan untuk penyakit ginjal tahap akhir (ESRD). Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013, prevalensi gagal ginjal kronik di Indonesia sekitar 0,2%. Sulawesi Selatan menduduki peringkat kelima setelah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Aceh, dan Gorontalo, dengan angka kejadian sebesar 0,3%. Berdasarkan kelompok umur, prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok umur >75 tahun dengan 0,6%, lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada laki-laki, prevalensi sebesar 0,3% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tingginya angka kejadian ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit sistemik dan kardiovaskuler. Banyak penyakit dapat muncul bersamaan dengan GGK, terutama infeksi dan penyakit kardiovaskuler yang merupakan penyebab

umum kematian. Tingginya kejadian GJK juga dipengaruhi oleh prevalensi diabetes dan hipertensi, masing-masing sebesar 34% dan 21% dari total kasus. (Hasanuddin, 2022).

Penderita GJK dapat diberikan terapi agar penderitanya merasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas selama sakit, serta dapat memperbaiki kualitas hidup serta meningkatkan harapan hidupnya. Pilihan terapi yang umum untuk gagal ginjal kronik adalah terapi hemodialisis. Tingkat kelangsungan hidup satu tahun bagi pasien yang menjalani terapi ini diperkirakan sekitar 79%. Namun, untuk jangka panjang, tingkat kelangsungan hidup menurun menjadi sekitar 33% dalam lima tahun, hemodialisis yang dijalani oleh pasien untuk mempertahankan kualitas hidupnya dilakukan seumur hidupnya meski demikian masih terdapat banyak masalah yang mungkin muncul pada penderita GJK (Hasanuddin, 2022).

Menurut (Malisa et al., 2023) masalah keperawatan yang mungkin muncul pada penderita GJK diantaranya adalah hipervolemi, Keletihan, pola napas tidak efektif, ansietas, risiko defisit nutrisi, gangguan integritas kulit, intoleransi aktivitas, risiko infeksi, gejala utama yang sering muncul adalah keletihan, nafsu makan menurun, mual muntah penurunan berat badan, dispnea, edema perifer dan sebagainya.

Dalam buku (Irwan, 2016) gagal ginjal menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, sehingga akan membuat kondisi tubuh sangat lemah. Hal ini dikarenakan oleh darah yang telah tercampur oleh banyak racun yang tidak dapat disaring dengan baik sehingga efeknya pada lemahnya kondisi tubuh.

Pada kondisi tersebut kebutuhan aktivitas dan istirahat seseorang akan terganggu sehingga kualitas hidupnya berkurang. Gangguan pemenuhan aktivitas dapat mempengaruhi berbagai hal, seperti perubahan metabolisme tubuh, gangguan dalam kebutuhan nutrisi, perubahan sistem pernapasan, perubahan sistem muskuloskeletal dan sebagainya. Tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan istirahat dapat menyebabkan beberapa masalah salah satunya ialah insomnia yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen dalam tubuh yang disebabkan oleh GJK (Kasiati & ni wayan dwi rosmalawati, 2016).

Lanjut (Irwan, 2016) menjelaskan, bahwa kadar oksigen yang rendah karena anemia yang disebabkan oleh GJK dapat menyebabkan tubuh mengalami kelelahan yang ekstrem (fatigue), dan akan memaksa jantung bekerja lebih keras menyuplai oksigen yang dibutuhkan. Salah satu terapi yang telah terbukti efektifitasnya untuk mengatasi kelelahan adalah terapi relaksasi napas dalam. *Slow deep breathing* adalah relaksasi yang disadari untuk mengatur pernapasan secara dalam dan lambat. Pernapasan dalam dan lambat merupakan bagian dari strategi perawatan diri holistik yang efektif untuk mengatasi berbagai keluhan, termasuk kelelahan. hal ini sejalan dengan penelitian (Pertwi & Prihati, 2020) yang menyatakan bahwa terapi relaksasi slow deep breathing dapat menurunkan fatigue pada penderita gagal ginjal kronik.

Metode non-farmakologis dapat digunakan dalam penanganan kelelahan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak akibat

penggunaan obat-obatan secara berlebih. Dengan adanya terapi non farmakologis diharapkan mampu memberikan penanganan yang efektif dan efisien dalam mengatasi nyeri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat menggunakan intervensi terapi relaksasi *slow deep breathing* di ruang Lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penulisan karya tulis akhir ini adalah "Bagaimana asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat pada Tn. A di Ruang Perawatan Lontara 1 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis asuhan keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat menggunakan intervensi intervensi terapi relaksasi *slow deep breathing* diruang lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pengkajian keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat.

- b. Mengetahui diagnosis keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat.
- c. Mengetahui intervensi keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat.
- d. Mengetahui implementasi pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat
- e. Mengetahui evaluasi keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat.
- f. Mengetahui pengaruh terapi relaksasi *slow deep breathing* pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya karya tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat menggunakan intervensi terapi relaksasi *slow deep breathing* di ruang Lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

### **1.4.2 Manfaat Aplikatif**

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pemberian intervensi *eviden based practice in nursing* (EBPN) untuk asuhan keperawatan pada pasien CKD dengan masalah gangguan

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. Intervensi yang digunakan adalah terapi relaksasi *slow deep breathing*, yang dapat diterapkan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat..



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Medis Chronic Kidney Disease (CKD)**

##### **2.1.1 Definisi**

Gagal ginjal kronik atau *Chronic Kidney Disease* (CKD) adalah penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel dimana ginjal tidak mampu untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan uremia : (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam dan azotemia kenaikan kadar kreatinin serum dan ureum darah (Hasanuddin, 2022).

Gagal Ginjal Kronis adalah kondisi di mana kemampuan ginjal untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh menurun. Ini merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular di mana proses penyakitnya berlangsung dalam jangka waktu lama, mengakibatkan penurunan fungsi yang tidak dapat dipulihkan. Kerusakan pada ginjal terjadi terutama pada unit fungsional nefron, termasuk glomerulus dan tubulus ginjal. Nefron yang mengalami kerusakan tidak dapat mengembalikan fungsinya ke kondisi semula (cholina trisa siregar, 2020).

Ginjal berfungsi melakukan penyaringan dan pembuangan hasil metabolisme tubuh. Penurunan kemampuan ginjal mengakibatkan terganggunya keseimbangan didalam tubuh, mengakibatkan penumpukan sisa metabolisme terutama ureum (menyebabkan

terjadinya uremia), dalam tubuh. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus, karena dapat menyebabkan keadaan yang membahayakan penderita (cholina trisa siregar, 2020).

### **2.1.2 Etiologi**

Gangguan pada ginjal dapat berasal dari tiga sumber utama: prerenal, renal, dan postrenal. Pasien yang memiliki kondisi seperti Diabetes Melitus, Glomerulonefritis, gangguan imun, Hipertensi, penyakit ginjal yang diwarisi, batu ginjal, keracunan, cedera pada ginjal, gangguan kongenital, dan keganasan dapat mengalami kerusakan ginjal (cholina trisa siregar, 2020).

Penyakit-penyakit tersebut umumnya menyerang nefron, yang mengakibatkan kehilangan kemampuan ginjal untuk melakukan proses penyaringan. Kerusakan pada nefron dapat terjadi dengan cepat, bertahap, dan sering kali pasien tidak merasakan penurunan fungsi ginjal dalam jangka waktu yang lama (cholina trisa siregar, 2020).

### **2.1.3 Klasifikasi**

Dalam buku (Tandra hans, 2018) menyebutkan bahwa kerusakan ginjal terjadi secara perlahan-lahan. Pada fase awal, kerusakan yang timbul tidak terlihat dan terjadi tanpa keluhan atau keluhan yang minimal. Kerusakan terus berlansung hinggamencapai kegagalan fungsi ginjal total yang sangat serius, berikut klasifikasi gagal ginjal :

Tabel 1 klasifikasi gagal ginjal

Stadium	Deskripsi	GFR (mL/menit/1,73 m <sup>2</sup> )
1	Hasil pemeriksaan darah menunjukkan bahwa fungsi ginjal masih baik. ginjal hanya mulai menunjukkan pembengkakan atau pembesaran ringan karena banyaknya glukosa dalam peredaran darah ginjal yang bertambah	≥ 90
2	Pada tahap ini, molekul kecil dari protein (albumin) dalam darah bocor dan keluar ke urine.	60-89
3	Pada stadium ini, protein yang bermolekul lebih besar sudah tampak di urin dan hal ini disebut proteinuria atau makroalbuminuria. Glomerulus mengalami kerusakan sehingga tidak mampu membuang bahan-bahan yang seharusnya dikeluarkan tubuh, sehingga racun akan menumpuk dalam darah	30-59
4	Kerusakan sudah amat berat, kebocoran yang berlebihan	15-29

	terjadi pada ginjal menyebabkan kreatinin selalu tinggi. Penderita pucat, bengkak dan sesak napas	
5	Gagal ginjal, hanya bisa ditolong dengan dialisis atau transplantasi ginjal	< 15

Nilai GFR menunjukkan seberapa besar fungsi ginjal yang dimiliki oleh pasien sekaligus sebagai dasar penentuan terapi oleh dokter. Semakin parah CKD yang dialami, maka nilai GFR nya akan semakin kecil.

Penurunan fungsi ginjal ditandai dengan peningkatan kadar ureum dan kreatinin serum. Penurunan GFR dapat dihitung dengan menggunakan rumus Cockcroft-Gault.

#### 2.1.4 Patofisiologi

Ada banyak penyakit yang menyebabkan CKD, masing-masing memiliki patofisiologinya sendiri-sendiri. Secara umum, saat terjadi gagal ginjal, sebagian nefron (termasuk glomerulus dan tubulus) diduga tetap utuh sementara yang lain mengalami kerusakan (hipotesa nefron utuh). Nefron-nefron yang utuh mengalami hipertrofi dan meningkatkan volume filtrasi serta reabsorpsi, meskipun terjadi penurunan GFR/daya saring. Adaptasi ini memungkinkan ginjal berfungsi meskipun hingga 3/4 nefron rusak. Akibatnya, beban bahan yang harus dilarutkan melebihi kapasitas reabsorpsi, yang

mengakibatkan diuresis osmotik, poliuria, dan haus. (Narsa et al., 2022).

Lanjut (Narsa et al., 2022) menjelaskan, Karena semakin banyak nefron yang rusak, terjadi retensi produk sisa. Gejala-gejala pada pasien menjadi lebih jelas dan khas ketika sekitar 80% hingga 90% fungsi ginjal telah hilang. Pada tahap ini, fungsi ginjal sangat menurun.

Ketika fungsi renal menurun, produk akhir metabolisme protein, yang biasanya diekskresikan dalam urin, menumpuk dalam darah. Hal ini menyebabkan uremia yang mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak produk limbah yang menumpuk, semakin parah gejalanya. (Narsa et al., 2022).

#### **2.1.5 Manifestasi Klinis**

Manifestasi klinis CKD sangat bervariasi menurut ... adapun hal yang mungkin muncul ialah :

- a. Stadium 1, klien biasanya memiliki tekanan dara normal dan tidak ada kelainan dalam tes laboratorium, dan tidak ada manifestasi klinis.
- b. Stadium 2 umumnya asimtomatik, tetapi mungkin mengalami hipertensi, dan ada kelainan pada tes laboratorium.
- c. Stadium 3, klien biasanya masih simtomatik tetapi tetapi nilai laboratoriumnya menunjukkan kelainan dibeberapa sistem organ, dan hipertensi sering ada.

- d. Stadium 5, klien mulai mengalami manifestasi klinis terkait CKD seperti keletihan dan nafsu makan yang buruk. Pada stadium 5, sesak napas berat menjadi manifestasi klinis penyakit ginjal stadium akhir menjadi buktinya.

#### **2.1.6 Penatalaksanaan**

Menurut (Malisa et al., 2023) penatalaksanaan yang dapat dilakukan ialah :

- a. Mencegah gagal ginjal akut
- b. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit
- c. Mengganti fungsi ginjal
- d. Mencegah infeksi

#### **2.1.7 Pemeriksaan penunjang**

Pemeriksaan penunjang pada pasien CKD menurut (Malisa et al., 2023) ialah :

- a. Pemeriksaan fungsi ginjal (tes darah), ditemukan peningkatan BUN, kreatinin, kalium, magnesium, dan fosfor. Penurunan kadar kalsium, hitung eritrosit, hematokrit, dan hemoglobin, PH darah menunjukkan asidosis.
- b. Urinalisis menunjukkan penurunan berat jenis
- c. Biopsi ginjal menunjukkan destruksi nefron
- d. Radiografi dan ultrasonografi menunjukkan cacat struktural pada ginjal, ureter dan bladder.
- e. Angiografi ginjal menunjukkan adanya obstruksi pembuluh darah.

### 2.1.8 Komplikasi

Menurut (cholina trisa siregar, 2020) fungsi ginjal yang terganggu mengakibatkan terjadinya komplikasi yang berbeda berdasarkan besarnya kerusakan nefron

Tabel 2 komplikasi gagal ginjal kronik

Derajat	Penjelasan	GFR (ml/mnt/1,73m <sup>2</sup> )	komplikasi
1	Kerusakan ginjal dengan GFR Normal	>90	
2	Kerusakan ginjal dengan penurunan ringan GFR	60-89	Peningkatan tekanan darah mulai terjadi
3	Kerusakan ginjal dengan penurunan sedang GFR	30-59	Hiperfosfatemia, hipokalsemia, anemia, hiperparatiroid, hipertensi, hiperhomosisteinemia
4	Kerusakan ginjal dengan penurunan berat GFR	15-29	Malnutrisi, asidosis metabolik, cenderung hyperkalemia, dyslipidemia
5	Gagal ginjal	<15	Gagal jantung dan uremia.

### 2.1.9 Konsep Teori Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat

#### a. Definisi

Aktivitas dan istirahat adalah kebutuhan dasar bagi setiap individu. Setiap orang memiliki pola atau ritme dalam menjalankan aktivitasnya. Kesehatan seseorang bisa diukur dari kemampuannya dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, menjaga kebersihan diri, berlibur, makan dan minum, dan lain sebagainya (Kasiati & ni wayan dwi rosmalawati, 2016).

Aktivitas dapat meningkatkan kesehatan fisik dan memengaruhi cara individu melihat dirinya sendiri dan harga

dirinya. Sementara itu, istirahat adalah keadaan yang tenang, santai, dan bebas dari perasaan gelisah serta tekanan emosional (Kasiati & ni wayan dwi rosmalawati, 2016).

Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Aktivitas adalah segala sesuatu yang dilakukan atau terjadi, baik fisik maupun non fisik. Aktivitas adalah suatu keadaan gerak dimana seseorang harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang memiliki pola atau ritme tersendiri dalam melakukan aktivitas. Salah satu tanda seseorang sehat adalah kemampuannya untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, makan dan minum, kebersihan diri, hobi, dll. Selain aktivitas tubuh yang sehat, juga dapat berdampak pada harga diri dan citra tubuh. (Nurwening & Herry, 2019).

Istirahat adalah keadaan tenang dan rileks, tanpa tekanan emosional atau kecemasan. Istirahat bukan berarti tidak beraktivitas sama sekali, tetapi juga keadaan yang membutuhkan istirahat. Kadang jalan-jalan di taman, nonton TV dan lain-lain bisa juga digambarkan sebagai bentuk istirahat. Keadaan istirahat adalah berhenti sejenak untuk menghilangkan rasa lelah, rileks untuk memulihkan diri, atau keadaan melepaskan diri dari segala sesuatu yang membosankan, sulit, atau bahkan menjengkelkan (Nurwening & Herry, 2019).

Aktivitas dan istirahat sangat penting bagi tubuh, seperti yang diterangkan dalam firman Allah SWT. QS. Al-Furqan/25:47 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

Terjemahnya :

*Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha (Kemenag RI, 2019)*

Dalam tafsir Al-Mishbah, Ayat di atas menyatakan: Dan di antara bukti-bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dialah sendiri yang menjadikan untuk kamu sekalian malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang menutupi diri kamu, dan menjadikan tidur sebagai pemutus aneka kegiatan kamu sehingga kamu dapat beristirahat guna memulihkan tenaga, dan Dia juga menjadikan siang untuk bertebaran antara lain berusaha mencari rezeki, dengan demikian ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kebutuhan aktivitas dan istirahat seseorang untuk memulihkan tenaga dan menjalankan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Potter & Perry, 2012) ada enam karakteristik istirahat, yakni tidak terganggu oleh ketidaknyamanan, merasa diterima, percaya bahwa segala sesuatu dapat diatasi, memahami

situasi yang sedang berlangsung, merasa puas dengan aktivitas yang bermakna, dan yakin bahwa bantuan tersedia saat dibutuhkan.

## **b. Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas dan Istirahat**

Menurut (BHF, 2014) dalam (Sumarta, 2020) faktor yang mempengaruhi aktivitas dan istirahat ialah :

### 1) Faktor Biologis

#### a) Usia

Semakin bertambahnya usia, maka semakin berkurang aktivitas fisik yang dapat dilakukan.

#### b) Jenis Kelamin

Laki-laki lebih aktif dalam beraktivitas fisik daripada perempuan.

### 2) Faktor Demografis

#### a) Sosial Ekonomi

Seseorang dengan sosial ekonomi yang tinggi lebih aktif dari pada yang memiliki sosial ekonomi yang rendah.

#### b) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap tingkat rendahnya melakukan aktivitas fisik.

#### c) Faktor Sosial

Faktor pendukung mempengaruhi partisipasi dalam aktivitas fisik Dukungan sosial dan orang-orang terkasih seperti teman, guru, profesional kesehatan dan pelatih atau pelatih atletik profesional.

d) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dapat memberikan efek positif dalam aktivitas fisik, antara lain:

- i. Akses ke program dan fasilitas tersedia seperti, lapangan, taman bermain dan area olahraga
- ii. Adanya zona pejalan kaki dan jalur bersepeda
- iii. Adanya waktu untuk bermain di luar rumah
- iv. Perbedaan tidak langsung dalam konstruksi bangunan karena dapat mempengaruhi pola aktivitas fisik di perkotaan dan pedesaan.

c. Gangguan yang dapat terjadi

Gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dapat menyebabkan berbagai dampak pada sistem tubuh. Misalnya, dapat terjadi perubahan dalam metabolisme, masalah dalam pemenuhan nutrisi, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan pada sistem pernapasan, gangguan fungsi gastrointestinal, perubahan pada sistem muskuloskeletal, perubahan pada sistem kardiovaskular, masalah dalam eliminasi (buang air besar maupun kecil), masalah kulit, dan perubahan perilaku (Widuri, 2019).

- 1) Perubahan metabolisme, secara umum imobilitas dapat mengganggu metabolisme tubuh atau menyebabkan penurunan laju metabolisme karena Basal Metabolism Rate (BMR) menurun, yang mengakibatkan kurangnya energi. Imobilisasi dapat mengakibatkan penurunan proses anabolisme dan meningkatkan proses katabolisme, yang berpotensi menyebabkan gangguan metabolisme.
- 2) Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi protein dalam serum dan penurunan stok protein, yang berpotensi mengganggu kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, penurunan perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisial bisa menyebabkan pembengkakan (edema), yang mengakibatkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit.
- 3) Gangguan perubahan zat gizi, terjadi ketika asupan protein dan kalori menurun, mengakibatkan penurunan transformasi zat-zat makanan pada tingkat sel. Hal ini disebabkan karena sel tidak menerima glukosa, lemak, asam amino, dan oksigen dalam jumlah yang mencukupi untuk menjalankan aktivitas metabolisme.
- 4) Gangguan fungsi gastrointestinal, imobilitas dapat mengakibatkan penurunan pencernaan makanan yang bisa menimbulkan keluhan seperti kembung perut, nyeri lambung,

dan mual. Keluhan-keluhan tersebut dapat mengganggu proses eliminasi tubuh.

- 5) Perubahan sistem pernapasan, menurut (Kasiati & ni wayan dwi rosmalawati, 2016) dampak yang bisa terjadi akibat imobilisasi ialah penumpukan sekret karena pengaruh gravitasi, penurunan gerakan pernapasan karena pembatasan gerak, kehilangan koordinasi otot, dan atelektasis.
- 6) Perubahan kardiovaskular, seperti peningkatan aktivitas jantung, serta hipotensi ortostatik juga dapat menyebabkan teradinya pembentukan thrombus.
- 7) Perubahan sistem muskulokeletal, Seperti berkurangnya massa otot, penurunan kekuatan otot, serta fungsi dan kapasitas otot yang menurun, ini tercermin dalam menurunnya stabilitas, atrofi otot, kontraktur pada sendi, osteoporosis, dan nyeri sendi.
- 8) Perubahan sistem integument, berupa elastisitas kulit mulai menurun yang disebabkan kurangnya sirkulasi darah serta dapat menimbulkan luka decubitus.
- 9) Perubahan eliminasi, seperti penurunan jumlah output urine yang disebabkan kurangnya asupan dan penurunan curah jantung yang mengakibatkan aliran darah renal dan urine dapat berkurang.
- 10) Perubahan perilaku, seperti munculnya sikap yang lebih antagonis, kecemasan, kebingungan, depresi, tingkat emosi

yang meningkat, penurunan kemampuan untuk mengatasi stres, serta perubahan pola tidur, dapat disebabkan oleh imobilisasi karena individu mengalami perubahan dalam persepsi tentang diri sendiri dan peran mereka, yang dapat menyebabkan kecemasan (Widuri, 2019).

Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan istirahat, beberapa gangguan umum meliputi insomnia (masalah dengan kualitas atau kuantitas tidur), parasomnia (gangguan perilaku saat tidur seperti tidur berjalan, dll), hipersomnia (tidur berlebihan), narkolepsi (gelombang kantuk yang tidak tertahankan), apnea tidur dan mendengkur, serta enuresis (buang air kecil saat tidur) (Kasiati & ni wayan dwi rosmalawati, 2016).



## 2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

### 2.2.1 Konsep teori keperawatan yang terkait

Konsep keperawatan merupakan ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model keperawatan. Teori keperawatan digunakan untuk menyusun suatu model konsep dalam keperawatan sehingga model keperawatan itu sendiri yang memungkinkan perawat untuk menerapkan cara mereka bekerja dalam batas kewenangan sebagai perawat. Salah satu ahli menanggapi terkait model konsep dan teori keperawatan dalam Teori Calista Roy (Nursalam, 2020).

Pada model konseptual adaptasi suster callista roy, ada empat elemen penting yang termasuk dalam model adaptasi keperawatan adalah manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Berikut ini elemen dalam model adaptasi keperawatan Callista roy dalam (Risnah, 2018) yaitu :

#### a. Manusia

Roy mengemukakan bahwa manusia adalah sebuah sistem adaptif. Sebagai sistem adaptif, manusia dapat digambarkan secara holistik sebagai satu kesatuan yang memiliki input, kontrol, output, dan proses umpan balik. Proses kontrol ini merupakan mekanisme koping yang diwujudkan melalui adaptasi. Secara lebih spesifik, manusia didefinisikan sebagai sistem adaptif dengan aktivitas kognator dan regulator untuk mempertahankan adaptasi dalam empat cara: fungsi fisiologi, konsep diri, fungsi peran, dan

interdependensi. Dalam model adaptasi keperawatan, manusia dijelaskan sebagai sistem yang hidup, terbuka, dan adaptif yang dapat mengalami kekuatan dan zat dari perubahan lingkungan. Sebagai sistem adaptif, manusia dapat digambarkan dalam istilah karakteristik sistem.

b. Lingkungan

Lingkungan diartikan sebagai keadaan di dalam dan di luar individu. Lingkungan berfungsi sebagai input bagi manusia yang merupakan sistem yang bisa beradaptasi, seperti lingkungan yang bertindak sebagai stimulus eksternal dan internal. Stimulus tersebut terbagi menjadi tiga jenis: fokal, kontekstual, dan residual. Secara lebih luas, lingkungan mencakup semua kondisi dan situasi di sekitar individu yang memengaruhi perkembangan dan perilaku manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok.

c. Kesehatan

Menurut Roy, kesehatan didefinisikan sebagai proses dan keadaan menjadi manusia secara menyeluruh dan terintegrasi. Keutuhan atau integritas manusia mengimplikasikan bahwa kesehatan atau keadaan yang tidak terganggu merujuk pada kelengkapan atau kesatuan serta pemenuhan potensi manusia yang maksimal. Dengan demikian, integritas menunjukkan kesehatan, sedangkan keadaan tanpa integritas mengindikasikan kesehatan yang kurang. Definisi kesehatan ini mencakup lebih dari sekadar

tidak adanya penyakit, melainkan juga menekankan kondisi kesejahteraan yang optimal.

Dalam model adaptasi keperawatan, konsep kesehatan terkait erat dengan konsep adaptasi. Adaptasi yang efektif memungkinkan penggunaan energi tanpa hambatan dari mekanisme koping yang tidak efektif, sehingga manusia bisa merespons terhadap stimulus lain. Pembebasan energi ini dapat meningkatkan proses penyembuhan dan meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, pembebasan energi ini menjadi penghubung antara konsep adaptasi dan kesehatan.

d. Keperawatan

Roy menggambarkan keperawatan sebagai disiplin ilmu dan praktek. Sebagai ilmu, keperawatan mengobservasi, mengklasifikasikan dan menghubungkan proses yang secara positif berpengaruh pada status kesehatan. Sebagai disiplin, praktek, keperawatan menggunakan pendekatan pengetahuan untuk menyediakan pelayanan pada orang-orang. Lebih spesifik dia mendefinisikan keperawatan sebagai ilmu dan praktek dari peningkatan adaptasi untuk meningkatkan kesehatan sebagai tujuan untuk mempengaruhi kesehatan secara positif. Keperawatan meningkatkan adaptasi individu dan kelompok dalam situasi yang berkaitan dengan kesehatan, Jadi model adaptasi keperawatan menggambarkan lebih spesifik perkembangan ilmu keperawatan

dan praktek keperawatan yang berdasarkan ilmu keperawatan tersebut.

Tujuan keperawatan menurut Roy adalah untuk meningkatkan respon adaptasi dalam hubungannya dengan empat model adaptif. Respon adaptif memiliki pengaruh yang positif terhadap Kesehatan (Asmadi, 2018). Dalam proses penyesuaian diri individu harus meningkatkan energi agar mampu melaksanakan tujuan untuk kelangsungan kehidupan, perkembangan, reproduksi dan keunggulan sehingga proses ini memiliki tujuan untuk meningkatkan respon adaptif.

Asumsi dasar model adaptasi Calista Roy menurut (Paipilaya et al., 2022) sebagai berikut :

- 1) Setiap individu memiliki integrasi keseluruhan dari komponen bio, psiko dan social yang berinteraksi secara konstan dengan lingkungan sekitarnya.
- 2) Dalam menjaga keseimbangan integritas, seseorang harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi melalui kemampuan yang dimiliki.
- 3) Setiap individu pasti akan bekerja keras dalam mempertahankan integritas fisiologi, konsep diri, fungsi peran dan interdependen mode.

- 4) Individu memiliki zona adaptasi yang berhubungan dengan kemampuan responsi individu terhadap rangsangan, kemampuan setiap individu dalam beradaptasi berbeda.
  - 5) Kemampuan individu dalam menjaga kesehatannya tergantung dari energi dan kemampuan yang dimiliki untuk beradaptasi kearah yang positif terhadap sehat, stimulus dan sakit.
- e. Hubungan teori roy dengan studi kasus

Roy beranggapan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatannya bergantung pada energi serta kemampuan yang dimiliki untuk beradaptasi kearah yang positif, Sister Calista roy menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki system adaptasi terhadap berbagai stressor atau stimulus yang dihadapinya (Romana et al., 2023).

Menurut (Hasanah et al., 2020) bila ginjal mengalami kerusakan, semakin banyak ATP yang digunakan untuk pembentukan energi, maka semakin banyak sisa metabolisme, klirens keratin akan menurun dan konsentrasi kreatinin meningkat. Asidosis metabolic sering terjadi karena ketidakmampuan ginjal mengekresikan muatan asam yang berlebihan. Penurunan sekresi asam terutama akibat penurunan tubulus ginjal untuk mengekresikan ammonia dan mengabsorpsi natrium bikarbonat. Penurunan sekresi fosfat dan asam organik lain juga terjadi. Penimbunan asam laktat dapat menghambat enzim-enzim kunci

pada jalur-jalur penghasil energy dan habisnya cadangan energi, hal itu dapat menyebabkan terjadinya kelelahan.

### **2.2.2 Pengkajian keperawatan**

Menurut (Malisa et al., 2023) untuk pasien CKD hal yang perlu dikaji adalah tanda-tanda vital dan masukan dan haluaran cairan. Pemantauan keluaran urin setiap hari untuk menentukan terapi dan volume cairan harian penggantian. Periksa urin dan lihat warna, berat enis, glukosa, protein, darah, dan endapan lihat penampilan umum pasien, termasuk kulit warna, busung, distensi vena jugularis, dan adanya memar.

Jika klien mendapatkan terapi dialisis, amati akses vaskuler terhadap inflamasi dan eksudat. Evaluasi status mental pasien dan tingkat kesadaran. Periksa mukosa mulut terhadap kekeringan dan peradangan. Auskultasi paru-paru biasanya ditemukan ronkhi, atau suara napas berkurang. Pantau bunyi jantung kemungkinan ditemukan suara s3, murmur, tau gesekan perikardial. Kaji pembacaan EKG akan adanya disritmia. Tinjau nilai laboraorium dan hasil uji diagnostik. Semua data sangat penting untuk menentukan rencana perawatan (Malisa et al., 2023).

### **2.2.3 Diagnosis keperawatan**

Diagnosis Keperawatan yang mungkin muncul menurut (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2017), pada masalah pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat adalah :

a. Disorganisasi perilaku bayi

1. Definisi

Disintegrasi respon fisiologis dan neurobehaviour bayi terhadap lingkungan.

2. Penyebab

- a) Keterbatasan lingkungan fisik
- b) Ketidaktepatan sensori
- c) Kelebihan stimulasi sensorik
- d) Imaturitas sistem sensoris
- e) Prematuritas
- f) Prosedur invasi
- g) Malnutrisi
- h) Gangguan motorik
- i) Kelainan kongenital
- j) Kelainan genetik
- k) Terpapar teratogenik

3. Gejala dan tanda mayor

Subjektif

(tidak tersedia)

Objektif

- a) Hiperekstensi ekstemitas
- b) Jari-jari meregang atau tangan menggenggam
- c) Respon abnormal terhadap stimulus sensorik

d) Gerakan tidak terkoordinasi

4. Gejala dan tanda minor

Subjektif

(tidak tersedia)

Objektif

a) Menangis

b) Tidak mampu menghambat respon terkejut

c) Iritabilitas

d) Gangguan refleks

e) Tonus motorik berubah

f) Tangan di wajah

g) Gelisah

h) Tremor

i) Tersentak

j) Aritmia

k) Bradikardia atau takikardia

l) Saturasi menurun

m) Tidak mau menyusu

n) Warna kulit berubah

5. Kondisi klinis terkait

a) Hospitalisasi

b) Prosedur invasif

c) Prematuritas

- d) Gangguan Neurologis
  - e) Gangguan pernapasan
  - f) Gangguan kardiovaskuler
- b. Gangguan mobilitas fisik
1. Definisi :  
Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri
  2. Penyebab
    - a) Kerusakan integritas struktur tulang
    - b) Perubahan metabolisme
    - c) Ketidakbugaran fisik
    - d) Penurunan kendali otot
    - e) Penurunan massa otot
    - f) Penurunan kekuatan otot
    - g) Keterlambatan perkembangan
    - h) Kekakuan sendi
    - i) Kontraktur
    - j) Malnutrisi
    - k) Gangguan muskuloskeletal
    - l) Gangguan neuromuskular
    - m) Indeks masa tubuh diatas persentil ke-75 sesuai usia
    - n) Efek agen farmakologis
    - o) Program pembatasan gerak
    - p) Nyeri

- q) Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik
- r) Kecemasan
- s) Gangguan kognitif
- t) Keengganan melakukan pergerakan
- u) Gangguan sensoripersepsi

### 3. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

Objektif

- a) Kekuatan otot menurun
- b) Rentang gerak (ROM) menurun

### 4. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- a) Nyeri saat bergerak
- b) Enggan melakukan pergerakan
- c) Merasa cemas saat bergerak

Objektif

- a) Sendi kaku
- b) Gerakan tidak terkoordinasi
- c) Gerakan terbatas
- d) Fisik lemah

### 5. Kondisi Klinis Terkait

- a) Stroke

- b) Cedera medula spinalis
  - c) Trauma
  - d) Fraktur
  - e) Osteoarthritis
  - f) Osteomalasia
  - g) Keganasan
- c. Gangguan pola tidur
1. Definisi :  
Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal
  2. Penyebab :
    - a) Hambatan lingkungan (mis. kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan/pemeriksaan/tindakan)
    - b) Kurang kontrol tidur
    - c) Kurang privasi
    - d) Restraint fisik
    - e) Ketiadaan teman tidur
    - f) Tidak familiar dengan peralatan tidur
  3. Gejala dan Tanda Mayor :  
Subjektif
    - a) Mengeluh sulit tidur
    - b) Mengeluh sering terjaga
    - c) Mengeluh tidak puas tidur

- d) Mengeluh pola tidur berubah
- e) Mengeluh istirahat tidak cukup

Objektif

(tidak tersedia)

4. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- a) Mengeluh kemampuan beraktivitas menurun

Objektif

(tidak tersedia)

5. Kondisi Klinis Terkait

- a) Nyeri/kolik
- b) Hipertirodisme
- c) Kecemasan
- d) Penyakit paru obstruktif kronis
- e) Kehamilan
- f) Periode pasca partum
- g) kondisi pasca operasi

d. Intoleransi aktivitas

1. Definisi :

Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari hari

2. Penyebab

- a) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
- b) Tirah baring
- c) Kelemahan

- d) Imobilitas
- e) Gaya hidup monoton

3. Gejala dan Tanda Mayor  
Subjektif

- a) Mengeluh lelah

Objektif

- a) frekuensi jantung meningkat  $>20\%$  dari kondisi sehat

4. Gejala dan Tanda Minor  
Subjektif

- a) Dispnea saat/setelah aktivitas
- b) Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas
- c) Merasa lemah

Objektif

- a) Tekanan darah berubah  $>20\%$  dari kondisi istirahat
- b) Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas
- c) Gambaran EKG menunjukkan iskemia
- d) Sianosis

5. Kondisi Klinis Terkait

- a) Anemia
- b) Gagal jantung kongesif
- c) Penyakit jantung koroner
- d) Penyakit katup jantung
- e) Aritmia

- f) Penyakit paru obstruksi kronis (PPOK)
  - g) Gangguan metabolik
  - h) Gangguan muskuloskeletal
- e. kelelahan
1. Definisi :  
Penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat.
  2. Penyebab
    - a) Gangguan tidur
    - b) Gaya hidup monoton
    - c) Kondisi fisiologis (mis. penyakit kronis, penyakit terminal, anemia, malnutrisi, kehamilan) ‘
    - d) Program perawatan/pengobatan jangka panjang
    - e) Peristiwa hidup negatif
    - f) Stres—berlebihan
    - g) Depresi
  3. Gejala dan Tanda mayor
    - Subjektif
      - a) Merasa energi tidak putih walaupun telah tidur
      - b) Merasa kurang tidur
      - c) Mengeluh lelah
    - Objektif
      - a) Tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin

b) Tampak lesu

4. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

a) Merasa bersalah akibat tidak mampu menjalankan tanggung jawab

b) libido menurun

Objektif

a) Kebutuhan istirahat meningkat

5. Kondisi Klinis Terkait

a) Anemia

b) Kanker

c) Hipotiroidisme/Hipertirodisme

d) AIDS

e) Depresi

f) Menopause

f. kesiapan peningkatan tidur

1. Definisi

Pola penurunan kesadaran alamiah dan periodik yang memungkinkan istirahat adekuat, memperthankan gaya hidup yang diinginkan dan dapat ditingkatkan.

2. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

a) Mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan tidur

b) Mengekspresikan perasaan cukup istirahat setelah tidur

Objektif

a) Jumlah waktu tidur sesuai dengan pertumbuhan perkembangan

3. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

a) Tidak menggunakan obat tidur

Objektif

a) Menerapkan rutinitas tidur yang meningkatkan kebiasaan tidur

4. Kondisi Klinis Terkait

a) Pemulihan pasca operasi

b) Nyeri kronis

c) Kehamilan (periode prenatal/postnatal)

d) Sleep apnea

g. Risiko disorganisasi perilaku bayi

1. Definisi :

Berisiko mengalami disintegrasi respon fisiologis dan neurobehaviour bayi terhadap lingkungan.

2. faktor Risiko

a) Kelebihan stimulasi sensorik

b) Prematuritas

c) Prosedur invasif

- d) Gangguan motorik
- e) Kelainan kongenital
- f) Kelainan genetik

3. Kondisi Klinis Terkait

- a) Hospitalisasi
- b) Prosedur invasif
- c) Prematuritas
- d) Gangguan neurologis
- e) Gangguan kongenital
- f) Kelainan kardiovaskuler

h. Risiko intoleransi aktivitas

1. Definisi :

Beresiko mengalami ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari

2. Faktor Risiko

- a) Gangguan sirkulasi
- b) Ketidakbugaran status fisik
- c) Riwayat intoleransi aktivitas sebelumnya
- d) Tidak berpengalaman dengan suatu aktivitas
- e) Gangguan pernapasan

3. Kondisi Klinis Terkait

- a) Anemia
- b) Gagal jantung kongestif

- c) Penyakit katup jantung
- d) Aritmia
- e) Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK)
- f) Gangguan metabolik
- g) Gangguan muskuloskeletal

#### **2.2.4 Intervensi Keperawatan**

Setelah merumuskan diagnosis keperawatan maka perlu dibuat perencanaan intervensi keperawatan dan aktifitas keperawatan. Tujuan dari perencanaan yaitu untuk mengurangi, mencegah, bahkan menghilangkan masalah keperawatan yang dialami klien. Pada bagian intervensi/perencanaan perawat memutuskan strategi dan intervensi keperawatan yang akan dilakukan dilihat dari etiologi atau factor pendukung pengangkatan diagnosis keperawatan (Rohayati, 2019).

#### **2.2.5 Implementasi keperawatan**

Implementasi keperawatan adalah tahap dimana perawat menjalankan rencana yang telah disusun sebelumnya. Sesuai dengan terminologi SIKI, implementasi terdiri dari dua bagian: pelaksanaan dan pendokumentasian tindakan khusus yang dilakukan untuk pelaksanaan intervensi keperawatan.

Implementasi membutuhkan kreativitas dan fleksibilitas. Sebelum implementasi, penting untuk memahami rasional dari rencana implementasi tersebut. Implementasi terdiri dari tiga tahap. Tahap

pertama adalah persiapan, termasuk pemahaman terhadap validitas rencana dan kesiapan pasien atau keluarga. Tahap kedua fokus pada pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ketiga melibatkan komunikasi perawat dengan pasien setelah tindakan keperawatan dilakukan. (Siska, 2021).

#### **2.2.6 Evaluasi keperawatan**


Evaluasi merupakan sebuah aktivitas yang telah direncanakan, dilakukan secara berkelanjutan serta terarah saat klien dan tenaga Kesehatan menilai kemajuan klien atau hasil keefektifan rencana asuhan keperawatan dengan Tindakan intelektual dalam melengkapi proses keperawatan yang mengindikasikan adanya keberhasilan dalam diagnosis, rencana dan implementasi keperawatan. Pada tahap evaluasi perawat memonitor apa saja yang terjadi selama pengkajian, analisis, intervensi dan implementasi intervensi keperawatan (Agustanti et al., 2023).

Evaluasi menurut (Agustanti et al., 2023) disusun dengan menggunakan SOAP secara operasional, yaitu :

- a. S (subektif) merupakan hal-hal yang dikemukakan oleh keluarga ataupun klien secara subjektif setelah intervensi dilakukan.
- b. O (Objektif) merupakan hal-hal yang didapatkan oleh perawat secara objektif setelah intervensi dilakukan.
- c. A (*Assesment*) merupakan analisis dari hasil yang telah dicapai disesuaikan dengan tujuan yang berkaitan dengan diagnosis.

- d. *P (Planning)* merupakan rencana yang akan datang setelah melihat respon dari keluarga ataupun klien pada tahapan evaluasi.

### 2.2.7 Penyimpangan KDM



## 2.3 Evidence Based Practice in Nursing

Masalah keperawatan yang paling sering muncul pada pasien dengan diagnosis medis CKD (*Chronic Kidney Disease*) atau penyakit gagal ginjal kronik adalah keletihan. Salah satu penatalaksanaan pasien CKD adalah terapi hemodialisis. Hemodialisis biasanya dilakukan selama 4 hingga 5 jam. Pasien yang menjalani hemodialisis menimbulkan tekanan fisik dan keletihan atau kelelahan (*fatigue*) pada pasien. Gejala yang muncul pada pasien CKD antara lain keletihan, keringat dingin dan sakit kepala akibat tekanan darah yang menurun. Penyebab lain yang menyebabkan keletihan adalah status nutrisi yang buruk. Prevalensi keluhan utama pasien yang menjalani hemodialisis yaitu keletihan yakni mencapai 60% sampai 97% (Jafar, 2019).

Penanganan keletihan pada pasien CKD dengan tindakan farmakologi dan non farmakologi. Salah satu tindakan non farmakologi yang dapat diberikan pasien CKD atau gagal ginjal kronik dengan masalah keperawatan keletihan yaitu intervensi Terapi *Slow Deep Breathing*.

### 2.3.1 Definisi

*Slow Deep Breathing* adalah relaksasi yang disadari untuk mengatur pernapasan secara dalam dan lambat. Terapi Relaksasi Napas Dalam adalah pernapasan abdomen dengan frekuensi lambat atau perlahan, berirama, dan nyaman yang dilakukan dengan memejamkan mata. Secara fisiologis, teknik relaksasi nafas dalam lambat akan menstimulasi sistem saraf parasimpatis sehingga meningkatkan produksi endorpin, menurunkan *heart rate*, meningkatkan ekspansi

paru sehingga dapat berkembang maksimal, dan otot-otot menjadi rileks (Pertiwi & Prihati, 2020).

Menurut (Nuraini et al., 2016) *Slow deep breathing* merupakan salah satu penatalaksanaan nonfarmakologi yaitu teknik relaksasi pernafasan dengan menarik nafas secara dalam dan di keluarkan melalui mulut secara lambat. Sedangkan menurut (Putra et al., 2021) *Slow deep breathing*, atau napas dalam dan lambat, adalah strategi *holistik self-care* yang membantu mengatasi berbagai keluhan, termasuk kelelahan. Secara fisiologis, teknik ini merangsang sistem saraf parasimpatik, yang meningkatkan produksi endorfin, menurunkan heart rate, dan meningkatkan ekspansi paru untuk mencapai kapasitas maksimal, sehingga otot-otot menjadi lebih rileks. (Putra et al., 2021).

Teknik relaksasi napas dalam dan lambat memberikan tubuh pasokan oksigen yang adekuat dan memadai. Oksigen memiliki peran krusial dalam sistem pernapasan dan sirkulasi tubuh. Saat kita melakukan teknik ini, oksigen mengalir ke pembuluh darah dan seluruh jaringan tubuh, menghilangkan racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai, meningkatkan metabolisme, dan menghasilkan energi. Ini akan meningkatkan jumlah oksigen yang tersedia untuk seluruh jaringan tubuh, membantu tubuh memproduksi energi dan mengurangi tingkat kelelahan/fatigue. (Pertiwi & Prihati, 2020).

### 2.3.2 Tujuan

Tujuan dari teknik relaksasi *slow deep breathing* adalah untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektasi paru, meningkatkan efisiensi batuk mengurangi stress baik stress fisik maupun emosional yaitu menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan dan menurunkan kelelahan. Tujuan *slow deep breathing* yaitu untuk mengurangi nyeri, Menurunkan tekanan darah, Mengurangi ketegangan otot (Pawestri et al., 2023).

### 2.3.3 Indikasi

Menurut (Ardhiansyah, 2016), adapun indikasi tindakan *slow deep breathing* antara lain :

- a. Klien yang memiliki kesadaran penuh (komposmentis) dan mengalami fatigue dan abnormalitas pernapasan
- b. Klien yang mengalami penumpukan sekret berlebih namun tidak mampu batuk dengan efektif.
- c. Klien tirah baring lama dan memakai bantuan ventilasi
- d. Mobilisasi sekret yang terhambat pada pasien dengan atelectasis akibat sekret, pasien yang menderita abses paru, pasien dengan pneumoni, pasien sebelum dan setelah operasi yang mengalami kecemasan, pasien neurologis dengan kelemahan umum, serta gangguan menelan atau batuk.

#### 2.3.4 Kontraindikasi

Dalam (Ardhiansyah, 2016) menjelaskan kontraindikasi pemberia teknik relaksasi slow deep breathing adalah :

- a. Tension pneumothoraks
- b. Hemoptisis
- c. Gangguan sistem kardiovaskuler seperti infark miokard akut, aritmia.
- d. Pasien kesadaran menurun dan tidak kooperatif mengikuti latihan

#### 2.3.5 Prosedur Penatalaksanaan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Slow Deep Breathing menurut (Fratama, 2022) yaitu:

- a. Menjelaskan kepada pasien serta keluarga mengenai tujuan dan cara melakukan tindakan atau prosedur tindakan serta menanyakan persetujuan pasien dan keluarga untuk diberikan tindakan
- b. Jaga privasi pasien
- c. Mencuci tangan (*hand hygiene*)
- d. Atur posisi pasien dengan posisi duduk atau berbaring
- e. Meletakkan kedua tangan di atas abdomen (perut)
- f. Anjurkan bernapas secara perlahan dan dalam melalui hidung, kemudian menarik napas selama 3 detik. Pasien diminta untuk merasakan pengembangan abdomen saat inspirasi
- g. Tahan napas selama kurang lebih 3 detik

- h. Anjurkan pasien mengerutkan bibir , kemudian menghembuskan lewat mulut secara perlahan selama 6 detik
- i. Lakukan langkah 1-5 selama 10 -15 menit

### 2.3.6 Kriteria evaluasi

- a. Mengeluh lelah menurun
- b. Pola napas normal

### 2.3.7 Artikel utama dan pendukung

Tabel 3 Artikel utama dan pendukung

No	Artikel	Penulis	Tahun	Judul	Sumber
1	Utama	Ria Astarina Pertiwi Dyah dan Restuning Prihati	2020	Penerapan <i>Slow Deep Breathing</i> untuk Menurunkan Kelelahan pada Pasien Gagal Ginjal Kronik	Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan Vol.4, No.1, Sinta 4
2	Pendukung	Ferry Fadli Fratama	2022	Pemanfaatan Terapi <i>Slow Deep Breathing</i> (SDB) Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi: Studi Literatur	Jurnal Skala Kesehatan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Vol.13, No.2,
3	Pendukung	Ambar Kurnia Ramadhani, Nia Risa Dewi, dan Anik Inayati	2023	Penerapan <i>Slow Deep Breathing</i> Terhadap Kelelahan pada Pasien dengan Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa	Jurnal Cendekia Muda Vol.3, No.1.
4	Pendukung	Elis Gresita, Ridlwan Kamauddin, Iwan Purnawan, dan Eva Rahayu	2022	<i>Implementation of Deep Breathing Exercise Therapy to Reduce Fantigue Levels With GGK at Banyumas Hospital: Case Study</i>	<i>International Journal of Biomedical Nursing Riview</i> , Vol 1, No.2. DOAJ

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Studi Kasus**

Studi kasus (*Case Studies*) merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan telaah secara mendalam pada kasus tertentu baik itu bersifat perorangan maupun berkelompok. Pada dasarnya penelitian jenis studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan pola hubungan yang sifatnya timbal balik (interaksi), mendeskripsikan atau memperoleh gambaran realitas yang lengkap, mendapatkan pemahaman sebuah kasus dan menemukan teori (Hidayat, 2021).

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis metode yaitu “Studi Kasus” dimana dalam penyajiannya dilakukan secara mendalam untuk melihat keadaan atau kondisi pasien secara menyeluruh dan tersistematis. Penelitian ini dilakukan secara sistematis mulai dari observasi, wawancara, analisis data, perumusan diagnosis atau masalah keperawatan, menyusun intervensi dan mengimplementasikan intervensi yang telah disusun berdasarkan hasil penelusuran intervensi keperawatan yang tepat untuk masalah keperawatan yang ditemukan kemudian melakukan evaluasi.

Berdasarkan hasil analisis Intervensi yang diberikan berdasarkan EBPN (*Eviden Based Practice in Nursing*) adalah *Slow Deep Breathing* pada

pasien dengan diagnosis keperawatan keletihan dengan diagnosis medis CKD (*Chronic Kidney Disease*) atau penyakit gagal ginjal kronik.

### 3.2 Subjek Studi Kasus

Dalam penelitian kasus ini, penggunaan subjektif bersifat individual, difokuskan pada pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria tersebut antara lain:

#### a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana individu memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam penelitian (Irfannuddin, 2015)

Adapun kriteria inklusi pada karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Pasien yang bersedia menjadi subjek penelitian studi kasus
2. Pasien yang mengalami masalah keperawatan keletihan

#### b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kriteria dari subjektif penelitian yang seharusnya tidak boleh ada didalam penelitian (Setyawan *et al.*, 2020).

Adapun kriteria eksklusi pada karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Pasien yang tidak kooperatif
2. Pasien yang pulang sebelum diberikan intervensi selama 3 hari

### 3.3 Fokus Studi Kasus

Adapun fokus studi kasus dalam penelitian ini adalah melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami keletihan dengan memberikan intervensi *Slow Deep Breathing*.

### 3.4 Instrumen Studi Kasus

Beberapa pendapat terkait instrumen penelitian dalam (Kurniawan, 2021) yakni Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melihat dan mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati. Menurut Editage Insight (2020) menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau sampel mengenai topik atau masalah yang diteliti. Pendapat lain dari DiscoverPhDs (2020) menyebutkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat apa pun yang mungkin digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data, mengukur data, dan menganalisis data yang relevan dengan subjek atau masalah penelitian (Kurniawan, 2021).

Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini ialah format proses asuhan keperawatan, SOP intervensi

### 3.5 Prosedur Pengambilan Data

- a. Tahap Persiapan
  - a) Peneliti mencari pasien dan mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti kemudian peneliti mencari intervensi berbasis *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) untuk mengatasi masalah pada pasien. Kemudian hasil penelusuran intervensi di konsultasikan dengan dosen pembimbing

- b) Peneliti sebelum memberikan intervensi terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perawat dan kepala ruangan untuk melakukan penelitian di ruangan Lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo
  - c) Peneliti sebelum melakukan pengkajian dan pemberian intervensi terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait penelitian yang akan dilakukan
  - d) Peneliti menyiapkan segala bentuk perlengkapan yang digunakan pada pemberian intervensi *Slow Deep Breathing*
- b. Pengumpulan data
- Adapun pengumpulan data diperoleh berdasarkan dari hasil observasi, pengamatan dan hasil wawancara
- c. Penyusunan laporan
- Penyusunan laporan ditulis berdasarkan pedoman karya tulis ilmiah UIN Alauddin Makassar

### 3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dimulai pada tanggal 11 September dan berakhir pada tanggal 13 September 2023.

### 3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data atau pengolahan data merupakan proses yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul dari sumber data, tujuannya agar data menjadi bermakna, dapat diinterpretasikan, dan dapat memberikan informasi. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan, mensistematiskan, menafsirkan,

dan memvalidasi data sehingga suatu fenomena memiliki nilai akademik, ilmiah dan sosial (Suharyat, 2022).

Analisis dan penyajian data dalam studi kasus ini disajikan secara terstruktur dan tekstual berdasarkan fakta-fakta kemudian disajikan dalam bentuk teks dan sifatnya naratif. Analisis data dilakukan mulai dari awal pengumpulan data hingga semua data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan pengkajian berupa observasi dan wawancara, membandingkan teori yang ada dan dituangkan melalui opini kedalam pembahasan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun narasi dari jawaban responden yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini kemudian akan diinterpretasikan oleh peneliti untuk merumuskan intervensi terkait masalah keperawatan yang teridentifikasi. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data disampaikan dalam bentuk uraian naratif dan diberikan interpretasi hasilnya.

### **3.8 Etika Studi Kasus**

Menurut (Wasis, 2006) Dalam penelitian studi kasus ini peneliti menekankan ada beberapa etika keperawatan yaitu:

#### **a. Otonom**

Hak responden untuk memilih apakah disertakan atau tidak dalam proyek penelitian dengan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan dalam *informed consent*. Persetujuan ini diberikan setelah menjelaskan prosedur dan tujuan penelitian.

b. *Beneficence* (Manfaat)

Peneliti selalu berupaya agar segala tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien mengandung kebaikan atau manfaat.

c. *Nonmaleficence*

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hendaknya tidak mengandung unsur bahaya atau merugikan pasien apalagi sampai mengancam jiwa. Penelitian yang dilakukan hendaknya baik untuk pengembangan profesi keperawatan.

d. *Confidentiality*

Peneliti wajib merahasiakan data-data yang sudah dikumpulkan. Seperti nama pasien dan identitas pasien



## BAB IV

## HASIL

### 5.1 Asuhan Keperawatan

#### 4.1.1 Pengkajian Keperawatan

Nama Mahasiswa : Khaedirnur  
NIM : 70900122036

REKAMAN ASUHAN KEPERAWATAN	PENGAJIAN AWAL
<b>A. IDENTITAS</b> Nama : Tn. A Umur : 61 Tahun Pendidikan : SLTA Pekerjaan : Pedagang Suku : Agama : Islam Status perkawinan : Menikah Alamat : Sorong, Papua barat Sumber Informasi : Keluarga pasien dan pasien	Ruang Rawat : Lontara 1 No. Rekam Medik : 01023135 Tgl Masuk : 10- 09-2023 Tgl/Jam Pengambilan Data : 11-09-2023 Diagnosa Masuk : CKD Cara masuk : ( )Berjalan (√) Kursi Roda ( ) Brankar Kiriman dari Poliklinik : Pindahan Dari : IGD Perawat/Tim Yang Bertanggung Jawab : perawat tim A Lontara 1
<b>B. RIWAYAT KESEHATAN</b> Keluhan Utama : Pasien mengatakan mudah lelah	

Keluhan saat

ini

: Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya, pasien mengatakan rutin HD 2x seminggu pada hari senin dan kamis, hari kamis terakhir pasien mengatakan tidak melakukan HD karena latihan menggunakan CAPD, pasien juga mengatakan terkadang mengalami sesak, pasien mengatakan sebelumnya mengalami sesak sehingga harus dirawat, saat ini pasien mengatakan sudah tidak mengalami sesak dan tampak pasien duduk dengan sandaran 60°.

Tidak pernah opname  Pernah Opname dengan sakit : CKD Di RS : RS Wahidin

BB Sebelum Sakit : 59 Kg Pernah Operasi :  Tidak  Pasca Operasi  
Hari Ke : terpasang CAPD sejak 25/7/2023

### C. KEADAAN UMUM

Kesadaran :  CM  Somnolen  Apatis  Soporos Koma  Koma

Pasien Mengerti Tentang Penyakitnya :  Tidak  Ya Pasca Operasi  
: Terpasang CAPD dan DL

TD : 145/101 mmHg

Nadi : 91 X/menit

Pernafasan : 24 X/menit

### D. KEBUTUHAN DASAR

#### NYERI

- Suhu : 36,5<sup>0</sup>C  Gelisah  Nyeri  Skala Nyari :
- Lain-lain : pasien mengatakan tidak merasakan nyeri

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

Ö Nyeri

Ö Hipertermia

Ö Hipotermia

NUTRISI	KEBERSIHAN PERORANGAN
<p>- TB : 161 Cm                      BB : 59 kg</p> <p>- Kebiasaan makan : 3 X/hari (Teratur/<del>tidak teratur</del> <del>teratur</del>)</p> <p>Keluhan saat ini : Pasien mengatakan setiap makan selalu merasa mual, Pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien mengatakan sulit menelan makanan.</p> <p>(√) Tidak Nafsu makan (√) Mual ( ) Muntah (√) Sulit Menelan ( ) Sakit gigi ( ) Stomatitis ( ) Nyeri ulu hati/salah cernah, yang berhubungan dengan</p> <p>- Di sembuhkan dengan :</p> <p>- Pembesaran tiroid : tidak ada</p> <p>- Hernia/Massa : tidak ada</p> <p>- Holitosisi :. Kondisi gigi/gusi :</p> <p>- Penampilan lidah : Tampak bersih Bising Usus 10 X/menit ( ) Makan per NGT/parienteral/Infus (dimulai tgl :.....Jenis cairan.. Dipasang di :</p> <p>- Porsi makan yang di habiskan : pasien mengatakan makan hanya makan +- 5 sendok, tampak porsi makan tidak dihabiskan</p> <p>- Mkanan yang di sukai : pasien mengatakan menyukai apa saja</p> <p>- Diet : pasien mengatakan asupan cairannya dibatasi karena pasien dengan penyakit CKD on HD</p>	<p>- Kebiasaan madi : waslap 1 X/hari</p> <p>- Cuci rambut : - X/hari</p> <p>- Kebiasaan gosok gigi : -X/hari</p> <p>- Kebersihan badan : ( √ ) Bersih ( ) Kotor</p> <p>- Keadaan rambut : ( √ ) Bersih ( ) Kotor</p> <p>- Keadaan kulit kepala : ( √ ) Bersih ( ) Kotor</p> <p>- Keadaan kuku : (√) Pendek ( ) panjang (√) Bersih ( ) Kotor</p> <p>- Keadaan vulva/perineal : ( √ ) Bersih ( ) Kotor</p> <p>- Keluhan saat ini: ( ) eritema ( ) gatal-gatal ( ) luka</p> <p>- Integritas kulit : ( ) Jaringan parut ( ) Kemerahan ( ) Laserasi ( ) userasi ( ) Ekimosis ( ) lepuh ( ) Drainase</p> <p>- Luka Bakar : (Derajat/Persen</p> <p>- Tandai lokasi dengan menggambar bentuk depan dan belakan tubuh</p> <p>- Keadaan luka : ( ) Bersih ( ) Kotor</p> <p>- Lain-lain : Tidak ada luka namun nampak terpasang alat CAPD pada bagian abdomen dan DLC di subcavia kanan</p>

Masalah keperawatan :	Masalah Keperawatan				
<b>CAIRAN</b>	<b>AKTIVITAS &amp; LATIHAN</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebiasaan minum : +- 500 CC/hari . Jenis : air putih</li> <li>- Turgor kulit : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Kering ( ) Tidak elastic</li> <li>- Punggung kuku : tampak normal Warna merah muda Pengisian kapiler : &lt; 2 detik</li> <li>- Mata cekung : ( ) Tidak ( ) Ya : Ka/Ki</li> <li>- Konjungtiva : pucat Sklera : tidak ikterik</li> <li>- Edema : ( ) Tidak ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Ya : pretebia bilateral</li> <li>- Distensi vena jugularis : tidak ada</li> <li>- Asites : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Tidak ( ) Ya</li> <li>Spider Neavi : ( ) Tidak ( ) Ya</li> <li>Minum per NGT : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Tidak ( ) Ya : CC/hari.</li> <li>Terpasang dekopresi (NGT):( <input checked="" type="checkbox"/> ) Tidak ( ) Ya : CC/hari</li> <li>Dimulai tgl : .....Jenis Cairan.....Dipasang di : .....</li> <li>- Terpasang infuse : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Tidak ( ) Ya tts/menit</li> <li>- Lain-lain :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas waktu luang : pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah Aktivitas/Hoby : pasien mengatakan hanya di tempat tidur</li> <li>- Kesulitan bergerak : ( ) Tidak ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Ya</li> <li>- Kekuatan otot : <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;">5</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot : Lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Postur : Normal Tremor : tidak</li> <li>- Keluhan saat ini : gerakan terbatas : ( ) Tidak ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Ya</li> <li>( ) Nyeri Otot ( ) Kaku otot ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Lemah Otot ( ) Nyeri sendi ( ) bengkak sendi ( ) Inkooordinasi ( ) Parise/paralise : dibagian : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Keletihan ( ) Amputasi ( ) Deformitas Kelainan bentuk ekstremitas : tampak edema pada kedua kaki</li> <li>- Penggunaan alat bantu : <del>gips/ Traksi/ Kruk (tongkat)</del></li> <li>- Pelaksanaan aktivitas : ( ) Mandiri ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Parsial ( ) Total</li> <li>- Jenis aktifitas yang perlu dibantu : tampak pasien dibantu berajalan</li> </ul>	5	5	4	4
5	5				
4	4				

	<p>oleh keluarga</p> <p>- Lain-lain :</p> <p>Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas. Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</p>
Masalah Keperawatan	Masalah Keperawatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keletihan</li> </ul>
<b>ELIMINASI</b>	<b>OKSIGENIASI</b>
<p>- Kebiasaan BAB : 1 X/hari BAK : 2 X/hari</p> <p>- Menggunakan laksan : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) tidak ( ) ya.</p> <p>Jenis</p> <p>- Menggunakan diuretic : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) tidak ( ) ya.</p> <p>Jenis :</p> <p>- Keluhan BAK Saai ini :</p> <p>( ) Retensi urin ( ) inkontinensia urin ( ) disuria</p> <p>( ) Keseringa ( ) Urgensi ( ) Nocturia</p> <p>- Peristalti usus : normal</p> <p>- Abdomen : Nyri Tekan : tidak ada nyeri tekan Lunak/<del>keras</del></p> <p>- Terpasang kateter urine : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Tidak ( ) ya</p> <p>- Pengguna alcohol : tidak pernah</p> <p>- Lain-lain :</p>	<p>Bunyi Nafas : ronkhi</p> <p>- Respirasi : ( )TAK ( )Dispnea ( <input checked="" type="checkbox"/> )Ronchi ( )stridor ( )Wheezing ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Batuk ( )hemoptisis ( )Sputum ( ) Pernafasan Cuping hidung ( ) Penggunaan otot-otor sensoris</p> <p>- Kedalaman : - Fremitus : -</p> <p>- Sputum : ( <input checked="" type="checkbox"/> )kental ( )encer( )merah( )putih ( ) hijau ( ) kuning</p> <p>- Sirkulasi oksigenasi : ( )TAK ( )Pusing ( )Sianosis ( ) akral dingin ( ) clubbing finger</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dada : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) TAK ( ) retraksi dada ( ) nyari dada ( ) berdebar-debar ( ) defisiensi trackhea ( ) bunyi jantung Normal Mur-mur ( ) gallop</li> <li>- Oksegien ( Tanggal : 10 september</li> <li>- WSD ( tanggal : Canula/Sungkup : 3 Ltr/m</li> <li>- Riwayat penyakit : ( ) bronchitis ( ) Asma ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Tuberkulosis ( ) Empisema ( <input checked="" type="checkbox"/> ) pneumonia kambuhan: ..... ( ) pemanjangan terhadap udara berbahaya : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Perokok Pak/hari : 1 bungkus Lamanya : 15 tahun telah berhenti 1 tahun yang lalu ( <input checked="" type="checkbox"/> ) hipertensi ( ) demam rematik ( ) flebitis ( ) kesemutan ( ) kebas</li> <li>- Lain-lain : pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya pada malam hari, pasien mengatakan sesaknya mengganggu tidurnya, pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring, pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul>
Masalah keperawatan	<p>Masalah keperawatan</p> <p>Ö Bersihan jalan nafas tidak efektif</p>

<b>TIDUR DAN ISTIRAHAT</b>	<b>PENCEGAHAN TERHADAP BAHAYA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebiasaan tidur : (√) Malam ( ) Siang</li> <li>- Lama Tidur : Malam: 2-3. Jam Siang : 1 jam</li> <li>- Kebiasaan tidur :tidak ada</li> <li>- Kebiasaan tidur : pasien mengatakan tidurnya kurang baik sejak ia mengalami sesak</li> <li>- Lain-lain : -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Refleksi : (√) tidak ( ) kelumpuhan</li> <li>- Penglihatan : (√) tidak ( ) masalah</li> <li>- Pendengaran: (√) tidak ( ) masalah</li> <li>- Penciuman : (√) tidak ( ) masalah</li> <li>- Perabaan : (√) tidak ( ) masalah</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
Masalah Keperawatan	Masalah Keperawatan
<b>NEUROSENSORIS</b>	<b>KEAMANAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasa Ingin Pingsan/Pusing : (√) Tidak ( ) Ya</li> <li>- Stroke (gejala sisa) : .</li> <li>- Kejang : (√) Tidak ( ) Ya Tipe : -</li> <li>Aura : -</li> <li>Frekuensi : -</li> <li>Status postika :-</li> <li>Cara Mengontrol :-</li> <li>Status Mental : terorientasi/Disorientasi : waktu : baik</li> <li>Tempat : baik</li> <li>Orang : baik</li> <li>Kesadaran : ( ) mengantuk ( ) letargi ( ) stupor</li> <li>( ) koma (√) kooperatif ( ) menyerang ( ) delusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alergi/sensitivitas</b> : pasien mengatakan tidak ada alergi</li> <li>Perubahan system imun sebelumnya: -penyebab:-</li> <li>Riwayat penyakit hubungan seksual (tanggal/tipe) :-</li> <li>Perilaku resiko tinggi : -</li> <li>Transfuse darah/jumlah : -</li> <li>Gambaran reaksi :-</li> <li>Riwayat cedera kecelakaan : pernah jatuh dikamar mandi karena tiba-tiba merasa lemas</li> </ul>

<p>( ) halusinasi afek (gambaran) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memori : saat ini baik yang lalu : baik</li> <li>- Kaca mata: pasien tidak menggunakan kacamata</li> <li>- Alat bantu dengar : (√) tidak ( ) ya</li> <li>- Ukuran/reaksi pupil : isokor</li> <li>.....</li> <li>- Facial drop : ( ) tidak ( ) kaku kuduk ( ) tidak ( ) ya</li> <li>- Genggaman tangan/lepas : ka/ki : lemah</li> <li>- Koordinasi : - reflex patella ka/ki : -</li> <li>- Reflex tendon dalam bisep/trisep:-</li> <li>- Kernig sign : ( ) Tidak ( ) Ya</li> <li>- Babinsky : ( ) tidak ( ) ya</li> <li>- Chaddock : ( ) tidak ( ) ya</li> <li>- Brudinsky : ( ) tidak ( ) ya</li> </ul>	<p>Fraktur/dislokasi : -</p> <p>Arthritis/sendi tak stabil : -</p> <p>Masalah punggung : -</p> <p>Perubahan pada tahi lalat : -</p> <p>Pembesaran nodus : -</p> <p>Kekuatan umum : -</p> <p>Cara berjalan : cara beralan normal, tapi dibantu oleh keluarga, terkadang juga menggunakan kursi roda</p> <p>Rom : aktif</p> <p>Hasil kultur, pemeriksaan system imun : -</p>
<p>Masalah Keperawatan :</p>	<p>Masalah Keperawatan :</p>
<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SEKSUALITAS ALAUDDIN MAKASSAR</p>	
<p>- Aktif melakukan hubungan seksual : (√) tidak ( ) ya</p> <p>- Penggunaan kondom</p> <p>- Masalah-masalah/kesulitan seksual</p> <p>- Perubahan terakhir dalam frekuensi /minat.</p> <p><b><u>Wanita</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia menarke : ..... Thn, lamanya siklus : .....hari</li> <li>- Durasi : .....</li> <li>- Periode menstruasi terakhir : ..... menopause:</li> </ul>	<p><b>Pria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabes Penis : -</li> <li>- gangguan Prostat :-</li> <li>- Sirkumsisi : ( ) tida ( √) ya</li> <li>- Vasektomi : ( ) Tidak ( ) Ya</li> <li>- Melakukan pemeriksaan sendiri:</li> <li>- Payudara/testis :</li> <li>- Prostoskopi/pemeriksaan Prostat terakhir :</li> </ul> <p><b>Tanda ( Obyektif)</b></p>

<p>.....</p> <p>- Rabas vagina :..... Perdarahan antar periode :.....</p>	<p>Pemeriksaan ;:payudara/Penis/Testis : .....</p> <p>Kulit genetalia/Lest :</p>
<p>Masala Keperawatan :</p>	
<p><b>KESEIMBANGAN &amp; PENINGKATAN HUBUNGAN RESIKO SERTA INTERAKSI SOSIAL</b></p>	
<p>- Lama perkawinan : 33 tahun, hidup dengan : istri</p> <p>- Malasa-masalah kesahatan/stress : pasien mengatakan kadang cemas dengan masalah kesehatannya tapi istrinya selalu ada untuk dirinya sehingga tidak terlalu memikirkan penyakitnya</p> <p>- Cara mengatasi stress : pasien bercerita dengan keluarganya</p> <p>- Orang Pendukung Lain : anaknya</p> <p>- Peran Dalam Struktur Keluarga :kepala keluarga</p> <p>- Masalah-masalah Yang berhubungan Dengan Penyakit/Kondisi : -</p> <p>- <b>Prikologis</b> : (√) Tak ( ) gelisah ( ) Takut ( )Sedih( )Rendah diri ( )Hiperaktif ( )acu tak acuh ( )marah ( )Mudah Tersinggung ( ) merasa Kurang sempurna ( ) Eurofik ( ) tidak Sabar</p> <p>- Keputusan asaan : tidak ada</p> <p>- Ketidak berdayaan :tidak ada</p>	<p>- Sosiologis : ( ) tidak ( ) menarik diri (√) komunikasi lancer ( ) komunikasi tidak lancer ( ) afasia ( ) isolasi diri ( ) amuk</p> <p>- Perubahan bicara : <del>penggunaan alat bantu komunikasi</del></p> <p>- Adanya laringektomi : Komunikasi verbal/nonverbal dengan keluarga/orang terdekat lain :</p> <p>- Spiritual : ( ) tak (√) dibantu dalam beribadah ( ) spiritual distress</p> <p>- Kegiatan keagamaan :pasien mengatakan selama sakit tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan tapi, rutin membaca al-qur an dan sholat</p> <p>- Gaya hidup : -</p> <p>- Perubahan terakhir :-</p>


Masalah keperawatan :

**E. PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN**

1. Bahasa dominan (khusus) : bahasa daerah
    - Ô Buta huruf :
    - Ô Ketidakmampuan belajar khusus :
    - Ô Keterbatasan kognitif
  2. Informasi yang telah disampaikan :
    - Ô pengaturan jam besuk
    - Ô hak dan kewajiban klien
    - Ô tim / petugas yang merawat
    - Ô lain-lain : lokasi kamar mandi
  3. Masalah yang telah dijelaskan :
    - Ô perawatan diri dirumah sakit
    - Ô obat-obatan yang diberikan
- Obat yang diresepkan (lingkari dosis yang terakhir) :

Obat	Dosis	Waktu	rute
Furosemid	200 mg	Setiap 24 jam	Syringe pump
Amlodipin	10 mg	Setiap 24 jam	oral
Captopril	25 mg	Setiap 24 jam	oral
Kalitake	5 gr	Setiap 8 jam	oral

**F. DATA GENOGRAM**



□ : Laki-laki

○ : Perempuan

— : Garis Pernikahan

⊗ : Meninggal

↗ : Pasien

— : Garis Keturunan

- - - : Serumah



G1 : pasien mengatakan kedua orang tuaya telah lama meninggal karena penyebab yang tidak diketahui

G2 : Pasien mengatakan ia anak terakhir dari 5 bersaudara, dan hanya ia yang mengalami gagal ginjal

G3 : Anak pasien dan keduanya telah menikah


**G. DATA PEMERIKSAAN PENUNJANG (diagnostic & laboratorium)**

Pemeriksaan Labolatorium 10/9/2023

No	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
<b>HEMATOLOGI</b>				
1	WBC	10,00	4.00 – 10.00	10 <sup>3</sup> /ul
2	RBC	3,25	4.00 – 6.00	10 <sup>6</sup> /ul
3	HGB	9,1	12.0 – 16.0	gr/dl
4	HCT	26	37.0 – 48.0	%
5	MCV	81	80.0 – 97.0	fL
6	MCH	28	26.5 – 33.5	pg
7	MCHC	35	31.5 – 35.0	gr/dl
8	PLT	136	150 – 400	10 <sup>3</sup> /ul
9	RDW-SD	43,8	37.0 – 54.0	fL
10	RDW- CV	14,6	10.0 – 15.0	
11	PDW	9,7	10.0 – 18.0	fL
12	MPV	9,2	6.50 – 11.0	fL
13	P-LCR	-	13.0-43.0	%
14	PCT	0.00	0.15 – 0.50	%
15	NEUT	41,	52.0 – 75.0	%
16	LYMPH	16,5	20.0 – 40.0	%
17	MONO	8,9	2.00 – 8. 00	10 <sup>3</sup> /ul
18	EO	31,9	1.00 – 3. 00	10 <sup>3</sup> /ul
19	BASO	0.8	0.00 – 0.10	10 <sup>3</sup> /ul
20	LED I	0.00	0.00-0.10	10 <sup>3</sup> /ul
21	LED jam III		L<10, P>20	mm
22	GDS	99	140	mg/dl
23	Ureum	150	10-50	mg/dl
24	Kreatinin	9,56	L(<1.3);P(<1.1)	mg/dl
25	SGOT	26	<38	U/L
26	SGPT	15	<41	U/L
27	Natrium	129	136-145	mmol/l
28	Kalium	5,4	3.5-5.1	mmol/l
29	Klorida	97	97-111	mmol/l

**Pemeriksaan Radiologi : Foto thorax tanggal 31 agustus 2023****Kesan**

- Terpasang DLC pada hemithorax kanan melalui vena subclavia kanan dengan tip setinggi CV T6-T7, kesan pada cavoatrial junction
- Pneumonia bilateral
- Cardiomegaly disertai edema plumonum
- Efusi pleura bilateral terutama kanan



## 1. KLASIFIKASI DATA

DATA OBJEKTIF	DATA SUBJEKTIF				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot               <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">- 5</td> <td style="padding: 0 10px;">- 5</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">- 4</td> <td style="padding: 0 10px;">- 4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 agustus 2023               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumonia bilateral</li> <li>Cardiomegaly disertai edema plumonum</li> <li>Efusi pleura bilateral terutama kanan</li> </ul> </li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> <li>- IMT : 22,7</li> <li>- tampak porsi makan tidak dihabiskan</li> </ul>	- 5	- 5	- 4	- 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</li> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan ++ 5 sendok</li> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul>
- 5	- 5				
- 4	- 4				

## 2. KATEGORISASI DATA

KATEGORI DAN SUB KATEGORI		DATA SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
FISIOLOGI	RESPIRASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pneumonia bilateral</li> <li>- Cardiomegaly disertai edema plumonum</li> <li>- Efusi pleura bilateral terutama kanan</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> </ul>
	SIRKULASI	Tanda tanda vital N : 91x/menit TD : 14/101 mmHg S : 36,5` C HGB : 9,1 gr/dl Pemeriksaan GDS : 99
	NUTRISI DAN CAIRAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien menagatakan setiap makan selalu merasa mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan +- 5 sendok, tampak porsi makan tidak dihabiskan</li> <li>- Kebiasaan minum : +- 500 CC/hari .</li> </ul>
	ELIMINASI	Kebiasaan BAB : 1 X/hari BAK : 2 X/hari
	AKTIVITAS DAN ISTIRAHAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas waktu luang : pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>Aktivitas/Hoby : pasien mengatakan hanya di tempat tidur</li> <li>- Kesulitan bergerak : ( ) Tidak (√) Ya</li> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul>

KATEGORI DAN SUB KATEGORI		DATA SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF						
		<p>- Kekuatan otot :</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">4</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">4</td> </tr> </table> <p>- Tonus otot : Lemah pada ektrimitas bawah</p> <p>- Pelaksanaan aktivitas : ( ) Mandiri (√) Parsial ( ) Total</p>	5		5	4		4
5		5						
4		4						
	<b>NEUROSENSORY</b>							
	<b>REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS</b>							
<b>PSOKOLOGIS</b>	<b>NYERI DAN KENYAMANAN</b>							
	<b>INTEGRITAS EGO</b>							
	<b>PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN</b>	61 tahun						
<b>PERILAKU</b>	<b>KEBERSIHAN DIRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebiasaan madi : waslap 1 X/hari</li> <li>- Cuci rambut : - X/hari</li> <li>- Kebiasaan gosok gigi : -X/hari</li> </ul>						
	<b>PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN</b>							
<b>RELASIONAL</b>	<b>INTERAKSI SOSIAL</b>							
<b>LINGKUNGAN</b>	<b>KEAMANAN DAN PROTEKSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riwayat cidera kecelakaan : pernah jatuh dikamar mandi karena tiba-tiba merasa lemas</li> <li>- Cara berjalan : cara beralan normal, tapi dibantu oleh keluarga, terkadang juga menggunakan kursi roda</li> </ul>						

### 3. ANALISA DATA

No	SIGN/SIMPTON/ DATA	ETIOLOGI/ PENYEBAB	PROBLEM/ MASALAH KEPERAWATAN
1.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 Agustus 2023 Pneumonia bilateral Cardiomegaly disertai edema pulmonum Efusi pleura bilateral terutama kanan</li> </ul>	<p>Pneumonia</p> <p>↓</p> <p>Peradangan pada bronkus menyebar ke parenkim paru</p> <p>↓</p> <p>Akumulasi sekret</p> <p>↓</p> <p>Sekret menumpuk pada bronkus</p> <p>↓</p> <p>Bersihkan jalan napas tidak efektif</p>	<p>Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif</p>
2.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah</li> </ul>	<p>CKD</p> <p>↓</p> <p>Fungsi ginjal menurun</p>	<p>Keletihan</p>

	<p>lelah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</li> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot</li> </ul> <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>-</td> <td>5</td> <td> </td> <td>-</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>4</td> <td> </td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>	-	5		-	5	-	4		-	4	<pre> graph TD     A[Eritropotin menurun] --&gt; B[Eritrosit menurun]     B --&gt; C[Anemia]     C --&gt; D[HB turun]     D --&gt; E[Oksigen dalam darah menurun]     E --&gt; F[Keletihan]     F --&gt; G[CKD]   </pre>	
-	5		-	5									
-	4		-	4									
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan +- 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> </ul>	<pre> graph TD     A[CKD] --&gt; B[Kerusakan tubulus]   </pre>	Risiko Desifisit Nutrisi										


<ul style="list-style-type: none"><li>- IMT : 22,7</li><li>- tampak porsi makan tidak dihabiskan</li></ul>	<p>Terganggunya fungsi absorpsi, sekresi, eksresi</p> <p>↓</p> <p>Menumpuknya toksik metabolik</p> <p>↓</p> <p>Urenia</p> <p>↓</p> <p>Gangguan keseimbangan asam basa</p> <p>↓</p> <p>Iritasi lambung</p> <p>↓</p> <p>Asam lambung meningkat</p> <p>↓</p> <p>Mual, muntah</p> <p>↓</p> <p>Risiko defisit nutrisi</p>	
--	--	--

## 5.2 Diagnosis Keperawatan

NO.	DIAGNOSIS	TANGGAL DITEMUKAN	TANGGAL TERATASI
1.	<p>Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 Agustus 2023               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumonia bilateral</li> <li>Cardiomegaly disertai edema pulmonum</li> <li>Efusi pleura bilateral terutama kanan</li> </ul> </li> </ul>	11-September-2023	-

2.	<p>Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</li> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">- 5</td> <td style="padding: 0 10px;">- 5</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">- 4</td> <td style="padding: 0 10px;">- 4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>	- 5	- 5	- 4	- 4	11-September-2023	13- september-2023
- 5	- 5						
- 4	- 4						

3.	<p>Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan +- 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> <li>- IMT : 22,7</li> <li>- tampak porsi makan tidak dihabiskan</li> </ul>	11-September-2023	13- september-2023
----	--	-------------------	--------------------



### 5.3 Intervensi Keperawatan

No.	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	LUARAN KEPERAWATAN	INTERVENSI KEPERAWATAN	RASIONAL
1.	<p>Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 agustus 2023 Pneumonia bilateral Cardiomegaly disertai edema</li> </ul>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan bersihan jalan napas meningkat dari rentan sedang menjadi meningkat, dengan kriteria hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frekuensi napas dari rentan sedang menjadi membaik</li> <li>2. Pola napas membaik dari rentan sedang menjadi membaik</li> </ol>	<p>Manajemen Jalan Napas (I.01011)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, mengi, wheezing, ronkhi kering)</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisikan Semi-Fowler atau Fowler</li> <li>2. Berikan Oksigen, Jika perlu</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajarkan teknik batuk efektif</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui pola napas pasien</li> <li>- Untuk mengetahui apakah terdapat bunyi napas tambahan</li> <li>- Untuk mengurangi sesak pasien</li> <li>- Agar sesak pasien berkurang</li> <li>- Agar sputum dapat dikeluarkan</li> </ul>

	<p>plumonum</p> <p>Efusi pleura bilateral terutama kanan</p>			
2.	<p>Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</li> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan tingkat keletihan menurun dari rentan sedang menjadi meningkat dengan kriteria hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat dari rentan sedang menjadi meningkat</li> <li>2. Pola napas membaik dari rentan sedang menjadi meningkat</li> </ol>	<p>Manajemen Energi (I.05178)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan</li> <li>2. Monitor pola dan jam tidur</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan)</li> <li>2. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan (terapi slow deep breathing)</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi keletihan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan</li> <li>- Untuk mengetahui pola tidur pasien</li> <li>- Untuk meningkatkan kenyamanan pasien</li> <li>- Untuk menenangkan pasien</li> <li>- Agar pasien paham cara mengurangi keletihan</li> </ul>

	<p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- 5</td> <td style="padding: 2px 5px;"> </td> <td style="padding: 2px 5px;">- 5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- 4</td> <td style="padding: 2px 5px;"> </td> <td style="padding: 2px 5px;">- 4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot lemah pada ekstremitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>	- 5		- 5	- 4		- 4			
- 5		- 5								
- 4		- 4								
3.	<p>Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan + 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> </ul>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan status menelan membaik dari rentan sedang menjadi meningkat dengan kriteria hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha menelan meningkat dari rentan sedang menjadi meningkat</li> </ol>	<p>Manajemen Nutrisi (I.03119)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik</li> <li>2. Monitor berat badan</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan oral hygienis sebelum makan, jika perlu</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memudahkan masuknya nutrisi</li> <li>- Untuk mengontrol berat badan</li> <li>- Untuk menjaga kebersihan mulut pasien</li> </ul>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IMT : 22,7</li> <li>- tampak porsi makan tidak dihabiskan</li> </ul>			- Untuk kenyamanan pasien
--	---	--	--	---------------------------

#### 5.4 Implementasi Keperawatan

NO DX	Diagnosis Keperawatan	Waktu	IMPLEMENTASI	NAMA JELAS
2.	Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dibuktikan dengan  DS :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai</li> </ul>	11-september-2023  10:00  10:15  10:20  10:25	Observasi  1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan Hasil : Keletihan diakibatkan karena penyakitnya CKD  2. Memonitor pola dan jam tidur Hasil : pasien mengatakan kadang teraga saat malam karena sesak  Terapeutik  1. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus Hasil : pasien dianjurkan menggunakan sampiran saat akan istirahat  2. Memberikan aktivitas distraksi yang	Khaedirnur

	<p>berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot</li> </ul> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>	-	5		-	5	-	4		-	4	<p style="text-align: center;">10:30</p>	<p>menenangkan Hasil : pasien diberikan relaksasi slow deep breathing</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan Hasil : pasien dianjurkan untuk sering melakukan relaksasi napas</li> </ol>	
-	5		-	5										
-	4		-	4										
<p>1.</p>	<p>Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun</li> </ul>	<p style="text-align: center;">11-september-2023</p> <p style="text-align: center;">11:00</p> <p style="text-align: center;">11:15</p> <p style="text-align: center;">11:20</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) Hasil : Napas sedikit cepat, RR : 24x/menit Spo2 : 95%</li> <li>2. Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : Ronkhi</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memposisikan Semi-Fowler atau Fowler</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Khaedirnur</p>										

	<p>yang lalu</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 agustus 2023</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">Pneumonia bilateral Cardiomegaly disertai edema plumonum Efusi pleura bilateral terutama kanan</p>	11:25	<p>Hasil : Pasien doposisikan head up 60°</p> <p>2. Memberikan Oksigen, Jika perlu Hasil : pasien mengatakan belum membutuhkan oksigen</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Mengajarkan teknik batuk efektif Hasil : Pasien paham cara batuk efektif</p>	
3.	<p>Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan +- 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> </ul>	<p>11-september-2023</p> <p>13:00</p> <p>13:15</p> <p>13:20</p>	<p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric Hasil : pasien menerima pemasangan NGT, tapi belum ada rencana pemasangan</p> <p>2. Memonitor berat badan Hasil : BB : 59 Kg</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Melakukan oral hygienis sebelum makan, jika perlu Hasil : Pasien Mengatakan akan sikat gigi</p>	Khaedirnur

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BB : 59 Kg</li> <li>- IMT : 22,7</li> <li>- tampak porsi makan tidak dihabiskan</li> </ul>	13:25	<p>tiap pagi, dan kumur-kumur sebelum makan</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajarkan posisi duduk, jika mampu</li> </ol> <p>Hasil : Pasien nyaman dalam posisi duduk</p>	
1.	<p>Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> </ul>	<p>12-september-2023</p> <p>09:00</p> <p>09:15</p> <p>09:20</p> <p>09:25</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>2. Memonitor bunyi napas tambahan</li> </ol> <p>Hasil : Napas sedikit cepat, RR : 25x/menit</p> <p>Hasil : Ronkhi</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memosisikan Semi-Fowler atau Fowler</li> <li>2. Memberikan Oksigen, Jika perlu</li> </ol> <p>Hasil : Pasien posisi duduk condong kedepan, pasien dianjurkan saat malam hari tidur dengan posisi semi fowler</p> <p>Hasil : pasien diberikan oksigen nasal canul 3 ltr/menit</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajarkan teknik batuk efektif</li> </ol> <p>Hasil : Pasien paham cara batuk efektif tapi</p>	Khaedirnur

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 agustus 2023 Pneumonia bilateral Cardiomegaly disertai edema plumonum Efusi pleura bilateral terutama kanan</li> </ul>		belum mencoba	
2.	<p>Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</li> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah</li> </ul>	<p>12-september-2023</p> <p>10:00</p> <p>10:15</p> <p>10:20</p> <p>10:25</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan Hasil : Keletihan diakibatkan karena penyakitnya CKD</li> <li>2. Memonitor pola dan jam tidur Hasil : pasien mengatakan semalam tidur saat selesai sholat isya, dan terjaga pada pukul 01:00 karena sesak dan belum bisa tidur kembali</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus Hasil : pasien mengatakan lingkungannya nyaman</li> <li>2. Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan Hasil : pasien mengatakan rileks setiap</li> </ol>	Khaedirnur

	<p>dirasakan sepanjang hari.</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">- 5</td> <td style="padding: 0 5px;">- 5</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">- 4</td> <td style="padding: 0 5px;">- 4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>	- 5	- 5	- 4	- 4	10:30	<p>sudah melakukan relaksasi</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan Hasil : pasien dianjurkan untuk sering melakukan relaksasi napas</li> </ol>	
- 5	- 5							
- 4	- 4							
3.	<p>Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan +- 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> </ul>	<p>12-september-2023</p> <p>11:00</p> <p>11:15</p> <p>11:20</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric Hasil : pasien menerima pemasangan NGT, tapi belum ada rencana pemasangan dari dokter</li> <li>2. Memonitor berat badan Hasil : BB : 59 Kg</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan oral higienis sebelum makan, jika perlu Hasil : Pasien Mengatakan akan sikat gigi tiap pagi, dan kumur-kumur sebelum makan,</li> </ol>	Khaedirnur				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IMT : 22,7</li> <li>- tampak porsi makan tidak dihabiskan</li> </ul>	11:25	<p>namun pasien belum makan karena sesak</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu Hasil : Pasien nyaman dalam posisi duduk</li> </ol>	
2.	<p>Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</li> </ul>	<p>13-september-2023</p> <p>09:00</p> <p>09:15</p> <p>09:20</p> <p>09:25</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan Hasil : Keletihan diakibatkan karena penyakitnya CKD</li> <li>2. Memonitor pola dan jam tidur Hasil : pasien mengatakan semalam tidurnya cukup baik, pasien tidur sekitar pukul 11 dan terbangun pukul 05:00</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus Hasil : pasien mengatakan lingkungannya nyaman</li> <li>2. Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan Hasil : pasien diberikan teknik relaksasi</li> </ol>	Khaedirnur

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- 5</td> <td>- 5</td> </tr> <tr> <td>- 4</td> <td>- 4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>	- 5	- 5	- 4	- 4	<p>09:30</p>	<p>slow deep breathing, pasien mengatakan rileks setelah diberikan relaksasi, pasien mengatakan sering melakukannya saat malam hari sebelum tidur atau saat sesak, pasien juga mengatakan sudah tidak terlalu merasa lelah saat kamar mandi</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan Hasil : pasien dianjurkan untuk sering melakukan relaksasi napas</li> </ol>	
- 5	- 5							
- 4	- 4							
<p>1.</p>	<p>Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul> <p>DO :</p>	<p>13-september-2023</p> <p>11:00</p> <p>10:15</p> <p>10:20</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) Hasil : Napas sedikit cepat, RR : 22x/menit</li> <li>2. Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : Ronkhi</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memposisikan Semi-Fowler atau Fowler Hasil : Pasien posisi duduk</li> <li>2. Memberikan Oksigen, Jika perlu Hasil : pasien mengatakan belum memerlukan oksigen, karena belum merasa</li> </ol>	<p>Khaedirnur</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 agustus 2023 Pneumonia bilateral Cardiomegaly disertai edema plumonum Efusi pleura bilateral terutama kanan</li> </ul>	10:25	<p>sesak</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajarkan teknik batuk efektif Hasil : Pasien mengatakan tidak ada dahak yang keluar</li> </ol>	
3.	<p>Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan +- 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> <li>- IMT : 22,7</li> </ul>	<p>13-september-2023</p> <p>11:00</p> <p>11:15</p> <p>11:20</p> <p>11:25</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric Hasil : tampak pasien terpasang NGT, Pasien mengatakan pemasangan NGT kemarin sore</li> <li>2. Memonitor berat badan Hasil : BB : 59 Kg</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan oral higienis sebelum makan, jika perlu Hasil : pasien terpasang NGT</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajarkan posisi duduk, jika mampu</li> </ol>	Khaedirnur

	- tampak porsi makan tidak dihabiskan		Hasil : Pasien nyaman dalam posisi duduk	
--	---------------------------------------	--	--	--

### 5.5 Evaluasi Keperawatan

NO DX	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	Hari/TGL/Jam	EVALUASI (SOAP)	NAMA JELAS
2.	<p>Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba</li> </ul>	<p>Senin/11- November-2023</p> <p>14:00</p>	<p>S : Pasien mengatakan setelah diberikan slow deep breathing, sesaknya cukup berkurang dan sedikit mengurangi keletihannya saat berpindah tempat dari bed ke kursi roda</p> <p>O : Pasien tampak duduk dengan sesekali mengulangi kembali teknik relaksasi slow deep breathing, pasien masih tampak lemah</p> <p>A : Masalah Keletihan belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi manajemen energi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan</li> <li>2. Monitor pola dan jam tidur</li> </ol> <p>Terapeutik</p>	Khaedirnur

<p>merasa lemas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot <table border="1" style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>- 5</td> <td>- 5</td> </tr> <tr> <td>- 4</td> <td>- 4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>	- 5	- 5	- 4	- 4		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan)</li> <li>2. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan Edukasi</li> <li>2. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan</li> </ol>	
- 5	- 5						
- 4	- 4						
<p>1. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul> <p>DO :</p>	<p>Senin/11- November-2023 14:15</p>	<p>S : Pasien mengatakan belum merasakan sesak karena selalu dalam posisi duduk</p> <p>O : Pasien tampak duduk RR : 23x/menit Spo2 : 96%</p> <p>A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling,</li> </ol>	<p>Khaedirnur</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 agustus 2023 Pneumonia bilateral Cardiomegaly disertai edema plumonum Efusi pleura bilateral terutama kanan</li> </ul>		<p>mengi, wheezing, ronkhi kering)</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisikan Semi-Fowler atau Fowler</li> <li>2. Berikan Oksigen, Jika perlu</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajarkan teknik batuk efektif</li> </ol>	
3.	<p>Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan + 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> <li>- IMT : 22,7</li> </ul>	<p>Senin/11- November-2023  14:30</p>	<p>S : Pasien Mengatakan masih mual saat makan siang, dan hanya menghabiskan beberapa sendok saja</p> <p>O : tampak porsi makan tidak dihabiskan</p> <p>A : Masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik</li> <li>2. Monitor berat badan</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan oral higienis sebelum makan, jika perlu</li> </ol> <p>Edukasi</p>	Khaedirnur

	- tampak porsi makan tidak dihabiskan		1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu	
2.	<p>Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</li> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> </ul>	<p>Selasa/12- November-2023</p> <p>15:00</p>	<p>S : Pasien mengatakan setelah melakukan slow deep breathing, sesaknya mulai berkurang, pasien mengatakan masih sedikit merasa lelah karena sebelumnya berjalan menuju kamar mandi</p> <p>O : Pasien tampak duduk dengan sesekali mengulangi kembali teknik relaksasi slow deep breathing</p> <p>A : Masalah Keletihan belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi manajemen energi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan</li> <li>2. Monitor pola dan jam tidur</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan)</li> <li>2. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi</li> </ol>	Khaedirnur

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan otot <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">- 5</td> <td style="padding: 0 10px;">- 5</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">- 4</td> <td style="padding: 0 10px;">- 4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga</li> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>	- 5	- 5	- 4	- 4		keletihan	
- 5	- 5							
- 4	- 4							
1.	<p>Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax</li> </ul>	<p>Selasa/12- November-2023</p> <p>14:15</p>	<p>S : Pasien mengatakan ia sudah tidak sesak seperti tadi subuh, pasien mengatakan saat sesak nyaman hanya dengan pemberian oksigen.</p> <p>O : Pasien tampak duduk RR : 23x/menit Spo2 : 95%</p> <p>A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, mengi, wheezing, ronkhi kering)</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisikan Semi-Fowler atau Fowler</li> <li>2. Berikan Oksigen, Jika perlu</li> </ol>	Khaedirnur				

	<p>31 agustus 2023</p> <p>Pneumonia bilateral</p> <p>Cardiomegaly disertai edema plumonum</p> <p>Efusi pleura bilateral terutama kanan</p>		<p>Edukasi</p> <p>1. Ajarkan teknik batuk efektif</p>	
3.	<p>Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan + 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> <li>- IMT : 22,7</li> <li>- tampak porsi makan tidak dihabiskan</li> </ul>	<p>Selasa/12- November-2023</p> <p>14:30</p>	<p>S : Pasien Mengatakan mual saat makan siang, dan sempat muntah</p> <p>O : tampak porsi makan tidak dihabiskan</p> <p>A : Masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik</li> <li>2. Monitor berat badan</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan oral higienis sebelum makan, jika perlu</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu</li> </ol>	Khaedirnur
2.	<p>Keletihan berhubungan dengan kondisi</p>	<p>Rabu/13-</p>	<p>S : Pasien mengatakan setelah melakukan slow deep breathing, sesaknya mulai berkurang, pasien</p>	Khaedirnur

<p>fisiologis dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya</li> <li>- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah</li> <li>- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena cepat merasa lelah, keseimbangan mulai berkurang, pasien pernah jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba merasa lemas</li> <li>- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari.</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien kesulitan bergerak</li> <li>- Kekuatan otot <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">- 5</td> <td style="padding: 0 10px;">- 5</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">- 4</td> <td style="padding: 0 10px;">- 4</td> </tr> </table> </li> <li>- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah</li> <li>- Tampak pasien dibantu berjalan</li> </ul>	- 5	- 5	- 4	- 4	<p>November-2023</p> <p>14:00</p>	<p>mengatakan sudah kurang merasa lelah, pasien mengatakan mampu berjalan ke kamar mandi sendiri dengan ditemani istrinya dan tidak merasa seletih kemarin, pasien mengatakan semalam tidak merasa sesak dan tidurnya baik</p> <p>O : Pasien tampak duduk</p> <p>A : Masalah Keletihan teratasi</p> <p>P : Optimalkan Intervensi manajemen energi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan</li> <li>2. Monitor pola dan jam tidur</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan)</li> <li>2. Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajarkan strategi coping untuk mengurangi keletihan</li> </ol>	
- 5	- 5						
- 4	- 4						

	<p>oleh keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HGB : 9,1 gr/dl</li> </ul>			
1.	<p>Bersihkan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien mengatakan air liurnya kental</li> <li>- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam hari</li> <li>- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien berbaring</li> <li>- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas tahun yang lalu</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunyi napas : ronkhi</li> <li>- Pasien nampak batuk berdahak</li> <li>- WSD : Canula : 3 ltr/mnt</li> <li>- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60°</li> <li>- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 Agustus 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumonia bilateral</li> <li>Cardiomegaly disertai edema plumonum</li> <li>Efusi pleura bilateral terutama kanan</li> </ul> </li> </ul>	<p>Rabu/13- November-2023</p> <p>14:15</p>	<p>S : Pasien mengatakan belum merasa sesak, namun sesekali masih batuk</p> <p>O : Pasien tampak duduk RR : 23x/menit Spo2 : 97%</p> <p>A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)</li> <li>2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, mengi, wheezing, ronkhi kering)</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisikan Semi-Fowler atau Fowler</li> <li>2. Berikan Oksigen, Jika perlu</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajarkan teknik batuk efektif</li> </ol>	Khaedirnur

3.	<p>Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual</li> <li>- Pasien mengatakan tidak nafsu makan</li> <li>- Pasien mengatakan sulit menelan makanan</li> <li>- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan</li> <li>- pasien mengatakan makan hanya makan + 5 sendok</li> <li>- TB : 161 Cm</li> <li>- BB : 59 Kg</li> <li>- IMT : 22,7</li> <li>- tampak porsi makan tidak dihabiskan</li> </ul>	<p>Rabu/13- November-2023</p> <p>14:30</p>	<p>S : Pasien Mengatakan makannya menggunakan NGT, pasien mengatakan tidak ada rasa mual dan muntah namun merasa kurang nyaman dengan selangnya</p> <p>O : tampak pasien menggunakan NGT</p> <p>A : Masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik</li> <li>2. Monitor berat badan</li> </ol> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan oral higienis sebelum makan, jika perlu</li> </ol> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu</li> </ol>	Khaedirnur
----	---	--	--	------------



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Analisis Asuhan Keperawatan**

##### **5.1.1 Analisis pengkajian keperawatan**

Pengkajian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara pada pasien dan keluarga pasien. Tn. A berusia 61 tahun dengan awal masuk rumah sakit dengan keluhan sesak setelah dilakukan tindakan di UGD, pasien dibawa ke ruangan lontara 1 untuk dilakukan perawatan lebih lanjut pada tanggal 10 september 2023. Saat dilakukan pengkajian pada tanggal 11 september 2023, didapatkan keluhan utama pasien yaitu merasa mudah lelah, pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya, hal ini sejalan dengan penelitian (Pertwi & Prihati, 2020) yang menyatakan bahwa penderita CKD akan merasakan keletihan disebabkan karena kadar oksigen yang rendah dalam darah yang disebabkan karena anemia, pemasukan nutrisi yang buruk pada penderita CKD juga mempengaruhi sehingga dapat menimbulkan keluhan mudah lelah. Penelitian lain juga menyatakan bahwa pasien CKD akan kekurangan oksigen dalam darah sehingga akan memaksa jantung mensuplay oksigen yang dibutuhkan tubuh sehingga akan meyebabkan tubuh mengalami keletihan ekstrem (fatigue) (Ramadhan et al., 2023).

Berdasarkan pengkajian, pasien memiliki masalah pada kebutuhan aktivitas karena selalu mengeluh lelah, karena sering

merasa lelah pasien mengatakan sulit melakukan aktivitas. Menurut (Sepadha Putra Sagala, 2020), pasien hemodialisa yang mengalami gangguan aktivitas sehari-hari akan berdampak terhadap kesehatan fisik, mobilisasi dan perlunya perawatan berulang dalam jangka panjang akibat anemia, uremia, miopati, gangguan tulang dan mineral. Kebutuhan mobilisasi yang tidak terpenuhi dapat menjadi salah satu faktor penyebab kematian pada pasien hemodialisa. Keterbatasan aktivitas sehari-hari pasien hemodialisa dapat mengakibatkan terjadinya stress, frustrasi, depresi, penurunan daya ingat, mudah tersinggung dan sensitif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lab didapatkan hasil hemoglobin yang rendah, yaitu 9,1 gr/dl, yang menandakan pasien mengalami anemia, sejalan dengan penelitian (Agustina & Wardani, 2019) menyebutkan bahwa penyakit ginjal kronik adalah kondisi irreversible dimana fungsi ginjal menurun dari waktu-kewaktu. Kondisi ginjal memburuk menyebabkan kemampuan untuk memproduksi erythropoietin yang memadai terganggu, sehingga terjadi anemia.

Dapat dilihat bahwa teori yang disajikan memberikan gambaran potensi pengalaman yang akan dialami oleh pasien dengan gagal ginjal kronik, dan data yang terhimpun dari pengkajian sesuai dengan kerangka yang terdapat dalam teori tersebut. Setelah mengevaluasi hasil pengkajian dan membandingkannya dengan teori,

peneliti tidak menemukan kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktek yang diamati di lapangan.

### **5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) masalah keperawatan yang timbul pada klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas meliputi gangguan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas, kelelahan dan risiko intoleransi aktivitas. Dari hasil pengkajian pada Trn A ditemukan masalah prioritas atau masalah utama yaitu kelelahan berhubungan dengan kondisi fisiologis. Kelelahan merupakan penurunan kapasitas kerja fisik yang tidak pulih dengan istirahat.

Alasan diangkatnya masalah kelelahan sebagai prioritas utama adalah karena kelelahan merupakan keluhan yang sering dirasakan pasien. Menurut buku standar diagnosis keperawatan indonesia, kelelahan muncul karena disebabkan oleh gangguan tidur, gaya hidup monoton, kondisi fisiologis, program perawatan/pengobatan jangka

panjang, stres berlebihan, dan depresi (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Berdasarkan teori diatas dan hasil pengkajian pada kasus tidak didapatkan adanya kesenjangan antara teori dan kasus dimana pada pasien Tn. A dimana masalah keperawatan yang muncul sesuai dengan konsep teori yang telah diuraikan sebelumnya, namun karena fokus studi kasus adalah pemenuhan kebutuhan aktivitas maka secara teori dibatasi diagnosis yang mungkin muncul yang berkaitan dengan pemenuhan aktivitas fisik, sementara kasus yang didapatkan, masalah keperawatan lain yang muncul ialah bersihan jalan napas tidak efektif, dan risiko defisit nutrisi

### **5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan**

Intervensi keperawatan merupakan penyusunan rencana Tindakan keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat untuk menanggulangi masalah klien sesuai dengan diagnosis keperawatan yang sudah ditentukan. Komponen rencana keperawatan terdiri dari tujuan, kriteria hasil dan rencana keperawatan (Basri et al., 2020).

Berdasarkan buku standar intervensi keperawatan indonesia pada masalah kelelahan intervensi utama yang dapat diberikan adalah edukasi aktivitas atau istirahat dan manajemen energi, sedangkan untuk intervensi pendukungnya yaitu dukungan program pengobatan, dukungan pengambilan keputusan, dukungan tidur, manajemen asma, manajemen dimensia, manajemen kemoterapi, manajemen medikasi,

manajemen lingkungan, manajemen mood, manajemen nutrisi, penentuan tujuan bersama, promosi dukungan sosial, promosi coping, promosi latihan fisik, reduksi ansietas, terapi aktivitas, dan terapi relaksasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018)

Analisis intervensi dengan masalah keletihan pada Tn A berfokus pada keluhan serta penyesuaian dengan kondisi pasien, maka penulis memberikan manajemen energi berupa, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan, monitor pola dan jam tidur, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan) berikan aktivitas distraksi yang menenangkan berupa terapi relaksasi *slow deep breathing*, edukasi ajarkan strategi coping untuk mengurangi keletihan.

Intervensi utama dalam mengatasi masalah keletihan pada penelitian ini adalah *slow deep breathing* dimana intervensi ini bertujuan untuk mengurasa rasa lelah pasien yang disebabkan oleh faktor penyakitnya. Menurut penelitian (Pertiwi & Prihati, 2020), secara fisiologis, teknik relaksasi nafas dalam lambat merangsang sistem saraf parasimpatik, yang mengakibatkan peningkatan produksi endorfin, penurunan heart rate, dan perluasan ekspansi paru-paru untuk mencapai kapasitas maksimal, sehingga otot-otot menjadi lebih rileks. Teknik relaksasi nafas dalam lambat juga memastikan tubuh menerima pasokan oksigen yang adekuat, yang memiliki peran krusial dalam sistem pernapasan dan sirkulasi tubuh. Saat melakukan teknik ini,

oksigen mengalir ke pembuluh darah dan jaringan tubuh, menghilangkan racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai, meningkatkan metabolisme, dan menghasilkan energi. Hal ini memaksimalkan jumlah oksigen yang tersedia untuk seluruh jaringan tubuh, membantu dalam produksi energi, dan mengurangi tingkat kelelahan/fatigue.

Penelitian lain juga menyebutkan dalam (Ramadhan et al., 2023) menyebutkan bahwa, teknik relaksasi nafas dalam lambat secara fisiologis akan menstimulasi sistem saraf parasimpatik sehingga meningkatkan produksi endorpin, menurunkan *heart rate*, meningkatkan ekspansi paru sehingga dapat berkembang maksimal, dan otot-otot menjadi rileks. Dari data tersebut tidak ditemukan keseimbangan antara teori dan kasus dalam pemberian intervensi terapi relaksasi *slow deep breathing* pada pasien dengan masalah kelelahan dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat.

Kemudian intervensi untuk masalah bersihan jalan napas tidak efektif berupa manajemen jalan napas adapun intervensi yang dilakukan ialah Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas), Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, mengi, wheezing, ronkhi kering, Posisikan Semi-Fowler atau Fowler, Berikan Oksigen, Jika perlu, dan Ajarkan teknik batuk efektif. Menurut buku standar intervensi keperawatan indonesia salah satu intervensi utama untuk mengatasi masalah bersihan jalan napas tidak efektif ialah,

manajemen jalan napas, sehingga dari hal tersebut tidak dapat ditemukan kesenjangan antara teori kasus dalam pemberian intervensi.

Selanjutnya untuk masalah risiko defisit nutrisi diberikan intervensi manajemen nutrisi, intervensi yang diberikan kepada pasien ialah, Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric, monitor berat badan, lakukan oral hygienis sebelum makan, jika perlu, anjurkan posisi duduk, jika mampu. Berdasarkan buku Standar intervensi keperawatan indonesia, salah satu intervensi yang dapat diberikan jika ditemukan masalah keperawatan risiko defisit nutrisi ialah manajemen nutrisi, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan.

#### **5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan**

Implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan Tindakan yang telah direncanakan sebelumnya agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal. Pelaksanaan Tindakan keperawatan kepada klien dilakukan secara urut sesuai dengan prioritas masalah yang sudah dibuat pada intervensi keperawatan (Basri et al., 2020). Implementasi keperawatan dimulai dari pelaksanaan intervensi hingga melakukan dokumentasi keperawatan termasuk Tindakan yang telah diberikan dalam menjelaskan suatu perencanaan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Pada kasus Tn A implementasi keperawatan keperawatan diberikan mulai tanggal 11 september sampai tanggal 13 september 2023.

Implementasi yang diberikan pada masalah kelelahan yaitu manajemen energi, manajemen energi. Manajemen energi adalah mengidentifikasi dan mengelola penggunaan energi untuk mengatasi atau mencegah kelelahan dan mengoptimalkan proses pemulihan. Pada implementasi yang diberikan ialah identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor pola dan jam tidur, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan) dalam hal ini pasien dianjurkan untuk memasang sampiran saat akan istirahat, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan berupa terapi relaksasi slow deep breathing, edukasi ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan, edukasi yang diajarkan yaitu cara melakukan slow deep breathing dan dianjurkan untuk selalu diulang-ulang agar pasien merasa lebih baik dan keluhan lelah berkurang.

Implementasi untuk masalah bersihan jalan napas yaitu diberikan Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas), Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering), dan hasil yang didapatkan ialah bunyi napas ronkhi. Posisikan Semi-Fowler atau Fowler, yang kemudian pasien lebih sering dalam posisi duduk atau head up 60°, sesekali diberikan Oksigen, dan mengajarkan teknik batuk efektif.

Implementasi terakhir yang diberikan untuk masalah risiko defisit nutrisi ialah, Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric, dalam hal ini pasien menerima jika akan dipasangkan

NGT namun terealisasi dihari ketiga, selanjutnya memonitor berat badan, dimana hasil didapatkan selama tiga hari ialah pasien belum mengalami penurunan berat badan, lakukan oral hygienis sebelum makan, anjurkan posisi duduk, dengan hasil psien lebih sering dalam posisi duduk.

Pada pelaksanaan implementasi kepada Tn. A, kendala yang muncul adalah kurangnya kontrol dari peneliti terhadap pasien, dikarenakan waktu dinas yang terbatas, sehingga tidak diketahui apakah pasien benar-benar melaksanakan apa yang tela dianjurkan atau tidak, meskipun saat setiap evaluasi pasien mengatakan kadang melaksanakannya.

#### **5.1.5 Analisis evaluasi keperawatan**

Evaluasi keperawatan merupakan proses penilaian pencapaian tujuan serta pengkajian ulang rencana keperawatan, evaluasi keperawatan bertujuan untuk menilai respon pasien yang meliputi subjektif, objektif, *assessment* dan *planning*. evaluasi keperawatan juga bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan intervensi dan implementasi yang sudah dilakukan (Basri et al., 2020).

Evaluasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan segera setelah implementasi untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan. Sementara itu, evaluasi sumatif merupakan evaluasi kontinu dari


proses dan hasil pelayanan asuhan keperawatan yang dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada Tn A evaluasi keperawatan diberikan secara formatif dan sumatif yang disesuaikan dengan luaran keperawatan dalam buku SLKI, dimana asien diberikan evaluasi setelah implementasi keperawatan dilakukan. Evaluasi yang diperoleh dari masalah keletihan, didapatkan hasil bahwa pasien mengatakan rileks setelah diberikan terapi slow deep breathing, pasien juga mengatakan sudah tidak terlalu merasa lelah khususnya saat ke kamar mandi. Evaluasi akhir didapatkan bahwa pasien mengatakan sudah kurang merasa lelah, pasien mengatakan mampu berjalan ke kamar mandi sendiri dengan ditemani istrinya dan tidak merasa seletih kemarin. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka masalah keletihan sudah teratasi intervensi dioptimalkan.

Kemudian hasil evaluasi dari masalah bersihan jalan napas tidak efektif ialah pasien tidak merasa sesak, namun masih ada suara napas tambahan (ronkhi), kemudian evaluasi akhir didapatkan pasien tidak merasa sesak Spo2 :97%, pasien masih batuk. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan masalah bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi. Selanjutnya untuk hasil evaluasi dari masalah risiko defisit nutrisi didapatkan hasil yaitu, pasien telah terpasang NGT, rasa mual dan muntah sudah tidak ada namun pasien merasa kurang nyaman dengan penggunaan NGT, dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi, sehingga intervensi dilanjutkan.

Dari ketiga masalah keperawatan yang ditemukan 2 diantaranya disimpulkan belum berhasil, Drs. H. Ahmad Suhaimi dalam (Ahmad Suhaimi, 2017) menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah SWT sayang kepada hamba-Nya. Banyak cara Allah dalam mewujudkan bentuk kasih sayangnya kepada kita. Salah satunya dengan sakit. Sesungguhnya sakit dapat menjadi media bagi kita untuk merenungi arti dari sebuah kenikmatan sehat. Dialah yang mengizinkan penyakit itu menimpa, dan dia pula lah yang mengangkatnya, dalam firman Allah SWT. QS. Asy-Syu'arah/26:80 yang berbunyi :



Terjemahnya :

*Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku*

Demikian ketentuan dari Allah. Sunnatullah ketika mendapatkan kenikmatan, mudah manusia menerima kenyataan itu. Namun ketika suatu musibah menimpa kita, tidak mudah menghadapinya. Padahal ketika suatu musibah itu datang kita menyikapinya dengan sabar dan tawakal, kita akan menemukan kenikmatan luar biasa yang ada didalamnya.

Dalam tafsir Al-Mishbah, yang menjelaskan tafsir surah Asy-Syu'arah ayat 78-82 menyebutkan bahwa : Ayat-ayat di atas menyatakan

bahwa: Tuhan semesta alam itu adalah Dia Yang telah menciptakan aku dengan kadar dan ukuran yang sangat tepat agar aku menjalankan fungsi dengan baik, maka hanya Dia pula Yang menunjuki aku aneka petunjuk yang kuperlukan sepanjang hidupku. Dan Yang hanya Dia Yang Maha Esa itu yang memberi aku makan dan memberi aku minum sehingga tanpa bantuan-Nya pastilah aku binasa. Dan, di samping itu, apabila aku memakan atau meminum sesuatu yang mestinya kuhindari atau melakukan kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya Dia pula Yang menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali pulih. Dengan demikian kesembuhan datangnya hanya dari Allah SWT, sehingga dalam kasus ini meskipun beberapa masalah keperawatan belum teratasi kita harus tetap yakin bahwa Allah akan selalu memberi petunjuknya.

## **5.2 Analisis Evidence Based Practiced in Nursing**

Pemberian *slow deep breathing* didapatkan mampu menurunkan kelelahan (fatigue) pada pasien gagal ginjal kronik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pertwi & Prihati, 2020) yang juga merupakan salah satu EBP penelitian ini, menyatakan bahwa secara fisiologis, teknik relaksasi nafas dalam lambat merangsang sistem saraf parasimpatik, yang mengakibatkan peningkatan produksi endorfin, penurunan heart rate, dan perluasan ekspansi paru-paru untuk mencapai kapasitas maksimal, sehingga otot-otot menjadi lebih rileks. Teknik relaksasi nafas dalam lambat juga memastikan tubuh menerima pasokan oksigen yang adekuat, yang memiliki peran krusial dalam sistem pernapasan dan sirkulasi tubuh. Saat melakukan teknik ini, oksigen

mengalir ke pembuluh darah dan jaringan tubuh, menghilangkan racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai, meningkatkan metabolisme, dan menghasilkan energi. Hal ini memaksimalkan jumlah oksigen yang tersedia untuk seluruh jaringan tubuh, membantu dalam produksi energi, dan mengurangi tingkat kelelahan/fatigue. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan latihan relaksasi napas dalam lambat (*slow deep breathing*) untuk mengurangi kelelahan pada pasien penyakit gangguan ginjal.

Pada kasus Tn A hasil evaluasi didapatkan bahwa pasien mampu berjalan ke kamar mandi sendiri dengan ditemani istrinya dan tidak merasa seletih saat awal pertemuan dengan peneliti, hal ini juga sejalan dengan penelitian (Ramadhan et al., 2023) yang menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa *slow deep breathing* dapat menurunkan tingkat kelelahan pada pasien gagal ginjal.

### **5.3 Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah selama proses pemberian intervensi tidak berlangsung dalam satu hari penuh, hal ini dikarenakan implementasi hanya diberikan selama satu sift dalam per hari sehingga proses kontrol perkembangan klien tidak maksimal dan pemberian intervensi juga masih kurang maksimal.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan pemberian intervensi terapi *slow deep breathing* pada pasien pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pengkajian keperawatan yang dilakukan pada Tn A ditemukan beberapa data yaitu keluhan utama pasien adalah sering merasa lelah sehingga mengganggu aktivitas kesehariannya, pasien juga kadang mengeluh sesak napas khususnya di malam hari, terdapat suara napas tambahan (ronkhi), pasien juga mengeluh tidak nafsu makan dan sering mual.
- b. Diagnosis keperawatan pada Tn A, yaitu kelelahan, bersihan alan napas tidak efektif, dan risiko defisit nutrisi.
- c. Intervensi yang diberikan pada masalah kelelahan yaitu manajemen energi, untuk masalah bersihan alan napas tidak efektif diberikan intervensi manajemen alan napas, selanjutnya untuk masalah risiko defisit nutrisi diberikan intervensi manajemen nutrisi.
- d. Implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan intervensi keperawatan dengan masalah prioritas kelelahan.
- e. Evaluasi keperawatan didapatkan bahwa, masalah kelelahan teratasi, dan untuk masalah bersihan jalan napas tidak efektif serta masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi.

- f. Pemberian intervensi *slow deep breathing* menunjukkan adanya perubahan pada tingkat keletihan pasien, dimana setelah 3 hari pemberian intervensi, keletihan pasien telah berkurang jika dibandingkan awal pengkajian.

## 6.2 Saran

- a. Bagi institusi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan untuk meningkatkan wawasan tentang asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat pada pasien gagal ginjal kronik, khususnya dengan menerapkan intervensi *slow deep breathing*.

- b. Bagi pelayanan kesehatan


*Slow deep breathing* dapat menjadi skil tambahan bagi perawat yang dapat diterapkan diruang perawatan selama memberikan asuhan keperawatan terutama kepada pasien dengan keluhan fatigue, perawat juga dapat membantu pasien dalam melakukan latihan tersebut secara mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA



- Agustanti, D., Rahayu, dian yuniar syanti, Festi, P., Hayati, W., Poniyah, Simanullang, & Wicaksoni, kurniawan erman. (2023). *Buku Ajar keperawatan Keluarga* (1st ed.). Mahakarya Citra Utama.
- Agustina, W., & Wardani, E. K. (2019). Penurunan Hemoglobin pada Penyakit Ginjal Kronik Setelah Hemodialisis di RSUD “KH” Batu. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(2), 141–146. <https://doi.org/10.26699/jnk.v6i2.art.p141-146>
- Ahmad Suhaimi. (2017). *Sakit Membawa Hikmah (Renungan & Hikmah di Balik Ujian Sakit)*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/451/sakit-membawa-hikmah-renungan-hikmah-di-balik-ujian-sakit>
- Ardhiansyah, T. (2016). *PENGARUH TERAPI RELAKSASI: SLOW DEEP BREATHING TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DERAJAT I*.
- Asmadi. (2018). *Konsep dan aplikasi kebutuhan dasar klien*. salemba medika.
- Basri, B., Utami, T., & Mulyadi, E. (2020). *Konsep Dasar Dokumentasi Keperawatan* (1st ed.). media sains indonesia.
- cholina trisa siregar. (2020). *Buku Ajar Manajemen Komplikasi Pasien Hemodialisa*. Penerbit deepublish.
- Fratama, F. F. (2022). Pemanfaatan Terapi Slow Deep Breathing (SDB) Terhadap Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi: Studi Literatur. *Jurnal Skala Kesehatan Politeknik Kesehatan Banjarmasin*, 13(2), 131–138.
- Hasanah, U., Hammad, H., & Rachmadi, A. (2020). Hubungan Kadar Ureum Dan Kreatinin Dengan Tingkat Fatigue Pada Pasien Chronic Kidney Disease (Ckd) Yang Menjalani Hemodialisa Di Ruang Hemodialisa RSUD Ulin Banjarmasin. *Jurnal Citra Keperawatan*, 8(2), 86–92. <https://doi.org/10.31964/jck.v8i2.158>
- Hasanuddin, fitria. (2022). *Adekuasi Hemodialisa Pasien Gagal Ginjal Kronik*. Penerbit NEM.
- Hidayat, A. A. (2021). *Studi Kasus Keperawatan Pendekatan Kualitatif* (1st ed.). Health Book Publishing.
- Irfannuddin. (2015). *Cara Sistematis Berlatih Meneliti*. Rayyana Komunikkasindo.
- Irwan. (2016). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. deepublish.
- Jafar, S. R. (2019). Penurunan Tingkat Keletihan Pasien Gagal Ginjal yang Menjalani Hemodialisis Melalui Promosi Kesehatan Teknik Relaksasi Napas Dalam. *Jurnal Keperawatan Terpadu*, 1(1), 22–28.
- Kasiati, & ni wayan dwi rosmalawati. (2016). *Kebutuhan Dasar Manusia 1*. Kementerian kesehatan republik indonesia.
- Kurniawan, H. (2021). *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Deepublish.
- Malisa, N., Agustina, F., Wahyuriyanto, Y., Oktavianti, D. siti, & Susilawati. (2023). *Buku Ajar Keperawatan medikal bedah*. Mahakarya Citra Utama.
- Narsa, A. C., Maulidya, V., Reggina, D., Andriani, W., & Rijai, H. R. (2022).

- Studi Kasus: Pasien Gagal Ginjal Kronis (Stage V) dengan Edema Paru dan Ketidakseimbangan Cairan Elektrolit. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 4(SE-1), 17–22. <https://doi.org/10.25026/jsk.v4ise-1.1685>
- Nuraini, D. S., Setyawan, D., & Widiyanto, B. (2016). Perbedaan Slow Deep Breathing dan Diaphragmatic Breathing Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di RSUD Ambarawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan (JIKK)*.
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan* (1st ed.). salemba medika.
- Nurwening, & Herry. (2019). *Modul 1 Kebutuhan Dasar Manusia*. Kementerian kesehatan republik indonesia.
- Paipilaya, M. Fransina, Haluruk, Jhon Davison, Metanfanuan, R., Musaidah, Rina, W., Kusumawardani, Lita Heni, Tansiana, F., Kelabora, J., & Gasper, Ivonne A. (2022). *Konsep dasar keperawatan* (2nd ed.). media sains indonesia.
- Pawestri, D., Ismoyowati, T. W., & Intening, V. R. (2023). Studi Kasus Asuhan Keperawatan Pasien Hipertensi pada Masalah Keperawatan Nyeri Akut dengan Intervensi Slow Deep Breathing di Panti Werda Buudhi Dharma Daerah Yogyakarta. *Prosiding STIKES Bethesda*, 2(1).
- Pertiwi, R. A., & Prihati, D. R. (2020). Penerapan Slow Deep Breathing Untuk Menurunkan Kelelahan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 4(1), 14–19. <https://doi.org/10.33655/mak.v4i1.77>
- Potter, & Perry. (2012). *Fundamental Of Nursing*. salemba medika.
- Putra, S. B., Hasanah, U., & Fitri, N. L. (2021). Penerapan Slow Deep Breathing Terhadap Kelelahan pada Pasien dengan Gagal Ginjal Kronik. *Jurnal Cendekia Muda*, 1(2), 151–158.
- Ramadhan, A. K., Dewi, N. R., & Inayati, A. (2023). Application Of Slow Deep Breathing To Fatigue In Patients With Chronic Renal Failure Undergoing Hemodialysis. *Jurnal Cendekia Muda*, 3(1), 41–45.
- Risnah. (2018). *Sejarah, Teori, dan Model Keperawatan* (2nd ed.). Pustaka Almaida Makassar.
- Rohayati, E. (2019). *Keperawatan Dasar I* (A. Rahmawati (ed.); 1st ed.). LovRinz Publishing.
- Romana, A. B. Y. ., Kedang, S. B., Rindu, Y., & Rambu, Roswita Viktoria R. (2023). *Buku ajar konsep dasar keperawatan* (1st ed.). penerbit media sains indonesia.
- Sepadha Putra Sagala, D. (2020). Aktivitas Sehari-Hari Dan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Terapi Hemodialisa Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 6(1), 59–65. <https://doi.org/10.52943/jikeperawatan.v6i1.354>
- Setyawan, D. A., Devriany, A., Huda, N., Rahmadiliyani, N., Patriyani, R. E. H., & Sulusyowati, E. C. (2020). *Buku Ajar Statistika* (1 (ed.)). CV Adanu Abimata.
- Siska. (2021). *apritual konsep : S.C.C.O.R.E model dan implementasinya* (1st ed.). penerbit adab.
- Suharyat, Y. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. Wawasan Ilmu Anggota IKAPI.

- Sumarta, N. H. (2020). Hubungan Aktivitas Fisik Sehari-Hari Dengan Derajat Hipertensi Pada Lansia Di Kota Batu. In *(Skripsi)*.
- Tandra hans. (2018). *Dari Diabetes Melitus Menuju Gagal Ginjal petunjuk praktis mencegah dan mengalahkan sakit ginjal dengan diet benar dan hidup sehat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- TIM Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia:Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Wasis. (2006). *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat (1 (ed.))*. Buku Kedokteran EGC.
- Widuri. (2019). *Kebutuhan Dasar Manusia (Aspek Mobilitas dan Istirahat Tidur)*. gosyen publishing.



Lampiran 1 : Jurnal utama



Lampiran 2 : Hasil Uji turnitin

KTA KHAEDIRNUR (70900122036).docx

---

ORIGINALITY REPORT

---

<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>3%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


---

PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>8%</b>
<b>2</b>	<b>www.dokumenakreditasipuskesmasfkt.com</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>vdocuments.mx</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.poltekkes-kdi.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>journal.poltekkes-mks.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.poltekkes-katim.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.poltekkeskupang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>pdfcoffee.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

---



10	Submitted to Seoul Venture University Student Paper	1%
11	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	1%
12	ia801806.us.archive.org Internet Source	1%
13	kasel.kemenag.go.id Internet Source	1%
14	titinsofyandari.blogspot.com Internet Source	1%
15	repository.stikstellamarismks.ac.id Internet Source	1%
16	repository.universitalirsyad.ac.id Internet Source	1%
17	pdfslide.tips Internet Source	1%
18	repository.pkr.ac.id Internet Source	1%
19	vdocuments.site Internet Source	1%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

Exclude quotes Off      Exclude matches < 1%  
 Exclude bibliography On

### Lampiran 3 : Daftar riwayat hidup

#### RIWAYAT HIDUP



**Khaedirnur**, yang biasa dipanggil Haidir, lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa pada tanggal 10 Mei 2000, merupakan anak sulung dari dua bersaudara dengan adik bernama Juhaedar, dari pasangan Bapak Jusman dan Ibu Dabi. Penulis menempuh pendidikan formal di TK AN-Nur pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke SD Inpres Pa'bangngiang dari tahun 2006 hingga 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMK Pratidina Makassar dan lulus pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan sekolah, penulis memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada tahun 2023, penulis lulus dengan gelar sarjana keperawatan, dan pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang profesi Ners. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti setiap kegiatan akademik dan terlibat dalam beberapa organisasi kemahasiswaan seperti HMJ Keperawatan UINAM, Himpunan Mahasiswa Islam, KSR PMI Unit 107 UINAM, dan HIPMA Gowa. Penulis selalu berusaha menjalani hari-harinya dengan kebahagiaan, karena percaya bahwa kebahagiaan berasal dari pola pikir sendiri. Penulis berharap pengalaman belajar yang diperolehnya akan berguna untuk masa depan setelah lulus. Semoga apa yang telah penulis pelajari di kampus dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, dan negara, untuk kemajuan bersama.