

**IMPLEMENTASI TERAPI MUROTTAL PADA PASIEN VESIKOLITHIASIS
DENGAN MASALAH KEPERAWATAN NYERI AKUT
RSUD SYEKH YUSUF GOWA**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

Muhammad Akil Agung Setia Budi
NIM : 70900122011

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

**IMPLEMENTASI TERAPI MUROTAL PADA PASIEN VESIKOLITHIASIS
DENGAN MASALAH KEPERAWATAN NYERI AKUT
RSUD SYEKH YUSUF GOWA**



Tugas Akhir Ners

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Muhammad Akil Agung Setia Budi

MNIM : 7096012201R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Akil Agung Setiabudi, S.Kep
Nim : 70900122011
Tempat/Tanggal Lahir : Jenepono, 15 Juni 1997
Jurusan Prodi : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Implementasi Terapi Murottal Pada Pasien Vesikolithiasis Dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akutrsud Syekh Yusuf Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners Ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tugas Akhir ini merupakan Duplikat, Tiruan, Plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir Ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 25 Juni 2023
Penyusun,

Muhammad Akil, S.Kep

Nim : 70900122007


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Muhamad Akil Agung Setia Budi, S.Kep NIM: 70300122007 mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Implementasi Terapi Murottal pada pasien Vesikolithiasis dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut RSUD Syekh Yusuf Gowa”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 12 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN


Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep., M.Kes
Pembimbing I


M. Saifulah, S.Kep., Ns., M., Kep
Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Implementasi Terapi Murottal pada pasien Vesikolithiasis dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut RSUD Syekh Yusuf Gowa”, yang disusun oleh Muhammad Akil Agung Setiabudi, S.Kep, NIM : 70900122011, Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa, Tanggal 27 Juni 2023, Bertepatan dengan 7 Dzulhijah 1444 H , dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam Program Studi Profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Juni 2023

7 Dzulhijah 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	:Hj.Sysnawati.,S.Kep.,Ns.,M.Kep,Sp.Kep.J	(.....)
Munaqisy I	: Nurul Khusnul Khotimah,S.kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Prof Dr H.M Dahlan, M.A.S	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Musdalifah, S.Kep.,Ns., M. Kep	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Jalaluddin Makassar



Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes
NIM: 70900701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul “Implementasi Terapi Murottal Pada Pasien Vesikolithiasis Dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut RSUD. Syekh Yusuf Gowa” dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju kealam yang terang benderang sampai sekarang ini.

Tujuan penyusunan KTI ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program Profesi *Ners* pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2023.

Dengan terselesaikannya penulisan KTI ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan KTI ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, terkasih, tersayang, serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, meraih gelar *ners*. Untuk segenap keluarga besar khususnya saudara kandung yang telah memberikan kasih sayang dan memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan selama menyelesaikan studi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.

3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku ketua prodi profesi *ners* dan Hj Sysnawati., S.Kep.,Ns.,M.Kep, Sp.Kep.J selaku sekretaris prodi profesi *ners* beserta dosen-dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Profesi *Ners* yang telah membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep., M.Kes selaku pembimbing I dan Musdalifah, S.Kep., Ns., M., Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan karya akhir *ners*, serta motivasi yang membangun
5. Nurul Khusnul Khotimah, S.kep., Ns., M.Kep Selaku penguji I dan Prof Dr H.M Dahlan M.Ag yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran yang membangun sehingga saya dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi siapa yang akan membacanya
6. Kepada teman-teman tersayang, yang telah menemani, menyemangati dan membantu penulis selama perkuliahan sampai sekarang

Disamping itu, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nanti

Samata, 15 Juni 2023
Penulis,

Muhammad Akil Agung
NIM: 70900122011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
BAB II TINJAUAN TEORI.....	6
A. Konsep Teori.....	6
1. Definisi	6
2. Klasifikasi.....	6
3. Etiologi	9
4. Manifestasi Klinis.....	9
5. Patofisiologi.....	10
6. Pemeriksaan Penunjang.....	13
7. Komplikasi	16
B. Konsep Keperawatan	16
1. Pengkajian	16
2. Diagnosis Keperawatan	20
3. Intervensi keperawatan.....	29
C. Teori Keperawatan	33
D. Evidence Based Nursing	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	1
A. Rancangan Studi Kasus.....	1

B. Subyek Studi Kasus	4
C. Fokus Studi Kasus.....	4
D. Instrumen Studi Kasus	5
E. Prosedur Studi Kasus	5
F. Tempat dan waktu pengambilan data.....	5
G. Analisis data dan penyajian data	5
H. Etika Studi Kasus	5
BAB IV LAPORAN KASUS	40
A. Pengkajian.....	40
B. Diagnosis Keperawatan	49
C. Intervensi Keperawatan	50
D. Implementasi Keperawatan	53
E. Evaluasi Keperawatan	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Analisa Kasus	64
B. Analisis Diagnosis	64
C. Analisis Intervensi	69
D. Analisis Implementasi	64
E. Alternatif Pemecahan Masalah (memberikan selain intervensi utama berbasis EBN). 72	
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	74



ABSTRAK

Nama : Muhammad Akil

NIM : 70900122011

Judul : Implementasi Terapi Murottal Pada Pasien Vesikolithiasis Dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut RSUD Syekh Yusuf Gowa

Latar Belakang: Setiap pembedahan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan trauma bagi pasien salah satu yang sering dikeluhkan oleh pasien ialah nyeri. Tindakan-tindakan untuk mengurangi nyeri selain dari Tindakan medis, yaitu pendekatan religious untuk mengurangi nyeri salah satunya dengan murottal Al-Qur'an.

Tujuan: untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada klien yang mengalami vesikolithiasis dengan masalah keperawatan Nyeri Akut akut Diruangan Bedah RSUD Syekh Yusuf Gowa. **Metode:** penelitian ini merupakan studi kasus yaitu Terapi murottal pada Tn M dengan diagnosis vesikolithiasis dengan masalah keperawatan Nyeri akut Diruangan Bedah RSUD Syekh Yusuf Gowa. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Tn M yaitu implementasi Terapi murottal surah Ar Rahman terhadap Tn M dengan masalah keperawatan nyeri akut dengan hasil akhir skala nyeri pasien menurun, pasien sudah tidak gelisah. **Kesimpulan:** terapi murottal Ar Rahman terhadap nyeri pasien dapat menurunkan intensitas nyeri pada post operasi. Oleh karena itu perawat untuk menerapkan murottal Ar Rahman sebagai salah satu intervensi non farmakologi selain tehnik relaksai dan distraksi dalam mengurangi nyeri pada post operasi yang mengalami nyeri.

Keyword: Nyeri, Post Operasi, Terapi murottal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan Pembedahan merupakan ancaman potensial maupun actual terhadap integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stress, fisiologi maupun psikologi. Himpunan perawat kamar bedah Indonesia (HIPKABI) mendefinisikan Tindakan operasi sebagai prosedur medis yang bersifat invasive dan diagnosis, pengobatan penyakit, trauma dan deformitas (HIPKABI, 2020). Pembedahan adalah semua Tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani (Redho dkk,2019).

Berdasarkan data yang diperoleh dari *World Health Organization* (WHO) jumlah pasien dengan Tindakan operasi mencapai angka peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2017 terdapat 140 juta pasien diseluruh rumah sakit di dunia, sedangkan pada tahun 2018 data mengalami peningkatan sebesar 148 juta jiwa, untuk di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1,2 juta jiwa (*World Health Organization, 2018*). Indonesia dengan jumlah kasus pasien bedah terbanyak yang merupakan Tindakan bedah laparatomi yaitu sebanyak 1,2 juta jiwa (Kemenkes RI, 2018). Data Sulawesi Selatan, setiap tahun terdaftar penyakit yang(Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2018)

Seseorang yang mengalami pembedahan atau operasi akan mengalami luka insisi, sehingga sel saraf kulit rusak. Trauma jaringan akan merangsang terbentuknya zat kimia seperti : bradykinin, serotonin, histamin, dan enzim

proteolitik yang merangsang nyeri dan membuat kekuatan otot. Sinyal nyeri dari daerah yang terluka berjalan sebagai impuls elektrokimia di sepanjang saraf ke bagian dorsal spinal cord. Pasien kemudian dihantarkan ke saraf perifer tubuh sehingga terjadi nyeri sebar (Anwar dkk, 2020).

Luka post operasi akan merangsang nyeri yang disebabkan jaringan luka yang mengeluarkan prostaglandin dan leuktiens yang merangsang susunan saraf serta adanya plasma darah yang akan mengeluarkan bradykinin yang merangsang susunan saraf pusat, kemudian diteruskan ke spinal cord untuk mengeluarkan impuls nyeri, nyeri akan menimbulkan berbagai masalah fisik maupun psikologis (Solehati, 2020)

Nyeri adalah pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang actual, potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian saat terjadi kerusakan. Nyeri dapat diartikan sebagai suatu sensasi yang tidak menyenangkan baik secara sensori maupun emosional yang berhubungan dengan adanya suatu kerusakan jaringan atau factor lain, sehingga individu merasa tersiksa, menderita yang akhirnya akan mengganggu aktivitas sehari-hari (Asmadi, 2020). Nyeri termasuk dalam pengalaman sensorik dan emosional yang sangat tidak menyenangkan dipicu oleh suatu stimulus pada ujung saraf sensorik. Semua pasien akan merasakan nyeri apabila efek anastesi sudah hilang, karena obat-obatan analgetic yang diberikan pasca operasi bertahan 6-8 jam (Rochmawati, 2021).

Salah satu tehnik non farmakologi untuk mengurangi nyeri adalah dengan tehnik distraksi. Tehnik distraksi merupakan salah satunya tehnik distraksi

pendengaran yang merupakan salah satu teknik untuk mengurangi rasa nyeri dengan cara memberikan atau mendengarkan music. Music adalah seni yang memengaruhi pusat fisik dan jaringan syaraf . music juga mempengaruhi system saraf simpatis atau system saraf otomatis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa jenis music yang digunakan adalah jazz, rock, klasik serta murottal (Potter & Perry, 2012)

Penelitian Syamsuddin & Kadir (2021) menunjukkan intensitas nyeri mengalami penurunan dari nyeri sedang keringan dengan beda mean 1.857 dan hasil uji statistic didapatkan $p=0.000$ ($p<0.05$). kemudian penelitian Pranowo & Kasron (2021) menunjukkan rata-rata respon nyeri sebelum diberikan terapi murottal adalah 6,266, sesudah diberikan terapi murottal didapatkan rata-rata respon nyeri adalah 4,666 serta terlihat rata-rata respon nyeri sesudah diberikan terapi murottal turun sebesar 1,60. Hasil uji beda dengan $p Value = 0,0005$ dan $\alpha = 0,05$ sehingga disimpulkan terdapat perbedaan respon nyero pasien post operasi laparatomi sebelum dan sesudah diberikan terapi murottal.

Murottal merupakan rekaman suara Al-Qur'an yang dilagukan oleh seorang Qori' (pembaca Al-Qur'an). Lantunan Al-Qur'an secara fisik mengandung unsur suara manusia merupakan intrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau yang dapat menurunkan hormon-hormon stress, mengakibatkan hormon endorphin alami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari rasa nyeri (Suwanto dkk, 2016) pendekatan spiritual dapat membantu mempercepat pemulihan atau penyembuhan klien (Siswanti & Kalsum, 2017). Seperti dengan halnya Al-Qur'an juga Al-Qur'an dapat menjadi

obat (penawar) tertanam dal surat Al Isra ayat 82

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Q.s Al isra : 82

Hasil observasi dan wawancara secara langsung selama departemen keperawatan Medikal Bedah yang dilakukan selama praktik di ruangan Bedah di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa. Salah satu intervensi yang berdasarkan Evidence Based Nursing (EBN) yang telah diterapkan di ruangan bedah ialah terapi murottal Al-qur'an yang diberikan pada pasien yang mengalami Nyeri Akut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus pengaruh intervensi terapi murottal AL-Qur'an menurunkan skala nyeri pada pasien di ruangan Bedah RSUD Syekh Yusuf Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penullisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan Terapi Murottal surah Ar Rahman pada pasien yang mengalami masalah keperawatan Nyeri Akut Di Ruangn Bedah RSUD Syekh Yusuf Gowa

C. Tujuan

a. Tujuan Umum

Diketuainya gambaran asuhan keperawatan pada klien yang mengalami

masalah keperawatan Nyeri akut pada pasien Vesikolithiasis dengan masalah keperawatan nyeri akut RSUD Syekh Yusuf Gowa.

b. Tujuan khusus

1. Diketuainya hasil pengkajian pada pasien dengan Vesikolithiasis
2. Diketuainya diagnosis keperawatan pada pasien dengan Vesikolithiasis
3. Diketuainya intervensi keperawatan pada pasien dengan Vesikolithiasis
4. Diketuainya implementasi keperawatan pada pasien dengan Vesikolithiasis
5. Diketuainya evaluasi keperawatan pada pasien dengan Vesikolithiasis
6. Untuk menganalisis intervensi Terapi Murottal surah Ar Rahman pada pasien Vesikolithiasis dengan masalah keperawatan Nyeri Akut



D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir profesi ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan implementasi asuhan keperawatan pada pasien Vesikolithiasis

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah Nyeri Akut dengan pemberian Terapi Murottal untuk mengatasi nyeri.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Definisi Vesikolithiasis

Batu saluran kemih adalah terbentuknya batu yang disebabkan oleh pengendapan substansi yang terdapat dalam air kemih yang jumlahnya berlebihan atau karena faktor lain yang mempengaruhi daya larut substansi (Nadesul, 2015). Batu Saluran Kemih adalah penyakit dimana didapatkan material keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih baik saluran kemih atas (ginjal dan ureter) dan saluran kemih bawah yang dapat menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih dan infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal (batu ginjal). Batu ini terbentuk dari pengendapan garam kalsium, magnesium, asam urat dan sistein (Nuari & Widayanti, n.d ,2020).

Batu saluran kemih dapat diketemukan sepanjang saluran kemih mulai dari sistem kaliks ginjal, pielum, ureter, buli-buli dan uretra. Batu ini mungkin terbentuk di di ginjal kemudian turun ke saluran kemih bagian bawah atau memang terbentuk di saluran kemih bagian bawah karena adanya stasis urine seperti pada batu buli- buli karena hiperplasia prostat atau batu uretra yang terbentuk di dalam divertikel uretra. Batu ginjal adalah batu yang terbentuk di tubuli ginjal kemudian berada di kaliks, infundibulum, pelvis ginjal dan bahkan bisa mengisi pelvis serta seluruh kaliks ginjal dan merupakan batu saluran kemih yang paling sering terjadi (Maulana, 2021).

2. Klasifikasi

Batu uretra dapat diklasifikasikan menurut asal dimana batu tersebut terbentuk. Klasifikasi tersebut membagi batu uretra menjadi batu primer dan sekunder. Batu primer adalah batu yang terbentuk de novo di uretra sedangkan batu sekunder atau disebut juga batu migrasi terbentuk di kandung kemih atau ginjal yang kemudian bergerak turun sampai ke uretra. Jenis batu primer biasanya berupa batu struvite, kalsium fosfat, atau kalsium karbonat. Sedangkan batu migrasi atau batu sekunder, yang lebih banyak ditemukan ketimbang batu primer, memiliki jenis yang terbanyak berupa batu kalsium oksalat dan fosfat (Prihadi et al., 2020).

Batu uretra juga diklasifikasikan menurut posisi anatomisnya menjadi batu uretra anterior dan batu uretra posterior. Batu uretra anterior meliputi batu pada pars bilbosa, pendulosa, dan fosa navikularis. Sedangkan batu uretra posterior mencakup uretra pars prostatika dan membranosa (Prihadi et al., 2020).

3. Etiologi

Terbentuknya batu kandung kemih atau vesikolitiasis sama dengan teori batu saluran kemih pada umumnya yang melibatkan banyak penyebab. Sedangkan teori yang menjelaskan proses pembentukannya juga masih belum pasti. Teori yang paling diyakini adalah terjadinya supersaturasi air kemih. Proses saturasi ini tergantung pada pH urin, jumlah ion yang terkandung, konsentrasi zat pelarut- terlarut (Wein, 2012).

Etiologi batu saluran kemih masih belum pasti. Ada kecenderungan laki- laki memiliki insidensi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pola hidup yang tidak baik juga mendukung hal ini terjadi. Kebiasaan kurang minum dapat meningkatkan saturasi air kemih. Angka kejadian juga tinggi pada orang yang memiliki berat badan yang berlebih (Wein, 2012).

Geografi yang tidak baik seperti suhu lingkungan yang panas maupun kering mempengaruhi konsentrasi cairan dalam tubuh dan juga meningkatkan risiko dehidrasi. Hal ini juga mempengaruhi konsentrasi urin termasuk kejenuhannya. Karena itu dapat meningkatkan saturasi urin. Selain dikarenakan teori supersaturasi ini, hal yang diduga kuat dalam terjadinya pembentukan batu adalah tidak adanya inhibitor terhadap batu ini. Bisa dikarenakan asupan yang kurang seperti makanan yang mengandung sitrat, dikarenakan sitrat adalah inhibitor paling kuat (McAninch, 2008).

4. Manifestasi Klinis

Gejala utama batu pada saluran kemih bagian atas biasanya berupa nyeri. Karakter nyeri sangat bergantung pada lokasi dari batu. Jenis nyeri pada saluran kemih dapat dibagi menjadi dua bagian: nyeri kolik maupun nyeri non kolik. Nyeri kolik umumnya terjadi pada tubulus yang memiliki peristaltic seperti ureter atau system kolektivus. Sedangkan nyeri non kolik disebabkan oleh distensi kapsul ginjal. Mekanisme seperti inflamasi, edema, hiperperistaltik, dan iritasi mukosa juga dapat berkontribusi memperberat rasa nyeri (Prihadi et al., 2020).

Nyeri pada batu saluran kemih umumnya muncul tiba-tiba dan membuat pasien tidak nyaman, sehingga sering pasien bergerak-gerak sebagai usaha untuk menghilangkan rasa sakit. Hal ini berbeda dengan nyeri pada peritonitis, dimana pasien cenderung diam, karena gerakan justru memperberat nyeri pada peritonitis (Prihadi et al., 2020).

Anamnesis yang baik terhadap nyeri dapat menentukan lokasi batu saluran kemih. Pada batu di ureteropelvic, nyeri sering dirasakan pada sudut kostovertebral akibat obstruksi urin dan menimbulkan peregangan dan distensi kapsul ginjal. Batu ureter proksimal dapat menimbulkan gejala nyeri seperti batu ureteropelvic, namun ditambah dengan mual, muntah, dan nyeri kolik yang menjalar ke abdomen hingga ke arah pusar di penjalaran dermatom T10. Batu di mid ureter juga dapat memunculkan gejala nyeri non kolik, namun seringkali keluhan disertai nyeri kolik yang menjalar ke abdomen bagian bawah hingga selangkangan sesuai penjalaran dermatome L12-4. Sedangkan pada batu ureter bagian distal nyeri dapat menjalar ke vulva, skrotum, atau buli-buli, terkadang dapat pula ditemukan gejala iritatif seperti urgensi, frekuensi, dan dysuria akibat respon inflamasi dari buli (Prihadi et al., 2020).

Selain nyeri, mual muntah, gejala lain seperti demam dapat dikeluarkan jika terjadi infeksi. Infeksi dapat terjadi akibat statis urin oleh batu sehingga bakteri dapat dengan lebih mudah berkembang di traktus urinarius (Prihadi et al., 2020).

5. Patofisiologi

Adanya kalkuli dalam traktus urinarius disebabkan oleh dua fenomena dasar. Fenomena pertama adalah supersaturasi urin oleh konstituen pembentuk batu, termasuk kalsium, oksalat, dan asam urat. Kristal atau benda asing dapat bertindak sebagai matriks kalkuli, dimana ion dari bentuk kristal super jenuh membentuk struktur kristal mikroskopis. Kristal akan bertahan di mukosa. Setelah ada aliran urin yang akan mendorong kristal ke saluran kemih, maka kristal ini akan menyumbat saluran tersebut. Namun semua tergantung pada besarnya ukuran kristal. Bila ukurannya telah sama dengan diameter lumen maka akan terbentuk obstruksi saluran kemih (Otolowo et al., 2021)

Fenomena kedua, yang kemungkinan besar berperan dalam pembentukan kalkuli kalsium oksalat, adalah adanya pengendapan bahan kalkuli matriks di papilla renalis, yang biasanya merupakan plak Randall (yang selalu terdiri dari kalsium fosfat). Kalsium fosfat mengendap di membran dasar dari Loop of Henle yang tipis, mengikis ke interstitium, dan kemudian terakumulasi di ruang subepitel papilla renalis. Deposit subepitel, yang telah lama dikenal sebagai plak Randall, akhirnya terkikis melalui urothelium papiler. Matriks batu, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat secara bertahap diendapkan pada substrat untuk membentuk kalkulus pada traktus urinarius (Brunner, 2018)

Pada orang dewasa, lebih dari 50% kasus jenis batu adalah batu asam urat. Sedangkan pada batu ginjal adalah batu kalsium oksalat. Selain itu juga ditemukan batu jenis kalsium oksalat, kalsium fosfat, amonium urat, sistein, atau magnesium ammonium fosfat (berhubungan dengan infeksi). Tidak jarang penderita batu kandung kemih berjenis asam urat tidak didahului oleh riwayat hiperurisemia. Sedangkan pada anak-anak, batu yang terbentuk terutama adalah asam urat amonium, kalsium oksalat, atau campuran murni asam urat dan amonium kalsium oksalat dengan kalsium fosfat

6. Pemeriksaan Penunjang

Menurut (Stoller, 2015) pemeriksaan penunjang pada penderita vesikolitiasis dapat dilakukan dengan:

- a. BNO Melihat adanya batu radio-opak di saluran kemih. Urutan radio-opasitas beberapa jenis batu saluran kemih.
- b. IVP Mendeteksi adanya batu semi opak ataupun batu non opak yang tidak terlihat di BNO, menilai anatomi dan fungsi ginjal, mendeteksi divertikel, indentasi prostat.
- c. USG Menilai adanya batu di ginjal atau buli-buli (echoic shadow), hidronefrosis, pembesaran prostat.
- d. Pemeriksaan Laboratorium

Darah rutin, kimia darah, urinalisa dan kultur urin. Pemeriksaan ini sering dilakukan karena cenderung tidak mahal dan hasilnya dapat memberikan gambaran jenis batu dalam waktu singkat. Pada pemeriksaan dipstick, batu buli berhubungan dengan hasil pemeriksaan yang positif jika

mengandung nitrat, leukosit esterase, dan darah. Batu vesika sering menyebabkan disuria dan nyeri hebat oleh karena itu banyak pasien yang sering mengurangi konsumsi air sehingga urin akan pekat. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan adanya sel darah merah dan leukosit, dan adanya kristal yang menyusun batu vesika. Pemeriksaan kultur juga berguna untuk memberikan antibiotik yang rasional jika dicurigai adanya infeksi.

7. Komplikasi

Komplikasi menurut (Basuki, 2012) adalah sebagai berikut:

a. Hidronefrosis

Adalah pelebaran pada ginjal serta pengisutan jaringan ginjal, sehingga ginjal menyerupai sebuah kantong yang berisi kemih, kondisi ini terjadi karena tekanan aliran balik ureter dan urine keginjal akibat kandung kemih tidak mampu lagi menampung urine. Sementara urin terus-menerus bertambah dan tidak bisa dikeluarkan. Bila hal ini terjadi maka, akan timbul nyeri pinggang, teraba benjolan besar di daerah ginjal dan secara progresif dapat terjadi gagal ginjal.

b. Uremia

Adalah peningkatan ureum didalam darah akibat ketidak mampuan ginjal menyaring hasil metabolisme ureum, sehingga akan terjadi gejala mual muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, kejang, koma, nafas dan keringat berbau urin.

c. Pyelonefritis

Adalah infeksi ginjal yang disebabkan oleh bakteri yang naik secara ascendan ke ginjal dan kandung kemih. Bila hal ini terjadi maka akan timbul panas yang tinggi disertai menggigil, sakit pinggang, disuria, poliuria, dan nyeri ketok kosta vertebra.

Komplikasi lainnya seperti gagal ginjal akut sampai kronik, obstruksi pada kandung kemih, perforasi pada kandung kemih, hematuria atau kencing nanah dan nyeri pinggang kronik.

B. Konsep Nyeri

1. Definisi Nyeri

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik yang multidimensional. Fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas (ringan, sedang, berat), kualitas (tumpul, seperti terbakar, tajam), durasi (transien, intermiten, persisten), dan penyebaran (superfisial atau dalam, terlokalisir atau difus). Meskipun nyeri adalah suatu sensasi, nyeri memiliki komponen kognitif dan emosional, yang digambarkan dalam suatu bentuk penderitaan. Nyeri juga berkaitan dengan reflex menghindar dan perubahan output otonom (Bahrudin, 2017).

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang actual atau potensial. Nyeri timbul sebagai bentuk respon sensori setelah menerima rangsangan nyeri. Nyeri dapat disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan dalam tubuh

sebagai akibat dari adanya cedera, kecelakaan, maupun tindakan medis seperti operasi. Nyeri merupakan masalah yang besar bagi kesehatan dunia, dimana diperkirakan 1 dari 5 orang dewasa menderita nyeri dan 1 dari 10 orang dewasa di diagnosa dengan nyeri di diagnosa dengan nyeri kronis tiap tahunnya (Kurniyawan, 2016).

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan yang aktual dan potensial (Mohammad, 2012 dalam Lestari, 2014). Arthur C Curton, (1983) dalam A. Azis, (2009) mengemukakan bahwa nyeri merupakan suatu mekanisme produksi bagi tubuh, timbul ketika jaringan sedang dirusak, dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rangsangan nyeri. Menurut Smeltzer & Bare (2002), *International Association for the Study of Pain (IASP)* mendefinisikan nyeri sebagai suatu sensori subyektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian dimana terjadi kerusakan (Aisyah, 2017).

2. Patofisiologi Nyeri

Rangsangan nyeri diterima oleh nociceptors pada kulit bisa intensitas tinggi maupun rendah seperti perenggangan dan suhu serta oleh lesi jaringan. Sel yang mengalami nekrotik akan merilis K^+ dan protein intraseluler. Peningkatan kadar K^+ ekstraseluler akan menyebabkan depolarisasi nociceptor, sedangkan protein pada beberapa keadaan akan menginfiltrasi mikroorganisme sehingga menyebabkan peradangan atau

inflamasi. Akibatnya, mediator nyeri dilepaskan seperti leukotrien, prostaglandin E₂, dan histamine yang akan merangsang nosiseptor sehingga rangsangan berbahaya dan tidak berbahaya dapat menyebabkan nyeri (hiperalgesia atau allodynia) (Bahrudin, 2017).

Selain itu lesi juga mengaktifkan faktor pembekuan darah sehingga bradikinin dan serotonin akan terstimulasi dan merangsang nosiseptor. Jika terjadi oklusi pembuluh darah maka akan terjadi iskemia yang akan menyebabkan akumulasi K⁺ ekstraseluler dan H⁺ yang selanjutnya mengaktifkan nosiseptor. Histamin, bradikinin, dan prostaglandin E₂ memiliki efek vasodilator dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah (Bahrudin, 2017).

Hal ini menyebabkan edema lokal, tekanan jaringan meningkat dan juga terjadi Perangsangan nosisepto. Bila nosiseptor terangsang maka mereka melepaskan substansi peptida P (SP) dan kalsitonin gen terkait peptida (CGRP), yang akan merangsang proses inflamasi dan juga menghasilkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Vasokonstriksi (oleh serotonin), diikuti oleh vasodilatasi, mungkin juga bertanggung jawab untuk serangan migraine, Perangsangan nosiseptor inilah yang menyebabkan nyeri (Bahrudin, 2017).

3. Transmisi Nyeri

Terdapat beberapa teori yang berusaha menggambarkan bagaimana nosiseptor dapat menghasilkan rangsang nyeri. Sampai saat ini dikenal

berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana nyeri dapat timbul, namun teori gerbang kendali nyeri dianggap paling relevan (Bahrudin, 2017).

a. Teori Spesivitas (Specivity Theory)

Teori ini digambarkan oleh Descartes pada abad ke 17. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat organ tubuh yang secara khusus mentransmisi rasa nyeri. Syaraf ini diyakini dapat menerima rangsangan nyeri dan mentransmisikannya melalui ujung dorsal dan substansia gelatinosa ke talamus, yang akhirnya akan dihantarkan pada daerah yang lebih tinggi sehingga timbul respon nyeri. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana faktor-faktor multidimensional dapat mempengaruhi nyeri. (Hartwig & Wilson, 2005).

b. Teori Pola (Pattern Theory)

Teori ini menerangkan bahwa ada dua serabut nyeri yaitu serabut yang mampu menghantarkan rangsang dengan cepat dan serabut yang mampu menghantarkan dengan lambat. Dua serabut syaraf tersebut bersinaps pada medula spinalis dan meneruskan informasi ke otak mengenai sejumlah intensitas dan tipe input sensori nyeri yang menafsirkan karakter dan kualitas input sensasi nyeri. (Hartwig & Wilson, 2005)

c. Teori Gerbang Kendali Nyeri (Gate Control Theory)

Tahun 1959 Milzack dan Wall menjelaskan teori gerbang kendali nyeri, yang menyatakan terdapat semacam pintu gerbang yang dapat memfasilitasi transmisi sinyal nyeri. (Hartwig & Wilson, 2005).

Gate Control Theory merupakan model modulasi nyeri yang populer. Teori ini menyatakan eksistensi dari kemampuan endogen untuk mengurangi dan meningkatkan derajat perasaan nyerimelalui modulasi impuls yang masuk pada kornu dorsalis melalui “gate” (gerbang). Berdasarkan sinyal dari sistem asendens dan desendens maka input akan ditimbang. Integrasi semua input dari neuron sensorik, yaitu pada level medulla spinalis yang sesuai, dan ketentuan apakah gate akan menutup atau membuka, akan meningkatkan atau mengurangi intensitas nyeri asendens. Gate Control Theory ini mengakomodir variabel psikologis dalam persepsi nyeri, termasuk motivasi untuk bebas dari nyeri, dan peranan pikiran, emosi, dan reaksi stress dalam meningkatkan atau menurunkan sensasi nyeri. Melalui model ini, dapat dimengerti bahwa nyeri dapat dikontrol oleh manipulasi farmakologis maupun intervensi psikologis (Bahrudin, 2017).

C. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

Menurut pengkajian keperawatan yang perlu diperhatikan terkait:

- a. Demografi
 - 1) Usia, Paling sering didapatkan pada usia 30 sampai 50 tahun
 - 2) Jenis kelamin, Banyak ditemukan pada pria dibandingkan Wanita
 - 3) Suku bangsa, Banyak ditemukan pada bangsa asia dan afrika
 - 4) Pekerjaan, Orang yang pekerjaan banyak duduk/kurang aktivitas
- b. Riwayat penyakit sekarang

Keluhan utama yang sering terjadi pada pasien dengan batu kandung kemih adalah nyeri pada kandung kemih yang menjalar ke penis, berat ringannya tergantung pada lokasi dan besarnya batu, dapat terjadi nyeri/kolik renal. Pasien dapat juga mengalami gangguan gastrointestinal dan perubahan dalam eliminasi urin.

c. Riwayat penyakit dahulu

Keadaan atau penyakit-penyakit yang pernah diderita oleh penderita yang mungkin berhubungan dengan batu saluran kemih antara lain infeksi kemih, hiperparatiroidisme, penyakit inflamasi usus, gout, keadaan-keadaan yang mengakibatkan hiperkalsemia, immobilisasi lama dan dehidrasi.

d. Riwayat penyakit keluarga

Beberapa penyakit atau kelainan yang sifatnya herediter dapat menjadi penyebab terjadinya batu ginjal antara lain riwayat keluarga dengan renal tubular acidosis (RTA), cystinuria, xanthinuria, dan dehidroksinadeninuria.

e. Pola fungsional

1) Pola persepsi dan pemeliharaan Kesehatan

Pasien biasanya tinggal pada lingkungan dengan temperatur panas dan lingkungan dengan kadar kalsium yang tinggi pada air. Terdapat riwayat penggunaan alcohol, obat-obatan seperti antibiotic, antihipertensi, natrium bikarbonat, alupurinol dan sebagainya. Aktivitas olahraga tidak pernah dilakukan.

2) Pola nutrisi dan metabolisme

Adanya asupan dengan diet tinggi purin, kalsium oksalat, dan fosfat. Terdapat juga ketidakcukupan intake cairan. Pasien dengan batu kandung kemih dapat mengalami mual/muntah, nyeri tekan abdomen.

3) Pola eliminasi

Pada pasien dengan batu kandung kemih terdapat riwayat adanya ISK kronis, adanya obstruksi sebelumnya sehingga dapat mengalami penurunan haluaran urine, kandung kemih terasa penuh, rasa terbakar saat berkemih, sering berkemih dan diare

4) Pola istirahat dan tidur

Pasien dengan batu kandung kemih dapat mengalami gangguan pola tidur apabila nyeri timbul pada malam hari/ saat tidur

5) Pola aktivitas

Adanya riwayat keterbatasan aktivitas, pekerjaan monoton ataupun imobilisasi sehubungan dengan kondisi sebelumnya (contoh: penyakit tak sembuh, cedera medulla spinalis)

6) Pola hubungan dan peran

Didapatkan riwayat pasien tentang peran dalam keluarga dan masyarakat. Interaksi dengan keluarga dan orang lain serta hubungan kerja, adakah perubahan atau gangguan.

7) Pola persepsi dan konsep diri

Pasien dapat melaporkan adanya keresahan gugup atau kecemasan yang dirasakan sebagai akibat kurangnya pengetahuan tentang kondisi, diagnosa dan tindakan operasi.

8) Pola kognitif-perseptual

Didapatkan adanya keluhan nyeri, nyeri dapat akut ataupun kolik tergantung lokasi batu.

9) Pola reproduksi dan seksual

Dikaji tentang pengetahuan fungsi seksual, adakah perubahan dalam hubungan seksual karena perubahan kondisi yang dialami.

10) Pola coping dan penanganan stress

Dikaji tentang mekanisme pasien terhadap stress, penyebab stressnya yang mungkin diketahui, bagaimana mengambil keputusan.

11) Pola tata nilai dan kepercayaan

Bagaimana praktek religius pasien (type, frekuensi) dengan apa (siapa) pasien mendapat sumber kekuatan/makna.

f. Pemeriksaan fisik

1) Tanda-tanda vital

Peningkatan tekanan dan nadi, peningkatan suhu bila dijumpai infeksi

2) Kulit

Hangat dan kemerahan, pucat

3) Abdomen

Adanya nyeri tekan abdomen, distensi abdominal, penurunan atau tidak adanya bising usus.

g. Pemeriksaan diagnostic

1) Urinalisa

Warna mungkin kuning, coklat gelap, berdarah : secara umum menunjukkan SDM, SDP, kristal (sistin, asam urat, kalsium oksalat), serpihan mineral, bakteri, PUS : pH mungkin asam (peningkatan magnesium, fosfat ammonium / batu kalsium fosfat

2) Urine 24 jam

Kreatinin, asam urat, kalsium, fosfat, oksalat/sistin mungkin meningkat.

3) Kultur urin

Mungkin menunjukkan ISK ((Staphylococcus Aureus, proteus, klebsiella, pseudomonas)

4) Survei biokimia

Peningkatan kadar magnesium, kalsium, asam urat, protein, elektrolit.

5) BUN/ kreatinin serum dan urine

Abnormal (tinggi pada serum / rendah pada urine) sekunder tingginya batu osbtruksi pada ginjal menyebabkan iskemia/nekrosis.

6) Kadar klorida dan bikarbonat serum Peningkatan kadar klorida dan penurunan kadar bikarbonat menunjukkan terjadinya asidosis tubulus ginjal.

7) Hitung darah lengkap

a) Sel darah putih, mungkin meningkat menunjukkan infeksi / septilumia.

b) Sel darah merah biasanya normal

c) Hb/Ht, Abnormal bila pasien dehidrasi berat / polisitemia terjadi (mendorong presipitasi pematangan) / anemia (perdarahan, disfungsi/gagal ginjal)

8) Hormone paratinoid

Mungkin meningkat jika gagal ginjal (PTH merangsang reabsorpsi kalsium dari tulang meningkatkan sirkulasi serum dan kalsium urine.

9) Foto rontgen KUB

Menunjukkan adanya kalkuli atau perubahan anatomic pada area ginjal dan sepanjang ureter.

10) IVP

Memberikan konfirmasi cepat urolithiasis seperti penyebab nyeri abdominal atau panggul. Menunjukkan abnormalitas pada struktur anatomic (distensi ureter) dan garis bentuk kalkuli

11) Sistouterkopi

Visualisasi langsung kandung kemih dapat menunjukkan batu /efek-efek obtruksi.



2. Diagnosis Keperawatan

Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan gangguan vesikolithiasis yang bersumber dari buku (PPNI, 2017b) adalah intoleransi aktivitas, gangguan pola tidur, nyeri akut dan hypovolemia.

a. Masalah keperawatan 1: intoleransi aktivitas

- 1) Definisi: ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari
- 2) Batasan karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Mengeluh lelah	Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
Dispnea saat/setelah Melakukan aktivitas\merasa tidak nyaman setelah beraktivitas Merasa lemah	Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/ setelah Beraktivitas Gambaran EKG menunjukkan iskemia Sianosis

3) Factor yang berhubungan

- a) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
- b) Tirah baring
- c) Kelemahan
- d) Imobilitas
- e) Gaya hidup monoton

b. Masalah keperawatan 2: gangguan pola tidur

- 1) Definisi: gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat factor eksternal
- 2) Batasan karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Mengeluh sulit tidur	Tidak tersedia

Mengeluh sering terjaga	
Mengeluh tidak puas tidur	
Mengeluh pola tidur berubah	
Mengeluh istirahat tidak cukup	
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
Mengeluh kemampuan beraktivitas menurun	Tidak tersedia

1) Factor yang berhubungan

- a) Hambatan lingkungan (mis: kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan/pemeriksaan/tindakan)
- b) Kurang control tidur
- c) Kurang privasi
- d) Restraint fisik
- e) Ketiadaan teman tidur
- f) Tidak familiar dengan peralatan tidur

b. Masalah keperawatan 3: nyeri akut

- 1) Definisi: pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.
- 2) Batasan karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Mengeluh nyeri	Tampak meringis Bersikap protektif (mis. Waspada, posisi menghindari nyeri) Gelisah Frekuensi nadi meningkat Sulit tidur
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif

Tidak tersedia	Tekanan darah meningkat Pola nafas berubah Nafsu makan berubah Proses berpikir terganggu Menarik diri Berfokus pada diri sendiri diaforesis
----------------	--

3) Factor yang berhubungan

- a) Agen pencedera fisiologis (inflamasi, iskemia, neoplasma)
- b) Agen pencedera kimiawi (terbakar, bahan kimia iritan)
- c) Agen pencedera fisik (abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan).

c. Masalah keperawatan 4: hypovolemia

- 1) Definisi: penurunan volume cairan intravascular, interstisial atau intraselular
- 2) Batasan karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
Tidak tersedia	Frekuensi nadi meningkat Nadi teraba lemah Tekanan darah menurun Tekanan nadi menyempit Turgor kulit menurun Membrane mukosa kering Volume urin menurun Hematocrit meningkat
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
Merasa lemah Mengeluh haus	Pengisian vena menurun Status mental berubah Suhu tubuh meningkat Konsentrasi urin meningkat Berat badan turun tiba-tiba

3) Factor yang berhubungan

- a) Kehilangan cairan aktif
- b) Kegagalan mekanisme regulasi
- c) Peningkatan permeabilitas kapiler
- a) Kekurangan intake cairan
- b) Evaporasi

3. Intervensi Keperawatan

- a. Masalah Keperawatan 1 : intoleransi aktivitas
- b. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan respon fisiologis terhadap aktivitas yang membutuhkan tenaga dapat meningkat
- c. Kriteria Hasil: (Tim Pokja SLKI, 2019)

Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat

Kekuatan tubuh bagian atas meningkat

Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat

Keluhan Lelah menurun

- d. Intervensi Keperawatan dan Rasional (PPNI, 2018)

Intervensi Keperawatan	Rasional
Manajemen energi	mengetahui penyebab terjadinya kelelahan
Observasi Identifikasi gangguan tubuh yang mengakibatkan kelelahan	
Monitor pola dan jam tidur	Menghindari kelelahan akibat kurang tidur
Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas	Untuk mengidentifikasi penyebab pasien tidak toleransi aktivitas
Teraupetik Lakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif	Meminimalkan atrofi otot
Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan	Memberikan rasa nyaman pada pasien
Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan	mengurangi resiko jatuh/sakit pada klien
Edukasi Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap	melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi
Anjurkan hubungi perawat jika tanda dan kelelahan tidak berkurang	untuk mengidentifikasi rencana tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perawat
Kolaborasi	
Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan	Pemberian gizi yang cukup dapat meningkatkan energi klien

- a. Masalah keperawatan 2: gangguan pola tidur

- 1) Tujuan : setelah dilakukan intervensi selama X 24 jam

diharapkan pola tidur membaik

2) Kriteria hasil:

- Keluhan sulit tidur menurun
- Keluhan sering terjaga berkurang
- Keluhan tidak puas tidur membaik
- Keluhan pola tidur berubah
- Keluhan istirahat tidak cukup menurun
- Kemampuan beraktivitas meningkat

3) Intervensi keperawatan dan rasional

Intervensi Keperawatan	Rasional
Dukungan tidur Observasi Identifikasi pola aktivitas dan tidur	mengetahui penyebab terganggunya pola tidur
Identifikasi factor pengganggu tidur	Untuk mengetahui penyebab pengganggu tidur
Teraupetik Tetapkan jadwal tidur rutin	Mengatur pola tidur pasien
Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan	Memberikan relaksasi pada pasien
Sesuaikan jadwal pemberian obat dan/atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga	Mengatur pola tidur
Edukasi Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit	Menambah energi dan mempercepat proses penyembuhan
Anjurkan menghindari makan/minum yang mengganggu tidur	Pasien dapat mengatur pola tidur dengan baik
Ajarkan relaksasi otot autogenic atau cara nonfarmakologi lainnya	Memberikan kenyamanan dan meningkatkan pola tidur pasien

a. Masalah keperawatan 3: nyeri akut

1) Tujuan : setelah dilakukan intervensi selamaX 24 jam diharapkan nyeri menurun

2) Kriteria hasil

- Keluhan nyeri menurun
- Meringis menurun
- Frekuensi nadi membaik
- Tekanan darah membaik

3) Intervensi Keperawatan dan rasional

Intervensi Keperawatan	Rasional
Manajemen energi Observasi Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri	Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien
Identifikasi skala nyeri	Mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien
Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri	Mengetahui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien
Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup	Mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengaruhi kualitas hidup pasien
Teraupetik Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)	Mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya
Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri	mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri
Fasilitasi istirahat dan tidur	mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istirahat pasien
Edukasi jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri	Memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien
Jelaskan strategi mengatasi nyeri	Membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul
Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri	Pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebab, lokasi saat nyeri muncul
Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri	Memudahkan pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara sederhana tanpa menggunakan obat-obatan
Kolaborasi	
Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu	Mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien, pemberian analgetik sesuai kebutuhan pasien.

a. Masalah keperawatan 4: hypovolemia

1) Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama...X

24 jam diharapkan status cairan membaik

2) Kriteria hasil:

- Kekuatan nadi meningkat
- Turgor kulit membaik

- Output urine meningkat
- Konsentrasi urin menurun
- Tekanan darah membaik

3) Intervensi dan rasional

Intervensi Keperawatan	Rasional
Manajemen hipovolemia Observasi Periksa tanda dan gejala hypovolemia (mis. Nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membrane mukosa kering, volume urin menurun, hematocrit meningkat, haus, lemah)	Untuk mengetahui adanya tanda dan gejala dehidrasi
Teraupetik Hitung kebutuhan cairan	Untuk memberikan informasi status keseimbangan cairan untuk menetapkan kebutuhan cairan
Berikan asupan cairan oral	Menambah asupan cairan
Edukasi Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral	Menyeimbangkan cairan masuk dalam tubuh
Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak	Menghindari atrofi otot, meningkatkan sirkulasi, mampu mencegah kontraktur
Kolaborasi Kolaborasi pemberian cairan IV isotonis (mis. NaCl, RL)	pemberian cairan intravena dapat menyeimbangkan elektrolit

4. Evidence Based Nursing

Terapi Murottal Al-Qur'an adalah rekaman suara Al-Qur'an yang dilagukan oleh Qori' (Pembaca Al-Qur'an). Lantunan Al-Qur'an mengandung suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon- hormon stres dengan cara mengaktifkan hormon endorphin alami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian rasa takut, cemas, serta dapat memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi dan aktivitas gelombang otak

(Bahuddin, 2021).

Suara manusia dapat disebut sebagai instrument. Irama suara manusia yang indah dapat mengaktifkan hormone endorphin dalam tubuh secara alami, sehingga dapat membuat tubuh menjadi rileks, menurunkan rasa cemas, menstabilkan irama pernafasan, nadi, jantung serta gelombang otak. Saat seseorang diperdengarkan suara lantunan ayat-ayat Al-Qur'an maka seketika itu pula akan terjadi perubahan arus listrik di otot, sirkulasi darah, kadar darah dan detak jantung (Taslim & Cahyani, 2021).

Adanya perubahan yang dirasakan maka akan mengalami keadaan rileksasi pada syaraf sehingga terjadinya vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) pada urat nadi dan peningkatan kadar konsentrasi oksigen dalam darah, dengan di ikuti oleh perlambatan irama detak jantung. Ketika seseorang mendengarkan terapi murottal Al-Qur'an maka otak manusia akan bereaksi sehingga memproduksi zat kimia yaitu neuropeptide. Neuropeptide tersebut akan diangkut melalui berbagai reseptor keseluruhan tubuh sehingga tubuh pun akan mengalami positive feedback yaitu yang disebut keadaan relaksasi (Taslim & Cahyani, 2021).

Menurut Puji Rochmawati, (2018) mendengarkan lantunan ayat-ayat alqur'an yang dibacakan secara tartil dan benar, akan memberikan efek ketenangan jiwa. Lantunan ayat-ayat Al-qur'an yang didengar merupakan instrument penyembuhan dan alat yang paling mudah dijangkau untuk sebuah terapi. Suara dari bunyi lantunan dapat menurunkan hormone stress dan mengaktifkan hormon endofrin alami,

sehingga memunculkan perasaan rileks yang berdampak menurunkan tekanan darah dan membuat pernafasan melambat, detak jantung, denyut nadi dan aktivitas gelombang otak berada pada kondisi stabil (Handayani et al., 2016) (Purwati et al., 2019) dalam (Sari et al., 2023). Ayat Al-Quran yang dilantunkan saat terapi murottal adalah surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Naas, ayat Qursy, surat Yasin ayat ke 58, Al-An'am ayat 1-3 dan 13 kemudian Ar Rahman ayat 1-78. Dalam Surat Ar-Rahman yang memiliki banyak ayat saat dilantunkan secara berulang-ulang sehingga mempunyai pengaruh dalam mengalihkan perhatian dan berfungsi sebagai hipnotis yang menurunkan gelombang otak pasien. Karakteristik surat Ar-Rahman memiliki tempo 79,8 bpm. Kategori tempo ini termasuk dalam tempo yang lambat dan seiring dengan denyutan jantung yang normal, sehingga denyut jantung klien akan sinkron dengan tempo murottal. Tempo murottal al-Qur'an juga berada antara 60-70/menit, serta nadanya rendah sehingga mempunyai efek relaksasi dan dapat menurunkan stress dan hipnotis mengalihkan perhatian pada kondisi nyeri (Aziza, 2019) dalam (Sari et al., 2023).

Di dalam intervensi ini menggunakan salah satu surah dalam Al-Qur'an yaitu surah Ar-Rahman yang merupakan surat ke 55 dan berjumlah 78 ayat. Dalam surat ini menerangkan bahwa Allah swt memiliki sifat murah hati kepada hamba-hamba Nya, yakni dengan memberikan nikmat yang tak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahman mempunyai karakter ayat yang pendek sehingga ayat ini nyaman didengarkan dan dapat menimbulkan efek relaksasi yang bagi pendengar

yang masih awam sekalipun (Lumbantobing & Anna, 2019).

Selain dapat menurunkan nyeri mendengarkan murottal Al-Qur'an juga dapat memperoleh ketenangan jiwa, serta pasien dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-A'raf/7:204

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan apabila dibacakan al-quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmatnya" (Kemenag RI, 2019).

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk Ilahi dan kembali menerima tuntunan-Nya, sebagaimana disebut pada ayat yang lalu, adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketenteraman itu bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni mengingat Allah atau karena ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, yang memesona kandungan serta redaksinya. Sungguh camkanlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, seperti yang keadaanya seperti itu, yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik, yaitu surga.

1. Tujuan

Adapun tujuan terapi *Murottal* Al-Qur'an yaitu :

- a. Mampu menurunkan Skala Nyeri
- b. Memperbaiki kondisi pasien yang ditandai dengan status hemodinamik dalam batas normal.

- c. Mencegah kerusakan sel otak akibat iskemik yang ditimbulkan oleh cedera kepala (Ismoyowati, 2021)

2. Indikasi

- a. Pasien yang mengalami nyeri
- b. Pasien yang mengalami Kecemasan
- c. Pasien yang mengalami stroke hemoragik dan nonhemoragik
(Arif dan Atika, 2019)

3. Kontraindikasi

Kontraindikasi *Murottal* menurut (Ika Sulistyawati, 2020) terapi *Murottal* ini tidak dapat digunakan bagi pasien non muslim dan yang mengalami gangguan pendengaran.



4. Prosedur Penatalaksanaan dan rasional

No	Prosedur Tindakan
1.	<p>Fase orientasi:</p> <p>a. Memberi salam terapeutik kepada keluarga klien Rasional : Salam terapeutik merupakan salah satu cara untuk membina terus antara perawat dan pasien / keluarga pasien.</p> <p>b. Memperkenalkan diri : Rasional : Memperkenalkan diri dapat menumbuhkan hubungan saling percaya kepada perawat dan keluarga klien.</p> <p>c. Menjelaskan tujuan Rasional : Dengan memberi penjelasan kepada klien / keluarga klien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, maka keluarga klien diharapkan mempunyai gambaran mengenai tindakan yang akan dilakukan dan memberi pilihan klien dan keluarga untuk tetap melanjutkan tindakan atau tidak.</p> <p>d. Kontrak Waktu Rasional : Menjelaskan waktu dilakukannya tindakan dan durasi serta berapa kali dilakukannya tindakan kepada keluarga klien agar klien atau keluarga klien memahami tindakan yang akan dilakukan berikutnya.</p> <p>e. Menyiapkan alat Rasional : Memudahkan perawat melakukan tindakan.</p>
2.	<p>Fase Kerja</p> <p>a. Mencuci tangan Rasional : Menghindari penyebaran mikroorganisme</p> <p>b. Membaca basmalah Rasional : Menerapkan nilai islami</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran pasien Rasional : Mengetahui keadaan umum pasien sebelum dilakukan tindakan</p> <p>d. Memberikan terapi <i>Murattal</i> selama 15-20 menit dengan menggunakan handphone aplikasi SINC Rasional : Untuk meningkatkan keadaan umum serta meningkatkan kesadaran pasien</p> <p>e. Mengatur volume musik dengan frekuensi 40 Hz (Volume sedang) Rasional : Agar klien dan keluarga klien merasa nyaman</p> <p>f. Melakukan pemeriksaan ulang tanda-tanda vital dan kesadaran atau skala nyeri pasien setelah diberikan terapi <i>Murottal</i>.</p> <p>g. Memasukkan hasil pemeriksaan ke lembar pemantauan tanda-tanda vital pasien.</p>
3.	<p>Fase Terminasi</p> <p>a. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada keluarga klien</p>

	Rasional : Agar keluarga klien mengetahui tindakan selanjutnya b. Mengucapkan salam Rasional : Membina hubungan saling percaya
4.	Pendokumentasian: a. Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan 1) Nama pasien, umur, jenis kelamin, dll 2) Keluhan utama 3) Tindakan yang dilakukan (terapi murottal) 4) Lama tindakan 5) Jenis terapi murottal yang diberikan 6) Reaksi selam, setelah terapi pemberian terapi murottal 7) Respon pasien 8) Nama perawat 9) Tanggal pemeriksaan (Ismoyowatu, 2021)

5. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi terapi murottal Al-Qur'an adalah sebagai beriku :

1. Skala nyeri menurun
2. Tanda-tanda vital membaik
3. Respon pasien meningkat (Siti Mutiah, 2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Menurut (Hidayat, 2019) studi kasus (Case Studies) ialah bagian dari metodologi penelitian, atau sering dibahasakan bahwa peneliti dituntut agar lebih cermat, trliti untuk mengungkapkan suatu kasus atau peristiwa, baik kasus perseorangan maupun berkelompok. Pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini jenis penelitian yang penulis gunakan ialah “Studi Kasus” dimana dalam pelaksanaanya yaitu dengan melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang sedang menjalankan proses perawatan di rumah sakit.

B. Subyek Studi Kasus

Dalam studi kasus ini subjek yang digunakan adalah bersifat individu atau pasien yang telah memenuhi kriteris inklusi dan ekslusi.

1. Kriteria inklusi ialah suatu karateristik umum dalam subjek penelitian dari suatu populasi target yang bisa dijangkau dan diteliti (Nuralam, 2017).
 - a. Pasien yang mengalami Nyeri
 - b. Pasien dengan diagnosa medis Vesikolithiasis
2. Kriteria ekslusi ialah menghapus atau mengeluarkan subjek tidak memenuhi kriteria inklusi
 - a. Pasien dengan penurunan kesadaran
 - b. pasien yang tidak kooperatif

C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus pada penelitian ini ialah melakukan asuhan keperawatan pada pasien Vesikolithiasis dengan masalah keperawatan Nyeri menggunakan Terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-rahman

D. Intstrumen Studi Kasus

Menurut (Sugiyono, 2014) instrumen penelitian diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang akan diamati. Dalam studi kasus ini instrumen yang digunakan berupa alat yaitu handphone, dimana alat ini digunakan untuk membuka sebuah aplikasi SINC untuk memutar Murottal Al-Qur'an yang bisa didengarkan oleh pasien baik sebelum dan setelah intervensi diberikan.

E. Prosedur Studi Kasus

1. Tahap Persiapan

- a. Peneliti mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti, kemudian mengajukan berbasis *Evidance based practice nursing* (EBPN) kepada pasien yang telah dipilih, berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing institusi.
- b. Peneliti melakukan koordinasi kepada kepala ruangan tempat pasien dirawat inap yaitu ruang Bedah RSUD Syekh Yusuf Gowa, serta menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan.
- c. Peneliti menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam melakukan intervensi yaitu Terapi Murottal Al-qur'an surah Ar-Rahman.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.

3. Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang telah dianjurkan oleh institusi dalam hal ini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Ners.

F. Tempat dan Waktu pengambilan Data

Penelitian ini dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, tepatnya diruang Bedah dan dilakukan pada tanggal

G. Analisis Data Dan Penyajian Data

Analisis data dilakukan saat peneliti berada dilapangan atau ruang perawatan, pada saat pengumpulan sampai keseluruhan fakta-fakta, membandingkan dengan teori yang kemudian akan dituangkan melalui opini pada bagian pembahasan. Teknik yang digunakan yaitu dengan menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf berdasarkan jawaban yang telah diperoleh dari hasil observasi ataupun wawancara, serta dokumentasi yang kemudian akan dipresentasikan oleh peneliti untuk memberikan intervensi terkait masalah yang ditemukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data dimana data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan hasil intervensi yang telah dilakukan peneliti kepada pasien.

H. Etika Studi Kasus

Dalam penelitian studi kasus ini peneliti menekankan beberapa prinsip etik dalam keperawatan yaitu menurut (Notoatmojo, 2012).

1. *Autonomy* (Otonomi /Keyakinan)

Peneliti menerapkan prinsip otonomi bahwa seseorang / pasien memiliki keyakinan, keputusan, ataupun pilihan sendiri untuk memberi persetujuan kepada peneliti dalam memberikan tindakan. Dalam hal ini persetujuan tindakan yang akan diberikan kepada pasien telah melalui Informed consent (izin) kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk membantu pasien dalam mendengarkan murottal Al-qur'an.

2. *Non Malafience* (Tidak Merugikan)

Peneliti menerapkan prinsip tidak merugikan, dimana selama proses perawatan atau pemberian intervensi Terap murottal Al-qur'an peneliti tidak akan memberikan kerugian kepada pasien dalam hal ini, tidak dapat memperburuk keadaan pasien baik secara fisik maupun psikologi. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al-Qasas/ 28:77



Terjemah nya :

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(Al-Qasas/28:77)

Tafsir Ringkas (Kemenag, 2019) Nasihat di atas tidak berarti seseorang hanya boleh beribadah murni (mahdah) dan melarang memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran untuk

memperoleh harta, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia, berupa kekayaan dan karunia lainnya, dengan menginfakkan dan menggunakannya di jalan Allah. Akan tetapi, pada saat yang sama janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia dengan tanpa berlebihan. Dan berbuatbaiklah kepada semua orang dengan bersedekah sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmat-Nya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dalam bentuk apa pun di bagian mana pun di bumi ini, dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan dan akan memberikan balasan atas kejahatan tersebut. (Al-Qasas/28:77)

3. Confidentiality (Kerahasiaan)

Peneliti menerapkan prinsip kerahasiaan dimana informasi pasien dijaga kerahasiaannya dalam hal ini penggunaan nama diubah menjadi inisial pasien, sehingga tidak akan ada dari pihak manapun yang akan mengetahui identitas pasien

BAB IV

LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2022
Jam Pengkajian : 10:00 Wita
Pengkaji : M. Akil Agung Setiabudi
Ruang : Perawatan Bedah

1. Identitas

a) Pasien

Nama : Tn. Y
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 55 Tahun
Agama : Islam
Status Perkawinan : menikah
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan terakhir : SMP
Alamat : Pakatto
No. RM : 576175
Diagnostik Medis : Vesikolitiasis
Tgl masuk RS : 11 oktober 2022

b) Penanggung Jawab

Nama : Rahmi
Umur : 29 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pakatto

2. Riwayat Keperawatan

a) Riwayat Kesehatan Pasien

3. Riwayat Penyakit Sekarang

a. Keluhan utama

Nyeri Post Op abdomen region bawah

b. Kronologi penyakit saat ini (dimulai kapan klien sakit, riwayat pengobatan, respon terhadap pengobatan, perjalanan pengobatan/perawatan di RS saat ini).

Pasien sakit dimulai sejak 2 minggu yang lalu dengan keluhan nyeri abdomen, pasien awalnya berobat di rumah sakit yapika lalu dirujuk ke RS Syekh Yusuf pada tanggal 8 oktober 2022. Pasien di diagnosis menderita penyakit vesikolithiasis dan pasien mendapatkan tindakan pembedahan pada tanggal 9 oktober 2022.

c. Pengaruh penyakit terhadap pasien

Pasien mengatakan nyeri, susah untuk melakukan aktivitas, pasien juga mengatakan tidak pernah sholat karena penyakitnya

d. Apa yang diharapkan pasien dari pelayanan kesehatan

Pasien mengatakan semoga bias cepat pulih dari penyakitnya agar bias kembali beraktivitas seperti semula.

4. Riwayat Penyakit Masa Lalu

a. Penyakit masa anak – anak.

Pasien mengatakan tidak ada penyakit yang diderita pada waktu anak-anak

b. Imunisasi

Pasien mengatakan lupa dengan riwayat imunisasinya

c. Alergi

Pasien mengatakan tidak ada riwayat alergi

d. Pengalaman sakit / dirawat sebelumnya

Pasien mengatakan 5 tahun yang lalu pernah dirawat di RS angkatan laut dengan penyakit stroke

e. Pengobatan terakhir. Tidak dikaji

G3: pasien mengatakan saudaranya meninggal karena penyakit hipertensi, pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi, pasien pola hidupnya merokok

a. Dengan siapa klien tinggal dan berapa jumlah keluarga?

Pasien mengatakan ia tinggal Bersama istri, anaknya 4, menantunya 1

b. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa?

Pasien mengatakan keluarga pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga menderita penyakit yang sama.

c. Apakah ada keluarga yang mempunyai penyakit menular atau menurun?

Pasien mengatakan keluarganya yaitu saudara-saudaranya memiliki riwayat penyakit hipertensi keturunan dari ibunya.

d. Bagaimana efek yang terjadi pada keluarga bila salah satu anggota keluarga sakit?

Pasien mengatakan jika ada anggota keluarga yang sakit langsung memeriksakan kondisi kesehatannya di puskesmas atau rumah sakit terdekat jika tidak bias diatasi sendiri.

6. Pengkajian Biologis (Dikaji Sebelum Dan Sesudah Sakit)

1) Rasa Aman Dan Nyaman

a. Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana ? jelaskan secara rinci:PQRST.

P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak

Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk

R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah(hipogastrik)

S: skala nyeri 5

T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul Pasien tampak meringis

Durasi nyeri 1-2 menit

b. Apakah mengganggu aktifitas?

Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur.

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi / menghilangkan nyeri?

Pasien mengatakan jika nyerinya datang pasien hanya berkuat di tempat tidurnya sambil menahan rasa sakitnya.

d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif?

Pasien mengatakan cara yang digunakan kurang efektif karena nyeri masih tetap dirasakan.

e. Apakah ada riwayat pembedahan ?

pasien mengatakan operasi vesikolitiasis pada tanggal 9 oktober 2022.

Tampak luka post operasi bagian abdomen region bawah

2) Aktifitas Istirahat – Tidur

a. Aktifitas

1. Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR? Sebelum sakit pasien mengatakan jarang berolahraga Setelah sakit Pasien mengatakan jarang berolahraga

2. Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas? Sebelum sakit pasien tidak menggunakan alat bantu beraktivitas Pada saat masuk RS sesudah operasi pasien dibantu oleh keluarganya untuk beraktivitas (berjalan, mengganti baju dll)

3. Apakah ada gangguan aktifitas?

Sebelum masuk RS pasien mnegatakan tidak ada gangguan dalam beraktivitas.

Pasien mengatakan tidak ada gangguan aktivitas

4. Berapa lama melakukan kegiatan perhari? Jam erapa mulai kerja? Pasien megatakan pasien bekerja sebagai buruh dan juga pernah bekerja sebagai sopir pergi pagi pulang malam.

Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur

5. Apakah klien mempunyai ketrampilan khusus?

Pasien mengatakan tidak ada keterampilan khusus

6. Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara Rinci. Pasien mengatakan sekarang aktivitasnya hanya di tempat tidur, dan dibantu oleh keluarganya

b. Istirahat

1. Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Sebelum sakit pasien mengatakan istirahatnya tidak menentu Pasien mengatakan semenjak sakit pasien beristirahat dimulai dari pagi hari sampai malam.

Pasien hanya terbaring di tempat tidur

2. Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang? Sebelum sakit pasien hanya menyempatkan waktu untuk tidur Pada saat sakit Pasien mengatakan hanya terbaring di tempat tidur menonton tv

3. Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat? Sebelum sakit Pasien mengatakan tidak menyediakan waktu khusus untuk istirahat

4. Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby?

-

5. Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini? Pasien mengatakan istirahatnya cukup

c. Tidur

1. Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama /nyenyak/tidak?)
Pasien mengatakan sebelum sakit tidurnya tidak menentu karena pekerjaan sebagai sopir Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam Pasien mengatakan sering terbangun Pasien mengatakan tidur siang kurang lebih 2 jam

2. Apakah kondisi saat ini mengganggu klien?

Pasien mengatakan kondisinya sangat mengganggu Pasien mengatakan kondisi sekarang membuat pasien tidak bias melaksanakan sholat

3. Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur?

Tidak ada obat penenang

4. Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur?

Pasien mengatakan tidak ada kegiatan yang dilakukan menjelang tidur

5. Bagaimana kebiasaan tidur?

Sebelum sakit pasien mengatakan tidur tidak menentu Pasien mengatakan semenjak sudah operasi pasien tidur dengan posisi terlentang

6. Apakah klien sering terjaga saat tidur?

Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri

7. Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? Pasien mengatakan tidak

bisa tidur jika masih ada lampu yang menyala Pasien mengatakan tidak bisa tidur karena nyeri

8. Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut?

Tidak ada

3) Cairan

a. Berapa banyak klien minum perhari? Gelas? Pasien mengatakan minum kurang lebih 2 liter per hari

b. Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum klien? Pasien hanya minum air putih

c. Apakah ada minuman yang disukai/ dipantang?

Tidak ada

d. Apakah klien terbiasa minum alkohol? Pasien mengatakan tidak pernah minum alkohol

- e. Bagaimana pola pemenuhan cairan perhari? Pasien mengatakan minum sedikit-sedikit tapi sering
- f. Ada program pembatasan cairan?
Tidak ada
- g. Bagaimana balance cairan klien ?
Terpasang infus RL 20 TPM

4) Nutrisi

- a. Apa yang biasa di makan klien tiap hari? Sebelum sakit pasien makan nasi dan lauk Pasien mengatakan semenjak dirawat di RS pasien makan bubur pagihari siang dan malam makan nasi yang diberikan oleh ahli gizi.
- b. Bagaimana pola pemenuhan nutrisi klien? Berapa kli perhari? Pasien mengatakan porsi makan dihabiskan
- c. Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang? Pasien mengatakan tidak ada makanan yang dipantang
- d. Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan? Tidak ada riwayat alergi makanan
- e. Apakah ada kesulitan menelan? Mengunyah? Pasien mengatakan tidak kesulitan menyalurkan dan menelan
- f. Apakah ada alat bantu dalam makan? Sonde, infus. Tidak ada alat bantu makan, terpasang infus RL 20 TPM
- g. Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan? Tidak ada
- h. Bagaimana kondisi gigi geligi klien? Jumlah gigi? Gigi palsu?
- i. Kekuatan gigi?Kondisi gigi lengkap, dan masih kuat.
- j. Adakah riwayat pembedahan dan pengobatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan? Tidak ada

k. Adakah program DIET bagi klien ? Jenis ? Bila ada, jelaskan secara RINCI!

Pasien dianjurkan diet rendah garam

Bentuk makan lunak

5) Eliminasi: Urine Dan Feses

a. Eliminasi feses:

1. Bagaimana pola klien dalam defekasi? Kapan, pola dan karakteristik feses? Sebelum sakit pasien mengatakan defekasi setiap pagi hari Pasien mengatakan defekasi sebanyak 1 sampai 2 kali per hari, fesesencer dan berwarna hitam
2. Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar? Tidak ada
3. Apakah ada kesulitan? Tidak ada
4. Usaha yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah? Tidak ada
5. Apakah klien menggunakan alat bantu untuk defeksi? Pasien tidak menggunakan alat bantu defekasi

b. Eliminasi Urine:

1. Apakah BAK klien teratur?
Sebelum sakit pasien mengatakan BAK teratur 5-7 kali per hari Semenjak sakit Pasien mengatakan tidak merasakan ketika BAK
2. Bagaimana pola , frekuensi, waktu,karakteristik serta perubahanyang terjadi dlam miksi?
Pasien mengatakan BAK di kateter dan tidak merasakan BAK nyakeluar.
Nampak berwarna pekat serta berwarna merah
Frekuensi kurang lebih 5 kali perhari
3. Bagaimana perubahan pola miksi klien?

Pada saat sebelum operasi pasien mengatakan nyeri pada saat miksi
Frekuensi BAK tidak lancar hanya sedikit-sedikit

Pada saat setelah operasi pasien mengatakan tidak merasakan pada saat
buang air kecil

4. Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan alat bantu dalam miksi?

Pasien riwayat pembedahan vesikolithiasis

Pasien terpasang keteter sejak 2 minggu yang lalu

5. Berapa volume air kemih?
6. Volume 2500 cc per hari
7. Bila menggunakan alat bantu sudah berapa lama?
Sejak 2 minggu yang lalu

6) Kebutuhan Oksigenasi Dan Karbondioksida

a. Pernafasan.

1. Apakah ada kesulitan dalam bernafas? Bunyi nafas? Dyspnea? Pasien tidak memiliki kesulitan bernafas, bunyi nafas bronchial, eupnea
2. Apakah yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah? Tidak ada masalah pada pernafasan
3. Apakah klien menggunakan alat bantu pernafasan? (Ya, jelaskan apa jenisnya)
Tidak ada alat bantu pernafasan
4. Posisi yang nyaman bagi klien?
Pasien nyaman dengan posisi telentang
5. Apakah klien terbiasa merokok? Obat – obatan untuk melancarkan pernafasan?
Pasien mengatakan sering merokok biasa menghabiskan 2 batang perhari
6. Apakah ada alergi terhadap debu, obat- obatan dll? Pasien tidak memiliki riwayat alergi

7. Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan pernafasan?

Tidak pernah

8. Apakah klien pernah punya riwayat gangguan pernafasan dan mendapat pengobatan? (Ya, apa jenis obat, berapa lamapemberiannya? Kapan?)

Tidak ada

b. Kardivaskuler

1. Apakah klien cepat lelah?

Pasien mengatakan sebelum sakit pasien tidak cepat LelahSetelah sakit pasien cepat Lelah ketika bergerak

2. Apakah ada keluhan berdebar – debar? Nyeri dada yang menyebar?

Pusing? Rasa berat didada?

Pasien mengatakan tidak ada keluhan berdebar-debar, nyeri padadada, tidak pusing, tidak ada rasa berat di dada

3. Apakah klien mengguankaan alat pacu jantung?

Pasien tidak menggunakan alat pacu jantung

4. Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler?

tidak

7) Personal Hygiene

a. Bagaimana pola personal hygiene? Berapa kali mandi, gosok gigidll?

Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanyalap dengan tissue basah

Pasien tidak pernah gosok gigi

Tampak kulit kotor

b. Berapa hari klien terbiasa cuci rambut?

Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramasTampak rambut kotor

- c. Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personalhygiene?
 Pasien mengatakan aktivitas dibantu oleh keluarganya

8) Sex

- a. Apakah ada kesulitan dalam hubungan seksual?
 Tidak dikaji
- b. Apakah penyakit sekarang mempengaruhi / mengganggu fungsi seksual?
 Tidak dikaji

9) Pengkajian Psikososial Dan Spiritual

A. Psikologi.

a. Status Emosi.

1. Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Pasien tampak gelisah dengan kondisinya.
2. Bagaimana suasana hati klien?
 Pasien merasa gelisa karena sudah lama di RS dan ingin cepat sembuh dari penyakitnya
3. Bagaimana perasaan klien saat ini? Pasien tampak meringis kesakitan
4. Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira?
 Pasien mengatakan hanya duduk dan diam atau biasa tidur

b. Konsep diri:

1. Bagaimana klien memandang dirinya? Pasien tidak dapat mengungkapkan tentang dirinya
2. Hal – hal apa yang disukai klien?
 -
3. Bagaimana klien memandang diri sendiri ?
 Pasien tidak dapat mengungkapkan tentang dirinya
3. Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya?

Pasien mengatakan mengerti tentang penyakitnya

4. Hal – hal apa yang dapat dilakukan klien saay ini?

Pasien hanya berbarin di tempat tidur

B. Hubungan sosial:

a. Apakah klien mempunyai teman dekat?

Pasien mengatakan memiliki banayak teman

b. Siapa yang dipercaya klien?

istri dan keluarganya

c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat?

Pasien mengatakan terkadang ikut dalam kegiatan kerja bakti

d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan?

Pasien mengatakan sekarang pasien bekerja sebagai buruh

C. Spiritual

a. Apakah klien menganut satu angama?

Pasien menganut agama islam

b. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah?

Pasien mengatakan semenjak sakit belum pernah sholat akibat urinyang selalu keluar pada bekas draine nya

c. Bagaimana mana hubungan natara manusia dan Tuhan dalam agama Pasien

mengatakan sangat sering sholat akan tetapi pada saat sakitpasien berharap urine yang keluar dari draine nya cepat diatasi kembaliagar tidak keluar sehingga pasien dapat sholat kembali

2. Pemeriksaan Fisik

a) Keadaan Umum

1. Kesadaran: GCS:

Kesadaran composmentis

GCS :E4 V5 M6

2. Kondisi klien secara umum

Pasien tampak lemas

Pasien tampak meringis

3. Tanda – tanda vital

TD: 160/80 mmHg

N: 94 X/menit

RR: 22 x/menit

S: 36,5⁰C

4. Pertumbuhan fisik: TB,BB,postur tubuh.antropometri

TB: 170 cm

BB: sebelum sakit pasien lupa berat badannya

Pada saat sakit 72 Kg

IMT 24,9

5. Keadaan kulit: wana, tekstur, kelainan kulit.

Warna: sawo matang

Tekstur: berminyak

Kelainan kulit : tidak ada

b) Pemeriksaan Cepalo Kaudal

1) Kepala

a. Bentuk, keadaan kulit, pertumbuhan rambut.

Inspeksi : Bentuk wajah simetris, bentuk kepala normal, keadaan rambut kotor dan lepek, tidak terdapat lesi

Palpasi : Tidak ada massa, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada nyeri tekan.

a. Mata:

Inspeksi : tidak ada gangguan penglihatan, pupil isokor, refleks kiri dan kanan, sclera tampak putih, konjungtiva anemis

Palpasi : tidak ada nyeri tekan pada kedua bola mata

b. Telinga:

Inpeksi : simetris kiri kanan, tidak terdapat lesi, telinga tampak kotor

Palpasi : tidak ada nyeri tekan

c. Hidung:

Inpeksi : bentuk hidung normal, lubang hidung simetris

Palpasi : tidak ada pembengkakan, tidak ada nyeri tekan

d. Mulut

Inspeksi : keadaan bibir baik, tidak ada lesi, kondisi gigi baik, mulut dan lidah tampak bersih , tidak ada pembengkakan.

2) Leher

Inspeksi : tidak terjadi distensi vena jugularis

Palpasi : tidak ada kelenjar getah bening, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid

3) Dada

a. Inspeksi: bentuk dada normochest, ekspansi dada normal, pernafasan dada, frekuensi respirasi normal, tidak ada retraksi otot dada

b. Auskultasi: tidak terdengar bunyi nafas tambahan, suara nafas vesikuler

c. Perkusi: Sonor dikedua lapang dada

d. Palpasi: tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa

4) Abdomen

a. Inspeksi: bentuk abdomen normal, warna kulit sekitar abdomen tidak ada masalah, tidak ada lesi, tidak ada edema pada bagian abdomen, tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm terdapat luka draine abdomen region bawah kanan, tampak urine keluar dari draine.

Umbilicus: normal, tidak ada benjolan

b. Auskultasi: bunyi bising usus normal 6 x/i

c. Perkusi: normal

d. Palpasi: tidak ada pembengkakan, terdapat nyeri tekan region bawah abdomen

5) Genetalia, Anus dan rektum

a. Inspeksi: tidak dikaji

b. Palpasi: tidak dikaji

6) Ekstremitas:

a. Atas:

Kiri : jari-jari tangan lengkap, tonus otot kuat, kekuatan otot klien mampu menggerakkan ekstremitas atas kiri, gerakan bahu bisa rotasi abduksi dan adduksi, siku bisa fleksi dan ekstensi, pergelangan tangan bisa rotasi, fleksi dan ekstensi, jari-jari bisa fleksi dan ekstensi, tidak ada memar, tidak ada nyeri tekan

Kanan : jari-jari tangan lengkap, tonus otot kuat, pasien mampu menggerakkan dengan bebas.

b. Bawah:

Kiri : jari-jari kaki lengkap, kekuatan otot penuh, tidak ada edema, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka, tidak ada clubbing finger, keadaan kuku normal

Kanan : jari kaki lengkap, kekuatan otot penuh, tidak ada edema, reflek normal, tidak ada luka, keadaan kuku berwarna merah muda, pengisian CRT kurang dari 3 detik.

- Kekuatan otot



 5 | 5

 ————

 5 | 5

3. Pemeriksaan Penunjang Tanggal 15 oktober 2022

Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
WBC	9,2	4.00-10.00	10 ³ /ul
LYMPH%	4,3	4.00-6.00	%
GRAN%	91,5	12.0-16.0	%
MID%	4,2	37.0-48.0	%
LYM#	1.07	80.0-97.0	10 ³ /ul
GRAN#	22.80	26.5-33.5	10 ³ /ul
MID#	1.05	31.5-35.0	10 ³ /ul
RBC	5.61	150-400	g/dl
HGB	17.2	37.0-54.0	%
HCT	44.5	10.0-15.0	%

MCV	79,4	10.0-18.0	F1
MCH	30.7	6.50-11.0	Pg
MCHC	38.7	13.0-43.0	g/dl
RDWCV	13.9	0.15-0.50	%
RDWSD	37.6	52.0-75.0	%
PLT	246	20.0-40.0	10 ³ /ul
MPV	9.2	2.00-8.00	F1
PDW	10.6	1.00-3.00	F1
PCT	0.227	0.00-0.10	%
P-LCR	22,5	0.00-0.10	%
P-LCC	55	0.00-0.10	10 ⁹ /ul



D. Teraphi Yang Diberikan

1. Ranitidine 50 gr/12 jam intravena digunakan untuk mengobati penyakit tukak lambung
2. Ketorolac 30mg/8 jam intravena untuk meredakan nyeri sedang hingga berat

E. Discharge Planning

- Tidak ada masalah
- Pengobatan Lingkungan rumah
- Kurang dukungan keluarga

Yang harus dilakukan klien :



KLASIFIKASI DATA

Data subjektif	Data objektif
<p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik) S: skala nyeri 5 T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat masuk RS sesudah operasi pasien dibantu oleh keluarganya untuk beraktivitas (berjalan, mengganti baju dll) - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit Pasien mengatakan hanya terbaring di tempat tidur menonton tv - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - Tampak luka post operasi bagian abdomen region bawah - Pasien dianjurkan diet rendah garam - Bentuk makan lunak - Urin Nampak berwarna pekat serta berwarna merah - Pasien terpasang keteter sejak 2 minggu yang lalu - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor - Pasien tampak lemas - Pasien tampak meringis - TD: 160/80 mmHg - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan - tampak urine keluar dari draine - bunyi timpani pada perut - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen

KATEGORISASI DATA

KATEGORI DAN SUBKATEGORI		DATA SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
FISIOLOGI	RESPIRASI	-
	SIRKULASI	- TD: 160/80 mmHg
	NUTRISI DAN CAIRAN	- Pasien dianjurkan diet rendah garam - Bentuk makan lunak - bunyi timpani pada perut
	ELIMINASI	- Urin Nampak berwarna pekat serta berwarna merah - Pasien terpasang keteter sejak 2 minggu yang lalu - tampak urine keluar dari draine
	AKTIVITAS DAN ISTIRAHAT	- Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien tampak lemas
	NEUROSENSORY	
	REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS	
PSIKOLOGIS	NYERI DAN KENYAMANAN	P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik) S: skala nyeri 5 T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul

		<ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien tampak meringis - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen
PERILAKU	KEBERSIHAN DIRI	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor
	PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN	
RELASIONAL	INTERAKSI SOSIAL	
LINGKUNGAN	KEAMANAN DAN PROTEKSI	<ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan

ANALISIS DATA

NO.	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1	<p>DS:</p> <p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik)</p> <p>S: skala nyeri 5</p> <p>T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 	<p>Vesikolithiasis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tindakan operasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Terputusnya kontinuitas kulit/jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mmrkan saraf tepi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nyeri akut</p>	<p>Nyeri akut</p>
2.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit 	<p>Nyeri perut operasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Hambatan dalam beraktivitas dan bermobiliasi</p>	<p>Deficit perawatan diri</p>

	<p>pasien tidak pernah keramas</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Deficit perawatan diri</p>	
3.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan - nyeri post op abdomen region bawah 	<p>Tindakan operasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Terputusnya kontinuitas kulit/jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Post de entry mikroorganisme</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Resiko infeksi</p>	Resiko infeksi



PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH KEPERAWATAN

No	Diagnosis keperawatan
1.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik)</p> <p>S: skala nyeri 5</p> <p>T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas
2	<p>Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi/minat dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor
3.	<p>Resiko infeksi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan - nyeri post op abdomen region bawah

Diagnosis Keperawatan

Nama / umur: Tn. Y

Ruang / kamar : Perawatan Bedah/II C

No	Diagnosis keperawatan	Tanggal ditemukan	Tanggal Teratasi
1	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik)</p> <p>S: skala nyeri 5</p> <p>T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 	Senin, 17 oktober 2022	-
2.	Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi/minat dibuktikan dengan	Senin, 17 oktober 2022	

	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 		
3.	<p>Resiko infeksi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan - nyeri post op abdomen region bawah 	Senin, 17 oktober 2022	Kamis, 20 oktober 2022



Rencana Keperawatan

NO	Rencana tindakan keperawatan			
	Diagnosis	Tujuan dan kriteria hasil	Intervensi	Rasional
1	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan:</p> <p>DS: P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik) S: skala nyeri 5 T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: Keluhan nyeri menurun (5) Meringis menurun (5) Kesulitan tidur menurun (5) Pola tidur membaik (5)</p>	<p>Manajemen nyeri Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. identifikasi skala nyeri 3. identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 5. fasilitasi istirahat dan tidur <p>edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. jelaskan strategi meredakan nyeri 7. ajarkan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. kolaborasi pemberian analgetik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk mengetahui penyebab nyeri, kualitas nyeri, dan durasi 2. untuk mengetahui seberapa nyeri yang dialami oleh pasien 3. mempertahankan rasa nyaman pada pasien 4. untuk mengurangi rasa nyeri 5. untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien 6. membantu pasien dalam meredakan nyeri 7. memudahkan pasien mengontrol nyeri secara sederhana 8. untuk menghilangkan nyeri

	<p>yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 			
2.	<p>Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi/minat dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 1x24 jam maka diharapkan perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil:</p> <p>Minat melakukan perawatan diri meningkat (5)</p> <p>Mempertahankan kebersihan diri meningkat (5)</p>	<p>I. 11348 Dukungan Perawatan diri Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tingkat kemandirian 2. Identifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. <p>Terapeutik Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri 4. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tingkat kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari 2. Untuk mengetahui tingkat kemandirian pasien 3. Membantu pasien dalam melakukan perawatan diri 4. Membeiasakan pasien dalam melakukan perawatan diri
3.	<p>Resiko infeksi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil:</p> <p>Kemerahan menurun (5)</p> <p>Nyeri menurun (5)</p>	<p>Pencegahan infeksi Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. monitor tanda dan gejala infeksi local dan patogenik <p>terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. batasi jumlah pengunjung 3. cuci tangan sebelum dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi perkembangan luka 2. Bila banyak pengunjung dapat membuat penyebaran mikroorganisme secara cepat

	<p>region bawah kanan</p> <p>- nyeri post op abdomen region bawah</p>		<p>sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p>edukasi</p> <p>4. jelaskan tanda dan gejala infeksi</p> <p>5. ajarkan mencuci tangan dengan benar</p> <p>6. anjurkan meningkatkan asupan nutrisi</p> <p>kolaborasi</p> <p>7. kolaborasi pemberian antibiotic jika perlu</p>	<p>3. Mencegah terjadinya infeksi</p> <p>4. Mengetahi apa saja tanda dan gejala infeksi</p> <p>5. Meminimalisir masuknya mikroorganisme pada luka pasien</p> <p>6. Mempercepat proses penyembuhan luka</p> <p>7. Mencegah terjadinya infeksi</p>
--	---	--	--	--



Implementasi Keperawatan

Implementasi 1

Inisial klien: Tn.Y

Ruangan : Bedah

No. RM 576175

Dx.Medis : Vesikolithiasis

No	DX. Kep	Waktu	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik)</p> <p>S: skala nyeri 5</p> <p>T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat 	<p>Selasa, 25 oktober 2022</p> <p>21:00 WITA</p> <p>21:05 WITA</p> <p>21:10 WITA</p> <p>21:15 WITA</p> <p>21:20 WITA</p> <p>21:25 WITA</p> <p>23:00 WITA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri hasil: lokasi nyeri abdomen region hbawah, karakteristik hilang timbul, durasi 1-2 menit, frekuensi tidak menentu 2. mengidentifikasi skala nyeri hasil: skala nyeri 6 3. mengidentifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri hasil: pasien tampak meringis ketika pasien bergerak dan batuk 4. memberikan Teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri hasil: pasien mengikuti arahan perawat. Pasien Nampak menarik nafas nari hidung dan mengeluarkan dari mulut 5. memfasilitasi istirahat dan tidur hasil: pasien mengikuti arahan perawat 6. menjelaskan strategi meredakan nyeri terapi music, murottal berdzikir, menonton TV hasil: pasien menahami strategi meredakan nyeri 7. kolaborasi pemberian ketorolac dan ranitidine hasil: pasien diberikan obat ketorolac dan ranitidin injeksi intravena 	Akil

	<p>mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 			
2	<p>Resiko infeksi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan - nyeri post op abdomen region bawah 	<p>21:30 WITA</p> <p>21:35 WITA</p> <p>21:40 WITA</p> <p>23:00 WITA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memonitor tanda dan gejala infeksi local dan patogenik hasil: adanya luka post op pada perut bagian bawah 2. membatasi jumlah pengunjung hasil: pengunjung hanya 1 orang 3. mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien hasil: telah dilakukan mencuci tangan 6 langkah 4. kolaborasi pemberian antibiotic jika perlu hasil: injeksi ceftriaxone 1 gr/IV/12 jam 	
3	<p>Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi/minat dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah 	<p>07:00 WITA</p> <p>07:10 WITA</p> <p>07:15 WITA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor tingkat kemandirian Hasil: pasien mampu menggerakkan ektermitasnya tampak dapat melakukan aktivitas secara mandiri 2. mengidentifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan Hasil: pasien tidak menggunakan alat bantu hanya dibantu oleh keluarganya 3. memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri hasil: pasien dan keluarga pasien mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 	07:20 WITA	4. menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan hasil: pasien mengikuti arahan perawat. Pasien mengganti seprei dan lap badan.	
Implementasi 2				
1	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik)</p> <p>S: skala nyeri 5</p> <p>T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering 	<p>Rabu, 28 oktober 2022</p> <p>21:00 WITA</p> <p>21:05 WITA</p> <p>21:10 WITA</p> <p>21:15 WITA</p> <p>21:20 WITA</p> <p>21:25 WITA</p> <p>23:00 WITA</p>	<p>1. mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri hasil: lokasi nyeri abdomen region bawah, karakteristik hilang timbul, durasi 1-2 menit, frekuensi tidak menentu</p> <p>2. mengidentifikasi skala nyeri hasil: skala nyeri 4</p> <p>3. mengidentifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri hasil: pasien tampak meringis ketika pasien bergerak dan batuk</p> <p>4. menganjurkan Teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri hasil: pasien mengikuti arahan perawat. Pasien menarik nafas nari hidung dan mengeluarkan dari mulut</p> <p>5. menjelaskan strategi meredakan nyeri terapi music, murottal berdzikir, menonton TV hasil: pasien melakukan relaksasi dengan menonton TV</p> <p>6. kolaborasi pemberian ketorolac dan ranitidine hasil: pasien diberikan obat ketorolac/8jam dan ranitidine/12 jam injeksi intravena/</p>	

	<p>terbangun jika nyeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur - Pasien mengatakan sulit beraktivitas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 			
2	<p>Resiko infeksi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan - nyeri post op abdomen region bawah 	<p>21:30 WITA</p> <p>21:40 WITA</p> <p>23:00 WITA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memonitor tanda dan gejala infeksi local dan patogenik hasil: adanya luka post op pada perut bagian bawah 2. menjelaskan tanda dan gejala infeksi nyeri, panas disekitar luka, terjadi pembengkakan disekitar luka, kemerahan, dan daerah luka tidak berfungsi dengan baik hasil: pasien memahami perkataan perawat 3. mengajarkan mencuci tangan dengan benar 6 langkah hasil: pasien memahami cara mencuci tangan dengan benar 4. menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi hasil: pasien menghabiskan porsi makan yang diberikan 5. mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 	

			<p>hasil: telah dilakukan memcuci tangan 6 langkah</p> <p>6. kolaborasi pemberian antibiotic jika perlu</p> <p>hasil: injeksi ceftriaxone 1 gr/IV/12 jam</p>	
3	<p>Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi/minat dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 	<p>07:00 WITA</p> <p>07:10 WITA</p> <p>07:15 WITA</p> <p>07:20 WITA</p>	<p>1. Memonitor tingkat kemandirian Hasil: pasien mampu menggerakkan ektermitasnya tampak dapat melakukan aktivitas secara mandiri</p> <p>2. mengidentifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan Hasil: pasien tidak menggunakan alat bantu hanya dibantu oleh keluarganya</p> <p>3. memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri hasil: tampak keluarga membantu dalam personal hygiene pasien</p> <p>4. menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan hasil: pasien belum mengikuti arahan perawat</p>	
Implementasi 3				
1	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak</p>	<p>Kamis, 20 oktober 2022</p> <p>14:30 WITA</p> <p>14:35 WITA</p> <p>09:15 WITA</p>	<p>1. mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri hasil: lokasi nyeri abdomen region bawah, karakteristik hilang timbul, durasi 1-2 menit, frekuensi tidak menentu. Pasien mengatakan nyeri sudah berkurang</p> <p>2. mengidentifikasi skala nyeri hasil: skala nyeri 3</p> <p>3. mengidentifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri</p>	

	<p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik)</p> <p>S: skala nyeri 5</p> <p>T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 	<p>14:40 WITA</p> <p>14:45 WITA</p> <p>14:50 WITA</p>	<p>hasil: pasien mengatakan yang membuaatnya nyeri karena batuk</p> <p>4. menganjurkan Teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri hasil: pasien mengikuti arahan perawat. Pasien menarik nafas nari hidung dan mengeluarkan dari mulut</p> <p>5. menjelaskan strategi meredakan nyeri terapi music, murottal berdzikir, menonton TV hasil: pasien melakukan relaksasi dengan menonton TV</p> <p>6. kolaborasi pemberian ketorolac dan ranitidine hasil: pasien diberikan obat oral mefenamic acid 500 mg</p>	
2	Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan	15:00 WITA	1. Memonitor tingkat kemandirian	

	<p>motivasi/minat dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 	<p>15:10 WITA</p> <p>15:15 WITA</p> <p>15:20 WITA</p>	<p>Hasil: pasien mampu menggerakkan ektermasnya tampak dapat melakukan aktivitas secara mandiri</p> <p>2. mengidentifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan</p> <p>Hasil: pasien tidak menggunakan alat bantu hanya dibantu oleh keluarganya</p> <p>3. memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri</p> <p>hasil: pasien mampu bergerak sendiri dibantu dengan keluarganya</p> <p>4. menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</p> <p>hasil: pasien belum mengikuti arahan perawat</p>	
--	--	---	--	--

F. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi 1

Nama / Umur

:Tn. Y/55 tahun

Hari/ Tgl	Diagnosis	Waktu	Evaluasi (SOAP/SOAPIER)	Nama Jelas
Selasa. 18 oktober 2022	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik)</p> <p>S: skala nyeri 5</p> <p>T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 	Rabu 07:00	<p>S:pasien mengatakan nyeri hilang timbul, nyeri post op</p> <p>O: tampak meringis</p> <p>Tampak memegang perut bagian bawah</p> <p>Skala nyeri 4</p> <p>A: masalah nyeri belum teratsi</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. identifikasi skara nyeri 3. identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. jelaskan strategi meredakan nyeri 6. ajarkan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. kolaborasi pemberian analgetik 	Akil
	<p>Resiko infeksi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm 		<p>S:</p> <p>O: tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm</p> <p>A: masalah nyeri belum Teratsi</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan - nyeri post op abdomen region bawah 		<p>P: lanjutkan intervensi</p> <p>Pencegahan infeksi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik <p>terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien <p>edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. jelaskan tanda dan gejala infeksi 4. ajarkan mencuci tangan dengan benar 5. anjurkan meningkatkan asupan nutrisi <p>kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. kolaborasi pemberian antibiotic jika perlu 	
	<p>Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi/minat dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 		<p>S: pasien mengatakan sudah membersihkan badannya</p> <p>O: pasien tampak bersih, pakaian diganti, tampak rambut kotor,</p> <p>A: masalah belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <p>I. 11348 Dukungan Perawatan diri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tingkat kemandirian 2. Identifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan 	

Evaluasi 2

Rabu, 19 oktober 2022	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <p>P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik)</p> <p>S: skala nyeri 5</p> <p>T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 	Kamis 07:00	<p>S: pasien mengatakan nyeri hilang timbul, nyeri post op</p> <p>O: tampak meringis</p> <p>Tampak memegang perut bagian bawah</p> <p>Skala nyeri 3</p> <p>A: masalah nyeri teratasi sebagian</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. identifikasi skala nyeri 3. identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. jelaskan strategi meredakan nyeri 6. ajarkan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. kolaborasi pemberian analgetik 	Akil
	<p>Resiko infeksi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm - terdapat luka draine abdomen region bawah kanan - nyeri post op abdomen region bawah 		<p>S:</p> <p>O: tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm</p> <p>A: tidak terdapat tanda-tanda infeksi</p> <p>P: intervensi dipertahankan</p> <p>Pencegahan Infeksi</p>	

	<p>Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi/minat dibuktikan dengan DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 		<p>S: pasien mengatakan sudah membersihkan badannya O: rambut pasien tampak kotor, pasien tampak kotor, A: masalah belum teratasi P: lanjutkan intervensi</p> <p>Perawatan diri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tingkat kemandirian 2. Identifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan 	
--	---	--	--	--

Evaluasi 3

<p>Kamis, 20 oktober 2022</p>	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik post op insisi abdomen region bawah dibuktikan dengan: DS: P: pasien mengatakan nyeri saat pasien bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk tusuk R: pasien mengatakan nyerinya pada abdomen region bawah (hipogastrik) S: skala nyeri 5 T: pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durasi nyeri 1-2 menit - Pasien mengatakan setelah operasi tidur malam hanya 3 jam - Pasien mengatakan sering terbangun jika nyeri - Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya sehingga pasien hanya terbaring di tempat tidur - Pada saat sakit tidak ada kegiatan yang dilakukan hanya terbaring di tempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis - terdapat nyeri tekan region bawah abdomen - Pasien tampak lemas 	<p>20:00 WITA</p>	<p>S: pasien mengatakan nyeri hilang timbul, nyeri post op O: tampak meringis Tampak memegang perut bagian bawah Skala nyeri 3 A: masalah nyeri teratasi sebagian P: lanjutkan intervensi</p> <p>Manajemen nyeri Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. identifikasi skala nyeri 3. identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. jelaskan strategi meredakan nyeri 6. ajarkan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. kolaborasi pemberian analgetik 	<p>Akil</p>
	<p>Deficit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi/minat dibuktikan dengan DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah mandi hanya lap dengan tissue basah - Pasien tidak pernah gosok gigi 		<p>S: pasien mengatakan sudah membersihkan badannya O: rambut pasien tampak kotor, pasien tampak kotor A: masalah belum teratasi P: lanjutkan intervensi</p> <p>Perawatan diri Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tingkat kemandirian 	

	<p>- Pasien mengatakan semenjak sakit pasien tidak pernah keramas</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak kulit kotor - Tampak rambut kotor 		<p>2. Identifikasi alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan.</p> <p>Terapeutik</p> <p>3. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri</p> <p>Edukasi</p> <p>4. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan</p>	
--	--	--	---	--



BAB VI

PEMBAHASAN

A. Analisa Kasus

Pada laporan kasus penulis menuliskan pengkajian di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa di Ruang Perawatan Bedah dengan jumlah pasien 2 pasien berjenis kelamin laki-laki dan kami melakukan pengkajian pada Tn. Y dengan diagnostik medis Vesikolitiasis dan. Pengkajian dilakukan pada Tn. Y tanggal 17 Oktober 2022 dengan keluhan pasien mengeluh nyeri akibat post operasi abdomen, terasa hilang timbul, dan seperti tertusuk-tusuk. Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu aktivitasnya sehingga pasien hanya dapat berbaring di tempat tidur. Sehingga selama di rumah sakit pasien tidak pernah mandi hanya di lap dengan tissue basah. Data Objektif yang didapatkan diantaranya : Kesadaran umum : Compos mentis GCS : E4V5M6, Pasien tampak meringis, Skala nyeri 5, keluhan utama pasien nyeri tekan region bawah abdomen, Pasien tampak lemas, Tampak kulit kotor, Tampak rambut kotor, Tampak luka tertutup post op, ukuran 7 cm, Terdapat luka draine abdomen region bawah kanan.

B. Analisa Diagnosis Keperawatan

Pada diagnosis nyeri akut diberikan intervensi manajemen nyeri dengan memberikan tehnik relaksasi nafas dalam dan tehnik distraksi seperti menonton dan kolaborasi pemberian analgetik, kemudian dukungan perawatan diri dengan memfasilitasi melakukan perawatan diri secara mandiri atau dibantu oleh keluarga serta menganjurkan untuk melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan, dan pencegahan infeksi dengan memonitor tanda dan gejala infeksi, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien serta

kolaborasi pemerian antibiotik.

Nyeri akut atau pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan muncul akibat kerusakan jaringan aktual atau potensial atau yang digambarkan sebagai kerusakan (*Internasional association for the studi of pain*), yang tiba-tiba atau lambat dari intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi, nyeri yang tidak tertangani dengan benar akan berefek pada mobility dan lama penyembuhan (Budiarti & Puspitasari, 2020).

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik yang multidimensional. Fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas (ringan, sedang, berat), kualitas (tumpul, seperti terbakar, tajam), durasi (transien, intermiten, persisten), dan penyebaran (superfisial atau dalam, terlokalisir atau difus). Meskipun nyeri adalah suatu sensasi, nyeri memiliki komponen kognitif dan emosional, yang digambarkan dalam suatu bentuk penderitaan. Nyeri juga berkaitan dengan reflex menghindar dan perubahan output otonom (Bahrudin, 2017). Teori inilah yang menjadi alasan peneliti mengangkat diagnose nyeri akut

Diagnosa kedua yang diambil yaitu dukungan perawatan diri dengan memfasilitasi melakukan perawatan diri secara mandiri atau dibantu oleh keluarga serta menganjurkan untuk melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Perawatan diri merupakan salah satu kemampuan dasa manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, dukungan keluarga merupakan suatu bentuk hubungan inter personal yang melindungi seseorang dari efekstress yang buruk (Herwin et al., 2017).

Pencegahan infeksi merupakan salah satu diagnosa yang diangkat pada kasus ini, dengan cara memonitor tanda dan gejala infeksi dan mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien untuk melindungi diri dari perpindahan infeksi penyakit khususnya pada perawat, kemudian kolaborasi pemberian antibiotik. Program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit merupakan salah satu standar mutu pelayanan rumah sakit. Pengendalian infeksi harus dilaksanakan oleh semua rumah sakit dan seluruh pelayanan kesehatan lainnya guna melindungi pasien dari kejadian infeksi dan penularan penyakit yang tidak diharapkan (Fitria et al., 2016).

C. Analisa Intervensi

Pada intervensi atau rencana keperawatan merupakan tahap proses keperawatan setelah data terkumpul, analisa data dan ditentukan rencana keperawatan yang tepat. Tahap perencanaan meliputi menentukan prioritas masalah, menuliskan tujuan dan kriteria hasil tujuan dan memilih rencana tindakan atau intervensi keperawatan. Penulis melakukan intervensi atau rencana keperawatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kasus dan kebutuhan klien. SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) digunakan sebagai referensi dalam merumuskan intervensi keperawatan sedangkan SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia) digunakan pada saat merumuskan tujuan keperawatan dan kriteria hasil.

Penentuan intervensi keperawatan dalam karya ilmiah akhir ini menggunakan referensi yang mempertimbangkan jenis intervensi/ tindakan yang sesuai dengan kemampuan perawat, kondisi klien, penilaian efektivitas dan efisien keberhasilan dalam mengatasi masalah klien. Pada karya ilmiah akhir ini menggunakan beberapa intervensi salah satunya adalah dengan melakukan relaksasi

nafas dalam sebagai perawatan non farmakologis yang digunakan untuk mengurangi nyeri kepala pada klien. Selain itu relaksasi nafas dalam dilakukan secara berturut-turut disaat nyeri kepala timbul dan juga dilakukan Teknik menurunkan nyeri dengan mendengarkan music atau murottal serta dengan menonton TV. Pendekatan spiritual dapat membantu mempercepat pemulihan atau penyembuhan klien (Ferinawati & Hartati R, 2019). Musik juga mempengaruhi pusat sistem saraf simpatis maupun sistem saraf otomatis, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu jenis musik yang digunakan adalah murottal Al-Qur'an (Perry, A.G & Potter, P. A., 2012)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan ditunjang oleh berbagai referensi penelitian terdahulu terkait pengaruh terapi murottal, maka penulis berasumsi bahwasanya terapi murottal dapat diberikan pada pasien dengan keluhan nyeri ringan hingga sedang untuk membantu klien mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan, bisa memberikan rasa aman nyaman dan tenang untuk pasien sehingga gangguan pemenuhan rasa aman dan nyaman dapat terselesaikan. Terapi murottal yang dilakukan akan merangsang otak untuk memproduksi zat kimia, yaitu neuropeptide yang berfungsi untuk menguatkan reseptor didalam tubuh serta memberikan umpan balik sehingga akan membuat timbulnya rasa nikmat dan kenyamanan. Terapi spritual sering kali dapat membantu proses penyembuhan selain dari obat-obatan ataupun tindakan medis lainnya (Sutrisno, 2018) dalam (Sari et al., 2023). Pemberian terapi Al-Quran merupakan terapi non farmakologi adjuvant yang dapat digunakan dalam mengatasi nyeri.

Intervensi yang diberikan pada kasus ini untuk diagnosis nyeri akut yaitu

memberikan manajemen nyeri seperti Observasi identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri. Untuk terapeutik berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri (seperti pemberian terapi murottal), kemudian untuk edukasi ajarkan teknik nonfarmkologis untuk mengurangi rasa nyeri, dan untuk kolaborasi pemberian analgetik. Intervensi ini sesuai dengan masalah keperawatan nyeri akut. Tindakan mengidentifikasi skala nyeri yaitu untuk mengetahui derajat skala nyeri klien, pemberian terapi murottal bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan merilekskan tubuh, selain itu diberikan edukasi mengajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengeurangi rasa nyeri bertujuan agar klien bias lebih mandiri mengatasi rasa nyerinya.

Teknik nonfarmakologi merupakan salah satu intervensi keperawatan secara mandiri untuk mengurangi nyeri yang dirasakan klien. Sebelum dilakukan intervensi, dilakukan observasi terlebih dahulu dengan mengidentifikasi skala nyeri yang dirasakan klien. Pengkajian nyteri pada klien menggunakan Numeric Rating Scale, intervensi nonfarmakologi terapi murottal dengan durasi ± 15 menit setelah itu di fasilitasi untuk mendengarkan lantunan terapi murottal. Setelah diberikan intervensi klien diberi edukasi untuk dapat melakukan terapi murottal untuk mengontrol nyeri ketika timbul.

Efek terapi murottal Al-Qur'an efektif untuk menurunkan tingkat nyeri, menurunkan tingkat insomnia, menurunkan tingkat kecemasan, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan kualitas tidur, menurunkan tekanan darah. Dalam Al-Qur'an Allah telah menerangkan fungsi dari mendengarkan lantunan ayat Al-Qur'an, yang dimana ayat tersebut berbunyi :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

“orang-orang beriman itu, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, bahwa mengingat Allah itu dapat menentramkan jiwa” (QS Al-Ra’d/28) (Kemenag RI, 2020)

Makna dari ayat di atas yaitu mereka yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, dan hati mereka menjadi tenang dan tentram dengan banyak mengingat Allah hati menjadi tentram. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratna Yunita Sari,2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi Murrtotal Al-Qur’an berpengaruh terhadap Nyeri dan hemodinamika Pada Pasien Jantung Coroner (PJK) Di Ruang ICU RS Islam Surabaya Jemursari. terapi murottal yang dilaksanakan selama periode peneitian dapat menurunkan nyeri dan mentabilkan status hemodinamikan menjadi normal. Selain itu, hasil di atas sesuai dengan konsep teoritis yang diungkapkan (Taslim & Cahyani, 2021)

menjelaskan bahwasanya terapi murottal memberikan perubahan pada apa yang dirasakan pasien sehingga munculah kondisi rileks pada syaraf sehingga terjadinya vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) pada urat nadi dan peningkatan kadar konsentrasi oksigen dalam darah, dengan di ikuti oleh perlambatan irama detak jantung. Ketika seseorang mendengarkan terapi murottal Al-Qur’an maka otak manusia akan bereaksi sehingga memproduksi zat kimia yaitu neuropeptide. Neuropeptide tersebut akan diangkut melalui berbagai reseptor keseluruh tubuh

sehingga tubuh pun akan mengalami positive feedback yaitu yang disebut keadaan relaksasi.

terbukti di dalam penelitian Ariska (2018) mengatakan bahwa bacaan Murattal Al-Qur'an merupakan salah satu rangkaian ibadah yang menunjukkan keimanan kepada Allah SWT. Karena keimanan akan memberikan ketenangan jiwa, kedamaian hati, ketenteraman pikiran dan kemuliaan. Murattal Al-Qur'an yang dijalankan dengan penuh khusyu, tepat, ikhlas dan kontinu dapat memberikan respon emosi positif (positive thinking) dan motivasi positif serta mengefektifkan coping sehingga dapat mengurangi derita nyeri.

Asumsi peneliti bahwasanya pengimplementasi pada masalah keperawatan yang dialami pasien tidak boleh hanya berfokus pada upaya farmakologis saja, namun seorang perawat harus mampu melakukan perencanaan tindakan non farmakologis seperti yang dilakukan peneliti dengan terapi murottal yang ternyata memiliki efek menurunkan tingkat nyeri.

D. Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi merupakan fase ketika perawat mengimplementasikan rencana keperawatan. Penatalaksanaan tersebut terdiri dari dua tipe dasar tindakan keperawatan yaitu farmakologi dan nonfarmakologi (Kozier et al., 2010). Tindakan- tindakan pada intervensi keperawatan terdiri atas observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

Implementasi ini akan mengacu pada SIKI yang telah dibuat pada rencana keperawatan. Implementasi keperawatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 hingga 20 oktober 2022. Secara umum, intervensi yang telah direncanakan pada

diagnosa keperawatan dapat diimplementasikan secara baik dan mandiri maupun kolaborasi. Teori pemberian relaksasi nafas dalam sejalan dengan kasus pada Tn. Y untuk mengatasi nyeri post operasi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh klien, melakukan relaksasi nafas dalam bisa dilakukan setiap nyeri timbul dan dapat membuat klien lebih rileks kembali. serta pasien juga sudah dapat melakukan personal hygiene yaitu tampak pasien membasuh atau mencuci kepalanya serta membersihkan badannyasehingga tampak pasien lebih bersih.

Dalam hal berkemih, dalam al-qur'an membersihkan diri dari hal-hal yang najis adalah sebuah keharusan. Dosa yang dianggap remeh yakni tidak mau membersihkan diri dari air kencing. Seperti di jelaskan dalam QS Al-Muddatssir :

Terjemahnya:

“dan pakaianmu bersihkanlah” (Al-Muddatssir[74]:4) (Kemenag Ri, 2019)

Menurut tafsir Jalalain mengungkapkan (Dan pakaianmu bersihkanlah) dari najis, atau pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab yang selalu menguntaiakan pakaian mereka hingga menyentuh tanah di kala mereka menyombongkan diri, karena dikhawatirkan akan terkena barang yang najis

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ



E. Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai keberhasilan rencana tindakan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang diharapkan belum tercapai, intervensi yang sudah ditetapkan dapat dimodifikasi. Evaluasi dapat berupa struktur, proses dan hasil evaluasi terdiri dari evaluasi formatif yaitu menghasilkan umpan balik selama program berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan informasi efektifitas pengambilan keputusan. Evaluasi asuhan keperawatan di dokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjektif, objektif, assessment, planning).

Evaluasi keperawatan pada laporan seminar kasus akhir departemen keperawatan medical bedah ini dilakukan selama 3 hari pada tanggal 18 oktober hingga 20 oktober 2022. Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai.

Berdasarkan evaluasi penulis dari 3 diagnosis keperawatan yang diangkat pada Tn. Y. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa 2 diagnosis yaitu nyeri akut dan defisit perawatan diri teratasi sebagian sedangkan 1 diagnosis yaitu risiko infeksi teratasi pada evaluasi hari kedua yaitu tanggal 19 oktober 2022

F. Alternatif pemecahan Masalah (Memberikan Selain Intervensi Utama selain berbasis EBN)

Relaksasi benson dapat menurunkan skala nyeri seseorang bekerja dengan cara mengalihkan fokus seseorang terhadap nyeri dengan berusaha menciptakan suasana yang nyaman serta tubuh yang rileks sehingga di dalam tubuh akan terjadi peningkatan proses analgesia endogen yang kemudian terus meningkat dengan diperkuatnya oleh kalimat atau kata-kata penuh keyakinan yang dianut pasien sehingga mampu merelaksasikan otot-otot dan memberikan efek menenangkan (Wahyu, 2020). Relaksasi benson merupakan tehnik relaksasi yang digabung dengan unsur kata-kata keyakinan dari pasien dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan endorfin dan enkefalin yang dapat menghambat impuls nyeri dengan cara memblok transmisi impuls di dalam otak dan medulla spinalis (Anita, Misrawati, dan Safri, 2020). Sejalan dengan teori. (Agustin, 2019) yang menyatakan bahwa dalam keadaan relaksasi secara alamiah akan memicu hormon endorfin, hormon ini merupakan analgesik alami dari tubuh sehingga nyeri akan berkurang.

Relaksasi benson merupakan tehnik relaksasi pernafasan dengan melibatkan keyakinan yang mengakibatkan penurunan terhadap konsumsi oksigen oleh tubuh dan otot-otot tubuh menjadi rileks sehingga menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Apabila O₂ dalam otak tercukupi maka manusia dalam kondisi seimbang. Kondisi ini akan menimbulkan keadaan rileks secara umum pada manusia. Perasaan rileks akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan corticotropin

releasing factor (CRF). CRF akan merangsang kelenjar dibawah otak untuk meningkatkan produksi proopiod melanocorthin (POMC) sehingga produksi enkephalin oleh medulla adrenal meningkat.

Kelenjar dibawah otak juga menghasilkan β endorphine sebagai neurotransmitter. (Yusliana, 2020). Endorphine muncul dengan cara memisahkan diri dari deoxyribo nucleid acid (DNA) yaitu substansi yang mengatur kehidupan sel dan memberikan perintah bagi sel untuk tumbuh atau berhenti tumbuh. Pada permukaan sel terutama sel saraf terdapat area yang menerima endorphine. Ketika endorphine terpisah dari DNA, endorphine membuat kehidupan dalam situasi normal menjadi tidak terasa menyakitkan. Endorphine mempengaruhi impuls nyeri dengan cara menekan pelepasan neurotransmitter di presinap atau menghambat impuls nyeri dipostsinap sehingga rangsangan nyeri tidak dapat mencapai kesadaran dan sensorik nyeri tidak dialami (Solehati & Kokasih, 2021).

Selain itu, relaksasi benson ini dapat menghambat aktivitas saraf simpatik yang mengarah pada pengurangan konsumsi oksigen oleh tubuh dan selanjutnya otot-otot jadi rileks sehingga timbul perasaan tenang dan nyaman (Safitri dkk., 2020). Melakukan relaksasi untuk mengendalikan nyeri yang dirasakan, maka tubuh akan meningkatkan komponen saraf parasimpatik secara stimulun, maka ini menyebabkan terjadinya penurunan kortisol dan adrenalin dalam tubuh yang mempengaruhi tingkat stress, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dan membuat merasa tenang untuk mengatur ritme pernafasan menjadi teratur. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan kadar PaCO₂ dan akan menurunkan

kadar pH sehingga terjadi peningkatan kadar oksigen (O₂) dalam darah (Nurseskasatmata & Rahayu, 2020).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi terapi murottal Al-Qur'an terhadap Pasien yang mengalami masalah keperawatan nyeri, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dari hasil pengkajian pada Tn. Y dengan diagnostik medis Vesikolitiasis dan dengan diagnosis keperawatan nyeri akut, defisit perawatan diri, dan risiko infeksi. Pengkajian dilakukan pada Tn. Y tanggal 17 Oktober 2022 dengan keluhan pasien mengeluh nyeri akibat post operasi abdomen, terasa hilang timbul, dan seperti tertusuk-tusuk.
 - b. Diagnosis keperawatan yang didapatkan pasien Tn.Y yaitu Nyeri akut, defisit perawatan diri, risiko infeksi
 - c. Intervensi keperawatan untuk diagnosis nyeri akut yaitu manajemen nyeri dengan pemberian terapi non farmakologi Murottal, diagnosis kedua defisit perawatan diri diberikan dukungan perawatan diri lalu diagnosis ketiga untuk risiko infeksi diberikan pencegahan infeksi
 - d. Implementasi keperawatan pada pasien dilakukan selama 3 hari berturut-turut mulai pada tanggal 17 oktober 2022 di ruang Bedah Syekh Yusuf Gowa. Implementasi dilakukan sesuai intervensi yang telah disusun dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan pada pasien Tn. Y.
- Evaluasi keperawatan pada pasien Tn.Y masalah teratasi sebagian sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan oleh peneliti, sehingga perawat mampu mempertahankan intervensi yang dilakukan. Setelah dilakukan

asuhan keperawatan pada Tn.Y selama tiga har

- e. Intervensi EBPN pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah keperawatan menggunakan intervensi terapi murottal Al-Qur'an. Terapi *Murottal* Al-Qur'an adalah rekaman suara Al-Qur'an yang dilagukan oleh Qori' (Pembaca Al-Qur'an). Lantunan Al-Qur'an mengandung suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Sehingga dengan memberikan intervensi terapi murottal Al- Qur'an berpengaruh terhadap penurunan skala nyeri pada pasien.

B. Saran

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi terapi murottal Al-Qur'an skala nyeri pada pasien, terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian ini, ialah:

- a. Bagi penelitian dan institusi pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi peneliti dikemudian hari dapat lebih mengkaji mengenai frekuensi dan durasi yang paling tepat dalam memberikan intervensi ini. Peneliti diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menambah informasi dan mendukung teori dan fakta berdasarkan *evidence based practice* yang tertera di dalamnya.

- b. Bagi Pelayanan Keperawatan

Mengembangkan intervensi inovasi sebagai tindakan mandiri

perawat yang dapat diunggulkan sehingga seluruh tenaga pelayanan kesehatan dapat mengaplikasikan terapi murottal Al-Qur'an ini dalam pemberian intervensi untuk menurunkan skala nyeri pada pasien



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., Kartika, I. R., & Apriliani, Y. (2022). Efektifitas Terapi Musik Klasik dan Murotal Al-Quran terhadap Penurunan Tekanan Darah Penderita Hipertensi. *Media Karya Kesehatan*, 5(1), 68–78.
- Apriliani, E., Basri, B., & Mulyadi, E. (2021). Aplikasi Terapi Murottal Al-Quran Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Nagrak Cianjur. *Jurnal Lentera*, 4(1), 2541–4119.
- Bahrudin, M. (2017). PATOFISIOLOGI NYERI (PAIN). 13(1), 7–13.
- Basuki, P. (2012). *dasar-dasar urologi*. CV Sagung Seto.
- Brunner, S. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. EGC.
- Budiarti, N. Y., & Puspitasari, M. T. (2020). Asuhan Keperawatan Pada Klien Batu Saluran Kemih Dengan Masalah Nyeri Akut. *Jurnal Keperawatan*, 1.
- Budiarti, N. Y., Puspitasari, M. T., & Rahmawati, A. (2020). NURSING CARE IN CLIENT STONE BLUE CHANNEL WITH ACUTE PAIN (Study In The Melati Space General Hospital Bangil Pasuruhan Area) Introduction Urinary stones are still one of the most common health problems in the urology department . On the client ' s urina. *Jurnal Keperawatan*, 1(1), 3.
- Fitria, I., Sri, N., & Hakim, L. (2016). Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 15(2).
- Herwin, Wiyono, J., & Ardiyani, V. M. (2017). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Perawatan Diri Pada Lansia di Tlogomas Kota Malang. *Nursing News*, 2(1).
- Kemenag RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemenag RI. (2020). Al-Quran dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Maulana, D. A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Batu Saluran Kemih Pada Pasien Benign Prostate Hyperplasia. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(3), 603–610.
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/view/557>

- McAninch, J. W. (2008). *Smith's General Urology*. Mc Graw Hill Medical.
- Nadesul, H. (2015). *Dari Balik Kamar Praktik Dokter*. Libri.
- Nuari, N. A., & Widayanti, D. (n.d.). *gangguan pada sistem perkemihan dan penatalaksanaan keperawatan*. Deepublish.
- Otolowo, D. T., Akinola, S. A., Bello, M., Alaba, J. O., & Ajejomoni, D. (2021). *C roatian J ournal of F ood S cience and T echnology potential treatment for diarrhoea*. 13(1), 68–79.
- PPNI. (2017a). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Edisi 1*. DPP PPNI.
- PPNI, T. P. S. D. (2017b). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia.
- PPNI, T. P. S. D. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Priyanto, & Anggraeni, I. I. (2019). Perbedaan Tingkat Nyeri Dada Sebelum dan Setelah Dilakukan Terapi Murottal Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya*, 14(1), 18–27.
- Priyadi, J. C., Soeselo, D. A., Kusumajaya, C., & Dicky. (2020). *Kegawat daruratan Urologi*. Universitas Atma Jaya.
- Perry, A.G & Potter, P. A. (2012). *Fundamental Keperawatan, Konsep, Klinis Dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Stoller, M. L. (2015). *Chapter 17 . Urinary Stone Disease Urinary Stone Disease : Introduction Renal and Ureteral Stones*. 1–51.
- Supriyanto, A., & Jamaludin. (2018). Perawatan Luka Dengan Sofratulle Pada Pasien Post Operasi Vesikolithotomy Hari Ke Vii Di Ruang Dahlia Rumah Sakit Umum Ra. Kartini Jepara. *Jurnal Profesi Keperawatan*, 1(1), 26–33.
- Tim Pokja SLKI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. DPP PPNI.
- Wein, A. J. (2012). *No Campbell-Walsh Urology, Tenth Edition International Edition*. ELSEVIER.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Akil Agung Setia budi lahir di Makassar pada tanggal 15 Juni 1997. Penulis merupakan anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Drs. H. Muh Nasir dan Ibu Hj Nurbaeti. Penulis atau yang lebih akrab dipanggil Akil ini mulai mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar di SDI 227 Romanga Kemudian dilanjutkan di SMPN1 Binamu Kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 2 Binamu pada tahun 2012 dan selesai 2015. Setelah itu penulis mendaftarkan diri ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Melalui jalur SPAN PTKIN dan diterima di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dan berhasil lulus S1 Keperawatan dikampus tersebut pada tahun 2021. Kemudian selang 1 tahun penulis kembali mendaftarkan di kampus tersebut dalam prodi Profesi Ners dan diterima. Syukur Alhamdulillah masih diberikan Kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melewati perjuangan keras serta Doa dari Ibu dan Bapak dan keluarga saya serta Teman-Teman yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan dan berhasil Menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Implementasi Terapi Murottal Pada Pasien Vesikolithiasis Dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut RSUD Syekh Yusuf Gowa”