

**SOLUSI NUMERIK MODEL SEIIT DARI PENYEBARAN
PENYAKIT DIABETES MELITUS DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Matematika Program Studi Matematika
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:
MUJAHIDA
NIM. 60600119058

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujahida

NIM : 60600119058

Jurusan : Matematika

Judul : Solusi Numerik Model SEIIT Dari Penyebaran Penyakit

Diabetes Melitus Di Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan bahwa skripsi yang penulis tulis ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan plagiat atau tulisan/pikiran orang lain yang penulis akui sebagai hasil tulisan/pikiran penulis sendiri, kecuali yang secara tulis sebagai materi referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata skripsi yang penulis tulis terbukti plagiat, maka penulis bersedia menanggung segala resiko yang akan penulis terima.

Gowa, September 2023

Penulis

Mujahida

NIM. 60600119058

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Solusi Numerik Model SEIIT dari Penyebaran Penyakit Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Selatan”, yang disusun oleh Saudari **Mujahida**, Nim: **60600119058** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal **13 Oktober 2023 M**, bertepatan dengan **27 Rabiul Awal 1445 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 13 Oktober 2023 M
27 Rabiul Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Fahmyddin A'raaf Tauhid, ST., M.Arch., Ph.D. (.....)	
Sekretaris	: Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si. (.....)	
Munaqisy I	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd. (.....)	
Munaqisy II	: Rofia Masrifah, S.Pd. I., M.Pd. I (.....)	
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si. (.....)	
Pembimbing II	: Ilham Syata, S.Si., M.Si. (.....)	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Fahmyddin A'raaf Tauhid, ST., M.Arch., Ph.D.
Nip. 19760610 200604 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan banyak rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul ***“Solusi Numerik Model SEIIT Dari Penyebaran Penyakit Diabetes Melitus Di Provinsi Sulawesi Selatan”*** sebagai salah satu tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana Matematika (S.Mat) Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, nabi yang telah memperkenalkan agama islam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh ummatnya hingga akhir ini.

Penulis menghaturkan terima kasih penuh cinta yang tak terhingga dan penghargaan kepada kedua orang tua, Ayahanda Alm. Muh. Suyuti dan Ibunda Norma, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan jiwa penuh kasih sayang dan hati yang tulus. Kepada Saudaraku tercinta Nur azizah, dan Rahmatullah, semua keluarga yang selalu memberikan do'a yang tak pernah terputus dalam kehidupan penulis serta menjadi sumber motivasi untuk melangkah mencapai keberhasilan. Penulis sangat berharap persembahkan penyelesaian tugas akhir yang tidak sebanding dengan pengorbanan mereka ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk mereka semua, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penyelesaian skripsi ini juga tak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, untuk itu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D**, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil rektor, dosen pengajar beserta staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Ar. Fahmyddin A'raf Tauhid, M.Arch., Ph.D**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Para wakil dekan, dosen pengajar beserta staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M. Si.**, Ketua Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selaku bersedia membimbing dan memberikan solusi serta nasihat yang terarah.
4. Bapak **Irwan, S.Si., M.Si.**, Dosen pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing I yang bersedia membimbing dan memberikan solusi serta nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Ilham Syata, S.Si., M.Si.**, Dosen Pembimbing II yang bersedia membimbing dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan arahan, motivasi dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.**, Penguji I dan Ibu **Rofiah Masrifah, S.Pd., M.Pd.**, Penguji II yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap **Dosen dan staf Prodi Matematika** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
8. Sahabat dan sahabatwati **A19ORITMA**, Matematika Angkatan 2019 yang selalu memberikan doa dan dukungannya, semoga persaudaraan dan persahabatan yang terjalin selama ini tetap terjaga.
9. Teman baik saya **Nurazizah, Nurul Sakiah, dan Suciana** yang tidak pernah bosan mendengar keluhan dan curhatan hati penulis.
10. Teman-teman **Limit B** yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dari awal semester hingga saat ini.
11. Teman-teman seperjuangan **KKN Angkatan 70 Posko 18 “RUMAH CEMARA”** desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab. Bone yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis.
12. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



Gowa, September 2023

Penulis

Mujahida
60600119058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SIMBOL.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Persamaan Diferensial.....	9
B. Metode Numerik	10
C. Solusi Numerik Persamaan Diferensial.....	11

D. Analisis Galat	16
E. Analisis Konvergensi	17
F. Penyakit Diabetes Melitus.....	19
G. Model Diabetes Melitus	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Waktu Penelitian.....	26
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	26
E. Prosedur Penelitian.....	27
F. Skema Penyelesaian Masalah.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Model SEIIT _T Pada Penyakit Diabetes Melitus.....	23
Gambar 3.1	Skema Penyelesaian Masalah.....	27
Gambar 4.1	Diagram Model SEIIT _T Pada Penyakit Diabetes Melitus.....	30
Gambar 4.2	Penyebaran Jumlah Susceptible pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Euler.....	38
Gambar 4.3	Penyebaran Jumlah Exposed pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Euler.....	39
Gambar 4.4	Penyebaran Jumlah Infection pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Euler.....	40
Gambar 4.5	Penyebaran Jumlah Infection With Treatment Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Euler.....	41
Gambar 4.6	Penyebaran Jumlah Susceptible pada penyakit Diabetes Melitus dengan metode Heun.....	48
Gambar 4.7	Penyebaran Jumlah Exposed pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Heun.....	49
Gambar 4.8	Penyebaran Jumlah Infection pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Heun.....	50
Gambar 4.9	Penyebaran Jumlah Infection With Treatment Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Heun.....	51

Gambar 4.10	Penyebaran Jumlah Susceptible pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge Kutta Orde 4.....	63
Gambar 4.11	Penyebaran Jumlah Exposed pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge Kutta Orde 4.....	63
Gambar 4.12	Penyebaran Jumlah Infection pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge Kutta Orde 4.....	64
Gambar 4.13	Penyebaran Jumlah Infection With Treatment Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge Kutta Orde 4...	65




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Formulasi dari nilai proporsi model SEIIT pada penyakit Diabetes Melitus	24
Tabel 2. 2 Formulasi dari parameter model SEIIT pada penyakit diabetes melitus	25
Tabel 4. 1 Nilai Awalan	33
Tabel 4. 2 Nilai Awalan Hasil Proporsi	33
Tabel 4. 3 Nilai Parameter	34
Tabel 4. 4 Hasil Solusi Numerik Penyakit Diabetes Melitus Menggunakan Metode Eule.....	37
Tabel 4. 5 Hasil Solusi Numerik Penyakit Diabetes Melitus Menggunakan Metode Heun	48
Tabel 4. 6 Hasil Solusi Numerik Penyakit Diabetes Melitus Menggunakan Metode Runge-Kutta Orde 4	64
Tabel 4. 7 Galat Mutlak Metode Euler, Heun, dan Runge Kutta Orde 4.....	71

ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Validasi.....	85
Lampiran 2 Data.....	86
Lampiran 3 Program.....	89
Lampiran 4 Output	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR SIMBOL

- $N(t)$: Jumlah individu dalam populasi pada saat t
- $S(t)$: Jumlah individu yang rentan pada saat t
- $E(t)$: Jumlah individu yang laten pada saat t
- $I(t)$: Jumlah individu sakit pada saat t
- $I_T(t)$: Jumlah individu sakit dengan perawatan pada saat t
- A : Laju kelahiran populasi
- μ : Laju kematian alami
- β : Laju kontak infeksi individu yang rentan terhadap individu yang laten
- α : Laju perpindahan individu yang laten terhadap individu sakit tanpa perawatan
- $(1 - \alpha)$: Laju perpindahan individu yang laten terhadap individu sakit dengan perawatan
- δ_1 : Laju kematian akibat penyakit tanpa perawatan
- δ_2 : Laju kematian akibat penyakit dengan adanya perawatan
- Δt : Interval waktu atau ukuran langkah
- $S(t_0)$: Nilai awal untuk populasi individu kelas rentan
- $E(t_0)$: Nilai awal untuk populasi individu kelas tereksposed
- $I(t_0)$: Nilai awal untuk populasi individu kelas terinfeksi tanpa perawatan

- $I_T(T_0)$: Nilai awal untuk populasi individu kelas terinfeksi dengan adanya perawatan
- S_{i+1} : Solusi numerik menggunakan metode euler, metode heun, dan metode runge-kutta orde 4 pada kelas rentan
- E_{i+1} : Solusi numerik menggunakan metode euler, metode heun, dan metode runge-kutta orde 4 pada kelas eksposed
- I_{i+1} : Solusi numerik menggunakan metode euler, metode heun, dan metode runge-kutta orde 4 pada kelas terinfeksi tanpa perawatan
- $I_{T_{i+1}}$: Solusi numerik menggunakan metode euler, metode heun, dan metode runge-kutta orde 4 pada kelas terinfeksi dengan adanya perawatan



ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait analisis dan simulasi penyakit Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menerapkan model $SEIIT_T$ menggunakan metode Euler, Metode Heun, dan Metode Runge-Kutta Orde 4. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan yang bertujuan untuk menerapkan model $SEIIT_T$ dan mengetahui solusi numerik pada model $SEIIT_T$ dalam memprediksi kasus penyakit diabetes melitus di Provinsi Sulawesi Selatan dimasa depan. Model matematika penyakit Diabetes Melitus berbentuk sistem persamaan diferensial non linear yang mencakup variabel S (*Susceptible*), E (*Exposed*), I (*Infected*), I_T (*Infected With Treatment*). Hasil penelitian yang diperoleh pada tahun 2023 dengan $\Delta t = 0,01$ Tahun menggunakan metode Euler, Metode Heun, Metode Runge-Kutta Orde 4 dengan nilai awal yaitu $S_0 = 8.770.632$, $E_0 = 190.173$, $I_0 = 31.916$, $I_{T_0} = 80.788$ adalah $S_{100} = 8.799.239$, $E_{100} = 70.090$, $I_{100} = 101.310$, $I_{T_{100}} = 127.705$ untuk hasil metode euler, $S_{100} = 8.799.244$, $E_{100} = 70.440$, $I_{100} = 101.476$, $I_{T_{100}} = 128.416$ untuk hasil metode heun, $S_{100} = 8.799.698$, $E_{100} = 101.827$, $I_{100} = 82.693$, $I_{T_{100}} = 114.969$ untuk hasil metode runge-kutta orde 4. Laju populasi rentan mengalami peningkatan, populasi individu ekspos mengalami penurunan sedangkan untuk populasi terinfeksi tanpa perawatan dan terinfeksi dengan adanya perawatan mengalami peningkatan kemudian menurun.

Kata kunci: *Solusi Numerik, Diabetes Melitus, Model $SEIIT_T$*



ABSTRACT

The study discusses the analysis and simulation of Diabetes Mellitus in South Sulawesi Province by applying the $SEIIT_T$ model using the Euler method, the Heun method, and the Order 4 Runge-Kutta method. The type of research used is applied research which aims to apply the $SEIIT_T$ model and find out numerical solutions to the $SEIIT_T$ model in predicting diabetes cases mellitus in South Sulawesi Province in the future. The mathematical model of Diabetes Mellitus is in S (Susceptible), E (Exposed), I (Infected), I_T (Infected With Treatment). The research results obtained in 2023 with $\Delta t = 0,01$ years using the Euler method, the Heun method, and the Order 4 Runge-Kutta method with initial values of $S_0 = 8.770.632$, $E_0 = 190.173$, $I_0 = 31.916$, $I_{T_0} = 80.788$ is $S_{100} = 8.799.239$, $E_{100} = 70.090$, $I_{100} = 101.310$, $I_{T_{100}} = 127.705$ for the results of the Euler method, $S_{100} = 8.799.244$, $E_{100} = 70.440$, $I_{100} = 101.476$, $I_{T_{100}} = 128.416$ for the results of the Heun method, $S_{100} = 8.799.698$, $E_{100} = 101.827$, $I_{100} = 82.693$, $I_{T_{100}} = 114.969$ for the results of the Order 4 Runge-Kutta method. The rate of the susceptible population has increased, the exposed individual population has decreased while the infected population without treatment and those infected with treatment have increased then decreased.

Keyword: *Diabetes Mellitus, $SEIIT_T$ Model, Numerical Solution.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diabetes melitus atau biasa disebut kencing manis merupakan penyakit metabolisme yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia. Gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai sistem tubuh seperti pembuluh darah, jantung, ginjal, kerusakan saraf (stroke) bahkan kematian. Makanan cepat saji juga menjadi salah satu penyebab diabetes, karena makanan cepat saji banyak mengandung gula yang dapat mempengaruhi metabolisme, selain itu makanan cepat saji tidak mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh (Kaya, Darmawati, & Ekawati, 2021). Salah satu penyebab meningkatnya penyakit diabetes adalah gaya hidup dan pola makan yang tidak teratur dengan porsi yang berlebihan, padahal dalam al-Qur'an Surat Toha ayat 81 disebutkan:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ
غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

Terjemahnya:

“Makanlah diantara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka binasalah ia.” (Departemen Agama RI, 2010)

Menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat ini adalah perintah untuk makanlah dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada kalian dan janganlah kalian berlebihan dalam melakukannya, dimana kalian mengambilnya diluar kebutuhan dan melanggar apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Bersikap rakus artinya ingin mengonsumsi makanan yang berlebihan dan memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Apabila pola makan tidak terkontrol dan tidak teratur dalam jumlah banyak, maka dapat menyebabkan kegemukan serta diabetes melitus (Katsir I. , 2003)

Hubungan ayat tersebut dengan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga gaya hidup dan pola makan yang tidak teratur. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka mengambil makanan dari yang mereka butuhkan dan janganlah berlebihan dalam mengambil makanan. Dengan mengonsumsi makanan yang tidak berlebihan dan memakan makanan yang sehat dapat mencegah terjadinya kegemukan serta diabetes melitus.

Berdasarkan hasil Kementerian Kesehatan RI prevalensi Diabetes Melitus (berdasarkan pemeriksaan darah) di Indonesia pada tahun 2013 dan 2018 mengalami peningkatan dari 6,9% menjadi 8,5%. Sedangkan menurut consensus perkemihan pada tahun 2018 menunjukan kasus diabetes melitus sebesar 10,9%. Prevalensi penderita diabetes melitus di Provinsi Sulawesi Selatan 3,4% (414.513 jiwa) terjadi peningkatan 2 kali lipat dari hasil Kementerian Kesehatan RI sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar Insiden Diabetes Melitus meningkat di tahun 2015 sekitar 1.697 kasus pada tahun 2016 sekitar 4.242 kasus meningkat 59%. (Angriani & Baharuddin, 2020).

Selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang matematika juga berperan dalam analisis masalah dan pemodelan. Model matematika yang dihasilkan, baik berupa persamaan, pertidaksamaan, sistem persamaan, dll dapat memberikan solusi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencari solusi permasalahan yang dimodelkan dalam model matematika. Salah satu model matematisnya adalah penyakit yang semakin meningkat setiap tahunnya dan banyak masyarakat Indonesia yang menghadapi penyakit diabetes. Masalah model matematika diabetes dapat diselesaikan dengan metode numerik (Santoso, 2011).

Metode numerik digunakan untuk mencari solusi numerik dari model matematika yang digunakan dalam metode analitik, dan solusinya sulit untuk ditentukan dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam metode numerik ini, nilai numerik diselesaikan dengan perhitungan berulang. Solusi numerik ditentukan dengan melakukan prosedur iteratif tertentu, sehingga setiap hasil akan lebih akurat dari perkiraan sebelumnya. Dengan melakukan proses iteratif secara memadai, hasil perkiraan yang mendekati hasil pasti akhirnya diperoleh. Oleh karena itu, metode numerik dapat disebut metode aproksimasi atau metode pendekatan (Santoso, 2011).

Banyak metode dalam metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan matematika. Ada beberapa metode numerik untuk menentukan nilai variabel persamaan simultan, antara lain metode Euler, metode Heun, dan metode Runge-kutta orde 4. Metode Euler adalah metode numerik dengan akurasi orde pertama. Metode Heun yang memiliki ketelitian orde kedua

dan dikenal sebagai sebagai penyempurnaan dari metode euler. Metode Runge-kutta orde 4 adalah metode dengan tingkat akurasi urutan keempat. Hasil simulasi dari ketiga metode tersebut akan dilihat apakah memiliki kesamaan perilaku dari solusinya. Perilaku yang sama akan meyakinkan tentang kebenaran dari hasil simulasinya. (Mungkasi, 2021)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait analisis model matematika untuk penyakit Diabetes Melitus telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah Hesti dkk.(2017) meneliti tentang analisis kestabilan model $SEII_T$ pada penyakit Diabetes Melitus yang menyatakan bahwa jika laju kontak infeksi individu yang rentan menjadi individu yang laten semakin besar, maka tingkat penyebaran penyakit diabetes melitus semakin besar. Peneliti lainnya dilakukan oleh Ardiansah & Kharis (2012) yang meneliti tentang model matematika untuk penyakit diabetes tanpa factor genetik. Peneliti yang dilakukan oleh Lede & Mungkasi (2019) meneliti tentang analisis model penyebaran demam berdarah. Dalam menyelesaikan model tersebut menggunakan metode Euler dan metode Heun. Peneliti yang dilakukan oleh Karlina Kaya dkk (2021) meneliti tentang model matematika pada penyakit diabetes melitus dengan faktor genetic dan faktor sosial.Selanjutnya peneliti yang dilakukan oleh Anastasia Poznyak dkk (2020) meneliti tentang hubungan diabetes mellitus-aterosklerosis: peran metabolisme lipid, glukosa dan peradangan kronis yang meringkas aspek utama diabetes mellitus yang mungkin mempengaruhi proses aterogenik dan hubungannya dengan peradangan kronis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji “Solusi Numerik Model $SEII_T$ Dari Penyebaran Penyakit Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana solusi numerik model $SEII_T$ pada penyakit diabetes melitus dengan menggunakan metode Euler?
2. Bagaimana solusi numerik model $SEII_T$ pada penyakit diabetes melitus dengan menggunakan metode Heun?
3. Bagaimana solusi numerik model $SEII_T$ pada penyakit diabetes melitus dengan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4?
4. Bagaimana solusi numerik terbaik pada model $SEII_T$ penyakit diabetes melitus berdasarkan nilai galat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui solusi numerik model $SEII_T$ Penyakit diabetes melitus dengan menggunakan metode Euler
2. Untuk mengetahui solusi numerik model $SEII_T$ Penyakit diabetes melitus dengan menggunakan metode Heun.
3. Untuk mengetahui solusi numerik model $SEII_T$ Penyakit diabetes melitus dengan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4.

4. Untuk mengetahui solusi numerik terbaik pada model $SEIIT$ penyakit diabetes mellitus berdasarkan nilai galat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan mengaplikasikan pemahaman penulis dalam menganalisis model matematika dan mendapatkan solusi numerik pada penyakit diabetes melitus menggunakan metode euler, heun, runge-kutta orde 4.

2. Bagi Pembaca

Menjadi sumber perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tepatnya pada Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang dapat berguna bagi mahasiswa(i) mengenai pelajaran Pemodelan Matematika dan Analisis Numerik.

E. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka diperlukan Batasan-batasan masalah sebagai berikut

1. Model matematika Penyakit diabetes melitus yang dibentuk tanpa memperhatikan umur dan jenis kelamin dalam populasi di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Data yang digunakan merupakan data penderita diabetes melitus pada tahun 2022 yang berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini, perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas mengenai penyakit Diabetes Melitus, persamaan diferensial, metode numerik, dan memodelkan penyakit diabetes melitus.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini membahas mengenai metode yang akan digunakan yaitu menyangkut tahapan pemecahan masalah penelitian, prosedur penelitian, dan skema penyelesaian masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil dan pembahasan terkait penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini meliputi daftar rujukan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persamaan Diferensial

Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi dari satu atau lebih variabel, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam turunan orde yang berbeda (Nuraeni, 2017). Persamaan diferensial adalah persamaan yang memberikan hubungan antara fungsi yang tidak diketahui dengan satu atau lebih turunan dari fungsi tersebut (Murtafi'ah & Apriandi, 2018). Persamaan diferensial dibagi menjadi dua persamaan, yaitu persamaan diferensial biasa (PDB) dan persamaan diferensial parsial (PDP). Di bawah ini adalah penjelasan tentang persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial.

1. Persamaan Diferensial Biasa merupakan suatu persamaan diferensial jika fungsi yang tidak diketahui hanya bergantung pada satu peubah bebas atau hanya melibatkan satu variabel bebas.

Contoh

$$5x + y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 9 \text{ (PDB Orde Satu)}$$

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} + \frac{dy(x)}{dx} + xy = 5x \text{ (PDB Orde Dua)}$$

2. Persamaan Diferensial Parsial merupakan persamaan diferensial yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas dan memuat turunan parsial dari fungsi yang tak diketahui.

Contoh

$$\frac{\partial z(x,y)}{\partial x} + 2 \frac{\partial z(x,y)}{\partial y} = z \text{ (PDP Orde Satu)}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \text{ (PDP Orde Dua)}$$

B. Metode Numerik

Penyelesaian persoalan matematika yang sulit dipecahkan ataupun tidak bisa dipecahkan secara analitik, hendak dikatakan kalau permasalahan tersebut tidak mempunyai solusi analitik. Metode numerik merupakan alternatif dari permasalahan matematika yang tidak mempunyai pecahan analitik (Triatmodjo, 2002).

Metode numerik juga dikenal sebagai alternatif dari metode analitik, yaitu metode penyelesaian masalah matematika dengan menggunakan rumus aljabar standar dan umum. Perbedaan utama antara metode numerik dan metode analitik terletak pada dua hal, yaitu:

1. Metode numerik selalu memiliki solusi dalam bentuk numerik, sedangkan metode analitik biasanya menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematika, yang kemudian dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk numerik.
2. Metode numerik dapat memperoleh solusi yang mendekati solusi sebenarnya, oleh karena itu solusi numerik disebut juga solusi pendekatan atau solusi hampiran. Namun, solusi pendekatan dapat dibuat setepat yang diinginkan. Tentu saja, solusi pendekatan tidak persis sama dengan solusi sebenarnya, jadi terdapat perbedaan antara keduanya, dan perbedaan ini disebut galat (error). Sedangkan dengan solusi analitik sudah pasti di hasilkan solusi sebenarnya yang sesuai dengan kenyataannya (Triadmojo, 2002).

C. Solusi Numerik Persamaan Diferensial

Metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial adalah metode analitik, namun ada persamaan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik sehingga diperlukan metode lain untuk mendekati nilai sebenarnya yaitu metode numerik. Beberapa metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa antara lain:

1. Metode Euler

Metode utama untuk menyelesaikan masalah nilai awal adalah metode Euler. Dengan menggunakan metode Euler, dapat mengikuti pendekatan intuitif yang sama dengan yang digunakan untuk perkiraan numerik dari nilai awal (Howard, 2017). Adapun Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan dengan menggunakan metode euler adalah:

- a. Mensubstitusikan nilai awal dan nilai parameter
- b. Menentukan jumlah iterasi (n) dan step size atau ukuran langkah (Δx) yang akan digunakan
- c. Melakukan integrasi dengan menggunakan persamaan:

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i + y_i) \Delta x \quad (2.1)$$

dimana:

y_{i+1} : Nilai y pada iterasi ke- i

y_i : Nilai y iterasi ke- i

$f(x_i + y_i)$: Fungsi diferensial pada x_i dan y_i

Δx : Ukuran Langkah (Yulistiyanto, 2015)

2. Metode Heun

Metode Heun merupakan penyempurnaan dari metode Euler dengan menggunakan estimasi nilai dari *predictor*, menjadikannya perhitungan dua langkah dari metode Euler. Selain itu, solusi perkiraan awal ini dikoreksi dengan menggunakan metode Heun (*corrector*). Metode yang sesuai dengan metode heun juga dikenal sebagai metode runge kutta orde 2. Metode ini ialah metode yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode numerik. Metode ini menggunakan nilai turunan pertama pada beberapa titik, bukan nilai turunan yang berurutan pada satu titik (Karris). Adapun Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan dengan menggunakan metode heun adalah:

- a. Mensubtitusikan nilai awal dan nilai parameter
- b. Menentukan jumlah iterasi (n) dan step size atau ukuran langkah (h) yang akan digunakan
- c. Melakukan integrasi dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Predictor: } y_{i+1}^{(0)} = y_i + \Delta t f(x_i, y_i) \quad (2.2)$$

$$\text{Corrector: } y_{i+1} = y_i + \frac{\Delta t}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(0)})] \quad (2.3)$$

dimana:

$y_{r+1}^{(0)}$: Nilai predictor y pada iterasi ke $r + 1$

y_i : Nilai y pada iterasi ke i

Δ_t : Ukuran Langkah

$f(x_i, y_i)$: Fungsi diferensial pada x_r dan y_r (Munir, Metode Numerik, 2006)

3. Metode Runge-Kutta

Metode Runge-Kutta merupakan metode satu langkah dengan banyak tahapan, banyaknya jumlah tahapan menentukan urutan metode. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dari persamaan diferensial eksplisit, implisit, parsial dan tertunda (Chauhan & Srivastava, 2019).

Berikut bentuk metode Runge-Kutta adalah:

$$y_{1+i} = y_i + \Phi(x_i, y_i, \Delta x)\Delta x \quad (2.4)$$

Dengan $\Phi(x_i, y_i, \Delta x)$ adalah fungsi pertambahan yang merupakan kemiringan

$$\Phi = a_1, k_1 + a_2, k_2 + \dots + a_n, k_n \quad (2.5)$$

pada interval, yang di tulis sebagai berikut:

Dengan a ialah konstanta dan k ialah:

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (2.6)$$

$$k_2 = f(x_i + p_1\Delta x, y_i + q_{11}k_1\Delta x) \quad (2.7)$$

$$k_3 = f(x_i + p_2\Delta x, y_i + q_{21}k_1\Delta x + q_{22}k_2\Delta x) \quad (2.8)$$

$$k_n = f(x_i + p_{n-1}\Delta x, y_i + q_{n-1,1}k_1\Delta x + q_{n-1,2}k_2\Delta x + \dots + q_{n-1,n-1}k_{n-1}\Delta x) \quad (2.9)$$

Keterangan:

y_i : Nilai sebelumnya

y_{i+1} : Nilai selanjutnya dengan ukuran Langkah Δx

Δx : Ukuran langkah

$\Phi(x_i, y_i, \Delta x)$: Fungsi inkremen yang dapat diinterpretasikan sebagai suatu kemiringan rerata pada interval

a, p dan q : Konstanta

a. Metode Runge-Kutta Orde Dua

Metode Runge-Kutta orde dua memiliki bentuk persamaan sebagaimana pada persamaan (2.10):

$$y_{i+1} = y_i + (k_1 + k_2)\Delta x \quad (2.10)$$

dengan

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (2.11)$$

$$k_2 = f(x_i + \Delta x, y_i + k_1\Delta x) \quad (2.12)$$

Keterangan:

y_i : Nilai Sebelumnya

y_{i+1} : Nilai Selanjutnya dengan ukuran Langkah Δx

Δx : Ukuran langkah

b. Metode Runge-Kutta Orde Tiga

Metode Runge-Kutta orde tiga dapat diturunkan dengan metode yang sama dengan orde dua dimana nilai $n = 3$. Metode Runge-Kutta orde tiga mempunyai bentuk persamaan (2.13):

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6} (k_1 + 4k_2 + k_3)\Delta x \quad (2.13a)$$

dengan:

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (2.13.b)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}\Delta x, y_i + \frac{1}{2}\Delta x k_1\right) \quad (2.13.c)$$

$$k_3 = f(x_i + \Delta x, y_i - \Delta x k_1 + 2\Delta x k_2) \quad (2.13.d)$$

Keterangan:

y_i : Nilai Sebelumnya

y_{i+1} : Nilai Selanjutnya dengan ukuran Langkah Δx

Δx : Ukuran langkah

c. Metode Runge-Kutta Orde Empat

Metode Runge-Kutta orde empat adalah metode yang sangat teliti dibandingkan dengan orde dua serta orde tiga. Oleh karena itu, metode Runge-Kutta orde empat sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Metode Runge-Kutta orde empat diturunkan dengan cara yang sama seperti metode Runge-Kutta orde dua untuk nilai $n = 4$. Adapun Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan dengan menggunakan metode runge kutta orde empat adalah:

1. Mensubtitusikan nilai awal dan nilai parameter

2. Menentukan jumlah iterasi (n) dan step size atau ukuran langkah (Δx) yang akan digunakan
3. Melakukan integrasi dengan menggunakan persamaan:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\Delta x \quad (2.14a)$$

dengan:

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (2.14.b)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}\Delta x, y_i + \frac{1}{2}\Delta x k_1\right) \quad (2.14.v)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2}\Delta x, y_i + \frac{1}{2}\Delta x k_2\right) \quad (2.14.d)$$

$$k_4 = f(x_i + \Delta x, y_i + \Delta x k_3) \quad (2.14.e)$$

Keterangan:

- y_i : Nilai sebelumnya
 y_{i+1} : Nilai selanjutnya dengan ukuran Langkah Δx
 Δx : Ukuran Langkah (Triadmojo, 2002)

D. Analisis Galat

Penyelesaian secara numerik akan memberikan solusi perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya dengan cara analitik. Seberapa dekat nilai hampiran dengan solusi sebenarnya ini dihitung dengan galat atau seberapa besar kesalahan yang didapat dari selisih nilai hampiran dengan nilai eksak. Secara umum galat terbagi dua yaitu galat pemotongan (*Truncation error*) dan galat pembulatan (*Round-off error*). Galat pemotongan yaitu solusi numerik digunakan untuk merepresentasikan dari nilai eksak.

Galat pemotongan terdiri dari galat pemotongan local yaitu galat yang terjadi pada langkah pertama perhitungan. Kesalahan yang terjadi akan terus salah pada langkah atau iterasi selanjutnya yang disebut juga galat pemotongan total (*total-global truncation error*). Galat pembulatan (*Round-off error*) yaitu angka yang didapat mempunyai signifikan terbatas untuk merepresentasikan nilai eksak. Untuk mencari galat secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$E_t = |\text{nilai sebenarnya} - \text{nilai aproksimasi}| \quad (2.15)$$

Dimana t , mewakili galat yang benar (*true*) (Capra, 2015)

E. Analisis Konvergensi

Pada metode numerik untuk memenuhi kriteria yang baik harus memenuhi tiga karakteristik atau sifat yaitu konvergensi, konsistensi, dan kestabilan. Metode Runge-Kutta orde empat menghasilkan penyelesaian yang lebih akurat dari pada metode euler dan metode heun yang ditandai dengan kekonvergenan pada metode yang memenuhi syarat konsisten dan stabil. Menurut Emmanuel, Chidinma & Ifeoma, 2020 pada analisis konvergen dari metode Runge-Kutta, bahwa metode Runge-Kutta orde empat merupakan metode yang efisien dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan memiliki hasil error terkecil diantara metode euler dan metode heun (hasil solusi mendekati dengan nilai eksak).

Teorema 2.1: Umum pada tingkat metode Runge-Kutta

$$y_{n+1} = y^n + h\phi(x_n, y_n, h) \text{ dengan } \phi(x_n, y_n, h) = \sum_{i=1}^n b_i k_i$$

Jika dan hanya jika stabil dan konsisten.

Bukti:

$$y_{i+1} = y_i + h\phi(x_i, y_i, h)$$

karena,

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + h\phi(x_i, y(x_i), h) + hr_i$$

$$|e_{i+1}| \leq |e_i| + h|\phi(x_i, y(x_i), h) - \phi(x_i, y_i, h)| + h|r_2|$$

$$\leq |e_i| \leq hK|e_i| + hr(h)$$

$$= (1 + hk)|e_i| + hr(h)$$

jadi ,

$$|e_1| \leq (1 + hk)|e_0| + hr(h)$$

$$|e_2| \leq (1 + hk)|e_1| + hr(h)$$

$$\leq (1 + hk)^2|e_0| + hr(h)(1 + (1 + hk))$$

dengan induksi,

$$|e_i| \leq (1 + hk)^2|e_0| + hr(h)(1 + (1 + hk) + (1 + hk)^2 + \dots + (1 + hk)^{i-1})$$

$$= (1 + hk)^i|e_0| + hr(h) \frac{(1 + hk)^i - 1}{(1 + hk) - 1}$$

$$= (1 + hk)^i|e_0| + r(h) \frac{(1 + hk)^i - 1}{K}$$

kemudian,

$$(1 + hk)^{\frac{1}{h}} \uparrow e^{kash} \rightarrow 0 \text{ (untuk } k > 0 \text{ dan } i = \frac{x_i - a}{h}, \text{ sehingga}$$

$$(1 + hk)^i = (1 + hk)^{\frac{x_i - a}{h}} \leq e^{k(xi-a)}$$

jadi,

$$|e_i| \leq e^{k(xi-a)}|e^0| + r(h) \frac{e^{k(xi-a)} - 1}{K}$$

Maka kita ketahui $y(x) \in C^p + 1$.

Teorema tersebut menyiratkan bahwa metode satu langkah adalah urutan yang akurat dan stabil.

$T(x, h) = O(h^{p+1})$ dan dengan demikian $r(h) = O(h^p)$

Selain itu, $e_0(h) = O(h^p)$, kemudian $\max_i |e_i(h)| = O(h^p)$

Berarti, untuk setiap metode runge-kutta akan diselidiki stabilitas dan konsistensinya dengan mengasumsikan kontinuitas dari $\emptyset(x, y, h)$ dengan $f(x, y)$. (Emmanuel, Chidinma, & Ifeoma, 2020)

F. Penyakit Diabetes Melitus

Diabetes melitus (DM) adalah gangguan metabolisme akibat gangguan sekresi insulin, yang menyebabkan hiperglikemia dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Insiden diabetes melitus telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena perubahan gaya hidup, peningkatan prevalensi obesitas dan peningkatan umur Panjang (Purnamasari D, 2014). Proyeksi saat ini memperkirakan bahwa jumlah penderita diabetes melitus akan meningkat sebesar 50,0% pada tahun 2010, dan hampir dua kali lipat pada tahun 2025 (Angriani & Baharuddin, 2020). World Health Organization (WHO) mendefinisikan bahwa diabetes sebagai suatu penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang sudah ada. Indonesia salah satu dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Indonesia menduduki peringkat ke-7 pada tahun 1995 dan diperkirakan akan mencapai peringkat ke-5 pada tahun 2025 dengan perkiraan jumlah penderita sebanyak 12,4 juta jiwa (Arisman, 2014). Secara klinis, resistensi insulin pada awalnya tidak menyebabkan diabetes. Dalam hal ini, sel beta pankreas masih dapat mengkompensasi kondisi tersebut sehingga terjadi hiperinsulinemia dan kadar glukosa darah yang masih normal atau sedikit

meningkat. Setelah terjadi ketidaksanggupan sel beta pankreas, diabetes melitus yang ditandai dengan peningkatan kadar gula glukosa dalam darah yang memenuhi kriteria diagnosis diabetes mellitus (Soegondo S, 2014).

1. Klasifikasi Diabetes Melitus

a. Diabetes Melitus Tipe 1

Pada Diabetes Melitus Tipe 1 terjadi ketidakmampuan memproduksi insulin akibat kerusakan autoimun pada sel beta pankreas, sehingga penderita diabetes tipe ini pasien bergantung pada pemberian insulin (Maulana I. , 2012). Diabetes Melitus Tipe 1 paling sering diagnosis pada anak-anak dan remaja, biasanya dengan kombinasi gejala yang disebutkan diatas dan hiperglikemia, yang ditandai dengan kebutuhan akan insulin eksogen (Poznyak, et al., 2020).

b. Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes Melitus tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling banyak diderita orang. Pada diabetes tipe 2, pankreas pasien masih memiliki kemampuan untuk memproduksi insulin, hanya saja dengan adanya faktor risiko tertentu menyebabkan tubuh membuat mekanisme resistensi terhadap efek insulin, sehingga gula darah naik (Maulana I. , 2012) .

c. Diabetes Gestasioanal (Kehamilan)

Diabetes Gestasioanal Merupakan penyakit diabetes yang banyak terjadi pada ibu hamil. Ibu hamil dengan diabetes tipe ini melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4,5 kg. Pada ibu hamil, hormon tertentu diproduksi

di plasenta, yang membantu mendistribusikan nutrisi dari ibu ke janin (Bujawati, 2012).

2. Komplikasi Diabetes Melitus

Diabetes Melitus juga disebut *the great imitator*, penyakit yang dapat menyerang organ tubuh dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, diketahui bahwa diabetes melitus dapat menyebabkan komplikasi akut dan kronis.

a. Komplikasi akut

Komplikasi akut terjadi ketika kadar darah seseorang tiba-tiba naik atau turun dalam waktu yang relative singkat. Dalam komplikasi akut dikenal beberapa istilah sebagai berikut :

1. Hipoglikemia
2. Ketoasidosis diabetic-koma
3. Koma hiperosmoler non ketorik
4. Koma lakto asidosis

b. Komplikasi Kronis

Komplikasi kronis merupakan kelainan pembuluh darah yang dimana dapat menyebabkan serangan jantung, gagal ginjal, dan gangguan saraf. Masalah kronis dapat dibedakan berdasarkan dari bagian tubuh yang mengalami kelainan, seperti kelainan dibagian mata, mulut, jantung, urogenital, saraf, dan kulit (Maulana M. , 2008). Komplikasi kronis yang dapat terjadi akibat diabetes yang tidak terkontrol antara lain:

1. Kerusakan saraf

2. Kerusakan ginjal
3. Kerusakan mata
4. Penyakit jantung koroner
5. Stroke
6. Hipertensi
7. Penyakit paru
8. Gangguan saluran cerna (Ndraha, 2014)


G. Model Diabetes Melitus

Dalam membentuk suatu model matematika pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus perlu diberikan asumsi, Adapun asumsinya yaitu sebagai berikut:

1. Individu yang telah sakit tidak dapat disembuhkan.
2. Pengaruh migrasi diabaikan sehingga penyebaran penyakit dalam suatu populasi bersifat tertutup.
3. Tidak ada faktor genetik yang mempengaruhi penyebaran diabetes melitus sehingga tergolong diabetes melitus tipe II.
4. Dengan adanya perawatan akan memperpanjang usia hidup penderita.
5. Rekrutmen masuk kelas S (*Susceptible*).
6. Individu yang memiliki kebiasaan buruk, penurunan hormon insulin, dan peningkatan glukosa darah masuk kelas E (*Exposed*).
7. Individu yang telah sakit dan tidak mendapatkan perawatan masuk kelas I (*ILL*).
8. Individu yang telah sakit dan mendapatkan perawatan masuk kelas I_T (*ILL with Treatment*).

9. Terjadi kematian akibat penyakit diabetes mellitus baik penderita yang mendapat perawatan atau tidak mendapat perawatan.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas maka dapat di gambarkan kompartemen penyebaran penyakit Diabetes Melitus berikut ini:



Gambar 2. 1 Diagram Model SEIIT pada Penyakit Diabetes Melitus

Berdasarkan gambar di atas, model matematika yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\frac{dS}{dt} = C - \delta S - \beta SE \quad (2.15)$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta SE - \delta E - E \quad (2.16)$$

$$\frac{dI}{dt} = \alpha E - (\delta + \delta_1)I \quad (2.17)$$

$$\frac{dI_T}{dt} = \gamma E - (\delta + \delta_2)I_T \quad (2.18)$$

Keterangan:

$S(t)$: Jumlah individu rentan pada saat t

$E(t)$: Jumlah individu exposed pada saat t

$I(t)$: Jumlah individu sakit pada saat t

$I_T(t)$: Jumlah individu sakit dengan perawatan pada saat t

- $N(t)$: Jumlah individu dalam populasi pada saat t
 C : Laju kelahiran populasi
 δ : Laju kematian alami
 β : Laju kontak infeksi individu yang rentan terhadap individu yang laten
 α : Laju perpindahan individu laten terhadap individu sakit tanpa perawatan
 γ : Laju perpindahan individu laten terhadap individu sakit dengan adanya perawatan
 δ_1 : Laju kematian akibat penyakit tanpa perawatan
 δ_2 : Laju kematian akibat penyakit dengan adanya perawatan (Lestari, 2017).

Dalam penelitian ini digunakan nilai proporsi. Nilai proporsi merupakan nilai awalan dibagi dengan jumlah populasi. Adapun formulasi dari nilai proporsi yang digunakan dalam model SEIIT pada penyakit Diabetes Melitus dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Formulasi dari nilai proporsi model SEIIT pada penyakit Diabetes Melitus

Nilai Awal	Formulasi
S_0	$\frac{\text{Jumlah rentan}}{\text{Jumlah populasi}}$
E_0	$\frac{\text{Jumlah laten}}{\text{Jumlah populasi}}$
I_0	$\frac{\text{Jumlah terinfeksi}}{\text{Jumlah populasi}}$
I_{T_0}	$\frac{\text{Jumlah terinfeksi dengan perawatan}}{\text{Jumlah populasi}}$

Sumber: (Rokhmayanti, 2021)

Adapun formulasi dari parameter yang digunakan dalam model SEIIT pada penyakit Diabetes Melitus dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 2 Formulasi dari parameter model SEIIT pada penyakit diabetes melitus

Parameter	Formulasi
N	<i>Jumlah populasi manusia</i>
C	$\frac{\text{Jumlah kelahiran}}{\text{Jumlah populasi}}$
δ	$\frac{1}{\text{Angka Harapan Hidup}}$
β	$\frac{\text{Jumlah populasi laten}}{\text{Jumlah suspek}}$
α	$\frac{\text{Jumlah penderita DM}}{\text{Jumlah laten}}$
γ	$1 - \frac{\text{Jumlah penderita DM}}{\text{Jumlah laten}}$
δ_1	$\frac{\text{Jumlah kematian penderita DM}}{\text{Jumlah penderita DM tanpa perawatan}}$
δ_2	$\frac{\text{Jumlah kematian penderita DM}}{\text{Jumlah penderita DM dengan perawatan}}$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kajian terapan. Kajian terapan merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April–Agustus 2023.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

S : Jumlah individu rentan terhadap penyakit Diabetes Melitus

E : Jumlah individu terekspos penyakit Diabetes Melitus

I : Jumlah individu sakit tanpa perawatan pada penyakit Diabetes Melitus

I_T : Jumlah individu sakit dengan perawatan pada penyakit Diabetes Melitus

Definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel S sebagai variabel jumlah individu yang rentan terinfeksi penyakit diabetes melitus di Provinsi Sulawesi Selatan

2. Variabel E sebagai variabel jumlah individu yang menunjukkan gejala terjangkit penyakit diabetes melitus di Provinsi Sulawesi Selatan
3. Variabel I sebagai variabel jumlah individu yang sakit atau terinfeksi penyakit diabetes melitus
4. Variabel I_T sebagai variabel jumlah individu sakit dengan perawatan penyakit diabetes melitus

E. Prosedur Penelitian


Adapun prosedur penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini agar mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:


1. Pengambilan data.
2. Menentukan Model $SEIIT$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus.
3. Melakukan simulasi numerik dengan:
 - a. Mensubstitusikan nilai awal dan nilai parameter.
 - b. Menentukan jumlah iterasi.
 - c. Melakukan integrasi dengan persamaan metode Euler, metode Heun, dan metode Runge Kutta Orde 4.
4. Mencari solusi numerik model $SEIIT$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus menggunakan Metode Euler, Metode Heun, dan Metode Runge-Kutta orde 4.
5. Menganalisis galat dari hasil solusi numerik yang diperoleh.

6. Melakukan interpretasi solusi numerik pada model penyebaran penyakit Diabetes Melitus menggunakan Metode Euler, Metode Heun, dan Metode Runge-Kutta orde 4.
7. Menarik kesimpulan dari solusi numerik pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus menggunakan Metode Euler, Metode Heun, dan Metode Runge-Kutta orde 4.

F. Skema Penyelesaian Masalah

Skema penyelesaian masalah dalam penyelesaian kasus penyebaran penyakit Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada bagan berikut:





Gambar 3. 1 Skema Penyelesaian Masalah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada Bab ini akan di bahas mengenai penyelesaian dari model $SEII_T$ pada penyakit diabetes melitus secara numerik. Model Penyakit Diabetes Melitus berbentuk sistem persamaan diferensial non linear. Sistem persamaan tersebut akan diselesaikan menggunakan metode euler, heun, dan runge-kutta orde 4 dan pada bagian akhir akan di analisis terkait hasil dari solusi numerik.

1. Pengambilan data sekunder

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 jumlah populasi penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan terbesar di 24 Kabupaten yaitu sebesar 9.073.509 jiwa, angka kelahiran sebesar 155.636 jumlah lahir hidup, angka harapan hidup sebesar 70,57 tahun.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan jumlah populasi laten sebesar 190.173 jiwa, jumlah penderita DM sebesar 112.704 jiwa, jumlah kematian penderita DM sebesar 230 jiwa, jumlah penderita DM tanpa perawatan sebesar 31.916 jiwa, dan jumlah penderita DM dengan perawatan sebesar 80.788 jiwa. Populasi individu Susceptible (rentan) terhadap diabetes melitus dihitung dengan mengurangi jumlah populasi penduduk dengan jumlah populasi *Exposed*, populasi *Infected*, dan populasi


Infected with treatment, yaitu $S = N - (E + I + I_T) = 9.073.509 - (190.173 + 31.916 + 80.788) = 8.770.632$.

2. Model $SEIIT_T$ pada Penyakit Diabetes Melitus

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model yang diambil dari hasil penelitian Hesti Endah Lestari, Dwi Lestari dan Husna Arifah (2017). Adapun asumsi yang digunakan dalam memformulasikan model matematika pada Penyakit Diabetes Melitus yaitu sebagai berikut:

- Tidak ada individu yang telah sakit sembuh
- Pengaruh penyebaran bersifat tertutup artinya penambahan dan pengurangan populasi hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian.
- Laju kelahiran populasi masuk kelas S (*Susceptible*)
- Individu yang memiliki kebiasaan buruk masuk kelas E (*Exposed*)
- Individu yang telah sakit dan tidak mendapatkan perawatan masuk kelas I (*Infected*)
- Individu yang telah sakit dan mendapatkan perawatan masuk kelas I_T (*Infected With Treatment*)
- Terjadi kematian akibat penyakit diabetes melitus baik yang mendapatkan perawatan maupun yang tidak mendapatkan perawatan.

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas maka dapat dibentuk diagram alir untuk model penyakit Diabetes Melitus sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Diagram Model SEIIT Pada Penyakit Diabetes Melitus

Dari diagram alir diatas dapat dibentuk formulasi untuk model $SEIIT_T$ pada penyakit diabetes melitus sebagai berikut:

$$\frac{dS}{dt} = C - \delta S - \beta SE \quad (4.1)$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta SE - \delta E - E \quad (4.2)$$

$$\frac{dI}{dt} = \alpha E - (\delta + \delta_1)I \quad (4.3)$$

$$\frac{dI_T}{dt} = \gamma E - (\delta + \delta_2)I_T \quad (4.4)$$

dengan Kondisi:

$$N = S + E + I + I_T$$

Keterangan:

$N(t)$: Jumlah individu dalam populasi pada saat t

$S(t)$: Jumlah individu yang rentan pada saat t

$E(t)$: Jumlah individu yang laten pada saat t

$I(t)$: Jumlah individu sakit pada saat t

$I_T(t)$: Jumlah individu sakit dengan perawatan pada saat t

$C(t)$: Laju Kelahiran Populasi pada saat t

$\delta(t)$: Laju kematian alami pada saat t

$\beta(t)$: Laju kontak infeksi individu yang rentan terhadap individu yang laten pada saat t

- $\alpha(t)$: Laju perpindahan individu yang laten terhadap individu sakit tanpa perawatan pada saat t
- $\gamma(t)$: Laju perpindahan individu yang laten terhadap individu sakit dengan perawatan pada saat t
- $\delta_1(t)$: Laju kematian akibat penyakit tanpa perawatan pada saat t
- $\delta_2(t)$: Laju kematian akibat penyakit dengan adanya perawatan pada saat t

3. Simulasi Numerik

a. Nilai Awal dan Nilai Parameter

Berdasarkan data yang telah di peroleh maka didapatkan nilai awalan untuk setiap variabel pada Model $SEII_T$ adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Nilai Awalan

Variabel	Nilai
S_0	8.770.632
E_0	190.173
I_0	31.916
I_{T_0}	80.788

Tabel 4. 2 Nilai Awalan Hasil Proporsi

Variabel	Nilai
S_0	0,966619
E_0	0,020959
I_0	0,003517
I_{T_0}	0,008903

Nilai parameter-parameter yang akan digunakan pada model $SEII_T$

pada penyakit diabetes melitus dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 3 Nilai Parameter

Parameter	Nilai
N	9.073.509
A	0,017152
μ	0,014170
β	0,021682
α	0,592639
γ	0,407361
δ_1	0,007206
δ_2	0,002846

b. Jumlah Iterasi dan Ukuran Langkah

Jumlah iterasi yang digunakan dalam menentukan Solusi numerik model $SEII_T$ pada penyebaran penyakit diabetes melitus dengan menggunakan metode Euler, Heun, dan Runge Kutta orde 4 sebanyak 5000 iterasi. Selain itu ukuran langkah (Δx) yang digunakan sebesar 0,01.

c. Solusi Numerik Model $SEII_T$ Pada Penyakit Diabetes Melitus

Model $SEII_T$ yang di dapatkan pada persamaan (4.1), (4.2), (4.3), dan (4.4) disubstitusikan pada nilai awal dan nilai parameter adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{dS(t)}{dt} &= C - \delta S - \beta SE \\ &= 0,017152 - 0,014170S(t) - 0,021682S(t)E(t) \end{aligned} \quad (4.5)$$

$$\begin{aligned}\frac{dE(t)}{dt} &= \beta SE - \delta E - E \\ &= 0,021682S(t)E(t) - 0,014170E(t) - E(t)\end{aligned}\quad (4.6)$$

$$\begin{aligned}\frac{dI(t)}{dt} &= \alpha E - (\delta + \delta_1)I \\ &= 0,592639E(t) - (0,014170 + 0,007206)I(t)\end{aligned}\quad (4.7)$$

$$\begin{aligned}\frac{dI_T(t)}{dt} &= \gamma E - (\delta + \delta_2)I_T \\ &= 0,407361E(t) - (0,014170 + 0,002846)I_T(t)\end{aligned}\quad (4.8)$$

Persamaan (4.5), (4.6), (4.7), dan (4.8) diatas adalah persamaan yang dihasilkan pada model $SEIIT$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus. Selanjutnya akan diselesaikan dengan metode euler, heun, dan runge kutta orde empat.

1. Penyelesaian model $SEIIT$ penyebaran penyakit Diabetes Melitus dengan menggunakan metode euler

Persamaan (4.5), (4.6), (4.7), dan (4.8) yang diperoleh, selanjutnya diselesaikan dengan metode Euler sebagai berikut

$$y_{i+1} = y_i + \Delta_x \cdot f(x_i, y_i)$$

Sehingga diperoleh Persamaan (4.5) hingga (4.6)

$$S_{i+1} = S_i + \Delta_t \cdot f(t_i, S_i) \quad (4.9)$$

$$E_{i+1} = E_i + \Delta_t \cdot f(t_i, E_i) \quad (4.10)$$

$$I_{i+1} = I_i + \Delta_t \cdot f(t_i, I_i) \quad (4.11)$$

$$I_{T_{i+1}} = I_{T_i} + \Delta_t \cdot f(t_i, I_{T_i}) \quad (4.12)$$

Persamaan (4.9) sampai (4.12) merupakan solusi numerik model $SEII_T$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus. Pada iterasi pertama waktu interval atau jarak langkah yang digunakan adalah $\Delta t = 0,01$ (Mardianto, 2022). Dan untuk nilai awal $S_0 = 0,966619$, $E_0 = 0,020959$, $I_0 = 0,003517$, $I_{T_0} = 0,008903$. Sehingga diperoleh hasil solusi numerik model $SEII_T$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus menggunakan metode euler sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 S_{0+1} &= S_0 + \Delta t \cdot f(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
 &= S_0 + \Delta t \cdot f(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) \\
 &= S_0 + 0,01(0,017152 - 0,014170S_0 - 0,021682S_0E_0) \\
 &= 0,966619 + 0,01(0,017152 - 0,014170(0,966619) + \dots \\
 &\quad - 0,021682(0,966619)(0,020959)) \\
 &= 0,966619 + 0,01(0,0030157) \\
 &= 0,966649
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_{0+1} &= E_0 + \Delta t \cdot g(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
 &= E_0 + \Delta t \cdot g(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) \\
 &= E_0 + 0,01(0,021682S_0E_0 - 0,014170E_0 - E_0) \\
 &= 0,020959 + (0,021682(0,966619)(0,020959) + \dots \\
 &\quad - 0,014170(0,020959) - (0,020959)) \\
 &= 0,020959 + 0,01(-0,0208167) \\
 &= 0,020750
 \end{aligned}$$

$$I_{0+1} = I_0 + \Delta t \cdot j(S_0, E_0, I_0, I_{T_0})$$

$$\begin{aligned}
&= I_0 + \Delta t \cdot j(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) \\
&= I_0 + 0,01(0,592639E_0 - (0,014170 + 0,007206)I_0) \\
&= 0,003517 + 0,01 \times \dots \\
&\quad (0,592639(0,020959) - (0,014170 + 0,007206)(0,003517)) \\
&= 0,003517 + 0,01(0,0123459) \\
&= 0,003639
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_{T_{0+1}} &= I_{T_0} + \Delta t \cdot k(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
&= I_{T_0} + \Delta t \cdot k(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) \\
&= I_{T_0} + 0,01(1 - 0,592639)E_0 - (0,014170 + 0,002846)I_{T_0} \\
&= 0,008903 + 0,01((0,407361)(0,020959) + \dots \\
&\quad - (0,014170 + 0,002846)(0,008903)) \\
&= 0,008903 + 0,01(0,0083863) \\
&= 0,008986
\end{aligned}$$

Jadi pada waktu $\Delta t = 0,01$ diperoleh $S_1 = 0,966649$, $E_1 = 0,020750$, $I_1 = 0,003639$, dan $I_{T_1} = 0,008986$. Selanjutnya untuk memprediksi laju 50 tahun kedepan pada setiap populasi dapat menggunakan program R-Studio yaitu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Solusi Numerik Penyakit Diabetes Melitus Menggunakan Metode Euler

t	S	E	I	I_T
0	0,966619	0,020959	0,003517	0,008903
100	0,966884	0,007676	0,00416	0,021388
200	0,967164	0,002811	0,00439	0,025935
300	0,967448	0,00103	0,004469	0,027574
400	0,967734	0,000377	0,004493	0,028149
500	0,968021	0,000138	0,004497	0,028334


t	S	E	I	I_T
600	0,968307	$5,06 \times 10^{-5}$	0,004493	0,028376
700	0,968593	$1,85 \times 10^{-6}$	0,004487	0,028366
800	0,968879	$6,78 \times 10^{-6}$	0,00448	0,028337
900	0,969165	$2,48 \times 10^{-6}$	0,004472	0,028301
1000	0,96945	$9,10 \times 10^{-7}$	0,004464	0,028263
1100	0,969735	$3,33 \times 10^{-7}$	0,004456	0,028223
1200	0,970019	$1,22 \times 10^{-7}$	0,004448	0,028183
1300	0,970303	$4,47 \times 10^{-8}$	0,00444	0,028144
1400	0,970587	$1,64 \times 10^{-8}$	0,004432	0,028104
1500	0,970871	$6,00 \times 10^{-9}$	0,004424	0,028064
1600	0,971154	$2,20 \times 10^{-9}$	0,004417	0,028024
1700	0,971437	$8,04 \times 10^{-10}$	0,004409	0,027985
1800	0,97172	$2,95 \times 10^{-10}$	0,004401	0,027945
1900	0,972002	$1,08 \times 10^{-10}$	0,004393	0,027905
2000	0,972284	$3,95 \times 10^{-11}$	0,004385	0,027866
2100	0,972565	$1,45 \times 10^{-11}$	0,004377	0,027826
2200	0,972846	$5,30 \times 10^{-12}$	0,00437	0,027787
2300	0,973127	$1,94 \times 10^{-12}$	0,004362	0,027748
2400	0,973408	$7,11 \times 10^{-13}$	0,004354	0,027708
2500	0,973688	$2,60 \times 10^{-13}$	0,004346	0,027669
2600	0,973968	$9,54 \times 10^{-14}$	0,004339	0,02763
2700	0,974247	$3,49 \times 10^{-14}$	0,004331	0,027591
2800	0,974527	$1,28 \times 10^{-14}$	0,004323	0,027552
2900	0,974806	$4,68 \times 10^{-15}$	0,004316	0,027513
3000	0,975084	$1,72 \times 10^{-15}$	0,004308	0,027474
3100	0,975362	$6,28 \times 10^{-16}$	0,0043	0,027435
3200	0,97564	$2,30 \times 10^{-16}$	0,004293	0,027396
3300	0,975918	$8,43 \times 10^{-17}$	0,004285	0,027357
3400	0,976195	$3,09 \times 10^{-17}$	0,004277	0,027318
3500	0,976472	$1,13 \times 10^{-17}$	0,00427	0,02728
3600	0,976749	$4,14 \times 10^{-18}$	0,004262	0,027241
3700	0,977025	$1,52 \times 10^{-18}$	0,004255	0,027203
3800	0,977301	$5,55 \times 10^{-19}$	0,004247	0,027164
3900	0,977576	$2,03 \times 10^{-19}$	0,004239	0,027126
4000	0,977852	$7,45 \times 10^{-20}$	0,004232	0,027087
4100	0,978127	$2,73 \times 10^{-20}$	0,004224	0,027049
4200	0,978401	$9,99 \times 10^{-21}$	0,004217	0,027011
4300	0,978676	$3,66 \times 10^{-21}$	0,004209	0,026972
4400	0,97895	$1,34 \times 10^{-21}$	0,004202	0,026934
4500	0,979223	$4,91 \times 10^{-22}$	0,004194	0,026896
4600	0,979497	$1,80 \times 10^{-22}$	0,004187	0,026858

t	S	E	I	I_T
4700	0,97977	$6,59 \times 10^{-23}$	0,004179	0,02682
4800	0,980043	$2,41 \times 10^{-23}$	0,004172	0,026782
4900	0,980315	$8,83 \times 10^{-24}$	0,004165	0,026744
5000	0,980587	$3,24 \times 10^{-24}$	0,004157	0,026706

Hasil perhitungan solusi numerik menggunakan R-Studio penyakit diabetes melitus dengan metode euler, lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

Selanjutnya diperoleh grafik plot hasil iterasi numerik dengan menggunakan metode Euler pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus untuk setiap populasi *Susceptible*, *Exposed*, *Infected*, dan *Infected With Treatment* menggunakan program R-Studio.

Hasil iterasi untuk laju individu pada sub populasi rentan (S) akan ditunjukkan pada plot grafik seperti pada Gambar 4.2 berikut:




Gambar 4. 2 Penyebaran Jumlah Susceptible pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Euler

Pada Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa jumlah nilai S_0 senilai 8.770.632 jiwa membuat grafik garis meningkat dari waktu ke waktu hingga berada pada waktu $t = 50$ tahun senilai 9.891.703,6005 jiwa.

Meningkatnya populasi *Susceptible* dapat disebabkan karena adanya angka kelahiran yang tinggi.


Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (E) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.3



Gambar 4. 3 Penyebaran Jumlah Exposed pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Euler

Pada Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa dengan jumlah nilai awalan atau $E(t_0)$ senilai 190.173 dapat membuat grafik garis menurun dari waktu ke waktu hingga berada pada waktu $t = 50$ tahun. Penurunan tersebut menunjukkan bahwan dalam beberapa waktu kedepan yang terjadi pada Populasi *Exposed* akan mengalami penurunan tetapi jumlah populasi *Exposed* akan ada dalam populasi karena terjadi kontak infeksiif antara populasi *Susceptible* dan *Exposed*. Dan dapat dilihat Grafiknya mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini disebabkan laju kelahiran yang masuk sangat rendah serta populasi *Exposed* mengalami perpindahan status menjadi *Infected*, *Infected With Treatment* dan adanya kematian alami.


Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (I) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.4



Gambar 4. 4 Penyebaran Jumlah Infection pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Euler

Pada Gambar 4.4 memperlihatkan bahwa dengan jumlah nilai awal atau I_0 senilai 31.916 jiwa dapat membuat grafik populasi *Infected* mengalami peningkatan hingga berada pada waktu $t = 3$ tahun kedepan dengan populasi individu senilai 132.717,9439 jiwa mencapai titik puncaknya, namun setelah melewati titik puncak, terjadi juga penurunan secara terus menerus. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa waktu kedepan yang terjadi pada populasi *Infected* akan mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya perpindahan individu *Exposed* ke individu *Infected With Treatment*. Adapun besarnya jumlah populasi individu *Infected* pada waktu $t = 50$ tahun kedepan adalah 50.386,9466 jiwa.

Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (I_T) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.5



Gambar 4. 5 Penyebaran Jumlah Infection With Treatment Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Euler

Pada Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa jumlah nilai awal atau I_{T_0} senilai 80.788 jiwa dapat membuat grafik populasi *Infection With Treatment* mengalami peningkatan hingga berada pada waktu $t = 3$ tahun kedepan dengan populasi individu senilai 147.758,7368 jiwa dan mencapai titik puncaknya, namun setelah melewati titik puncak, terjadi juga penurunan secara terus menerus . Adapun jumlah populasi *Infection With Treatment* pada waktu $\Delta t = 50$ tahun kedepan adalah 68.051,9889 jiwa.

2. Penyelesaian model $SEIIT_T$ penyebaran penyakit Diabetes Melitus dengan menggunakan metode heun

Persamaan (4.5), (4.6), (4.7), dan (4.8) yang diperoleh, selanjutnya diselesaikan dengan metode Heun sebagai berikut:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{\Delta t}{2} \left[f(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) + f\left(S_{i+1}^{(0)}, E_{i+1}^{(0)}, I_{i+1}^{(0)}, I_{T_{i+1}}^{(0)}\right) \right]$$

Maka diperoleh Persamaan (4.9) sampai (4.16)

Untuk perhitungan *predictor* yang merupakan solusi perkiraan awal atau solusi dari metode Euler dengan formula:

predictor

$$S_{i+1}^{(0)} = S_i + \Delta t \cdot f(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) \quad (4.13)$$

$$E_{i+1}^{(0)} = E_i + \Delta t \cdot g(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) \quad (4.14)$$

$$I_{i+1}^{(0)} = I_i + \Delta t \cdot j(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) \quad (4.15)$$

$$I_{T_{i+1}}^{(0)} = I_{T_i} + \Delta t \cdot k(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) \quad (4.16)$$

Selanjutnya perhitungan *corrector* atau perbaikan dari solusi perkiraan awal dengan formula:

Corrector

$$S_{i+1} = S_i + \frac{\Delta t}{2} \left[f(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) + f(S_{i+1}^{(0)}, E_{i+1}^{(0)}, I_{i+1}^{(0)}, I_{T_{i+1}}^{(0)}) \right] \quad (4.17)$$

$$E_{i+1} = E_i + \frac{\Delta t}{2} \left[g(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) + g(S_{i+1}^{(0)}, E_{i+1}^{(0)}, I_{i+1}^{(0)}, I_{T_{i+1}}^{(0)}) \right] \quad (4.18)$$

$$I_{i+1} = I_i + \frac{\Delta t}{2} \left[j(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) + j(S_{i+1}^{(0)}, E_{i+1}^{(0)}, I_{i+1}^{(0)}, I_{T_{i+1}}^{(0)}) \right] \quad (4.19)$$

$$I_{T_{i+1}} = I_{T_i} + \frac{\Delta t}{2} \left[k(S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) + k(S_{i+1}^{(0)}, E_{i+1}^{(0)}, I_{i+1}^{(0)}, I_{T_{i+1}}^{(0)}) \right] \quad (4.20)$$

Persamaan (4.13) sampai (4.20) merupakan solusi numerik model $SEII_T$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus. Pada iterasi pertama waktu interval atau jarak langkah yang digunakan adalah $\Delta t = 0,01$. Dan untuk nilai awal $S_0 = 0,966619$, $E_0 = 0,020959$, $I_0 = 0,003517$, $I_{T_0} = 0,008903$. Sehingga diperoleh hasil solusi numerik model $SEII_T$ pada

penyebaran penyakit Diabetes Melitus menggunakan metode heun sebagai berikut:

Melakukan perhitungan *predictor* yang merupakan solusi perkiraan awal (metode Euler) sebagai berikut:

Predictor

$$\begin{aligned}
 S_{0+1}^{(0)} &= S_0 + \Delta t \cdot f(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
 &= S_0 + \Delta t \cdot f(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) \\
 &= S_0 + 0,01(0,017152 - 0,014170S_0 - 0,021682S_0E_0) \\
 &= 0,966619 + 0,01(0,017152 - 0,014170(0,966619) + \dots \\
 &\quad - 0,021682(0,966619)(0,020959)) \\
 &= 0,966619 + 0,01(0,0030157) \\
 &= 0,966649
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_{0+1}^{(0)} &= E_0 + \Delta t \cdot g(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
 &= E_0 + \Delta t \cdot g(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) \\
 &= E_0 + 0,01(0,021682S_0E_0 - 0,014170E_0 - E_0) \\
 &= 0,020959 + (0,021682(0,966619)(0,020959) + \dots \\
 &\quad - 0,014170(0,020959) - (0,020959)) \\
 &= 0,020959 + 0,01(-0,0208167) \\
 &= 0,020750
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{0+1}^{(0)} &= I_0 + \Delta t \cdot j(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
 &= I_0 + \Delta t \cdot j(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) \\
 &= I_0 + 0,01(0,592639E_0 - (0,014170 + 0,007206)I_0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 0,003517 + 0,01 \times \dots \\
&(0,592639(0,020959) - (0,014170 + 0,007206)(0,003517)) \\
&= 0,003517 + 0,01(0,0123459) \\
&= 0,003639
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_{T_{0+1}}^{(0)} &= I_{T_0} + \Delta t \cdot k(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
&= I_{T_0} + \Delta t \cdot k(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) \\
&= I_{T_0} + 0,01(1 - 0,592639)E_0 - (0,014170 + 0,002846)I_{T_0} \\
&= 0,008903 + 0,01((0,407361)(0,020959) + \dots \\
&\quad - (0,014170 + 0,002846)(0,008903)) \\
&= 0,008903 + 0,01(0,0083863) \\
&= 0,008986
\end{aligned}$$

Selanjutnya melakukan perhitungan *corrector* atau perbaikan dari solusi perkiraan awal sebagai berikut:

Corrector

$$\begin{aligned}
S_{0+1} &= S_0 + \frac{\Delta t}{2} \left[f(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) + f(S_{0+1}^{(0)}, E_{0+1}^{(0)}, I_{0+1}^{(0)}, I_{T_{0+1}}^{(0)}) \right] \\
S_1 &= S_0 + \frac{\Delta t}{2} \left[f(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) + f(S_1^{(0)}, E_1^{(0)}, I_1^{(0)}, I_{T_1}^{(0)}) \right] \\
S_1 &= 0,966619 + \frac{0,01}{2} \left[f(0,966619; 0,020959; 0,003517; \right. \\
&\quad \left. 0,008903) + f(0,966649; 0,020750; 0,003639; 0,008986) \right] \\
S_1 &= 0,966619 + \frac{0,01}{2} (0,017152 - 0,014170(0,966619) + \dots \\
&\quad - 0,021682(0,966619)(0,020959)) + \dots \\
&\quad (0,017152 - 0,014170(0,966649) + \dots
\end{aligned}$$

$$-0,021682(0,966649)(0,020750))$$

$$S_1 = 0,966619 + \frac{0,01}{2} (0,0030157 + 0,0030196)$$

$$S_1 = 0,966649$$

$$E_{0+1} = E_0 + \frac{\Delta t}{2} \left[g(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) + g(S_{0+1}^{(0)}, E_{0+1}^{(0)}, I_{0+1}^{(0)}, I_{T_{0+1}}^{(0)}) \right]$$

$$E_1 = E_0 + \frac{\Delta t}{2} \left[g(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) + g(S_1^{(0)}, E_1^{(0)}, I_1^{(0)}, I_{T_1}^{(0)}) \right]$$

$$E_1 = 0,020959 + \frac{0,01}{2} [g(0,966619; 0,020959; 0,003517; 0,008903) + g(0,966649; 0,020750; 0,003639; 0,008986)]$$

$$E_1 = 0,020959 + \frac{0,01}{2} \times \dots$$

$$(0,021682(0,966619)(0,020959) - 0,014170(0,020959) + \dots$$

$$-(0,020959)) + (0,021682(0,966649)(0,020750) + \dots$$

$$-0,014170(0,020750) - (0,020750))$$

$$E_1 = 0,020959 + \frac{0,01}{2} (-0,0208167 + (-0,0206091))$$

$$E_1 = 0,020751$$

$$I_{0+1} = I_0 + \frac{\Delta t}{2} \left[j(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) + j(S_{0+1}^{(0)}, E_{0+1}^{(0)}, I_{0+1}^{(0)}, I_{T_{0+1}}^{(0)}) \right]$$

$$I_1 = I_0 + \frac{\Delta t}{2} \left[j(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) + j(S_1^{(0)}, E_1^{(0)}, I_1^{(0)}, I_{T_1}^{(0)}) \right]$$

$$I_1 = 0,003517 + \frac{0,01}{2} [j(0,966619; 0,020959; 0,003517;$$

$$0,008903) + j(0,966649; 0,020750; 0,003639; 0,008986)]$$

$$I_1 = 0,003517 + \frac{0,01}{2} \times \dots$$

$$(0,592639(0,020959) - (0,014170 + 0,007206)(0,003517)) + \dots$$

$$(0,592639(0,020750) - (0,014170 + 0,007206)(0,003639))$$

$$I_1 = 0,003517 + \frac{0,01}{2} (0,0123459 + 0,0122194)$$

$$I_1 = 0,003639$$

$$I_{T_{0+1}} = I_{T_0} + \frac{\Delta t}{2} \left[k(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) + k(S_{0+1}^{(0)}, E_{0+1}^{(0)}, I_{0+1}^{(0)}, I_{T_{0+1}}^{(0)}) \right]$$

$$I_{T_1} = I_{T_0} + \frac{\Delta t}{2} \left[k(S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) + k(S_1^{(0)}, E_1^{(0)}, I_1^{(0)}, I_{T_1}^{(0)}) \right]$$

$$I_{T_1} = 0,008903 + \frac{0,01}{2} [k(0,966619; 0,020959; 0,003517;$$

$$0,008903) + k(0,966649; 0,020750; 0,003639; 0,008986)]$$

$$I_{T_1} = 0,008903 + \frac{0,01}{2} ((1 - 0,592639)(0,020959) + \dots$$

$$-(0,014170 + 0,002846)(0,008903)) + \dots$$

$$((0,407361)(0,020750) + \dots$$

$$-(0,014170 + 0,002846)(0,008986))$$

$$I_{T_1} = 0,008903 + \frac{0,01}{2} (0,0083863 + 0,0082998)$$

$$I_{T_1} = 0,008986$$

Jadi pada waktu $\Delta t = 0,01$ diperoleh $S_1 = 0,966649$, $E_1 = 0,020751$, $I_1 = 0,003639$, dan $I_{T_1} = 0,008986$. Selanjutnya untuk memprediksi laju 50 tahun kedepan pada setiap populasi dapat menggunakan program R-Studio yaitu pada table sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Solusi Numerik Penyakit Diabetes Melitus Menggunakan Metode Heun

t	S	E	I	I_T
0	0,966619	0,020959	0,003517	0,008903
100	0,969773	0,007763	0,011184	0,014153
200	0,973057	0,002876	0,013818	0,015975
300	0,976358	0,001065	0,014593	0,01653
400	0,979638	0,000395	0,014683	0,016615
500	0,98288	0,000146	0,014524	0,016529
600	0,98608	$5,42 \times 10^{-5}$	0,014276	0,01638
700	0,989236	$2,01 \times 10^{-5}$	0,014	0,01621
800	0,992348	$7,44 \times 10^{-6}$	0,013716	0,016032
900	0,995417	$2,76 \times 10^{-6}$	0,013434	0,015854
1000	0,998442	$1,02 \times 10^{-6}$	0,013156	0,015676
1100	1,001425	$3,79 \times 10^{-7}$	0,012883	0,0155
1200	1,004366	$1,40 \times 10^{-7}$	0,012615	0,015325
1300	1,007265	$5,21 \times 10^{-8}$	0,012353	0,015153
1400	1,010124	$1,93 \times 10^{-8}$	0,012096	0,014982
1500	1,012943	$7,16 \times 10^{-9}$	0,011845	0,014813
1600	1,015722	$2,65 \times 10^{-9}$	0,011599	0,014646
1700	1,018461	$9,84 \times 10^{-10}$	0,011358	0,014482
1800	1,021163	$3,65 \times 10^{-10}$	0,011122	0,014319
1900	1,023826	$1,35 \times 10^{-10}$	0,010891	0,014157
2000	1,026452	$5,02 \times 10^{-11}$	0,010664	0,013998
2100	1,02904	$1,86 \times 10^{-11}$	0,010443	0,01384
2200	1,031593	$6,90 \times 10^{-12}$	0,010226	0,013684
2300	1,034109	$2,56 \times 10^{-12}$	0,010013	0,01353
2400	1,03659	$9,50 \times 10^{-13}$	0,009805	0,013378
2500	1,039036	$3,52 \times 10^{-13}$	0,009601	0,013227
2600	1,041448	$1,31 \times 10^{-13}$	0,009402	0,013078
2700	1,043826	$4,85 \times 10^{-14}$	0,009206	0,012931
2800	1,04617	$1,80 \times 10^{-14}$	0,009015	0,012786
2900	1,048482	$6,67 \times 10^{-15}$	0,008828	0,012642
3000	1,05076	$2,48 \times 10^{-15}$	0,008644	0,012499
3100	1,053007	$9,19 \times 10^{-16}$	0,008465	0,012358
3200	1,055222	$3,41 \times 10^{-16}$	0,008289	0,012219
3300	1,057406	$1,27 \times 10^{-16}$	0,008117	0,012082
3400	1,05956	$4,70 \times 10^{-17}$	0,007948	0,011946
3500	1,061683	$1,74 \times 10^{-17}$	0,007783	0,011811
3600	1,063776	$6,47 \times 10^{-18}$	0,007621	0,011678
3700	1,065839	$2,40 \times 10^{-18}$	0,007463	0,011547
3800	1,067874	$8,92 \times 10^{-19}$	0,007307	0,011417


t	S	E	I	I_T
3900	1,06988	$3,31 \times 10^{-19}$	0,007156	0,011288
4000	1,071858	$1,23 \times 10^{-19}$	0,007007	0,011161
4100	1,073808	$4,56 \times 10^{-20}$	0,006861	0,011035
4200	1,07573	$1,69 \times 10^{-20}$	0,006719	0,010911
4300	1,077626	$6,29 \times 10^{-21}$	0,006579	0,010788
4400	1,079494	$2,33 \times 10^{-21}$	0,006442	0,010667
4500	1,081337	$8,67 \times 10^{-22}$	0,006309	0,010547
4600	1,083153	$3,22 \times 10^{-22}$	0,006177	0,010428
4700	1,084944	$1,20 \times 10^{-22}$	0,006049	0,01031
4800	1,08671	$4,44 \times 10^{-23}$	0,005923	0,010194
4900	1,088451	$1,65 \times 10^{-23}$	0,0058	0,01008
5000	1,090168	$6,12 \times 10^{-24}$	0,00568	0,009966

Hasil perhitungan solusi numerik menggunakan R-Studio penyakit diabetes melitus dengan metode heun, lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

Selanjutnya diperoleh grafik plot hasil iterasi numerik dengan menggunakan metode Heun pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus untuk setiap populasi *Susceptible*, *Exposed*, *Infected*, dan *Infected With Treatment* menggunakan program R-Studio.

Hasil iterasi untuk laju individu pada sub populasi rentan (S) akan ditunjukkan pada plot grafik seperti pada Gambar 4.6 berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR




Gambar 4. 6 Penyebaran Jumlah Susceptible pada penyakit Diabetes Melitus dengan metode Heun

Pada Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa jumlah nilai S_0 senilai 8.770.632 jiwa membuat grafik garis meningkat dari waktu ke waktu hingga berada pada waktu $t = 50$ tahun senilai 9.891.649,1595 jiwa. Meningkatnya populasi *Susceptible* dapat disebabkan karena adanya angka kelahiran yang tinggi.

Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (E) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.7


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



Gambar 4. 7 Penyebaran Jumlah Exposed pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Heun

Pada Gambar 4.7 memperlihatkan bahwa dengan jumlah nilai awalan atau $E(t_0)$ senilai 190.173 dapat membuat grafik garis menurun dari waktu ke waktu hingga berada pada waktu $t = 50$ tahun. Penurunan tersebut menunjukkan bahwan dalam beberapa waktu kedepan yang terjadi pada Populasi *Exposed* akan mengalami penurunan tetapi jumlah populasi *Exposed* akan nanda dalam populasi karena terjadi kontak infeksi antara populasi *Susceptible* dan *Exposed*. Dan dapat dilihat Grafiknya mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini disebabkan laju kelahiran yang masuk sangat rendah serta populasi *Exposed* mengalami perpindahan status menjadi *Infected*, *Infected With Treatment* dan adanya kematian alami.


Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (I) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.8



Gambar 4. 8 Penyebaran Jumlah Infection pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Heun

Pada Gambar 4.8 memperlihatkan bahwa dengan jumlah nilai awal atau I_0 senilai 31.916 jiwa dapat membuat grafik populasi *Infected* mengalami peningkatan hingga berada pada waktu $t = 3$ tahun kedepan dengan populasi individu senilai 133.332,7649 jiwa mencapai titik puncaknya, namun setelah melewati titik puncak, terjadi juga penurunan secara terus menerus. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa waktu kedepan yang terjadi pada populasi *Infected* akan mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya perpindahan individu *Exposed* ke individu *Infected With Treatment*. Adapun besarnya jumlah populasi individu *Infected* pada waktu $t = 50$ tahun kedepan adalah 51.534,9542 jiwa.

Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (I_T) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.9



Gambar 4. 9 Penyebaran Jumlah Infection With Treatment Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Heun

Pada Gambar 4.9 memperlihatkan bahwa jumlah nilai awal atau I_{T_0} senilai 80.788 jiwa dapat membuat grafik populasi *Infection With Treatment* mengalami peningkatan hingga berada pada waktu $t = 3$ tahun kedepan dengan populasi individu senilai 150.781,0319 jiwa dan mencapai titik puncaknya, namun setelah melewati titik puncak, terjadi juga penurunan secara terus menerus . Adapun jumlah populasi *Infection With Treatment* pada waktu $t = 50$ tahun kedepan adalah 90.427,1260 jiwa.

3. Penyelesaian model $SEII_T$ penyebaran penyakit Diabetes Melitus dengan menggunakan metode runge kutta orde 4

Model $SEII_T$ penyakit Diabetes Melitus pada Persamaan (4.1) sampai dengan Persamaan (4.4) diselesaikan secara numerik dengan menggunakan metode runge kutta orde 4 sebagai berikut:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\Delta x$$

Sehingga diperoleh Persamaan (4.21) hingga (4.24)

$$S_{i+1} = S_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\Delta t \quad (4.21)$$

$$E_{i+1} = E_i + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)\Delta t \quad (4.22)$$

$$I_{i+1} = I_i + \frac{1}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)\Delta t \quad (4.23)$$

$$I_{T_{i+1}} = I_{T_i} + \frac{1}{6}(n_1 + 2n_2 + 2n_3 + n_4)\Delta t \quad (4.24)$$

dengan

$$\begin{aligned} k_1 &= a(t, S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) \\ &= C - \delta S_i - \beta S_i E_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_1 &= b(t, S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) \\ &= \beta S_i E_i - \delta E_i - E_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_1 &= c(t, S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) \\ &= \alpha E_i - (\delta + \delta_1) I_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n_1 &= d(t, S_i, E_i, I_i, I_{T_i}) \\ &= \gamma E_i - (\delta + \delta_1) I_{T_i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= a\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_1 \frac{1}{2}, E_i + l_1 \frac{1}{2}, I_i + m_1 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2}\right) \\ &= C - \delta \left(S_i + k_1 \frac{1}{2}\right) - \beta \left(S_i + k_1 \frac{1}{2}\right) \left(E_i + l_1 \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_2 &= b\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_1 \frac{1}{2}, E_i + l_1 \frac{1}{2}, I_i + m_1 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2}\right) \\ &= \beta \left(S_i + k_1 \frac{1}{2}\right) \left(E_i + l_1 \frac{1}{2}\right) - \delta \left(E_i + l_1 \frac{1}{2}\right) - \left(E_i + l_1 \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_2 &= c\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_1 \frac{1}{2}, E_i + l_1 \frac{1}{2}, I_i + m_1 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2}\right) \\
&= \alpha\left(E_i + l_1 \frac{1}{2}\right) - (\delta + \delta_1)\left(I_i + m_1 \frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n_2 &= d\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_1 \frac{1}{2}, E_i + l_1 \frac{1}{2}, I_i + m_1 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2}\right) \\
&= \gamma\left(E_i + l_1 \frac{1}{2}\right) - (\delta + \delta_2)\left(I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
k_3 &= a\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_2 \frac{1}{2}, E_i + l_2 \frac{1}{2}, I_i + m_2 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2}\right) \\
&= C - \delta\left(S_i + k_2 \frac{1}{2}\right) - \beta\left(S_i + k_2 \frac{1}{2}\right)\left(E_i + l_2 \frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_3 &= b\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_2 \frac{1}{2}, E_i + l_2 \frac{1}{2}, I_i + m_2 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2}\right) \\
&= \beta\left(S_i + k_2 \frac{1}{2}\right)\left(E_i + l_2 \frac{1}{2}\right) - \delta\left(E_i + l_2 \frac{1}{2}\right) - \left(E_i + l_2 \frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_3 &= c\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_2 \frac{1}{2}, E_i + l_2 \frac{1}{2}, I_i + m_2 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2}\right) \\
&= \alpha\left(E_i + l_2 \frac{1}{2}\right) - (\delta + \delta_1)\left(I_i + m_2 \frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n_3 &= d\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_2 \frac{1}{2}, E_i + l_2 \frac{1}{2}, I_i + m_2 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2}\right) \\
&= \gamma\left(E_i + l_2 \frac{1}{2}\right) - (\delta + \delta_2)\left(I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

$$k_4 = a(t, S_i + k_3, E_i + l_3, I_i + m_3, I_{T_i} + n_3)$$

$$= C - \delta(S_i + k_3) - \beta(S_i + k_3)(E_i + l_3)$$

$$l_4 = b(t, S_i + k_3, E_i + l_3, I_i + m_3, I_{T_i} + n_3)$$

$$= \beta(S_i + k_3)(E_i + l_3) - \delta(E_i + l_3) - (E_i + l_3)$$

$$m_4 = c(t, S_i + k_3, E_i + l_3, I_i + m_3, I_{T_i} + n_3)$$

$$= \alpha(E_i + l_3) - (\delta + \delta_1)(I_i + m_3)$$

$$n_4 = d(t, S_i + k_3, E_i + l_3, I_i + m_3, I_{T_i} + n_3)$$

$$= \gamma(E_i + l_3) - (\delta + \delta_2)(I_{T_i} + n_3)$$

Selanjutnya melakukan simulasi dengan mensubstitusikan nilai awal dan parameter yang diberikan pada Table 4.1 dan 4.2 ke dalam Persamaan (4.5) hingga Persamaan (4.8) yang merupakan solusi numerik model $SEII_T$ pada penyakit Diabetes Melitus.

Pada iterasi pertama, interval waktu atau jarak langkah yang digunakan yaitu $\Delta t = 0,01$. Kemudian diberikan $S_0 = 0,966619$, $E_0 = 0,020959$, $I_0 = 0,003517$, $I_{T_0} = 0,008903$ sebagai nilai awal sehingga diperoleh hasil penyelesaian numerik model $SEII_T$ pada penyakit diabetes melitus menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 sebagaimana pada persamaan berikut:

$$S_{0+1} = S_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\Delta t \quad (4.25)$$

$$E_{0+1} = E_0 + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)\Delta t \quad (4.26)$$

$$I_{0+1} = I_0 + \frac{1}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)\Delta t \quad (4.27)$$

$$I_{T_{0+1}} = I_{T_0} + \frac{1}{6}(n_1 + 2n_2 + 2n_3 + n_4)\Delta t \quad (4.28)$$

dengan

$$k_1 = b(t, S_0, E_0, I_0, I_{T_0})$$

$$= C - \delta S_0 - \beta S_0 E_0$$

$$\begin{aligned}
&= 0,017152 - (0,014170)(0,966619) + \dots \\
&\quad - (0,021682)(0,966619)(0,020959) \\
&= 0,0030157
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_1 &= b(t, S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
&= \beta S_0 E_0 - \delta E_0 - E_0 \\
&= (0,021682)(0,966619)(0,020959) - (0,014170)(0,020959) + \dots \\
&\quad - (0,020959) \\
&= -0,0208167
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_1 &= c(t, S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
&= \alpha E_0 - (\delta + \delta_1) I_0 \\
&= (0,0592639)(0,020959) - (0,014170 + 0,007206)(0,003517) \\
&= 0,0123459
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n_1 &= c(t, S_0, E_0, I_0, I_{T_0}) \\
&= \gamma E_0 - (\delta + \delta_2) I_{T_0} \\
&= (0,407361)(0,020959) - (0,014170 + 0,002846)(0,008903) \\
&= 0,0083863
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
k_2 &= a\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_1 \frac{1}{2}, E_i + l_1 \frac{1}{2}, I_i + m_1 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2}\right) \\
&= C - \delta \left(S_0 + k_1 \frac{1}{2}\right) - \beta \left(S_0 + k_1 \frac{1}{2}\right) \left(E_0 + l_1 \frac{1}{2}\right) \\
&= (0,017152) - (0,014170) \left(0,966619 + \left(0,0030157 \left(\frac{1}{2}\right)\right)\right) + \dots
\end{aligned}$$

$$-(0,021682) \left(0,966619 + \left(0,0030157 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \times \dots$$

$$\left(0,020959 + \left(-0,0208167 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right)$$

$$= 0,0032121$$

$$l_2 = b \left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_1 \frac{1}{2}, E_i + l_1 \frac{1}{2}, I_i + m_1 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2} \right)$$

$$= \beta \left(S_0 + k_1 \frac{1}{2} \right) \left(E_0 + l_1 \frac{1}{2} \right) - \gamma \left(E_0 + l_1 \frac{1}{2} \right) - \left(E_0 + l_1 \frac{1}{2} \right)$$

$$= (0,021682) \left(0,966619 + \left(0,0030157 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \times \dots$$

$$\left(0,020959 + \left(-0,0208167 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) + \dots$$

$$-(0,014170) \left(0,020959 + \left(-0,0208167 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) + \dots$$

$$-\left(0,020959 + \left(-0,0208167 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right)$$

$$= -0,0104787$$

$$m_2 = c \left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_1 \frac{1}{2}, E_i + l_1 \frac{1}{2}, I_i + m_1 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2} \right)$$

$$= \alpha \left(E_0 + l_1 \frac{1}{2} \right) - (\delta + \delta_1) \left(I_0 + m_1 \frac{1}{2} \right)$$

$$= (0,592639) \left(0,020959 + \left(-0,0208167 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) + \dots$$

$$-(0,014170 + 0,007206) \left(0,003517 + \left(0,0123459 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right)$$

$$= 0,0060455$$

$$n_2 = d \left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_1 \frac{1}{2}, E_i + l_1 \frac{1}{2}, I_i + m_1 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_1 \frac{1}{2} \right)$$

$$= \gamma \left(E_0 + l_1 \frac{1}{2} \right) - (\delta + \delta_2) \left(I_{T_0} + n_1 \frac{1}{2} \right)$$

$$= (0,407361) \left(0,020959 + \left(-0,0208167 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) + \dots$$

$$-(0,014170 + 0,002846) \left(0,008903 + \left(0,0083863 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right)$$

$$= 0,0040750$$

$$k_3 = a \left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_2 \frac{1}{2}, E_i + l_2 \frac{1}{2}, I_i + m_2 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2} \right)$$

$$= C - \delta \left(S_0 + k_2 \frac{1}{2} \right) - \beta \left(S_0 + k_2 \frac{1}{2} \right) \left(E_0 + l_2 \frac{1}{2} \right)$$

$$= 0,017152 - 0,014170 \left(0,966619 + \left(0,0032121 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) + \dots$$

$$- 0,021682 \left(0,966619 + \left(0,0032121 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \times \dots$$

$$\left(0,020959 + \left(-0,0104787 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right)$$

$$= 0,0031022$$

$$\begin{aligned}
l_3 &= b \left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_2 \frac{1}{2}, E_i + l_2 \frac{1}{2}, I_i + m_2 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2} \right) \\
&= \beta \left(S_0 + k_2 \frac{1}{2} \right) \left(E_0 + l_2 \frac{1}{2} \right) - \delta \left(E_0 + l_2 \frac{1}{2} \right) - \left(E_0 + l_2 \frac{1}{2} \right) \\
&= (0,021682) \left(0,966619 + \left(0,0032121 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \times \dots
\end{aligned}$$

$$\left(0,020959 + \left(-0,0104787 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) - (0,014170) \times \dots$$

$$\left(0,020959 + \left(-0,0104787 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) + \dots$$

$$- \left(0,020959 + \left(-0,0104787 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right)$$

$$= -0,0156124$$

$$m_3 = c \left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_2 \frac{1}{2}, E_i + l_2 \frac{1}{2}, I_i + m_2 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2} \right)$$

$$= \alpha \left(E_0 + l_2 \frac{1}{2} \right) - (\delta + \delta_1) \left(I_0 + m_2 \frac{1}{2} \right)$$

$$= (0,592639) \left(0,020959 + \left(-0,0104787 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) + \dots$$

$$- (0,014170 + 0,007206) \left(0,003517 + \left(0,0060455 \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right)$$

$$= 0,0091762$$

$$\begin{aligned}
n_3 &= d\left(t_i + \frac{1}{2}, S_i + k_2 \frac{1}{2}, E_i + l_2 \frac{1}{2}, I_i + m_2 \frac{1}{2}, I_{T_i} + n_2 \frac{1}{2}\right) \\
&= \gamma\left(E_0 + l_2 \frac{1}{2}\right) - (\delta + \delta_2)\left(I_{T_0} + n_2 \frac{1}{2}\right) \\
&= (0,407361)\left(0,020959 + \left(-0,0104787\left(\frac{1}{2}\right)\right)\right) + \dots \\
&\quad - (0,014170 + 0,002846)\left(0,008903 + \left(0,0040750\left(\frac{1}{2}\right)\right)\right) \\
&= 0,0062174 \\
k_4 &= a(t, S_i + k_3, E_i + l_3, I_i + m_3, I_{T_i} + n_3) \\
&= C - \delta(S_0 + k_3) - \beta(S_0 + k_3)(E_0 + l_3) \\
&= (0,017152) - (0,014170)(0,966619 + 0,0031022) + \dots \\
&\quad - (0,021682)(0,966619 + 0,0031022) \times \dots \\
&\quad (0,020959 + (-0,0156124)) \\
&= 0,0032986 \\
l_4 &= b(t, S_i + k_3, E_i + l_3, I_i + m_3, I_{T_i} + n_3) \\
&= \beta(S_0 + k_3)(E_0 + l_3) - \delta(E_0 + l_3) - (E_0 + l_3) \\
&= (0,021682)(0,966619 + 0,0031022) \times \dots \\
&\quad (0,020959 + (-0,0156124)) - (0,014170) \times \dots \\
&\quad (0,020959 + (-0,0156124)) - (0,020959 + (-0,0156124)) \\
&= -0,0053099
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_4 &= c(t, S_i + k_3, E_i + l_3, I_i + m_3, I_{T_i} + n_3) \\
&= \alpha(E_0 + l_3) - (\delta + \delta_1)(I_0 + m_3) \\
&= (0,592639)(0,020959 + (-0,0156124)) + \dots \\
&\quad - (0,014170 + 0,007206)(0,003517 + 0,0091762) \\
&= 0,0028972
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n_4 &= d(t, S_i + k_3, E_i + l_3, I_i + m_3, I_{T_i} + n_3) \\
&= \gamma(E_i + l_3) - (\delta + \delta_2)(I_{T_i} + n_3) \\
&= (0,407361)(0,020959 + (-0,0156124)) + \dots \\
&\quad - (0,014170 + 0,002846)(0,008903 + 0,0062174) \\
&= 0,0019207
\end{aligned}$$

Kemudian mensubstitusikan nilai k_1 sampai k_4 , l_1 sampai m_1 sampai m_2 dan n_1 sampai n_4 kedalam Persamaan (4.25) sampai (4.28) maka akan diperoleh hasil dari solusi numerik model $SEII_T$ pada penyakit diabetes menggunakan metode runge-kutta orde 4 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
S_{0+1} &= S_0 + \left(\frac{1}{6}\right)(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\Delta t \\
&= 0,966619 + \left(\frac{1}{6}\right)(0,0030157 + 2(0,0032121) + \dots \\
&\quad 2(0,0031022) + (0,0032986))(0,01) \\
&= 0,966650
\end{aligned}$$

$$E_{0+1} = E_0 + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)\Delta t$$

$$\begin{aligned}
&= 0,020959 + \left(\frac{1}{6}\right) \times \dots \\
&\quad ((-0,0208167) + 2(-0,0104787) + 2(-0,0156124) + \dots \\
&\quad (-0,0053099))(0,01) \\
&= 0,020828
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_{0+1} &= I_0 + \frac{1}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)\Delta t \\
&= 0,003517 + \left(\frac{1}{6}\right) \times \dots \\
&\quad ((0,0123459) + 2(0,0060455) + 2(0,0091762) + \dots \\
&\quad (0,0028972))(0,01) \\
&= 0,003593
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_{T_{0+1}} &= I_{T_0} + \frac{1}{6}(n_1 + 2n_2 + 2n_3 + n_4)\Delta t \\
&= 0,008903 + \left(\frac{1}{6}\right) \times \dots \\
&\quad ((0,0083863) + 2(0,0040750) + 2(0,0062174) + \dots \\
&\quad (0,0019207))(0,01) \\
&= 0,008954
\end{aligned}$$

Jadi pada waktu $\Delta t = 0,01$ diperoleh $S_1 = 0,966650$, $E_1 = 0,020828$, $I_1 = 0,003593$, dan $I_{T_1} = 0,008954$. Selanjutnya untuk memprediksi laju 50 tahun kedepan pada setiap populasi dapat menggunakan program R-Studio yaitu pada table sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Solusi Numerik Penyakit Diabetes Melitus Menggunakan Metode Runge-Kutta Orde 4


t	S	E	I	I_T
0	0,966619	0,020959	0,003517	0,008903
100	0,969823	0,011222	0,009114	0,012671
200	0,973076	0,006009	0,011959	0,014556
300	0,976334	0,003218	0,013335	0,015436
400	0,979574	0,001723	0,013926	0,015779
500	0,982783	0,000923	0,014101	0,015837
600	0,985955	0,000494	0,014056	0,015745
700	0,989087	0,000265	0,013895	0,015574
800	0,992177	0,000142	0,013676	0,015362
900	0,995225	$7,59 \times 10^{-5}$	0,013428	0,015132
1000	0,998232	$4,06 \times 10^{-5}$	0,013168	0,014893
1100	1,001197	$2,18 \times 10^{-5}$	0,012903	0,014651
1200	1,00412	$1,17 \times 10^{-5}$	0,012639	0,01441
1300	1,007003	$6,24 \times 10^{-6}$	0,012378	0,014171
1400	1,009845	$3,34 \times 10^{-6}$	0,01212	0,013935
1500	1,012648	$1,79 \times 10^{-6}$	0,011867	0,013703
1600	1,015412	$9,60 \times 10^{-7}$	0,01162	0,013474
1700	1,018137	$5,14 \times 10^{-7}$	0,011377	0,013249
1800	1,020824	$2,75 \times 10^{-7}$	0,011139	0,013027
1900	1,023474	$1,47 \times 10^{-7}$	0,010906	0,012809
2000	1,026086	$7,90 \times 10^{-8}$	0,010677	0,012595
2100	1,028662	$4,23 \times 10^{-8}$	0,010454	0,012384
2200	1,031202	$2,27 \times 10^{-8}$	0,010235	0,012177
2300	1,033706	$1,21 \times 10^{-8}$	0,010021	0,011973
2400	1,036176	$6,51 \times 10^{-9}$	0,009811	0,011773
2500	1,038611	$3,49 \times 10^{-9}$	0,009606	0,011576
2600	1,041012	$1,87 \times 10^{-9}$	0,009405	0,011382
2700	1,043379	$1,00 \times 10^{-9}$	0,009208	0,011192
2800	1,045714	$5,36 \times 10^{-10}$	0,009015	0,011004
2900	1,048015	$2,87 \times 10^{-10}$	0,008827	0,01082
3000	1,048015	$2,87 \times 10^{-10}$	0,008827	0,01082
3100	1,052523	$8,24 \times 10^{-11}$	0,008461	0,010461
3200	1,054729	$4,42 \times 10^{-11}$	0,008284	0,010286
3300	1,056905	$2,37 \times 10^{-11}$	0,008111	0,010114
3400	1,05905	$1,27 \times 10^{-11}$	0,007941	0,009945
3500	1,061166	$6,79 \times 10^{-12}$	0,007775	0,009778
3600	1,063251	$3,64 \times 10^{-12}$	0,007612	0,009615
3700	1,065308	$1,95 \times 10^{-12}$	0,007453	0,009454
3800	1,067336	$1,04 \times 10^{-12}$	0,007297	0,009296

t	S	E	I	I_T
3900	1,069336	$5,60 \times 10^{-13}$	0,007144	0,00914
4000	1,071307	$3,00 \times 10^{-13}$	0,006994	0,008987
4100	1,071307	$3,00 \times 10^{-13}$	0,006994	0,008987
4200	1,075168	$8,61 \times 10^{-14}$	0,006705	0,008689
4300	1,077058	$4,62 \times 10^{-14}$	0,006564	0,008544
4400	1,078922	$2,47 \times 10^{-14}$	0,006427	0,008401
4500	1,08076	$1,33 \times 10^{-14}$	0,006292	0,00826
4600	1,082572	$7,10 \times 10^{-15}$	0,006161	0,008122
4700	1,084359	$3,81 \times 10^{-15}$	0,006032	0,007986
4800	1,08612	$2,04 \times 10^{-15}$	0,005906	0,007852
4900	1,087857	$1,09 \times 10^{-15}$	0,005782	0,007721
5000	1,08957	$5,86 \times 10^{-16}$	0,005661	0,007592

Hasil perhitungan solusi numerik menggunakan R-Studio penyakit diabetes melitus dengan metode runge kutta orde 4 , lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

Selanjutnya diperoleh grafik plot hasil iterasi numerik dengan menggunakan metode Runge Kutta Orde 4 pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus untuk setiap populasi *Susceptible*, *Exposed*, *Infected*, dan *Infected With Treatmen* menggunakan program R-Studio.


Hasil iterasi untuk laju individu pada sub populasi rentan (S) akan ditunjukkan pada plot grafik seperti pada Gambar 4.9 berikut:



Gambar 4. 10 Penyebaran Jumlah Susceptible pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge Kutta Orde 4

Pada Gambar 4.10 memperlihatkan bahwa jumlah nilai S_0 senilai 8.770.632 jiwa membuat grafik garis meningkat dari waktu ke waktu hingga berada pada waktu $t = 50$ tahun senilai 9.886.223,2011 jiwa. Meningkatnya populasi *Susceptible* dapat disebabkan karena adanya angka kelahiran yang tinggi.

Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (E) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.11




Gambar 4. 11 Penyebaran Jumlah Exposed pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge Kutta Orde 4

Pada Gambar 4.11 memperlihatkan bahwa dengan jumlah nilai awalan atau $E(t_0)$ senilai 190.173 dapat membuat grafik garis menurun dari waktu ke waktu hingga berada pada waktu $t = 50$ tahun. Penurunan tersebut menunjukkan bahwan dalam beberapa waktu kedepan yang terjadi pada Populasi *Exposed* akan mengalami penurunan tetapi jumlah populasi *Exposed* akan ada dalam populasi karena terjadi kontak infeksi antara populasi *Susceptible* dan *Exposed*. Dan dapat dilihat Grafiknya mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini disebabkan laju kelahiran yang masuk

sangat rendah serta populasi *Exposed* mengalami perpindahan status menjadi *Infected*, *Infected With Treatment* dan adanya kematian alami.


Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (*I*) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.12



Gambar 4. 12 Penyebaran Jumlah Infection pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge Kutta Orde 4

Pada Gambar 4.12 memperlihatkan bahwa dengan jumlah nilai awal atau I_0 senilai 31.916 jiwa dapat membuat grafik populasi *Infected* mengalami peningkatan hingga berada pada waktu $t = 5$ tahun kedepan dengan populasi individu senilai 127.985,5645 jiwa mencapai titik puncaknya, namun setelah melewati titik puncak, terjadi juga penurunan secara terus menerus. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa waktu kedepan yang terjadi pada populasi *Infected* akan mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya perpindahan individu *Exposed* ke individu *Infected With Treatment*. Adapun besarnya jumlah populasi individu *Infected* pada waktu $t = 50$ tahun kedepan adalah 51.364,8531 jiwa.

Selanjutnya untuk hasil iterasi laju kelas Populasi individu manusia yang laten (I_T) ditunjukkan pada plot Grafik seperti Gambar 4.13



Gambar 4.13 Penyebaran Jumlah Infection With Treatment Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge Kutta Orde 4

Pada Gambar 4.13 memperlihatkan bahwa jumlah nilai awal atau I_{T_0} senilai 80.788 jiwa dapat membuat grafik populasi *Infection With Treatment* mengalami peningkatan hingga berada pada waktu $t = 5$ tahun kedepan dengan populasi individu senilai 143.730,6432 jiwa dan mencapai titik puncaknya, namun setelah melewati titik puncak, terjadi juga penurunan secara terus menerus. Adapun jumlah populasi *Infection With Treatment* pada waktu $t = 50$ tahun kedepan adalah 68.885,1911 jiwa.

4. Analisis Galat

Hasil Penyelesaian Model $SEIIT_T$ pada penyakit diabetes melitus menggunakan metode Euler, Heun, dan Runge Kutta orde 4 dapat digunakan rumus galat mutlak untuk menentukan galat (*error*). Untuk memperoleh nilai galat dapat digunakan persamaan berikut:

$$\text{Galat} = \text{Max} \left(\text{abs}(S_i - S_{i-1}), \text{abs}(E_i - E_{i-1}), \text{abs}(I_i - I_{i-1}), \text{abs}(I_{T_i} - I_{T_{i-1}}) \right)$$

Sehingga diperoleh galat untuk metode Euler sebagai berikut:

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 100 dan $\Delta t = \frac{0,01}{100} = 0,0001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{100} - S_{99}| = |0,9666492 - 0,9666489| = 0,0000003$$

$$|\varepsilon_E| = |E_{100} - E_{99}| = |0,02075185 - 0,02075391| = 0,00000206$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{100} - I_{99}| = |0,003639826 - 0,003638603| = 0,000001223$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{100}} - I_{T_{99}}| = |0,008986430 - 0,008985600| = 0,00000083$$

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 1.000 dan $\Delta t = \frac{0,01}{1.000} = 0,00001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{1000} - S_{999}| = |0,9666492 - 0,9666491| = 0,0000001$$

$$|\varepsilon_E| = |E_{1000} - E_{999}| = |0,02075186 - 0,02075207| = 0,00000021$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{1000} - I_{999}| = |0,003639831 - 0,003639709| = 0,000000122$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{1000}} - I_{T_{999}}| = |0,008986434 - 0,008986351| = 0,000000083$$

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 10.000 dan $\Delta t = \frac{0,01}{10.000} = 0,000001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{10000} - S_{9999}| = |0,9666492 - 0,9666492| = 0$$

$$|\varepsilon_E| = |E_{10000} - E_{9999}| = |0,02075186 - 0,02075188| = 0,00000002$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{10000} - I_{9999}| = |0,003639832 - 0,003639819| = 0,000000013$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{10000}} - I_{T_{9999}}| = |0,008986434 - 0,008986426| = 0,000000008$$

Selanjutnya perhitungan galat untuk metode heun sebagai berikut:

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 100 dan $\Delta t = \frac{0,01}{100} = 0,0001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{100} - S_{99}| = |0,01509561 - 0,01494594| = 0,00014967$$

$$|\varepsilon_E| = |E_{100} - E_{99}| = |0,3919165 - 0,3954700| = 0,0035535$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{100} - I_{99}| = |0,3513681 - 0,3493658| = 0,0020023$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{100}} - I_{T_{99}}| = |0,2319863 - 0,2305883| = 0,001398$$

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 1.000 dan $\Delta t = \frac{0,01}{1.000} = 0,00001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{100} - S_{99}| = |0,1431538 - 0,1430192| = 0,0001346$$

$$\begin{aligned} |\varepsilon_E| &= |E_{1000} - E_{999}| = |0,0001175225 - 0,0001185851| \\ &= 0,0000010626 \end{aligned}$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{1000} - I_{999}| = |0,4937704 - 0,4938621| = 0,0000917$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{1000}} - I_{T_{999}}| = |0,3566487 - 0,3566842| = 0,0000355$$

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 10.000 dan $\Delta t = \frac{0,01}{10.000} = 0,000001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{10000} - S_{9999}| = |0,8675307 - 0,8674874| = 0,0000433$$

$$|\varepsilon_E| = |E_{10000} - E_{9999}| = |1,624513 \times 10^{-39} - 1,638972 \times 10^{-39}| = 0$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{10000} - I_{9999}| = |0,09179386 - 0,09181103| = 0,00001717$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{10000}} - I_{T_{9999}}| = |0,1439588 - 0,1439733| = 0,0000145$$

Selanjutnya perhitungan galat untuk metode runge kutta orde 4 sebagai berikut:

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 100 dan $\Delta t = \frac{0,01}{100} = 0,0001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{100} - S_{99}| = |0,9666506 - 0,9666503| = 0,0000003$$

$$|\varepsilon_E| = |E_{100} - E_{99}| = |0,02082889 - 0,02083018| = 0,00000129$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{100} - I_{99}| = |0,003592901 - 0,003592144| = 0,000000757$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{100}} - I_{T_{99}}| = |0,008954319 - 0,008953808| = 0,000000511$$

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 1.000 dan $\Delta t = \frac{0,01}{1.000} = 0,00001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{1000} - S_{999}| = |0,9666222 - 0,9666221| = 0,0000001$$

$$|\varepsilon_E| = |E_{1000} - E_{999}| = |0,02094595 - 0,02094608| = 0,00000013$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{1000} - I_{999}| = |0,003524612 - 0,003524536| = 0,000000076$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{1000}} - I_{T_{999}}| = |0,008908147 - 0,008908096| = 0,000000051$$

Perhitungan galat dengan jumlah iterasi 10.000 dan $\Delta t = \frac{0.01}{10.000} = 0.000001$

$$|\varepsilon_S| = |S_{10000} - S_{9999}| = |0,9666506 - 0,9666506| = 0$$

$$|\varepsilon_E| = |E_{10000} - E_{9999}| = |0,02082889 - 0,02082890| = 0,00000001$$

$$|\varepsilon_I| = |I_{10000} - I_{9999}| = |0,003592898 - 0,003592891| = 0,000000007$$

$$|\varepsilon_{I_T}| = |I_{T_{10000}} - I_{T_{9999}}| = |0,008954318 - 0,008954313| = 0,000000005$$

Hasil perhitungan galat pada metode euler, heun, dan runge kutta orde 4 dapat dilihat pada table 4.6 berikut :

Tabel 4. 7 Galat Mutlak Metode Euler, Heun, dan Runge Kutta Orde 4

Nilai Galat Max		
Euler	Heun	RK4
0,00000206	0,0035535	0,00000129

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai galat untuk semua variabel pada metode Euler adalah 0,00000206, untuk metode Heun adalah 0,0035535, dan untuk metode Runge Kutta Orde 4 adalah 0,00000129. Dari hasil galat ketiga metode tersebut, metode runge kutta orde 4 lebih kecil dari pada menggunakan metode euler dan metode heun.

B. Pembahasan

Pada penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Sulawesi Selatan, Adapun data yang didapatkan berupa data bulanan yang dihitung dari Januari sampai Desember Tahun 2022 pada Penyakit Diabetes Melitus.

Penyelesaian model pada penyakit Diabetes Melitus secara numerik dengan terlebih dahulu menentukan model yang sesuai dengan data yang di dapatkan, Adapun model yang digunakan yaitu model $SEIIT_T$ yang terdiri atas *Susceptible*, *Exposed*, *Infected*, dan *Infected With Treatment* dimana pada populasi *Susceptible* merupakan populasi yang rentan dimana akan mengalami peningkatan populasi karena adanya laju kelahiran yang tinggi. Populasi *Exposed* akan berkurang disebabkan adanya perpindahan individu laten masuk ke populasi terinfeksi dan kematian alami dari populasi laten tetapi jumlah individu laten akan tetap dalam populasi karena terjadi kontak infeksi antara populasi *Susceptible* dan *Exposed*. Populasi *Infected* meningkat diakibatkan pindahnya populasi laten terhadap individu sakit tanpa perawatan, namun secara bersamaan akan berkurang karena adanya kematian alami akibat penyakit tanpa perawatan dan kematian alami dari populasi terinfeksi tanpa perawatan dan populasi *Infected With Treatment* mengalami peningkatan diakibatkan pindahnya populasi laten terhadap individu sakit dengan adanya perawatan., namun secara bersamaan akan berkurang karena adanya kematian akibat penyakit dengan adanya perawatan.

Model yang dihasilkan dalam bentuk persamaan diferensial biasa yang selanjutnya akan diselesaikan secara numerik menggunakan metode euler dimulai

dengan menentukan nilai awal yaitu $S_0 = \frac{8.770.632}{9.073.509} = 0,966619$,

$$E_0 = \frac{190.173}{9.073.509} = 0,020959, \quad I_0 = \frac{31.916}{9.073.509} = 0,003517, \quad I_{T_0} = \frac{80.788}{9.073.509} =$$

0,008903 dengan interval waktu yang digunakan adalah $\Delta t = 0,01$. Selanjutnya melakukan perhitungan untuk nilai dari model $SEIIT_T$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus. Maka diperoleh solusi untuk 0,01 tahun yaitu $S_1 = 0,966649$, $E_1 = 0,020750$, $I_1 = 0,003639$ dan $I_{T_1} = 0,008986$ begitupun untuk tahun berikutnya dapat menggunakan program R-Studio.

Berdasarkan hasil iterasi pada Tabel 4.3 ataupun plot grafik pada Gambar 4.2 sampai 4.5 dapat dilihat bahwa besarnya populasi *Susceptible* atau rentan (S) berdasarkan nilai awal yang diberikan ($S(t_0)$) = 8.770.632 yang diselesaikan secara numerik sampai pada 50 Tahun kedepan, diperoleh ($S(t_{50})$) = 9.891.703,6005 dapat dilihat bahwa populasi yang rentan terhadap penyakit Diabetes Melitus mengalami peningkatan dari nilai awal yang diberikan, hal ini disebabkan karena adanya jumlah kelahiran yang tinggi. Pada kelas yang terekspos penyakit (E) diberikan nilai awal ($E(t_0)$) = 190.173 hingga 50 tahun kedepan diperoleh ($E(t_{50})$) = $4,774915 \times 10^{-24}$, dapat dilihat dari jumlah populasinya mengalami penurunan yang disebabkan adanya perpindahan populasi laten masuk ke populasi terinfeksi tanpa perawatan dan juga masuk ke populasi terinfeksi dengan adanya perawatan. Untuk kelas yang telah terinfeksi diabetes melitus tanpa perawatan (I) diberikan nilai awal $I(t_0) = 31.916$ hingga 50 tahun kedepan diperoleh ($I(t_{50})$) = 50.386,9466, dilihat bahwa jumlah populasi ini mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan akibat adanya perpindahan

individu yang laten terhadap individu terinfeksi tanpa perawatan dan adanya kematian akibat penyakit tanpa perawatan dan untuk kelas yang telah terinfeksi diabetes melitus dengan adanya perawatan (I_T) diberikan nilai awal $I_T(t_0) = 80.788$ hingga 50 tahun kedepan diperoleh $(I_T(t_{50})) = 68.051,9889$, dilihat bahwa jumlah populasi ini mengalami kenaikan kemudian menurun secara terus menerus, hal ini terjadi karena adanya kematian akibat penyakit dengan perawatan.

Selanjutnya akan diselesaikan secara numerik menggunakan metode heun dimulai dengan menentukan nilai awal yaitu $S_0 = \frac{8.770.632}{9.073.509} = 0,966619$, $E_0 = \frac{190.173}{9.073.509} = 0,020959$, $I_0 = \frac{31.916}{9.073.509} = 0,003517$, $I_{T_0} = \frac{80.788}{9.073.509} = 0,008903$ dengan interval waktu yang digunakan adalah $\Delta t = 0,01$. Selanjutnya melakukan perhitungan untuk nilai dari model $SEIIT_T$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus. Maka diperoleh solusi untuk 0,01 tahun yaitu $S_1 = 0,966649$, $E_1 = 0,020751$, $I_1 = 0,003639$, dan $I_{T_1} = 0,008986$ begitupun untuk tahun berikutnya dapat menggunakan program R-Studio.

Berdasarkan hasil iterasi pada Tabel 4.4 ataupun plot grafik pada Gambar 4.6 sampai 4.9 dapat dilihat bahwa besarnya populasi *Susceptible* atau rentan (S) berdasarkan nilai awal yang diberikan ($S(t_0) = 8.770.632$) yang diselesaikan secara numerik sampai pada 50 Tahun kedepan, diperoleh $(S(t_{50})) = 9.891.649,1595$ dapat dilihat bahwa populasi yang rentan terhadap penyakit Diabetes Melitus mengalami peningkatan dari nilai awal yang diberikan, hal ini disebabkan karena adanya jumlah kelahiran yang tinggi. Pada kelas yang tereksposes penyakit (E) diberikan nilai awal ($E(t_0) = 190.173$) hingga 50 tahun

kedepan diperoleh $(E(t_{50})) = 6,120879 \times 10^{-24}$, dapat dilihat dari jumlah populasinya mengalami penurunan yang disebabkan adanya perpindahan populasi laten masuk ke populasi terinfeksi tanpa perawatan dan juga masuk ke populasi terinfeksi dengan adanya perawatan. Untuk kelas yang telah terinfeksi diabetes melitus tanpa perawatan (I) diberikan nilai awal $I(t_0) = 31.916$ hingga 50 tahun kedepan diperoleh $(I(t_{50})) = 51.534,9542$ dilihat bahwa jumlah populasi ini mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan akibat adanya perpindahan individu yang laten terhadap individu terinfeksi tanpa perawatan dan adanya kematian akibat penyakit tanpa perawatan dan untuk kelas yang telah terinfeksi diabetes melitus dengan adanya perawatan (I_T) diberikan nilai awal $I_T(t_0) = 80.788$ hingga 50 tahun kedepan diperoleh $(I_T(t_{50})) = 90.427,1260$, dilihat bahwa jumlah populasi ini mengalami kenaikan kemudian menurun secara terus menerus, hal ini terjadi karena adanya kematian akibat penyakit dengan perawatan.

Selanjutnya akan diselesaikan secara numerik menggunakan metode runge kutta orde 4 dimulai dengan menentukan nilai awal yaitu

$$S_0 = \frac{8.770.632}{9.073.509} = 0,966619, \quad E_0 = \frac{190.173}{9.073.509} = 0,020959, \quad I_0 = \frac{31.916}{9.073.509} = 0,003517, \quad I_{T_0} = \frac{80.788}{9.073.509} = 0,008903$$

dengan interval waktu yang digunakan adalah $\Delta t = 0,01$, selanjutnya mencari nilai k_1 hingga k_4 , l_1 hingga l_4 , m_1 hingga m_4 dan n_1 hingga n_4 . Untuk iterasi pertama diperoleh nilai $k_1 = 0,0002519$, $k_2 = -0,0002700$, $k_3 = 0,0002609$, $k_4 = 0,0002789$, $l_1 = -0,0209473$, $l_2 = -0,0104795$, $l_3 = -0,057104$, $l_4 = -0,0052456$, $m_1 = 0,0010288$, $m_2 = 0,0005107$, $m_3 = 0,0007696$, $m_4 = 0,0002516$, $n_1 = 0,0199113$,

$n_2 = 0,0099408$, $n_3 = 0,0149233$, $n_4 = 0,0049556$, maka didapatkan solusi numerik untuk waktu 0,01 Tahun yaitu $S_1 = 0,966650$, $E_1 = 0,020828$, $I_1 = 0,003593$ dan $I_{T_1} = 0,008954$ begitupun untuk iterasi selanjutnya menggunakan program R-Studio.

Berdasarkan hasil iterasi pada Tabel 4.4 ataupun plot grafik pada Gambar 4.10 sampai 4.13 dapat dilihat bahwa besarnya populasi *Susceptible* atau rentan (S) berdasarkan nilai awal yang diberikan ($S(t_0) = 8.770.632$) yang diselesaikan secara numerik sampai pada 50 Tahun kedepan, diperoleh ($S(t_{50}) = 9.886.223,2011$) dapat dilihat bahwa populasi yang rentan terhadap penyakit Diabetes Melitus mengalami peningkatan dari nilai awal yang diberikan, hal ini disebabkan karena adanya jumlah kelahiran yang tinggi. Pada kelas yang tereksposes penyakit (E) diberikan nilai awal ($E(t_0) = 190.173$) hingga 50 tahun kedepan diperoleh ($E(t_{50}) = 5,860066 \times 10^{-16}$), dapat dilihat dari jumlah populasinya mengalami penurunan yang disebabkan adanya perpindahan populasi laten masuk ke populasi terinfeksi tanpa perawatan dan juga masuk ke populasi terinfeksi dengan adanya perawatan. Untuk kelas yang telah terinfeksi diabetes melitus tanpa perawatan (I) diberikan nilai awal $I(t_0) = 31.916$ hingga 50 tahun kedepan diperoleh ($I(t_{50}) = 51.364,8531$), dilihat bahwa jumlah populasi ini mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan akibat adanya perpindahan individu yang laten terhadap individu terinfeksi tanpa perawatan dan adanya kematian akibat penyakit tanpa perawatan dan untuk kelas yang telah terinfeksi diabetes melitus dengan adanya perawatan (I_T) diberikan nilai awal $I_T(t_0) = 80.788$ hingga 50 tahun kedepan diperoleh ($I_T(t_{50}) = 68.885,1911$), dilihat

bahwa jumlah populasi ini mengalami kenaikan kemudian menurun secara terus menerus, hal ini terjadi karena adanya kematian akibat penyakit dengan perawatan.

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai galat semua variabel untuk metode euler adalah 0,00000206, untuk metode heun adalah 0,0035535, dan untuk metode runge kutta orde 4 adalah 0,00000129 artinya metode runge kutta orde 4 lebih efisien dibandingkan metode euler dan metode heun dan nilai galat yang dihasilkan semakin berkurang atau mendekati nilai 0. Sehingga hasil yang diperoleh dikatakan konvergen.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun solusi numerik model $SEII_T$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus menggunakan metode euler dengan ukuran langkah atau $\Delta t = 0,01$ diperoleh untuk prediksi 50 tahun kedepan yaitu untuk populasi individu rentan sebesar $S = 8.773.030, 8.775.571, 8.778.148, \dots, 9.891.703, 6005$ Untuk populasi individu laten sebesar $E = 69.648, 25.505, 9.345, \dots, 4,774915 \times 10^{-24}$. Untuk populasi individu terinfeksi $I = 37.745, 39.832, 40.549, \dots, 50.386, 9466$. Untuk populasi individu terinfeksi dengan perawatan $I_T = 194.064, 235.321, 250.192, \dots, 68.051, 9889$.
2. Adapun solusi numerik model $SEII_T$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus menggunakan metode heun dengan ukuran langkah atau $\Delta t = 0,01$ diperoleh untuk prediksi 50 tahun kedepan yaitu untuk populasi individu rentan sebesar $= 8.799.244, 8.829.041, 8.858.993, \dots, 9.891.649, 1595$. Untuk populasi individu laten sebesar $E = 70,437, 26.095, 9.663, \dots, 6,120879 \times 10^{-24}$. Untuk populasi individu terinfeksi $I = 101.478, 125.377, 132.409, \dots, 51.534, 9542$. Untuk populasi individu terinfeksi dengan perawatan $I_T = 128.417, 144.949, 149.985, \dots, 90.427, 1260$.

3. Adapun solusi numerik model $SEII_T$ pada penyebaran penyakit Diabetes Melitus menggunakan metode runge kutta orde 4 dengan ukuran langkah atau $\Delta t = 0,01$ diperoleh untuk prediksi 50 tahun kedepan yaitu untuk populasi individu rentan sebesar $S = 8.799.697, 8.829.213, 8.858.775, \dots, 9.886.223, 2011$. Untuk populasi individu laten sebesar $E = 101.822, 54.522, 29.198, \dots, 5,860066 \times 10^{-16}$. Untuk populasi individu terinfeksi $I = 82.695, 108.510, 120.995, \dots, 51.364, 8531$. Untuk populasi individu terinfeksi dengan perawatan $I_T = 114.970, 132.073, 140.058, \dots, 68.8851911$.
4. Berdasarkan hasil galat yang diperoleh pada metode euler. Metode heun, dan metode runge kutta orde 4 yaitu diperoleh nilai maksimum untuk semua variabel dengan menggunakan metode euler dan metode heun lebih besar dari nilai maksimum untuk semua variabel dengan menggunakan metode runge kutta orde 4. Berdasarkan hasil perbandingan ketiga metode tersebut menyatakan bahwa metode Runge Kutta Orde 4 memiliki ketelitian yang lebih akurat dibandingkan metode Euler dan metode Heun.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih terbaru dan spesifik sehingga diperoleh model yang optimal. Serta diharapkan penelitian selanjutnya agar membandingkan beberapa metode numerik dengan orde yang lebih tinggi sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, S., & Baharuddin. (2020). Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis Vol. 15 No. 2*, 102-106.
- Ardiansah, N., & Kharis, M. (2012). Model Matematika untuk Penyakit Diabetes tanpa Faktor Genetik. *Indonesian Journal of Mathematic and Natural Sciences*.
- Arisman. (2014). *Buku Ajar Ilmu Gizi Obesitas, diabetes melitus, dan dislipidemia*. Jakarta: EGC.
- Bujawati, E. (2012). *Penyakit Tidak Menular Faktor Resiko dan Pencegahannya*. Makassar: Alauddin University prees.
- Capra, S. &. (2015). *Numerical methods for engineers*. NewYork: Mc Graw Hill Education.
- Chauhan , V., & Srivastava, P. K. (2019). Computational Techniques Based on Runge-Kutta Method of Various Order and Type for Solving Differential Equations. *International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences*.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Emmanuel, E. C., Chidinma, N., & Ifeoma , N. (2020). On Review of the Convergence Analyses of the Runge Kutta Fixed Point Iterative Methods. *Asian Journal of Pure and Applied Mathematics*.
- Howard, J. P. (2017). *Computational Methods for Numerical Analysis with R*. Maryland: CRC Press.
- Karris, S. T. (n.d.). *Numerical Analysis Using Matlab and Spreadsheets*. Orchardpublications.
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Katsir, I., & Ismail bin Katsir. (2000). *Al-Misbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsir Ibni Katsir*. Terjemahan oleh A.Aalim. Riyadh: Daarus salaam.
- Kaya, K., Darmawati, & Ekawati, D. (2021). Model Matematika Pada Penyakit Diabetes Melitus dengan Faktor Genetik dan Faktor Sosial. *Journal of Mathematics: Theory and Applications*, 23-30.
- Lede, Y. K., & Mungkasi, S. (2019). Performance of the Runge-Kutta Methods in Solving a Mathematical Model for the Spread of Dengue Fever Disease. *International Conference on Science and Applied Science*.

- Lestari, H. E., Lestari, D., & Arifah, H. (2017). Analisis Kestabilan Model SEIIT (Susceptible-Exposed-Ill-Ill With Treatment) Pada Penyakit Diabetes Mellitus. *Jurnal Matematika*.
- Mardianto, Y. B. (2022). Metode Runge-Kutta Orde 4 Dalam Penyelesaian Persamaan Gelombang 1D Syarat Batas Dirichlet. *Indonesian Journal of Applied Mathematics Vol 2*.
- Maulana, I. (2012). *Analisis Komplikasi Yang Berhubungan dengan Kejadian Silent Coronary Artery diseases pada pasien Riwayat Diabetes Melitus tipe 2*. Fakultas Ilmu Keperawatan.
- Maulana, M. (2008). *Mengenal Diabetes Melitus panduan menangani penyakit kencing manis*. Jogjakarta: Kata hati.
- Mungkasi, R. U. (2021). The Euler, Heun, and Fourth Order Runge-Kutta Solutions to SEIR Model for the Spread of Meningitis Disease. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 6 No.2*.
- Munir, R. (2006). *Metode Numerik*. Bandung: Informatika, <http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Buku/Metode-Numerik>.
- Munir, R. (2010). *Metode Numerik*. Bandung: Informatika.
- Murtafi'ah, W., & Apriandi, D. (2018). *Persamaan Diferensial Biasa dan Aplikasinya*. UNIPMA PRESS.
- Ndraha, S. (2014). *Diabetes Melitus Tipe 2 dan Tatalaksana Terkini*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Krida Wacana.
- Nuraeni, Z. (2017). Aplikasi Persamaan Diferensial Dalam Estimasi Jumlah Populasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 9-16.
- Poznyak, A., Grechko, A. V., Poggio, P., Myasoedova, V. A., Alfieri, V., & Orekhov, A. N. (2020). The Diabetes Mellitus-Atherosclerosis Connection: The Role of Lipid and Glucose Metabolism and Chronic Inflammation. *International Journal of Molecular Sciences*.
- Purnamasari D. (2014). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: Interna Publishing.
- Santoso, F. G. (2011). Analisis Perbandingan Metode Numerik Dalam Menyelesaikan Persamaan-Persamaan Serentak. *Widya Warta No. 01 XXXV*, 19-39.
- Sari, F., Yundari, & Helmi. (2014). Penyelesaian numerik persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan menggunakan metode adams bashforth-moulton. *Buletin ilmiah Mat. Stat. dan Terapannya (Bimaster)*, 125-134.
- Soegondo S. (2014). *Farmakoterapi Pada Pendendalian Glikemia Diabetes Melitus tipe 2*. Jakarta: Interna Publishing.

Triadmojo, B. (2002). *Metode Numerik*. Yogyakarta: Beta Offset.

Yulistiyo, B. (2015). *Metode Numerik Aplikasi Untuk Teknik Sipil*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mujahida, lahir di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Juli 2001. Lahir sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Alm Muh Suyuti dan Norma. Penulis menempuh pendidikan dasar pada SDN 37 Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, lulus pada tahun 2016. Kemudian Sekolah Menengah Atas di SMAN 8 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi hingga tahun 2023 .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

L

A

M

P

I

R

A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran 1 Surat Keterangan Validasi

SURAT KETERANGAN

VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM

No : / val / m / 358_2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Mujahida
Nim : 60600119058
Judul Karya Ilmiah : **“Solusi Numerik Model SEIIT Dari Penyebaran Penyakit Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Selatan“**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan Valid.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 26 Juli 2023
Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika



Adnan Sauddin, S. Pd., M. Si

Lampiran 2 Data

1. Data Penderita Penyakit Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

No	Kabupaten	Eksposed	Penderita DM Tanpa Perawatan	Penderita DM Rawat Inap/ Rawat Jalan	Penderita DM	Meninggal DM
1.	Bantaeng	1.880	0	1.509	1.509	10
2.	Barru	9.253	1.077	6.160	7.237	15
3.	Bone	5.742	834	3.150	3.984	20
4.	Bulukumba	5.828	3.103	1.862	4.965	13
5.	Enrekang	5.067	450	1.110	1.560	15
6.	Gowa	8.397	1.820	1.238	3.058	8
7.	Jeneponto	2.617	780	3.648	4.428	5
8.	Luwu	4.843	990	125	1.115	0
9.	Luwu Utara	2.295	1.550	3.030	4.580	7
10.	Luwu Timur	2.969	879	145	1.024	5
11.	Maros	10.658	2.130	2.944	5.074	10
12.	Makassar	4.015	4.430	35.644	40.074	15
13.	Pare-Pare	8.799	404	950	1.354	12
14.	Pinrang	2.820	7.020	4.458	11.478	11
15.	Pangkep	2.678	2.107	1.466	3.573	10
16.	Soppeng	2.020	1.230	3.520	4.750	15
17.	Sinjai	5.576	267	2.347	2.614	5
18.	Selayar	479	545	953	1.498	17
19.	Sidrap	4.391	1.510	2.476	3.986	7
20.	Takalar	4.956	1.240	0	1.240	6
21.	Tanah Toraja	3.008	0	670	670	13
22.	Wajo	18.350	6.150	1.768	7.918	10
23.	Kota Palopo	2.518	0	1.725	1.725	11
24.	Toraja Utara	2.810	4.50	2.535	2.985	5
Total		121.969	38.966	83.433	122.399	245

2. Data Penderita Penyakit Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021

No	Kabupaten	Eksposed	Penderita DM Tanpa Perawatan	Penderita DM Rawat Inap/ Rawat Jalan	Penderita DM	Meninggal DM
1.	Bantaeng	1.278	0	1.609	1.609	0
2.	Barru	10.551	666	6.264	6.930	12
3.	Bone	1.609	1.519	3.250	4.769	12
4.	Bulukumba	5.133	1.278	2.681	3.959	15
5.	Enrekang	4.660	132	1.139	1.271	11
6.	Gowa	10.890	3.687	13.083	16.770	8
7.	Jeneponto	2.518	220	4.864	5.084	4
8.	Luwu	4.547	1.108	215	1.323	5
9.	Luwu Utara	2.216	2.411	3.969	6.380	10
10.	Luwu Timur	923	0	3.645	3.645	25
11.	Maros	11.902	3.081	4.429	7.510	20
12.	Makassar	3.987	6.271	34.564	40.835	15
13.	Pare-Pare	9.083	1.351	980	2.331	19
14.	Pinrang	2.674	53	4.584	4.637	21
15.	Pangkep	4.765	1.613	1.664	3.277	7
16.	Soppeng	1.639	1.109	3.250	4.359	5
17.	Sinjai	22.993	2.381	2.473	4.854	5
18.	Selayar	1.420	604	9.73	1.577	5
19.	Sidrap	4.694	898	2.674	3.572	6
20.	Takalar	4.533	652	2.379	3.031	11
21.	Tanah Toraja	4.111	248	698	946	16
22.	Wajo	27.004	1.535	1.876	3.411	0
23.	Kota Palopo	2.312	672	2.517	3.189	0
24.	Toraja Utara	2.869	249	2.626	2.875	14
Total		14.8311	31.738	10.6406	13.8144	246

3. Data Penderita Penyakit Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2022

No	Kabupaten	Eksposed	Penderita DM tanpa Perawatan	Penderita DM Rawat Inap/ Rawat jalan	Penderita DM	Meninggal DM
1.	Bantaeng	1.851	686	1.459	2.145	5
2.	Barru	2.801	1.127	881	2.008	7
3.	Bone	10.658	2.713	7.445	10.158	5
4.	Bulukumba	5.682	1.078	4.971	6.049	12
5.	Enrekang	1.967	529	1.012	1.541	13
6.	Gowa	23.292	1.761	6.777	8.538	8
7.	Jeneponto	5.133	1.212	3.300	4.512	9
8.	Luwu	6.205	719	4.700	5.419	0
9.	Luwu Utara	4.747	1.253	3.649	4.902	9
10.	Luwu Timur	4.533	979	1.347	2.326	13
11.	Maros	4.489	1.200	4.526	5.726	15
12.	Makassar	79.608	5.367	18.305	23.672	20
13.	Pare-Pare	2.463	1.487	2.793	4.280	18
14.	Pinrang	2.678	958	2.601	3.559	5
15.	Pangkep	2.216	2.389	1.875	4.264	8
16.	Soppeng	4.015	1.674	2.310	3.984	0
17.	Sinjai	2.594	1.637	1.495	3.132	0
18.	Selayar	1.566	310	927	1.237	12
19.	Sidrap	2.709	1.463	1.208	2.671	10
20.	Takalar	4.660	1.417	1.884	3.301	10
21.	Tanah Toraja	1.753	154	1.003	1.157	15
22.	Wajo	8.964	980	3.727	4.707	17
23.	Kota Palopo	2.810	618	1.249	1.867	10
24.	Toraja Utara	2.779	205	1.344	1.549	9
		190.173	31.916	80.788	112.704	230

Lampiran 3 Program

1. Program Penyelesaian Model SEIIt Penyakit Diabetes Melitus dengan

Metode Euler

#PENYELESAIAN MODEL PENYAKIT DIABETES MELLITUS

DENGAN MENGGUNAKAN METODE EULER

```
euler <- function (f ,g, j, k, S0 , E0 , I0, It0, h , t0, n) {
```

```
  t = t0
```

```
  S = S0
```

```
  E = E0
```

```
  I = I0
```

```
  It = It0
```

```
  for (i in 1: n) {
```

```
    S0 = S0 + h * f(S0 , E0 , I0, It0)
```

```
    E0 = E0 + h * g(S0 , E0 , I0, It0)
```

```
    I0 = I0 + h * j(S0 , E0 , I0, It0)
```

```
    It0 = It0 + h * k(S0 , E0 , I0, It0)
```

```
  t0=t0+h
```

```
  S = c(S , S0 )
```

```
  E = c(E , E0 )
```

```
  I = c(I , I0 )
```

```
  It = c(It , It0)
```

```
t = c(t , t0)
```

```
}
```

```
return ( data.frame (t=t, S=S , E=E , I=I, It=It))
```

```
}
```

```
f=function(S,E,I,It) {(0.017152-0.014170*S-0.021682*S*E)}
```

```
g=function(S,E,I,It) {(0.021682*S*E-1.014170*E)}
```

```
j=function(S,E,I,It) {(0.5926396*E-0.021376*I)}
```

```
k=function(S,E,I,It) {(0.407361*E-0.017016*It)}
```

```
euler(f, g, j, k, 0.966619, 0.020959, 0.003517, 0.008903, 0.01,0, 5000)
```

```
eulerr=euler(f, g, j, k, 0.966619, 0.020959, 0.003517, 0.008903, 0.01, 0, 5000)
```

```
euler2<-data.frame(eulerr)
```

```
euler2
```

```
View(euler2)
```

```
head(euler2)
```

```
tail(euler2)
```

```
#Plot euler
```

```
library(ggplot2)
```

```
AA<-ggplot(euler2,aes(t,S))+geom_line(aes(color="Susceptible"))+
```

```
labs(colour = "")+
```

```
labs(title = "Model SEIIT Pada Penyakit Diabetes Mellitus Dengan  
Metode Euler ", x = "Waktu (Tahun)",y = "Jumlah Orang yang Rentan")+
```

```
theme(legend.position = "right")+
```

```
coord_cartesian(ylim = c( 0.96, 1.1 ))
```

AA

```
BB<-ggplot(euler2,aes(t,E))+geom_line(aes(color = "Exposed"))+ labs(colour  
= "")+
```

```
labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ",x = "Waktu  
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang laten")+ theme(legend.position =  
"right")+
```

```
coord_cartesian(ylim=c(0,0.022))+scale_color_manual(values=c('#FFA  
500'))
```

BB

```
CC<-ggplot(euler2,aes(t,I)) +geom_line(aes(color = "Infection"))+ labs(colour  
= "")+
```

```
labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu  
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi")+ theme(legend.position =  
"right")+
```

```
coord_cartesian(ylim=c(0.003,0.015))+scale_color_manual(values=c('#  
008000'))
```

CC

```
DD<-ggplot(euler2,aes(t,It))+geom_line(aes(color=
  "InfectionWithTreatment"))+ labs(colour = "")+
  labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu
  (Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi dengan Perawatan")+
  theme(legend.position = "right")+
  coord_cartesian(ylim=c(0.007,0.0165))+scale_color_manual(values=c('#
  0000FF'))
DD
#GALAT
eulerr_10=euler(f,g,j,k,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.001,0,10)
eulerr_100=euler(f,g,j,k,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.0001,0,100
)
eulerr_1000=euler(f,g,j,k,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.00001,0,1
000)
eulerr_10000=euler(f,g,j,k,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.000001,
0,10000)
tail(eulerr_10)
tail(eulerr_100)
tail(eulerr_1000)
tail(eulerr_10000)
```

2. Program Penyelesaian Model SEIIT_T Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode

Heun

#PENYELESAIAN MODEL SEIIT PADA PENYAKIT DIABETES
MELLITUS DENGAN MENGGUNAKAN METODE HEUN

```

heun<-function(f,g,j,k,S0,E0,I0,It0,h,t0,n){

t<-t0

S<-S0

E<-E0

I<-I0

It<-It0

for(i in 1:n){

Se<-S0+h*f(S0,E0,I0,It0)

Ee<-E0+h*g(S0,E0,I0,It0)

Ie<-I0+h*j(S0,E0,I0,It0)

Ite<-It0+h*k(S0,E0,I0,It0)

S0<-S0+(h/2)*(f(S0,E0,I0,It0)+f(Se,Ee,Ie,Ite))

E0<-E0+(h/2)*(g(S0,E0,I0,It0)+g(Se,Ee,Ie,Ite))

I0<-I0+(h/2)*(j(S0,E0,I0,It0)+j(Se,Ee,Ie,Ite))

It0<-It0+(h/2)*(k(S0,E0,I0,It0)+k(Se,Ee,Ie,Ite))

t0<-t0+h

t<-c(t,t0)

```

```
S<-c(S,S0)

E<-c(E,E0)

I<-c(I,I0)

It<-c(It,It0)

}

return(data.frame(x=t,S=S,E=E,I=I,It=It))

}

f=function(S,E,I,It) {(0.017152-0.014170*S-0.021682*S*E)}

g=function(S,E,I,It) {(0.021682*S*E-1.014170*E)}

j=function(S,E,I,It) {(0.5926396*E-0.021*I)}

k=function(S,E,I,It) {(0.407361*E-0.011324*It)}

heun(f, g, j, k, 0.966619, 0.020959, 0.003517, 0.008903, 0.01, 0, 5000)

HHeun=heun(f, g, j, k, 0.966619, 0.020959, 0.003517, 0.008903, 0.01, 0,
5000)

Heun2<-data.frame(HHeun)

Heun2

View(Heun2)

head(Heun2)

tail(Heun2)

#Plot Heun

library(ggplot2)

library(cowplot)
```

```
AA<-ggplot(Heun2,aes(x,S))+geom_line(aes(color="Susceptible"))+  
  labs(colour = "")+  
  labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu  
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang Rentan")+ theme(legend.position =  
  "right")+  
  coord_cartesian(ylim = c(0.96, 1.1))
```

AA

```
BB<-ggplot(Heun2,aes(x,E))+geom_line(aes(color="Exposed"))+ labs(colour  
  = "")+  
  labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ",x = "Waktu  
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang laten")+ theme(legend.position =  
  "right")+  
  coord_cartesian(ylim=c(0,0.022))+scale_color_manual(values=c('#FFA5  
  00'))
```

BB


```
CC<-ggplot(Heun2,aes(x,I))+geom_line(aes(color="Infection"))+ labs(colour  
  = "")+  
  labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu  
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi")+ theme(legend.position =  
  "right")+  
  coord_cartesian(ylim=c(0.003,0.016))+scale_color_manual(values=c('#  
  008000'))
```

CC

```
DD<-ggplot(Heun2,aes(x,It))+geom_line(aes(color=
  "InfectionWithTreatment"))+ labs(colour = "")+
  labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu
  (Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi dengan Perawatan")+
  theme(legend.position = "right")+
  coord_cartesian(ylim=c(0.0085,0.017))+scale_color_manual(values=c('
  #0000FF'))

DD
#GALAT
Heun_10=heun(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.001,10)
Heun_100=heun(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.0001,100)
Heun_1000=heun(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.00001,1
000)
Heun_10000=heun(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.000001
,10000)

tail(Heun_10)
tail(Heun_100)
tail(Heun_1000)
tail(Heun_10000)
```



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3. Program Penyelesaian Model SEIIT Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode

Runge-Kutta Orde 4

```
rm(list=ls(all=TRUE))
```

```
Rungekutta4<-function(f,g,j,k,t0,S0,E0,I0,It0,At,n){
```

```
  t=t0
```

```
  S=S0
```

```
  E=E0
```

```
  I=I0
```

```
  It=It0
```

```
  for(i in 1:n){
```

```
    k1=f(t0,S0,E0,I0,It0)
```

```
    l1=g(t0,S0,E0,I0,It0)
```

```
    m1=j(t0,S0,E0,I0,It0)
```

```
    n1=k(t0,S0,E0,I0,It0)
```

```
    k2=f(t0,S0+0.5*k1,E0+0.5*l1,I0+0.5*m1,It0+0.5*n1)
```

```
    l2=g(t0,S0+0.5*k1,E0+0.5*l1,I0+0.5*m1,It0+0.5*n1)
```

```
    m2=j(t0,S0+0.5*k1,E0+0.5*l1,I0+0.5*m1,It0+0.5*n1)
```

```
    n2=k(t0,S0+0.5*k1,E0+0.5*l1,I0+0.5*m1,It0+0.5*n1)
```

```
    k3=f(t0,S0+0.5*k2,E0+0.5*l2,I0+0.5*m2,It0+0.5*n2)
```

```
    l3=g(t0,S0+0.5*k2,E0+0.5*l2,I0+0.5*m2,It0+0.5*n2)
```

$$m_3 = j(t_0, S_0 + 0.5 * k_2, E_0 + 0.5 * l_2, I_0 + 0.5 * m_2, It_0 + 0.5 * n_2)$$

$$n_3 = k(t_0, S_0 + 0.5 * k_2, E_0 + 0.5 * l_2, I_0 + 0.5 * m_2, It_0 + 0.5 * n_2)$$

$$k_4 = f(t_0, S_0 + k_3, E_0 + l_3, I_0 + m_3, It_0 + n_3)$$

$$l_4 = g(t_0, S_0 + k_3, E_0 + l_3, I_0 + m_3, It_0 + n_3)$$

$$m_4 = j(t_0, S_0 + k_3, E_0 + l_3, I_0 + m_3, It_0 + n_3)$$

$$n_4 = k(t_0, S_0 + k_3, E_0 + l_3, I_0 + m_3, It_0 + n_3)$$

$$S_0 = S_0 + ((1/6) * At * (k_1 + (2 * k_2) + (2 * k_3) + k_4))$$

$$E_0 = E_0 + ((1/6) * At * (l_1 + (2 * l_2) + (2 * l_3) + l_4))$$

$$I_0 = I_0 + ((1/6) * At * (m_1 + (2 * m_2) + (2 * m_3) + m_4))$$

$$It_0 = It_0 + ((1/6) * At * (n_1 + (2 * n_2) + (2 * n_3) + n_4))$$

$$t_0 = t_0 + At$$

$$t = c(t, t_0)$$

$$S = c(S, S_0)$$

$$E = c(E, E_0)$$

$$I = c(I, I_0)$$

$$It = c(It, It_0)$$

}

return(data.frame(x=t, S=S, E=E, I=I, It=It))

}

f=function(t,S,E,I,It){(0.017152-0.014170*S-0.021682*S*E)}

```

g=function(t,S,E,I,It){(0.021682*S*E-1.014170*E)}

j=function(t,S,E,I,It){(0.5926396*E-0.021376*I)}

k=function(t,S,E,I,It){(0.407361*E-0.017016*It)}

Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619, 0.020959, 0.003517, 0.008903,0.01,5000)

RK4=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,      0.020959,      0.003517,
0.008903,0.01,5000)

RK44<-data.frame(RK4)

View(RK44)

head(RK44)

tail(RK44)

library(ggplot2)

library(cowplot)

AA<-ggplot(RK44,aes(x,S))+geom_line(aes(color="Susceptible"))+
  labs(colour = "")+
  labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang Rentan")+ theme(legend.position =
"right")+
  coord_cartesian(ylim = c(0.96, 1.09))

AA

BB<-ggplot(RK44,aes(x,E))+geom_line(aes(color = "Exposed"))+ labs(colour
= "")+

```

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ",x = "Waktu  
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang laten")+ theme(legend.position =  
"right")+  
coord_cartesian(ylim=c(0,0.022))+scale_color_manual(values=c('#FFA  
500'))
```

BB

```
CC<-ggplot(RK44,aes(x,I))+geom_line(aes(color = "Infection"))+ labs(colour  
= "")+  
labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu  
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi")+ theme(legend.position =  
"right")+coord_cartesian(ylim=c(0.003,0.015))+scale_color_manual(va  
lues=c('#008000'))
```

CC

```
DD<-ggplot(RK44,aes(x,It))+geom_line(aes(color=  
"InfectionWithTreatment"))+ labs(colour = "")+  
labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu  
(Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi dengan Perawatan")+  
theme(legend.position = "right")+  
coord_cartesian(ylim=c(0.0075,0.016))+scale_color_manual(values=c(  
#0000FF'))
```

DD

#GALAT

**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400



RK4_10=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.001,

10)

RK4_100=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.00

01,100)

RK4_1000=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.0

0001,100)

RK4_10000=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.

000001,10000)

tail(RK4_10)

tail(RK4_100)

tail(RK4_1000)

tail(RK4_10000)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4 Output

1. Output Penyelesaian Model SEI_T Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode

Euler

```
> #PENYELESAIAN MODEL PENYAKIT DIABETES MELLITUS DENGAN MENGGUNAKAN METODE EULER
> euler <- function (f ,g, j, k, s0 , E0 , I0, It0, h , t0, n) {
+   t = t0
+   S = s0
+   E = E0
+   I = I0
+   It= It0
+   for (i in 1: n) {
+     s0 = s0 + h * f(s0 , E0 , I0, It0)
+     E0 = E0 + h * g(s0 , E0 , I0, It0)
+     I0 = I0 + h * j(s0 , E0 , I0, It0)
+     It0 = It0 + h * k(s0 , E0 , I0, It0)
+
+     t0=t0+h
+     S = c(S , s0 )
+     E = c(E , E0 )
+     I = c(I , I0 )
+     It = c(It , It0)
+     t = c(t , t0)
+   }
+   return ( data.frame (t=t, S=S , E=E , I=I, It=It))
+ }
> f=function(S,E,I,It) {(0.017152-0.014170*S-0.021682*S*E)}
> g=function(S,E,I,It) {(0.021682*S*E-1.014170*E)}
> j=function(S,E,I,It) {(0.5926396*E-0.021376*I)}
> k=function(S,E,I,It) {(0.407361*E-0.017016*It)}
> euler(f, g, j, k, 0.966619, 0.020959, 0.003517, 0.008903, 0.01,0, 5000)
```

	t	S	E	I	It
1	0.00	0.9666190	0.020959000	0.003517000	0.008903000
2	0.01	0.9666492	0.020750833	0.003639226	0.008986016
3	0.02	0.9666794	0.020544733	0.003760204	0.009068178
4	0.03	0.9667096	0.020340681	0.003879947	0.009149495
5	0.04	0.9667399	0.020138656	0.003998468	0.009229975
6	0.05	0.9667702	0.019938637	0.004115777	0.009309627
7	0.06	0.9668005	0.019740605	0.004231888	0.009388458
8	0.07	0.9668309	0.019544540	0.004346812	0.009466477
9	0.08	0.9668613	0.019350422	0.004460561	0.009543693
10	0.09	0.9668918	0.019158232	0.004573147	0.009620112
11	0.10	0.9669223	0.018967952	0.004684581	0.009695743
12	0.11	0.9669528	0.018779561	0.004794875	0.009770594
13	0.12	0.9669834	0.018593042	0.004904039	0.009844672
14	0.13	0.9670140	0.018408375	0.005012087	0.009917985
15	0.14	0.9670446	0.018225543	0.005119027	0.009990542
16	0.15	0.9670753	0.018044526	0.005224872	0.010062348
17	0.16	0.9671060	0.017865308	0.005329632	0.010133412
18	0.17	0.9671367	0.017687870	0.005433318	0.010203741
19	0.18	0.9671675	0.017512194	0.005535941	0.010273343
20	0.19	0.9671983	0.017338263	0.005637511	0.010342224
21	0.20	0.9672291	0.017166059	0.005738038	0.010410392
22	0.21	0.9672600	0.016995566	0.005837534	0.010477854
23	0.22	0.9672909	0.016826767	0.005936009	0.010544617
24	0.23	0.9673218	0.016659644	0.006033471	0.010610687
25	0.24	0.9673528	0.016494181	0.006129933	0.010676073
26	0.25	0.9673838	0.016330362	0.006225402	0.010740779
27	0.26	0.9674148	0.016168170	0.006319891	0.010804815
28	0.27	0.9674458	0.016007588	0.006413407	0.010868185

29 0.28 0.9674769 0.015848602 0.006505961 0.010930896
30 0.29 0.9675080 0.015691195 0.006597563 0.010992956
31 0.30 0.9675391 0.015535351 0.006688221 0.011054371
32 0.31 0.9675703 0.015381055 0.006777946 0.011115146
33 0.32 0.9676015 0.015228292 0.006866746 0.011175289
34 0.33 0.9676327 0.015077046 0.006954630 0.011234805
35 0.34 0.9676639 0.014927303 0.007041609 0.011293702
36 0.35 0.9676952 0.014779047 0.007127690 0.011351984
37 0.36 0.9677265 0.014632263 0.007212883 0.011409658
38 0.37 0.9677578 0.014486937 0.007297197 0.011466731
39 0.38 0.9677892 0.014343055 0.007380639 0.011523208
40 0.39 0.9678205 0.014200602 0.007463220 0.011579095
41 0.40 0.9678519 0.014059563 0.007544947 0.011634398
42 0.41 0.9678834 0.013919926 0.007625829 0.011689122
43 0.42 0.9679148 0.013781676 0.007705875 0.011743274
44 0.43 0.9679463 0.013644798 0.007785092 0.011796860
45 0.44 0.9679778 0.013509281 0.007863490 0.011849884
46 0.45 0.9680093 0.013375109 0.007941075 0.011902353
47 0.46 0.9680409 0.013242270 0.008017856 0.011954271
48 0.47 0.9680724 0.013110750 0.008093842 0.012005645
49 0.48 0.9681040 0.012980537 0.008169040 0.012056480
50 0.49 0.9681356 0.012851617 0.008243457 0.012106781
51 0.50 0.9681673 0.012723978 0.008317102 0.012156553
52 0.51 0.9681989 0.012597606 0.008389983 0.012205802
53 0.52 0.9682306 0.012472489 0.008462106 0.012254534
54 0.53 0.9682623 0.012348616 0.008533480 0.012302752
55 0.54 0.9682940 0.012225972 0.008604112 0.012350462
56 0.55 0.9683258 0.012104547 0.008674009 0.012397670
57 0.56 0.9683576 0.011984328 0.008743179 0.012444380
58 0.57 0.9683893 0.011865303 0.008811628 0.012490597

59 0.58 0.9684212 0.011747460 0.008879365 0.012536326
60 0.59 0.9684530 0.011630787 0.008946396 0.012581572
61 0.60 0.9684848 0.011515274 0.009012727 0.012626340
62 0.61 0.9685167 0.011400907 0.009078367 0.012670634
63 0.62 0.9685486 0.011287677 0.009143322 0.012714460
64 0.63 0.9685805 0.011175571 0.009207598 0.012757821
65 0.64 0.9686124 0.011064579 0.009271203 0.012800723
66 0.65 0.9686444 0.010954689 0.009334143 0.012843170
67 0.66 0.9686763 0.010845891 0.009396425 0.012885167
68 0.67 0.9687083 0.010738173 0.009458055 0.012926717
69 0.68 0.9687403 0.010631525 0.009519040 0.012967826
70 0.69 0.9687723 0.010525936 0.009579386 0.013008498
71 0.70 0.9688044 0.010421397 0.009639099 0.013048737
72 0.71 0.9688364 0.010317895 0.009698187 0.013088548
73 0.72 0.9688685 0.010215422 0.009756654 0.013127935
74 0.73 0.9689006 0.010113966 0.009814508 0.013166901
75 0.74 0.9689327 0.010013518 0.009871754 0.013205452
76 0.75 0.9689648 0.009914067 0.009928399 0.013243591
77 0.76 0.9689969 0.009815605 0.009988448 0.013281322
78 0.77 0.9690291 0.009718120 0.010039907 0.013318650
79 0.78 0.9690612 0.009621604 0.010094782 0.013355578
80 0.79 0.9690934 0.009526046 0.010149079 0.013392111
81 0.80 0.9691256 0.009431438 0.010202804 0.013428253
82 0.81 0.9691578 0.009337769 0.010255963 0.013464006
83 0.82 0.9691901 0.009245030 0.010308560 0.013499376
84 0.83 0.9692223 0.009153212 0.010360602 0.013534365
85 0.84 0.9692546 0.009062307 0.010412094 0.013568978
86 0.85 0.9692868 0.008972304 0.010463042 0.013603219
87 0.86 0.9693191 0.008883196 0.010513451 0.013637091

88 0.87 0.9693514 0.008794972 0.010563326 0.013670598
89 0.88 0.9693837 0.008707624 0.010612673 0.013703743
90 0.89 0.9694161 0.008621145 0.010661496 0.013736531
91 0.90 0.9694484 0.008535524 0.010709802 0.013769694
92 0.91 0.9694808 0.008450753 0.010757596 0.013801046
93 0.92 0.9695131 0.008366825 0.010804881 0.013832781
94 0.93 0.9695455 0.008283730 0.010851664 0.013864171
95 0.94 0.9695779 0.008201460 0.010897950 0.013895222
96 0.95 0.9696103 0.008120007 0.010943742 0.013925935
97 0.96 0.9696427 0.008039364 0.010989047 0.013956315
98 0.97 0.9696752 0.007959521 0.011033870 0.013986364
99 0.98 0.9697076 0.007880472 0.011078214 0.014016086
100 0.99 0.9697401 0.007802207 0.011122085 0.014045484
101 1.00 0.9697725 0.007724720 0.011165487 0.014074562
102 1.01 0.9698050 0.007648003 0.011208425 0.014103322
103 1.02 0.9698375 0.007572047 0.011250905 0.014131767
104 1.03 0.9698700 0.007496846 0.011292929 0.014159902
105 1.04 0.9699025 0.007422392 0.011334503 0.014187729
106 1.05 0.9699350 0.007348677 0.011375631 0.014215250
107 1.06 0.9699676 0.007275694 0.011416318 0.014242469
108 1.07 0.9700001 0.007203437 0.011456568 0.014269390
109 1.08 0.9700327 0.007131897 0.011496386 0.014296014
110 1.09 0.9700652 0.007061067 0.011535775 0.014322346
111 1.10 0.9700978 0.006990941 0.011574740 0.014348387
112 1.11 0.9701304 0.006921512 0.011613286 0.014374141
113 1.12 0.9701630 0.006852772 0.011651415 0.014399611
114 1.13 0.9701956 0.006784714 0.011689134 0.014424799
115 1.14 0.9702282 0.006717333 0.011726445 0.014449708
116 1.15 0.9702608 0.006650621 0.011763352 0.014474341

117 1.16 0.9702935 0.006584572 0.011799860 0.014498701
118 1.17 0.9703261 0.006519178 0.011835973 0.014522791
119 1.18 0.9703588 0.006454434 0.011871695 0.014546613
120 1.19 0.9703914 0.006390333 0.011907029 0.014570169
121 1.20 0.9704241 0.006326869 0.011941979 0.014593463
122 1.21 0.9704568 0.006264035 0.011976549 0.014616497
123 1.22 0.9704895 0.006201825 0.012010744 0.014639274
124 1.23 0.9705222 0.006140233 0.012044566 0.014661796
125 1.24 0.9705549 0.006079253 0.012078019 0.014684065
126 1.25 0.9705876 0.006018878 0.012111108 0.014706085
127 1.26 0.9706203 0.005959103 0.012143835 0.014727858
128 1.27 0.9706530 0.005899922 0.012176204 0.014749386
129 1.28 0.9706858 0.005841329 0.012208219 0.014770671
130 1.29 0.9707185 0.005783317 0.012239884 0.014791717
131 1.30 0.9707513 0.005725882 0.012271201 0.014812525
132 1.31 0.9707840 0.005669017 0.012302175 0.014833098
133 1.32 0.9708168 0.005612716 0.012332809 0.014853438
134 1.33 0.9708496 0.005556975 0.012363105 0.014873547
135 1.34 0.9708823 0.005501788 0.012393068 0.014893428
136 1.35 0.9709151 0.005447149 0.012422701 0.014913064
137 1.36 0.9709479 0.005393052 0.012452007 0.014932515
138 1.37 0.9709807 0.005339493 0.012480989 0.014951725
139 1.38 0.9710135 0.005286465 0.012509651 0.014970716
140 1.39 0.9710464 0.005233965 0.012537995 0.014989490
141 1.40 0.9710792 0.005181985 0.012566026 0.015008049
142 1.41 0.9711120 0.005130522 0.012593745 0.015026395
143 1.42 0.9711448 0.005079570 0.012621157 0.015044530
144 1.43 0.9711777 0.005029125 0.012648263 0.015062457
145 1.44 0.9712105 0.004979180 0.012675068 0.015080177
146 1.45 0.9712434 0.004929731 0.012701574 0.015097693



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```

147 1.46 0.9712762 0.004880773 0.012727785 0.015115006
148 1.47 0.9713091 0.004832302 0.012753702 0.015132119
149 1.48 0.9713420 0.004784312 0.012779330 0.015149034
150 1.49 0.9713748 0.004736798 0.012804670 0.015165752
151 1.50 0.9714077 0.004689757 0.012829726 0.015182275
152 1.51 0.9714406 0.004643182 0.012854501 0.015198606
153 1.52 0.9714735 0.004597071 0.012879897 0.015214747
154 1.53 0.9715064 0.004551417 0.012903218 0.015230699
155 1.54 0.9715393 0.004506217 0.012927165 0.015246464
156 1.55 0.9715722 0.004461465 0.012950842 0.015262043
157 1.56 0.9716051 0.004417158 0.012974252 0.015277440
158 1.57 0.9716380 0.004373291 0.012997396 0.015292656
159 1.58 0.9716709 0.004329860 0.013020279 0.015307692
160 1.59 0.9717038 0.004286860 0.013042901 0.015322550
161 1.60 0.9717368 0.004244287 0.013065266 0.015337232
162 1.61 0.9717697 0.004202137 0.013087377 0.015351740
163 1.62 0.9718026 0.004160406 0.013109236 0.015366076
164 1.63 0.9718356 0.004119089 0.013130845 0.015380241
165 1.64 0.9718685 0.004078182 0.013152207 0.015394237
166 1.65 0.9719015 0.004037682 0.013173324 0.015408065
167 1.66 0.9719344 0.003997584 0.013194200 0.015421728
168 1.67 0.9719674 0.003957884 0.013214835 0.015435227
169 1.68 0.9720003 0.003918579 0.013235233 0.015448563
170 1.69 0.9720333 0.003879663 0.013255397 0.015461738
171 1.70 0.9720663 0.003841135 0.013275327 0.015474755
172 1.71 0.9720992 0.003802989 0.013295028 0.015487613
173 1.72 0.9721322 0.003765221 0.013314500 0.015500316
174 1.73 0.9721652 0.003727829 0.013333746 0.015512864
175 1.74 0.9721981 0.003690809 0.013352769 0.015525259
176 1.75 0.9722311 0.003654156 0.013371571 0.015537503
177 1.76 0.9722641 0.003617867 0.013390154 0.015549597
178 1.77 0.9722971 0.003581938 0.013408519 0.015561543
179 1.78 0.9723301 0.003546366 0.013426670 0.015573341
180 1.79 0.9723631 0.003511148 0.013444609 0.015584994
181 1.80 0.9723961 0.003476279 0.013462337 0.015596503
182 1.81 0.9724291 0.003441756 0.013479856 0.015607870
183 1.82 0.9724621 0.003407577 0.013497169 0.015619095
184 1.83 0.9724951 0.003373737 0.013514278 0.015630181
185 1.84 0.9725281 0.003340233 0.013531185 0.015641128
186 1.85 0.9725611 0.003307061 0.013547891 0.015651938
187 1.86 0.9725941 0.003274220 0.013564400 0.015662613
188 1.87 0.9726271 0.003241704 0.013580712 0.015673153
189 1.88 0.9726601 0.003209511 0.013596830 0.015683560
190 1.89 0.9726932 0.003177638 0.013612755 0.015693836
191 1.90 0.9727262 0.003146082 0.013628490 0.015703981
192 1.91 0.9727592 0.003114839 0.013644037 0.015713998
193 1.92 0.9727922 0.003083906 0.013659397 0.015723887
194 1.93 0.9728252 0.003053280 0.013674572 0.015733649
195 1.94 0.9728583 0.003022959 0.013689564 0.015743286
196 1.95 0.9728913 0.002992939 0.013704375 0.015752799
197 1.96 0.9729243 0.002963216 0.013719007 0.015762190
198 1.97 0.9729574 0.002933790 0.013733461 0.015771459
199 1.98 0.9729904 0.002904655 0.013747739 0.015780608
200 1.99 0.9730234 0.002875810 0.013761844 0.015789637
[ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 4801 ]
>

```

```


> View(euler2)
> head(euler2)
      t      S      E      I      It
1 0.00 0.9666190 0.02095900 0.003517000 0.008903000
2 0.01 0.9666492 0.02075083 0.003639226 0.008986016
3 0.02 0.9666794 0.02054473 0.003760204 0.009068178
4 0.03 0.9667096 0.02034068 0.003879947 0.009149495
5 0.04 0.9667399 0.02013866 0.003998468 0.009229975
6 0.05 0.9667702 0.01993864 0.004115777 0.009309627
> tail(euler2)
      t      S      E      I      It
4996 49.95 1.090088 5.018593e-24 0.005559132 0.007506459
4997 49.96 1.090105 4.968882e-24 0.005557943 0.007505181
4998 49.97 1.090122 4.919664e-24 0.005556755 0.007503904
4999 49.98 1.090139 4.870933e-24 0.005555568 0.007502627
5000 49.99 1.090157 4.822685e-24 0.005554380 0.007501351
5001 50.00 1.090174 4.774915e-24 0.005553193 0.007500074
>

```


```

> #plot euler
> library(ggplot2)
> AA<-ggplot(euler2, aes(t,s))+geom_line(aes(color="Susceptible"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIT pada Penyakit Diabetes Mellitus Dengan Metode Euler ", x = "waktu (Tahun)",y = "Jumlah Orang yang
Rentan")+ theme(legend.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.96, 1.1))
> AA
>


```




```
> BB<-ggplot(euler2, aes(t,E)) +geom_line(aes(color = "Exposed"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ",x = "waktu (Tahun)",y = "Jumlah Orang yang laten")+ theme(legend.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0, 0.022))+scale_color_manual(values=c('#FFA500'))
> BB
```



```
> CC<-ggplot(euler2, aes(t,I)) +geom_line(aes(color = "Infection"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "waktu (Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi")+ theme(legend.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.003, 0.015))+scale_color_manual(values=c('#008000'))
> CC
> |
```



```
> DD<-ggplot(euler2, aes(t,It)) +geom_line(aes(color = "infectionwithtreatment"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "waktu (Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi dengan Perawatan")+ theme(legend.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.007, 0.0165))+scale_color_manual(values=c('#0000FF'))
> DD
> |
```



```

> #GALAT
> eulerr_10=euler(f,g,j,k,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.001,0.10)
> eulerr_100=euler(f,g,j,k,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.0001,0.100)
> eulerr_1000=euler(f,g,j,k,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.00001,0.1000)
> eulerr_10000=euler(f,g,j,k,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.000001,0.10000)
> tail(eulerr_10)
      t      S      E      I      It
6  0.005  0.9666341  0.02085512  0.003578542  0.008944803
7  0.006  0.9666371  0.02083441  0.003590813  0.008953138
8  0.007  0.9666401  0.02081372  0.003603071  0.008961465
9  0.008  0.9666431  0.02079304  0.003615317  0.008969783
10 0.009  0.9666462  0.02077239  0.003627550  0.008978092
11 0.010  0.9666492  0.02075176  0.003639771  0.008986392
> tail(eulerr_100)
      t      S      E      I      It
96 0.0095  0.9666477  0.02076216  0.003633714  0.008982279
97 0.0096  0.9666480  0.02076010  0.003634937  0.008983109
98 0.0097  0.9666483  0.02075804  0.003636159  0.008983940
99 0.0098  0.9666486  0.02075598  0.003637381  0.008984770
100 0.0099  0.9666489  0.02075391  0.003638603  0.008985600
101 0.0100  0.9666492  0.02075185  0.003639826  0.008986430
> tail(eulerr_1000)
      t      S      E      I      It
996 0.00995  0.9666490  0.02075289  0.003639220  0.008986019
997 0.00996  0.9666491  0.02075269  0.003639342  0.008986102
998 0.00997  0.9666491  0.02075248  0.003639464  0.008986185
999 0.00998  0.9666491  0.02075227  0.003639587  0.008986268
1000 0.00999  0.9666491  0.02075207  0.003639709  0.008986351
1001 0.01000  0.9666492  0.02075186  0.003639831  0.008986434

> tail(eulerr_10000)
      t      S      E      I      It
9996 0.009995  0.9666492  0.02075197  0.003639770  0.008986393
9997 0.009996  0.9666492  0.02075195  0.003639783  0.008986401
9998 0.009997  0.9666492  0.02075192  0.003639795  0.008986409
9999 0.009998  0.9666492  0.02075190  0.003639807  0.008986418
10000 0.009999  0.9666492  0.02075188  0.003639819  0.008986426
10001 0.010000  0.9666492  0.02075186  0.003639832  0.008986434
    
```

2. Output Penyelesaian Model SEI_T Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Heun

```
> #PENYELESAIAN MODEL SEIIT PADA PENYAKIT DIABETES MELLITUS DENGAN MENGGUNAKAN METODE HEUN
> heun<-function(f,g,j,k,s0,E0,I0,It0,h,t0,n){
+   t<-t0
+   S<-S0
+   E<-E0
+   I<-I0
+   It<-It0
+   for(i in 1:n){
+     Se<-S0-h*f(s0,E0,I0,It0)
+     Ee<-E0-h*g(s0,E0,I0,It0)
+     Ie<-I0-h*j(s0,E0,I0,It0)
+     Ite<-It0-h*k(s0,E0,I0,It0)
+
+     S0<-S0+(h/2)*f(s0,E0,I0,It0)+f(Se,Ee,Ie,Ite)
+     E0<-E0-(h/2)*g(s0,E0,I0,It0)+g(Se,Ee,Ie,Ite)
+     I0<-I0-(h/2)*j(s0,E0,I0,It0)+j(Se,Ee,Ie,Ite)
+     It0<-It0+(h/2)*k(s0,E0,I0,It0)+k(Se,Ee,Ie,Ite)
+
+     t0<-t0+h
+     t<-c(t,t0)
+     S<-c(S,S0)
+     E<-c(E,E0)
+     I<-c(I,I0)
+     It<-c(It,It0)
+   }
+   return(data.frame(x=t,S=S,E=E,I=I,It=It))
+ }
> f=function(s,E,I,It) {(0.017152-0.014170*s-0.021682*s*e)}
> g=function(s,E,I,It) {(0.021682*s*e-1.014170*e)}
> j=function(s,E,I,It) {(0.5926396*e-0.021*I)}
```

```
> k=function(s,E,I,It) {(0.407361*e-0.011324*It)}
> heun(f, g, j, k, 0.966619, 0.020959, 0.003517, 0.008903, 0.01, 0, 5000)
      x      g      j      k      S      E      I      It
1  0.00  0.9666190  0.020959000  0.003517000  0.008903000
2  0.01  0.9666492  0.020751867  0.003639229  0.008986520
3  0.02  0.9666794  0.020546780  0.003760217  0.009069195
4  0.03  0.9667096  0.020343721  0.003879977  0.009151034
5  0.04  0.9667399  0.020142669  0.003998520  0.009232044
6  0.05  0.9667703  0.019943604  0.004115589  0.009312235
7  0.06  0.9668006  0.019746506  0.004232005  0.009391613
8  0.07  0.9668310  0.019551356  0.004346970  0.009470188
9  0.08  0.9668615  0.019358135  0.004460766  0.009547966
10 0.09  0.9668920  0.019166824  0.004573405  0.009624957
11 0.10  0.9669225  0.018977403  0.004684897  0.009701167
12 0.11  0.9669530  0.018789855  0.004795255  0.009776605
13 0.12  0.9669836  0.018604160  0.004904490  0.009851278
14 0.13  0.9670142  0.018420301  0.005012611  0.009925193
15 0.14  0.9670449  0.018238258  0.005119632  0.009998359
```

```
16 0.15 0.9670755 0.018058015 0.005225562 0.010070782
17 0.16 0.9671063 0.017879553 0.005330412 0.010142470
18 0.17 0.9671370 0.017702855 0.005434193 0.010213430
19 0.18 0.9671678 0.017527904 0.005536916 0.010283670
20 0.19 0.9671986 0.017354681 0.005638590 0.010353196
21 0.20 0.9672294 0.017183171 0.005739227 0.010422015
22 0.21 0.9672603 0.017013356 0.005838837 0.010490135
23 0.22 0.9672912 0.016845219 0.005937429 0.010557562
24 0.23 0.9673222 0.016678743 0.006035014 0.010624304
25 0.24 0.9673531 0.016513913 0.006131602 0.010690367
26 0.25 0.9673841 0.016350712 0.006227203 0.010755757
27 0.26 0.9674152 0.016189124 0.006321826 0.010820482
28 0.27 0.9674462 0.016029134 0.006415481 0.010884548
29 0.28 0.9674773 0.015870724 0.006508178 0.010947961
30 0.29 0.9675084 0.015713880 0.006599926 0.011010729
31 0.30 0.9675395 0.015558586 0.006690734 0.011072856
32 0.31 0.9675707 0.015404827 0.006780612 0.011134350
33 0.32 0.9676019 0.015252587 0.006869570 0.011195218
34 0.33 0.9676331 0.015101852 0.006957615 0.011255464
35 0.34 0.9676644 0.014952607 0.007044758 0.011315096
36 0.35 0.9676957 0.014804837 0.007131006 0.011374119
37 0.36 0.9677270 0.014658528 0.007216370 0.011432539
38 0.37 0.9677583 0.014513664 0.007300857 0.011490362
39 0.38 0.9677897 0.014370232 0.007384476 0.011547595
40 0.39 0.9678210 0.014228218 0.007467237 0.011604243
41 0.40 0.9678524 0.014087607 0.007549147 0.011660312
42 0.41 0.9678839 0.013948386 0.007630214 0.011715807
43 0.42 0.9679153 0.013810541 0.007710448 0.011770735
44 0.43 0.9679468 0.013674058 0.007789856 0.011825100
96 0.95 0.9696109 0.008158525 0.010960783 0.013999530
97 0.96 0.9696433 0.008077901 0.011006348 0.014030848
98 0.97 0.9696757 0.007998074 0.011051430 0.014061838
99 0.98 0.9697082 0.007919036 0.011096035 0.014092502
100 0.99 0.9697406 0.007840779 0.011140166 0.014122844
101 1.00 0.9697731 0.007763296 0.011183829 0.014152866
102 1.01 0.9698056 0.007686578 0.011227029 0.014182573
103 1.02 0.9698381 0.007610618 0.011269769 0.014211968
104 1.03 0.9698706 0.007535410 0.011312055 0.014241052
105 1.04 0.9699031 0.007460944 0.011353890 0.014269830
106 1.05 0.9699356 0.007387214 0.011395280 0.014298304
107 1.06 0.9699681 0.007314213 0.011436228 0.014326478
108 1.07 0.9700007 0.007241934 0.011476740 0.014354354
109 1.08 0.9700332 0.007170369 0.011516819 0.014381936
110 1.09 0.9700658 0.007099511 0.011556470 0.014409226
111 1.10 0.9700984 0.007029353 0.011595696 0.014436226
112 1.11 0.9701309 0.006959889 0.011634503 0.014462941
113 1.12 0.9701635 0.006891111 0.011672894 0.014489373
114 1.13 0.9701961 0.006823013 0.011710874 0.014515524
115 1.14 0.9702288 0.006755587 0.011748446 0.014541398
116 1.15 0.9702614 0.006688829 0.011785614 0.014566997
117 1.16 0.9702940 0.006622730 0.011822383 0.014592324
118 1.17 0.9703266 0.006557284 0.011858757 0.014617381
119 1.18 0.9703593 0.006492485 0.011894739 0.014642171
120 1.19 0.9703920 0.006428326 0.011930333 0.014666698
121 1.20 0.9704246 0.006364802 0.011965543 0.014690963
122 1.21 0.9704573 0.006301905 0.012000373 0.014714969
123 1.22 0.9704900 0.006239630 0.012034827 0.014738718
124 1.23 0.9705227 0.006177970 0.012068909 0.014762214
125 1.24 0.9705554 0.006116913 0.012102621 0.014785458
```



Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

```

45 0.44 0.9679783 0.013538924 0.007868447 0.011878909
46 0.45 0.9680098 0.013405126 0.007946229 0.011932166
47 0.46 0.9680414 0.013272650 0.008023209 0.011984878
48 0.47 0.9680730 0.013141483 0.008099396 0.012037050
49 0.48 0.9681046 0.013011613 0.008174797 0.012088687
50 0.49 0.9681362 0.012883026 0.008249420 0.012139794
51 0.50 0.9681678 0.012755710 0.008323273 0.012190377
52 0.51 0.9681995 0.012629652 0.008396364 0.012240441
53 0.52 0.9682312 0.012504840 0.008468700 0.012289991
54 0.53 0.9682629 0.012381262 0.008540289 0.012339031
55 0.54 0.9682946 0.012258905 0.008611137 0.012387588
56 0.55 0.9683264 0.012137757 0.008681252 0.012435606
57 0.56 0.9683581 0.012017807 0.008750643 0.012483149
58 0.57 0.9683899 0.011899042 0.008819314 0.012530204
59 0.58 0.9684217 0.011781450 0.008887275 0.012576774
60 0.59 0.9684536 0.011665021 0.008954531 0.012622865
61 0.60 0.9684854 0.011549743 0.009021090 0.012668481
62 0.61 0.9685173 0.011435604 0.009086959 0.012713627
63 0.62 0.9685492 0.011322593 0.009152144 0.012758307
64 0.63 0.9685811 0.011210699 0.009216553 0.012802527
65 0.64 0.9686130 0.011099911 0.009280492 0.012846290
66 0.65 0.9686450 0.010990217 0.009343667 0.012889602
67 0.66 0.9686769 0.010881608 0.009406185 0.012932466
68 0.67 0.9687089 0.010774072 0.009468053 0.012974887
69 0.68 0.9687409 0.010667599 0.009529277 0.013016870
70 0.69 0.9687729 0.010562179 0.009589864 0.013058419
71 0.70 0.9688050 0.010457800 0.009649819 0.013099538
72 0.71 0.9688370 0.010354452 0.009709149 0.013140231
73 0.72 0.9688691 0.010252127 0.00976861 0.013180503
126 1.25 0.9705881 0.006056472 0.012135968 0.014808453
127 1.26 0.9706208 0.005996623 0.012168953 0.014831203
128 1.27 0.9706535 0.005937365 0.012201581 0.014853708
129 1.28 0.9706863 0.005878692 0.012233854 0.014876213
130 1.29 0.9707190 0.005820599 0.012266575 0.014898718
131 1.30 0.9707517 0.005763081 0.012299350 0.014921223
132 1.31 0.9707845 0.005706130 0.012332580 0.014943728
133 1.32 0.9708173 0.005649743 0.012365969 0.014966233
134 1.33 0.9708500 0.005593913 0.012399021 0.014988738
135 1.34 0.9708828 0.005538635 0.012432040 0.015011243
136 1.35 0.9709156 0.005483903 0.012465012 0.015033748
137 1.36 0.9709484 0.005429711 0.012497687 0.015056253
138 1.37 0.9709812 0.005376056 0.012530823 0.015078758
139 1.38 0.9710140 0.005322930 0.012563738 0.015101263
140 1.39 0.9710468 0.005270330 0.012596436 0.015123768
141 1.40 0.9710796 0.005218249 0.012629418 0.015146273
142 1.41 0.9711124 0.005166684 0.012662269 0.015168778
143 1.42 0.9711453 0.005115627 0.012695052 0.015191283
144 1.43 0.9711781 0.005065076 0.012727710 0.015213788
145 1.44 0.9712109 0.005015024 0.012760465 0.015236293
146 1.45 0.9712438 0.004965466 0.012793152 0.015258798
147 1.46 0.9712766 0.004916398 0.012825980 0.015281303
148 1.47 0.9713095 0.004867816 0.012858416 0.015303808
149 1.48 0.9713424 0.004819713 0.012891001 0.015326313
150 1.49 0.9713752 0.004772086 0.012923569 0.015348818
151 1.50 0.9714081 0.004724929 0.012956091 0.015371323
152 1.51 0.9714410 0.004678238 0.012988593 0.015393828
153 1.52 0.9714739 0.004632009 0.012910675 0.015416333
154 1.53 0.9715067 0.004586237 0.012933140 0.015438838

```

```

74 0.73 0.9689012 0.010150812 0.009825960 0.013220357
75 0.74 0.9689333 0.010050499 0.009883452 0.013259799
76 0.75 0.9689654 0.009951177 0.009940343 0.013298831
77 0.76 0.9689975 0.009852836 0.009996640 0.013337459
78 0.77 0.9690297 0.009755468 0.010052348 0.013375685
79 0.78 0.9690618 0.009659062 0.010107473 0.013413515
80 0.79 0.9690940 0.009563608 0.010162021 0.013450951
81 0.80 0.9691262 0.009468098 0.010216598 0.013487938
82 0.81 0.9691584 0.009375522 0.010269409 0.013524660
83 0.82 0.9691907 0.009282871 0.010322259 0.013560940
84 0.83 0.9692229 0.009191136 0.010375455 0.013596843
85 0.84 0.9692552 0.009100307 0.010426301 0.013632371
86 0.85 0.9692874 0.009010375 0.010477504 0.013667529
87 0.86 0.9693197 0.008921333 0.010528168 0.013702321
88 0.87 0.9693520 0.008833170 0.010578300 0.013736749
89 0.88 0.9693843 0.008745879 0.010627903 0.013770818
90 0.89 0.9694167 0.008659451 0.010676984 0.013804531
91 0.90 0.9694490 0.008573877 0.010725548 0.013837892
92 0.91 0.9694813 0.008489148 0.010773599 0.013870903
93 0.92 0.9695137 0.008405257 0.010821143 0.013903570
94 0.93 0.9695461 0.008322195 0.010868185 0.013935894
95 0.94 0.9695785 0.008239953 0.010914730 0.013967879
155 1.54 0.9715396 0.004540917 0.012959332 0.015377411
156 1.55 0.9715725 0.004496045 0.012983252 0.015399383
157 1.56 0.9716054 0.004451616 0.013006905 0.015421355
158 1.57 0.9716384 0.004407626 0.013030292 0.015443327
159 1.58 0.9716713 0.004364072 0.013053415 0.015465300
160 1.59 0.9717042 0.004320947 0.013076279 0.015487273
161 1.60 0.9717371 0.004278249 0.013098884 0.015509246
162 1.61 0.9717700 0.004235972 0.013121235 0.015531219
163 1.62 0.9718030 0.004194114 0.013143332 0.015553200
164 1.63 0.9718359 0.004152669 0.013165179 0.015575181
165 1.64 0.9718688 0.004111634 0.013186779 0.015597162
166 1.65 0.9719018 0.004071004 0.013208133 0.015619143
167 1.66 0.9719347 0.004030376 0.013229245 0.015641124
168 1.67 0.9719677 0.003989945 0.013250116 0.015663105
169 1.68 0.9720006 0.003949508 0.013270749 0.015685086
170 1.69 0.9720336 0.003912461 0.013291146 0.015707067
171 1.70 0.9720665 0.003873799 0.013311310 0.015729048
172 1.71 0.9720995 0.003835520 0.013331242 0.015751029
173 1.72 0.9721325 0.003797619 0.013350946 0.015773010
174 1.73 0.9721654 0.003760092 0.013370424 0.015794991
175 1.74 0.9721984 0.003722936 0.013389677 0.015816972
176 1.75 0.9722314 0.003686148 0.013408708 0.015838953
177 1.76 0.9722644 0.003649723 0.013427520 0.015860934
178 1.77 0.9722973 0.003613658 0.013446113 0.015882915
179 1.78 0.9723303 0.003577949 0.013464491 0.015904896
180 1.79 0.9723633 0.003542594 0.013482656 0.015926877

```

```

181 1.80 0.9723963 0.003507587 0.013500610 0.015948857
182 1.81 0.9724293 0.003472927 0.013518354 0.015970838
183 1.82 0.9724623 0.003438609 0.013535892 0.015992819
184 1.83 0.9724953 0.003404630 0.013553224 0.016014800
185 1.84 0.9725283 0.003370987 0.013570353 0.016036781
186 1.85 0.9725613 0.003337677 0.013587281 0.016058762
187 1.86 0.9725943 0.003304696 0.013604011 0.016080743
188 1.87 0.9726273 0.003272040 0.013620543 0.016102724
189 1.88 0.9726603 0.003239707 0.013636880 0.016124705
190 1.89 0.9726933 0.003207694 0.013653025 0.016146686
191 1.90 0.9727264 0.003175998 0.013668977 0.016168667
192 1.91 0.9727594 0.003144614 0.013684741 0.016190648
193 1.92 0.9727924 0.003113541 0.013700317 0.016212629
194 1.93 0.9728254 0.003082774 0.013715708 0.016234610
195 1.94 0.9728584 0.003052312 0.013730915 0.016256591
196 1.95 0.9728914 0.003022151 0.013745940 0.016278572
197 1.96 0.9729245 0.002992288 0.013760784 0.016300553
198 1.97 0.9729575 0.002962719 0.013775451 0.016322534
199 1.98 0.9729905 0.002933444 0.013789941 0.016344515
200 1.99 0.9730236 0.002904457 0.013804256 0.016366496


```

[reached 'max' / getopt("max.print") -- omitted 4801 rows]


EGERI
DIN
AR

```
> View(Heun2)
> head(Heun2)
      x          S          E          I          It
1 0.00 0.9666190 0.02095900 0.003517000 0.008903000
2 0.01 0.9666492 0.02075187 0.003639229 0.008986520
3 0.02 0.9666794 0.02054678 0.003760217 0.009069195
4 0.03 0.9667096 0.02034372 0.003879977 0.009151034
5 0.04 0.9667399 0.02014267 0.003998520 0.009232044
6 0.05 0.9667703 0.01994360 0.004115859 0.009312235
> tail(Heun2)
      x          S          E          I          It
4996 49.95 1.090082 6.431653e-24 0.005685683 0.009971703
4997 49.96 1.090099 6.368260e-24 0.005684489 0.009970574
4998 49.97 1.090116 6.305493e-24 0.005683295 0.009969445
4999 49.98 1.090133 6.243344e-24 0.005682102 0.009968316
5000 49.99 1.090150 6.181808e-24 0.005680909 0.009967188
5001 50.00 1.090168 6.120879e-24 0.005679716 0.009966059
```

```
> #Plot Heun
> library(ggplot2)
> AA<-ggplot(Heun2, aes(x,s))+geom_line(aes(color="susceptible"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "waktu (Tahun)", y = "Jumlah Orang yang Rentan")
+ theme(legend.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.96, 1.1))
> AA
```




```
> BB<-ggplot(Heun2, aes(x,E)) +geom_line(aes(color = "Exposed"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "waktu (Tahun)", y = "Jumlah Orang yang laten")+ theme(leg
d.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0, 0.022))+scale_color_manual(values=c('#FFA500'))
> BB
```




```
> CC<-ggplot(Heun2, aes(x,I)) +geom_line(aes(color = "Infection"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "waktu (Tahun)", y = "Jumlah Orang yang terinfeksi")+ theme(leg
end.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.003, 0.016))+scale_color_manual(values=c('#008000'))
> CC
```

Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus



```
> DO<-ggplot(Heun2, aes(x,It)) +geom_line(aes(color = "InfectionwithTreatment"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu (Tahun)", y = "Jumlah Orang yang terinfeksi dengan Perawatan")
+ theme(legend,position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.0085, 0.017))+scale_color_manual(values=c('#0000FF'))
> DO
```

Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus



```
> #GALAT
> Heun_10=heun(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.001,10)
> Heun_100=heun(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.0001,100)
> Heun_1000=heun(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.00001,1000)
> Heun_10000=heun(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.000001,10000)
> tail(Heun_10)
      x          S          E          I          It
6  0.045515 0.0007629354 0.9239516 0.04574848 0.02057187
7  0.054418 0.0009153848 0.9156469 0.05057057 0.02389037
8  0.063321 0.0010677896 0.9074169 0.05534834 0.02717868
9  0.072224 0.0012201501 0.8992609 0.06008220 0.03043709
10 0.081127 0.0013724668 0.8911782 0.06477252 0.03366586
11 0.090030 0.0015247403 0.8831682 0.06941971 0.03686525
> tail(Heun_100)
      x          S          E          I          It
96 0.845885 0.01434707 0.4100093 0.3411636 0.2248647
97 0.854788 0.01449682 0.4063251 0.3432434 0.2263155
98 0.863691 0.01464655 0.4026740 0.3453036 0.2277530
99 0.872594 0.01479625 0.3990557 0.3473444 0.2291772
100 0.881497 0.01494594 0.3954700 0.3493658 0.2305883
101 0.890400 0.01509561 0.3919165 0.3513681 0.2319863
> tail(Heun_1000)
      x          S          E          I          It
996 8.858495 0.1424804 0.0001229327 0.4942290 0.3568264
997 8.867398 0.1426151 0.0001218311 0.4941373 0.3567908
998 8.876301 0.1427498 0.0001207394 0.4940455 0.3567553
999 8.885204 0.1428845 0.0001196574 0.4939538 0.3567198
1000 8.894107 0.1430192 0.0001185851 0.4938621 0.3566842
1001 8.903010 0.1431538 0.0001175225 0.4937704 0.3566487
> tail(Heun_10000)
      x          S          E          I          It
9996 88.98549 0.8673143 1.698110e-39 0.09187971 0.1440313
9997 88.99439 0.8673576 1.683128e-39 0.09186254 0.1440168
9998 89.00329 0.8674009 1.668279e-39 0.09184536 0.1440023
9999 89.01219 0.8674441 1.653561e-39 0.09182819 0.1439878
10000 89.02110 0.8674874 1.638972e-39 0.09181103 0.1439733
10001 89.03000 0.8675307 1.624513e-39 0.09179386 0.1439588
>
```

- Output Penyelesaian Model SEIIt Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Runge-Kutta orde 4

```

> rm(list=ls(all=TRUE))
> Rungekutta4<-function(f,g,j,k,t0,S0,E0,I0,It0,At,n){
+   t=t0
+   S=S0
+   E=E0
+   I=I0
+   It=It0
+
+   for(i in 1:n){
+     k1=f(t0,S0,E0,I0,It0)
+     l1=g(t0,S0,E0,I0,It0)
+     m1=j(t0,S0,E0,I0,It0)
+     n1=k(t0,S0,E0,I0,It0)
+
+     k2=f(t0,S0-0.5*k1,E0+0.5*l1,I0+0.5*m1,It0-0.5*n1)
+     l2=g(t0,S0-0.5*k1,E0+0.5*l1,I0+0.5*m1,It0-0.5*n1)
+     m2=j(t0,S0-0.5*k1,E0+0.5*l1,I0+0.5*m1,It0-0.5*n1)
+     n2=k(t0,S0-0.5*k1,E0+0.5*l1,I0+0.5*m1,It0-0.5*n1)
+
+     k3=f(t0,S0-0.5*k2,E0+0.5*l2,I0+0.5*m2,It0-0.5*n2)
+     l3=g(t0,S0-0.5*k2,E0+0.5*l2,I0+0.5*m2,It0-0.5*n2)
+     m3=j(t0,S0-0.5*k2,E0+0.5*l2,I0+0.5*m2,It0-0.5*n2)
+     n3=k(t0,S0-0.5*k2,E0+0.5*l2,I0+0.5*m2,It0-0.5*n2)
+
+     k4=f(t0,S0+k3,E0+l3,I0+m3,It0+n3)
+     l4=g(t0,S0+k3,E0+l3,I0+m3,It0+n3)
+     m4=j(t0,S0+k3,E0+l3,I0+m3,It0+n3)
+     n4=k(t0,S0+k3,E0+l3,I0+m3,It0+n3)
+
+     S0=S0+(1/6)*At*(k1-(2*k2)+(2*k3)+k4)
+     E0=E0+(1/6)*At*(l1-(2*l2)+(2*l3)+l4)
+     I0=I0+(1/6)*At*(m1-(2*m2)+(2*m3)+m4)
+     It0=It0+(1/6)*At*(n1-(2*n2)+(2*n3)+n4)
+
+     t0=t0+At
+     t=c(t,t0)
+     S=c(S,S0)
+     E=c(E,E0)
+     I=c(I,I0)
+     It=c(It,It0)
+   }
+   return(data.frame(x=t, S=S, E=E, I=I, It=It))
+ }
> f=function(t,S,E,I,It){(0.017152-0.014170*S-0.021682*S^2)}
> g=function(t,S,E,I,It){(0.021682*S^2-E-1.014170*I)}
> j=function(t,S,E,I,It){(0.5926396*I-E-0.021376*I)}
> k=function(t,S,E,I,It){(0.407381*I-E-0.017016*I)}
> Rungekutta4(f,g,j,k,0.0,966619, 0.020959, 0.003517, 0.008903,0.01,5000)
  x      S      E      I      It
1  0.00 0.9666190 0.020959000 0.003517000 0.008903000
2  0.01 0.9666506 0.020828485 0.003593145 0.008954487
3  0.02 0.9666822 0.020698783 0.003668795 0.009005635
4  0.03 0.9667138 0.020569889 0.003743954 0.009056447
5  0.04 0.9667454 0.020441798 0.003818623 0.009106924
6  0.05 0.9667770 0.020314504 0.003892807 0.009157069
7  0.06 0.9668086 0.020188003 0.003966508 0.009206883
8  0.07 0.9668403 0.020062289 0.004039730 0.009256369
9  0.08 0.9668719 0.019937359 0.004112475 0.009305530

10 0.09 0.9669036 0.019813207 0.004184746 0.009354366
11 0.10 0.9669353 0.019689827 0.004256547 0.009402880
12 0.11 0.9669670 0.019567216 0.004327880 0.009451074
13 0.12 0.9669987 0.019445369 0.004398748 0.009498949
14 0.13 0.9670304 0.019324280 0.004469154 0.009546509
15 0.14 0.9670621 0.019203946 0.004539101 0.009593754
16 0.15 0.9670938 0.019084361 0.004608591 0.009640688
17 0.16 0.9671256 0.018965521 0.004677629 0.009687311
18 0.17 0.9671574 0.018847420 0.004746216 0.009733625
19 0.18 0.9671891 0.018730055 0.004814355 0.009779634
20 0.19 0.9672209 0.018613421 0.004882049 0.009825338
21 0.20 0.9672527 0.018497514 0.004949301 0.009870739
22 0.21 0.9672845 0.018382328 0.005016113 0.009915840
23 0.22 0.9673163 0.018267860 0.005082489 0.009960641
24 0.23 0.9673481 0.018154104 0.005148431 0.010005146
25 0.24 0.9673800 0.018041057 0.005213941 0.010049356
26 0.25 0.9674118 0.017928713 0.005279023 0.010093273
27 0.26 0.9674437 0.017817070 0.005343680 0.010136898
28 0.27 0.9674755 0.017706121 0.005407913 0.010180233
29 0.28 0.9675074 0.017595864 0.005471725 0.010223281
30 0.29 0.9675393 0.017486293 0.005535119 0.010266043
31 0.30 0.9675712 0.017377405 0.005598098 0.010308520
32 0.31 0.9676031 0.017269194 0.005660665 0.010350715
33 0.32 0.9676350 0.017161658 0.005722821 0.010392629
34 0.33 0.9676669 0.017054791 0.005784569 0.010434265
35 0.34 0.9676988 0.016948590 0.005845913 0.010475623
36 0.35 0.9677308 0.016843050 0.005906854 0.010516706
37 0.36 0.9677627 0.016738167 0.005967394 0.010557515
38 0.37 0.9677947 0.016633938 0.006027538 0.010598052

```




Kampus II : Jalan Sultan Alauddin

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Table with 6 columns of numerical data, rows 39-67.

Table with 6 columns of numerical data, rows 127-156.

Table with 6 columns of numerical data, rows 68-97.


Table with 6 columns of numerical data, rows 157-186.

Table with 6 columns of numerical data, rows 98-126.


Table with 6 columns of numerical data, rows 187-200, ending with a message: [reached 'max' / getOption("max.print")] -- omitted 4801 rows]

```
> View(RK44)
> head(RK44)
  x      S      E      I      It
1 0.00 0.9666190 0.02095900 0.003517000 0.008903000
2 0.01 0.9666306 0.02082849 0.003593145 0.008954487
3 0.02 0.9666822 0.02069878 0.003668795 0.009005635
4 0.03 0.9667138 0.02056989 0.003743954 0.009056447
5 0.04 0.9667454 0.02044180 0.003818623 0.009106924
6 0.05 0.9667770 0.02031450 0.003892807 0.009157069
> tail(RK44)
  x      S      E      I      It
4996 49.95 1.089485 6.045710e-16 0.005666959 0.007598310
4997 49.96 1.089502 6.008116e-16 0.005665760 0.007597028
4998 49.97 1.089519 5.970756e-16 0.005664562 0.007595746
4999 49.98 1.089536 5.933629e-16 0.005663364 0.007594465
5000 49.99 1.089553 5.896733e-16 0.005662166 0.007593183
5001 50.00 1.089570 5.860066e-16 0.005660969 0.007591902
```


```
> library(ggplot2)
> AA<-ggplot(RK44, aes(x,S))+geom_line(aes(color="susceptible"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "waktu (Tahun)", y = "Jumlah Orang yang Rentan")
+ theme(legend.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.96, 1.09))
> AA
```




```
> BB<-ggplot(RK44, aes(x,E)) +geom_line(aes(color = "Exposed"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "waktu (Tahun)", y = "Jumlah orang yang laten") + theme(leg
d.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0, 0.022))+scale_color_manual(values=c('#FFA500'))
> BB
```



```
> CC<-ggplot(RK44, aes(x,I)) +geom_line(aes(color = "infection"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "waktu (Tahun)", y = "Jumlah Orang yang terinfeksi")+ theme(leg
end.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.003, 0.015))+scale_color_manual(values=c('#008000'))
> CC
> |
```



```
> DO<-ggplot(RK44, aes(x,t)) +geom_line(aes(color = "InfectionwithTreatment"))+ labs(colour = "")+
+ labs(title = "Model SEIIt Pada Penyakit Diabetes Melitus ", x = "Waktu (Tahun)",y = "Jumlah Orang yang terinfeksi dengan Pe
rawatan")+ theme(legend.position = "right")+
+ coord_cartesian(ylim = c(0.0075, 0.016))+scale_color_manual(values=c('#0000FF'))
> DO
```



```
> #GALAT
> RK4_10=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.001,10)
> RK4_100=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.0001,100)
> RK4_1000=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.00001,1000)
> RK4_10000=Rungekutta4(f,g,j,k,0,0.966619,0.020959,0.003517,0.008903,0.000001,10000)
> tail(RK4_10)
      x      S      E      I      It
6  0.005 0.9666348 0.02089382 0.003555023 0.008928710
7  0.006 0.9666379 0.02088081 0.003562613 0.008933841
8  0.007 0.9666411 0.02086781 0.003570198 0.008938970
9  0.008 0.9666443 0.02085482 0.003577778 0.008944095
10 0.009 0.9666474 0.02084183 0.003585353 0.008949216
11 0.010 0.9666506 0.02082885 0.003592923 0.008954335
> tail(RK4_100)
      x      S      E      I      It
96 0.0095 0.9666490 0.02083537 0.003589117 0.008951762
97 0.0096 0.9666493 0.02083408 0.003589874 0.008952273
98 0.0097 0.9666496 0.02083278 0.003590631 0.008952785
99 0.0098 0.9666499 0.02083148 0.003591387 0.008953296
100 0.0099 0.9666503 0.02083018 0.003592144 0.008953808
101 0.0100 0.9666506 0.02082889 0.003592901 0.008954319
> tail(RK4_1000)
      x      S      E      I      It
96 0.00095 0.9666220 0.02094660 0.003524232 0.008907890
97 0.00096 0.9666220 0.02094647 0.003524308 0.008907941
98 0.00097 0.9666221 0.02094634 0.003524384 0.008907993
99 0.00098 0.9666221 0.02094621 0.003524460 0.008908044
100 0.00099 0.9666221 0.02094608 0.003524536 0.008908096
101 0.00100 0.9666222 0.02094595 0.003524612 0.008908147
> tail(RK4_10000)
      x      S      E      I      It
9996 0.009995 0.9666506 0.02082896 0.003592860 0.008954292
9997 0.009996 0.9666506 0.02082894 0.003592868 0.008954297
9998 0.009997 0.9666506 0.02082893 0.003592875 0.008954302
9999 0.009998 0.9666506 0.02082892 0.003592883 0.008954308
10000 0.009999 0.9666506 0.02082890 0.003592891 0.008954313
10001 0.010000 0.9666506 0.02082889 0.003592898 0.008954318
> |
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R