

**HUBUNGAN STATUS GIZI DAN KELENGKAPAN IMUNISASI DENGAN
KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT PADA BALITA DI
PUSKESMAS MINASA UPA KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR KHAIRIYAH

NIM: 70600120008

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama : Nur Khairiyah

NIM : 70600120008

Tempat/Tgl Lahir : Pare-Pare/30 Agustus 2001

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Bau Masepe No. 215, Parepare

Judul : Hubungan Status Gizi dan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Februari 2024

Penyusun



Nur Khairiyah

NIM: 70600120008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Status Gizi dan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022" yang disusun oleh Nur Khairiyah, NIM 70600120008, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 Februari 2024, bertepatan dengan 9 Sha'ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 19 Februari 2024

9 Sha'ban 1445 Hijriah


1965
DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes | (.....) |
| Sekretaris | : dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed | (.....) |
| Pembimbing I | : dr. Saharuddin, M. Kes | (.....) |
| Pembimbing II | : dr. Rini Fitriani, M. Kes | (.....) |
| Penguji I | : dr. Asrul Abdul Azis, Sp. P | (.....) |
| Penguji II | : Prof. Dr. Abd Rahman, M. Ag | (.....) |

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan Status Gizi dan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita”**. Shalawat serta salam tiada henti kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi Rahmatan Lil'alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian hasil ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orang tua, Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Hadidah, saudara/i penulis Hasbi Ash Shiddieqy, Nur Hamidah, Sofyan Ash Shiddieqy dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku

Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. dr. Saharuddin, M.Kes. dan dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku dosen pembimbing penelitian yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, motivasi, bimbingan, dan pemberian informasi yang tepat.
5. dr. Asrul Abdul Azis, Sp.P. selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. Abd. Rahman, M. Ag. selaku penguji integrasi keislaman, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat dan rekan kuliah saya (Nisa, Taty, Cica, Andis, Muti, Cece, Chusnul, Mumtaz, Evi, Nada, Awi) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman Aponeu20sis (Pendidikan Dokter Angkatan 2020) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 19 Februari 2023
Penyusun,





Nur Khairiyah
NIM: 70600120008

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| SAMPUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR BAGAN..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Hipotesis..... | 4 |
| D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 5 |
| E. Kajian Pustaka..... | 8 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS..... | 15 |
| A. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)..... | 15 |
| B. Status Gizi..... | 23 |
| C. Kelengkapan Imunisasi..... | 27 |
| D. Integrasi Keislaman..... | 31 |
| E. Kerangka Teori..... | 37 |
| F. Kerangka Konsep..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 39 |
| A. Desain Penelitian..... | 39 |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 39 |
| C. Variabel Penelitian..... | 39 |
| D. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 39 |
| E. Teknik Pengambilan Sampel..... | 41 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 41 |

| | |
|--|----|
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 41 |
| H. Alur Penelitian | 43 |
| I. Penyajian Data | 45 |
| J. Etika Penelitian..... | 45 |
| BAB IV | 47 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Hasil | 47 |
| B. Pembahasan..... | 51 |
| C. Keterbatasan..... | 59 |
| PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 60 |
| KEPUSTAKAAN | 62 |
| LAMPIRAN | 67 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 81 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Definisi Operasional | 5 |
| Tabel 2. Kajian Pustaka..... | 8 |
| Tabel 3. Klasifikasi Status Gizi..... | 24 |
| Tabel 4. Distribusi Karakteristik dan Variabel Sampel Penelitian | 47 |
| Tabel 5. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian ISPA pada Balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar | 49 |
| Tabel 6. Hubungan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian ISPA di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar | 50 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| Bagan 1 Kerangka Teori..... | 37 |
| Bagan 2 Kerangka Konsep..... | 38 |
| Bagan 3 Alur Penelitian | 44 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Anatomi Sistem Pernapasan..... 15



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1: Etik Penelitian | 67 |
| Lampiran 2: Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi | 68 |
| Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian DPM-PTSP Kota | 69 |
| Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota | 70 |
| Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Meneliti | 70 |
| Lampiran 6: Master Tabel | 72 |
| Lampiran 7: Hasil SPSS | 77 |
| Lampiran 8: Dokumentasi | 80 |



Hubungan Status Gizi dan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita

NUR KHAIRIYAH¹, SAHARUDDIN², RINI FITRIANI³, ASRUL ABDUL AZIS⁴, ABD RAHMAN⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁵Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email penulis korespondensi: nurkhaiyahlia@gmail.com

Abstrak

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tetap menjadi isu utama dalam bidang kesehatan di Indonesia dengan kunjungan 40%-60% di puskesmas dan 15-30% di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara status gizi dan kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data dianalisis menggunakan prosedur observasi analitis dengan desain *cross-sectional*. Pendekatan ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar dengan sampel balita (12-59 bulan) sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Sumber data berasal dari rekam medik dan buku data registrasi imunisasi puskesmas. Analisis menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara status gizi terhadap kejadian infeksi saluran pernapasan akut pada balita ($p=0,000$; $PR=10,000$; $95\% CI= 3,192-$

31,331) dan terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara status gizi terhadap kejadian infeksi saluran pernapasan akut pada balita ($p=0,002$ PR=4,114 ;95% CI= 1.591-10.638).

Kata kunci : ISPA, balita, status gizi, kelengkapan imunisasi



**Relationship between Nutritional Status and Completeness of
Immunization With The Incidence Of Acute Respiratory Infections In
Toddlers**

NUR KHAIRIYAH¹, SAHARUDDIN², RINI FITRIANI³, ASRUL ABDUL
AZIS⁴, ABD RAHMAN⁵

^{1,2,3,4}Medical Education Study Program, Faculty of Medicine and Health
Sciences, Alauddin State Islamic University Makassar

⁵Arabic Language and Literature Study Program, Faculty of Adab and
Humanities, Alauddin State Islamic University Makassar

Email penulis korespondensi: nurkhairiyahlia@gmail.com

Abstract

Acute Respiratory Tract Infection (ARI) remains a major health issue in Indonesia with 40%-60% of visits to community health centers (Puskesmas) and 15-30% to hospitals. This study aims to determine whether there is a correlation between nutritional status and completeness of immunization with the occurrence of ARI in toddlers. The method used in this study is quantitative research. Data were analyzed using analytical observational procedures with a cross-sectional design. This approach employed a purposive sampling technique for sample collection. The research was conducted at Minasa Upa Community Health Center in Makassar City with toddler samples (12-59 months) according to inclusion and exclusion criteria. Data sources were obtained from medical records and immunization registration books at the community health center. A statistical chi-square test was used for analysis. The research findings indicate a statistically significant correlation between nutritional status and the occurrence of acute respiratory tract infections in toddlers ($p=0.000$;

PR=10.000; 95% CI= 3.192-31.331) and a statistically significant correlation between nutritional status and the occurrence of acute respiratory tract infections in toddlers ($p=0.002$; PR=4.114; 95% CI= 1.591-10.638).

Keywords : *ARI, toddlers, nutritional status, immunization completeness*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut WHO 2020, Infeksi saluran pernapasan akut menimbulkan tingkat kesakitan dan kematian yang serius di seluruh dunia. Hampir 4 juta jiwa kehilangan nyawa setiap tahun akibat infeksi ini, dengan sebagian besar (98%) dari kematian ini terjadi akibat infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah. Tingkat kematian ini sangat mencemaskan, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia, terutama di negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dan menengah. Infeksi saluran pernapasan akut seringkali menjadi penyebab utama kunjungan atau perawatan di fasilitas kesehatan, terutama di unit perawatan anak-anak (WHO, 2020).

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tetap menjadi isu utama dalam bidang kesehatan di Indonesia, dengan penyakit ini masih menjadi alasan banyaknya kunjungan pasien ke puskesmas (RISKESDAS, 2018). Kunjungan penderita ISPA ditemukan 40%-60% di puskesmas dan 15-30% di rumah sakit. (Pratiwi et al., 2022). Faktor risiko terjadinya ISPA pada balita dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi aspek seperti usia, jenis kelamin, status gizi, dan kelengkapan imunisasi balita. Sementara itu, faktor ekstrinsik mencakup sejumlah elemen, seperti tingkat kepadatan hunian di tempat tinggal, tingkat polusi udara, tingkat ventilasi di rumah, paparan asap rokok, tingkat penghasilan keluarga (Putri et al., 2020).

Pada tahun 2015, kasus ISPA di Indonesia mencapai jumlah yang signifikan, yaitu sekitar 25.000 jiwa, sehingga Indonesia menempati peringkat pertama dalam jumlah kasus ISPA di kawasan Asia Tenggara pada tahun

tersebut. Menurut (RISKESDAS, 2018). Prevalensi ISPA menurut diagnosis tenaga kesehatan sebanyak 4.4%, lalu prevalensi ISPA berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan gejala sebanyak 9.3%. Prevalensi ISPA pada balita di Provinsi Sulawesi Selatan menurut diagnosis tenaga kesehatan yaitu 2,73%. (Risksedas Kab/kota, 2018)

Kekurangan gizi dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap penyakit. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, termasuk jika makanan yang mereka makan sehari-hari tidak mengandung nutrisi yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas mereka (Saharuddin, 2017). Selain itu, jika balita mengalami infeksi, hal ini dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, yang kemudian berdampak pada penurunan berat badan dan kehilangan energi dalam tubuh (Sutriyawan, Agung Kurniawati, Ratna Dian Rahayu, Sri Habibi, 2020)

Imunisasi adalah langkah terbaik dan paling efisien dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit-penyakit berbahaya. Dalam konteks imunisasi, terdapat konsep kekebalan kelompok atau *herd immunity*. Kekebalan Kelompok ini hanya akan tercapai jika tingkat cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Kekebalan ini secara tidak langsung akan memberikan perlindungan kelompok kepada orang lain dalam masyarakat, sehingga jika terdapat kasus-kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), penyakit tersebut tidak akan dengan cepat menyebar dan Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat dihindari. Konsep ini membuktikan bahwa program imunisasi sangat efektif dan efisien karena dengan fokus pada kelompok yang rentan, seluruh masyarakat dapat terlindungi. (Kemenkes RI, 2020b)

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit, imunisasi diberikan dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh sehingga tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya dengan cara memberikan resistensi di penyakit tertentu, sehingga diperlukan imunisasi lain dengan harapan anak menjadi kebal terhadap penyakit dan menurunkan morbiditas serta mortalitas serta mengurangi kecacatan akibat penyakit tertentu (Rahayuningrum & Nur, 2021). Program imunisasi telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1956 melalui Program Pengembangan Imunisasi (PPI) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. PPI bertujuan untuk mengurangi kasus penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015, terungkap bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Indonesia hanya mencapai 86,54%. Sementara target yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk tahun 2015 adalah sebesar 91%.

Saat ini, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima vaksinasi lengkap (Abukhaer et al., 2023). Anak yang tidak mendapatkan imunisasi campak berisiko terkena ISPA yang mampu berkomplikasi menjadi radang paru-paru. Imunisasi DPT dapat mencegah penyakit difteri serta pertusis yang juga merupakan ISPA. Program Pengembangan Imunisasi (PPI) yang dilaksanakan pemerintah selama ini dapat menurunkan proporsi kematian balita. Vaksinasi yang tidak memadai menjadi faktor risiko morbiditas serta kematian akibat ISPA terutama pneumonia. Imunisasi dapat meningkatkan perlindungan bayi dari ISPA (Kemenkes RI, 2022a).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan status gizi dan kelengkapan imunisasi dengan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita.
- b. Tidak ada hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Ada hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita.
- b. Ada hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita.




D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

| No. | Variabel | Definisi Operasional | Alat Ukur | Hasil Ukur | Skala |
|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|---------|
| Variabel Independen | | | | | |
| 1. | Status Gizi | Keadaan dari balita yang dapat ditentukan dari indikator berat badan menurut umur (BB/U) dengan nilai Z-Score. | Rekam medis | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) (PMK NO.2 TAHUN 2020) 1. Gizi kurang bila z-score terletak pada <-2 SD 2. Gizi baik bila z-score terletak >-2 SD | Nominal |
| 2. | Kelengkapan imunisasi | Imunisasi dasar lengkap yang mempengaruhi ISPA untuk bayi usia dibawah 1 tahun yaitu Pentabio (DPT-HB-HiB) | Data Imunisasi Puskesmas | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak lengkap, jika imunisasi dasar pentabio tidak terpenuhi 2. Lengkap, jika imunisasi dasar pentabio terpenuhi | Nominal |

| Variabel Dependen | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---|--------------------|--|---------|
| 1. | Infeksi Saluran Pernapasan Akut | Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang diderita oleh balita yang didiagnosis oleh dokter berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang. | Rekam medis pasien | 1. Tidak terdiagnosis ISPA berdasarkan diagnosis dokter 2. Terdiagnosis ISPA berdasarkan diagnosis dokter | Nominal |



2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada anak usia 12-59 bulan di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar. Instrumen penelitian ini adalah rekam medik dan buku data imunisasi puskesmas sebagai data sekunder.



E. Kajian Pustaka

Tabel 2. Kajian Pustaka

| No | Penelitian/ Tahun | Judul | Metode | Jumlah Sampel | Cara Pengukuran | Hasil |
|----|----------------------------------|--|---|------------------|---|---|
| 1. | Rahayuning rum & Nur, 2021 | Hubungan Status Gizi dan Status Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita Kota Padang | Analitik kuantitatif, <i>Cross- Sectional</i> | 86 sampel | Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. | Terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita (p 0,000) dan hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita dengan nilai (p 0,021). |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---|-----------|---|---|
| 2. | (Suci & Kuswandi, 2016) | Hubungan Status Imunisasi Dan Status Gizi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita | Observasion al analitik, <i>cross-sectional</i> | 97 sampel | Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>quota sampling</i> . data dikumpulkan dari responden menggunakan lembar observasi dan daftar cek. | Tidak terdapat hubungan antara pemberian imunisasi dasar lengkap dengan kejadian ISPA pada balita dengan <i>p-value</i> sebesar 0.727. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita dengan <i>p-value</i> sebesar 0,823. |
|----|-------------------------|--|---|-----------|---|---|

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---|-----------|--|--|
| 3. | (Atira, 2017) | <i>Nutrition Status and Immunization as Determinant of Acute Respiratory Infection on Toddlers</i> | Survei analitik korelasional, <i>cross sectional.</i> | 94 sampel | Pengambilan sampel dengan teknik <i>insidental sampling.</i> | Terdapat korelasi antara status gizi dan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita, dengan nilai p-value sebesar 0,029 dan hubungan antara status imunisasi dan kejadian ISPA pada balita, dengan nilai p-value sebesar 0,005. |
|----|---------------|--|---|-----------|--|--|



| | | | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------|------------|--|--|
| 4. | (Lea et al., 2022) | Gambaran Faktor Penyebab Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita (Status Gizi Dan Status Imunisasi) Di Wilayah Kerja Puskesmas Sikumana | Kuantitatif, deskriptif. | 100 sampel | Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Instrumen penelitian ini menggunakan lembar <i>checklist</i> . | Hasil penelitan menunjukkan bahwa balita yang mengalami ISPA sebagian besar memiliki status gizi baik sebanyak 67 balita dan sebagian besar status imunisasi belum lengkap sebanyak 54 balita. |
|----|--------------------|---|--------------------------|------------|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|------------|---|---|
| 5. | (Widyawati et al., 2020) | <p>Hubungan Status Gizi dengan Angka Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita Usia 1-5 Tahun di Surakarta</p> | <p>Survei analitik korelasional, <i>case control</i></p> | 120 sampel | <p>Pengambilan sampel dengan teknik <i>stratified random sampling</i></p> | <p>Terdapat hubungan antara status gizi buruk (OR = 8,63; CI 95% = 1,875–39,714), status gizi kurang (OR = 3,776; CI 95% = 1,586–8,988), dan obesitas (OR = 0,154; CI 95% = 0,032–0,736) dengan angka kejadian ISPA. Sementara, tidak terdapat hubungan antara status gizi lebih ($p=0,402$) dengan angka kejadian ISPA.</p> |
|----|--------------------------|--|--|------------|---|---|

Beberapa literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini menunjukkan persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ditemukan adalah adanya variabel yang relevan dengan penelitian ini dan penggunaan data sekunder. Perbedaan antara penelitian ini dengan literatur yang digunakan, seperti lokasi penelitian, waktu penelitian, desain penelitian, cara pengukuran, jumlah sampel, jumlah variabel, analisis data, serta hasil pengukuran variabel bebas.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara status gizi dan kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk pengetahuan dan wawasan, yang dapat diterapkan dalam konteks kesehatan, khususnya dalam penelitian yang berfokus pada Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).


2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi materi bacaan dan sumber informasi yang mendidik mengenai hubungan antara status gizi dan kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita. Tindak lanjut dari

penelitian ini dapat dilakukan penyuluhan mengenai status gizi, imunisasi dan ISPA.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat berperan sebagai tambahan dalam literatur yang digunakan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam kajian kesehatan ibu, khususnya dalam mengkaji hubungan antara status gizi dan kelengkapan imunisasi dengan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada balita. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi penelitian lanjutan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.




BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

1. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan



Gambar 1. Anatomi Sistem Pernapasan
(Martini et al., 2012)

Sistem Pernapasan terdiri dari hidung, cavum nasi, sinus, faring, laring, trakea, dan saluran penghantar menuju tempat pertukaran gas di permukaan paru-paru. Saluran Pernapasan terdiri atas:

- Bagian konduksi: Rentang mulai cavum nasi hingga bronkiolus.
- Bagian pernapasan: Ini mencakup bronkioli dan alveoli yang merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbondioksida.

Bagian atas sistem pernapasan melibatkan hidung, cavum nasi, sinus paranasal dan faring. Fungsi utama bagian ini yaitu mempersiapkan udara yang dihirup dengan melakukan penyaringan, pemanasan, dan pelembaban sehingga membantu melindungi saluran Pernapasan bawah dari patogen dan kondisi lingkungan ekstrem. Bagian pernapasan bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru (Martini et al., 2012).

Respirasi atau proses pernafasan terbagi menjadi dua tahap yang berbeda namun saling terkait, yaitu respirasi seluler dan respirasi eksternal.

Respirasi seluler adalah istilah yang merujuk kepada serangkaian proses metabolik yang terjadi di dalam mitokondria sel, yang menggunakan oksigen dan menghasilkan karbondioksida sambil menghasilkan energi dari molekul nutrien. Respirasi eksternal mengacu pada semua proses yang terlibat dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara lingkungan eksternal dan sel-sel jaringan. Respirasi eksternal mencakup empat langkah yaitu:

- a. Udara secara bergantian dihirup dan dikeluarkan dari paru-paru, memungkinkan pertukaran gas antara atmosfer (lingkungan eksternal) dan alveolus. Proses pertukaran ini terjadi melalui mekanisme pernapasan, yang disebut juga sebagai ventilasi. Kecepatan ventilasi disesuaikan untuk mengatur aliran udara antara atmosfer dan alveolus sesuai dengan kebutuhan tubuh dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.
- b. Oksigen dan karbon dioksida dipindahkan antara udara di alveolus dan darah dalam kapiler paru melalui difusi.
- c. Darah membawa oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan jaringan tubuh.
- d. Oksigen dan karbon dioksida dialihkan antara sel-sel jaringan dan darah melalui difusi yang terjadi melalui kapiler sistemik (jaringan) (Sherwood, 2018).

2. Pengertian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah kondisi akut yang dapat menjangkiti sebagian atau seluruh bagian saluran pernapasan, yang meliputi jalur pernapasan dari hidung hingga alveoli, serta struktur terkait seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui droplet, namun berkontak dengan tangan atau permukaan

yang terkontaminasi juga dapat menularkan penyakit ini (Kemenkes RI, 2011).

ISPA, atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut, merupakan jenis penyakit infeksi yang mempengaruhi saluran pernapasan dan bersifat akut. Gejalanya meliputi batuk, pilek, serak, demam, dan bisa atau tidak disertai dengan napas cepat atau kesulitan bernapas. Biasanya, penyakit ini berlangsung selama maksimal 14 hari (Lazamidarmi et al., 2021).

3. Etiologi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

ISPA bisa disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, maupun riketsia. Bakteri seperti: *Diplococcus pneumonia*, *Pneumococcus*, *Streptococcus hemolyticus*, *Streptococcus aureus*, *Hemophilus influenza*, *Bacillus Friedlander*. Virus seperti: *Respiratory syncytial virus*, *virus influenza*, *Adenovirus*, *cytomegalovirus*. Jamur seperti: *Mycoplasma pneumococ dermatitides*, *Coccidioides immitis*, *Aspergillus*, *Candida albicans*. Menurut penelitian penelitian (Lei et al., 2022), *Enterovirus (EV)/rhinovirus (HRV)*, *adenovirus (ADV)*, *Respiratory Syncytial Virus (RSV)*, dan *Influenza Virus (IFV)* adalah virus yang paling sering dikaitkan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara Human *Bocavirus (hBOV)* menunjukkan tingkat infeksi multipel yang paling tinggi.

4. Faktor Risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut

a. Usia

Semakin muda usia bayi, semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Terdapat laporan bahwa kejadian penyakit ISPA dan pneumonia tertinggi terjadi pada bayi yang berusia antara 6 hingga kurang dari 12 bulan, disebabkan oleh penurunan antibodi dari ibu, kurang matangnya sistem

kekebalan tubuh, saat berhentinya pemberian ASI, dan awal penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2022b).

b. Jenis Kelamin

Faktor yang dapat menjelaskan kaitan antara jenis kelamin dan kejadian ISPA, yaitu fakta bahwa anak laki-laki cenderung lebih aktif dibandingkan dengan anak perempuan. Akibatnya, anak laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk sering terpapar oleh agen penyebab ISPA (Iskandar et al., 2015)

c. Status Gizi

Ada hubungan timbal balik antara penyakit infeksi dan keadaan gizi yang kurang, dan keduanya saling memengaruhi. Penyakit infeksi dapat memperburuk status gizi seseorang, dan individu dengan status gizi yang buruk menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Jika keadaan gizi semakin memburuk, kemampuan sistem kekebalan tubuh akan menurun, dan ini mengakibatkan tubuh menjadi lebih rentan terhadap serangan infeksi. Anak-anak yang menderita malnutrisi berat seringkali memiliki sistem kekebalan yang lemah dan mukosa saluran napas yang tidak berfungsi dengan baik, yang dapat meningkatkan risiko terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) (Widyawati et al., 2020). Nutrisi berkontribusi pada fungsi normal sistem kekebalan tubuh, dengan berbagai nutrisi bertindak sebagai sumber energi dan bahan pembangun selama respon imun. Banyak mikronutrien (vitamin dan mineral) bertindak sebagai pengatur respons molekuler sel kekebalan terhadap infeksi. Defisiensi gizi kronik dan defisiensi mikronutrien tertentu dapat mempengaruhi sejumlah respons imun dan membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit menular, terutama yang

berhubungan dengan saluran pernapasan dan pencernaan. (Govers et al., 2022)

d. Kelengkapan imunisasi

Banyak anak yang menderita ISPA memiliki status imunisasi dasar yang belum lengkap. Imunisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ISPA adalah imunisasi pneumokokus dan Haemophilus influenza tipe B, yang bertujuan untuk melindungi dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan pneumonia. Selain itu, imunisasi pertussis dalam DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) dan imunisasi campak juga penting sebagai bagian dari imunisasi dasar untuk melindungi anak dari risiko pneumonia sebagai komplikasi dari penyakit sebelumnya. Hal ini termasuk dalam jadwal imunisasi dasar untuk anak di bawah usia 1 tahun (Rizqullah et al., 2021).

e. ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) mengandung berbagai zat antimikroba, komponen antiinflamasi, dan faktor-faktor yang meningkatkan perkembangan perlindungan kekebalan tubuh. Ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang belum matang dan membantu dalam melawan agen infeksi selama masa menyusui. Manfaat dari pemberian ASI eksklusif adalah memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap infeksi saluran pernapasan pada tahun pertama kehidupan bayi. (Wahyuni et al., 2020)

f. Kondisi Tempat Tinggal

Beberapa faktor mengenai kondisi tempat tinggal yang dapat menjadi faktor risiko ISPA:

Rumah dengan kepadatan hunian yang padat akan menyebabkan sirkulasi dan pertukaran udara menjadi lebih rendah, dan juga memiliki

kemungkinan lebih mudah untuk terserang penyakit jika salah satu anggota keluarga sedang sakit, karena penularan ISPA akan lebih cepat terjadi apabila ada pengumpulan massa (Kemenkes RI, 2011).

Udara yang berkualitas buruk berisiko meningkatkan risiko berbagai penyakit, terutama yang berhubungan dengan gangguan saluran Pernapasan, termasuk ISPA (Suharno et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian (Aripin & Sasongko, 2019), menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara paparan asap rokok dan kejadian ISPA pada balita dengan total 94 responden, 68 di antaranya (sekitar 72, 3%) memiliki balita yang terpapar asap rokok dari salah satu anggota keluarganya yang merokok.

5. Tanda dan Gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Masa inkubasi ISPA pada anak sekitar 1 sampai 3 hari tergantung virus penyebabnya. Awal mula kebanyakan orang mengalami sensasi terbakar pada hidung dan tenggorokan, hidung tersumbat, bersin, malaise serta myalgia. Gejala mencapai puncak ketika 48 jam (divestasi virus). Nasofaringitis akut biasanya tidak disertai demam atau hanya demam ringan, terutama apabila terjadi infeksi rhinovirus atau coronavirus. Dapat pula timbul konjungtiva hiperemis, fotofobia, edema mukosa tenggorokan, pembengkakan kelopak mata. Sekresi nasal biasanya encer dan bening kemudian menjadi purulen. Batuk biasanya tidak parah dan dapat berlangsung hingga 2 minggu. Sputum purulen pada saluran napas bawah dicurigai adanya kombinasi virus selain rhinovirus atau infeksi bakteri sekunder. Gejala flu pada anak cenderung lebih parah dibandingkan pada orang dewasa. Pilek biasanya sembuh sendiri dan terjadi sekitar 4 sampai 10 hari apabila tidak disertai komplikasi (Ma et al., 2021).

6. Klasifikasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Secara anatomis yang termasuk infeksi saluran Pernapasan akut:

- a. ISPA ringan, ditandai dengan satu atau lebih gejala batuk, pilek dengan atau tanpa demam.
- b. ISPA sedang, meliputi gejala ISPA ringan ditambah satu atau lebih gejala berikut: Pernapasan cepat, wheezing, sakit atau keluar cairan dari telinga, bercak kemerahan.
- c. ISPA berat, meliputi gejala sedang atau ringan ditambah satu atau lebih gejala berikut: Penarikan sela iga kedalam sewaktu Inspirasi, penurunan kesadaran, bibir/kulit pucat kebiruan, stidor sewaktu istirahat, adanya selaput membran difteri. (Tompubolon, 2019).

Menurut (Kunoli, 2013), klasifikasi penyakit ISPA dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

a. Non-Pneumonia

Dalam kategori ini terdapat balita yang mengalami batuk tanpa gejala seperti peningkatan frekuensi napas dan tanpa tarikan dinding dada bagian bawah yang mengarah ke dalam. Contoh-contohnya termasuk faringitis, tonsilitis, dan flu biasa.

b. Pneumonia

Dalam kategori pneumonia, balita mengalami gejala batuk dan kesulitan bernapas. Diagnosis gejala ini bergantung pada usia balita tersebut. Untuk anak berusia 2 bulan hingga kurang dari 1 tahun, batas frekuensi napas yang dianggap cepat adalah 50 kali per menit, sedangkan untuk anak usia 1 hingga kurang dari 5 tahun, batasnya adalah 40 kali per menit.

c. Pneumonia Berat

Dalam kategori pneumonia berat, balita yang berusia 2 bulan hingga kurang dari 5 tahun mengalami gejala batuk, kesulitan bernapas, dan sesak napas. Untuk balita di bawah usia 2 bulan, gejalanya berupa napas yang cepat, dengan frekuensi pernapasan mencapai 60 kali per menit atau lebih.

7. Penularan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

ISPA dapat terjadi akibat penularan organisme melalui melalui *airborne* dan droplet. Penularan *airborne* terjadi karena penyebaran nukleus droplet yang tetap memiliki kemampuan infeksi saat mereka tersebar di udara dalam jarak yang cukup jauh (lebih dari 1 meter) dan untuk periode waktu yang cukup lama. Droplet dihasilkan oleh individu yang sedang mengalami infeksi, terutama saat mereka batuk, bersin, atau berbicara. Penularan terjadi ketika percikan-percikan yang berisi mikroorganisme tersebar dalam jarak yang pendek, biasanya kurang dari 1 meter (WHO, 2020).

8. Penatalaksanaan Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Dalam pengelolaan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang bukan pneumonia, pemberian antibiotik tidak diperlukan. Sebagai gantinya, diberikan obat kombinasi berupa tablet atau serbuk yang terdiri dari antipiretik (seperti Parasetamol), ekspektoran (seperti GG), antihistamin (seperti CTM dan Dexa), dan suplemen vitamin (vitamin c atau vitamin b kompleks). Hal ini didasarkan pada diagnosis oleh dokter dan hasil anamnesis antara petugas kesehatan dan ibu balita, yang menyimpulkan bahwa bagi balita yang mengalami ISPA bukan pneumonia hanya mengalami gejala batuk, pilek, dan demam. Obat-obatan tersebut digunakan untuk mendukung perawatan, dan penting untuk memberi tahu ibu balita bahwa

jika batuk berlangsung lebih dari 3 minggu, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Maakh et al., 2017).

Jika diagnosis adalah ISPA sedang atau pneumonia sedang sesuai dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), maka antibiotik seperti Amoksisilin atau Kotrimoksazol diberikan bersamaan dengan antipiretik seperti Parasetamol. Jika Parasetamol tidak tersedia, ibuprofen dapat digunakan sebagai pengganti. Efedrin juga dapat ditambahkan sebagai obat simptomatik untuk mengatasi gejala batuk dan pilek (Maakh et al., 2017).

B. Status Gizi

1. Definisi Status Gizi

Status gizi adalah kondisi fisik tubuh yang dipengaruhi oleh asupan makanan yang dikonsumsi dan pemanfaatan zat gizi. Zat gizi ini memiliki peran penting dalam menyediakan energi bagi tubuh, mendukung pertumbuhan dan perawatan jaringan tubuh, serta mengatur berbagai proses tubuh (Berlina, 2021). Status gizi adalah representasi dari situasi keseimbangan dalam bentuk faktor khusus atau perubahan dalam unsur gizi dalam bentuk faktor khusus, dimana status gizi yang optimal mencerminkan keselarasan antara asupan nutrisi dan kebutuhan tubuh akan nutrisi tersebut (Hasrul et al., 2020).

2. Klasifikasi Status Gizi

Klasifikasi status gizi peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Standar

antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi:

- a. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U)
- b. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U)
- c. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB)
- d. Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

Tabel 3. Klasifikasi Status Gizi

| Indeks | Kategori Status Gizi | Ambang Batas (Z-Score) |
|---|---|------------------------|
| Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan | Berat badan sangat kurang (<i>severely underweight</i>) | <-3 SD |
| | Berat badan kurang (<i>underweight</i>) | - 3 SD sd <- 2 SD |
| | Berat badan normal | -2 SD sd +1 SD |
| | Risiko Berat badan lebih | > +1 SD |
| Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) | Sangat pendek (<i>severely stunted</i>) | <-3 SD |
| | Pendek (<i>stunted</i>) | - 3 SD sd <- 2 SD |
| | Normal | -2 SD sd +3 SD |

| | | |
|---|--|-------------------|
| anak usia 0 – 60 bulan | Tinggi | > +3 SD |
| Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan | Gizi buruk (<i>severely wasted</i>) | <-3 SD |
| | Gizi kurang (<i>wasted</i>) | -3 SD sd <-2 SD |
| | Gizi baik (normal) | -2 SD sd +1 SD |
| | Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>) | > +1 SD sd +2SD |
| | Gizi lebih (<i>overweight</i>) | > +2 SD sd +3 SD |
| | Obesitas (<i>obese</i>) | > + 3 SD |
| Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan | Gizi buruk (<i>severely wasted</i>) | <-3 SD |
| | Gizi kurang (<i>wasted</i>) | -3 SD sd <-2 SD |
| | Gizi baik (normal) | -2 SD sd +1 SD |
| | Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>) | > +1 SD sd +2 SD |
| | Gizi lebih (<i>overweight</i>) | > + 2 SD sd +3 SD |
| | Obesitas (<i>obese</i>) | > + 3 SD |

(Kemenkes RI, 2020a)

3. Cara Perhitungan Status Gizi Balita

a. Pengukuran berat badan

Pengukuran berat badan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menilai status gizi dengan cara menimbang berat tubuh individu. Berat badan adalah salah satu parameter antropometri yang berguna karena perubahan berat badan dapat dengan mudah terlihat dalam waktu singkat, dan memberikan gambaran mengenai status gizi seseorang pada saat tertentu (Sutanto, 2022).

Untuk melakukan pengukuran berat badan, digunakan berbagai jenis alat seperti timbangan bayi, dacin (khusus untuk balita), timbangan detektor, timbangan bath room, atau timbangan injak digital. Saat menggunakan alat ini, penting untuk meletakkan di permukaan yang datar dan keras agar beban tubuh dapat didistribusikan secara merata di atas timbangan, sehingga hasil pengukuran menjadi akurat. Sebelum digunakan untuk menimbang individu, jarum timbangan harus dikembalikan ke posisi nol (Sutanto, 2022).

b. Pengukuran tinggi badan

Pengukuran tinggi badan merupakan metode antropometri yang digunakan untuk menilai panjang tubuh seseorang. Pengukuran tinggi badan dapat digunakan sebagai indikator masalah gizi kronis karena perubahan panjang tubuh terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Instrumen yang digunakan untuk pengukuran ini mencakup alat ukur manual dan digital untuk bayi, mikrotoise, stadiometer, serta teknologi ultrasonik (Sutanto, 2022).

Cara Mengukur:

Untuk melakukan pengukuran, bayi yang akan diukur ditempatkan di atas perangkat pengukur dengan tangan dan kaki yang dipegang untuk

mencegah gerakan, pastikan mereka dalam posisi lurus. Pada orang dewasa, individu yang akan diukur harus berdiri dengan kaki rapat, tumit bersentuhan, dan lutut lurus. Kedua lengan mereka harus tergantung secara santai di samping tubuh, dengan telapak tangan menghadap ke arah paha (Sutanto, 2022).

C. Kelengkapan Imunisasi

1. Definisi Imunisasi

Imunisasi merupakan upaya untuk merangsang atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga ketika terpapar penyakit tersebut, mereka tidak akan mengalami penyakit atau hanya akan mengalami gejala ringan (Kemenkes RI, 2020b).

2. Tujuan Pemberian Imunisasi

Menurut (Kemenkes RI, 2015) Imunisasi menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Pemberian imunisasi adalah cara untuk memberikan perlindungan kepada tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh agar tubuh dapat mengembangkan kekebalan terhadap penyakit yang sedang menyebar atau berpotensi berbahaya. Imunisasi hanya efektif dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu, sehingga untuk melindungi diri dari penyakit lainnya, imunisasi yang berbeda mungkin diperlukan. Tujuan dari memberikan imunisasi adalah untuk menjaga agar anak-anak memiliki kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu, dengan tujuan mengurangi angka kesakitan dan kematian serta mengurangi dampak cacat yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut (Rahayuningrum & Nur, 2021).

3. Manfaat Pemberian Imunisasi

Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak jauh lebih besar daripada risiko efek di dekatnya. Imunisasi sebagai salah satu cara preventif untuk mencegah penyakit menular. Imunisasi melindungi tubuh bayi dan anak dari serangan serta ancaman bakteri dan virus penyakit tertentu. Ini membantu mencegah mereka terkena penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan status kesehatan bayi dan anak, yang berdampak positif pada perkembangan dan produktivitas mereka di masa depan. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua tentang anak-anak mereka penyakit tertular, sehingga memberikan keyakinan bahwa anak-anak mereka dapat tumbuh dengan sehat dan aman.

Selain itu, imunisasi telah terbukti sebagai cara yang efektif, aman, dan relatif murah atau hemat biaya dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Penting untuk memastikan bahwa setiap bayi atau anak mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga vaksinasi dapat memberikan perlindungan dan kekebalan yang optimal. Jadwal vaksinasi dibuat sesuai dengan jenis penyakit yang ingin dicegah. Beberapa contoh penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi antara lain hepatitis b, tuberkulosis, tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubela (Kemenkes RI, 2022d).

4. Jenis-Jenis Imunisasi

Jenis-jenis imunisasi menurut (Kemenkes RI, 2015)

a. Imunisasi Wajib

Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka

melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

1) Imunisasi Rutin

Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.

a) Imunisasi Dasar

Di Indonesia, setiap bayi berusia 0-11 bulan harus menerima imunisasi dasar lengkap yang mencakup berbagai jenis vaksin. Ini termasuk 1 dosis vaksin Hepatitis B, 1 dosis vaksin BCG, 3 dosis vaksin DPT-HB-HiB, 4 dosis vaksin polio dalam bentuk tetes atau Oral Polio Vaccine (OPV), 1 dosis vaksin polio dalam bentuk suntikan atau Inactivated Polio Vaccine (IPV).), dan 1 dosis vaksin Campak Rubela. Keputusan tentang jenis vaksin dan jadwal pemberian ini didasarkan pada penelitian oleh para ahli dan analisis epidemiologi terkait penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi (Kemenkes RI, 2015).

- (1) Vaksin BCG
- (2) Vaksin DPT – HB – HIB
- (3) Vaksin Hepatitis B
- (4) Vaksin Polio Oral (Oral Polio Vaccine [OPV])
- (5) Vaksin Inactive Polio Vaccine (IPV)
- (6) Vaksin Campak

b) Imunisasi Lanjutan

Imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa

perlindungan. Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia bawah tiga tahun (Batita), anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur (Kemenkes RI, 2015).

Pada tahun 2022, Tiga jenis vaksin baru telah ditambahkan, yaitu vaksin *Pneumococcal Conjugate* (PCV), vaksin Rotavirus, dan vaksin *Human Papilloma Virus* (HPV). Vaksin PCV dimaksudkan untuk mencegah radang paru, radang selaput otak, dan radang telinga yang disebabkan oleh bakteri *Pneumokokus*. Vaksin *Rotavirus* digunakan untuk mencegah diare berat dan komplikasinya yang disebabkan oleh *Rotavirus*, sementara vaksin HPV bertujuan untuk mencegah kanker leher rahim pada wanita (Kemenkes RI, 2022c).

2) Imunisasi Tambahan

Imunisasi tambahan diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah Backlog fighting, Crash program, PIN (Pekan Imunisasi Nasional), Sub-PIN, Catch up Campaign campak dan Imunisasi dalam Penanganan KLB (Outbreak Response Immunization/ORI) (Kemenkes RI, 2015).

3) Imunisasi Khusus

Imunisasi khusus merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi tertentu antara lain persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umrah, persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu dan kondisi kejadian luar biasa. Jenis imunisasi khusus, antara lain terdiri atas Imunisasi Meningitis Meningokokus, Imunisasi , dan Imunisasi Anti-Rabies (Kemenkes RI, 2015).

b. Imunisasi Pilihan

Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, Hib, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, Japanese Encephalitis, dan HPV (Kemenkes RI, 2015).

D. Integrasi Keislaman

Balita memiliki daya tahan tubuh yang cenderung lebih lemah sehingga lebih mudah terjangkit penyakit. Selain dalam bidang sains dan kedokteran terkait permasalahan Infeksi saluran pernapasan akut pada balita, terdapat kajian keislaman mengenai ketahanan tubuh manusia dalam al-Qur'an Allah SWT. berfirman dalam QS Ar-Rum/30: 54.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ الْقَدِيرِ وَهُوَ الْعَلِيمُ قُوَّةً ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

Terjemahnya :

“Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikanmu lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.” (Kemenag RI, 2022)

Menurut Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah, Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan manusia dari air mani, lalu manusia tumbuh dalam keadaan lemah. Setelah itu, Allah memberikan kekuatan kepada manusia melalui pertumbuhan mereka hingga dewasa. Namun, setelah mencapai kekuatan itu, manusia kembali lemah, terutama saat mencapai usia tua dan beruban. Allah adalah pencipta segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ciptaan-

Nya dan memiliki kekuasaan yang besar untuk menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya (Shihab, 2009).

Semakin muda usia bayi, semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya dapat disebabkan oleh kurang matangnya sistem kekebalan tubuh sehingga lebih rentan mengalami infeksi saluran Pernapasan akut (ISPA).

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dapat menjadi mematikan terutama pada kasus yang berat atau komplikasi serius. Penting untuk diingat bahwa sebagian besar kasus ISPA bersifat ringan dan dapat sembuh dengan pengobatan yang tepat dan istirahat yang cukup. Namun, kesadaran akan gejala serius, pencegahan, vaksinasi yang tepat waktu sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi dan kematian akibat ISPA. terdapat kajian keislaman mengenai larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan.

Allah SWT. berfirman dalam QS Al Baqarah /2: 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

" Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Kemenag RI, 2022)

Istilah "التَّهْلُكَةِ" (*at-tahlukah*), yang berarti kebinasaan, merujuk pada penyimpangan atau kehilangan nilai positif suatu hal tanpa jelas arahnya. Akibatnya, individu tersebut menghadapi risiko jatuh ke dalam kebinasaan, yang berarti kehilangan nilai-nilai positif seperti keyakinan akan keesaan Allah, kemerdekaan, kebebasan, bahkan kehidupan dan kedamaian secara fisik dan spiritual. Semua itu bisa hilang tanpa jejak, tidak diketahui arahnya,

menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berada di sisi Allah, dan karenanya tidak mengalami perkembangan atau kemajuan (Shihab, 2002).

Ayat ini tidak membahas infeksi saluran pernapasan secara spesifik tetapi larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan pada ayat ini dapat dikaitkan dengan perintah menjaga kesehatan agar tidak mudah terjangkit penyakit terutama penyakit yang dapat meningkatkan risiko kematian. Infeksi saluran pernapasan akut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko salah satunya adalah status gizi kurang. Status gizi dipengaruhi oleh *intake* yang orang tua berikan kepada anaknya.

Makanan bergizi berperan penting dalam membentuk kekebalan tubuh anak oleh karena itu Allah SWT menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban* yaitu yang halal baik cara memperolehnya maupun zat yang terkandung dalamnya serta baik bagi kesehatan tubuh. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai makanan yang baik terletak pada QS. Al-Baqarah/2:168 yang berbunyi :

الشَّيْطٰنُ خٰطُوٰتٍ تَتَّبِعُوۡا ۗ وَلَا طَيِّبًا حٰلًا اَلْاَرْضِ فِيۡ مِمَّا كَلُوۡا النَّاسُ يٰۤاَيُّهَا
مُبِيۡنٌ عَدُوۡ لَكُمْ اِنَّهٗ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, ia begimu merupakan musuh yang nyata” (Kemenag RI, 2022)

Penafsiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa seruan mengenai kehalalan makanan dan minuman dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, apakah mereka beriman kepada Allah atau tidak. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua makanan dan minuman yang halal secara hukum otomatis dianggap baik. Konsep

kehalalan sendiri terdiri dari empat jenis, yaitu yang wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Makanan yang diwajibkan bisa mengacu pada jenis makanan yang dianggap esensial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Ini mencakup makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan. Makanan sunnah adalah makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi berdasarkan tindakan atau anjuran yang dilakukan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Contohnya adalah kurma, madu, dan zaitun, yang sering disebut dalam hadis sebagai makanan yang dianjurkan. Makanan mubah adalah makanan yang tidak diharamkan atau dianjurkan, tetapi juga tidak diwajibkan atau dianjurkan secara khusus. Sebagian besar makanan termasuk dalam kategori ini, dan muslim dapat mengonsumsinya tanpa melanggar aturan agama. Makanan makruh adalah makanan yang sebaiknya dihindari atau dikurangi konsumsinya menurut ajaran Islam, meskipun tidak diharamkan secara tegas. Contohnya adalah makanan yang dianggap tidak sehat atau berpotensi membawa dampak buruk pada kesehatan (Shihab, 2002).

Selain itu, tidak semua makanan yang halal cocok untuk setiap individu, karena kondisi kesehatan dan preferensi individu berbeda-beda. Ada makanan yang mungkin baik untuk seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu, tetapi tidak sesuai untuk orang lain. Ada juga makanan yang mungkin rasanya enak, tetapi kurang bergizi, sehingga tidak selalu dianggap baik secara keseluruhan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga bermanfaat dan baik untuk kesehatan (Shihab, 2002).

Islam sebagai agama secara komprehensif memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah makanan. Islam menekankan bahwa makanan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu harus halal dan *thayyib*. Halal mencakup semua jenis zat yang diharamkan dalam ajaran Islam. Contoh makanan yang haram adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. *Thayyib* merujuk pada makanan yang tidak merugikan tubuh, kesehatan, akal, dan kehidupan manusia. Contoh makanan yang merugikan tubuh adalah makanan yang tinggi lemak, gula, atau bahan makanan lain yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu, termasuk balita, untuk mengikuti pola makan yang baik dan sehat agar terhindar dari berbagai penyakit, termasuk ISPA.

Selain status gizi, imunisasi menjadi salah satu tindakan pencegahan agar manusia tidak mudah menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Di dalam Al-quran terdapat perintah untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Dalam QS An-Nisa/4:9. Allah SWT. berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Kemenag RI, 2022)


Orang tua seharusnya membayangkan situasi di mana setelah mereka meninggal, mereka meninggalkan di belakang anak-anak yang masih kecil atau tidak memiliki harta, yang dapat menghadapi risiko ketidakamanan atau

perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, disarankan agar mereka hidup dengan takwa kepada Allah, mematuhi segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan selalu mengungkapkan kata-kata yang jujur dan benar (Shihab, 2006).

Ayat di atas menekankan untuk memiliki keturunan yang tidak lemah baik jasmani maupun rohani. Hal ini dapat dikaitkan dengan orang tua memerhatikan kesehatan anaknya agar tidak mudah terjangkit penyakit. Salah satu tindakan agar anak menjadi individu yang tidak lemah adalah dengan pemberian imunisasi kepada anak-anak. Imunisasi merupakan langkah pencegahan yang sangat penting bagi orangtua dan wali dalam upaya menjaga kesehatan bayi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bayi yang menjalani proses imunisasi memiliki kekuatan daya tahan tubuh yang lebih optimal jika dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapat imunisasi. Tindakan ini menjadi suatu bentuk ikhtiar untuk menghindarkan potensi kelemahan dan penyakit pada generasi mendatang.




E. Kerangka Teori




Bagan 1 Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep



Keterangan :

-  : Variabel yang tidak diteliti
-  : Variabel independen
-  : Hubungan yang diteliti
-  : Hubungan yang tidak diteliti
-  : Variabel dependen

Bagan 2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan prosedur analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2023 - Januari 2024 di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan nilai atau faktor yang muncul akibat variabel independen (Soesilo, 2019). Variabel dependen pada penelitian ini ialah infeksi saluran pernapasan akut pada balita.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah faktor atau nilai yang dapat memengaruhi atau mengubah faktor lainnya (Soesilo, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini adalah status gizi dan kelengkapan imunisasi.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian mengacu pada seluruh entitas atau individu yang menjadi fokus sumber data atau subjek penelitian yang akan diperoleh (Rifai, 2021). Populasi dalam penelitian ini balita berusia 12-59 bulan yang

didagnosis ISPA serta berada di wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa periode Januari - Desember 2022 sebanyak 345 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil yang mewakili keseluruhan populasi. Penting untuk melakukan pengambilan sampel dengan cermat guna memastikan bahwa sampel yang dipilih secara akurat mencerminkan keseluruhan populasi (Syahza, 2021). Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan pendekatan *cross-sectional*, yang berarti pengamatan dilakukan pada satu saat tertentu tanpa adanya tindak lanjut terhadap subjek yang diamati. Besarnya sampel ditentukan melalui rumus Slovin:


$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{345}{1 + 345(0.1)^2}$$
$$n = \frac{345}{4,45} = 77,528$$

$n = 77,528$ dibulatkan menjadi 78 sampel

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditoleransi

Hasil perhitungan banyak sampel menggunakan rumus Slovin adalah 78 sampel.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling. *Purposive sampling* yaitu sampel dipilih dari populasi dengan mempertimbangkan ciri-ciri atau sifat khusus yang ada di dalam populasi tersebut, dan pemilihan sampel ini didasarkan pada tujuan penelitian.

1. Kriteria Inklusi

- a. Balita yang menjadi pasien di Puskesmas Minasa Upa
- b. Balita berusia 12-59 bulan
- c. Balita dengan data rekam medik lengkap
- d. Balita yang didiagnosis ISPA oleh dokter di Puskesmas Minasa Upa

2. Kriteria Eksklusi

- a. Balita yang lahir prematur
- b. Balita dengan riwayat BBLR
- c. Balita yang memiliki kelainan bawaan
- d. Balita dengan penyakit infeksi penyerta

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder diambil dari rekam medis pasien dan buku data imunisasi puskesmas yang berisi informasi kelengkapan imunisasi balita.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*

Tahap ini merupakan langkah pemeriksaan dan koreksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini diperlukan karena adanya potensi bahwa data mentah mungkin tidak memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan keperluan penelitian.

a. Coding

Pengkodean data dengan memberikan kode-kode khusus pada setiap data, termasuk memberikan kategori untuk data dengan karakteristik yang serupa. Hal ini bertujuan untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.

c. Tabulating

Tabulasi melibatkan pengaturan data ke dalam bentuk tabel dengan membuat tabel yang berisi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

2. Analisis Data

Tujuan dari analisis data dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian yang berfokus pada pengaruh tiap variabel ISPA pada balita. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Statitiscal Program for Social Science (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut :

a. Analisis Univariat


Melibatkan tabel distribusi frekuensi, nilai mean (rata-rata), dan median (nilai tengah) dari variabel dependen dan independen. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang distribusi dan frekuensi dari setiap variabel.

b. Analisis Bivariat

Menggunakan uji *Chi square* untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara variabel-variabel tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah

untuk mengetahui keberadaan atau tidaknya hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

H. Alur Penelitian



Bagan 3 Alur Penelitian



I. Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan melalui narasi. Data-data yang diperoleh dari penelitian disusun secara terstruktur dalam tabel untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Selain itu, penjelasan lebih lanjut tentang data juga disampaikan dalam bentuk narasi, yang memberikan interpretasi dan konteks dari informasi yang terdapat dalam tabel. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses dengan jelas dan akurat oleh pembaca, serta memungkinkan interpretasi yang tepat mengenai temuan penelitian.

J. Etika Penelitian

Setelah peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mendapatkan *ethical clearance*, peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti:

1. Peneliti perlu membawa surat pengantar sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian kepada pihak terkait.
2. Dalam upaya menghormati dan menjaga privasi subjek penelitian, peneliti harus menghindari mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan data. Sebagai gantinya, peneliti dapat menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien
3. Peneliti tidak boleh memaksa atau mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data

4. Peneliti harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini terealisasi di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar pada bulan Januari tahun 2024. Partisipasi dalam penelitian ini melibatkan total 106 responden, terdiri dari 71 responden balita yang didiagnosis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan 35 responden balita yang tidak mengalami ISPA. Informasi rinci mengenai hasil penelitian dapat ditemukan melalui tabel dan penjelasan yang tersedia.

1. Karakteristik Responden

Tabel 4. *Distribusi Karakteristik dan Variabel Sampel Penelitian*

| Karakteristik Responden | Status Gizi | | Kelengkapan Imunisasi | | Kejadian ISPA | | Total |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------|
| | Kurang n (%) | Baik n (%) | Tidak lengkap n (%) | Lengkap n (%) | ISPA n (%) | Tidak ISPA n (%) | |
| Usia | | | | | | | |
| 12-35 bulan | 29 (43.9%) | 37 (56.1%) | 25 (37.9%) | 41 (62.1%) | 45 (68.2%) | 21 (31.8%) | 66 |
| 36-59 bulan | 15 (37.5%) | 25 (62.5%) | 18 (45%) | 22 (55%) | 26 (65%) | 14 (35%) | 40 |
| Jenis Kelamin | | | | | | | |
| Laki laki | 16 (32%) | 34 (68%) | 18 (36%) | 32 (64%) | 30 (60%) | 20 (40%) | 50 |
| Perempuan | 28 (50%) | 28 (50%) | 25 (44.6%) | 31 (55.4%) | 41 (73.2%) | 15 (26.8%) | 56 |

Sumber: Data Sekunder

Pada Tabel 4 di atas, tergambar distribusi karakteristik responden dari total sampel sebanyak 106, mencakup parameter usia dan jenis kelamin. Pada

parameter usia, ditemukan bahwa sebagian besar responden, yaitu 66 orang (62.3%) tergolong dalam kelompok usia 12-35 bulan. Mayoritas balita pada rentang usia tersebut disertai status gizi baik sebanyak 25 orang (62.5%), mendapatkan imunisasi pentabio lengkap sebanyak 22 orang (55%), mengalami ISPA sebanyak 45 orang (68.2%).

Balita berusia 36-59 bulan sebanyak 40 orang (37.7%). Mayoritas balita pada rentang usia tersebut disertai status gizi baik sebanyak 25 (62.5%), tidak mendapatkan imunisasi pentabio lengkap sebanyak 41 (62.1%), mengalami ISPA sebanyak 26 orang (65%).

Karakteristik responden dalam hal jenis kelamin menunjukkan sebanyak 50 responden (47.2%) berjenis kelamin laki-laki. Balita berjenis kelamin laki-laki mayoritas disertai status gizi baik sebanyak 34 orang (68%), mendapatkan imunisasi pentabio lengkap sebanyak 32 orang (64%), mengalami ISPA sebanyak 30 orang (60%).

Responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 56 orang (52.8%) . Balita berjenis kelamin perempuan status gizi kurang sebanyak 28 orang (50%), status gizi baik sebanyak 28 (50%) mendapatkan imunisasi pentabio lengkap sebanyak 31 (55.4%), mengalami ISPA sebanyak 41 orang (73.2%).

Berdasarkan pada hasil penelitian yang terdapat dalam tabel 4 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memiliki status gizi baik, yaitu sebanyak 62 orang (58.5%). Sebaliknya, terdapat sejumlah kecil responden yang memiliki status gizi kurang, berjumlah 44 orang (41.5%). Balita dengan

imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) lengkap berjumlah 63 orang (59.4%) dan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) tidak lengkap berjumlah 43 orang (40.6%). Balita yang mengalami ISPA berjumlah 71 orang (67%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak (35%).

2. Analisis Bivariat

Tabel 5. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian ISPA pada Balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar

| Status Gizi | Kejadian ISPA | | | | | | <i>p-value</i> | PR (CI 95%) |
|-------------|---------------|------|------------|-----|-------|-----|----------------|------------------------------|
| | ISPA | | Tidak ISPA | | Total | | | |
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | | |
| Kurang | 40 | 90.9 | 4 | 9.1 | 44 | 100 | 0.000* | 10.000 (3.192- 31.331) |
| Baik | 31 | 50 | 31 | 50 | 62 | 100 | | |
| Total | 71 | | 35 | | 106 | | | |

* *Chi-square test*

Sumber: Data Sekunder

Pada tabel 5. disajikan hasil uji *Chi square* yang mengevaluasi hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar. Ditemukan bahwa balita yang memiliki status gizi kurang sebagian besar mengalami ISPA berjumlah 40 orang (90.9%). Adapun terdapat balita yang memiliki status gizi kurang, tetapi tidak mengalami ISPA berjumlah 4 orang (9.1%). Adapun balita dengan status gizi baik, ditemukan sebagian tidak mengalami ISPA sebanyak 31 orang (50%). Sementara sebanyak 31 orang (50%) lainnya mengalami ISPA. Hasil dalam penelitian ini didapatkan nilai *p-value* status gizi dan ISPA pada balita adalah 0,000 sesuai dengan nilai $\alpha < 0,05$.

Hasil penelitian didapatkan faktor risiko PR didapatkan nilai 10.000 > 1 dan merupakan faktor risiko sehingga *prevalence ratio* bermakna. Secara statistik dapat diartikan bahwa responden dengan status gizi kurang berisiko

10 kali untuk mengalami ISPA dibandingkan responden dengan status gizi baik.

Tabel 6. Hubungan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian ISPA di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar

| Kelengkapan Imunisasi | Kejadian ISPA | | | | | | <i>p-value</i> | PR (CI 95%) |
|-----------------------|---------------|------|------------|------|-------|-----|----------------|-----------------------------|
| | ISPA | | Tidak ISPA | | Total | | | |
| | n | (%) | n | (%) | n | (%) | | |
| Tidak Lengkap | 36 | 83.7 | 7 | 16.3 | 43 | 100 | 0.002* | 4.114 (1.591- 10.638) |
| Lengkap | 35 | 55.6 | 28 | 44.4 | 63 | 100 | | |
| Total | 71 | | 35 | | 106 | | | |

* *Chi-square test*

Sumber: Data Sekunder

Dalam Tabel 6, disajikan hasil uji *Chi-square* yang menginvestigasi keterkaitan antara kelengkapan imunisasi pentabio (DPT-HB-Hib) dengan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang tidak menerima imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) secara lengkap memiliki kecenderungan untuk mengalami ISPA, yakni sebanyak 36 individu (83.7%). Sebaliknya, sejumlah kecil balita yang tidak mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) secara lengkap tetapi tidak mengalami ISPA tercatat sebanyak 7 individu (16.3%). Adapun balita yang mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) lengkap yang tidak mengalami ISPA sebanyak 28 orang (44.4%). Balita yang yang mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) lengkap namun mengalami ISPA berjumlah 35 orang (55.6%). Hasil uji *Chi square* pada penelitian ini memberikan nilai *p-value* sebesar 0.002, memenuhi kriteria nilai $\alpha < 0.05$. Hasil penelitian didapatkan faktor risiko PR

didapatkan nilai $4,114 > 1$ dan merupakan faktor risiko sehingga *prevalence ratio* bermakna. Secara statistik dapat diartikan bahwa responden yang tidak mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) lengkap berisiko 4,114 kali untuk mengalami ISPA dibandingkan responden yang mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) lengkap.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Usia

Dari hasil penelitian terdapat 106 balita yang menjadi responden di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022, didapatkan balita yang berusia 12-35 bulan paling banyak berkunjung dibanding balita berusia 36-59 bulan. Hal ini relevan dengan penelitian (Lalu et al., 2020) terdapat 59 responden (58.4%) berusia 12-59 bulan dan 42 responden (41.6%) berusia 36-59 bulan. Kemungkinan ini dapat terjadi karena keberadaan faktor imunitas yang cenderung belum matang pada rentang usia tersebut. Pada kelompok usia yang lebih muda, perkembangan sistem kekebalan tubuh belum mencapai tingkat optimal (Dagne et al., 2020).

b. Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian terdapat 106 balita yang menjadi responden di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022. Didapatkan balita berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 56 orang (52.8%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 50 orang (47.2%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Lea et al., 2022). Laki-laki secara alami dinilai memiliki kerentanan yang lebih tinggi karena sistem kekebalan tubuhnya dianggap lebih lemah dibandingkan dengan anak

perempuan (JD et al., 2017). Faktor kromosom mempengaruhi kondisi ini, menyebabkan bayi laki-laki memiliki kekuatan biologis yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bayi perempuan. Secara biologis, perempuan memiliki dua kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Kromosom X dikenal berperan dalam mengatur berbagai respons dari sistem kekebalan tubuh dan mengandung gen-gen yang terkait dengan imunitas, menjadikannya memiliki jumlah gen terbesar dalam seluruh genom (Bianchi et al., 2012).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Intan Kamala Aisyiah, Eka Trio Effandilus, 2023) yang menyatakan kejadian ISPA banyak didapatkan pada jenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki seringkali menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dan lebih suka bermain di luar ruangan. Tingginya aktivitas fisik dan paparan terhadap unsur di luar ruangan dapat meningkatkan risiko terhadap paparan agen penyebab ISPA. Lebih lanjut, tingkat keberanian dan eksplorasi yang lebih tinggi pada anak laki-laki dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kontak dengan individu atau lingkungan yang dapat menyebarkan infeksi.

Menurut peneliti, kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian hasil penelitian ini dengan teori tersebut karena pada kenyataannya, pada era modern ini, tidak terdapat perbedaan signifikan antara tempat bermain balita perempuan dan laki-laki. Saat ini, frekuensi bermain di luar ruangan bagi balita laki-laki dan perempuan cenderung serupa, karena berkembangnya teknologi dan ragam permainan *outdoor* semakin bervariasi. Oleh karena itu, teori yang menyatakan bahwa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) lebih sering terjadi pada balita laki-laki karena lebih banyak bermain di luar rumah dianggap tidak sesuai dengan hasil penelitian ini.

2. Status Gizi

Hasil dari penelitian ini mencerminkan bahwa mayoritas balita menunjukkan status gizi yang baik, yakni sebanyak 62 orang (58.5%). Di sisi lain, jumlah responden yang mengalami status gizi kurang relatif kecil, yaitu sebanyak 44 orang (41.5%). Hasil ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Haris et al., 2022), di mana mayoritas balita menunjukkan status gizi baik, mencakup 109 responden (87,20%), sementara 16 responden balita (12,80%) memiliki status gizi kurang. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang didukung oleh status gizi yang optimal dapat meningkatkan kesehatan dan respons sistem kekebalan tubuh (Nurjamillah & Dwiriani, 2022). Menurut peneliti, hal ini dapat menggambarkan bahwa para ibu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga status gizi anak balita mereka. Asupan nutrisi yang cukup pada fase perkembangan ini dapat memengaruhi kesehatan mental, fisik, dan kognitif anak hingga ke tahap dewasa.

3. Kelengkapan Imunisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total sampel yaitu 106 responden terdapat balita yang tidak menerima imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) secara lengkap sebanyak 43 (40.6%) orang sedangkan balita yang mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) secara lengkap sebanyak 63 orang (59.4%). Penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Komala et al., 2022) yang menyatakan mayoritas responden memiliki status imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) lengkap sebanyak 268 orang (83.8%) dan sebagian kecil lainnya yang tidak mendapatkan imunisasi pentabio lengkap sebanyak 52 orang (16.3%). Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk

terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya. Tujuan diberikan imunisasi adalah harapan anak menjadi kebal terhadap penyakit sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit tertentu. Imunisasi merupakan peranan penting dalam menciptakan daya tahan tubuh Balita (Rahayuningrum & Nur, 2021). Menurut peneliti, orang tua dengan pengetahuan imunisasi yang baik akan cenderung memberikan anaknya imunisasi dasar yang lengkap dan memperhatikan jadwal pemberiannya.

4. Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 106 balita yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 71 balita (67%) mengalami insiden Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara 35 balita (33%) tidak mengalami ISPA. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Afriani, 2020) di Puskesmas Cikuya Tahun 2022. Dalam penelitian tersebut, dari total 108 balita, 76 balita (70.4%) mengalami penyakit ISPA, sementara 32 balita tidak mengalami ISPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian ISPA pada balita lebih dominan dibandingkan dengan balita yang tidak mengalami ISPA. Kejadian ISPA pada balita dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu, termasuk imunisasi yang tidak lengkap dan status gizi yang kurang. ISPA sendiri merupakan sekumpulan penyakit yang menyerang saluran pernapasan, dengan penyebabnya melibatkan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur.

5. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita

Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar balita yang mengalami status gizi kurang juga mengalami insiden Infeksi Saluran

Pernapasan Akut (ISPA), jumlahnya mencapai 40 orang (90.9%). Sementara itu, pada kelompok balita dengan status gizi baik, terdapat 31 balita yang tidak mengalami ISPA (50%) dan 31 balita lainnya yang mengalami ISPA (50%). Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara status gizi dan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar dengan nilai $p\text{-value}$ $0,000 < 0,05$. Pada kondisi gizi yang semakin memburuk, respons sistem kekebalan tubuh cenderung melemah, menyebabkan penurunan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan imunitas, dan kerusakan mukosa, termasuk mukosa saluran nafas (CDC, 2021). Menurunnya imunitas dan kerusakan mukosa memegang peran utama dalam jalannya proses patogenesis penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kondisi ini, pada gilirannya, dapat mempermudah agen-agen infeksius untuk masuk ke dalam sistem pertahanan tubuh.

Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap hipotesis alternatif bahwa status gizi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian ISPA pada balita. Kejadian penyakit ISPA secara dominan ditemukan pada kelompok balita dengan status gizi kurang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Rahayuningrum & Nur, 2021) yang berjudul "Hubungan Status Gizi dan Status Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut pada Balita di Kota Padang". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proporsi kejadian ISPA lebih tinggi pada balita dengan status gizi kurang (90.2%). Analisis statistik dengan uji *Chi-square* menunjukkan nilai $p\text{-value}$ sebesar $0.000 < 0.05$. Penyakit infeksi dan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik dan sebab akibat. Penyakit

infeksi dapat memperburuk status gizi dan seseorang dengan status gizi yang buruk menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Tubuh mempunyai cukup kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap penyakit infeksi dalam keadaan gizi yang baik (Widyawati et al., 2020). Jika keadaan gizi semakin buruk maka reaksi kekebalan tubuh akan menurun dan menyebabkan kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap serangan infeksi menjadi turun. Balita yang mengalami status gizi kurang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) (Widyawati et al., 2020). Menurut peneliti, jika kondisi gizi mengalami kekurangan, ini akan mengakibatkan penurunan ketahanan tubuh, sementara virulensi patogen meningkat, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang berpotensi memicu infeksi. Salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ini adalah status gizi individu. Anak balita yang mengalami kekurangan gizi lebih rentan terhadap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dibandingkan dengan mereka yang memiliki status gizi normal, karena sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan intervensi yang fokus pada perbaikan status gizi, terutama mulai dari usia bayi hingga balita.

Dari analisis data, ditemukan bahwa ada balita yang memiliki status gizi yang baik, tetapi mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Penting untuk dicatat bahwa ISPA pada balita tidak hanya dipengaruhi oleh status gizi mereka, tetapi juga oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti, seperti riwayat pemberian ASI eksklusif, kepadatan hunian, perilaku merokok anggota keluarga, dan pendapatan orang tua.

4. Hubungan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa balita dengan status imunisasi pentabio tidak lengkap mayoritas mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan persentase 83.7%. Sementara balita yang memiliki status imunisasi lengkap mayoritas tidak mengalami ISPA. Hasil analisis *Chi-square* menunjukkan *p-value* $(0,002) < \alpha(0,05)$, mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara kelengkapan imunisasi dan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahayuningrum & Nur, 2021), di mana sebagian besar balita yang mengalami ISPA memiliki status imunisasi tidak lengkap sebanyak 78,2%, dibandingkan dengan balita yang memiliki status imunisasi lengkap sebanyak 22,6%. Hasil uji statistik menggunakan uji *Chi-square* menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,000, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara status imunisasi dan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Lubuk Buaya Padang pada tahun 2019.

Kelengkapan vaksin Pentabio dapat berpotensi memengaruhi kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita. Salah satu mekanisme utama vaksin dalam kelengkapan ini adalah vaksin Difteri. Dalam komposisinya, vaksin DPT mengandung antigen dari bakteri *Corynebacterium diphtheriae*, penyebab difteri. Proses imunisasi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat mengenali dan melawan bakteri tersebut. Begitu juga dengan vaksin Pertusis dalam kelengkapan Pentabio, yang mengandung antigen dari *Bordetella pertussis*, penyebab batuk rejan. Antibodi yang dihasilkan melalui vaksinasi memberikan

perlindungan terhadap infeksi dan mencegah perkembangan penyakit. Keduanya bekerja sinergis untuk memperkuat respons kekebalan tubuh, yang dapat berperan dalam mengurangi risiko terjadinya ISPA pada balita (Plotkin et al., 2018). Vaksin Haemophilus influenzae tipe B (HiB) beroperasi melalui stimulasi respons imun tubuh untuk menghasilkan perlindungan alami, yaitu antibodi, terhadap patogen penyebab penyakit ini (WHO, 2016). Komponen utama vaksin ini berasal dari polisakarida gula yang melapisi bakteri tersebut. Antibodi yang dihasilkan sebagai respons terhadap polisakarida Hib tersebut bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap infeksi tersebut (Offit, 2020). Vaksin ini termasuk dalam kategori vaksin konjugat, di mana polisakarida PRP (polyribosylribitol phosphate) dihubungkan dengan suatu protein pembawa. Proses penghubungan, yang disebut konjugasi, merupakan elemen kunci yang membuat vaksin mampu efektif dalam memicu respons kekebalan terhadap bakteri Haemophilus influenzae tipe B (CDC, 2021).

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Haris et al., 2022) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara status imunisasi dan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita di wilayah kerja Puskesmas Padongko. Hal ini diindikasikan oleh *p-value* sebesar 0,737. Balita yang telah menerima imunisasi lengkap namun mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menunjukkan bahwa kejadian ISPA tidak terjadi secara langsung setelah pemberian imunisasi, melainkan mungkin terjadi beberapa waktu setelahnya. Menurut peneliti, Imunisasi seperti pentabio (DPT-HB-HiB) bertindak sebagai salah satu langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan kejadian ISPA pada balita. Walaupun balita telah mendapatkan imunisasi lengkap, kejadian ISPA pada mereka tetap mungkin terjadi, terutama jika belum mencapai tingkat optimal.

Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa imunisasi memiliki peran terutama dalam mencegah faktor risiko yang terkait dengan ISPA, meskipun tidak menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap penyakit tersebut. Dari analisis data, ditemukan bahwa masih ada balita yang mendapatkan imunisasi pentabio lengkap, tetapi mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Penting untuk dicatat bahwa ISPA pada balita tidak hanya dipengaruhi oleh kelengkapan imunisasi pentabio mereka, tetapi juga oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti, seperti riwayat pemberian ASI eksklusif, kepadatan hunian, perilaku merokok anggota keluarga, dan pendapatan orang tua.

C. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar pada bulan Januari 2024 ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut.

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga validitas data tidak dapat dikontrol oleh peneliti.
2. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel perancu yang tidak dapat peneliti kendalikan, yaitu tingkat pendapatan orang tua, kepadatan hunian, perilaku merokok anggota keluarga, serta riwayat pemberian ASI eksklusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi hubungan antara status gizi dan kelengkapan imunisasi dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut pada balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022 menggunakan uji *Chi square*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita dengan *p-value* 0.000.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara kelegkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita dengan *p-value* 0.002.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Saran untuk masyarakat terkhusus orang tua agar lebih memerhatikan pentingnya pemeliharaan status gizi yang optimal dan kelengkapan imunisasi bagi balita serta mampu mengenali faktor-faktor lainnya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan petugas kesehatan mengisi data rekam medis dengan lengkap dan menggunakan penulisan yang jelas, atau menyediakan sistem rekam medik elektronik untuk mempermudah penelitian kasus oleh para peneliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar data, direkomendasikan untuk memperluas penelitian dengan memasukkan imunisasi dasar PCV dan variabel tambahan lainnya yang terkait dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Penelitian yang lebih lanjut juga dapat memperluas cakupan wilayah geografis atau melibatkan puskesmas di berbagai lokasi di Kota Makassar, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.



KEPUSTAKAAN

- Abukhaer, S. R., Najamuddin, Asrul Abdul Azis, & Abd. Rahman. (2023). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pencapaian Target Imunisasi Dasar Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 22(2), 154–161. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v22i2.500>
- Afriani, B. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita. *Cendekia Medika*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.52235/cendekiamedika.v5i1.8>
- Aripin, & Sasongko, H. P. (2019). Pengaruh Paparan Asap Rokok dalam Rumah Terhadap Kejadian ISPA Pada Balita di Puskesmas Kapongan Situbondo. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida*, 6(2), 121–134. <https://doi.org/10.55500/jikr.v6i2.122>
- Atira. (2017). Nutrition Status and Immunization as Determinant of Acute Respiratory Infection on Toddlers. *Heal. Notions*, 1(3), 266–272.
- Berlina, E. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Gizi pada Balita di Posyandu Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. 10, 6.
- Bianchi, I., Lleo, A., Gershwin, M. E., & Invernizzi, P. (2012). The X chromosome and immune associated genes. *Journal of Autoimmunity*, 38(2–3). <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2011.11.012>
- CDC. (2021). *About Hib Vaccines*. 4–5. <https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hib/hcp/about-vaccine.html>
- Dagne, H., Andualem, Z., Dagne, B., & Taddese, A. A. (2020). Acute respiratory infection and its associated factors among children under-five years attending pediatrics ward at University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, Northwest Ethiopia: Institution-based cross-sectional study. *BMC Pediatrics*, 20(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12887-020-1997-2>
- Govers, C., Calder, P. C., Savelkoul, H. F. J., Albers, R., & van Neerven, R. J. J. (2022). Ingestion, Immunity, and Infection: Nutrition and Viral Respiratory Tract Infections. *Frontiers in Immunology*, 13(February), 1–22. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.841532>
- Haris, N., Rismayanti, R., & Dwinata, I. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ispa Pada Balita. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 2(3), 251–265. <https://doi.org/10.30597/hjph.v2i3.13519>
- Hasrul, H., Hamzah, H., & Hafid, A. (2020). Pengaruh Pola Asuh Terhadap Status Gizi Anak. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 792–797. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i2.403>

- Intan Kamala Aisyiah, Eka Trio Effandilus, N. B. (2023). *Hubungan Jenis Kelamin dan Berat Badan Lahir dengan Kejadian ISPA pada Balita*. 4, 6031–6037.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/21835/16273>
- Iskandar, A., Tanuwijaya, S., & Yuniarti, L. (2015). Hubungan Jenis Kelamin dan Usia Anak Satu Tahun Sampai Lima Tahun dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). *Global Medical & Health Communication (GMHC)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29313/gmhc.v3i1.1538>
- JD, O., Harper PT, H., SD, R., AS, I., INS, D., OC, A., AN, A., G, I., T, J., & P, D. (2017). The Relationship of Gender in the Pattern and Risk of Acute Respiratory Infection among Infants in Rivers State, Nigeria. *Journal of Community Medicine & Health Education*, 07(06). <https://doi.org/10.4172/2161-0711.1000569>
- Kemendes RI. (2011). *Pedoman Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut*.
- Kemendes RI. (2015). Buku Ajar Imunisasi. In *Kementerian Kesehatan RI*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SZEswjdl5uoBOEflQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1698155180/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fakbid-sby.org%2Fnew%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FBuku-Ajar-Imunisasi.pdf/RK=2/RS=_5.1ZgsfwAnKtx_zEEprgrtHv8
- Kemendes RI. (2020a). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak. *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Kemendes RI. (2020b). *Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi pada Masa Pandemi COVID-19*. https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/juknis-pelayanan-imunisasi-pada-masa-pandemi-covid-19.pdf?sfvrsn=cf2391f2_2
- Kemendes RI. (2022a). *Faktor Risiko Terjadi ISPA pada Balita*. 1–1. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1789/faktor-risiko-terjadi-ispa-pada-balita
- Kemendes RI. (2022b). *Faktor Risiko Terjadi ISPA pada Balita*. 1–1.
- Kemendes RI. (2022c). *Kemendes Tambah 3 Jenis Vaksin Imunisasi Rutin*. April, 1–7.
- Kemendes RI. (2022d). *Pentingnya Imunisasi Bagi Anak*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1331/pentingnya-imunisasi-bagi-anak
- Komala, N. S., M.Mukhtar, Hipni, R., & Setiawati, E. (2022). Umur Balita Dan Status Imunisasi Pentabio (Dpt Hb-Hib) Dengan Kejadian Ispa Pada Balita. *Mahakam Midwifery Journal*, 7(1), 28–36.


- Kunoli, F. (2013). Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular: untuk Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. In *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular: untuk Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*.
- Lalu, S. T., Akili, R. H., & Maddusa, S. S. (2020). Gambaran faktor kesehatan lingkungan pada balita 12 - 59 Bulan dengan penyakit ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kema tahun 2020. *Kemas*, 9(7), 190-199. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/>
- Lazamidarmi, D., Sitorus, R. J., & Listiono, H. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 299. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1163>
- Lea, A. I., Febriyanti, E., Trianista, S. O., & Bangsa, C. (2022). *Gambaran Faktor Penyebab Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita (Status Gizi dan Status Imunisasi) di Wilayah Kerja Puskesmas Sikumana. VOL.13 NO., 67-75.*
- Lei, C., Lou, C. T., Io, K., SiTou, K. L., Ip, C. P., Hongjin, U., Pan, B., & Ung, C. O. L. (2022). Viral etiology among children hospitalized for acute respiratory tract infections and its association with meteorological factors and air pollutants: a time-series study (2014-2017) in Macao. *BMC Infectious Diseases*, 22(1), 1-13. <https://doi.org/10.1186/s12879-022-07585-y>
- Ma, Y., Lu, L., & Mai, Q. (2021). Clinical Diagnosis and Treatment Characteristics of Acute Respiratory Infections in Children and New Developments in Laboratory Testing. *Open Journal of Pediatrics*, 11(01), 114-124. <https://doi.org/10.4236/ojped.2021.111011>
- Maakh, Y. F., Laning, I., & Tattu, R. (2017). Profil Pengobatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada Balita Di Puskesmas Rambangaru Tahun 2015 Profile of Treatment for Acute Respiratory Infection (ARI) in Toddlers at Rambangaru Health Center in 2015. *Profil Pengobatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada Balita Di Puskesmas Rambangaru Tahun 2015 Profile of Treatment for Acute Respiratory Infection (ARI) in Toddlers at Rambangaru Health Center in 2015*, 15(2), 435-450.
- Martini, F. H., Timmons, M. J., & Rober B. Tallitsch. (2012). Human Anatomy Seventh Edition. In *Human anatomy* (Seventh). Pearson Education.
- Nurjamillah, S. Y., & Dwiriani, C. M. (2022). Status Gizi dengan Kejadian ISPA Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Unyur Kota Serang Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Gizi Dan Dietetik*, 1(2). <https://doi.org/10.25182/jigd.2022.1.2.95-102>
- Offit, P. A. (2020). *A Look at Each Vaccine: Haemophilus Influenzae Type B (Hib) Vaccine.* <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/haemophilus-influenzae-type-b-hib-vaccine>
- Plotkin, S., Orenstein, W., Offit, P., & Kathryn, M. E. (2018). Plotkin's Vaccines - 7th Edition. In *Elsevier.* <https://www.sciencedirect.com/book/9780323357616/plotkins-vaccines#book-info>

- Pratiwi, A. E. M., Raully Ramadhani, & Utami Murti Pratiwi. (2022). Hubungan Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Dengan Angka Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (IsPa) Pada Balita Usia 6-12 Bulan. *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 6(1), 21-26. <https://doi.org/10.24252/alami.v6i1.27001>
- Putri, A., Dwi, F., & Achmadi, U. F. (2020). Hubungan Konsentrasi Kadar Debu PM10 dengan Kejadian Gejala ISPA pada Pekerja Proyek Konstruksi X di Depok. *Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global*, 1(3), 272-283.
- Rahayuningrum, D. C., & Nur, S. A. (2021). Hubungan Status Gizi dan Status Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut pada Balita Kota Padan. *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 7(1). <https://doi.org/10.36053/mesencephalon.v7i1.247>
- Kemenag RI. (2022). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Rifai, A. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga*.
- RISKESDAS. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional. In *Lembaga Penerbit Balitbangkes* (p. hal 156).
- Riskesdas Kab/kota. (2018). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* (Vol. 110, Issue 9). <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/lpb/article/view/3658>
- Rizqullah, N., Putri, M., & Zulmansyah, Z. (2021). Hubungan Status Imunisasi Dasar terhadap Pneumonia pada Pasien Balita Rawat Inap di RSIA Respati Tasikmalaya. *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains*, 3(1), 19-23. <https://doi.org/10.29313/jiks.v3i1.7296>
- Saharuddin. (2017). Perbandingan Derajat Status Gizi Anak Berdasarkan Riwayat Pemberian Asi Eksklusif. *Alami Journal*, 1(1), 90-100.
- Sherwood, L. (2018). Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem. In *EGC* (9th ed.). EGC.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah (Jilid 1). In *Tafsir Al-Misbah*.
- Shihab, M. Q. (2006). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah (Jilid 2). In *Lentera Hati* (Vol. 2). https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir_Al-Mishbah_Jilid_14_-_Dr._M._Quraish_Shihab.pdf
- Shihab, M. Q. (2009). Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 11. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 11(01), 96.
- Soesilo, T. D. (2019). Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan. In *Satya Wacana University Press*.

- Suci, U., & Kuswandi, K. (2016). Hubungan status imunisasi dan status gizi dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada balita. *Jurnal Obstretika Scientia*, 4(2).
- Suharno, I., Akili, R. H., Boky, H. B., Kesehatan, F., Universitas, M., & Alami, P. (2019). Hubungan Kondisi Fisik Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Wawonasa Kota Manado. *Kesmas*, 8(4), 96–103.
- Sutanto, L. B. (2022). *Penilaian Status Gizi bagi Pemula*. [http://repository.ukrida.ac.id/bitstream/123456789/1269/1/Buku ajar Penilaian Status Gizi Bagi Pemula final.pdf](http://repository.ukrida.ac.id/bitstream/123456789/1269/1/Buku%20ajar%20Penilaian%20Status%20Gizi%20Bagi%20Pemula%20final.pdf)
- Sutriyawan, Agung Kurniawati, Ratna Dian Rahayu, Sri Habibi, J. (2020). Hubungan Status Imunisasi Dan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita: Studi Retrospektif. *Journal Of Midwifery*, 8(2), 1–9. <https://doi.org/10.37676/jm.v8i2.1197>
- Syahza, A. (2021). Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021). In *UR Press Pekanbaru* (Issue 01).
- Tompubolon, S. (2019). *Gambaran Peresepan Antibiotik terhadap Pengobatan ISPA di RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah*.
- Wahyuni, F., Mariati, U., & Zuriati, T. S. (2020). Hubungan Pemberian Asi Eksklusif dan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian ISPA pada Anak Usia 12-24 Bulan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.32584/jika.v3i1.485>
- Widyawati, W., Hidayah, D., & Andarini, I. (2020). Hubungan Status Gizi dengan Angka Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita Usia 1-5 Tahun di Surakarta. *Smart Medical Journal*, 3(2), 59. <https://doi.org/10.13057/smj.v3i2.35649>
- World Health Organization. (2016). *Haemophilus influenzae tipe b (Hib)*. <https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/vaccine-standardization/hib>
- World Health Organization. (2020). Pusat Pengobatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat. In *World Health Organization*. (WHO/2019-nCoV/SARI_treatment_center / 2020.1)

LAMPIRAN

Lampiran 1: Etik Penelitian



KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.027/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama
Principal In Investigator

: Nur Khaliyah

Nama Institusi
Name of the Institution

: UIN Alauddin Makassar

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN STATUS GIZI DAN KELENGKAPAN IMUNISASI DENGAN KEJADIAN
INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT PADA BALITA DI PUSKESMAS MINASA
UPA KOTA MAKASSAR TAHUN 2022"**

**"THE RELATIONSHIP OF NUTRITIONAL STATUS AND COMPLETENESS OF
IMMUNIZATION WITH THE INCIDENCE OF ACUTE RESPIRATORY TRACT
INFECTIONS IN TODDLERS IN THE MINASA UPA HEALTH CENTER, MAKASSAR
CITY, 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemertanian Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privasi, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 18, 2023 until December 18, 2024.

December 18, 2023
Chairperson and Chairperson,
M. H. S. Jamil, S.Si., M.Si., Apt.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **30389/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5380/Un.06/LP2M/PP.00.9/11/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NUR KHAIRIYAH**
Nomor Pokok : **70600120008**
Program Studi : **Pendidikan Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN STATUS GIZI DAN KELENGKAPAN IMUNISASI DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT PADA BALITA DI PUSKESMAS MINASA UPA KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 November 2023

ALAUDDIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian DPM-PTSP Kota



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstsp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/957/SKP/SB/DPMPSTSP/12/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/957/SKP/SB/DPMPSTSP/12/2023, Tanggal 30 November 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 957/SKP/SB/BKBP/12/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : NUR KHAIRIYAH
NIM / Jurusan : 70600120008 / Pendidikan Dokter
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa
Lokasi Penelitian : Terlampir,-
Waktu Penelitian : 01 Desember 2023 - 31 Januari 2024
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : "HUBUNGAN STATUS GIZI DAN KELENGKAPAN IMUNISASI DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT PADA BALITA DI PUSKESMAS MUNASA BANGSA KOTA MAKASSAR TAHUN 2022"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-12-29 15:42:40



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar**

No : 440/7/PSDK/XII/2023
Lamp :-
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Minasa Upa
Di-
Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/650/SKP/DPMP/TSP/9/2023 tanggal 29 Desember 2023, maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Nur Khairiyah
NIM : 70600120008
Jurusan : S1 Pendidikan Dokter
Institusi :
Tanggal Penelitian : 1 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024
Judul Disertasi : Hubungan Status gizi dan kelengkapan Imunisasi dengan kejadian infeksi saluran pernafasan akut pada balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar tahun 2022

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 4 Januari 2024
Kepala Dinas kesehatan
Kota Makassar

dr. Nursalim Sirajuddin, M.Kes
Pangkat: Pembina TK I/IV B
NIP : 19730112 2006042012

Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Meneliti

| | | |
|--|--|---|
|  | PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MINASA UPA <i>Jl. Minasa Upa Raya 18 telp. (0411) 882998 Makassar</i> |  |
| <hr/> | | |
| <u>SURAT KETERANGAN</u> No : 003.1/ PKM.MU/1/2024 | | |
| <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Puskesmas Minasa Upa menerangkan bahwa :</p> | | |
| Nama | : Nur Khairiyah | |
| Nim/Jurusan | : 70600120008 / Pendidikan Dokter | |
| Instansi | : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | |
| Judul | : Hubungan Status Gizi dan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022. | |
| <p>Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Minasa Upa pada tanggal 04 sd 26 Januari 2024.</p> | | |
| <p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> | | |
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR | | |
| Makassar, 30 Januari 2024 Pit. Kepala Puskesmas Minasa Upa | | |
|  dr. Yulianingsih Tamrin Nip. 19790703 200502 2 005 | | |

Lampiran 6: Master Tabel

| | Nomor RM | Nama | Domisili | Jenis Kelamin | Usia (bulan) | Berat Badan (kg) | Status Gizi (BB/U) | Kelengkapan Imunisasi | Diagnosis |
|----|----------|---------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 1 | | An. AMG | Katangka | Laki - laki | 20 | 9 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 2 | | An. ANR | Minasa Upa | Perempuan | 37 | 10,7 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 3 | | An. APA | Minasa Upa | Perempuan | 19 | 8,5 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 4 | | An. A | Minasa Upa | Laki - laki | 39 | 11,3 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 5 | | An. AR | Katangka | Laki - laki | 16 | 8,6 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 6 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 17 | 8,5 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 7 | | An. AH | Minasa Upa | Laki - laki | 12 | 9,6 | Normal | Tidak Lengkap | Tidak ISPA |
| 8 | | An. AA | Minasa Upa | Perempuan | 19 | 10,5 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 9 | | An. ASK | Minasa Upa | Perempuan | 25 | 10 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 10 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 16 | 11,2 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 11 | | An. AAR | Minasa Upa | Laki - laki | 37 | 10,8 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 12 | | An. AD | Minasa Upa | Laki - laki | 32 | 9,7 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 13 | | An. AA | Minasa Upa | Perempuan | 12 | 7,7 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 14 | | An. AZ | Minasa Upa | Perempuan | 25 | 10,5 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 15 | | An. AM | Katangka | Perempuan | 54 | 12,5 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 16 | | An. AZ | Minasa Upa | Perempuan | 43 | 14,1 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 17 | | An. AU | Minasa Upa | Laki - laki | 36 | 8,8 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 18 | | An. AM | Minasa Upa | Perempuan | 15 | 7,4 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 19 | | An. AZ | Minasa Upa | Perempuan | 47 | 14 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 20 | | An. AK | Minasa Upa | Perempuan | 12 | 10,5 | Normal | Tidak Lengkap | Tidak ISPA |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------------|-------------|----|------|--------|---------------|------------|
| 21 | | An. ARS | Minasa Upa | Laki - laki | 20 | 9,9 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 22 | | An. A | Minasa Upa | Perempuan | 18 | 9,5 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 23 | | An. AF | Minasa Upa | Perempuan | 14 | 8 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 24 | | An. A | Minasa Upa | Perempuan | 14 | 8 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 25 | | An. A | Minasa Upa | Laki - laki | 22 | 8,9 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 26 | | An. A | Minasa Upa | Perempuan | 14 | 6,4 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 27 | | An. ATM | Minasa Upa | Perempuan | 23 | 8,1 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 28 | | An. AR | Minasa Upa | Laki - laki | 19 | 10,1 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 29 | | An. AA | Katangka | Perempuan | 33 | 9,8 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 30 | | An. AK | Minasa Upa | Perempuan | 24 | 11,7 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 31 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 35 | 12,1 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 32 | | An. B | Minasa Upa | Laki - laki | 15 | 10,3 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 33 | | An. DMA | Minasa Upa | Perempuan | 14 | 8,5 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 34 | | An. AF | Minasa Upa | Perempuan | 18 | 8 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 35 | | An. AP | Minasa Upa | Laki - laki | 56 | 17,5 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 36 | | An. F | Minasa Upa | Perempuan | 24 | 12 | Normal | Tidak Lengkap | Tidak ISPA |
| 37 | | An. AN | Minasa Upa | Perempuan | 22 | 8 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 38 | | An. AP | Minasa Upa | Perempuan | 18 | 8,9 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 39 | | An. AA | Minasa Upa | Perempuan | 57 | 12 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 40 | | An. F | Minasa Upa | Laki - laki | 22 | 11,2 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 41 | | An. GRA | Minasa Upa | Laki - laki | 17 | 12 | Normal | Tidak Lengkap | Tidak ISPA |
| 42 | | An. HNI | Minasa Upa | Laki - laki | 54 | 14,8 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 43 | | An. H | Minasa Upa | Perempuan | 17 | 7,6 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 44 | | An. H | Katangka | Perempuan | 49 | 14,4 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------------|-------------|----|------|--------|---------------|------------|
| 45 | | An. AI | Minasa Upa | Perempuan | 47 | 13,5 | Normal | Tidak Lengkap | Tidak ISPA |
| 46 | | An. I | Katangka | Perempuan | 14 | 6,9 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 47 | | An. AH | Minasa Upa | Perempuan | 37 | 16,3 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 48 | | An. J | Minasa Upa | Perempuan | 27 | 9,6 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 49 | | An. AI | Minasa Upa | Laki - laki | 52 | 14,5 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 50 | | An. AT | Minasa Upa | Perempuan | 14 | 7,6 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 51 | | An. K | Katangka | Perempuan | 36 | 13,7 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 52 | | An. AM | Minasa Upa | Laki - laki | 37 | 13,6 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 53 | | An. K | Minasa Upa | Perempuan | 47 | 13,6 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 54 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 15 | 8,8 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 55 | | An. KAG | Minasa Upa | Laki - laki | 24 | 10,3 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 56 | | An. LIH | Minasa Upa | Perempuan | 24 | 12,1 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 57 | | An. AV | Katangka | Perempuan | 32 | 11,1 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 58 | | An. MDL | Minasa Upa | Perempuan | 15 | 7,1 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 59 | | An. AE | Katangka | Perempuan | 15 | 7,1 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 60 | | An. M | Minasa Upa | Perempuan | 42 | 13,9 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 61 | | An. M | Minasa Upa | Perempuan | 36 | 17,6 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 62 | | An. M | Minasa Upa | Perempuan | 19 | 8 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 63 | | An. MHR | Katangka | Perempuan | 32 | 10,6 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 64 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 41 | 12 | Normal | Tidak Lengkap | Tidak ISPA |
| 65 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 45 | 11,7 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 66 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 13 | 9 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 67 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 57 | 15 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 68 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 48 | 13 | Normal | Lengkap | ISPA |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------|------------|-------------|----|------|--------|---------------|------------|
| 69 | | An. AF | Minasa Upa | Laki - laki | 15 | 8,6 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 70 | | An. AH | Minasa Upa | Laki - laki | 42 | 11,8 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 71 | | An. MYAH | Minasa Upa | Laki - laki | 15 | 8,1 | Kurang | Lengkap | Tidak ISPA |
| 72 | | An. MAC | Minasa Upa | Laki - laki | 13 | 13,2 | Normal | Tidak Lengkap | Tidak ISPA |
| 73 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 44 | 13,4 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 74 | | An. MDH | Minasa Upa | Laki - laki | 47 | 13,4 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 75 | | An. AG | Minasa Upa | Laki - laki | 32 | 10,3 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 76 | | An. AG | Minasa Upa | Laki - laki | 19 | 8,8 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 77 | | An. AK | Minasa Upa | Laki - laki | 21 | 7,4 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 78 | | An. AZ | Minasa Upa | Laki - laki | 26 | 9,2 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 79 | | An. MFA | Minasa Upa | Laki - laki | 30 | 12,4 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 80 | | An. AR | Minasa Upa | Laki - laki | 24 | 11,5 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 81 | | An. AR | Minasa Upa | Perempuan | 19 | 8,7 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 82 | | An. AA | Minasa Upa | Perempuan | 20 | 7,8 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 83 | | An. AA | Minasa Upa | Perempuan | 24 | 12,3 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 84 | | An. NAU | Minasa Upa | Perempuan | 55 | 11,4 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 85 | | An. AA | Minasa Upa | Perempuan | 30 | 9,2 | Kurang | Lengkap | Tidak ISPA |
| 86 | | An. AA | Minasa Upa | Perempuan | 20 | 9 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 87 | | An. AA | Katangka | Perempuan | 31 | 9,3 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 88 | | An. NRH | Minasa Upa | Laki - laki | 40 | 12,4 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 89 | | An. O | Minasa Upa | Perempuan | 45 | 11,1 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 90 | | An. P | Minasa Upa | Laki - laki | 13 | 12 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 91 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 16 | 9,3 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------------|-------------|----|------|--------|---------------|------------|
| 92 | | An. AN | Minasa Upa | Perempuan | 58 | 12,9 | Kurang | Lengkap | Tidak ISPA |
| 93 | | An. AA | Minasa Upa | Laki - laki | 17 | 19,3 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 94 | | An. R | Katangka | Laki - laki | 42 | 11,4 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 95 | | An. AF | Minasa Upa | Laki - laki | 18 | 14,8 | Normal | Tidak Lengkap | ISPA |
| 96 | | An. AM | Minasa Upa | Laki - laki | 28 | 9,8 | Kurang | Lengkap | Tidak ISPA |
| 97 | | An. AH | Minasa Upa | Perempuan | 47 | 11,7 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 98 | | An. AK | Minasa Upa | Perempuan | 34 | 10 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 99 | | An. AR | Minasa Upa | Perempuan | 55 | 12,9 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 100 | | An. SIZ | Minasa Upa | Perempuan | 55 | 12,2 | Kurang | Lengkap | ISPA |
| 101 | | An. AP | Minasa Upa | Perempuan | 49 | 13,7 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 102 | | An. U | Minasa Upa | Laki - laki | 44 | 14 | Normal | lengkap | Tidak ISPA |
| 103 | | An. U | Minasa Upa | Laki - laki | 41 | 13,8 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |
| 104 | | An. AF | Minasa Upa | Perempuan | 46 | 11,5 | Kurang | Tidak Lengkap | ISPA |
| 105 | | An. W | Minasa Upa | Laki - laki | 51 | 16,2 | Normal | Lengkap | ISPA |
| 106 | | An. YBT | Minasa Upa | Laki - laki | 43 | 12,1 | Normal | Lengkap | Tidak ISPA |

Lampiran 7: Hasil SPSS

1. Analisis Univariat

| Jenis Kelamin | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Laki-laki | 50 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| | Perempuan | 56 | 52.8 | 52.8 | 100.0 |
| | Total | 106 | 100.0 | 100.0 | |

| Usia | | | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | 12-35 bulan | 66 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
| | 36-59 bulan | 40 | 37.7 | 37.7 | 100.0 |
| | Total | 106 | 100.0 | 100.0 | |

| Status Gizi | | | | | |
|-------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Kurang | 44 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| | Baik | 62 | 58.5 | 58.5 | 100.0 |
| | Total | 106 | 100.0 | 100.0 | |

| Kelengkapan Imunisasi | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Tidak Lengkap | 43 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| | Lengkap | 63 | 59.4 | 59.4 | 100.0 |
| | Total | 106 | 100.0 | 100.0 | |

| Kejadian ISPA | | | | | |
|---------------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Tidak ISPA | 35 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| | ISPA | 71 | 67.0 | 67.0 | 100.0 |
| | Total | 106 | 100.0 | 100.0 | |

2. Analisis Bivariat

| | | Status_Gizi * Kejadian_ISPA Crosstabulation | | | |
|-------------|----------------------|---|------------|--------|--------|
| | | Kejadian_ISPA | | Total | |
| Status_Gizi | Kurang | ISPA | Tidak ISPA | | |
| | | | Count | 40 | 4 |
| | Expected Count | 29.5 | 14.5 | 44.0 | |
| | % within Status_Gizi | 90.9% | 9.1% | 100.0% | |
| Status_Gizi | Baik | Count | 31 | 31 | 62 |
| | | Expected Count | 41.5 | 20.5 | 62.0 |
| | | % within Status_Gizi | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| Total | Count | 71 | 35 | 106 | |
| | Expected Count | 71.0 | 35.0 | 106.0 | |
| | % within Status_Gizi | 67.0% | 33.0% | 100.0% | |

| Chi-Square Tests | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
| Pearson Chi-Square | 19.474 ^a | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction ^b | 17.669 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 21.716 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 19.291 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 106 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.53.

b. Computed only for a 2x2 table

| Risk Estimate | | | |
|--|--------|-------------------------|--------|
| | Value | 95% Confidence Interval | |
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Status_Gizi (Kurang / Baik) | 10.000 | 3.192 | 31.331 |
| For cohort Kejadian_ISPA = ISPA | 1.818 | 1.394 | 2.372 |
| For cohort Kejadian_ISPA = Tidak ISPA | .182 | .069 | .478 |
| N of Valid Cases | 106 | | |

| | | Kelengkapan_Imunisasi * Kejadian_ISPA Crosstabulation | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------|--------|--------|
| | | Kejadian_ISPA | | Total | |
| | | ISPA | Tidak ISPA | | |
| Kelengkapan_Imunisasi | Tidak Lengkap | Count | 36 | 7 | 43 |
| | | Expected Count | 28.8 | 14.2 | 43.0 |
| | | % within Kelengkapan_Imunisasi | 83.7% | 16.3% | 100.0% |
| | Lengkap | Count | 35 | 28 | 63 |
| | | Expected Count | 42.2 | 20.8 | 63.0 |
| | | % within Kelengkapan_Imunisasi | 55.6% | 44.4% | 100.0% |
| Total | Count | 71 | 35 | 106 | |
| | Expected Count | 71.0 | 35.0 | 106.0 | |
| | % within Kelengkapan_Imunisasi | 67.0% | 33.0% | 100.0% | |
| | | | | | |

| Chi-Square Tests | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
| Pearson Chi-Square | 9.167 ^a | 1 | .002 | | |
| Continuity Correction ^b | 7.938 | 1 | .005 | | |
| Likelihood Ratio | 9.710 | 1 | .002 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .003 | .002 |
| Linear-by-Linear Association | 9.080 | 1 | .003 | | |
| N of Valid Cases | 106 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.20.

b. Computed only for a 2x2 table

| Risk Estimate | | | |
|--|-------|-------------------------|--------|
| | Value | 95% Confidence Interval | |
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Kelengkapan_Imunisasi (Tidak Lengkap / Lengkap) | 4.114 | 1.591 | 10.638 |
| For cohort Kejadian_ISPA = ISPA | 1.507 | 1.165 | 1.949 |
| For cohort Kejadian_ISPA = Tidak ISPA | .366 | .176 | .761 |
| N of Valid Cases | 106 | | |

Lampiran 8: Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Nur Khairiyah
2. NIM : 70600120008
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Parepare/30 Agustus 2001
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Bau Masepe No. 215, Parepare
8. Orang Tua
Ayah : Amiruddin
Ibu : Hadidah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 275 Jampuserenge
2. SMP : SMP Pesantren Puteri Ummul Mukminin
3. SMA : SMA Negeri 2 Parepare

Penulis melanjutkan studi S1 di UIN Alauddin Makassar pada jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.