

**ANALISIS KADAR NATRIUM BENZOAT DARI BEBERAPA MEREK  
JAJANAN JELLY DI PASAR TRADISIONAL BONTORAMBA  
KABUPATEN JENEPONTO MENGGUNAKAN METODE  
SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh :**

**RAHMA YUNIAR**  
**NIM. 70100119075**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Yuniar  
NIM : 70100119075  
Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto/03 September 2002  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jeneponto  
Judul : Analisis Kadar Natrium Benzoat Dari Beberapa Merek  
Jajanan Jelly Di Pasar Tradisional Bontoramba  
Kabupaten Jeneponto Menggunakan Metode  
Spektrofotometri Uv-Vis

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 22 Januari 2024

Penulis,

**Rahma Yuniar**

**NIM. 70100119075**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Kadar Natrium Benzoat Dari Beberapa Merek Jajanan Jelly Di Pasar Tradisional Bontoramba Kabupaten Jeneponto Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis” yang disusun oleh **Rahma Yuniar, NIM: 70100119075**, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 22 Januari 2024** yang bertepatan dengan **10 Rajab 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 22 Januari 2024

10 Rajab 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. (.....)

Sekretaris : apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. (.....)

Pembimbing II : apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin. (.....)

Penguji I : Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. Wahyuddin G, M.Ag. (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.

NIP. 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad saw sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Skripsi dengan judul “Analisis Kadar Natrium Benzoat Dari Beberapa Merek Jajanan Jelly Di Pasar Tradisional Bontoramba Kabupaten Jeneponto Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis” disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penyelesaian penelitian dan skripsi ini mendapat banyak bimbingan, pengarahan, serta dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada orang yang sangat berarti dalam hidup penulis yakni kedua orang tua Bapak Rahman dan Ibu Maryuni, juga kepada kedua adik tercinta yakni Rahmat Rivaldi dan Rahmat Anugerah serta semua keluarga yang selalu mendoakan dan memotivasi ataupun memberi semangat kepada penulis. Sampai detik ini tanpa doa mereka penulis tidak akan bisa mencapai tahap penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Andi Aderus, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Prof. Muhammad Khalifa Mustami, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof. Muhammad Amry, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Ibu Dr. Patimah S.Kep.,Ns, M.Kes., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Bapak Apt. Muh Rusdi S.Si., M.Si., selaku ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Ibu Apt. Khaerani, S. Farm., M.Farm., Klin., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Sekaligus pembimbing kedua yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan mengoreksi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku pembimbing pertama yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan mengoreksi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si., selaku penguji kompetensi sekaligus pembimbing akademik yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

14. Bapak Dr. Wahyuddin G. M.Ag., selaku penguji agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
16. Teman-teman Interferon Angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang farmasi serta bernilai pahala di sisi Allah swt.

Saran dan kritik yang membangun dari segala pihak guna kesempurnaan skripsi dan penelitian selanjutnya diterima dengan senang hati. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Gowa, 22 Januari 2024

Penulis,

**Rahma Yuniar**

**NIM. 70100119075**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Minuman Jelly .....	10
B. Pengawet .....	23
C. Natrium Benzoat .....	27
D. Spektrofotometri UV-Vis .....	33
E. Tinjauan Islami .....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	48
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	48
1. Jenis Penelitian .....	48
2. Lokasi Penelitian .....	48

3. Waktu Penelitian .....	48
B. Populasi dan Sampel .....	48
1. Populasi .....	48
2. Sampel .....	48
C. Alat dan Bahan .....	49
1. Alat .....	49
2. Bahan .....	49
D. Prosedur Kerja .....	49
a. Ekstraksi natrium benzoat pada sampel .....	49
b. Pembuatan larutan baku induk natrium benzoat 100 ppm .....	50
c. Pembuatan deret larutan baku natrium benzoat .....	50
d. Penentuan panjang gelombang maksimum .....	50
e. Pembuatan kurva standar .....	50
f. Penetapan kadar natrium benzoat pada sampel .....	50
g. Analisis data .....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan .....	55
BAB V PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
KEPUSTAKAAN .....	62
LAMPIRAN .....	66
RIWAYAT HIDUP .....	94

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis kegagalan dalam pembuatan jelly .....	13
Tabel 2. Pewarna sintetik yang diizinkan di Indonesia .....	15
Tabel 3. Pewarna sintetik yang dilarang di Indonesia .....	16
Tabel 4. Pemanis jelly .....	16
Tabel 5. Persyaratan mutu permen jelly .....	21
Tabel 6. Daftar pengawet sintetis .....	26
Tabel 7. Pelarut-pelarut yang mengabsorpsi sinar UV pada panjang gelombang spesifik .....	37
Tabel 8. Spektrum Sinar Tampak .....	39
Tabel 9. Hasil ekstraksi natrium benzoat pada sampel .....	52
Tabel 10. Hasil pengukuran absorbansi larutan standar natrium benzoat .....	52
Tabel 11. Hasil pengukuran absorbansi natrium benzoat pada sampel .....	53
Tabel 12. Hasil analisis data kadar natrium benzoat pada sampel .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jelly .....	12
Gambar 2. Jelly cup .....	17
Gambar 3. Jelly serbuk instan .....	18
Gambar 4. Permen jelly .....	19
Gambar 5. Jelly drink .....	22
Gambar 6. Reaksi Sodium Hidroksida dengan Asam Benzoat .....	27
Gambar 7. Struktur molekul natrium benzoat .....	28
Gambar 8. Spektrofotometri UV-Vis Single-beam .....	35
Gambar 9. Skema Spektrofotometri UV-Vis Double-beam .....	36
Gambar 10. Grafik .....	53
Gambar 11. Sampel jelly.....	75
Gambar 12. Spektrofotometri UV-Vis .....	76
Gambar 13. Hasil ekstraksi sampel .....	77
Gambar 14. Larutan sampel jelly .....	78
Gambar 15. Larutan standar natrium benzoat .....	79
Gambar 16. Penentuan panjang gelombang maksimum .....	80
Gambar 17. Pembacaan absorbansi larutan standar natrium benzoat .....	81
Gambar 18. Pembacaan absorbansi natrium benzoat pada sampel .....	82
Gambar 19. Hasil absorbansi larutan standar natrium benzoat .....	83
Gambar 20. Hasil absorbansi larutan natrium benzoat pada sampel .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta lokasi pengambilan sampel .....	66
Lampiran 2. Skema kerja penelitian .....	67
Lampiran 3. Perhitungan kadar natrium benzoat .....	71
Lampiran 4. Gambar sampel jajanan jelly .....	74
Lampiran 5. Gambar alat Spektrofotometri UV-Vis.....	76
Lampiran 6. Gambar hasil ekstraksi sampel jajanan jelly.....	77
Lampiran 7. Gambar larutan sampel jajanan jelly .....	78
Lampiran 8. Gambar larutan standar natrium benzoat .....	79
Lampiran 8. Gambar penentuan panjang gelombang maksimum .....	80
Lampiran 9. Gambar pembacaan absorbansi larutan standar natrium benzoat...	81
Lampiran 10. Gambar pembacaan absorbansi natrium benzoat pada sampel ...	82
Lampiran 11. Gambar hasil absorbansi larutan standar natrium benzoat .....	83
Lampiran 12. Gambar hasil absorbansi natrium benzoat pada sampel .....	84
Lampiran 13. Batas maksimum penggunaan BTP pengawet .....	85

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Rahma Yuniar

NIM : 70100119075

Judul Skripsi : “Analisis Kadar Natrium Benzoat Dari Beberapa Merek Jajanan Jelly Di Pasar Tradisional Bontoramba Kabupaten Jeneponto Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-Vis”

---

Minuman jelly adalah produk minuman semipadat yang terbuat dari sari buah-buahan yang dimasak dalam gula dan ditambah pengawet dimana minuman jelly tidak hanya sekedar minuman biasa, tetapi dapat juga dikonsumsi sebagai minuman penunda lapar dan tekstur yang diinginkan pada minuman jelly saat dikonsumsi menggunakan bantuan sedotan mudah hancur, namun bentuk gelnya masih terasa dimulut yang banyak dijual di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly dan mengetahui kadar natrium benzoat yang terkandung dalam jajanan jelly telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013, yaitu 600 mg/kg. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain analisis deskriptif dengan menggunakan metode teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dan adapun beberapa sampel dalam penelitian ini yaitu jelly Indra<sup>®</sup>, jelly Iki premium<sup>®</sup>, jelly Jiggo<sup>®</sup>, jelly Milenia<sup>®</sup> dan jelly Tiky<sup>®</sup> yang mengandung natrium benzoat dan memenuhi persyaratan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kadar natrium benzoat berbeda dari kelima sampel, yaitu pada sampel A1 sebanyak 2.3943 mg/L, sampel A2 sebanyak 0.8897 mg/L, sampel A3 sebanyak 1.2916 mg/L, sampel A4 sebanyak 1.3660 mg/L dan sampel A5 sebanyak 0.9746 mg/L sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Minuman jelly, Natrium Benzoat, Spektrofotometri UV-Vis

## ABSTRACT

Author's name : Rahma Yuniar  
NIM : 70100119075  
Thesis Title : “Analysis of Sodium Benzoate Levels from Several Brands of Jelly Snacks in the Bontoramba Traditional Market, Jenepono Regency Using the UV-Vis Spectrophotometry Method”

---

Jelly drinks are semisolid drink products made from fruit juice cooked in sugar and added preservative the jelly drink is not just an ordinary drink, but can also be consumed as drinks to delay hunger and the desired texture of jelly drinks when consumed using a straw is easily crushed, but the gel form still feels in the mouth which is widely sold in the market. This research aims to determine the levels of sodium benzoate preservative in jelly snacks and to find out that the levels of sodium benzoate contained in jelly snacks have met the standards set by the Head of BPOM RI Regulation Number 36 of 2013, is 600 mg/kg. This research is a quantitative research that uses a descriptive analysis design using a sampling technique method, namely purposive sampling and some of the samples in this research are jelly Indra<sup>®</sup>, jelly Iki premium<sup>®</sup>, jelly Jiggo<sup>®</sup>, jelly Milenia<sup>®</sup> and jelly Tiky<sup>®</sup> which contains sodium benzoate and meets the requirements. The results showed that there were different levels of sodium benzoate in the five samples, such as in sample A1 is 2.3943 mg/L, sample A2 is 0.8897 mg/L, sample A3 is 1.2916 mg/L, sample A4 is 1.3660 mg/L and sample A5 is 0.9746 mg/L has met the established standards.

Keywords: Jelly Drink, Sodium Benzoate, UV-Vis Spectrophotometry

# BAB I

## PENDAHULIAN

### ***A. Latar Belakang***

Di era milenial, bermunculan bisnis-bisnis modern dengan daya saing, utamanya di Indonesia. Terlihat dari semakin banyaknya produk baru yang diperkenalkan ke pasar. Hal ini menimbulkan persaingan antar berbagai pelaku usaha dalam memperebutkan perhatian konsumennya (Hadi & Zakiah, 2021). Pelaku usaha harus mampu membujuk dan menjunjung tinggi *brand image* yang dimilikinya selain wajib melakukan promosi dan menjaga eksistensi *brand image* yang sudah mapan agar dapat menghasilkan kepuasan pelanggan (Sutomo, dkk., 2022).

Minuman jeli merupakan jenis minuman fungsional masa kini yang dapat diciptakan saat ini; mereka mengandung serat makanan dan baik untuk sistem pencernaan. Masyarakat sudah sangat familiar dengan minuman jelly. Minuman jelly mempunyai keunggulan seperti dapat diproduksi dengan menggunakan teknologi yang sederhana serta bisa disimpan lama apabila produk tersebut pada kondisi penyimpanan yang tepat (Putra, dkk., 2021).

Jelly merupakan produk makanan dengan kandungan separuh padatan minimal 65% bentuknya semi padat, dibuat dari buah juga gula. Menurut (Hariyanto, dkk., 2020) agar-agar dikatakan baik jika warnanya bening, kenyal, aromanya khas, dan rasanya seperti buah segar. Cemilan berbentuk gel, jeli dapat dibuat dengan gula, asam, dan/atau suplemen nutrisi lain yang disetujui menggunakan pektin, agar, karagenan, gelatin, atau senyawa hidrokoloid.

Minuman yang mudah dihisap dikenal minuman jeli karena kekentalan gelnya yang lemah. Jus buah yang dimasak dengan gula digunakan untuk membuat minuman semi padat yang dikenal sebagai minuman jeli. Namun,

konsistensi minuman jeli yang diinginkan jika dikonsumsi melalui sedotan akan mudah musnah. Minuman jeli bukan sekadar minuman biasa, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai cemilan untuk menunda kelaparan yang jika dimakan bentuk gelnya masih terasa jelas dimulut (Desniar, dkk., 2016).

Minuman yang dikenal sebagai jeli dibuat ketika larutan gula dan hidrokoloid dalam air berbentuk gel, menunjukkan kualitas elastis tanpa adanya butiran halus. Minuman semi padat yang disebut jeli diproduksi dengan memasak jus buah dengan gula. Karena kandungan gula pada jelly menurunkan tekanan osmotik sehingga dapat mencegah pertumbuhan bakteri serta penyimpanan produk bisa bertahan lebih lama juga dapat berfungsi sebagai pengendap pektin (Amirudin, dkk., 2019).

Jelly merupakan salah satu jenis produk cemilan di pasaran yang dalam proses produksinya memakai produk pengawet. Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertugas mengawasi peraturan Kementerian Kesehatan mengenai penggunaan bahan pengawet di Indonesia. Bahan pengawet acapkali dipakai dikeseharian, khususnya dalam produksi produk pangan khususnya makanan ringan. Bahan pengawet yang berdampak buruk bagi kesehatan dan tidak boleh digunakan dalam produksi makanan masih banyak digunakan oleh perusahaan makanan. Pengawet dapat digunakan secukupnya atau pada tingkat yang masih dalam batas yang diperbolehkan. Ketika penggunaan bahan pengawet melampaui batas ambang batas, masalah kesehatan dan bahkan penyakit dapat terjadi (Gama Indjar Sabaniah, dkk., 2023).

Pengawet sering digunakan di hampir semua makanan dan minuman. Pengawet adalah senyawa kimia, baik alami maupun buatan, yang memiliki kemampuan untuk menghentikan atau mengurangi kerusakan mikroba dan perubahan warna pada makanan dan minuman. Pengawet ditambahkan ke

makanan dan minuman untuk memperbaiki penampilan, memperpanjang waktu simpan, dan meningkatkan rasa dan tekstur. Natrium benzoat sering kali digunakan pada produk makanan/minuman (Rahmania, dkk., 2020).

Bahan pengawet lebih sering ditambahkan dibandingkan teknik lain karena lebih mudah digunakan dan relatif lebih murah. Benzoat mudah larut di air biasanya ditemukan dinatrium atau kalium benzoat, merupakan bahan pengawet yang sering dipakai mengawetkan makanan. Natrium benzoat bersifat asam (efektif pada pH 2,5–4,0), termasuk minuman berkarbonasi, salad buah, jeli, selai, margarin, ikan, pasta, acar. Benzoat mempunyai aktivitas yang tinggi pada pH asam (Estiasih, 2015).

Karena lebih mudah larut dalam air, menambah rasa asam pada minuman, mudah didapat, dan lebih mudah dibuat dibandingkan bahan pengawet lainnya, natrium benzoat sebagai pengawet umumnya dilihat dimakanan berbentuk garam. Produk makanan yang mengandung natrium benzoat sebagai pengawet terlindungi dari kerusakan mikroba melalui penurunan laju fermentasi dan pembusukan. Hal ini memungkinkan produk makanan tetap segar untuk jangka waktu penyimpanan yang lebih lama, sehingga meningkatkan jangkauan pasarnya (Centhya, 2021).

Natrium benzoat adalah bubuk atau butiran kristal warnanya putih tidak berbau. Ia padat di udara dan gampang larut di air, tetapi lebih sulit larut di etanol 90%. Natrium benzoat adalah pengawet organik (Dirjen POM Edisi VI, 2020: 1215). Natrium benzoat merupakan pengawet minuman atau makanan yang tidak dilarang dan telah diizinkan oleh Pemerintah Indonesia, tetapi pemakaiannya tidak diperbolehkan melampaui batasannya serta penggunaannya tidak boleh berlebihan karena akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan (Ramadhani, dkk., 2019). Sebagai antimikroba, natrium benzoat dapat menghentikan pertumbuhan bakteri, ragi, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Sesuai aturan BPOM RI No 36 Tahun

2013, diperbolehkan bahan tambahan mengandung pengawet natrium benzoat sebanyak 600 mg/kg (Dari, dkk., 2021).

Analisis jumlah kadar bahan pengawet natrium benzoat dalam produk jelly biasanya dilakukan memakai spektrofotometri UV-Vis. Dalam analisis farmasi, metode spektrofotometri UV-Vis umumnya dipakai. Spektrofotometri UV-Vis suatu teknik mendeteksi suatu zat dengan menggunakan daerah serapan pada panjang gelombang UV dan Visible. Informasi mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif, spektrofotometri UV-Vis dipakai. Ciri-ciri penting spektrofotometri UV-Vis mencakup selektivitas yang sangat baik, presisi yang sangat baik, dan sensitivitas yang relatif tinggi. Dibandingkan dengan teknik lain, Spektrofotometri UV-Vis relatif cepat ( Abriyani Ermi., dkk, 2023).

Spektrofotometri UV-Vis teknik analisis berbasis cahaya tampak memakai perangkat spektrofotometer untuk mengukur radiasi elektromagnetik ultraviolet. Ide di balik metode spektrofotometri UV-Vis adalah bahwa molekul-molekul tereksitasi ditingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi ketika mereka menyerap sinar ultraviolet yang terlihat. Teknik yang berguna untuk mengukur serapan cahaya pada daerah ultraviolet (panjang gelombang 100–200 nm) dan cahaya terlihat (panjang gelombang 200–700 nm) adalah spektrofotometri UV-Vis (Harahap, dkk., 2020).

Dengan memakai panjang gelombang UV dan Visible untuk lokasi serapan, pendekatan spektrofotometri UV-Vis merupakan teknik analisis untuk menemukan senyawa. Kategori aoksokrom dan kromofor umumnya terdapat pada zat yang dapat dikenali melalui Spektrofotometri UV-Vis. Dibandingkan yang lain, evaluasi spektrofotometri UV-Vis relatif cepat (Sahumena, dkk., 2020). Teknik ini menawarkan cara cepat dan mudah untuk menilai kualitas bahan kimia yang sangat kecil. Hasilnya sangat akurat, dengan angka yang dibaca oleh

detektor langsung disimpan dan dibuat sebagai nilai numerik atau grafik yang disesuaikan (Taupik, dkk., 2021).

Spektrofotometer Uv-Vis dipakai untuk menganalisis natrium benzoat dilihat dari interaksi cahaya atau sinar disepanjang gelombang khusus dengan materi berbentuk molekul/atom yang mempunyai elektron valensi, sedangkan cahaya dapat berbentuk tampak (visibel), ultraviolet (tidak tampak), atau inframerah. Nama lain cahaya yang berasal dari suatu sumber adalah radiasi elektromagnetik. Spektroskopi emisi, spektroskopi serapan, dan spektroskopi hamburan dipakai mengungkapkan teknik cahaya atau radiasi elektromagnetik dapat berinteraksi dengan materi (Angraini, dkk., 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan uji analisis kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly di pasaran dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Berapa kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly?
2. Apakah kadar natrium benzoat yang terkandung dalam jajanan jelly telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup**

#### **1. Definisi Operasional**

- a. Minuman dengan kekentalan besar terbuat dari buah, kandungannya pectin, gula, asam yang diperlukan untuk membuat gel tanpa menggunakan komponen tambahan yang diperbolehkan menurut aturan disebut minuman jeli.

- b. Natrium benzoat yakni pengawet digunakan dalam makanan dan minuman, natrium benzoat dapat digunakan untuk menghentikan pertumbuhan mikroorganisme dalam suatu produk.
- c. Spektrofotometri UV-Vis suatu teknik analisis mendeteksi senyawa dengan memakai daerah serapan disepanjang gelombang UV dan Visible.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Cakupan riset yakni jajanan jelly yang dilakukan analisis kadar pengawet natrium benzoat. Berdasarkan sampel dari produk yang di temukan di pasaran, dilakukan analisis memakai teknik spektrofotometri UV-Vis.

## **D. Kajian Pustaka**

Dikajian kepustakaan diuraikan tentang riset sebelumnya yang bertujuan agar mengetahui kemanfaatan, petunjuk riset, kemudian dilakukan perbandingan temuan riset sebelumnya.

1. Berdasarkan riset Sari, M., dkk pada tahun 2022 tentang “Menguji Kadar Natrium Benzoat Disaus Sambal Kemasan dari Berbagai Pasar Konvensional Kota Medan” identifikasi dilakukan dengan menggunakan uji kualitatif, menentukan kadar senyawa natrium benzoat memakai spektrofotometri UV-Vis. Uji kualitatif digunakan untuk memperoleh sampel yang mengandung bahan pengawet natrium benzoat terhadap 9 sampel yang diperiksa. Beberapa sampel menghasilkan kadar berkisar 48,9845-97,3628 mg/kg memakai Spektrofotometri UV-Vis yang beroperasi disepanjang gelombang 271 nm. Peraturan BPOM No 11 Tahun 2019, penggunaan natrium benzoat tidak melebihi kebutuhan 1000 mg/kg.
2. Riset Rohmah, S.A.A., dkk pada tahun 2021 tentang “Validasi Metode Menetapkan Kadar Pengawet Natrium Benzoat diSari Kedelai di Banyak

Kec di Kab Tulungagung Memakai Spektrofotometer Uv-Vis” sebelum ditetapkan kadar maka sampel dianalisis dengan kualitatif sebelumnya memakai titrasi asam basa. Spektrofotometri UV-Vis metode untuk memperkirakan jumlah bahan pengawet natrium benzoat. Jika sampel mengandung natrium benzoat, hasil pemeriksaan kualitatif ini akan berubah warna menjadi merah muda. Setelah itu, kisaran 200-400 nm digunakan untuk mengoptimalkan panjang gelombang natrium benzoat, dengan 226 nm menjadi panjang gelombang ideal. Uji linieritas, uji presisi, uji akurasi, dan LOD&LOQ merupakan empat variabel yang digunakan dalam prosedur verifikasi metode. Hasil validasi pendekatan menunjukkan nilai koefisien korelasi ( $R^2$ ) sebesar 0,99563 yang menunjukkan linearitas; persentase pemulihannya adalah 97,58%, turun antara 80 dan 120 persen dari sampel; RSD sebesar 0,0454%,  $\leq 2\%$ ; LOD sebesar 0,33 ppm; dan LOQ sebesar 1,0996 ppm. Temuan ini mendukung validitas pendekatan ini karena setiap parameter memenuhi standar yang telah ditentukan. Memanfaatkan alat Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 226 nm, analisis konsentrasi menunjukkan sampel A memiliki konsentrasi  $92,243 \pm 0,039$  ppm, sampel B memiliki konsentrasi  $80,286 \pm 0,039$  ppm, sampel C memiliki konsentrasi  $99,04 \pm 0,063$  ppm, sampel D memiliki konsentrasi  $101,483 \pm 0,025$  ppm, dan sampel E konsentrasi  $80,143 \pm 0,038$  ppm. Kadar natrium benzoat sari kedelai sesuai BPOM RI No 36 Tahun 2013 menetapkan batas atas konsumsi komponen pangan. Penggunaan natrium benzoat jus buah dan sayuran, serta produk kedelai non-fermentasi, dibatasi hingga 600 ppm makanan, dengan asupan harian yang dapat diterima (ADI) sebesar 0–5 mg/kgBB.

3. Riset Zarwinda, I., dkk pada tahun 2021 tentang “Analisis Natrium Benzoat Sirup Pala Produksi Kota Tapaktuan Prov Aceh” memanfaatkan deskriptif analitik dengan analisis kualitatif secara uji warna, dan kuantitatif secara spektrofotometri UV-Vis. Riset dikerjakan di Lab Akafarma, Kimia FMIPA Univ Syiah Kuala. Populasi dari penelitian ini seluruh sirup pala yang diproduksi. Pengambilan sampel dilakukan secara totally sampling. Sampel yakni sirup pala CR, MS, DN, UR, dan YN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel positif menggunakan bahan pengawet natrium benzoat pada masing-masing sirup pala. Sampel sirup kayu manis (CR, MS, DN, UR, dan YN), jumlah natrium benzoat ditentukan berurutan 0,012 mg/kg, 0,012 mg/kg, 0,019 mg/kg, 0,022 mg/kg , dan 0,026 mg/kg berat. Menunjukkan sirup pala bebas dari natrium benzoat lebih dari yang diperlukan untuk mempertahankan umur simpannya.
4. Riset Dewi, K.A.Y., dkk pada tahun 2019 tentang “Menetapkan Kadar Pengawet Natrium Benzoat Sambal Kemasan Secara Spektrofotometri Uv-Vis” Dietil eter untuk pemisahan dianalisis kualitatif, menghasilkan pembentukan presipitasi besi benzoat. Untuk menentukan kadar natrium benzoat adalah spektrofotometri UV-Vis. Temuan riset, 2 sampel positif mengandung bahan pengawet natrium benzoat, dengan kadar 157,767 mg/kg untuk sampel A dan 182,8 mg/kg untuk sampel B. Namun kadar yang terdapat pada sampel A dan B tidak melebihi kadar 1000 mg/kg sesuai aturan Kemenkes No 722/Menkes/PER/IX/88.

Berdasarkan uraian diatas, maka penerapan teknik spektrofotometri UV-Vis sangat bisa dipakai dalam menganalisis kadar natrium benzoat pada jajanan jelly. Tahapan memakai metode ini memanfaatkan panjang gelombang dalam pengukuran kadar natrium benzoat.

#### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly.
- b. Untuk mengetahui kadar natrium benzoat yang terkandung dalam jajanan jelly telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan informasi tentang kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly.
- b. Memberikan informasi tentang kadar natrium benzoat dalam jajanan jelly telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Minuman Jelly***

Jelly yakni makanan/minuman ringan bentuknya gel terbuat dari agar, karaginan, gelatin/senyawa hidrokoloid dan pektin menggunakan gula, asam atau tanpa bahan lain sudah dilegalkan pemerintah (Saputri, dkk., 2021). Minuman jelly dibuat dari buah, maka banyak warga dari segala usia menyukainya. Dari bahannya, buah yang dapat meningkatkan gizi dan menyehatkan tubuh. Jelly tidak hanya sebagai minuman tetapi bisa untuk menunda lapar. Minuman jelly bisa menunda lapar sebab komposisi minuman jelly didalamnya ada gula gampang dimetabolisme badan dan mengenyangkan, menghasilkan energi dalam tubuh. Minuman jelly mempunyai sifat elastis atau lentur, sebab kekuatan gelnya kurang daripada jelly agar (Pulungan, dkk., 2022).

Orang-orang dari segala usia menyukai minuman jeli karena rasanya yang manis, lembut, kenyal, dan mudah dicerna. Jus buah, khususnya buah dengan kandungan pektin rendah, digunakan untuk membuat minuman jeli, yaitu minuman dengan viskositas tinggi yang juga mengandung gula, air, asam, dan bahan pembentuk gel. Sering digunakan sebagai agen pembentuk gel dalam minuman jeli yaitu karagenan, sebab mempunyai kemampuan yang bersifat sebagai hidrokoloid sehingga dapat mendukung proses keberhasilan di dalam suatu pembuatan produk minuman jelly. Karagenan adalah salah satu sumber pektin yang bersifat hidrokoloid sehingga mampu digunakan sebagai *gelling agent* (Saputra, dkk., 2022).

Produk jelly drink yang dikembangkan dipasaran hanya dari berbagai macam buah. Tetapi produk jelly drink sudah banyak berkembang aspek rasa. Umumnya dibuat dari sari buah yang mengandung pektin. Karakteristik jelly

drink yang baik yakni mempunyai konsistensi gel lemah bisa gampang disedot dan ditelan. Keberhasilan dalam membuat jelly drink dilihat dari konsentrasi dan jenis bahan pembuatan gel. Karagenan digunakan sebagai bahan pengental pada minuman jeli karena viskositasnya dan kemampuannya membentuk gel. Ketika gel karagenan terkonsentrasi 1,5% (b/b) dan 75°C, viskositasnya adalah 5-800. Nutrisi minuman jelly dijual di pasaran hanyalah serat, gula, dan natrium (Abidah, dkk., 2020).

Jelly adalah makanan setengah padat yang terbuat dari sari buah-buahan dan gula. Syarat jelly yang baik ialah transparan, mudah dioleskan dan mempunyai aroma dan rasa buah asli (Sutrisno Koswara, 2011) dalam (Wachyuni, 2019). Jelly merupakan makanan yang dibuat dari karaginan, yaitu senyawa polisakarida rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut jenis-jenis karaginofit, seperti *Eucheuma* sp., *Chondrus* sp., *Hypnea* sp., dan *Gigartina* sp. Karaginan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Ioto-karaginan, Kappa-karaginan, dan Lambda-karaginan. Ketiganya berbeda dalam sifat gel yang dihasilkan. Kappa-karaginan dan Lambda-Karaginan menghasilkan gel yang kuat (rigid), sedangkan Ioto-karaginan membentuk gel yang halus (flaccid) dan mudah dibentuk (Anggadiredja, 2009).

Komposisi jelly secara umum yakni 45 bagian buah dan 55 bagian gula, serta dibutuhkan sejumlah air (60-62 %) untuk melarutkannya hingga diperoleh produk akhir. Salah satu senyawa yang sangat berpengaruh dalam proses pembuatan jelly adalah pektin, sebab pektin mempengaruhi pembentukan gel dari jelly. Pektin merupakan senyawa yang berasal dari asam polygalakturonat. Kondisi pH optimum untuk pembentukan gel dari pektin adalah 2,8-3,2. Apabila pH diatas 3,5, maka gel tidak akan terbentuk. Sedangkan pH dibawah 2,5 gel yang terbentuk terlalu keras.

Jelly merupakan produk makanan yang hampir sama dengan selai, namun ada perbedaan dalam komposisi, komposisi jelly terdiri dari campuran 45 bagian sari buah dan 55 bagian berat gula. Pendapat lainnya, Padmaningrum (2013), jelly terdiri dari 45 bagian buah dan 55 bagian gula dengan membutuhkan air sebanyak 60-62% agar terlarut sehingga dapat diperoleh hasil akhir. Ada empat bahan pokok dalam pembuatan jelly, yaitu adanya karaginan, pektin, asam, dan gula. Proses pembuatan jelly sangatlah mudah, berdasarkan Koswara (2006), pembuatan jelly yang berbahan dasar sari buah, diawali dengan pemotongan buah dengan ukuran kecil, lalu potongan tersebut direbus selama 5-10 menit. Kemudian, rebusan potongan buah dihaluskan dengan cara diblender, lalu disaring (Rahma & Hajijah, 2023).



**Gambar 1.** Jelly

Proses penyaringan didapatkan cairan, cairan tersebut didiamkan selama 1 jam untuk mendapatkan sari buah yang bening. Sebanyak 450 gram sari buah akan ditambahkan dengan gula pasir 550 gram dan proses selanjutnya pemasakan. tunggu sampai mengental dan matang. Tanda jelly telah matang dapat dilihat dari kekentalannya. Jelly dapat dikatakan baik apabila transparan, mudah dioleskan dan mempunyai aroma dan rasa buah asli (Koswara, 2011) dalam (Padmaningrum, 2013). Sedangkan, (Warsito, 2015) menyatakan jelly yang baik

harus mempunyai warna yang cerah, jernih, kenyal menyerupai agar-agar namun tidak terlalu keras, dan mempunyai rasa buah asli (Rahma & Hajjah, 2023).

Berikut ini syarat-syarat jelly buah yang baik yang memenuhi kriteria berikut:

1. Berwarna cerah, jernih (transparan)
2. Mempunyai konsistensi yang baik (seperti agar-agar, tetapi tidak terlalu kaku dan keras)
3. Memiliki cita rasa buah yang baik
4. Tingkat keasaman (pH) harus dibawah 4,5 (Saptoningsih & Jatnika, 2012).

Berikut ini penyebab dan jenis-jenis kegagalan yang sering terjadi selama proses pembuatan jelly:

**Tabel 1.** Jenis kegagalan dalam pembuatan jelly (Saptoningsih & Ajat, 2012)

No	Kegagalan	Penyebab
1.	Tekstur jelly seperti sirup kental	Terlalu banyak gula yang ditambahkan, kandungan air buah terlalu rendah, kandungan pektin buah tidak mencukupi, dan proses pemasakan yang terlalu lama
2.	Tekstur jelly terlalu encer	Proses pemasakan terlalu lama
3.	Tekstur jelly mengental dan tidak dapat membentuk gel	Suhu pemasakan terlalu tinggi
4.	Tekstur jelly sangat liat dan sukar dipotong	Penambahan gula terlalu banyak dibandingkan dengan kandungan pektin yang terdapat dalam sari buah
5.	Tekstur jelly keruh	Penyaringan sari buah kurang sempurna
6.	Warna jelly kelam (terjadi proses	Pemasakan terlalu lama, penyimpanan terlalu lama di tempat yang terkena sinar matahari

	browning atau pencoklatan)	secara langsung, dan suhu ruang penyimpanan terlalu tinggi
7.	Terbentuk kristal gula dalam jelly	Terlalu banyak penambahan gula, rendahnya kandungan asam dalam buah, dan penambahan gula yang sudah menjadi kristal
8.	Tekstur jelly berair	Asam dalam sari buah terlalu tinggi dan pembentukan gel terlalu cepat
9.	Tekstur jelly berjamur	Wadah gelas jelly kurang bersih, ruang penyimpanan terlalu lembap dan panas, serta proses penutupan botol kurang sempurna

Prinsip pembuatan jelly secara umum cukup sederhana, yakni buah-buahan yang akan dibuat jelly diperas dan diambil sarinya. Sejumlah gula kemudian ditambahkan, sesuai dengan perbandingan, yakni 45 bagian buah dan 55 bagian gula. Tahapan pembuatan jelly: buah dipotong-potong kecil, lalu direbus selama 5-10 menit. Kemudian dihaluskan dengan blender, kemudian disaring. Cairan yang diperoleh didiamkan selama 1 jam sampai semua kotoran mengendap, sehingga diperoleh cairan sari buah yang bening. Dimasukkan 450 gram sari buah ke dalam wajan, lalu ditambahkan 550 gram gula pasir dan dimasak sampai kental dan matang. Tanda kematangannya ialah bila dituangkan jatuhnya terputus-putus dan tercium aroma buah yang khas (Koswara, 2011).

Pada prinsipnya semua jenis buah dapat digunakan untuk membuat jelly, terutama buah yang mengandung pektin. Untuk menghasilkan pektin yang banyak, buah yang digunakan sebaiknya matang fisiologis, namun untuk mendapatkan cita rasa (aroma dan rasa) digunakan buah yang sudah matang morfologis. Sebaiknya dalam pembuatan jelly digunakan buah matang fisiologis dan matang morfologis dengan perbandingan yang sama untuk menghasilkan komposisi pektin yang tepat dan cita rasa yang baik (Koswara, 2011).

Pewarna jelly merupakan salah satu aspek yang penting terhadap kualitas suatu produk makanan. Kualitas warna dianggap menunjukkan kualitas rasa dan tekstur dari suatu makanan agar makanan tersebut dapat diterima di masyarakat. Warna juga mengindikasikan bahwa telah terjadi reaksi kimia pada makanan. Apabila jelly yang dihasilkan dari sari buah kurang menarik karena tidak berwarna atau intensitas warna kurang kuat, maka dapat ditambahkan pewarna alami atau pewarna sintetis. Penambahan zat warna ini harus mempertimbangkan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebagai konsumen. Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pewarna, kandungan pewarna, dan dosis penggunaan pewarna. Peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang diizinkan dan pewarna yang dilarang sesuai SK Menteri Kesehatan RI No. 722/menkes/Per/IX/88 mengenai Bahan Tambah pangan (BTP) (Cahyadi, 2008)

**Tabel 2.** Pewarna sintetis yang diizinkan di Indonesia

<b>Pewarna</b>	<b>Nomor Indeks warna (C.I. No)</b>
Amaran	16185
Biru Berlian	42090
Eritrosin	45430
Hijau FCF	42053
Hijau S	44090
Indigotin	73015
Ponceau 4R	16255
Kuning Kuinelin	15980
Sunset Yellow	15985
Tartrazin	19140
Carmoisin	14720

**Tabel 3.** Pewarna sintetik yang dilarang di Indonesia

<b>Pewarna</b>	<b>Nomor Indeks warna (C.I. No)</b>
Citrus Red	12156
Ponceau 3R	16155
Ponceau SX	14700
Rhodamin B	45170
Buinea Green B	42085
Magenta	42510
Chrysoidine	11270
Butter Yellow	11020
Sudan I	12055
Methanil Yellow	13065
Auramine	41000
Oil Orange SS	12100
Oil Orange XO	12140
Oil Yellow AB	11380
Oil Yellow OB	11390

**Tabel 4.** Pemanis jelly

No	Nama pemanis sintetis		Batas maksimum penggunaan
	Bahasa indonesia	Bahasa inggris	
1.	Sakarín (garam natrium)	Sacharin (natrium salt)	200 mg/kg (Natrium Sakarin)
2.	Siklamát (garam natrium dan garam kalsium)	Cyclamate (sodium salt and calcium salt)	2 g/kg
3.	Sorbitol	Sorbitol	300 g/kg

Sumber: Lampiran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan

Buah yang cocok yang dijadikan bahan dasar pembuatan jelly adalah buah yang sudah matang, tetapi tidak terlalu matang dan busuk. Sedangkan buah yang masih mentah tidak dapat digunakan karena sedikit mengandung pektin, tetapi lebih banyak terkandung zat pati (karbohidrat). Contoh buah yang dapat dijadikan jelly adalah anggur, apel, murbei, arbei, gowok, jambu biji, jeruk, pala, dan lain-lainnya. Saat ini, dengan berkembangnya industri pangan yang semakin modern, produk olahan jelly semakin beranekaragam. Contoh jelly yang ada dipasaran seperti dibawah ini:

1. Jelly cup



**Gambar 2.** Jelly cup

Jelly cup atau jelly siap saji dalam kemasan merupakan produk olahan semi padat yang terbuat dari sari buah yang di masak dalam gula dan dikemas dalam suatu wadah. Perbandingan bobot sari buah dan gula pasir adalah 45% : 55% (Saptoningsih & Jatnika, 2012).

Jelly cup atau jelly siap saji merupakan makanan ringan dalam bentuk kemasan cup maupun plastik yang memiliki tekstur padat dan kenyal, dengan rasa manis, dan mempunyai warna yang beraneka ragam. Umumnya jelly siap saji berbahan dasar jelly powder lalu ditambahkan air, gula, dan pewarna.

## 2. Jelly serbuk instan



**Gambar 3.** Jelly serbuk instan

Jelly bubuk (powder) adalah jelly yang mempunyai bentuk bubuk, biasanya terbuat dari ekstrak rumput laut dan lebih dikenal dengan konyaku jelly, untuk mengonsumsi jelly bubuk (powder) perlu adanya proses pemasakan. Komposisi dari jelly powder terdiri dari bahan pembentuk gel (karaginan dan agar), gum (konjak, LBG, gum Arab). Salah satu komposisi kimiawi jelly powder adalah senyawa hidrokoloid. Senyawa hidrokoloid merupakan komponen yang dapat membentuk koloid dalam air dan biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya kristalisasi, sebagai pengental, atau sebagai stabilizer. Penggunaan jelly powder dapat ditemukan pada produk olahan permen jelly, jelly, pudding, es krim, dan lain-lain. Jelly powder dapat dijadikan sebagai makanan penutup, selain itu jelly powder mempunyai kadar serat yang tinggi dan kalori yang rendah sehingga dapat membantu orang yang sedang melakukan diet (Sinurat et al., 2010).

Produk jelly dapat diubah menjadi bentuk serbuk kering, sehingga dapat memperpanjang umur simpannya. Serbuk jelly ialah jelly yang

memiliki sifat kering dan berbentuk serbuk atau granul, stabil dalam penyimpanan dan transportasi (Wintirani, 2016).

Cara membuat jelly menggunakan jelly serbuk instant:

- a. Campur jelly bubuk dengan gula
- b. Rebus air hingga mendidih, tuangkan bubuk jelly dan gula. Masak selama 2 menit, aduk terus hingga merata
- c. Tuangkan rebusan jelly kedalam cetakan. Diamkan hingga membeku (Hestianawati, 2013).

### 3. Permen Jelly



**Gambar 4.** Permen jelly

Permen jelly merupakan salah satu jenis permen yang digemari oleh berbagai kalangan usia, khususnya anak-anak. Dengan demikian permen jelly juga dapat dijadikan sebagai makanan pembawa (food carrier) fortifikasi zat besi dengan sasaran anak-anak. Menurut SNI 3547.2-2008, permen jelly adalah permen bertekstur lunak yang diproses dengan penambahan komponen hidrokoloid seperti agar, gum, pektin, pati, karagenan, gelatin dan lainlain yang digunakan untuk modifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang kenyal, harus dicetak dan diproses aging terlebih dahulu sebelum dikemas.

Prosedur pembuatan permen jelly memiliki beberapa tahapan diantaranya:

- a. Membuat campuran gula
- b. Menambahkan bahan pembentuk gel (gelatin, agar, pektin dan karagenan) dengan cita rasa dan warna yang berbeda-beda. Permen jelly umumnya dimasak sampai menghasilkan padatan 75 persen yang terdiri dari campuran gula, sirup glukosa, bahan pembentuk gel, cita rasa dan warna serta sedikit garam.

Tahapan pembuatan jelly ada dua yaitu pembuatan sari buah dan pembuatan jelly atau pemasakan sari buah. Sari buah yang diperoleh sebaiknya diblansing selama 5 menit, kemudian didiamkan selama satu jam sehingga semua kotoran mengendap dan diperoleh sari buah yang bening. Dalam pembuatan jelly, sari buah dimasak dengan penambahan gula hingga kental. Penentuan titik akhir pembuatan jelly dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dilakukan dengan mencelupkan sebuah sendok kedalam sari buah, kemudian diangkat. Bila masakan sari buah meleleh tidak lama, dan terpisah menjadi dua bagian, hentikan pemasakan, artinya jelly telah terbentuk.

Cara penentuan yang kedua adalah dengan fork test atau uji menggunakan garpu, dimana sebuah garpu dicelupkan kedalam masakan sari buah kemudian diangkat. Bila garpu diselimuti masakan sari buah yang kemudian jatuh meninggalkan beberapa bagian jelly pada sisi garpu maka jelly telah terbentuk. Fungsi buah dalam pembuatan jelly adalah sebagai pemberi warna dan aroma serta mengandung pektin yang sangat dibutuhkan untuk membuat struktur gel yang baik dan kokoh. Jika pektin dalam buah kurang untuk membentuk gel, maka perlu dilakukan penambahan pektin atau gelling agent lainnya. Penambahan pektin harus dilakukan sebelum sari buah mengalami pemanasan.

**Tabel 5.** Persyaratan mutu permen jelly (Badan Standarisasi Nasional, 2008)

No	Variabel	Satuan	Nilai
1.	Keadaan		
	Rasa		Normal
	Bau		Normal
2.	Kadar Air	% fraksi massa	Max 20
3.	Kadar Abu	% fraksi massa	Max 3
4.	Gula reduksi (gula invert)	% fraksi massa	Max 25
5.	Sakarosa	% fraksi massa	Max 27
6.	Cemaran Logam		
	Timbal (Pb)	mg/kg	Max 2
	Tembaga (Cu)	mg/kg	Max 2
	Timah (Sn)	mg/kg	Max 4
	Raksa (Hg)	mg/kg	Max 0,03
7.	Cemaran Arsen (As)	mg/kg	Max 1

Kekerasan dan tekstur permen jelly berbeda-beda, hal ini tergantung pada bahan gel yang digunakan. Jelly dengan bahan gelatin mempunyai konsistensi yang lunak dan bersifat seperti karet; lalu jelly dengan agar- agar mempunyai tekstur yang rapuh dan lunak. Sedangkan jelly dari pektin menghasilkan tekstur yang sama dengan agar-agar, tetapi gelnya lebih baik pada pH yang rendah, sedangkan karagenan menghasilkan gel yang kuat (Koswara, 2009).

#### 4. Jelly drink



**Gambar 5.** Jelly drink

Jelly drink merupakan produk minuman semi padat yang terbuat dari sari buah-buahan yang masak dalam gula dimana jelly drink tidak hanya sekedar minuman biasa, tetapi dapat juga dikonsumsi sebagai minuman penunda lapar. Tekstur yang diinginkan pada minuman jelly adalah mantap, saat dikonsumsi menggunakan bantuan sedotan mudah hancur, namun bentuk gelnya masih terasa di mulut. Pembuatan jelly drink diperlukan bahan pembentuk gel diantaranya agar, locust bean gum, pectin, gelatin, dan karagenan. Karagenan merupakan senyawa yang termasuk kelompok polisakarida galaktosa hasil ekstraksi dari rumput laut. Karagenan dapat diekstraksi dari protein dan lignin rumput laut dan dapat digunakan dalam industri pangan karena karakteristiknya yang dapat berbentuk jelly, bersifat mengentalkan, dan menstabilkan material utamanya. Konsistensi gel dipengaruhi beberapa faktor antara lain : jenis karagenan, konsistensi, adanya ion-ion serta pelarut yang menghambat pembentukan hidrokoloid (Agustin et al., 2014).

Pengertian jelly drink menurut (Agustin et al., 2014) jelly drink adalah minuman yang bentuknya semi padat dan mudah hancur saat dikonsumsi, biasanya terbuat dari sari buah-buahan dengan penambahan gula, dan bentuk

gelnya masih terasa di mulut. Karakter gel jelly drink bersifat elastis dan tidak mengandung butiran halus. Tekstur jelly drink haruslah mantap dan saat dikonsumsi dengan sedotan jelly mudah hancur serta masih terasa gel pada mulut. Dalam produk jelly drink mempunyai kandungan air lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk jelly lainnya. Sehingga massa jelly drink lebih rapuh. Selain itu, ada kandungan serat. Serat tersebut diperoleh dari gelling agent (karagenan). Pembuatan jelly drink itu sendiri diperlukan bahan pembentuk gel diantaranya agar, locust bean gum, pektin, gelatin, dan karagenan. Selain itu, ada penambahan gula, asam, ekstrak buah, dan bahan tambahan pangan lainnya.

#### **B. Pengawet**

Bahan tambahan pangan memegang peranan penting dalam mengimbangi kemajuan teknologi modern. Menurut Aturan Kemenkes No 33 Tahun 2013, bahan yang sengaja ditambahkan demi kemajuan teknologi dalam produksi, penyiapan, pengolahan, pembungkus, dikemas, disimpan berpengaruh nilai gizi pangan. Oleh sebab itu, keamanan pangan menjadi syarat penting karena akan dikonsumsi oleh manusia sehingga industri pangan menjadi faktor penentu terkait dengan standarisasi mutu dan keamanan pangan yang sudah diatur. Semakin berkembangnya produk pangan saat ini banyak bahan berbahaya dimasukkan ke makanan dan minuman contohnya natrium benzoate dipakai untuk mengawetkan makanan/minuman (Hidayah Nur, dkk., 2023).

Pengawet sebagai tambahan pangan menghentikan/penghambat proses fermentasi, diasamkan/degradasi pangan oleh mikroba lainnya, sesuai aturan Kemenkes No 33 Tahun 2012 Bahan Tambahan Pangan. Pengawet adalah zat yang memiliki kekuatan untuk mencegah dan menghambat fermentasi, pengasaman, dan proses lain yang dapat membahayakan atau merusak suatu

barang. Bahan pengawet yang diperbolehkan BPOM yakni natrium sorbat, asam sorbat, natrium benzoat, sebagaimana tercantum di Peraturan BPOM No 11 Tahun 2019 Bahan Tambah Pangan (Sobari, dkk., 2019).

Bahan tambahan pangan menurut definisi BPOM (2019) adalah zat yang dengan sengaja dimasukkan dimakanan/minuman saat prosedur produksi, mengolah, penyiapan, pengolahan, pembungkusan, tidak mempunyai nilai gizi melainkan mengubah penampilan atau penampilan makanan atau minuman tersebut. Pengawet umumnya ditambahkan ke makanan karena alasan berikut:

- a. Mencegah perkembangan mikroorganisme berbahaya dan non-patogen dalam makanan.
- b. Umur simpan makanan diperpanjang.
- c. Tidak mengurangi warna, rasa, aroma, atau nilai gizi makanan diawetkan.
- d. Belum disembunyikan keadaan pangan dibawah standarisasi, belum disembunyikan pemakaian bahan tidak tepat/tidak sesuai, dan belum menyembunyikan kerusakan bahan pangan (Cahyadi, 2009).

Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas mengawasi peraturan Kementerian Kesehatan tentang penggunaan bahan pengawet di Indonesia. Bahan pengawet acapkali dipakai dikeseharian warga, khususnya dalam produksi bahan makanan, khususnya makanan ringan. Bahan pengawet yang berdampak buruk bagi kesehatan dan tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan masih banyak digunakan oleh produsen makanan. Pengawet dapat digunakan secukupnya atau pada tingkat yang masih dalam batas yang diperbolehkan. Ketika penggunaan bahan pengawet melampaui batas ambang batas, masalah kesehatan dan bahkan penyakit dapat terjadi (Gama Indjar Sabaniah, dkk., 2023).

Pengawet dikelompokkan jadi 2 yakni.

#### 1. Pengawet Alami

Pengawet alami berasal dari berbagai tumbuhan dan hewan dan biasanya aman. Rempah-rempah merupakan bahan pengawet alami yang sering digunakan dalam makanan. Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai komponen obat, wewangian, kosmetik, dan barang industri lainnya disebut rempah-rempah. Bagian tersebut dapat berupa kulit kayu, bunga, buah, akar, daun, rimpang, biji, umbi, pucuk daun, atau bagian tanaman lainnya. Rempah-rempah berfungsi sebagai zat penyedap selain memiliki kualitas antibakteri. Rempah-rempah yang berbeda memiliki dampak berbeda terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini disebabkan jumlah dan jenis zat antimikroba yang terkandung dalam rempah-rempah berbeda-beda. Minyak atsiri rempah-rempah memiliki kualitas antimikroba yang memiliki kemampuan untuk menekan atau membasmi mikroba sepenuhnya (Rosliana mawaddah, 2008).

#### 2. Pengawet Sintetik

Ada dua jenis pengawet sintesis: anorganik dan organik. Roti, jus buah, selai, jelly dan susu kedelai merupakan contoh produk nabati yang dikelola yang biasanya menggunakan bahan pengawet alami. Asam benzoat, asam sorbat, asam asetat, dan natrium benzoat merupakan contoh bahan pengawet organik yang lebih umum digunakan karena kelarutannya dalam air lebih tinggi karena kandungan garamnya. Pengawet asalnya dari zat anorganik, atau mineral, termasuk hidrogen,  $\text{SO}_2$ , peroksida, nitrat dan nitrit. Pengawet anorganik biasa dimasukkan dimakanan yakni zat garam nitrit dan nitrat (Cahyadi, 2009). Karena bahan pengawet buatan telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan, maka sangat memprihatinkan

bila bahan tersebut digunakan dalam makanan. Olehnya, kita memerlukan pengganti bahan pengawet yang lebih aman, seperti beralih ke bahan pengawet alami, ada disemua buah dan tanaman (Paulus H. Abram, 2016).

**Tabel 6.** Daftar pengawet sintetis


No	Nama pengawet sintetis		Batas maksimum penggunaan
	Bahasa indonesia	Bahasa inggris	
1.	Etil phidroksibenzoat	Ethyl phydroxybenzoate	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan Asam Benzoat dan garamnya, atau dengan Asam Sorbat dan Kalium sorbat
2.	Asam benzoat	Benzoic acid	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan garamnya atau dengan asam sorbat dan garamnya dan senyawa sulfit, tetapi senyawa sulfit tidak lebih dari 500 mg/kg
3.	Belerang dioksida	Sulfur dioxice	100 mg/kg
4.	Kalium benzoat	Potassium Benzoate	1 g/kg, tunggal atau campuran dengan Kalium Sorbat atau dengan garam benzoat
5.	Kalium sorbat	Potassium Sorbate	g/kg, tunggal atau campuran dengan Asam Sorbat atau dengan senyawa benzoat
6.	Natrium benzoat	Sosium benzoate	1 g/kg tunggal atau campuran dengan Asam Sorbat dan garam

			kaliumnya, atau dengan ester dari asam para hidroksibenzoat
--	--	--	---

Sumber: Lampiran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambah Makanan

### C. Natrium Benzoat

Natrium benzoat lebih larut di air dibandingkan asamnya, natrium benzoat sering digunakan sebagai pengganti asam benzoat. Asam benzoat dan natrium hidroksida dapat bereaksi menghasilkan natrium benzoat, yang terlihat seperti ini:




**Gambar 6.** Reaksi Sodium Hidroksida dengan Asam Benzoat

Natrium benzoate memperpanjang umur simpan suatu barang dengan mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi. Aditif yang disebut natrium metabisulfit mencegah proses karamelisasi, sehingga menghasilkan warna yang lebih cerah (Nofita, dkk., 2023).

Natrium benzoat ( $\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_2$ ) garam/ester asam benzoat dihasilkan komersial dengan sintesis kimia. Natrium benzoat adalah bubuk atau partikel kristal berwarna putih tidak berbau. Ia aman di udara dan gampang larut di air, tetapi lebih sulit larut di etanol 90%. Natrium benzoat adalah pengawet organik. (Dirjen POM Edisi VI, 2020: 1215). Pengawet natrium benzoat sangat berperan

dalam menjaga kualitas makanan atau minuman agar tetap terlihat baik dalam waktu yang lebih lama (Sari, dkk., 2022).



**Gambar 7.** Struktur Molekul Natrium Benzoat

(Sumber: PubChem, 2021)

Natrium hidroksida dan asam benzoat bereaksi membentuk natrium benzoat, suatu unsur benzoat (garam natrium dari asam benzoat). Sebab natrium benzoat gampang larut, stabil di air daripada asam benzoat, natrium benzoat sering acapkali dipakai pengawet makanan/minuman. Natrium benzoat bahan pengawet lain, acapkali dipakai mengawetkan contohnya saus salad, selai, acar, minuman berkarbonasi, acar karena dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur di lingkungan asam. Mengonsumsi bahan pengawet natrium benzoat secara lebih bisa menyebabkan masalah kesehatan, termasuk asma, urtikaria, angioedema, dan hiperaktif pada anak-anak (Evana, dkk., 2021).

Benzoat merupakan jenis bahan pengawet yang umum dijual di pasaran dan memiliki izin edar dari BPOM. Natrium atau kalium benzoat adalah dua contoh bahan pengawet yang termasuk dalam klasifikasi benzoat. Zat ini mudah larut dalam air. Natrium benzoat, garam/ester asam benzoat ( $C_6H_5COOH$ ), jenis pengawet organik dipakai dimakanan. PH netral tetap konstan dalam sel mikroba,

itulah cara kerja natrium benzoat dengan mengganggunya. Struktur sel mikroba dapat terganggu, mengakibatkan gangguan metabolisme dan akhirnya kematian, jika tingkat keasaman sel diubah jadi asam atau basa. Sesuai aturan BPOM No 36 Tahun 2013, batasan konsumsi natrium benzoat diatur SNI 01-0222-1995 yakni 1g/kg materi. Jika digunakan melebihi dosis anjuran, meski BPOM mengizinkan, terdapat peningkatan risiko radang, stres oksidatif, obesitas, ADHD, alergi. Karena benzena bersifat karsinogenik, kesehatan manusia akan terancam jika natrium benzoat diubah ke dalamnya. Stabilitas natrium benzoat yang sangat baik dan larut dalam air menjadikannya bahan pengawet biasanya dipakai dibahan makanan/minuman (Rivianto Auladi Faizal, dkk., 2023).

Bahan tambahan pangan ditambahkan pada produk pangan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di pasar. Bahan Tambahan Pangan (BTP) yakni zat dimasukkan ke pangan dengan tujuan mengubah komposisi/tampilan pangan atau produk pangan, tanpa memperhatikan apakah zat tersebut bernilai gizi atau tidak. FAO (Food and Agriculture Organization) mendefinisikan bahan tambahan makanan sebagai zat disengaja dimasukkan ke jenis dan ukuran makanan tertentu untuk membantu persiapan, dikemas, disimpan. Tujuannya untuk meningkatkan warna, bentuk, rasa, penampilan sekaligus memperlama umur penyimpanan produk (Kusuma, dkk., 2021).

Meskipun kurang efektif melawan jamur, natrium benzoat aktif menekan pertumbuhan jamur dan bakteri. Berbagai ragi memiliki kapasitas berbeda untuk pertumbuhan benzoat. Natrium benzoat biasanya digunakan sebagai garam, seperti garam natrium atau amonium. Karena lebih mudah larut, penggunaan dalam bentuk garam lebih efektif dibandingkan penggunaan dalam bentuk asam. Asam benzoat larut dalam air dengan laju 0,35%, tetapi menjadi 50% larut dalam garam natrium (Ulya, dkk., 2020).

Stabilitas natrium benzoat yang sangat baik dan larut dalam air menjadikannya bahan yang lebih umum dalam minuman dan makanan. Makanan biasanya merupakan jalur kontak dengan natrium benzoat. Natrium benzoat akan cepat diserap setelah masuk ke dalam sistem pencernaan. Natrium benzoat diproses di hati melalui konjugasi dengan glisin setelah diserap melalui kulit atau saluran pencernaan, menghasilkan asam hipurat. Urin mengandung ekskresi asam hipurat. Ketika manusia mengonsumsi natrium benzoat hingga 160 mg/kg BB, 75–100% dosisnya dieliminasi dalam 6 jam, dan sisanya disimpan di dalam tubuh selama 2–3 hari sebelum dieliminasi (Azmi, dkk., 2020).

Sektor makanan dan minuman sering menggunakan natrium benzoat. Karena natrium benzoat bersifat larut dan dapat mencegah perkembangan bakteri dan jamur dalam lingkungan asam, maka penggunaan natrium benzoat diperbolehkan, namun sebaiknya tidak digunakan dalam jumlah berlebihan. Dalam industri makanan dan minuman, natrium benzoat banyak ditemukan pada minuman ringan, jus, jelly, minuman berkarbonasi, dan minuman isotonik (Supriyatin, 2019). Pengawet alami dan buatan merupakan dua kategori bahan pengawet yang sering ditemukan pada makanan dan minuman. Anda bisa menggunakan gula pasir, garam, kunyit, kulit kayu manis, dan cengkeh sebagai bahan pengawet alami. Secara bersamaan, bahan pengawet buatan seperti kalium nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam askorbat, kalsium stearoyl-2-laktilat, dan asam sitrat (Setia, 2022).

Kecap, jus buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, selai, dan jeli hanyalah beberapa makanan dan minuman yang sering menggunakan natrium benzoat untuk mengawetkannya. Dosis tertinggi natrium benzoat yang diperbolehkan 1000 mg/kg, sesuai aturan Kemenkes No 722/Menkes/PER/IX/88. Kejang, hiperaktif, dan penurunan berat badan merupakan efek samping yang

berpotensi mematikan dari konsumsi natrium benzoat yang berlebih (Dewi, dkk., 2019).

Metabolisme glisin dan fungsi tubuh lainnya mungkin dipengaruhi oleh konsumsi natrium benzoat. Ada laporan terjadinya urtikaria, asma, rinitis, atau syok anafilaksis pada individu dengan riwayat atopik. Berbagai kelompok di seluruh dunia mengontrol jumlah yang diperbolehkan untuk menambahkan natrium benzoat ke dalam makanan. Kadar natrium benzoat aman dimakanan adalah kurang dari 0,1% menurut Food and Drug Administration, 5 mg/kgBB menurut WHO, dan 2000 mg/kg menurut European Food Safety Authority. Peraturan di Indonesia menyatakan bahwa total maksimal natrium benzoat ditemukan makanan 1 g/kg (Azmi Afifah Dara, dkk., 2020).

Produk makanan yang mengandung bahan pengawet natrium benzoat terlindung dari kerusakan mikroba dengan mengurangi laju fermentasi dan pembusukan, sehingga produk tetap segar lebih lama selama pengawetan. Menurut Rorong dan Wilar (2019), ketahanan produk pangan dan nilai gizinya dapat ditingkatkan dengan menambahkan natrium benzoat. Pengawet biasanya ditambahkan dengan tujuan tertentu pada produk makanan untuk mempertahankan rasanya dan memperpanjang umur simpannya, sehingga meningkatkan potensi jangkauan pasar produk tersebut (Centhya, 2021).

Bahan tambahan makanan menawarkan sejumlah keuntungan, seperti menjaga makanan dan minuman untuk menghentikan perkembangan mikroorganisme yang mengkontaminasi makanan atau menghentikan reaksi kimia yang menurunkan kualitas makanan, seperti natrium benzoat. Sistem kerja natrium benzoat sebagai pengawet didasarkan pada permeabilitas membran sel mikroba terhadap molekul asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Molekul asam benzoat dapat masuk ke dalam sel mikroba pada pH 4,5 karena membran sel

tersebut permeabel terhadap asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Pada pH 4,5, natrium benzoat dan bentuk garamnya digunakan sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Aturan BPOM No 36 Tahun 2013, jumlah max natrium benzoat yang boleh ditambahkan pada makanan dan minuman 600 mg/kg. Jumlah maksimum yang dapat digunakan diminuman ringan non-karbonasi 1000 mg/L. Penggunaan natrium benzoat lebih dari batas aman mengakibatkan gangguan kesehatan urtikaria, mual, muntah, sakit perut, serta gangguan sistem saraf (Ansyah, dkk., 2021).

Asam benzoat pertama kali diaktifkan di dalam sel sebagai bagian dari proses pengawetan ini. Fermentasi anaerobik yang dimediasi fosfofruktokinase berkurang 95% jika pH antar sel turun menjadi 5 atau kurang. Pertumbuhan mikroorganisme hidup penyebab makanan menjadi busuk dapat dihambat dengan kondisi ini. Mengonsumsi natrium benzoat secara berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kejang pada otot perut, kanker jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama, dan kerusakan saraf (Farooh, dkk., 2021). Penetrasi membran sel mikroba terhadap molekul asam benzoat merupakan dasar dari sistem kerja natrium benzoat sebagai pengawet. Natrium benzoat tidak selalu merupakan bahan pengawet yang aman untuk digunakan, terutama jika masyarakat menggunakannya secara berlebihan (Wahyuningsih, dkk., 2021).

Risiko yang terkait dengan penggunaan natrium benzoat dan garamnya secara berlebihan termasuk asidosis metabolik, kejang, dan hiperpnea. Selain itu, bisa menyebabkan mati rasa di mulut dan kram di perut. Pengawet bisa memperburuk kondisi akhirnya menyebabkan kanker (Hadriyati, dkk., 2020).

Konsumsi natrium benzoat yang berlebih bisa berdampak negatif bagi kesehatan, antara lain edema (pembengkakan), mual, muntah, dan memperburuk kelelahan serta kondisi kulit seperti eksim dan urtikaria. Karena bahan pengawet

ini menumpuk seiring berjalannya waktu dan dikaitkan dengan kerusakan sistem saraf, ada kemungkinan bahan pengawet ini pada akhirnya juga menyebabkan kanker. Batasan berdasarkan rekomendasi untuk konsentrasi natrium benzoat sangat penting untuk menjamin tingkatnya (Rohmah, dkk., 2021).

#### **D. Spektrofotometri UV-Vis**

Tujuan analisisnya, jenis dan kuantitas sampel, tingkat ketelitian, presisi diperlukan, serta biaya terkait semuanya harus dipertimbangkan ketika memilih metode analisis. Dalam analisis farmasi, teknik spektrofotometri UV-Vis sebagai teknik seringkali dipakai. Dengan menggunakan metode ini, seseorang dapat menentukan berapa banyak sinar UV atau cahaya tampak yang diserap suatu unsur dalam larutan. Dengan menggunakan spektrofotometer, tentukan sumber cahaya tampak (380–780 nm) dan radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190–380 nm). Tujuannya untuk mengukur perbandingan, atau fungsi perbandingan, antara intensitas daerah tampak dari dua sinar cahaya. Spektrofotometri ini sangat mudah digunakan, cepat, dan cukup serbaguna untuk digunakan dengan berbagai zat. Hukum Lambert-Beer merupakan prinsip dasar spektrofotometri (Wahyuni, dkk., 2022). Metode Spektrofotometri UV-Vis digunakan karena banyak keunggulan dibandingkan pendekatan alternatif. Aspek positif dari metode ini meliputi sensitivitas yang baik, keterjangkauan, dan penggunaan instrumen dasar. Sebaliknya, teknik lain seperti kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) mempunyai proses derivatisasi yang panjang dan rumit serta biayanya sangat mahal, meskipun sensitivitasnya baik (Pereiz Zimon, dkk., 2023).

Spektrofotometri adalah teknik yang menggunakan spektrofotometer dan cahaya elektromagnetik untuk mengukur serapan sampel secara kuantitatif berdasarkan bagaimana zat organik merespons cahaya. Untuk analisis data kualitatif dan kuantitatif, spektrofotometri UV-Vis berguna. Panjang gelombang


maksimum, intensitas, pH, dan efek pelarut merupakan data dihasilkan oleh spektrofotometri UV-Vis, lalu analisis kuantitatif, berkas radiasi diarahkan ke sampel (larutan sampel), dan kekuatan berkas radiasi yang diteruskan ditentukan. Salah satu teknik terbaik dianalisis kualitatif dan kuantitatif adalah spektrofotometri UV-Vis. Ciri-ciri penting spektrofotometri UV-Vis antara lain selektivitas tinggi, akurasi baik, dan sensitivitas relatif tinggi. Keunggulan metode ini antara lain analisisnya lebih sederhana, terjangkau, cepat, dan sensitif (Abriyani, dkk., 2023).

Panjang gelombang UV dan panjang gelombang tampak, yang digunakan sebagai daerah serapan untuk mengidentifikasi zat, dapat digunakan untuk menganalisis metode spektrofotometri UV-Vis. Senyawa dengan gugus auksokrom, kromofor merupakan senyawa yang dikenal dengan spektrofotometri UV-Vis (Mierza, dkk., 2023). Spektrofotometri UV-Vis merupakan cara cepat, mudah, harga terjangkau yang dapat digunakan (Iswandi, 2022). Interaksi antara energi berupa cahaya monokromatik dari suatu sumber cahaya dengan material berbentuk molekul menjadi dasar pengoperasian spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometer memiliki keuntungan karena dapat diterapkan secara luas pada zat organik, anorganik, dan biokimia yang diserap dalam spektrum tampak atau ultraviolet. Keuntungan lainnya termasuk sensitivitas tinggi, selektivitas tinggi, akurasi yang baik, kemudahan pengukuran, dan waktu penyelesaian yang cepat (Ningtias, dkk., 2022).

Secara umum instrumen spektrofotometer ada 2 yakni single-beam dan double-beam.


1. Single-beam instrumen bisa dipergunaakan dalam pengujian kuantitatif, pengukuran serapan disepanjang gelombang tunggal. Single-beam memiliki banyak keunggulan seperti *simple*, murah, dan biaya rendah. Kekurangannya

cahaya hanya dapat mengalir searah, menghasilkan angka mewakili serapan larutan yang diinjeksikan, variasi tegangan dapat terjadi. menyebabkan variasi intensitas cahaya. Instrumen tertentu mengukur sinar tampak dan ultraviolet memakai sinar tunggal. 190–210 nm adalah panjang gelombang terendah dan 800-1100 nm adalah yang tertinggi.



**Gambar 8.** Spektrofotometri UV-Vis Single-beam

2. Double-beam instrumen, yaitu cermin berbentuk V, membagi dua balok pada alat balok ganda. Pada saat yang sama ketika sinar kedua melalui sampel, Sinar pertama melalui larutan blanko. Kisaran panjang gelombang untuk Double-beam adalah 190–750 nm. Keuntungan penggunaan spektrofotometer double-beam adalah nilai serapan larutan lebih rendah dibandingkan nilai serapan blanko, sehingga nilai blanko dan larutan yang diinginkan dapat diukur secara bersamaan dalam prosedur yang sama. Sebaliknya, balok ganda memiliki kelemahan yakni biayanya relatif lebih mahal daripada balok tunggal hingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi.



**Gambar 9.** Skema Spektrofotometri UV-Vis Double-beam

Identifikasi sampel berupa larutan, gas, atau uap dapat dikerjakan memakai spektrofotometer UV-Vis. Biasanya, sampel perlu diubah menjadi larutan transparan. Sampel dalam bentuk larutan harus memenuhi sejumlah spesifikasi pelarut yang digunakan, antara lain (Tati Suhartati, 2013):

- a. Sampel larut seluruhnya.
- b. Pelarut digunakan tidak berwarna (tidak dapat menyerap cahaya dipakai sampel) dan tidak memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dalam struktur molekulnya.
- c. Berkenaan dengan molekul senyawa yang diperiksa, tidak ada interaksi.
- d. Harus ada tingkat kemurnian yang tinggi.

**Tabel 7.** Pelarut-pelarut yang mengabsorpsi sinar UV pada panjang gelombang spesifik.

Pelarut	$\lambda_{\text{maks}}$ (nm)	Pelarut	$\lambda_{\text{maks}}$ (nm)
Asetronitril	190	n-heksan	201
Kloroform	240	Metanol	205
Sikloheksana	195	Isooktana	195
1-4 dioksan	215	Air	190
Etanol 95%	205	Aseton	330
Benzene	285	Piridina	305

Karena tersedia dalam spektrum ultraviolet, pelarut biasanya dipakai yakni air, etanol, metanol, dan n-heksana (Tati Suharti, 2013).

Rentang mengukur spektrofotometer UV-Vis antara panjang gelombang 200 dan 400 nm. Karena radiasi UV berinteraksi dengan molekul dan dapat menyebabkan molekul tersebut melalui transisi elektronik, spektrum UV juga disebut sebagai spektrum elektronik. Setiap molekul atau atom yang terkena radiasi elektromagnetik akan menyerap sebagian radiasi akibat adanya pengelompokan kromofor pada struktur molekul atau atom tersebut. Dengan berinteraksi antara radiasi elektromagnetik (REM) yang dipancarkan pada suatu sampel dan kemudian menentukan serapan sampel tersebut dengan detektor untuk mengidentifikasi kadar dalam suatu sampel, spektrofotometri UV-Vis dapat dimanfaatkan dalam uji kuantitatif. Analisis kuantitatif serapan dilakukan dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Satria, dkk., 2022).

Hukum Lambert-Beer, transmitansi berbanding terbalik dengan serapan dan mempunyai hubungan eksponensial dengan konsentrasi larutan analitis. Hukum Lambert-Beer mengandung sejumlah batasan:

- a. Cahaya yang digunakan diyakini bersifat monokromatik.
- b. Penampang melintang yang sama ditemukan pada volume tempat terjadinya penyerapan.
- c. Zat-zat dalam larutan yang menyerap berbeda satu sama lain.
- d. Tidak ada pendar atau fluoresensi.
- e. Konsentrasi larutan tidak berpengaruh pada indeks bias.

Hukum Lambert-Beer dinyatakan dalam persamaan:

$$A = a \cdot b \cdot c$$

Keterangan : A = Absorban

a = absorpsivitas molar

b = tebal kuvet (cm)

c = konsentrasi

Pengelompokan kromofor merupakan salah satu syarat suatu unsur dapat diperiksa dengan spektrofotometer UV-Vis. Ketika diikat oleh gugus ausokrom, kromofor adalah gugus fungsi yang menyerap sinar UV dan cahaya tampak. Ikatan rangkap terkonjugasi terdapat di hampir semua kromofor, seperti diena ( $C=C-C=C$ ), dienon ( $C=C-C=O$ ), benzena, dan lain-lain. Gugus fungsi dengan elektron bebas, seperti  $-OH$ ,  $NH_2$ ,  $NO_2$ , dan  $-X$ , dikenal sebagai ausokrom (Rohman, 2012).

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**Tabel 8.** Spektrum Sinar Tampak

Panjang gelombang (nm)	Warna asli	Warna komplementer
400-435	Ungu	Kuning-hijau
435-480	Biru	Kuning
480-490	Hijau-biru	Jingga
490-500	Biru-hijau	Merah
500-560	Hijau	Ungu
560-580	Kuning-hijau	Ungu
580-595	Kuning	Biru
595-610	Oranye	Hijau-biru
610-750	Merah	Biru-hijau

Monokromator, kuvet, detektor, dan sumber cahaya adalah empat komponen utama peralatan spektrofotometer. Monokromator akan digunakan untuk memberikan sinar cahaya dari sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Radiasi akan terkonsentrasi pada detektor, yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik (Suhartati, 2013).

Bagian instrumen Spektrofotometer UV-Vis:

#### 1. Sumber cahaya

Sumber cahaya perlu memancarkan radiasi dengan intensitas dan stabilitas tinggi. Hanya wilayah tampak yang menerima energi cahaya dari sumber biasanya. Sinar UV berasal dari lampu deuterium yang memiliki panjang gelombang antara 190 dan 350 nm. Untuk cahaya tampak, cahaya tampak berasal dari lampu kuarsa halogen atau tungsten yang memiliki panjang gelombang antara 350 dan 1100 nm.

#### 2. Monokromator

Monokromator sebuah alat yang membagi cahaya polikromatik jadi elemen dengan panjang gelombang tunggal yang membentuk cahaya monokromatik. Ketika suatu sumber radiasi memancarkan radiasi

polikromatik, tugas monokromator adalah mengubahnya menjadi radiasi monokromatik. Filter, prisma, kisi, celah masuk, dan celah keluar membentuk monokromator.

### 3. Wadah sampel (kuvet)

Salah satu alat untuk menyimpan sampel atau sampel untuk dianalisis adalah kuvet. Bahan yang paling umum digunakan untuk membuat kuvet adalah kaca, plastik, kaca plexiglass, dan silika (kuarsa). Bentuknya persegi panjang berukuran 1 x 1 cm dan tinggi 5 cm. Kisaran UV (190–1100 nm) diukur menggunakan kuvet kuarsa atau kaca plexiglass. Sementara itu, mengingat kaca menyerap sinar UV, maka tidak mungkin menggunakan kuvet yang terbuat dari kaca. Segala jenis kuvet dapat digunakan untuk pengujian cahaya tampak (380–1100 nm).

### 4. Detektor

Detektor bisa mengambil cahaya yang ditransmisikan larutan. Cahaya tersebut berubah jadi sinyal listrik oleh amplifier dan di perekam bisa dimunculkan berbentuk angka pada pembaca (komputer).

### 5. Visual display/rekorder

Tampilan/perekam visual adalah sistem pembacaan yang menampilkan besaran sinyal listrik, dinyatakan dengan symbol % transmitansi atau serapan. Perekamnya bisa printer/tampilan di komputer.

Mencari besaran kenaikan suatu zat bisa dikerjakan memakai spektrofotometri UV-Vis. Pemilihan metode khusus ini didasarkan pada kesederhanaan, kemudahan penggunaan, dan tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan gula putih/metode lain yang menganalisis bahan jumlah kecil. Sebab murah, mudah, tidak membutuhkan alat lab rumit, pendekatan ini juga paling populer (Nofita, dkk., 2023).

Spektrofotometer UV-Vis beroperasi berdasarkan cahaya yang menembus lensa untuk mencapai monokromator dan filter cahaya pada spektrofotometer, yang menerima cahaya dari lampu deuterium polikromatik atau tungsten. Cahaya polikromatik kemudian akan diubah menjadi cahaya monokromatik tunggal oleh monokromator. Sampel kemudian akan terkena sinar cahaya dengan panjang tertentu mengandung bahan berkonsentrasi khusus. Akibatnya, separuh cahaya melewatinya, sebagian lagi diperoleh. Detektor kemudian menerima cahaya yang telah lewat. Setelah itu, detektor akan menghitung jumlah cahaya yang diterimanya dan menghitung berapa banyak sampel yang diserap. Jumlah cahaya yang diserap berkorelasi dengan konsentrasi zat disampel, memungkinkan penentuan konsentrasi zat secara kuantitatif (Hanif, 2016).

Dengan menganalisis hubungan antara cahaya, atau cahaya pada panjang gelombang tertentu, dan materi dalam bentuk molekul atau atom, spektrofotometer Uv-Vis digunakan untuk mengevaluasi natrium benzoat. Materi dapat berbentuk molekul atau atom yang mempunyai elektron valensi, sedangkan cahaya dapat berbentuk tampak (visibel), ultraviolet (tidak tampak), atau inframerah. Nama lain cahaya yang asalnya dari benda adalah radiasi elektromagnetik. Spektroskopi emisi, spektroskopi serapan, dan spektroskopi hamburan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai cara cahaya atau radiasi elektromagnetik dapat berinteraksi dengan materi. Spektrofotometer yang digunakan pada Uv-Vis bekerja dengan serapan. Sederhananya, spektrofotometer Uv-Vis yakni:

1. Sumber cahaya adalah lampu polikromatik yang memancarkan cahaya pada rentang cahaya tampak (400–800 nm) dan ultraviolet (0-400 nm). Ini adalah lampu Tungsten/Wolfram.
2. Monokromator yang memungkinkan pemilihan panjang gelombang.

3. Menggunakan kuvet atau sel sampel untuk menampung sampel. Bersifat tembus cahaya, tidak rentan terhadap zat, tidak mudah rapuh, berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm, serta mempunyai permukaan visual sejajar dan lurus.
4. Detektor fungsinya merekam cahaya yang masuk ke sampel.
5. Sistem pembacaan dirancang untuk menerima sinyal listrik dari detektor dan mengeluarkannya sebagai angka transmisi atau serapan. Angka-angka ini kemudian ditampilkan di layar perangkat (Angraini, dkk., 2021).

#### **E. Tinjauan Islam**

Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur kehidupan manusia dalam segala keadaan dan bersifat universal, memerintahkan hanya yang menyehatkan dan mengharamkan segala sesuatu yang merugikan, seperti makanan atau minuman yang mengandung bahan pengawet dalam jumlah tinggi, yang dapat langsung berdampak buruk bagi kesehatan seseorang entah saat ini maupun di kemudian hari, sesuai dengan Q.S. Taha/ 20 : 81.

فِيهِ تَطْعَمًا وَلَا رِزْقًا ۖ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلِّهَا

Terjemahnya:

“Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu, janganlah melampaui batas” (Kementrian Agama RI, 2022).

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab) dijelaskan bahwa makanlah makanan apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak

menyukai yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang berlebihan dalam hal apapun itu (Shihab, 2002: 87).

Dalam buku tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka juga dijelaskan bahwa “Makanlah dari antara rezeki-rezeki yang baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu.” (pangkal ayat 81). Dengan demikian maka Tuhan mempersilahkan memakan rezeki baik yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. Rezeki yang baik ialah yang halal lagi enak rasanya, terimalah itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jangan memakan makanan yang haram dan jangan dapatkan sumber makanan itu dari sumber yang haram walaupun makanan itu halal, tapi kalau kita mendapatinya dengan cara yang haram maka akan menjadi haram. Sebagai contoh, ayam adalah makanan yang halal tetapi kalau kita mencuri ayam itu maka ayam tersebut adalah haram untuk kita makan. “Dan janganlah melampaui batas padanya” Melampaui batas dengan rezeki yang diberikan Tuhan ialah apabila dikumpulkan dengan serakah dan rakus, sehingga tidak mengingat agar orang lain pun mendapat rezeki tersebut. Atau menjadi bakhil, tidak suka memberi kepada orang yang kekurangan atau karena tamak ingin pula hendak mempunyai apa yang ada ditangan orang lain. Maksud ‘jangan melampaui’ itu juga bermaksud ‘jangan tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan’. Mereka diingatkan untuk bersyukur dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka dan sepatutnya mereka bersyukur atas nikmat Nya (Hamka, 1983).

Berdasarkan surah diatas dapat dimaknai bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan di antara rezeki yang baik, yang lezat cita rasanya dan yang telah Allah karuniakan kepada kita, Allah tidak menyukai orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan berlebih-lebihan, tidak mensyukurinya, mendermakan kepada kemaksiatan, menghambur-hamburkannya dengan tanpa rasa sesal, bersenang-senang berlebihan, dan sebagainya. Karena kalau demikian

berarti mereka telah mengundang kemurkaan Allah yang akan menimpakan siksa-Nya. Celaka dan binasalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah. Diterangkan pula dalam Q.S. an-Nahl/16 : 114.

طَيِّبًا ۖ حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُم مِّمَّا فَكُلُوا

Terjemahnya:

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik” (Kementrian Agama RI, 2022).

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab) dijelaskan bahwa pilihlah wahai orang-orang beriman, jalan kesyukuran dan makanlah sebagian dari apa yang direzekikan, yakni dianugerahkan oleh Allah kepada kamu. Makanlah itu dalam keadaan halal lagi baik, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi kesehatan; dan syukurilah nikmat Allah agar kamu tidak ditimpa apa yang menimpa negeri-negeri terdahulu jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (Shihab, 2002: 757).

Dalam buku tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka juga dijelaskan bahwa sebagai umat manusia sudah selayaknya untuk meninggalkan perbuatan orang terdahulu yang tidak mengikuti perintah yang diterapkan. Karena sejatinya perintah Allah semata-mata untuk kemaslahatan manusia pula. Manusia diperintahkan untuk makan yang halal dan baik serta meninggalkan perkara haram untuk kesehatan jiwa dan raganya dan sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan (Hamka, 1998: 2285).

Ayat ini disampaikan bahwasanya umat Islam diwajibkan oleh hukum Islam untuk memakan makanan halal. Makanan yang disantap dalam keadaan baik (ṭayyib) dan mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. segala jenis

makanan yang tidak dilarang oleh Hadits atau Al-Qur'an. Makanan dan minuman halal diperbolehkan asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Demikian juga pada Q.S. al-Baqarah/2: 168.

طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik ” (Kementrian Agama RI, 2022).

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab), namun demikian tidak semua yang halal pasti baik. Karena yang dinamakan halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Terdapat perkara halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau itu baik untuk orang lain. Terdapat pula makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika ia memakannya menjadi kurang baik. Dan yang terkandung dalam ayat ini adalah yang halal lagi baik (Shihab, 2002. Jil. 1: 380).

Dalam buku tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka juga menyebutkan makanan halal ialah lawan dari makanan yang haram dan sesuatu yang haram telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan jika tidak ada perintah yang mengharamkan maka halal untuk dimakan. Tetapi dalam hal ini tidak cukup bila halal saja, melainkan yang baik pula. Dan batas-batas yang baik itu batas yang dapat dipertimbangkan oleh manusia terkait baik buruknya. Misalnya daging sapi yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Dalam hal ini halal tetapi tidak baik untuk digunakan. Dalam ayat ini menegaskan makanan yang halal lagi baik, maka apabila manusia hendak mencarinya harus dari sumber yang

halal, bukan dari penipuan, bukan dari korupsi sehingga tercipta jiwa yang terpelihara dari sifat-sifat tercela tersebut (Hamka, 1998: 375).

Ayat ini menegaskan makanan halal yang baik, ketika manusia ingin mendapatkannya, sumbernya harus halal, bukan penipuan, bukan korupsi hingga tercipta jiwa terpelihara dari sifat tercela. Ayat ini menekankan bahwa makanan itu baik dan halal, maka untuk melindungi jiwa dari sifat-sifat menjijikkan tersebut, orang yang mencari makanan harus dari bahan yang halal dan bukan dari penipuan atau suap.

Surah yang disebutkan di atas juga dapat digunakan untuk menyatakan bahwa tidak semua makanan dan minuman halal secara bawaan bersifat thayyib dan tidak semua makanan dan minuman halal adalah halal dalam keadaan tertentu. Makanan tertentu halal dan bermanfaat bagi orang-orang dengan kondisi medis tertentu, dan ada makanan lain yang buruk bagi mereka meskipun bermanfaat bagi orang lain. Makanan tertentu memang sehat tetapi kurang nutrisi sehingga kurang sehat. Sebab, makanan harus halal dan thayyib. Demikian pula dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۙ وَأَحْسِنُوا ۙ الشَّهْلَكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا  
المُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Kementrian Agama RI, 2022).

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab), menyebutkan bahwa dalam ayat tersebut berbuat baik disebut dengan istilah ihsan. Ihsan berupa melakukan semua aktivitas positif, seolah-olah melihat Allah dan selalu merasa dilihat oleh-Nya, sebagaimana dalam hadits Rasulullah “menyembah Allah,

seakan-akan melihat-Nya dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu”. Kesadaran atas pengawasan Allah mendorong manusia untuk berbuat baik kapanpun dan dimanapun (Shihab, 2002. Jil. 1: 426).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk: dalam segi amal diperintahkan untuk berinfak di jalan Allah, dan dalam segi ketaatan dengan mendekati diri kepada Allah, terutama membelanjakan harta untuk berperang melawan musuh dan memperkuat kaum muslim (Katsir, 2008. Jil. 1: 372).

Berdasarkan pengertiannya, umat Islam pada umumnya dianjurkan untuk menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, maksudnya untuk hal-hal yang bermanfaat, patut disembah, menaati Allah, dan mencari keridhaan-Nya. Anda akan diberi gelar “ihsan” yang sangat dijunjung tinggi oleh Allah jika Anda menahan diri dari kebiasaan belanja yang boros.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain analisis deskriptif dengan menggunakan metode teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai digunakan untuk penelitian kuantitatif, dimana seluruh populasi memenuhi persyaratan yang diambil sebagai sampel untuk dianalisis kadarnya dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Laboratorium Fitokimia) dan Fakultas Sains dan Teknologi (Laboratorium Riset) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai 21 Agustus sampai 31 Oktober 2023.

#### ***B. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Unsur yang menjadi objek/subjek memiliki kualitas dan ciri khas khusus pada penelitian (Jasmalinda, 2021). Populasi riset ini yakni 20 jenis jajanan jelly yang berada di Pasar Tradisional Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

##### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Jasmalinda, 2021). Adapun beberapa sampel dalam penelitian

ini yaitu 5 sampel jajanan jelly yang mengandung natrium benzoat dan memenuhi persyaratan. Persyaratan minuman jelly yang bagus adalah transparan, beraroma, rasa buah asli dan tekstur gampang hancur, namun masih dirasakan saat dimulut (Widjaja, dkk., 2019).

### **C. Alat dan Bahan**

#### **1. Alat**

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yaitu gelas kimia 100 ml (IWAKI CTE33), labu ukur 100, 50 dan 10 ml (PYRE ®IWAKI), gelas ukur 50 ml (IWAKI CTE33), corong pisah (PYRE), water bath (MEMMERT), erlenmeyer (PYRE ® IWAKI), micropipet (SOCOREX), cawan porselin, batang pengaduk dan spektrofotometri UV-Vis (VARIAN).

#### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan baku pembanding natrium benzoat, NaCl jenuh, HCL 5%, NaOH 10 %, etanol 96%, klorofom, aquadest, kertas lakmus merah dan biru, kertas saring dan 5 sampel jajanan jelly yaitu jelly Indra, jelly Iki premium, jelly Jiggo, jelly Milenia dan jelly Tiky.

### **D. Prosedur Kerja**

#### **a. Ekstraksi natrium benzoat pada sampel**

Sebanyak 20 ml sampel jajanan jelly ditambahkan dengan 1 g NaCl, lalu dimasukkan ke labu ukur 50 ml. Kemudian labu ukur dimasukkan NaCl jenuh sebanyak 20 ml. Masukkan NaOH 10% hingga larutan menjadi basa. Larutan yang bersifat basa ditunjukkan dengan berubahnya warna kertas lakmus merah jadi biru. Disaring larutan dengan menggunakan kertas saring. Setelah filtrat didapatkan ditambahkan kecorong pisah, ditambahkan HCl 5% hingga larutan mencapai situasi asam. Diekstraksi dengan 25, 15, dan 10 ml kloroform, secara berurutan. Penangas air pada suhu 50°C

digunakan untuk memisahkan dan menguapkan lapisan kloroform. Campur ekstrak kering dengan 25 mililiter etanol (Rahmasari, dkk., 2021).

b. Pembuatan larutan baku induk natrium benzoat 100 ppm

Ditimbang seksama 10 mg natrium benzoat, dilarutkan dengan menggunakan aquadest 50 ml. Dimasukan ke labu ukur 50 ml sampai tanda batas. Larutan induk tersebut setara dengan 100 ppm kadar natrium benzoat.

c. Pembuatan deret larutan baku natrium benzoat

Deret larutan baku induk 100 ppm dibuat dengan cara memindahkan larutan baku ke dalam labu ukur 50 ml kemudian diencerkan sampai batas. Larutan standar natrium benzoat 2,4 ppm, 2,6 ppm, 2,8 ppm, 3 ppm dan 3,2 ppm.

d. Penentuan panjang gelombang maksimum

Diambil salah satu larutan baku pembanding diukur serapannya pada panjang gelombang 200-400 nm menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan diperoleh  $\lambda_{\max}$  dari natrium benzoat yaitu 227 nm.

e. Pembuatan kurva standar

Diukur serapan larutan baku natrium benzoat dari deret konsentrasi yang telah dibuat pada  $\lambda_{\max}$  yang diperoleh. Dari hasil pengukuran serapan deret larutan baku pada panjang gelombang maksimum natrium benzoat dibuat hubungan antara serapan dengan konsentrasi bpj, sumbu Y adalah nilai serapan (A) dan sumbu X adalah konsentrasi (bpj). Persamaan garis lurus adalah  $y = ax + b$ .

f. Penetapan kadar natrium benzoat pada sampel

10 mg dari setiap sampel ditimbang, dimasukkan ke labu takar 10 ml, diencerkan sampai kadar ditentukan dengan 10 ml air suling. Spektrofotometri UV-Vis dipakai mengukur serapan larutan disepanjang gelombang maksimum 227 nm. Selanjutnya menentukan jumlah zat aditif

pada natrium benzoat dengan menghitungnya menggunakan persamaan kurva standar yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai serapannya.

g. Analisis data

Data pengukuran kurva rerata standar digunakan untuk membuat persamaan garis regresi  $y = ax + b$ . Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan garis regresi sebagai dasar, bahan sampel ditentukan. Setelah itu, informasi tersebut diolah manual, diberikan analisis deskriptif yang disajikan berbentuk tabel/grafik.

Keterangan :

y = Menyatakan Absorban

b = Slope (Koefisien regresi)

a = Intersep (juga menyatakan slope = kemiringan)

x = Konsentrasi (Variabel terikat)

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

1. Hasil Ekstraksi

**Tabel 9.** Hasil Ekstraksi Natrium Benzoat Pada Sampel

Jenis Ekstrak	Volume Sampel (ml)	Volume pelarut etanol (ml)	Berat Ekstrak (mg)
Jelly 1	20	25	10
Jelly 2	20	25	10
Jelly 3	20	25	10
Jelly 4	20	25	10
Jelly 5	20	25	10


2. Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Natrium Benzoat

**Tabel 10.** Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Natrium Benzoat 100 ppm

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
2.4	0.3487
2.6	0.3685
2.8	0.3929
3	0.4151
3.2	0.4490
Slope (b)	0.0488
Aksis intersep (a)	0.1236
Koefisien korelasi (r)	0.9904

Didapatkan persamaan regresi:  $y = a + bx$

$$y = 0.1236 + 0.0488x$$



**Gambar 10.** Grafik hubungan antara serapan larutan natrium benzoat baku pembanding dengan konsentrasi pada panjang gelombang maksimum 227 nm.

### 3. Hasil Pengukuran Absorbansi Natrium Benzoat Pada Sampel

**Tabel 11.** Hasil Pengukuran Absorbansi Natrium Benzoat Pada Sampel

No	Sampel	Absorbansi
1.	SA 1	0.2996
2.	SA 2	0.1420
3.	SA 3	0.1841
4.	SA 4	0.1919
5.	SA 5	0.1509

**Keterangan :**

1. SA 1 : Sampel 1 (jelly Indra)<sup>®</sup>
2. SA 2 : Sampel 2 (jelly Iki premium)<sup>®</sup>
3. SA 3 : Sampel 3 (jelly Jiggo)<sup>®</sup>
4. SA 4 : Sampel 4 (jelly Milenia)<sup>®</sup>
5. SA 5 : Sampel 5 (jelly Tiky)<sup>®</sup>

## 4. Hasil Analisis Data Kadar Natrium Benzoat Pada Sampel

**Tabel 12.** Hasil Analisis Data Kadar Natrium Benzoat Pada Sampel

No	Sampel	Absorbansi	Rata-rata	Kadar	Range Kadar Yang Diterima
1.	SA 1	0.2998 0.2994 0.2996	0.2996	2.3943 mg/L	Menurut Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013, penggunaan kadar pengawet natrium benzoat sebagai bahan tambahan yang diizinkan yaitu 600 mg/kg (Rohmah Amanatur, dkk., 2021).
2.	SA 2	0.1426 0.1420 0.1416	0.1420	0.8897 mg/L	
3.	SA 3	0.1841 0.1839 0.1843	0.1841	1.2916 mg/L	
4.	SA 4	0.1919 0.1918 0.1921	0.1919	1.3660 mg/L	
5.	SA 5	0.1511 0.1509 0.1507	0.1509	0.9746mg/L	

## **B. Pembahasan**

Minuman jelly berbahan dasar buah, hingga banyak yang menyukainya dari semua umur, dapat meningkatkan gizi dan menyehatkan tubuh. Minuman jelly mempunyai keunggulan seperti dihasilkan memakai teknologi sederhana, disimpan lama apabila produk tersebut pada kondisi penyimpanan yang tepat (Putra, dkk., 2021).

Makanan atau minuman dalam bentuk gel yang disebut jeli terbuat dari agar, karagenan, gelatin, senyawa hidrokoloid, dan pektin dan mungkin mengandung gula, asam, atau bahan lainnya yang legal. Minuman jelly mempunyai kekentalan gel lemah hingga lebih mudah dihisap. Minuman semi padat yang disebut jeli dihasilkan dengan memasak jus buah dengan gula. Namun, konsistensinya jika dikonsumsi melalui sedotan akan mudah hancur. Minuman jeli bukan sekadar minuman biasa; mereka juga bisa dicerna sebagai cara untuk menunda rasa lapar. Mulut masih merasakan bentuk gelnya (Desniar, dkk., 2016). Produk makanan ringan yang tersebar dipasar adalah jelly dibuat dengan berbagai macam bahan pengawet (Saputri, dkk., 2021).

BPOM tugasnya melakukan pengawasan tentang pemakaian pengawet di Indonesia. Bahan pengawet seringkali dipakai keseharian oleh warga, khususnya dalam produksi produk pangan khususnya makanan ringan. Pengawet dapat digunakan secukupnya atau pada tingkat yang masih dalam batas yang diperbolehkan. Jika penggunaan bahan pengawet melampaui batasan yang diizinkan, masalah kesehatan dan bahkan penyakit dapat terjadi (Gama Indjar Sabaniah, dkk., 2023).

Dibandingkan teknik lain, penggabungan bahan pengawet lebih umum digunakan karena lebih sederhana dan terjangkau. Benzoat, biasanya terdapat pada kalium atau natrium benzoat yang lebih larut dalam air, merupakan bahan

pengawet yang banyak digunakan untuk mengawetkan berbagai jenis makanan dan dijual di pinggir jalan. Karena natrium benzoat mempunyai aktivitas tinggi pada pH asam, natrium benzoat dapat dipakai mengawetkan makanan sifatnya asam (efektif pada pH 2,5–4,0), termasuk salad buah, minuman berkarbonasi, acar, selai, jeli, dan margarin (Estiasih, 2015).

Aturan BPOM No 36 Tahun 2013, komponen yang mengandung bahan pengawet natrium benzoat sebanyak 600 mg/kg diperbolehkan (Rohmah Amanatur, dkk., 2021). Natrium benzoat bahan pengawet seringkali dipakai dimakanan/minuman karena toksisitasnya yang rendah, kualitas antimikroba, dan peningkatan kelarutan dalam air. Ketika  $\text{pH} \leq 4,5$ , natrium benzoat bekerja dengan baik di lingkungan asam; nilai pH yang lebih tinggi sebaiknya tidak digunakan. Karena lebih banyak asam yang tidak terikat dapat dihasilkan pada nilai pH yang lebih rendah, benzoat akan bekerja lebih baik. Pelarutan natrium benzoat dalam membran sel mikroba dan pembentukan ion hidrogen dapat menurunkan pH, mengganggu metabolisme, dan pada akhirnya menyebabkan kematian sel akan difasilitasi oleh asam yang tidak terdisosiasi ini. Karena stabilitas dan kelarutannya yang unggul dalam air, natrium benzoat lebih sering digunakan (Azmi, dkk., 2020).


Analisis jumlah kadar bahan pengawet natrium benzoat dalam produk jelly biasanya diterapkan memakai spektrofotometri UV-Vis. Panjang gelombang UV dan sinar tampak digunakan sebagai daerah serapan dalam spektrofotometri UV-Vis, suatu teknik analisis yang menemukan zat. Data analisis kuantitatif dan kualitatif dapat diperoleh melalui spektrofotometri UV-Vis. Sensibilitas tinggi, selektivitas unggul, dan akurasi yang baik merupakan ciri utama spektrofotometri UV-Vis. Dibandingkan dengan teknik lain, pengujian dengan Spektrofotometri UV-Vis relatif cepat ( Abriyani Ermi., dkk, 2023).

Dalam penelitian ini terkait analisis kadar natrium benzoat dari beberapa merek jajanan jelly di pasar tradisional Bontoramba kabupaten Jeneponto menggunakan metode spektrofotometri uv-vis periode Agustus-Oktober 2023 didapatkan kadar pengawet dalam kelima sampel jajanan jelly memenuhi standarisasi sudah diputuskan aturan BPOM RI No. 36 Tahun 2013 yaitu 600 mg/kg.

Tabel 9 menyajikan temuan dari pemisahan natrium benzoat dari sampel. Terlihat kelima sampel mempunyai volume yang sama (20 ml), pelarut etanol 25 ml, dan berat ekstrak 10 mg. Dalam penelitian ini, ekstraksi cair-cair adalah metodologinya. Menambahkan pelarut cair ke dalam campuran homogen memungkinkan pemisahan sejumlah bagian jadi 2 fase yakni organik dan aqueous. Proses ini dikenal sebagai ekstraksi cair-cair. Kedua fase yang termasuk bahan tersebar dikocok dan didiamkan sampai terpisah sempurna lalu berbentuk 2 lapisan fasa cair. Pendekatan ini melibatkan pemisahan unsur-unsur kimia diantara 2 tahap pelarut yang tidak bercampur satu sama lain. Beberapa bagian larut difase pertama dan sebagiannya larut difase kedua. dan rasio konsentrasi yang ditetapkan akan digunakan untuk membagi unsur-unsur kimia menjadi dua tahap berbeda berdasarkan derajat polaritasnya (Sugiarto Wahyu Kurniawan, dkk., 2023).

Sebelum menggunakan kloroform untuk ekstraksi natrium benzoat, 20 mililiter NaCl jenuh ditambahkan ke sampel pada fase ekstraksi natrium benzoat. Fungsinya mengubah asam benzoat jadi garam natrium benzoat. Dibandingkan dengan asam benzoat, natrium benzoat lebih larut di air karena garam asam benzoat bersifat ionik. NaOH 10% kemudian ditambahkan kelarutan hingga warna jadi biru, yang ditunjukkan dengan warna kertas lakmus berubah jadi biru. HCl 5% ditambahkan ke garam natrium benzoat, mengubahnya kembali jadi asam

benzoat, yang terdapat dimolekul di lingkungan asam yang terlihat dari memerahnya kertas lakmus biru. Inilah respons yang terjadi:



Teknik spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk melakukan tahap analisis kuantitatif. Spektrofotometri UV-Vis merupakan suatu teknik analisis yang mendeteksi senyawa dengan menggunakan daerah serapan pada panjang gelombang UV dan Visible. Teknik yang berguna untuk mengukur serapan cahaya pada daerah ultraviolet (panjang gelombang 100–200 nm) dan spektrum tampak (panjang gelombang 200–700 nm) adalah spektrofotometri UV-Vis (Harahap, dkk., 2020). Sebelum pemisahan asam benzoat menggunakan metode least square untuk memastikan kandungan asam benzoat dan selanjutnya menghitung bahan natrium benzoat menurut berat molekulnya, sampel dikeluarkan menggunakan kloroform dengan penambahan 25, 15, dan 10 ml.

Absorbansi tertinggi yang diukur pada salah satu konsentrasi yang digunakan untuk menentukan kurva baku menentukan panjang gelombang yang digunakan untuk pengujian sampel. Pada Tabel 10 konsentrasi tipikal natrium benzoat yang digunakan adalah 2,4 ppm, 2,6 ppm, 2,8 ppm, 3 ppm, dan 3,2 ppm, dan serapan maksimum yang diperoleh berturut-turut adalah 0,3487, 0,3685, 0,3929, 0,4151, dan 0,4490. Pembacaan serapan spektrofotometer harus antara 15% dan 70%, atau 0,2 dan 0,8. Penganjuran ini didasarkan pada gagasan bahwa kesalahan fotometrik dapat diabaikan dalam spektrum nilai serapan ini. Tabel 11 menampilkan temuan penentuan serapan natrium benzoat dalam sampel: untuk SA1 adalah 0,2996 ppm; untuk SA2 sebesar 0,1420 ppm; untuk SA3 sebesar 0,1841 ppm; untuk SA4 sebesar 0,1919 ppm; dan untuk SA5 sebesar 0,1509 ppm.


Penyerapan terbesar ditemukan pada panjang gelombang 227 nm berdasarkan ukuran panjang gelombang natrium benzoat yang digunakan diriset.

Hal ini menghasilkan kurva tipikal dengan persamaan regresi  $y = 0,1236 + 0,0488x$ .

Pada riset ini jumlah natrium benzoat yang terdapat pada sampel pada tabel 12 untuk A1 adalah 2,3943 mg/L, sampel A2 adalah 0,8897 mg/L, sampel A3 adalah 1,2916 mg/L, sampel A4 adalah 1,3660 mg/L, dan sampel A5 adalah 0,9746 mg/L. Nilai-nilai ini ditentukan dari rumus regresi yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima sampel makanan ringan jeli telah memenuhi persyaratan 600 mg/kg yang ditentukan dalam Aturan BPOM No 36 Tahun 2013. Kajian “Penentuan Kadar Pengawet Natrium Benzoat pada Saus Cabai Kemasan Menggunakan Spektrofotometri Uv-Vis” oleh Dewi, K.A.Y., dkk. (2019) tidak jauh berbeda dengan ini. Pengawet natrium benzoat terdeteksi pada dua sampel yang dinyatakan positif. Kadar bahan pengawet natrium benzoat yaitu 157,767 mg/kg untuk sampel A dan 182,8 mg/kg untuk sampel B, belum melampaui batas kadar 1000 mg/kg yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 722/Menkes/PER/IX/88. Riset Sari, M., dkk. (2022) perihal “Pengujian Kadar Natrium Benzoat pada Saus Cabai Kemasan dari Beberapa Pasar Tradisional di Kota Medan” memberikan hasil untuk beberapa sampel berkisar antara 48,9845 mg/kg hingga 97,3628 mg/kg, namun tetap berada di bawah ambang batas yakni 1000 mg/kg sesuai aturan BPOM RI No 11 Tahun 2019. Penjelasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa kadar natrium benzoat sebesar 0,1 g/kg terhambatnya mikroorganisme. Olehnya, setiap produsen dapat memutuskan berapa banyak natrium benzoat dimasukkan dimakanan dengan tetap memperhatikan batas peningkatan yang sesuai untuk setiap produk yang dihasilkan.

Lima sampel jelly yang digunakan diriset memiliki penggunaan bahan pengawet natrium benzoat yang memenuhi pedoman 600 mg/kg sesuai aturan

BPOM No 36 Tahun 2013. Pengawet benzoat digunakan terutama pada produk sirup, minuman isotonik, saus, margarin, kecap, selai, dan jeli untuk menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Natrium benzoat berfungsi dengan membuat sesuatu menjadi lebih asam. Dengan cara ini, makanan aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dan jamur tidak dapat berkembang dan menyebar. Total natrium benzoat yang digunakan sebagai bahan pengawet telah memenuhi SNI yaitu 600 mg/kg, maka dianggap aman digunakan. Namun, hal ini akan mengakibatkan masalah kesehatan jika dosis yang disarankan tidak diikuti saat menggunakannya. Menggunakan natrium benzoat dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko kanker dan menyebabkan urtikaria, asma, dan iritasi lambung (Nurhasnawati Henny, dkk., 2023).



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kadar pengawet natrium benzoat yang terkandung dalam lima sampel jajanan jelly tersebut yaitu pada sampel A1 sebesar 2.3943 mg/L, sampel A2 sebesar 0.8897 mg/L, sampel A3 sebesar 1.2916 mg/L, sampel A4 sebesar 1.3660 mg/L dan sampel A5 sebesar 0.9746 mg/L.
2. Kadar pengawet dalam kelima sampel jajanan jelly memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 36 Tahun 2013 yaitu 600 mg/kg.

#### **B. Saran**

Warga dan produsen semestinya memperhatikan pemakaian bahan pengawet pada produk makanan/minuman, sehingga tidak melewati batasan yang sudah diatur oleh BPOM maupun kemenkes.

## KEPUSTAKAAN


- Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi' i, 2008), 372.
- Abidah, dkk. *Pengaruh Jumlah Ekstrak Daun Kelor (Moringa Oleifera) Dan Karagenan Terhadap Sifat Organoleptik Jelly Drink Nira Siwalan (Borassus Flabellifer L)*. E-Jurnal Tata Boga Volume 9 No.2. 2020.
- Abriyani, dkk. *Analisis Kadar Kafein Kopi, Teh, Dan Coklat Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Journal Of Comprehensive Science Vol. 2no. 1. 2023.
- Abriyani, dkk. *Metode Spektrofotometri Uv-Vis Dalam Analisis Penentuan Kadar Vitamin C Pada Sampel Yang Akan Diuji*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling Volume 5 Nomor 1. 2023.
- Agustin, F., Dwi, W., & Putri, R. (2014). *Pembuatan Jelly Drink Averrhoa Blimbi L. (Kajian Proporsi Belimbing Wuluh : Air Dan Konsentrasi Karagenan)*. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2(3), 1–9.
- Amirudin, dkk. *Formula Jelly Drink Cincau Hijau, Pandan Wangi Dan Kayu Manis Untuk Menurunkan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Melitus*. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* Vol. 16. 2019.
- Anggadiredja. (2009). *Rumput Laut, Pembudidayaan, Pengolahan, & Pemasaran Komoditas Perikanan Potensial*. Penebar Swadaya.
- Angraini, dkk. *Penggunaan Spektrofotometer Uv-Vis Untuk Analisis Nutrien Fosfat Pada Sedimen Dalam Rangka Pengembangan Modul Praktikum Oseanografi Kimia*. *Jurnal Penelitian Sains* 23 (2). 2021.
- Ansyah, Dkk. *Analisis Kandungan Natrium Benzoat Pada Minuman Teh Kemasan Yang Tidak Bermerek Yang Dijual Di Peuniti*. *Jurnal Sains & Kesehatan Darussalam*. 2021.
- Azmi Afifah Dara, Dkk. *Identifikasi Kualitatif Dan Kuantitatif Natrium Benzoat Pada Saus Cabai Yang Dijual Di Beberapa Pasar Di Kota Padang*. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 2020.
- Cahyadi, W. (2008). *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. PT Bumi Aksara.
- Centhya, M. V. *Pengaruh Natrium Benzoat Dan Waktu Penyimpanan Terhadap Mutu Kimia Dan Mikrobiologis Selai Pala (Myristica Fragrans Houtt)*. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri* Vol. 9 No.4. 2021.
- Dari, dkk. *Karakteristik Kimia Dan Derajat Keasaman Minuman Sari Buah Pedada (Sonneratia Sp.) Dengan Penambahan Natrium Benzoat*. *Jurnal Teknologi Pangan Dan Gizi* Vol 20 (1): 35-44. 2021.
- Depkes RI. *Farmakope Indonesia edisi VI*. Departemen Kesehatan. Republik Indonesia. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020.
- Departemen Agama RI. 2022, *Quran Kemenag*. dalam <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses pada 6 Juli 2022.
- Dewi, dkk. *Penetapan Kadar Pengawet Natrium Benzoat Pada Sambal Kemasan Secaraspektrofotometri Uv-Vis*. *Jurnal Ilmiah Medicamento* Vol.5no.1. 2019.

- Evana, dkk. *Analisis Natrium Benzoat Pada Kecap Di Kota Yogyakarta Dengan Metode Alkalimetri*. Prosiding Seminar Nasional Kimia Dan Terapan. 2021.
- Faroch, dkk. *Analisis Kadar Natrium Benzoat Pada Saus Sambal Di Pasar Wage Kabupaten Banyumas*. Jurnal Labora Medika 5. 2021.
- Gandjar, I. G. dan Rohman, A. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 379-393. 2012.
- Hadi, Demaz Fauzi, & Zakiah, Kiki. Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk Bersaing di Era Pandemi\_Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk Bersaing di Era Pandemi. *Competitive*, 16 (1), 32–41. 2021.
- Hadriyati, dkk. *Analisis Kadar Natrium Benzoat Pada Bumbu Jahe Giling (Zingiber Officinale) Di Pasar Tradisional Jambi*. Journal Of Health care Technology And Medicine Vol. 6 No. 1. 2020.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura. 1998.
- Hanif Romadhani. *Validasi Metode Penetapan Kadar Tablet Floating Metformin Hidroklorida Dengan Spektrofotometri*. Fakultas Farmasi, UMP, 2016.
- Harahap, dkk. *Analisa Kandungan Beta Karoten Pada Cpo (Crudepalmoil) Di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Ppks) Medan Menggunakan spektrofotometri Uv-Vis*. Jurnal Kimia Sains Dan Terapan Volume 2. 2020.
- Hariyanto, dkk. *Pengendalian Proses Produksi Makanan Ringan Mini Jelly*. Journal Of Industrial View Volume 02, Nomor 01. 2020.
- Hestianawati, M. D. (2013). *Bekal Sekolah Favorit Anak : Sehat, Lezat, Dan Mudah* (N. Kenyar (ed.); 1st ed.). Redaksi Cemerlang.
- Iswandi. *Pengaruh Perendaman Terhadap Kadar Kafein Pada Biji Kopi Di Kota Surakarta Secara spektrofotometri Uv-Vis*. Pharmacon–Program Studi Farmasi, Fmipa, Universitas Sam Ratulangi Volume 11 Nomor 2. 2022.
- Jasmalinda. *Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Motor Yamaha Di Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.10. 2021.
- Koswara, S. (2011). *Cara Sederhana Membuat Jam dan Jelly*. 30 Januari 2011. <http://www.ebookpangan.com>
- Khuniati dan Teti Estiasih. *Pengaruh Konsentrasi Natrium Benzoat dan Kondisi Pasteurisasi (suhu dan waktu) terhadap Karakteristik Minuman Sari Buah Apel Berbagai Varietas: Kajian Pustaka*. Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol.3 No.2 p.523-529. Universitas Brawijaya, Malang. 2015.
- Kusuma W, R., Rahayu, C., Gizi, J., Kemenkes, P., Raya, P., & Tengah, K. *Analisis Keberadaan Rhodamin B Dan Natrium Benzoat Dalam Saus Tomat Pentol Di Kota Palangka Raya*. J. Sains Dan Teknologi Pangan, 6(3), 4011– 4019. 2021.
- Material Safety Data Sheet Sodium Hydroxide* [serial online]. labchem (Diakses pada 23 Oktober 2021). Pubchem. 2021.
- Mierza, dkk. *Literature Review: Analisis Kadar Kafein Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Jurnal Farmasetis Volume 12 no 1. 2023.

- Ningtias, dkk. *Pengaruh Suhu Penyimpanan Terhadap Kadar Amoksisilin Tablet Yang Diukur Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Jurnal Analis Farmasi Volume 7, No. 1. 2022.
- Nurhasnawati Henny, dkk. *Analisis Pengawet Natrium Benzoat Pada Kecap Asin Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis*. JURNAL FARMASI ETAM SSN : 2797- 6696 Volume 3, Nomor 1. 2023.
- Pulungan, dkk. *Pengaruh Konsentrasi Sari Buah Stroberi (Fragaria X Ananassa ) Terhadap Formulasi Dan Evaluasi Jelly Drink Dengan Kombinasi Madu Dan Gula*. Jurnal Farmasi, Sains, Dan Kesehatan Vol. 1 No. 2. 2022.
- Putra, dkk. *Karakterisasi Mutu Fisik Dan Organoleptik Jelly Drink Berbasis Rumput Laut (Eucheuma Cottonii) Dan Buah Mangrove Pidada (Sonneratia Caseolaris)*. Manfish Jo urnal Volume 2 Nomor 1. 2021.
- Rahma, F. A., & Hajijah, S. (2023). Inovasi Pembuatan Jelly Dari Daun Bidara (Ziziphus Mauritiana) Sebagai Sumber Antioksidan. *Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas, 1*(1), 7823–7830.
- Rahmania, dkk. *Analisis Natrium Benzoat Pada Saos Yang Diproduksi Di Kota Jambi Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Journal Of Healthcare Technology And Medicine Vol. 6. 2020.
- Ramadhani, dkk. *Analisis Kadar Natrium Benzoat Dalam Saus Sambal Di Pasar Panorama Bengkulu Dengan Metode Spektrofotometri Ultraviolet*. Jurnal Ilmiah Pharmacy, Vol. 6 No.1. 2019.
- Rahmasari, dkk. *Analisis Natrium Benzoat Pada Minuman Kemasan Di Kabupaten Pekalongan Dengan Spektrofotometri Uv-Vis*. Journal Of Science, Technology, And Entrepreneurship Vol: 3 No: 2. 2021.
- Rohmah, dkk. *Validasi Metode Penetapan Kadar Pengawet Natrium Benzoat Pada Sari Kedelai Di Beberapa Kecamatan di kabupaten Tulungagung Menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis*. Jurnal Sains Dan Kesehatan Vol 3. No 2. 2021.
- Sahumena, dkk. *Identifikasi Jamu Yang Beredar Di Kota Kendari Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Journal Syifa Sciences And Clinical Research Volume 2 Nomor 2. 2020.
- Saptoningsih, & Jatnika, A. (2012). *Membuat Olahan Buah*. Agromedia.
- Saputra, dkk. *Pengaruh Penambahan Karagenan Terhadap Total Asam Minuman Jelly Sari Buah Kuini*. Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta, Vol, 1, No.1. 2022.
- Saputri, dkk. *Daya Terima Konsumen Terhadap Jelly Drink Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L.)*. Jurnal.Yudharta Volume 12, No. 1. 2021.
- Sari, dkk. *Pengujian Kadar Natrium Benzoat Pada Saus Sambal Kemasan Dari Beberapa Pasar Tradisional Kota Medan*. Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1. 2022.
- Satria, dkk. *Penetapan Kadar Flavonoid Total Dari Fraksi N-Heksana Ekstrak Daun Gelinggang Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Journal Of Engineering, Technology & Applied Science Volume. 4. 2022.
- Setia, S. E. *Edukasi Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Pada Kelompok Produksi Wingko Babat di Karangwuni, Rongkop Gunung Kidul*. Journal Of Community Service Vol.1 No.2. 2022.


- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Lentera Hati. Jakarta. 2002.
- Sinurat, E., Murdinah, & Fransiska, D. Karakterisasi Permen Jeli yang Dibuat dari Hasil Formulasi Jelly Powder. *Jurnal Pascapanen Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan*, 5(1), 57–64. 2010.
- Sugiarto Wahyu Kurniawan, dkk. Prediksi Data Kesetimbangan Cair-cair Pada Sistem Ternern Air + Asam Laktat + Pelarut Menggunakan Model UNIFAC-DMD. *Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia* ISSN 1693-4393. 2023.
- Suhartati, T. Dasar-dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrometri Massa untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik. Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2013.
- Supriyatin. *Penetapan Kadar Natrium Benzoat Pada Minuman Isotonik Berbagai Merk Yang Dijual Disalah Satu Swalayan Kota Cirebon*. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4. 2019.
- Taupik, dkk. *Analisis Kadar Rhodamin B Pada Blush-On Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Indonesian Journal Of Pharmaceutical Education (E-Journal). 2021.
- Ulya, dkk. *Pengaruh Penambahan Natrium Benzoat Dan Suhu Penyimpanan Terhadap Mutu Minuman Herbal Cabe Jamu Cair*. Journal Of Science And Technology. 2020.
- Wachyuni, S. S. (2019). Inovasi Pembuatan Jelly Dari Bahan Lidah Buaya Dengan Penambahan Lemon. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 4(3), 20–29. <https://journal.polteksahid.ac.id/index.php/jstp/article/view/126>
- Wahyuni, dkk. *Pengembangan Dan Validasi Metode Analisis Spektrofotometri Uv-Vis Derivatif Untuk Deteksi Kombinasi Hidrokortison Asetat Dan Nipagin Pada Sediaan Krim*. Sainsbertek Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi Vol. 3 No. 1-Farmasi. 2022.
- Wahyuningsih, dkk. *Analisis Kandungan Zat Pengawet Natrium Benzoat Pada Sambal Tradisional Khas Bima “Mbohi Dunga” Sambal Jeruk Yang Difermentasi*. Sebatik Vol. 25 No. 2. 2021.
- Widjaja, dkk. *Karakteristik Minuman Jeli Ikan Lele (Clarias Sp.) Yang Dipengaruhi Oleh Pemanis Dan Karagenan*. Pasundan Food Technology Journal, Volume 6, No.1. 2019.
- Wintirani, G. (2016). Optimalisasi Bahan Baku Dan Penunjang Terhadap Karakteristik Serbuk Jelly Buah Naga (Hylocereus Costaricensis) Dengan Progm D-Expert. *Teknologi Pangan*, [http://repository.unpas.ac.id/12016/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/12016/3/BAB I.pdf](http://repository.unpas.ac.id/12016/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/12016/3/BAB%20I.pdf)

## LAMPIRAN


**Lampiran 1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel**  
Dusun Tombolo, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto

## Lampiran 2. Skema Kerja Penelitian


### 1. Ekstraksi natrium benzoat



## 2. Pembuatan larutan baku induk natrium benzoat 100 ppm



## 3. Pembuatan kurva standar



## 4. Perhitungan larutan induk

$$1 \text{ ppm} = \frac{\text{g}}{\text{ml}} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$1 \text{ ppm} = \frac{100 \text{ mg}}{1.00 \text{ ml}} = \frac{1 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = \frac{1 \text{ mg}}{1 \text{ L}}$$

$$1 \text{ ppm} = 0,01 \text{ mg/ml}$$

$$100 \text{ ppm} = x$$

$$\frac{1 \text{ ppm}}{100 \text{ ml}} = \frac{0,01 \text{ mg/ml}}{x}$$

$$x = 100 \times 0,01 \text{ mg/ml}$$

$$x = 1 \text{ mg/ml}$$

Jadi 1 mg natrium benzoat dalam 1 ml aquadest

$$100 \text{ ppm} = 1 \text{ mg dalam } 1 \text{ ml}$$

$$= 100 \text{ ml} = 100 \text{ mg}$$

$$100 \text{ ppm} = 100 \text{ ml}$$

Jadi larutan induk yang ditimbang itu sebanyak 100 mg natrium benzoat dan ditambahkan aquadest sebanyak 100 ml.

### 5. Perhitungan pengenceran

Adapun kadar baku standar yaitu 2,4, 2,6, 2,8, 3 dan 3,2 ppm

Rumus :

$$V1.N1 = V2.N2$$

a. 2,4 ppm

$$V1.N1 = V2.N2$$

$$V1. 100 \text{ ppm} = 50 \text{ ml} . 2,4 \text{ ppm}$$

$$V1 = \frac{50 \text{ ml} . 2,4 \text{ ppm}}{100 \text{ ppm}}$$

$$= 1,2 \text{ ml}$$

b. 2,6 ppm

$$V1.N1 = V2.N2$$

$$V1. 100 \text{ ppm} = 50 \text{ ml} . 2,6 \text{ ppm}$$

$$V1 = \frac{50 \text{ ml} . 2,6 \text{ ppm}}{100 \text{ ppm}}$$

$$= 1,3 \text{ ml}$$

c. 2,8 ppm

$$V1.N1 = V2.N2$$

$$V1. 100 \text{ ppm} = 50 \text{ ml} . 2,8 \text{ ppm}$$

$$V1 = \frac{50 \text{ ml} . 2,8 \text{ ppm}}{100 \text{ ppm}}$$

$$= 1,4 \text{ ml}$$

d. 3 ppm

$$V1.N1 = V2.N2$$

$$V1. 100 \text{ ppm} = 50 \text{ ml} . 3 \text{ ppm}$$

$$V1 = \frac{50 \text{ ml} . 3 \text{ ppm}}{100 \text{ ppm}}$$
$$= 1,5 \text{ ml}$$

e. 3,2 ppm

$$V1.N1 = V2.N2$$

$$V1. 100 \text{ ppm} = 50 \text{ ml} . 3,2 \text{ ppm}$$

$$V1 = \frac{50 \text{ ml} . 3,2 \text{ ppm}}{100 \text{ ppm}}$$
$$= 1,6 \text{ ml}$$

### Lampiran 3. Perhitungan Kadar Natrium Benzoat

#### 1. Sampel 1

Berat sampel yang ditimbang A	= 10 mg
Serapan (y) 1	= 0.2998
(y) 2	= 0.2994
(y) 3	= 0.2996
Rata-rata serapan	$y = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$ $= \frac{0.2998+0.2994+0.2996}{3} = 0.2996$
Persamaan regresi	$y = 0.1236 + 0.0488x$
Kadar natrium benzoat	$(x) 0.2996 = 0.1236 + 0.0488x$ $x = \frac{0.2996 - 0.0488}{0.1236}$ $x = 2.0291 \mu\text{L/ml}$ $K = \frac{x \cdot v}{B_s} \times f_p$ $K = \frac{2.0291 \mu\text{g/ml} \cdot 10 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 10/10$ $K = 2.0291 \text{ mg/g}$
Kadar natrium benzoat	$= \text{kadar as. benzoat} \times \frac{BM \text{ Na. benzoat}}{BM \text{ As. benzoat}}$ $= 2.0291 \times \frac{144,11}{122,12}$ $= 2.0291 \times 1,18$ $= 2.3943 \text{ mg/L}$

#### 2. Sampel 2

Berat sampel yang ditimbang A	= 10 mg
Serapan (y) 1	= 0.1426
(y) 2	= 0.1420
(y) 3	= 0.1416
Rata-rata serapan	$y = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$

$$= \frac{0.1426+0.1420+0.1416}{3} = 0.1420$$

Persamaan regresi  $y = 0.1236 + 0.0488x$

Kadar natrium benzoat (x)  $0.1420 = 0.1236 + 0.0488x$

$$x = \frac{0.1420 - 0.0488}{0.1236}$$

$$x = 0.7540 \mu\text{L/ml}$$

$$K = \frac{x \cdot v}{B_s} \times f_p$$

$$K = \frac{0.7540 \mu\text{g/ml} \cdot 10 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 10/10$$

$$K = 0.754 \text{ mg/g}$$

Kadar natrium benzoat = kadar as.benzoat x

$$\frac{BM Na.benzoat}{BM As.benzoat}$$

$$= 0.754 \times \frac{144,11}{122,12}$$

$$= 0.754 \times 1,18$$

$$= 0.8897 \text{ mg/L}$$

### 3. Sampel 3

Berat sampel yang ditimbang A = 10 mg

Serapan (y) 1 = 0.1841

(y) 2 = 0.1839

(y) 3 = 0.1843

Rata-rata serapan  $y = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$

$$= \frac{0.1841+0.1839+0.1843}{3} =$$

0.1841

Persamaan regresi  $y = 0.1236 + 0.0488x$

Kadar natrium benzoat (x)  $0.1841 = 0.1236 + 0.0488x$

$$x = \frac{0.1841 - 0.0488}{0.1236}$$

$$x = 1.0946 \mu\text{L/ml}$$

$$K = \frac{x.v}{Bs} \times fp$$

$$K = \frac{1.0946 \mu\text{g/ml} \cdot 10 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 10/10$$

$$K = 1.0946 \text{ mg/g}$$

Kadar natrium benzoat

$$\frac{BM \text{ Na.benzoat}}{BM \text{ As.benzoat}}$$

$$= \text{kadar as.benzoat} \times$$

$$= 1.0946 \times \frac{144,11}{122,12}$$

$$= 1.0946 \times 1,18$$

$$= 1.2916 \text{ mg/L}$$

#### 4. Sampel 4

Berat sampel yang ditimbang A = 10 mg

Serapan (y) 1 = 0.1919

(y) 2 = 0.1918

(y) 3 = 0.1921

Rata-rata serapan

$$y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

$$= \frac{0.1919 + 0.1918 + 0.1921}{3} =$$

0.1919

Persamaan regresi  $y = 0.1236 + 0.0488x$

Kadar natrium benzoat (x) 0.1919 = 0.1236 + 0.0488x

$$x = \frac{0.1919 - 0.0488}{0.1236}$$

$$x = 1.1577 \mu\text{L/ml}$$

$$K = \frac{x.v}{Bs} \times fp$$

$$K = \frac{1.1577 \mu\text{g/ml} \cdot 10 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 10/10$$

$$K = 1.1577 \text{ mg/g}$$

Kadar natrium benzoat = kadar as.benzoat x

$$\frac{BM \text{ Na.benzoat}}{BM \text{ As.benzoat}}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1.1577 \times \frac{144,11}{122,12} \\
 &= 1.1577 \times 1,18 \\
 &= 1.3660 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

### 5. Sampel 5

Berat sampel yang ditimbang A	= 10 mg
Serapan (y) 1	= 0.1511
(y) 2	= 0.1509
(y) 3	= 0.1507
Rata-rata serapan	$y = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$ $= \frac{0.1511+0.1509+0.1507}{3} =$
0.1509	
Persamaan regresi	$y = 0.1236 + 0.0488x$
Kadar natrium benzoat	$(x) 0.1509 = 0.1236 + 0.0488x$ $x = \frac{0.1509 - 0.0488}{0.1236}$ $x = 0.8260 \text{ } \mu\text{L/ml}$ $K = \frac{x.v}{B_s} \times fp$ $K = \frac{0.8260 \mu\text{g/ml} \cdot 10 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 10/10$ $K = 0.836 \text{ mg/g}$
Kadar natrium benzoat	= kadar as.benzoat x
$\frac{BM Na.benzoat}{BM As.benzoat}$	$= 0.826 \times \frac{144,11}{122,12}$ $= 0.826 \times 1,18$ $= 0.9746 \text{ mg/L}$

**Lampiran 4. Gambar sampel jajanan jelly**



**Gambar 11. Sampel jelly**

**Lampiran 5. Gambar alat Spektrofotometri UV-Vis**




**Gambar 12.** Spektrofotometri UV-Vis

**Lampiran 6. Gambar hasil ekstraksi sampel jajanan jelly**



**Gambar 13. Hasil Ekstraksi Sampel**

**Lampiran 7. Gambar larutan sampel jajanan jelly**




**Gambar 14. Larutan sampel jelly**

**Lampiran 8. Gambar larutan standar natrium benzoat**



**Gambar 15. Larutan standar natrium benzoat**

**Lampiran 8. Gambar penentuan panjang gelombang maksimum**

Wavelength (nm)	Abs
282.0	3.057
276.9	3.163
273.0	3.589
270.0	3.280
267.0	3.234
261.0	3.780
254.0	3.652
250.0	3.887
248.0	3.928
240.0	3.188
237.9	3.200
235.0	3.269
232.9	3.263
229.0	4.021
227.0	4.147
220.0	3.795
218.0	3.623
215.0	3.588
213.0	3.662
---	---

**Gambar 16.** Penentuan panjang gelombang maksimum

**Lampiran 9. Gambar pembacaan absorbansi larutan standar natrium benzoat**



**Gambar 17.** Pembacaan absorbansi larutan standar natrium benzoat

**Lampiran 10. Gambar pembacaan absorbansi natrium benzoat pada sampel**



**Gambar 18.** Pembacaan absorbansi natrium benzoat pada sampel

**Lampiran 11. Gambar hasil absorbansi larutan standar natrium benzoat**

**Calibration**

Collection time

10/31/2023 10:34:23 AM

Standard Concentration F Mean SD %RSD Readings  
 11/1/2023 9:49:15 AM Page 2 of 2

mg/L

Std	Concentration	F	Mean	SD	%RSD	Readings
Std 1						0.3489 0.3486
2.4	0.3487	0.0001	0.04	0.3486		
Std 2						0.3687 0.3685
2.6	0.3685	0.0002	0.07	0.3682		
Std 3						0.3930 0.3927
2.8	0.3929	0.0002	0.05	0.3930		
Std 4						0.4152 0.4150
3.0	0.4151	0.0001	0.03	0.4152		
Std 5						0.4491 0.4491 0.4489
			3.2	0.4490	0.0001	0.02
Calibration eqn	Abs = 0.12366*Conc +0.04860					
Correlation Coefficient	0.99035					
Calibration time	10/31/2023 10:43:33 AM					

**Gambar 19.** Hasil absorbansi larutan standar natrium benzoat

### Lampiran 12. Gambar hasil absorbansi natrium benzoat pada sampel

#### Analysis

Collection time 10/31/2023 10:43:33 AM

Sample mg/L	Concentration	F	Mean	SD	%RSD	Readings
Sample 1						0.2998 0.2994
2.0	0.2996	0.0002	0.05	0.2996		
Sample 2						0.1426 0.1420
0.8	0.1420	0.0005	0.36	0.1416		
Sample 3						0.1842 0.1839
1.1	0.1841	0.0002	0.12	0.1843		
Sample 4						0.1918 0.1918
1.2	0.1919	0.0002	0.08	0.1921		
Sample 5						0.1511 0.1509 0.1507
			0.8	0.1509	0.0002	0.15

#### Results Flags Legend

U = Uncalibrated

O = Overage

N = Not used in calibration

R = Repeat reading

**Gambar 20.** Hasil absorbansi natrium benzoat pada sampel

Lampiran 13. Batas maksimum penggunaan BTP pengawet  
**BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PENGAWET**

(PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BATAS  
 MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN  
 PENGAWET)

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam sorbat
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin ( <i>plain</i> )	1000
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	200
01.6.4	Keju olahan	3000
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	1000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	1000
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	1000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2000
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	1000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	1000
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	500
04.1.1	Buah segar	375
04.1.2.1	Buah beku	375
04.1.2.2	Buah kering	500
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	500
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	1000
04.1.2.7	Buah bergula	500
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1000
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	1000
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	1000
04.1.2.12	Buah yang dimasak	1000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	500
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	1000
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	1000

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam sorbat
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	1000
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	1000
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	1000
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	1000
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	1000
05.3	Kembang gula karet / permen karet	1000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	1000
06.2	Tepung dan pati	1000
06.4.1	Pasta dan mi mentah serta produk sejenisnya	1000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	1000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	1000
06.7	Kue beras	1000
07.0	Produk bakeri	1000
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh atau potongan	1000
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	1000
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	1000
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	1000

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam asetat
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari ( <i>juice</i> ) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	1000
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	1000
09.2.4.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata rebus atau kukus	1000
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	1000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup maple, gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup maple), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1000
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	1000
12.5	Sup dan kaldu	1000
12.6	Saus dan produk sejenis	1000
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	1000
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	1000
12.10	Produk protein	1000
13.6	Suplemen pangan	1000 kecuali suplemen yang bentuk dan jenisnya sesuai dengan kategori pangan lain
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	1000
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	1000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	1000
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	1000

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam benzoat
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	200
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	1000
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	1000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	1000
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	1000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	1000
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	200
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	1000
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1000
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	200
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	500
04.1.2.12	Buah yang dimasak	350
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	500
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut	500

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam benzoat
	dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	500
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	500
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	500
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	500
05.3	Kembang gula karet / permen karet	500
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	500
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	500
09.3.2	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diolah menjadi pikel dan atau direndam dalam larutan garam	1000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	1000 (Tidak termasuk yang dikalengkan)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula	600

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam benzoat
	untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
12.2.2	Bumbu dan kondimen	600
12.5	Sup dan kaldu	500
12.6	Saus dan produk sejenis	1000
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	1000
12.9.2.2	Saus kedelai non-fermentasi	600
12.9.3.2	Saus kedelai lainnya	1000
13.6	Suplemen pangan	600 (kecuali suplemen yang bentuk dan jenisnya sesuai dengan kategori pangan lain)
14.1.2.1	Sari buah	600
14.1.2.2	Sari sayur	600
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	600
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	1000
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	600
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	400 mg/kg (kecuali minuman cair yang memerlukan pengenceran sebelum penyajian 900 mg/kg)
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk punches dan ades	400 mg/kg (kecuali minuman cair yang memerlukan pengenceran sebelum)

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai residu SO <sub>2</sub>
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	30
04.1.2.2	Buah kering	100
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	100
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	50
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	100
04.1.2.7	Buah bergula	100
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	100
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	100
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastrri	50
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	50
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	100
4.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	100
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	300
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	200
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	100
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	200
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	100
06.2	Tepung dan pati	70

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai residu SO <sub>2</sub>
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	20
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard, vla</i> )	50
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	200 (tidak termasuk yang dikalengkan)
11.1.2	Tepung gula, tepung dekstrosa	15
11.1.3	Gula putih lunak ( <i>soft white sugar</i> ), gula merah lunak ( <i>soft brown sugar</i> ), sirup glukosa, sirup glukosa kering ( <i>dried glucose syrup</i> ), gula pasir mentah	20
11.1.5	Gula kristal putih	15
11.2	Gula merah, tidak termasuk dalam kategori pangan 11.1.3	40
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal <i>xilosa</i> , sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	40
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	200
12.3	Cuka makan	100
12.4	<i>Mustard</i>	250 (kecuali penggunaan untuk <i>mustard</i> dijon 500 mg/kg)
12.6	Saus dan produk sejenis	300
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	300
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	50
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	50
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	50
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	50
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	50

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	2500
01.6.4	Keju olahan	2000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2000
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	1000
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	2000
07.0	Produk bakeri	2000
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i> )	2000
14.1.2	Sari buah dan sari sayuran	2000

## RIWAYAT HIDUP



**Rahma Yuniar**, lahir di Jeneponto tepatnya di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 03 September 2002. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan suami istri Rahman dan Maryuni, juga mempunyai dua orang adik laki-laki yaitu Rahmat Rivaldi dan Rahmat Anugerah. Penulis memulai memasuki pendidikan formal pada tahun 2008 di SD Negeri 53 Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dan tamat SD pada tahun 2013. Pada tahun yang sama kemudian lanjut pendidikan di SMP Negeri 2 Bontoramba selama 3 tahun dan mendapat ijazah tamat SMP pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Jeneponto pada tahun 2016 dan menamatkan diri pada tahun 2019. Karena kemauan dan mendapat dukungan dari orang tua, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi. Semoga kelak bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua dan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R