

ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN EPILEPSI PADA ANAK DI RUMAH SAKIT

PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

TAHUN 2023



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

WA ODE NUR ANISAH HAMZAH

NIM : 70600120035

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa ode Nur Anisah Hamzah
NIM : 70600120035
Tempat/Tgl Lahir : Kendari, 09 Februari 2002
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Villa Harmony Minasa Upa.
Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Epilepsi Pada Anak Di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2023.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Februari 2024

Penyusun


Wa Ode Nur Anisah Hamzah


NIM: 70600120035

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Wa ode Nur Anisah Hamzah , NIM 70600120035, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: “Analisi Faktor Risiko Kejadian Epilepsi Pada Anak Di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2023”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 16 Februari 2024

Pembimbing 1



dr. Raully Ramadhani, M.Kes., Sp.N

Pembimbing 2



dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisi Faktor Risiko Kejadian Epilepsi Pada Anak Di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2023" yang disusun oleh Wa ode Nur Anisa Hamzah, NIM 70600120035, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Februari 2024, bertepatan dengan 6 Sha'ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 16 Februari 2024

6 Sha'ban 1445 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed	(.....)
Pembimbing I	: dr. Raully Ramadhani, M. Kes., Sp. N	(.....)
Pembimbing II	: dr. Henny Fauziah, M. Kes., Sp. PK	(.....)
Penguji I	: dr. Destya Maulani, M. Kes., Sp. A	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Abd Rahman R, M. Ag	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian “**Analisis Faktor Risiko Kejadian Epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Tahun 2023**”. Shalawat dan salam juga talupa saya panjatkan kepada Rasulullah SAW yang membuat kita merasakan nikmatnya Islam dan ilmu pengetahuan pada zaman ini.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dukungan baik secara moril maupun materil, karena penulis sadar proposal penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut. Terima kasih kepada keluarga penulis terkhususnya orang tua penulis H.Akalim Hamzah, S.pd.,M.H dan Hj.Sufiani,S.P. Ucapan terima kasih lainnya ditujukan kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor beserta dengan jajarannya yang senantiasa memfasilitasi dan mendukung seluruh kegiatan Prodi Pendidikan Dokter.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M. Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh ilmu di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. dr. Raulya Ramadhani, Sp. N, M. Kes dan dr. Henny Fauziah, M. Kes., Sp.PK selaku Dosen pembimbing penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis.
 5. dr. Destya Maulani, M. Kes., Sp. A dan Prof. Dr. Abd Rahman R, M. Ag selaku dosen penguji penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi saran dan kritikan kepada penulis.
 6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
 7. Terimakasih kepada kedua orangtua saya yang tidak berhenti menyemangati, mendukung dan mendoakan secara penuh dalam banyak hal yang sudah saya lewati selama ini.
 8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bias saya ucapkan satu persatu
- Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Makassar, 16 Februari 2024

Penyusun

Wa Ode Nur Anisah Hamzah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	i
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan penelitian.....	12
G. Manfaat penelitian.....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Epilepsi.....	15
1. Definisi	15
2. Klasifikasi.....	15
3. Epidemiologi.....	17

4. Patogenesis	18
5. Gejala dan Tanda klinis	19
6. Diagnosis.....	22
7. Tatalaksana.....	27
8. Prognosis	30
9. Faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian epilepsi pada Anak	30
B. Integrasi keislaman.....	34
C. Kerangka teori	37
D. Kerangka konsep.....	38
BAB III	39
METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Desain penelitian	39
B. Waktu dan tempat penelitian	39
C. Variabel Penelitian.....	39
D. Populasi dan sampel penelitian.....	40
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	40
F. Instrumen penelitian.....	42
G. Teknik pengolahan dan Analisis Data	42
H. Analisis Data	43
I. Alur Penelitian	44
J. Penyajian Data	44
K. Etika Penelitian.....	44
BAB IV.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46

A. Hasil Penelitian.....	46
1. Analisis Univariat.....	46
2. Analisis Bivariat.....	47
1) Riwayat kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak ..	48
2) Riwayat prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.....	49
3) Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.....	50
4) Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak...	51
5) Riwayat keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak	52
3. Analisis Multivariat	53
B. Pembahasan.....	54
1. Riwayat kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak .	54
2. Riwayat kelahiran prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak	55
3. Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.....	57
4. Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak .	58
5. Riwayat keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak	59
C. Keterbatas peneliti.....	60
D. Kelebihan peneliti	60
BAB V	61
SARAN DAN KESIMPULAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
1) Bagi Masyarakat.....	62
2) Bagi Tenaga Kesehatan.....	62
3) Bagi Peneliti Selanjutnya	62

LAMPIRAN.....	67
<i>A. Master Tabel</i>	67
<i>B. Etik.....</i>	75
<i>C. Balitbangda.....</i>	76
<i>D. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....</i>	77
<i>E. Dokumentasi.....</i>	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 4.1 Analisis Univariat Faktor Risiko Kejadian Epilepsi Pada anak.	46
Tabel 4.2 Kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak	48
Tabel 4.3 Riwayat prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak...	49
Tabel 4.4 Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.....	50
Tabel 4.5 Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak	51
Tabel 4.6 Riwayat Keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak	52
Tabel 4.7 Hasil uji regresi logistik.....	53

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka teori.....	37
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	38
Bagan 3.1 Alur Penelitian	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah individu yang bertumbuh dan berkembang. Proses tumbuh kembang tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya yaitu apabila ada Gangguan atau penyakit kronik hal ini dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, serta dapat mengurangi potensi anak kedepannya. Epilepsi merupakan salah satu penyakit kronik dengan angka kejadian tinggi seperti di negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh sistem pelayanan kesehatan belum cukup mampu untuk memerangi penyebab epilepsi seperti gangguan selama proses kehamilan dan kelahiran serta penyakit infeksi (Kementrian kesehatan RI, 2017).

Epilepsi berasal dari kata Yunani yaitu *epilapsia* yang berarti serangan. Epilepsi merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya bangkitan yang terjadi secara berulang akibat terganggunya fungsi otak yang disebabkan oleh muatan listrik yang abnormal pada neuron-neuron otak. (Khairin, 2020), Kejang pada epilepsi merupakan kejadian sementara sebagai akibat dari aktivitas neuron yang berlebihan dan sinkron yang abnormal dalam otak (Faradilah, 2022).

Epileptogenesis adalah proses perubahan otak non-epilepsi menjadi otak yang mampu menghasilkan kejang spontan dan berulang. Proses ini dikonseptualisasikan sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara

aktivitas rangsang dan penghambatan dalam jaringan saraf, sehingga menjadi mungkin berfungsi secara berlebihan, hipersinkron, yang bila dipertahankan, mengganggu pemrosesan saraf normal dan mampu mengganggu jaringan saraf lainnya. Untuk epilepsi umum, jaringan epileptogenik terdistribusi secara luas, melibatkan struktur talamokortikal secara bilateral. Untuk epilepsi fokal, jaringan melibatkan sirkuit saraf di satu belahan, umumnya limbik atau neokortikal (Anderson, 2020).

Epilepsi merupakan salah satu masalah kesehatan global dimana kesehatan lebih dari 50 juta orang diseluruh dunia dengan Insidens Epilepsi di negara berkembang 100 per 100.000 ribu penduduk, sedangkan di negara maju berkisar 50 per 100.000 ,Epilepsi juga menempati urutan kelima di antara semua penyebab neurologis untuk tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas dan secara tidak proporsional mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (world health organization, 2016).

Epilepsi juga adalah salah satu penyakit yang sering dijumpai, dimana sekitar 50 juta orang di dunia menderita epilepsi. Setiap tahunnya muncul penderita baru sebanyak 40-190 per 100.000 individu, dengan insiden yang lebih tinggi pada negara-negara miskin. Epilepsi pada anak menyerang sekitar 4-7 per 1,000 populasi pada kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia dilaporkan terdapat 250.000 kasus epilepsi (Khairin, 2020).

Tingginya angka epilepsi dan banyaknya faktor risiko yang berhubungan dengan epilepsi serta dampak yang di timbulkan oleh penyakit tersebut dimana di Indonesia juga masih ditemukan adanya kesalah pahaman, diskriminasi, serta masih adanya stigma sosial yang negatif terhadap penderita epilepsi, hal ini tidak hanya berdampak pada psikologi anak penderitanya epilepsi tapi juga menyebabkan seorang anak menjadi antisosial serta berdampak pada prestasi anak yang akan semakin menurun karena epilepsi yang ia derita selain itu, hal ini juga di bahas pada penelitian yang dilakukan Putu Dewinadya Saraswati *et.all* (2022) dimana dari hasil penelitian tersebut mayoritas penyandang epilepsi adalah anak-anak yakni pada kelompok umur 0-17 dan juga karena banyaknya faktor yang dapat menyebabkan epilepsi yang dimana Faktor prenatal dan perinatal saling berkaitan dalam timbulnya gangguan pada janin atau bayi (Hasibuan,2020.) dalam beberapa penelitian terkait epilepsi tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berperan dalam kejadian epilepsi khususnya epilepsi pada anak, maka penting untuk melakukan penelitian dengan judul analisis faktor resiko yang mempengaruhi kejadian epilepsi pada pasien Anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian Epilepsi pada Anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023 ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak ada hubungan antara kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.
- b. Tidak ada hubungan antara riwayat kelahiran prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.
- c. Tidak ada hubungan antara riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.
- d. Tidak ada hubungan antara Trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.
- e. Tidak ada hubungan antara riwayat keluarga dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Ada hubungan antara riwayat kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.
- b. Ada hubungan antara riwayat kelahiran prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.
- c. Ada hubungan antara riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.
- d. Ada hubungan antara Trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.
- e. Ada hubungan antara riwayat keluarga dengan risiko kejadian epilepsi pada anak.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi operasional

No.	Variabel	Definisi Oprasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Riwayat Kejang Demam	Kejang demam adalah kejang yang disertai demam (suhu 100,4°F atau 38°C dengan metode pengukuran suhu apapun), tanpa infeksi sistem saraf pusat.	Rekam Medis	➤ Parameter Demam Anak 1. Ada kejang demam. 2. Tidak kejang demam.	Ordinal
2.	Riwayat Kelahiran Prematur	Persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi sebelum usia gestasi 37 minggu, yang dibagi menjadi <i>extremely preterm</i> , <i>verypreterm</i> dan <i>late preterm</i> .	Rekam Medis	➤ Parameter Usia Kehamilan 1. Lahir prematur. 2. Tidak lahir prematur.	Ordinal

3.	Riwayat Asfiksia	Asfiksia adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, Asfiksia perinatal adalah kondisi bayi yang ditandai dengan hipoksia dan hipercapnia disertai asidosis metabolik.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Parameter 1. Terjadi asfiksia 2. Tidak pernah mengalami asfiksia. 	Ordinal
4.	Riwayat trauma kepala	Trauma kepala merupakan salah satu penyebab terjadinya kecacatan dan kematian yang penting dalam bidang neurologi dan menjadi masalah kesehatan bagi penderitanya.	Rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Parameter Trauma 1. Adanya trauma kepala. 2. Tidak Ada trauma kepala. 	Ordinal
5.	Riwayat Keluarga Epilepsi	Salah satu patofisiologi epilepsi dapat disebabkan oleh adanya mutasi genetik	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Parameter 1. Memiliki riwayat keluarga epilepsi. 2. Tidak memiliki keluarga dengan epilepsi. 	Ordinal
Variabel Dependen					

1.	Kejadian Epilepsi pada anak	Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Parameter kejadian epilepsi 1. Epilepsi pada anak usia 0-18 tahun. 2. Tidak pernah terjadi epilepsi pada anak usia 0-18 tahun. 	Ordinal
----	-----------------------------	---	-------------	--	---------

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan riwayat Kejang demam, riwayat kelahiran prematur, riwayat asfiksia, trauma kepala dan riwayat keluarga terhadap risiko kejadian Epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023. Instrumen penelitian ini adalah rekam medis pasien yang merupakan data sekunder.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil
1.	(paramita riski setianingsih, 2012)	Faktor-faktor terjadinya epilepsi pada anak di RSUD Dr.Moewardi	Case-control	86 Sampel	Faktor risiko yang hasilnya signifikan yaitu riwayat herediter, kejang demam,dan trauma kepala .

2.	(Khairin, 2020)	Karakteristik Penderita Epilepsi di Bangsal Anak RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2018.	Cross Sectional	65 Sampel	pada penderita epilepsi di bangsal anak RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2018 usia paling banyak pada usia 0-5 tahun paling banyak adalah laki-laki, paling banyak yaitu tidak memiliki riwayat epilepsi keluarga, pada pasien di dapatkan lebih banyak pada
----	-----------------	--	-----------------	-----------	---

					gambaran EEG gelombang tajam dan paku.
3.	(Gusta, 2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kejadian Epilepsi Intraktabel Anak Di Rsup Dr Kariadi Semarang.	Cross Sectional	38 Sampel	Ada hubungan abnoemalitas neurologi dengan kejadian epilepsi pada anak.
4.	(Budiman, 2022)	Pengaruh Riwayat Kejang Demam terhadap Kejadian Epilepsi pada Anak.	Studi Literatur	10 Literatur	Riwayat kejang demam merupakan faktor risiko terbanyak untuk berkembang menjadi epilepsi

					pada anak di kemudian hari.
5.	(Symonds, 2019)	Incidence and phenotypes of childhood-onset genetic epilepsies: a prospective population-based national cohort.	Studi kohort Epidemiologi	343 Sampel	Banyak kasus yang diidentifikasi dalam penelitian ini merupakan epilepsi genetik dominan akibat mutasi de novo.

F. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui hubungan faktor risiko yang mempengaruhi kejadian Epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023.

2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi distribusi frekuensi kejadian epilepsi berdasarkan usia pada anak yang berobat di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023.
- b. Mengetahui hubungan Kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023.
- c. Mengetahui hubungan riwayat kelahiran prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023.
- d. Mengetahui hubungan Asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023.
- e. Mengetahui hubungan riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak yang berobat di di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023.
- f. Mengetahui hubungan riwayat keluarga mengalami epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak yang berobat di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023.
- g. Mengetahui Variabel independen yang paling dominan berpengaruh dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin makassar tahun 2023.

G. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan selama studi khususnya mengenai faktor yang meningkatkan / menurunkan risiko kejadian Epilepsi pada Anak.

2. Bagi pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah wawasan dan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan epilepsi pada anak.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat mengenai faktor risiko yang berhubungan dengan epilepsi pada anak.

4. Bagi instansi

a. Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan faktor risiko yang diteliti dengan kejadian Epilepsi pada anak.

b. Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Epilepsi

1. Definisi

Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang banyak terjadi pada anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal (Gusta, 2019).

Epilepsi merupakan manifestasi dari disfungsi otak, Ada banyak penyebab yang berbeda dengan gejala khasnya adalah kejang berulang akibat terlalu banyak pelepasan muatan listrik oleh sel-sel saraf di otak dan Kejang paroksismal. Ada dua jenis epilepsi: epilepsi fokal kejang (parsial) dan kejang umum Kejang fokal terjadi karena lesi di bagian dari korteks serebral dimana kelainan ini mungkin menyertai mungkin menyertai hilangnya kesadaran parsial. Sedangkan pada kejang umum, kerusakan lesi mencakup sebagian besar korteks serebral dan kedua *hemisfer cerebri*. Termasuk kejang mioklonik, tonik, dan klonik termasuk dalam epilepsi umum (Budiman, 2022).

2. Klasifikasi

a. *International League Against Epilepsy* (ILAE) membagi kejang menjadi kejang umum dan kejang parsial seperti yang terdapat pada definisi sebagai berikut:

1) Kejang umum

Suatu serangan kejang dikatakan kejang umum bila disertai dengan gelombang *epileptiform* umum. Pada kejang umum terjadi hilang kesadaran yang dapat merupakan gejala awal manifestasi

kejang. Gejala motorik yang tampak bersifat bilateral. Beberapa tipe kejang umum ditandai gejala dan gerakan motorik yang terlihat; tonik, klonik, tonik-klonik, mioklonik, atau atonik (Kementerian kesehatan republik indonesia, 2017).

2) Kejang parsial (fokal)

Kejang parsial atau kejang fokal bermula dari struktur kortikal atau subkortikal dari satu hemisfer, namun dapat menyebar ke area lain, baik ipsilateral maupun kontralateral. Kejang parsial dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kejang parsial sederhana, kejang parsial kompleks, dan kejang parsial menjadi umum. Kejang parsial sederhana adalah kejang fokal tanpa disertai gangguan kesadaran dan kejang parsial kompleks adalah kejang fokal disertai hilang atau perubahan kesadaran.

gejala awal kejang dan/atau gambaran EEG menunjukkan aktivasi pada neuron terbatas pada satu hemisfer saja (Kementerian kesehatan republik indonesia, 2017).

Berikut Klasifikasi kejang :

1) Kejang umum

- a. Tonik
- b. Klonik
- c. Tonik – klonik
- d. Absans

1. Tipika absans
2. Atipika absans

- e. Mioklonik
- f. Atonik

2) Kejang parsial

- a. Kejang parsial sederhana (tanpa gangguan kesadaran)
- b. Kejang parsia kompleks

1. Dengan gangguan kesadaran pada awal serangan
 2. Diawali parsial sederhana lalu di ikuti dengan gangguan kesadaran
- c. Kejang parsial menjadi umum
1. Parsial sederhana menjadi tonik klonik
 2. Parsial kompleks menjadi kejang tonik konik
- 3) Kejang yang belum dapat di klasifikasi.
(Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).

ILAE (1989) juga membagi epilepsi berdasarkan etiologi, dapat dibagi menjadi:

1. Epilepsi atau sindrom epilepsi idiopatik yaitu epilepsi tanpa adanya kelainan struktur otak dan tidak ditemukan defisit neurologi. Faktor genetik diduga berperan pada tipe ini dan biasanya khas mengenai usia tertentu (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).
2. Epilepsi atau sindrom epilepsi simtomatik yaitu epilepsi yang disebabkan satu atau lebih kelainan anatomi dan ditemukan defisit neurologi (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).
3. Epilepsi atau sindrom epilepsi kriptogenik yaitu epilepsi atau sindrom epilepsi yang diasumsikan simtomatik tetapi etiologi masih belum diketahui (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).

3. Epidemiologi

lebih dari 50 juta orang diseluruh dunia mengidap epilepsi dengan Insidens Epilepsi di negara berkembang 100 per 100.000 ribu penduduk, sedangkan di negara maju berkisar 50 per 100.000 dan 7-6 orang per setiap 1000 orang akan menderita epilepsi pada suatu saat dalam hidup mereka. Epilepsi menempati urutan kelima di antara semua penyebab neurologis

untuk tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas dan secara tidak proporsional mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (World Health Organization, 2016). Sedangkan dari data World Health Organization lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia menderita epilepsi. Setiap tahun, diperkirakan 2,4 juta orang baru didiagnosis menderita epilepsi (World Health Organization, 2016).

4. Patogenesis

Membran neuronal terdiri atas lipid dan protein (lipoprotein) di seluruh membran. Setiap neuron memiliki resting potensial (potensial istirahat) yaitu keadaan dimana sel memiliki muatan arus listrik atau terpolarisasi. Sel saraf yang sedang beristirahat, seperti sel lain dalam tubuh mempertahankan perubahan potensial listrik (voltase) pada membran sel antara bagian dalam sel dan cairan ekstraseluler di sekeliling sel. Voltase di dalam sel pada saat istirahat berkisar antara -50 milivolts (mV) sampai -80 mV terhadap voltase di luar, bergantung pada kondisi neuron dan ekstraseluler yang mengelilingi sel, perbedaan potensial tersebut terjadi karena terdapat perubahan arus positif dan negatif pada membran sel. Perubahan pada potensial membran terjadi karena perubahan pada perpindahan ion menembus membran. Perubahan pada perpindahan ion ditimbulkan oleh perubahan pada permeabilitas membran sebagai respon terhadap berbagai kejadian pemicu (Sherwood, 2013). Bergantung pada jenis sinyal listriknya, kejadian pemicu dapat berupa :

- 1) Perubahan muatan listrik di sekitar membran peka rangsang.
- 2) Interaksi suatu perantara kimiawi dengan reseptor permukaan tertentu di membran sel saraf.
- 3) Rangsangan, misalnya gelombang suara yang merangsang sel-sel saraf khusus di telinga.

- 4) Perubahan spontan potensial akibat ketidak seimbangan siklus bocor-pompa (Sherwood, 2013).

Kejang terjadi ketika neuron diaktifkan secara sinkron, hal ini disebabkan oleh depolarisasi sinkron dari sekelompok neuron di area otak yang tidak normal. Normalnya, neuron-neuron eksitatorik yang melepaskan muatan akan mengaktifkan interneuron penghambat, Kebanyakan sinapsis penghambatan menggunakan neurotransmitter GABA. Arus kalium yang bergantung pada tegangan dan bergantung pada kalsium juga diaktifkan pada neuron pelepasan untuk menekan rangsangan. Selain itu, adenosin yang dihasilkan dari adenosin trifosfat (ATP) yang dilepaskan menyembuhkan eksitasi selanjutnya menekan eksitasi neuron dengan mengikat reseptor adenosin yang ada pada neuron di dekatnya. Gangguan mekanisme penghambatan ini karena perubahan saluran ion, atau karena cedera pada neuron dan sinapsis penghambat, memungkinkan terjadinya pengembangan fokus kejang (Hammer.Gray D & J. McPhee Stephen, 2014).

5. Gejala dan Tanda klinis

a. Bangkitan Umum Tonik-klonik

Bangkitan ini secara etiologi dapat berupa idiopatik, kriptogenik, atau simtomatik. Tipe bangkitan ini dapat terjadi pada semua usia kecuali neonatus.

Manifestasi klinis:

- 1) Hilang kesadaran sejak awal bangkitan hingga akhir bangkitan, bangkitan tonik-klonik umum, dapat disertai gejala autonom seperti mengompol dan mulut berbusa (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).
- 2) Gambaran iktal: tiba-tiba mata melotot dan tertarik ke atas, seluruh tubuh kontraksi tonik, dapat disertai suara teriakan dan nyaring, selanjutnya

diikuti gerakan klonik berulang simetris di seluruh tubuh, lidah dapat tergigit dan mulut berbusa serta diikuti mengompol. Setelah ikthal, tubuh pasien menjadi hipotonus, pasien dapat tertidur dan terasa lemah (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).

Pada pemeriksaan *elektroensefalografi* (EEG) saat interiktal didapatkan aktivitas epileptiform umum berupa kompleks gelombang paku-ombak (*spike wave*) terutama pada saat tidur stadium non-REM (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).

b. Bangkitan Tonik

Bangkitan tonik ditandai oleh kontraksi seluruh otot yang berlangsung terus menerus, berlangsung selama 2-10 detik namun dapat hingga beberapa menit, di-sertai hilangnya kesadaran. Dapat disertai gejala autonom seperti apnea. Gambaran EEG interiktal menunjukkan irama cepat dan gelombang paku atau kompleks paku-ombak frekuensi lambat yang bersifat umum (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).

c. Bangkitan Klonik

Bangkitan ini ditandai oleh gerakan kontraksi klonik yang ritmik (1-5Hz) di seluruh tubuh disertai hilangnya kesadaran sejak awal bangkitan. Pada EEG ikthal didapatkan aktivitas *epileptiform* umum berupa gelombang paku, paku multipel, atau kombinasi gelombang irama cepat dan lambat (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).

d. Bangkitan Mioklonik

Mioklonik adalah gerakan kontraksi involunter mendadak dan berlangsung sangat singkat (*jerk*) tanpa disertai hilangnya kesadaran. Biasanya berlangsung 10-50 milidetik, durasi dapat mencapai lebih dari 100milidetik. Otot yang berkontraksi dapat tunggal atau multipel atau

berupa sekumpulan otot yang agonis dari berbagai topografi. Mioklonik dapat berlangsung fokal, segmental, multifokal, atau umum. Gambaran EEG berupa gelombang *polyspikes* yang bersifat umum dan singkat (Kementerian kesehatan republik indonesia, 2017).

e. Bangkitan Atonik

Bangkitan ditandai oleh hilangnya tonus otot secara mendadak. Bangkitan atonik dapat didahului oleh bangkitan mioklonik atau tonik. Bentuk bangkitan bisa berupa "jatuh" atau "kepala menunduk". Pemulihan *pascaiktal* cepat, sekitar 1-2 detik. Gambaran EEG dapat berupa gelombang paku (*spikes*) atau *polyspikes* yang bersifat umum dengan frekuensi 2-3Hz dan gelombang lambat (Kementerian kesehatan republik indonesia, 2017).

f. Bangkitan Absans Tipikal

Bangkitan absans (*petit mall*) berlangsung sangat singkat (dalam hitungan detik) dengan onset mendadak dan berhenti mendadak. Bentuk bangkitan berupa hilang kesadaran atau "pandangan kosong". Dapat pula disertai komponen motorik yang minimal (dapat berupa mioklonik, atonik, tonik, *automatisme*). Pada pemeriksaan EEG didapatkan aktifitas *epileptiform* umum berupa kompleks paku-ombak 3Hz (>2,5Hz) (Kementerian kesehatan republik indonesia, 2017).

g. Bangkitan Absans Atipikal

Bangkitan berupa gangguan kesadaran disertai perubahan tonus otot (hipotonia atau atonia), tonik, atau *automatisme*. Pasien dengan bangkitan absans atipikal sering mengalami kesulitan belajar akibat seringnya disertai terjadinya bangkitan tipe lain seperti atonik, tonik, dan mioklonik. Pada absans atipikal, onset dan berhentinya bangkitan tidak semendadak bangkitan absans tipikal, dan perubahan tonus otot lebih sering terjadi pada

bangkitan tipe absans atipikal. Pada EEG didapatkan gambaran kompleks pakuombak frekuensi lambat (1-2,5Hz atau <2,5Hz) yang iregular dan heterogen dan dapat bercampur dengan irama cepat (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).

h. **Bangkitan Fokal/ Parsial**

Bentuk bangkitan yang terjadi tergantung dari letak fokus epileptik di otak. Fokus epileptik berasal dari area tertentu yang kemudian mengalami propagasi dan menyebar ke bagian otak yang lain. Bentuk bangkitan dapat berupa gejala motorik, sensorik (kesemutan, baal), sensorik spesial (halusinasi visual, halusinasi auditorik), emosi (rasa takut, marah), autonom (kulit pucat, merinding, rasa mual). Bangkitan parsial sederhana yang diikuti dengan bangkitan parsial kompleks atau bangkitan umum sekunder disebut sebagai aura (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017).

6. Diagnosis

Menurut Hassan dan Atlas (2007) untuk menentukan apakah seseorang menderita bangkitan kejang atau epilepsi biasanya tidak sukar, asal dapat menyaksikan sendiri serangan tersebut atau dapat memperoleh anamnesis yang dapat di percaya .Tiap penderita harus diperiksa secara teliti dengan melakukan anamnesis,pemeriksaan fisik,pemeriksaan laboraturium yang dibutuhkan,antara lain:

a. **Anamnesis**

Mengenai bangkitan kejang yang timbul perlu diketahui mengenai pola serangan,keadaan sebelum,selama,sesudah serangan,lama serangan, frekuensi serangan, waktu serangan teriadi dan faktor-faktor atau keadaan yang dapat memprovokasi atau menimbulkan serangan. Perlu diusahakan agar diperoleh gambaran lengkap mengenai pola serangan, agar dapat

diketahui fokus serta klasifikasinya. Ditanyakan apakah ada gejala prodromal, aura, keadaan selama serangan (dimana atau bagaimana kejang mulai, bagaimana penjarannya) dan keadaan sesudah kejang (parese Todd, nyeri kepala, segera sadar, mengacau, kesadaran menurun) (Hassan dan Alats, 2007).

Ditanyakan pula lama (duration) masing-masing keadaan tersebut, waktu serangan (pagi, siang, malam, waktu mau tidur, sedang tidur, mau tidur, sedang bangun). Apakah ada rangsang tertentu yang dapat menimbulkan serangan, misalnya melihat televisi, bernafas dalam, lapar, letih, menstruasi, obat-obatan tertentu dan sebagainya (Hassan dan Alatas, 2007).

Riwayat keluarga : ditanyakan apakah ada anggota keluarga yang menderita kejang, penyakit saraf, dan penyakit lainnya. Hal ini misalnya perlu untuk mencari adanya faktor herediter (Hassan dan Atlas, 2007).

Riwayat masa lalu (*past history*) : ditanyakan mengenai keadaan ibu waktu hamil (riwayat kehamilan), misalnya penyakit yang dideritanya, perdarahan per-vaginam, obat yang dimakan. Secara teliti ditanyakan pula mengenai riwayat kelahiran penderita, apakah letak kepala, letak sungsang, mudah atau sukar, apakah digunakan cunam atau vakum ekstraksi atau seksio *caesar*, apakah terdapat perdarahan antepartum, ketuban pecah dini, asfiksia. Penyakit apa saja yang pernah diderita (trauma kepala, radang selaput otak atau radang otak, ikterus, reaksi terhadap imunisasi, kejang demam). Bagaimana perkembangan (*milestones*) kecakapan mental dan motorik (Hassan dan Alatas, 2007).

b. Pemeriksaan Fisik

Dalam pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan secara pediatrik dan neurologis. Bila perlu dikonsultasikan ke

Bagian Mata, THT Hematologi, Endokrinologi dan sebagainya (Hassan dan Alatas, 2007).

Diperiksa keadaan umum, tanda-tanda vital, kepala, jantung, paru, perut, hati dan limpa, anggota gerak dan sebagainya (Hassan dan Alatas, 2007). Pada pemeriksaan neurologis diperhatikan kesadaran, kecakapan, motorik dan mental, tingkah laku, berbagai gejala proses intrakranium, fundus okuli, penglihatan, pendengaran, saraf otak lain, sistem motorik (kelumpuhan, trofik, tonus, gerakan tidak terkendali, koordinasi, ataksia), sistem sensorik (parestesia, hipestesia, anastesia), refleks fisiologis dan patologis. Bila perlu dilakukan tap' subdural, pada anak dengan ubun ubun yang masih terbuka, untuk melihat adanya hematoma subdural atau efusi subdura dan pungsi lumbal untuk memperoleh cairan serebrospinalis (Hassan dan Alatas, 2007).

c. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan ini dilakukan seperti pemeriksaan darah dimana perlu dilakukan pemeriksaan darah tepi rutin, juga pemeriksaan lain sesuai dengan indikasi (misal kadar gula darah, elektrolit). Pemeriksaan serebrospinalis (bila perlu) untuk mengetahui tekanan, warna, kejernihan, berdarah, *xantokrom*, jumlah sel, hitung jenis sel, kadar protein, gula, NaCl dan pemeriksaan lain atas indikasi (Hassan dan Alatas, 2007).

d. Pemeriksaan Elektroensefalogram (EEG)

Electroencefalogram (EEG) adalah suatu tes untuk mendeteksi kelainan aktivitas elektrik otak (Campellone, 2006). Pemeriksaan EEG sangat berguna membantu penegakan diagnosis epilepsi, Walaupun EEG secara rutin dilakukan pada kejang tanpa provokasi pertama dan pada (dugaan) epilepsi, pemeriksaan ini bukanlah baku emas untuk menegakkan diagnosis epilepsi. Kelainan pada EEG dapat ditemukan pada

2-4% anak yang tidak pernah kejang; sebaliknya, EEG interiktal pertama dapat normal pada 55% anak dengan kejang pertama tanpa provokasi. Gambaran EEG saja tanpa memandang informasi klinis tidak dapat menyingkirkan maupun menegaskan diagnosis epilepsi. Pada EEG diperhatikan frekuensi dan amplitudo gelombang irama dasar, ada tidaknya asimetri, serta ada tidaknya aktivitas epileptiform yang dapat berupa gelombang paku, gelombang tajam, paku-ombak, tajam-ombak, paku multipel, burst-suppression, dan hipsaritmia. Diperhatikan juga lokalisasi aktivitas abnormal, bila ada. Peran EEG pada epilepsi adalah sebagai berikut:

- a. membantu menentukan tipe kejang
- b. menunjukkan lokalisasi fokus kejang bila ada
- c. membantu menentukan sindrom epilepsi
- d. pemantauan keberhasilan terapi
- e. membantu menentukan apakah terapi obat antiepilepsi dapat dihentikan.

Secara tersendiri, sensitivitas EEG untuk mendiagnosis epilepsi hanya 25-56%, sedangkan spesifisitasnya 78-98%. Jika digunakan bersama dengan temuan klinis pada anamnesis dan pemeriksaan neurologis, maka sensitivitasnya menjadi 98,3%. Beberapa hal yang dapat meningkatkan nilai diagnostik EEG adalah sebagai berikut:

- 1) Pengulangan EEG
- 2) Melakukan EEG pada saat tidur (sensitivitas 81%), terutama apabila dilakukan pengulangan siklus bangun-tidur (sensitivitas 92%)
- 3) Deprivasi tidur parsial meningkatkan angka deteksi aktivitas epileptiform pada EEG sebesar 10%
- 4) Hiperventilasi, terutama pada epilepsi absans
- 5) Stimulasi fotik

Kelainan EEG yang sering dijumpai pada penderita epilepsi disebut "*epileptiform discharge*" atau "*epileptiform activity*", misalnya *spike*, *sharp wave* dan '*paroxissmal slow activity*'. Kadang-kadang rekaman EEG dapat menentukan fokus serta jenis epilepsi, apakah fokal, multifokal, kortikal, subkortikal misalnya "*petit mal*" mempunyai gambaran '*3 cps spike and wave*' dan spasme infantil mempunyai gambaran hipsaritmia (Hassan dan Alatas, 2007). Pemeriksaan EEG harus dilakukan secara berkala. Perlu diingatkan bahwa kira-kira 8-12% dari penderita epilepsi mempunyai rekaman EEG normal (Kementrian kesehatan RI, 2017).

e. Pemeriksaan Psikologis dan Psikiatris

Tidak jarang anak yang menderita epilepsi mempunyai tingkat kecerdasan yang rendah (retardasi mental), gangguan tingkah laku (*behaviour disorders*), gangguan emosi, hiperaktif. Hal ini harus mendapat perhatian yang wajar, agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Hubungan antara penderita dengan orang tuanya juga perlu mendapat perhatian, yaitu apakah terdapat proteksi berlebihan, rejeksi atau '*overanxiety*'. Bila perlu dapat diminta bantuan dari psikolog atau psikiater (Hassan dan Alatas, 2007).

f. Pemeriksaan Radiologis

Pada foto tengkorak diperhatikan simetri tulang tengkorak, destruksi tulang, kalsifikasi intrakranium abnormal (yang disebabkan oleh tumor, hematoma menahun, tuberkulosis, toksoplasmosis, anomali vaskular, hemangioma), tanda peninggian tekanan intrakranial seperti pelebaran sutura, erosi sela tursika (Hassan dan Alatas, 2007).

Pneumoensefalografi dan ventrikulografi dilakukan atas indikasi tertentu, yaitu untuk melihat gambaran sistem ventrikel, sisterna, rongga

subaraknoid serta gambaran otal Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui adanya atrofi otak tumor serebri hidrosefalus, araknoiditis. Pada pneumoensefalografi udara (zat kontras) dimasukkan melalui pungsi lumbal dan pada ventrikulografi udara (zat kontras) dimasukkan melalui pungsi ventrikel atau burr hole'. Pada penderita dengan tekanan intrakranial meninggi dilakukan ventrikulografi, tetapi bila tidak meninggi dapat dilakukan pneumoensefalografi (Hassan dan Alatas, 2007).

Arteriografi (memasukkan kontras ke dalam pembuluh darah) dilakukan untuk melihat keadaan pembuluh darah di otak, apakah ada peranjakan (neoplasma, hematoma, abses), penyumbatan (trombosis), peregangan (hidrosefalus) atau anomali pembuluh darah (malforasi arteri-vena, hemangioma). Zat kontras dapat dimasukkan melalui suntikan di arteri karotis intema, arteri vertebralis, arteri brakialis atau arteri femoralis (dengan menggunakan kateter) (Hassan dan Alatas, 2007).

7. Tatalaksana

a. Medikamentosa

Titik berat tatalaksana epilepsi adalah pencegahan bangkitan berulang dan pencarian etiologi. Bangkitan epileptik dapat merupakan gejala dari suatu penyakit sistemik maupun akibat kelainan intrakranial. Bangkitan epileptik pertama yang terjadi pasca fase akut akibat penyakit yang mendasarinya, biasanya tidak memerlukan terapi jangka panjang. Sementara bangkitan epileptik yang terjadi akibat suatu kelainan intrakranial yang kronis diperlukan terapi jangka panjang. Pada bangkitan epileptik pertama, terapi obat anti epilepsi (OAE) dapat langsung diberikan bila terdapat risiko yang tinggi untuk terjadinya bangkitan berulang.

1. OAE diberikan berdasarkan tipe bangkitan. OAE pilihan pada kejang tipe parsial berdasarkan pedoman ILAE 2013 antara lain adalah

- karbamazepin - fenitoin
- levetirasetam - zonisamid

2. Pilihan OAE pada anak adalah okskarbazepin

3. pada lanjut usia diberikan lamotrigin dan gabapentin.

4. Sementara pada bangkitan pertama umum tonik klonik pada dewasa dan anak adalah diazepam, karbamazepin, okskarbazepin, fenitoin, dan lamotrigin.

Dosis obat dimulai dari dosis kecil dan dinaikkan secara bertahap sampai mencapai dosis terapi. Pantau efek samping jangka pendek, seperti mengantuk, gangguan emosi dan perilaku, gangguan hematologi, fungsi hepar, atau alergi. Jika tidak ditemukan efek samping dan pasien merasa nyaman dengan obat tersebut, dosis obat dapat dinaikkan bertahap sampai tercapai bebas bangkitan atau terjadi intoksikasi. Gejala dan tanda intoksikasi dapat muncul ringan sampai berat. Bila muncul gejala dan tanda intoksikasi ringan, seperti *dizziness* dan *nistagmus* pada intoksikasi fenitoin, dosis dapat diturunkan ke dosis sebelum tanda intoksikasi tersebut muncul. Namun apabila terjadi intoksikasi berat seperti penurunan kesadaran pada intoksikasi valproat maka obat harus langsung dihentikan dan diganti dengan obat yang tidak mempunyai profil efek samping yang sama serta waktu *steady state* cepat untuk mencegah status epileptikus akibat efek *withdrawal*. Selain tipe bangkitan, pemilihan OAE perlu memperhatikan faktor-faktor individual seperti komorbiditas, usia, ekonomi, interaksi obat, ketersediaan, dan lain sebagainya. Komunikasi, edukasi, dan informasi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kemungkinan bebas serangan.

Prinsip pengobatan epilepsi adalah monoterapi dengan target pengobatan 3 tahun bebas bangkitan. Bila pemberian monoterapi tidak dapat mencegah bangkitan berulang, politerapi dapat diberikan dengan pertimbangan profil obat yang akan dikombinasikan. Apabila masih tidak dapat diatasi, maka perlu dipertimbangkan tindakan pembedahan untuk menghilangkan fokus epileptik.

b. Nonmedikamentosa

Tata laksana nonmedikamentosa pada epilepsi antara lain:

1. Pembedahan epilepsi
2. Stimulasi nervus vagus
3. Diet ketogenik

Pembedahan epilepsi adalah salah satu tata laksana nonmedikamentosa yang efektif pada pasien epilepsi fokal resisten obat. Angka keberhasilan pembedahan epilepsi antara lain 66% pasien bebas bangkitan pada epilepsi lobus temporal, 46% pada epilepsi lobus oksipital dan parietal, serta 27% pada epilepsi lobus frontal.

Stimulasi nervus vagus (SNV) merupakan metode invasif pada terapi pasien epilepsi yang resisten obat. Metode ini menggunakan suatu elektroda yang ditanam di bawah kulit pada dada kiri dan berhubungan dengan elektroda stimulator yang diletakkan pada nervus vagus kiri. Stimulator ini mengeluarkan impuls dengan berbagai frekuensi sesuai dengan kebutuhan pasien. Frekuensi bangkitan sangat menurun setelah penggunaan stimulasi nervus vagus ini. Penurunan frekuensi bangkitan sekitar 35 -75% setelah 10 tahun penggunaan SNV.

Diet ketogenik sampai saat ini terbukti efektif pada pasien epilepsi anak-anak. Diet ketogenik adalah diet dengan tinggi lemak, rendah protein, dan rendah karbohidrat. Angka bebas bangkitan pada anak-anak mencapai

16%, penurunan >90% frekuensi bangkitan sebesar 32%, penurunan >50% frekuensi bangkitan sebesar 56%. Namun diet ketogenik ini belum terbukti efektif pada pasien dewasa.

8. Prognosis

Resiko terjadinya relaps meningkat pada :

- a. Anak dengan epilepsi simtomatik.
- b. Awitan bangkitan umur ≥ 12 tahun.
- c. Durasi bebas bangkitan < 6 bulan.
- d. EEG abnormal saat penghentian bangkitan.
- e. Sindroma dengan risiko relaps tinggi: *Juvenile Myoclonic Epilepsy*, sindroma epilepsi pada remaja (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, 2016).

9. Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian epilepsi pada Anak

a. Kejang demam

Kejang demam ialah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh (suhu rektal di atas 38 derajat *Celcius*) yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium, kejang demam terbagi atas 2 jenis yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana adalah kejang demam yang terjadi dengan waktu yang relatif singkat yaitu kurang dari 15 menit, serta biasanya akan dengan sendiri dalam hal ini kejang umum tonik dan atau klonik, tanpa gerakan fokal dan tidak berulang dalam waktu 24 jam (Kerja Koordinasi Neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia & Hardiono Pusponegoro Dwi Putro Widodo Sofyan Ismael, n.d). Hal ini juga terdapat dalam penelitian (Budiman et al., 2022) yang dimana Riwayat kejang demam merupakan faktor risiko terbanyak untuk berkembang menjadi epilepsi pada anak di kemudian hari, hal ini dikaitkan

dengan terjadinya perubahan molekuler dan fungsional terjadi setelah kejang demam berkepanjangan, dapat mempengaruhi mekanisme hipereksitabilitas hipokampus yang ditimbulkan oleh kejang meningkatkan rangsangan jaringan hipokampus dan mempromosikan epilepsi. Proses ini melibatkan perubahan menetap tingkat molekuler dan fungsional, seperti perubahan reseptor neurotransmitter atau saluran ion (Hasibuan,2020.)

b. Kelahiran prematur

Persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi antara usia kehamilan 20 - <37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, Persalinan prematur merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal. Penyulit-penyulit yang dapat terjadi pada bayi prematur meliputi penyulit jangka pendek seperti sindroma gawat napas bayi baru lahir yang sering berakhir dengan kematian bayi dan penyulit jangka panjang berupa kebutaan, ketulian, kelumpuhan, dan keterbelakangan mental.(Rsup Prof R D Kandou Manado *et al.*, 2015). pada anak yang lahir prematur berkaitan dengan terjadinya kerusakan patologis pada korteks serebral, yang disebut dengan ensfalopati prematuritas. Peristiwa ini melibatkan kerusakan *subplate*, sebuah struktur sementara yang penting untuk perkembangan sirkuit korteks serebral. Subplate neuron mengarahkan perkembangan sirkuit inhibisi kortikal selama akhir kehamilan. Perkembangan tersebut ialah perkembangan spesifik tonik murni *γ-amino butyric acid* (GABA) ergik ekstrasinaps menjadi aktivitas sinapsis (GABA) ergik fase dependen yang diikuti oleh sinapsis glutamanergik terjadi selama perkembangan Sistem Saraf Pusat (SSP). Perubahan dalam perkembangan spatiotemporal ini bisa mengganggu urutan perkembangan sirkuit (Robinson, 2010).

c. Asfiksia

Asfiksia adalah suatu kondisi kegawatan pada bayi baru lahir yang menyebabkan terjadinya depresi pernapasan akibat kurangnya pasokan oksigen serta mengakibatkan berbagai komplikasi dalam hal ini dampaknya yaitu asfiksia perinatal jangka pendek berupa disfungsi multiorgan yang dapat berlanjut kematian, serta komplikasi jangka panjang adalah kelainan neurologi dan keterlambatan perkembangan, hal ini disebabkan karena adanya gangguan pertukaran gas dan pengangkutan oksigen selama persalinan yang dapat mempengaruhi fungsi sel organ organ vital terutama pada otak karena dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan secara irreversibel (Indriani, 2015).

d. Trauma lahir

Trauma kapitis atau cedera kepala, adalah trauma mekanik terhadap kepala baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan gangguan fungsi neurologis, seperti fisik, kognitif, psikososial, baik temporer maupun permanen, trauma kapitis merupakan salah satu penyebab terjadinya kecacatan dan kematian yang penting dalam bidang neurologi dan menjadi masalah kesehatan bagi penderitanya, Bangkitan pasca-trauma kapitis diklasifikasikan berdasarkan onset setelah cedera, yaitu *immediate*, *early seizures*, dan *late seizures*. Bangkitan pasca-trauma kapitis *immediate* bersifat segera yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Bangkitan yang muncul antara 24 jam hingga satu minggu setelah cedera kepala termasuk klasifikasi *early seizures* atau bangkitan awal. Bangkitan yang terjadi setelah satu minggu pasca-trauma kepala disebut *late seizures* atau bangkitan lambat. Bangkitan epileptik tanpa provokasi atau bangkitan lambat pasca-trauma kapitis berulang disebut epilepsi pasca-trauma kapitis (Wangidjaja & Wreksoatmodjo, 2022)

Beberapa mekanisme penyebab perubahan aktivitas otak pemicu bangkitan setelah cedera kepala, antara lain peningkatan penanda inflamasi dan sitokin serta perubahan sawar darah-otak. Perubahan penting pasca cedera kepala yang dapat mencetuskan bangkitan, yaitu peningkatan *interleukin- β* (IL- β) yang dapat merusak sel parenkim otak. Berbagai sel mikroglia menghasilkan IL- β dan menyebabkan aktivasi reseptor *N-metilD-aspartat* (NMDA). Aktivasi reseptor NM menyebabkan hipereksitabilitas neuron melalui jalur *glutamatergic excitatory synaptic transmission* dengan meningkatkan masuknya kalsium ke dalam sel. Peningkatan eksitasi ini dapat menyebabkan serangan menetap dan neurodegenerasi. Sitokin memainkan peran penting dalam patogenesis epilepsi pasca-trauma kapitis. Pengeluaran tumor *necrosis factor-alpha* (TNF- α) mengganggu sawar darah otak, menyebabkan masuknya leukosit, sehingga terjadi kerusakan neuron (Wangidjaja & Wreksoatmodjo, 2022).

e. Riwayat keluarga epilepsi

Salah satu patofisiologi epilepsi dapat disebabkan oleh adanya mutasi genetik, dimana mutasi genetik ini terjadi sebagian besar pada gen yang mengkode protein kanal ion. Contoh : *Generalized epilepsy with febrile seizure, benign familia neonatal convulsions*. Pada kanal ion yang normal terjadi keseimbangan antara masuknya ion natrium (natrium infulus) dan keluarnya ion kalium (kalium efluks) sehingga terjadi aktivitas depolarisasi dan repolarisasi yang normal pada sel neuron. Jika terjadi mutasi pada kanal Na seperti yang terdapat pada *generalized epilepsy with febrile seizures plus*, maka terjadi natrium infulus yang berlebihan sedangkan kalium efluks tetap seperti semula sehingga terjadi depolarisasi dan repolarisasi yang berlangsung berkali-kali dan cepat atau terjadi hipereksitasi pada neuron. Hal yang sama terjadi pada *benign familial neonatal convulsion* dimana terdapat mutasi kanal kalium sehingga terjadi

efluks kalium yang berlebihan dan menyebabkan hipereksitasi sel neuron (Sherwood, 2013).

hal ini di jelaskan juga pada panelitian (Zapata-Aldana., 2021) Warisan sindrom epilepsi terkait SCNIA bersifat autosomal dominan. Sebagian besar mutasi, terutama pada fenotipe yang parah, terjadi secara *de novo*. Mutasi SCNIA selalu dijumpai pada kondisi heterozigot. (Maruthi, Dhayalan, Kumaran, Soundraoandiyana, & Gambhir, 2023)

B. Integrasi keislaman

Dalam islam hal-hal mengenai penyakit pada anak telah banyak di jelaskan pada Al-Qur'an.

1. Mengenai bayi premature, penyakit akibat genetik, dan asfiksia juga sudah di jelaskan dalam Al-qur'an.

Allah berfirman dalam QS Surah al-Hajj/22:5.

مِنْ ثَمَّ نُطْفَةٍ مِنْ تُّرَابٍ مِمَّنْ خَلَقْنَاكُمْ فَإِنَّا الْبَعْثُ مِنْ رَبِّ فِي كُنْتُمْ إِنَّ النَّاسَ يَأْتِيهَا
إِلَى نِسَاءٍ مَا الْأَرْحَامُ فِي وَنُقِرُّ لَكُمْ لِنَبِيِّنَ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ مُضْغَةٍ مِنْ ثَمَّ عَلَقَةٍ
يُرْدُ مَنْ وَمِنْكُمْ يُتَوَفَّى مَنْ وَمِنْكُمْ أَشَدَّكُمْ لِيَتَّبِعُوا ثُمَّ طِفْلًا نُخْرِجُكُمْ ثُمَّ مُسَمًّى آجَلٍ
أَنْزَلْنَا فَإِذَا هَامِدَةٌ الْأَرْضِ وَتَرَى شَيْئًا عِلْمٍ بَعْدَ مِنْ يَعْلَمُ لِكَيْلَا الْعُمْرُ أَرْدَلِ إِلَى
بِهَيْجِ زَوْجِ كُلِّ مَنْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَّتْ اهْتَرَّتِ الْمَاءَ عَلَيْهَا

Terjemahan:

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah".

Dalam surah tersebut dijelaskan proses penciptaan yaitu, “kami telah menjadikan kamu dari tanah, dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, dari segumpal daging dari yang sempurna kejadiannya maupun tidak sempurna”. Dari ayat itu bisa dimaknai bahwa ada kejadian sempurna dimana proses penciptaan sempurna tersebut terciptalah manusia yang lahir sehat fisik maupun mental ,sedangkan kejadian yang tidak sempurna menyebabkan banyak hal seperti penyakit maupun kematian,hal ini berkaitan dengan risiko genetik dengan kejadian epilepsi yang merupakan suatu bentuk kekuasaan allah atas segala sesuatu yg di kehendaknya,hal ini juga di jelaskan dalam tafsir quraish shihab yang berbunyi “apabila kalian ragu akan kebenaran pembangkitan kami terhadap kalian dari kematian,maka sebetulnya dari proses penciptaan kalian terdapat bukti tentang kekuasaan kami untuk melakukan hal itu.” (M. Quraish shihab, 2001).

Diperjelas “Setelah itu adakalanya Kami membuat kandungan itu gugur menurut kehendak Kami, ataupun meletakkan di dalam rahim hingga kandungan menjadi sempurna hingga Kami mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam bentuk bayi. Kalian yang masih bayi itu kemudian Kami pelihara hingga sempurna kekuatan fisik dan akal pikirannya (M. Quraish shihab, 2001).

2. Mengenai trauma kepala dengan risiko epilepsi

Musibah merupakan kejadian yang berasal dari kelalaian orang itu sendiri seperti yang dijelaskan di dalam QS As-Syura/26:30 , Allah SWT berfirman :

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۖ

Terjemahnya:

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa musibah yang menimpa manusia adalah dampak dari perbuatan mereka sendiri, namun musibah dapat menghapus dosa hal ini tergantung kepada cara manusia menyikapi, apakah dengan bersabar atau berputus asa. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah mengampuni sebagian besar kesalahan yang telah diperbuat oleh hamba-Nya, karena jika tidak manusia akan dihancurkan sesuai dengan timbunan dosa yang telah diperbuat mereka (Kementrian Agama RI, 2016). Dalam kejadian trauma kepala pada anak itu merupakan dampak dari kelalaian manusia yang tidak berhati-hati dalam menjaga dan merawat anak, dimana dalam kasus epilepsi pada anak trauma kepala juga merupakan faktor risiko yang dapat mempengaruhi risiko kejadian epilepsi dimana anak adalah makhluk yang lemah dan butuh perlindungan dari orangtua oleh karena itu sebaiknya orangtua menjaga dan merawat anaknya lebih baik agar terhindar dari berbagai risiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan nyawa, hal terkait ini juga di jelaskan dalam firman Allah SWT.

Allah berfirman dalam QS An-Nisa: 28

ضَعِيفًا الْإِنْسَانَ وَخُلِقَ ۖ عَنْكُمْ يُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ

Terjemahannya:

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah”.


Allah SWT juga menegaskan kita tidak boleh menjatuhkan diri kepada kebinasaan atau mempersulit diri sendiri dengan melakukan hal buruk, dalam hal ini adalah tidak menghindari faktor risiko yang berkaitan dengan kejadian epilepsi khususnya pada anak. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Al-Qur’an surah Al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۖ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.


C. Kerangka teori



Bagan 2.1 Kerangka teori

ALAUDDIN
MAKASSAR

D. Kerangka konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain penelitian

Jenis penelitian yang di pakai adalah penelitian kuantitatif, dan selanjutnya di analisis dengan prosedur analisis observastional dengan pendekatan *case control*, Pendekatan *case control* ini mencoba mencari perbandingan anantara kelompok kasus dan kelompok kontrol terhadap kejadian epilepsi yang di mana penelitian ini kemudian di kumpulkan dan ukur dalam waktu bersamaan.

B. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini akan di lakukan pada bulan November – Desember tahun 2023 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Damanah, 2019). Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah epilepsi pada anak.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Bentuk hubungan antara variabel independen dengan dependen adalah sebab akibat (Damanah, 2019). Variabel independent dalam penelitian ini adalah kejang demam, riwayat kelahiran prematur, riwayat asfiksia, trauma kepala saat lahir, dan riwayat keluarga.

D. Populasi dan sampel penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek yang akan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Damanah, 2019). Populasi dalam penelitian ini yaitu Anak penderita epilepsi Usia 1 bulan -18 tahun di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan di jadikan subjek penelitian, dalam penelitian ini sampel yang diambil berupa data sekunder yang diambil melalui rekam medik pendekatan *case control* ,dengan teknik *purposive sampling*

$$\begin{aligned} S &= \frac{N}{Nd^2+1} \\ &= \frac{314}{314 (0,1)^2+1} \\ &= \frac{314}{314 (0,01)+1} \\ &= \frac{314}{4,14} \end{aligned}$$

= 75,84 (sampel dalam penelitian ini 76)

Keterangan:

S = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d^2 = presisi yang ditetapkan $(0,1)^2$

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *Purposive sampling* yang berarti sampel dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan

penelitian. *Purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti.

1. Kelompok kasus

a. Kriteria Inklusi

- 1) Kriteria Inklusi Pasien Anak 1 bulan-18 tahun yang terdiagnosis epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023.
- 2) Anak yang tidak memiliki riwayat neurologi lain.
- 3) Anak yang tidak memiliki penyakit kronis

b. Kriteria Eksklusi

Data Rekam Rekam Medis yang kurang lengkap.

Pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan mencatat variabel yang dibutuhkan dalam rekam medik pasien Epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023.

2. Kasus kontrol

Kelompok Kontrol Pasien Anak 0 bulan - 18 tahun yang tidak terdiagnosis epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, perbandingan antara kelompok kasus dan kontrol pada penelitian ini 1:1.

a. Kriteria inklusi

Kriteria Inklusi Pasien Anak 1 bulan - 18 tahun yang tidak terdiagnosis epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Anak dengan riwayat penyakit neurologi lain.
- 2) Anak yang memiliki riwayat penyakit kronis

Pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan mencatat variabel yang dibutuhkan dalam rekam medik pasien Epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023.

F. Instrumen penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekam medik anak dan wawancara apabila rekam medik tidak lengkap yang terdapat di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023. Data yang digunakan adalah rekam medik Anak yang terdiagnosis Epilepsi.

G. Teknik pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengelolaan Data

1. Editing

Tahap pertama Peneliti harus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan kejelasan data rekam medik yang diperoleh.

2. Coding

Tahap *coding* merupakan kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi angka atau bilangan sehingga memberikan kode terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini untuk mempermudah pengolahan data yang diperoleh (Hoesin, 2017).

3. Tabulating

Langkah *tabulating* yaitu dengan mempersiapkan informasi yang telah diperoleh peneliti yang kemudian harus diolah dengan merancang tabel analisis (Hoesin, 2017).

4. *Processing*

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk dianalisis. *Processing* dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi ke dalam *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) (Rinaldi & Mujianto, 2017).

5. *Cleaning*

Pada tahap *cleaning* ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddian yang akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data rekam medik dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut diolah menggunakan *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut :


c. *Analisis Univariat*

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat distribusi setiap variabel.

d. *Analisis Bivariat*

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Odds Ratio yang bertujuan untuk membandingkan antara kasus dan kontrol terhadap faktor risiko. Odd Ratio (OR) adalah ratio antara odd terpapar terhadap odd yang tidak terpapar.

I. Alur Penelitian



Bagan 3.1 Alur Penelitian

J. Penyajian Data

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

K. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan *ethical*

clearance maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti :

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien.
3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian dalam pengambilan data.
4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar didapatkan anak yang terdiagnosis epilepsi selama tahun 2023 sebanyak 76 orang anak dan anak yang tidak terdiagnosis epilepsi sebanyak 76 orang anak. Semua sampel kelompok kasus dan kontrol memenuhi kriteria inklusi sehingga diperoleh data sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Uji analisis univariat ini dilakukan untuk mengetahui distribusi dari variabel yang diteliti. Jumlah populasi yang diteliti sebanyak 152. Distribusi sampel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Analisis Univariat Faktor Risiko Kejadian Epilepsi Pada Anak

Variabel	Jumlah	Persen (%)
Riwayat kejang demam		
Ada riwayat kejang demam	33	21,7
Tidak ada riwayat kejang demam	119	78,3
Riwayat Kelahiran Prematur		
Riwayat kelahiran prematur	8	5,3
Tidak ada Riwayat kelahiran prematur	144	94,7
Riwayat Asfiksia		
Riwayat kelahiran prematur	9	5,9
Tidak ada Riwayat kelahiran prematur	143	94,1
Riwayat Trauma Kepala		
Ada riwayat trauma kepala	7	4,6
Tidak ada Riwayat trauma kepala	145	96,4
Riwayat Keluarga Epilepsi		
Ada Riwayat Keluarga	24	15,8
Tidak Ada Riwayat Keluarga	128	84,2
Riwayat Epilepsi pada anak		
Epilepsi pada anak usia 0-18 tahun	76	50,0
Tidak pernah terjadi epilepsi pada anak usia 0-18 tahun	76	50,0
Total	152	100,0

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar (Januari-Februari Tahun 2023).

Tabel 4.1 menunjukkan distribusi jumlah variabel yang diukur dalam penelitian yang dimana dalam penelitian ini terdapat 152 sampel yang diteliti dan didapatkan sebanyak 33 (21,7%) anak yang memiliki riwayat kejang demam dan 119 (78,3%) anak tidak memiliki riwayat kejang demam. Terdapat 8(5,3%) pasien anak yang memiliki riwayat kelahiran prematur dan 144 (94,7%) pasien anak yang tidak memiliki riwayat kelahiran prematur. Sebanyak 9 (5,9%) memiliki riwayat asfiksia dan 143 (94,1%) anak yang tidak memiliki riwayat asfiksia . Untuk variabel Riwayat trauma kepala 7 (4,6) responden yang memiliki riwayat trauma kepala dan 145 (95,4%) yang tidak memiliki riwayat trauma kepala . Responden yang memiliki riwayat keluarga epilepsi sebanyak 24 (15,8%) anak dan yang tidak memiliki riwayat keluarga epilepsi sebanyak 128 (84,2%) ibu. Variabel dependen untuk kelompok kasus sebanyak 76 dan kelompok kontrol sebanyak 76 anak .

2. Analisis Bivariat

Uji analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu riwayat kejang demam, riwayat kelahiran prematur, riwayat asfiksia, riwayat trauma kepala, riwayat keluarga epilepsi. Adapun analisis hubungan antara variabel independen dengan kejadian Epilepsi pada anak dilampirkan pada tabel sebagai berikut:

1) Riwayat kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Tabel 4.2 Kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Riwayat Kejang Demam	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Ada riwayat kejang demam	33	21,7	0	0,0	33	21,7	0,000	0,566	0,465	0,689
Tidak ada riwayat kejang demam	43	28,3	76	50,0	119	78,3				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

Sumber: (Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar)

Tabel 4.2 Menunjukkan hubungan antara Kejang demam dengan kejadian epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 33 orang (21,7%) dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 0 (0%). Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,566 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,465 dan *upper limit* (UL) sebesar 0,689. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat kejang demam memiliki risiko 0,566 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat kejang demam . Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencakup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%,sehingga nilai 0,566 dianggap bermakna secara statistik dimana kejang demam merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak.

2) Riwayat prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Tabel 4.3 Riwayat prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Riwayat Kelahiran Prematur	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Lahir prematur	5	3,3	3	2,0	8	5,3	0,468	1,714	0,395	7,439
Tidak lahir prematur	71	46,7	73	48,0	144	94,7				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar)

Tabel 4.3 menunjukkan hubungan antara kelahiran prematur dengan kejadian epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 5 orang (3,3%) dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 3(2,0%). Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 1,174 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,395 dan *upper limit* (UL) sebesar 7,439. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat kelahiran prematur memiliki risiko 1,714 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat kelahiran prematur. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencakup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%,sehingga nilai 1,714 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana riwayat kelahiran prematur bukan merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak.

3) Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Tabel 4.4 Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Riwayat Asfiksia	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Ada riwayat asfiksia	3	2,0	6	3,9	9	5,9	0,303	0,497	0,115	1,992
Tidak ada riwayat asfiksia	73	48,0	70	46,1	143	94,1				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar)

Tabel 4.4 menunjukkan hubungan antara riwayat asfiksia dengan kejadian epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 3 orang (2,0%) dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 6(3,9%). Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,497 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,115 dan *upper limit* (UL) sebesar 1,992. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat asfiksia memiliki risiko 0,497 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat asfiksia. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%,sehingga nilai 0,497 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana riwayat asfiksia bukan merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak.

4) Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Tabel 4.5 Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Riwayat Trauma Kepala	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Ada riwayat trauma kepala	6	3,9	1	0,7	7	4,6	0,053	6,429	0,755	54,744
Tidak ada riwayat trauma kepala	70	46,1	75	49,3	145	95,4				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar)

Tabel 4.5 menunjukkan hubungan antara riwayat trauma kepala dengan kejadian epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 6 orang (3,9%) dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 1 (0,7%). Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 6,429 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,755 dan *upper limit* (UL) sebesar 54,744. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat trauma kepala memiliki risiko 6,429 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat trauma kepala. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 6,429 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana riwayat trauma kepala bukan merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak.

5) Riwayat keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Tabel 4.6 Riwayat keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Riwayat Keluarga Epilepsi	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Ada riwayat keluarga	24	15,8	0	0,0	24	15,8	0,000	0,684	0,587	0,797
Tidak ada riwayat keluarga	52	34,2	76	50,0	128	84,2				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar)

Tabel 4.6 Menunjukkan hubungan riwayat keluarga epilepsi dengan kejadian epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 24 orang (15,8%) dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 0 (0%). Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,684 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,587 dan *upper limit* (UL) sebesar 0,797. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat keluarga epilepsi memiliki risiko 0,684 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat keluarga epilepsi. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,684 dianggap bermakna secara statistik dimana riwayat keluarga epilepsi merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak.

3. Analisis Multivariat

Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui variabel independen yang lebih erat kaitannya dengan variabel dependen dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Tabel 4.7 Hasil uji regresi logistik.

Variabel	Nilai <i>p-value</i>	OR	CI 95%
Riwayat Kejang Demam	0,000	0,566	0,465-0,689
Riwayat Keluarga Epilepsi	0,000	0,684	0,587-0,797

Tabel 4.6 Menjelaskan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik yang menunjukkan bahwa 2 variabel yang diikutkan dalam uji regresi berganda logistik didapatkan hasil bahwa nilai variabel dengan nilai $p < 0,25$ yaitu variabel riwayat kejang demam dan riwayat keluarga epilepsi. Oleh karena semua variabel memiliki nilai $p < 0,25$ maka semua faktor risiko dengan nilai terbesar yaitu variabel riwayat kejang demam dengan nilai OR 0,566 (CI 95% =0,465 - 0,689) dan riwayat keluarga epilepsi dengan nilai OR 0,684 (CI 95% =0,587 - 0,797).

B. Pembahasan

Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang banyak terjadi pada anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal (Gusta, 2019). Faktor risiko kejadian epilepsi pada anak yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu riwayat kejang demam, riwayat kelahiran prematur, riwayat asfiksia, riwayat trauma kepala dan riwayat epilepsi keluarga. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data kemudian dijabarkan pembahasan dari masing-masing faktor risiko. Adapun pembahasan dari faktor risiko kejadian epilepsi pada anak tersebut sebagai berikut

1. Riwayat kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,566 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,465 dan *upper limit* (UL) sebesar 0,689. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat kejang demam memiliki risiko 0,566 kali lebih besar terkena epilepsi dibanding anak yang tidak memiliki riwayat kejang demam. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencakup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,566 dianggap bermakna secara statistik dimana kejang demam merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putu Asita Pungky Mithayayi, Dewi Sutriani Mahalini (2020) oleh yang menunjukkan adanya hubungan antara kejang demam dengan kejadian epilepsi pada anak, dimana 82 sampel yang memenuhi kriteria, kejang demam merupakan faktor yang memiliki proporsi kejadian paling tinggi diantara

faktor lainnya. Begitupula pada penelitian yang dilakukan oleh Suryanti *et.al* (2022) dimana dari hasil penelitian tersebut dengan total sampel 98 Hasil uji statistik diperoleh nilai p value sebesar 0,045 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kejang demam dengan kejadian epilepsi pada anak di RSSanta Elisabeth Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021, riwayat kejang demam dapat meningkatkan risiko 3 kali lebih besar untuk mengalami epilepsi dibandingkan yang tidak memiliki riwayat kejang demam.

Menurut peneliti kejang demam beresiko menyebabkan epilepsi pada anak disebabkan oleh peningkatan suhu di atas 38°C pada anak, sedangkan sel neuron pada anak masi dalam keadaan immatur, keadaan otak yang demikian akan menyebabkan reseptor glutamat sebagai eksitor bersifat lebih aktif, sebaliknya reseptor GABA sebagai inhibitor bersifat kurang aktif, sehingga mekanisme eksitasi lebih dominan daripada inhibisi. Otak yang belum matang, regulasi ion natrium, kalium, dan kalsium belum sempurna sehingga mengakibatkan gangguan repolarisasi setelah depolarisasi dan meningkatkan eksitabilitas neuron yang memungkinkan untuk timbulnya kejang, Efek ini dapat berupa kerusakan neuron-neuron serta sel-sel glia yang dapat menjadi lingkungan neuronal epileptogeni (Chairunnisa et al., 2018).

2. Riwayat kelahiran prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 1,174 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,395 dan *upper limit* (UL) sebesar 7,439. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat kelahiran prematur memiliki risiko 1,714 kali lebih besar terkena epilepsi dibanding anak yang tidak memiliki riwayat kelahiran prematur. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan

95%, sehingga nilai 1,714 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana riwayat kelahiran prematur bukan merupakan faktor risiko bermakna terhadap kejadian epilepsi pada anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri Handayan *et.al* (2022) dimana dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara riwayat kelahiran prematur dengan kejadian epilepsi pada anak di RSUD dr.H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dikarenakan mayoritas sampelnya lahir dengan cukup bulan, dengan (p value 1,000) yang menunjukkan tidak ada hubungan kelahiran prematur dengan kejadian epilepsi pada anak, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putu Asita Pungky Mithayayi, Dewi Sutriani Mahalini (2020) dimana dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa insiden epilepsi akan meningkat seiring dengan penurunan usia kehamilan atau kelahiran yang belum cukup bulan.

Menurut teori pada anak yang lahir prematur berkaitan dengan keretakan terjadinya kerusakan patologis pada korteks serebral, yang disebut dengan ensfalopati prematuritas. Peristiwa ini melibatkan kerusakan *subplate*, sebuah struktur sementara yang penting untuk perkembangan sirkuit korteks serebral. Subplate neuron mengarahkan perkembangan sirkuit inhibisi kortikal selama akhir kehamilan kelahiran. Peristiwa ini melibatkan kerusakan *subplate*, sebuah struktur sementara yang penting untuk perkembangan sirkuit korteks serebral. Perubahan dalam perkembangan spasiotemporal ini bisa mengganggu urutan perkembangan sirkuit (Robinson, 2010), sehingga menurut peneliti walaupun pada penelitian ini kelahiran prematur tidak berhubungan terhadap kejadian epilepsi pada anak akan tetapi kelahiran prematur tetap menjadi faktor risiko dari kejadian epilepsi.

3. Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,497 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,115 dan *upper limit* (UL) sebesar 1,992. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat asfiksia memiliki risiko 0,497 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat asfiksia. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,497 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana riwayat asfiksia bukan merupakan faktor risiko bermakna terhadap kejadian epilepsi pada anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan supriadi *et.al* (2002) dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa riwayat asfiksia tidak bermakna sebagai faktor risiko epilepsi dengan (OR:1,23;p>0,05) Hal ini berarti riwayat asfiksia tidak bermakna terhadap kejadian epilepsi sehingga bukan merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh abdul khanis,mustika ratna ningsih purbowati (2018) dari dilakukan analisis menggunakan uji *chi square*, didapat nilai $P < 0,05$ yang berarti hasil signifikan yang menunjukkan adanya pengaruh asfiksia neonatorum terhadap kejang neonatorum.

Menurut peneliti meskipun dalam penelitian ini faktor risiko asfiksia tidak berhubungan dengan kejadian epilepsi namun asfiksia tetap di pertimbangkan sebagai salah satu faktor risiko epilepsi dikarenakan asfiksia menyebabkan terganggunya aliran oksigen dalam tubuh, dan apabila

mengganggu oksigenasi otak, asfiksia bisa menimbulkan kerusakan neurologis seperti kejang epilepsi (Mithayay & Mahalini, 2020).

4. Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 6,429 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,755 dan *upper limit* (UL) sebesar 54,744. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat trauma kepala memiliki risiko 6,429 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat trauma kepala. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 6,429 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana riwayat trauma kepala bukan merupakan faktor risiko bermakna terhadap kejadian epilepsi pada anak.

Hasil penelitian ini menunjukan tidak ada hubungan antara riwayat trauma kepala dengan epilepsi berbeda seperti penelitian mutya yulinda (2015) pada penelitian tersebut yang mencari hubungan riwayat cedera kepala terhadap kejadian epilepsi di poliklinik saraf RSUD Dokter soedarso pontianak dilakukan uji chi-square didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat cedera kepala dengan kejadian epilepsi ($p = 0,000$) dengan nilai *Odds Ratio* (OR)=16,000. Hal ini menunjukkan bahwa orang dengan riwayat cedera kepala memiliki resiko 14 sebesar 16 kali lebih tinggi untuk mengalami epilepsi dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat cedera kepala,namun pada penelitian yang dilakukan oleh taewoo shin *et.al* (2019) pada penelitian tersebut dikatakan bahwa kejadian kejang akibat trauma kepala tergantung dengan derajat trauma untuk menimbulkan kejadian kejang.

5. Riwayat keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak

Dari hasil analisis yang diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 0,684 pada CI 95% dengan *Lower Limit* (LL) sebesar 0,587 dan *upper limit* (UL) sebesar 0,797. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat keluarga epilepsi memiliki risiko 0,684 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat keluarga epilepsi. Nilai *lower limit* dan *upper limit* mencakup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,684 dianggap bermakna secara statistik dimana riwayat keluarga epilepsi merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irma Fidora *et.al* (2021) bahwa yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit epilepsi sebanyak 16 orang dengan nilai $p = 0,019$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ada hubungan riwayat keluarga dengan penyakit epilepsi pada pasien rawat jalan di Poli Anak di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Dari hasil analisis diperoleh nilai $OR = 8,667$, artinya pasien yang memiliki riwayat keluarga mempunyai peluang 8,667 kali menyebabkan epilepsi dibanding dengan pasien yang tidak memiliki riwayat keluarga. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pravita Tri Andrianti *et.al* (2013)

Menurut peneliti Genetik merupakan salah satu penyebab dari kejadian epilepsi, secara tidak langsung, hal ini dijelaskan juga pada penelitian (Zapata-Aldana, 2021) Warisan sindrom epilepsi terkait SCNIA bersifat autosomal dominan. Sebagian besar mutasi, terutama pada fenotipe yang parah, terjadi secara *de novo*. Mutasi SCNIA selalu dijumpai pada kondisi heterozigot.

C. Keterbatas peneliti

1. Penelitian ini mengambil data dari berkas rekam medik sehingga validitas data sangat bergantung dengan validitas data yang terdapat dalam rekam medik.
2. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik yang tidak lengkap datanya sehingga data tersebut dianggap sebagai missing cases dan tidak bisa diikutsertakan dalam penelitian.

D. Kelebihan peneliti

1. Dalam pengumpulan data rekam medik data lengkap mencukupi jumlah sampel yang dibutuhkan.



BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Epilepsi Pada Anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Faktor faktor yang berpengaruh dalam kejadian epilepsi pada anak berdasarkan penelitian ini adalah, riwayat kejang demam, riwayat kelahiran prematur, riwayat asfiksia, riwayat trauma kepala dan riwayat epilepsi keluarga.
- b) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kejang demam dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.
- c) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kelahiran prematur dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.
- d) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat asfiksia dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.
- e) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat trauma kepala dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

- f) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat epilepsi keluarga dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.
- g) Variabel independen yang paling dominan berpengaruh dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin makassar adalah riwayat kejang demam dan riwayat keluarga epilepsi.

B. Saran

1) Bagi Masyarakat

- a) Memperhatikan faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian epilepsi khususnya pada anak, sehingga dapat melakukan pencegahan lebih awal.
- b) Menambah informasi dan wawasan orangtua serta keluarga agar dapat bersama-sama dapat mengidentifikasi dan menghindari faktor risiko yang ada.

2) Bagi Tenaga Kesehatan

- a) Petugas kesehatan diharapkan dapat mengenali faktor risiko epilepsi serta melakukan usaha untuk mencegah kejadian tersebut sembari melakukan pemeriksaan jika terjadi hal hal yang berkaitan dengan risiko epilepsi.
- b) Petugas kesehatan diharapkan dapat mengisi rekam medik secara lengkap dan dapat terbaca untuk kebutuhan penelitian, maupun pasien itu sendiri. Rekam medik juga harus disimpan dengan rapi dan aman agar tidak hilang.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan epilepsi pada anak.

- b) Melakukan penelitian di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang berhubungan epilepsi pada anak.
- c) Melakukan penelitian dengan variabel faktor risiko yang lebih banyak.



DAFTAR PUSTAKA

- Asita, P., Mithayayi, P., & Mahalini, D. S. (n.d.). KARAKTERISTIK FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN EPILEPSI PADA ANAK DI DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA/RSUP SANGLAH DENPASAR. *JULI*, 9(7), 2020. <https://doi.org/10.24843.MU.2020.V9.i7.P15>
- Budiman, M., Salendu, P. M., & Rompis, J. L. (2022). Pengaruh Riwayat Kejang Demam terhadap Kejadian Epilepsi pada Anak. *E-CliniC*, 11(1), 19–26. <https://doi.org/10.35790/ecl.v11i1.44268>
- Damanah, G. (2019a). *Metodologi Penelitian*. CV Hira Tech.
- Damanah, G. (2019b). *Metodologi Penelitian*. CV Hira Tech.
- Faradilah, A., January, R., As'ad, S., & Jalaluddin, S. (2022). NUTRITIONAL THERAPY IN MALNOURISHED YOUNG ADOLESCENT: FROM EPILEPTIC STATE TO CATCH UP GROWTH. *Nutritional Therapy in Malnourished...*, | *Andi Faradillah Alami Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.24252/alami.v6i2.35933>
- Gusta, N., Yolanda, A., Sareharto, P., Istiadi, H., Nuh, G., Ady, Y., & Paksi Sareharto, T. (2019). FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KEJADIAN EPILEPSI INTRAKTABEL ANAK DI RSUP DR KARIADI SEMARANG. 8(1), 378–389.
- Hammer.Gray D, M. P., & J.McPhee Stephen, M. (2014). *pathophysiology of Disease An Introduction to Clinical Medicine* (M. Hammer.Gary D, Ed.; Seventh Edition).
- Hasibuan, D. K., & Dimyati, Y. (n.d.). *CONTINUING MEDICAL EDUCATION Akreditasi PB IDI-2 SKP Kejang Demam sebagai Faktor Predisposisi Epilepsi pada Anak* (Vol. 47, Issue 9).
- Hoesin, H. (2017). *Mengedit Koding dan Tabulasi* (Liszhan, Ed.). Wordpress.
- Indriani, N., Rustina, Y., Agustini, N., Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi, S., Timur, J., & Studi Magister Ilmu Keperawatan, P. (2015). PERKEMBANGAN BAYI USIA 6-12

BULAN DENGAN RIWAYAT ASFIKSIA PERINATAL. In *Jurnal Keperawatan Indonesia* (Vol. 18, Issue 2).

Kementrian kesehatan RI. (2017). *KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/367/2017*.

Kerja Koordinasi Neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, U., & Hardiono Puspongoro Dwi Putro Widodo Sofyan Ismael, P. D. (n.d.). *Konsensus Penatalaksanaan Kejang Demam*.

Khairin. (2020). *Karakteristik Penderita Epilepsi di Bangsal Anak RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2018*. 2.

M. Quraish shihab. (2001). *Tafsir Al-Mishbah; Pesan dan keserasian al qur'an* (Vol. 1).

paramita riski setianingsih. (2012). *Faktor-Faktor Terjadinya Epilepsi pada Anak*. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. (2016). *Panduan Praktik Klinis Neurologi* (M. Kurniawan; Insti Suharjanti; Rizaldy T Pinzon, Ed.).

Reis-Dennis, S. (2019). Anger: Scary Good. *Australasian Journal of Philosophy*, 97(3), 451–464. <https://doi.org/10.1080/00048402.2018.1520268>

Rinaldi, S. F., & Mujiyanto, B. (2017). *Metodologi Penelitian dan Statistik*. News.Ge, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>

Rsup Prof R D Kandou Manado, D. D., Oroh, S., Suparman, E., M Tendean, H. M., Ratulangi Manado, S., & Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, B. (2015). KARAKTERISTIK PERSALINAN PREMATUR. In *Jurnal e-Clinic (eCl)* (Vol. 3, Issue 2). Mei-Agustus.

Symonds, J. D., Zuberi, S. M., Stewart, K., McLellan, A., O'Regan, M., MacLeod, S., Jollands, A., Joss, S., Kirkpatrick, M., Brunklaus, A., Pilz, D. T., Shetty, J., Dorris, L., Abu-Arafah, I., Andrew, J., Brink, P., Callaghan, M., Cruden, J., Diver, L. A., ... Wilson, M. (2019). Incidence and phenotypes of childhood-onset genetic epilepsies: A prospective population-based national cohort. *Brain*, 142(8), 2303–2318. <https://doi.org/10.1093/brain/awz195>

World Health Organization. (2016). *EPILEPSY A public health imperative*.

Yulianingsih, D., Hidayat, R., & Azza Nabila, F. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Islami bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Laras. In *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (Vol. 1, Issue 2).

Zapata-Aldana, E., Sadikovic, B., Yang, P., Balci, T. B., & Prasad, A. N. (2021). Genetic Testing in Children with Epilepsy: Report of a Single-Center Experience. *Canadian Journal of Neurological Sciences*, 48(2), 233–244. <https://doi.org/10.1017/cjn.2020.167>



LAMPIRAN

A. Master Tabel

1) Variabel yang diteliti

No	Nomor RM	Nama	Diagnose	Kejang demam	Riwayat kelahiran prematur	Riwayat Asfiksia	Trauma Kepala	Riwayat Penyakit Epilepsi Keluarga
1	213999	Muh.Safwan Zakirin	Non Epilepsy					
2	215909	Aidyn Alhanan Azfar	Non Epilepsy					
3	161691	Rayyan Al Farizi Khaidir	Non Epilepsy					
4	215754	Malikul Mulki Putra Dana	Non Epilepsy					
5	215665	Muhammad Prasetyo Rahman	Non Epilepsy					
6	215968	Abdul Azis Ramadhan	Non Epilepsy					
7	216067	Azkira Almahyra	Non Epilepsy					
8	204173	Gracia Dewanti Maraya Arang Tiku	Non Epilepsy					
9	134452	Khanza	Non Epilepsy					
10	216392	Nur Inayah	Non Epilepsy					
11	215820	Azura elshhamam Sahfir	Non Epilepsy					
12	215455	Ayman Elfathan Nugraha	Non Epilepsy					
13	177021	An.Muhamad Nur Afdal Wafi	Non Epilepsy					
14	213074	Ayman Ramadhan Syam	Non Epilepsy					
15	192972	Mohammad ayudhapratama	Non Epilepsy					
16	125267	Ahmad Faizan Achmad	Non Epilepsy					
17	155302	Nur Assyifah Raihana	Non Epilepsy					
18	111932	Raja Abul Abhinaya	Non Epilepsy					
19	215703	Muh.Zaki Mubarak	Non Epilepsy					
20	209087	Muhammad Al Baihaqi Syamsuaris	Non Epilepsy					
21	215975	Ahmad Gaza Al-Hammuri	Non Epilepsy					
22	215768	Aghina Aina Azfar	Non Epilepsy					
23	216699	Andi Shamum Kayla Azzahra	Non Epilepsy					
24	207488	Muh.Raisa Athillah adha	Non Epilepsy					
25	216187	Assyami Radhiyah Yumas	Non Epilepsy					
26	216401	Alfiana Ziya Waldiansyah	Non Epilepsy					
27	136247	Ainunnya Fathiyah Akbar	Non Epilepsy					
28	215884	Fathimah Azzahra Darmawan	Non Epilepsy					
29	189334	Nur aini fatma mutala lia	Non Epilepsy					
30	215176	Ayatul Husna	Non Epilepsy					
31	178931	Kasya Ayu Saffiri	Non Epilepsy					
32	211461	Muh.Zein Al Varendra A	Non Epilepsy					
33	204181	Muhammad qinawa aqalqurami	Non Epilepsy					
34	215822	Arifan	Non Epilepsy					
35	215953	Medina Zea Azzahra	Non Epilepsy					
36	215955	Muhammad Athaya AL qarnic	Non Epilepsy					
37	192973	Maisuri AB	Non Epilepsy					
38	212330	Muhammad Rayhan Idrus	Non Epilepsy					
39	215773	Ian Rahmat Adila	Non Epilepsy					
40	214867	Muh Adha Rayhan Shakeil R	Non Epilepsy					
41	216092	Khusnu Khotimah	Non Epilepsy					
42	219194	Abdul Aziz Al-Miswar	Non Epilepsy					
43	214309	Sri Aldariani	Non Epilepsy					
44	216308	Moh Angga Adiawan	Non Epilepsy					
45	216371	Najwa Aviena	Non Epilepsy					
46	214750	Muhammad Fatir Ramadhan	Non Epilepsy					
47	210852	Muhammad yusuf Hendra	Non Epilepsy					
48	215895	Shawqi Muhammad Hafidzan	Non Epilepsy					
49	215930	Zea Khayra	Non Epilepsy					

26	210401 Alfiana Ziya Waldiansyah	Non Epilepsy	
27	136247 Ainayya Fathiyah Abdur	Non Epilepsy	
28	215894 Fathimah Azzahra Darmawan	Non Epilepsy	
29	189334 Nur aini fatima mutala lia	Non Epilepsy	
30	215176 Ayatul Husna	Non Epilepsy	
31	178931 Kesya Ayu Safitri	Non Epilepsy	
32	211461 Muh.Zein Al Varentra A	Non Epilepsy	
33	204181 Muhammad qinawati oqalqurani	Non Epilepsy	
34	215822 Arfan	Non Epilepsy	
35	215953 Medina Zee Azrahra	Non Epilepsy	
36	215955 Muhammad Athaya Al qamie	Non Epilepsy	
37	192973 Muisari AB	Non Epilepsy	
38	212330 Muhammad Rayhan Idrus	Non Epilepsy	
39	215773 Ian Rahmat Adiba	Non Epilepsy	
40	214867 Muli Adha Kaylan Shakeil R	Non Epilepsy	
41	210092 Khuma Khotimah	Non Epilepsy	
42	219194 Abdul Aziz Al-Miswar	Non Epilepsy	
43	214309 Sri Aldariani	Non Epilepsy	
44	216308 Moh.Angga Adhawan	Non Epilepsy	
45	216371 Najwa Aviena	Non Epilepsy	
46	214750 Muhammad Fatir Ramodhan	Non Epilepsy	
47	210852 Muhammad yusuf Hendra	Non Epilepsy	
48	215895 Shawaqi Muhammad Hafidzan	Non Epilepsy	
49	215930 Zee Khayra	Non Epilepsy	
50	216284 Armani Khurramia Anief	Non Epilepsy	
51	215716 Erlangga Anwar Sulko	Non Epilepsy	
52	215290 Alnosyia faridah AAR	Non Epilepsy	
53	215883 Gibran almad AAR	Non Epilepsy	
54	212686 Qanita Ayesha Herman	Non Epilepsy	
55	214941 Muhammad Zam Hamizana	Non Epilepsy	
56	183664 Ahmad Rayyan	Non Epilepsy	
57	214996 Khumairah Syakila	Non Epilepsy	
58	213182 Muh Fahri Al Gilari	Non Epilepsy	
59	213679 Enoch Juliardi Darmasa	Non Epilepsy	
60	214573 Hafidza sboleha putri abdullah	Non Epilepsy	
61	212829 Harlayani Khuzumi Haziza	Non Epilepsy	
62	192254 Rafiqi Alfarizki	Non Epilepsy	
63	190872 Abizar Alimul Insan	Non Epilepsy	
64	208383 Kala jagadnata dewangga	Non Epilepsy	
65	175978 Rizky ramadhani	Non Epilepsy	
66	209087 Muhammad al baihaqi syamsuaris	Non Epilepsy	
67	215968 Abdul aziz ramadhani	Non Epilepsy	
68	216575 Muhammad iman haikar	Non Epilepsy	
69	195236 Muhammad ibrii satryadi	Non Epilepsy	
70	214996 Khumaira shakila	Non Epilepsy	
71	215074 Muhammad alby arlani	Non Epilepsy	
72	212630 Aisyah azzahra taufiq	Non Epilepsy	
73	215189 Muhammad arrazka firdaus	Non Epilepsy	
74	211761 Andi ahmad zaimul al ayyub	Non Epilepsy	
75	215816 Kahisa arda safwana	Non Epilepsy	
76			

30	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
31	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
32	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
33	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
34	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
35	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 ada asfiksia	1 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
36	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
37	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
38	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
39	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
40	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
41	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
42	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
43	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
44	tidak ada kejang demam	2 prematur	1 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
45	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
46	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
47	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
48	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 ada asfiksia	1 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
49	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
50	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
51	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
52	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
53	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
54	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
55	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
56	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
57	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
58	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
59	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
60	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 ada trauma kepala	1 tidak ada riwayat keluarga
61	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
62	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
63	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
64	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
65	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
66	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 ada asfiksia	1 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
67	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
68	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
69	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
70	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
71	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
72	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 ada asfiksia	1 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
73	tidak ada kejang demam	2 prematur	1 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
74	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
75	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga
76	tidak ada kejang demam	2 tidak prematur	2 tidak asfiksia	2 tidak trauma kepala	2 tidak ada riwayat keluarga

Selesai

anisa2 4

Sheet1	Sheet3	sheet2	Sheet4						
30	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
31	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
32	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
33	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
34	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
35	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	ada asfiksia	1	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
36	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
37	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
38	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
39	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
40	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
41	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
42	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
43	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
44	tidak ada kejang demam	2	prematu	1	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
45	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
46	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
47	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
48	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	ada asfiksia	1	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
49	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
50	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
51	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
52	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
53	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
54	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
55	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
56	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
57	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
58	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
59	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
60	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	ada trauma kepala	1	tidak ada riwayat keluarga
61	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
62	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
63	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
64	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
65	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
66	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	ada asfiksia	1	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
67	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
68	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
69	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
70	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
71	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
72	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	ada asfiksia	1	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
73	tidak ada kejang demam	2	prematu	1	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
74	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
75	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga
76	tidak ada kejang demam	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga

No	Nomor RM	Nama	Diagnose	Kejang demam	Riwayat kelahiran prematur	Riwayat Asfiksia	Trauma Kepala	Riwayat Penyakit Epilepsi Keluarga
1	200030	Muk Nur Maulana	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
2	181237	Dhikriyah Thaqifah nou	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
3	193243	Cetsya Almahyza	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
4	179161	Almeera Putri Maulana	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
5	187053	Ayska hamas nurafar	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
6	200502	Nidal Syameis Reza	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
7	172209	An.Joshua Noel Mabalette	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
8	200445	Reza prawira segara rasnain R	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
9	186946	Aereha Bilqis Ricenza	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
10	185572	Sergio bustian jumpang	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
11	172890	Dzaki haidar	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
12	168802	An.Audi M Tsaqib Mappakaya	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
13	201093	Dovya Arayilla Muthia	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
14	155726	Adel Aulia Putri	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
15	160729	Syifa dwi ardalia	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
16	174433	An.Bryn deven tryananda	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
17	204639	Andi indira arraya defina	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
18	150447	An.Audhia ifina assyabiya	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
19	165654	An.Queen Itasya putri amalia	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
20	215265	Altha Khumara	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
21	185253	Muhammad Al zayan ahidqi	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
22	191119	Aqilah Mashe rafiqah	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
23	170352	IRSAN	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
24	168758	Najwa Insyirah	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
25	170736	Mukliran hakeem	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
26	214896	Andi Rayyan hidayatullah	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
27	171190	An.Juan candra resa	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
28	181956	Wulan Ramadani	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
29	108705	Syekh abdul azlan qadafi	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
30	213199	Suhaila putri kahar ode	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
31	206170	lensayus olvino	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
32	122380	An. Andrey arsalwin	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
33	210080	Rezki fahizah	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
34	174433	An. Bryn deven tryananda	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
35	172209	An. Joshua noel mabalette	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
36	188611	Charles henrymal	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
37	168761	Muhammad firhan abqary	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
38	185572	Sergio bustian jumpang	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
39	200927	M inah nabil a	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
40	152779	Yethiyo kyreion noya	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
41	280453	Rafifah	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
42	180723	By ny sadriana	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
43	171190	An.Juan candra resa	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-
44	204009	Nanda fajrannisa kahar	Epilepsy,unspecified	+	-	-	-	-

MAKASSAR

45	181956	Wulan Ramadani	Epilepsy,unspecified							
46	187053	Asyka hanun nursafar	Epilepsy,unspecified							
47	209122	Khalizah syakirah jahja	Epilepsy,unspecified							
48	204425	Muh nur azhar	Epilepsy,unspecified							
49	172890	Dzaki haidar	Epilepsy,unspecified							
50	181273	Dzikriyah Thaqifah nou	Epilepsy,unspecified							
51	201993	Divya Arsyilla Mulia	Epilepsy,unspecified							
52	188802	An Anuli M Tsqib Mappukaya	Epilepsy,unspecified							
53	168758	Nijana Inayirah	Epilepsy,unspecified							
54	204425	Muh nur azhar	Epilepsy,unspecified							
55	210072	binuang giovano sigar	Epilepsy,unspecified							
56	175640	An.egy zba nediva dnyra demiamas	Epilepsy,unspecified							
57	172890	Dzaki haidar	Epilepsy,unspecified							
58	210609	Nozra sabira	Epilepsy,unspecified							
59	168761	Muhammad farhan abqary	Epilepsy,unspecified							
60	160729	Syifa dwi ardela	Epilepsy,unspecified							
61	210213	Muhammad yuzid alghifari	Epilepsy,unspecified							
62	181565	Ahmad hilmi rahman	Epilepsy,unspecified							
63	185253	Muhammad Al zayan shidiq	Epilepsy,unspecified							
64	123380	An.andrey arsalvin	Epilepsy,unspecified							
65	210080	Rezki fahizah	Epilepsy,unspecified							
66	188611	Charles henrymal	Epilepsy,unspecified							
67	185572	Sargio bastian jumpang	Epilepsy,unspecified							
68	208435	Rafifah	Epilepsy,unspecified							
69	187053	Asyka hanun nursafar	Epilepsy,unspecified							
70	201993	Divya arsyilla mulia	Epilepsy,unspecified							
71	171190	An. juan candra resya	Epilepsy,unspecified							
72	174433	An.Bryn deven ryananda	Epilepsy,unspecified							
73	206170	lenasyus olvino	Epilepsy,unspecified							
74	108705	Syech ahdul aidin qadafi	Epilepsy,unspecified							
75	191839	Waode Atikah dzakyah rohmah	Epilepsy,unspecified							
76	205822	Zahira Pramudhita handi	Epilepsy,unspecified							

no	riwayat kejang demam	tabulasi	riwayat kelahiran prematur	tabulasi	riwayat asfiksia	tabulasi	riwayat trauma kepala	tabulasi	riwayat keluarga epilepsi	tabulasi
1	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
2	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
3	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
4	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
5	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
6	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
7	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
8	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
9	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		ada trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
10	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
11	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
12	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
13	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
14	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
15	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
16	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
17	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
18	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
19	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
20	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
21	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
22	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
23	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
24	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
25	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
26	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
27	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
28	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
29	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
30	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
31	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
32	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
33	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
34	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
35	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
36	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
37	tidak ada		prematuur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
38	tidak ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
39	tidak ada		tidak prematur		ada afeksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2
40	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		ada riwayat keluarga	1
41	ada		tidak prematur		tidak asfiksia		tidak trauma kepala		tidak ada riwayat keluarga	2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

44	tidak ada	2	prematurn	1	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
45	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
46	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
47	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
48	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
49	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	ada trauma kepala	1	tidak ada riwayat keluarga	2
50	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	ada trauma kepala	1	tidak ada riwayat keluarga	2
51	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
52	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
53	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
54	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	ada trauma kepala	1	tidak ada riwayat keluarga	2
55	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
56	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
57	tidak ada	2	prematurn	1	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
58	tidak ada	2	prematurn	1	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
59	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
60	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
61	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	ada trauma kepala	1	tidak ada riwayat keluarga	2
62	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
63	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
64	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
65	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
66	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
67	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
68	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	ada riwayat keluarga	1
69	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
70	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
71	tidak ada	2	tidak prematur	2	ada asfiksia	1	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
72	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
73	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	ada trauma kepala	1	tidak ada riwayat keluarga	2
74	tidak ada	2	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
75	ada	1	tidak prematur	2	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2
76	tidak ada	2	prematurn	1	tidak asfiksia	2	tidak trauma kepala	2	tidak ada riwayat keluarga	2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2) Hasil Analisis Univariat

Variabel	Frekuensi	
	n	%
Riwayat Kejang Demam		
a. Demam tinggi disertai kejang	33	21,7
b. Demam tinggi tanpa disertai kejang		

	119	78,3
Riwayat Kelahiran Prematur		
a. Lahir prematur	8	5,3
b. Tidak lahir prematur	144	94,7
Riwayat Asfiksia		
a. Ada riwayat asfiksia	9	5,9
b. Tidak ada riwayat asfiksia	143	94,1
Riwayat Trauma Kepala		
a. Ada riwayat trauma kepala	7	4,6
b. Tidak ada riwayat trauma kepala	145	96,4
Riwayat Keluarga Epilepsi		
a. Ada riwayat keluarga	24	15,8
b. Tidak ada riwayat keluarga	128	84,2
Kejadian Epilepsi pada anak		
a. Epilepsi pada anak usia 0-18 tahun	76	50,0
b. Tidak pernah terjadi epilepsi pada anak usia 0-18 tahun	76	50,0
Total	152	100,0

3) Hasil Analisis Bivaria

a. Kejang Demam

Riwayat Kejang Demam	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Ada riwayat kejang demam	33	21,7	0	0,0	33	21,7	0,000	0,566	0,465	0,689
Tidak ada riwayat kejang demam	43	28,3	76	50,0	119	78,3				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

b. Kelahiran prematur

Riwayat Kelahiran Prematur	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Lahir prematur	5	3,3	3	2,0	8	5,3	0,468	1,714	0,395	7,439
Tidak lahir prematur	71	46,7	73	48,0	144	94,7				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

c. Riwayat Asfiksia

Riwayat Asfiksia	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Ada riwayat asfiksia	3	2,0	6	3,9	9	5,9	0,303	0,497	0,115	1,992
Tidak ada riwayat asfiksia	73	48,0	70	46,1	143	94,1				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

d. Trauma kepala

Riwayat Trauma Kepala	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Ada riwayat trauma kepala	6	3,9	1	0,7	7	4,6	0,053	6,429	0,755	54,744
Tidak ada riwayat trauma kepala	70	46,1	75	49,3	145	95,4				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

e. Keluarga epilepsi

Riwayat Keluarga Epilepsi	Kasus		Kontrol		Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Ada riwayat keluarga	24	15,8	0	0,0	24	15,8	0,000	0,684	0,587	0,797
Tidak ada riwayat keluarga	52	34,2	76	50,0	128	84,2				
Total	76	50,0	76	50,0	152	100,0				

3) Hasil Analisis Multivariat

Variabel	Nilai <i>p-value</i>	OR	CI 95%
Riwayat Kejang Demam	0,000	0,566	0,465-0,689
Riwayat Keluarga Epilepsi	0,000	0,684	0,587-0,797

B. Etik



ALAUDDIN
MAKASSAR
Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.023/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Wa Ode Nur Anisah Hamzah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**" ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN EPILEPSI PADA ANAK DI
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN 2023 "**

**" ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR EPILEPSY IN CHILDREN
HASANUDDIN UNIVERSITY EDUCATIONAL HOSPITAL 2023 "**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 13, 2023 until December 13, 2024.

December 13, 2023
Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan
and Chairperson,

Dr. Istikomah, S.Si., M.Si., Apt.

C. Balitbangda



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **30030/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Direktur RS Pend. Universitas
Perihal : **Izin penelitian** Hasanuddin Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5297/Un.06/LP2M/PP.00.9/11/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **WA ODE NUR ANISAH HAMZAH**
Nomor Pokok : 70600120035
Program Studi : Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN EPILEPSI PADA ANAK DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 November s/d 31 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

A

D. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



RUMAH SAKIT UNHAS

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245

Website www.rs.unhas.ac.id Email info@rs.unhas.ac.id Telp: (0411) 591331 Fax: (0411) 591332

Nomor : 658/UN4.24.1.1/PT.01.05/2024 25 Januari 2024
Hal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Wa ode Nur Anisah Hamzah
NIM : 70600120035
Institusi : Universitas Islam Negeri Makassar

Telah menyelesaikan penelitian di Rumah Sakit Unhas.

Terhitung pada tanggal : 24 Januari 2024

Jenis Data Penelitian : Data Sekunder : Data Rekam Medis

Dalam rangka penyusunan yang berjudul:

"Analisis faktor resiko kejadian Epilepsi pada anak"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Manajer Pendidikan dan Penelitian

dr. Aslim Taslim, Sp.Onk.Rad, M.Kes
NIP. 198304252012121003

A

E. Dokumentasi



ALAUDDIN
MAKASSAR

