

**KEANEKARAGAMAN DAN KELIMPAHAN  
GASTROPODA DI SUNGAI JE'NEBERANG  
KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**WAHDANIAR**  
60300112045

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
2016

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahdaniar  
NIM : 60300112045  
Tempat/Tgl. Lahir : Bone, 29 September 2014  
Jur/Prodi : Biologi  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Perumnas Antang Blok 1, No. 11, Makassar.  
Judul : Keanekaragaman dan Kelimpahan Gastropoda di Sungai  
Je'neberang Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Agustus 2016

**Penulis**

**WAHDANIAR**  
NIM. 60300112045

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara Wahdaniar, Nim 60300112045, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama memeriksa dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Keanekaragaman Dan Kelimpahan Gastropoda di Sungai Je’neberang”. Memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 1 Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Sitti Saenab S.Pd.M.Pd

Ar. Syarif Hidayat S.Si.M.kes

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Keanekaragaman Dan Kelimpahan Gastropoda Di Sungai Je’neberang” yang disusun oleh Wahdaniar, NIM: 60300112045, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 27 Syawal 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 1 Agustus 2016 M.  
27 Syawal 1437 H.

## DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Penguji I	: Dr. Ernawati S.Kaseng, M.P.	(.....)
Penguji II	: Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji III	: Dr. Thahir Maloko, M.Thi.	(.....)
Pembimbing I	: Sitti Saenab, S.Pd. M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Ar. Syarif Hidayat, S.Si. M.Kes.	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 196912051993031001

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Keanekaragaman Dan Kelimpahan Gastropoda Di Sungai Je’neberang”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai sekarang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dan penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah sehingga peran dan partisipasi dari berbagai pihak sangat berarti dan berguna bagi penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besarku terkhusus kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku dan keluarga-keluarga yang telah memberikan Do’a, semangat, dukungan, dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan studi perkuliahan.
2. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. , selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi dan Baiq Farhatul Wahida, S.Si., M.S.i., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
5. Sitti Saenab S.Pd., M.Pd, dan Ar. Syarif Hidayat S.Si., M.Kes., selaku pembimbing I dan II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
6. Dr. Ernawati S. Kaseng, M.P, Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. dan Dr. Thahir Maloko, M.Thi. selaku penguji I, II, dan III, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Staf pengajar terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi.
8. Ibunda Dr. Cut Mutiadin, M.Si. yang telah menjadi motifasi bagi saya, dan telah memberikan dukungan dan doanya selama penyusunan skripsi.
9. Laboran Jurusan Biologi yang telah banyak membantu dalam identifikasi dan pengawetan spesies.

10. Teman-teman yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi, keluarga besar Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Kakanda Alumni IKA BIO FST UINAM
11. Spesial buat sahabat saya Zulhaeni, Muhammad Ikhsan Inzana, M. Fadjrin Adim, Akhmad Nur terima kasih banyak atas segala kenangan, dukungan, kebersamaan dan bantuannya.
12. Teman teman seperjuangan saya angkatan 2012 (Ranvier) terima kasih atas kenangan yang telah di ukir bersama selama berada di kampus dan terima kasih atas dukungan dan doanya.
13. Teman seperjuangan di HMJ PERIODE 2014/2015 suherman mulcheri, dewi kartika dan rezki yunita nasrul, terima kasih atas dukungannya dan hari-hari yang dilewati selama berlembaga.
14. Teman SMA NEG 1 SINJAI UTARA kelas EXPARATIVE terima kasih dukungan dan bantuanya selama penyusunan Skripsi.
15. Teman-teman dan Adik-adik yang telah membantu dalam pembuatan formalin dan turut serta dalam kegiatan penelitian, Rahmat Fajrin Alir, Rahmat Yusni, Nurman Marang, Mursalim, Andika Saputra, Wahyuni Mentari, Sutriana, Niyah Asmi Wahyuni dan Saenab.
16. Angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan dan doanya.
17. Terima kasih untuk Lactéal yang telah banyak memberikan bantuan mulai dari tahap awal penyusunan skripsi sampai tahap akhir dan telah memberikan dukungan dan doanya.

18. Terima kasih kepada teman-teman KKNP dan keluarga besar Balai Besar Veteriner Maros yang memberikan banyak pelajaran sebagai melaksanakan KKNP.

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin.

Makassar, 1 Agustus 2016.  
**Penulis**

**WAHDANIAR**  
NIM. 60300112045

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Keanekaragaman.....	8
B. Tinjauan Umum Kelimpahan.....	11
C. Tinjauan Umum Sungai Je'neberang .....	11
D. Ekosistem Perairan Sungai .....	13
E. Tinjauan Umum Gastropoda	
1. Morfologi .....	21
2. Anatomi.....	23

3. Fisiologi.....	25
F. Fungsi dan Peranan Gastropoda dalam Ekosistem	
1. Fungsi Ekologis .....	29
2. Fungsi Ekonomis .....	30
G. Tinjauan Umum Faktor Lingkungan	
1. Suhu .....	31
2. Salinitas.....	31
3. PH .....	32
4. Intensitas Cahaya .....	32
H. Tinjauan Umum Indeks Ekologi	
1. Indeks Keanekaragaman .....	33
2. Indeks Keseragaman .....	34
3. Indeks Dominansi .....	34
I. Ayat yang berkaitan.....	36
J. Kerangka Fikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Populasi Dan Sampel	
1. Populasi .....	38
2. Sampel.....	38
C. Variabel Penelitian .....	38
D. Definisi Operasional Variabel.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Penelitian .....	39
G. Prosedur Kerja.....	40
H. Tehnik Dan Pengolahan Dan Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
B. Pembahasan .....	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kategori indeks keanekaragaman jenis ( $H'$ ).....	33
Tabel 2.2 Kategori indeks keseragaman (E) .....	34
Tabel 2.3 Kategori indeks dominansi ( D) .....	35
Tabel 4.1 Keanekaragaman Gastropoda pada stasiun I,II, dan III .....	43
Tabel 4.2 Indeks ekologi meliputi keanekaragaman, keseragaman dan dominansi pada stasiun I.II Dan III .....	45
Tabel 4.3 Hasil parameter Fisika Kimia di sungai Je'neberang .....	47

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Wilayah daerah sungai Je'neberang .....	13
Gambar 2.2 Morfologi Gastropoda.....	23
Gambar 2.3 Anatomi Gastropoda .....	24
Gambar 3.1 Titik pengambilan sampel .....	41
Gambar 4.1 Diagram perbandingan spesies tiap stasiun.....	44
Gambar 4.2 Diagram perbandingan nilai indeks ekologi .....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perhitungan indeks ekologi stasiun 1 .....	62
Lampiran 2. Perhitungan indeks ekologi stasiun II .....	62
Lampiran 3. Perhitungan indeks ekologi stasiun III .....	62
Lampiran 4 Perhitungan indeks ekologi stasiun I,II dan III.....	62
Lampiran 5. Hasil pengamatan faktor lingkungan .....	63
Lampiran 6. Peta penelitian sungai Je'neberang .....	63
Lampiran 7. Peta titik pengambilan sampel sungai Je'neberang.....	64
Lampiran 8. Deskripsi sungai Je'neberang .....	64
Lampiran 9. Gambar hasil penelitian.....	65
Lampiran 10. Dokumentasi penelitian sungai Je'neberang .....	66

## ABSTRAK

**Nama : WAHDANIAR**  
**Nim : 60300112045**  
**Jurusan : Biologi**  
**Fakultas : Sains dan Teknologi**

---

Sungai Je'neberang merupakan sungai yang terletak di Kabupataen Gowa yang memiliki keanekaragaman hayati seperti mollusca yang terdiri dari Gastropoda dan Bivalvia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keanekaragaman Dan Kelimpahan Gastropoda di Sungai Je'neberang. Pengambilan sampel dilakukan di tiga titik stasiun yaitu stasiun I Limbah Domestik, stasiun II Penambangan Pasir dan stasiun III Muara Sungai. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2016, dengan menggunakan metode *Line transect*. Parameter yang diukur meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi. Dari hasil penelitian pada 3 stasiun ditemukan 7 spesies Gastropoda dengan indeks Keanekaragaman yang tergolong rendah dengan jumlah yaitu 1,792, sedangkan indeks Dominansi juga tergolong rendah dengan jumlah yaitu 0,178.

Kata kunci: Keanekaragaman jenis Gastropoda, metode *Line Transect* (Transek garis), dan sungai je'neberang.

## ABSTRACT

**Nama : WAHDANIAR**  
**Nim : 60300112045**  
**Jurusan : Biologi**  
**Fakultas : Sains dan Teknologi**

---

Je'neberang River is a river located in Gowa biodiversity such as molluscs consists of gastropods and bivalves. This study aims to determine the diversity and abundance of gastropods in Je'neberang River. Sampling was carried out at three points, namely stations Domestic Waste station I, station II and station III Sand Mining estuary. This study was conducted in January 2016, using line transect. Parameters measured include parameters of physics, chemistry, and biology. From the results of the study at 3 stations found seven species of gastropods with the diversity index is low with the number that is 1,792, while the dominance index is also low with the number is 0.178.

Keywords: diversity of gastropods, method Line Transect (transect line), and the river je'neberang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Sungai Je'neberang merupakan sungai yang terletak di wilayah kabupaten Gowa dan sebagian berada pada bagian selatan wilayah kota Makassar, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan.1 Sungai Je'neberang yang memiliki panjang 75 km dengan luas pengalirannya 727 km<sup>2</sup> bersumber dari Gunung Bawakaraeng. Sungai ini sering meluap pada saat musim hujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Januari. Kondisi yang paling parah terjadi pada tahun 1976 hampir 2/3 kota Makassar tergenang. Air genangan ini berasal dari meluapnya air sungai Je'neberang di daerah bagian hilir jembatan Sungguminasa, dan saluran saluran *drainase* seperti Sinrijala, Jongala, dan Panampu tidak memadai dalam menampung luapan air, disisi lain pada musim kemarau tidak mampu memenuhi kebutuhan irigasi dan air minum masyarakat ( Sandy, 2000).

Keanekaragaman hayati pada sungai Je'neberang tergolong baik, keberadaan sungai Je'neberang memberikan asupan air bagi masyarakat sekitar, juga dapat dijadikan sarana transportasi sekaligus sumber air bagi pertanian dan kehidupan sekitarnya. Selain dari airnya yang digunakan sebagai asupan masyarakat untuk pertanian sungai Je'neberang juga menyimpan kekayaan ekosistem seperti

Gastropoda yang digunakan masyarakat sekitar sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar (Fahmi: 2006).

Gastropoda adalah hewan invertebrata yang melakukan aktifitas lokomosi dengan menggunakan perutnya sebagai kaki. kelas Gastropoda umumnya lebih dikenal dengan sebutan siput atau keong. Tubuh Gastropoda sangat bervariasi. Gastropoda memiliki cangkang tunggal berulir, kepala yang berkembang baik, dilengkapi dengan tentakel dan mata. Kaki lebar dan berotot untuk merayap dan mendukung massa visceral. Habitat Gastropoda bervariasi, dari yang sangat dekat dengan permukaan air hingga jauh dari permukaan air, kecendrungan dan aktifitas Gastropoda sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut dan keberadaan makanannya. Penyebaran hewan didasarkan pada dua faktor. Pertama faktor makanan, hewan cenderung akan tinggal di suatu daerah dimana mereka dapat dengan mudah mendapatkan makanan. Faktor kedua adalah faktor *barrier*. Barrier sangat mempengaruhi persebaran suatu populasi karena barrier atau rintangan ini akan menghambat kelangsungan hidup individu atau bahkan populasi tersebut (Laria, 2016).

Gastropoda memiliki peranan penting dalam mekanisme daur hidup ulang dan perputaran hara dan kandungan hayati perairan. Gastropoda mempunyai peranan yang penting baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun ekologi. Dari segi ilmu pengetahuan keanekaragaman biota laut merupakan laboratorium alami yang menarik untuk dipelajari dan dikaji secara mendalam, sedangkan bila di pandang dari segi ekonomi Gastropoda mempunyai nilai jual, seperti *cypraea*, dimana cangkangnya

digunakan untuk hiasan yang harganya mahal. Selain itu, beberapa Gastropoda juga dapat berperan sebagai sumber bahan makanan karena nutrient, seperti *Cymbiola* yang dagingnya diambil untuk konsumsi, *Haliotis* selain sebagai lauk abalone telah di ekstrak dan dibuat sebagai bahan makanan. Oleh karena itu keberadaan Gastropoda perlu kita jaga lestariannya sehingga keanekaragaman dan kelimpahan jenis Gastropoda tersebut dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, sedangkan dari segi ekologi Gastropoda berperan sebagai konsumen, seperti : *Cellana radiata* (Pechenik : 2000).

Dalam Firman Allah QS Al- Baqarah / 2:164 mengatakan, sebagai berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah swt, yaitu Allah menurungkan air dari langit dan dengan air itu Allah hidupkan bumi yang sudah kering dan hewan- hewan yang mampu hidup di dalam air, misalnya Gastropoda yang akan menjadi bahan penelitian (Shihab: 2009).

Tingginya aktifitas manusia dalam memanfaatkan lingkungan perairan pantai dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan perairan tersebut. Selain itu kualitas ekosistem perairan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang berpengaruh diantaranya adalah produsen sebagai sumber makanan dan adanya predator, sedangkan faktor abiotik adalah fisika kimia air antaranya suhu, pH, salinitas, serta substrat hidup ( Setyobudiandi, 2014).

Beberapa jenis Gastropoda juga merupakan keong yang bernilai ekonomis tinggi karena cangkangnya diambil sebagai bahan untuk perhiasan dan cendramata, sedangkan dagingnya merupakan makanan yang lezat, seperti beberapa jenis keong dari suku Strombidae, Cypraeidae, Olividae, Conidae, dan Tonnidae (Mudjiono, 2009).

Mengingat begitu pentingnya informasi tentang pemanfaatan Gasropoda terhadap masyarakat, maka perlu dilakukan penelitian tentang Keanekaragaman dan kelimpahan Gastropoda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan alam kita terutama keanekaragaman dan kelimpahan Gastropoda di Sungai Je'neberang ( Retno,dkk : 2011).

### ***B. Rumusan Masalah***

- 1) Bagaimanakah tingkat keanekaragaman gastropoda yang ada di perairan sungai Je'neberang?
- 2) Bagaimanakah kelimpahan gastropoda yang ada di perairan sungai Je'neberang?

### ***C. Ruang Lingkup Penelitian***

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah penelitian ini berlokasi di perairan sungai Je'neberang yang berada di kabupaten Gowa. Sedangkan Parameter yang diukur meliputi parameter fisika (suhu dan kecerahan), kimia (pH dan oksigen terlarut), sedangkan biologi (Gastropoda).

Pengambilan sampel hanya dilakukan pada tiga titik yaitu Stasiun 1 (limbah domestik), Stasiun 2 (penambangan pasir), Stasiun 3 (muara sungai) di perairan sungai Je'neberang, Pengambilan sampel dilakukan dengan tiga kali pengulangan selama satu hari.

### ***D. Kajian Pustaka***

Nurlinda (2013) dalam penelitiannya yaitu Studi Keanekaragaman Gastropoda Di perairan Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang mengungkapkan spesies Gastropoda yang memiliki jumlah individu yang banyak pada stasiun *Faunus Ater* sebanyak 337 jumlah individu. Pada stasiun ini jumlah individu setiap spesies sangat sedikit jika di bandingkan dengan stasiun yang memiliki banyak mangrove karena stasiun yang tidak ditumbuhi mangrove atau memiliki substrat pasir yang kurang mendukung kehidupan Gastropoda sehingga sumber nutrient dan bahan makanannya sangat kurang.

Sartika (2012) dalam penelitiannya yaitu Distribusi Dan Keanekaragaman Gastropoda Di Perairan Puntondo Kabupaten Takalar memiliki tingkat keanekaragaman yang rendah. Rendahnya keanekaragaman yang diperoleh pada penelitian ini di sebabkan karena terdapat beberapa spesies tertentu yang mendominasi dalam komunitas tersebut dan jumlah tiap spesies tidak merata sehingga nilai indeks keanekaragaman yang diperoleh pada penelitian ini tergolong rendah.

Abdul Wahab (2011) dalam penelitiannya yaitu Komposisi Fitoplankton di Perairan Sungai Je'neberang Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan pada penelitian ini di dapatkan 30 jenis fitoplankton di sungai Je'neberang dan paling banyak jenis fitoplankton di dapatkan di daerah hulu sungai Je'neberang dan paling sedikit di hilir sungai Je'neberang.

Ahmad Ashar Abbas (2014) dalam penelitiannya yaitu "Biodiversitas Gastropoda Epifauna di Kawasan Mangrove Perairan Bontolebang Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan" pada penelitian ini mangrove perairan Desa Bontolebang ditemukan 5 jenis gastropoda yang terdiri 3 famili. Spesies gastropoda didominasi oleh *Littorina scabra*. Indeks keanekaragaman jenis pada indeks biologi tergolong rendah masing-masing stasiun berkisar antara 0 – 0,35. Kisaran nilai ini tergolong rendah, menunjukkan keanekaragaman jenis Gastropoda tergolong rendah, sebagai indikasi adanya tekanan ekologi yang berat. Kondisi di mangrove perairan desa Bontolebang tidak stabil.

### ***E. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat keanekaragaman Gastropoda yang ada di perairan sungai Je'neberang.
- 2) Untuk mengetahui tingkat kelimpahan Gastropoda yang ada di perairan sungai Je' neberang

### ***F. Kegunaan Penelitian***

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat terutama sekitar perairan sungai je'neberang tentang keanekaragaman Gastropoda yang ada di perairan tersebut.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Keanekaragaman***

Keanekaragaman adalah gabungan antara kekayaan jenis dan pemerataan dalam satu nilai tunggal atau sebagai jumlah jenis diantara jumlah total individu dari seluruh jenis yang ada. Keragaman jenis dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas dan dapat digunakan untuk mengukur stabilitas komunitas, yaitu kemampuan suatu komunitas untuk menjaga dirinya tetap stabil meskipun ada gangguan terhadap komponen-komponennya (Christine, 2013).

Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman yang tinggi jika komunitas tersebut disusun oleh banyak spesies dengan kelimpahan spesies sama dan hampir sama. Sebaliknya jika suatu komunitas disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya sedikit spesies yang dominan maka keanekaragaman jenisnya rendah. Keanekaragaman yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas yang tinggi. Komunitas yang tua dan stabil akan mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi. Sedangkan suatu komunitas yang sedang berkembang pada tingkat suksesi mempunyai jumlah jenis rendah daripada komunitas yang sudah mencapai klimaks. Komunitas yang memiliki keanekaragaman yang tinggi lebih tidak mudah terganggu oleh pengaruh lingkungan. Jadi dalam suatu komunitas dimana keanekaragamannya tinggi akan terjadi interaksi spesies yang

melibatkan transfer energi, predasi, kompetisi dan niche yang lebih kompleks ( Resosoedarmo, 2006).

Keanekaragaman jenis adalah merupakan variasi organisme yang ada di bumi. Jenis merupakan suatu organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya dan merupakan gabungan individu yang mampu saling kawin di antara sesamanya secara bebas (tetapi tidak dapat melakukannya dengan jenis lain), untuk menghasilkan keturunan yang fertil (subur). Jenis itu terbentuk oleh kesesuaian kandungan genetik yang mengatur sifat-sifat kebakaan dengan lingkungan tempat hidupnya. Karena lingkungan tempat hidup jenis itu beranekaragam, jenis yang dihasilkannya pasti akan beranekaragam pula. Proses terjadinya jenis, pada umumnya berlangsung secara perlahan-lahan dan dapat memakan waktu ribuan tahun, melalui perubahan penyesuaian atau evolusi jenis lain yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, jenis yang terjadi ini juga mempunyai peluang untuk menjelmakan jenis-jenis yang lain. Ada enam faktor yang menentukan perubahan keanekaragaman jenis organisme dalam satu ekosistem yaitu waktu, heterogenitas ruang, persaingan, pemangsaan, stabilitas lingkungan dan produktivitas. Selama kurun waktu geologis akan terjadi perubahan keadaan lingkungan yang mengakibatkan banyak individu yang tidak dapat mempertahankan kehidupannya, tetapi ada juga kelompok-kelompok individu yang mampu bertahan hidup terus dalam waktu relatif lama sebagai hasil proses evolusi. Evolusi dapat diartikan sebagai proses yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat populasi spesies dari waktu ke waktu berikutnya ( Heddy, 2009).

Keanekaragaman jenis menunjuk seluruh jenis pada ekosistem. Keanekaragaman jenis dapat pula diartikan sebagai jumlah jenis dan jumlah individu dalam satu komunitas. Jadi keanekaragaman jenis adalah menunjuk pada jumlah jenis dan jumlah individu setiap jenis (Desmukh, 1992).

Keanekaragaman jenis, meliputi flora dan fauna. Beranekaragaman jenis memiliki perilaku, strategi hidup, bentuk, rantai makanan, ruang dan juga ketergantungan antar jenis satu dengan yang lainnya. Adanya keanekaragaman yang tinggi akan menghasilkan kestabilan lingkungan yang mantap. Keanekaragaman ekosistem, berupa plasma nutfah bersama lingkungannya, keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman hayati yang paling kompleks, berbagai keanekaragaman ekosistem yang ada di Indonesia misalnya ekosistem hutan dan pantai, hutan payau (mangrove), hutan tropika basah, terumbu karang, dan beberapa ekosistem pengunungan, perairan darat maupun lautan. Pada setiap ekosistem terdapat berbagai jenis organisme, baik flora maupun fauna, dan mereka memiliki tempat hidup yang unik (Budi, 2011).

Ada dua komponen keanekaragaman jenis yaitu kekayaan jenis dan kesamarataan. Kekayaan jenis adalah jumlah jenis dalam suatu komunitas. Kekayaan jenis dapat di hitung dengan indeks jenis atau area yakni jumlah jenis per satuan area. Kesamarataan atau akuitabilitas adalah pembagian individu yang merata diantara jenis. Namun pada kenyataan setiap jenis itu mempunyai jumlah individu yang tidak sama. Satu jenis dapat diwakili oleh 100 hewan, yang lain oleh 10 hewan dan ketiganya

diwakili oleh 1 hewan. Kesamarataan menjadi maksimum bila semua jenis mempunyai jumlah individu yang sama atau rata (Soegianto, 1994).

### ***B. Tinjauan Umum Kelimpahan***

Kelimpahan merupakan banyaknya individu dari satu spesies dalam satuan meter kuadrat. Kelimpahan suatu vegetasi dipengaruhi oleh frekuensi, kerapatan dan dominasi jenis. Frekuensi suatu jenis menunjukkan penyebaran suatu jenis dalam suatu areal. Jenis yang menyebar secara merata akan mempunyai nilai frekuensi yang besar. Kerapatan suatu jenis menunjukkan nilai yang menggambarkan seberapa banyak atau jumlah jenis per satuan luas. Semakin besar nilai kerapatan jenisnya maka semakin banyak jumlah individu yang berada dalam satuan luas tersebut. Dominasi suatu jenis merupakan nilai yang menggambarkan penguasaan jenis tertentu terhadap jenis-jenis lain dalam komunitas tersebut. Semakin besar nilai dominasi suatu jenis maka besar pula pengaruh penguasaan jenis tersebut terhadap jenis yang lain (Krebs, 2000).


### ***C. Tinjauan Umum Sungai Je'neberang***

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bagian muka bumi, yang airnya mengalir ke dalam sungai yang bersangkutan apabila hujan jatuh. DAS adalah suatu tempat dengan pembatasan fisik berupa pegunungan dimana air hujan yang jatuh tepat berada pada daerah yang dibatasi oleh pegunungan dan memberi dampak terhadap pegunungan tanah di sekitarnya. Daerah aliran sungai terdapat karakteristik yang diperoleh dari air hujan yang jatuh terhadap penggunaan tanah. Hal ini dicirikan pada daerah aliran sungai Je'neberang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Karakteristik yang mencolok tentu saja terhadap lahan pertanian dimana air dibutuhkan dalam aktivitas ini. Keberadaan sungai ini selain memberikan asupan air bagi masyarakat sekitar, juga dapat dijadikan sebagai prasarana transportasi (Sandy, 1996).

Sungai Je'neberang merupakan sungai besar yang terletak di wilayah Kabupaten Gowa dan sebagian berada pada bagian selatan wilayah Kota Makassar, ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai ini berasal dan mengalir dari bagian timur gunung Bawakaraeng (2,833 mdpl) dan gunung Lompobattang (2,876 mpdl) yang kemudian menuju hilirnya di Selat Makassar. Pada daerah aliran sungai Je'neberang, terdapat dua daerah penampungan air (*reservoir*) utama yaitu di Kota Bili-bili dan Jenelata. Secara geografis daerah aliran sungai Je'neberang terletak pada  $119^{\circ} 23' 50''$  BT –  $119^{\circ} 56' 10''$  LS dengan panjang sungai utamanya 78,75 kilometer. Daerah Aliran Sungai Je'neberang dialiri oleh satu sungai pendukungnya (anak sungai) yaitu Sungai Jenelata (220 km<sup>2</sup>). Kota-Kota besar yang diliputi daerah aliran sungai ini selain Makassar yaitu Kota Malino, Kota Bili-bili, dan Kota Sungguminasa. Pada peta geologi daerah aliran sungai Je'neberang dapat ditemukan bahwa di bagian barat atau hilir terdapat deposit dari *aluvial*. Hal ini dikarenakan daerah hulu sungai dengan ketinggian sekitar 0-3 meter dari permukaan air laut. Deposit *aluvial* ini merupakan jenis batuan yang dominan berada pada hilir Daerah Aliran Sungai Je'neberang. Bagian timur daerah aliran sungai Je'neberang merupakan batuan vulkanik yang berasal dari zaman holosen. Dimana penggunaan lahan pada daerah tengah ini merupakan hutan yang berfungsi sebagai penahan

longsor untuk wilayah-wilayah di bagian hilir dari daerah aliran sungai Je'neberang ini (Sandy, 1997).



Gambar 2.1. Wilayah Daerah Sungai Je'neberang

#### D. Ekosistem Perairan Sungai

Air merupakan sumberdaya alam yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumberdaya air harus dilindungi agar dapat tetap dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup lain. Air sebagai media bagi kehidupan organisme air, bersama dengan substansi lain (biotik dan abiotik)

akan membentuk suatu ekosistem perairan. Perairan umum tawar alami dikenal sebagai sungai, rawa, dan danau. Perairan sungai merupakan suatu perairan yang di dalamnya dicirikan dengan adanya aliran air yang cukup kuat, sehingga digolongkan ke dalam perairan mengalir (perairan lotik). Perairan sungai biasanya keruh, sehingga penetrasi cahaya ke dasar sungai terhalang. Pada perairan sungai biasanya terjadi pencampuran massa air secara menyeluruh dan tidak terbentuk stratifikasi vertikal kolom air seperti pada perairan lentik. Sungai dicirikan oleh arus yang searah dan relatif kencang, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim, dan pola aliran air. Kecepatan arus, erosi, dan sedimentasi merupakan fenomena yang umum terjadi di sungai sehingga kehidupan flora dan fauna pada sungai sangat dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut ( Wijaya, 2009).

Sungai merupakan perairan umum dengan pergerakan air satu arah yang terus menerus. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi biota air yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sungai juga merupakan sumber air bagi masyarakat yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kegiatan, seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, sumber mineral, dan pemanfaatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap sumberdaya air, di antaranya adalah menurunnya kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi makhluk hidup yang bergantung pada sumberdaya air, Perairan mengalir mempunyai corak tertentu yang secara jelas membedakannya dari air tergenang walaupun keduanya merupakan habitat air. Satu perbedaan dasar antara danau dan sungai

adalah bahwa danau terbentuk karena cekungannya sudah ada dan air mengisi cekungan itu, tetapi danau itu setiap saat dapat terisi oleh endapan sehingga menjadi tanah kering. Sebaliknya sungai terjadi karena airnya sudah ada, sehingga air itulah yang membentuk dan menyebabkan tetap adanya saluran selama masih terdapat air yang mengisinya (Ewusie, 1990).

Ekosistem perairan, baik perairan sungai, danau, maupun perairan pesisir dan laut merupakan himpunan integral dari komponen abiotik (fisika-kimia) dan biotik (organisme hidup) yang berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu struktur fungsional. Perubahan pada salah satu dari komponen tersebut tentunya akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem kehidupan yang ada di dalamnya ekosistem lotik atau sungai dibagi menjadi beberapa zona dimulai dengan zona *krenal* (mata air) yang umumnya terdapat di daerah hulu. Zona *krenal* dibagi menjadi *rheokrenal*, yaitu mata air yang berbentuk air terjun biasanya terdapat pada tebing-tebing yang curam, *limnokrenal*, yaitu mata air yang membentuk genangan air yang selanjutnya membentuk aliran sungai yang kecil dan *helokrenal*, yaitu mata air yang membentuk rawa-rawa. Selanjutnya aliran dari beberapa mata air akan membentuk aliran sungai di daerah pegunungan yang disebut zona *rithral*, ditandai dengan relief sungai yang terjal. Zona *rithral* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *epirithral* (bagian yang paling hulu), *metarithral* (bagian tengah dari zona *rithral*), dan *hyporithral* (bagian paling akhir dari zona *rithral*). Setelah melewati zona *hyporithral*, aliran sungai akan memasuki zona *potamal*, yaitu aliran sungai pada daerah-daerah yang relatif lebih landai dibandingkan dengan zona *rithral*. Zona

*potamal* juga dibagi menjadi tiga bagian yaitu *epipotamal* (bagian atas dari zona *potamal*), *metapotamal* (bagian tengah) dan *hypopotamal* (akhir dari zona *potamal*) (Fachrul, 2008).

### ***E. Tinjauan Umum Gastropoda***

Gastropoda berasal dari bahasa Yunani yang berarti kaki perut (*gaster* = perut; *pous* = kaki). Pada umumnya Gastropoda merupakan hewan yang lunak dan lambat pergerakannya, hewan Gastropoda bergerak atau berjalan dengan menggunakan kaki yang berada di perutnya. Kaki Gastropoda menyerupai flat yang digunakan untuk bergerak. Dan bagian bawah kakinya terdapat silia yang banyak mengandung sel kelenjar. Beberapa jenis keong berukuran kecil, yang hidup pada substrat lumpur dan pasir memerlukan pergerakan dengan bantuan dorongan dari silianya. Kelenjar dari kaki menguraikan saluran lender ketika spesies melakukan pergerakan ( Barnes, 1974).

Kelas Gastropoda merupakan kelas terbesar dari filum Mollusca yang memiliki 40.000 spesies atau 80% dari filum Mollusca. Di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 1.500 jenis hewan ini. Kelas Gastropoda lebih umum dikenal dengan sebutan keong atau siput, dan mempunyai ukuran yang relatif besar. Gastropoda merupakan kelas yang terpenting dari filum Mollusca, karena sebagian diantaranya merupakan sumber protein dan bernilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis Gastropoda dapat di makan. Kebanyakan siput laut memakan pelecypoda. Bekicot termasuk gastropoda yang merugikan pertanian ( Nontji, 1987).

Gastropoda yang berhabitat di Mangrove merupakan Gastropoda dari genus Littorina. Biasanya menempel di akar napas, daun, atau cabang. Littorina adalah hewan mikrofagus yang memakan detritus, sponge, alga, dan mikroorganisme tak bercangkang lainnya. Kecenderungan dan aktifitas Gastropoda sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut dan keberadaan makanan. persebaran hewan didasarkan atas dua faktor. Pertama faktor makanan, hewan cenderung akan tinggal di suatu daerah dimana mereka dapat dengan mudah mendapatkan makanan (wisnu, 1990).

Gastropoda mangrove memangsa hewan mikrofagus seperti detritus, sponge, alga, dan mikroorganisme tak bercangkang lainnya. Pada keadaan surut, mangsa-mangsa tersebut terdedah di permukaan substrat sehingga memudahkan Gastropoda untuk memangsanya. Seperti yang dikemukakan oleh Hesse (1947) faktor kedua yang menstimulus hewan untuk berlokomosi adalah faktor *barrier*. Saat keadaan surut, predator Gastropoda yang berupa kepiting sedang tidak aktif. Kepiting aktif pada sore dan malam hari, yaitu saat keadaan substrat berair karena kepiting adalah hewan yang berlokomosi dengan cara berenang dan berjalan. Gastropoda jantan akan menjaga betina ketika akan melakukan kopulasi. Gastropoda betina akan menghasilkan feromon seks yang akan dikenali oleh jantan. Gastropoda jantan mampu membedakan bekas jalur lendir atau mukus yang akan dihasilkan oleh betina atau jantan Gastropoda (rahmawati, 1990).

Pada keadaan surut, Gastropoda sangat aktif. Hal ini memberikan keterangan bahwa Gastropoda adalah hewan yang aktif di siang hari, yaitu pada saat surut.

Cahaya matahari merupakan sumber panas yang utama di perairan, karena cahaya matahari yang diserap oleh badan air akan menghasilkan panas di perairan, Sehingga cahaya matahari akan meningkatkan suhu perairan sehingga menjadi lebih hangat. Pada saat malam hari, suhu air menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suhu air saat siang hari. Suhu air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktifitas serta memacu atau menghambat perkembangbiakan organisme perairan. Suhu yang terlalu rendah mungkin akan membahayakan bahkan dapat menyebabkan hipotermik pada hewan yang berujung pada kematian ( Sugiarto, 2005).

Sebagai dalam firman Allah dalam QS Al-Maidah/5: 96 yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا  
 دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya:

*“Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut.sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kamu (menangkap) binatang buruan darat, selama kalian masih ihram. Dan bertakwalah kepada allah yang kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan.*

Maksud ayat tersebut yaitu binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti menggail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah : sungai, danau, kolam dan sebagainya. Ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya. Air yang dimaksud di sini bukan hanya air laut, namu juga termasuk hewan air tawar. Karena pengertian “ *al bahru al maa*” adalah kumpulan air yang

banyak. Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan “ yang di maksud dengan air dalam ayat tersebut adalah setiap air yang di dalamnya terdapat hewan air untuk diburu, baik itu di sungai maupun di kolam” (Al- Marigi : 1992).

Gastropoda merupakan kelas yang terbesar dari phylum Mollusca, dengan ciri-ciri:

- a. Hidup di air laut dan air payau.
- b. Rumahnya terdiri dari satu test yang berputar (terpilin) memanjang melalui satu sumbu.
- c. Tubuhnya terdiri dari kepala, kaki, dan alat pencernaan.
- d. Kepala dilengkapi dengan alat pengunyah yang disebut rongga mantel ( berfungsi sebagai insang pada air laut dan berfungsi sebagai paru-paru pada lingkungan darat).
- e. Arah putaran test gastropoda terdiri dari Dextral (searah jarum jam) dan Sinistral (berlawanan putaran jarum jam).

Gastropoda adalah Mollusca yang mengalami modifikasi dari bentuk bilateral simetri menjadi bentuk yang mengadakan rotasi (pembelitan). Di dalam pembelitan terjadi perubahan sudut  $80^\circ$  Gastropoda sebenarnya hewan air walaupun beberapa hidup di darat. Untuk menghindari kekeringan tubuh, hewan ini membuat cangkang dan cangkang inilah tempat hewan ini berteduh dalam keadaan merugikan. Cangkang akan ditutup dengan penutup yang disebut epiphragma. Beberapa Gastropoda ada yang parasit, yaitu ektoparasit di luar hospes, endoparasit di dalam hospes. Hewan ini pindah tempat dengan merayap (didarat). Proses merayap dilaksanakan oleh kaki

dengan dibantu oleh kelenjar yang menyebabkan tempat selalu basah. Bagian tubuh hewan ini yang peka terhadap rangsangan-rangsangan luar adalah kaki dan tentakel yang panjang, yang peka terhadap sinar dengan intensitas cahaya tertentu. Kebanyakan mencari makan di malam hari, sehingga mata disesuaikan pada sinar yang lembut (Jasin. 1984).

Beberapa Gastropoda dapat mengubah konsentrasi cairan dalam tubuh Gastropoda sesuai dengan kadar garam diluar tubuhnya. Hal ini menyebabkan Gastropoda merupakan penyusun utama fauna mangrove. Kehadiran jenis-jenis moluska yang tinggi terdapat pada jenis-jenis yang mudah menyesuaikan diri atau memiliki toleransi yang luas. Penyebaran mendarat dari laut kearah darat berlaku baik bagi jenis-jenis yang hidup sebagai epifauna maupun infauna. Dari jenis-jenis moluska yang ditemukan di daerah hutan mangrove, ada yang merupakan moluska asli mangrove, fakultatif dan molusca pendatang. Penyebaran susunan Gastropoda hutan mangrove dipengaruhi oleh kondisi substrat dan komposisi mangrove tempat habitatnya substrat berpasir yang berbatasan langsung dengan laut terbuka sangat disukai oleh jenis *littorina acabra-scabra*, sedangkan pottamidadae umumnya menempati bagian tengah dan belakang hutan mangrove (Rangan, 2007).

Gastropoda hidup di daerah pasang surut sampai kedalaman 6 meter dengan dasar berlumpur pasir yang banyak ditumbuhi alga. Gastropoda umumnya ditemukan di antara karang yang banyak tersedia bahan makanan atau pada daerah yang bias menjamin keberlangsungan hidupnya. Moluska yang hidup di laut umumnya ditemukan pada zona litoral atau di laut dangkal seperti *strombus*, *cyprea*, *Terebra*

dan lain-lain. selain gastropoda yang ditemukan pada perairan dangkal misalnya di terumbu karang yang masih mendapat suplai sinar matahari yang cukup banyak, ada pula ditemukan jenis Gastropoda pada perairan dalam seperti Haliotis asinina dengan kedalaman mencapai 300 m dimana alga masih dapat tumbuh (Nyabakken, 1998).

### ***1. Morfologi***

Gastropoda adalah hewan yang bertubuh lunak, berjalan dengan perut yang dalam hal ini disebut kaki. Gerakan Gastropoda disebabkan oleh kontraksi-kontraksi otot seperti gelombang, dimulai dari belakang menjalar ke depan. Pada waktu bergerak, kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah berjalan, sehingga jalannya meninggalkan bekas. Hewan ini dapat bergerak secara mengagumkan, yaitu memanjat ke pohon tinggi atau memanjat ke bagian pisau cukur tanpa teriris. Sebagian besar Gastropoda mempunyai cangkang (rumah) dan berbentuk kerucut terpilin (spiral). Bentuk tubuhnya sesuai dengan bentuk cangkang. Padahal waktu larva, bentuk tubuhnya simetri bilateral. Namun ada pula Gastropoda yang tidak memiliki cangkang, sehingga sering disebut siput telanjang (*vaginula*). Hewan ini terdapat di laut dan ada pula yang hidup di darat. Gastropoda ini menggondong cangkang, kakinya besar untuk merayap di batu atau menggedup pasir atau lumpur. Pada kelas hewan ini telah terjadi reduksi beberapa organ tubuh untuk menyesuaikan ukuran cangkangnya, seperti mereduksi satu ginjal dan beberapa jenis sudah mereduksi menjadi satu insang (Pechenik : 2000).

Gastropoda ini merupakan kelompok molusca yang telah berhasil menduduki berbagai habitat. Terdapat di darat, perairan tawar, dan yang terbanyak yaitu di laut. Bentuk tubuhnya beraneka ragam. Terdapat lebih dari 60.000 spesies hidup dan 15.000 spesies fosil. Dalam banyak hal, Gastropoda hanya mengalami sedikit perubahan dari bentuk nenek moyangnya. Modifikasi yang nyata adalah torsi. Torsi adalah peristiwa memutarnya cangkang beserta mantel, rongga mantel dan masa visceral ke arah berlawanan arah jarum jam terhadap kaki dan kepala. Torsi bukanlah hipotesa evolusi sebab dapat dibuktikan dengan perkembangan embrio Gastropoda hidup (Sugiarti , 2005).

Morfologi Gastropoda terwujud dalam morfologi cangkangnya. Sebagian besar cangkangnya terbuat dari bahan kalsium karbonat yang di bagian luarnya dilapisi periostrakum dan zat tanduk. Cangkang Gastropoda yang berputar ke arah belakang searah dengan jarum jam disebut dekstral, sebaliknya bila cangkangnya berputar berlawanan arah dengan jarum jam disebut sinistral. Siput-siput Gastropoda yang hidup di laut umumnya berbentuk dekstral dan sedikit sekali ditemukan dalam bentuk sinistral (Dharma, 1988).



Gambar 2.2 Morfologi Gastropoda  
(Bengen, 2004).

## 2. Anatomi

Bentuk cangkang, siput pada umumnya seperti kerucut dari tabung yang melingkar seperti konde (gelung). Puncak kerucut merupakan bagian yang tertua, disebut apex. Gelung terbesar disebut body whorl dan gelung kecil-kecil di atasnya disebut spire (ulir). Diantara bibir dalam dan gelung terbesar terdapat umbilicus yaitu ujung columella, yang berupa celah sempit sampai lebar dalam. Apabila umbilicus tertutup, maka cangkang disebut imperforate (Hickman, 1989).

Cangkang Gastropoda terdiri atas 4 lapisan. Paling luar adalah periostraktum, yang merupakan lapisan tipis terdiri dari bahan protein seperti tanduk, disebut conchiolin atau conchin. Pada lapisan ini terdapat endapan pigmen beraneka warna, yang menjadikan banyak cangkang siput terutama spesies laut sangat indah warnanya, kuning, hijau cemerlang dengan bercak – bercak merah dan garis garis cerah.

a. Kepala


Pada kepala terdapat sepasang alat peraba yang dapat dipajang pendekan. Pada alat peraba ini terdapat titik mati untuk membedakan terang dan gelap. Pada mulut terdapat lidah parut dan gigi rahang.

b. Badan

Didalam badanya terdapat alat-alat penting untuk hidupnya diantaranya ialah alat pencernaan, alat pernafasan serta alat genetalis untuk pembiakanya. Saluran pencernaan terdiri dari atas mulut, pharynx yang berotot, kerongkongan, lambung, usus, dan anus.

c. Alat gerak

Alat gerak mengeluarkan lender, untuk memudahkan pergerakanya. Cangkang gastropoda terdiri atas 4 lapisan. Paling luar adalah periostraktum, yang merupakan lapisan tipis terdiri dari bahan protein seperti zat tanduk.



Gambar 2.3 Anatomi Gastropoda  
(Bengen, 2004).

### 3. Fisiologi

#### a. Pertumbuhan

Gastropoda mempunyai badan yang tidak simetri dengan mantelnya terletak di depan, cangkang berikut isi perutnya tergulung spiral ke arah belakang. Pertumbuhan dari Gastropoda terjadi lebih cepat di waktu umurnya masih muda dibandingkan dengan siput yang sudah dewasa ( Cleveland p.dkk: 1989).

#### b. Respirasi dan Peredaran Darah

Pada Gastropoda darat, pernafasan menggunakan sebuah paru – paru yang disebut pulmonate, pada Gastropoda yang hidup d air tempat pulmonate itu ditempati oleh insang, paru – paru merupakan anyaman pembuluh darah pada dinding luar. Udara masuk dan keluar melalui porus respiratorius. Darah yang berasal dari tubuh mengalami aerasi di dalam paru – paru dan kemudian dipompakan oleh jantung melalui arteri kearah kepala, kaki dan viscera ( alat-alat dalam) (Cleveland P, dkk : 1989).

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Asy Syuura 42: 29

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا

يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

*Di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. dan dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.*

### c. Alat Ekskresi

Alat ekskresi menggunakan sebuah ginjal, mengeluarkan zat – zat sisa dari rongga pericardial yang mengelilingi jantung dan membuangnya ke dalam rongga mantel ( Jasin Maskoeri : 1984).

### d. Sistem Reproduksi

Setiap individu gastropoda mempunyai alat kelamin jantan dan betina ( Hermaprodit). Gastropoda yang melangsungkan perkawinana dengan cara sel telur setelah dibuahi oleh sperma akan terjadi zigot dan menjadi telur. Telur ini akan dikeluarkan dari saluran telur satu persatu dari saluran telur siput betina. Gastropoda yang hidup di laut mengamankan telur – telurnya dengan meletakkan di dalam selaput agar – agar. Bentuk selaput perlindungan ini bermacam- macam banyak diantaranya yang berbentuk kapsul dan setiap kapsul dapat berisi satu sampai ratusan telur didalamnya. Ada induk yang menjaga telurnya tetapi ada pula yang meninggalkan ( Dharma : 1992).

Sebagaimana dalam firman Allah QS Asy Syuura/42: 11

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“(dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat”.

#### e. Sistem Pencernaan

Kebiasaan makan gastropoda sangat beragam seperti bentuk dan habitat, tetapi semua termasuk penggunaan beberapa adaptasi radula tersebut. Gastropoda banyak herbivora, serak dari partikel ganggang substrat. Beberapa herbivora adalah grazers, beberapa browser, beberapa pengumpan planktonik. Abalones memegang rumput laut dengan kaki dan pecah buah dengan radula mereka, beberapa siput adalah pemulung, hidup dari daging mati dan membusuk, yang lainnya adalah karnivora, menerkam mangsanya terpisah Wirth gigi radular mereka (Aidil, 2016).

#### f. Sistem Saraf

Sistem saraf Gastropoda pada dasarnya seperti sistem saraf moluska pada umumnya, meskipun tiap-tiap jenis mengalami beberapa perbedaan pada derajat pemusatan ganglia. Dengan adanya torsi, maka sistem saraf Gastropoda menjadi asimetri terdiri atas sepasang ganglion otak di bagian posterior esophagus yang berhubungan dengan saraf mata, tentakel dan statocyst, sepasang ganglion mulut berhubungan dengan rongga mulut. Dari ganglion otak terapat sepasang benang saraf ventral yang berhubungan dengan ganglion kaki, dan sepasang lagi ke ganglion sisi yang berhubungan dengan mantel dan otot columella. Benang saraf dari ganglion memilin (memutar) dan berhubungan dengan ganglion visceral di dalam viscular ( Tedi, 2016).

#### e. Habitat

Mollusca termasuk hewan yang sangat berhasil menyesuaikan diri untuk hidup di berbagai tempat dan cuaca. Sebagian Gastropoda yang hidup di daerah

hutan– hutan bakau, ada yang hidup di atas tanah yang berlumpur atau tergenang air, ada pula yang menempel pada akar atau batang, dan memanjat, misalnya pada littoria, cassidula, cerihtiidae, dan lainnya. Pada umumnya Gastropoda lambat pergerakannya dan bukan merupakan binatang yang berpindah- pindah. Kebanyakam Cypraeaen ditemukan dibalik koral atau karang yang telah mati. Conus lebih banyak variasinya, ada yang menempel di atas terumbu karang, di bawah karang, di atas pasir, ataupun membenamkan dirinya di dalam pasir. Murex ada yang hidup di atas terumbu karang, dibalik karang atau di atas pasir. beberapa *cypraea*, *conus*, *murex* ditemukan hidup didasar laut yang didalamnya sampai ratusan meter ( Dharma : 1992).

Gastropoda hidup di daerah pasang surut sampai kedalaman 6 meter dengan dasar berlumpur pasir yang banyak ditumbuhi alga. Gastropoda umumnya ditemukan di antara karang – karang yang banyak tersedia bahan makanan atau pada daerah yang bias menjamin kelangsungan hidupnya. Selain Gastropoda yang ditemukan pada perairan dangkal misalnya pada terumbu karang yang masih mendapat sinar matahari yang cukup banyak, ada pula ditemukan jenis Gastropoda pada perairan dengan kedalaman 30 m dimana alaga masih dapat tumbuh ( Oemardjati dan wardhana : 1990).

#### ***F. Fungsi dan Peranan Gastropoda dalam Ekosistem***

Gastropoda merupakan salah satu jenis biota yang hidup di perairan termasuk hutan mangrove. Masyarakat lebih mengenal gastropoda sebagai sipt/keong. Adanya perhatian yang cukup besar dari masyarakat terhadap keanekaragaman Gastropoda

berkaitan dengan pemanfaatan secara ekonomis jenis-jenis Gastropoda karena keunikan bentuk dan warnanya, sedangkan secara ekologis Gastropoda memiliki peranan penting dalam mekanisme daur hidup dan perputaran hara dalam kandungan hayati perairan. Selain itu, dimanfaatkan pula sebagai sumber makanan dan benda koleksi yang cukup berharga. Gastropoda banyak ditemukan di darat, perairan tawar dan laut. Jenis Gastropoda yang ditemukan di perairan laut sebagian besar habitatnya berada di ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang (Soegianto, 1994).

### **1. Fungsi Ekologis**

Fungsi ekologis berkaitan dengan peranan Gastropoda dalam suatu siklus ekosistem yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas ekosistem tersebut. Beberapa fungsi Gastropoda yang hidup di daerah ekosistem di antaranya :

- a. Sebagai pengontrol populasi makroalga. Beberapa Gastropoda bersifat herbivora seperti *Littorina*, *Aplysia*, dan lain-lain. Di ekosistem Mangrove, padang lamun, ataupun terumbu karang banyak ditemukan mikroalga. Kestabilan populasi mikroalga dapat dijaga dengan adanya keberadaan Gastropoda terutama sebagai bahan makanannya.
- b. Bioindikator perairan, Gastropoda merupakan hewan akuatik yang dapat dijadikan bioindikator apabila diindikasikan terjadinya pencemaran di suatu perairan. Kondisi ini tidak terlepas dari Gastropoda yang memiliki sifat berikut : mobilitasnya yang lambat, habitat didasar perairan dan pola makan detritus/ suspension feeder.

Apabila terjadi indikasi masuknya logam berat, limbah beracun maupun bahan organik yang membahayakan baik yang bersifat kronis maupun lethal. Selain analisis secara langsung ke perairan Gastropoda adapt di jadikan indikasi keberadaan bahan pencemar tersebut langsung ke jaringan tubuhnya akibat akumulasi bahan pencemar (Nyabakken, 1988).

## **2. Fungsi Ekonomis**

Gastropoda mempunyai rti penting sebagai bahan makanan berbagai ikan, burung dan mamalia termasuk manusia. Larva Gastropoda di laut merupakan makanan bagi anak ikan yang karnivora. Gastropoda laut yang umum dimakan adalah *Haliotis* (Abalone) dan *Strombus* (keong gonggong). Selain sebagai biota laut, Abalone telah di ekstrak dan dibuat sebagai makanan tambahan (food supplement) yang berfungsi untuk mencegah berbagai penyakit. Gastropoda air tawar yang umum dimakan manusia adalah *pila scutata* dan *pila polita* (keong sawah). Siput darat yang umum di makan adalah *Helix pomatia* dan *Acathina* (Suwignyo,dkk, 2005).

## **G. Tinjauan Umum Faktor Lingkungan**

Seperti hewan lainnya, hewan Mollusca kelas Gastropoda untuk kelangsungan hidupnya membutuhkan lingkungan tertentu. Faktor-faktor lingkungan yang berepegaruh antara lain:

## 1. Suhu

Suhu merupakan yang banyak perhatian dalam pengkajian laut. Suhu di daerah tropis berkisar  $20^{\circ}\text{C}$  sampai  $28^{\circ}\text{C}$  dan suhu menurun dengan bertambahnya kedalaman air, namun permukaan tidak sebanding dengan seluruh kedalaman sampai dasar laut. Suhu merupakan factor lingkungan penting yang dapat menentukan ada tidaknya beberapa jenis hewan. Hewan yang hidup di daerah pasang surut dan sering mengalami kekeringan mempunyai daya tahan yang besar terhadap perubahan suhu (Ewusie, 1980).

Suhu air permukaan di perairan nusantara umumnya berkisar antara  $28-31^{\circ}\text{C}$ . Batas toleransi tertinggi untuk keseimbangan struktur populasi hewan benthos pada suhu mendekati  $32^{\circ}\text{C}$ , tetapi beberapa jenis dapat mentolerir suhu yang lebih tinggi.

## 2. Salinitas

Salinitas adalah jumlah keseluruhan garam yang terlarut dalam volume air tertentu. Salinitas ini dinyatakan sebagai bagian gram per seribu bagian air (%). Salinitas rata-rata air laut dalam samudra adalah 35%. Perubahan salinitas dapat memengaruhi konsumsi oksigen. Oksigen naik dengan turunya salinitas (Nontji, 1987).

Pengaruh salinitas terhadap kepadatan makrozoobentos terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui kerapatan pohon yang mengakibatkan suatu tunjangan bagi kenaikan kepadatan makrozoobentos tergantung rendahnya salinitas, tetapi ada juga sebaliknya. Perubahan salinitas sangat berpengaruh terhadap

perkembangan beberapa jenis makrozoobenthos tersebut. Beberapa jenis yang lain memang sudah mengalami proses aklimasi, yaitu modifikasi sifat fenotip organisme oleh lingkungan, sehingga mampu hidup dan tahan terhadap lingkungan yang ada tanpa kesulitan (Arief, 2003).

Pada perairan yang bersalinitas tinggi atau rendah, ditemukan hewan benthos seperti siput, cacing dan kerang-kerangan. Mollusca umumnya hidup pada perairan yang salinitasnya berkisar 15 – 30 ‰, sementara kisaran salinitas yang dianggap layak bagi kehidupan makrozoobenthos berkisar antara 15 – 45 ‰ (Aditya, 2006).

### 3. pH

Derajat keasaman (pH) adalah ukuran konsentrasi ion hydrogen dalam sebuah larutan, yaitu berat gram ion hydrogen per liter air. Nilai pH menunjukkan derajat keasaman atau kebebasan suatu perairan. Toleransi organisme air terhadap pH bervariasi. Hal ini tergantung pada suhu air, oksigen terlarut dan adanya berbagai anion dan kation serta jenis dan stadium organisme (Nyabakken, 1988).

### 4. Intensitas Cahaya

Intensitas cahaya mempengaruhi pola sebaran organisme. Ada sebagian organisme yang menyukai cahaya dengan intensitas cahaya yang besar, namun ada juga organisme yang lebih menyukai cahaya redup. Hewan Mollusca kelas Gastropoda merupakan hewan yang menyukai cahaya redup, dimana aktifitas hidupnya banyak dilakukan pada malam hari (Odum, 1993).

## H. Tinjauan Umum Indeks Ekologi

### 1. Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman jenis ( $H'$ ) menggambarkan keadaan populasi organisme secara matematis untuk mempermudah dalam menganalisa informasi-informasi jumlah individu masing-masing jenis dalam suatu komunitas, ini merupakan ciri yang unik untuk menggambarkan struktur komunitas di dalam organisasi kehidupan. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keragaman jenis tinggi, jika kelimpahan masing-masing jenis tinggi dan sebaliknya keragaman jenis rendah jika hanya terdapat beberapa jenis yang melimpah (Onum, 1993).

Keanekaragaman ( $H'$ ) mempunyai nilai terbesar jika semua individu berasal dari genus atau spesies yang berbeda-beda, sedangkan nilai terkecil didapat jika semua individu berasal dari 1 genus atau 1 spesies saja (Odum, 1971). Adapun kategori indeks keanekaragaman jenis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Kategori Indeks Keanekaragaman Jenis ( $H'$ )

Indeks Keanekaragaman ( $H'$ )	Kategori
$H' \leq 2,0$	Rendah
$2,0 < H' \leq 3,0$	Sedang
$H' \geq 3,0$	Tinggi

## 2. Indeks Keseragaman (E)

Indeks keseragaman (E) digunakan untuk menggambarkan keadaan jumlah spesies atau genus yang mendominasi atau bervariasi. Nilai indeks keseragaman berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai E maka populasi menunjang keseragaman, artinya jumlah individu setiap genus atau spesies sama atau hampir sama. Sebaliknya semakin kecil nilai E maka keseragaman populasi semakin kecil, artinya penyebaran jumlah individu setiap spesies tidak merata ada kecenderungan suatu spesies untuk mendominasi populasi tersebut ( Odum, 1993).

Nilai indeks keseragaman (E)  $0,75 < E < 1,00$  menandakan kondisi komunitas yang stabil, komunitas stabil menandakan ekosistem tersebut mempunyai keanekaragaman yang tinggi, tidak ada jenis yang dominan serta pembagian jumlah individu ( Odum, 1993).

Tabel 2.2. Kategori Indeks Keseragaman Jenis (E)

Indeks Keseragaman ( E)	Kategori
$0,0 < E \leq 0,50$	Tertekan
$0,50 < E \leq 0,75$	Tidak stabil
$0,75 < E \leq 1,00$	Stabil

## 3. Indeks Dominansi

Indeks dominansi adalah suatu pernyataan atau penggambaran secara matematik yang melukiskan jumlah komunitas pada suatu daerah tertentu. Apabila

nilai suatu indeks dominansi mendekati satu maka ada satu spesies yang dominan dan apabila nilainya mendekati nol maka tidak ada spesies yang dominan ( Odum, 1993).

Dominansi makrozoobenthos digunakan untuk menghitung adanya spesies tertentu yang mendominasi suatu komunitas makrozoobenthos. Perhitungan mengenai indeks dominansi jenis tertentu dalam suatu komunitas makrozoobenthos, digunakan indeks Simpson nilai indeks dominansi berkisar antara 0 -1. Semakin mendekati 1, berarti semakin tinggi pula tingkat dominansi oleh spesies tertentu, sebaliknya jika nilai mendekati 0 (nol) berarti tidak ada jenis tertentu yang mendominasi (Odum, 1993).

Tabel 2.3. Kategori Indeks Dominansi (D)

Indeks Dominansi	Kategori
$0 < D \leq 0,50$	Rendah
$0,50 < D \leq 0,75$	Sedang
$0,75 < D \leq 1,00$	Tinggi

### H. Ayat yang berkaitan

Allah berfirman dalam QS An-Nur : 45


وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ  
 وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ خَلَقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

*Dan Allah Telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Ayat di atas menjelaskan tentang kebesaran kekuasaan-Nya. Setiap hewan yang Dia ciptakan berasal dari air merupakan bagian dari materi-Nya. Hal ini disebabkan karena tingkat kebutuhan hewan terhadap air sangatlah tinggi. Dalam ayat tersebut juga Allah SWT menjelaskan tentang berbagai macam jenis hewan. Ada hewan yang berjalan di atas perutnya seperti reptil, ada juga yang berjalan di atas 4 kaki seperti unta, kambing dan kuda. Perbedaan hewan ini telah diatur oleh-Nya sebagai pengatur Yang Maha Bijaksana. Dan tidak ada sedikitpun yang tidak diketahui oleh-Nya ( Shihab: 2009).

## I. Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Lokasi dan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang keanekaragaman jenis Gastropoda yang berada di sekitar perairan sungai Je'neberang kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada sungai Je'neberang yang terdapat dikabupaten Gowa.

#### ***B. Populasi dan sampel***

##### ***1. Populasi***

Populasi dalam penelitian ini adalah Mollusca yang terdapat diperairan sungai Je'neberang kabupaten Gowa.

##### ***2. Sampel***

Sampel pada penelitian ini adalah Gastropoda yang terdapat pada ekosistem perairan sungai Je'neberang.

#### ***C. Variabel Penelitian***

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yang mengkaji keanekaragaman dan kelimpahan jenis Gastropod yang berada di sekitar perairan sungai Je'neberang kabupaten Gowa.

#### ***D. Definisi Operasional Variabel***

1. Keanekaragaman jenis Gastropoda merupakan banyaknya jumlah jenis dan jumlah individu dari spesies Gastropoda yang ditemukan di perairan sungai je'neberang kabupaten Gowa.
2. Kelimpahan adalah banyaknya individu dari satu spesies per stasiun dalam satuan meter kuadrat.

#### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman jenis di perairan sungai Je'neberang. Parameter yang diukur meliputi parameter fisika adalah (*Suhu*), parameter kimia (*pH dan salinitas*) dan parameter biologi (identifikasi keanekaragaman jenis Gastropoda).

#### ***F. Penelitian***

Adapun alat yang digunakan Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wadah koleksi, meteran, pH meter, lup, salinometer, GPS , sekop, ayakan, kantong plastik, Tali rafia, Kertas label, camera, alat tulis dan buku identifikasi Gastropoda (*Indonesian and Shells, jilid I dan jilid II Guide to Shell*).

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Formalin 4%, alkohol dan sampel Gastropoda.


### ***G. Prosedur Kerja***

Penelitian ini didahului dengan melakukan observasi lapangan. observasi disini sebagai indikator utama dalam pengambilan suatu tempat yang cocok untuk penelitian ini. Dalam observasi ini, peneliti menentukan 3 titik stasiun.

Sebelum ke lapangan, terlebih dahulu mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan dan membersihkannya serta mengecek apakah semua peralatan dapat berfungsi dengan baik. Setelah itu menyiapkan larutan formalin 4 % . Membuat transek dengan ukuran plot 10 x 10 meter pada tiap stasiun dengan menggunakan meteran dan tali rafia. Tiap stasiun terdapat 3 plot.

Pada pengambilan sampel untuk tiap transek dilakukan dengan mengambil spesies-spesies yang termasuk Gastropoda. Setelah itu, mengambil substrat yang ada pada tiap stasiun dengan menggunakan sekop kemudian menyaringnya dengan menggunakan ayakan. Sampel yang telah diambil dan disaring kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah berisi Formalin Setelah itu, maka dilakukan identifikasi dengan menggunakan kunci identifikasi Mollusca.

Titik pengambilan sampel dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Titik Pengambilan Sampel Sungai Je'neberang

## H. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif yang dijelaskan dalam bentuk tabel dan gambar. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus Keanekaragaman dan rumus indeks keseragaman (*diversity*) shannon-Wiener serta rumus indeks dominansi (D).

### 1. Indeks keanekaragaman dan keseragaman

Indeks Keanekaragaman dihitung dengan rumus Shannon – Wiener (Odum, 1971).

$$H' = - \sum P_i \ln P_i ; P_i = n_i/N$$

Indeks Keseragaman dihitung dengan rumus Evennes – indeks (Odum, 1971).

$$E = \frac{H'}{\ln S}$$

Dimana : E = Indeks keseragaman  
 H' = Indeks keanekaragaman  
 S = Jumlah jenis organisme

## 2. Indeks Dominansi (D)

Indeks Dominansi dihitung dengan rumus Dominance of Simpson (Odum, 1971).

$$D = \sum \left[ \frac{n_i}{N} \right]^2$$

Dimana : D = Indeks dominansi  
 ni = Jumlah Individu setiap jenis  
 N = Jumlah total individu

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian


##### 1. Gambaran Spesies Gastropoda di Sungai Je'neberang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Gastropoda yang terdapat pada stasiun I ( Limbah domestik) sebanyak 115 individu yang terdiri dari 7 jenis, pada stasiun II ( Penambangan pasir) sebanyak 83 individu yang terdiri dari 3 jenis dan pada stasiun III sebanyak 102 individu yang terdiri dari 7 jenis. Adapun Gastropoda yang terdapat pada stasiun I, II, dan III dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Keanekaragaman Gastropoda yang terdapat pada stasiun I,II,dan III

NO	SPESES	STASIUN I	STASIUN II	STASIUN III	JML.INDI VIDU
1	<i>Orania mixta</i>	28	9	14	51
2	<i>Nassarius pullus</i>	13	15	18	55
3	<i>Telescopium telescopium</i>	26	18	16	58
4	<i>Littorina Scabra</i>	16	12	10	38
5	<i>Terebralia Sucata</i>	14	8	13	35
6	<i>Nerita Planospira</i>	12	10	11	23
7	<i>Cerithium Kobelthi</i>	6	11	20	37
<b>JUMLAH</b>		<b>115</b>	<b>83</b>	<b>102</b>	<b>297</b>

Gambaran distribusi (Penyebaran) spesies Gastropoda dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 4.1 Diagram perbandingan spesies tiap stasiun

## 2. Pengamatan indeks ekologi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, indeks ekologi yang meliputi indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi Gastropoda yang terdapat pada stasiun I (limbah domestik), stasiun II (penambangan pasir) dan stasiun III (muara sungai) dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Indeks Ekologi yang Meliputi Indeks Keanekaragaman, indeks Keseragaman dan Indeks Dominansi.

STASIUN	INDEKS EKOLOGI					
	H'	Kategori	E	Kategori	D	Kategori
<b>I</b>	1,408	Rendah	0,786	Stabil	0,312	Rendah
<b>II</b>	0,944	Rendah	0,860	Stabil	0,372	Rendah
<b>III</b>	0,931	Rendah	0, 847	Stabil	0,438	Tinggi
<b>Total Keseluruhan</b>	1,792	Rendah	0,921	Stabil	0,18	Rendah


Keterangan

H' = Indeks Keanekaragaman

E = Indeks Keseragaman

D = Indeks Dominansi

Perbandingan indeks ekologi tiap stasiun penelitian dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Diagram perbandingan nilai indeks ekologi

Dari Diagram perbandingan nilai indeks keaneekaragaman diatas dapat dilihat bahwa keaneekaragaman Gastropoda pada stasiun 1 (limbah domestik), stasiun II (Penambangan Pasir) dan stasiun III ( muara sungai) tergolong rendah, karena nilai  $H'$  yang diperoleh  $\leq 2,0$  , nilai indeks keseragaman diatas dapat dilihat bahwa keseragaman Gastropoda pada stasiun I ( Limbah domestik), stasiun II (Penambangan pasir) dan stasiun III ( muara sungai) tergolong stabil, karena indeks keseragaman yang diperoleh pada stasiun 1 yaitu 0,949 pada stasiun II yaitu 0,981 dan stasiun III yaitu 0,986 sedangkan perbandingan nilai indeks dominansi diatas dapat dilihat bahwa indeks dominansi Gastropoda pada stasiun 1 (limbah domestik) stasiun II (Penambangan pasir) tergolong rendah, karena nilai indeks dominansi yang diperoleh

pada stasiun I dan II yaitu 0,170 dan 0,153 sedangkan pada Stasiun III ( muara sungai) tergolong tinggi karena nilai dominansi yang diperoleh pada stasiun 3 0,150.

### **3. Hasil Parameter Lingkungan**

Pengukuran parameter lingkungan meliputi parameter fisika (suhu) dan parameter kimia (pH, salinitas). Berikut merupakan hasil data parameter fisika kimia Lingkungan pada stasiun I (limbah domestik) stasiun II ( Penambangan pasir) dan stasiun III ( muara sungai).

Tabel 4.2 Hasil Data Parameter Fisika Kimia Lingkungan Pada Setiap Stasiun

<b>Stasiun</b>	<b>Suhu ( °C)</b>	<b>Salinitas (‰)</b>	<b>pH</b>
I	29	25	7,63
II	30	25	7,67
III	30	27	8,58

### **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian Gastropoda di sungai Je'neberang memiliki tingkat indeks Keanekaragaman yang tergolong rendah dengan nilai yaitu 1,906 dan pada indeks Keseragaman tergolong stabil dengan nilai yaitu 0,979 sedangkan pada indeks Dominansi mencapai 0,153 yang tergolong rendah. Hal ini di karenakan aktifitas manusia di sungai Je'neberang sudah sangat beragam sehingga indeks keanekaragaman sampai indeks dominansi yang di dapatkan tergolong rendah. Selain itu cuaca pada saat penelitian tidak mendukung untuk mendapatkan jenis Gastropoda yang lebih banyak.

*a. Keanekaragaman Gastropoda Yang Terdapat Pada Stasiun 1 (Limbah Domestik)*

Stasiun I merupakan tempat pembuangan sampah warga atau sering disebut sebagai limbah domestik. Pada stasiun I ditemukan lebih banyak jenis Gastropoda dibandingkan stasiun II dan III. Hal ini dikarenakan pada stasiun I terdapat lumpur di pinggiran sungai Je'neberang dan sesuai dengan teori Gastropoda merupakan hewan yang menyukai daerah yang berlumpur dan banyak juga ditemukan spesies yang melekat pada poho yang terdapat pada pinggiran sungai tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada stasiun 1 telah diperoleh 7 jenis Gastropoda yang tergolong dalam 5 famili dan sebanyak 50 individu yaitu *Telescopium telescopium*, *Terebralia sucata*, *Orania mixta*, *Nassarius Pullus*, *Littorina Scabra*, *Cerithium Kobelthi* dan *Nerita planospira*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan spesies Gastropoda yang memiliki jumlah individu yang banyak pada stasiun ini yaitu *Orania mixta* sebanyak 28 jumlah individu. Pada stasiun ini jumlah individu setiap spesies banyak dibandingkan stasiun II dan III karena pada stasiun ini Gastropoda banyak melekat pada tumbuhan yang berada di tepi sungai sehingga di stasiun ini lebih banyak individu Gastropoda di banding stasiun II dan III.

Berdasarkan dari hasil penelitian indeks keanekaragaman Gastropoda pada stasiun 1 yaitu 1,847 dan tergolong rendah. Rendahnya keanekaragaman pada stasiun ini disebabkan karena adanya penyebaran jumlah individu setiap spesies tidak

sama serta ada kecenderungan suatu spesies untuk mendominasi populasi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman jenis tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak jenis dengan kelimpahan jenis yang sama atau hampir sama. Sebaliknya jika komunitas itu disusun oleh sangat sedikit jenis dan jika hanya sedikit jenis yang dominan maka keanekaragaman jenisnya rendah. Indeks dominansi yang diperoleh pada stasiun I yaitu 0,170 dan tergolong rendah. Hal ini menandakan bahwa tidak ada spesies yang mendominasi pada stasiun tersebut. Hal ini disebabkan karena derasnya arus sungai yang mengalir yang mengakibatkan Gastropoda yang terdapat pada stasiun ini tidak menetap tempatnya dan kedalaman dalam sungai ini yang sulit di jangkau yang memungkinkan tidak semua jenis Gastropoda yang terdapat pada stasiun I dapat diperoleh pada penelitian di sungai je'neberang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sartika tentang distribusi dan keanekaragaman jenis Gastropoda di pantai Puntondo memiliki tingkat keanekaragaman jenis Gastropoda di pantain puntondo memiliki tingkat keanekaragaman rendah. Rendahnya keanekaragaman yang diperoleh pada penelitian ini disebabkan karena terdapat beberapa spesies tertentu yang mendominasi dalam komunitas tersebut dan jumlah tiap spesies tidak merata sehingga nilai indeks keanekaragaman yang diperoleh pada penelitian ini tergolong rendah (Sartika, 2012).

Indeks keseragaman di stasiun ini mencapai 0,949 dan tergolong stabil karena nilai E yang diperoleh  $\leq 1,00$ . Stabilitasnya keseragaman pada stasiun ini disebabkan tidak adanya individu yang mendominasi pada stasiun ini.

Indeks keseragaman ( E) digunakan untuk menggambarkan keadaan jumlah spesies atau genus yang mendominasi atau bervariasi. Nilai indeks keseragaman berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai E maka populasi menunjang keseragaman, artinya jumlah individu setiap genus atau spesies sama atau hampir sama. Sebaliknya semakin kecil nilai E maka keseragaman populasi semakin kecil, artinya penyebaran jumlah individu setiap spesies tidak sama serta ada kecenderungan suatu spesies untuk mendominasi populasi tersebut ( Odum, 1993).

Kisaran suhu pada stasiun 1 yaitu  $29^{\circ}\text{C}$ . Kisaran suhu yang didapatkan pada stasiun ini umumnya masih bisa ditolerir oleh organisme khususnya Gastropoda. Batas toleransi tertinggi untuk keseimbangan struktur populasi hewan Benthos pada suhu mendekati  $32^{\circ}\text{C}$ , tetapi beberapa jenis dapat mentolerir suhu yang lebih tinggi. Suhu yang baik bagi pertumbuhan hewan bentik berkisar antara  $25\text{-}30^{\circ}\text{C}$ . Jika suhu air diatas  $30^{\circ}\text{C}$  maka Invertebrata Zoobenthos akan mengalami stress ( Zakaria, 1999).

Salinitas di stasiun ini yaitu  $25\text{‰}$ . Kondisi salinitas air laut pada lokasi ini tergolong normal dan cukup baik untuk kelangsungan hidup Gastropoda. Kadar salinitas lingkungan perairan di lokasi penelitian masih layak bagi kelangsungan hidup organisme makrozoobenthos. Kisaran salinitas yang layak bagi kehidupan makrozoobenthos adalah  $15\text{-}45\text{‰}$ .

Nilai pH di lokasi ini adalah 7,63 kisaran pH tersebut masih berada pada kisaran nilai yang baik untuk kehidupan biota laut, sehingga Gastropoda masih bertahan hidup pada stasiun ini (Mahida, 2001).

*b. Keanekaragaman Gastropoda yang terdapat pada stasiun II (Penambangan Pasir)*

Stasiun II merupakan tempat penambangan pasir, dimana pada stasiun ini masyarakat menggunakan sungai Je'neberang sebagai tempat mengambil pasir untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya jenis Gastropoda yang terdapat pada stasiun ini, sehingga indeks keanekaragaman dan dominansi pada stasiun ini tergolong rendah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada stasiun II telah diperoleh 7 jenis Gastropoda yang tergolong dalam 6 famili dan sebanyak 83 individu yaitu *Telescopium telescopium*, *Terebralia sucata*, *Orania mixta*, *Nassarius Pullus*, *Littorina Scabra*, *Cerithium Kobelthi* dan *Nerita planospira*. Jenis Gastropoda yang memiliki jumlah individu yang banyak pada stasiun ini yaitu *Telescopium telescopium* sebanyak 18 individu. Pada stasiun ini jumlah jenis dan jumlah individu berkurang dibanding stasiun I hal ini disebabkan karena pada stasiun 2 merupakan tempat penambangan pasir jadi Gastropoda yang terdapat pada stasiun 2 banyak mengikut pada saat pengambilan pasir.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat indeks keanekaragaman Gastropoda yaitu 1,909 dan tergolong rendah karena nilai  $H'$  yang diperoleh  $\leq 2,0$ . Rendahnya keanekaragaman pada stasiun ini disebabkan karena hanya beberapa jenis saja yang terdapat pada stasiun ini dan yang diperoleh di lokasi penelitian

sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah jenis yang diperoleh pada stasiun ini. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman jenis tinggi, jika kelimpahan masing-masing jenis tinggi dan sebaliknya keanekaragaman rendah jika hanya terdapat beberapa jenis yang dominan. Indeks dominansi yang diperoleh pada stasiun ini yaitu 0,153 tergolong rendah. Hal ini menandakan bahwa tidak ada spesies yang mendominasi pada stasiun tersebut. Indeks dominansi yang diperoleh sebagian besar mendekati nilai 0, hal tersebut berarti bahwa tidak terdapat jenis atau spesies tertentu yang mendominasi dalam komunitas tersebut, hal ini disebabkan karena stasiun II merupakan penambangan pasir (Zulkifli, 2007).

Indeks keseragaman di stasiun ini yaitu 0,981 dan tergolong stabil. Hal ini disebabkan karena tidak adanya individu yang mendominasi pada stasiun ini. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar nilai E maka populasi menunjang keseragaman, artinya jumlah individu setiap genus atau spesies sama atau hampir sama. Sebaliknya semakin kecil nilai E maka keseragaman populasi semakin kecil, artinya penyebaran jumlah individu setiap spesies tidak sama serta ada kecenderungan suatu spesies untuk mendominasi populasi tersebut.

Kisaran suhu pada stasiun II yaitu  $30^{\circ}$  C. Kisaran suhu yang didapatkan pada stasiun ini pada umumnya masih bisa ditolerir oleh organisme khususnya Gastropoda. Bats toleransi tertinggi untuk keseimbangan struktur populasi hewan benthos pada suhu mendekati  $32^{\circ}$  C. Salinitas di stasiun ini yaitu  $25^{00}/_{\text{o}}$ . Kondisi

salinitas air sungai pada lokasi ini tergolong normal dan cukup baik untuk kelangsungan hidup Gastropoda. Kisaran salinitas yang layak bagi kehidupan makrozoobenthos adalah 15-45<sup>00</sup>/0, sedangkan nilai PH pada stasiun yaitu 7,67 nilai tersebut memperlihatkan bahwa Gastropoda masih bisa hidup di PH kisaran tersebut.

*c. Keanekaragaman Gastropoda Yang Terdapat pada Stasiun III (Muara Sungai)*

Stasiun III merupakan muara sungai dimana pertemuan antara air tawar dan air laut. Sehingga pada stasiun ini arus air lebih besar dibandingkan dengan stasiun I dan II. Pada stasiun ini Gastropoda lebih cenderung ditemukan melekat pada batuan yang terdapat di pinggir muara sungai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada stasiun III telah diperoleh 7 jenis Gastropoda yang tergolong dalam 6 famili dan sebanyak 102 individu yaitu *Telescopium telescopium*, *Terebralia sucata*, *Orania mixta*, *Nassarius Pullus*, *Littorina Scabra*, *Cerithium Kobelthi* dan *Nerita planospira*. Jenis Gastropoda yang memiliki jumlah individu yang banyak pada stasiun ini yaitu *Cerithium kobelti*. Pada stasiun ini jumlah individu lebih banyak dibandingkan pada stasiun 2 hal ini disebabkan bahwa pada stasiun ini banyak individu yang melekat pada batuan yang terdapat pada stasiun III.

Berdasarkan dari hasil tersebut di atas dapat di lihat indeks keanekaragaman Gastropoda yaitu 1,919 dan tergolong rendah karena nilai H' yang diperoleh  $\leq 2,0$ . Rendahnya keanekaragaman pada stasiun ini disebabkan karena pada stasiun ini merupakan pembuangan limbah domestik dan pada saat

penelitian arus air tinggi sehingga jenis Gastropoda yang didapatkan diambil dari batuan yang terdapat di sekitaran Plot yang dipasang.

Indeks keseragaman di stasiun ini yaitu 0,986 dan tergolong stabil hal ini disebabkan karena tidak adanya penyebaran spesies dan individu dalam stasiun tersebut. Sedangkan indeks dominansi pada stasiun ini yaitu 0,150 tergolong sedang hal ini disebabkan karena ada jenis Gastropoda yang mendominasi yaitu *Cerithium kobelti*, hal ini disebabkan jenis Gastropoda ini banyak di dapatkan melekat pada batuan sekitaran plot pada stasiun ini.

Kisaran suhu pada stasiun III yaitu  $39^{\circ}$  C. Kisaran suhu yang di dapatkan pada stasiun ini pada umumnya masih bisa di tolerir oleh organisme khususnya Gastropoda. Salinitas di stasiun ini yaitu 27<sup>00</sup>‰. Kondisi air laut ini tergolong normal dan cukup baik untuk kelangsungan hidup Gastropoda, sedangkan nilai PH pada stasiun ini yaitu 8,58 nilai tersebut memperlihatkan bahwa PH perairan termasuk normal untuk PH air laut di stasiun ini.

Dari hasil penelitian ini, spesies yang melimpah adalah *Orania mixta* dan *Terebralia sucata*. Kedua spesies ini melimpah disebabkan karena spesies tersebut telah mampu beradaptasi dan cocok hidup pada lingkungan tersebut. Ini menunjukkan bahwa spesies tersebut mempunyai kisaran yang cukup luas terhadap faktor lingkungan, mampu berkembangbiak dengan cepat dan mampu melekat pada bagian apa saja serta mempunyai daerah jelajah yang digunakanya untuk mencari dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan (Zulkifli, 2008).

Spesies *Nerita planospira* memiliki kepadatan yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena habitat jenis ini tidak bisa hidup melekat terlalu lama.

Hasil penelitian pada stasiun I dan II memiliki indeks dominansi yang rendah disebabkan jenis individu yang terdapat pada stasiun I dan II termasuk jenis yang tidak bisa bertahan lama dengan cara melekat, sedangkan pada stasiun 3 memiliki indeks dominansi yang sedang dibandingkan stasiun 1 dan 2 hal ini disebabkan jenis individu Gastropoda pada stasiun ini bisa bertahan hidup dengan cara melekat selain itu Gastropoda dapat berkembangbiak secara singkat dan dapat mengeluarkan telur-telurnya dua minggu setelah menetas, sehingga *cerithium kobelthi* yang terdapat pada sungai Je'neberang tidak akan habis akibat eksploitasi manusia.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di kepulauan selayar tentang biodeversitas Gastropoda yang memiliki indeks ekologi yang stabil karena keanekaragaman spesies dan persebaran jumlah individu setiap jenis merata, komunitas yang seragam serta ditemukan adanya spesies yang mendominasi. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman yang tinggi jika komunitas tersebut disusun oleh banyak spesies dengan kelimpahan spesies sama dan hampir sama. Sebaliknya jika suatu komunitas disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya sedikit spesies yang dominan maka keanekaragaman jenisnya rendah. Keanekaragaman yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleks yang tinggi (Restu Sirante, 2012).

Dari tiga lokasi yaitu stasiun I II dan stasiun III . Muara sungai cenderung lebih banyak ditemukan jumlah individu jenis Gastropoda dibandingkan dengan area penambangan pasir dan limbah domestik karena ketersediaan sumber makanan yang ada di area muara sungai memungkinkan sehingga Gastropoda dapat mempertahankan diri dan berkembang biak dengan baik, selain itu pada muara sungai banyak batuan yang bisa digunakan sebagai tempat menempelnya Gastropoda ( Gunawan, 2005).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan di sungai je'neberang terdapat 6 famili Gastropoda yang ditemukan. Adapun jenis spesienya yaitu *Orania mixta*, *Nassariss pullus*, *Telescopium telescopium*, *Littorina scabra*, *Terebralia sucata*, *Nerita planospira*, *Cerithium kobelthi*.
2. Indeks keanekaragaman (H') gastropoda di sungai Je'neberang yaitu 1,789 tergolong rendah, indeks keseragaman (E) yaitu 0,919 tergolong stabil dan pada indeks dominansi (D) yaitu 0,178 tergolong rendah.

#### ***B. Saran***

1. Sebaiknya masyarakat terus menjaga keanekaragaman gastropoda karena cangkanya sangat berguna bagi perekonomian dan dagingnya dapat dikonsumsi.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian di sungai Je'neberang tentang Keanekaragaman ikan yang terdapat di sungai tersebut.

### LAMPIRAN 1. INDEKS EKOLOGI STASIUN I

STASIUN	SPESIES	JMLH. INDIVIDU	JMLJENI S	In S	Pi: [ni/N]	In Pi	Pi In Pi	[ni/N]2	INDEKS EKOLOGI		
									H'	E	D
I (Limbah Domestik)	<i>Orania Mixta</i>	24	6	1.79175947	0.48	-0.733969175	-0.352305204	0.2304	1.408813111	0.78627357	0.312
	<i>Nassarius Pullus</i>	12			0.24	-1.427116356	-0.342507925	0.0576			
	<i>Telescopium telescopium</i>	2			0.04	-3.218875825	-0.128755033	0.0016			
	<i>Littorina Scabra</i>	6			0.12	-2.120263536	-0.254431624	0.0144			
	<i>Terebralia Sucata</i>	4			0.08	-2.525728644	-0.202058292	0.0064			
	<i>Nerita Planospira</i>	2			0.04	-3.218875825	-0.128755033	0.0016			
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>	<b>6</b>	<b>1.791759</b>	<b>1</b>	<b>-13.24482936</b>	<b>-1.408813111</b>	<b>0.312</b>	<b>1.408813111</b>	<b>0.78627</b>	<b>0.312</b>

### LAMPIRAN 2. INDEKS EKOLOGI STASIUN II

STASIUN	SPESIES	JMLH. INDIVIDU	JMLJENI S	In S	Pi: [ni/N]	In Pi	Pi In Pi	[ni/N]2	INDEKS EKOLOGI		
									H'	E	D
II (PENAMBANGAN PASIR)	<i>Telescopium telescopium</i>	12	3	1.09861229	0.48	-0.733969175	-0.352305204	0.2304	0.94481	0.86000312	0.3728
	<i>Littorina Scabra</i>	5			0.2	-1.139434283	-0.227886857	0.04			
	<i>Terbralia Sucata</i>	8			0.32	-1.139434283	-0.364618971	0.1024			
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>3</b>	<b>1.098612</b>	<b>1</b>	<b>-3.012837741</b>	<b>-0.944811031</b>	<b>0.3728</b>	<b>0.94481</b>	<b>0.860003</b>	<b>0.3728</b>

### LAMPIRAN 3. INDEKS EKOLOGI STASIUN III

STASIUN	SPESIES	JMLH. INDIVIDU	JMLJENI S	In S	Pi: [ni/N]	In Pi	Pi In Pi	[ni/N]2	INDEKS EKOLOGI		
									H'	E	D
III (Muara Sungai)	<i>Orania Mixta</i>	4	3	1.09861229	0.11429	-2.1690537	-0.247891851	0.01306	0.93144	0.84783323	0.4384
	<i>Terebralia Sucata</i>	11			0.31429	-1.157452789	-0.363770876	0.09878			
	<i>Cerithium Kobelthi</i>	20			0.57143	-0.559615788	-0.31978045	0.32653			
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>3</b>	<b>1.098612</b>	<b>1</b>	<b>-3.886122277</b>	<b>-0.931443178</b>	<b>0.43837</b>	<b>0.93144</b>	<b>0.847833</b>	<b>0.4384</b>


### LAMPIRAN 4. INDEKS EKOLOGI STASIUN I, II dan III

STASIUN	SPESIES	JMLH. INDIVIDU	JMLJENIS	In S	Pi: [ni/N]	In Pi	Pi In Pi	[ni/N]2	INDEKS EKOLOGI		
									H'	E	D
I,II,III	<i>Orania mixta</i>	28	7	1.9459101	0.2545455	-1.3682759	-0.3482884	0.0647934	1.79265	0.9212399	0.18
	<i>Nassarius pullus</i>	12			0.1090909	-2.2155737	-0.241699	0.0119008			
	<i>Telescopium telescopium</i>	14			0.1272727	-2.061423	-0.2623629	0.0161983			
	<i>Littorina Scabra</i>	11			0.1	-2.3025851	-0.2302585	0.01			
	<i>Terebralia sucata</i>	23			0.2090909	-1.5649861	-0.3272244	0.043719			
	<i>Nerita planospira</i>	2			0.0181818	-4.0073332	-0.0728606	0.0003306			
	<i>Cerithium kobelthi</i>	20			0.1818182	-1.7047481	-0.3099542	0.0330579			
<b>JUMLAH</b>		<b>110</b>	<b>7</b>	<b>1.9459101</b>	<b>1</b>	<b>-15.224925</b>	<b>-1.792648</b>	<b>0.18</b>	<b>1.79265</b>	<b>0.9212399</b>	<b>0.18</b>


### LAMPIRAN 5. HASIL PENGAMATAN FAKTOR LINGKUNGAN

Stasiun	Suhu ( °C)	Salinitas (‰)	pH
<b>I (Muara Sungai)</b>	29	27	7,63
<b>II (Penambangan pasir)</b>	30	25	7,67
<b>III (Limbah Domestik)</b>	30	25	8,58

### LAMPIRAN 6. PETA PENELITIAN DI SUNGAI JE'NEBERANG





### LAMPIRAN 7. PETA TITIK PENGAMBILAN SAMPEL SUNGAI JE'NEBERANG



### LAMPIRAN 8. DESKRIPSI TEMPAT SUNGAI JE'NEBERANG

Lokasi Sampel	Deskripsi Lokasi
Stasiun I	Merupakan tempat pembuangan sampah warga yang bermukim di sekitaran sungai Je'neberang atau sering di sebut tempat pembuangan Limbah Domestik.
Stasiun II	Merupakan tempat penambangan pasir, dimana pada stasiun ini masyarakat menggunakan sungai Je'neberang sebagai tempat mengambil pasir untuk kebutuhan masyarakat.
Stasiun III	Merupakan muara sungai dimana pertemuan antara air laut dan air yang berasal dari sungai Je'neberang itu sendiri.

**LAMPIRAN 9. GAMBAR GASTROPODA***Cerithium Cobelthi**Littorina Scabra**Nassarius Pullus**Nerita Planospira**Orania Mixta**Terebralia Sucata**Telescopium telescopium*

**LAMPIRAN 10. DOKUMENTASI PENELITIAN DI SUNGAI  
JE'NEBERANG**





# LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief. “ *Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya*. Yogyakarta : Kanisius. 2003.
- Aidil, I . *Gastropoda mollusca*, <http://afghanaus.com/kelas-gastropoda/>.( 20 februari 2016).
- Al- Maraghi. “ *Tafsir Al- Maraghi*”. Semarang : Toha Putra Semarang . 1992.
- Barnes. “*Invertebrata Zoology*”. Philadelphia : Saunders Company. 1974.
- Bengen, D. G “ *kosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut Institut Pertanian*” Bogor (PKSPL – IPB): 2004.
- Budi N. “ Keanekaragaman dan Kelimpahan Makrozoobentos”. Jawa tengah Survey dan Pemetaan, 2011.
- Desmukh. I, “ Ekologi dan Biologi Tropika”. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Dharma. “ *Siput dan Kerang Indonesia*”. Jakarta : Sarana Graha. 1992.
- Christine. 2013. “*Tingkat Keanekaragaman dalam Kehidupan*”. <http://www.sentra-edukasi.com>. Diakses pada Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 20.00 WITA.
- E.P, Odum. “ Dasar- dasar Ekologi. Terjemahan Tjahjono Samingan”. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1993.
- Ewusie, J. Y. *Ekologi Tropika*, terj. Usman Tanuwidjaja. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1990.
- Ferianita Fachrul, M. *Metode Ekologi untuk Penentuan Pencemaran Perairan*. Jakarta: Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, 2002.
- Hickman. Jr. Cleveland et a., eds. *Zoology*. New Delhi: Tata Mc Graw Hill Publishing Company Ltd, 1989.
- Heddy, S., “*Pengantar Ekologi*”. CV Rajawali, Jakarta:2009.

- Jasin Maskoeri. "Zoology Invertebrata". Surabaya : Sinar Wijaya, 1984.
- Krebs C.J. "Ecological Methodology". Newyork : Haeper and Publisher : 2000
- Laria, "Gastropoda" <http://lariajamift.wordpress.com/2007/10/04/gastropoda/>(17 maret 2016)
- Mahida. "Pencemaran Air dan Pemanfaatn Limbah Industri". Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- Mudjiono dan Sudjoko, "Fauna dan Molluska Padang Lamun di Pantai Lombok Selatan" (Indonesia : Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi, Lembaga Ilmu Pengertahuan Indonesia, 2009)
- Muhammad Chairul Fahmi, "Pengelolaan daerah sungai Je'neberang kota Makassar Sulawesi Selatan". Makassar: 2006.
- Nontji. "Laut Nusantara". Jakarta : Penerbit Jambatan, 1987.
- Pechenik, *Biology of The Invertebratates*. New York : McGraw-Hill Book Company, 2000
- Rangan J.K. "Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri". Jakarta : CV. Rajawali, 2007.
- Rahmawati. "Struktur dan Tipologi Komunitas Gastropoda Pada Hutan Zona Mangrove". Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. 1990.
- Restu Sirante. "Studi Komunitas Gastropoda Di Lingkungan Perairan Kawasan Mangrove Kelurahan Lappa dan Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai". Skripsi. 2011
- Resosoedarmo, S., "Pengantar Ekologi". PT Remaja Rosdakarya, Jakarta: 2006
- Retno Budiati,Sry Mulyani,dkk, "Analisis Keanekaragaman Gastropoda Pada Komunitas Mangrove di Perairan Muarareja kota Tegal" ( Jakarta: 2011)
- Roberts. Cleveland P. Hickman. Jr, Larry S. dkk, "Animal Diversity" ( New Delhi : Tata Mc Graw Hill Publishing Company Ltd, 1989.
- Sandy. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Jurusan Geografi FMIPA UI-PT Indograph Bakti, 1996.

- Sartika.”*Distribusi dan keanekaragaman jenis Gastropoda di pantai puntondo*”. Skripsi. 2012
- Setyobudiandi, “*Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*” (Bogor: Institut Pertanian Bogor,2014).
- Shihab, Quraish.” *Tafsir Al-Misbah*”. Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran. Jakarta : Lentera Hati, 2009.
- Soegianto. “ Studi Komunitas Gastropoda Dilingkungan Perairan Mangrove”. Bogor : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. 1994.
- Stoddart, T.I *Regional Variation In Indian Oncean Coral Reefs*. London : The Zoologi Society of London Academic Press, 1998.
- Sugiarti. “ Ekologi Kuantitatif Metode Analisis Populasi dan Komunitas” Surabaya : Usaha Nasional, 2005.
- Tedi, P. *Mollusca Paper*. <http://delphisbiologi.wordpress.com/2011/09/28/mollusca-paper/> ( 28 februari 2016)
- Wardhana. Oemardjati dan “ *Taksonomi Avertebrata*”. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1990.
- Wijaya, Krisna, Habib. “Komunitas Perifiton dan Fitoplankton serta Parameter Fisika Kimia Perairan sebagai Penentu Kualitas Air di Bagian Hulu Sungai Cisadane Jawa Barat.” Skripsi Sarjana, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009.
- Zakaria, Studi Tentang Komunitas Makrozoobenthos pada Hutan Mangrove Alami dan Hasil Rehabilitasi. Makassar : Tesis Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin, 1999.

