



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PERSEPSI KOMDA SULSELBAR



“Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui
Penguatan Agribisnis Berbasis UMKM”

PERHIMPUNAN ILMUWAN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN INDONESIA
KOMDA SULSELBAR BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

RABU 27 JULI 2022 | **HOTEL SWISS-BELINN**
Panakkukang, Makassar

SPONSORED BY:



✉ semnas1.persepsisulselbar@gmail.com [persepsisulselbar](https://www.instagram.com/persepsisulselbar)

BUKU PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PERSEPSI KOMDA SULSELBAR

“Pemulihan Ekonomi Nasional
Melalui Penguatan Agribisnis Berbasis UMKM”

Diselenggarakan oleh:

Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia
Komda Sulselbar Bekerjasama dengan Fakultas Peternakan
Universitas Hasanuddin

Editor:

Aslina Asnawi
Veronica Sri Lestari
Vidyahwati Tenrisanna
Putra Astaman

Design by:
hasc.id

RABU
27
JULI
2022

HOTEL SWISS-BELINN
Panakkukang, Makassar



Penerbit



Prosiding Seminar Nasional Persepsi Komda Sulselbar

“Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Penguatan Agribisnis Berbasis UMKM”

Editor

Aslina Asnawi
Veronica Sri Lestari
Vidyahwati Tenrisanna
Putra Astaman

Reviewer

Dr. Ir. Aslina Asnawi, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng.
Ir. Veronica Sri Lestari, M.Ec., IPM.
Vidyahwati Tenrisanna, S.Pt., M.Ec., Ph.D.
Rusni Fitri Y. R., S.Pt., M.Si.
Dr. Muhammad Rizal, S.Pt., M.Si.
Dr. Aisyah, S.Pt., M.Si.

Desain

hasc.id

Cetakan I, 2022

ISBN 978-979-530-423-4

e-ISBN 978-979-530-424-1

Penerbit

Unhas Press
Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar
☎ +62 8229 9555 591 – ✉ unhaspress@gmail.com
🌐 unhaspress.unhas.ac.id

Anggota IKAPI No.: 002/SSL/01 & APPTI No.: 005.026.1.03.2018

Hak Cipta ©Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia Komda Sulselbar & Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Hak cipta dilindungi undang-undang. *All right reserved.*

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

NILAI EKONOMI RANSUM DALAM PEMANFAATAN LIMBAH ISI RUMEN SAPI PADA RANSUM AYAM TERHADAP KUALITAS TELUR

THE ECONOMIC VALUE OF RATIONS IN THE UTILIZATION OF WASTE CONTENTS OF CATTLE RUMEN IN CHICKEN RATIONS AGAINST THE QUALITY OF EGGS

Andi Suarda

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email korespondensi : andi.suarda@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai ekonomis pakan dalam kaitannya dengan pengaruh limbah isi rumen sapi pada ransum ayam terhadap kualitas telur. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 ekor ayam petelur. Selain itu, ayam ditempatkan dalam 24 petak kandang, masing-masing berukuran 1 x 0,5 x 1 m, terbuat dari terbuat dari belahan bambu dengan alas kandang sekam padi dan slat. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial 4x2 dengan tiga ulangan (Steel dan Torrie, 1980). Faktor pertama adalah jenis distribusi, R-1 adalah distribusi tanpa tepung isi rumen sapi, R-2 adalah distribusi 2,5% dari limbah isi rumen sapi, dan R-3 adalah distribusi 5% limbah isi rumen sapi dan distribusi R-4, adalah distribusi yang mengandung 7,5% limbah isi rumen sapi. Elemen kedua adalah jenis lantai kandang yang terbuat dari sekam padi dan slat. Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah ketebalan kerabang, berat protein (putih telur), berat kuning telur dan warna kuning telur. Hasilnya menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan limbah isi rumen sapi hingga kadar 7,5% dalam pakan ayam tidak menunjukkan manfaat/pengaruh yang signifikan terhadap ketebalan kerabang, berat kerabang, protein atau kuning telur. 2) Penggunaan kadar limbah rumen sapi dengan kadar hingga 7,5% pada pakan ayam menunjukkan manfaat/pengaruh yang nyata ($P < 0,01$) terhadap warna kuning telur. 3) Interaksi antara jenis ransum dan alas kandang yang digunakan tidak menunjukkan manfaat/pengaruh yang nyata terhadap ketebalan kerabang, bobot kerabang, protein, kuning telur, atau warna kuning telur. 4) Lebih bernilai ekonomis karena dapat menekan biaya distribusi dan lebih efisien.

Kata Kunci: Nilai Ekonomi, Kerabang Telur, Putih Telur, Kuning Telur, Ayam.

Abstract

The purpose of this study is to determine the economic value of feed in relation to the influence of cow rumen content waste on chicken rations on egg quality. The material used in this study was 48 laying hens. In addition, chickens are placed in 24 plots of cages, each measuring 1 x 0.5 x 1 m and made of bamboo hemispheres with a base of rice husk cages and slats. This study used a complete randomized design with a 4x2 factorial pattern with three replays (Steel and Torrie, 1980). The first factor is the type of distribution. R-1 is the distribution without flour of the contents of the cow's rumen; R-2 is the distribution of 2.5% of the waste of the contents of the cow's rumen; R-3 is the distribution of 5% of the waste of the contents of the cow's rumen; and the distribution of R-4 is the distribution containing 7.5% of the waste of the contents of the cow's rumen. The second element is a type of cage floor made of rice husks and slats. The indicators measured in this study were the thickness of the shell, the weight of the protein (egg white), the weight of the yolk, and the color of the yolk. The results showed that: 1) the use of cow rumen content waste up to 7.5% in chicken feed did not show significant benefits or influences on shell thickness, cage weight, protein or egg yolk. 2) The use of cow rumen waste levels with levels up to 7.5% in chicken feed shows a noticeable benefit or influence ($P < 0.01$) on the color of the yolk. 3) The interaction between the type of ration and the base of the cage used did not show any noticeable benefit or influence on shell thickness, cage weight, protein, egg yolk, or yolk color. 4) It has a higher economic value because it can lower distribution costs and be more efficient.

Keywords: Economic Value, Egg Shell, Egg White, Egg Yolk, Chicken.

PENDAHULUAN

Telur merupakan salah satu bahan pangan asal hewan yang bergizi dan salah satu sumber kandungan protein yang sangat tinggi, terutama bagi kehidupan manusia pada umumnya yaitu anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Menurut Indrawan dkk, (2012) Telur telah terbukti menjadi makanan yang sempurna karena mengandung nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisme hidup seperti protein, lemak, vitamin dan mineral. Jika tidak ditangani dengan baik, kualitas telur akan cepat memburuk. Hal ini dikarenakan sifat telur yang mudah rusak oleh bakteri dan merusak zat-zat makanan yang terkandung di dalam telur. Telur terdiri dari tiga bagian utama: 1) kerabang telur, 2) putih telur, dan 3) kuning telur.

Kerabang telur adalah keramik biopori yang diproduksi oleh salah satu mineralisasi tercepat yang dikenal di alam, dan kerabang telur berjuang untuk melindungi albumin dan kuning telur dari kerusakan fisik dan mikrobiologis. Faktor lain yang dapat mempengaruhi berat kerabang termasuk jenis hewan, umur, keturunan, umur pembuahan, berat induk, perubahan musim, dan pakan ayam. (Sarwono dkk. 2001). Selain itu, kulit telur umumnya terbuat dari kalsium karbonat, jadi menghindari kerabang tipis adalah perbaikan pola makan. Artinya pakan harus mengandung kalsium yang cukup, Amrullah (2011). Namun, keberadaan kalsium dan fosfor dalam makanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berat dan ketebalan kulit telur, Ali U (2006). Selain itu, menurut Winarno dan Kaswara (2002), telur yang kerabangnya melekat pada feses dan kotoran selama penyimpanan mempengaruhi kualitas internal telur. Bakteri dengan mudah melewati pori-pori. Pori-pori secara bertahap terbuka seiring bertambahnya usia penyimpanan. Selain itu, Santoso, U (2005) Kelainan yang menyebabkan penurunan kualitas telur dikatakan disebabkan oleh terlalu banyak kalsium dalam pakan, sehingga kalsium dapat menumpuk di kulit telur.

Menurut Ali (2006) Kuning telur dikatakan dapat diidentifikasi berdasarkan berat, diameter, ketebalan dan warna. Selain itu, Orr dan Flether (2001), dikutip oleh Hariana (2003), melaporkan bahwa kesempurnaan warna kuning telur ayam tergantung pada komposisi dan jenis makanan yang

dikonsumsi. Menurut Kurniawan, (2011) dapat meningkatkan kualitas ayam dengan mengubah faktor eksternal. Salah satunya adalah pakan. Karena pakan merupakan faktor penting dalam efisiensi dan kualitas produksi ternak, maka 70% biaya produksi ternak ditentukan oleh biaya pakan. Ketersediaan bahan pakan ayam yang sulit didapat menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga pakan. Upaya menurunkan harga pakan ayam terdiri dari mencari bahan pakan alternatif yang selalu tersedia. Limbah pertanian dapat dimanfaatkan sebagai pakan ayam dengan nilai gizi yang hampir sama dengan pakan komersial. Hasil limbah yang sering terlihat adalah limbah isi rumen yang ditemukan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar.

Limbah isi rumen belum diolah dengan baik dan dibuang begitu saja tanpa pengolahan. Karena sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), biaya pembuangan dan pengangkutan menjadi sangat tinggi dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, pemanfaatan limbah seperti isi bovine lumens dapat menjadi solusi bahan pakan alternatif, Heryani dkk (2015). Lebih lanjut (Nurhajati, T., R. S. Wahyuni dan G. C. de Vries. 1996), pengganti pakan bergizi ini dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan membuatnya lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan nilai ekonomis produk pakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di daerah Maros pada bulan September 2017 dan nilai ekonomis pakan terkait dampak limbah rumen sapi pada pakan ayam terhadap kualitas kerabang, kualitas putih dan kualitas kuning telur. Sedangkan limbah rumen sapi diperoleh dari rumah potong hewan di Makassar. Penelitian ini menggunakan 48 ekor ayam dan umur 9 bulan, dan ayam tersebut dipelihara didalam 24 petak kandang dengan menggunakan alas sekam padi dan slat.

Ayam tersebut ditempatkan secara acak dalam satu ruang kandang dengan ruang makan, dan ruang kandang diisi dengan dua ekor ayam, memberikan kesempatan setiap ayam untuk makan dan minum secara seimbang. Memberi makan secara ad-libitum. Menurut Steel dan Torrie (1980). Dikatakannya, rancangan percobaan penelitian ini adalah rancangan acak lengkap dengan pola faktorial 4x2 dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah jenis ransum, yang terdiri dari R-1 yaitu ransum tanpa tampa limbah isi rumen sapi, R-2 adalah

ransum dengan limbah isi rumen sapi 2,5 %, R-3 adalah ransum dengan limbah isi rumen sapi sebanyak 5 %, R-4 adalah ransum dengan limbah isi rumen sapi 7,5 %, Berdasarkan rekomendasi NRC bahwa keempat ransum tersebut disusun dengan baik secara isonitrogenous ($\pm 16\%$ protein). Elemen kedua adalah jenis lantai kandang yang terbuat dari sekam padi dan slat. Dalam penelitian ini, indikator yang diukur meliputi berat telur, kerabang telur, berat albumin, berat kuning telur dan kuning telur. Warna kuning telur standar digunakan untuk menentukan warna kuning telur.

Komposisi bahan makanan dan komposisi bahan dalam setiap ransum disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan yang digunakan pada masing-masing level

Bahan Makanan	Jenis Ransum			
	R-1 (gr)	R-2 (gr)	R-3(gr)	R-4(gr)
Jagung	55,0	54,0	53,0	52,0
Dedak Padi	12,0	10,5	9,0	7,5
Tepung Ikan	10,0	10,0	10,0	10,0
Bungkil Kedele	4,0	4,0	4,0	4,0
Bungkil Kelapa	15,0	15,0	15,0	15,0
Tepung Kerang	3,5	3,5	3,5	3,5
Rhodiamix	0,5	0,5	0,5	0,5
Limbah isi Rumen Sapi	-	2,5	5,0	7,5
Protein Kasar	16,175	16,178	16,181	16,184
Total	100	100	100	100

Keterangan : *) Disusun berdasarkan rekomendasi Wahyu (2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketebalan Kerabang Telur

Tabel 2 menunjukkan ketebalan kerabang telur per telur. Analisis varians menunjukkan bahwa baik jenis pakan maupun alas kandang yang digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketebalan kerabang telur selama penelitian.

Sebab, selain meratakan ayam di kandangnya, jatah kalsium ayam juga relatif sama. Selain itu, telah dilaporkan bahwa kelainan yang menyebabkan penurunan kualitas telur adalah terlalu banyak kalsium dalam pakan, yang dapat menyebabkan akumulasi kalsium di kerabang telur. Interaksi antara jenis pakan dan kandang yang digunakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketebalan kerabang telur selama penelitian.

Tabel 2. Rata-rata Ketebalan Kerabang Telur Ayam Per butir Selama Penelitian.

Jenis Alas Kandang	Jenis Ransum					Jumlah
	Ulangan	R-1 (gr)	R-2 (gr)	R-3 (gr)	R-4 (gr)	
Sekam	1	0,135	0,135	0,134	0,134	
Padi	2	0,135	0,136	0,133	0,133	
	3	0,134	0,135	0,134	0,133	
	Jumlah		0,404	0,406	0,401	0,400
Rata-rata		0,134	0,135	0,133	0,133	
Slat	1	0,133	0,135	0,135	0,133	
	2	0,135	0,134	0,131	0,134	
	3	0,133	0,133	0,133	0,131	
Jumlah		0,401	0,402	0,399	0,198	1,60
Rata-rata		0,133	0,134	0,133	0,132	
<i>Total</i>		0,805	0,808	0,800	0,789	3,211

2. Berat Albumen

Analisis varians menunjukkan bahwa jenis makanan tidak secara signifikan mempengaruhi berat protein per telur selama penelitian. Hal ini dikarenakan konsumsi air minum dan nilai gizi ransum, terutama protein dalam setiap ransum, relatif seimbang. Hasil penelitian ini konsisten dengan yang dilaporkan oleh Jansen et al (1978) yang dikutip oleh Santos, U (2005) mengurangi jumlah pakan yang dibutuhkan diharapkan dapat meningkatkan jumlah protein dalam telur, yang memaksa untuk minum lebih banyak air dan jumlah pakan dari kebutuhan sebenarnya tidak mencukupi. Pakan mengandung serat kasar, ayam dapat mengkonsumsi air minum dalam jumlah besar untuk membantu dalam proses mencerna serat kasar dan protein. Kekentalan cairan protein berkurang, sehingga kualitas protein berkurang.

Jenis kandang yang digunakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap bobot protein ayam per telur selama penelitian. Hal ini dikarenakan suhu kandang yang normal memungkinkan ayam mengkonsumsi air minum secara merata dan bobot protein menjadi relatif merata. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Rahardjo (2010) bahwa dalam keadaan normal ayam mengkonsumsi air minum 2 sampai 2,5 kali lebih banyak daripada pakan, dan ayam mengkonsumsi lebih banyak air saat suhu naik. Suhu ideal untuk ayam dikatakan 13-21 ° C. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Rata-rata berat putih telur ayam per butir selama penelitian.

Jenis Alas Kandang	Ulangan	Jenis Ransum				Jumlah
		R-1 (gr)	R-2 (gr)	R-3 (gr)	R-4 (gr)	
Sekam	1	36,78	33,73	37,05	35,49	432,6
	2	35,17	37,06	35,77	36,31	
Padi	3	36,04	37,37	35,43	36,40	
Jumlah		107,99	108,16	108,25	108,20	
Rata-rata		36,00	36,05	36,08	36,07	
Slat	1	35,04	35,72	38,30	38,47	
	2	36,15	38,62	35,53	35,85	
	3	38,29	35,18	35,85	35,25	
Jumlah		109,48	109,52	109,68	109,57	
Rata-rata		36,49	36,51	36,56	36,52	
Total		217,47	217,68	217,93	217,77	870,85

Demikian pula interaksi antara jenis pakan dan jenis alas kandang yang digunakan tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap bobot protein per telur yang diteliti.

3. Berat Yolk (Kuning Telur)

Tabel 4 menunjukkan rata-rata berat kuning telur ayam per telur yang diteliti, sebagai berikut

Tabel 4. rata-rata berat kuning telur ayam per butir selama penelitian.

Jenis Alas Kandang	Ulangan	Jenis Ransum				Jumlah
		R-1 (gr)	R-2 (gr)	R-3 (gr)	R-4 (gr)	
Sekam	1	16,53	16,30	16,29	16,13	195,33
	2	16,24	16,16	16,26	16,30	
Padi	3	16,11	16,33	16,34	16,34	
Jumlah		48,88	48,79	48,89	48,77	
Rata-rata		16,29	16,26	16,30	16,25	
Slat	1	16,36	16,03	16,34	15,89	
	2	16,19	16,17	16,23	16,13	
	3	16,27	16,42	16,28	15,99	
Jumlah		48,82	48,62	48,85	48,01	
Rata-rata		16,27	16,21	16,28	16,00	
Total		97,70	97,41	97,74	96,78	389,63

Analisis ragam menunjukkan bahwa baik jenis pakan yang digunakan maupun alas kandang tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kuning telur ayam

per telur yang diteliti. Hal ini dikarenakan kandungan protein yang relatif sama untuk setiap ransum. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Ali U. (2006) bahwa kandungan protein dalam pakan ayam secara langsung mempengaruhi berat kuning telur dan putih telur. Lebih lanjut dikatakannya, pengurangan protein dalam ransum ayam yang digunakan dapat menurunkan bobot kuning telur dan bobot protein yang dihasilkan. Interaksi antara jenis pakan dan bedding yang digunakan tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap bobot kuning telur ayam per telur yang diteliti.

4. Warna Kuning Telur

Tabel 5 menunjukkan rata-rata warna setiap kuning telur, sebagai berikut

Tabel 5. rata-rata warna kuning telur ayam per butir selama penelitian.

Jenis Alas Kandang	Ulangan	Jenis Ransum				Jumlah
		R-1 (gr)	R-2 (gr)	R-3 (gr)	R-4 (gr)	
Sekam	1	6,59	6,72	6,81	6,88	
	2	6,56	6,72	7,06	6,75	
Padi	3	6,25	6,66	7,19	7,06	
	Jumlah	19,40	20,10	21,06	20,69	
	Rata-rata	6,47	6,70	7,02	6,90	
Slat	1	6,13	6,31	6,71	6,72	
	2	6,19	6,34	6,75	6,59	
	3	6,19	6,56	6,69	6,81	
	Jumlah	18,51	19,21	20,15	20,12	77,99
	Rata-rata	6,17	6,40	6,72	6,71	
	Total	37,91	39,31	41,21	40,81	159,24

Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan, bahwa jenis ransum memperlihatkan pengaruh yang sangat nyata ($P < 0,01$) lebih rendah warna kuning telurnya dibandingkan dengan jenis ransum R-2, R-3, dan R-4. demikian pula dengan ransum R-2 berbeda sangat nyata ($P < 0,01$) lebih rendah warna kuningnya dibandingkan dengan jenis ransum R-3 dan R-4. sedangkan jenis ransum R-3 tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan jenis ransum R-4. hal ini disebabkan kandungan limbah isi rumen sapi yang berasal dari hijauan sebagai bahan makanan utama sapi, dan hijauan tersebut mengandung karotin yang akan berpengaruh terhadap warna kuning telur.

Hasil penelitian ini sejalan yang diporkan oleh Orr dan Fletcher (1973) yang dikutip oleh Hariana (2010) mengatakan, bahwa kesempurnaan warna kuning telur tergantung pada konsumsi makanan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pada umumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi warna kuning telur diantaranya adalah hijau dan biji-bijian yang dikonsumsi. Selain itu, menurut Purnamaningsih (2010), semakin tinggi kandungan protein dan lemak dalam ransum maka semakin tinggi indeks kuning telur. Hal ini sesuai dengan Badan Standardisasi Nasional (2008) yang memiliki indeks kualitas kuning telur sebesar 0,458-0,521 (Kualitas I), 0,394-0,457 (Kualitas II), dan 0,330-0,393 (Kualitas III).

Jenis alas kandang yang digunakan sangat mempengaruhi warna kuning telur. Hal ini terlihat bahwa pada alas sekam padi nyata lebih warna kuning telurnya dibanding dengan jenis alas kandang slat. Hal ini disebabkan ayam yang dipelihara pada alas kandang slat tidak memperoleh makanan tambahan didalam kandang selain makanan yang diberikan, sedang ayam yang dipelihara pada alas kandang sekam padi dapat memperoleh makanan tambahan yang dihasilkan oleh limbah sekam padi yang mungkin berupa mineral, protein atau vitamin yang dapat mengakibatkan warna kuning telur menjadi lebih baik. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Donna, A.P. 2008. bahwa keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan menggunakan relative lebih murah dibandingkan dengan alas kandang lainnya, dan juga sebagai sumber Animal Protein Factor (APF) yang mungkin dapat menyebabkan warna kuning telur menjadi lebih baik.

Interaksi antara jenis ransum dan lantai kandang yang digunakan tidak berpengaruh nyata terhadap warna kuning telur setiap telur. Selain itu, pemanfaatan limbah perjalanan ternak untuk ayam petelur dapat menekan biaya ransum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan (Nurhajati, T., R. S. Wahyuni dan G. C. de Vries, 1996), dengan mengganti pakan yang bergizi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produk yang dihasilkan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai ekonomis pakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Penggunaan 7,5% limbah isi rumen sapi dalam pakan ayam petelur tidak menunjukkan manfaat/pengaruh yang signifikan terhadap ketebalan cangkang, berat protein atau

berat kuning telur, 2) namun penggunaan limbah isi rumen sapi kadar hingga 7,5% pada ransum ayam petelur menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap warna kuning telur ($P < 0,01$), 3) Interaksi antara jenis pakan dengan alas kandang yang digunakan tidak menunjukkan manfaat/pengaruh yang nyata terhadap ketebalan cangkang, bobot protein dan bobot kuning telur, serta warna kuning telur, dan 4) Penggunaan limbah isi rumen sapi untuk pakan berlapis dapat mengurangi biaya pakan dan meningkatkan efisiensi, sehingga meningkatkan nilai ekonomisnya.

Saran yang diberikan adalah pemanfaatan limbah isi rumen sapi dalam ransum ayam petelur sangat baik karena dapat mengurangi bau pada lingkungan tersebut dan perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam skala besar sehingga dapat mengurangi biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, U. (2006). Pengaruh Penggunaan Onggok dan Isi Rumen Sapi dalam Pakan Komplit terhadap Penampilan Kambing Peranakan Etawah. *Majalah Ilmiah Peternakan*. 9(3)
- Amrullah, I.K. (2011). Kerabang Telur Penentu Keuntungan. *Majalah Ayam dan Telur Jakarta*, 1:22-23
- Badan Standardisasi Nasional (BSN) (2008). SNI3926-2008 Telur Ayam Konsumsi BSN. Jakarta
- Donna, A.P. (2008). *Kandungan Serat Kasar Dan Protein Kasar Tepung Isi Rumen Yang Difermentasi Dengan Probiotik [Skripsi]*. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga.
- Hariana. (2010). *Pengaruh Pemanfaatan Daun Ubi Kayu dalam Ransum Terhadap Kualitas Telur. Tesis Fakultas Peternakan*. Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
- Indrawan ,I.G.,Sukada.I.M,& Suada,I.K. (2012). Kualitas Telur dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penanganan Telur di Tingkat Rumah Tangga. *Artikel Telur , ISSN 2301-784*
- Kurniawan, H. (2011). *Karkas dan Potongan Karkas Ayam Kampung Umur 10 Minggu yang Diberi Ransum Mengandung Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L) Terfermentasi Rhizopus oligosporus [Skripsi]*. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Nurhajati, T., R. S. Wahyuni dan G. C. de Vries. (1996). *Analisis Ekonomis Penggunaan Ampas Tahu Terfermentasi Sebagai Substitusi Pakan Komersial Terhadap Performan, Daya Cerna Pakan, Kualitas Daging Serat Gambaran Darah Ayam Pedaging Jantan*. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya.
- Purnamaningsih, A. (2010). *Pengaruh Penambahan Tepung Keong Mas (Pomacea canaliculata Lamarck) dalam Ransum Terhadap Kualitas Telur Itik*. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Solo.
- Steel, R.G. and J.H. Torrie.(1980). *Principles and Procedures of Statistics*. Mc Graw Hill Book Company Inc., New york.
- Sarwono, dkk. (2001). Effect of Sauropus androgynus Extract on Organ Weight,

Toxicity and Number of Salmonella sp and Escherichia coli of Broilers Meat. *B I P P*, 7 (2): 162-169.

Santoso, U. (2005). Pengaruh pemberian ekstrak daun katuk dalam ransum terhadap produksi, kadar nitrogen dan forsor, dan jumlah koloni mikrobia pada feses ayam petelur. *Jurnal Pengembangan Peternakan Tropis*, 30(4): 237-241

Winarno, F.G. dan S. Kaswara. (2002). *Telur: Komposisi, Penanganan dan Pengolahannya* M-Brio Press. Bogor.