



BIOKIMIA FARMASI

Dr. apt. Muntasir, S.Si., M.Si.

apt. Andi Ifriany Harun, S.Si., M.Si.

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.

Dr. Tahirah Hasan, S.Si., M.Si.

Apt. Warsidah, S.Si. M.Si.

Gustria Ernis, S. Pd., M. Si.


Dr. Sofi Siti Shofiyah.

Marwati, S.Farm., M.Si.

apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.

Ida Ayu Suci, S.Pd., M.Si.

EDITOR : Dr. Apt. Widy Susanti Abdulkadir, M.Si.



BIOKIMIA FARMASI

Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.
Apt. Andi Ifriany Harun, S.Si., M.Si.
Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.
Dr. Tahirah Hasan, S.Si., M.Si.
Apt. Warsidah, S.Si., M.Si
Gustria Ernis, S. Pd., M. Si.
Dr. Sofi Siti Shofiyah.
Marwati, S.Farm., M.Si.
Apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.
Ida Ayu Suci, S.Pd., M.Si.

PENERBIT



2024

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BIOKIMIA FARMASI

Ukuran unesco : (15,5 x 23 cm)
Halaman : vi + 229
Isbn : 978-623-8050-46-8
Penulis :
Dr. apt. Muntasir. S.Si., M.Si.
Apt. Andi Ifriany Harun, S.Si., M.Si.
Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.
Dr. Tahirah Hasan, S.Si., M.Si.
Apt. Warsidah, S.Si., M.Si
Gustria Ernis, S. Pd., M. Si.
Dr. Sofi Siti Shofiyah.
Marwati, S.Farm., M.Si.
Apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.
Ida Ayu Suci, S.Pd., M.Si.

Editor : **Dr. Apt. Widy Susanti Abdulkadir, M.Si.**

Layout &
Desain Cover :Tim Creative Rizmedia

RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA

Redaksi :

Jl. Batara Ugi Blok/Griya Astra
Blok C. No.18 (Yogyakarta/Makassar)

Telp/Wa:085242065812

Email:rizmediapustaka@gmail.com

Website : rizmediapustakaindonesia.com

Cetakan Pertama, Januari 2024

Hak Cipta 2024@Rizmedia Pustaka Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku yang berjudul **“BIOKIMIA FARMASI”**.

Ilmu biokimia merupakan bagian dari kelompok ilmu biomedik. Penerapan ilmu ini pada kefarmasian berfokus pada pemahaman tentang enzim dan Ko-enzim, oksidasi biologi, nutrisi pada manusia, karbohidrat, asam amino, purin pirimidin, lemak serta hormon dan peranannya dalam metabolisme.

Biokimia farmasi adalah cabang biokimia yang mempelajari bagaimana molekul dalam tubuh berinteraksi dengan obat. Ini menyelidiki sifat pengikatan antara obat dan reseptor dan mekanisme seluler kerja obat. biokimia farmasi digunakan untuk mengembangkan obat dan pengobatan yang lebih baik untuk berbagai penyakit dan kondisi. Hal ini juga penting untuk memahami penyebab reaksi merugikan dan toksisitas obat, serta memberikan informasi untuk pengembangan sistem penghantaran obat yang lebih baik. Biokimia farmasi sangat penting untuk meningkatkan kesehatan manusia, karena merupakan inti dari pemahaman dan pengembangan pengobatan yang dapat meningkatkan kehidupan

Buku ini membahas tentang:

BAB 1 PENTINGNYA MEMPELAJARI BIOKIMIA, MOLEKUL PENYUSUN KEHIDUPAN, DAN PERAN PENTING DALAM KEHIDUPAN.

BAB 2 BIOENERGETIKA

BAB 3 BIOSINTESIS KARBOHIDRAT

BAB 4 BIOSINTESIS ASAM AMINO, NUKLEOTIDA

BAB 5 PROTEIN

BAB 6 ENZIM

BAB 7 METABOLISME KARBOHIDAT

**BAB 8 METABOLISME LEMAK, METABOLISME LEMAK TAK
JENUH, DAUR UREA, DAN APLIKASI HDL DAN LDL**

BAB 9 METABOLISME TERINTEGRASI

**BAB 10 KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT
KELAINAN METABOLISME KARBOHIDRAT, PROTEIN,
LEMAK DAN ASAM AMINO**

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Swt senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

TIM PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1_PENTINGNYA MEMPELAJARI BIOKIMIA SEBAGAI MOLEKUL PENYUSUN KEHIDUPAN DAN PERAN PENTING DALAM KEHIDUPAN (Dr. Muntasir, S.Si., Apt. M.Si.)	2
BAB 2_BIOENERGETIKA (Apt. Andi Ifriany Harun,M.Si)	28
BAB 3_BIOSINTESIS KARBOHIDRAT (Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si).....	45
BAB 4_BIOSINTESIS ASAM AMINO DAN NUKLEOTIDA (Dr. Tahirah Hasan, S.Si., M.Si)	68
BAB 5_PROTEIN (Apt. Warsidah, S.Si. M.Si.)	89
BAB 6_ENZIM (Gustria Ernis, S. Pd., M. Si)	124
BAB 7_METABOLISME KARBOHIDRAT (Dr. Sofi Siti Shofiyah.)	145
BAB 8_METABOLISME LEMAK, METABOLISME LEMAK TAK JENUH, DAUR UREA, DAN APLIKASI HDL DAN LDL (Marwati, S.Farm., M.Si).....	163
BAB 9_METABOLISME TERINTEGRASI (Apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.)	193
BAB 10_KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN METABOLISME KARBOHIDRAT, PROTEIN, LEMAK, DAN ASAM AMINO (Ida Ayu Suci, S.Pd., M.Si.)	213
PENUTUP	229



BAB 1



**PENTINGNYA MEMPELAJARI BIOKIMIA SEBAGAI
MOLEKUL PENYUSUN KEHIDUPAN DAN PERAN
PENTING DALAM KEHIDUPAN
(Dr. Muntasir, S.Si., Apt. M.Si.)**

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucipto Penfui Kupang NTT 85001 Telp. 0380 821410

Email: muntasir@staf.undana.ac.id, munbasrypps@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia terdiri atas unit-unit kecil yang disebut sel. Selama makhluk hidup masih hidup banyak sekali proses dan perubahan yang terjadi dalam sel. Aktivitas yang terjadi dalam sel inilah yang menunjang fungsi organ-organ dalam makhluk hidup. Fenomena kehidupan yang ditandai oleh adanya pertumbuhan dan reproduksi serta hal-hal yang berkaitan, merupakan ruang lingkup biolog, kimia dan ilmu-ilmu lainnya misalnya ilmu kedokteran dan kesehatan.

Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses kimia dalam organisme hidup. Biokimia mengatur semua organisme hidup dan proses hidup. Dengan mengontrol arus informasi melalui sinyal biokimia dan aliran energi kimia melalui metabolisme, proses biokimia menimbulkan fenomena yang tampak magis kehidupan. Sebagian besar berkaitan biokimia dengan struktur dan fungsi komponen seluler protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat dan biomolekul (Chatterjea & Shinde, 2012)

Biokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan kimiawi makhluk hidup beserta proses-prosesnya. Biokimia memainkan peranan penting dalam pemahaman berbagai proses yang terjadi pada zat-zat penyusun cairan tubuh. Karya tulis ini akan membahas beragam interaksi biokimia yang turut meregulasi cairan tubuh, seperti osmolaritas, asam dan basa, larutan dapor, serta kesetimbangan kimia (Sutanto & Rania, 2020)

Biokimia adalah bahasa biologi. Alat untuk penelitian di semua cabang ilmu kedokteran terutama biokimia di alam. Ilmu yang mempelajari biokimia adalah penting untuk memahami fungsi dasar tubuh. penelitian bidang biokimia akan memberikan informasi mengenai fungsi sel pada tingkat molekuler. Bagaimana makanan yang kita makan dicerna, diserap, dan digunakan untuk membuat bahan-bahan tubuh? Bagaimana tubuh memperoleh energi untuk normal pekerjaan sehari-hari? Bagaimana berbagai proses metabolismenya saling berhubungan? Apa fungsi gen? Apakah yang dasar molekuler untuk resistensi imunologis terhadap organisme yang menyerang? Jawaban untuk pertanyaan mendasar seperti itu bisa hanya dapat diperoleh melalui studi biokimia yang sistematis.

Praktik medis modern sangat bergantung pada hal ini analisis laboratorium cairan tubuh, terutama darah. Manifestasi penyakit tercermin pada komposisinya darah dan jaringan lain. Oleh karena itu, demarkasi abnormal dari komponen normal tubuh adalah hal lain tujuan studi biokimia.

Kata kimia berasal dari kata Yunani "chemi" (tanah hitam), nama kuno Mesir. Ilmu kedokteran India, bahkan dari zaman kuno, telah mengidentifikasi dasar metabolik dan genetik penyakit. Charaka, ahli pengobatan India yang hebat, dalam risalahnya (sekitar tahun 400 SM)

mengamati bahwa madhumeha (diabetes melitus) disebabkan oleh perubahan metabolisme karbohidrat dan lemak; pernyataan masih bertahan dengan baik.

Biokimia telah berkembang sebagai cabang dari kimia organik, dan cabang ini sering disebut sebagai "kimia fisiologis". Itu istilah "Biokimia" diciptakan oleh Neuberg pada tahun 1903 dari bahasa Yunani kata, bios (= kehidupan) dan chymos (= jus). Salah satu risalah paling awal di biokimia adalah "Buku Kimia Organik dan Penerapannya". to Physiology and Pathology", diterbitkan pada tahun 1842 oleh Justus von Liebig (1803–73), yang memperkenalkan konsep metabolisme. "Buku Teks Kimia Fisiologis" diterbitkan pada tahun 1877 oleh Felix Hoppe-Seyler (1825–95), yang merupakan Profesor kimia Fisiologis di Universitas Strausbourg, Perancis. Beberapa tonggak dalam Pembangunan ilmu biokimia diberikan pada Tabel 1.

Tabel 1.1 Penemuan Penting dan Kajian Riset Ilmuwan

Penemuan Penting	Tahun	Ilmuwan
Rouelle	1773	Mengisolasi urea dari urin
Lavoisier	1785	Oksidasi bahan makanan
Wohler	1828	Sintesis urea
Berzelius	1835	Teori katalisis enzim
Louis Pasteur	1860	Proses fermentasi
Edward Buchner	1897	Enzim yang diekstraksi
Fiske dan Subbarao	1926	Mengisolasi ATP dari otot
Lohmann	1932	Kreatin fosfat
Hans Krebs	1937	Siklus asam sitrat
Avery dan Macleod	1944	DNA adalah materi genetic
Lehninger	1950	siklus TCA di mitokondria
Watson dan Crick	1953	Struktur DNA
Nirenberg	1961	Kode genetik dalam mRNA
Holley	1963	Mengurutkan gen untuk tRNA
Khorana	1965	Mensintesis gen

Paul Berg	1972	Teknologi DNA rekombinan
Kary Mullis	1985	Reaksi berantai polimerase
Kary Mullis	1990	Proyek genom manusia dimulai
Kary Mullis	2000	Draf genom manusia
Kary Mullis	2003	Proyek genom manusia selesai
ENCODE	2012	ENSiklopedia Unsur DNA

Praktik kedokteran adalah seni sekaligus sains. Kata “Dokter” berasal dari kata Latin “docere” yang berarti “kepada”. mengajar”. Pengetahuan tanpa latar belakang etika terkadang bisa saja demikian bencana! Hippocrates (460 SM hingga 377 SM), bapak modern kedokteran mengartikulasikan “Sumpah”. Sekitar satu abad sebelumnya, Sushruta (?500 SM), ahli bedah besar India, mengumumkan kode etik untuk praktisi medis, yang masih berlaku. Dia menyatakan: “Anda harus hanya berbicara kebenaran; peduli terhadap kebaikan semua makhluk hidup; mengabdikan dirimu untuk itu kesembuhan orang sakit meskipun nyawamu hilang karena pekerjaanmu; menjadi sederhana berpakaian dan tidak minum minuman keras; selalu berusaha untuk tumbuh dalam pengetahuan; di dalam di hadapan Tuhan, kamu dapat mengambil sumpah ini untuk dirimu sendiri.”

Biokimia mungkin merupakan disiplin ilmu yang paling cepat berkembang dalam kedokteran. Tak heran, hadiah Nobel mendapat porsi besar di bidang kedokteran untuk para peneliti pada penelitian yang terlibat dalam biokimia, munculnya teknologi rekombinan DNA, gen kini dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain, sehingga banyak yang ditentukan secara genetis penyakit sekarang dapat menerima terapi gen. Banyak gen, (misalnya manusia gen insulin) telah ditransfer ke mikroorganisme dalam jumlah besar skala produksi insulin

manusia. Kemajuan dalam genomik seperti RNA campur tangan untuk membungkam gen dan penciptaan hewan transgenic dengan penargetan gen sel induk embrionik membuka pandangan baru dalam terapi penyakit seperti kanker dan AIDS. Diharapkan di masa depan, dokter akan dapat merawat pasien, memahami genetiknya dasar, sehingga "obat perancang" yang sangat efisien dapat menyembuhkan penyakit (Vasudevan et al., 2013)

Dipandang secara luas biokimia merupakan ilmu yang berkembang secara cepat yang menerangkan berbagai molekul dan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dan organisme hidup. Biokimia dapat diartikan secara formal sebagai ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan dasar kimiawi kehidupan (kata *bios* dalam bahasa Yunani berarti "kehidupan"). Sel adalah satuan struktural pada pelbagai sistem kehidupan. Dengan berpegang pada konsep ini, kita akan mendapatkan suatu definisi fungsional biokimia, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan unsur-unsur kimiawi pada sel hidup dengan berbagai reaksi proses yang dialami. Ruang lingkup ilmu biokimia sama luasnya dengan ruang lingkup kehidupan. Di mana kehidupan itu ada, di situ berlangsung proses-proses kimiawi. Para pakar biokimia mempelajari proses-proses kimiawi yang terjadi dalam mikroorganisme, tumbuhan, insekta, burung, mammalia rendah dan tinggi, terlebih dahulu harus mengetahui metabolismenya, molekulernya, dan enzim-enzim yang mempengaruhi proses-proses tersebut. Sehingga metabolisme itu sendiri merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh sejumlah enzim dan metabolisme bukanlah suatu proses acak melainkan sangat terintegrasi dan terkoordinasi. Ilmu-ilmu Biokimia banyak menekankan kerangka pokok dan logika molekuler biokimia yang selalu diikuti oleh keterangan lengkap dan

penggambaran proses dasarnya. Sehingga ringkasan kimia organik yang berhubungan dengan biomolekul agar memudahkan bagi bagi mahasiswa yang telah mendapat pengetahuan biologi dan kimia organik yang minimum. (Wahjuni, 2013)

B. DEFENISI BIOKIMIA

Biokimia mempelajari proses kehidupan yang dimulai dari sel, karena sel adalah satuan terkecil dari kehidupan. Sel sebagai satuan terkecil kehidupan memiliki struktur dan organisasi yang unik. Keunikan sel itulah yang akan dijelaskan oleh biokimia berdasarkan kaidah-kaidah biologi dan kimia. Secara simultan, Biokimia mempelajari aspek biologi dan kimiawi senyawa-senyawa penyusun sel (Wahyudiati, 2017)

Biokimia merupakan kajian mengenai proses-proses yang terjadi di dalam zat hidup dalam melangsungkan kehidupannya, baik cara membangun tubuhnya, cara mendapatkan energi untuk menjalankan kehidupan, maupun cara memelihara eksistensi spesiesnya dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kajian biokimia meliputi struktur dan fungsi biomolekul, metabolisme dan *bioenergetika*, serta aliran pewarisan informasi genetik (Setiadi, 2013)

Biokimia dapat dianggap mengandung beberapa cabang. Ini termasuk Enzimologi; Endokrinologi; Biologi molekuler; Genetika Molekuler dan Rekayasa genetika; Imunologi; Biokimia Struktural; Neurokimia; dan Biologi Sel. Masing-masing disiplin ilmu ini menyangkut komponen yang berbeda biokimia (Aliouche & Sc, n.d.)

Dalam Biokimia kita mempelajari proses biokimia yang terjadi pada makhluk hidup atau zat hidup, sehingga semua hukum kimia dan fisika yang berlaku pada proses kimia juga berlaku pada zat hidup. Molekul

kimia yang terdapat dalam zat hidup itu tidak hanya bercampur dan bereaksi membentuk biomolekul dan berbagai komponen hidup lainnya, tetapi juga mengadakan interaksi satu dengan lainnya mengikuti prinsip azas logika molekul zat hidup (*principil of moleculer logic in living state*) (Julianto, 2015)

C. SEJARAH PERKEMBANGAN BIOKIMIA

Sejarah biokimia dapat dikatakan dimulai sejak zaman Yunani kuno yang tertarik pada komposisi dan proses kehidupan, meskipun biokimia sebagai suatu disiplin ilmu tertentu dimulai sekitar awal abad ke-19.[1] Ada yang berargumen bahwa awal mula biokimia mungkin adalah penemuan enzim pertama, diastase (sekarang disebut amilase), pada tahun 1833 oleh Anselme Payen,[2] sementara yang lain menganggap demonstrasi pertama Eduard Buchner tentang proses biokimia kompleks fermentasi alkohol dalam sel- ekstrak bebas menjadi kelahiran biokimia.[3][4] Beberapa orang mungkin juga menunjuk pada karya berpengaruh Justus von Liebig dari tahun 1842, Kimia hewan, atau, Kimia organik dalam penerapannya pada fisiologi dan patologi, yang menyajikan teori kimia tentang metabolisme, atau bahkan studi sebelumnya pada abad ke-18 tentang metabolisme. fermentasi dan respirasi oleh Antoine Lavoisier.[5][6]

Istilah biokimia sendiri berasal dari gabungan bentuk bio-, yang berarti 'kehidupan', dan kimia. Kata ini pertama kali dicatat dalam bahasa Inggris pada tahun 1848,[7] sedangkan pada tahun 1877, Felix Hoppe-Seyler menggunakan istilah (Biochemie dalam bahasa Jerman) dalam kata pengantar untuk edisi pertama Zeitschrift für Physiologische Chemie (Journal of Physiological Chemistry) sebagai sinonim untuk kimia fisiologis dan menganjurkan pendirian lembaga

yang didedikasikan untuk studinya. Namun demikian, beberapa sumber mengutip ahli kimia Jerman Carl Neuberg yang menciptakan istilah untuk disiplin baru ini pada tahun 1903,[10][11] dan beberapa menyebutkannya sebagai Franz Hofmeister.[12]

Subjek kajian biokimia adalah proses kimia pada organisme hidup, dan sejarahnya melibatkan penemuan dan pemahaman komponen kompleks kehidupan serta penjelasan jalur proses biokimia. Sebagian besar biokimia berkaitan dengan struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya; jalur metabolisme dan aliran energi kimia melalui metabolisme; bagaimana molekul biologis menimbulkan proses yang terjadi di dalam sel hidup; ini juga berfokus pada proses biokimia yang terlibat dalam pengendalian aliran informasi melalui sinyal biokimia, dan bagaimana kaitannya dengan fungsi organisme secara keseluruhan. Selama 40 tahun terakhir, bidang ini telah berhasil menjelaskan proses kehidupan sehingga kini hampir semua bidang ilmu kehidupan mulai dari botani hingga kedokteran terlibat dalam penelitian biokimia.

Di antara sejumlah besar biomolekul yang berbeda, banyak di antaranya merupakan molekul kompleks dan besar (disebut polimer), yang tersusun dari subunit berulang serupa (disebut monomer). Setiap kelas biomolekul polimer memiliki serangkaian tipe subunit yang berbeda. Misalnya, protein adalah polimer yang subunitnya dipilih dari dua puluh atau lebih asam amino, karbohidrat terbentuk dari gula yang dikenal sebagai monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida, lipid terbentuk dari asam lemak dan gliserol, dan asam nukleat terbentuk dari nukleotida. Biokimia mempelajari sifat kimia molekul biologis penting, seperti protein, dan khususnya kimia reaksi yang dikatalisis

enzim. Biokimia metabolisme sel dan sistem endokrin telah dijelaskan secara luas. Bidang biokimia lainnya termasuk kode genetik (DNA, RNA), sintesis protein, transportasi membran sel, dan transduksi sinyal. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia>.

Biokimia atau kimia biologis, adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup.^[1] Sebagai subdisiplin dari biologi dan kimia, biokimia dapat dibagi menjadi tiga bidang: biologi struktural, enzim, dan metabolisme. Selama beberapa dekade terakhir pada abad ke-20, biokimia telah berhasil menjelaskan proses kehidupan melalui tiga subdisiplin ilmu ini. Hampir semua bidang ilmu hayat sedang ditemukan dan dikembangkan melalui metodologi dan penelitian biokimia.^[2] Biokimia berfokus pada pemahaman dasar kimiawi yang memungkinkan molekul biologis memunculkan proses-proses yang terjadi di dalam sel hidup dan di antara sel,^[3] yang pada gilirannya berkaitan erat dengan pemahaman jaringan dan organ, serta struktur dan fungsi organisme.^[4] Biokimia berkaitan erat dengan biologi molekuler yang mempelajari mekanisme molekuler dari fenomena biologi.^[5] Sebagian besar biokimia berhubungan dengan struktur, fungsi, dan interaksi makromolekul biologis, seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Molekul-molekul ini membangun struktur sel dan melakukan banyak fungsi yang berhubungan dengan kehidupan.^[6]

Sifat kimiawi sel juga bergantung pada reaksi molekul dan ion kecil. Mereka dapat berupa senyawa anorganik (misalnya air dan ion logam) atau organik (misalnya asam amino yang digunakan untuk menyintesis protein).^[7] Mekanisme yang digunakan oleh sel

untuk memanfaatkan energi dari lingkungannya melalui reaksi kimia dikenal sebagai metabolisme. Temuan biokimia diterapkan terutama di bidang kedokteran, nutrisi, dan pertanian. Dalam pengobatan, ahli biokimia menyelidiki penyebab dan penyembuhan penyakit.^[8]

Ilmu gizi mempelajari bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran serta pengaruh dari kekurangan gizi.^[9] Di bidang pertanian, ahli biokimia menyelidiki tanah dan pupuk. Meningkatkan budidaya tanaman, penyimpanan tanaman, serta pengendalian hama juga merupakan tujuan penerapan biokimia.

Menurut definisi yang paling komprehensif, biokimia dapat dilihat sebagai studi tentang komponen dan komposisi makhluk hidup dan bagaimana mereka bersatu dan bekerja sama menjadi bentuk kehidupan. Dalam pengertian ini, sejarah biokimia dapat berasal dari zaman Yunani kuno.^[10] Namun, biokimia sebagai disiplin ilmu yang spesifik dimulai sekitar abad ke-19, atau lebih awal, bergantung pada aspek biokimia mana yang difokuskan. Beberapa orang berpendapat bahwa biokimia mungkin dimulai sejak penemuan molekul enzim yang pertama, yaitu diastase (sekarang disebut amilase), pada tahun 1833 oleh Anselme Payen,^[11] sementara yang lain menganggap demonstrasi Eduard Buchner mengenai proses biokimia kompleks pertama, yaitu fermentasi alkohol pada ekstrak yang bebas-sel pada tahun 1897 sebagai tanda kelahiran biokimia.^{[12][13]}

Beberapa orang juga mungkin menunjuk karya berpengaruh yang terbit pada tahun 1842 oleh Justus von Liebig, *Kimia hewan, atau, Kimia organik dalam aplikasinya pada fisiologi dan patologi*, yang mempresentasikan teori kimia tentang metabolisme, sebagai

permulaan dari biokimia,^[10] atau bahkan sejak studi abad ke-18 tentang fermentasi dan respirasi oleh Antoine Lavoisier.^{[14][15]} Banyak pionir lain disebut sebagai pendiri biokimia modern karena membantu mengungkap kompleksitas biokimia. Emil Fischer, yang mempelajari kimia protein,^[16] dan F. Gowland Hopkins, yang mempelajari enzim dan sifat dinamis biokimia, mewakili dua contoh ahli biokimia awal.^[17] Istilah "biokimia" sendiri berasal dari gabungan antara biologi dan kimia. Pada tahun 1877, Felix Hoppe-Seyler menggunakan istilah ini (*biochemie* dalam bahasa Jerman) sebagai sinonim untuk kimia fisiologis dalam kata pengantar untuk edisi pertama *Zeitschrift für Physiologische Chemie* (Jurnal Kimia Fisiologis) ketika ia menyarankan untuk mendirikan lembaga yang didedikasikan untuk bidang studi ini.^{[18][19]} Ahli kimia Jerman Carl Neuberg sering dikutip bahwa telah menciptakan kata tersebut pada tahun 1903,^{[20][21][22]} sementara beberapa orang lain mengkreditkannya ke Franz Hofmeister.^[23]

Pada awalnya, orang-orang secara umum memercayai bahwa kehidupan dan materialnya memiliki beberapa sifat atau substansi esensial (yang sering disebut sebagai "prinsip vital") yang berbeda dari materi yang ditemukan pada benda tak hidup, dan menganggap bahwa hanya makhluk hidup yang dapat menghasilkan molekul kehidupan (senyawa organik).^[25] Pada tahun 1828, Friedrich Wöhler menerbitkan tulisan tentang sintesis urea, yang membuktikan bahwa senyawa organik dapat dibuat secara artifisial.^[26] Sejak itu, biokimia mulai maju, terutama sejak pertengahan abad ke-20 dengan perkembangan teknik baru seperti kromatografi, difraksi sinar-X, interferometri polarisasi ganda, spektroskopi NMR, pelabelan radioisotop, mikroskop elektron, dan simulasi dinamika molekuler.

Teknik-teknik ini memungkinkan penemuan dan analisis yang lebih mendalam dari berbagai molekul dan jalur metabolisme sel, seperti glikolisis dan siklus Krebs (siklus asam sitrat), serta mengarah pada pemahaman tentang biokimia pada tingkat molekuler. Perkembangan ilmu baru seperti bioinformatika juga banyak membantu dalam peramalan dan pemodelan struktur molekul raksasa.

Peristiwa bersejarah penting lainnya dalam biokimia adalah penemuan gen dan perannya dalam mentransfer informasi di dalam sel. Pada tahun 1950-an, James D. Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, dan Maurice Wilkins berperan penting dalam penemuan struktur DNA dan menunjukkan hubungannya dengan transfer informasi genetik.^[27] Pada tahun 1958, George Beadle dan Edward Tatum menerima Hadiah Nobel atas penelitian mereka mengenai fungi yang menunjukkan bahwa satu gen menghasilkan satu enzim.^[28] Pada tahun 1988, Colin Pitchfork adalah orang pertama yang terbukti melakukan pembunuhan dengan digunakannya DNA sebagai alat bukti, yang mendorong perkembangan ilmu forensik.^[29] Belum lama ini, Andrew Z. Fire dan Craig C. Mello menerima Hadiah Nobel 2006 untuk menemukan peran interferensi RNA (RNAi) dalam membungkam ekspresigen.^[30] <https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia>

Biokimia berasal dari kata Yunani *bios* “kehidupan” dan *chemis* “kimia” yang sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dasar kimia kehidupan. Atau dapat juga diartikan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel hidup. Istilah biokimia telah dikemukakan oleh Karl Neuberg (1903) ahli kimia Jerman dan sekitar pertengahan abad XVIII Karl Wilhelm Scheele ahli kimia swedia telah melakukan penelitian mengenai susunan kimia jaringan pada tumbuhan dan hewan. Selain itu ia juga

telah dapat mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat serta beberapa ester dan kasein dari bahan alam. Pada awal Abad XIX, oleh Friedrich Wohler yaitu pada tahun 1828 Wohler menunjukkan bahwa urea, suatu senyawa yang terdapat dalam urine, ternyata dapat dibuat dalam laboratorium dengan jalan memanaskan alkali sianat dengan garam amonium. Perkembangan Biokimia dilanjutkan dengan penemuan dua bersaudara Eduard dan Hans Buchner yang berdasarkan hasil percobaannya membuktikan bahwa sel-sel ragi yang telah mati masih mampu untuk menyebabkan terjadinya proses fermentasi gula menjadi alkohol. Penemuan dua bersaudara ini menjadikan tonggak sejarah baru dalam perkembangan pengetahuan dan aplikasi Biokimia, yaitu adanya kemungkinan dilakukannya analisis reaksi dan proses Biokimia dengan alat laboratorium (*in vitro*), tanpa perlu menggunakan organisme hidup (*in vivo*). Penemuan ini dilanjutkan dengan penemuan dan penerapan biokatalis, yaitu katalisator alami yang mampu mempercepat suatu reaksi kimia yang terjadi. Selanjutnya Pada tahun 1926 J.B. Sumner membuktikan bahwa urease, yakni enzim yang diperoleh dari biji kara pedang (*jack beans*) dapat dikristalkan seperti juga senyawa organik lainnya. Hal ini makin memperkuat kenyataan bahwa enzim dengan struktur kompleksnya, dapat diteliti meskipun dalam skala laboratorium sekalipun. Sejalan dengan perkembangan biokimia, para ahli biologi sel memberikan sumbangannya dalam bidang struktur sel. Diawali oleh Robert Hooke pada Abad XVII telah melakukan observasi terhadap sel-sel, maka perbaikan atas teknik observasi dengan menggunakan mikroskop telah dapat meningkatkan pemahaman atas struktur yang kompleks. Pengembangan mikroskop elektron pada pertengahan Abad XX juga telah memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap

perkembangan ilmu Biokimia baik pemahaman atas struktur senyawa-senyawa biokimia, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, maupun identifikasi reaksi metabolisme dalam sel makhluk hidup. Selanjutnya dalam bidang genetika seorang ahli genetika yang bernama Gregor Mendel pada pertengahan Abad XIX dan kemudian menjelang Abad XX berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa gen yang menjadi penyusun sel makhluk hidup. Pada tahun 1869 asam nukleat telah diisolasi Friedrich Miescher dan pada awal Abad XX Para ahli biokimia berpendapat bahwa hanya protein yang memiliki struktur yang paling kompleks yang membawa informasi genetika, sedangkan asam nukleat diasumsikan hanya sebagai senyawa yang sederhana sebagai penyusun sel makhluk hidup. Menjelang pertengahan Abad XX ini terbukti bahwa asam deoksiribonukleat (DNA) adalah senyawa pembawa informasi genetika. James Watson dan Francis Crick (1953) berdasarkan hasil percobaannya dengan melakukan elusidasi struktur 3 dimensi DNA dan mekanisme replikasinya menjadi dasar pemahaman mengenai fungsi gen sebagai pembawa sifat suatu jasad. Pada tahun 1970an Paul Berg melakukan eksperimen penyambungan DNA suatu virus sehingga diperoleh suatu DNA rekombinan dan menjadi titik awal baru perkembangan teknologi baru yang sangat mendukung berkembangnya aplikasi Biokimia dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara umum pada Abad XX ini biokimia mengalami perkembangan yang pesat yang didukung oleh kemajuan atau perkembangan metode analisis kromatografi, penemuan hasil antara dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, penemuan struktur primer, sekunder, tersier dan kuarterner protein serta struktur DNA dan RNA mempunyai

arti yang sangat penting dalam perkembangan biokimia. (Wahyudiati, 2017)

D. TUJUAN DAN MANFAAT BIOKIMIA

Pada hakikatnya, dengan belajar biokimia kita tidak sekedar mengetahui susunan dan bagian-bagian dari organisme, tetapi lebih jauh lagi mengenai hubungan antara organisme dengan lingkungannya dan interaksi antara proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme itu sendiri. Sehingga pada akhirnya diperoleh penjelasan mengenai:

1. ciri zat hidup;
2. biokimia dalam zat hidup;
3. biomolekul dalam zat hidup;
4. fungsi biomolekul dalam zat hidup;
5. hierarki organisasi molekul dalam sel;
6. transformasi energi (Setiadi, 2013)

Dengan mempelajari biokimia kita mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Dengan demikian diharapkan kita akan mampu menghindari hal-hal dari luar yang akan mempengaruhi proses dalam sel-sel tubuh, misalnya kita akan dapat mengatur makanan yang akan kita makan sehingga kita memperoleh manfaat dari makanan secara optimal. Contoh lain kita akan mampu menghindari dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah yang membahayakan kesehatan.

Manfaat mempelajari biokimia tersebut dapat kita berikan kepada orang lain, masyarakat atau kepada anak didik apabila kita bekerja sebagai pendidik. Bagi dosen dan guru sangat diperlukan adanya suatu

wawasan yang luas. Misalnya dalam mengajarkan ilmu kimia, maka pengetahuan kita tentang biokimia akan sangat membantu dalam memberikan contoh-contoh yang dapat menarik perhatian para anak didik. Wawasan yang luas tentang masalah lingkungan hidup tentu akan meningkatkan gairah dalam proses belajar-mengajar dan hal ini akan membantu upaya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan yang sehat (Ischak et al., 2017)

Tujuan mempelajari biokimia secara umum yaitu mendiskripsikan struktur, organisasi dan fungsi zat hidup pada tingkat molekul yang terkait dengan bagaimana suatu organisme membentuk struktur “supramolekul” yang dimulai dari tingkat sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Selain itu, biokimia juga membahas bagaimana mekanisme reaksi-reaksi kimia di dalam sel berlangsung dan reaksi-reaksi kimia apa saja yang berkaitan dengan proses reproduksi, pertumbuhan dan kematian suatu sel atau organisme, dan bagaimana organisme menyimpan dan menyalurkan informasi genetik dengan sangat tepat dan akurat, proses metabolisme sel, termasuk reaksi-reaksi yang menggunakan enzim, yaitu biokatalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi biokimia tersebut.

Tujuan mempelajari biokimia sangat berkaitan erat dengan manfaat mempelajari biokimia yaitu hasil temuannya telah banyak dipakai secara luas baik di laboratorium maupun di luar laboratorium termasuk di bidang pertanian, kedokteran, farmasi, nutrisi, dan sebagainya. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. khususnya pada pemeriksaan darah: kadar kolesterol, SGPT-SGOT, bilirubin dsb.
2. Obat-obatan:
3. Antibiotik: penisilin, streptomisin, erytromycin dlsb

4. Viagra
5. AZT (azido dideoksi timidin) → menggantikan Thimine, memblokir sintesis DNA oleh virus (HIV)
6. 6-Merkapto Purin → menghambat sintesis DNA pada pembiakan sel leukemia
7. Isoproterenol → menyerupai hormon ephineprin/ adrenalin sehingga menghambat rangsangan oleh hormon itu.
8. Herbisida dan pestisida → umumnya adalah inhibitor salah satu enzim pada tanaman atau serangga. (Wahyudiati, 2017)

E. PERAN PENTING BIOKIMIA DALAM KEHIDUPAN

Dengan dimanfaatkan biokimia dalam bidang kesehatan kita dapat memahami kesehatan dan memelihara kesehatan kita agar terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Jika kita sudah terkena penyakit kita juga bisa memahami dan melakukan penanganan suatu penyakit secara efektif. Selain itu biokimia juga dapat menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi dan toksilologi karena dua bidang ini berhubungan dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme. Lalu dalam obat-obatan biasanya mempengaruhi jalur metabolik tertentu. Misalnya antibiotik penisilin dapat membunuh bakteri dengan menghambat pembentukan polisakarida pada dinding sel bakteri. Dengan demikian bakteri akan mati karena tak dapat membentuk dinding sel. Dampak biokimia terutama terlihat pada bidang medis dan industri farmasi. Namun, biokimia memainkan peran mendasar dalam hal ini kehidupan sehari-hari, mempengaruhi berbagai aspek masyarakat mulai dari ritel, makanan, kosmetik, dan fashion hingga perawatan kesehatan.

Biokimia telah terlibat dalam pengembangan banyak produk dan proses yang digunakan setiap hari. Ini termasuk penemuan dan

peningkatan produk medis, produk pembersih dan teknologi rekombinan DNA yang dapat digunakan untuk membuat molekul penting seperti insulin dan bahan tambahan makanan. Pengetahuan biokimia dan binokular juga membantu kualitas dan kuantitas produksi pangan melalui peningkatan bahan kimia pertanian, pengembangan tanaman dengan peningkatan ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan penyiapan makanan yang meningkatkan kesehatan manusia, yang mencakup pra dan pro-biotik dan antioksidan (Aliouche & Sc, n.d.)

Dengan dimanfaatkannya biokimia dalam bidang kesehatan kita dapat dapat memahami kesehatan dan memelihara kesehatan kita agar terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Jika kita sudah terkena penyakit kita juga bisa memahami/melakukan penanganan suatu penyakit secara efektif.

Selain itu Biokimia juga dapat menjelaskan hal ini dalam bidang farmakologi dan toksikologi karena dua bidang ini berhubungan dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme. Lalu dalam kasus Obat-obatan biasanya mempengaruhi jalur metabolik tertentu, misalnya antibiotik penisin dapat membunuh bakteri dengan menghambat pembentukan polisakarida pada dinding sel bakteri, dengan demikian bakteri akan lisis dan mati karena tidak dapat membentuk dinding sel.

Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber yaitu dari tanaman (glikosida jantung untuk mengobati lemah jantung), jaringan hewan (heparin untuk mencegah pembekuan darah), kultur mikroba (penisilin G sebagai antibiotik pertama), urin manusia (choriogonadotropin) dan dengan teknik bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit diabetes. Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan

aktivitasnya maka pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan ilmu baru yaitu kimia medisinal dan farmakologi molecular yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari biokimia molecular

Studi tentang kemoterapi anti protozoa mengalami perkembangan, sekitar 1890, dan anti malaria sintetik yang pertama, berkembang bersama obat hipnotik, anti-inflamasi, adrenergik, kholonergik, hormon dan obat lain. Kemudian diikuti penemuan-penemuan yang lebih baik seperti antibakteria, antibiotika, antihistaminika, vitamin dan hormon-hormon, berkembang lebih maju. Setelah perang dunia ke II perencanaan dan perkembangan penelitian obat-obatan terpusat pada 3 pokok utama; ialah obat-obatan antituberkulosis, hormon dan kontrasepsi, antipsikotika, ansiolitik, dan antidepresan psikofarmakologik. Penggunaan metode-metode canggih seperti analisis spektroskopi untuk elusidasi rumus struktur senyawa, pemakaian senyawa bertanda isotop, analisis secara otomatis, dan pemisahan menggunakan kromatografi dan cara partisi lainnya, membuka jalan untuk mempelajari bahan kimia dalam jumlah sangat kecil. Kemajuan cara monitoring biologi dari berbagai macam aktivitas obat menambah perkembangan ilmu itu, yang mulai meletakkan dasar biokimia kepada imunologi dan cara aksi biologi yang kompleks dari suatu obat. Perkembangan ilmu biokimia dan biologi molekuler dan antagonisme metabolit dalam obat-obatan, membuka jalan secara bertahap untuk pengobatan kanker dan penyakit mental dengan cara kemoterapi. Walaupun percobaan dan penelitian biokimia mutakhir secara mengejutkan selama empat dekade terakhir, proses pemikiran intelektual tentang praduga rancangan obat mengalami kemajuan dengan diikuti banyak kebimbangan dan keraguan yang merupakan ciri khas dan filosofi dari perkembangan ilmu pengetahuan (Ahmad, 2012)

F. KAITAN BIOKIMIA DENGAN PENGETAHUAN TERKINI

Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi katalisis enzim, energetika dan reaksi-reaksi metabolisme sel, proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik. Bidang ilmu ini juga didukung dengan penguatan pemahaman teknik isolasi biomolekul dari berbagai sumber daya alam hayati, pemurnian, karakterisasi biomolekul yang mendukung pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam hayati menjadi produk bioteknologi.

Kajian Biokimia saat ini dapat dipelajari dalam kajian kimia biomolekul antara lain kimia karbohidrat, kimia lipid, protein dan asam amino, immunoglobulin, kimia enzim, oksidasi biologi, vitamin, hemoglobin, kimia respirasi, radikal bebas. Pada kajian biologi molekuler dapat dipelajari kimia nukleotida, metabolisme purin dan pirimidin, kimia asam nukleat, sintesis protein, reaksi ikatan polymerase, genom manusia dan terapi gen. Pada kajian Metabolisme dapat dipelajari metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, kimia hormon, metabolisme vitamin dan trace elemen, Pada kajian biokimia klinik dapat dipelajari enzim dan isoenzim penting dalam klinik, uji fungsi hati, uji fungsi ginjal, uji fungsi pencernaan, uji fungsi tiroid, nutrisi dan diet, biokimia kanker, biokimia AIDS, biokimia penuaan (ageing) dan juga kajian biokimia lingkungan dan penggunaan alat analisis terkini yang berkaitan pemeriksaan biokimia. (Chatterjea & Shinde, 2012)

Biokimia digunakan dalam aplikasi bioteknologi di industri tekstil. Enzim digunakan secara rutin untuk memutihkan dan mencuci tekstil,

dan untuk mengubah properti pakaian, misalnya mengubah tampilan denim atau mencegah penyusutan jenis serat, seperti wol dan kapas. Makin, keterlibatan mikroba dalam industri fashion sudah mulai terjadi dan dihindari penggunaan proses kimia tradisional yang berhubungan dengan kadar tinggi polusi. Sutra laba-laba, misalnya, terkenal karena sifatnya yang kuat, fleksibel, dan ringan properti; namun, budidaya sutra laba-laba di industri belum dapat dilakukan skala di masa lalu. Namun dengan menggunakan bioreaktor fermentasi secara genetic bakteri rekayasa dapat digunakan untuk memproduksi ini dalam jumlah besar. Karena pengetahuan tentang sifat material sutra pada tingkat molekuler, ini memberikan kontrol yang signifikan terhadap produk akhir dibandingkan dengan bahan tradisional. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga mengatasi masalah keberlanjutan sutra diproduksi tanpa adanya bahan hewani atau minyak bumi.

Faktanya, pendekatan yang dimediasi secara biokimia berpotensi berdampak pada iklim perubahan, yang semakin diakui sebagai tantangan besar yang dihadapi Biokimia dalam Kehidupan Sehari-hari masyarakat di seluruh dunia. Pengetahuan biokimia telah digunakan untuk mengidentifikasi solusi seperti biofuel alga, penyerapan karbon, dan industri yang lebih efisien proses yang dapat membantu melindungi lingkungan dan meningkatkan perekonomian peluang. Penelitian biokimia juga dapat digunakan untuk memahami dasar biologi proses serta mekanisme yang kompleks dan elegan untuk memanfaatkan energi dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan. Dengan memahami iniproses, pengembangan produk bioteknologi maju telah tercapai, yang memungkinkan produksi jenis bioenergi baru seperti fotovoltaiik biokimia. Melalui identifikasi produk alami yang terjadi dari biokimia reaksi, produk telah dikembangkan

yang meningkatkan kesehatan manusia. Ini penelitian telah menjadi hal mendasar dan telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nutrisi dan penyakit yang baik. Biokimia terus mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia, meningkatkan dan mempengaruhi aspek kehidupan kita (Aliouche & Sc, n.d.)

Dengan mempelajari biokimia kita mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Dengan demikian diharapkan kita akan mampu menghindari hal-hal dari luar yang akan mempengaruhi proses dalam sel-sel tubuh, misalnya kita akan dapat mengatur makanan yang akan kita konsumsi sehingga kita memperoleh manfaat dari makanan secara optimal. Contoh lain kita akan mampu menghindari dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah yang membahayakan kesehatan.

Biokimia mempunyai peranan dalam memecahkan masalah gizi, penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi terutama pada anak-anak. Adapun salah satu penyebab dari kekurangan gizi adalah asupan makanan, infeksi penyakit. Seperti halnya yang telah di jelaskan di atas dengan mengetahui reaksi-reaksi apa saja yang terjadi dalam tubuh kita, kita dapat mengatasi kekurangan gizi dan kita akan dapat mengatur makanan yang akan kita konsumsi sehingga kita memperoleh manfaat dari makanan secara optimal. Serta kita mampu menghindari dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah yang membahayakan kesehatan.

REFERENCE

- Ahmad, A. (2012). *Pendekatan Biokimia Dan Medisinal Senyawa Kimia Obat*.
- Aliouche, B. H., & Sc, B. (n.d.). *Applications of Biochemistry : Agriculture and*. 1–7.
- Chatterjea, M., & Shinde, R. (2012). *Texboof of Medical Biochemistry* (R. Saxena (ed.); 12th ed., Vol. 12). Jaypee Brothers Medical Publisher (P) Ltd.
- Ischak, N. I., Salimi, Y. K., & Botutihe, D. N. (2017). *Biokimia Dasar 1*. UNG Press.
- Julianto, T. S. (2015). *Biomolekul Dalam Perspektif Al- Qur'an*.
- Setiadi, R. (2013). Pengantar Biokimia. *Biokimia*, 1–42.
- Sutanto, R. L., & Rania, G. (2020). Interaksi Biokimia pada Regulasi Cairan Tubuh: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 12(1), 18–24.
<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol12.iss1.art1>
- Vasudevan, D., S, S., & Vaidyanathan, K. (2013). *Textbook of Biochemistry for Medical Students* (VII). Jaypee Brothers Medical Publsbers (P) Ltd.
- Wahjuni, S. (2013). *Metabolisme Biokimia* (J. Atmaja (ed.); Pertama). Udayana University Press.
- Wahyudiati, D. (2017). *Biokimia* (E. M. Jayadi (ed.); Cetakan I). LEPPIM Mataram.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia>

PROFIL PENULIS

Dr. Muntasir, S.Si, Apt. M.Si.

Staf dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana mulai Agustus 2023 yang sebelumnya berada pada program studi Kesehatan Masyarakat dari tahun 2003. mengajarkan mata kuliah : Biokimia, Kimia Analisis Kualitatif, Kimia Analisis Kuantitatif, Metode Pemisahan, Analisis Instrumen, Kimia Kesehatan, Biokimia Gizi, Biomedik I dan II, dan Kewirausahaan Kesehatan dengan sertifikat dosen bidang keahlian Biomedik. Sejak 2016 Mengajar pada prodi Magister S2 pada mata kuliah Biokimia Gizi, Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Menyelesaikan Doktorat di Program Studi Ilmu Kimia pada kajian Pencemaran Sianida di lingkungan tahun 2016 di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini juga sebagai staf pengajar program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan S2 IKM Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.



Email : muntasir@staf.undana.ac.id

Alamat : Perumahan RSS Baumata Blok C No. 2 Baumata Barat.
Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85361

Buku dan book Chapter yang sudah dituliskan dan terbit, yaitu :

1. **Muntasir.** 2018. **Kewirausahaan Bidang Kesehatan** ISBN 978-602-5668-68-5. Penerbit Litera Nusa Inspirasi. Bandung;
2. **Muntasir.** 2019. **Kimia Kesehatan** ISBN 978-602-6478-47-4 Penerbit LP2M Universitas Nusa Cendana. Kupang;
3. **Muntasir.** 2019. **Manajemen Logistik Kesehatan** ISBN 978-623-7276-47-0. Penerbit Litera Nusa Inspirasi. Bandung;
4. Herniwati, **Muntasir.**, dkk. Buku Chapter **Etika Hukum Kesehatan**.

2020. ISBN: 978-623-92777-8-9
5. Zulkarnain Hamson, **Muntasir**, dkk. 2021. **Informasi Teknologi di Dunia Ilmu Kesehatan** ISBN 978-623-6290-38-5. Penerbit Media Sains Indonesia
 6. **Muntasir dkk, Antibiotik dan Resistensi Antibiotik**. 2021; ISBN 978-623-98733-6-3
 7. **Muntasir, Biomedik**, 2021. ISBN 978-623-285-700-1.
 8. **Muntasir, Inovasi Alat Musik Sasando Elektrik**, 2022; ISBN 978-623-99679-2-5
 9. **Muntasir dkk, Biomedik Dasar**, 2022. ISBN 978-623-8050-10-9
 10. **Dr. Sri Syatriani, SKM., M.Kes., Dr. Apt. Muntasir, S.Si, M.Si dkk. Surveilans Kesehatan Masyarakat**. 2023. ISBN 978-623-8050-35-2



BAB 2



BIOENERGETIKA

(Apt. Andi Ifriany Harun,M.Si)

Universitas Tanjungpura; jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi

Pontianak, (0561)739630


Email : andi.ifriani@fkip.untan.ac.id

A. PENGANTAR BIOENERGETIKA

Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Agar dapat tumbuh dan berkembang, makhluk hidup perlu mengonsumsi zat gizi dari makanan yang dimakannya. Makanan yang dikonsumsi, terutama oleh manusia terdiri dari makro nutrisi dan mikro nutrisi. Yang termasuk makro nutrisi adalah karbohidrat, protein dan lemak, sedangkan mikronutrien terdiri dari vitamin, mineral dan sebagainya. Fungsi utama makronutrien untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan untuk pertumbuhan.

Makanan yang dimakan akan melewati sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung dan akan diserap di usus halus. Selama dalam proses pencernaan, makanan akan mengalami berbagai reaksi enzimatik sehingga mengubah bentuk molekul dari molekul besar (polisakarida, polipeptida, dan lipid) menjadi prekursor-prekursor pembentuknya (monosakarida, asam amino, asam lemak, dan gliserol). Prekursor-prekursor inilah yang akan diserap melalui usus halus dan mengalami metabolisme. Sistem pencernaan manusia dapat dilihat dari gambar 2,1.

Gambar 2.1 Sistem Pencernaan manusia



Sumber : <https://desinayoe.files.wordpress.com/2012/03/sistem-pencernaan.jpg>, diakses tanggal 27 November 2023

Perpaduan dari ilmu biokimia dan biologi sel menghasilkan cabang ilmu yang disebut bioenergetika atau termodinamika biokimia, dimana pada bioenergetika dipelajari tentang perubahan energi yang menyertai reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh manusia. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung oleh energi yang cukup. Hasil dari bioenergetika adalah energi yang dilepaskan, baik pada sistem biologik maupun sistem non biologik. Dalam sistem biologik, karena bersifat isotermik, maka penggunaan energi untuk melangsungkan proses kehidupan dalam bentuk energi kimia. Sumber energi kimia dalam tubuh manusia adalah senyawa

organik berenergi tinggi yang di kenal dengan ATP (Adenosin Trifosfat).

Sumber utama energi primer bagi semua kehidupan di bumi adalah energi cahaya matahari. Sebelum energi tersebut dapat digunakan oleh sel, energi cahaya matahari akan mengalami 3 tahap transformasi, yaitu :

- a. Transformasi energi oleh klorofil
- b. Transformasi energi oleh mitokondria
- c. Transformasi energi oleh sel.


B. TRANSFORMASI ENERGI OLEH KLOORIFIL

Adanya bantuan sinar matahari dan klorofil dapat mengubah karbondioksida (CO_2) di udara dan air (H_2O) dari tanah membentuk karbohidrat yang tersimpan dalam sel. Peristiwa ini disebut fotosintesis.

Fotosintesis adalah suatu proses metabolisme pada tanaman untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan karbondioksida (CO_2) dari udara bebas dan air (H_2O) dari dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Pada dasarnya fotosintesis adalah proses perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam sel berupa gula.

Ada 2 macam klorofil yang terdapat dalam tumbuhan tingkat tinggi, yaitu klorofil a dan klorofil b. Rumus Tumbuhan tinggi mengandung 2 macam klorofil yaitu klorofil a (berwarna hijau tua) dan klorofil b (berwarna hijau muda). Rumus bangun dari klorofil berupa suatu cincin yang terdiri dari atas 4 pirol dengan Mg sebagai inti. Rumus molekul klorofil a dan b disajikan pada Gambar 2.1.


Gambar 2.2 Rumus Molekul Klorofil a dan Klorofil b



Sumber : <https://generasibiologi.com/2016/10/uji-analisis-konsentrasi-klorofil-daun.html>, diakses tanggal 28 November 2023

Ada 2 fase reaksi fotosintesis, yaitu :


1. Reaksi terang yaitu reaksi pemecahan molekul air oleh energi cahaya matahari dengan reaksi sebagai berikut :



Hidrogen yang dilepas di tangkap oleh NADP yang berubah menjadi NADPH. Penangkapan energi cahaya juga digunakan untuk mengubah ADP (Adenosin Difosfat) menjadi ATP (Adenosin trifosfat). Pada tahap ini, dihasilkan ATP dan NADH.

2. Reaksi gelap, yang menggunakan ATP dan NADH hasil dari reaksi terang dengan cara memindahkan Hidrogen dari air oleh NADPH₂ ke asam organik berenergi rendah sehingga mengubah CO₂ dan H₂O menjadi glukosa, pati, selulosa dan polisakarida sebagai hasil akhir dari fotosintesis. Reaksi gelap terjadi di stroma, seperti gambar berikut :

Gambar 2.3. Struktur Kloroplast




Sumber:<http://www.biomagz.com/2015/08/fungsi-kloroplas-plastida-struktur.html>, diakses tanggal 29 November 2023

C. TRANSFORMASI ENERGI DALAM MITOKONDRIA

Hasil dari katabolisme berupa energi bebas, sebelum digunakan oleh reaksi yang membutuhkan energi, disintesis dulu menjadi senyawa antara berenergi tinggi dan dalam bentuk atom hydrogen/elektron. Salah satu senyawa antara berenergi tinggi adalah ATP (Adenosin Trifosfat).

Energi bebas dari atom hidrogen berenergi tinggi diperoleh dari senyawa yang menggunakan enzim dehidrogenase dalam reaksinya. Enzim ini mengkatalisis pemindahan atom Hidrogen dari senyawa yang bereaksi ke NADP⁺ yang merupakan koenzim khusus dalam bentuk teroksidasi sehingga menghasilkan NADPH. NADP dalam bentuk tereduksinya merupakan elektron berenergi tinggi dari reaksi katabolik ke reaksi anabolik. Gambar 2.4 menunjukkan molekul NADP dan transfer Hidrogen dari NADP⁺ menjadi NADPH.

Gambar 2.4 Molekul NADP dan perubahan NADP + menjadi NADPH.




Sumber : a1d04c3b9e3dc280961bb70c95ebc83d.pdf, diakses tanggal 29 November 2023

Senyawa antara berenergi tinggi lainnya adalah ATP, yang terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Basa (adenin)
2. Gula (Ribosa)
3. Gugus posforil yang terikat pada ribosa oleh ikatan ester posfat dan terikat satu sama lain oleh ikatan posfoanhidrida.


Gambar 2.5 Rumus Bangun ATP



2-Fosfohidrida merupakan bagian utama dari ATP dan dalam reaksinya mengalami pengurangan energi bebas yang banyak. Setiap senyawa yang dalam reaksinya mengalami penurunan energi bebas lebih dari 5 kkal/mol disebut sebagai **senyawa berenergi tinggi**. Reaksi hidrolisis ATP menjadi ADP atau reaksi ADP menjadi AMP dan masing-masing melepaskan 1 gugus fosfat, mengalami penurunan energi bebas baku sebesar -7,3 kkal/mol.

Karena ATP merupakan salah satu senyawa antara berenergi tinggi, maka ATP dapat menghubungkan proses yang menghasilkan energi (eksoterm) dan yang membutuhkan energi (endoterm). Energi bebas dalam proses metabolisme dibentuk melalui pembentukan Ikatan fosfohidrida dan energi bebas yang dihasilkan tersebut akan dilepaskan oleh ATP ke reaksi biokimia yang membutuhkan energi (endoterm) melalui pemecahan ikatan fosfohidrida. Gambar 2.6 memperlihatkan bagaimana hubungan antara energi (ATP) dengan reaksi eksoterm dan endoterm.


Gambar 2.6. Hubungan ATP dengan reaksi biokimia




Menurut Lipmann, symbol “~ P” menunjukkan ikatan fosfat berenergi tinggi, sehingga ikatan pada ATP dapat dituliskan sebagai A-P ~ P ~ P, dimana 2 ikatan fosfat terakhir adalah ikatan yang kaya

energi, sedangkan ikatan antara adenosin dengan fosfor adalah ikatan ester biasa. Hal ini terlihat dari pengurangan energi bebas pada hidrolisis ATP sebagai berikut :


Gambar 2.7 Hidrolisis ATP



Gambar 2.8 Hidrolisis ADP



Gambar 2.9. Hidrolisis AMP



Dari gambar 2.7 - 2.9 terlihat bahwa 2 fosfat terakhir pada senyawa antara ATP adalah ikatan yang kaya energi karena menghasilkan energi yang lebih besar dari 5 kkal/mol, sedangkan pada hidrolisis AMP, ikatan antara adenosin dengan gugus fosfat adalah ikatan ester biasa karena energi yang dihasilkan kurang dari 5 kkal/mol.

Selain ATP dan NADH, ada beberapa senyawa fosfat berenergi tinggi lainnya, yaitu :

- a. Fosfoguanidin
- b. Tioester
- c. Enol posfat
- d. Anhidrida asam posforik karboksilat
- e. Nukleosida trifosfat (untuk biosintesis) yang terdiri dari :
 - Uridin Triposfat (UTP) (sintesa polisakarida)
 - Guanosin Triposfat (GTP) : untuk sintesa lipida
 - Sitidin Triposfat (CTP) : untuk sintesa protein
 - deoksiadenosin Triposfat (dATP) : untuk sintesa DNA
 - deoksiguanosin Triposfat (dGTP) : untuk sintesa DNA
 - deoksisitidin Triposfat (dCTP) : untuk sintesa DNA
 - deoksitimidin Triposfat (dTTP) : untuk sintesa DNA
 - ATP, UTP, GTP, CTP : untuk sintesa RNA

D. TRANSFORMASI ENERGI OLEH SEL

Pada metabolisme dalam sel, peranan ATP sebagai sumber energi terjadi dengan mekanisme mendaur, dimana energi yang dihasilkan dari proses eksoterm melalui reaksi katabolisme, akan diangkut reaksi-reaksi biokimia yang membutuhkan energi (endoterm), seperti biosintesis, proses pengangkutan, kontraksi otot, dan sebagainya. Pembentukan ATP dari ADP + Pi dengan reaksi fosforilasi melalui proses oksidasi molekul penghasil energi. ATP yang dihasilkan akan disalurkan ke reaksi yang membutuhkan energi (endoterm) melalui

reaksi hidrolisis ADP dan Pi (fosfat anorganik). Peristiwa ini terjadi terus-menerus sehingga membentuk suatu daur ATP – ADP secara terus-menerus. Dalam hal ini gugus fosfat ujung pada molekul ATP secara kontinu dipindahkan ke molekul penerima gugus fosfat dan secara kontinu pula diganti oleh gugus fosfat lainnya selama katabolisme.

E. PRINSIP BIOENERGETIKA (TERMODINAMIKA)

Prinsip bioenergetika pada umumnya sesuai prinsip termodinamika pada bidang fisika. Prinsip bioenergetika terdiri dari :

1. Hukum Termodinamika I
2. Hukum termodinamika II

Istilah Termodinamika pertama kali dikemukakan oleh ahli Fisika berkebangsaan Yunani dan berasal dari kata **Thermos** yang berarti panas dan **dynamic** yang berarti perubahan. Termodinamika mempelajari tentang hukum-hukum perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain.

1. Hukum Termodinamika I

Hukum Termodinamika I sering disebut sebagai hukum kekekalan energi menjelaskan tentang energi yang terdapat dalam suatu sistem dan mengatakan bahwa “energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi yang terdapat dalam sistem tersebut hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain.

Akibat dari hukum termodinamika I, maka kalor dan kerja dapat saling tukar antara sistem (zat) dengan lingkungannya. Kalor (Q) yang diberikan dari lingkungan ke sistem sama dengan kerja eksternal (W) yang dilakukan sistem ditambah dengan energi dalam (U). Energi dalam (U) adalah jumlah dari energi kinetik (E_k) dan energi potensial

(Ep) sistem. Proses hukum I termodinamika meliputi proses isobarik, isotermik, adiabatik, dan isokhorik. Rumus hukum termodinamika I adalah :

$$\Delta U = Q - W$$

Keterangan :

ΔU = Perubahan energi dalam tubuh

Q = Perpindahan kalor dalam tubuh manusia

W = Kerja yang dihasilkan oleh tubuh

Ketika energi yang tersimpan berkurang, kalor akan berpindah dari tubuh dan tubuh akan menghasilkan kerja .

Penerapan Hukum I Termodinamika pada tubuh manusia

Hukum I termodinamika terjadi juga dalam tubuh manusia, dimana energi total yang dihasilkan oleh tubuh (laju metabolisme) adalah total energi yang dihasilkan dari proses metabolisme tubuh ditambah kerja eksternal tubuh, dengan rumus :

$$dM = dH + dW$$

Keterangan :

dM = laju metabolisme

dH = energi total dari proses metabolisme

dW = kerja eksternal yang dilakukan tubuh.

Energi yang dihasilkan dari makanan yang dikonsumsi (lingkungan) diubah dalam bentuk ATP, sehingga manusia dapat melakukan aktivitas yang akan menimbulkan energi lain, seperti energi potensial.

Untuk keseimbangan energi, energi yang diperlukan jumlahnya sama dengan energi yang digunakan untuk aktivitas tubuh manusia. Keseimbangan ini terjadi karena semua system pada tubuh manusia bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Antara lingkungan

dan tubuh manusia juga harus mengalami keseimbangan, dimana Lingkungan akan berpengaruh pada transfer energi dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya.

2. Hukum Termodinamika II

Bunyi dari hukum termodinamika II adalah kalor mengalir secara spontan dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah, tapi tidak terjadi sebaliknya. Untuk mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi, diperlukan tambahan kerja/usaha.

Pada tubuh manusia, perubahan energi yang terjadi adalah perubahan dari energi kimia yang diperoleh dari metabolisme makro nutrient (karbohidrat, protein, dan lemak) menjadi berbagai macam bentuk energi, seperti energi gerak (mekanik), energi panas, energi listrik dan bentuk energi lainnya.

Selama proses metabolisme, makro nutrien yang kita makan akan mengalami proses pencernaan baik pencernaan mekanik maupun kimiawi sehingga makanan tersebut terhidrolisis menjadi prekursornya masing-masing. Karbohidrat terhidrolisis menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino dan lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Karbohidrat akan mengalami metabolisme melalui proses glikolisis, siklus asam sitrat (siklus krebs) dan fosforilasi oksidatif, lipid teroksidasi melalui proses beta oksidasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP. ATP inilah yang akan diubah oleh tubuh menjadi berbagai macam bentuk energi sesuai kebutuhan tubuh.

F. RESPIRASI

Respirasi adalah pertukaran gas antar makhluk hidup. Respirasi pada manusia adalah proses pembakaran zat makanan (makro nutrien) dalam sel tubuh dengan bantuan oksigen dan enzim. Dalam tubuh, respirasi terjadi di mana saja pada sel hidup, khususnya pada mitokondria.

Berdasarkan keberadaan oksigen, respirasi terdiri dari respirasi aerob dan anaerob.

1. Respirasi Aerob

Respirasi aerob adalah proses respirasi yang memerlukan oksigen dalam jumlah yang banyak. Respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Ada 4 tahap respirasi aerob, yaitu:

a. Glikolisis.

Pada tahap ini, 1 molekul glukosa atau monosakarida yang lain akan mengalami beberapa tahap metabolisme dan menghasilkan asam piruvat. Proses ini terjadi di sitosol.

b. Dekarboksilasi Oksidatif.

Dekarboksilasi oksidatif adalah perubahan asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis menjadi asetil Koenzim A.

c. Siklus Asam Sitrat (Siklus Krebs)

Siklus ini terjadi di matriks mitokondria dan mengubah asetil Ko-A menjadi CO_2 dan H_2O

d. Fosforilasi Oksidatif

Yaitu system pengangkutan electron (transport electron) yang terjadi di permukaan membrane tilakoid.

Ciri-ciri respirasi aerob adalah :

a. Membutuhkan oksigen

- b. Berlangsung di mitokondria
- c. Menghasilkan 36 ATP
- d. Mempunyai 4 tahapan

2. Respirasi Anaerob

Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang dalam prosesnya tidak memerlukan oksigen. Ada 2 tahap respirasi anaerob, yaitu :

a. Fermentasi Alkohol

Fermentasi alkohol mengubah asam piruvat menjadi asetaldehid dan akhirnya membentuk etanol dalam kondisi anaerob.

b. Fermentasi Asam Laktat

Pada fermentasi asam laktat, asam piruvat menerima Hidrogen dan elektron dari NADH dan diubah menjadi asam laktat. Proses ini juga berlangsung secara anaerob

Ada 3 ciri respirasi anaerob, yaitu :

- a. Memiliki proses fermentasi alkohol karena sel tidak memiliki akseptor elektron yang berguna untuk memproduksi ATP saat oksigen tidak ada.
- b. Proses fermentasi hanya dapat dilakukan saat jamur ragi sudah membuat semua gas CO₂.
- c. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan.

REFERENCE

Runtulalu, D., dkk, 2009, "Media Interaktif Pembelajaran Sistem Pencanaan", Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra, Surabaya, Jurnal GEA, Vol. VI No. 1,

Song N. dan Banyo. Y., 2011, "Konsentrasi Klorofil Daun Sebagai Indikator Kekurangan Air pada Tanaman", Program Studi Biologi FMIPA Universitas SamRatulangi, Manado, Jurnal Ilmiah Sains Vol. 11 No. 2, hal 166-173

Artha I.N., 2016, "Lintasan C-3 Fotosintesis pada Tanaman", Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Bali, available from
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/c09133189ff27382cfc28935b10d900b.pdf,

Suci S., 2016, "Bioenergetika", Laboratorium Biokimia, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana, Bali

Anonim, 2007, "Prinsip Energi Metabolisme", Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya, Palembang

Cornelius, R.S., dkk., 2023, Termodinamika lubang Hitam : Hukum Pertama dan Kedua Serta Persamaan Entropi. Jurnal Kumparan Fisika, Vol. 6 No. 1, April 2023, Hal. 1-10
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/kumparan_fisika e-ISSN: 2655-1403 p-ISSN: 2685-1806

Vina Serevina, Emanina Y., 2021, "Penerapan Hukum Termodinamika dalam Metabolisme Tubuh", Program Studi Fisika, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta,
https://www.kompasiana.com/39_yohannaemanina9625/618f74ec06310e74b4752952/penerapan-hukum-termodinamika-dalam-metabolisme-tubuh

PROFIL PENULIS

Apt. A. Ifriany Harun, M.Si

Penulis Lahir di Makassar pada hari minggu, tanggal 27 desember 1970. Menyelesaikan pendidikan TK di Makassar, Tahun 1980 – 1986 pindah ke kota Palu Sulawesi-Tengah mengikuti orang tua, lalu kembali lagi ke Makassar. Tahun 1988-1989 pindah ke kota depok mengikuti orang tua dan kembali ke Makassar tahun 1989 sampai menyelesaikan kuliah S1 di FMIPA Jurusan Farmasi Universitas



Hasanuddin pada tahun 1996. Tahun 1998 menyelesaikan pendidikan profesi apoteker dan tahun 2001 menyelesaikan S2 Jurusan Kimia (biokimia) di Universitas Hasanuddin.

Tahun 1998 mengikuti program karya siswa yang dilaksanakan oleh Dikti dan diterima sebagai dosen pada Universitas Tanjungpura dari tahun 2000 sampai sekarang. Mengampu mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul, Metabolisme dan Rekayasa genetika, Ikatan Kimia, Kimia Koordinasi, Mikrobiologi, kimia Bahan Pangan, kimia kuantum, dan Bioteknologi. Tahun 2001-2010 menjadi apoteker pengelola apotek (APA) pada apotek Vega di Pontianak.

Bookchapter yang sudah ditulis sudah 2, yaitu Antibiotik dan Resistensi Antibiotik. (desember 2021) dan Ilmu Biomedik Dasar (desember 2022). Bookchapter ini adalah bookchapter ketiga yang Insya Allah akan terbit di tahun 2024

Email Penulis: andi.ifriani@fkip.untan.ac.id



BAB 3



BIOSINTESIS KARBOHIDRAT

(Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si)

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/Jl. H. Yasin Limpo

No.36 Samata-Gowa/Tlp 841879/Fax.8221400

Email:bmaswati@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Biosintesis karbohidrat adalah proses pembentukan karbohidrat dalam sel hidup. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi semua organisme hidup. Studi tentang biosintesis karbohidrat merupakan hal yang sangat penting bagi bidang farmasi. Melalui studi jalur biosintesis, para ilmuwan dapat memperoleh wawasan tentang jaringan metabolisme dasar sel, serta pengembangan pendekatan rekayasa metabolisme baru untuk menghasilkan molekul yang bermanfaat.

Mekanisme yang mendasari biosintesis karbohidrat dapat menciptakan strategi baru untuk produksi senyawa bernilai tinggi seperti obat-obatan. Selain itu, pengetahuan tentang biosintesis karbohidrat dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen, mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Karbohidrat sebagai salah satu jenis senyawa organik yang penting dalam biokimia sel. Tujuan untuk memahami dasar-dasar kimia dan biokimia yang terlibat dalam produksi, metabolisme, dan fungsi karbohidrat dalam tubuh manusia. Pemahaman ini sangat penting dalam konteks farmasi dan memiliki beberapa kegunaan yang signifikan.


Pengembangan obat-obatan yang berinteraksi dengan jalur metabolisme karbohidrat. Misalnya, obat-obatan yang digunakan untuk mengatur kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus bekerja dengan mempengaruhi jalur biosintesis dan metabolisme glukosa. Beberapa obat-obatan dapat memengaruhi metabolisme karbohidrat, dan pemahaman ini dapat membantu dalam mengantisipasi dan mengelola efek samping yang mungkin terjadi. Selain itu pengembangan Produk Kesehatan dapat membantu memahami bagaimana produk mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan kesehatan secara keseluruhan.

Metabolisme secara umum terbagi atas dua yaitu katabolisme dan anabolisme. **Biosintesis karbohidrat** merupakan proses anabolisme (pembentukan) karbohidrat di dalam sel. Semua sel bergantung pada glukosa dan monosakarida yang lain untuk proses metabolisme energi. Untuk kebutuhan ini organisme harus menyatukan glukosa dan mendistribusikan ke bagian yang membutuhkan. Sel membutuhkan glukosa untuk pembentukan glukolipid, glikoprotein dan struktural polisakarida. Glikogen yang tersimpan dalam hati akan mengalami metabolisme dan dapat menjaga kadar glukosa darah antara 12-24 jam.

Karbohidrat dihasilkan dari proses fotosintesis yang mengubah energi elektromagnetik menjadi energi kimia. Pada tumbuhan hijau, fotosintesis terdiri dari dua reaksi. Reaksi terang akan mengubah energi elektromagnetik menjadi potensi kimia. Reaksi enzimatik yang memanfaatkan energi dari reaksi terang untuk mengikat karbon dioksida menjadi gula disebut sebagai reaksi gelap. Reaksi karbon dioksida menjadi senyawa organik dan akhirnya menjadi gula dengan regenerasi akseptor karbon dioksida biosintetik. Jalur karbon dalam fotosintesis, seperti yang terutama dilakukan oleh Calvin dapat dilihat

pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1. Jalur biosintesis karbohidrat



B. ORGANISME DAN ENERGI

Biosintesis karbohidrat terjadi dalam berbagai organisme, termasuk tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Tumbuhan melakukan biosintesis karbohidrat melalui proses fotosintesis. Organisme mengubah energi cahaya matahari, karbon dioksida, dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di kloroplas dalam sel-sel tumbuhan.

Manusia dapat melakukan biosintesis karbohidrat melalui proses yang disebut glikoneogenesis. Ini terjadi ketika tubuh perlu menghasilkan glukosa dari sumber non-karbohidrat, seperti asam

amino dan gliserol, untuk memenuhi kebutuhan energi. Beberapa Organisme seperti bakteri dapat menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen, yang mirip dengan penyimpanan **glikogen** pada manusia. Bakteri ini melakukan proses biosintesis glikogen untuk menyimpan energi dalam kondisi nutrisi berlimpah dan menggunakannya saat nutrisi terbatas.

Jamur melakukan biosintesis **kitin** yang merupakan polisakarida yang terdiri dari unit-unit N-asetilglukosamina. Kitin adalah komponen utama dinding sel jamur dan eksoskeleton serangga. Biosintesis kitin ini melibatkan enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi khusus. Alga dan protozoa bisa melakukan biosintesis berbagai jenis karbohidrat, seperti alginat dan selulosa. Alginat adalah komponen dinding sel alga coklat, sementara **selulosa** adalah komponen utama dinding sel tumbuhan. Selain itu cadangan energi pada tanaman tersimpan pada bagian buah dan umbi dari tanaman yang mengandung pati atau amilum (**Amilosa dan amilopektin**)

Hewan seperti mamalia juga melakukan biosintesis glikogen untuk menyimpan karbohidrat dalam hati dan otot sebagai sumber energi yang dapat digunakan saat diperlukan. Setiap organisme memiliki jalur dan proses biosintesis karbohidrat yang khusus sesuai dengan kebutuhan fungsional dan biologisnya.

C. TEMPAT TERJADINYA BIOSINTESIS KARBOHIDRAT

Biosintesis karbohidrat terjadi di berbagai lokasi dalam sel dan organisme, tergantung pada jenis karbohidrat yang dihasilkan dan jenis organismenya. Berikut adalah beberapa tempat utama di mana biosintesis karbohidrat terjadi yaitu :

1. Kloroplas pada Tumbuhan

Proses fotosintesis pada tumbuhan merupakan biosintesis utama pada biomolekul karbohidrat. Kloroplas merupakan organel tempat tumbuhan mengubah energi matahari, karbon dioksida, dan air menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi atau disimpan dalam bentuk pati (amilosa dan amilopektin).

2. Hati dan Otot pada Manusia dan Hewan

Glikogen adalah polisakarida yang terdiri dari unit-unit glukosa yang dihasilkan melalui glikoneogenesis. Proses ini terutama terjadi di hati dan otot. Manusia dan hewan memiliki kemampuan untuk menyimpan dan menghasilkan glikogen sebagai sumber energi.

3. Glikoneogenesis pada Hati

Glikoneogenesis merupakan proses pembentukan glukosa yang bukan berasal dari karbohidrat tetapi berasal dari non karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Proses ini terjadi di hati sebagai respons terhadap penurunan kadar glukosa dalam darah.

4. Bakteri dan Mikroorganisme

Bakteri dan mikroorganisme juga melakukan biosintesis karbohidrat untuk menyediakan energi dan bahan bakar bagi selnya. Mikroorganisme dapat menghasilkan berbagai karbohidrat, termasuk glikogen dan polisakarida lainnya.

5. Sel Tumbuhan dalam Produksi Selulosa

Selulosa adalah komponen utama dinding sel tumbuhan. Sel tumbuhan mensintesis selulosa dalam sitoplasma dan mengangkutnya ke dinding sel untuk memperkuat struktur sel.

Reaksi-reaksi ini melibatkan enzim dan jalur biosintesis yang terdapat dalam sel tumbuhan.

6. Kemolitotrof dan Organisme Arke

Organisme kemolitotrof dan beberapa organisme arke, dapat menggunakan reaksi kimia yang tidak melibatkan fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat. Energi yang diperoleh berasal dari reaksi kimia dengan melakukan kemosintesis dan mengonversi senyawa anorganik menjadi karbohidrat.

D. ENZIM YANG BERPERAN

Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah substrat menjadi produk. Pada proses biosintesis karbohidrat enzim yang berperan diantaranya :

1. Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PDH)

G6PDH adalah enzim yang terlibat dalam glikoneogenesis dan glikogenolisis. Ini berperan dalam konversi glukosa-6-fosfat menjadi 6-fosfoglukonat melalui reaksi oksidatif. Reaksi bertujuan untuk menghasilkan NADPH yang dapat menjadi suplai hidrogen.

2. Fosfofruktokinase (PFK)

PFK adalah enzim kunci dalam glikolisis berperan dalam mengatur kecepatan glikolisis dengan mengkatalisis reaksi fosforilasi fruktosa-6-fosfat menjadi fruktosa-1,6-bisfosfat. Reaksi ini merupakan langkah pengaturan utama dalam produksi energi dan biosintesis karbohidrat.

3. Fruktosa-1,6-Bisfosfatase

Enzim ini berperan dalam proses glikoneogenesis dengan mengkatalisis reaksi pemecahan fruktosa-1,6-bisfosfat menjadi

fruktosa-6-fosfat dan fosfat. Langkah merupakan kebalikan dari PFK dalam glikolisis.

4. Glukosa-6-Fosfat Fosfatase

Glukosa-6-fosfat fosfatase adalah enzim yang hadir dalam hati dan ginjal dan terlibat dalam glikoneogenesis. Ini mengkatalisis reaksi konversi glukosa-6-fosfat menjadi glukosa bebas yang dapat dilepaskan ke dalam darah.

5. Amilopektin dan Glikogen Sintase

Enzim amilopektin dan glikogen sintase berperan dalam mengkatalisis reaksi penggabungan unit-unit glukosa ke dalam rantai-rantai polisakarida yang membentuk glikogen. Enzim ini bertindak sebagai enzim yang merakit rantai-rantai pembentukan glikogen.

6. Sintase Selulosa

Sintase selulosa merupakan enzim yang penting dalam biosintesis selulosa. Enzim ini bertanggung jawab untuk mengkatalisis reaksi penggabungan unit-unit glukosa ke dalam rantai-rantai selulosa. Selulosa merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan.

7. Enzim-enzim dalam Fotosintesis

Enzim RuBisCO (Ribulosa-1,5-bisfosfat karboksilase) dan sedoheptulosa bisfosfat karboksilase adalah enzim kunci dalam konversi karbon dioksida dan energi matahari menjadi karbohidrat, seperti glukosa dan fruktosa.

E. KOENZIM DAN KOFAKTOR

Dalam proses metabolisme biomolekul Koenzim (senyawa organik) dan kofaktor(senyawa anorganik) yang berperan dalam membantu kerja enzim. Berikut adalah beberapa koenzim dan kofaktor penting yang terlibat dalam biosintesis karbohidrat:

1. **NAD⁺ dan NADP⁺**

Koenzim ini berperan dalam reaksi redoks (pengurangan dan oksidasi) dalam berbagai langkah biosintesis karbohidrat. Misalnya, NAD⁺ terlibat dalam oksidasi glukosa dalam glikolisis, dan NADP⁺ digunakan dalam reaksi biosintesis yang memerlukan reduksi.

2. **ATP (*Adenosin Trifosfat*)**

ATP adalah sumber utama energi dalam sel dan digunakan dalam berbagai reaksi yang memerlukan energi, termasuk reaksi dalam glikolisis dan pembentukan ikatan dalam sintesis karbohidrat.

3. **Koenzim A (CoA)**

Koenzim A adalah molekul yang berperan dalam membawa dan transfer grup asetil dalam berbagai reaksi, termasuk dalam pembentukan glikogen dan glikoneogenesis.

4. **Biotin (Vitamin H)**

Biotin berperan dalam reaksi karboksilasi dalam glikoneogenesis dan metabolisme asam lemak pada proses transfer gugus karboksil.

5. **FAD (*Flavin Adenin Dinukleotida*)**

FAD adalah koenzim yang berperan dalam reaksi redoks dalam berbagai jalur biosintesis karbohidrat. Ini terlibat dalam reaksi yang melibatkan transfer dua elektron dalam proses biokimia.

6. Tiamin Pirofosfat (TPP)

TPP adalah koenzim yang berperan dalam enzim-enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme, seperti piruvat dehidrogenase, yang mengkatalisis langkah awal glikolisis.

7. Fosfat

Ion fosfat (Pi) adalah kofaktor penting dalam reaksi fosforilasi yang terjadi dalam berbagai tahap glikolisis, glukoneogenesis, dan sintesis glikogen.

8. Magnesium (Mg^{2+})

Ion magnesium adalah kofaktor yang penting dalam banyak reaksi enzimatik yang melibatkan transfer grup fosfat dan katalisis reaksi dalam biosintesis karbohidrat.

9. Zink (Zn^{2+})

Ion seng berperan dalam aktivitas enzimatik dalam berbagai jalur biosintesis karbohidrat.

10. Besi (Fe^{2+}/Fe^{3+})

Ion besi berperan dalam enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi redoks dalam biosintesis karbohidrat.

F. BIOSINTESIS GLUKOSA (MONOSAKARIDA)

Sintesis awal glukosa melalui piruvat, laktat, gliserol, asam amino serta molekul-molekul kecil yang lain. Pembentukan atau sintesis glukosa ini merupakan jalur umum yang terjadi pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Pada hewan tingkat tinggi, hati menjadi tempat sintesis glukosa. Prekursor yang penting pada proses ini adalah piruvat, laktat, gliserol dan beberapa asam amino. Tumbuhan mensintesis glukosa dan sukrosa dari CO_2 menggunakan energi matahari. Pada Mikroorganisme, sintesis glukosa berasal dari asam

asetat dan propionat sebagai prekursor. Beberapa mikroorganisme juga menghasilkan glukosa dari asam amino dan asam lemak.

Pada hewan tingkat tinggi proses sintesis glukosa dari piruvat dimulai dengan pengangkutan piruvat ke mitokondria. Piruvat yang dihasilkan bisa berasal dari asam amino seperti alanin. Selanjutnya Piruvat mengalami karboksilasi membentuk oksaloasetat dengan bantuan enzim piruvat karboksilase dan kofaktor biotin sebagai pengangkut CO₂. Sebagai inhibitor pembentukan oksaloasetat dilakukan oleh enzim malat dehidrogenase dan NADH sebagai donor elektron. Produksi glukosa memerlukan atom karbon dari dua piruvat, energi dari 4 ATP, 2 GTP dan reduksi energi dari 2 molekul NADH.

1. Jalur piruvat- phosphoenolpiruvat


Perubahan bentuk piruvat menjadi PEP dalam sel tidak bisa terjadi dengan pembalikan reaksi yang dikatalisis oleh piruvat kinase. Reaksi ini memerlukan energi yang paling tinggi (ΔG paling positif) setiap reaksi di dalam jalur glukoneogenesis.

Jalur yang utama untuk inisiasi sintesa glukosa dari piruvat pada hewan tingkat tinggi mulai dengan pengangkutan piruvat ke mitokondria yang berasal dari asam amino, terutama alanin. Proses selanjutnya piruvat akan mengalami dekarboksilasi ke bentuk oksaloasetat dikatalisis oleh piruvat karboxilase. Jenis reaksi ini adalah kategori 6, sintesis dari ikatan karbon-karbon menggunakan energi dari ATP dengan kofaktor biotin sebagai pengangkut CO₂ aktif. Produk Oksaloasetat dikurangi menjadi malat oleh enzim malate dehidrogenase bersama dengan NADH yang bertindak sebagai donor elektron. Malate diangkut dari mitokondria ke sitoplasma, selanjutnya dioksidasi kembali menjadi


oxaloasetat. Oxaloasetat sangat polar untuk berdifusi sederhana tidak ada transpor protein. Selanjutnya reaksi pembentukan PEP dengan enzim phosphoenolpiruvat karboksikinase. Sumber gugus phosphoril adalah GTP. Reaksi keseluruhan adalah:




Energi bebas dari perpindahan dua gugus fosforil (dari ATP dan GTP) digunakan untuk mengangkat piruvat ke tingkat energi PEP.




Phosphofruktokinase menjadi enzim pengatur yang utama di dalam glikolisis dan mengkatalisasi reaksi irreversibel phosphoril dipindahkan dari ATP ke fruktosa-6-phosphat. Pembalikan dari reaksi ini untuk glukoneogenesis akan memerlukan sintesa dari suatu ATP. Pada glukoneogenesis gugus phosphoril dipindahkan oleh hidrolisis yang dikatalisasi oleh fruktosa-1,6-bisphosphatase:



Reaksi akhir dan yang ketiga yang diikuti oleh glukoneogenesis terjadi pemindahan gugus phosphoril dari glukosa-6-fosfat .



Reaksi untuk gluconeogenesis digambarkan berikut ini :



Produksi glukosa tunggal memerlukan atom karbon dari dua piruvat, energi dari enam ikatan (empat ATP, dua GTP), dan reduksi energi dari dua molekul NADH. Perbedaan utama antar glukoneogenesis dan glikolisis adalah kebutuhan energi. Persamaanya pada penggunaan beberapa enzim yang sama. Glikolisis melepaskan energi yang cukup untuk menghasilkan dua fosfoanhidrid yang terikat di dalam ATP setiap degradasi glukosa; glukoneogenesis mengkonsumsi enam fosfoanhidrid yang terikat setiap membuat glukosa.

2. Pengaktifan glukosa dan galaktosa untuk biosintesis

Tidak semua glukosa tersedia untuk suatu organisme yang diperlukan dengan seketika untuk energi atau tujuan metabolisme lain. Hewan tingkat tinggi menyimpan kelebihan glukosa di dalam polisakarida glikogen umumnya tersimpan di dalam hati. Kebutuhan glukosa didistribusikan melalui darah untuk menyediakan sumber daya energi ke jaringan untuk membuat secara khusus karbohidrat seperti laktosa (gula susu).


Glukosa pada tanaman menjadi bangunan untuk membuat disakarida **sukrosa** dan polisakarida **pati dan sellulosa**. Biosintesis laktosa, sukrosa, pati, glikogen, dihubungkan kepada jalur glikolisis dan glukoneogenesis, tetapi reaksi yang membedakan di dalam cara pengaktifan karbohidrat mereka.

Karbohidrat di dalam glikolisis dan glukoneogenesis diaktifkan dengan gugus fosforil (fosfat gula). Di mana seperti sintesis disakarida dan polisakarida, gula difosfat nukleosida (gula NDP) digunakan. Molekul UDP-galaktosa dan UDP-glukosa akan memasukan galaktosa ke dalam glikolisis.

Sintesis senyawa aktif berperan di dalam reaksi karbohidrat. Senyawa yang paling utama adalah UDP-glukosa, adenosin difosfat-glukosa (ADP-glukosa), guanosin difosfat-glukosa (GDP-glukosa) dan UDP-galakstosa.

Pembentukan NDP-glukosa


Suatu reaksi umum dapat dituliskan untuk menunjukan pembentukan NDP- glukosa:




NTP = nukleosida trifosfat, **ATP** atau **UTP** atau **GTP**

NDP- glukosa = nukleosida difosfat glukosa, **ADP-** glukosa atau **UDP-** glukosa atau **GDP-** glukosa.

Enzim yang bekerja pada reaksi ini adalah ADP-Glukosa pirofosforilase atau UDP-Glukosa pirofosforilase atau GDP-glukosa pirofosforilase. Keseimbangan yang terjadi mengakibatkan konsentrasi komponen reaktan dan produk sama. Enzim anorganik pirofosfatase mengkatalisasi hidrolisis produk PPI. Keseimbangan bergeser ke arah pembentukan NDP-glukosa.




Menambahkan keduanya reaksi menghasilkan keseluruhan reaksi untuk sintesa NDP-glukosa:



Pembentukan UDP-galaktosa


Sintesa UDP-galaktosa mempunyai kemungkinan dua jalur :

- a. Isomerisasi UDP- glukosa



Enzim yang bekerja pada reaksi ini adalah UDP-glukosa 4-epimerase

- b. Pertukaran UDP




Enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut adalah galaktosa-1-fosfat uridilil transferase

Kedua reaksi ini digunakan untuk memasukkan galaktosa ke dalam glikolisis. kehadiran suatu [*reserse*] gen untuk uridilil transferase, yang menjadi suatu penyebab galaktosemia, terjadinya intoleransi glukosa dalam tubuh. UDP-glukosa, UDP-galaktosa, GDP-glukosa, atau ADP-glukosa menjadi bentuk monosakarida aktif digunakan untuk sintesa glikogen, pati, laktosa, sukrosa dan selulosa.

G. BIOSINTESIS DISAKARIDA

1. Laktosa

Sintesis disakarida, laktosa diaktifkan di dalam kelenjar susu manusia dan hewan lain mengikuti kelahiran muda. Laktosa dibentuk dengan kombinasi galaktosa diaktifkan dengan glukosa:




Sistem enzim laktosa sintase mengkatalisasi pembentukan suatu β (1,4) ikatan glikosidik antara kedua monosakarida.

2. Sukrosa

Disakarida, sukrosa berasal dari kebanyakan sayur-mayur dan buah-buahan, tetapi terutama tebu dan gula bit. Sukrosa adalah suatu bentuk penyimpanan monosakarida untuk energi dan proses biosintetis yang diangkut keseluruhan tumbuhan melalui floem. Disakarida disintesis didalam dua langkah dari UDP- glukosa diaktifkan dan fosfat-fruktosa diaktifkan. Produksi Monosakarida melalui Fotosintesis

Gambar 3. 2. Mekanisme pembentukan sukrosa



Sukrosa sangat penting dalam metabolisme tanaman tingkat tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa sukrosa bukan hanya gula pertama yang terbentuk dalam fotosintesis tetapi juga bahan transpor utama. Oleh karena itu, sukrosa yang baru terbentuk mungkin merupakan prekursor umum untuk sintesis polisakarida. Meskipun jalur alternatif yang terdiri dari reaksi antara glukosa 1-fosfat dan fruktosa bertanggung jawab untuk produksi sukrosa pada mikroorganisme tertentu, biosintesis metabolit penting ini pada tumbuhan tingkat tinggi tampaknya terjadi seperti Gambar 3.2.


Fruktosa 6-fosfat, yang berasal dari siklus fotosintesis, diubah menjadi glukosa 1-fosfat, yang selanjutnya bereaksi dengan UTP membentuk UDP-glukosa. UDP-glukosa bereaksi dengan fruktosa 6-fosfat untuk membentuk sukrosa fosfat pertama dan akhirnya sukrosa, atau dengan fruktosa untuk membentuk sukrosa secara langsung.

Setelah terbentuk, sukrosa bebas dapat tetap berada di tempatnya atau dapat dipindahkan melalui tabung saringan ke berbagai bagian tanaman. Sejumlah reaksi, misalnya hidrolisis dengan invertase atau pembalikan urutan sintetik, mengubah sukrosa menjadi monosakarida yang dapat dijadikan sumber oligosakarida atau polisakarida lain.


H. BIOSINTESIS POLISAKARIDA

1. Glikogen

Kelebihan Glukosa di dalam hewan disimpan di dalam polisakarida glikogen:



Glukosa, diaktifkan dan ditandai oleh keterikatan ke UDP, ditambahkan diakhir tanpa reduksi dari suatu molekul glikogen yang ada. Enzim glikogen sintase mengkatalisasi pembentukan ikatan α (1,4) glikosidik antar glukosa membentuk glikogen. Masing-Masing diakhir tanpa reduksi glikogen boleh bertindak sebagai suatu lokasi untuk pemasangan unit glukosa baru untuk penyimpanan. dicatat bahwa ini adalah lokasi sama yang menjadi penempatan glikogen fosforilase. reaksi total untuk menggabungkan satu sisa glukosa-6-fosfat ke dalam glikogen yang ada adalah:



Hanya satu fosfoanhidrida yang terikat dikonsumsi di dalam penyimpanan suatu molekul glukosa. Ini suatu cara yang

sangat hemat untuk menyimpan glukosa dan dapat menghasilkan di atas 30 fosfoanhidrida yang terikat ketika dioksidasi di bawah kondisi aerob.

2. Pati


Penyimpanan glukosa di dalam tumbuhan mengikuti jalur yang serupa untuk hewan kecuali glukosa yang diaktifkan oleh ADP, bukan UDP dan terkumpulkan didalam pati $(\text{glukosa})_n$



Sintesis pati dikatalisasi dengan penambahan sisa glukosa baru diakhir tanpa reduksi dari suatu molekul pati yang ada oleh pembentukan $\alpha (1, 4)$ ikatan glikosidik.

3. Selulosa

Sellulosa merupakan polisakarida dengan struktur utama di dalam dinding sel tumbuhan dan beberapa bakteri. Ikatan selulosa terdiri atas residu glukosa berhubungan $\beta (1,4)$ ikatan glikosidik. Jalur sintesis sellulosa serupa dengan pati. Bentuk glukosa yang diaktifkan adalah UDP-glukosa dalam beberapa organisma, tetapi GDP-glukosa di pihak lain.



Atau GDP Sellulosa sudah ada atau GDP Sellulosa diperpanjang

I. MEKANISME PENGATURAN

Organisme mengatur produksi karbohidrat dengan berbagai mekanisme yang mencakup umpan balik positif dan negatif. Inilah beberapa konsep umum yang terkait dengan regulasi produksi karbohidrat:

1. Umpan Balik Negatif (*Negative Feedback*):

Umpan balik negatif adalah mekanisme regulasi yang digunakan oleh organisme untuk menjaga keseimbangan dalam proses-produksi biokimia. Ketika konsentrasi karbohidrat dalam tubuh suatu organisme meningkat di atas ambang batas tertentu, organisme akan merespons dengan mengurangi produksi lebih lanjut. Ini dilakukan untuk menghindari penumpukan yang berlebihan. Sebagai contoh, dalam tubuh manusia, peningkatan kadar glukosa dalam darah menyebabkan pelepasan insulin oleh pankreas, yang pada gilirannya merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel dan pengubahan glukosa menjadi glikogen untuk penyimpanan.

2. Umpan Balik Positif (*Positive Feedback*):

Umpan balik positif merupakan mekanisme yang memperkuat suatu proses dan pengendalian peningkatan eksponensial dalam produksi karbohidrat. Namun, mekanisme ini jarang digunakan dalam regulasi karbohidrat karena dapat menyebabkan ketidakstabilan dan perubahan yang ekstrem. Contoh jarang yang menggunakan umpan balik positif adalah pembentukan bekuan darah saat terjadi luka. Ketika suatu proses dimulai, itu memicu lebih banyak reaksi yang sama, yang pada akhirnya menghentikan proses itu sendiri.

3. Kontrol Enzim

Produksi karbohidrat dikendalikan melalui regulasi enzim-enzim yang terlibat dalam biosintesis karbohidrat. Organisme dapat mengaktifkan atau menonaktifkan enzim-enzim ini sesuai dengan kebutuhan. Umumnya, enzim-enzim yang terlibat dalam biosintesis karbohidrat diatur oleh berbagai

sinyal hormonal, seperti insulin dan glukagon dalam tubuh manusia.

4. Konsentrasi Substrat dan Produk

Organisme juga mengatur produksi karbohidrat berdasarkan konsentrasi substrat (bahan awal) dan produk (karbohidrat) dalam jalur biosintesis. Konsentrasi substrat yang tinggi dan produk yang rendah akan merangsang produksi lebih banyak karbohidrat, sementara konsentrasi produk yang tinggi dapat menghambat proses produksi.

5. Koordinasi Metabolik

Selain itu, organisme juga mengatur produksi karbohidrat dengan koordinasi metabolik yang kompleks. Ini melibatkan berbagai jalur metabolik yang terkait, seperti glikolisis, glukoneogenesis, dan glikogenolisis, yang berinteraksi untuk menjaga homeostasis karbohidrat.

Regulasi produksi karbohidrat sangat penting karena karbohidrat adalah sumber energi utama bagi organisme. Mekanisme regulasi ini memastikan bahwa tubuh memiliki cukup energi tetapi juga mencegah potensi bahaya akibat penumpukan glukosa yang berlebihan dalam tubuh.

REFERENCE

- Adeva-Andany, M. M., González-Lucán, M., Donapetry-García, C., Fernández-Fernández, C., & Ameneiros-Rodríguez, E. (2016). Glycogen metabolism in humans. *BBA Clinical*, 5, 85–100. <https://doi.org/10.1016/j.bbacli.2016.02.001>
- Chen, G. X., Zhou, J. W., Liu, Y. L., Lu, X. B., Han, C. X., Zhang, W. Y., Xu, Y. H., & Yan, Y. M. (2016). Biosynthesis and Regulation of Wheat Amylose and Amylopectin from Proteomic and Phosphoproteomic Characterization of Granule-binding Proteins. *Scientific Reports*, 6(May), 1–15. <https://doi.org/10.1038/srep33111>
- Gary w Morrow, (2016) Biosynthesis of carbohydrates and amino acid, Bioorganic Synthesis : an Itroduction
- Lenardon, M. D., Munro, C. A., & Gow, N. A. R. (2010). Chitin synthesis and fungal pathogenesis. *Current Opinion in Microbiology*, 13(4), 416–423. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2010.05.002>
- Li, W., McArthur, J. B., & Chen, X. (2019). Strategies for chemoenzymatic synthesis of carbohydrates. *Carbohydrate Research*, 472, 86–97. <https://doi.org/10.1016/j.carres.2018.11.014>
- Na, L., Li, R., & Chen, X. (2021). Recent progress in synthesis of carbohydrates with sugar nucleotide-dependent glycosyltransferases. *Current Opinion in Chemical Biology*, 61, 81–95. <https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2020.10.007>
- Polko, J. K., & Kieber, J. J. (2019). The regulation of cellulose biosynthesis in plants. *Plant Cell*, 31(2), 282–296. <https://doi.org/10.1105/tpc.18.00760>

PROFIL PENULIS

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.

Merupakan dosen tetap pada fakultas sains dan teknologi jurusan kimia universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bidang biokimia. Lahir pada tanggal 8 Januari 1978 , Soppeng, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar, menengah dan tingkat atas diselesaikan di Daerah batu-batu Kabupaten Soppeng.

Penulis menyelesaikan pendidikan S3 tahun 2017 pada universitas Hasanuddin.

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan protein secara strukturan dan fungsional, telah mengisolasi enzim selulase, amilase dan lignase pada beberapa larva diantaranya Coosus cossus, larva kumbang sagu, larva kumbang tanduk, dan larva ulat grayak. Kajian spesifik berkaitan dengan mikroba simbion. Peneliti juga telah mengkaji beberapa biomolekul karbohidrat lignoselulosa dari limbah yang punya potensi dijadikan bioenergi.

Buku yang sudah ditulis diantaranya biokimia Tahun 2013, metabolisme biomolekul Tahun 2022 dan pada tahun ini menulis buku bioteknologi enzim (2023).

Email Penulis: bmaswati@gmail.com





BAB 4



BIOSINTESIS ASAM AMINO DAN NUKLEOTIDA


(Dr. Tahirah Hasan, S.Si., M.Si)

Institusi: Universitas Islam Makassar

Email:(tahirah.dty@uim-makassar.co.id)

A. PENDAHULUAN

Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein yang mengontrol seluruh proses seluler dalam tubuh. Asam amino memiliki dua gugus fungsi yaitu $-NH_2$ dan $-COOH$, jika gugus amino terikat langsung pada karbon alfa maka disebut asam amino alfa. Asam amino diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu asam amino-esensial dan non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga harus diperoleh dari asupan makanan yang mengandung protein, sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat di produksi dalam tubuh atau disebut sebagai asam amino endogen. Struktur umum asam amino diperlihatkan pada Gambar 1 (Winarno, 2008).



Gambar 4. 1. Struktur Umum Asam Amino

Meskipun asam amino tidak berperan langsung untuk fungsi fisiologis di dalam tubuh, namun asam amino memiliki peran yang sangat penting dalam sintesis protein dan beberapa sintesis senyawa lain yang membutuhkan nitrogen dalam strukturnya. Beberapa jalur biokimia terlibat dalam biosintesis asam amino, termasuk sintesis asam amino dari prekursor lain. Sintesis asam amino non-esensial dilakukan melalui jalur sederhana, sedangkan biosintesis asam amino esensial melalui jalur yang lebih kompleks (Azhar, M., 2016).

B. KLASIFIKASI ASAM AMINO

Berdasarkan sifat kepolaran (polarity) gugus R, asam amino dapat dibagi menjadi 4 golongan (Lehninger. 2008).

1. Asam amino dengan gugus R yang tak mengutub

Golongan asam amino ini terdiri dari lima asam amino yang mengandung gugus R alifatik (Alanin, Lesin, Isolesin, Valin dan Prolin), dua dengan gugus R. aromatik, (fenilalanin dan triptofan), dan satu mengandung atom sulfur pada gugus R-nya yaitu metionin.

2. Asam amino dengan gugus R mengutub tak bermuatan

Golongan asam amino dengan gugus R mengutub lebih mudah larut dalam air karena gugus R yang mengutub dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Kelarutannya dalam air

disebabkan oleh gugus hidroksil pada gugus R asam amino serin, treonin dan tirosin, gugus amida pada gugus R asam amino asparagin dan glutamin dan gugus sulfhidril pada asam amino sistein yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air.

3. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif (asam amino asam)

Asam amino dalam golongan ini, bermuatan negatif pada pH 6,0 – 7,0 dan gugus R-nya mempunyai gugus karboksil sehingga pada asam amino ini mempunyai 2 gugus karboksil.

4. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif (asam amino basa)

Asam amino dalam golongan ini, pada pH 6,0 lebih dari 50% molekul asam amino ini bermuatan positif, pada pH 7,0 kurang dari 10% bermuatan positif. Gugus R dari asam amino lisin dan arginin mengandung gugus amino pada posisi $-\epsilon$, gugus basa lemah, imidazol dari histidin.

Di samping ke 20 asam amino yang umum terdapat dalam protein, juga terdapat golongan asam amino yang jarang didapat sebagai satuan pembentuk dan yang sama sekali tidak merupakan satuan pembentuk protein. Beberapa asam amino bukan protein mempunyai fungsi penting sebagai sumber atau senyawa antara dalam metabolisme. β -alanin, merupakan sumber vitamin asam pantotenat, sitrulin dan ornitin merupakan senyawa antara dalam sintesa arginin.

Berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis, asam amino dibagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis

oleh tubuh

Tabel 4. 1. Asam Amino Esensial dan Asam Amino Non-Esensial

Asam Amino Esensial	Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine* Phenylalanine*, Threonine, Tyrtophan, Valine
Asam Amino Non-Esensial	Alanine, Asparagine, Aspartate, Cysteine, Glutamate, Glutamine, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine, Arginine

Prekursor asam amino yang digunakan dalam sintesis beberapa asam amino lainnya adalah aspartat, treonin, fenilalanin, serin dan glutamat. Tirosin dapat disintesis dari fenilalanin, sistein dan glisin dapat disintesis dari serin. Aspartat dapat menghasilkan asam amino asparagin, metionin, lisin dan treonin, terakhir dapat membentuk isoleusin. Alfa ketoglutarat, oksaloasetat, ribosa-5-fosfat dan 3-fosfoglisarat adalah substrat yang digunakan dalam reaksi untuk sintesis asam amino glutamat, aspartat, histidin dan serin. Glutamat yang diperoleh dari alfa-ketoglutarat dapat membentuk glutamin, prolin dan arginin. Substrat lain yaitu piruvat dapat menghasilkan fenilalanin, tirosin dan triptofan. Asam amino ini merupakan prekursor untuk sintesis glukosa melalui jalur glukoneogenesis. Semua asam amino memiliki sifat glukogenik kecuali lisin dan leusin . Lisin dan leusin adalah asam amino bersifat ketogenik, yang hanya dapat masuk melalui jalur intermediat asetil KoA atau asetoasetil KoA.

Jalur metabolik utama asam amino meliputi; pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui


siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Keempat, adalah sintesis protein dari asam-asam amino.

Asam amino selain sebagai penyusun sintesis protein, beberapa diantaranya memainkan peran utama dalam fungsi yang lain. Asam amino berperan dalam regulasi pergantian protein dan transduksi sinyal, pengangkutan nitrogen dan karbon melintasi organ, atau transmisi saraf. Biosintesis asam amino melibatkan beberapa jalur biokimia dimana asam amino dibentuk dari prekursor lain.

C. BIOSINTESIS ASAM AMINO

Gambaran umum sintesis asam amino non-esensial yang dibentuk dari glukosa melalui zat antara dalam proses glikolisis atau siklus asam trikarboksilat (ATK), Gambar 2. Sepuluh asam amino non-esensial kerangka karbonnya berasal dari glukosa. Empat asam amino non-esensial yaitu serin, glisin, sistein dan alanin dibentuk dari glukosa melalui komponen jalur glikolitik. Enam asam amino non-esensial lainnya kerangka karbonnya disediakan oleh zat antara pada siklus ATK yang dibentuk dari glukosa. Tirosin adalah asam amino non-esensial disintesis melalui proses hidroksilasi asam amino esensial fenilalanin (Marks, D.B. *at al.* 2000).

Gambar 4. 2. Gambaran Umum Sintesis Asam Amino Non-Esensial



Asam amino non-esensial dapat disintesis apabila prekursornya tersedia di dalam tubuh (Marks, D.W., 2000).


Sintesis Serin

Jalur utama untuk sintesis serin dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfogliserat. Gugus α -hidroksil dioksidasi oleh NAD^+ dengan bantuan enzim dehidrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi 3-fosfopiruvat, kemudian mengalami proses transaminasi membentuk 3-fosfoserin. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin. Senyawa ini mengalami defosforilasi yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase.

Sintesis Glisin

Jalur utama untuk sintesis glisin melalui satu tahap reaksi, yang terjadi secara reversibel dikatalisis oleh enzim serin hidroksimetiltransferase yang melibatkan tetrahidrofolat (THF). THF adalah koenzim yang mentransfer gugus hidroksimetil dari serin menghasilkan glisin dan N^5, N^{10} -metilen-THF.

Gambar 4. 3. Sintesis Serin dan Glisin



Sintesis Alanin


Alanin disintesis dari piruvat yang merupakan zat antara dalam proses glikolisis. Proses ini melalui reaksi transaminasi yang

dikatalisis oleh enzim alanin transaminase (ALT) dan secara reversibel dapat diubah kembali menjadi piruvat. Hati mengakumulasi alanin plasma, kebalikan transaminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan perpindahan glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa-alanin. Alanin adalah asam amino glukogenik utama karena dapat masuk kembali ke jalur produksi piruvat, dan merupakan prekursor untuk sintesis glukosa melalui jalur glukoneogenesis. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot yaitu pertama, secara langsung melalui degradasi protein. Kedua, melalui transaminasi piruvat dengan bantuan enzim alanin transaminase (ALT) atau dikenal sebagai serum glutamat-piruvat transaminase (SGPT) (Marks, D.W., 2000).

Sintesis Sistein

Untuk sintesis sistein karbon dan nitrogen disediakan dari serin, sulfur berasal dari metionin. Dalam sintesis sistein, homosistein berkondensasi dengan serin menghasilkan sistationin dengan bantuan enzim sistationase. Selanjutnya dengan bantuan enzim sistationin liase, diubah menjadi sistein dan α -ketobutirat. Gabungan dari 2 reaksi terakhir ini dikenal sebagai trans-sulfurasi (Marks, D.W., 2000).

Gambar 4.4 Sintesis Sistein




Sintesis Aspartat dan Asparagin

Aspartat disintesis melalui reaksi transaminasi oksaloasetat dan reaksinya terjadi secara reversibel, sehingga aspartat dapat diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pembentukan asparagin dari aspartat dengan glutamin yang menyediakan nitrogen untuk membentuk gugus amida (Marks, D.W., 2000).

Sintesis Arginin

Arginin disintesis dari glutamat melalui semialdehid membentuk glutamat semialdehid, kemudian mengalami proses transaminasi membentuk ornitin yang merupakan zat intermediet pada siklus urea. Enzim arginase dan melepaskan Reaksi yang terjadi pada siklus urea mengubah ornitin menjadi arginin. Arginin dapat diubah kembali menjadi ornitin oleh enzim arginase dan melepaskan urea (Harvey, R.A, 2014).

Gambar 4.5. Sintesis Arginin



Sintesis Glutamat dan Glutamin.


Untuk sintesis glutamat, glutamin, prolin dan arginin, prekursoranya adalah α -ketoglutarat. Glutamat disintesis dengan aminasi reduktif α -ketoglutarat yang dikatalisis oleh glutamat


dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogenfixing. Glutamat juga dihasilkan oleh reaksi aminotranferase, yang dalam hal ini nitrogen amino diberikan oleh sejumlah asam amino lain. Sehingga, glutamat merupakan kolektor umum nitrogen amino. Glutamin dihasilkan dari glutamat oleh enzim glutamat sintetase dengan penambahan NH_4^+ ke gugus karboksil rantai samping sehingga terbentuk suatu amida. Glutamin dapat diubah kembali menjadi glutamat oleh enzim glutaminase (Harvey, R.A, 2014).

Sintesis Prolin

Glutamat merupakan prekursor dalam sintesis ornitin dan prolin. Glutamat mula-mula mengalami fosforilasi kemudian direduksi pada gugus karboksil pada gugus R menjadi glutamat semialdehid. Semialdehid secara spontan membentuk siklik basa shiff internal antara aldehid dan gugus α -amino, selanjutnya senyawa siklik direduksi menghasilkan prolin. Prolin diubah kembali menjadi glutamat semialdehid dan direduksi menjadi glutamat (Harvey, R.A, 2014).

Gambar 4. 6. Sintesis Prolin






Sintesis Tirosin

Tirosin disintesis di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilalanin sampai dengan 50%. Fenilalanin hidroksilase adalah suatu oksidase yang memiliki fungsi campuran, yaitu molekul oksigen memberikan satu oksigen pada molekul air dan satu atom ke produknya yaitu tirosin. Kofaktor, tetrahydrobiopterin (BH₄) teroksidasi menjadi dihydrobiopterin (BH₂) dan harus direduksi kembali menjadi BH₄ agar reaksi tetap dapat menghasilkan tirosin (Marks, D.W., 2000).

Gambar 4.7 Sintesis Tirosin



D. MANFAAT BEBERAPA ASAM AMINO

Asam amino sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Beberapa fungsi asam amino yaitu memperbaiki jaringan yang rusak pasca operasi, melindungi hati dari berbagai zat toksik, menurunkan tekanan darah, mengatur metabolisme kolesterol, mendorong sekresi hormon pertumbuhan, dan mengurangi kadar amonia di dalam darah (Kamiya *et al.* (2002)

Manfaat dari beberapa asam amino esensial diantaranya adalah metionin merupakan suatu antioksidan yang baik karena dapat mensuplai belerang, menginaktifkan radikal bebas dan membantu meningkatkan daya ingat. Metionin sebagai prekursor sistein yang merupakan asam amino penghasil glutation untuk detoksifikasi di hati. Kekurangan metionin dapat menyebabkan akumulasi lemak di hati, dan pertumbuhan yang lambat. Treonin, dapat mencegah penumpukan lemak di hati, membantu hati dengan fungsi lipotropiknya. Kekurangan treonin akan menyebabkan warna kulit menjadi tidak normal (Wu, G., 2009).

Menurut Villanueva *et al.* (2004), arginin merupakan asam amino non-esensial yang diperlukan tubuh untuk pembuatan cairan seminal, meningkatkan kesuburan pria, dan memperkuat sistem imun. Arginin bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh atau produksi limfosit, meningkatkan pengeluaran hormon pertumbuhan atau human growth hormone (HGH). Arginin membantu detoksifikasi hati pada sirosis hati dan perlemakan hati (Linder, 1992).

Asam glutamat merupakan asam amino non-esensial yang berperan dalam menunjang fungsi otak, mempermudah dan memperkuat daya ingat. Asam glutamat juga bermanfaat untuk membantu dalam meningkatkan massa otot. Keberadaan asam glutamat, glisin, dan sistein di dalam tubuh juga sangat penting karena asam amino tersebut merupakan prekursor pembentukan glutation. Glutation adalah senyawa antioksidan enzim yang diproduksi di dalam tubuh dan dapat mendeaktivasi radikal bebas sebagai pemicu terjadinya penyakit degeneratif seperti kanker (Hasan, T. *at al*, 2015).

Glutamin memfasilitasi penyimpanan dan transport amonia yang tidak toksik, dan memerlukan ATP dan enzim glutamat sintetase untuk pembentukan glutamin dari glutamat dan amonia yang terutama terjadi di dalam hati dan otot. Glutamin penting juga di dalam sistem saraf yang merupakan tempat bagi mekanisme pembuangan amonia yang utama di dalam otak. Glutamin ditemukan di dalam plasma dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam amino lainnya (Harvey, R.A., 2014).


E. NUKLEOTIDA

Nukleotida merupakan ester dari asam posfat dan nukleosida. Nukleotida terdapat bebas di dalam sel, dan memiliki banyak fungsi

dalam metabolisme selular. Nukleotida sebagai prekursor untuk asam nukleat, deoxyribonucleic acid (DNA) dan ribonucleic acid (RNA). Sintesis protein dan metabolisme biomolekul dan komponen selular lainnya merupakan produk informasi yang sudah terprogram dalam nukleotida (Lehninger. 2008).

RNA adalah polimer dari nukleotida yang memiliki beberapa fungsi. Ribosomal RNA (rRNA) adalah komponen ribosom yang bertanggungjawab pada sintesis protein. Messenger RNA (mRNA) membawa informasi genetik dari suatu gen ke ribosom untuk sintesis protein. Transfer RNA (tRNA) menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi asam amino tertentu. Nukleotida memiliki peran yang penting untuk semua sel, dan merupakan komponen dari koenzim, donor gugus fosforil (ATP dan GTP), donor gula (UDP dan GDP-gula) atau donor lipid (CDP-asilgliserol). Asam nukleat dibentuk dari nukleotida yang terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen terdiri dari basa-basa purin dan pirimidin, Gambar 8 (Marks, D.W., 2000).


Gambar 4. 8 Struktur Basa Nitrogen (Purine dan Pirimidin)



Nukleosida Monofosfat

Nukleosida monofosfat dalam ribonukleotida dapat mengikat asam fosfat pada posisi 2', 3' dan 5' dari cincin pentosa, sedangkan dalam deoksiribonukleotida hanya terdapat pada posisi 3', dan 5'. Struktur dasar dari berbagai senyawa utama ribonukleotida 5'-monofosfat dan deoksiribonukleosida 5'-monofosfat (Stryer, L. 2000).


Gambar 4. 9 Struktur Ribonukleotida Dan Deoksiribonukleotida



Nukleotida trifosfat (NTP) mengandung energi. ATP adalah salah satu contoh NTP yang memiliki gugus fosfat dan pirofosfat serta berperan pada transfer energi kimia pada reaksi enzimatik. ATP dapat mengalami defosforilasi menjadi ADP, sebaliknya ADP dapat mengalami refosforilasi menjadi ATP pada proses respirasi. Selain sistem ATP-ADP, transfer gugus fosfat pada sel dapat melibatkan GTP, UTP dan CTP, akan tetapi sistem ini hanya berlangsung pada bagian biosintesis spesifik. Sumber energi ini tersebar pada sel-sel tubuh dan menyediakan energi untuk fungsi metabolisme seperti sintesis asam amino, protein, membran sel, dan organel pergerakan sel dan organel (intraselular dan ekstraselular); hingga pembelahan sel

melalui mitosis dan meiosis, struktur nukleotida pada Gambar 11 (Marks, D.W., 2000).

Gambar 4. 10. Struktur Nukleotida



Tabel 4. 2. Ribonuklesida 5-fosfat dan Deoxyribonukleosida 5-fosfat

	Base	Mono	Di	Tri
Ribonuklesida 5-fosfat	Adenine	AMP	ADP	ATP
	Guanine	GMP	GDP	GTP
	Sitosine	CMP	CDP	CTP
	Uracil	UMP	UDP	UTP
Deoxyribonukleosida 5-fosfat	Adenine	dAMP	dADP	dATP
	Guanine	dGMP	dGDP	dGTP
	Sitosine	dCMP	dCDP	dCTP
	Thymine	dTMP	dTDP	dTTP

Sumber: Kurniawati, P. dan Banowati, R.

Tabel 4. 3. Nukleotida Dan Asam Nukleat

<i>Base</i>	<i>Nucleoside</i>	<i>Nucleotide</i>	<i>Nucleic acid</i>
Purines			
Adenine	Adenosine	Adenylate	RNA
	Deoxyadenosine	Deoxyadenylate	DNA
Guanine	Guanosine	Guanylate	RNA
	Deoxyguanosine	Deoxyguanylate	DNA
Pyrimidines			
Cytosine	Cytidine	Cytidylate	RNA
	Deoxycytidine	Deoxycytidylate	DNA
Thymine	Thymidine or deoxythymidine	Thymidylate or deoxythymidylate	DNA
Uracil	Uridine	Uridylate	RNA

Sumber: Kurniawati, P. dan Banowati, R.

Selain menjadi monomer penyusun untuk asam nukleat, mononukleotida berperan dalam penyimpanan dan penyediaan energi seluler, persinyalan seluler, sebagai sumber gugus fosfat yang digunakan untuk memodulasi aktivitas protein dan molekul persinyalan lainnya. Nukleotida juga berperan sebagai kofaktor enzimatik yang sering melakukan reaksi redoks. Beberapa nukleotida persinyalan memiliki konfigurasi gugus fosfat yang berbeda, karena memiliki beberapa gugus fosfat yang terikat pada lokasi berbeda pada gula. Kofaktor nukleotida mengandung gugus kimia yang lebih luas yang terikat pada gula melalui ikatan glikosidik, termasuk nikotinamida dan flavin. Gula ribosa pada senyawa flavin, lebih linier dibandingkan bentuk cincin yang terlihat pada nukleotida lain. Mononukleotida dan dinukleotida yang bukan merupakan pembentuk asam nukleat, beberapa diantaranya adalah nikotinamid mononukleotida, merupakan sumber nikotinamid adenin dinukleotida (NAD). Flavin mononukleotida (FMN) berfungsi sebagai koenzim dalam proses respirasi dan merupakan sumber untuk sintesis flavin adenin dinukleotida (FAD). Kofaktor ini dalam sel memainkan peran penting dalam fiksasi energi misalnya fotosintesis, metabolisme, dan transduksi sinyal selular (Murray R.K., 2003)

REFERENCE

- Azhar, M., 2016. Biomolekul Sel Karbohidrat, Protein, dan Enzim. Padang: UNP Press, Padang.
- Harvey, R.A, 2014. *Lippincott's Illustrated Reviews Biokimia* Edisi 6, Jilid 2, Binarupa Aksara
- Hasan, T., Wahab, A.W., Djide, M.N., Zakir, M., 2015. Antioxidant Activity of Bioactive Protein of Kerang Kepah (*Atactodea striata*) from South Sulawesi. *American Journal of Biomedical and Life Sciences*, 3(6): 111-114.
- Kamiya, T., Miyukigaoka, T. Shi, and Ibaraki, 2002. Biological Functions and Health Benefits of Amino Acids. *Journal of Food and Food Ingredients*, 68 (3): 206-210.
- Kurniawati, P. dan Banowati, R., *Modul Biokimia* Jilid 1, Universitas Islam Indonesia.
- Lehninger. 2008. *Principle of Biochemistry*. Terjemahan oleh Thenawijaya M, *Dasar-Dasar Biokimia*. Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- Linder, M.C., 1992. *Biokimia Nutrisi dan Metabolisme* dengan Pemakaian Secara Kimia. Terjemahan oleh Aminuddin P., Jakarta: UI Press.
- Marks, D.W., Marks, A.D., Smith, C.M., 2000. *Biokimia Kedokteran Dasar* Buku Kedokteran EGC.
- Murray RK. Granner DK dan Rodwell VW. 2003. *Harper's illustrated Biochemistry*. 27 th edition. United States : McGraw-Hill.
- Stryer, L. 2000. *Biokimia*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC.
- Villanueva, R., J. Riba, C. Ruiz-Capillas, Gonzales AV, Baeta M. 2004. Amino Acid Composition of Early Stages of Cephalopods and Effect of Amino Acid Dietary Treatments on Octopus *vulgaris paralarvae*. *Aquaculture*, 242 :455-478.
- Winarno, F.G. 2008. *Kimia Pangan dan Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wu, G., 2009, *Amino Acids: Metabolism, Functions, and Nutrition; Amino Acids*, 37: 1-17. DOI 10.1007/s00726-009-0269-0

PROFIL PENULIS

Dr. Tahirah Hasan, M.Si.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kimia FMIPA Unhas tahun 1993 dan lulus S2 pada Program Pascasarjana Jurusan Kimia Unhas, tahun 2000 dalam bidang Kimia Organik Bahan Alam. Pendidikan S3 Jurusan Kimia Pascasarjana Unhas lulus tahun 2016 dalam bidang Biokimia. Pada tahun 2003-



sekarang sebagai dosen tetap pada Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Makassar, bidang kajian Biokimia Kesehatan. Penulis mengajar mata kuliah Kimia Organik, Biokimia, Kimia Organik Bahan Alam dan Metodologi Penelitian pada Program Studi Kimia dan mata kuliah Kimia Farmasi Dasar, Kimia Organik dan Biokimia Farmasi pada Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Makassar.



BAB 5



PROTEIN

(Apt. Warsidah, S.Si., M.Si.)

Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak,
Kalimantan Barat

Email: warsidah@fmipa.untan.ac.id.


A. STRUKTUR PROTEIN

Protein dari kata Yunani protos, yang berarti “paling penting” adalah makromolekul biologis yang terbentuk dari asam amino (monomer) dan merupakan bahan penyusun utama organisme hidup. Protein terbentuk melalui proses sintesis protein, yang melibatkan langkah transkripsi dan translasi. Protein adalah sekumpulan biomolekul besar yang memainkan peran sangat penting dalam organisme hidup Untuk memperoleh protein, RNA harus melalui proses translasi Proses memperoleh RNA terjadi melalui proses transkripsi DNA (Haryanto T dan Ardi Surya B, 2015).


Protein adalah makromolekul polipeptida yang terdiri dari beberapa asam L-amino dihubungkan oleh ikatan peptida. Molekul protein terdiri dari beberapa asam amina dengan susunan tertentu dan merupakan turunan. Asam amino terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Nitrogen merupakan unsur utama protein 16% dari massa protein. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang dan jenisnya berbeda-beda protein yang mengandung unsur logam seperti tembaga dan besi (Probosari E, 2019).

Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing masing protein. Protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptide dan bahkan terkandung dihubungkan oleh ikatan sulfida. Protein terlibat dalam hampir semua fungsi biologis dan menyumbang setengah (50%). Massa sel kering organisme hidup. Pembentukan ikatan peptida antara gugus amino dan karboksil dari dua asam amino yang berbeda merupakan dasar terbentuknya rantai polipeptida yang besar dan kompleks (Janke, 2019).


Struktur umum asam amino penyusun protein



Level dari Struktur Protein



Reaksi Pembentukan Peptida Melalui Pembentukan Reaksi Dehidrasi



a. Struktur Primer


Pada tahun 1953, Frederick Sanger menentukan urutan asam amino insulin, suatu hormon protein. Hal ini merupakan peristiwa penting karena pertama kali memperlihatkan dengan tegas bahwa protein mempunyai urutan asam amino yang tertentu yang tepat. Struktur primer merupakan urutan dari asam amino.

Ruang residu asam amino yang berdekatan dalam urutan linier. Pengaturan sterik ini memberi struktur periodik. Urutan asam amino inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur primer. Struktur primer protein adalah struktur sederhana yang urutan asam aminonya tersusun dengan lurus mirip dengan susunan huruf pada kata dan tidak terjadi percabangan rantai (Taylor *et al*, 2001).


b. Struktur Sekunder

Struktur sekunder protein merupakan struktur dua dimensi suatu protein dan merupakan kombinasi struktur primer linier yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus =CO dan =NH di sepanjang tulang punggung polipeptida (Taylor *et al*, 2001). Struktur sekunder merupakan rangkaian asam amino yang membentuk struktur terpilih melingkar. Struktur sekunder protein adalah rangkaian asam amino yang membentuk struktur tiga dimensi (3D) lokal, seperti struktur alfa-heliks (H), beta-sheet (E), atau kumparan-kumparan(C) (Atar, dkk. 2010).

α -Heliks (H)




Beetha-sheet (B)



Coil (C)



Glosarium



c. Struktur Tersier

Struktur tersier suatu protein adalah kombinasi berbagai struktur sekunder setelah proses pelipatan protein. Peranan suatu protein dapat diketahui dari bentuk struktur tersiernya, namun struktur tersiernya dapat diketahui jika diketahui struktur primer dan sekundernya (Haryanto, 2011). Morfologi struktur ini diklasifikasikan menjadi struktur alpha-helix (H), beetha-sheet (B), dan coil (C).

Struktur tersier protein merupakan suatu lapisan yang tumpang tindih pada pola struktur sekunder yang terdiri dari lilitan tak beraturan antara ikatan rantai samping (gugus R) dari asam amino yang berbeda. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linier dan pola ikatan-ikatan disulfida (Murray *et al*, 2009 dan Lehninger *et al*, 2004). Struktur tersier ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R dari asam amino, yang memberikan bentuk tiga dimensi dan membentuk struktur protein yang padat dan padat (Enny, 2019).

Struktur tersier mewakili keseluruhan aksi dari sebagian besar dari gaya intramolekul, termasuk gaya struktural primer dan sekunder. Satu-satunya ikatan kovalen yang terlibat dalam struktur tersier adalah ikatan disulfida, yang dibentuk oleh oksidasi gugus sulfhidril dari dua residu sisteinil. Tingkat struktural keempat mengacu pada interaksi antara dua atau lebih rantai polipeptida yang bergabung dengan cara tertentu untuk membentuk protein yang aktif secara biologis (Enny, 2019).

d. Struktur Kuartener

Struktur kuartener merupakan kombinasi dua atau lebih polipeptida, namun tidak semua protein memiliki struktur kuartener (Kappel *et al*, 2019 dan Banach *et al*, 2019). Kompleks struktural protein kuartener juga disebut multimer, memainkan peran penting dalam sel. Struktur kuartener dibagi menjadi lima kategori: monomer, dimer, trimer, tetramer, dan oligomer orde tinggi. Setiap kategori memiliki perbedaan


dalam urutan asam amino, entropi termodinamika, dan luas permukaan yang dapat diakses (Huang *et al*, 2018).

Struktur kuartener protein merupakan asosiasi yang terjadi antara dua atau lebih rangkaian polipeptida menjadi protein multisubunit (Wibowo, 2009).


B. STRUKTUR ASAM AMINO

Struktur umum asam amino adalah satu atom C yang menghubungkan empat gugus yaitu gugus amina (NH_2), gugus karboksil (COOH), atom hidrogen H dan satu residu (R atau residu) atau disebut juga gugus rantai samping. yang memisahkan satu asam. Asam amino dengan asam amino lainnya (Winarno, 1997). Analisis asam amino sangat diperlukan, misalnya dalam analisis produk industri seperti pangan, pakan, obat obatan, serta cairan biologis dan hidrolisat protein (Rediatning, 1987).

Struktur Glisin dan Alanin



Asam Amino dengan Rantai Samping Karboksilat dan Karboksamin




C. IKATAN KIMIA YANG MENSTABILKAN PROTEIN

1. Ikatan Hidrogen

Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom hidrogen dengan atom lain, seperti oksigen dalam satu molekul dan salah satu komponen (N, O, F) dalam molekul lain. Inilah gaya tarik menarik antar molekul (Effendy, 2018). Ikatan hidrogen terbentuk pada atom yang mempunyai elektronegativitas tinggi dengan atom hidrogen dan terikat secara kovalen pada atom yang elektronegatif (Rachmania *et al.*, 2015). Ikatan hidrogen antar residu pada protein B4ZE95 sebanyak 83 ikatan, menunjukkan bahwa protein merpati β -NGF berada dalam keadaan stabil. Sheu, et al (2009) melaporkan bahwa ikatan hidrogen dapat menstabilkan beberapa residu asam


amino dalam struktur tiga dimensi protein dan merupakan penentu dinamika dan stabilitas protein. Ikatan hidrogen terbentuk antara atom hidrogen dalam molekul yang mengandung salah satu unsur (N, O, F) (Effendy, 2006), dan digambarkan sebagai bentuk interaksi elektrostatik antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif (Pranoto, 2013). Santoso, A (1999) menyatakan bahwa ikatan hidrogen terbentuk antar molekul karena adanya gaya elektrostatik di antara keduanya.

Ikatan Kimia pada Protein




Pengaruh Ikatan Hidrogen terhadap Struktur Molekul Etanol merupakan bahan bakar yang mengandung molekul O-H. Ikatan hidrogen adalah suatu bentuk interaksi elektrostatik antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif dan atom elektronegatif lainnya. Ikatan hidrogen biasanya terjadi antara atom hidrogen dan nitrogen, oksigen, dan tepung. Interaksi ini secara sederhana ditulis sebagai D-HA. Donor proton (D) adalah atom elektronegatif yang bergabung dengan hidrogen sehingga memiliki bagian positif, dan akseptor proton (A) adalah atom elektronegatif lain yang berinteraksi dengan bagian positif atom hidrogen.

Ikatan Hidrogen Air dan Etanol




Ikatan antara etanol dan air mempunyai dua struktur ikatan hidrogen berkenaan dengan isomer yang terbentuk, etanol merupakan akseptor proton pada $\text{RHO}-\text{H}_2\text{O}$ dan donor proton pada $\text{ROH} \cdots \text{OH}$ Air larut dalam molekul etanol. Jika iya maka akan terlihat seperti ini: Terlepas dari ini, ikatan hidrogen antara molekul etanol terputus. Dalam keadaan ini, molekul etanol dikelilingi oleh molekul air. Hal ini terjadi karena perbedaan keelektronegatifan antara molekul etanol dan etanol serta antara molekul etanol dan air. Menurut teori ini, setiap molekul air dikelilingi oleh empat molekul etanol. Representasi ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Ikatan Hidrogen Etanol Air



Struktur Molekul Etanol 95,11% v/v




Dari gambar terlihat bahwa dua molekul ethanol sebelah kiri akan mengikat molekul polar lain baik itu ethanol maupun air, demikian juga halnya dengan 2 molekul ethanol sebelah kanan. Jika pada molekul tersebut ditambahkan dua molekul ethanol, untuk meningkatkan nilai kalor karena air tidak memiliki nilai kalor, maka terjadi struktur molekul seperti pada gambar. Pada gambar terlihat struktur molekul ethanol dengan sedikit air akan menjadi pendek dengan oksigen terpusat ditengah. Dengan semakin baiknya struktur molekul bahan bakar, sedikit kadar air pada ethanol yang terpusat ditengah berfungsi sebagai oksigenit akan meningkatkan karakteristik pembakaran. Jika dalam molekul bahan bakar terdapat satu molekul air dengan massa molekul (M) 18,015 gram dan densitas (ρ) air adalah 1g/cc. Juga terdapat 6 molekul ethanol dengan massa molekul (M) 46,068 g/mol, dan $\rho=0,789$ g/cc. Jika komposisi tersebut diprosentasikan dalam fraksi volume maka menjadi ethanol 95.11%.

2. Ikatan Peptida

Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus karboksil α dari satu asam amino dan gugus α -amino dari asam amino lain. ikatan peptida dapat mengubah struktur protein dan menurunkan kadar protein. Polipeptida dan protein adalah polimer yang terbuat dari asam

amino. Perbedaan antara polipeptida dan protein adalah jumlah asam amino penyusunnya. Polipeptida adalah polimer yang terbuat dari asam amino yang memiliki unit asam amino lebih sedikit dibandingkan protein. Istilah polipeptida biasanya mengacu pada senyawa peptida dengan kurang dari 50 monomer asam amino. Sebaliknya, protein memiliki lebih dari 50 monomer asam amino. Dalam senyawa peptida, dua atau lebih asam amino bergabung melalui ikatan peptida. Ketika gugus α -amino dari satu asam amino bergabung dengan gugus α -karboksil dari asam amino lain, ikatan peptida terbentuk dan molekul air dilepaskan. Istilah dipeptida digunakan untuk senyawa peptida yang mengandung dua asam amino. Tripeptida mengandung tiga asam amino.

Pembentukan Ikatan Peptida



Peptida berbeda dari protein karena mereka memiliki panjang asam amino yang lebih pendek dan berat molekul yang lebih rendah. Artinya peptida lebih mudah larut dalam air panas atau dingin, lebih mudah dicerna, dan masuk ke aliran darah dengan cepat dan efektif. Peptida bersifat selektif dan efektif, relatif aman, dan karena terbuat dari fragmen protein, tidak dianggap sebagai zat asing seperti bahan kimia dan dikenal sebagai bahan yang mudah ditoleransi oleh tubuh, serta digunakan dalam aplikasi medis dan bidang farmasi (Viruly, 2021). Peptida dan protein adalah polimer yang tersusun dari unit

asam amino melalui ikatan peptida antara gugus α -amino dari satu asam amino dan karboksil dari asam amino lainnya. Ikatan peptida ini terjadi membentuk gugus Amida. Asam amino yang menyusun peptida disebut residu. Contoh peptida yang dibentuk oleh glisin dan serin diberi nama glisilserin. Ada dua kemungkinan kombinasi dipeptida, yaitu di bawahnya. Tripeptida dapat membentuk kombinasi asam amino dalam enam cara. Dengan demikian, residu asam amino semakin banyak. Semakin banyak kemungkinan kombinasi Asam Amino Peptida diberi nama dari sebelah kiri nama asam amino tepat (Reza Fadhillah 2019). Selama sintesis protein, rantai panjang asam amino yang disebut rantai peptida terbentuk. Ikatan kimia yang menghubungkan dua asam amino disebut ikatan peptida. Ikatan ini terjadi karena hidrogen (H) gugus amino suatu asam amino bergabung dengan hidroksil (OH) gugus karboksil asam amino lain. Proses ini menghasilkan molekul air, dan sisa CO dan NH membentuk ikatan peptida. Di sisi lain, ikatan peptida ini dipecah menjadi asam amino oleh asam dan enzim ketika molekul air ditambahkan. Proses ini disebut hidrolisis (Rismayanthi, 2006)


Peptida bioaktif dapat diproduksi dengan beberapa metode, yaitu hidrolisis enzimatik dengan enzim pencernaan, aktivitasnya menggunakan fermentasi mikroba dan sintesis kimia (Bhat et al., 2015). Hidrolisis enzimatik protein dengan enzim proteolitik yang sesuai yang mampu menghasilkan peptida tindakan yang diharapkan. Kondisi fisiko-kimia substrat, seperti suhu dan pH. Solusinya harus memenuhi kondisi optimal untuk aktivitas enzim. Beberapa enzim adalah enzim yang biasa digunakan dalam hidrolisis adalah papain, tripsin, α -chymotrypsin, pepsin,

bromelain, alkalase dan netraz. Faktor terpenting dalam produksi peptida bioaktif adalah berat molekul peptida. Metode yang umum digunakan Produksi peptida dengan berat molekul tertentu adalah suatu sistem membran ultrafiltrasi. Sistem hidrolisis bertingkat Beberapa enzim mampu secara bersamaan menghasilkan peptida dengan ukuran berbeda lebih sedikit. Kombinasi hidrolisis multistage dan sistem reaktor membran. Sistem membran ultrafiltrasi mampu menghasilkan peptida yang sangat aktif lebih optimal (Kim dan Wijesekara, 2010). Peptida bioaktif yang terbuat dari protein makanan dapat mengurangi tekanan darah, menjaga keseimbangan berat badan, menghindari aktivitas Endopeptidase spesifik prolin, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah agregasi trombosit, menghambat proses protease dan oksidasi HIV efek antibakteri dan antijamur, mengikat ion dan meningkatkan pengangkutan mineral dan meningkatkan nilai gizi makanan (Li dan Yu, 2014; Chakrabarti et al. 2014).

Peptida terdiri dari beberapa asam amino dan merupakan rantai gugus Gugus karboksil dari satu asam amino terikat pada gugus amino dari asam amino lain melalui ikatan peptida. Sintesis ikatan peptida ini terjadi pada sel a langkah-langkah reaksi yang sangat kompleks. Ikatan peptida terbentuk dengan menghilangkan molekul air, menghubungkan gugus karboksilat dari asam amino ke gugus amino asam amino lainnya. Asam amino yang dihubungkan oleh dua ikatan peptida disebut dipeptida, peptida 3 asam amino disebut tripeptida dll. Jika peptida polipeptida yang mengandung lebih dari 10 asam amino. Oligopeptida terdiri dari empat asam amina dapat dilihat pada gambar dengan ujung karboksil (-COOH) dan ujung terminal amino (-NH₂). Jika peptida

terdiri dari asam amino netral, maka peptida tersebut hanya mengionisasi gugus karboksil dan gugus amino pada kedua ujungnya. Tapi jika Peptida terdiri dari asam amino basa atau asam, termasuk ionisasinya ditemukan di bagian lain dari molekul tersebut. Dan cluster ini bisa aktif dan berfungsi (Normah dan fahmi, 2015).

Ikatan Peptida



Beberapa peptida dengan aktivitas biologis yang signifikan meliputi: adalah glutathione yang terdiri dari 3 asam amino, sedangkan hormon vasopresin dan oksitosin adalah nonapeptida. Oksitosin menyebabkan kontraksi otot, vasopresin meningkatkan tekanan darah akibat vasokonstriksi perifer. Ini juga termasuk berbagai antibiotik Polipeptida termasuk gramicidin, tyrosidine dan penisilin. Contoh lainnya adalah hormon ACTH (adrenokortikotropik) merupakan polipeptida dari 39 residu asam amino, sedangkan Insulin terdiri dari 51 asam amino, yang terdiri dari dua rantai polipeptida.

3. Ikatan Disulfida

Ikatan disulfida adalah jenis ikatan kimia yang terjadi antara dua atom belerang dalam molekul. Ikatan ini merupakan ikatan kovalen yang sangat kuat dan umumnya terbentuk antara dua gugus sulfhidril (-SH) dari dua molekul protein atau antara dua rantai polipeptida yang sama. Proses pembentukan ikatan disulfida, dikenal sebagai oksidasi sulfhidril, terjadi ketika dua gugus sulfhidril berdekatan pada rantai polipeptida mengalami reaksi oksidasi. Akibatnya, terbentuklah ikatan disulfida yang menghasilkan struktur jembatan yang kuat antara dua rantai polipeptida atau dalam suatu rantai polipeptida yang sama. Ikatan disulfida sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan struktur tiga dimensi dari protein-protein kompleks. Struktur tiga dimensi ini merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan fungsi protein dalam tubuh. Contohnya, dalam protein struktural seperti keratin yang membentuk struktur rambut, kuku, dan kulit, ikatan disulfida membantu menjaga kekuatan dan kekakuan protein tersebut. Dalam enzim, ikatan disulfida dapat mempengaruhi aktivitas katalitik enzim dengan memodifikasi struktur protein.

Pentingnya ikatan disulfida juga terlihat dalam konteks pengembangan obat-obatan. Dalam penelitian farmasi, pemahaman terhadap ikatan disulfida membantu para ilmuwan dalam merancang obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan protein tertentu dengan cara yang diinginkan. Manipulasi ikatan disulfida pada protein dapat menjadi strategi dalam pengembangan obat karena dapat mengubah struktur protein dan, akibatnya, memodifikasi aktivitas biologisnya. Selain itu,

ikatan disulfida juga dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik dari material biologis. Contohnya, pada pembuatan produk pangan, pembentukan atau penghancuran ikatan disulfida pada protein dapat mempengaruhi tekstur dan konsistensi makanan. Pemahaman tentang ikatan disulfida sangat penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk biokimia, biologi molekuler, farmakologi, dan rekayasa protein. Studi yang lebih mendalam tentang sifat dan interaksi ikatan disulfida juga dapat membuka peluang untuk pengembangan material baru, obat-obatan inovatif, dan pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme biologis yang mendasarinya. Ini adalah sebagian kecil dari pentingnya ikatan disulfida dalam berbagai bidang ilmu dan aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. (Bechtel & Weerapana, 2017).


D. METODE PEMISAHAN DAN PEMURNIAN PROTEIN

1. Kromatografi Filtrasi Gel


Kromatografi filtrasi gel merupakan teknik pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul. Matriks filtrasi gel adalah gel berpori seperti dekstran, agarosa, atau poliakrilamida. Pori-pori matriks dapat menampung molekul yang lebih kecil. Molekul kecil menembus pori-pori matriks, namun molekul besar tidak terperangkap di pori-pori kolom (Rahmi, *et al.*, 2020). Pada metode kromatografi filtrasi gel terdapat fase diam, yang dimana fase diam yang digunakan adalah silika atau polimer berpori, sehingga zat terlarut dapat melewati pori-pori atau berdifusi melalui fase diam (Gandjar dan Rohman, 2007).

Kromatografi filtrasi gel digunakan untuk proses pemurnian protease *Pseudomonas aeruginosa*. Protease *Pseudomonas aeruginosa* menunjukkan aktivitas tertinggi sebesar 0,243 IU/ml setelah inkubasi 48 jam pada medium LB. Proses pemurnian protease juga membutuhkan *Sephadex G-100* sebagai matriks dan *buffer Tris-HCl* 0,05 M, pH 8 sebagai eluennya. Pengendapan dilakukan dengan amonium sulfat 70% sebelum dimurnikan menggunakan kromatografi gel (Baehaki, A., *et al.*, 2008). Matriks pada filtrasi gel adalah gel berpori yang diatur dalam kolom. proses penyaringan gel ini bergantung pada perbedaan kemampuan molekul- molekul protein enzim untuk masuk kedalam pori-pori pada fase diam (Putranto, *et al.*, 2006).

Prinsip Pemisahan Protein dengan Filtrasi Gel



Kromatogram Pemisahan Protein yang Berbeda



Protease yang dimurnikan dengan filtrasi gel melalui Sephadex G-100 memiliki aktivitas spesifik dan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan langkah sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Sephadex G-100, protein yang diinginkan yaitu enzim dapat dipisahkan dari senyawa selain pengotor. Logam berat dan asam nukleat biasanya mengganggu kerja enzim, dan kontaminan tersebut dapat dihilangkan untuk meningkatkan aktivitas enzim (Haris dan Angal, 1989). Kromatografi filtrasi gel menggunakan matriks berpori seperti dekstran, agarosa, atau poliakrilamida untuk memisahkan protein dan makromolekul biologis berdasarkan ukuran mereka. Matriks komersial seperti sepharose, sephadex, dan biogel digunakan dalam kolom untuk menampung molekul kecil di dalam pori-porinya, sedangkan molekul besar tidak tertahan, sehingga menyebabkan molekul besar keluar lebih awal dari kolom dibandingkan dengan molekul yang lebih kecil (Bouvier dan Koza 2014).

2. Metode Kromatografi Afinitas


Pemurnian protein memiliki beberapa metode salah satunya ialah metode kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas merupakan cara utama dalam memisahkan dan membersihkan sebagian besar molekul biologi dengan mempertimbangkan susunan kimianya. yang dimana metode ini secara spesifik serta reversibel memiliki interaksi antara ligan pada fasa diam dengan produk target (Alami et al., 2022). Adapun tiga komponen penting dalam afinitas, yaitu padatan pendukung, lengan penghubung dan juga ligan (Muldiani dan Widarti, 2017). Metode kromatografi afinitas didasarkan oleh suatu interaksi yang terdapat secara spesifik dan reversibel antara ligan pada suatu fasa diam yang didalam kolom dengan produk targetnya. Fasa diam

dalam kromatografi afinitas terdapat tiga komponen utama yang ada, yaitu padatan pendukungnya, lengan penghubung, dan ligan. Selain pada interaksinya, secara spesifik juga produk target yang terdapat pada ligan saat berproses terhadap pemurnian memungkinkan untuk terjadi suatu retensi produk target pada padatan pendukung dan lengan penghubungnya (Ratu & Sri, 2017). Kromatografi afinitas adalah suatu metode yang paling sering digunakan pada setiap percobaan sampel, karena memiliki keuntungan yaitu, selektivitas yang tinggi, resolusi yang tinggi, dan menghasilkan protein pada kapasitas yang tinggi. Metode ini menggunakan buffer yang digunakan untuk membantu pada proses pemurniannya, seperti NaCl dan imidazol. NaCl juga berfungsi untuk dapat pengikat protein untuk menghindarkan protein dari kontaminannya, sedangkan imidazol sebagai dapat pemisah antara ikatan ligan dan protein, sehingga protein yang dapat dihasilkan sesuai dengan harapan (IBA Lifesciences, 2012; Puspitaningrum et al., 2018).

Afinitas adalah kemauan suatu elemen atau senyawa untuk membentuk ikatan kimia dengan elemen atau senyawa lainnya. Ketika massa molekul ion organik bertambah besar, afinitasnya biasanya juga meningkat; dan semakin besar muatan ion, maka afinitas resin juga cenderung meningkat (Windasari dan Sari, 2021). Teknik ini sangat umum digunakan karena menawarkan selektivitas tinggi, resolusi yang baik, serta kemampuan untuk menghasilkan protein dalam jumlah besar. Proses pemurnian melibatkan penggunaan berbagai jenis buffer seperti NaCl dan imidazol. NaCl digunakan sebagai senyawa yang dapat mengikat protein untuk menghindari kontaminasi, sedangkan imidazol berfungsi sebagai senyawa pemisah antara ligan dan protein untuk menghasilkan protein sesuai kebutuhan (Alami et al., 2022).

Kromatografi afinitas adalah jenis kromatografi cair yang menggunakan interaksi mirip biologis untuk pemisahan dan analisis spesifik komponen sampel. Teknik ini menawarkan selektivitas tinggi, sehingga resolusi tinggi, dan biasanya kapasitas tinggi untuk protein yang diminati. Pemurnian dapat mencapai beberapa ribu kali lipat dan pemulihan materi aktif umumnya sangat tinggi. Kromatografi afinitas (juga disebut pemurnian afinitas) memanfaatkan interaksi pengikatan khusus antara molekul. Ligand tertentu diimobilisasi secara kimiawi atau "coupled" ke dukungan padat sehingga ketika campuran kompleks dilewatkan melalui kolom, molekul-molekul yang memiliki afinitas pengikatan spesifik terhadap ligand menjadi terikat. Setelah komponen sampel lainnya dicuci, molekul yang terikat dihilangkan dari dukungan, menghasilkan pemurnian dari sampel asli. Ide dasarnya telah banyak dimanfaatkan sebagai alat yang kuat untuk pemisahan dan pemurnian berbagai macam makromolekul biologis. Keefektifan pemurniannya bergantung pada selektivitas interaksi, dan dengan demikian adsorpsi, dari makromolekul biologis pada adsorben afinitas yang disiapkan melalui imobilisasi kovalen ligand spesifik pada matriks polimer padat (Shirisha et al, 2018).

Prinsip Kromatografi Afinitas




3. Kromatografi Cair Penukar Kation

Kromatografi cair penukar kation (CEX) adalah metode non-denaturasi yang umum digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur varian mAb asam dan basa, bergantung pada muatan permukaan yang tersedia. Selain icIEF, CEX juga dianggap sebagai strategi standar emas lainnya untuk menganalisis varian muatan dalam protein. Tergantung pada kekuatan interaksi antara fase diam dan protein, resin penukar kation lemah atau kuat yang mengandung gugus asam karboksilat atau sulfonat pada permukaannya dapat digunakan.

CEX memungkinkan dua pendekatan untuk mengelusi senyawa ionik dari kolom. Melemahkan interaksi ionik antara analit dan fase diam dengan meningkatkan konsentrasi garam (mode gradien garam) atau Ubah pH larutan (Farsang, *et al.*, 2019). Pertukaran dengan menggunakan resin penukar kation hanya dapat menurunkan konsentrasi ion positif yang ada dalam limbah air terproduksi, seperti ion natrium yang merupakan ion dominan dalam limbah terproduksi (Partuti, 2014). kromatografi penukar ion adalah teknik pemisahan yang umum dan populer dalam memisahkan serta menentukan ion ion organik dan anorganik dalam campuran. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan diberbagai lingkungan, termasuk laboratorium dan industri, karena kemudahan dan keefektifannya (Anggraeni, *et al.*, 2017).

Kromatografi Cair Penukar Kation




Kendala dalam pemisahan metode kromatografi pertukaran ion pada kolom terbuka ini cukup berat, karena memerlukan resin dalam jumlah banyak dengan harga yang mahal, hal ini yang menyebabkan banyak dari para peneliti yang melakukan penelitian mengenai pembuatan resin penukar ion berbahan dasar polimer, baik polimer organik maupun anorganik. Polimer atau ko-polimer stiren mempunyai sifat aliran yang konstan pada suhu dibawah suhu degradasi, dan dapat dilelehkan dengan mudah (Gooch, 2007). Dalam suatu kesetimbangan dan pembentukan ion, proses pertukaran ion memberikan variasi yang cukup banyak bagi suatu pemisahan unsur dengan menggunakan resin penukar anion dan kation (Cochrane, 1986). Kapasitas pertukaran ion menggambarkan kemampuan resin untuk bertukar ion, sebanding dengan jumlah gugus aktif yang terikat pada resin. Semakin banyak gugus aktif yang terikat pada resin, maka kapasitas pertukaran ion akan dihasilkan semakin

besar. Penentuan nilai kapasitas pertukaran ion dilakukan melalui titrasi asam-basa. Nilai kapasitas pertukaran ion dapat dihitung dengan mengukur selisih konsentrasi natrium hidroksida sebelum dan sesudah resin polistiren hasil sintesis direndam (Zainudin, *et al.*, 2015).

Kromatografi ion merupakan teknik yang sangat menguntungkan terhadap penggunaan teknik absorpsi radiasi atomic absorption spectrometry (AAS) dan emisi radiasi inductively coupled plasma atomic spectroscopy (ICP) (Jenke D., 2011). Kromatografi ion adalah suatu kombinasi proses pemisahan antara analit yang berdasarkan pada perbedaan migrasi ion dan deteksi analit. Kromatografi cair pertukaran ion adalah salah satu bagian dari kromatografi ion dan memungkinkan penggunaannya terhadap pemisahan molekul-molekul yang dapat terionisasikan berdasarkan oleh perbedaan sifat suatu muatannya. Metode ini sering digunakan karena relatif tidak mahal dan memungkinkan otomatisasinya (Cummins P., *et al.*, 2017). Pada umumnya, metode kromatografi penukar ion sudah efektif untuk memisahkan DPO dari protein-protein pengotor lain. Sebenarnya ada metode lain yang sangat selektif untuk memurnikan suatu DPO yaitu dengan metode kromatografi afinitas pada resin yang digunakan yaitu resin Ni-NTA (Singh, 2015). Namun metode tersebut memerlukan sampel yang sangat banyak saat memisahkan dengan resin Ni-NTA karena selektivitasnya yang tinggi dan hanya menghasilkan sample murni yang relatif sedikit (Singh, 2015).

Ilustrasi Pemisahan pada Kromatografi Penukar Ion




4. Kromatografi Eksklusi

Metode yang paling umum dan efisien untuk memperoleh informasi mengenai berat molekul dan distribusi berat molekul dari makromolekul adalah melalui kromatografi eksklusi. Meskipun teknik ini mulai digunakan sekitar tahun 1950, kemajuan signifikan terjadi di sekolah kromatografi Swedia, khususnya setelah publikasi fundamental oleh Porath dan Flodin pada tahun 1959 tentang pemisahan substansi makromolekul larut dalam air menggunakan dextran yang saling terikat (Gooding dan Regnier 2002). Kromatografi Eksklusi (size exclusion chromatography/SEC) adalah cara yang digunakan untuk memurnikan enzim. Teknik kromatografi eksklusi ukuran (SEC) adalah metode yang telah lama digunakan untuk karakterisasi mendalam protein terapeutik dan dapat dianggap sebagai

metode referensi yang kuat untuk mengevaluasi secara kualitatif maupun kuantitatif agregat. Keunggulan utama dari pendekatan ini terletak pada kondisi fase gerak yang ringan, memungkinkan karakterisasi protein dengan dampak minimal pada struktur konformasional dan lingkungan lokal. Dengan suatu proses yang memisahkan protein berdasarkan muatan ion pada permukaannya, dengan menggunakan resin yang telah dimodifikasi dengan gugus kimia yang bermuatan positif (anion exchanger) atau negatif (cation exchanger) (Tan dan Yiap 2009). Size exclusion chromatography ini biasanya efektif untuk digunakan pada tahap awal purifikasi (Robinson, 2015). SEC juga disebut suatu proses pemisahan protein yang berdasarkan pada ukurannya. Proses ini pula merupakan proses pemisahan yang sangat sederhana. Karena sampel tidak dapat berikatan dengan mediana sehingga komposisi yang terdapat buffernya tidak dapat mempengaruhi resolusi (Tan dan Yiap, 2009).

Prinsip pemisahan dengan kromatografi eksklusi atau Size Exclusion Chromatography (SEC)



Meskipun istilah SEC sering digunakan untuk pemisahan dalam larutan air dan GPC untuk pemisahan dalam eluen organik, latar

belakang teoritis, struktur, kelebihan, dan keterbatasannya sama. Namun, dari perspektif mekanisme pemisahan, SEC (kromatografi eksklusi ukuran) adalah nama yang paling deskriptif (Sriegel et al., 2009). SEC dapat digunakan untuk mengukur berat molekul dan distribusi makromolekul. Paling sering itu adalah polidispersitas. Artinya, dalam kasus paling sederhana, ini adalah campuran fisik dari molekul berbeda dengan panjang rantai (berat molekul) berbeda. Hal ini merupakan keuntungan besar ketika memilih teknik analisis untuk mengkarakterisasi makromolekul, karena teknik yang bersaing hanya dapat mengukur sifat massal (Kilz, 2006).

5. Kromatografi Interaksi Hidrofobik

Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam akan menahan komponen campuran sedangkan fase gerak akan melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal. Sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. (Kantasubrata, *et al.*, 1993). Kromatografi interaksi hidrofobik adalah sistem kromatografi dasar yang menggunakan media hidrofobik dan dapat dibagi menjadi (a) fase terbalik dan (b) kromatografi interaksi hidrofobik. Dalam kromatografi interaksi hidrofobik, solut (protein) diadsorpsi dan dipisahkan pada fase padat diam (sistem dua dimensi) yang membawa gugus hidrofobik yang terimobilisasi. Di sisi lain, dalam kromatografi fase terbalik, solut diserap dan dipisahkan (terpartisi) dalam fase cair stasioner apolar (sistem tiga dimensi) dan bukan pada fase padat. Karena perbedaan cakupan dan detail

metodologi yang signifikan, kromatografi fase terbalik dan kromatografi partisi hidrofobik cair-cair tidak akan dibahas di sini. Perbedaan tidak akan dibuat antara sistem kromatografi klasik dan kromatografi cair bertekanan tinggi atau kromatografi cair kinerja tinggi, karena pada dasarnya, kinerja yang lebih tinggi (misalnya, kapasitas produksi dan resolusi) dalam metode terakhir disebabkan oleh ukuran butiran yang kecil dan monodispersitas, bukan oleh sifat hidrofobik permukaan. Interaksi nonkovalen tipe hidrofobik telah dijelaskan sebagai 'daya tarik yang sangat kuat antara molekul nonpolar dan permukaan dalam air' (Israelachvili, 1985).


Kromatografi interaksi hidrofobik merupakan metode pemisahan berdasarkan interaksi hidrofobik antara penyerap dan sampel. Agar interaksi hidrofobik enzimatik dapat terjadi, kondisi optimal tertentu harus dipenuhi. Untuk mencapai aktivitas xilanase yang optimal harus dilakukan optimalisasi kondisi. Dalam penelitian ini, dua parameter optimal yang dipertimbangkan adalah pH dan konsentrasi amonia sulfat (Yuliana, 2009). Kromatografi interaksi hidrofobik (HIC) merupakan teknik penting untuk pemurnian protein; ia mengeksploitasi sifat hidrofobik zat terlarut (protein) dan sering digunakan dalam kombinasi dengan kromatografi penukar ion dan kromatografi permeasi gel. HIC melibatkan pemisahan molekul protein yang memiliki interaksi diferensial dari molekul-molekul ini dengan situs hidrofobik pada permukaan penyangga padat. Dalam proses pemisahan, bercak hidrofobik pada protein berinteraksi dengan molekul hidrofobik yang tidak bergerak pada permukaan fase padat hidrofilik (Jennissen, *et al*, 2000).

Pemurnian enzim bertujuan untuk memisahkan enzim yang dikehendaki dari enzim lain yang tidak diinginkan. Ada tiga strategi

yang harus diperhatikan dalam pemurnian enzim:

1) kualitas, perlu tindakan untuk mempertahankan aktivitas enzim dengan mengurangi proteolisis dan denaturasi, 2) kuantitas, perlu diperhatikan jumlah pemakaian akhir protein murni, dan 3) ekonomis, perlu dipertimbangkan biaya apabila diterapkan dalam skala laboratorium maupun industri. Seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini (Harris dan Angal, 1989). Kromatografi interaksi hidrofobik adalah metode pemisahan berdasarkan interaksi hidrofobik antara penyerap dan sampel. Metode ini adalah sebuah metode yang ringan dan diketahui meningkat dan dengan kekuatan tinggi di dalam kromatografi ini, campuran protein dipisahkan untuk bertindak sebagai fase gerak, sedangkan matriksnya memiliki ligan hidrofobik bertindak sebagai fase padat (Roe, 1989; Eriksson, 1998).

Prinsip Pemisahan pada Kromatografi Interaksi Hidrofobik



HIC digunakan terutama untuk pemisahan makromolekul biologis, terutama protein. Ukuran, struktur kompleks, dan kecenderungan terjadinya denaturasi protein membuatnya agak sulit dilakukan menjelaskan pengaruh suhu terhadap energi proses retensi dalam HIC dengan eluit berprotein. Untuk ini sebab itulah kami

dijadikan model senyawa asam dansylamino, yang mana adalah molekul yang relatif sederhana dengan hidrofobik yang cukup besar gugus, diperkirakan tidak akan menjalani konformasi pada kolom perubahan kondisi yang digunakan dalam HIC, dipertahankan secukupnya, dan terdeteksi pada konsentrasi rendah karena sinar UV yang kuat penyerapan. Gambar kromatogram khas enam asam dansyl amino yang diperoleh HIC dengan elusi gradien dalam kondisi yang mirip dengan pemisahan protein. Faktor retensi asam dansylamino terpilih adalah diukur dalam kisaran suhu dari 5°C hingga 45°C kolom A dan dari 5°C hingga 50°C pada kolom B dan C. Dengan pengaturan sewenang-wenang nilai rasio fase terhadap kesatuan, datanya dipasang sesuai dengan persamaan logaritma dan kuadrat yaitu, Persamaan 7 dan 8-dengan r^2 2 0,995 yang paling cocok persamaan logaritmik dengan data yang diperoleh dengan ketiganya kolom. Plot van't Hoff sangat nonlinier dan, dengan beberapa pengecualian, lakukan secara maksimal dalam eksperimen interval suhu. Perilaku ini menunjukkan panas yang besar perubahan kapasitas yang menyertai proses retensi di HIC (Tanford, C.,1980). Retensi dan selektivitas dalam HIC kemungkinan besar akan diatur oleh efek hidrofobik Studi tentang termodinamika aspek interaksi hidrofobik, yang diyakini menentukan juga arsitektur tiga dimensi, stabilitas, dan dinamika molekul protein (Kauzmann, W.1959), telah menjadi tujuan lama studi kalorimetri pada pelipatan protein (Privalov, P. L. & Makhatadze, G. I.,1992). Lebih sering daripada tidak, sistem model yang relatif sederhana, seperti itu sebagai pelarutan senyawa gas, cair, dan padat dalam air, telah digunakan untuk mengevaluasi besaran termodinamika berhubungan dengan interaksi hidrofobik. Studi kalorimetri pada transfer hidrokarbon cair (Gill, S. J. & Wadso, I. 1976), gas nonpolar zat

(Dec, S. F. & Gill, S. J.1984), dan dipeptida siklik padat (Murphy, K. P. & Gill, S. J. ,990) menjadi air telah mengungkapkan efek kapasitas panas yang signifikan. Perilaku ini adalah terutama disebabkan oleh penghilangan luas permukaan nonpolar dari molekul dari air saat dipindahkan (Sturtevant, J. M.,1977).

Kemajuan yang dicapai dalam menjelaskan dampak dari hal ini masih kurang suhu pada retensi di HIC. Peningkatan yang diamati pada retensi protein dengan suhu, misalnya, telah terjadi dianggap berasal dari peningkatan interaksi hidrofobik dengan peningkatan suhu karena perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh suhu dan peningkatan yang bersamaan area kontak hidrofobik setelah berikatan dengan permukaan kromatografi (Wu, S.-L., Figueroa, A. & Karger, B. L.,1986). Sejauh ini satu-satunya studi termodinamika yang dilakukan pengaruh suhu pada HIC dilakukan dengan alifatik alkohol dan asam karboksilat pada fase diam oktil-agarosa dengan buffer fosfat berair murni (Gelsema, W. J., Brandts, P. M., de Ligny, C. L., Theeuwes, A. G. M. & Roozen, A. M. P.1984) dan hidro-organik fase gerak yang mengandung metanol atau etilen glikol (Brandts, P. M., Gelsema, W. J. & de Ligny, C. L. (1986) *J. Chromatogr.* 354, 19-36.). Karena konsentrasi garam sangat rendah dalam penelitian ini, maka kondisi berbeda dari yang digunakan untuk pemisahan protein di HIC. Untuk menjelaskan retensi HIC perilaku protein, perlu dipahami terlebih dahulu dasar fisikokimia HIC dengan molekul sederhana itu tidak mengalami perubahan konformasi yang signifikan dan dapat digunakan biaya publikasi artikel ini dibiayai sebagian oleh biaya halaman pembayaran. Oleh karena itu, artikel ini harus diberi tanda "iklan" disesuaikan dengan 18 U.S.C. 1734 semata-mata untuk menunjukkan fakta ini. kondisi yang mensimulasikan kondisi yang digunakan untuk pemisahan protein.

REFERENCE

- Abu bakar Sidik Katili, 2009, Struktur Dan Fungsi Protein Kolagen, jurnal pelangi ilmu, vol 2, no 5
- Adelina, S., 2015, Asam Amino, Peptida, dan Protein, Fakultas Kedokteran Ukrida, Jakarta. Bandung (ID), Gramedia Pustaka Utama.
- Banach, M., Konieczny, L., & Roterman, I. (2019). Secondary and Supersecondary Structure of Proteins in Light of the Structure of Hydrophobic Cores. *Methods Mol. Biol*, 1958, 347-378.
- Borg, W.R. & Gall, M.G. (1983). *Educational Research: An Introduction*. New York. Longman Inc
- Dufour DR. Liver disease. In: Carl AB, Edward RA, David EB editors. *Clinical chemistry and molecular diagnostics*. Fourth ed. Missouri: Elsevier saunders; 2006. p. 1777-1827
- Dwi Fitri Khotimah, Ulinnuha Nur Faizah, dan Titah Sayekti, 2021, Protein sebagai Zat Penyusun dalam Tubuh Manusia: Tinjauan Sumber Protein Menuju Sel, vol 1, no 1
- Enny P, 2019, Pengaruh Protein Diet Terhadap Indeks Glikemik, *Journal of nutrition and health*, vol 7 no 1
- Hamidah. I, Nur Subkhi, dan Anilia Ratnasari, 2020, Validasi Media Pembelajaran Alat Peraga Sintesis Protein Berbahan Baku Limbah Plastik, vol 1, no 2
- Huang, C.C., Chang, C.C., Chen, C.W., Shao-yu Ho, Chang, H.P., & Chu, Y.W. (2018). PClass: Protein Quaternary Structure Classification by Using Bootstrapping Strategy as Model Selection. *Genes*, 9(2), 91
- Irnaningtyas, 2014. *Biologi untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Erlangga
- Kappel, K., Jarmoskaite, I., Vaidyanathan. P.P., Greenleaf, W.J., Herschlag, D., & Das, R. (2019). Blind tests of RNA-protein binding affinity prediction. *Proc. Natl. Acad. Sci*, 23:116(17), 8336-8341
- Murray (2006). *Harper's illustrated biochemistry*. Boston, Mass.: McGraw-Hill.
- Poedjiadi, A., 1994, *Dasar-dasar Biokimia*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Probosari, E., 2019, Pengaruh Protein Diet Terhadap Indeks Glikemik, *Journal of nutrition and health*, vol 7 no 1
- Rediatning WS dan Nanny Karti H, 1987, Analisis asam amino dengan kromatografi cairan kinerja tinggi secara derivatisasi prakolom dan pascakolom, *Proceeding Institut Teknologi Bandung* 20, 1-2
- Subkhi, Ratnasari, dan Hamidah, 2020, Eksplorasi Limbah Lokal

- Indramayu Sebagai Bahan Baku Alat Peraga Media Analog dan Efektivitasnya Terhadap Hasil Belajar, *Quagga: Jurnal Pendidikan dan Biologi*, vol 12, no 1, 31-43.
- Sudirga S. K. (2016). *Biokimia Biologi Unud*. Bali : Universitas Udayana
- Suhardjo dan Clara M. Kusharto. 2002. *Prinsip-Prinsip Ilmu Gizi*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Tandem LC-MS Yuanqi Tao, dan Ryan R Julian, 2014, Identifikasi Epimerisasi dan Isomerisasi Asam Amino pada Protein Kristal, *Analytical chemistry*, Departemen kimia, Universitas California, Riverside, California, Amerika Serikat, ACS Publication
- Tao dan Ryan R. Julian. 2014. Identifikasi Epimerisasi dan Isomerisasi Asam Amino pada Protein Kristal oleh Tandem LC-MS Yuanqi, Departemen Kimia, Universitas California, Riverside, California 92521, Amerika Serikat.
- Taylor, W.R., Alex, C.W., May, Nigel, P. Brownny & Andras Aszodi. (2001). *Protein Structure: Geometry, Topology and Classification*. Ridgeway.uniprot Londo
- Toha, Abdul Hamid A. 2001. *Biokimia: Metabolisme Biomolekul*. Bandung: Alfabeta.
- Toto Haryanto, Buono A, dan Nugroho AS, 2011, Pengembangan Hidden Semi Markov Model dengan Distribusi Durasi Empiris untuk Prediksi Struktur Sekunder Protein, Thesis, Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Toto Haryanto, dan Budiman Surya Ardi, 2015, Penggunaan Fitur Kimia fisik dan Posisi Atom untuk Prediksi Struktur Sekunder Protein, Penggunaan fitur kimiafisik dan posisi atom untuk prediksi struktur sekunder protein, vol 1, no, 2
- Wibowo L, 2009, Deskripsi dan Macam-Macam Tingkatan Struktur Protein,
- Winarno FG, 1997, *Kimia Pangan dan Gizi*, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Gramedia

PROFIL PENULIS

Apt. Warsidah, S.Si. M.Si.

Penulis lahir di Kalumpang, 12 April 1973. Penulis ini merupakan lulusan S-1 dan S-2 dari Universitas Hasanudin, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Studi Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Ilmu Kelautan, FMIPA Untan, dengan kajian bidang utama adalah pemanfaatan sumber daya hayati laut dalam bidang pangan, pertanian dan kesehatan. Sebagai dosen, penulis ini juga menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala laboratorium di Jurusan Ilmu Kelautan dari 2021 hingga saat ini. Beberapa buku yang telah disusun antara lain **Fermentasi Kekekangan Ale-ale Khas Kalimantan Barat, Meretrix sp. : Bioekologi, Mikrobiologi Kimiawi, Pemanfaatan sebagai Bahan Pangan Fungsional dan Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Rumput Laut**. Book Chapter Biokimia Farmasi merupakan buku keempat, yang ditulis bersama dengan dosen-dosen dan praktisi kesehatan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Semoga buku ini menjadi bacaan bermanfaat dan rujukan bagi mahasiswa atau siapa saja yang membutuhkan.





BAB 6



ENZIM

(Gustria Ernis, S.Pd., M.Si)

Universitas Bengkulu; Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota

Bengkulu, (0736) 20919, 21170

Email: gustriaernis@unib.ac.id

A. DEFINISI DAN SIFAT ENZIM

1. Definisi dan Aspek Umum Enzim

Reaksi biokimia yang sangat beragam membentuk sistem biologis. Tanpa katalis, reaksi-reaksi ini akan sangat lambat untuk menghasilkan produk metabolisme pada waktu yang tepat. Enzim melakukan banyak hal dalam sistem biologis (Ischak, salami, botutihe biokimia dasar). Enzim adalah katalis, atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan hadirnya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan mengalami perubahan yang dipercepat menjadi molekul lain yang disebut produk. Enzim adalah biomolekul berbentuk bulat (globular) yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida.

Suatu reaksi yang di katalisis oleh enzim akan memiliki energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Salah satu keunggulan enzim sebagai biokatalisator adalah spesifitasnya yang tinggi, kemampuan mereka untuk mempercepat reaksi kimia tanpa menciptakan produk samping, produktivitasnya yang tinggi, dan kemampuan mereka untuk menghasilkan produk akhir yang


tidak terkontaminasi, yang mengurangi biaya purifikasi dan dampak negatif terhadap lingkungan (Chaplin and Bucke 1990).

Komponen enzim ada dua, yaitu protein atau disebut dengan Apoenzim, dan non-protein atau disebut gugus prostetik. Beberapa enzim hanya membutuhkan residu asam aminonya untuk berfungsi. Enzim lainnya membutuhkan kofaktor, yaitu satu atau lebih ion inorganik seperti Fe^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} , atau Zn^{2+} (Tabel 1), atau molekul organik kompleks atau molekul metaloorganik. Koenzyme berfungsi sebagai pembawa sementara gugus fungsi atau elektron tertentu. Definisi tentang protein enzim ini dapat dilihat dari Gambar 6. 1.

Tabel 6.1. Beberapa Kofaktor Ion logam pada Enzim (Azhar 2016).

Ion	Enzim
Cu^{2+}	<i>Cytochrome oxidase</i>
Fe^{2+} atau Fe^{3+}	<i>Cytochrome oxidase, catalase, peroxidase</i>
K^{+}	<i>Pyruvate kinase</i>
Mg^{2+}	<i>Hexokinase, glucose 6-phosphatase, pyruvate kinase</i>
Mn^{2+}	<i>Arginase, Ribonucleotide reductase</i>
Mo	<i>Dinitrogenase</i>
Ni^{2+}	<i>Urease</i>
Se	<i>Glutathione peroxidase</i>
Zn^{2+}	<i>Carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase, carboxypeptidase A dan B</i>


Gambar 6. 1. Defenisi protein enzim secara sistematis



Sumber: (Palmer 1991)

Gugus prostetik merupakan gugus bukan protein yang terikat kuat pada protein, sehingga sukar terurai dalam larutan, sedangkan kofaktor merupakan gugus yang tidak begitu kuat terikat pada protein, sehingga mudah dipisahkan secara dialisis. gugus prostetik maupun koenzim adalah bagian enzim yang memungkinkan enzim dapat bekerja terhadap substrat, yaitu reaktan dari suatu reaksi. Beberapa enzim hanya dapat berfungsi jika mereka memiliki coenzyme dan satu atau lebih cofactor. Gugus prostetik adalah ikatan coenzyme atau cofactor yang kuat atau bahkan kovalen pada protein enzim. Holoenzim adalah enzim aktif yang terikat dengan coenzyme dan atau cofactornya (Gambar 6. 2).

Gambar 6. 2. Enzim dengan kofaktor dan koenzim



(sumber: (Azhar 2016)

2. Sifat dan Karakteristik Enzim

Enzim adalah senyawa yang memiliki struktur protein baik murni maupun terikat pada gugus non-protein. Mereka memiliki sifat yang sama dengan protein lain, seperti: enzim dapat terdenaturasi oleh panas; dapat terpresipitaskan atau terendapkan oleh senyawa organik cair seperti etanol dan aseton, serta oleh garam organik berkonsentrasi tinggi seperti ammonium sulfat; dan mereka memiliki bobot molekul yang besar sehingga tidak dapat melewati membran semipermeabel.

Enzim mempunyai tenaga katalitik yang luar biasa. Daya katalitik enzim sering jauh lebih besar daripada katalis inorganik atau katalis sintetik. Enzim mempunyai derajat kespesifikan yang tinggi untuk substratnya. Enzim mempercepat reaksi dengan dahsyat dan enzim berfungsi dalam larutan berair pada kondisi pH dan suhu tertentu. Sedikit katalis nonbiologi yang mempunyai semua sifat ini (Azhar 2016)

Sifat umum enzim adalah sebagai berikut:

- a. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Ini berarti bahwa enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mengubah keseimbangan reaksi, tetapi hanya meningkatkan laju reaksi.
- b. Enzim bekerja secara spesifik, sehingga hanya mempengaruhi substrat tertentu.
- c. Karena enzim adalah protein, enzim memiliki sifat yang mirip dengan protein, seperti bekerja pada suhu ideal, biasanya suhu kamar. Karena pH yang terlalu asam atau basa kuat, serta pelarut organik, enzim akan kehilangan aktivitasnya. Panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi,

menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi dengan baik.

- d. Karena sifatnya sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah kecil.
- e. Enzim bekerja berulang kali. Enzim dapat mengontrol reaksi. Ini menunjukkan bahwa enzim tidak mengontrol arah reaksi, tetapi hanya mempercepatnya untuk mencapai keseimbangan. Enzim memiliki kemampuan untuk menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa lain atau sebaliknya, menyusun senyawa tertentu menjadi senyawa baru.
- f. Faktor lingkungan memengaruhi enzim. Suhu, pH, aktivator (pengaktif), inhibitor (penghambat), dan konsentrasi substrat adalah beberapa faktor yang memengaruhi kerja enzim.

Berbeda dengan katalis kimia (nonenzimatis), enzim adalah katalis yang unik terhadap substrat tertentu. Ini berbeda dengan katalis lain (bukan enzim) yang dapat bekerja terhadap berbagai macam reaksi. Untuk ilustrasi, enzim urease hanya berinteraksi dengan urea sebagai substratnya. Namun, ada enzim yang bekerja dengan lebih dari satu substrat, tetapi tetap memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, enzim esterase memiliki kemampuan untuk menghidrolisis beberapa ester asam lemak, tetapi tidak dapat menghidrolisis jenis ester lain.

Dibandingkan dengan katalis nonenzimatis biasa, enzim berbeda dalam beberapa hal berikut:

- a. Reaksi yang dikatalisis enzim terjadi pada kondisi yang lunak (mild), biasanya pada suhu di bawah 100 °C dan pH sekitar netral.
- b. Reaksi ini juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi, 10^6 hingga 10^{12} kali lebih cepat daripada reaksi yang tidak

dikatalisis

- c. Enzim memiliki spesifisitas yang tinggi terhadap substrat dan produknya
- d. Enzim mempunyai kemampuan dalam regulasi, salah satunya yaitu modifikasi kovalen dan kontrol alosterik sebagai mekanisme pengaturan enzim.

B. KLASIFIKASI ENZIM

Berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis, enzim dibagi menjadi enam kelas utama dan beberapa subkelas, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6. 2 di bawah ini (McMurry and Castellion 1991).

No	Kelas	Tipe Reaksi	Subkelas	Tipe Reaksi yang dikatalisis
1	Oksidoreduktase	Reaksi reduksi oksidasi (transfer elektron dari satu substrat ke substrat lainnya)	Oksidase	Oksidasi substrat
			Reduktase	Reduksi substrat
			Dehidrogenase	Pelepasan atom hidrogen (H ₂) sehingga terbentuknya ikatan rangkap
2	Transferase	Transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lain	Transaminase	Transfer gugus amino antara substrat
			Kinase	Transfer gugus Fosfat antara substrat
3	Hidrolase	Reaksi hidrolisis (pemecahan ikatan karena adanya air)	Lipase	Hidrolisis gugus ester dalam lipid
			Protease	Hidrolisis gugus amida dalam protein
			Nuklease	Hidrolisis gugus fosfat dalam lasam nukleat
4	Liase	Penambahan gugus fungsi pada ikatan	Dehidrase	Kehilangan air
			Dekarboksilase	Kehilangan karbondioksida

		rangkap (adisi) atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi		
5	Isomerase	Reaksi isomerisasi (penyusunan ulang atom-atom substrat)	Epimerase	Isomerisasi pada pusat kiral substrat
6	Ligase	Pembentukan ikatan C-C, C-S, C-O, dan C-N diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP	Sintetase	Pembentukan ikatan baru dengan melibatkan ATP
			Karboksilase	Pembentukan ikatan baru antara substrat dan CO ₂ dengan melibatkan ATP


C. PROSES REGULASI AKTIVITAS ENZIM

Dalam reaksi yang dikatalisis enzim, enzim membentuk kompleks dengan substrat. Hubungan atau kontak antara enzim dan substrat diperlukan agar enzim dapat bekerja pada suatu zat atau substrat. Suatu enzim memiliki ukuran yang lebih besar daripada substrat. Akibatnya, tidak setiap komponen enzim dapat berhubungan dengan substrat. Enzim diikat oleh substrat melalui ikatan nonkovalen pada sisi aktif enzim. Asam amino-asam amino di sisi aktif enzim memiliki gugus fungsional khusus yang berfungsi untuk mengikat molekul substrat. Sisi aktif ini juga disebut sebagai sisi katalitik atau sisi pengikatan substrat.

Hubungan hanya dapat terjadi apabila sisi aktif memiliki ruang

yang cukup untuk menyimpan substrat. Substrat yang memiliki bentuk atau struktur lain tidak dapat berikatan dengan gugus-gugus tertentu pada sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat berfungsi terhadap substrat tersebut. Ini memberikan penjelasan tentang mengapa setiap enzim memiliki sifat unik terhadap substrat tertentu. Kompleks enzim-substrat terbentuk karena hubungan atau kontak enzim dengan substrat. Kemampuan katalis enzim dimulai dengan pembentukan transition state dalam kompleks enzim substrat. Substrat terikat pada sisi aktif enzim, area tertentu seperti pada Gambar 6. 3:

Gambar 6. 3. Kompleks Enzim-substrat/ sisi aktif




sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim> diakses Desember 1, 2023)

Model sisi aktif pada kompleks Enzim-Substrat terdiri dari dua, yaitu:

1. **Lock and Key (Kunci dan Anak Kunci)**

Situs aktif enzim dibuat dengan cara yang tepat untuk menampung substrat khusus. Fischer mengemukakan model kunci dan anak kunci pada tahun 1890, bahwa struktur enzim dan substratnya mempengaruhi kespesifikan enzim. Kunci selalu berpasangan dengan anak kuncinya karena bentuk molekul substrat mewakili situs pengikatan enzim (Gambar 6. 4).


Gambar 6. 4. Model *lock and key*



(Sumber: (Wahyuni 2017))

Menurut model ini, struktur enzim dan substrat tampaknya sangat kaku. Jika substrat berbentuk kotak, situs pengikat pada enzim harus berbentuk kotak; jika tidak, substrat tidak dapat masuk dan berikatan dengan enzim. Sisi aktif pada enzim yang belum terikat komplementer dengan bentuk substrat (Gambar 6. 5).

Gambar 6. 5. Penggunaan model *lock and key* untuk mengikat substrat pada lokasi sisi aktif enzim




(Sumber: (Puspitaningrum and Adhiyanto 2016))

2. ***Induced Fit* (Penyesuaian)**

Teori yang dikenal sebagai penyesuaian, atau *induced-fit*, pertama kali diusulkan oleh Daniel Koshland pada tahun 1958. Karena sisi aktif enzim bukan struktur yang kaku, model ini luwes. Pengikatan substrat dapat menyebabkan perubahan konformasi sisi aktif hingga berada di tempat yang tepat. agar substrat dan enzim membentuk ikatan (Gambar 6. 6).


Gambar 6. 6 Model *Induced-fit*



Sumber (Wahyuni 2017)

Menurut teori ini, sebelum substrat menempel pada situs aktif enzim, struktur atau konformasi tiga dimensi substrat tidak sama dengan bentuk situs aktif enzim, tetapi situs aktif enzim fleksibel (Gambar 6. 7). Dengan ikatan substrat pada enzim, perubahan konformasi enzim terjadi.

Gambar 6. 7. Penggunaan model *Induced-fit* untuk mengikat substrat pada lokasi sisi aktif enzim




(Sumber: (Puspitaningrum and Adhiyanto 2016)

D. KINETIKA ENZIM

Studi kinetika enzim dimulai pada tahun 1902 ketika Adrian Brown mempelajari enzim ragi (yeast) untuk mengkatalisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Studi ini juga dapat digunakan untuk menghitung seberapa efisien suatu enzim bekerja. Hasil akhir

menunjukkan bahwa konsentrasi sukrosa lebih tinggi daripada enzim, dan kecepatan reaksi tidak lagi bergantung pada konsentrasi sukrosa. Ini menunjukkan bahwa enzim tidak dapat lagi menampung substrat karena telah "jenuh" dengan substrat.


Pada tahun 1913, Leonor Michaelis dan Mauden Menten mengusulkan bahwa dalam reaksi enzimatik, kompleks enzim-substrat (ES) pertama kali terbentuk. Kemudian, kompleks ES ini akan membentuk produk reaksi dan enzim kembali. Michaelis dan Menten menemukan bahwa kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi kompleks enzim-substrat (ES). Karena itu, jika konsentrasi ES bergantung pada konsentrasi substrat (s), penambahan kecepatan reaksi yang digambarkan akan berbentuk garis lurus. Oleh karena itu, reaksi dengan enzim biasanya digambarkan sebagai berikut:



Dengan k_1 , k_2 , dan k_3 adalah tetapan kecepatan reaksi pembentukan kompleks ES, tetapan (konstanta) kecepatan reaksi pembentukan kembali E dan S, dan tetapan (konstanta) kecepatan reaksi penguraian kompleks ES menjadi enzim dan hasil reaksi.

Kita dapat membuat diagram yang menghubungkan kecepatan reaksi dengan konsentrasi substrat untuk melihat bagaimana reaksi dikatalisis oleh enzim. Dari diagram terlihat bahwa laju reaksi akan bernilai nol saat substrat tidak ada, dan laju reaksi akan bertambah seiring dengan peningkatan jumlah substrat. Namun, semakin banyak substrat yang ditambahkan akan membuat laju reaksi mencapai puncaknya.

Gambar 6. 8. Kurva penenuhan Michaelis–Menten pada reaksi enzim menunjukkan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi substrat



(Sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim> diakses Desember 2, 2023)

Untuk reaksi terkatalisis enzim pada konsentrasi enzim konstan, Gambar 8 menunjukkan laju reaksi dibandingkan dengan konsentrasi substrat yang dituliskan dalam persamaan Michaelis–Menten seperti berikut:

$$v = \frac{d[P]}{dt} = \frac{V_{max}[S]}{K_M + [S]}$$

Laju reaksi dipengaruhi oleh larutan dan konsentrasi substrat. Aktivitas enzim akan dihilangkan dalam kondisi yang dapat menyebabkan denaturasi protein, seperti suhu tinggi, konsentrasi garam yang tinggi, dan nilai pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sementara peningkatan konsentrasi substrat biasanya mengarah pada peningkatan aktivitasnya. Konsentrasi substrat harus ditingkatkan sampai laju pembentukan produk yang terpantau menjadi konstan untuk memaksimalkan kelajuan reaksi enzimatik. Kurva kejenuhan di


bawah menunjukkan hal ini. Kejenuhan terjadi karena semakin banyak enzim bebas yang diubah menjadi kompleks substrat-enzim ES seiring dengan konsentrasi substrat.

Pada kelajuan maksimum (V_{max}), semua tapak aktif enzim akan terikat dengan substrat, dan jumlah kompleks ES sama dengan jumlah enzim total. V_{max} , bagaimanapun, hanyalah satu konstanta kinetika enzim. Jumlah substrat yang dibutuhkan untuk mencapai kelajuan reaksi tertentu juga sangat penting. Konstanta Michaelis-Menten (K_m), yang merupakan konsentrasi substrat yang diperlukan oleh suatu enzim untuk mencapai setengah kecepatannya, adalah cara untuk menggambarkan hal ini. Nilai K_m yang berbeda-beda untuk suatu substrat dimiliki oleh setiap enzim, yang menunjukkan seberapa kuat pengikatan substrat ke enzim.

Sangat sulit untuk menentukan harga K_M secara tepat dari grafik Michaelis-Menten. Oleh karena itu, untuk menganalisis data yang sudah ada, digunakan teknik tambahan, yaitu grafik Lineweaver-Burk (Gambar 9). Suatu garis lurus dengan slope K_m/V_{max} dan intercept sumbu y $1/V_{max}$ digunakan sebagai grafik hubungan $1/v$ dan $1/[S]$.

$$\frac{1}{V} = \left(\frac{K_M}{V_{MAKS}} \right) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{MAKS}} \quad \text{Persamaan Lineweaver-Burk}$$

Gambar 6. 9. grafik Lineweaver-Burk



Untuk mendapatkan reaksi yang lebih terkendali dan murni yang melibatkan interaksi enzim-substrat, berbagai faktor yang menentukan laju aktivitas enzim (seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, pH, dan suhu) harus dipelajari dengan cermat dan diatur kondisinya. Pola kinetika senyawa bioaktif dapat diamati untuk mengetahui apakah ia berfungsi sebagai inhibitor atau aktivator. Untuk mengetahui bagaimana pola kinetikanya berubah terhadap lingkungan tempat reaksi enzim berlangsung, senyawa bioaktif ditambahkan dalam konsentrasi tertentu, dan pola kinetika yang dihasilkan dibandingkan dengan pola kinetika dasar (hanya interaksi enzim-substrat) (Price & Stevens 1996).


Pola kinetika enzim yang dihasilkan oleh inhibitor atau aktivator dapat diidentifikasi dengan menggunakan grafik, seperti persamaan Michaelis-Menten atau persamaan Lineweaver-Burk. Inhibitor enzim adalah zat yang mengubah tindakan katalis enzim sehingga aktivitas enzim menjadi lebih lambat atau turun, atau bahkan dapat menghentikan kerja katalis atau enzim. Pola kinetika enzim yang dihasilkan berbeda-beda tergantung pada mekanisme reaksi yang terjadi. Inhibisi kompetitif, nonkompetitif, atau unkompetitif dapat

menjadi bentuk mekanisme inhibisi (Voet et al., 2001).

E. PROSES INHIBISI ENZIM

Inhibitor adalah molekul yang dapat memperlambat atau mengurangi aktivitas enzim. Molekul ini dapat berupa pengawet makanan, obat-obatan, atau antibiotik. Inhibitor enzim dapat terlibat pada jalur metabolik dan mengganggu aktivitas biokimia atau biologi. Sebaliknya, dalam pengobatan, inhibitor digunakan untuk mengontrol aktivitas enzim. Antibiotik digunakan untuk mengeliminasi atau mengurangi aktivitas enzim tertentu. Inhibitor enzim juga dapat berikatan dengan sisi aktif enzim dan mengurangi aktivitas enzim tersebut. Proses inhibisi enzim dapat dilihat pada Gambar 6.10.

Gambar 6.10. Proses terjadinya a). reaksi dengan katalisis enzim, dan b). proses inhibisi enzim oleh inhibitor



(sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim> diakses desember 3 2023)


Inhibitor secara langsung mengurangi laju pertumbuhan maksimum (V_{maks}) atau meningkatkan konstanta Michaelis-Menten

(K_m). Inhibisi enzim dibagi menjadi dua jenis: inhibisi reversibel dan irreversibel. Inhibisi irreversibel terjadi ketika molekul memasuki sisi aktif enzim dan membentuk ikatan kovalen dengannya, yang membuat sisi aktif enzim inaktif secara irreversibel. Inhibisi reversibel terbagi menjadi tiga kategori:

1. Inhibisi Kompetitif


Inhibisi kompetitif terjadi di bagian sisi pengikatan (binding site) enzim. Ini terjadi karena inhibitor kompetitif memiliki struktur yang hampir sama atau mirip dengan substrat enzim, jadi substrat tidak dapat berinteraksi dengan enzim jika inhibitor terlebih dahulu berikatan dengan enzim. Untuk menghilangkan efek inhibisi dari inhibitor kompetitif, konsentrasi substrat harus ditambahkan (jumlah). Akibatnya, proses penjumlahan enzim oleh substrat menjadi lebih lambat, yang mengakibatkan peningkatan nilai K_m akhir setelah inhibisi. Namun, karena ES tidak terganggu, nilai V_{max} tidak berubah.

Gambar 6. 11. Reaksi Inhibitor bersaing dengan substrat beserta grafik Lineaweaver-Burk untuk inhibisi kompetitif.



Contoh kasus menggunakan ekstrak daun salam (*S. polyanthum*) sebagai inhibitor enzim xanthine oksidase dalam menghasilkan asam urat, dapat dilihat grafik Lineaweaver-Burknya seperti pada Gambar 6.12 yang menunjukkan terjadinya inhibisi kompetitif:

Gambar 6. 12. Kinetika inhibisi kompetitif dari *S. polyanthum* terhadap Xantina oksidase dengan metode Lineaweaver-Burk




(Sumber: Ernis, Saprudin, and Darusman 2018)

2. Inhibisi Non-Kompetitif

Inhibisi non-kompetitif terjadi ketika substrat belum atau sudah terikat pada sisi aktif enzim. Inhibitor jenis ini tidak terikat dan tidak mengganggu sisi aktif enzim; sebaliknya, mereka melekat pada sisi selain sisi aktif atau ketika enzim membentuk kompleks dengan substrat. Karena sifat inhibitor tidak mempengaruhi sisi aktif enzim, nilai K_m tidak berubah, tetapi V_{max} menjadi lebih kecil.

Gambar 6. 13. Reaksi yang melibatkan Inhibitor nonkompetitif dengan substrat beserta grafik Lineaweaver-Burk untuk inhibisi non-kompetitif.




3. Inhibisi Un-Kompetitif

Inhibisi unkompetitif terjadi pada enzim yang telah terikat dengan substrat (kompleks ES). Ini dapat terjadi karena perubahan konformasi pada enzim yang menyebabkan sisi pengikatan untuk inhibitor, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14. Namun, inhibitor unkompetitif tidak dapat terikat pada enzim bebas.

Melalui penambahan senyawa tertentu yang dapat berinteraksi dengan inhibitor sehingga inhibitor tidak dapat membentuk kompleks ESI, perlu ditambahkan konsentrasi substrat untuk mengatasi efek inhibisi inhibitor ini. Semakin banyak konsentrasi substrat yang ditambahkan, semakin banyak kompleks ESI yang dapat dibentuk, sehingga enzim lebih cepat jenuh oleh substrat ketika diinhibisi, akibatnya nilai K_m akhir setelah inhibisi akan menjadi lebih kecil dari K_m sebelum inhibisi, demikian juga dengan nilai V_{max} .

Gambar 6.14. Reaksi yang melibatkan Inhibitor unkompetitif dengan substrat beserta grafik Lineaweaver-Burk untuk inhibisi non-kompetitif.



REFERENCE

- Azhar, Minda. 2016. *Biomolekul Sel Karbohidrat, Protein Dan Ezim*. Vol. 53. Padang: UNP Press.
- Chaplin, Martin F. and Christopher Bucke. 1990. *Enzyme Technology*. Firts Edit. Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press.
- Ernis, G., D. Saprudin, and L. K. Darusman. 2018. "Magnetite Nanospheres as Carbon Paste Electrode Modifier for Xanthine Biosensor." Pp. 0–13 in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 187.
- McMurry, J. and M. Castellion. 1991. *Fundamental of General Organic and Biological Chemistry*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Palmer, Trevor. 1991. *Understanding Enzymes*. 3rd editio. England: Ellis Horwood Limited.
- Puspitaningrum, Rini and Chris Adhiyanto. 2016. *Enzim Dan Pemanfaatannya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, Sri. 2017. *Biokimia Enzim Dan Karbohidrat*. Lhokseumawe: Unimal Press.

PROFIL PENULIS

Gustria Ernis, S.Pd., M.Si.

Penulis Lahir di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 29 Agustus 1990 dari Pasangan Bapak Israk dan Ibu Ernawati Khairat, dan sudah menikah pada tahun 2017 dengan Perkasa Arian yang berlatar belakang Pendidikan S2 Biokimia IPB.

Lulus Pendidikan S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Bengkulu (UNIB) pada tahun 2013. Lulus Pendidikan S2 Ilmu Kimia FMIPA Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2016 dengan Tesis berkaitan dengan Kinetika dan Inhibisi Enzim. Kegiatan mengajar dimulai sejak menjadi mahasiswa S1 sebagai asisten praktikum (2010-2013), Asisten dosen Agroekoteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Andalas (2017-2018), dan Dosen D3 Laboratorium Sains Fakultas MIPA Universitas Bengkulu (2019-sekarang) dengan jabatan Fungsional Lektor. Saat ini berkesempatan mengikuti tugas belajar di Program studi S3 Ilmu Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia dengan dibiayai Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dari Kemendikbudikti tahun 2023.



Email Penulis: gustriaernis@unib.ac.id



BAB 7



METABOLISME KARBOHIDRAT

(Dr. Sofi Siti Shofiyah.)

Universitas OSO; Jl. Untung Suropati No. 99 Kota Pontianak

78113

Email: sofi@oso.ac.id

Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi makhluk hidup dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di alam. Karbohidrat terdiri atas tiga unsur utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Serangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam sel untuk mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel disebut dengan metabolisme karbohidrat.

Fungsi dan peran karbohidrat dalam organisme yang paling utama adalah sebagai sumber energi. Glukosa, monosakarida utama, merupakan sumber energi utama dalam metabolisme seluler. Selain itu, karbohidrat juga memiliki fungsi sebagai penyimpanan energi. Polisakarida seperti amilum pada tumbuhan dan glikogen pada hewan berfungsi sebagai cadangan energi yang dapat diubah menjadi glukosa saat diperlukan. Pada manusia, glikogen disimpan di hati dan otot manusia sebagai bentuk penyimpanan energi yang dapat segera diakses saat dibutuhkan.

Tidak hanya terkait dengan fungsinya sebagai sumber energi, karbohidrat dapat berfungsi sebagai pembangun struktur sel, seperti selulosa, polisakarida utama pada dinding sel tumbuhan, serta kitin yang ditemukan pada dinding sel jamur dan eksoskeleton artropoda.

Fungsi karbohidrat lainnya adalah sebagai komponen utama dalam penyusunan struktur asam nukelat DNA dan RNA, dan juga memiliki peran dalam interaksi seluler.

Pada bab ini, pembahasan akan difokuskan pada metabolisme karbohidrat yang memiliki peran sebagai sumber energi dan penyimpanan energi sebagai bahan bangunan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme. Pembahasan metabolisme karbohidrat akan dimulai dari jalur utama metabolisme karbohidrat, regulasi dari metabolisme karbohidrat, serta pembentukan glikogen sebagai penyimpanan energi.

A. JALUR UTAMA METABOLISME KARBOHIDRAT

1. Glikolisis

Metabolisme karbohidrat terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah suatu jalur metabolik yang terjadi di dalam sel untuk mengubah glukosa menjadi piruvat. Proses ini merupakan langkah awal dalam metabolisme karbohidrat dan menghasilkan sejumlah kecil energi dan prekursor metabolik untuk jalur-jalur metabolik lainnya.

Tahap persiapan diawali dengan fase pengaktifan, yaitu glukosa diubah menjadi glukosa-6-fosfat melalui reaksi fosforilasi yang dikatalisis oleh enzim heksokinase. Proses ini memerlukan ATP dan menghasilkan ADP. Kemudian, dilanjutkan dengan fase isomerisasi, yaitu mengubah glukosa-6-fosfat menjadi fruktosa-6-fosfat melalui reaksi isomerisasi yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksoisomerase.


Fruktosa-6-fosfat dipecah menjadi dua molekul tiga karbon, yaitu dihidroaseton fosfat dan gliseroldehid-3-fosfat melalui reaksi

aldolase, dapat disebut sebagai tahap pemecahan, atau fase klivasi. Dihidroaseton fosfat mengalami fase *rearrangement* menjadi gliseroldehid-3-fosfat melalui reaksi isomerisasi.

Tahap pembentukan ATP dan NADH merupakan fase oksidatif, yaitu gliseroldehid-3-fosfat dioksidasi menjadi 1,3-bifosfogliseraldehida. Dalam prosesnya, reaksi ini menghasilkan NADH dan mereduksi NAD⁺. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliceroldehid-3-fosfat dehidrogenase. Senyawa 1,3-bifosfogliseraldehida mengalami fosforilasi melalui menjadi 3-fosfogliseraldehida melalui transfer fosfat ke ADP, menghasilkan ATP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfogliseraldehida kinase.

Tahap terakhir dalam glikolisis adalah tahap penghasilan ATP dan Piruvat. Pemindahan Fosfat dari 3-fosfogliseraldehida menjadi 2-fosfogliseraldehida melalui transfer fosfat ke ADP, menghasilkan ATP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfogliseraldehida kinase. Reaksi *dephosphorylation* terjadi untuk menghasilkan piruvat melalui reaksi dehidrasi dan dephosphorylation dari 2-fosfogliseraldehida. Reaksi ini menghasilkan NADH dan mereduksi NAD⁺. Keseluruhan tahap glikolisis dapat dilihat pada Gambar 7. 1.

Gambar 7.1 Tahap perubahan glukosa menjadi piruvat dalam proses glikolisis



Sumber:

<https://www.sciencefacts.net/wpcontent/uploads/2022/04/Glycolysis.jpg>
 Hasil metabolisme satu molekul glukosa dari proses glikolisis adalah sebanyak 2 molekul ATP diinvestasikan, dan 4 molekul ATP dihasilkan, sehingga menghasilkan keuntungan bersih 2 molekul ATP. Selain itu, dalam glikolisis dihasilkan 2 molekul NADH dan dua molekul piruvat dihasilkan sebagai produk akhir glikolisis.


Glikolisis berlangsung di sitoplasma sel dan dapat terjadi baik dalam kondisi aerobik (dengan oksigen) maupun anaerobik (tanpa oksigen). Piruvat yang dihasilkan selama glikolisis dapat memasuki siklus asam sitrat jika oksigen tersedia atau mengalami fermentasi jika oksigen tidak cukup. Glikolisis adalah jalur sentral dalam metabolisme karbohidrat dan berfungsi untuk menyediakan energi dan prekursor metabolik untuk sel.

2. Konversi Piruvat menjadi Asetil-KoA

Proses konversi piruvat menjadi asetil-KoA merupakan tahap penting dalam metabolisme karbohidrat dan menyambung antara glikolisis dan siklus Krebs. Tahap ini disebut juga sebagai "*link reaction*" atau "*pyruvate decarboxylation*." Reaksi ini menghubungkan glikolisis dengan siklus Krebs karena asetil-KoA yang dihasilkan akan memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan lebih banyak molekul pembawa energi (NADH dan FADH₂) dan ATP melalui fosforilasi substrat dan fosforilasi oksidatif, sehingga dapat memasok energi dan prekursor metabolik untuk sel-sel dalam tubuh.

Proses ini terjadi di mitokondria sel eukariotik, tepatnya di dalam matriks mitokondria. Piruvat, yang dihasilkan dari glikolisis di sitoplasma sel masuk ke dalam mitokondria untuk mengalami konversi menjadi asetil-KoA. Piruvat yang masuk ke dalam matriks mitokondria mengalami dekarboksilasi, yaitu pelepasan sebuah gugus karboksil dalam bentuk CO₂. Enzim piruvat dehidrogenase bertanggung jawab atas reaksi ini. Gugus karboksil yang dilepaskan menghasilkan CO₂. Sisa molekul yang dihasilkan setelah dekarboksilasi disebut gugus asetil, yang selanjutnya menghasilkan suatu senyawa yang disebut asetil-KoA. Dalam proses ini, NADH terlibat dan direduksi menjadi NAD⁺ (Gambar 2)

Gambar 7. 2 Reaksi yang terjadi pada perubahan piruvat menjadi asetil-KoA



Sumber: <https://img.brainkart.com/imagebk28/Bsvihtw.jpg>

Asetil-KoA yang dihasilkan akan memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi melalui oksidasi lengkap karbon organik. Dalam proses ini juga, menghasilkan NADH, yang berperan dalam rantai transpor elektron untuk menghasilkan ATP melalui reaksi fosforilasi oksidatif.


3. Siklus Krebs (siklus asam sitrat)

Siklus Krebs dikenal juga sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat. Siklus krebs merupakan suatu jalur metabolisme yang terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik. Siklus ini memainkan peran kunci dalam menghasilkan energi, khususnya dalam bentuk ATP, melalui oksidasi molekul organik. Siklus Krebs berperan sebagai pusat konvergensi berbagai jalur metabolisme dalam sel, memungkinkan integrasi sumber daya dan regulasi keseimbangan energi seluler.

Dalam metabolisme karbohidrat, siklus Krebs dimulai ketika asetil-koenzim A (asetil-KoA) yang berasal dari piruvat hasil glikolisis, masuk ke dalam siklus. Asetil-KoA bergabung dengan oksaloasetat, membentuk senyawa antara, sitrat. Selama siklus, asetil-KoA dan oksaloasetat mengalami serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan beberapa senyawa antara dan memulihkan oksaloasetat (Gambar 3). Reaksi-reaksi ini melibatkan dehidrogenasi, dekarboksilasi, dan reaksi

transfer gugus fungsional. Selama proses siklus krebs, dihasilkan beberapa senyawa antara, seperti sitrat, isositrat, α -ketoglutarat, suksinil-KoA, suksinat, fumarat, malat, dan kembali ke oksaloasetat. Setiap putaran siklus menghasilkan satu molekul ATP, tiga molekul NADH, satu molekul FADH₂, dan dua molekul CO₂.

Gambar 7. 3 Siklus Krebs (Siklus Asam Sitrat)



(Sumber: *Frontiers in Bioscience* 8, s1084-1106, September 1, 2003, doi: 10.2741/1119)

Dalam siklus Krebs, terdapat tahap dehidrogenasi yang signifikan terjadi selama siklus, yaitu pada α -ketoglutarat dan suksinil-KoA. Reaksi ini menghasilkan NADH yang akan digunakan dalam rantai transpor elektron untuk menghasilkan ATP. Oksaloasetat yang awalnya bergabung dengan asetil-KoA dipulihkan di akhir siklus, sehingga siklus Krebs dapat berulang. Oksaloasetat yang dihasilkan kemudian dapat bergabung dengan asetil-KoA baru untuk memulai siklus berikutnya.


Siklus Krebs menghasilkan molekul yang dapat memasok energi ke rantai transpor elektron dan fosforilasi oksidatif. Siklus Krebs terintegrasi dengan berbagai jalur metabolik, termasuk glikolisis, oksidasi asam lemak, dan glukoneogenesis.

4. Rantai Transpor Elektron dan Fosforilatif Oksidatif

Rantai transpor elektron dan fosforilatif oksidatif merupakan dua tahap utama dalam produksi ATP selama metabolisme karbohidrat di mitokondria, setelah siklus Krebs. Kedua proses ini merupakan tahap-tahap kunci dalam produksi ATP selama respirasi aerobik. Secara garis besar, rantai transpor elektron menghasilkan gradien proton dan fosforilatif oksidatif menggunakan energi dari gradien tersebut untuk menghasilkan ATP. Proses ini mengonversi energi kimia yang tersimpan dalam NADH dan FADH₂ menjadi ATP, yang merupakan sumber utama energi seluler.

Rantai transpor elektron atau dikenal sebagai respirasi aerobik terjadi di membran dalam mitokondria. Serangkaian kompleks protein membentuk rantai transpor elektron, termasuk kompleks I, kompleks II, kompleks III, dan kompleks IV (Gambar 4). Molekul pemindah elektron, seperti NADH dan FADH₂, mentransfer elektron melalui kompleks-kompleks ini. Selama transfer elektron, proton (H⁺) dipompa ke luar membran mitokondria, menciptakan gradien elektrokimia.

Gambar 7. 4 Rantai transpor elektron dan fosforilatif oksidatif



(Sumber: Expert Opinion on Orphan Drugs 9(3), doi: 10.1080/21678707.2021.1932459)

Proses dilanjutkan ke tahap fosforilatif oksidatif yang terjadi di membran dalam mitokondria. Fosforilatif oksidatif menghasilkan ATP melalui pemompaan proton dan aliran balik proton melalui ATP sintase. ATP sintase adalah protein yang berfungsi sebagai enzim yang memfasilitasi sintesis ATP. Gradien proton yang telah terbentuk selama rantai transpor elektron digunakan untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk membentuk ATP pada ATP sintase dengan memanfaatkan potensial energi dari gradien proton. Pemompaan proton selama rantai transpor elektron menciptakan kondisi yang mendukung aliran proton kembali ke mitokondria, memungkinkan ATP sintase menghasilkan ATP. Proton yang dipompa keluar selama rantai transpor elektron kembali ke dalam mitokondria melalui ATP sintase. Energi dari aliran proton ini digunakan untuk menggabungkan ADP dan fosfat menjadi ATP melalui fosforilasi


Dengan adanya rantai transpor elektron dan fosforilatif oksidatif, sel dapat mengoptimalkan efisiensi energi seluler. Proses ini membuktikan bahwa respirasi aerobik adalah mekanisme yang sangat efektif untuk mendapatkan energi dari substrat organik, seperti karbohidrat, dan menyimpannya dalam bentuk ATP yang dapat digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai fungsi biologisnya.

B. REGULASI METABOLISME KARBOHIDRAT

Hormon-hormon tertentu memainkan peran kunci dalam pengaturan keseimbangan glukosa dalam tubuh. Dua hormon utama yang terlibat dalam regulasi kadar glukosa darah adalah insulin dan glukagon, yang diproduksi oleh pankreas. Pada individu sehat, glukagon dan insulin bekerja sama untuk mempertahankan kadar

glukosa dalam darah normal (Gambar 5). Selama hiperglikemia, sel beta (b) pankreas melepaskan insulin, yang merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel yang memakan energi dan pembentukan glikogen di hati. Selama hipoglikemia, sel alfa (a) pankreas melepaskan glukagon, yang merangsang glukoneogenesis dan glikogenolisis di hati dan pelepasan glukosa ke plasma darah.

Gambar 7. 5 Regulasi kadar gula darah oleh hormon insulin dan glukagon



(Sumber: Mayo Clinic Proceedings 93(2),
DOI:10.1016/j.mayocp.2017.12.003)

1. Insulin

Hormon insulin diproduksi oleh sel beta di pankreas. Insulin berperan dalam stimulasi penyerapan glukosa. Insulin akan merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel, khususnya di otot dan jaringan adiposa. Selain itu, insulin akan menstimulus proses glikolisis. Dengan adanya insulin, aktivitas enzim-enzim yang terlibat dalam glikolisis akan meningkat, sehingga terjadi proses pemecahan glukosa menjadi energi. Selain itu, insulin dapat menghambat glukoneogenesis. Insulin menghambat proses glukoneogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari substrat non-karbohidrat. Namun, insulin mendorong penyimpanan glukosa sebagai glikogen di hati dan otot.

2. Glukagon

Hormon glukagon diproduksi oleh sel alpha di pankreas. Glukagon berperan merangsang produksi dan pelepasan glukosa dari hati melalui glukoneogenesis. Dalam penguraian glikogen, glukagon merangsang penguraian glikogen menjadi glukosa di hati dan meningkatkan kadar glukosa darah. Glukagon merangsang pemecahan lemak pada proses lipolisis menjadi asam lemak dan gliserol, yang dapat diubah menjadi glukosa melalui glukoneogenesis. Glukagon merupakan hormon yang akan mengurangi penyerapan glukosa oleh sel-sel, terutama di otot dan jaringan adiposa.

C. PENYIMPANAN DAN PEMINDAHAN ENERGI DALAM BENTUK GLIKOGEN

Glikogen adalah sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai-rantai glukosa, berperan penting sebagai sumber penyimpanan dan pengaturan energi dalam tubuh manusia. Glikogen utamanya disimpan di hati dan otot, berfungsi sebagai cadangan glukosa yang dapat dilepaskan saat dibutuhkan dan memastikan keseimbangan glukosa darah.

Glikogen dalam metabolisme karbohidrat tidak hanya terbatas pada penyimpanan energi, tetapi juga terkait dengan kemampuannya untuk memelihara kadar glukosa darah yang stabil. Proses pembentukan glikogen, yang dikenal sebagai glikogenesis, melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang mengonversi glukosa menjadi glikogen, sedangkan pemecahan glikogen kembali menjadi glukosa melalui glikogenolisis. Mekanisme ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan gula darah saat berbagai kebutuhan energi

tubuh terpenuhi atau dalam keadaan puasa.

Selain sebagai sumber energi, glikogen juga terlibat dalam mekanisme pemindahan energi yang bersifat cepat dan efisien selama aktivitas fisik intensif. Otot dapat menyimpan glikogen dalam jumlah besar, serta dapat dengan cepat mengubah glikogen menjadi glukosa untuk digunakan sebagai bahan bakar saat tubuh membutuhkan energi tambahan selama latihan atau aktivitas fisik lainnya.

1. Glikogenolisis:

Glikogenolisis adalah proses penguraian glikogen menjadi glukosa. Proses ini terjadi ketika tubuh membutuhkan glukosa tambahan untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama selama periode puasa atau aktivitas fisik intensif. Glikogenolisis terjadi di hati dan otot. Penguraian glikogen diawali oleh glikogen fosforilase yang memecah ikatan glukosa di rantai glikogen melepaskan glukosa-1-fosfat, selanjutnya diubah menjadi glukosa-6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Glukosa-6-fosfat dapat diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh.


2. Glikogenesis

Glikogenesis adalah proses sintesis glikogen dari glukosa. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa dalam darah melebihi kebutuhan tubuh atau saat tubuh tidak memerlukan glukosa tambahan sebagai sumber energi. Glikogenesis terjadi di hati dan otot. Tahap glikogenesis diawali dengan fosforilasi glukosa. Glukosa diambil oleh sel dan difosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat oleh enzim heksokinase atau glukokinase. Selanjutnya, glukosa-1-fosfat diubah menjadi glukosa-1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Glukosa-1-fosfat diubah menjadi uridinil glukosa-1-fosfat (UDP-glukosa) oleh enzim uridin difosfat glukosa

fosforilase (UDP-glukosa fosforilase). Penggabungan menjadi glikogen terjadi saat UDP-glukosa ditransfer ke rantai glikogen dan diintegrasikan oleh enzim glikogen sintase untuk membentuk glikogen.

Proses glikogenolisis dan glikogenesis diatur dengan cermat oleh hormon, khususnya insulin dan glukagon. Insulin merangsang glikogenesis dan menghambat glikogenolisis, sementara glukagon merangsang glikogenolisis dan menghambat glikogenesis. Dengan demikian, keduanya berkontribusi pada pengaturan keseimbangan energi dan kadar glukosa darah dalam tubuh. Perbandingan kedua proses ini dapat dilihat pada Gambar 7. 6.

Gambar 7. 6 Perbandingan proses glicogenesis dan glicogenolisis



(sumber: May 2013Clinical Biochemistry 46(15), DOI:10.1016/j.clinbiochem.2013.04.027)

D. PENGARUH GANGGUAN METABOLISME KARBOHIDRAT TERHADAP KESEHATAN

Gangguan metabolisme karbohidrat dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan karena karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh manusia. Gangguan ini dapat berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan, termasuk penyakit metabolik dan penyakit kronis. Berikut adalah beberapa pengaruh gangguan metabolisme karbohidrat terhadap kesehatan:

1. Resistensi Insulin dan Diabetes Mellitus Tipe 2:

Resistensi insulin adalah kondisi saat sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Jika resistensi insulin berlanjut, dapat berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2, di mana tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin dengan efektif. Diabetes mellitus tipe 2 terkait dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular, gangguan mata, ginjal, dan neuropati.

2. Obesitas

Gangguan metabolisme karbohidrat dapat terkait erat dengan obesitas. Diet tinggi gula dan karbohidrat sederhana, bersama dengan ketidakseimbangan antara asupan kalori dan pembakaran energi, dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas. Obesitas meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, dan kondisi kesehatan lainnya.

3. Hipoglikemia dan Gangguan Glikogen

Gangguan dalam pemecahan glikogen atau regulasi kadar glukosa darah dapat menyebabkan hipoglikemia, yaitu kadar glukosa darah rendah. Gejala yang timbul seperti pusing, lemas, gemetar,

dan bahkan kehilangan kesadaran. Kondisi ini dapat terjadi pada orang dengan gangguan seperti penyakit hati, penyakit glikogen, atau disfungsi hormonal.

4. Penyakit Jantung dan Kesehatan Kardiovaskular

Gangguan metabolisme karbohidrat dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan kardiovaskular lainnya. Hal ini terkait dengan resistensi insulin, sehingga peningkatan kadar glukosa darah dan peradangan kronis dapat merusak pembuluh darah dan jantung.

5. Gangguan Sistem Saraf

Gangguan metabolisme karbohidrat, terutama hiperglikemia yang tidak terkontrol, dapat merusak sistem saraf. Neuropati diabetik adalah komplikasi umum diabetes yang dapat menyebabkan kerusakan saraf perifer dan gangguan fungsi saraf.

REFERENCE

- Caudarella, R., Vescini, F., Buffa, A., & Stefoni, S. (2003). Citrate and mineral metabolism: kidney stones and bone disease. *Frontiers in Bioscience-Landmark*, 8(6), 1084-1106.
- Dashty, M. (2013). A quick look at biochemistry: carbohydrate metabolism. *Clinical biochemistry*, 46(15), 1339-1352.
- Grandy, S., Shaunik, A., & Hardy, E. J. D. M. (2016). Effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on beta-cell function in patients with type 2 diabetes. *J Diabetes Metab*, 7(643), 2.
- Nelson, D. L., Cox, M. M. & Freeman (ed.) (2004). *Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition*.
- Turton, N., Bowers, N., Khajeh, S., Hargreaves, I. P., & Heaton, R. A. (2021). Coenzyme Q10 and the exclusive club of diseases that show a limited response to treatment. *Expert Opinion on Orphan Drugs*, 9(5), 151-160.

PROFIL PENULIS

Dr. Sofi Siti Shofiyah

Penulis lahir pada tanggal 18 Desember 1988 di Bandung. Ia lulus dari Program Studi Kimia Institut Teknologi Bandung dan memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2010. Gelar Magister diperoleh pada tahun 2011 di Jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung. Pada saat program magister, penulis mendapat kesempatan untuk mengikuti program



Sandwich di *Molecular Microbiology Reseach Group, University of Groningen*, Belanda, selama 6 bulan.

Pada tahun 2012, penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Program Doktor (S3) di Program Studi Kimia FMIPA, ITB dengan Beasiswa Unggulan DIKTI 2012-2015. Penulis melaksanakan penelitian di *Aquatic Biotechnology and Bioprocess Engineering Research Group, University of Groningen* melalui program *PhD Mobility, Lotus Unlimited*, Program Erasmus Mundus selama 1 tahun (April 2015-2016). Penulis menyelesaikan pendidikan doktor pada tahun 2018. Sejak 2020 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen tetap di Universitas OSO, Kota Pontianak, pada Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Kelautan. Penulis aktif melakukan penelitian di bidang Bioteknologi Kelautan dengan mengeksplorasi potensi sumber daya alam yang berasal dari laut.

Email Penulis: sofi@oso.ac.id



BAB 8



METABOLISME LEMAK, METABOLISME LEMAK TAK JENUH, DAUR UREA, DAN APLIKASI HDL DAN LDL (Marwati, S.Farm., M.Si)

Prodi Sarjana Farmasi, Fakultas ilmu Kesehatan Universitas
Almarisah Madani, *Alamat*, Jl Perintis Kemerdekaan KM 13 Daya.
Kota/Kabupaten, Kota *Makassar*. Kode Pos, 90242. Telepon,
0411 8037222. Faximile, 0411 8037222
Email:(watimar514@gmail.com)

A. PENCERNAAN DAN TRANPOR LEMAK

1. Pencernaan Lemak

Metabolisme merupakan proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel, metabolisme disebut juga reaksi enzimatik karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Oleh karena itu, metabolisme lipida berarti proses pembakaran lipid atau lemak, ataupun proses penguraian atau perombakan lemak di dalam tubuh.

Hubungan antara proses biologi dan kimia pada makhluk hidup saling berkaitan erat. Hal tersebut dapat dilihat, misalnya dari proses pencernaan makanan dalam

tubuh yang tidak lepas dari kedua proses tersebut. Metabolisme kimiawi dalam sistem pencernaan makanan memiliki peranan penting dalam tiap prosesnya. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sistem pencernaan dapat membantu pemecahan molekul- molekul makanan menjadi molekul yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh.

Seperti halnya lemak juga merupakan sumber energi dalam proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Besarnya energi yang dihasilkan setiap gram lemak adalah lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat atau 1 gram protein. 1gram lemak menghasilkan 9 kal, sedangkan karbohidrat atau protein hanya menghasilkan 4 kal/gram.

Metabolisme lipid atau lemak dalam tubuh terjadi dalam hati /hepar dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas, dengan pH optimum 7,5 – 8 lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral, yaitu trigliserida (ester antara gliserol dengan 3 asam lemak). Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol, selain itu ada juga yang masih berupa monogliserid. Karena larut dalam air, gliserol

masuk sirkulasi portal (vena porta) menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air, maka diangkut oleh miselus (dalam bentuk besar

disebut emulsi) dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus (enterosit). Di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida (lipid) dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena kava, sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa.

Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya asam-asam lemak dan gliserol tersebut, dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas (*free fatty acid/FFA*).¹


Pencernaan lemak terutama terjadi dalam usus, karena dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase yang tidak dapat menghidrolisis lemak. Dalam usus lemak diubah dalam bentuk emulsi, sehingga dengan mudah berhubungan dengan enzim steapsin dalam cairan pankreas. Hasil akhir proses pencernaan lemak ialah asam lemak, gliserol, monogliserol, digliserida serta sisa trigliserida. Pegeluaran cairan pankreas dirangsang oleh hormon

sekretin dan pankreozimin.²

Lemak yang keluar dari lambung masuk ke usus merangsang pengeluaran hormon kolesistokinin yang pada gilirannya menyebabkan kantung empedu berkontraksi hingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Lipid lainnya yang dapat terhidrolisis oleh cairan pankreas antara lain adalah lesitin oleh fosfolipase, fosfatase, dan esterase. Ester kolesterol dan kolesterol esterase dihidrolisis menjadi kolesterol dan asam lemak.

Pada proses oksidasi 1 gram lemak dihasilkan energi sebesar 9 kkal, sedangkan 1 gram karbohidrat maupun protein hanya menghasilkan 4 kkal. Selain itu lemak mempunyai fungsi melindungi organ-organ tubuh tertentu dari kerusakan akibat benturan atau guncangan, sumber energi, dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Lemak juga merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K.³

Gambar 8.1. Proses Pencernaan Lemak



2. Tranpor Lemak

Pada umumnya 2,5 hingga 3 jam setelah orang makan, makanan yang mengandung banyak lemak, kadar lemak dalam darah akan kembali normal. Dalam darah lemak diangkut dalam tiga bentuk, yaitu berbentuk kilomikron, partikel lipoprotein yang sangat kecil, dan bentuk asam lemak yang terikat dalam albumin. Kilomikron yang menyebabkan darah tampak keruh, terdiri atas lemak 81-82%, Protein 2%, fosfolipid 7% dan kolesterol 9%. Kekeruhan akan hilang dan darah menjadi jernih kembali apabila darah telah mengalir melalui beberapa organ tubuh atau jaringan-jaringan, karena terjadinya proses hidrolisis lemak oleh enzim lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase terdapat dalam sebagian besar jaringan, terdapat dalam jumlah banyak pada jaringan adiposa dan otot jantung. Sebagian besar lemak yang diabsorpsi diangkut ke hati. Disini lemak diubah menjadi fosfolipid yang kemudian diangkut ke organ-organ maupun ke jaringan-jaringan tubuh.

Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Adapun rumus umum dari asam monokarboksilat adalah: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{COOH}$ atau $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{-COOH}^4$

B. OKSIDASI B (BETA) DAN SINTESIS ASAM LEMAK

1. Oksidasi β (Beta)

Saat tubuh dalam keadaan lapar/puasa dan tidak ada asupan makanan, tubuh mampu menggunakan lemak

sebagai sumber energi menggantikan karbohidrat. Lemak-lemak di dalam tubuh akan dipecah menjadi asam lemak yang selanjutnya akan didegradasi melalui oksidasi α (alfa) dan oksidasi β (beta). Oksidasi α akan memecah asam lemak menjadi molekul dengan 1 atom C, sedangkan oksidasi β memecah asam lemak menjadi molekul dengan 2 atom C.⁴


Oksidasi β merupakan jalur utama dari degradasi asam lemak. Langkah-langkah reaksi beta oksidasi adalah :

- a. Proses dehidrogenasi asil lemak-KoA dengan enzim asil- KoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil-KoA. Pada reaksi ini FAD sebagai koenzim direduksi menjadi FADH₂.
- b. Ikatan rangkap pada enoil-KoA dihidrasi menjadi hidroksiasil-KoA oleh enzim enoil Ko-A hidratase.
- c. Hidroksiasil Ko-A dioksidasi menjadi ketoasil-KoA menggunakan enzim β hidroksiasil-KoA dehidrogenase. Pada reaksi ini NAD sebagai koenzim direduksi menjadi NADH.
- d. Reaksi tahap akhir dimana β hidroksiasil-KoA bereaksi dengan KoA bebas menghasilkan asetil-KoA dan sisa asam lemak, reaksi tersebut karena aktivitas enzim asetil- KoA asiltransferase.
- e. Asetil-KoA akan lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil-KoA yang lain.

Oksidasi beta adalah proses pemecahan asam lemak menjadi asetil KoA, yang akan diproses lebih lanjut menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses pemecahan/degradasi asam lemak pada eukariotik terjadi di mitokondria, jadi asam lemak yang ada di sitoplasma harus dibawa ke mitokondria dulu agar dapat berlangsung oksidasi beta.

Asam lemak yang terdapat pada sitoplasma harus diaktivasi terlebih dahulu menjadi asil lemak-KoA sebelum masuk mitokondria. Asil lemak-KoA tidak dapat begitu saja menembus membran mitokondria, molekul tersebut harus dibawa oleh pembawa (karier) yang disebut karnitin. Asil lemak-KoA akan berikatan dengan karnitin membentuk asil lemak karnitin dan menembus membrane mitokondria. Di dalam mitokondria, asil lemak kornitin akan bereaksi dengan koenzim A sehingga terbentuk asil lemak KoA dan karnitin kembali. Karnitin kemudian akan keluar mitokondria untuk membawa asil lemak-KoA yang lainnya.

Gambar 8. 2. Reaksi Beta Oksidasi



Asil lemak yang telah masuk mitokondria kemudian akan menjalani Beta Oksidasi, dengan langkah-langkah sederhana sebagai berikut :

- a. Asil lemak-KoA akan diubah menjadi enoil-KoA oleh enzim asil-KoA dehydrogenase
- b. Enoil-KoA kemudian diubah menjadi hidroksiasil-KoA oleh enzim enoil-KoA hidratase
- c. Hidroksiasil-KoA diubah menjadi ketoasil-KoA oleh enzim hidroksiasil-KoA dehidrogenase
- d. Ketoasil-KoA kemudiaan akan dipotong menjadi asetil-KoA dan sisa asam lemak
- e. Asetil-KoA akan lepas dan masuk siklus krebs untuk menghasilkan energi, sedangkan sisa asam lemak akan mengulangi reaksi dari awal agar dapat menghasilkan asetil-KoA lainnya.

Setiap asam lemak akan dipecah setiap 2 atom C sehingga apabila asam palmitat (16 atom C) akan dipecah menjadi 8 asetil-KoA (masing-masing 2 atom C). Asetil-KoA kemudian dapat masuk ke dalam siklus krebs untuk menghasilkan ATP. Karena tiap jenis asam lemak memiliki atom C yang bervariasi maka jumlah asetil-KoA yang dihasilkan berbeda- beda. Sebagai contoh asam palmitat dipecah menjadi 8 molekul asetil-KoA, asam oleat menjadi 9 asetil-KoA, dan asam arakidonat menjadi 10 asetil-KoA. Molekul asetil-KoA akan masuk siklus krebs untuk menjalani serangkaian proses untuk menghasilkan ATP.⁵

B-oksidasi terdiri dari pemisahan dua atom karbon asam lemak pada suatu waktu dalam bentuk asam asetat yang selalu mengoksidasi karbon ketiga (C-3 atau karbon β) mulai dari ujung karboksil (atom yang dengan nomenklatur lama diindikasikan sebagai karbon β). Untuk alasan ini seluruh proses disebut β -oksidasi.

B-oksidasi adalah proses yang terjadi dalam matriks mitokondria dan terkait erat dengan siklus krebs (untuk oksidasi asetat lebih lanjut) dan ke rantai pernapasan (untuk reoksidasi koenzim NAD dan FAD).

Tahapan B-oksidasi; Reaksi β -oksidasi pertama adalah dehidrogenasi asam lemak oleh enzim yang disebut asil KoA dehydrogenase. Enzim ini adalah enzim FAD dependen. Enzim ini memungkinkan pembentukan ikatan rangkap antara C2 dan C3: atom hydrogen hilang berkat ikatan dehydrogenase dengan FAD yang menjadi FADH₂. Reaksi kedua terdiri dari penambahan molekul air ke ikatan rangkap (hidrasi). Reaksi ketiga adalah dehidrogenasi lain yang mengubah gugus hidroksil pada C3 menjadi gugus karbonil. Akseptor hidrogen kali ini adalah NAD. Reaksi keempat melibatkan pemisahan ketoasid dengan tiolase: asetil KoA terbentuk dan asil KoA dengan rantai yang lebih pendek (2 C kurang).

Rangkaian reaksi ini diulang sebanyak C rantai / 2 minus satu, karena di bagian bawah dua asetil KoA terbentuk. Contoh: palmitoyl KoA 16: $2-1 = 7$ kali. Asetil KoA diproduksi dengan β -oksidasi dapat memasuki siklus krebs

di mana ia mengikat oksalat asetat untuk oksidasi lebih lanjut hingga karbon dioksida dan air. Untuk setiap asetil KoA teroksidasi dalam siklus krebs 12 ATP diproduksi.⁶

2. *Sintesis Asam Lemak*

Sintesis *de novo* adalah pembentukan asam lemak (palmitat) dari asetil KoA. Asetil-KoA ini berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sintesis *de novo* terjadi terutama di dalam hati untuk kemudian sebagian besar diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk trigliserida.

Proses ini terjadi di sitosol, sedangkan asetil-KoA yang merupakan bahan dasarnya, terbentuk dari piruvat di dalam mitokondria. Asetil-KoA keluar dari mitokondria dengan jalan membentuk sitrat setelah bereaksi dengan oksaloasetat. Reaksi ini adalah sebagian dari siklus TCA (*tricarboxylic acid acid*). Sebagian dari sitrat tidak mengalami oksidasi lebih lanjut pada siklus TCA (*tricarboxylic acid acid*), tetapi dipindahkan keluar dari mitokondria oleh transporter-trikarboksilat yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Reaksi ini adalah sebagian dari siklus TCA (*tricarboxylic acid acid*). Sebagian dari sitrat tidak mengalami oksidasi lebih lanjut pada siklus TCA (*tricarboxylic acid acid*), tetapi dipindahkan keluar dari mitokondria oleh transporter-trikarboksilat yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Pada sitosol, dengan adanya ATP dan koenzim A, sitrat dipecah oleh enzim ATP-sitrat liase, membebaskan kembali asetilKoA dan oksaloasetat. Dengan demikian, asetil-KoA yang semula

terbentuk dari piruvat dalam mitokondria dipindahkan ke sitosol untuk disintesis menjadi palmitat oksaloasetat yang dibebaskan pada sitosol, dengan adanya NADH, membentuk malat. Malat kemudian oleh enzim malat menjadi piruvat dengan melepaskan hidrogen, yang ditangkap oleh NADP. NADPH yang terbentuk digunakan sebagai donor hidrogen pada sintesis *de novo*. Piruvat yang terbentuk masuk kembali ke dalam mitokondria dan dengan dikatalisis enzim piruvat karboksilase, membentuk kembali oksaloasetat yang semula dipakai untuk membentuk sitrat. Perjalanan dari sitrat- oksaloasetat-malat-piruvat- oksaloasetat dan membentuk kembali sitrat ini sebagai siklus sitrat-piruvat.

Malat yang terbentuk, selain membentuk piruvat, juga dapat memasuki mitokondria dengan bantuan transporter dikarboksilat, yang kemudian masuk ke siklus TCA (*tricarboxylic acid*) membentuk kembali oksaloasetat. Selain asetil-KoA *de novo* juga memerlukan : NADH, yang diperoleh dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim malat, dari HMP Shunt dan dari yang dikatalisis oleh enzim isositrat dehidrogenase; ATP dan CO₂ untuk sintesis malonil-KoA. CO₂ diperoleh dari bikarbonat HMP-shunt (lintasan *heksosa monophospat*) merupakan siklus pentosa fosfat tidak menghasilkan ATP (jalur alternatif untuk oksidasi glukosa), tetapi mempunyai dua fungsi utama yaitu: (1) sebagai produksi NADPH atau digunakan sintesis reduktif seperti biosintesis asam lemak dan steroid (2) sebagai penghasil ribosa pada biosintesis nukleotida serta asam lemak.

Lintasan ini bekerja aktif di dalam hati, jaringan adiposa, korteks adrenal, tiroid, eritrosit, testis, kelenjar mammae dari wanita yang menyusui, dan memiliki aktivitas yang rendah di dalam otot skelet (otot skelet mampu mensintesis ribosa 5- fosfat untuk sintesis nukleotida).⁷


Badan Keton dan Kolesterol

3. *Badan Keton*

Ketika asetil KoA melebihi kapasitas penerimaan dari siklus krebs (defisiensi oksalat asetat) ia diubah menjadi badan keton. Konversi ke glukosa melalui *gluconeogenesis* tidak dimungkinkan. Secara khusus kelebihan asetil KoA berkondensasi menjadi dua molekul asetil KoA membentuk asetil-KoA.

Mulai dari asetil-KoA, enzim menghasilkan asetoasetat (salah satu dari tiga badan keton) yang dapat diubah menjadi 3-hidroksiburat, atau dengan dekarboksilasi, dapat diubah menjadi aseton (dua badan keton lainnya). Badan keton yang terbentuk dapat digunakan oleh tubuh dalam kondisi ekstrim sebagai sumber energi alternatif.

Gambar 7.3. Tiga badan Keton; Aseton (kiri), Asetoasetat (tengah), Beta-Hidroksibutirat (kanan).



Oksidasi asam lemak pada jumlah atom karbon ganjil, jika jumlah atom karbon asam lemak ganjil pada akhirnya diperoleh molekul propionil-KoA dengan 3 atom karbon. Propionil-KoA di hadapan biotin adalah karboksilasi dan diubah menjadi D-metilmalonil-KoA. Dengan epimerase, D metilmalonil KoA akan ditransformasikan menjadi L metilmalonil KoA. L metilmalonil KoA oleh mutase dan dengan adanya *cyanocoballamin* (vitamin B12) akan ditransformasikan menjadi suksinil KoA (perantara siklus krebs).

Suksinil KoA dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai proses metabolisme seperti *gluconeogenesis*. Oleh karena itu, dari propionil KoA, tidak seperti asetil KoA, dimungkinkan untuk mensintesis glukosa.⁸

C. PEMECAHAN ASAM LEMAK

Ada beberapa jenis lemak, diantaranya adalah asam lemak, gliserida dan fosfogliserida. Asam lemak adalah asam monokarboksilat yang mempunyai rantai panjang. Asam lemak mempunyai rentang ukuran sebesar C12 hingga C24. Terdapat 2 jenis asam lemak, yakni:

1. Asam Lemak Jenuh

Asam lemak jenuh atau *saturated fatty acid* tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantainya.

2. Asam Lemak Tak Jenuh

Asam lemak tak jenuh atau *unsaturated fatty acid* mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap pada rantainya.

Lemak gliserida terdiri atas gliserida netral atau lemak netral. Maksudnya netral ialah perbandingan antara gliserol dengan asam lemak sama. Setiap gliserol memiliki ikatan 1,2, atau 3 asam lemak yang berbeda. Monogliserida, merupakan gliserol yang berikatan dengan 1 asam lemak. Digliserida, merupakan gliserol yang berikatan dengan 2 asam lemak.

Trigliserida, merupakan gliserol yang berikatan dengan 3 asam lemak. Contoh trigliserida yang banyak kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak dan lemak. Kedua trigliserida tersebut mempunyai perbedaan, yakni:

a). Lemak

Biasanya didapatkan pada hewan. Pada suhu ruang memiliki bentuk atau wujud yang padat. Lemak (*fat*)

merupakan susunan dari asam lemak jenuh.¹⁰

b). Minyak

Pada umumnya ditemukan pada tumbuhan. Pada suhu ruang memiliki wujud cair. Minyak (*oil*) merupakan susunan dari asam lemak tak jenuh.

Fosfoliserida (fosfolipid) di dalam lipid terdapat kandungan gugus fosfat. Lemak akan mengalami modifikasi pada saat terdapat fosfat yang menggantikan salah satu rantai pada asam lemak. Fosfoliserida berfungsi sebagai agen emulsi dan komponen untuk menyusun membran sel.¹¹

D. SINTESIS ASAM LEMAK

Jalan yang tampak untuk mensintesis asam lemak berbeda sekali dari Jalan oksidasinya. Senyawa yang digunakan untuk menambah panjang rantai asam lemak adalah malonil-KoA, yang disintesis dari asetil-KoA. Pada hewan tingkat tinggi sintesis asam lemak terutama terjadi dalam hati, jaringan adiposa dan dalam kelenjar susu. Di tingkat sel pembentukan asam lemak berlangsung dalam sitosol, sebaliknya pada oksidasi asam lemak terjadi pada mitokondria. Asam sitrat dan karbondioksida merupakan senyawa yang penting pada biosintesis asam lemak, kemungkinan besar kedua senyawa di atas bertindak sebagai katalisator. Setelah berakhirnya reaksi, CO₂ yang mula-mula terlibat di dalamnya, tidak terdapat dalam asam lemak yang dibentuk.

Enzim yang mengkatalisis biosintesis asam lemak merupakan enzim kompleks yang terdiri dari tujuh protein. Tahapan

Sintesis Asam Lemak sebagai berikut :

1). Pengangkutan asetil-KoA ke dalam sitoplasma

Asetil-KoA yang terdapat dalam mitokondria berasal dari tiga sumber yaitu: 1) dekarboksilasi asam piruvat, 2) degradasi asam amino dan 3) β -oksidasi asam lemak. Senyawa beratom¹¹ C dua buah diatas tidak dapat keluar menembus dinding mitokondria untuk menuju ke Sitosol tempat berlangsungnya sintesis asam lemak. Asetil-KoA itu dapat keluar dari mitokondria dengan Jalan mengubah senyawa tersebut menjadi asam sitrat atau diangkut oleh karnitin. Baik asil- karnitin maupun asam sitrat dapat menembus dinding mitokondria dan kemudian terurai lagi menjadi bagian-bagian.

2). Perubahan asetil-KoA menjadi malonil-KoA

Satuan yang memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah malonil-KoA. Pembentukan senyawa ini dikatalisis oleh enzim asetil-KoA karboksilase yang membutuhkan biotin, CO₂ dan ATP.

3). Transfer gugus asil ke kompleks enzim

Senyawa yang bertindak sebagai pemula rantai asam lemak adalah asetil-KoA. Senyawa aktif yang beratom C sebanyak dua buah ini di kait oleh ACP yang selanjutnya di tempelkan ke enzim β -ketoasil-ACP sintas.

4). Gugus malonil terikat pada ACP

Malonil-KoA, yang dibentuk melalui reaksi karboksilasi asetil-KoA, selanjutnya di kait oleh ACP. Malonil-S-KoA +HS-ACP, malonil-S-ACP+KoA-SH dengan bantuan ACP-

malonil transferase.

5). Reaksi kondensasi

Setelah kedua gugus yang akan bereaksi yaitu asetil dan malonil berada pada kompleks enzim maka terjadilah reaksi kondensasi

6) Reaksi reduksi pertama

Aseto asetil yang masih terikat erat pada kait 4'-fosfopantetein direduksi menjadi β -hidroksibutiril -S-ACP oleh enzim β - ketoasil reduktase.

7) Dehidrasi

Senyawa yang terbentuk pada reaksi reduksi di atas didehidrasi pada tahap ini. Senyawa yang terbentuk tidak jenuh pada atom C α dan β , ikatan gandanya adalah trans dan dinamakan asil-S-ACP tak jenuh.

8) Reaksi reduksi kedua

Enzim enoil-ACP reduktase (NADPH) mereduksi krotonil-S-ACP menjadi butiril-S-ACP. Senyawa yang masih tetap terkait pada kompleks melalui kait 4' fosfopantenin kemudian dipindahkan ke enzim sintase. Oleh karena itu maka ACP menjadi bebas dan dapat mengkait malonil-KoA berikutnya. Senyawa ini kemudian direaksikan dengan butiril-S-sintase dan berlangsunglah siklus sintesis yang kedua melalui urutan dan mekanisme reaksi yang sama, terjadilah siklus-siklus biosintesis berikut, sehingga tercapai panjang asam lemak tertentu. Pada biosintesis

asam palmitat maka siklus yang dilalui ada sebanyak 7 kali. Hasil sintesis yang terakhir adalah palmitoil-S-ACP yang dibebaskan dari ACP-nya melalui reaksi hidrolisis dengan bantuan enzim tioesterase. Gugus palmitoil yang terikat pada ACP bisa langsung dipindahkan pada HS-KoA menjadi palmitoil-KoA dan apabila bereaksi dengan asam fosfatidat akan membentuk fosfolipida. Pada umumnya jasad hidup mensintesis asam lemak hanya sampai C16 saja.¹²

E. MALONIL KO-A

Pengubahan asetil-KoA menjadi malonil-KoA, satuan yang memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah malonil-KoA. Pembentukan senyawa ini dikatalisis oleh enzim asetil-KoA karboksilase yang membutuhkan biotin, CO₂ dan ATP.¹

Proses sintesis *denovo* meliputi pembentukan malonil-KoA. Urutan proses dari sintesis *de novo* ialah:

1. Pembentukan malonil-KoA. Malonil-KoA adalah senyawa yang diperlukan sebagai penambah 2-atom C pada sintesis *de novo*. Malonil-KoA disintesis dari asetil-KoA, yang mengalami karboksilasi dengan katalisis asetil-KoA karboksilase. Reaksi ini memerlukan energi yang diperoleh dari ATP.
2. Sintesis palmitat dari asetil-KoA. Di sini, asetil-KoA berfungsi sebagai *primer* untuk sintesis lemak. Keseluruhan reaksinya dikatalisis oleh sejumlah enzim yang bergabung dalam kompleks sintetase asam lemak.

Komplek ini berupa dimer yang terdiri 2 monomer identik. Tiap monomernya tersusun atas rangkaian peptide yang terdiri atas 7 aktivitas enzim yang di bagian ujungnya terdapat suatu protein pengikat gugus asil (*Acyl Carrier Protein = ACP*).

Palmitat itu kemudian dapat diesterifikasi kasi membentuk trigliserida atau fosfolipida atau kolesterol ester. Sebagian lagi membentuk asam lemak baru dengan pemanjangan rantai, desaturasi atau gabungan keduanya (kedua proses-proses ini palmitat harus diaktifkan terlebih dahulu, oleh enzim tiokinase, menjadi palmitil-KoA).¹⁴

F. METABOLISME ASAM LEMAK TAK JENUH

Dalam tubuh, asam lemak jenuh, selain diperoleh dari makanan, juga dapat disintesis dari asam lemak jenuh. Proses dikatalisis oleh serangkaian enzim yang dikenal sebagai sistem desaturasi asam lemak, yang terdapat pada mikrosom. Ikatan rangkap yang pertama selalu terbentuk di antara atom C-9 dan atom C-10. Pada mammalia sistem enzim desaturasi hanya bekerja pada asam-asam lemak dengan 16 atau atom C. Asam lemak monoenoat (*monounsaturated*: asam lemak dengan 1 ikatan rangkap) tersebut selanjutnya dapat pula disintesis, dengan sistem enzim yang sama, menjadi asam lemak polienoat, dengan penambahan satu atau beberapa ikatan rangkap lagi¹⁴

Ikatan rangkap kedua dan seterusnya tersebut, pada hewan selain terbentuk kearah gugus karboksil, dengan jarak 3 atom C dari ikatan rangkap yang sebelumnya (pada tumbuh-

tumbuhan, penambahan ikatan rangkap dapat terjadi karah gugus karboksil maupun kearah atom C- \dot{A}). Akibatnya, selalu terbentuk asam polienoat dengan pola sbb: $\text{CH}_3\text{-C}=\text{C}-\text{C}=\text{C}=\text{C}-\text{COOH}$. Ikatan rangkap yang terbentuk juga selalu dalam konfigurasi cis. Dengan kombinasi antara proses desaturasi dan pemanjangan rantai dapat terbentuk berbagai asam polienoat dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Contoh: sistem nomenclatur (pemberian nama) asam-asam lemak. Asam-asam lemak dari suatu seri pada desaturasi dan pemanjangan rantai selalu menghasilkan asam-asam lemak dari seri yang sama. Sebaliknya, asam-asam lemak dari seri yang satu tidak dapat berubah menjadi asam-asam lemak dari seri yang lain. Karena mammalia hanya dapat mensintesis asam lemak jenuh dengan jumlah atom C > 16, dan karena ikatan-ikatan rangkap berikutnya selalu terbentuk ke arah gugus karboksil, maka mammalia tidak dapat mensintesis asam-asam lemak dari seri $\dot{A} < 7$.¹⁵

Asam lemak terbagi dua yaitu asam lemak jenuh dan tidak jenuh (esensial). Asam lemak jenuh adalah rantai karbon yang tidak mengandung ikatan rangkap, contohnya asam lemak butirrat, asam lemak kaproat, asam lemak palmitat, asam lemak stearat, asam lemak kaprilat, asam lemak kaprat, asam lemak laurat, asam lemak miristat, asam lemak stearat. Asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal (jenuh) seperti berikut :



Contoh: asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Karakteristik asam lemak jenuh (12-24 °C) pada suhu kamar bentuk padat sedangkan (1-2 °C) bentuk cair, lemak jenuh banyak ditemukan pada hewan. Lemak jenuh tidak memiliki ikatan ganda antara atom karbon dalam rantai asam lemak. Lemak jenuh meningkatkan LDL dalam aliran darah dan meningkatkan kadar kolesterol.

Asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang mengandung atau mempunyai ikatan rangkap lebih dari satu dan mengandung asam esensial yaitu asam yang tidak dapat di sintesiskan dalam tubuh contohnya asam oleat, asam linoleat, asam linolena, asam arakidonat. Asam lemak tak jenuh, yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya seperti berikut :



Contoh: asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat.

Karakteristik asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh biasanya dijumpai pada lemak nabati atau tumbuhan. Asam lemak tak jenuh ini masih dibedakan lagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

- a). Asam tak jenuh tunggal/*Monounsaturated fatty acids* (MUFAs), dimana ikatan rangkapnya hanya satu.
- b). Asam tak jenuh ganda/*Polyunsaturated fatty acids* (PUFAs) dimana ikatan rangkapnya lebih dari satu. (kehilangan hidrogennya bias 4,6,8 atau kelipatan 2 selanjutnya).

PUFAs dibedakan lagi menjadi dua bagian besar yaitu :

- a). Asam lemak Omega-6 Cis
- b). Asam lemak Omega-3 Cis¹⁶

G. DAUR UREA

Daur urea atau siklus urea disebut juga siklus ornitin, reaksi pengubah ammonia (NH_3) menjadi urea (NH_2CO). Reaksi terjadi dihati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati menjadi pusat pengubah ammonia menjadi urea karena terkait dengan fungsi hati sebagai tempat menetralka racun.

Ammonia merupakan hasil degradasi dari asam amino yang berasal dari reaksi transaminase, asam oksalat dikatalis oleh enzim aspartate dehydrogenase aspartate, aspartate akan masuk pada siklus uea dan reaksi deaminasi, glutamate (hasil transaminase) dan H_2O yang dibantu oleh NAD^+ yang menghasilkan NADH dan ammonia. Amonia hasil reaksi tersebut yang akan diolah di siklus urea.

Setiap molekul urea yang dibentuk, harus dikonsumsi satu molekul HCO_3^- . Oleh karena itu, siklus urea mempergunakan dan mengeluarkan dua hasil buangan yaitu ammonia dan bikarbonat. Selanjutnya, kenyataan ini menyatakan bahwa siklus urea berpartisipasi dalam pengaturan pH darah, yang bergantung pada nisbah CO_2 terlarut terhadap HCO_3^- (Sumarlin, 2020).

Reaksi di dalam siklus

Dua siklus utama pertama dari sintesis urea terjadi di matriks mitokondria, sedangkan enzim lain dari siklus tersebut berada di sitosol.

a. Pembentukan karbamoil fosfat

Pembentukan karbamoil fosfat oleh karbamoil fosfat sintetase 1 (CPS1) dilakukan melalui pemecahan dua molekul ATP. Amonia yang digabungkan dengan karbamoil fosfat terutama disediakan melalui deaminasi oksidasi glutamate dehydrogenase mitokondria. Pada akhirnya atom nitrogen berasal dari ammonia ini menjadi salah satu nitrogen urea.

b. Pembentukan Sitrulin

Bagian karbamoil fosfat akan ditransfer ke ornitin oleh enzim ornitin transkarbomoilase (OTC) ketika fosfat berenergi tinggi dilepas sebagai fosfat anorganik. Pada reaksinya, yaitu sitrulin dibawa ke dalam sitosol.

c. Sintesis arginosuksinat

Sintesis arginosuksinat menggabungkan sitrulin dengan aspartate untuk membentuk arginosuksinat. Gugus α -amino dari aspartate menyediakan nitrogen kedua, yang pada akhirnya bergabung dengan urea. Pembentukan arginosuksinat dilakukan melalui pemecahan ATP menjadi AMP dan pirofosfat (Ppi). ATP tersebut merupakan molekul ATP ketiga dan terakhir yang dipakai dalam pembentukan urea..

d. Pemecahan arginosuksinat

Arginosuksinat dipecah oleh arginosuksinat liase untuk menghasilkan arginine dan fumarat. Arginin yang dibentuk melalui reaksi ini berperan sebagai precursor antara urea. Fumarat yang dihasilkan dari siklus urea akan dihidrasi menjadi malat sehingga membentuk

hubungan dengan beberapa jalur metabolisme. Misalnya malat dapat diangkat ke dalam mitokondria melalui shuttle malat dan masuk kembali ke dalam siklus TCA dan mengalami oksidasi untuk membentuk osaloasetat (OAA) yang digunakan untuk gluconeogenesis. Oksidasi malat menghasilkan NADH dan selanjutnya ATP.

- e. Pemecahan arginine menjadi ornitin dan urea
Arginase memecah arginin menjadi ornitin dan urea, dan hanya terjadi di dalam hati. Sementara di jaringan lain seperti ginjal, dapat mensintesis arginine melalui reaksi ini, hanya hati yang dapat memecah arginin dan akan mensintesis urea.
- f. Nasib urea
Urea berdifusi dari hati dan diangkut melalui darah ke ginjal yang akan difiltrasi dan diekskresikan ke dalam urin. Sebagian urea berdifusi dari darah ke dalam usus dan dipecah menjadi CO_2 dan NH_3 oleh urease bakteri. Amonia ini sebagian akan menghilang melalui feses dan sebagian lagi akan direabsorpsi kembali ke dalam darah.

H. APLIKASI LDL DAN HDL

1. LDL (*Low Density Lipoprotein*)

Ada dua tipe kolesterol utama, yakni *high density lipoprotein* (HDL) dan *low density lipoprotein* (LDL). Lipoprotein sendiri tersusun atas lemak dan protein dan berfungsi sebagai transportasi untuk mengangkut kolesterol di dalam tubuh.

LDL dicap sebagai kolesterol jahat. LDL mengangkut kolesterol menuju pembuluh darah arteri—menyebabkan adanya penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah dan dapat menimbulkan plak (aterosklerosis). Adanya plak ini dapat menurunkan aliran darah ke otot jantung (penyakit jantung koroner), otot di kaki (penyakit jantung perifer), atau sumbatan arteri tiba-tiba di otak atau jantung, menyebabkan stroke atau serangan jantung. Karena meninjau fungsinya, kadar LDL yang lebih sedikit akan lebih baik untuk kesehatan yang baik adalah 130 mg/dL.

Perubahan gaya hidup dan asupan makanan merupakan dua cara utama dalam mencegah atau menurunkan kadar kolesterol LDL. Percobaan diet yang rendah lemak, aktivitas fisik aerobik yang teratur, menjaga berat badan ideal, dan mengecilkan lingkaran pinggang secara bertahap merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk menurunkan LDL. Beberapa obat-obatan yang dapat menurunkan kolesterol, seperti statin. Pada beberapa kasus yang jarang, LDL tinggi merupakan kondisi genetik yang diturunkan di dalam garis keluarga.

Kondisi ini disebut hiperkolestroemia keluarga (tingginya kolesterol dalam darah yang berjalan di keluarga) yang disebabkan oleh adanya mutasi genetik yang menurunkan kemampuan hati untuk membantu membereskan kolesterol yang berlebih. Fenomena tersebut dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke, di usia muda sekalipun.¹⁷

2. **HDL (High Density Lipoprotein)**

HDL berperan dalam pengangkutan kolesterol dari seluruh tubuh ke dalam hati. Karena itu, HDL dapat mencegah pembentukan plak di pembuluh darah, melindungi arteri, dan melindungi diri dari ancaman penyakit jantung serta pembuluh darah (seperti aterosklerosis). Akibat fungsinya, HDL sering dianggap sebagai kolesterol baik. Semakin tinggi kadar HDL dalam tubuh, semakin baik. Angka ideal HDL dalam tubuh adalah 55 mg/dL untuk wanita dan 45 mg/dL bagi pria. Semakin tinggi angka HDL, semakin rendah risiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke.

Meskipun HDL umumnya ditentukan oleh faktor genetik, ada tiga cara utama untuk meningkatkan HDL:

- a. Berhenti merokok
- b. Membiasakan diet yang baik untuk kesehatan jantung, seperti rendah lemak dan tinggi serat
- c. Aktivitas fisik aerobik juga memiliki efek yang baik untuk HDL. Jika ada kesulitan dalam berolahraga, carilah teman untuk menemani dan memberikan motivasi untuk terus bergerak dan aktif.

Saat ini, beberapa obat-obatan juga dapat meningkatkan kadar HDL. Namun, semua pengobatan perlu didiskusikan lebih lanjut dengan dokter sebelum dikonsumsi.¹⁸

REFERENCE

1. Academia. *Metabolisme Lemak: Proses, Gangguan dan Jalurnya*. Di akses dari <https://academia.co.id/>. 02/10/2023
2. Al Air. *Biokimia Asam Lemak*. Di akses dari <https://id.energymedresearch.com/> 25/10/2023.
3. Aziz Nugraha. *Hubungan Indeks Masa Tubuh Dengan Kadar Kolesterol Total Pada Guru Dan Karyawan SMA Muhammadiyah 1 Dan 2 Surakarta*. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.
4. Belajar Biologi. *Dekarboksilasi Oksidatif Atau Pembentukan Asetil Ko-A*. Di akses dari <https://robi-biologi.blogspot.com/> 02/10/2023.
5. Brainly. *Sintesis Asam Lemak Pada Reaksi Krebs*. Di akses dari <https://brainly.co.id/tugas/22053229> 03/10/2021
6. Dosen Pendidikan. *Metabolisme Lipid-Kelainan Lemak*. Di akses dari <https://www.dosenpendidikan.id.co.id/> 02/10/2023.
7. Catur Suci Sutrisnani. *Glicogen Storage Disease Tipe 1 Von Gierke Disease*. Tugas Makalah Karbohidrat Universitas Brawijaya Malang. 2012
8. Sri Wahjuni. *Metabolisme Biokimia*. Udayana University Press Denpasar. 2013
9. Hermawanbtl. *Metabolisme Lipid*. Di akses dari <https://hermawanbtl.wordpress.com> 27/10/2023
10. Industrial Farm Corp. *Metabolisme Asam Lemak Jenuh Dan Asam Lemak Essensial*. Di akses dari <https://industrialfarmcorp.wordpress.com/metabolisme-asam->

lemak- jenuh-dan-asam-lemak-essensial/ 02/10/2023

11. Naisya Pratiwi. *Pengertian Fosforilasi Oksidatif Dan Prosesnya*. Di akses dari <https://apayangdimaksud.com/02/10/2023>
12. Panji Tok. *Beta Oksidasi Asam Lemak*. Di akses dari [https://edubio.info .com](https://edubio.info.com) 25/10/2023
13. Rafina Gaming. *Metabolisme Lipida*. Di akses dari <https://indoslayer.wordpress.com/2011/09/18/metabolisme-lipida/> 29/11/2023
14. Slide Share. *Siklus Asam Sitrat*. Di akses dari [https://www.slideshare.net /imopriyanto/siklus-asam-sitrat/](https://www.slideshare.net/imopriyanto/siklus-asam-sitrat/) 03/11/2023.
15. Tips Kesehatan. *Mengenal HDL Dan LDL*. Di akses dari <https://aido.id /health -articles/mengenal-kolesterol-hdl-dan-ldl/detail> 02/11/2021

PROFIL PENULIS

Marwati, S.Farm., M.Si.

Penulis bernama marwati di lahirkan di Desa Latawe Kota Raha Sulawesi Tenggara pada tanggal 04 Juni 1990, anak perempuan ini adalah buah hati yang lahir dari pasangan Ibunda Radi' dan Ayahanda Hayyung. Yang merupakan anak bungsu dari 5 saudari lainnya yaitu Herman, Herwan, Herlina dan Haerati.



Masa pendidikan penulis dimulai pada sekolah tingkat Pendidikan Dasar di SD Negeri 2 Napanokusambi Raha dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Setelah itu penulis duduk di Sekolah Menengah Pertamanya di SMP Negeri 1 Napabalano Raha pada tahun 2006 dan menyelesaikan studinya di tahun 2006. Selanjutnya penulis memasuki masa putih abu-abunya di SMA Negeri 1 Raha pada tahun 2009.

Pada tahun 2009 penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi di Makassar Program Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar . Saat ini saya mengabdikan sebagai dosen di Universitas Almarisah Madani dengan background Pendidikan Farmasi. Pendidikan formalnya dilanjutkan di Universitas Hasanuddin hingga mendapat gelar M.Si. pada tahun 2018 dalam Bidang Herbal Medicine. Tahun 2018, aktif dalam mengajar dan sekarang sedang melakukan lanjut Studi Doktor Di Fakultas farmasi Universitas Hasanuddin . Selain aktif mengajar. Ia juga aktif dalam melakukan penelitian dan mengisi Kajian Keislaman pada kalangan mahasiswa dalam Forum Kajian Islam Farmasi (FKIF) serta aktif dalam management Project Dakwah. Prinsip Hidup Jadikanlah Akhirat di Hatimu, Dunia di Tanganmu, dan Kematian di Pelupuk Matamu.

Email Penulis: watimar514@gmail.com



BAB 9



METABOLISME TERINTEGRASI

(Apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.)

Universitas Muhammadiyah Lamongan; Jl. Raya Plalangan

Plosowahyu KM 02 Lamongan, (0322) 322356

Email: arumaisyah81@gmail.com

A. JALUR-JALUR UTAMA METABOLISME

1. Pendahuluan

Metabolisme merupakan istilah yang merujuk pada proses pertukaran senyawa kimia di dalam tubuh, termasuk penjelasan mengenai jalur yang dilalui oleh setiap molekul, interaksi antarmolekul, dan mekanisme yang mengatur aliran metabolik melalui berbagai jalur metabolisme (Murray et al, 2014). Metabolisme juga merupakan serangkaian reaksi yang terjadi di dalam sel, memberikan kemampuan pada sel untuk mempertahankan kehidupannya (Sismindari et al, 2021).

Jalur metabolik dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: (1) Jalur anabolik, yang bertanggung jawab atas sintesis senyawa kompleks dari prekursor yang lebih kecil, seperti pembentukan protein dari asam amino dan akumulasi cadangan triasilgliserol serta glikogen. Proses anabolisme bersifat endotermik, memerlukan energi untuk membentuk senyawa (Harper, 2014). (2) Jalur katabolik, berfokus pada penguraian molekul besar, sering melibatkan reaksi oksidatif,

dan bersifat eksotermik, menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui rantai respiratorik (Murray et al, 2014). Katabolisme berfungsi sebagai proses untuk menghasilkan energi dari degradasi molekul (Sismindari, 2021). (3) Jalur amfibolik, beroperasi di persimpangan metabolisme, berperan sebagai penghubung antara jalur katabolik dan anabolik, contohnya adalah siklus asam sitrat (Murray et al, 2021).

Selain itu, di dalam sel, terdapat berbagai jalur metabolisme, termasuk glikolisis, siklus Krebs, jalur pentose fosfat, siklus urea, oksidasi asam lemak, dan gluconeogenesis, serta jalur metabolisme lainnya yang turut berperan.


2. Metabolisme Karbohidrat Berpusat pada Penyediaan dan Nasib Glukosa

Glukosa berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sebagian besar jaringan. Proses metabolisme glukosa melibatkan transformasi menjadi piruvat melalui jalur glikolisis. Pada jaringan aerob, piruvat kemudian diubah menjadi asetil-KoA, yang dapat memasuki siklus asam sitrat untuk mengalami oksidasi penuh menjadi CO_2 dan H_2O . Proses ini terkait dengan pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Selain itu, glikolisis juga dapat terjadi secara anaerob (tanpa oksigen), menghasilkan laktat sebagai produk akhir.

Glukosa dan metabolitnya juga terlibat dalam berbagai proses lain, termasuk: (1) Sintesis glikogen sebagai polimer penyimpanan energi di otot rangka dan hati. (2) Partisipasi dalam jalur pentose fosfat sebagai alternatif sebagian dari jalur glikolisis. Jalur ini berperan sebagai sumber ekuivalen pereduksi (NADPH) untuk sintesis asam lemak dan sebagai sumber ribosa untuk

pembentukan nukleotida dan asam nukleat. (3) Triosa fosfat berkontribusi pada pembentukan gugus gliserol triasilgliserol. (4) Piruvat dan zat-zat antara siklus asam sitrat menyediakan kerangka karbon untuk sintesis asam amino nonesensial, sementara asetil-KoA berperan sebagai prekursor untuk sintesis asam lemak dan kolesterol (Murray et al, 2014).

Gambar 9.1 Jalur Utama Metabolisme Karbohidrat



Sumber: Jurnal Kimia Sains dan Terapan, VOL 3 NO 2, Oktober 2021.

3. Metabolisme Lipid Terutama Berpusat pada Asam Lemak dan Kolesterol

Sumber utama asam lemak rantai panjang adalah lipid dalam makanan atau melalui sintesis de novo dari asetil-KoA yang berasal dari karbohidrat atau asam amino. Asam lemak dapat mengalami oksidasi menjadi asetil-KoA atau diesterifikasi dengan gliserol (oksidasi β), menghasilkan triasilgliserol (lemak) sebagai cadangan bahan bakar utama tubuh (Murray et al, 2014). Asetil-KoA yang terbentuk dari oksidasi β memiliki tiga kemungkinan: (1) Dioksidasi menjadi CO₂ + H₂O melalui siklus asam sitrat, mirip

dengan asetil-KoA dari glikolisis; (2) Menjadi prekursor untuk sintesis kolesterol dan steroid lainnya; (3) Di hati, digunakan untuk membentuk badan keton (asetoasetat dan 3-hidroksibutirat), yang menjadi bahan bakar penting selama lama puasa dan kelaparan (Murray et al, 2014).

4. Banyak Metabolisme Asam Amino Melibatkan Transaminasi

Asam amino diperlukan dalam pembentukan protein, sebagian diperoleh dari makanan (asam amino esensial), sementara sisanya, yaitu asam amino nonesensial, dapat dibentuk dari zat-zat metabolik melalui transaminase dengan menggunakan nitrogen amino dari asam amino lain. Setelah deaminasi, gugus amino diekskresikan sebagai urea, dan kerangka karbon yang tersisa setelah transaminase dapat (1) Dioksidasi menjadi CO₂ melalui siklus asam sitrat; (2) Digunakan untuk sintesis glukosa (gluconeogenesis); atau (3) Digunakan untuk membentuk badan keton atau asetil-KoA yang dapat dioksidasi atau digunakan untuk sintesis asam lemak (Murray et al, 2014).


Pada reaksi oksidasi glukosa, asam lemak, dan asam amino, dihasilkan adenosin trifosfat (ATP) sebagai energi universal dalam sel. NADPH berperan sebagai donor elektron utama dalam biosintesis melalui reaksi reduksi.

Berbagai jalur metabolisme dapat saling terhubung melalui "kunci percabangan." Sebagai contoh, kunci percabangan melibatkan G-6-fosfat, piruvat, dan asetil-KoA. Saat glukosa memasuki sel, mengalami fosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat, yang kemudian mengalami katabolisme menjadi piruvat. Piruvat dapat disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi ribosa-5-fosfat melalui jalur pentose fosfat. Glukosa 6-fosfat juga dapat dihasilkan

dari glikogen melalui jalur gluconeogenesis. Piruvat, yang merupakan kunci percabangan, dapat dihasilkan dari glukosa 6-fosfat melalui jalur glikolisis (Sismindari et al, 2021).

Percabangan ketiga melibatkan asetil-KoA, senyawa 2 karbon yang teraktivasi yang dihasilkan dari degradasi asam piruvat, beta-oksidasi asam lemak, atau degradasi asam amino ketogenik. Asetil-KoA dapat mengalami total oksidasi menjadi CO₂ melalui siklus urea, diubah menjadi 3-hidroksi-3-metil-glutaril KoA (HMG-KoA) yang selanjutnya diubah menjadi badan keton atau kolesterol. Asetil-KoA juga dapat dilepaskan ke sitosol dan diubah menjadi asam (Sismindari et al, 2021, Hanggu et al, 2021).

Gambar 9.2 Jalur Percabangan pada Metabolisme Karbohidat



Sumber: Sismindari, et al, 2021.

B. POLA METABOLIK PADA ORGAN UTAMA

Setiap organ dalam tubuh kita memiliki profil metabolisme yang unik, dengan liver menjadi satu-satunya organ yang mampu menjalankan semua jalur utama metabolisme. (a) Otak mengirim sinyal ke organ lain dan mempertahankan membran potensial. (b) Otot menggunakan ATP untuk melakukan pergerakan mekanik. (c) Jaringan adiposa mensintesis, menyimpan, dan mobilisasi triasilgliserol. (d) Liver memproses lemak, karbohidrat, dan protein dari makanan serta melakukan sintesis glukosa dan lipid. (e) Kelenjar limpa membawa lipid dari usus. (f) Pankreas mengeluarkan insulin dan glukagon sebagai respons terhadap kadar glukosa dalam darah (Sismindari et al, 2021).

1. Otak

Glukosa merupakan bahan bakar utama untuk otak yang menghasilkan ATP dan CO₂. Pada kondisi kelaparan tanpa asupan glukosa, otak menggunakan benda-benda keton sebagai bahan bakar. Otak tidak memiliki kapasitas penyimpanan bahan bakar seperti otot, sehingga perlu suplai glukosa terus-menerus. Otak mengkonsumsi sekitar 120 gram glukosa setiap hari, yang diangkut oleh transporter glukosa, GLUT3. Jika konsentrasi glukosa turun di bawah 2.2 mM (Km dari GLUT3), otak tidak dapat berfungsi, menyebabkan kehilangan kesadaran hingga koma. Pada kondisi kelaparan yang berkepanjangan, badan keton digunakan sebagai pengganti bahan bakar dalam otak (Sismindari et al, 2021, Wahyuni, 2017).

2. Otot

Berbeda dengan otak, otot berfungsi sebagai tempat penyimpanan glikogen, selain liver. Tiga perempat dari total

glikogen tersimpan di otot. Beberapa poin penting dalam metabolisme otot melibatkan:

- (a) Glukosa, asam lemak, dan badan keton sebagai bahan bakar utama.
- (b) Glukosa dipilih sebagai bahan bakar utama saat aktivitas berat, di mana glikogen diubah menjadi glukosa. ATP dapat dihasilkan lebih cepat melalui glikolisis daripada oksidatif fosforilasi. Akibatnya, piruvat diubah menjadi asam laktat (sistem anaerob) untuk meregenerasi NAD⁺ yang diperlukan dalam glikolisis. Akumulasi asam laktat dapat menurunkan pH otot dan efisiensi gerak otot.
- (c) Asam lemak menjadi bahan bakar utama pada aktivitas ringan jangka panjang dan pada otot jantung, menghasilkan CO₂ (sistem aerob).
- (d) Dalam situasi aktivitas berat, diperlukan daur ulang asam laktat untuk diubah menjadi glukosa di hati, kemudian disintesis sebagai glikogen di otot untuk digunakan kembali sebagai energi (ATP) melalui "Cory Cycle" (Sismindari et al, 2021).

3. Jaringan Adiposa

Jaringan adiposa berfungsi sebagai tempat penyimpanan triasilgliserol (TAG) dan melepaskan asam lemak jika diperlukan. Liver adalah tempat sintesis asam lemak, yang kemudian diesterifikasi dengan gliserol membentuk triasilgliserol dan dikemas sebagai lipoprotein densitas rendah (LDL). Jaringan ini menyerap asam lemak bebas dari LDL melalui hidrolisis TAG dengan lipoprotein lipase ekstraseluler. Asam lemak di jaringan adiposa kemudian diubah kembali menjadi triasilgliserol dan disimpan (Sismindari et al, 2021).

Sintesis TAG membutuhkan glukosa, sehingga tingkat glukosa memengaruhi jumlah TAG yang dilepaskan ke dalam darah. Glukosa pertama-tama diubah menjadi gliserol-6-fosfat sebelum menjadi TAG. Reaksi ini melibatkan asil KoA.

4. Liver

Liver memainkan peran kunci dalam metabolisme glukosa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar otak, otot, dan organ lainnya. Sebagian besar komponen yang diabsorpsi dari makanan melewati liver, memungkinkannya mengatur jumlah metabolit dalam darah.

Hanya liver dan ginjal yang mengandung glukosa-6-fosfat karena keduanya berfungsi untuk menjaga kadar glukosa darah. Setelah kebutuhan darah terpenuhi, glukosa-6-fosfat di liver dapat disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi asetil-KoA untuk masuk ke siklus Krebs atau menjadi TAG. Glukosa juga dapat diubah menjadi Ribosa-5P (melalui jalur pentose fosfat), menghasilkan NADPH (Sismindari et al, 2021, Wahyuni, 2017).


Profil metabolisme liver (asam amino): Liver menyusun asam amino menjadi protein yang akan di transfer ke dalam darah. Asam amino juga merupakan bahan pembentuk nukleotida, hormon, dan protein, yang terdegradasi menjadi piruvat (senyawa ketoasam) untuk masuk ke siklus Krebs. Sebagian besar asam amino mengalami metabolisme di liver, sementara hanya liver dan ginjal yang mampu mengubah ammonia hasil katabolisme asam amino menjadi urea (Sismindari et al, 2021, Wahyuni, 2017).

Profil metabolik liver, asam lemak di dalam liver digunakan

untuk membentuk lemak. Asam lemak juga diubah menjadi asetil-KoA untuk memasuki siklus Krebs. Liver tidak mengandung KoA transferase, enzim yang diperlukan untuk menggunakan badan keton sebagai sumber energi. Senyawa keton yang dihasilkan akan disekresikan ke dalam darah sebagai bahan bakar alternatif jika glukosa tidak tersedia (Sismindari, 2021).

Pada kadar glukosa darah tinggi, terjadi sintesis asam lemak yang kemudian diubah menjadi triasilgliserol, dikemas sebagai *very low density lipoproteins*, dan disekresikan ke dalam darah. Saat kadar glukosa darah rendah, liver akan memproduksi benda keton sebagai bahan bakar untuk jantung, otot jantung, dan otak (Sismindari et al, 2021).

Gambar 9.3 Profil Metabolik di Dalam Liver



Sumber: Sismindari, et al, 2021.

5. Ginjal

Sebagian besar profil metabolisme ginjal terkait dengan produksi urin dan sekresi metabolit air larut. Saat kadar gula darah rendah, ginjal menjadi penting dalam proses gluconeogenesis dan memproduksi setengah dari total glukosa dalam darah (Sismindari et al, 2021).

C. REGULASI HORMONAL

Untuk menjaga kestabilan kadar glukosa dalam darah, pankreas mengeluarkan insulin, suatu hormon yang mengakibatkan perlambatan penguraian glikogen menjadi glukosa. Sebaliknya, saat kadar glukosa dalam darah rendah, pankreas mengeluarkan hormon glukagon, yang bekerja secara berkebalikan dengan insulin, yakni dengan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Hal serupa terjadi pada kelenjar pituitary atau hipofisis yang mengeluarkan hormon pertumbuhan, juga berkontribusi pada peningkatan kadar glukosa dalam darah (Poedjiadi dan Supriyanti, 2012).

Dalam kondisi normal, insulin, glikogen, dan hormon pertumbuhan berada dalam keseimbangan, menjaga kadar glukosa darah relatif stabil. Namun, dalam situasi kritis seperti kedinginan, bahaya, atau ketakutan, tiga jenis hormon lain memainkan peran penting, yaitu adrenalin, kortison, dan tiroksin. Saat terjadi ancaman, sistem saraf mendeteksinya dan memberi sinyal kepada kelenjar adrenal di atas ginjal untuk mengeluarkan adrenalin dan noreadrenalin. Kedua hormon ini meningkatkan kadar glukosa darah di otot, mempersiapkannya untuk digunakan sebagai sumber energi dalam situasi darurat.

Adrenal korteks menghasilkan hormon kortison, yang juga berperan dalam meningkatkan kadar glukosa darah saat terjadi tekanan fisiologis, seperti kondisi inflamasi yang ditandai dengan kemerahan kulit, rasa panas, dan pembengkakan (Poedjiadi dan Supriyanti, 2012).

Hormon tiroksin berfungsi mengatur metabolisme glukosa ketika tubuh menghadapi suhu dingin. Pada keadaan tersebut, laju metabolisme glukosa dipercepat untuk menghasilkan lebih banyak kalori guna mengatasi kondisi dingin tersebut (Poedjiadi dan Supriyanti, 2012).

D. MEKANISME PENGATURAN KADAR GULA DI DALAM DARAH.

Glukosa selalu menjadi kebutuhan penting bagi sistem saraf pusat dan eritrosit. Eritrosit, yang tidak memiliki mitokondria, secara mutlak bergantung pada glikolisis (anaerob) melalui jalur pentose fosfat. Meskipun otak mampu memetabolisme badan keton untuk memenuhi sekitar 20% kebutuhannya, sumber utama energi harus dipasok oleh glukosa.

Perubahan metabolisme yang terjadi selama puasa dan kelaparan merupakan hasil dari keharusan untuk menjaga glukosa dan cadangan glikogen yang terbatas di hati dan otot, yang digunakan oleh otak dan sel darah merah, serta untuk memastikan penyediaan bahan bakar metabolik alternatif bagi jaringan lain (Murray et al, 2014).

Pada kondisi kenyang, terjadi penyimpanan bahan bakar metabolik. Beberapa jam setelah makan, ketika produk pencernaan diserap, pasokan bahan bakar metabolik menjadi melimpah. Saat ini, glukosa menjadi bahan bakar utama untuk

oksidasi di sebagian besar jaringan; hal ini diamati sebagai peningkatan respirasi kuosien (rasio karbon dioksida yang dihasilkan terhadap oksigen yang dikonsumsi) dari sekitar 0,8 dalam keadaan puasa hingga mendekati 1 (Murray et al, 2014).

Penyerapan glukosa oleh otot dan jaringan adiposa dikendalikan oleh insulin yang dihasilkan oleh sel islet- β pankreas sebagai respons terhadap peningkatan kadar glukosa di dalam porta. Selama puasa, transporter glukosa di otot dan jaringan adiposa (GLUT-4) berada dalam vesikel intraseluler. Respons awal terhadap insulin melibatkan migrasi vesikel-vesikel ini ke permukaan sel. Tempat vesikel-vesikel tersebut menyatu dengan membran plasma dan mengeluarkan transporter glukosa yang aktif (Murray et al, 2014).

Jaringan yang responsif terhadap insulin hanya akan menyerap glukosa dari aliran darah dalam jumlah yang signifikan jika hormon ini hadir. Saat sekresi insulin berkurang selama puasa, reseptor kembali diinternalisasi, mengurangi penyerapan glukosa. Namun, di otot rangka, peningkatan ion kalsium sitoplasma sebagai respons terhadap simulasi saraf merangsang migrasi vesikel-vesikel ini ke permukaan sel dan mengeluarkan transporter glukosa yang aktif, baik dalam situasi dengan atau tanpa stimulasi insulin yang signifikan (Murray et al, 2014).

Penyerapan glukosa oleh hati tidak bergantung pada insulin; sebaliknya, hati memiliki suatu isoenzim heksokinase yang disebut glukokinase dengan K_m tinggi. Oleh karena itu, ketika konsentrasi glukosa yang masuk ke hati meningkat, laju sintesis glukosa-6-fosfat juga meningkat. Hal ini melebihi kebutuhan hati untuk metabolisme pembentuk energi dan terutama digunakan untuk

pembentukan glikogen.

Di hati dan otot rangka, insulin berperan dalam merangsang glikogen sintetase dan menghambat glikogen fosforilase. Sebagian dari glukosa tambahan yang masuk ke hati juga dapat digunakan untuk lipogenesis dan, akibatnya, untuk sintesis triasilgliserol. Di jaringan adiposa, insulin merangsang penyerapan glukosa, mengubahnya menjadi asam lemak, dan melakukan esterifikasi untuk membentuk triasilgliserol. Insulin juga menghambat lipolisis intraseluler dan pelepasan asam lemak bebas (Murray et al, 2014).

Pada kondisi puasa, terjadi mobilisasi cadangan bahan bakar metabolik. Saat puasa, terjadi penurunan kadar glukosa plasma, dan perubahan tersebut secara bertahap menjadi kelaparan. Asam lemak bebas dalam plasma meningkat selama puasa, meskipun peningkatannya sedikit selama kelaparan. Seiring berlanjutnya puasa, kadar plasma badan keton, seperti asetoasetat dan 3-hidroksibutirat, mengalami peningkatan yang signifikan (Murray et al, 2014).

Dalam situasi puasa, ketika konsentrasi glukosa di dalam portal vena menurun, produksi insulin menurun, dan otot rangka bersama dengan jaringan lemak menyerap glukosa dalam jumlah yang lebih sedikit. Peningkatan produksi glukagon oleh sel-sel pankreas menghambat glikogen sintetase dan merangsang aktivitas glikogen fosforilase di hati. Glukosa 6-fosfat yang dihasilkan kemudian dihidrolisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase, dan glukosa dilepaskan ke dalam aliran darah untuk digunakan oleh otak dan eritrosit (Murray et al, 2014).

Glikogen dalam otot tidak dapat secara langsung berkontribusi pada glukosa dalam plasma karena otot tidak memiliki enzim glukosa 6-fosfatase. Fungsi utama otot adalah menyediakan sumber glukosa 6-fosfat untuk metabolisme pembentukan energi di dalam otot itu sendiri. Namun, asetil-KoA yang dihasilkan melalui oksidasi asam lemak di otot menghambat enzim piruvat dehydrogenase, menyebabkan penumpukan piruvat (Murray et al, 2014).

Di jaringan adiposa, penurunan kadar insulin dan peningkatan glukagon menghambat lipogenesis, menginaktivasi dan menginternalisasi lipoprotein lipase, serta mengaktifkan lipase yang peka terhadap hormon intraseluler. Hal ini menyebabkan peningkatan pelepasan gliserol (sebagai substrat untuk gluconeogenesis di hati) dan asam lemak bebas dari jaringan adiposa. Bahan bakar ini digunakan oleh hati, jantung, dan otot rangka sebagai bahan bakar metabolik yang lebih disukai, sehingga glukosa dapat dihemat (Murray et al, 2014).

Meskipun pada kondisi puasa otot memiliki kecenderungan untuk menyerap dan memetabolisme asam lemak bebas, namun jaringan ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui oksidasi- β . Sebaliknya, hati memiliki kapasitas oksidasi- β yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika kondisi puasa berlanjut, hati membentuk lebih banyak asetil-KoA daripada yang dioksidasi (Murray et al, 2014).

Asetil-KoA yang dihasilkan digunakan untuk membentuk badan keton, yang merupakan bahan bakar metabolik utama untuk otot rangka dan jantung, serta dapat memenuhi hingga 20% kebutuhan

energi otak. Dalam keadaan kelaparan yang berlanjut, glukosa hanya memberikan kontribusi kurang dari 10% dari total metabolisme penghasil energi tubuh (Murray et al, 2014).

E. PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA ADANYA KELAINAN METABOLISME

Pada situasi puasa yang berlangsung lama, ketika cadangan jaringan adiposa telah habis, terjadi peningkatan signifikan dalam laju katabolisme protein untuk menghasilkan asam amino. Ini tidak hanya berfungsi sebagai substrat untuk gluconeogenesis, tetapi juga sebagai bahan bakar metabolik untuk semua jaringan. Kematian dapat terjadi jika protein esensial dalam jaringan terus dikatabolisme tanpa penggantian. Pada pasien dengan kakeksia, yang disebabkan oleh pelepasan berbagai sitokin sebagai respons terhadap tumor dan kondisi patologis lainnya, terjadi peningkatan laju katabolisme protein jaringan dan peningkatan laju metabolisme yang signifikan, mengakibatkan pasien berada dalam keadaan kelaparan yang parah. Kematian mungkin terjadi jika protein esensial dalam jaringan terus dikatabolisme tanpa adanya penggantian (Murray et al, 2014).

Kegagalan dalam proses gluconeogenesis dapat berakibat fatal, yakni menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Keadaan hipoglikemia dapat mengakibatkan disfungsi otak dan bahkan dapat berujung pada kematian. Pada pasien dengan penyakit berat, seperti yang mengalami trauma atau infeksi, terjadi peningkatan gluconeogenesis sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Hal ini juga berkontribusi pada perkembangan hiperglikemia dengan prognosis buruk.

Hiperglikemia dapat mengakibatkan perubahan osmolalitas cairan tubuh, gangguan aliran darah, asidosis intrasel, dan peningkatan

produksi radikal superoksida. Dampak ini mungkin menciptakan ketidakseimbangan pada fungsi sistem imun dan endothelial, serta menimbulkan masalah dalam koagulasi darah. Adanya gluconeogenesis yang berlebihan juga menjadi faktor yang turut berperan dalam hiperglikemia pada diabetes tipe 2, yang disebabkan oleh gangguan sensitivitas gluconeogenesis terhadap regulasi yang menurun sebagai tanggapan terhadap insulin (Murray et al, 2014).

Pada penderita diabetes melitus tipe 1 yang tidak terkontrol, terjadi hiperglikemia. Ini disebabkan sebagian oleh kurangnya insulin untuk merangsang penyerapan dan penggunaan glukosa, dan sebagian lainnya oleh kurangnya insulin yang menyebabkan peningkatan gluconeogenesis dari asam amino di hati. Pada saat yang bersamaan, kurangnya insulin menyebabkan lipolisis di jaringan adiposa, dan asam lemak bebas yang dihasilkan menjadi substrat untuk ketogenesis di liver (Murray et al, 2014).

Penggunaan badan keton oleh otot (dan jaringan lainnya) dapat terhambat karena kekurangan oksaloasetat. Semua jaringan memerlukan metabolisme glukosa untuk menjaga oksaloasetat dalam jumlah yang memadai untuk aktivitas siklus asam sitrat.

Pada diabetes yang tidak terkontrol, ketosis dapat menjadi sangat parah sehingga menyebabkan asidosis berat (ketoasidosis) karena asetoasetat dan 3-hidroksibutirat bersifat asam yang relatif kuat. Kondisi asidosis dan peningkatan osmolalitas cairan ekstraseluler, terutama disebabkan oleh hiperglikemia dan diuresis akibat ekskresi glukosa dan badan keton dalam urin, dapat menyebabkan koma (Murray et al, 2014).

Kemampuan tubuh untuk memanfaatkan glukosa dapat dinilai dengan mengukur toleransi glukosa. Toleransi glukosa merujuk pada

kemampuan tubuh untuk mengatur tingkat glukosa dalam darah setelah menerima dosis uji glukosa (biasanya sekitar 1 mg/kg berat badan).

Diabetes melitus tipe 1 dicirikan oleh penurunan sekresi insulin akibat kerusakan bertahap pada sel-sel β di pulau pankreas. Pada diabetes melitus tipe 2, toleransi glukosa terganggu karena ketidakpekaan jaringan terhadap insulin. Resistensi insulin, terutama yang terkait dengan obesitas, dapat mengakibatkan hiperlipidemia, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, dan diabetes yang termanifestasi secara jelas, yang dikenal sebagai sindrom metabolik (Murray et al, 2014).

Gangguan toleransi glukosa juga dapat muncul dalam kondisi-kondisi yang merusak fungsi hati, pada beberapa infeksi, sebagai tanggapan terhadap penggunaan obat tertentu, serta pada keadaan yang menyebabkan peningkatan aktivitas hipofisis atau korteks adrenal. Peningkatan aktivitas hipofisis atau korteks adrenal terjadi sebagai hasil dari antagonisme hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ini terhadap insulin (Murray et al, 2014).

REFERENCE

- Henggu, KU., dan Nurdiansyah, Y, 2021. "Review dari Metabolisme Karbohidrat, Lipid, Protein, dan Asam Nukleat". *Quimica: Jurnal Kimia Sains dan Terapan*, Vol.3, N0.2, Oktober 2021. [www.https://ejournalunsam.id/index.php/JQ](http://ejournalunsam.id/index.php/JQ) diunduh tanggal 26 November 2023.
- Murray, R.K. et al, 2014. *Biokimia Harper edisi bahasa Indonesia*, Edisi 29, Penerbit EGC, Jakarta, Bab 16, hal: 170-183, Bab 20: hal 209.
- Poedjiadi, A, dan Supriyanti, FM., 2012. *Dasar-Dasar Biokimia*, Edisi Revisi, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal: 349, 353-355.
- Sismindari, Jenie, RI, Rumiyati, Meiyanto, E, 2021. *Biokimia Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal: 194-211.
- Wahyuni, S, 2017. *Biokimia Enzim dan Karbohidrat*, Unimal Press, Lhokseumawe, hal 41-48.

PROFIL PENULIS

Apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.

Penulis merupakan dosen Biokimia di Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur. Muhtaromah menyelesaikan Pendidikan S1, profesi, dan pasca sarjana di Universitas Airlangga. Ia juga mengajar Imunologi dan Farmakokinetika.

Baginya, menjadi pendidik dan mengajar ibarat mengalirkan kebaikan yang tiada habisnya.



Email Penulis: arumaisyah81@gmail.com



BAB 10



KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN METABOLISME KARBOHIDRAT, PROTEIN, LEMAK, DAN ASAM AMINO

(Ida Ayu Suci, S.Pd., M.Si.)

Universitas Panca Bhakti; Jl. Komodor Yos Sudarso Pontianak,
085750703972
Email: idaayusuci@upb.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kelainan atau gangguan penyakit merupakan kondisi abnormal dalam struktur atau fungsi organ atau sistem tubuh yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan kesehatan, atau disfungsi tubuh. Kelainan ini dapat bersifat sementara atau kronis, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan, baik fisik maupun mental. Kelainan metabolisme adalah kondisi yang melibatkan gangguan dalam satu atau lebih tahap proses metabolisme normal di dalam tubuh. Kelainan metabolisme merujuk pada sejumlah kondisi yang mempengaruhi proses kimia tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Kelainan melibatkan gangguan dalam proses pembentukan atau penguraian zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Kelainan ini dapat

disebabkan oleh mutasi genetik atau faktor lingkungan tertentu, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek metabolisme, termasuk penguraian karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan zat-zat lainnya.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KELAINAN METABOLISME

Kelainan metabolisme dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dan penyebabnya dapat bersifat genetik (dari lahir) atau didapat (akibat faktor lingkungan atau kondisi tertentu). Berikut adalah beberapa penyebab umum kelainan metabolisme:

1. Faktor Genetik

Mutasi Genetik: Kelainan metabolisme sering kali bersifat genetik dan dapat disebabkan oleh mutasi atau perubahan gen tertentu. Gen-gen yang mengontrol produksi enzim atau protein yang terlibat dalam proses metabolisme dapat mengalami mutasi.

Warisan Genetik: Beberapa kelainan metabolisme dapat diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka. Jika pasangan memiliki gen yang mengkodekan kelainan metabolisme, ada risiko bahwa anak mereka dapat mewarisi kondisi tersebut.

2. Faktor Lingkungan

Paparan Zat Tertentu: Paparan zat-zat beracun atau infeksi selama kehamilan atau pada masa anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan normal organ atau sistem yang terlibat dalam metabolisme.

Kekurangan Nutrisi: Kekurangan nutrisi selama kehamilan atau masa pertumbuhan dapat menyebabkan kelainan

metabolisme. Misalnya, kekurangan asam folat dapat berkontribusi pada kelainan pada perkembangan otak janin.

3. Faktor Hormonal

Gangguan Hormonal: Kelainan pada kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon penting untuk regulasi metabolisme, seperti insulin dari pankreas, dapat menyebabkan gangguan metabolisme.

4. Faktor Immunologis

Penyakit Autoimun: Beberapa kelainan metabolisme dapat terkait dengan respons sistem kekebalan tubuh yang salah, di mana tubuh menyerang sel-sel atau enzim yang terlibat dalam proses metabolisme.

5. Faktor Infeksi

Infeksi: Beberapa jenis infeksi dapat merusak organ atau sel-sel yang berperan dalam metabolisme, menyebabkan kelainan metabolisme.

6. Faktor Keturunan (Hereditas)

Kromosom Abnormal: Kelainan pada struktur kromosom atau jumlah kromosom dapat menyebabkan kelainan metabolisme. Contohnya adalah sindrom Down yang disebabkan oleh kelebihan satu kromosom 21.

7. Faktor Gaya Hidup

Kebiasaan Makan dan Aktivitas Fisik: Pola makan yang tidak sehat dan kekurangan aktivitas fisik dapat menyebabkan gangguan metabolisme, terutama terkait dengan obesitas dan resistensi insulin.

8. Faktor Usia

Proses Penuaan: Beberapa kelainan metabolisme dapat terkait dengan proses penuaan, di mana kemampuan tubuh untuk memproses nutrisi atau menjaga keseimbangan metabolik dapat menurun seiring bertambahnya usia.

Kelainan metabolisme bersifat kompleks, dan seringkali ada kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang berkontribusi pada perkembangannya. Diagnosis dan manajemen kelainan metabolisme memerlukan kerja sama antara ahli genetika, dokter spesialis, dan ahli nutrisi (Medghalchi et al., 2020).

C. KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN METABOLISME KARBOHIDRAT

Kelainan atau gangguan penyakit akibat kelainan metabolisme karbohidrat dapat mencakup beberapa kondisi yang mempengaruhi cara tubuh memproses, menyimpan, atau menggunakan karbohidrat. Beberapa contoh kelainan atau penyakit yang terkait dengan kelainan metabolisme karbohidrat meliputi:

1. Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh resistensi insulin (tubuh tidak merespons insulin dengan baik) atau ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan insulin yang cukup. Diabetes mellitus dibagi menjadi tipe 1 (autoimun, di mana pankreas tidak menghasilkan insulin) dan tipe 2 (resistensi insulin dan produksi insulin yang berkurang). Pada diabetes tipe 1 berasal

dari faktor genetik, lingkungan, usia dan faktor lain dan pada diabetes tipe 2 faktornya antara lain gaya hidup dan obesitas. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes melitus yaitu dengan terapi insulin, mengonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi dan memperbaiki life style (pola hidup sehat) dengan memakan makanan yang bergizi atau sehat serta berolahraga (Lestari, Zulkarnain, 2021).

Gambar 10.1 Kaki Diabetik



Sumber: Jurnal JAAPA, Vol 28 No (Aumiller & Dollahite, 2015)

2. Hipoglikemia

Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar glukosa darah turun di bawah batas normal, biasanya karena terlalu banyak insulin atau kurangnya asupan karbohidrat. Hal ini dapat terjadi pada orang dengan diabetes yang menggunakan insulin atau obat-obatan tertentu.

3. Gangguan Metabolisme Glikogen

Beberapa kondisi, seperti penyakit Pompe, merupakan kelainan metabolisme yang melibatkan gangguan dalam pembentukan

atau penguraian glikogen. Ini dapat menyebabkan akumulasi glikogen dalam sel-sel tubuh dan mempengaruhi berbagai organ, termasuk otot dan hati.

4. Galaktosemia

Galaktosemia adalah kelainan genetik yang melibatkan ketidakmampuan tubuh untuk memetabolisme galaktosa, yang merupakan gula yang ditemukan dalam susu. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi galaktosa dalam darah dan jaringan, menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan otak.

Galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen GALT, GALK1, dan GALE. Gen-gen tersebut berfungsi untuk membentuk enzim yang diperlukan untuk memecah galaktosa. Akibat mutasi gen tersebut, terjadi defisiensi enzim yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah galaktosa dengan baik. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal recessive. Jika kedua orang tua memiliki gen galaktosemia, risiko anaknya menderita galaktosemia adalah sebesar 25% pada setiap kehamilan. Meski tidak menderita galaktosemia, anak dari kedua orang tua yang memiliki galaktosemia juga dapat menjadi pembawa gen (carrier) dengan risiko 50% (Succoio et al., 2022).

5. Penyakit Von Gierke

Merupakan salah satu jenis glikogenosis yang melibatkan defisiensi enzim yang diperlukan untuk pemecahan glikogen menjadi glukosa. Akibatnya, glikogen menumpuk dalam hati dan ginjal, menyebabkan masalah metabolik dan hepatomegali (pembesaran hati).

6. Penyakit McArdle

Merupakan jenis glikogenosis yang melibatkan defisiensi enzim yang terlibat dalam penguraian glikogen di dalam otot. Ini dapat menyebabkan kelelahan otot yang cepat selama aktivitas fisik.

Kelainan metabolisme karbohidrat seringkali membutuhkan manajemen khusus, terutama dalam hal diet. Penggunaan obat-obatan atau insulin juga dapat diperlukan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kelainan tersebut. Pemantauan dan manajemen yang baik dapat membantu mengelola gejala dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Individu dengan kelainan metabolisme karbohidrat seringkali memerlukan perawatan dan bimbingan dari tim kesehatan yang terdiri dari dokter, ahli nutrisi, dan ahli endokrinologi.

D. KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN METABOLISME PROTEIN

Kelainan atau gangguan penyakit yang disebabkan oleh kelainan metabolisme protein dikenal sebagai penyakit metabolisme protein. Metabolisme protein melibatkan pemecahan asam amino dan penggunaannya untuk sintesis protein yang diperlukan oleh tubuh. Gangguan dalam proses ini dapat mengakibatkan penumpukan zat-zat yang tidak normal atau kekurangan zat-zat penting dalam tubuh, menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Beberapa contoh penyakit metabolisme protein melibatkan kelainan dalam enzim atau jalur metabolisme tertentu. Berikut adalah beberapa contoh umum:

1. **Phenylketonuria (PKU):** Penderita PKU tidak dapat mencerna asam amino fenilalanin dengan baik karena kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan fenilalanin dalam darah, yang dapat menyebabkan kerusakan otak dan gangguan perkembangan mental.

Phenylketonuria disebabkan oleh mutasi genetik yang mengurangi atau bahkan menghilangkan produksi enzim fenilalanin hidroksilase, yang diperlukan untuk memecah asam amino fenilalanin. Akibatnya, fenilalanin menumpuk dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan otak serta komplikasi kesehatan lainnya. Kelainan genetik ini diturunkan secara autosomal resesif, yang berarti seseorang perlu mewarisi gen yang bermutasi dari kedua orangtuanya untuk mengembangkan PKU (Rubiyanti, 2019).

2. **Maple Syrup Urine Disease (MSUD):** adalah kelainan metabolisme yang disebabkan oleh kekurangan enzim yang diperlukan untuk pemecahan tiga jenis asam amino: leusin, isoleusin, dan valin. Penderita MSUD memiliki bau urine yang khas, mirip dengan sirup maple.
3. **Homocystinuria:** Kelainan ini melibatkan kelainan dalam metabolisme asam amino homosistein. Kekurangan enzim atau kelainan genetik dapat menyebabkan peningkatan kadar homosistein dalam darah, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan mata, masalah kardiovaskular, dan gangguan neuropsikiatrik.
4. **Alkaptonuria:** Penderita alkaptonuria memiliki kekurangan enzim yang diperlukan untuk pemecahan asam amino tirosin.

Hal ini menyebabkan penumpukan senyawa yang disebut homogentisic acid dalam tubuh, yang dapat menyebabkan perubahan warna pada kulit dan masalah sendi.

5. **Cystic Fibrosis:** Meskipun bukan penyakit metabolisme protein murni, cystic fibrosis melibatkan kelainan pada protein yang mengatur produksi lendir, keringat, dan cairan tubuh lainnya. Ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, pencernaan, dan infeksi berulang.

Setiap penyakit ini memiliki ciri-ciri klinis yang unik, dan pengelolaannya biasanya melibatkan diet khusus, suplementasi nutrisi, dan pengawasan medis yang ketat. Penanganan dini dan manajemen yang baik dapat membantu meminimalkan dampak negatifnya pada kesehatan.

E. KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN METABOLISME LEMAK

Beberapa kelainan atau gangguan penyakit yang terkait dengan kelainan metabolisme lemak melibatkan perubahan dalam pemrosesan, transportasi, atau penyimpanan lemak dalam tubuh. Berikut adalah beberapa kondisi kesehatan yang terkait dengan kelainan metabolisme lemak:

1. Hiperlipidemia

Hiperlipidemia adalah kondisi di mana terdapat peningkatan kadar lemak dalam darah, termasuk kolesterol dan trigliserida. Ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Hiperlipidemia merupakan kondisi ketidakseimbangan kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh jumlah kolesterol LDL yang terlalu banyak. Beberapa penyebab hiperlipidemia meliputi gaya hidup kurang sehat, obesitas, diabetes, gangguan hati, faktor genetik, dan pengaruh umur. Gaya hidup tidak sehat seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, kebiasaan merokok, terlalu sering mengonsumsi minuman beralkohol, dan malas berolahraga dapat meningkatkan risiko hiperlipidemia. Selain itu, hiperlipidemia juga bisa menjadi kondisi keturunan.

2. Hiperkolesterolemia Familial

Merupakan kelainan genetik yang menyebabkan tingginya kadar kolesterol dalam darah sejak usia muda, meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit jantung.

3. Hipertrigliseridemia Familial

Merupakan kelainan genetik yang menyebabkan peningkatan kadar trigliserida dalam darah, yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

4. Sindrom Metabolik

Kombinasi faktor risiko, termasuk obesitas abdominal, resistensi insulin, hipertensi, dan dislipidemia, yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes.

5. Penyakit Hati Lemak Nonalkoholik (NAFLD)

Penumpukan lemak di hati tanpa adanya konsumsi alkohol yang berlebihan, dapat berkembang menjadi kondisi lebih serius seperti nonalcoholic steatohepatitis (NASH) dan sirosis.

6. Xantomatosis

Kondisi di mana xantoma (benjolan kuning yang terbentuk oleh penumpukan lemak) muncul di kulit atau tendon, seringkali terkait dengan hiperlipidemia.

7. Sindrom Kearns-Sayre

Gangguan mitokondria yang dapat menyebabkan masalah metabolisme lemak dan energi.

8. Defisiensi Enzim Metabolisme Lemak

Misalnya, defisiensi lipoprotein lipase (LPL) atau defisiensi apolipoprotein, yang dapat menyebabkan hipertrigliseridemia.

9. Sindrom Wolman

Kelainan genetik langka yang menyebabkan akumulasi trigliserida dalam sel-sel, terutama di hati dan limpa.

10. Sindrom Alagille

Gangguan genetik yang dapat menyebabkan penumpukan asam empedu dan lemak di hati.

Setiap kondisi ini memiliki karakteristik dan gejala khusus, dan pengelolannya dapat melibatkan perubahan gaya hidup, obat-obatan, atau terapi khusus. Diagnosis dan perawatan sebaiknya dilakukan oleh profesional kesehatan setelah pemeriksaan menyeluruh (Natesan & Kim, 2021).

F. KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN METABOLISME ASAM AMINO

Kelainan atau gangguan penyakit akibat kelainan metabolisme asam amino melibatkan gangguan dalam proses pembentukan, penguraian, atau transportasi asam amino dalam tubuh. Berikut beberapa contoh kelainan atau penyakit yang terkait dengan

kelainan metabolisme asam amino (Aliu et al., 2018):

1. Phenylketonuria (PKU)

Phenylketonuria adalah kelainan genetik yang mengakibatkan tubuh tidak dapat menguraikan phenylalanine dengan baik. Akumulasi phenylalanine dapat merusak sistem saraf dan menyebabkan kerusakan otak, terutama pada bayi dan anak-anak.

2. Tirosinemia

Terdapat beberapa jenis tirosinemia, yang masing-masing disebabkan oleh kelainan pada enzim yang terlibat dalam metabolisme tirosin. Akumulasi tirosin dapat menyebabkan kerusakan organ, terutama hati dan ginjal.

3. Homocystinuria

Kelainan genetik yang menyebabkan akumulasi homocysteine dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan berbagai masalah kesehatan termasuk masalah mata, pembuluh darah, dan sistem saraf.

4. Maple Syrup Urine Disease (MSUD)

MSUD disebabkan oleh kelainan dalam pemecahan asam amino leusin, isoleusin, dan valin. Akibatnya, tubuh tidak dapat mengurai asam amino ini dengan benar, dan zat-zat beracun dapat berkumpul dalam darah dan urin.

5. Alkaptonuria

Merupakan kelainan genetik di mana tubuh tidak dapat mengurai homogentisic acid, menyebabkan penumpukan zat ini dalam jaringan dan cairan tubuh. Akumulasi ini dapat menyebabkan warna gelap pada urin dan masalah sendi.

6. Cystinuria

Kelainan yang menyebabkan akumulasi cystine dalam urine, yang dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal.

7. Argininemia

Kelainan genetik yang melibatkan defisiensi dalam enzim yang memecah asam amino arginine, dapat menyebabkan penumpukan arginine dalam darah.

8. Hyperprolinemia

Kelainan yang menyebabkan peningkatan kadar proline dalam darah dan dapat terkait dengan masalah neurologis.

9. Ornithine Transcarbamylase (OTC) Deficiency

Kelainan genetik yang terkait dengan defisiensi enzim OTC, yang penting untuk metabolisme urea. Akumulasi amonia dalam darah dapat menyebabkan kerusakan otak.

10. Histidinemia

Kelainan genetik yang terkait dengan peningkatan kadar histidine dalam darah, meskipun dampak klinisnya seringkali lebih ringan dibandingkan dengan kelainan lainnya.

11. Albinisme

Albinisme adalah kelainan bawaan yang menyebabkan hipopigmentasi atau tidak adanya pigmentasi hanya pada mata atau kombinasi kulit, mata, dan rambut. Albinisme menyebabkan kelainan refraksi, nistagmus, penurunan ketajaman penglihatan, kelainan transiluminasi iris, strabismus, fundus albino, dan persilangan serabut saraf yang tidak normal.

Gambar 10.2 Albinisme dengan Atrofi *Chorioretinal* Difusi



Sumber : Jurnal Caspian Journal of Neurological Sciences, VOL 6
NO 22

Pengelolaan kelainan metabolisme asam amino sering melibatkan diet khusus, suplementasi, dan pemantauan kesehatan secara rutin. Diagnosis dan perawatan harus dilakukan oleh profesional kesehatan yang berpengalaman dalam genetika atau spesialis metabolisme.

REFERENCE

- Aliu, E., Kanungo, S., & Arnold, G. L. (2018). *Amino acid disorders*. 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.21037/atm.2018.12.12>
- Aumiller, W. D., & Dollahite, H. A. (2015). *of diabetic foot ulcers*. 28(5).<https://doi.org/10.1097/01.JAA.0000464276.44117.b1>
- Lestari, Zulkarnain, A. S. (2021). *Diabetes Melitus: Review Etiologi , Patofisiologi , Gejala , Penyebab , Cara Pemeriksaan , Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan*. November, 237–241.
- Medghalchi, A., Rad, A. H., Soltani-moghadam, R., & Dalili, S. (2020). *The Effect of Amino Acid, Carbohydrate, and Lipid Metabolism Disorders on Eyes*. 6(3), 190–196.
- Natesan, V., & Kim, S. (2021). *Lipid Metabolism , Disorders and Therapeutic Drugs – Review*. 29(6), 596–604.
- Rubiyanti, R. (2019). *Farmaka Farmaka*. 17, 75–88.
- Succoio, M., Sacchetti, R., Rossi, A., Parenti, G., & Ruoppolo, M. (2022). *Galactosemia : Biochemistry , Molecular Genetics , Newborn Screening , and Treatment*. 1–14.

PROFIL PENULIS

Ida Ayu Suci, S.Pd., M.Si.

Penulis akrab dipanggil dengan nama Ayu, lahir di Kota Mempawah, Kalimantan Barat. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Pendidikan Kimia di Universitas Tanjungpura angkatan 2006, kemudian melanjutkan studi Magister Kimia di Institut Pertanian Bogor (IPB) angkatan 2013. Selama mengemban ilmu di IPB, penulis aktif dalam organisasi IMAPASKA IPB. Selain itu penulis juga aktif mengikuti organisasi Gita Swara Pascasarjana IPB. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Panca Bhakti. Penulis juga aktif sebagai tutor di Universitas Terbuka. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif menulis jurnal ilmiah, menjadi pembicara di berbagai seminar internasional, terlibat di berbagai organisasi keprofesian maupun organisasi kemasyarakatan serta pernah terlibat sebagai juri dalam beberapa lomba terkait keilmuan kimia.



PENUTUP

Kami Tim Penulis Buku

BIOKIMIA FARMASI

Dr. apt. Muntasir, S.Si., M.Si.

Apt. Andi Ifriany Harun, S.Si., M.Si.

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.

Dr. Tahirah Hasan, S.Si., M.Si.

Apt. Warsidah, S.Si., M.Si.

Gustria Ernis, S. Pd., M. Si.

Dr. Sofi Siti Shofiyah.

Marwati, S.Farm., M.Si.

Apt. Muhtaromah, S.Si., Sp.FRS.

Ida Ayu Suci, S.Pd., M.Si.

Mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatan buku ini dan semoga suatu saat kami bisa melanjutkan tulisan kami di edisi selanjutnya dengan tema buku yang sama ataupun berbeda.

Ilmu biokimia merupakan bagian dari kelompok ilmu biomedik. Penerapan ilmu ini pada kefarmasian berfokus pada pemahaman tentang enzim dan Koenzim, oksidasi biologi, nutrisi pada manusia, karbohidrat, asam amino, purin pirimidin, lemak serta hormone dan peranannya dalam metabolisme. Biokimia farmasi adalah cabang biokimia yang mempelajari bagaimana molekul dalam tubuh berinteraksi dengan obat. Ini menyelidiki sifat pengikatan antara obat dan reseptor dan mekanisme seluler kerja obat. biokimia farmasi digunakan untuk mengembangkan obat dan pengobatan yang lebih baik untuk berbagai penyakit dan kondisi. Hal ini juga penting untuk memahami penyebab reaksi merugikan dan toksisitas obat, serta memberikan informasi untuk pengembangan sistem penghantaran obat yang lebih baik. Biokimia farmasi sangat penting untuk meningkatkan kesehatan manusia, karena merupakan inti dari pemahaman dan pengembangan pengobatan yang dapat meningkatkan kehidupan

Buku ini membahas tentang:

BAB 1 PENTINGNYA MEMPELAJARI BIOKIMIA, MOLEKUL PENYUSUN KEHIDUPAN, DAN PERAN PENTING DALAM KEHIDUPAN.

BAB 2 BIOENERGETIKA

BAB 3 BIOSITESIS KARBOHIDRAT

BAB 4 BIOSINTESIS ASAM AMINO DAN NUKLEOTIDA

BAB 5 PROTEIN

BAB 6 ENZIM

BAB 7 METABOLISME KARBOHIDRAT

BAB 8 METABOLISME LEMAK, METABOLISME LEMAK TAK JENUH, DAUR UREA, DAN APLIKASI HDL DAN LDL

BAB 9 METABOLISME TERINTEGRASI

BAB 10 KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN METABOLISME KARBOHIDRAT, PROTEIN, LEMAK DAN ASAM AMINO



PENERBIT
CV RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA
Jl. Batara Ugi/Griya Astra Blok C. No.18
(Yogyakarta/Makassar)
Telp/Wa:085242065812
Email: rizmediapustaka@gmail.com
Website: rizmediapustakaindonesia.com



IKAPI
035/SSL/2022