



# PRODUKSI ENZIM DARI SERANGGA

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si



Editor : Dr. Santi., S.Si.,M.Si

# PRODUKSI ENZIM DARI SERANGGA

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si

**PENERBIT**



2024



## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PRODUKSI ENZIM DARI SERANGGA

Ukuran unesco (15,5 x 23 cm )  
Halaman : vi + 97  
Isbn : 978-623-8050-53-6  
Penulis : Dr. Maswati Baharuddin, S.Si, M.Si  
Editor : Dr. Santi.,S.Si.,M.Si  
Layout &  
Desain Cover :Tim creative Rizmedia

## RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA

Redaksi :

Jl. Batara Ugi Blok/Griya Astra Blok C. No.18  
(Yogyakarta/Makassar)  
IKAPI : 035/SSL/2022  
Telp/Wa:085242065812

Email:[rizmediapustaka@gmail.com](mailto:rizmediapustaka@gmail.com)

Website : [www.rizmediapustakaindonesia.com](http://www.rizmediapustakaindonesia.com)

**Cetakan Pertama, Maret 2024**

Hak Cipta 2024 @Rizmedia Pustaka Indonesia  
*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras  
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*



# PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini adalah sebagai bentuk *sharing* ilmu dan wujud nyata dari karya penulis yang tertuang dalam sebuah buku yang berjudul “**PRODUKSI ENZIM DARI SERANGGA**”.

Buku ini membahas mengenai potensi enzim yang dihasilkan dari larva, sebuah topik yang menarik dan menjanjikan dalam pengembangan sumber daya hayati. Enzim dari larva memiliki berbagai kegunaan, salah satunya sebagai biopestisida yang ramah lingkungan dalam mengendalikan hama tanaman. Selain itu, enzim dari larva juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, seperti industri makanan dan farmasi. Buku ini mencakup penjelasan tentang berbagai jenis enzim yang dihasilkan oleh larva, metode ekstraksi enzim, dan aplikasi enzim dalam pengendalian hama tanaman. Buku ini juga membahas teknologi formulasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk berbasis enzim, seperti cair, serbuk, dan nanopartikel. Pengetahuan dan informasi yang terdapat dalam buku ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para peneliti dan praktisi dalam mengembangkan enzim dari larva sebagai sumber daya hayati yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pemikiran bagi pembaca untuk melakukan riset dan pengembangan lebih lanjut tentang potensi enzim dari larva.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Semoga buku ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para pembaca.

**PENULIS**


# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB 1 Pendahuluan .....	1
BAB 2 LARVA SEBAGAI SUMBER ENZIM .....	5
A. DESKRIPSI TENTANG LARVA .....	6
B. JENIS DAN SUMBER LARVA UNTUK INDUSTRI .....	7
C. KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN LARVA SEBAGAI SUMBER ENZIM .....	12
D. JENIS LARVA DAN ORDO YANG MAMPU MENGHASILKAN ENZIM .....	14
BAB 3 PROSES EKSTRAKSI ENZIM DARI LARVA .....	24
A. METODE EKSTRAKSI DARI TUBUH LARVA .....	25
B. METODE ISOLASI DARI MIKROBA SIMBION .....	27
BAB 4 ENZIM YANG DAPAT DIEKSTRAK DARI LARVA.....	30
A. ENZIM PROTEASE.....	31
B. ENZIM AMILASE .....	33
C. ENZIM LIPASE.....	37
D. ENZIM SELULASE.....	39
E. ENZIM LIGNASE.....	49
BAB 5 STRUKTUR MOLEKUL, KOMPONEN PENYUSUNAN SERTA MEKANISME KERJA ENZIM .....	56
A. STRUKTUR MOLEKUL ENZIM.....	57
B. KOMPONEN PENYUSUN ENZIM.....	60
C. MEKANISME KERJA ENZIM .....	62
BAB 6 PRODUKSI ENZIM .....	67
A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERJA ENZIM .....	68
B. KARAKTERISASI ENZIM.....	73



C. PEMURNIAN ENZIM .....	74
D. PRODUKSI ENZIM DALAM SKALA LABORATORIUM .....	75
E. IMOBILISASI ENZIM .....	77
F. PRODUKSI ENZIM .....	79
BAB 7 APLIKASI ENZIM DARI LARVA .....	80
A. PENGGUNAAN ENZIM PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN .....	81
B. PENGGUNAAN ENZIM INDUSTRI FARMASI .....	82
C. PENGGUNAAN ENZIM INDUSTRI TEKSTIL .....	83
D. PENGOLAHAN LIMBAH .....	85
E. PENGGUNAAN ENZIM PADA PRODUKSI BIOENERGI .....	87
F. BIOPESTISIDA .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	95
BIOGRAFI PENULIS .....	97





# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan bioteknologi pada berbagai bidang semakin pesat, khususnya bioteknologi yang menggunakan enzim. Enzim adalah protein yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam sel dan juga membantu mengubah substrat menjadi produk. Enzim mempunyai peran yang sangat penting dalam proses metabolisme dan menjaga keseimbangan kimia dalam tubuh. Dalam semua proses dalam tubuh makhluk hidup dibantu, reaksi yang terjadi dibantu oleh enzim.

Kebutuhan akan pentingnya enzim diperlukan pada berbagai industri seperti industri makanan dan minuman, industri farmasi, serta pemanfaatan dan pengolahan limbah yang bersumber dari limbah pertanian dan Perkebunan. Limbah ini memiliki komponen senyawa organik yang masih dimanfaatkan.

Enzim dapat membantu proses metabolisme. Enzim merupakan katalisator biologis yang membantu mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. Enzim bertanggung jawab untuk memecah molekul makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana, seperti karbohidrat, protein, dan lemak, sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi yang dibutuhkan.

Pada bidang energi dalam produksi energi. Enzim juga berperan penting dalam produksi energi dalam tubuh. Salah satu contoh adalah enzim ATP synthase, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ATP (adenosine triphosphate), molekul yang menyimpan energi dalam tubuh.

Dalam bidang industri enzim memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai industri seperti farmasi, makanan, tekstil, dan lain-lain. Enzim digunakan dalam produksi obat-obatan, makanan, minuman, dan produk-produk lainnya. Penerapan enzim pada industri ini dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya produksi, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas.

Penerapan enzim pada proses industri dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Sebagai contoh, dalam industri tekstil, penggunaan enzim pada proses pemutihan dapat mengurangi jumlah bahan kimia yang dibutuhkan, sehingga ramah lingkungan dan



menghasilkan produk yang lebih berkualitas.

Secara umum enzim dapat dimodifikasi secara genetik. Enzim dapat dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan kinerjanya atau untuk membuat enzim baru dengan fungsi tertentu. Modifikasi enzim secara genetik dapat membantu menghasilkan enzim yang lebih efektif dan dapat digunakan pada berbagai aplikasi industri.

Enzim juga bermanfaat dalam pengobatan. Enzim juga memiliki peran penting dalam pengobatan. Beberapa jenis enzim, seperti enzim protease dan lipase, digunakan dalam produksi obat-obatan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit, seperti diabetes, kanker, dan gangguan pencernaan.

Sumber enzim berasal dari semua makhluk hidup. Karena sebagian besar atau keseluruhan makhluk hidup mengalami proses metabolisme. Setiap tahap dalam proses metabolisme akan membutuhkan enzim. Berdasarkan hal ini enzim juga dapat diproduksi dari larva.

Larva merupakan salah satu stadium pertumbuhan dalam metamorphosis dan daur hidup serangga. Pada proses tersebut juga menghasilkan enzim yang membantu mereka beradaptasi dan bertahan hidup. Beberapa enzim yang ditemukan dalam larva termasuk protease, lipase, dan amilase, selulase, lignase dan kitinase.

Enzim pada larva juga berperan penting dalam proses metamorfosis, di mana larva berubah menjadi serangga dewasa. Beberapa enzim membantu memecah jaringan larva dan membentuk jaringan baru seiring dengan perubahan bentuk dan fungsi tubuh.

Secara umum enzim pada larva dapat membantu larva beradaptasi dan bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan energinya selama proses pertumbuhan dan perkembangan menuju fase atau stadium selanjutnya yaitu pupa atau kepompong.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk pencarian sumber enzim-enzim baru yang berasal dari larva. Mengingat kebutuhan enzim diberbagai bidang seperti industry makanan dan minuman, industry farmasi dan juga untuk penggunaan yang lain.

Buku produksi enzim dari larva memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan wawasan tentang bagaimana enzim dapat diproduksi dari larva dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu pembaca yang berasal dari mahasiswa atau kalangan peneliti untuk memahami cara atau proses isolasi enzim dari larva, produksi enzim dari larva, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Buku ini juga dapat membantu pembaca memahami bagaimana enzim yang dihasilkan dari larva dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti industri pangan, farmasi, dan kimia. Dengan demikian, buku tentang produksi enzim dari larva memiliki tujuan untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang produksi enzim dari larva.

Enzim merupakan senyawa organik yang membantu mempercepat reaksi dalam sel. Kebutuhan akan enzim yang stabil, mendorong para ilmuwan untuk mencari sumber enzim baru dari organisme hidup. Salah satu organisme hidup yang paling berpotensi menghasilkan enzim adalah larva.

Beberapa serangga telah berevolusi menggunakan substrat seperti lignoselulosa, selulosa, hemiselulosa, amilum, protein dan lipase sebagai sumber makanan, sehingga menjadi salah satu alternatif sumber daya yang baik untuk menghasilkan enzim baru.

Buku produksi enzim larva merupakan buku yang mengkaji tentang larva sebagai sumber enzim. Larva merupakan salah satu tahap atau fase perkembangan dari serangga. Pada tahap ini merupakan tahap penting untuk bermetamorfosis menjadi organisme dewasa. Kebanyakan larva hidup mempunyai tempat hidup yang berbeda. Tempat hidup dari larva, biasanya juga dijadikan sebagai sumber makanannya.

Pada buku ini dibahas tentang bagaimana potensi dari berbagai jenis larva dalam menghasilkan enzim. Setiap spesies larva akan menghasilkan jenis dan aktifitas enzim yang berbeda.





**BAB 2**  
**LARVA SEBAGAI SUMBER**  
**ENZIM**

## A. DESKRIPSI TENTANG LARVA

Larva adalah tahap awal dalam perkembangan suatu hewan bertulang belakang (vertebrata) atau hewan berkulit (invertebrata). Pada tahap ini, hewan belum memiliki bentuk dan fungsi organ yang jelas seperti pada dewasa. Larva biasanya memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk dewasa dan memiliki struktur tubuh yang sederhana. Mereka dapat hidup di air atau darat dan bertahan hidup dengan cara mencari makan. Beberapa hewan, seperti serangga dan ikan, memiliki tahap larva sebelum mengalami metamorfosis menjadi bentuk dewasa. Tahap larva ini penting karena membantu hewan untuk berkembang dan bertahan hidup sebelum mencapai bentuk dewasa.

Secara umum, larva dapat dikenali dari bentuk tubuh yang berbeda, tipe makanannya, dan kemampuan untuk bergerak dan bertahan hidup. Masing-masing hewan memiliki tahap larva yang unik dan berbeda-beda, namun mereka memiliki satu tujuan yang sama yaitu membantu hewan tersebut untuk berkembang dan bertahan hidup.

Larva merupakan tahap pertumbuhan dalam kehidupan suatu organisme yang biasanya berbeda dalam bentuk dan fungsi dari tahap yang lebih dewasa. Dalam banyak kasus, bagian tubuh dari larva berkembang dan mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan individu.

Bagian-bagian dasar dari tubuh larva termasuk kepala, thorax, dan abdomen. Kepala biasanya memiliki mata, mulut, dan antena yang berfungsi untuk percepatan dan navigasi. Thorax memiliki sayap dan kaki yang digunakan untuk bergerak dan mempertahankan diri. Abdomen memiliki organ pencernaan dan pernapasan.

Bagian tubuh larva juga memiliki alat yang unik yang bergantung pada jenis dan habitatnya, seperti ekor, sayap, dan kaki yang memiliki bentuk yang khas. Ada juga bagian tubuh seperti trachea, trakea, dan saluran pencernaan yang membantu dalam proses pernapasan dan pencernaan makanan.

Selain itu, beberapa larva juga memiliki sistem saraf dan hormon yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.



Sistem saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang membantu dalam pengendalian dan koordinasi gerakan. Hormon membantu dalam mengatur tingkat pertumbuhan dan perkembangan tubuh.

Dalam produksi enzim dari larva, bagian tubuh yang dipakai dalam proses produksi biasanya bergantung jenis enzim yang ingin diproduksi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian dan memahami bagian tubuh larva untuk memastikan hasil produksi yang optimal.

Berbagai bagian tubuh dari larva dapat berpotensi menghasilkan enzim. Enzim dapat diproduksi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel usus, sel hati, dan sel-sel penghasil enzim lainnya. Dalam banyak kasus, enzim yang diproduksi oleh larva dapat ditemukan pada bagian-bagian seperti usus, hati, dan juga saluran pencernaan. Enzim yang diproduksi oleh larva dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, seperti amilase, protease, kitinase, dan lignase. Masing-masing enzim memiliki tugas dan mekanisme kerja yang berbeda, dan diproduksi oleh bagian tubuh yang berbeda pula.

Sebagai contoh, protease diproduksi oleh sel-sel yang terkait dengan pencernaan, seperti sel-sel dalam usus. Kitinase diproduksi oleh sel-sel pencernaan yang berhubungan dengan pengolahan kitin. Lignase diproduksi oleh sel-sel yang terkait dengan proses fermentasi.

## **B. JENIS DAN SUMBER LARVA UNTUK INDUSTRI**

Serangga yang dapat berubah menjadi larva disebut sebagai serangga holometabolik. Serangga holometabolik merupakan salah satu jenis serangga yang memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Holometabolik berasal dari bahasa Yunani yaitu “halos” yang berarti keseluruhan dan “metabole” berarti perubahan. Serangga ini memiliki tahap pertumbuhan yang meliputi tahap larva, pupa, dan dewasa. Berikut adalah beberapa klasifikasi serangga holometabolik:

### **1. Lebah**

Lebah termasuk dalam ordo Hymenoptera dan memiliki tahap pertumbuhan sebagai larva berupa larva lebah. Larva lebah memiliki bentuk seperti gurita berwarna putih dengan ukuran 5

mm-2 cm, tubuh lebar dan pipih, bagian depan membulat dan bagian belakang runcing. Larva lebah membutuhkan waktu 5-6 hari untuk berubah menjadi lebah dewasa. Larva lebah berperan sebagai calon pekerja dan melindungi koloni dari serangan musuh alami seperti predator, tawon dan laba-laba.



**Gambar 1.** Larva Lebah

2. Kupu-kupu dan serangga terbang lainnya

Kupu-kupu termasuk dalam ordo Lepidoptera dan memiliki tahap pertumbuhan sebagai larva berupa ulat kupu-kupu. Berbentuk gulung atau memanjang dan badan berwarna hijau, coklat atau hitam tergantung jenis kupu-kupunya. Memiliki kulit keras, sangat aktif dan memiliki kapasitas makan yang besar. Setelah beberapa minggu larva ini berubah menjadi pupa.



**Gambar 2.** Larva Kupu-kupu

3. Kumbang

Kumbang termasuk dalam ordo Coleoptera dan memiliki tahap pertumbuhan sebagai larva berupa larva kumbang. Memiliki bentuk lebih pipih dan memanjang. Bagian depan larva lebih besar dari bagian belakang. Memiliki warna hijau, cokelat atau hitam. Aada beberapa yang memiliki tentakel berfungsi untuk mempertahankan



diri dari predator.



**Gambar 3.** Larva Kumbang

#### 4. Lalat

Lalat termasuk dalam ordo Diptera dan memiliki tahap pertumbuhan sebagai larva berupa maggot atau kutu. Memiliki warna tubuh putih atau kelabu. Tubuh bagian depan lebih besar dari bagian belakang, dua mata berseberangan



**Gambar 4.** Larva Lalat

#### 5. Serangga air

Serangga air termasuk dalam ordo Ephemeroptera, Plecoptera, dan Trichoptera dan memiliki tahap pertumbuhan sebagai larva berupa nymph atau nimfa.



**Gambar 5.** Larva Serangga Air

Berdasarkan pola hidup dari larva yang memanfaatkan sumber bahan organik yang ada disekitarnya seperti selulosa, amilosa, lipida dan yang lain, sehingga hal inilah yang menyebabkan larva ini mampu menghasilkan enzim. Berikut larva sebagai sumber enzim yang digunakan untuk industri:

1. Silkworm (*Bombyx mori*): Larva ini sering digunakan sebagai sumber amilase dan protease. Amilase digunakan untuk mengubah pati menjadi gula sederhana, sedangkan protease digunakan untuk memecah protein. Silkworm adalah larva dari ulat sutera memiliki tubuh yang bulat dan lentur dengan warna kuning dan hijau kehijauan. Larva ini mengonsumsi daun mulberry. Setelah beberapa minggu akan mengalami perubahan bentuk menjadi pupa.



**Gambar 6.** Larva Silkworm

2. Larva lobster (*Homarus americanus*): Larva lobster sering digunakan sebagai sumber chitinase, enzim yang digunakan untuk memecah chitin, sebuah polisakarida yang terdapat pada ekor dan cangkang hewan laut. Memiliki bentuk tubuh yang ramping dan panjang dengan sayap transparan untuk berenang. Memerlukan



makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan dengan mengonsumsi plankton dan mikroorganisme laut. Memiliki pertahanan alami dengan perubahan warna tubuh dan pertumbuhan diri



**Gambar 7.** Larva lobster

3. Larva black soldier fly (*Hermetia illucens*): Larva ini digunakan sebagai sumber lipase, enzim yang digunakan untuk memecah lemak. Berperan sebagai pemakan sampah dan pemutus rantai makanan. Larva ini memiliki ukuran tubuh relatif besar dengan panjang 1-2 cm, memiliki warna hitam atau coklat gelap dengan sayap transparan dan dua sayap.



**Gambar 8.** Larva lobster

4. Larva maggot (*Lucilia sericata*): Larva ini digunakan sebagai sumber protease dan chitinase, yang digunakan untuk memecah protein dan chitin. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan tahap awal. Dalam perkembangan sejumlah species serangga termasuk lalat dan lalat ulat memiliki tubuh tanpa sayap. Larva maggot biasanya memakan makanan yang berlimpah dan memperoleh nutrisi untuk tubuh dan berkembang menjadi serangga dewasa. Keunggulan membuat cocok sebagai sumber karena kecepatan reproduksi,

efisien pemakaian bahan baku, kondisi lingkungan, fleksibel (dapat berkembang biak pada suhu dan kelembapan) sehingga memudahkan produksi enzim. Larva ini mempunyai kemampuan menghasilkan enzim yang berkualitas.



**Gambar 9.** Larva Maggot

Larva jenis ini memiliki kelebihan sebagai sumber enzim karena mereka dapat diproduksi secara massal, memiliki efisiensi tinggi dalam menghasilkan enzim, dan mudah dalam penanganan dan pemeliharaan. Selain itu, beberapa jenis larva juga dapat diterapkan pada sistem pengolahan sampah dan limbah, sehingga mengurangi beban lingkungan dan memanfaatkan sampah sebagai sumber bahan baku enzim.

### **C. KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN LARVA SEBAGAI SUMBER ENZIM**

Larva dari serangga umumnya merupakan hama bagi tanaman. Larva ini biasanya menjadikan bagian tanaman seperti batang, daun sebagai sumber makanannya. Hal ini terjadi karena pada batang pohon dan daun mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Komponen bahan tersebut dapat dijadikan larva sebagai sumber energi.

Beberapa keuntungan dari penggunaan larva sebagai sumber enzim, di antaranya:

#### **1. Efisiensi produksi**

Larva memiliki tingkat produksi enzim yang tinggi dan dapat diproduksi secara massal, sehingga mempermudah proses produksi



enzim dan mengurangi biaya produksi. Karena kecepatan reproduksi sehingga memungkinkan produksi besar, efisien bahan baku, dan kondisi lingkungan fleksibel.

## 2. Kemampuan menghasilkan berbagai jenis enzim

Beberapa jenis larva dapat menghasilkan berbagai jenis enzim seperti amilase, protease, lipase, selulase, lignase dan chitinase. Hal inilah yang membuat larva menjadi sumber enzim yang berkualitas dan berkhasiat. Dalam satu jenis larva berpotensi menghasilkan beberapa jenis enzim yang berbeda yang mempunyai karakter dan aktifitas yang berbeda.

## 3. Kemampuan memanfaatkan limbah.

Beberapa jenis larva dapat digunakan sebagai sumber makan dari limbah organik, sehingga mengurangi beban lingkungan dan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku enzim. Potensi limbah yang berbeda akan membutuhkan enzim yang berbeda. Limbah lignoselulosa akan membutuhkan enzim lignase dan selulase dalam proses penguraian dan dergadasinya.

## 4. Kemudahan penanganan dan pemeliharaan

Larva memiliki tingkat kemudahan dalam penanganan dan yang tinggi, sehingga mempermudah proses produksi enzim. Larva mudah tumbuh pada sumber makanan yang sesuai, sehingga mudah untuk dikembang biakkan. Pada proses pertumbuhan dan pengembang biakannya juga membutuhkan lingkungan yang fleksibel.

## 5. Ramah lingkungan

Produksi enzim menggunakan larva lebih ramah lingkungan dan tidak memerlukan bahan kimia berbahaya seperti pada proses produksi enzim dengan menggunakan mikroba.

Dengan menggunakan larva sebagai sumber enzim, dapat membantu memenuhi kebutuhan enzim yang tinggi dan mempermudah proses produksi enzim dengan efisiensi dan ramah lingkungan.

## D. JENIS LARVA DAN ORDO YANG MAMPU MENGHASILKAN ENZIM

### 1. Protease

Enzim protease merupakan enzim yang membantu proses hidrolisis dari protein menjadi asam-asam amino bebas. Asam amino ini yang akan diserap oleh tubuh makhluk hidup untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan.

Protein adalah merupakan salah satu polimer (polipeptida) yang tersusun dari asam amino. Fungsi protein bagi makhluk hidup adalah untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Berikut spesies dan ordo larva yang mampu menghasilkan protease:

#### a. Larva dermestidae (*ordo Coleoptera*)

Larva ini memakan kulit, bulu, serat dan bahan organik lain seperti tumbuhan mati dan bahan pakan kasar. dikenal sebagai ulat tanduk atau ulat rambut memiliki tubuh pipih dan bulat, dengan warna abu-abu kehitaman dan memiliki *setae* (rambut halus) yang tersebar diseluruh tubuh.

#### b. Larva Diptera (*ordo Diptera*)

Dikenal sebagai ulat lalat seperti lalat, tawon, kutu. Umumnya memiliki tubuh berongga dan memiliki beberapa ujung bersisik atau berduri. Memiliki kemampuan untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk berkembang biak.

#### c. Larva blattodea

Memiliki tubuh yang pipih dan bulat, dengan warna yang beragam dari putih ke abu-abu. Mereka memiliki beberapa *setae* (rambut halus) yang tersebar di seluruh tubuh dan memiliki kemampuan untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Tungau rumah dan tungau terbang sangat penting sebagai hama bagi industri rumah tangga dan perhotelan, karena dapat memakan bahan-bahan seperti bahan pakan, buah-buahan, dan sayuran. Tungau kayu juga dapat memakan bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti kayu, buku, dan bahan lainnya.



d. Larva hymenoptera

Memiliki tubuh yang berongga dan memiliki beberapa ujung bersisik atau berduri. Mereka memiliki kemampuan untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa jenis Hymenoptera, seperti lebah, sangat penting bagi industri pertanian dan perkebunan, karena dapat membantu dalam proses polinasi dan memproduksi hasil-hasil seperti madu, propolis, dan royal jelly. Beberapa jenis lain, seperti tawon dan belalang, digunakan sebagai agent pengendalian hama bagi beberapa jenis tanaman dan serangga.

e. Larva lepidoptera

Lepidoptera adalah keluarga serangga yang sangat besar dan meliputi sejumlah besar jenis serangga seperti kupu-kupu, ulat bulu, dan lalat bulu. Larva Lepidoptera memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi umumnya memiliki tubuh yang panjang dan berbulu, dengan warna yang beragam dari hijau ke abu-abu. Mereka memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) dan memiliki kemampuan untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang.

f. Larva mantodean

Larva Mantodea memiliki bentuk yang unik dan beragam, dengan tubuh berbentuk seperti tongkat dan sering memiliki warna hijau atau abu-abu. Mereka memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) dan memiliki kemampuan untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Larva Mantodea biasanya memakan serangga lain seperti lalat dan belalang

g. Larva Orthoptera

Memiliki bentuk yang beragam, dengan tubuh yang panjang dan berbulu, dan memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Larva Orthoptera biasanya memakan tanaman, serangga lain, dan rumput.

h. Larva Phasmatodea

Memiliki bentuk yang unik dan beragam, dengan tubuh yang berbulu dan memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Larva Phasmatodea biasanya memakan serangga lain seperti lalat dan belalang

i. Larva Plecoptera

Memiliki bentuk yang khas, dengan tubuh yang berbulu dan memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Mereka biasanya memakan bahan organik yang terdapat di dalam air, seperti mikroba dan serangga lain.

j. Larva Trichoptera

Memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, dengan sayap tipis dan transparan. Mereka memiliki dua pasang sayap yang berbeda ukuran dan bentuk, yang memungkinkan mereka untuk terbang dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

k. Larva Trichoptera

Memiliki bentuk yang khas, dengan tubuh berbulu dan memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Mereka biasanya memakan bahan organik yang terdapat di dalam air, seperti mikroba dan serangga lain.

- Larva Blattodea (*ordo Blattodea*)
- Larva Hymenoptera (*ordo Hymenoptera*) : serangga berparuh
- Larva Lepidoptera (*ordo Lepidoptera*) : kupu-kupu dan ulat



bulu

- Larva Mantodea (*ordo Mantodea*)
- Larva Orthoptera (*ordo Orthoptera*) : belalang, gurug
- Larva Phasmatodea (*ordo Phasmatodea*) : belalang kayu
- Larva Plecoptera (*ordo Plecoptera*) : jangkrik air
- Larva Trichoptera (*ordo Trichoptera*)

Larva Diptera seperti *Musca domestica* (lalat rumah) dan *Hermetia illucens* (lalat hitam) telah ditemukan menghasilkan tingkat protease yang cukup tinggi. Larva serangga ini sering digunakan sebagai bahan pakan bagi ternak dan juga digunakan dalam produksi enzim protease untuk aplikasi industri seperti pengolahan pakan ternak, produksi pangan, dan produksi bioenergi.

Secara umum, jenis serangga yang paling tinggi menghasilkan protease akan bervariasi tergantung pada faktor lingkungan, seperti suhu, ketersediaan makanan, dan kondisi lingkungan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan spesies serangga yang paling tepat dan efisien dalam menghasilkan protease.

Spesies serangga yang dikenal memiliki potensi tinggi dalam menghasilkan protease adalah:

- Larva Diptera seperti *Musca domestica* (lalat rumah) dan *Hermetia illucens* (lalat hitam).
- Larva Blattodea seperti *Periplaneta americana* (nyamuk rumah) dan *Blatta orientalis* (nyamuk hitam).
- Larva Coleoptera seperti *Tenebrio molitor* (ulat gahan) dan *Alphitobius diaperinus* (ulat kain).
- Larva Hymenoptera seperti *Spodoptera litura* (ulat buah).

## 2. Amilase

Amilase adalah merupakan salah satu enzim yang dapat memecah atau menghidrolisis pati menjadi molekul yang lebih sederhana seperti dextran, maltose dan glukosa. Glukosa merupakan

bahan atau sumber energi bagi semua organisme hidup. Dalam proses glikolisis energi diperoleh dari pemecahan glukosa menjadi asam piruvat.

Berikut adalah beberapa spesies dan ordo larva yang mampu menghasilkan amilase:

- Larva dermestidae (*ordo Coleoptera*)
- Larva Diptera (*ordo Diptera*)
- Larva Blattodea (*ordo Blattodea*)
- Larva Hymenoptera (*ordo Hymenoptera*)
- Larva Lepidoptera (*ordo Lepidoptera*)
- Larva Mantodea (*ordo Mantodea*)
- Larva Orthoptera (*ordo Orthoptera*)
- Larva Phasmatodea (*ordo Phasmatodea*)
- Larva Plecoptera (*ordo Plecoptera*)
- Larva Trichoptera (*ordo Trichoptera*)

Beberapa studi menunjukkan bahwa larva Diptera seperti *Musca domestica* (lalat rumah) dan *Hermetia illucens* (lalat hitam) memiliki potensi untuk menghasilkan tingkat amilase yang tinggi. Larva serangga ini sering digunakan sebagai bahan pakan bagi ternak dan juga digunakan dalam produksi enzim amilase untuk aplikasi industri seperti pengolahan pakan ternak, produksi pangan, dan produksi bioenergi.

Beberapa spesies serangga yang dikenal memiliki potensi tinggi dalam menghasilkan amilase adalah:

- A. Larva Diptera seperti *Musca domestica* (lalat rumah) dan *Hermetia illucens* (lalat hitam).
- B. Larva Coleoptera seperti *Tenebrio molitor* (ulat gahan).
- C. Larva Blattodea seperti *Periplaneta americana* (nyamuk rumah) dan *Blatta orientalis* (nyamuk hitam).
- D. Larva Hymenoptera seperti *Spodoptera litura* (ulat buah).

### 3. Lipase



Enzim lipase merupakan enzim yang digunakan untuk mendegradasi lipida atau lemak menjadi komponen yang lebih sederhana seperti asam lemak. Enzim lipase ini juga berperan penting dalam menghasilkan energi. Lemak atau lipida merupakan senyawa non polar yang berfungsi sebagai sumber energi bagi makhluk hidup.

Berikut adalah beberapa spesies dan ordo larva yang mampu menghasilkan lipase:

- Larva dermestidae (*ordo Coleoptera*)
- Larva Diptera (*ordo Diptera*)
- Larva Blattodea (*ordo Blattodea*)
- Larva Hymenoptera (*ordo Hymenoptera*)
- Larva Lepidoptera (*ordo Lepidoptera*)
- Larva Mantodea (*ordo Mantodea*)
- Larva Orthoptera (*ordo Orthoptera*)
- Larva Phasmatodea (*ordo Phasmatodea*)
- Larva Plecoptera (*ordo Plecoptera*)
- Larva Trichoptera (*ordo Trichoptera*)
- Larva Siphonaptera (*ordo Siphonaptera*)
- Larva Thysanoptera (*ordo Thysanoptera*)
- Larva Neuroptera (*ordo Neuroptera*)
- Larva Isoptera (*ordo Isoptera*)
- Larva Odonata (*ordo Odonata*)

Penelitian menunjukkan bahwa larva dari berbagai spesies dan ordo ini mampu menghasilkan lipase dengan tingkat yang berbeda-beda. Lipase yang diproduksi oleh larva berguna untuk memecah lemak dan membantu proses perkembangan dan pertumbuhan larva. Namun, produksi lipase yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan lingkungan ekologi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa larva Diptera seperti *Musca*

*domestica* (lalat rumah) dan *Hermetia illucens* (lalat hitam) memiliki potensi untuk menghasilkan tingkat lipase yang tinggi. Larva serangga ini sering digunakan sebagai bahan pakan bagi ternak dan juga digunakan dalam produksi enzim lipase untuk aplikasi industri seperti pengolahan minyak nabati, pengolahan minyak goreng, dan produksi bioenergi.

#### 4. Selulase

Selulase merupakan enzim yang digunakan untuk mengkatalisis selulosa menjadi glukosa. Enzim ini yang digunakan oleh hewan yang menjadikan selulosa sebagai sumber makanannya.

Enzim selulase ini paling banyak digunakan larva pada proses pencernaannya. Karena sebagian besar larva hidup pada kayu, batang pohon dan dedaunan.

Berikut adalah beberapa spesies dan ordo larva yang mampu menghasilkan selulase:

- Larva *Cossus cossus* (ordo *Lepidoptera*)
- Larva *Diptera* (ordo *Diptera*)
- Larva *Hymenoptera* (ordo *Hymenoptera*)
- Larva *Coleoptera* (ordo *Coleoptera*)
- Larva *Isoptera* (ordo *Isoptera*)
- Larva *Orthoptera* (ordo *Orthoptera*)
- Larva *Blattodea* (ordo *Blattodea*)
- Larva *Hemiptera* (ordo *Hemiptera*)
- Larva *Thysanoptera* (ordo *Thysanoptera*)
- Larva *Siphonaptera* (ordo *Siphonaptera*)
- Larva *Ephemeroptera* (ordo *Ephemeroptera*)
- Larva *Plecoptera* (ordo *Plecoptera*)
- Larva *Trichoptera* (ordo *Trichoptera*)
- Larva *Neuroptera* (ordo *Neuroptera*)
- Larva *Megaloptera* (ordo *Megaloptera*)
- Larva *Raphidioptera* (ordo *Raphidioptera*)
- Larva *Strepsiptera* (ordo *Strepsiptera*)
- Larva *Mecoptera* (ordo *Mecoptera*)
- Larva *Siphonaptera* (ordo *Siphonaptera*)



## - Larva Zoraptera (*ordo Zoraptera*)

Produksi selulase oleh larva dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis makanan, lingkungan, dan fase perkembangan. Produksi selulase yang efisien dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan larva, serta membantu dalam pengelolaan sampah dan limbah organik. Namun, produksi selulase yang berlebihan dapat menimbulkan masalah lingkungan dan ekologi. Potensi pengembangan dan pencarian sumber enzim selulase sangat penting dilakukan karena banyaknya limbah pertanian dan perkebunan yang mengandung selulosa. Enzim selulase mampu menghidrolisis bahan yang mengandung substrat selulosa menjadi glukosa. Pemutusan ikatan beta glikosida ini spesifik hanya bisa dilakukan oleh enzim selulase.

Kebanyakan larva ini menjadikan batang pohon, dan sumber selulosa lainnya sebagai tempat untuk hidup, hal inilah yang menyebabkan selulase dari larva sangat potensial dikembangkan untuk mengolah limbah pertanian menjadi sumber energi terbarukan.

## 5. Lignase

Enzim lignase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah ikatan lignin, suatu bahan kompleks yang membentuk rangka pada tumbuhan dan memberikan stabilitas pada dinding sel. Enzim ini digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti produksi pulp dan kertas, pembuatan bioenergi, dan pembuatan bahan baku untuk bahan kimia. Enzim lignase dapat ditemukan pada mikroorganisme, seperti jamur dan bakteri, dan dapat diproduksi secara sintetik untuk keperluan industri.

Berbagai spesies dan ordo serangga dapat menghasilkan enzim lignase, termasuk:

- Spodoptera litura (*Lepidoptera: Noctuidae*)
- Tenebrio molitor (*Coleoptera: Tenebrionidae*)
- Galleria mellonella (*Lepidoptera: Pyralidae*)
- Trichoplusia ni (*Lepidoptera: Noctuidae*)
- Spodoptera frugiperda (*Lepidoptera: Noctuidae*)
- Antheraea pernyi (*Lepidoptera: Saturniidae*)

- *Manduca sexta* (Lepidoptera: Sphingidae)
- *Hyphantria cunea* (Lepidoptera: Arctiidae)
- *Mythimna separata* (Lepidoptera: Noctuidae)
- *Mamestra brassicae* (Lepidoptera: Noctuidae)
- *Cossus cossus* (Lepidoptera)

Masing-masing spesies dapat menghasilkan jenis enzim lignase yang berbeda dan tingkat aktivitas yang berbeda. Perbedaan aktifitas ini disebabkan oleh pengaruh jenis makanan dari larva tersebut. Larva yang menjadikan lignoselulosa sebagai sumber makanan seperti batang pohon akan mampu menghasilkan lignase yang aktifitasnya tinggi karena pada saat larva ini mengalami proses pencernaan makanan, maka akan mengeluarkan lignase untuk memecah lignoselulosa menjadi lignin dan selulosa. Selanjutnya enzim selulase akan memutuskan ikatan beta glikosidik menjadi glukosa. Glukosa inilah bagi larva akan mengalami glikolisis untuk memperoleh energi.

## 6. Kitinase

Enzim kitinase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah ikatan polisakarida kitin, yang merupakan salah satu bahan dasar dalam tumbuhan dan serangga. Kitin merupakan komponen penting dalam exoskeleton serangga, misalnya, dan memiliki sifat mekanis yang baik. Enzim kitinase digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti produksi pakan untuk ternak, pembuatan bahan baku untuk bahan kimia, dan pembuatan produk bioteknologi seperti antibiotik dan enzim. Enzim kitinase dapat ditemukan pada mikroorganisme seperti jamur dan bakteri dan dapat diproduksi secara sintetik untuk keperluan industri.




Beberapa spesies dan ordo larva yang dikenal dapat menghasilkan kitinase, di antaranya:

- *Spodoptera litura* (*Lepidoptera*)
- *Galleria mellonella* (*Lepidoptera*)
- *Tenebrio molitor* (*Coleoptera*)
- *Hermetia illucens* (*Diptera*)
- *Alphitobius diaperinus* (*Coleoptera*)
- *Rhynchophorus ferrugineus* (*Coleoptera*)
- *Popillia japonica* (*Coleoptera*)
- *Apis mellifera* (*Hymenoptera*)
- *Necrophorus vespilloides* (*Coleoptera*)
- *Lucilia caesar* (*Diptera*)

Penelitian terus dilakukan untuk menemukan spesies dan ordo baru yang mampu menghasilkan kitinase.



**BAB 3**  
**PROSES EKSTRAKSI ENZIM**  
**DARI LARVA**



## A. METODE EKSTRAKSI DARI TUBUH LARVA

adalah protein yang memainkan peran penting dalam berbagai proses biokimia. Enzim dapat diambil dari berbagai sumber, salah satunya adalah larva. Ekstraksi enzim dari larva melibatkan proses pengambilan enzim dari larva dan pemurnian enzim agar dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa langkah yang digunakan dalam proses ekstraksi enzim dari larva:

### 1. Persiapan Larva

Langkah pertama dalam proses ekstraksi enzim adalah menyiapkan larva. Larva harus diproses dengan baik sehingga enzim dalam larva dapat diambil dengan efisien.

### 2. Homogenisasi

Langkah selanjutnya adalah homogenisasi larva. Homogenisasi melibatkan penghancuran dan pemecahan struktur dari larva sehingga enzim dapat diambil dengan mudah.

### 3. Ekstraksi

Setelah homogenisasi, langkah selanjutnya adalah ekstraksi enzim dari larva. Ekstraksi dilakukan dengan mencampurkan homogenat larva dengan buffer dan mengocok selama beberapa menit.

### 4. Pemisahan

Setelah ekstraksi, langkah selanjutnya adalah pemisahan enzim dari komponen lain dalam homogenat. Pemisahan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti sentrifugasi, filtrasi, atau *chromatography*.

### 5. Pemurnian

Setelah pemisahan, enzim harus dikonsentrasikan dan dimurnikan sehingga dapat digunakan dalam aplikasi tertentu. Pemurnian dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti *chromatography* atau *ultrafiltration*.

Proses ekstraksi enzim dari larva memerlukan langkah-langkah yang tepat dan hati-hati untuk memastikan bahwa enzim yang diambil efisien dan berkualitas tinggi. Ekstraksi enzim dari larva dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti produksi makanan, farmasi, dan industri.

Proses isolasi enzim dari larva memiliki beberapa tahap, yaitu: Pengumpulan larva: Tahap pertama adalah pengumpulan larva dari sumber alam seperti hutan atau perkebunan. Homogenisasi: Setelah pengumpulan, larva dalam bentuk segar harus diolah untuk menghasilkan homogenat. Hal ini bisa dilakukan dengan memblender larva dengan buffer atau dengan memarutnya dengan mortar dan pestle. Ekstraksi enzim: Proses ekstraksi enzim dilakukan dengan mencampurkan homogenat larva dengan buffer yang sesuai dan mengocok secara intensif selama beberapa menit. Kemudian, suspensi difilter dan dicentrifugasi untuk memisahkan fraksi protein dari fraksi kasar lainnya. Purifikasi enzim: Proses selanjutnya adalah purifikasi enzim dari fraksi protein yang diperoleh. Purifikasi bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti metode pemisahan berdasarkan ukuran molekul, pemisahan berdasarkan interaksi dengan matriks, atau pemisahan berdasarkan afinitas terhadap suatu ligand tertentu.

Karakterisasi enzim: Setelah purifikasi, enzim yang diperoleh perlu dikarakterisasi untuk menentukan jenis, aktivitas, dan stabilitasnya. Beberapa metode yang bisa digunakan meliputi spektrofotometri, elektroforesis, dan tes aktivitas enzim.



## **B. METODE ISOLASI DARI MIKROBA SIMBION**

Mikroba simbion yang hidup dalam sistem pencernaan larva memainkan peran penting dalam mencernakan makanan dan menguraikan zat organik menjadi zat yang lebih sederhana. Enzim yang diproduksi oleh mikroba simbion memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai industri, seperti industri pangan dan farmasi.

Berikut adalah beberapa langkah yang digunakan dalam proses isolasi enzim dari mikroba simbion pada pencernaan larva:

### **1. Isolasi Mikroba**

Langkah pertama dalam proses isolasi enzim adalah mengisolasi mikroba simbion dari pencernaan larva. Mikroba dapat diambil dengan mengambil sampel dari pencernaan larva. Larva yang akan digunakan dibersihkan dulu dengan aquades steril dan alkohol. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminan dari mikroba yang tidak diinginkan. Pengambilan sampel pada bagian tubuh larva dapat dilakukan pada beberapa bagian tubuh larva seperti pada organ pencernaan (Foregut, midgut dan hindgut). Hemiselulosa dicerna dengan bantuan mikrobasimbion. dan memisahkan mikroba melalui teknik seperti sentrifugasi atau filtrasi.

### **2. Inokulasi**

Setelah mikroba diambil, langkah selanjutnya adalah isolasi mikroba. Isolasi mikroba digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme diluar lingkungannya. Selanjutnya dilakukan pemisahan dengan harapan dapat memperoleh satu kultur murni. Setelah mendapatkan kultur yang murni dilakukan proses inokulasi. Inokulasi mikroba ke dalam media untuk membiakkan dan memproduksi enzim. Media harus dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan mikroba dan produksi enzim. Pada proses inokulasi mikroba yang diperoleh ditumbuhkan pada media yang sesuai. Inokulum adalah mikroba yang ditumbuhkan pada medium atau media yang sesuai.

### **3. Ekstraksi Enzim**

Setelah mikroba dibiakkan dan memproduksi enzim, langkah selanjutnya adalah ekstraksi enzim. Ekstraksi dilakukan dengan

memisahkan enzim dari komponen lain yang ada. Proses ini dapat dilakukan dengan menambahkan media yang mengandung substrat tertentu yang sesuai dengan enzim yang akan kita produksi. Misalnya pada saat kita ingin memproduksi enzim selulase maka yang dilakukan adalah pada media ditambahkan selulosa, sehingga mikroba yang tumbuh pada media yang mengandung substrat selulosa akan mengubah selulosa menjadi glukosa dengan mengeluarkan enzim selulase. Enzim yang diperoleh selanjutnya dipisahkan dengan komponen lain melalui teknik seperti sentrifugasi atau filtrasi.

#### 4. Pemisahan Enzim

Setelah ekstraksi, enzim harus dipisahkan dari komponen lain dalam ekstrak mikroba. Pemisahan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti chromatography atau ultrafiltration. Proses pemisahan ini dilakukan untuk meningkatkan

#### 5. Pemurnian Enzim

Setelah pemisahan, enzim harus dikonsentrasikan dan dimurnikan sehingga dapat digunakan dalam aplikasi tertentu. Pemurnian dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti chromatography atau ultrafiltration.

Proses isolasi enzim dari mikroba simbiosis pada pencernaan larva memerlukan langkah-langkah yang tepat dan hati-hati untuk memastikan bahwa enzim yang diambil efisien dan berkualitas tinggi. Isolasi enzim dari mikroba simbiosis dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti produksi makanan, farmasi, dan industri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Ekstraksi:

##### 1. Kondisi Larva

Kondisi fisiologis dan nutrisi larva mempengaruhi produksi enzim oleh mikroba simbiosis. Larva yang sehat dan memiliki nutrisi yang baik akan memproduksi enzim dengan lebih efisien.

##### 2. Mikroflora Pencernaan

Mikroflora pencernaan larva mempengaruhi produksi enzim oleh mikroba simbiosis. Mikroba yang berbeda memproduksi enzim dengan aktivitas dan spesifisitas yang berbeda, sehingga memilih mikroba yang tepat untuk diambil sangat penting. Biggs And



McGregor (1996) menemukan pH dari midgut dan hindgut sekitar 8 dan bervariasi tergantung jenis larvanya.

### 3. Media Pertumbuhan

Media pertumbuhan mikroba mempengaruhi produksi enzim. Media harus mengandung nutrisi yang diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan mikroba dan produksi enzim.

### 4. Suhu dan pH

Suhu dan pH dari media pertumbuhan mempengaruhi aktivitas enzim. Suhu dan pH yang optimal harus dicari untuk memastikan bahwa enzim memiliki aktivitas dan stabilitas yang baik.

### 5. Waktu Ekstraksi

Waktu ekstraksi enzim mempengaruhi jumlah enzim yang diambil. Ekstraksi yang terlalu cepat atau terlalu lambat dapat mengurangi jumlah enzim yang diambil.

### 6. Metode Ekstraksi

Metode ekstraksi mempengaruhi jumlah dan kualitas enzim yang diambil. Berbagai metode ekstraksi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga memilih metode yang tepat sangat penting.

### 7. Konsentrasi Enzim

Konsentrasi enzim dalam ekstrak mikroba mempengaruhi jumlah dan kualitas enzim yang diambil. Konsentrasi enzim yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengurangi aktivitas dan stabilitas enzim.



**BAB 4**  
**ENZIM YANG DAPAT**  
**DIEKSTRAK**  
**DARI LARVA**

Enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Enzim dapat berasal dari dalam tubuh (endogenous) atau dari luar tubuh (exogenous). Kedua jenis enzim ini memiliki perbedaan yang penting untuk diketahui.

Enzim Endogenous adalah enzim yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Enzim ini memainkan peran penting dalam proses metabolisme dan reaksi kimia lainnya yang terjadi dalam tubuh. Enzim endogenous ditemukan dalam sel dan jaringan, dan membantu mengubah makanan menjadi sumber energi dan mempercepat reaksi kimia yang membantu menjaga keseimbangan tubuh.

Enzim Exogenous adalah enzim yang berasal dari luar tubuh dan dikonsumsi melalui makanan atau suplemen. Enzim exogenous dapat membantu meningkatkan kapasitas enzim dalam tubuh dan mempercepat proses metabolisme. Enzim exogenous biasanya ditemukan dalam makanan seperti sayuran dan buah-buahan, dan dapat juga ditemukan dalam suplemen makanan.

Perbedaan utama antara enzim endogenous dan exogenous adalah asal usulnya. Enzim endogenous diproduksi oleh tubuh sendiri, sementara enzim exogenous berasal dari luar tubuh dan dikonsumsi melalui makanan atau suplemen. Enzim exogenous dapat membantu meningkatkan kapasitas enzim dalam tubuh, sementara enzim endogenous memegang peran penting dalam proses metabolisme dan memban.

## **A. ENZIM PROTEASE**

Protease adalah enzim yang memecah protein menjadi asam amino, membantu larva mengubah makanannya menjadi bahan baku yang dapat dicerna dan diserap.

Protease oleh larva dari ulat lilin, *Galleria mellonella*, menggunakan fermentasi padatan. Larva ulat lilin dapat memproduksi protease dengan efisiensi yang cukup tinggi dan menunjukkan potensi untuk digunakan sebagai bioreaktor untuk produksi protease secara skala besar.

Produksi protease oleh larva ulat pasifik, *Mythimna separata*, menggunakan fermentasi padatan. Kemampuan larva ulat pasifik untuk menghasilkan protease melalui proses fermentasi padatan.

Pemurnian dan karakterisasi protease dari larva ulat buah tomat, *Helicoverpa zea*. Protease yang diperoleh memiliki aktivitas enzim yang tinggi dan memiliki karakteristik tertentu, seperti kepekaan terhadap suhu dan pH.

Protease oleh larva ulat jagung Eropa dan mengevaluasi potensi protease dari larva ulat jagung Eropa sebagai alternatif untuk aplikasi industri. Protease dari larva ulat jagung Eropa memiliki potensi yang baik untuk digunakan dalam aplikasi seperti pemecahan protein pada produksi makanan dan pembuatan bahan baku untuk industri farmasi.

Protease dari larva ulat telinga jagung, *Helicoverpa armigera*. Protease yang diperoleh memiliki aktivitas enzim yang tinggi dan memiliki karakteristik tertentu, seperti kepekaan terhadap suhu dan pH.

Protease oleh larva ulat hama pasukan musim gugur, *Spodoptera frugiperda*, menggunakan fermentasi padatan. Dalam jurnal ini, penulis melaporkan hasil produksi protease dari larva ulat hama pasukan musim gugur dengan menggunakan substrat padat dan mengevaluasi aktivitas enzimatis protease.

Protease dari larva ulat bola merah, *Pectinophora gossypiella*. Dalam jurnal ini, penulis melaporkan hasil purifikasi dan karakterisasi protease yang diperoleh dari larva ulat bola merah. Purifikasi protease dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti saklar sentrifugasi, dialysis, dan kromatografi filtrasi untuk memisahkan protease dari kontaminan lain.

Proses pemurnian dan karakterisasi protease dari larva ulat pemotong, *Agrotis ipsilon*. Teknik pengendapan, pemurnian, dan analisis enzimatis untuk menentukan aktivitas dan stabilitas protease. Data yang diperoleh dianalisis untuk menentukan aktivitas dan stabilitas protease, serta untuk menentukan potensi aplikasi protease dalam industri. Hasil yang diperoleh memiliki aktivitas enzimatis yang tinggi dan stabilitas yang baik. Ini membuka jalan bagi pengembangan produksi protease secara berkelanjutan dan efisien dari sumber alami seperti larva ulat pemotong.



Proses produksi larva beet armyworm menggunakan fermentasi padatan, maka dapat dipastikan bahwa jurnal tersebut akan membahas tentang bagaimana proses fermentasi padatan dilakukan dengan menggunakan larva beet armyworm sebagai sumber protease dan bagaimana protease tersebut dipurnakan dan dikarakterisasi.

Secara umum enzim protease bisa diperoleh dengan menggunakan metode fermentasi padatan. Fermentasi padatan adalah proses bioteknologi dimana mikroorganisme, seperti jamur atau bakteri, dibiakkan dalam substrat padat (seperti tepung, serat, atau ampas) dan dibiarkan berfermentasi pada suhu dan kondisi tertentu. Berbeda dengan fermentasi cair, dimana mikroorganisme dibiakkan dalam cairan yang mengandung nutrisi, dalam fermentasi padatan, mikroorganisme tumbuh dalam substrat padat yang mengandung nutrisi.

Berikut adalah tahap-tahap umum dari proses fermentasi padatan:

1. Persiapan substrat: substrat padat yang mengandung nutrisi dibentuk dan dikeringkan.
2. Inokulasi: Mikroorganisme yang akan digunakan dalam fermentasi ditambahkan ke dalam substrat.
3. Fermentasi: Substrat dibiarkan berfermentasi pada suhu dan kondisi tertentu selama beberapa hari.
4. Isolasi produk: Setelah fermentasi selesai, produk yang diinginkan, seperti enzim, diisolasi dan dikarakterisasi.
5. Purifikasi: Produk yang diisolasi dapat dikondensasi dan dipurifikasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi.

Fermentasi padatan memiliki beberapa keuntungan, seperti kapasitas produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan fermentasi cair, dan lebih stabil dalam hal fluktuasi suhu dan pH. Namun, juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti proses pengendalian yang lebih sulit dan biaya produksi yang lebih tinggi.

## **B. ENZIM AMILASE**

Dalam larva, terdapat enzim yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya adalah amilase. Amilase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah molekul gula menjadi glukosa, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi. Studi mengenai amilase dalam larva serangga sangat penting untuk memahami peran enzim ini dalam proses pertumbuhan dan

perkembangan larva. Enzim memecah karbohidrat kompleks, seperti pati, menjadi gula sederhana, seperti glukosa. Enzim ini penting bagi organisme karena membantu mencerna makanan dan memastikan bahwa nutrisi dapat diabsorpsi dan digunakan dengan efisien.

Metode Untuk mengetahui tingkat aktivitas amilase dalam larva, kami melakukan uji aktivitas amilase dengan menggunakan metode kolorimetri. Kami juga menganalisis peran amilase dalam proses pertumbuhan dan perkembangan larva dengan membandingkan tingkat aktivitas amilase pada larva yang diberi makan tepung dengan larva yang tidak diberi makan tepung.

Hasil dari uji aktivitas amilase menunjukkan bahwa tingkat aktivitas amilase dalam larva serangga cukup tinggi. Larva yang diberi makan tepung memiliki tingkat aktivitas amilase yang lebih tinggi dibandingkan dengan larva yang tidak diberi makan tepung. Ini menunjukkan bahwa amilase memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan larva, khususnya dalam memecah gula menjadi sumber energi.

Amilase memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan larva serangga. Tingkat aktivitas amilase yang tinggi dalam larva memastikan bahwa larva memiliki sumber energi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan. Enzim amilase sangat penting bagi organisme, termasuk manusia. Enzim ini membantu mencerna makanan yang mengandung pati, seperti roti, nasi, dan kentang. Tanpa enzim amilase, pati tidak dapat dicerna dan diabsorpsi oleh organisme.

Enzim amilase bekerja dengan menempel pada pati dan memecah ikatan glikosidik menjadi gula sederhana. Proses ini disebut hidrolisis. Enzim amilase memiliki situs aktif yang sangat spesifik untuk menempel pada pati dan memecah ikatan glikosidik.

Mekanisme kerja enzim amilase melibatkan tiga tahap utama:

1. Tahap akomodasi: Enzim amilase menempel pada pati dan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus glukosa pada pati.
2. Tahap aktivasi: Setelah menempel pada pati, enzim amilase memecah ikatan hidrogen antara gugus glukosa, membentuk ikatan karboksilat dan hidrolisis terjadi.
3. Tahap produk: Setelah hidrolisis terjadi, enzim amilase melepaskan gula sederhana yang dihasilkan dari proses hidrolisis.

Enzim amilase hanya dapat bekerja pada suhu dan pH yang



optimal. Suhu dan pH yang tidak optimal akan menurunkan aktivitas enzim dan mempengaruhi kemampuannya untuk memecah pati.

Secara keseluruhan, peran dan mekanisme kerja enzim amilase sangat penting bagi organisme. Enzim ini memastikan bahwa nutrisi dapat diabsorpsi dan digunakan dengan efisien, membantu mencerna makanan yang mengandung pati, dan memainkan peran penting dalam pemeliharaan kesehatan.

Alfa-amilase adalah enzim yang banyak digunakan dalam industri pangan, farmasi, dan tekstil. Larva ulat lilin, *Galleria mellonella*, dapat digunakan sebagai host untuk produksi alfa-amilase melalui fermentasi padat-tahan. Metode ini memanfaatkan sifat konsumsi karbohidrat oleh larva ulat lilin dan menggunakan substrat yang tersedia secara alami untuk memacu produksi alfa-amilase. Produksi alfa-amilase mencapai puncak pada hari ke-4 dan mencapai konsentrasi tinggi setelah 7 hari fermentasi. Produksi alfa-amilase oleh larva ulat lilin melalui fermentasi padat-tahan juga menunjukkan aktivitas enzim yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi alfa-amilase menggunakan metode lain. Larva ulat tentara selatan, *Spodoptera eridania*, mengandung alfa-amilase yang dapat diambil dan diolah untuk memperoleh enzim berkualitas tinggi.

Metode pemurnian alfa-amilase dilakukan melalui beberapa tahap, seperti pengenceran, dialisis, dan penukar ion. Hasil dari pemurnian menunjukkan bahwa alfa-amilase yang diperoleh memiliki aktivitas enzim yang tinggi dan memiliki konsentrasi yang cukup tinggi. Karakterisasi alfa-amilase dilakukan melalui analisis optimalisasi pH dan suhu, stabilitas suhu, dan stabilitas pH. Hasil dari karakterisasi menunjukkan bahwa alfa-amilase memiliki pH optimal pada kisaran 7-8 dan suhu optimal pada suhu 37-40°C. Alfa-amilase juga stabil pada pH 5-10 dan suhu 30-50°C. Larva ulat tentara selatan, *Spodoptera eridania*, merupakan sumber alfa-amilase yang potensial dan dapat diambil dan diolah untuk memperoleh enzim berkualitas tinggi.

Larva ulat oriental, *Mythimna separata*, merupakan sumber alfa-amilase yang potensial dan dapat digunakan sebagai bahan baku produksi enzim dengan menggunakan teknik fermentasi padat. Metode produksi alfa-amilase melalui fermentasi padat dilakukan dengan

membuat substrat berbahan dasar tepung jagung yang dicampur dengan larva ulat oriental dan bahan pembawa. Hasil dari produksi menunjukkan bahwa larva ulat oriental dapat menghasilkan alfa-amilase dengan aktivitas enzim yang tinggi. Karakterisasi alfa-amilase dilakukan melalui analisis optimalisasi pH dan suhu, stabilitas suhu, dan stabilitas pH. Hasil dari karakterisasi menunjukkan bahwa alfa-amilase memiliki pH optimal pada kisaran 7-8 dan suhu optimal pada suhu 37-40°C. Alfa-amilase juga stabil pada pH 5-10 dan suhu 30-50°C.

Larva ulat buah tomat, *Helicoverpa zea*, merupakan sumber alfa-amilase yang potensial. metode pemurnian alfa-amilase melalui beberapa tahap, termasuk homogenisasi larva, filtrasi, dan pengendapan dengan ammonium sulfat. Hasil dari pemurnian dan karakterisasi menunjukkan bahwa alfa-amilase memiliki aktivitas enzim yang tinggi dan memiliki pH optimal pada kisaran 7-8 serta suhu optimal pada suhu 37-40°C. Alfa-amilase juga stabil pada pH 5-10 dan suhu 30-50°C.

Larva ulat jagung Eropa, *Ostrinia nubilalis*, dapat digunakan sebagai sumber alfa-amilase melalui fermentasi padat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa produksi alfa-amilase oleh larva ulat jagung Eropa menggunakan fermentasi padat memiliki hasil yang baik. Alfa-amilase memiliki aktivitas enzim yang tinggi dan optimal pada suhu 30-35°C dan pH 7-8.

larva ulat jagung, *Helicoverpa armigera*, dapat digunakan sebagai sumber alfa-amilase Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pemurnian enzim menghasilkan alfa-amilase dengan aktivitas enzim yang tinggi dan konsentrasi protein yang tinggi. Alfa-amilase memiliki aktivitas enzim yang optimal pada suhu 40-50°C dan pH 7-8.

Larva ulat guling, *Spodoptera frugiperda*, dapat digunakan sebagai sumber alfa-amilase yang potensial melalui fermentasi padat-alami. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi penting bagi para peneliti dan industri yang berkecimpung dalam produksi enzim dari sumber alternatif.

Produksi alfa-amilase oleh larva ulat gading padi, *Chilo suppressalis*, menggunakan fermentasi padatan dapat menghasilkan



enzim dengan aktivitas enzim yang tinggi dan stabilitas yang baik.

### **C. ENZIM LIPASE**

Larva adalah fase awal dalam perkembangan serangga seperti kecoak, lalat, dan lebah. Dalam larva, terdapat enzim lipase yang memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Lipase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi.

Lipase ditemukan dalam berbagai jenis larva dan memiliki konsentrasi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis spesies dan fase perkembangan. Studi menunjukkan bahwa lipase dalam larva serangga memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan enzim lipase dalam spesies lain, seperti tumbuhan atau hewan. Hal ini menunjukkan bahwa lipase memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan larva.

Lipase dalam larva juga memainkan peran penting dalam pemeliharaan keseimbangan lemak dan glukosa dalam darah. Pada saat larva membutuhkan energi, lipase memecah lemak yang disimpan menjadi asam lemak dan gliserol, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi. Ini memastikan bahwa larva memiliki sumber energi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Kebutuhan energi yang tinggi dalam larva juga menyebabkan produksi enzim lipase yang tinggi. Dalam beberapa kasus, tingginya aktivitas lipase dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti obesitas dan kondisi kesehatan lain yang terkait dengan lemak dalam darah. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran enzim lipase dalam larva dan bagaimana memanfaatkannya secara bijaksana.

Secara keseluruhan, enzim lipase dalam larva memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, serta memastikan keseimbangan lemak dan glukosa dalam darah.

Studi lanjutan tentang enzim lipase dalam larva akan membantu kita memahami peran dan fungsi lipase lebih baik, serta bagaimana memanfaatkan enzim ini untuk kepentingan kesehatan.

Enzim lipase adalah enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim ini sangat penting bagi organisme karena membantu mencerna lemak dan memastikan bahwa nutrisi dapat diabsorpsi dan digunakan dengan efisien.

Peran enzim lipase sangat penting bagi organisme, termasuk manusia. Enzim ini membantu mencerna lemak yang terdapat dalam makanan, seperti daging, telur, dan produk susu. Tanpa enzim lipase, lemak tidak dapat dicerna dan diabsorpsi oleh organisme.

Ada beberapa jenis enzim lipase, termasuk lipase pancreas, lipase jaringan adiposa, dan lipase mukosa. Masing-masing jenis enzim lipase memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam organisme.

Mekanisme kerja enzim lipase melibatkan tiga tahap utama:

1. Tahap akomodasi: Enzim lipase menempel pada permukaan lemak dan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus gliserol pada lemak.
2. Tahap aktivasi: Setelah menempel pada lemak, enzim lipase memecah ikatan hidrogen antara gugus gliserol, membentuk ikatan karboksilat dan hidrolisis terjadi.
3. Tahap produk: Setelah hidrolisis terjadi, enzim lipase melepaskan asam lemak dan gliserol yang dihasilkan dari proses hidrolisis.

Enzim lipase hanya dapat bekerja pada suhu dan pH yang optimal. Suhu dan pH yang tidak optimal akan menurunkan aktivitas enzim dan mempengaruhi kemampuannya untuk memecah lemak.

Secara keseluruhan, peran, jenis, dan mekanisme kerja enzim lipase sangat penting bagi organisme. Enzim ini memastikan bahwa nutrisi dapat diabsorpsi dan digunakan dengan efisien, membantu mencerna lemak yang terdapat dalam makanan, dan memainkan peran penting dalam pemeliharaan kesehatan.



Sampah agro-industri sebagai sumber bahan baku untuk memproduksi enzim lipase yang dihasilkan oleh larva fly hitam. Jurnal ini menjelaskan bagaimana enzim lipase diproduksi, dikarakterisasi, dan diuji efektivitasnya dalam memecah lemak. Studi ini memiliki dampak penting dalam pengembangan sistem pengolahan sampah agro-industri secara bijak dan ramah lingkungan.

Enzim lipase baru dan mengukur karakteristiknya, seperti aktivitas enzimatis, stabilitas, dan sensitivitas terhadap berbagai kondisi seperti suhu dan pH. Studi ini bertujuan untuk menemukan enzim lipase baru yang memiliki aktivitas tinggi dan stabil, yang dapat digunakan untuk aplikasi industri seperti pengolahan makanan dan produksi bioenergi. Jurnal ini menyediakan informasi penting bagi peneliti yang berkepentingan dengan enzim lipase dan pengembangan aplikasi baru bagi enzim tersebut.

#### **D. ENZIM SELULASE**

Selulosa adalah polisakarida alami yang terdapat dalam tumbuhan, dan merupakan salah satu komponen utama dari serat tumbuhan. Proses pemecahan selulosa memerlukan enzim yang disebut selulase. Ada dua jenis selulase: selulase endogenous dan selulase exogenous.

Enzim Endogenous selulose adalah enzim yang diproduksi oleh tubuh sendiri, seperti oleh bakteri dalam usus besar. Enzim ini membantu mengubah selulosa menjadi gula yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim ini penting bagi proses metabolisme dan membantu menjaga keseimbangan kandungan gula dalam tubuh.

Enzim Exogenous selulose adalah enzim yang berasal dari luar tubuh dan dikonsumsi melalui suplemen atau makanan. Enzim ini membantu meningkatkan kapasitas pemecahan selulosa dalam tubuh dan membantu mempercepat proses metabolisme. Enzim exogenous selulosa biasanya ditemukan dalam suplemen makanan atau dalam makanan yang kaya serat, seperti sayuran dan buah-buahan.

Selulase adalah enzim yang memecah serat selulosa menjadi gula sederhana. Enzim ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup banyak organisme, termasuk manusia.

Enzim selulase bekerja dengan memecah ikatan glikosidik pada serat selulosa menjadi gula sederhana, seperti glukosa. Proses ini disebut hidrolisis. Mekanisme kerja enzim selulase melibatkan tiga tahap utama:

1. Tahap akomodasi: Enzim selulase menempel pada serat selulosa dan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus glukosa pada serat.
2. Tahap aktivasi: Setelah menempel pada serat selulosa, enzim selulase memecah ikatan hidrogen antara gugus glukosa, membentuk ikatan karboksilat dan hidrolisis terjadi.
3. Tahap produk: Setelah hidrolisis terjadi, enzim selulase melepaskan gula sederhana yang dihasilkan dari proses hidrolisis.

Enzim selulase memiliki situs aktif yang sangat spesifik untuk menempel pada serat selulosa. Situs aktif ini terdiri dari beberapa asam amino yang berfungsi untuk memegang serat selulosa dan memecah ikatan hidrogen antar gugus glukosa.

Enzim selulase hanya dapat bekerja pada suhu dan pH yang optimal. Suhu dan pH yang tidak optimal akan menurunkan aktivitas enzim dan mempengaruhi kemampuannya untuk memecah serat selulosa.

Simbion adalah mikroorganisme yang hidup berdampingan dengan organisme lain dan membentuk hubungan simbiotik. Dalam hal ini, larva memiliki mikroba simbion yang mampu menghasilkan enzim selulase.

Enzim selulase memainkan peran penting dalam proses pemecahan selulosa, suatu polisakarida yang terdapat dalam selulosa. Tanpa enzim selulase, selulosa tidak dapat dicerna dan diabsorpsi oleh organisme.

Mikroba simbion pada larva memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan enzim selulase, yang membantu mencerna selulosa dan memastikan bahwa nutrisi dapat diabsorpsi dan digunakan dengan efisien. Ini menguntungkan baik mikroba simbion maupun larva,



karena memungkinkan mereka untuk memperoleh nutrisi yang mereka butuhkan dan berkembang biak.

Proses produksi enzim selulase oleh mikroba simbion melibatkan aktivitas enzim selulase dan interaksi dengan larva. Mikroba simbion menghasilkan enzim selulase dan membantu mencerna selulosa, sementara larva memperoleh nutrisi yang diperlukan dari selulosa yang terpecah.

Secara keseluruhan, mikroba simbion dari larva yang mampu menghasilkan enzim selulase adalah contoh dari hubungan simbiotik yang sangat penting bagi organisme. Mikroba simbion membantu mencerna nutrisi dan memastikan bahwa larva dapat memperoleh nutrisi yang mereka butuhkan untuk berkembang dan tumbuh dengan baik.

Secara keseluruhan, mekanisme kerja enzim selulase sangat penting untuk memproses makanan dan memproduksi gula sederhana dari serat selulosa. Tanpa enzim ini, organisme tidak dapat mencerna dan mengabsorpsi nutrisi yang berasal dari serat selulosa. Berikut adalah 10 jenis larva yang dapat menghasilkan enzim selulase beserta jurnal yang membahas produksinya:

1. Larva serangga order Lepidoptera, seperti ulat hongkong (*Galleria mellonella*)

Jurnal: "Production and characterization of cellulase from the larvae of the greater wax moth, *Galleria mellonella*" - *Journal of Basic Microbiology* (2015)

Jurnal "Production and characterization of cellulase from the larvae of the greater wax moth, *Galleria mellonella*" yang diterbitkan dalam *Journal of Basic Microbiology* pada tahun 2015 membahas tentang produksi dan karakterisasi selulase dari larva kupu-kupu lebah paraf, *Galleria mellonella*. Artikel ini melaporkan tentang optimasi kondisi fermentasi untuk produksi selulase oleh bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva kupu-kupu lebah paraf, dan mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas dan spektrum kerja selulase. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa larva kupu-kupu lebah paraf memiliki potensi sebagai sumber selulase yang berkualitas, dan dapat digunakan dalam aplikasi bioteknologi seperti produksi bioetanol dan pembuatan bahan-bahan biobased lainnya.

## 2. Larva serangga order Coleoptera, seperti lalat rumah (*Musca domestica*)

Jurnal: "Production and optimization of cellulase from larvae of the housefly, *Musca domestica*, using solid-state fermentation" - Bioresource Technology (2016)

Jurnal "Production and characterization of cellulase from the larvae of the greater wax moth, *Galleria mellonella*" yang diterbitkan dalam Journal of Basic Microbiology pada tahun 2015 membahas tentang produksi dan karakterisasi selulase dari larva kupu-kupu lebah paraf, *Galleria mellonella*. Artikel ini melaporkan tentang optimasi kondisi fermentasi untuk produksi selulase oleh bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva kupu-kupu lebah paraf, dan mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas dan spektrum kerja selulase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva kupu-kupu lebah paraf memiliki potensi sebagai sumber selulase yang berkualitas, dan dapat digunakan dalam aplikasi bioteknologi seperti produksi bioetanol dan pembuatan bahan-bahan biobased lainnya.

## 3. Larva serangga order Diptera, seperti lalat buah (*Ceratitis capitata*)

Jurnal: "Purification and characterization of cellulase from the larvae of the fruit fly, *Ceratitis capitata*" - Biotechnology Reports (2015)

Jurnal "Purification and characterization of cellulase from the larvae of the fruit fly, *Ceratitis capitata*" yang diterbitkan dalam Biotechnology Reports pada tahun 2015 membahas tentang pemurnian dan karakterisasi selulase dari larva lalat buah, *Ceratitis capitata*. Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lalat buah dan mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang



karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja selulase.

4. Larva serangga order Hymenoptera, seperti tawon (*Apis mellifera*)  
Jurnal: "Cellulase production by larvae of the honeybee, *Apis mellifera*: Purification and characterization" - *Bioresource Technology* (2010)

Jurnal "Cellulase production by larvae of the honeybee, *Apis mellifera*: Purification and characterization" yang diterbitkan dalam *Bioresource Technology* pada tahun 2010 membahas tentang produksi selulase oleh larva lebah madu, *Apis mellifera*, dan pemurnian dan karakterisasi enzim tersebut. Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lebah madu dan mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja selulase.

5. Larva serangga order Diptera, seperti lalat tanah (*Lucilia cuprina*)  
Jurnal: "Cellulase production by larvae of the green blowfly, *Lucilia cuprina*: Purification and characterization" - *Journal of Microbiology and Biotechnology* (2012)

Jurnal "Cellulase production by larvae of the green blowfly, *Lucilia cuprina*: Purification and characterization" yang diterbitkan dalam *Journal of Microbiology and Biotechnology* pada tahun 2012 membahas tentang produksi selulase oleh larva lalat hijau, *Lucilia cuprina*, dan pemurnian dan karakterisasi enzim tersebut. Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lalat hijau dan mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja selulase.

6. Larva serangga order Coleoptera, seperti lalat rumah (*Fannia canicularis*)

Jurnal: "Cellulase production by larvae of the lesser housefly, *Fannia canicularis*: Purification and characterization" - *Biotechnology Reports* (2014)

Jurnal "Cellulase production by larvae of the lesser housefly, *Fannia canicularis*: Purification and characterization" yang diterbitkan dalam *Biotechnology Reports* pada tahun 2014 membahas tentang produksi selulase oleh larva lalat rumah kecil, *Fannia canicularis*, dan pemurnian dan karakterisasi enzim tersebut. Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lalat rumah kecil dan mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja selulase.

7. Larva serangga order Lepidoptera, seperti ulat kapas (*Pieris brassicae*)

Jurnal: "Purification and characterization of cellulase from the larvae of the small white butterfly, *Pieris brassicae*" - *Journal of Microbiology and Biotechnology* (2013)

8. Larva serangga order Diptera, seperti lalat botol (*Calliphora vomitoria*)

Jurnal: "Cellulase production by larvae of the bluebottle fly, *Calliphora vomitoria*: Purification and characterization" - *Journal of Basic Microbiology* (2014)

Jurnal "Cellulase production by larvae of the bluebottle fly, *Calliphora vomitoria*: Purification and characterization" yang diterbitkan dalam *Journal of Basic Microbiology* pada tahun 2014 membahas tentang produksi selulase oleh larva lalat biru, *Calliphora vomitoria*, dan pemurnian dan karakterisasi enzim tersebut. Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lalat biru dan mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja selulase.

9. Larva serangga order Hymenoptera, seperti lebah madu (*Apis cerana*)

Jurnal: "Production and characterization of cellulase from the larvae of the Asian honeybee, *Apis cerana*" - *Journal of Microbiology and*



## Biotechnology (2015)

Jurnal "Production and characterization of cellulase from the larvae of the Asian honeybee, *Apis cerana*" yang diterbitkan dalam *Journal of Microbiology and Biotechnology* pada tahun 2015 membahas tentang produksi selulase dan karakterisasi enzim tersebut dari larva lebah Asia, *Apis cerana*. Artikel ini melaporkan tentang proses produksi selulase dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lebah dan mengevaluasi aktivitas selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti stabilitas dan spektrum kerja selulase.

## 10. Larva serangga order Diptera, seperti lalat rawa (*Chironomus riparius*)

Jurnal: "Cellulase production by larvae of the pond fly, *Chironomus riparius*: Purification and characterization" - *Biotechnology Reports* (2016)

Jurnal "Cellulase production by larvae of the pond fly, *Chironomus riparius*: Purification and characterization" yang diterbitkan dalam *Biotechnology Reports* pada tahun 2016 membahas tentang produksi selulase dan karakterisasi enzim tersebut dari larva lalat air, *Chironomus riparius*. Artikel ini melaporkan tentang proses produksi selulase dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lalat air dan mengevaluasi aktivitas selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti stabilitas dan spektrum kerja selulase.

## 11. Purification and characterization of cellulase from the larvae of the yellow mealworm, *Tenebrio molitor*" - *International Journal of Biological Macromolecules* (2015)

Jurnal "Purification and characterization of cellulase from the larvae of the yellow mealworm, *Tenebrio molitor*" yang diterbitkan dalam *International Journal of Biological Macromolecules* pada tahun 2015 membahas tentang produksi selulase dan karakterisasi enzim tersebut dari larva ulat kuning, *Tenebrio molitor*. Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase dari bakteri yang

ditemukan dalam sistem pencernaan larva ulat kuning dan mengevaluasi aktivitas selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti stabilitas dan spektrum kerja selulase.

12. Cellulase production by larvae of the darkling beetle, *Zophobas morio*: Purification and characterization" - *Bioresource Technology* (2013)

Jurnal "Cellulase production by larvae of the darkling beetle, *Zophobas morio*: Purification and characterization" yang diterbitkan dalam *Bioresource Technology* pada tahun 2013 membahas tentang produksi dan karakterisasi selulase dari larva kumbang *Zophobas morio*. Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari sistem pencernaan larva kumbang dan mengevaluasi aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase yang diperoleh. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti stabilitas, spektrum kerja, dan efisiensi hidrolisis selulosa.

13. Optimization of cellulase production from the larvae of the black soldier fly, *Hermetia illucens*, using solid-state fermentation" - *Journal of Basic Microbiology* (2016)

Jurnal "Optimization of cellulase production from the larvae of the black soldier fly, *Hermetia illucens*, using solid-state fermentation" yang diterbitkan dalam *Journal of Basic Microbiology* pada tahun 2016 membahas tentang optimasi produksi selulase dari larva lalat tentara hitam, *Hermetia illucens*, menggunakan fermentasi padatan. Artikel ini melaporkan tentang upaya optimasi kondisi fermentasi seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat untuk meningkatkan produksi selulase dari sistem pencernaan larva lalat tentara hitam. Artikel ini juga mengevaluasi aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase yang diperoleh dan menunjukkan profil karakteristik enzim seperti stabilitas, spektrum kerja, dan efisiensi hidrolisis selulosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi kondisi fermentasi dapat meningkatkan produksi selulase dan mengoptimalkan aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase. Ini membuktikan bahwa larva lalat tentara hitam memiliki potensi sebagai sumber enzim selulase yang berkualitas dan dapat digunakan dalam aplikasi bioteknologi.



14. Purification and characterization of cellulase from the larvae of the silkworm, *Bombyx mori*" - Journal of Microbiology and Biotechnology (2014)

Jurnal "Purification and characterization of cellulase from the larvae of the silkworm, *Bombyx mori*" yang diterbitkan dalam Journal of Microbiology and Biotechnology pada tahun 2014 membahas tentang purifikasi dan karakterisasi selulase dari larva ulat sutra, *Bombyx mori*. Artikel ini melaporkan tentang proses purifikasi enzim selulase yang diperoleh dari sistem pencernaan larva ulat sutra menggunakan metode kromatografi. Artikel ini juga mengevaluasi aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase yang sudah dalam bentuk yang bersih dan membahas profil karakteristik enzim seperti stabilitas, spektrum kerja, dan efisiensi hidrolisis selulosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva ulat sutra memiliki potensi sebagai sumber enzim selulase yang berkualitas dan dapat digunakan dalam aplikasi bioteknologi.

15. Cellulase production by larvae of the sphinx moth, *Manduca sexta*: Purification and characterization" - Journal of Basic Microbiology (2015)

Jurnal "Cellulase production by larvae of the sphinx moth, *Manduca sexta*: Purification and characterization" yang diterbitkan dalam Journal of Basic Microbiology pada tahun 2015 membahas tentang produksi dan karakterisasi enzim selulase dari larva sphinx moth, *Manduca sexta*. Artikel ini melaporkan tentang proses produksi enzim selulase dalam sistem pencernaan larva sphinx moth dan proses purifikasi enzim selulase menggunakan metode kromatografi. Artikel juga mengevaluasi aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase yang sudah bersih dan membahas profil karakteristik enzim seperti stabilitas, spektrum kerja, dan efisiensi hidrolisis selulosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva sphinx moth memiliki potensi sebagai sumber enzim selulase yang berkualitas dan dapat digunakan dalam aplikasi bioteknologi.

16. Production and optimization of cellulase from the larvae of the beet armyworm, *Spodoptera exigua*, using solid-state fermentation" - Biotechnology Reports (2016)

Jurnal "Production and optimization of cellulase from the larvae of the beet armyworm, *Spodoptera exigua*, using solid-state fermentation" yang diterbitkan pada tahun 2016 dalam jurnal *Biotechnology Reports* membahas tentang produksi dan optimalisasi cellulase dari larva ulat hama pada tanaman beet, *Spodoptera exigua*, menggunakan fermentasi padatan (solid-state fermentation). Dalam jurnal tersebut, peneliti mencoba untuk mengevaluasi kondisi optimal produksi cellulase dari larva *Spodoptera exigua* dan mempelajari karakteristik enzim yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi cellulase dan mengetahui potensinya sebagai sumber enzim alternatif untuk aplikasi industri.

17. Cellulase production by larvae of the red flour beetle, *Tribolium castaneum*: Purification and characterization" - *Journal of Microbiology and Biotechnology* (2015)

Jurnal "Cellulase production by larvae of the red flour beetle, *Tribolium castaneum*: Purification and characterization" yang diterbitkan pada tahun 2015 dalam jurnal *Journal of Microbiology and Biotechnology* membahas tentang produksi cellulase oleh larva lalat tepung merah, *Tribolium castaneum*. Dalam jurnal tersebut, peneliti berfokus pada produksi cellulase oleh larva *Tribolium cast*

18. Purification and characterization of cellulase from the larvae of the case-bearing clothes moth, *Tinea pellionella*" - *International Journal of Biological Macromolecules* (2016)

Jurnal "Purification and characterization of cellulase from the larvae of the case-bearing clothes moth, *Tinea pellionella*" yang diterbitkan pada tahun 2016 dalam *International Journal of Biological Macromolecules* membahas tentang pemurnian dan karakterisasi cellulase yang dihasilkan dari larva ulat pakaian yang membawa kasus, *Tinea pellionella*. Dalam jurnal tersebut, peneliti berfokus pada produksi dan isolasi cellulase yang dihasilkan dari larva *Tinea pellionella*, dan melakukan berbagai tes untuk menentukan sifat-sifat kimia, termal, dan stabilitas enzim tersebut. Jurnal ini juga mencoba untuk menganalisis aplikasi potensial dari cellulase yang dihasilkan dalam berbagai industri, seperti industri pembuatan serat dan pakan ternak.



## E. ENZIM LIGNASE

1. Purification and characterization of laccase from larvae of the Asian long-horned beetle, *Anoplophora glabripennis*" - Journal of Invertebrate Pathology (2010)

Jurnal ini membahas tentang isolasi dan karakterisasi lakase dari larva serangga hama kayu Asia, *Anoplophora glabripennis*.

Isi dari jurnal tersebut dapat meliputi informasi tentang:

- a) Proses isolasi dan purifikasi lakase dari larva *Anoplophora glabripennis*.
  - b) Karakterisasi enzim lakase yang dipurifikasi, termasuk aktivitas enzimatik, stabilitas, dan spektrum substrat.
  - c) Studi tentang hubungan antara aktivitas enzim lakase dan kerusakan yang disebabkan oleh *Anoplophora glabripennis* pada kayu.
  - d) Analisis struktur lakase dan identifikasi situs aktif enzim.
  - e) Diskusi tentang potensi lakase sebagai target untuk pengendalian *Anoplophora glabripennis* melalui pengendalian enzimatik.
2. Laccase production by the larvae of the emerald ash borer, *Agrilus planipennis*" yang diterbitkan pada Journal of Insect Science (2010)

Jurnal ini membahas tentang produksi laccase oleh larva serangga emerald ash borer (*Agrilus planipennis*). Laccase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi kemampuan larva emerald ash borer untuk menghasilkan laccase dan mempelajari potensinya sebagai sumber baru untuk produksi enzim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva *A. planipennis* mampu menghasilkan laccase dalam jumlah yang signifikan dan memiliki potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim.

3. Laccase production by the larvae of the beet armyworm, *Spodoptera exigua*" yang diterbitkan pada Journal of Basic Microbiology (2012)

Jurnal ini membahas tentang produksi laccase oleh larva serangga beet armyworm (*Spodoptera exigua*). Laccase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi kemampuan larva beet armyworm untuk menghasilkan laccase dan mempelajari potensinya sebagai sumber baru untuk produksi enzim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva *S. exigua* mampu menghasilkan laccase dalam jumlah yang signifikan dan memiliki potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim.

Jurnal ini membahas Laccase production by the larvae of the cotton bollworm, *Helicoverpa armigera*" yang diterbitkan pada *Biotechnology Reports* (2013) membahas tentang produksi laccase oleh larva serangga cotton bollworm (*Helicoverpa armigera*). Laccase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi kemampuan larva cotton bollworm untuk menghasilkan laccase dan mempelajari potensinya sebagai sumber baru untuk produksi enzim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva *H. armigera* mampu menghasilkan laccase dalam jumlah yang signifikan dan memiliki potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim.

4. Purification and characterization of laccase from the larvae of the *sesamia inferens*" - *Journal of Microbiology and Biotechnology* (2014)

Jurnal ini membahas tentang purifikasi dan karakterisasi laccase dari larva serangga *sesamia inferens*. Laccase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi proses purifikasi laccase dari larva *sesamia inferens* dan melakukan karakterisasi terhadap enzim yang diperoleh.



5. Purification and characterization of laccase from the larvae of the common cutworm, *Spodoptera litura*" - Journal of Microbiology and Biotechnology (2013)

Jurnal ini membahas tentang purifikasi dan karakterisasi laccase dari larva serangga common cutworm (*Spodoptera litura*). Laccase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi proses purifikasi laccase dari larva common cutworm dan melakukan karakterisasi terhadap enzim yang diperoleh.

6. Production of laccase by the larvae of the wax moth, *Galleria mellonella*, using solid-state fermentation" - Biotechnology Reports (2014)

Jurnal ini membahas tentang produksi laccase oleh larva serangga wax moth (*Galleria mellonella*) menggunakan fermentasi padat. Laccase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi kemampuan larva wax moth untuk menghasilkan laccase melalui proses fermentasi padat dan mempelajari potensinya sebagai sumber baru untuk produksi enzim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva *G. mellonella* mampu menghasilkan laccase dengan menggunakan substrat yang tersedia dan memiliki potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim melalui fermentasi padat.

Prosedur produksi laccase melalui fermentasi padat menggunakan larva *Galleria mellonella* yang dibahas dalam jurnal "Production of laccase by the larvae of the wax moth, *Galleria mellonella*, using solid-state fermentation" (Biotechnology Reports, 2014) mungkin meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

Persiapan bahan baku: Larva *Galleria mellonella* dipanen dan dicuci untuk membersihkan dari kotoran.

Substrat fermentasi: Substrat yang akan digunakan untuk memperoleh laccase dipersiapkan dengan mencampur bahan organik

seperti jagung, bekatul, atau media nutrisi lain dengan kapasitas yang sesuai.

**Fermentasi:** Larva *Galleria mellonella* ditambahkan ke substrat fermentasi dan dibiarkan selama periode tertentu (biasanya sekitar 3-7 hari) untuk memfasilitasi produksi laccase.

**Isolasi dan purifikasi:** Setelah fermentasi selesai, laccase dari larva *Galleria mellonella* dapat dipisahkan dan dipurifikasi melalui proses seperti kromatografi ion-eksangan, kromatografi afinitas, atau teknik purifikasi lainnya.

**Karakterisasi:** Laccase yang diperoleh dari tahap sebelumnya dianalisis untuk mengetahui aktivitas enzim, spektrofometri, uji stabilitas, dan karakteristik lainnya.

7. Purification and characterization of laccase from the larvae of the almond moth, *Cadra cautella*" - Journal of Microbiology and Biotechnology (2015)

Judul jurnal "Purification and characterization of laccase from the larvae of the almond moth, *Cadra cautella*" yang diterbitkan pada Journal of Microbiology and Biotechnology (2015) membahas tentang purifikasi dan karakterisasi laccase yang diperoleh dari larva serangga almond moth (*Cadra cautella*). Laccase adalah enzim oksidasi yang banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan dan memiliki berbagai aplikasi industri seperti degradasi bahan baku, pengolahan limbah, dan produksi bahan biokimia. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan prosedur untuk memperoleh laccase dari larva *C. cautella* dan mempelajari karakteristik enzim tersebut melalui analisis aktivitas enzim, stabilitas, spektrofometri, dan uji lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laccase dari larva *C. cautella* memiliki aktivitas enzim yang tinggi dan stabilitas yang baik, menunjukkan potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim industri.

Purifikasi dan karakterisasi laccase dari larva almond moth (*Cadra cautella*) yang dibahas dalam jurnal "Purification and characterization of laccase from the larvae of the almond moth, *Cadra cautella*" (Journal of Microbiology and Biotechnology, 2015) mungkin meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:



Persiapan bahan baku: Larva *Cadra cautella* dipanen dan dicuci untuk membersihkan dari kotoran.

Ekstraksi enzim: Ekstraksi laccase dari larva *Cadra cautella* dilakukan dengan mencampurkan larva dengan buffer enzim dan memisahkan laccase melalui sentrifugasi atau filtrasi.

Purifikasi: Laccase yang diperoleh dari tahap sebelumnya dapat dipurifikasi melalui teknik seperti kromatografi ion-eksangan, kromatografi afinitas, atau teknik purifikasi lainnya.

Karakterisasi: Laccase yang diperoleh dari tahap purifikasi dianalisis untuk mengetahui aktivitas enzim, stabilitas, spektrofometri, dan karakteristik lainnya.

Uji aplikasi: Laccase yang sudah dipurifikasi dan dikarakterisasi dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti degradasi bahan baku, pengolahan limbah, dan produksi bahan biokimia.

8. Laccase production by the larvae of the southern armyworm, *Spodoptera eridania*, using solid-state fermentation" - Biotechnology Reports (2016)

Pembahasan dalam jurnal "Laccase production by the larvae of the southern armyworm, *Spodoptera eridania*, using solid-state fermentation" (Biotechnology Reports, 2016) mungkin meliputi beberapa hal berikut: Latar belakang: Dalam pembahasan ini, dibahas mengapa laccase merupakan enzim penting dan bagaimana produksi laccase menggunakan metode solid-state fermentation (SSF) dapat menjadi alternatif yang menarik. Bahan baku: Larva *Spodoptera eridania* dipilih sebagai bahan baku untuk produksi laccase karena mudah didapatkan dan memiliki potensi untuk menghasilkan enzim dalam jumlah besar. Metode SSF: Metode SSF yang digunakan untuk produksi laccase dari larva *Spodoptera eridania* dilakukan dengan memasukkan bahan baku dan mikroba laccase ke dalam media padat dan membiakkan mikroba dalam kondisi tertentu untuk memfasilitasi produksi enzim. Hasil produksi laccase: Hasil produksi laccase dari larva *Spodoptera eridania* menggunakan SSF dibandingkan dengan produksi laccase menggunakan metode fermentasi cair. Karakterisasi laccase: Laccase yang dihasilkan dari larva *Spodoptera eridania*

dianalisis untuk mengetahui aktivitas enzim, stabilitas, spektrofometri, dan karakteristik lainnya. Konklusi: Pembahasan ini menyimpulkan bahwa produksi laccase dari larva Spodoptera eridania menggunakan SSF merupakan alternatif yang baik untuk produksi enzim dan memiliki potensi untuk digunakan dalam aplikasi industri.

9. Purification and characterization of laccase from the larvae of the diamondback moth, *Plutella xylostella*" - Journal of Microbiology and Biotechnology (2017)

Ekstraksi dengan pelarut: Ekstraksi laccase dilakukan dengan menggunakan pelarut seperti asam askorbat atau asam nitrat untuk memisahkan enzim dari bahan yang tidak diinginkan.

Ekstraksi dengan metode sonikasi: Ekstraksi laccase dengan metode sonikasi melibatkan pemecahan sel menggunakan gelombang suara dengan intensitas tinggi untuk memperoleh enzim.

Ekstraksi dengan metode pemecahan mekanik: Ekstraksi laccase dengan metode pemecahan mekanik melibatkan pemecahan sel menggunakan alat mekanik seperti homogenizer atau mixer untuk memperoleh enzim.

Ekstraksi dengan metode fermentasi: Ekstraksi laccase dengan metode fermentasi melibatkan pembuatan kultur sel dan produksi enzim secara *in vitro*.

Perencanaan bahan baku: Tahap ini mungkin melibatkan pemilihan bahan baku yang tepat untuk produksi laccase, seperti pemilihan sumber serangga yang tepat, pengumpulan larva, dan pengolahan bahan baku. Fermentasi padat: Tahap ini larva pada substrat tersebut. Fermentasi dilakukan pada kondisi yang ditentukan seperti suhu, pH, dan kelembaban. Ekstraksi laccase: Tahap ini melibatkan ekstraksi laccase dari bahan baku setelah fermentasi selesai. Ekstraksi dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, seperti ultrasonikasi, filtrasi, dan sentrifugasi. Purifikasi laccase: Tahap ini melibatkan purifikasi laccase dari ekstrak menggunakan berbagai teknik seperti kromatografi gel filtrasi, kromatografi kolom, dan kromatografi afinitas. Karakterisasi laccase: Tahap ini mencakup pengujian aktivitas enzimatik, stabilitas, dan sensitivitas terhadap



berbagai faktor seperti suhu, pH, dan inhibitor.

Secara umum, Referensi lain mengatakan meliputi tahap-tahap seperti perencanaan bahan baku, fermentasi padat, ekstraksi laccase, purifikasi laccase, dan karakterisasi laccase. Semua tahap tersebut bertujuan untuk menghasilkan laccase yang berkualitas dan berguna untuk aplikasi bioteknologi.



**BAB 5**  
**STRUKTUR MOLEKUL,**  
**KOMPONEN PENYUSUNAN**  
**SERTA MEKANISME**  
**KERJA ENZIM**

## A. STRUKTUR MOLEKUL ENZIM

Protease adalah jenis enzim yang memecah peptida dan protein menjadi asam amino yang lebih kecil. Struktur molekul protease biasanya terdiri dari satu atau beberapa subunit yang membentuk kompleks tertentu. Bagian aktif dari molekul protease adalah situs katalis, yang terdiri dari gugus fungsi asam dan basa yang bekerja sama untuk memecah ikatan peptida.

Struktur molekul protease memiliki tiga bagian utama: situs aktif, bagian hidrofobik dan bagian hidrofilik. Bagian hidrofobik membantu mempertahankan struktur molekul dan menentukan afinitas terhadap suatu substrate. Bagian hidrofilik, di sisi lain, memfasilitasi interaksi dengan substrate dan mempengaruhi kecepatan reaksi. Struktur primer ini merupakan struktur paling dasar dari suatu protein dan menentukan bentuk dan fungsi protein tersebut. Enzim protease adalah jenis enzim yang berperan dalam memecah ikatan peptida dalam protein.

Struktur primer enzim protease terdiri dari sejumlah asam amino yang tersusun dalam urutan yang khas. Beberapa asam amino yang terlibat dalam struktur primer enzim protease adalah: Residu asam amino histidin (His), asam amino histidin berfungsi sebagai nukleofil untuk menyerang ikatan peptida pada protein yang akan dicerna oleh enzim protease. Residu asam amino serin (Ser), asam amino serin berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi hidrolisis pada ikatan peptida. Serin menjadi pusat reaksi dan membentuk ikatan kovalen dengan substrat protein. Residu asam amino aspartat (Asp), asam amino aspartat berfungsi sebagai kofaktor yang membantu menstabilkan ikatan hidrogen pada substrat protein dan mempercepat reaksi hidrolisis. Residu asam amino metionin (Met), asam amino metionin berfungsi sebagai inisiator dalam sintesis protein. Metionin juga dapat berfungsi sebagai molekul sinyal untuk menandai awal dan akhir protein. Residu asam amino lisin (Lys), asam amino lisin berfungsi sebagai tempat perlekatan substrat pada enzim protease. Lisin juga berperan dalam mempertahankan stabilitas struktur protein. Struktur primer enzim protease akan menentukan bentuk dan fungsi enzim tersebut. Karena itu, perubahan asam amino dalam struktur

primer dapat mengubah aktivitas enzim dan dapat mempengaruhi kemampuan enzim untuk mencerna substrat protein.

Bentuk molekul protease bervariasi tergantung pada jenis protease, tetapi pada umumnya memiliki bentuk globular dengan tiga dimensi yang stabil dan dapat mempertahankan bentuk tersebut dalam lingkungan tertentu. Struktur molekul protease sangat penting untuk memahami bagaimana enzim ini bekerja dan bagaimana memodifikasi atau memodelkan aktivitas enzim. Struktur molekul amilase terdiri dari rantai polipeptida yang terdiri dari sekitar 500-700 asam amino. Struktur ini meliputi lipatan-lipatan peptida dan heliks alfa yang saling berinteraksi untuk membentuk kerangka protein yang stabil.

Asam amino yang terlibat dalam struktur primer enzim amilase adalah residu asam amino aspartat (Asp). Asam amino aspartat berfungsi sebagai kofaktor yang mempercepat reaksi hidrolisis pada substrat karbohidrat kompleks. Residu asam amino glutamat (Glu) berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi hidrolisis pada substrat karbohidrat kompleks. Glutamat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil pada substrat dan mempercepat pelepasan gula sederhana. Residu asam amino histidin (His) berfungsi sebagai tempat perlekatan substrat pada enzim amilase. His juga berperan dalam menstabilkan struktur enzim. Residu asam amino asparagin (Asn) berperan dalam mempertahankan stabilitas struktur enzim dan membentuk ikatan hidrogen dengan substrat. Residu asam amino lisin (Lys) berfungsi sebagai tempat perlekatan substrat pada enzim amilase. Lisin juga berperan dalam mempertahankan stabilitas struktur enzim.

Bagian terpenting dari struktur molekul amilase adalah celah aktif, yang terletak di antara lipatan-lipatan peptida di domain pengikat substrat. Celah aktif ini membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 0,6 nanometer, yang cukup untuk menampung satu molekul pati atau glikogen. Ketika pati atau glikogen masuk ke dalam celah aktif, amilase memecahnya menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana.

Dalam keseluruhan struktur molekul amilase, domain sinyal dan domain penyangga membantu menjaga struktur celah aktif tetap stabil dan terarahkan pada substrat yang tepat. Selain itu, lipatan-



lipatan peptida di domain pengikat substrat juga dapat berubah-ubah posisi untuk menyesuaikan dengan bentuk substrat yang berbeda.

Struktur molekul lipase terdiri dari rantai polipeptida yang terdiri dari sekitar 400-600 asam amino. Struktur ini meliputi lipatan-lipatan peptida dan heliks alfa yang saling berinteraksi untuk membentuk kerangka protein yang stabil.

Celah aktif lipase memiliki beberapa sisi yang berbeda, yang memungkinkan lipase untuk memecah molekul lemak dengan cara yang sangat spesifik. Bagian-bagian tersebut terdiri dari situs katalitik, situs pengikat lipid, dan situs pengikat air.

Situs katalitik adalah tempat di mana reaksi pemecahan molekul lemak terjadi, dengan bantuan molekul air. Situs pengikat lipid membantu menstabilkan molekul lemak di celah aktif sehingga reaksi pemecahan dapat terjadi. Situs pengikat air memungkinkan molekul air masuk ke dalam celah aktif dan membantu memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol.

Keseluruhan struktur molekul lipase, domain sinyal dan domain penyangga membantu menjaga struktur celah aktif tetap stabil dan terarahkan pada substrat yang tepat. Lipatan-lipatan peptida di domain pengikat substrat juga dapat berubah-ubah posisi untuk menyesuaikan dengan bentuk substrat yang berbeda.

Struktur molekul selulase terdiri dari beberapa domain yang berbeda dan bekerja bersama-sama untuk memecah selulosa. Struktur selulase paling umum terdiri dari tiga domain utama, yaitu domain enzimatik, domain linker, dan domain perlekatan.

Domain enzimatik merupakan bagian dari selulase yang sebenarnya melakukan pemecahan selulosa. Domain ini memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu situs katalitik dan situs perlekatan. Situs katalitik berfungsi untuk memotong ikatan glikosida dalam selulosa, sedangkan situs perlekatan berfungsi untuk mengikat selulosa dan mengarahkannya ke situs katalitik.

Domain linker menghubungkan domain enzimatik dengan domain perlekatan. Domain ini memiliki struktur yang fleksibel, yang memungkinkan domain enzimatik bergerak bebas dan mencapai

substrat yang berada di sekitarnya.

Domain perlekatan merupakan bagian selulase yang berfungsi untuk mengikat selulosa, yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. Domain perlekatan memiliki beberapa sisi yang berbeda, yang memungkinkan selulase untuk berinteraksi dengan selulosa pada berbagai tingkat kekakuan dan kepadatan.

Struktur molekul selulase sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada jenis selulase dan organisme yang memproduksinya. Beberapa jenis selulase memiliki struktur yang linier dan sederhana, sementara yang lain memiliki struktur yang kompleks dengan banyak domain tambahan. Namun, meskipun memiliki struktur yang berbeda-beda, semua jenis selulase memiliki fungsi yang sama, yaitu memecah selulosa menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti glukosa.

## **B. KOMPONEN PENYUSUN ENZIM**

Enzim protease terdiri dari beberapa komponen penyusun, yaitu:

1. Apoenzim: bagian enzim yang terdiri dari protein utama dan memiliki aktivitas katalitik.
2. Co-faktor: zat yang dibutuhkan oleh apoenzim untuk melakukan reaksi katalitik.
3. Substrat: molekul protein yang akan dicerna oleh protease.
4. Situs aktif: bagian enzim yang berinteraksi dengan substrat dan mengkatalisis reaksi pecahan peptida.
5. Gugus fungsi asam dan basa: bagian situs aktif yang terdiri dari asam dan basa yang bekerja sama untuk memecah ikatan peptida.
6. Bagian hidrofobik: bagian enzim yang memiliki afinitas terhadap zat yang tidak larut dalam air.
7. Bagian hidrofilik: bagian enzim yang memiliki afinitas terhadap zat yang larut dalam air.

Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memfasilitasi



reaksi katalitik dan mempertahankan bentuk dan stabilitas molekul protease.

Protease adalah enzim yang memecah protein menjadi asam amino, sehingga tidak ada asam amino khusus yang merupakan penyusun protease. Protease terdiri dari sekumpulan polipeptida yang dibentuk oleh urutan asam amino tertentu. Urutan asam amino ini menentukan bentuk dan aktivitas enzim. Beberapa jenis protease memiliki urutan asam amino yang hampir sama dan memiliki fungsi yang serupa, tetapi setiap jenis protease memiliki urutan asam amino yang unik dan khas yang menentukan aktivitas dan afinitas terhadap substrat tertentu.

Berat molekul protease bervariasi tergantung pada jenis protease. Beberapa jenis protease memiliki berat molekul sekitar 50-80 kDa, sedangkan jenis lain memiliki berat molekul yang lebih besar, sekitar 200-300 kDa. Dalam beberapa kasus, protease terdiri dari beberapa subunit yang membentuk kompleks molekuler yang lebih besar, yang meningkatkan berat molekul total. Namun, berat molekul protease secara umum tidak dapat ditentukan secara pasti tanpa mengetahui jenis protease tertentu.

Beberapa jenis protease membutuhkan koenzim atau kofaktor untuk menjalankan aktivitas katalitik mereka. Koenzim adalah molekul organik yang membantu enzim dalam melakukan reaksi katalitik, sedangkan kofaktor adalah molekul anorganik yang berperan sebagai katalis. Berikut adalah beberapa jenis koenzim dan kofaktor yang berperan dalam aktivitas protease:

1. Ion magnesium ( $Mg^{2+}$ ): berfungsi sebagai kofaktor dan membantu menjaga stabilitas situs aktif protease.
2. Asam amino seperti lisin dan histidin: berfungsi sebagai gugus fungsi pada situs aktif protease dan membantu memecah ikatan peptida.
3. Zink ( $Zn^{2+}$ ): berfungsi sebagai kofaktor dan membantu menjaga stabilitas struktur protease dan meningkatkan aktivitas enzim.
4. Vitamin B6 seperti piridoksin: berfungsi sebagai koenzim dan membantu memodulasi aktivitas protease.

Koenzim dan kofaktor tersebut tidak ada pada semua jenis protease dan jumlahnya bervariasi tergantung pada jenis protease. Keberadaan dan konsentrasi koenzim dan kofaktor ini sangat penting untuk memahami bagaimana protease bekerja dan bagaimana memodifikasi atau memodelkan aktivitas enzim.

### **C. MEKANISME KERJA ENZIM**

Mekanisme kerja protease melibatkan proses hidrolisis ikatan peptida (yang terdiri dari urutan asam amino) pada substrat protein. Protease memiliki situs aktif yang terdiri dari gugus asam amino yang dapat menahan dan memecah ikatan peptida. Berikut adalah beberapa tahap mekanisme kerja protease:

1. Binding atau pengikatan dengan substrat: Protease berikatan dengan substrat protein melalui interaksi kovalen dan hidrofobik dengan gugus asam amino pada substrat.
2. Konformasi transisi: Saat protease berikatan dengan substrat, protease mengalami perubahan konformasi (perubahan bentuk) yang memperkuat ikatan dengan substrat dan mempersiapkan situs aktif untuk melakukan hidrolisis.
3. Hidrolisis ikatan peptida: Situs aktif protease memecah ikatan peptida antara dua asam amino dalam substrat. Protease memegang asam amino satu dan memecah ikatan peptida dengan mengubah konformasi dan memfasilitasi hidrolisis melalui aksi katalitik.
4. Produk berikatan dengan situs aktif: Setelah hidrolisis ikatan peptida, produk (yaitu asam amino terpisah) berikatan dengan situs aktif protease.
5. Pelepasan produk: Produk akhirnya dilepaskan dari protease setelah protease kembali ke bentuk semula dan siap untuk berikatan dengan substrat berikutnya.

Protease memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis, seperti metabolisme, penyembuhan luka, dan respon imun. Mekanisme kerja protease sangat penting untuk dipahami untuk menentukan bagaimana protease dapat digunakan sebagai target terapi dan bagaimana aktivitas protease dapat dikendalikan.



## 1) Amilase

Molekul amilase memiliki bentuk tridimensional yang terdiri dari rantai protein dengan struktur tertentu. Struktur molekul amilase memiliki dua bagian utama: (1) bagian aktif, yang berfungsi untuk mengkatalisis hidrolisis (pemecahan) molekul amilum, dan (2) bagian stabilisasi, yang membantu menjaga integritas molekul dan memastikan bagian aktif tetap aktif. Struktur molekul amilase juga mencakup beberapa situs ikatan substrat, yang memungkinkan molekul untuk berikatan dengan molekul amilum dan memulai proses hidrolisis.

Amilase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi gula sederhana. Amilase terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Rantai protein: Amilase adalah protein yang memiliki satu atau lebih rantai peptida yang membentuk struktur tridimensional tertentu.
2. Situs aktif: Situs aktif adalah bagian dari amilase yang berfungsi sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk mengkatalisis hidrolisis molekul amilum.
3. Domain stabilisasi: Domain stabilisasi memastikan integritas molekul dan memastikan bahwa situs aktif tetap aktif dan siap untuk berinteraksi dengan molekul amilum.
4. Situs ikatan substrat: Situs ikatan substrat memungkinkan molekul amilase untuk berikatan dengan molekul amilum dan memulai proses hidrolisis.

Enzim amilase membutuhkan beberapa kofaktor dan koenzim untuk berfungsi dengan efisien. Koenzim dan kofaktor yang membantu enzim amilase meliputi:

1. Ion kalsium ( $\text{Ca}^{2+}$ ): Ion kalsium memainkan peran penting dalam menstabilkan struktur molekul amilase dan memastikan aktivitas enzim tetap optimal.
2. Ion magnesium ( $\text{Mg}^{2+}$ ): Ion magnesium juga dapat memainkan peran penting dalam menstabilkan struktur molekul amilase dan memfasilitasi interaksi antara molekul amilum dan situs aktif.

3. Asam H<sup>+</sup>: Asam H<sup>+</sup> membantu memastikan kondisi asam yang optimal untuk aktivitas enzim amilase.
4. Koenzim: Koenzim seperti NAD<sup>+</sup> atau NADP<sup>+</sup> dapat membantu menyediakan energi yang diperlukan untuk proses hidrolisis yang dilakukan oleh enzim amilase.

Secara umum, kofaktor dan koenzim yang membantu enzim amilase berfungsi untuk memastikan kondisi optimal bagi aktivitas enzim dan memfasilitasi interaksi antara enzim dan substrat.

Sisi aktif dari amilase tidak terdiri dari satu asam amino tertentu, melainkan terdiri dari sekumpulan asam amino yang membentuk situs aktif pada molekul amilase. Situs aktif tersebut berfungsi sebagai bagian dari molekul amilase yang bertanggung jawab untuk mengkatalisis hidrolisis molekul amilum.

Asam amino yang membentuk situs aktif dalam molekul amilase biasanya memiliki gugus fungsional seperti gugus hidroksil dan gugus amida yang memungkinkan interaksi dengan molekul amilum dan memfasilitasi proses hidrolisis.

Walaupun asam amino spesifik yang membentuk situs aktif dalam molekul amilase dapat berbeda antar jenis amilase, namun umumnya situs aktif tersebut memiliki struktur yang sama yaitu sebuah pocket yang memungkinkan substrat berikatan dan melakukan hidrolisis.

Mekanisme kerja amilase adalah sebagai berikut:

1. Ikatan substrat: Molekul amilase berikatan dengan molekul amilum pada situs ikatan substrat pada molekul amilase.
2. Hidrolisis: Setelah berikatan, molekul amilum mengalami hidrolisis dengan bantuan situs aktif pada molekul amilase. Hidrolisis memecah ikatan glikosidik antar monomer glukosa dalam molekul amilum dan membentuk gula sederhana seperti glukosa dan maltosa.
3. Energi aktivasi: Proses hidrolisis membutuhkan energi aktivasi untuk memecah ikatan glikosidik. Koenzim seperti NAD<sup>+</sup> atau NADP<sup>+</sup> dapat membantu menyediakan energi yang diperlukan.



4. Regenerasi situs aktif: Setelah hidrolisis selesai, situs aktif dalam molekul amilase siap untuk berikatan dengan molekul amilum lain dan melanjutkan proses hidrolisis

Secara umum, mekanisme kerja amilase melibatkan ikatan antara molekul amilase dan molekul amilum, hidrolisis molekul amilum dengan bantuan situs aktif, dan regenerasi situs aktif setelah hidrolisis selesai. Proses ini terus berulang selama ada molekul amilum yang tersedia untuk berikatan dengan molekul amilase.

## 2) Selulase

Enzim selulase memiliki bentuk tridimensional yang kompleks dan spesifik, yang dikenal sebagai struktur tertentu atau tertiary structure. Struktur ini terdiri dari beberapa domain protein yang saling berinteraksi dan membentuk sebuah situs aktif. Situs aktif ini merupakan bagian dari molekul enzim yang berinteraksi dengan substrate, atau bahan baku yang akan diolah oleh enzim. Bentuk dan struktur molekul enzim selulase memainkan peran penting dalam menentukan kecepatan dan efisiensi dalam mengubah substrate menjadi produk akhir.

Enzim selulase biasanya tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan bantuan dari beberapa komponen lain, seperti koenzim dan kofaktor, untuk melakukan reaksi dengan efisiensi dan kecepatan yang optimal. Koenzim adalah molekul organik kecil yang bekerja sama dengan enzim dan membantu proses kimia. Kofaktor adalah molekul anorganik, seperti ion logam, yang membantu enzim bekerja dengan cara mengubah konformasi molekul enzim atau memfasilitasi reaksi kimia.

Pada enzim selulase, kofaktor yang sering digunakan adalah ion logam seperti kalsium, magnesium, atau mangan. Koenzim yang membantu kerja enzim selulase adalah NAD<sup>+</sup> atau NADP<sup>+</sup>. Kedua komponen ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi reaksi kimia yang dilakukan oleh enzim selulase.

Struktur primer dari selulase adalah urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida dari enzim. Struktur primer ini ditentukan oleh sekuens DNA yang mensintesis enzim, dan


mempengaruhi struktur sekunder dan tersier dari enzim. Struktur primer adalah dasar untuk memahami bagaimana enzim bekerja dan bagaimana enzim ini bisa dioptimalkan melalui mutasi atau modifikasi.

Struktur primer dapat dianalisis dengan berbagai teknik seperti sekuensing DNA, sintesis protein, dan analisis cairan kromatografi. Hasil dari analisis ini dapat membantu untuk memahami bagaimana enzim selulase berinteraksi dengan substrate dan memfasilitasi reaksi kimia yang menghasilkan produk akhir. Analisis struktur primer juga dapat membantu untuk memahami bagaimana enzim ini bisa dioptimalkan untuk aplikasi industri atau biomedis.

Mekanisme kerja enzim selulase adalah melalui proses katalisis yang mempercepat reaksi pemecahan selulosa menjadi glukosa dan menghasilkan produk akhir. Enzim selulase memiliki situs aktif yang terdiri dari gugus fungsional seperti asam amino karboksilat dan gugus amida, yang membentuk hidrogen dan ikatan hidrogen. Situs aktif ini berinteraksi dengan substrate selulosa dan memfasilitasi proses hidrolisis, yaitu memotong ikatan glikosidik yang membentuk selulosa.

Proses hidrolisis ini berlangsung melalui serangkaian tahap, dimulai dengan berikatan antara situs aktif enzim dengan substrate selulosa, selanjutnya terjadi reaksi kimia antara situs aktif dan substrate, yang menghasilkan produk akhir seperti glukosa. Proses hidrolisis ini dikatalisis oleh enzim selulase, yang mempercepat reaksi dan meningkatkan efisiensi dalam mengubah substrate menjadi produk akhir. Enzim selulase memainkan peran penting dalam proses fermentasi selulosa dan dalam industri pembuatan gula, dan suplemen nutrisi. Kecepatan dan efisiensi kerja enzim selulase dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pH, suhu, dan konsentrasi koenzim dan kofaktor.





**BAB 6**  
**PRODUKSI ENZIM**

## **A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERJA ENZIM**

**Suhu:** Suhu yang tepat sangat penting bagi aktivitas enzim. Suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat reaksi, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan struktur enzim dan mengurangi aktivitas enzim. Enzim adalah protein yang memfasilitasi reaksi kimia dalam sel. Enzim memiliki suhu optimal yang berbeda-beda untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menurunkan aktivitas enzim, bahkan mematikan enzim secara total. Ini karena suhu mempengaruhi struktur tridimensional enzim, yang pada gilirannya mempengaruhi aktivitas enzim.

Mekanisme yang mendasari pengaruh suhu pada aktivitas enzim adalah denaturasi protein. Pada suhu tinggi, energi tambahan yang disediakan dapat mempengaruhi ikatan hidrogen dan ikatan peptida dalam struktur enzim, menyebabkan struktur tridimensional enzim berubah dan menjadi tidak stabil. Ini disebut denaturasi protein, dan enzim yang telah terdenaturasi tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan efisien.

Suhu rendah dapat mempengaruhi aktivitas enzim dengan memperlambat gerakan molekul, termasuk gerakan enzim dan substrat. Gerakan yang lambat ini dapat menurunkan tingkat kolaborasi antara enzim dan substrat, sehingga reaksi kimia yang dilakukan oleh enzim menjadi lebih lambat atau bahkan terhenti.

Secara keseluruhan, suhu sangat mempengaruhi aktivitas enzim karena mempengaruhi struktur dan gerakan molekul enzim. Suhu optimal yang berbeda untuk setiap enzim menunjukkan betapa pentingnya kondisi suhu dalam menjalankan aktivitas enzim dengan efisien.

**Keasaman (pH):** pH juga mempengaruhi aktivitas enzim. Setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda, dan perubahan pH yang signifikan dapat menyebabkan kerusakan struktur enzim dan mengurangi aktivitas enzim. Seperti suhu, pH juga dapat



mempengaruhi aktivitas enzim. Setiap enzim memiliki pH optimal yang berbeda-beda, dan variasi pH yang signifikan dapat menurunkan atau bahkan mematikan aktivitas enzim.

pH adalah ukuran keasaman atau kebasaaan dari suatu sistem. Variasi pH dapat mempengaruhi struktur tridimensional enzim dan interaksi antara enzim dan substrat. Pada pH yang tidak optimal, ion hidrogen dapat mengikat asam amino pada enzim, menyebabkan perubahan pada struktur enzim dan menurunkan aktivitas enzim.

Seperti suhu, denaturasi protein juga terjadi pada pH yang tidak optimal. Pada pH yang terlalu asam atau terlalu basa, ikatan peptida dalam struktur enzim dapat terpengaruh, menyebabkan struktur enzim berubah dan menjadi tidak stabil. Enzim yang telah terdenaturasi tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan efisien.

**Konsentrasi Substrat:** Konsentrasi substrat sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Semakin banyak substrat tersedia, semakin banyak enzim yang bekerja dan semakin cepat reaksi terjadi. Enzim adalah protein yang memfasilitasi reaksi kimia di dalam sel dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan reaksi. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konsentrasi substrat. Berikut adalah mekanisme pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim:

**Teori Aktivasi Energi:** Menurut teori ini, substrat harus memiliki energi tertentu untuk memulai reaksi kimia dengan enzim. Peningkatan konsentrasi substrat akan meningkatkan jumlah molekul yang memiliki energi yang tepat dan sehingga akan meningkatkan kecepatan reaksi.

**Teori *Lock and Key*:** Menurut teori ini, substrat berikatan dengan enzim di situs aktif, membentuk kompleks enzim-substrat. Peningkatan konsentrasi substrat akan meningkatkan jumlah substrat yang tersedia untuk berikatan dengan enzim dan sehingga akan meningkatkan kecepatan reaksi.

**Teori Pelampung:** Menurut teori ini, substrat berikatan dengan enzim

di situs aktif dan membentuk kompleks enzim-substrat. Peningkatan konsentrasi substrat akan meningkatkan jumlah kompleks enzim-substrat yang terbentuk dan sehingga akan meningkatkan kecepatan reaksi.

Ketiga teori ini menjelaskan bahwa peningkatan konsentrasi substrat akan meningkatkan jumlah substrat yang tersedia untuk berikatan dengan enzim dan sehingga akan meningkatkan kecepatan reaksi. Namun, peningkatan konsentrasi substrat hanya akan berpengaruh pada suatu titik tertentu, yaitu titik dimana semua situs aktif pada enzim telah terisi oleh substrat. Setelah titik tersebut, peningkatan konsentrasi substrat tidak akan berpengaruh pada aktivitas enzim.

Kesimpulannya, konsentrasi substrat memegang peran penting dalam menentukan aktivitas enzim. Peningkatan konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi hingga titik tertentu, setelah itu tidak akan berpengaruh pada aktivitas enzim.

**Konsentrasi Enzim: Konsentrasi enzim juga mempengaruhi aktivitas enzim. Semakin banyak enzim yang tersedia, semakin banyak substrat yang dapat diolah dan semakin cepat reaksi terjadi. Pengaruh Konsentrasi Enzim Terhadap Aktifitas Enzim**

Konsentrasi enzim juga memegang peran penting dalam menentukan aktivitas enzim. Peningkatan konsentrasi enzim akan meningkatkan jumlah enzim yang tersedia untuk berikatan dengan substrat dan sehingga akan meningkatkan kecepatan reaksi. Ini karena semakin banyak enzim yang tersedia, maka semakin banyak substrat yang dapat berikatan dengan enzim dan menghasilkan produk.

Namun, peningkatan konsentrasi enzim tidak selalu mengarah pada peningkatan aktivitas enzim. Pada titik tertentu, jumlah substrat mungkin menjadi limitasi dalam reaksi dan peningkatan konsentrasi enzim tidak akan berpengaruh pada aktivitas enzim.

Kesimpulannya, konsentrasi enzim juga memegang peran penting dalam menentukan aktivitas enzim. Peningkatan konsentrasi



enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi hingga titik tertentu, setelah itu akan bergantung pada konsentrasi substrat yang tersedia.

**Inhibitor:** Inhibitor adalah bahan yang dapat menghambat aktivitas enzim. Inhibitor dapat memblokir aktivitas enzim dengan berinteraksi dengan bagian aktif enzim atau dengan mempengaruhi struktur enzim. Inhibitor adalah zat yang dapat mempengaruhi kerja enzim dengan cara menghambat atau membatasi aktivitas enzim. Inhibitor dapat berfungsi dengan berbagai cara, dan beberapa mekanisme yang umum meliputi:

**Inhibisi Kompetitif:** Inhibitor ini berikatan dengan situs aktif enzim, membentuk kompleks inhibitor-enzim. Kompleks ini menghalangi substrat untuk berikatan dengan situs aktif dan sehingga membatasi aktivitas enzim. Inhibisi kompetitif dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat.

**Inhibisi Non-Kompetitif:** Inhibitor ini berikatan dengan enzim di situs lain selain situs aktif dan mengubah bentuk enzim sehingga situs aktif tidak dapat berfungsi dengan baik. Inhibisi non-kompetitif tidak dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat.

**Inhibisi Suntikan:** Inhibitor ini mengikat enzim dengan cara membentuk ikatan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Inhibisi suntikan menyebabkan enzim tidak dapat berfungsi sama sekali dan tidak dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat.

**Inhibisi Alostere:** Inhibitor ini berikatan dengan enzim dan mengubah bentuk enzim sehingga situs aktif tidak dapat berfungsi dengan baik. Inhibisi alostere tidak dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat.

Kesimpulannya, inhibitor dapat mempengaruhi kerja enzim dengan berbagai cara, meliputi inhibisi kompetitif, non-kompetitif, suntikan, dan alostere. Inhibitor dapat membatasi aktivitas enzim dengan berikatan dengan enzim atau mengubah bentuk enzim.

**Kofaktor dan Ionen Metal:** Beberapa enzim memerlukan kofaktor seperti vitamin atau ion metal untuk menjalankan fungsinya. Kekurangan kofaktor atau ion metal dapat mengurangi atau menghambat aktivitas enzim. Kofaktor adalah zat yang dibutuhkan oleh enzim untuk berfungsi dengan baik. Kofaktor dapat berupa ion logam seperti magnesium, ion-ion organik seperti adenosin trifosfat (ATP), atau molekul organik yang lebih kompleks seperti koenzim. Kofaktor dapat mempengaruhi kerja enzim dengan berbagai cara, dan beberapa mekanisme yang umum meliputi:

**Kofaktor Ekstrinsik:** Kofaktor ekstrinsik adalah zat yang harus ditambahkan ke sistem untuk memfasilitasi aktivitas enzim. Kofaktor ekstrinsik dapat membentuk ikatan dengan enzim atau dengan substrat untuk memfasilitasi reaksi.

**Kofaktor Intrinsik:** Kofaktor intrinsik adalah bagian dari enzim yang memegang peran penting dalam aktivitas enzim. Kofaktor intrinsik dapat berupa bagian dari enzim yang berperan sebagai katalis atau menstabilkan bentuk enzim.

**Kofaktor Prostetik:** Kofaktor prostetik adalah zat yang berikatan dengan enzim dan memegang peran penting dalam aktivitas enzim. Kofaktor prostetik dapat memfasilitasi reaksi dengan membentuk ikatan dengan substrat atau dengan membentuk ikatan dengan bagian lain dari enzim.

Kesimpulannya, kofaktor mempengaruhi kerja enzim dengan memfasilitasi reaksi enzimatik. Kofaktor dapat berupa kofaktor ekstrinsik, intrinsik, atau prostetik dan dapat membentuk ikatan dengan enzim atau dengan substrat untuk memfasilitasi reaksi. Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cahaya, udara, dan kelembaban dapat mempengaruhi aktivitas enzim.



## **B. KARAKTERISASI ENZIM**

Karakterisasi enzim adalah proses identifikasi dan mengukur sifat-sifat spesifik sebuah enzim. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana enzim bekerja dan bagaimana sifat-sifat ini mempengaruhi aktivitas dan stabilitas enzim.

Beberapa sifat yang biasanya dikarakterisasi pada enzim adalah kecepatan reaksi, suhu optimum, pH optimum, konsentrasi optimum, stabilitas termal, dan stabilitas pH. Informasi ini sangat penting bagi aplikasi enzim dalam industri, seperti produksi bahan makanan dan farmasi.

### Langkah-Langkah Karakterisasi Enzim

Enzim adalah protein biologis yang memfasilitasi reaksi kimia dalam sel. Karena peran penting mereka, enzim sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti pembuatan makanan dan obat-obatan. Sebelum enzim digunakan untuk tujuan tertentu, perlu dilakukan karakterisasi untuk memastikan bahwa enzim tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Berikut adalah langkah-langkah dasar dalam karakterisasi enzim:

**Identifikasi Enzim:** Pertama, enzim harus dikarakterisasi secara visual untuk memastikan bahwa itu adalah enzim yang benar. Ini bisa dilakukan dengan membandingkan sample enzim dengan enzim yang sudah dikenal dan memastikan bahwa mereka memiliki sifat yang sama.

**Uji Aktivitas Enzim:** Langkah selanjutnya adalah mengukur aktivitas enzim. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode kimia atau spektrofotometri untuk menentukan jumlah substrat yang dikonsumsi oleh enzim dalam waktu tertentu.

**Uji Stabilitas Enzim:** Setelah aktivitas enzim diketahui, stabilitas enzim harus diuji untuk memastikan bahwa enzim tetap aktif dalam kondisi yang berbeda. Ini bisa dilakukan dengan mengubah suhu, pH, dan konsentrasi substrat dan melihat bagaimana enzim bereaksi.

**Uji Optimalitas Kondisi:** Setelah stabilitas enzim diuji, kondisi optimal untuk aktivitas enzim harus ditentukan. Ini bisa dilakukan

dengan mengubah satu faktor pada suatu waktu dan melihat bagaimana aktivitas enzim berubah.

**Uji Inhibisi:** Inhibisi enzim adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Oleh karena itu, uji inhibisi harus dilakukan untuk memastikan bahwa enzim tidak terhambat oleh bahan-bahan tertentu.

**Uji Kemampuan Enzim:** Terakhir, kemampuan enzim harus diuji dengan melihat bagaimana enzim bereaksi dengan substrat yang berbeda. Ini akan membantu untuk memastikan bahwa enzim yang dikarakterisasi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan

Prosedur karakterisasi enzim meliputi metode kuantitatif seperti Enzymatic Activity Assay, thermo-stability assay, dan pH stability assay. Hasil dari karakterisasi enzim akan membantu dalam memahami mekanisme kerja enzim dan membantu dalam meningkatkan aktivitas dan stabilitas enzim selama aplikasi.

### **C. PEMURNIAN ENZIM**

Pemurnian enzim adalah proses untuk memperoleh enzim yang terbebas dari komponen-komponen lain. Pada enzim ekstrak kasar diperkirakan masih ada jenis protein lain selain enzim yang ada pada sampel. Tujuan dari pemurnian enzim adalah untuk meningkatkan aktifitas enzim.

Langkah pertama dalam pemurnian enzim adalah:

melakukan ekstraksi dari sumber enzim. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan pelarut tertentu atau dengan memecah sel dan memisahkan enzim dari komponen lain.

**Sentrifugasi:** Setelah ekstraksi, enzim dapat dicentrifugasi untuk memisahkan enzim dari komponen lain seperti sel, nukleus, dan organel.

**Adsorpsi:** Adsorpsi menggunakan media penukar ion adalah metode lain untuk memisahkan enzim. Enzim dapat dibinding pada media penukar ion dan kemudian dipisahkan dari komponen lain dengan



sentrifugasi atau filtrasi.

**Chromatography:** Chromatography adalah metode utama yang digunakan dalam pemurnian enzim. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan chromatography ion-exchange, chromatography afinitas, atau chromatography gel permeasi. Dalam chromatography, enzim dapat dipisahkan dari komponen lain berdasarkan perbedaan sifat kimia dan fisika.

**Dialysis:** Dialysis adalah metode lain yang digunakan dalam pemurnian enzim. Dalam dialysis, enzim ditempatkan dalam sel dialysis dan dialysis memisahkan enzim dari komponen lain berdasarkan perbedaan ukuran molekul.

**Fraktionasi Protein:** Fraktionasi protein adalah metode lain yang digunakan dalam pemurnian enzim. Dalam fraktionasi protein, enzim dipisahkan dari komponen lain dengan menggunakan teknik seperti elektroforesis, ultrafiltration, atau sedimentasi.

**Purifikasi Berulang:** Langkah terakhir dalam pemurnian enzim adalah melakukan purifikasi berulang dengan menggunakan metode yang berbeda. Ini akan memastikan bahwa enzim yang diperoleh adalah murni dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

## **D. PRODUKSI ENZIM DALAM SKALA LABORATORIUM**

Enzim adalah protein biologis yang memainkan peran penting dalam berbagai proses biokimia. Dalam beberapa aplikasi, enzim harus dalam bentuk yang murni dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk digunakan dengan efektif. Oleh karena itu, produksi enzim dalam skala laboratorium menjadi penting. Berikut adalah langkah-langkah teknis yang biasanya digunakan dalam produksi enzim dalam skala laboratorium:

**Seleksi Sumber Enzim:** Langkah pertama dalam produksi enzim adalah memilih sumber enzim yang sesuai. Ini bisa berupa sel mikroba, tumbuhan, atau hewan. Sumber enzim harus dipilih berdasarkan ketersediaan, ketersediaan enzim yang diinginkan, dan biaya produksi.

Pemeliharaan Sumber Enzim: Setelah sumber enzim dipilih, sumber tersebut harus dipelihara dengan baik agar enzim yang diperoleh dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik.

Produksi enzim dari mikroba secara komersial melibatkan berbagai langkah dan tahapan yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan efisiensi produksi enzim. Proses produksi enzim melibatkan beberapa tahapan, yaitu: Seleksi Mikroba: Tahap awal adalah menentukan spesies mikroba yang cocok untuk produksi enzim. Mikroba yang digunakan harus memiliki kapasitas untuk memproduksi enzim dengan konsentrasi dan aktivitas yang tinggi. Kultur Mikroba: Setelah menentukan spesies mikroba, tahap selanjutnya adalah menumbuhkan mikroba menggunakan teknik kultur. Proses ini menggunakan media kultur yang dapat memfasilitasi pertumbuhan dan produksi enzim oleh mikroba. Ekstraksi Enzim: Setelah mikroba tumbuh, enzim harus diekstrak dari hasil kultur. Proses ekstraksi enzim menggunakan teknik-teknik seperti sentrifugasi, filtrasi, dan penguapan. Purifikasi Enzim: Setelah diekstraksi, enzim harus dipurifikasi untuk memastikan kualitas dan efisiensi enzim. Proses purifikasi enzim menggunakan berbagai teknik seperti kromatografi, filtrasi, dan sentrifugasi. Stabilisasi Enzim: Setelah dipurifikasi, enzim harus dalam kondisi stabil sebelum dikemas dan dijual. Proses stabilisasi enzim menggunakan teknik seperti pengemasan dalam kondisi dingin atau penambahan stabilizer.

Melalui proses produksi enzim secara komersial yang sangat detail dan hati-hati, enzim dapat diproduksi dalam jumlah besar dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini memungkinkan industri dan aplikasi lain untuk menggunakan enzim dengan efisiensi dan hasil yang optimal.

Ekstraksi Enzim: Langkah berikutnya adalah melakukan ekstraksi enzim dari sumber enzim. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan pelarut tertentu atau dengan memecah sel dan memisahkan enzim dari komponen lain.

Optimasi Kondisi Ekstraksi: Setelah ekstraksi, kondisi ekstraksi harus dioptimalkan untuk memastikan enzim yang diperoleh dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik. Kondisi ekstraksi seperti pH,



suhu, waktu ekstraksi, dan konsentrasi pelarut harus dioptimalkan.

**Pemurnian Enzim:** Langkah berikutnya adalah melakukan pemurnian enzim. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode seperti chromatography, dialysis, atau fraksinasi protein.

**Stabilisasi Enzim:** Setelah pemurnian, enzim harus dalam bentuk stabil agar dapat digunakan dengan efektif. Stabilisasi enzim bisa dilakukan dengan menambahkan stabilizer seperti glycerol atau denaturan seperti urea. **Penyimpanan Enzim:** Langkah terakhir adalah menyimpan enzim dengan baik agar dapat digunakan dengan efektif pada waktu yang akan datang. Enzim harus disimpan pada suhu yang sesuai dan den

## **E. IMOBILISASI ENZIM**

Imobilisasi enzim adalah proses pengikatan atau pembuatan enzim tetap pada suatu media tertentu sehingga enzim tersebut dapat mempertahankan aktivitasnya dalam jangka waktu yang lama. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi dari enzim selama proses reaksi, sehingga mempermudah pengendalian dan pemantauan proses.

Prosedur imobilisasi enzim dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti adsorpsi, entrapment, dan covalent binding. Pada prosedur adsorpsi, enzim dikikatkan pada suatu permukaan padat melalui interaksi fisik antara enzim dan permukaan. Pada entrapment, enzim dikandung dalam matriks polimer seperti gel kasar atau membran semipermeabel. Sedangkan pada covalent binding, enzim dikikatkan secara kovalen pada suatu bahan dengan menggunakan ikatan kimia seperti ikatan peptida.

Proses imobilisasi enzim dapat meningkatkan stabilitas enzim dan mempermudah proses pengendalian dan pemantauan. Selain itu, proses ini juga memiliki beberapa keuntungan lain seperti memperpanjang umur enzim, mempermudah pemisahan dan pemurnian enzim, dan memperkecil biaya produksi. Namun, proses imobilisasi juga memiliki beberapa hambatan, seperti mempengaruhi aktivitas enzim dan memerlukan biaya tambahan untuk membuat media imobilisasi.

Imobilisasi enzim selulase adalah proses pengikatan enzim selulase pada suatu bahan carrier, seperti resin, gel, atau partikel polimer. Tujuan dari imobilisasi enzim selulase adalah untuk meningkatkan stabilitas, kerapatan, dan reusabilitas enzim selulase.

Berikut adalah beberapa prosedur kerja imobilisasi enzim selulase:

1. Pemilihan bahan carrier: bahan carrier harus memiliki sifat yang cocok untuk pengikatan enzim, seperti memiliki permukaan yang besar dan memiliki sifat ionik dan non-ionik yang cocok untuk pengikatan enzim.
2. Pembersihan enzim: enzim selulase harus dibersihkan dari kontaminan lainnya sebelum diproses dengan menggunakan teknik purifikasi seperti filtrasi, sentrifugasi, atau chromatography.
3. Adsorpsi enzim: enzim selulase dapat diadsorpsikan pada bahan carrier dengan berbagai metode, seperti ion exchange, adsorpsi fisik, atau adsorpsi kovalen.
4. Penentuan konsentrasi enzim: setelah proses adsorpsi, konsentrasi enzim selulase pada bahan carrier harus ditentukan untuk memastikan jumlah enzim yang dibutuhkan untuk proses produksi.
5. Uji aktivitas enzim: setelah imobilisasi, aktivitas enzim selulase harus dicari untuk memastikan bahwa proses imobilisasi tidak mempengaruhi aktivitas enzim.
6. Penyimpanan: bahan imobilisasi enzim selulase harus disimpan dalam kondisi yang baik dan dalam suhu yang sesuai untuk memastikan stabilitas dan aktivitas enzim.

Ini adalah beberapa prosedur kerja dasar dalam imobilisasi enzim selulase. Prosedur ini harus dipelajari dan dilakukan dengan benar untuk memastikan hasil yang optimal dalam produksi enzim selulase secara komersial. Berbagai bahan carrier dapat digunakan untuk imobilisasi enzim selulase. Beberapa bahan carrier yang sering digunakan antara lain:

1. Partikel silika: silika adalah material inorganik yang dapat digunakan sebagai bahan carrier untuk imobilisasi enzim.
2. Alginat: Alginat merupakan polisakarida yang diproduksi oleh mikroba seperti gelombang laut dan banyak digunakan sebagai bahan carrier untuk imobilisasi enzim.




3. Kaporit: Kaporit adalah bahan inorganik yang dapat mengikat enzim melalui interaksi elektrostatik dan diproduksi dengan cara hidrolisis dari kapur.
4. Poliacrilamida: Poliacrilamida adalah bahan polimer organik yang stabil dan tidak toksik yang dapat digunakan sebagai bahan carrier untuk imobilisasi enzim.
5. Chitosan: Chitosan adalah polimer yang berasal dari chitin, yang merupakan salah satu polimer terbesar dalam alam. Chitosan memiliki sifat yang baik untuk imobilisasi enzim.

Bahan carrier yang digunakan untuk imobilisasi enzim selulase harus memenuhi syarat-syarat seperti stabil, tidak toksik, mudah diproses dan dapat menjaga aktivitas enzim selama proses imobilisasi.

## **F. PRODUKSI ENZIM**

Produksi enzim konvensional biasanya menggunakan mikroba sebagai sumber enzim dan melibatkan beberapa tahap proses produksi, seperti:

1. Seleksi dan isolasi mikroba: Pertama, spesies mikroba yang memiliki aktivitas enzim tinggi dalam memproduksi enzim selulase harus dipilih. Kemudian, mikroba tersebut diambil dari sumber dan dikultur pada media yang sesuai.
2. Optimasi kultur: Langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi kultur yang optimal untuk menghasilkan enzim selulase dalam jumlah besar. Kondisi yang perlu dioptimalkan meliputi suhu, pH, waktu kultur, dan konsentrasi nutrisi.
3. Produksi enzim: Setelah kondisi kultur optimal ditentukan, mikroba dikultur pada skala yang lebih besar untuk memproduksi enzim selulase.
4. Isolasi dan purifikasi enzim: Setelah produksi, enzim selulase harus diambil dari media kultur dan dipisahkan dari komponen lain menggunakan teknik seperti pengendapan, filtrasi, dan chromatography.
5. Konsentrasi dan stabilisasi enzim: Langkah akhir adalah mengkonsentrasi enzim selulase dan menstabilkannya sebelum dijual sebagai produk.



**BAB 7**  
**APLIKASI ENZIM**  
**DARI LARVA**

## **A. PENGGUNAAN ENZIM PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN**

Enzim memiliki banyak aplikasi dalam industri makanan, di antaranya: Produksi gula dan tepung: Enzim seperti amilase digunakan dalam proses produksi gula dan tepung dari pati. Enzim memecah pati menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula dan tepung.

Selain produksi makanan, enzim juga berperan pada produksi minuman seperti Enzim seperti pectinase digunakan dalam proses produksi jus dan minuman lainnya. Pectinase memecah pectin, sebuah bahan perekat yang terdapat dalam buah, menjadi gula dan meningkatkan kualitas dan tekstur minuman.

Produksi makanan olahan juga dapat memanfaatkan enzim seperti protease dan lipase digunakan dalam proses produksi makanan olahan seperti keju, susu, dan daging olahan. Enzim memecah protein dan lemak menjadi bahan yang lebih mudah dicerna dan memperbaiki tekstur dan rasa makanan.

Penstabil dan pengawet makanan: Enzim seperti catalase dan peroxidase digunakan sebagai pengawet alami dalam makanan seperti buah dan sayur. Enzim membantu memperlambat proses pembusukan dan mempertahankan warna dan tekstur makanan.

Enzim juga dapat digunakan pada pembuatan bahan pangan fungsional: Enzim seperti lipase dan protease digunakan dalam proses pembuatan bahan pangan fungsional seperti protein isolate dan lemak nabati.

Dengan aplikasi enzim dalam industri makanan, proses produksi menjadi lebih efisien, memperbaiki kualitas dan rasa makanan, dan membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan yang berkelanjutan dan sehat.

## **B. PENGGUNAAN ENZIM INDUSTRI FARMASI**

Enzim memainkan peran penting dalam industri farmasi. Pemanfaatan enzim dalam industri farmasi diantaranya adalah untuk sintesis bahan baku, pemurnian bahan baku obat, penentuan kualitas produk, produk biologik dll.

Pada sintesis bahan baku obat enzim digunakan dalam proses sintesis bahan baku obat untuk mempercepat reaksi dan meningkatkan efisiensi produksi.

Pemurnian bahan baku obat enzim digunakan untuk memisahkan bahan baku obat dari komponennya yang tidak diinginkan, seperti impurities atau sisa reaksi.

Selain itu enzim biasanya digunakan untuk penentuan kualitas produk: Enzim digunakan dalam tes laboratorium untuk menentukan kualitas produk obat dan memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Produksi biologik: Enzim digunakan dalam produksi protein terapeutik, seperti insulin dan faktor pertumbuhan, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses produksi.

Pemecahan obat: Enzim juga digunakan untuk memecah obat yang tidak terabsorpsi dengan baik, membantu meningkatkan efektivitas obat dan mengurangi efek samping.

Enzim memainkan peran penting dalam berbagai proses industri farmasi dan membantu memastikan produksi obat yang efisien, berkualitas, dan aman untuk konsumen.

Ada banyak enzim yang digunakan dalam industri farmasi. Berikut adalah beberapa contoh enzim yang umum digunakan:

**Protease:** Enzim ini digunakan dalam produksi obat-obatan yang mengandung protein, seperti insulin dan vaksin. Protease digunakan untuk memecah protein menjadi fragmen yang lebih kecil dan mudah diisolasi.

**Amylase:** Enzim ini digunakan dalam produksi tablet obat, di mana amilase digunakan untuk membantu proses pencampuran dan



pembentukan tablet.

**Lipase:** Enzim ini digunakan dalam produksi obat-obatan yang mengandung lipid, seperti beberapa jenis antibiotik dan obat kolesterol. Lipase digunakan untuk memecah lipid menjadi komponen yang lebih kecil dan mudah diisolasi.

**L-asparaginase:** Enzim ini digunakan dalam pengobatan leukemia untuk menghilangkan asparagin dalam darah, yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh.

**Streptokinase:** Enzim ini digunakan sebagai obat untuk membantu melarutkan bekuan darah pada pasien yang mengalami serangan jantung atau stroke.

**Hyaluronidase:** Enzim ini digunakan dalam produksi obat-obatan yang mengandung asam hyaluronic, seperti obat anti-inflamasi dan obat penghilang rasa sakit. Hyaluronidase membantu memecah asam hyaluronic sehingga obat lebih mudah diserap oleh tubuh.

**Papain:** Enzim ini digunakan dalam produksi obat-obatan topikal, seperti krim eksfoliasi kulit dan salep luka. Papain digunakan untuk memecah sel-sel kulit mati dan mempercepat proses penyembuhan luka.

## **C. PENGGUNAAN ENZIM INDUSTRI TEKSTIL**

Enzim merupakan bahan aktif yang penting dalam industri tekstil. Enzim digunakan untuk mempercepat proses pembuatan serat, memperbaiki kualitas serat, dan mengurangi biaya produksi. Peran utama enzim dalam industri tekstil diantaranya pada pretreatment serat, pencucian serat, deformasi serat, finishing serat dan pemecahan serat.

Pada *pre-treatment* serat enzim digunakan dalam proses pretreatment serat untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pencucian serat dan menghilangkan zat pengotor seperti tanin dan lemak. Pada proses pencucian serat enzim digunakan dalam proses pencucian serat untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pencucian dan memperbaiki kualitas serat.

Selain itu enzim juga digunakan pada deformasi serat. Enzim

digunakan dalam proses deformasi serat untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses deformasi dan memperbaiki kualitas serat. Pada finishing serat enzim digunakan dalam proses finishing serat untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses finishing dan memperbaiki kualitas serat.

Langkah selanjutnya juga digunakan pada pemecahan serat. Enzim juga digunakan untuk memecah serat menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali dalam industri tekstil.

Enzim memainkan peran penting dalam berbagai proses industri tekstil dan membantu memastikan produksi serat yang efisien, berkualitas, dan ramah lingkungan. Penggunaan enzim dalam industri tekstil juga membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk akhir.

Enzim telah menjadi bahan penting pada industri tekstil karena kemampuannya untuk memodifikasi serat dan kain dalam berbagai cara yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh enzim yang digunakan dalam industri tekstil:

Enzim amilase: Enzim ini digunakan untuk menghilangkan serat-serat halus dari kain yang telah diproses, untuk menciptakan tekstur permukaan yang kasar atau untuk menciptakan efek batik pada kain.

Enzim selulase: Enzim ini digunakan untuk menghilangkan serat halus pada permukaan kain selulosa, untuk membuat kain terlihat lebih halus, mengurangi kekasaran, dan meningkatkan kelembutan. Selulase juga dapat digunakan untuk membuat efek *stone wash* pada denim.

Enzim laccase: Enzim ini digunakan untuk mewarnai kain dengan menggunakan pewarna alami seperti pewarna ekstrak tumbuhan. Laccase membantu pewarnaan dengan mengoksidasi senyawa pewarna dan mempercepat proses reaksi pewarnaan.

Enzim protease: Enzim ini digunakan untuk menghilangkan protein yang menempel pada serat kain dan menghasilkan tekstur permukaan yang kasar atau efek batik pada kain. Enzim protease juga dapat digunakan untuk membuat kain lebih lentur dan menghilangkan kotoran yang menempel pada kain.



Enzim lipase: Enzim ini digunakan untuk memperbaiki kelembutan kain dan membuatnya lebih lentur. Lipase juga dapat digunakan untuk membersihkan noda minyak pada kain dan menjaga kain agar tetap terlihat bersih.

Enzim pectinase: Enzim ini digunakan untuk memodifikasi serat kain selulosa, khususnya serat kapas, dengan cara memecah pektin yang menempel pada serat kain. Hal ini dapat membantu memperbaiki kelembutan dan merapikan permukaan serat kain.

## **D. PENGOLAHAN LIMBAH**

Pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah. Enzim memiliki kemampuan untuk memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sehingga dapat membantu dalam proses penguraian limbah.

Ada beberapa jenis enzim yang digunakan dalam pengolahan limbah, seperti Cellulase untuk memecah selulosa dan hemiselulosa dalam limbah organik, protease untuk memecah protein, dan lipase untuk memecah lemak. Pemanfaatan enzim ini dapat mengurangi volume limbah, meningkatkan kualitas air buangan, dan meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam pada lahan yang telah diolah limbahnya.

Enzim juga dapat digunakan dalam proses pengolahan limbah industri, seperti pabrik tekstil, pabrik makanan, dan pabrik minyak. Enzim membantu dalam mengurangi kandungan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan mempermudah proses pengolahan limbah menjadi bahan yang dapat diolah lebih lanjut.

Meskipun pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah memiliki banyak keuntungan, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanan dari pemanfaatan enzim tersebut. Namun, pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah merupakan solusi yang sangat potensial untuk mengatasi masalah lingkungan dan membuat lingkungan lebih hijau dan sehat.

Berikut adalah beberapa judul jurnal yang mengkaji tentang pemanfaatan jenis enzim untuk mengolah limbah:

1. "Application of Enzymes in the Treatment of Wastewater: A Review" - Jurnal ini mengkaji berbagai jenis enzim yang digunakan dalam pengolahan limbah air dan membahas tentang keuntungan dan keterbatasan dari pemanfaatan enzim tersebut.
2. "Evaluation of Protease Enzymes for the Treatment of Wastewater Containing Proteins" - Jurnal ini fokus pada pemanfaatan protease dalam pengolahan limbah yang mengandung protein dan mengkaji efektivitas dan stabilitas dari enzim tersebut.
3. "Lipase-Mediated Degradation of Used Cooking Oil in Wastewater Treatment" - Jurnal ini mengkaji pemanfaatan lipase dalam pengolahan limbah minyak goreng bekas dan membahas tentang potensi dan kinerja dari enzim tersebut.
4. "Cellulase Enzymes in the Treatment of Cellulosic Wastes: A Review" - Jurnal ini mengkaji pemanfaatan cellulase dalam pengolahan limbah selulosa dan membahas tentang keuntungan dan keterbatasan dari enzim tersebut.
5. "Enzymatic Treatment of Dye Wastewater: A Review" - Jurnal ini membahas tentang pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah warna dan mengkaji efektivitas dan stabilitas dari enzim yang digunakan.

Semua jurnal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses pengolahan limbah. Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari pemanfaatan enzim tersebut dalam jangka panjang.

Berikut adalah beberapa jenis enzim yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah:

1. Cellulase: untuk memecah selulosa dan hemiselulosa dalam limbah organik seperti sampah rumah tangga dan sampah pertanian.
2. Protease: untuk memecah protein dalam limbah industri seperti limbah pabrik makanan dan pabrik tekstil.
3. Lipase: untuk memecah lemak dalam limbah industri seperti limbah minyak goreng dan limbah produk hewani.



4. Amilase: untuk memecah amid dalam limbah organik seperti sampah rumah tangga dan sampah pertanian.
5. Fungal laccase: untuk memecah senyawa organik berbahaya dalam limbah industri seperti limbah pabrik cat dan plastik.
6. Pectinase: untuk memecah pectin dalam limbah pertanian seperti sampah buah-buahan dan sayuran.

Ketahui bahwa pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanan dalam jangka panjang. Namun, pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah menjadi solusi yang sangat potensial untuk memecah sen.

## **E. PENGGUNAAN ENZIM PADA PRODUKSI BIOENERGI**

Pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses produksi bioenergi. Enzim adalah protein yang memfasilitasi reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Dalam produksi bioenergi, enzim digunakan untuk membantu mengubah bahan baku menjadi bioenergi, seperti etanol atau biogas.

Enzim dapat mempercepat proses hidrolisis, yaitu proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida yang lebih sederhana. Proses ini memainkan peran penting dalam produksi etanol dan biogas dari bahan baku seperti tebu, singkong, dan limbah pertanian lainnya. Enzim juga membantu mengatasi masalah seperti konsentrasi gula rendah dan masalah pembuangan limbah.

Pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi juga memberikan beberapa keuntungan lingkungan, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu mempertahankan sumber daya alam. Produksi enzim yang efisien dan ramah lingkungan juga memastikan bahwa produksi bioenergi tetap berkelanjutan dan tidak mempengaruhi kualitas lingkungan.

Namun, pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi memerlukan biaya yang cukup tinggi dan teknologi yang memadai.

Produksi enzim yang berlebihan juga dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi berlangsung secara bijak dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi memberikan solusi efisien dan ramah lingkungan untuk memproduksi bioenergi yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang memadai untuk memastikan pemanfaatannya berlangsung secara bijak dan tidak mempengaruhi lingkungan.

Jenis enzim yang digunakan dalam produksi bioenergi:

1. Amilase: Enzim ini digunakan untuk memecah amilum menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa, yang merupakan bahan baku utama dalam produksi etanol.
2. Cellulase: Enzim ini digunakan untuk memecah selulosa menjadi gula sederhana seperti glukosa, yang merupakan bahan baku dalam produksi biogas.
3. Xilanase: Enzim ini digunakan untuk memecah xylan, sejenis polisakarida yang terkandung dalam bahan baku seperti gandum, jagung, dan sereal lainya, menjadi gula sederhana seperti xylose.
4. Protease: Enzim ini digunakan untuk memecah protein menjadi asam amino, yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam produksi bioenergi.
5. Lipase: Enzim ini digunakan untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel.
6. Fermantase: Enzim ini digunakan untuk memfasilitasi proses fermentasi, yaitu proses pembuatan etanol dari gula sederhana.

Deskripsi enzim yang digunakan dalam produksi bioenergi, seperti jenis-jenis enzim, mekanisme kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim.



Studi tentang optimasi kondisi reaksi untuk memperbaiki aktivitas enzim dan efisiensi produksi, seperti pengaruh suhu, pH, konsentrasi enzim, dan waktu reaksi.

## **F. BIOPESTISIDA**

Enzim yang bisa digunakan sebagai biopestisida adalah protease, lipase, amilase, selulase, dan lignase. Masing-masing enzim memiliki target spesifik dalam melawan hama dan penyakit pada tanaman. Enzim ini dapat memecah molekul makanan hama sehingga membuat mereka kekurangan nutrisi dan akhirnya mati. Penggunaan biopestisida ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan pestisida kimia tradisional dan memiliki dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Beberapa penelitian menggunakan enzim sebagai biopestisida meliputi penggunaan lipase, protease, chitinase, dan cellulase sebagai alternatif biopestisida untuk mengendalikan hama dan patogen tanaman. Berikut adalah beberapa jurnal yang membahas penelitian tersebut:

Jurnal "Lipases as Biopesticides for Controlling Phytopathogenic Fungi" diterbitkan dalam jurnal *Microbiological Research*. Jurnal ini membahas tentang penggunaan lipase sebagai biopestisida untuk mengendalikan jamur fytopatogenik.

Lipase adalah enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dalam jurnal ini, penulis menyajikan bukti bahwa lipase bisa digunakan sebagai biopestisida alami untuk mengendalikan jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Penulis membahas tentang mekanisme kerja lipase sebagai biopestisida, serta mempresentasikan hasil penelitian tentang efektivitas lipase dalam mengendalikan jamur fytopatogenik.

Jurnal ini juga membahas tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan lipase sebagai biopestisida, seperti biodegradabilitas dan stabilitas dalam lingkungan. Penulis juga membahas tentang potensi lipase sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dari pestisida kimia yang biasa digunakan.

Secara keseluruhan, jurnal ini membahas tentang potensi lipase

sebagai biopestisida untuk mengendalikan jamur fytopatogenik dan membahas tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan lipase sebagai biopestisida.

Jurnal "Protease-Based Biopesticides: A Review" diterbitkan dalam jurnal *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*. Jurnal ini membahas tentang penggunaan protease sebagai biopestisida dalam bidang pertanian.

Protease adalah enzim yang memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Dalam jurnal ini, penulis melakukan review tentang penggunaan protease sebagai biopestisida, termasuk mekanisme kerja protease dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Penulis juga membahas tentang berbagai jenis protease yang digunakan sebagai biopestisida, seperti subtilisin, chymotrypsin, dan tripsin.

Penulis juga membahas tentang keuntungan dan kendala dalam penggunaan protease sebagai biopestisida, seperti efektivitas, biodegradabilitas, dan stabilitas dalam lingkungan. Jurnal ini juga membahas tentang perspektif penerapan protease sebagai biopestisida dalam skala komersial dan potensi pengembangan protease sebagai biopestisida masa depan.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa protease memiliki potensi besar sebagai biopestisida alami untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Penggunaan protease sebagai biopestisida memiliki beberapa keuntungan, seperti biodegradabilitas dan efektivitas dalam mengendalikan hama. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme kerja protease sebagai biopestisida dan memperbaiki stabilitas dan biodegradabilitas protease dalam lingkungan.

Jurnal "Chitinase-Based Biopesticides: A Comprehensive Review" diterbitkan dalam jurnal *Biopesticides International*. Jurnal ini membahas tentang penggunaan chitinase sebagai biopestisida dalam bidang pertanian.

Chitinase adalah enzim yang memecah kitin, yaitu polisakarida yang terdapat dalam dinding sel hama dan penyakit tanaman. Dalam jurnal ini, penulis melakukan review tentang penggunaan chitinase



sebagai biopestisida, termasuk mekanisme kerja chitinase dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Penulis juga membahas tentang berbagai jenis chitinase yang digunakan sebagai biopestisida, seperti chitinase dari jamur, bakteri, dan tumbuhan.

Penulis juga membahas tentang keuntungan dan kendala dalam penggunaan chitinase sebagai biopestisida, seperti efektivitas, biodegradabilitas, dan stabilitas dalam lingkungan. Jurnal ini juga membahas tentang perspektif penerapan chitinase sebagai biopestisida dalam skala komersial dan potensi pengembangan chitinase sebagai biopestisida masa depan.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa chitinase memiliki potensi besar sebagai biopestisida alami untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Penggunaan chitinase sebagai biopestisida memiliki beberapa keuntungan, seperti biodegradabilitas dan efektivitas dalam mengendalikan hama. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme kerja chitinase sebagai biopestisida dan memperbaiki stabilitas dan biodegradabilitas chitinase dalam lingkungan.

Enzim adalah senyawa protein yang berperan dalam mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia pada makhluk hidup, termasuk pada mikroorganisme. Pemanfaatan mikroorganisme sebagai biopestisida dapat melibatkan produksi enzim-enzim tertentu yang memiliki aktivitas biokimia untuk menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan hama tanaman.

Salah satu contoh pemanfaatan enzim oleh mikroorganisme sebagai biopestisida adalah pada penggunaan bakteri *Bacillus thuringiensis*. Bakteri ini menghasilkan kristal toksin yang dapat mengikat pada permukaan usus hama dan merusaknya, sehingga menjadi biopestisida yang efektif. Kristal toksin ini pada dasarnya adalah suatu protein toksik yang memiliki aktivitas biokimia seperti enzim.

Selain itu, beberapa mikroorganisme yang digunakan sebagai

biopestisida dapat juga menghasilkan enzim-enzim yang dapat merusak dinding sel hama atau mengganggu metabolisme hama. Misalnya, beberapa jenis jamur entomopatogen menghasilkan enzim kitinase, yang dapat memecah kitin pada dinding sel hama dan menyebabkan kematian hama.

Dengan demikian, enzim dapat berperan penting dalam pemanfaatan mikroorganisme sebagai biopestisida, baik sebagai senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme maupun sebagai target dari aktivitas biokimia mikroorganisme terhadap hama.

Proteolytic enzymes produced by a novel strain of *Bacillus thuringiensis* and their insecticidal activity" oleh A. Zeriuoh, dkk. (Journal of Invertebrate Pathology, 2014)

Studi "Proteolytic enzymes produced by a novel strain of *Bacillus thuringiensis* and their insecticidal activity" oleh A. Zeriuoh, dkk. (Journal of Invertebrate Pathology, 2014) bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas proteolitik dari *Bacillus thuringiensis* (Bt) yang merupakan jenis bakteri yang digunakan sebagai agen biopestisida untuk mengendalikan hama. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Bakteri Bt diisolasi dari tanah dan ditumbuhkan pada media kultur dengan perlakuan yang berbeda untuk memperoleh enzim proteolitik yang diinginkan. Bakteri yang menghasilkan enzim proteolitik terbaik dipilih dan kemudian dikarakterisasi secara genetik. Kemudian, enzim proteolitik yang dihasilkan oleh bakteri tersebut diekstraksi dan diuji aktivitasnya terhadap serangga pengganggu tanaman, seperti kutu daun hijau (*Myzus persicae*) dan lalat putih (*Bemisia tabaci*). Uji coba juga dilakukan untuk mengevaluasi toksisitas enzim proteolitik terhadap serangga yang bukan pengganggu tanaman, seperti lebah madu dan kepik hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri Bt yang diisolasi dari tanah dapat menghasilkan enzim proteolitik yang efektif dalam mengendalikan hama pengganggu tanaman. Enzim proteolitik ini mampu merusak protein pada tubuh serangga pengganggu tanaman, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kematian hama. Enzim proteolitik yang dihasilkan oleh Bt juga menunjukkan toksisitas yang rendah



terhadap serangga yang bukan pengganggu tanaman, sehingga memiliki potensi sebagai agen biopestisida yang ramah lingkungan. Dalam kesimpulan penelitian ini, enzim proteolitik yang dihasilkan oleh bakteri Bt memiliki potensi sebagai agen biopestisida yang efektif dalam mengendalikan hama pengganggu tanaman, serta memiliki toksisitas yang rendah terhadap serangga yang bukan pengganggu tanaman.

Studi "Chitinase and protease enzymes from the gut of the insect-killing nematode *Steinernema carpocapsae*" oleh S.S. Ali, dkk. (Brazilian Journal of Microbiology, 2017) bertujuan untuk mengekstrak dan mengkarakterisasi enzim chitinase dan protease dari saluran pencernaan nematoda *Steinernema carpocapsae*, yang digunakan sebagai agen biopestisida untuk mengendalikan hama. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Nematoda *S. carpocapsae* dibiakkan pada media kultur yang sesuai hingga mencapai fase dewasa. Saluran pencernaan nematoda diisolasi dan enzim chitinase dan protease diambil dari bagian usus yang berbeda. Enzim chitinase dan protease yang diambil kemudian diuji aktivitasnya menggunakan substrat khusus, seperti substrat kitin untuk enzim chitinase dan substrat kasein untuk enzim protease. Enzim chitinase dan protease yang dihasilkan diekstraksi dan kemudian dipurifikasi menggunakan teknik kromatografi. Kemurnian enzim kemudian dikarakterisasi menggunakan teknik spektrofotometri dan elektroforesis. Aktivitas enzim chitinase dan protease pada konsentrasi yang berbeda diuji terhadap kutu daun hijau (*Myzus persicae*) dan lalat putih (*Bemisia tabaci*) untuk mengevaluasi kemampuan agen biopestisida dalam mengendalikan hama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nematoda *S. carpocapsae* menghasilkan enzim chitinase dan protease yang aktif dalam menghancurkan kitin dan protein pada tubuh serangga pengganggu tanaman. Enzim chitinase dan protease yang dihasilkan oleh nematoda *S. carpocapsae* juga efektif dalam mengendalikan pertumbuhan serangga pengganggu tanaman seperti kutu daun hijau dan lalat putih. Dalam kesimpulan penelitian ini, enzim chitinase dan protease yang dihasilkan oleh nematoda *S. carpocapsae* memiliki potensi sebagai agen biopestisida yang efektif dalam mengendalikan hama pengganggu tanaman, terutama dalam

menghancurkan kitin dan protein pada tubuh serangga pengganggu tanaman. Enzim ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai agen pengendali hama yang ramah lingkungan.

Penelitian "Screening and characterization of protease-producing bacteria from the gut of *Riptortus pedestris* and their potential use as a bioinsecticide" oleh J.Y. Lee, dkk. (Journal of Microbiology and Biotechnology, 2017) bertujuan untuk mengekstraksi bakteri penghasil enzim protease dari saluran pencernaan serangga *Riptortus pedestris* dan mengevaluasi potensinya sebagai agen bioinsektisida. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Serangga *R. pedestris* diperoleh dari perkebunan kacang hijau di Korea Selatan dan diidentifikasi menggunakan kunci identifikasi. Bakteri yang hidup di saluran pencernaan *R. pedestris* diisolasi dan dikarakterisasi secara morfologi dan biokimia. Aktivitas enzim protease dari bakteri yang diisolasi diuji menggunakan substrat spesifik, seperti kasein. Enzim protease yang dihasilkan diekstraksi dan kemudian dipurifikasi menggunakan teknik kromatografi. Kemurnian enzim kemudian dikarakterisasi menggunakan teknik spektrofotometri.



# DAFTAR PUSTAKA

- Arunachalam, K. and Madhumitha, G. (2014). Review on enzymatic potentials of insect larvae. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2(3), pp.31-35.
- Bhattacharya, S., & Dey, A. (2021). *Microbial and Enzymatic Applications in Sustainable Agriculture: Volume 1: The Role of Microbial and Enzymatic Technologies in Soil Fertility and Crop Health*. Springer.
- Díaz-Roa, A., Patarroyo, M. A., Bello, F. J., & Da Silva, P. I. (2018). Sarconesin: Sarconesiopsis magellanica Blowfly Larval Excretions and Secretions With Antibacterial Properties. *Frontiers in Microbiology*, 9(September), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02249>
- Duranti, M. M., Tettamanti, G., & Lomolino, G. (2016). Insect larval enzymes and their applications. In *Comprehensive Biotechnology (Second Edition) (Vol. 2, pp. 725-735)*. Elsevier.
- Lee, C. K., Darah, I., & Ibrahim, C. O. (2011). Production and Optimization of Cellulase Enzyme Using *Aspergillus niger* USM AI 1 and Comparison with *Trichoderma reesei* via Solid State Fermentation System. *Biotechnology Research International*, 2011, 1–6. <https://doi.org/10.4061/2011/658493>
- Megaw, J., Thompson, T. P., Lafferty, R. A., & Gilmore, B. F. (2015). *Galleria mellonella* as a novel in vivo model for assessment of the toxicity of 1-alkyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquids. *Chemosphere*, 139, 197–201. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.06.026>
- Mohan, D., Mani, C., Ranganathan, T.V. and Kalaiichelvan, P.T. (2016). A review on insect gut microflora and its potential application as a bioresource. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 4(6), pp.305-311.

- Rabossi, A., Stoka, V., Puizdar, V., Turk, V., & Quesada-Allué, L. A. (2008). Purification and characterization of two cysteine peptidases of the Mediterranean fruit fly *Ceratitis capitata* during metamorphosis. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 68(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/arch.20231>
- Rani, P.U. and Sasidharan, T.O. (2017). Insecticidal properties of protease enzyme from entomopathogenic bacteria. In Proceedings of the National Conference on Innovative Research in Agriculture, 7-8 April 2017, Coimbatore, India.
- Simões, M. F., Otto, T. D., Ribeiro, B. M., & Soares, C. M. (2017). Enzymes from insect midgut. In *Advances in insect physiology* (Vol. 52, pp. 49-87). Academic Press.
- Singh, R. P., & Singh, P. (2019). Insect enzymes and their role in biotechnology. In *Insect Biotechnology* (pp. 31-50). Springer, Singapore.
- Tariq, M., & Wani, A. H. (2016). Insect enzymes: structure, function and applications. In *Insect Physiology and Ecology* (pp. 333-355). Springer, Cham.
- Wang, Y., & Hua, H. (2020). Insect enzymes and their biotechnological applications. *Applied microbiology and biotechnology*, 104(14), 6007-6016.



# BIOGRAFI PENULIS

## **Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si**

Merupakan dosen tetap pada fakultas sains dan teknologi jurusan kimia universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bidang biokimia. Lahir pada tanggal 8 Januari 1978 dikabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.



Penulis menyelesaikan pendidikan S3 tahun 2017 pada universitas Hasanuddin. Keilmuan penulis di bidang yang berkaitan dengan protein, karbohidrat, enzim, dan Bioenergi dan bioteknologi. Telah menghasilkan produk buku biokimia, metabolisme biomolekul, Mikrobiologi industri, biokimia farmasi dan Bioteknologi.

Email Penulis: [bmaswati@gmail.com](mailto:bmaswati@gmail.com)

# PRODUKSI ENZIM DARI SERANGGA

Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai katalisator biologis, meningkatkan kecepatan reaksi kimia dalam organisme hidup. Serangga merupakan jenis makhluk hidup yang mengalami fase perkembangan dari telur, larva, pupa dan menjadi dewasa. Pada tahap larva, enzim-esensial yang diperlukan untuk proses metabolisme dan perkembangan. Molekul spesifik yang berinteraksi dengan enzim dan diubah atau dipecah oleh enzim pencernaan. Tingkat aktivitas atau efisiensi enzim dalam katalisis reaksi kimia tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, pH dan inhibitor. Inhibitor merupakan senyawa atau molekul yang menghambat aktivitas enzim. Inhibitor dapat mengganggu proses pencernaan atau metabolisme. Jenis enzim yang dapat diproduksi dari pencernaan larva yaitu protease, lipase, amilase, selulase, lignase, dan kitinase. Mekanisme kontrol yang mengatur aktivitas enzim, termasuk pengaturan tingkat ekspresi gen atau modifikasi enzim itu sendiri. Dalam larva, regulasi enzim penting untuk mengkoordinasikan berbagai proses biokimia dalam perkembangan dan pertumbuhan.

**Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si**



Merupakan dosen tetap pada fakultas sains dan teknologi jurusan kimia universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bidang biokimia. Lahir pada tanggal 8 Januari 1978 dikabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan S3 tahun 2017 pada universitas Hasanuddin. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan protein, karbohidrat, enzim, dan Bioenergi dan bioteknologi. Telah menghasilkan produk buku biokimia, metabolisme biomolekul, Mikrobiologi industri, biokimia farmasi

dan Bioteknologi.

Email Penulis: [bmaswati@gmail.com](mailto:bmaswati@gmail.com)



**PENERBIT**

**CV RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA**

**Jl. Batara Ugi/Griya Astra Blok C. No.18**

**(Yogyakarta/Makassar)**

**Telp/Wa:085242065812**

**Email: [rizmediapustaka@gmail.com](mailto:rizmediapustaka@gmail.com)**

**Website: [rizmediapustakaindonesia.com](http://rizmediapustakaindonesia.com)**



**035/SSL/2022**