

**HUBUNGAN STRESS DAN POLA MAKAN DENGAN KEJADIAN
SINDROMA DISPEPSIA PADA MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN DOKTER UIN ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN 2023**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
ALAUDDIN
CHAIRUNNISA AZAHRA AMRIN

NIM: 70600120009

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairunnisa Azahra Amrin

NIM : 70600120009

Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 23 Juni 2002

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Aroeppala

Judul : Hubungan Stress dan Pola Makan dengan
Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa
Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar
Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Februari 2024

Chairunnisa Azahra Amrin
NIM: 70600120009

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Chairunnisa Azahra Amrin, NIM 70600120009, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Hubungan Stress dan Pola Makan dengan Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar Tahun 2023", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 22 Februari 2024

Pembimbing 1

dr. Saharuddin, M.Kes.

Pembimbing 2

Dr. dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Stress dan Pola Makan dengan Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar Tahun 2023" yang disusun oleh Chairunnisa Azahra Amrin, NIM 70600120009, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Februari 2024, bertepatan dengan 12 Sha'ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 22 Februari 2024

12 Sha'ban 1445 Hijriah

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M. Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Saharuddin, M. Kes.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Andi Sitti Rahma, M. Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rista Suryaningsih, M. Med. Ed	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan M, M. Ag	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hubungan Stress dan Pola Makan dengan Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW sebagai *Rahmatan Lil’alamin* beserta para sahabat Nabi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Laode Amrin dan ibunda Marlina dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya.
2. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. Ibu dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Ibu dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak dr. Saharuddin, M.Kes selaku pembimbing I dan Ibu Dr.dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu membimbing penulis baik dalam bentuk arahan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Ibu dr. Rista Suryaningsih, M.Med.Ed selaku penguji I dan Bapak Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu

membimbing penulis baik dalam bentuk arahan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.

6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat saya di bangku perkuliahan (Lia, Taty, Cica, Cece, Muti, Andis, Lintang) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat SMA saya (Aliyah, Yayan, Afni, Atika) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman Aponeurosis yang selalu kebersamai selama di bangku perkuliahan dan banyak memberi masukan pada pembuatan skripsi ini
10. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari segala pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 3 Februari 2024


Chairunnisa Azahra Amrin

NIM : 70600120009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum mengenai Dispepsia	14
1. Definisi Dispepsia	14
2. Epidemiologi Dispepsia.....	15
3. Klasifikasi Dispepsia.....	16
4. Patofisiologi Dispepsia.....	17
5. Gambaran Klinis Dispepsia.....	21
6. Penegakan Diagnosis Dispepsia.....	22
7. Tatalaksana Dispepsia	23
B. Tinjauan Umum mengenai Tingkat Stress	27
1. Definisi	27
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan stress remaja.....	28
3. Hubungan Stress dengan Dispepsia.....	30
C. Tinjauan Umum mengenai Pola Makan.....	32
1. Definisi	32
2. Klasifikasi Pola Makan	32
3. Hubungan pola makan dengan dispepsia	33
D. Kerangka Teori.....	36
E. Kerangka Konsep	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian.....	38
B. Waktu dan Tempat Penelitian	38
C. Variabel Penelitian	38
1. Variabel Independen.....	38
2. Variabel Dependen	38
D. Populasi dan Sampel	39
1. Populasi	39
2. Sampel.....	39

E. Teknik Pengambilan Sampel.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Pengolahan Data.....	42
1. Editing (Penyuntingan).....	42
2. Coding (Pengkodean).....	42
3. Tabulasi (tabulating).....	42
H. Analisis Data	42
I. Alur Penelitian.....	44
J. Etika Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 2.1 Klasifikasi Dispepsia.....	16
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	46
Tabel 4.2 Hubungan Stress dan Sindroma Dispepsia	48
Tabel 4.3 Hubungan Tingkat Stress dan Sindroma Dispepsia.....	49
Tabel 4.4 Hubungan Pola Makan dan Sindroma Dispepsia.....	50



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori	36
Bagan 2. Kerangka Konsep.....	37
Bagan 3. Alur Penelitian	44



Hubungan Stress dan Pola Makan dengan Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar Tahun 2023

The Relationship between Stress and Diet and the Incidence of Dyspepsia Syndrome in Medical Education Study Program Students at UIN Alauddin Makassar in 2023

Chairunnisa Azahra Amrin¹, Saharuddin¹, Andi Sitti Rahma¹, Rista Suryaningsih¹, Dahlan²

¹Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat email korespondensi: nisazahra750@gmail.com

Abstract:

Background: *Dyspepsia is still common among teenagers and can affect their quality of life and productivity because it reduces academic achievement. Many factors influence the incidence of dyspepsia, including stress and diet. The aim of this research was to examine the influence of stress and diet on the incidence of dyspepsia in students of the Medical Education Study Program at UIN Alauddin Makassar.*

Method: *The type of research used is quantitative research with a cross sectional approach. The population in this study were all students of the medical education study program at UIN Alauddin Makassar. The sampling technique used was stratified random sampling with a total sample of 139 samples.*

Results: *The research results showed that 81 respondents (84.4%) experienced stress with dyspepsia syndrome, with 30 (75%) moderate stress levels and 30 respondents (75%) who experienced stress with dyspepsia syndrome. 76 respondents (76%) had poor eating patterns and dyspepsia.*

Conclusion: *There is a significant relationship between stress and dyspepsia and there is no relationship between diet and dyspepsia in students of the Medical Education Study Program at UIN Alauddin Makassar.*

Keywords: *dyspepsia syndrome, stress, diet, teenager.*

Hubungan Stress dan Pola Makan dengan Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar Tahun 2023

The Relationship between Stress and Diet and the Incidence of Dyspepsia Syndrome in Medical Education Study Program Students at UIN Alauddin Makassar in 2023

**Chairunnisa Azahra Amrin¹, Saharuddin¹, Andi Sitti Rahma¹,
Rista Suryaningsih¹, Dahlan²**

¹Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat email korespondensi: nisazahra750@gmail.com

Abstrak:

Latar Belakang: Dispepsia masih banyak terjadi di kalangan remaja dan bisa memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas mereka karena akan menurunkan prestasi belajar. Banyak faktor yang memengaruhi kejadian dispepsia, antara lain stres dan pola makan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh stres dan pola makan terhadap kejadian dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah semua mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *stratified random sampling* dengan total sampel sebanyak 139 sampel.

Hasil: Hasil penelitian didapatkan responden yang mengalami stress dengan sindroma dispepsia sejumlah 81 responden (84,4%) dengan tingkat stress sedang sebanyak 30 (75%) dan responden yang memiliki pola makan kurang baik dengan dispepsia sejumlah 76 responden (76%).

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara stress dengan dispepsia dan tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

Kata kunci : sindroma dispepsia, stress, pola makan, remaja

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Dispepsia adalah keluhan atau kumpulan gejala yang termasuk atau nyeri atau rasa tidak nyaman di epigastrium, bersendawa, mual, muntah, kembung, dan rasa cepat kenyang. Sindroma dispepsia adalah salah satu penyakit saluran pencernaan yang paling umum dialami oleh masyarakat. Dispepsia dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu dispepsia organik yang disebabkan karena adanya kelainan organik pada saluran pencernaan dan dispepsia fungsional yang tidak terdapat kelainan organik atau kelainan struktural pada saluran pencernaan tetapi dapat diakibatkan karena pengaruh psikologis atau ketidakteraturan pola makanan (Marcellus Simadibrata, 2014)

Dispepsia merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia, dengan tingkat kejadian yang terus meningkat, memengaruhi sejumlah besar populasi dan menempati peringkat tinggi dalam daftar penyakit terbanyak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2010, dispepsia menempati urutan ke-5 penyakit rawat inap di rumah sakit dengan jumlah kasus mencapai 24.882 (CFR 0,67%) dan urutan ke-6 penyakit rawat jalan di rumah sakit dengan jumlah kasus mencapai 88.599 (jumlah kunjungan mencapai 163.428) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012). Pada tahun 2020 angka kejadian dispepsia terjadi peningkatan dari 10 juta jiwa menjadi 28 jiwa setara dengan 11,3% dari keseluruhan penduduk di Indonesia (Maresa, 2020).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, dispepsia termasuk dalam 10 besar penyakit terbanyak pada semua umur di Kota Makassar pada tahun 2015 sebanyak 35.159 kasus dengan angka kematian sebanyak 151 kasus (Hasanuddin, 2020). Dari data RSUD Kota Makassar pada bulan November 2023, dispepsia termasuk urutan ke-4 penyakit terbanyak untuk kategori rawat jalan dengan jumlah 91 pasien dan urutan ke-2 untuk penyakit rawat inap dengan jumlah 43 pasien (RSUD Kota Makassar, 2023). Berdasarkan penelitian (Rahma, 2019) tingkat pengetahuan gizi tentang sarapan pada mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar adalah kurang dan untuk kebiasaan sarapan sebanyak 96% tetapi dengan frekuensi sarapan jarang yaitu <4x seminggu dengan alasan tidak ada waktu, dari penelitian ini melihat bahwa frekuensi makan pada mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar masih jarang.

Dispepsia pada anak-anak dan remaja adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal faktor psikologis dan non-farmakologis untuk mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kejadian dispepsia banyak ditemukan pada anak-anak maupun remaja (Tamimi et al., 2020). Remaja adalah salah satu yang berisiko terkena sindrom dispepsia, karena sebagian besar dari mereka memiliki pola makan yang tidak teratur (Djojoningrat, 2017). Berdasarkan penelitian (Oswari et al., 2019) didapatkan dispepsia fungsional merupakan penyakit pediatrik yang umum terjadi pada remaja Indonesia dengan prevalensi 11,5%, dan tercatat lebih tinggi pada anak perempuan dan remaja yang mengalami kehidupan keluarga yang penuh tekanan. Dari penelitian (Shubhanshu Saini, 2021) subtype yang paling umum dilaporkan

adalah dispepsia fungsional dan migrain perut. Faktor psikologis seperti beban akademik, kondisi keuangan yang buruk, stres terkait ujian, dan perundungan di sekolah perlu disingkirkan pada anak dengan kondisi ini. Intervensi non-farmakologis seperti terapi perilaku dapat memberikan perbaikan yang luar biasa pada gejala anak-anak dengan dispepsia fungsional.

Pentingnya penanganan dispepsia pada remaja untuk menjaga kualitas hidup mereka dan masa depan pendidikan serta kontribusi mereka terhadap bangsa. Penurunan produktivitas sehari-hari, misalnya tidak masuk sekolah akibat gejala yang telah disebutkan sebelumnya dapat menurunkan kualitas belajar pada remaja. Sementara itu, kualitas belajar yang menurun dapat menurunkan prestasi belajar siswa. Lama-kelamaan, hal ini dapat berdampak pada menurunnya mutu siswa sebagai sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa di masa akan datang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Ada beberapa faktor dapat menyebabkan gejala dispepsia, dan penting untuk menemukan dan mengelola faktor-faktor ini untuk mengurangi risiko dan gejala dispepsia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan dispepsia adalah jenis kelamin perempuan, usia, infeksi *Helicobacter pylori*, status sosial ekonomi yang tinggi, merokok, dan penggunaan NSAIDs (nonsteroid anti-inflammatory drugs) (Giringan et al., 2021).

Salah satu faktor pencetus yang berhubungan dengan prevalensi kejadian dispepsia tersebut adalah faktor psikologis yaitu seperti stress. Ketika seseorang mengalami stres, rangsangan konflik emosi pada korteks serebral mempengaruhi

kerja hipotalamus anterior dan kemudian nukleus vagus, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja lambung. Selain itu, rangsangan pada korteks serebral dapat sampai ke hipotalamus anterior dan kemudian ke hipofisis anterior, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kortikotropin. Hormon ini mendorong korteks adrenal untuk menghasilkan hormon adrenal, yang selanjutnya merangsang sekresi asam lambung, penyebab utama sindrom dispepsia fungsional. Dengan demikian, semakin banyak stres yang dialami seseorang, semakin tinggi produksi hormon adrenal (Melina et al., 2023)

Ketidakteraturan pola makan sering terjadi pada kelompok usia remaja. Aktivitas yang padat membuat remaja sering menunda waktu makan bahkan hingga lupa untuk makan (Dhiya'Ulhaq et al., 2022). Remaja juga cenderung mengejar gaya hidup yang serba langsung ini menyebabkan pola makan yang tidak baik dan dapat menyebabkan gangguan dispepsia (Sari et al., 2021).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah ada hubungan antara stress dan pola makan dengan sindroma dispepsia pada mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan antara stress dan pola makan dengan kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat hubungan antara stress dan pola makan dengan
sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN
Alauddin Makassar.



C. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

1. **Definisi operasional**

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil ukur	Skala Data
Variabel Independen					
1.	Stress	Tekanan yang dirasakan pada saat menghadapi tuntutan atau harapan yang menantang kemampuan seseorang untuk mengatasi atau mengelola hidup	Kuesioner penelitian (Depression, Anxiety, Stress Scale 21)	1: Tidak stress: 0-14 2: Stress ringan: 15-18 3: Stress sedang: 19-25 4: Stress berat: 26-33 5 : Stress sangat berat : 34+	Ordinal
2.	Pola Makan	Frekuensi: Struktur	Kuesioner	1: Baik, apabila skor <	Nominal

		(waktu) yang tetap dalam hal makan	penelitian	4,00 (nilai mean) b. Kurang baik, apabila skor $\geq 4,00$ (nilai mean)	
Variabel Dependen					
1.	Sindrom dispepsia	Suatu gangguan nyeri epigastrium, rasa terbakar, rasa penuh setelah makan, mual, muntah, serta sendawa yang dirasakan pada abdomen bagian atas	Kuesioner penelitian	1: Tidak dispepsia: 0 2: Dispepsia: ≥ 1 untuk pertanyaan 1-4 atau ≥ 2 dari seluruh pertanyaan.	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas hubungan tingkat stress dan pola makan dengan kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan data primer.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
1.	(Octaviana et al., 2021)	Hubungan Pola Makan dan Stres dengan Kejadian Dispepsia pada Siswa di SMP Negeri 2 Karang Intan	Analitik observasional, cross sectional	56 sampel	Terdapat hubungan antara pola makan yang tidak teratur dengan kejadian dispepsia $p=0,001$ ($p<0,05$), dan terdapat hubungan stress dengan kejadian dispepsia dimana nilai $p=0,001$ ($p<0,05$).
2.	(Hasanuddin, 2019)	Hubungan Penerapan beberapa Sunnah Makan	Total sampling, Cross sectional	106 sampel	Terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah

		terhadap Gejala Dispepsia pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar			intake makanan, pola makan, posisi makan, jenis makanan dan minuman iritatif terhadap kejadian dispepsia
3.	(Yuni Sara et al., 2021)	Status Gizi dan Aktivitas Fisik dengan Gangguan Lambung pada Mahasiswa	Propotional stratified random sampling, cross sectional	85 sampel	Terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan gangguan lambung ($p < 0,05$) dan tidak terdapat hubungan bermakna antara tingkat aktivitas fisik dengan gangguan lambung ($p > 0,05$).
4.	(Sandi, 2020)	Hubungan Keteraturan Pola	Systematic	244 sampel	Berdasarkan 14 jurnal yang

		Makan dengan Kejadian Dispepsia Fungsional	literature review		telah diuji, rata-rata terdapat hubungan atau keterkaitan antara pola makan dengan kejadian dispepsia fungsional
5.	(Fajriani, 2020)	Hubungan antara Kebiasaan dan Kualitas Sarapan dengan Sindroma Dispepsia dan Status Gizi pada Remaja di SMAI PB Soedirman 1 Bekasi	Cross sectional	87 sampel	Tidak terdapat hubungan yang signifikan ($p>0.05$) antara kebiasaan dan kualitas sarapan dengan sindroma dispepsia dan status gizi dan tidak terdapat hubungan yang signifikan ($p>0.05$) antara frekuensi dan durasi aktivitas fisik dengan status gizi siswa.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan stress dan pola makan dengan kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
- b. Untuk mengetahui pola makan pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
- c. Untuk mengetahui tingkat stress pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan terutama mengenai hubungan stress dan pola makan dengan kejadian sindroma dispepsia.

2. Bagi pengetahuan


Dapat dijadikan salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat mengenai hubungan stress dan pola makan dengan dispepsia.

4. Bagi Instansi

- a. Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan khususnya mengenai hubungan stress dan pola makan dengan dispepsia
- b. Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum mengenai Dispepsia*

1. *Definisi Dispepsia*

Dispepsia berasal dari Bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu “dys” yang berarti buruk dan “peptie” yang berarti pencernaan (Salsabila, 2021). *Dispepsia* menurut kriteria Rome III adalah serangkaian gangguan di gastrointestinal seperti rasa yang mengganggu setelah makan, cepat kenyang, kembung, rasa tidak nyaman atau nyeri dan rasa terbakar di epigastrium. Gejala yang dirasakan harus berlangsung kurang lebih selama tiga bulan terakhir (Hasanuddin, 2020).

Dispepsia adalah kondisi yang kompleks dengan kumpulan gejala seperti sensasi nyeri atau tidak nyaman di perut bagian atas, rasa terbakar, mual, muntah, rasa kenyang, dan kembung. Gangguan motilitas usus, hipersensitivitas, infeksi, atau faktor psikososial adalah beberapa kemungkinan mekanisme yang mendasarinya (Giringan et al., 2021).

British Society of Gastroenterology (BSG) menyatakan bahwa istilah “*dyspepsia*” bukan merupakan suatu diagnosis penyakit, melainkan kumpulan gejala yang mengarah pada penyakit/gangguan saluran pencernaan bagian atas (Handayani et al., 2021).

Dispepsia didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan gejala nyeri atau ketidaknyamanan perut bagian atas yang berulang atau

persisten, kembung, cepat kenyang, dan mual, yang tidak terkait dengan kelainan struktural atau biokimia apa pun (Sari et al., 2021)

Dispepsia menempati peringkat ke-10 dalam klasifikasi penyakit terbanyak menurut data profil Kesehatan Indonesia 2007 pada pasien dengan kategori rawat inap di rumah sakit, tahun 2006 dengan jumlah pasien 34.029 atau sekitar 1,59% (Sari et al., 2021).

2. *Epidemiologi Dispepsia*

Dispepsia, (yang juga dikenal sebagai *uninvestigated dyspepsia* atau penyakit dispepsia yang belum dilakukan pemeriksaan diagnostik pasti), adalah kondisi yang sangat umum di masyarakat. Tenaga medis terkadang menyebutnya sebagai "gastritis", tetapi masyarakat Indonesia sering menyebutnya "maag". Jika kita telah melakukan pemeriksaan objektif, minimal dengan barium meal (Oesophagus-Maag-Duodenum / OMD), atau dengan pemeriksaan gold standard, yaitu endoskopi saluran cerna bagian atas dan patologi jaringan gastrointestinal bagian atas (gaster atau duodenum), maka istilah "gastritis" sebaiknya digunakan. Di Amerika Serikat, dispepsia mencapai 25%, tidak termasuk refluks esofagitis (penyakit refluks esofageal, atau GERD). Sebuah pusat di Indonesia melaporkan bahwa dispepsia mencapai 40% (Bayupurnama, 2019)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa jumlah orang yang menderita dispepsia di seluruh dunia berkisar antara 15-30 persen setiap tahunnya. Di Indonesia, angka tersebut mencapai 40 hingga

50 persen, dan dispepsia termasuk dalam sepuluh penyakit terburuk di negara itu. Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Inggris dengan jumlah penderita dispepsia terbanyak (Putri et al., 2022).

3. *Klasifikasi Dispepsia*

Secara etiologi, dispepsia dibagi menjadi dua yaitu organik dan fungsional. Dispepsia organik merupakan kelompok dispepsia yang ditemukannya gangguan struktur maupun patologi biokimia setelah dilakukan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, radiologi, dan pemeriksaan laboratorium, sedangkan dispepsia fungsional adalah kelompok dispepsia yang tidak ditemukannya gangguan struktur maupun patologi biokimia setelah dilakukan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, radiologi, dan pemeriksaan laboratorium (Barberio et al., 2020).

Tabel 2.1 Klasifikasi Dispepsia

Dispepsia Organik	Dispepsia Fungsional
<ul style="list-style-type: none"> • Ulkus peptik kronik (ulkus ventrikul, ulkus duodeni) • Gastro-oesophageal refluks disease (GERD), dengan atau tanpa esofagitis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disfungsi sensorik- motorik gastroduodenum •Gastroparesis idiopatik/hipomotilitas antrum • Disritmia gaster

<ul style="list-style-type: none"> • Obat : OAINS, aspirin • Gangguan metabolik (uremia, hiperkalsemia, gastroparesis DM) • Keganasan (gaster, pankreas, kolon) • Insufisiensi vaskula mesentrikus • Nyeri dinding perut 	<ul style="list-style-type: none"> • Hipersensitivitas gaster/duodenum • Faktor psikososial • Gastritis H.pylori • Idiopatik
---	--

4. *Patofisiologi Dispepsia*

Patofisiologi dispepsia fungsional saat ini dikaitkan dengan gabungan motilitas gastrointestinal bagian atas dan gangguan hipersensitivitas visceral yang dikombinasikan oleh sistem saraf enterik. Kelainan patofisiologi dispepsia fungsional meliputi perubahan laju pengosongan lambung (terlambat atau dipercepat), gangguan akomodasi lambung, hipersensitivitas lambung atau duodenum terhadap nutrisi tertentu yang terdapat dalam makanan, dan distensi lambung atau duodenum.

a. Sekresi asam lambung

Kasus dengan dispepsia fungsional umumnya mempunyai tingkat sekresi asam lambung, baik sekresi basal maupun dengan stimulasi pentagastrin, yang rata-rata normal. Diduga terdapat peningkatan

sensitivitas mukosa lambung terhadap asam yang menimbulkan rasa tidak enak di perut (Djojoningrat, 2017).

b. Gangguan motilitas gastroduodenal

Gangguan motilitas gastroduodenal terdiri dari penurunan kapasitas

lambung dalam menerima makanan (impaired gastric accommodation), inkoordinasi antroduodenal, dan perlambatan pengosongan lambung.

Gangguan motilitas gastroduodenal merupakan salah satu mekanisme utama dalam patofisiologi dispepsia fungsional, berkaitan dengan perasaan begah setelah makan, yang dapat berupa distensi abdomen, kembung, dan rasa penuh (Djojoningrat, 2017).

c. Peranan hipersensitivitas viseral

Saraf aferen yang sensitif terhadap capsaicin terlibat dalam kontrol fungsi sensorimotor lambung dan usus, dan peningkatan regulasi saluran V1 potensial reseptor transien yang sensitif terhadap capsaicin adalah mekanisme potensial yang mendasari hipersensitivitas. melaporkan bahwa kelompok pasien memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi terhadap capsaicin dibandingkan kelompok kontrol yang sehat. Temuan ini mendukung kemosensitivitas sebagai faktor hipersensitivitas visceral pada FD (Marcellus Simadibrata, 2014).

d. *Helicobacter pylori*

Peran infeksi *Helicobacter pylori* pada dispepsia fungsional belum

sepenuhnya dimengerti dan diterima. Kecepatan infeksi H.pylori terdapat sekitar 50% pada dispepsia fungsional dan tidak berbeda pada kelompok orang sehat. Mulai terdapat kecenderungan untuk melakukan eradikasi H.pylori pada dispepsia fungsional dengan H.pylori positif yang gagal dengan pengobatan konservatif baku (Djojoningrat, 2017)

Infeksi HP pada pasien dispepsia fungsional terjadi dari 39 hingga 87%. Tidak ada hubungan antara infeksi HP dan gangguan motilitas, tetapi eradikasi HP memperbaiki gejala dispepsia fungsional.

Proses patofisiologi dispepsia fungsional masih perlu diteliti. Penanda biologis seperti ghrelin dan leptin, serta perubahan ekspresi muscle-specific mikroRNAs, dikaitkan dengan ini (Marcellus Simadibrata, 2014).

e. Aktivitas mioelektrik lambung

Adanya distritmia mioelektrik lambung pada pemeriksaan elektrogastrografi dilaporkan terjadi pada beberapa kasus dispepsia fungsional, tapi hal ini bersifat inkonsisten (Djojoningrat, 2017)

f. Ambang rangsang persepsi

Reseptor kimiawi, reseptor mekanik, dan nociceptor adalah beberapa jenis reseptor yang tersedia di dinding usus. Menurut penelitian, kasus dispepsia ini tampaknya memiliki hipersensivitas viseral terhadap balon di duodenum atau gaster. Mekanismenya masih belum dipahami. Studi yang menggunakan balon intragastrik menemukan bahwa setengah dari populasi yang menderita dispepsia fungsional telah mengalami rasa

veri atau tidak nyama diperut saat inflasi balon dengan volume yang lebih rendah daripada volume yang menyebabkan nyeri pada populasi kontrol (Djojoningrat, 2017)

g. Disfungsi autonom

Pada kasus dispepsia fungsional, disfungsi persarafan vagal dianggap bertanggung jawab atas hipersensitivitas gastrointestinal. Neuropati vagal juga dianggap bertanggung jawab atas ketidakmampuan untuk merelaksasi bagian proksimal lambung saat menerima makanan, yang menyebabkan rasa cepat kenyang dan gangguan akomodasi lambung (Kim & Kuo, 2019)

h. Peranan hormonal

Hormon masih belum diketahui berperan dalam pembentukan dispepsia fungsional. Ada laporan bahwa penurunan kadar hormon motilin menyebabkan gangguan dalam gerak antroduodenal. Dalam beberapa percobaan, progesteron, estradiol, dan prolaktin mempengaruhi kontraktilitas otot polos dan memperlambat waktu transit gastrointestinal (Dhiya'Ulhaq et al., 2022)

i. Diet dan faktor lingkungan

Faktor makanan dapat menjadi penyebab potensial dari gejala dispepsia fungsional. Pasien dengan dispepsia fungsional cenderung mengubah pola makan karena adanya intoleransi terhadap beberapa makanan khususnya makanan berlemak yang telah dikaitkan dengan dispepsia. Intoleransi dilaporkan lebih sering terjadi pada kasus dispepsia

fungsional dibandingkan kasus kontrol terutama makanan yang berlemak (Melina et al., 2023).

5. *Gambaran Klinis Dispepsia*

Presentasi klinis dispepsia dapat bervariasi antar individu, tetapi gejala umumnya meliputi:

- a. Nyeri atau ketidaknyamanan epigastrium: Ini adalah gejala dispepsia yang paling umum. Ini biasanya digambarkan sebagai sensasi terbakar atau menggerogoti di perut bagian atas.
- b. Rasa kenyang lebih awal: Merasa kenyang atau puas setelah makan hanya sedikit.
- c. Kembung: Sensasi perut penuh atau kembung.
- d. Mual dan muntah: Beberapa penderita dispepsia mungkin mengalami episode mual atau muntah.
- e. Bersendawa: Sering atau berlebihan bersendawa.
- f. Mulas : Sensasi terbakar di dada, sering disertai rasa asam atau asam di mulut.

Gejala ini mungkin tumpang tindih dengan gangguan gastrointestinal lainnya, dan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk membuat diagnosis yang akurat. (Dhiya'Ulhaq et al., 2022)

6. Penegakan Diagnosis Dispepsia

Dispepsia yang telah diinvestigasi terdiri dari dispepsia organik dan fungsional. Dispepsia organik terdiri dari ulkus gaster, ulkus duodenum, gastritis erosi, gastritis, duodenitis dan proses keganasan. Dispepsia fungsional mengacu kepada kriteria Roma III

Dispepsia yang telah dipelajari terdiri dari dispepsia fungsional dan organik. Contoh dispepsia organik termasuk erosi gastritis, gastritis, duodenitis, dan penyakit ganas. Kriteria Roma III mengacu pada dispepsia fungsional. Indonesia belum menerima validitas kriteria tersebut. Konsensus Asia-Pasifik (2012) membuat keputusan untuk mengikuti gagasan tentang kriteria diagnosis Roma III, tetapi dengan menambah gejala kembung pada abdomen bagian atas, yang biasanya merupakan gejala dispepsia fungsional. Menurut kriteria Roma III, dispepsia didefinisikan sebagai kondisi yang memiliki satu atau lebih gejala yang dikaitkan dengan gangguan gastroduodenal:

- Nyeri epigastrium adalah rasa sakit di epigastrium
- Rasa tidak nyaman atau penuh setelah makan
- Rasa cepat kenyang

Gejala ini harus terjadi selama minimal tiga bulan terakhir, dan gejala baru muncul enam bulan sebelum diagnosis dibuat.

Epigastric pain syndrome dan post prandial distress syndrome adalah dua subkategori dispepsia fungsional menurut Kriteria Roma III. Namun,

penelitian terbaru menunjukkan bahwa dua pertiga pasien dispepsia memiliki diagnosis tumpang tindih.

Pada dasarnya langkah pemeriksaan diagnostik adalah untuk mengeksklusi gangguan organik atau biokimiawi. Pemeriksaan laboratorium (gula darah, fungsi tiroid, fungsi pankreas dan sebagainya). Radiologi (barium meal, US, endoskopi ultrasonografi) dan endoskopi merupakan langkah yang paling penting untuk eksklusi penyebab organik ataupun biokimiawi. Untuk menilai patofisiologinya, dalam rangka mencari dasar terapi yang lebih kausatif, sebagai pemeriksaan dapat dilakukan.

Keluhan utama yang menjadi kunci untuk mendiagnosis dispepsia adalah adanya nyeri dan atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas. Apabila kelainan organik ditemukan, dipikirkan kemungkinan diagnosis banding dispepsia organik, sedangkan bila tidak ditemukan kelainan organik apa pun, dipikirkan kecurigaan kearah dispepsia fungsional (Harer & Hasler, 2020).

7. Tatalaksana Dispepsia

Tatalaksana dispepsia diberikan secara kombinasi untuk meredakan berbagai gejala/keluhan klinis (sindrom) yang terjadi pada dispepsia, antara lain rasa tidak nyaman/nyeri perut bagian atas disertai keluhan lain, rasa terbakar di dada, di perut. Jantung (mulas), refluks, kembung,

merasa kenyang, cepat merasa kenyang, bersendawa, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, dan beberapa gejala lainnya.

1. Antihiperasiditas

a. Antasida

Antasida ini termasuk yang murah dan mudah diakses. Sekresi asam lambung akan ditetralisir oleh antasida. Zat-zat yang tidak larut dalam air seperti natrium bikarbonat, $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, dan magnesium trisiklat, juga dikenal sebagai kompleks hidrotalsit, biasanya merupakan komponen antasida.

Karena antasida hanya berfungsi sebagai analgesik simptomatis, pemberian antasida tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Magnesium trisiklat adalah adsorben yang tidak berbahaya, tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah besar, akan menyebabkan diare karena pembentukan senyawa MgCl_2 . Zat magnesium bersifat pencahar, menyebabkan diare, sedangkan aluminium menyebabkan konstipasi. Oleh karena itu, kedua zat ini bergabung. (Habibie, 2021)

b. NaHCO_3

Antasida jenis ini bekerja cepat dan larut dalam air. Namun, dosis berlebihan NaHCO_3 dapat menyebabkan alkalosis, atau darah bersifat basa. Terlepasnya senyawa karbondioksida yang terkandung dalam kompleks obat ini dapat menyebabkan sendawa. (Black et al., 2022)

c. Kombinasi Bismut dan Kalsium

Kombinasi Bi dan Ca akan membentuk lapisan yang melindungi lesi pada lambung. Karena sifatnya yang neurotoksik, obat ini dapat menyebabkan ensefalopati, kerusakan otak yang menyebabkan kejang-kejang dan kebingungan. Selain itu, dapat menyebabkan konstipasi, dan kalsium dapat menyebabkan sekresi asam lambung yang berlebih, yang dapat menyebabkan hiperkalsemia. (Handayani et al., 2021)

d. Sukralfat

Golongan sukralfat dan bismuth koloidal, yang sering digabungkan dengan aluminium hidroksida, dapat melindungi tukak lambung dari iritasi asam lambung dengan membentuk lapisan pelindung (Habibie, 2021).

2. Antikolinergik

Pirenzepin, salah satu contoh obat yang agak selektif dari kelompok ini, bekerja sebagai anti reseptor muskarinik dengan kemampuan untuk mengurangi sekresi asam lambung sekitar 28% hingga 43%. Obat ini juga memiliki efek sitoprotektif (Handayani et al., 2021).

3. Antagonis reseptor H₂

Simetidin, nizatidin, roksatidin, dan famotidin adalah contoh obat dari kategori ini. Salah satu obat yang paling umum digunakan dalam kategori obat ini adalah ranitidin; namun, karena sifatnya yang memicu kanker, N-nitrosodimethylamine (NDMA), telah ditarik dari pasar. Banyak

orang menggunakan jenis obat ini untuk mengobati dispepsia organik atau esensial, seperti tukak peptik, karena mekanisme penghambatan reseptor H₂ yang mengurangi sekresi asam lambung (Habibie, 2021).

4. Proton pump inhibitor [PPI]

Omeprazol, esomeprazol lansoprazol, dan pantoprazol adalah beberapa obat PPI. Golongan obat ini mengontrol sekresi asam lambung pada pompa proton, yang mengeluarkan proton (ion H⁺) (Habibie, 2021).

5. Sitoprotektif

Salah satu obat dari kategori ini adalah prostaglandin sintetik seperti misoprostol (PGE₁) dan enprostil (PGE₂). Selain berfungsi sebagai sitoprotektif, ia juga memiliki kemampuan untuk menghentikan sekresi asam lambung oleh sel parietal. Sukralfat meningkatkan prostaglandin endogen, yang memperbaiki mikrosirkulasi, meningkatkan produksi mucus, meningkatkan sekresi bikarbonat mukosa, dan membentuk lapisan yang bersenyawa dengan protein di sekitar luka pada mukosa saluran cerna bagian atas (Handayani et al., 2021).

6. Golongan prokinetik

Dispepsia fungsional dan refluks esofagitis dapat diobati dengan baik dengan obat-obatan seperti cisapride, domperidon, dan metoclopramide. Obat-obatan ini memperbaiki asam lambung dan mencegah refluks (Habibie, 2021).

7. Golongan anti depresi

Trisiclic Antidepressants [TCA], seperti amitriptilin, termasuk dalam kategori ini. Karena tidak jarang keluhan yang muncul terkait dengan faktor kejiwaan cemas dan depresi, pasien dengan dispepsia fungsional biasanya memerlukan psikoterapi dan psikofarmaka, seperti obat anti depresi dan cemas. Dispepsia fungsional tidak memiliki pengobatan yang jelas. Pemberantasan helicobacter pylori, PPI, dan terapi psikologi adalah beberapa pengobatan yang didukung oleh bukti ilmiah. Antasida, antispasmodik, bismuth, terapi diet, terapi herbal, antagonis reseptor H₂, misoprostol, golongan prokinetik, selective serotonin-reuptake inhibitor, sukralfat, dan antidepresan adalah contoh pengobatan yang belum didukung bukti (Habibie, 2021).

B. Tinjauan Umum mengenai Tingkat Stress

1. Definisi

Menurut National Safety Council, stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman yang dihadapi oleh mental, emosional, fisik, dan spiritual individu yang lama kelamaan akan berpengaruh pada kesehatan fisik individu. Dalam Santrock (2003) stres adalah respon seseorang terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres (stressor), yang dapat mengancam dan mengganggu kemampuan individu untuk menanganinya (coping). Rasmun (2004) mendefinisikan stres sebagai gejala umum yang terjadi apabila tubuh merespon setiap kebutuhan tubuh yang terganggu. Stres merupakan ungkapan reaksi tubuh

manusia terhadap tuntutan dan merupakan gerakan pembelaan tubuh manusia (Gintings, 2021).

Berdasarkan pengertian stres tersebut dapat disimpulkan bahwa stres merupakan respon tubuh terhadap suatu ancaman yang dihadapi oleh mental, emosional, fisik, dan spiritual individu dan mengganggu kemampuan individu untuk menghadapinya. Individu yang mengalami stres akan merasakan dampak stres terhadap fisik, psikologis, sosial, intelektual, dan spiritual, serta dapat berpengaruh pada keseimbangan fisiologis. Selain itu stres dapat menjadi faktor penyebab dari suatu gangguan atau penyakit.

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan stress remaja

Menurut penelitian (Nurwela & Israfil, 2022), faktor-faktor yang menjadi sumber stress pada remaja:

a. Pemenuhan Tugas Perkembangan Emosional

Perkembangan remaja mencakup menerima diri mereka sendiri, memahami dan menerima peran seks orang dewasa, membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, mencapai kemandirian emosional dan ekonomi, dan mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Mereka juga harus memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orang tua (Cahyono et al., 2019).

b. Keadaan Lingkungan Tempat Tinggal

Keadaan lingkungan tempat tinggal ditemukan paling tinggi mempengaruhi stres psikososial pada remaja. Penelitian telah menunjukkan bahwa remaja sekarang memiliki paparan risiko kesehatan termasuk kesehatan psikis yang lebih tinggi daripada remaja dimasa lalu akibat krisis kehidupan sosial. Para remaja ditemukan memiliki prevalensi kualitas dan kuantitas tidur yang buruk, kurang olahraga teratur, gangguan emosi, termasuk gejala gangguan stres pasca-trauma yang secara independen menyebabkan tekanan emosional (Ho & Lee, 2022)

c. Kecanduan Internet

Masalah kesehatan mental, stres, perasaan sedih, dan keinginan bunuh diri memiliki keterkaitan erat dengan waktu penggunaan internet. Kelompok remaja yang memiliki waktu penggunaan internet lebih dari rata-rata memiliki kesehatan subjektif yang lebih buruk, tingkat stres yang lebih tinggi, dan memiliki perasaan sedih dan keinginan bunuh diri lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok remaja dengan penggunaan internet yang kurang dari rata-rata (Kwak et al., 2022).

d. Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua ditemukan memiliki hubungan dengan stres pada remaja. Keharmonisan orang tua atau keluarga tentu akan melahirkan pola asuh yang baik dan menjadikan anak memiliki mental yang sehat, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan keluarga yang tidak

harmonis tentu tidak dapat memberikan pola asuh yang baik yang akhirnya dapat memicu stres pada remaja karena kondisi yang ia dapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Windarwati et al., 2020).

3. Hubungan Stress dengan Dispepsia

Hipersensitivitas atau hiperaktif sumbu Hipotalamus Pituitary Adrenal terhadap stresor yang berlebihan menyebabkan hiperkortisolemia. Kerentanan biologis seseorang terhadap stres akan meningkat dalam keadaan ini. Kerentanan ini menyebabkan sekresi hormon corticotropin-releasing (CRH) yang tinggi ketika terpapar stresor. Sekresi CRH ini akan mempengaruhi hipokampus, menghentikan mekanisme umpan balik negatif kortisol. Ketika mekanisme ini terganggu, kortisol menekan sekresi CRH, yang mengakibatkan pelepasan CRH yang lebih tinggi. Selanjutnya, nilai kortisol serum akan meningkat sebagai akibatnya. Hal ini yang menimbulkan gejala dispepsia (Murni, 2020).

Kecemasan juga dapat mengganggu sistem saraf pusat. Saraf vagus adalah persarafan yang akan terkena karena merangsang produksi asetilkolin oleh serabut kolinergik, gastrin, dan histamin. Ini menyebabkan keluhan sindrom dispepsia karena peningkatan sekresi asam lambung yang mempengaruhi integritas mukosa lambung, dan peningkatan atau penurunan pergerakan atau motilitas lambung yang dapat mempengaruhi waktu pengosongan lambung (Rahmadyah et al., 2019).

Salah satu hukum dan ketentuan Allah bagi semua makhluk-Nya adalah ditetapkannya ujian dan cobaan bagi mereka. Sudah menjadi tabiat

kehidupan dunia dan kehidupan manusia bila manusia tidak akan pernah lepas dari musibah yang menghampirinya ataupun kesulitan yang melilitnya. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:155 :

وَالْأَنْفُسَ الْأَمْوَالَ مِّنْ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ وَالْخَوْفِ مِّنْ بَشِيءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

الصَّابِرِينَ وَبَشِيرًا وَالنَّمْرَاتِ

Terjemahnya:

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,

Tafsir Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al Mishbah berdasarkan firman-Nya: Sungguh, Kami pasti akan terus menerus menguji kamu, mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian yang diberikan Allah sedikit. Kadarnya sedikit bila dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Ia hanya sedikit, sehingga setiap yang diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi – potensi yang dianugerahkan Allah itu (Shihab, 2017).

Patut dicamkan bahwa ayat sebelum ini mengajarkan sholat dan sabar. Jika demikian, yang diajarkan itu harus diamalkan sebelum datangnya ujian Allah ini. Demikian pula ketika ujian berlangsung. Itu sebabnya Rasul SAW., sebagaimana diriwayatkan oleh imam Ahmad melalui sahabat Nabi SAW. Hudzaifah Ibn al Yaman, bahwa “Apabila beliau dihadapkan pada satu kesulitan/ujian, beliau melaksanakan shalat.”

Karena itu pula ayat di atas ditutup dengan perintah, “Sampaikanlah berita gembira kepada orang – orang yang sabar”(Shihab, 2017).

Ini tidak ubahnya dengan ujian pada lembaga pendidikan yang dirasakan oleh mahasiswa. Soal – soal ujian disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing – masing. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berat soal ujian. Setiap yang diuji akan lulus jika ia mempersiapkan diri dengan baik, serta mengikuti tuntunan yang diajarkan.

C. Tinjauan Umum mengenai Pola Makan

1. Definisi

Pola makan adalah upaya untuk mengontrol jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh, tingkat gizi, mencegah penyakit, atau membantu penyembuhan penyakit (RI, 2009).

Pola makan terdiri dari frekuensi makan dan jumlah makanan.

2. Klasifikasi Pola Makan

a. Frekuensi Makan

Menurut Permenkes RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang menyebutkan bahwa makan teratur adalah pola makan dengan makan utama 3 kali sehari (sarapan atau makan pagi, makan siang, dan makan malam). Selain makanan utama 3 kali sehari, juga dianjurkan untuk makan makanan selingan sehat. Jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang setiap hari, baik makanan utama maupun selingan, disebut

frekuensi makan. Frekuensi makan yang baik adalah ketika seseorang makan tiga kali sehari, atau dua kali makan makanan utama dan satu kali makan selingan. Jika seseorang makan kurang dari dua kali sehari, itu disebut frekuensi makan kurang baik.

b. Jumlah makanan

Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), porsi makanan pokok memiliki kisaran berat sebesar 150 gram nasi atau setara dengan 3 centang nasi. Porsi lauk pauk sebesar 75 - 100 gram atau setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit atau 1 butir telur ukuran besar. Porsi sayuran sebesar 150 gram atau setara dengan 1 mangkuk sedang, buah-buahan sebesar 150 gram per porsi atau setara dengan 2 potong sedang pepaya atau 2 buah jeruk sedang dan air sekitar 250 ml per gelas.

3. Hubungan pola makan dengan dispepsia

Kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas, makanan atau minuman asam, minum kopi, minum teh, dan minuman yang berkarbonasi dapat meningkatkan risiko terjadinya dispepsia. Pola makan yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya sindrom dispepsia sehingga sekresi asam lambung akan berlebihan yang akan berakibat pada rusaknya mukosa lambung dan menimbulkan keluhan seperti mual. Apabila pola makan teratur maka akan memudahkan kerja lambung untuk mengenali waktu makan sehingga produksi asam lambung dapat terkontrol. Jika hal ini

berlangsung lama, sekresi asam lambung akan meningkat sehingga dapat mengiritasi mukosa lambung yang dapat menyebabkan adanya gastritis dan dapat menjadi tukak peptik. Hal ini dapat menyebabkan mual dan rasa tidak enak serta nyeri pada gastrointestinal bagian atas (Irfan, 2019).

Disebutkan dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran mengenai pentingnya menjaga pola makan yaitu pada surah Taha/20:81

وَمَنْ غَضِبِي عَلَيْكُمْ فَجِلِّ فِيهِ تَطْعَمًا وَلَا رِزْقًا مِمَّا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلِّهَا
هُوَ فَقَدْ غَضِبِي عَلَيْهِ يَحِلُّ

Terjemahnya:

“Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaan-Ku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia.


Dari tafsir Ibnu Katsir yakni makanlah sebagian dari rezeki yang Aku turunkan kepada kalian ini, dan janganlah kalian bersikap rakus terhadapnya dengan cara mengambilnya lebih dari apa yang kalian perlukan, sebab hal ini berarti kalian melanggar perintah-Ku (Syaikh, 2017).

Baik secara agama maupun secara ilmiah sikap berlebihan dalam makan serta minum merupakan sebuah tindakan yang tidak baik. Selain membuat tidak sehat atau menimbulkan penyakit, sikap berlebihan atau melampaui batas dalam makanan juga menimbulkan murka Allah Swt. sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas. Dengan mengatur pola

makan yang baik tidak berlebihan serta tidak menunda akan membuat tubuh menjadi sehat (Syaikh, 2017).



E. Kerangka Konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional* untuk mengetahui hubungan stress dan pola makan dengan sindroma dispepsia pada mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

B. *Waktu dan Tempat Penelitian*

Penelitian ini akan berlangsung yakni di bulan Desember 2023 – Januari 2024 di Kampus 1 Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

C. *Variabel Penelitian*

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu variabel independent (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. *Variabel Independen*

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat stress dan pola makan.

2. *Variabel Dependen*

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian sindroma dispepsia.


D. *Populasi dan Sampel*

1. *Populasi*

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

2. *Sampel*

Sampel penelitian ini adalah bagian dari populasi yang diteliti, yang meliputi mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Besarnya sampel ditentukan melalui rumus Slovin :


$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$
$$n = \frac{212}{1 + 212 \cdot (0.05)^2}$$
$$n = \frac{212}{1 + 0.53}$$
$$n = \frac{212}{1.53} = 138.56$$

$n = 138.56$ dibulatkan menjadi 139 sampel

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persentase batas toleransi (margin of error)

Hasil perhitungan banyak sampel menggunakan rumus Slovin adalah 139 sampel.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *stratified random sampling*. Teknik sampling dilakukan dengan cara mengambil perwakilan dari setiap angkatan pada mahasiswa program studi pendidikan dokter. Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter terdiri dari 4 angkatan, pada angkatan 2020 sampel yang diambil sebesar 35 sampel, angkatan 2021 sebesar 35 sampel, angkatan 2022 sebesar 35 sampel, dan angkatan 2023 sebesar 34 sampel.

1. Kriteria Inklusi

a. Mahasiswa/i program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar

b. Mahasiswa yang bersedia menjadi responden

2. Kriteria Eksklusi

a. Mahasiswa yang tidak mengisi dengan lengkap

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner penelitian terdiri dari pertanyaan untuk mendapat gambaran mengenai tingkat stress, pola makan dan sindroma dispe pada responden. Kuesioner dibuat dengan menyesuaikan tujuan

penelitian yang merujuk pada kerangka konsep dan teori penelitian.

Kuesioner terdiri dari 3 bagian, yaitu:

a. Kuesioner tingkat stress

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat stress yaitu kuesioner Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) yang terdiri dari 21 pertanyaan. Untuk intepretasinya dikatakan tidak stress : 0-14, stress ringan : 15-18, stress sedang : 19-25, stress berat : 26-33 dan stress sangat berat : 34+

b. Kuesioner pola makan

Kuesioner pola makan yang dipakai diadopsi dari peneliti sebelumnya (Irfan, 2019). Kuesioner ini terdiri dari 5 pertanyaan menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban (a), (b), (c), atau (d). Skor tertinggi untuk setiap pertanyaan adalah 3 dan skor terendah adalah 0. Pola makan dikatakan kurang baik apabila jumlah skor $\geq 4,00$ (nilai mean) dan dikatakan baik apabila jumlah skor $< 4,00$ (nilai mean). Hasil uji validitas dan realibilitas yang didapatkan dengan menggunakan *cronbac's alpha* adalah 0,645 dan dikatakan tervalidasi dan nilai realibilitasnya baik.

c. Kuesioner sindroma dispepsia

Kuesioner sindrom dispepsia yang dipakai berdasarkan kriteria Rome III dan diadopsi dari peneliti sebelumnya (Irfan, 2019). Kuesioner ini terdiri dari 6 pertanyaan dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. Dikatakan positif apabila terdapat jawaban “ya” pada 1 atau lebih

pertanyaan nomor 1-4 ataupun terdapat 2 atau lebih jawaban “ya” dari seluruh pertanyaan dan dikatakan negatif apabila seluruh pertanyaan dengan jawaban “tidak”. Hasil uji validitas dan realibilitas yang didapatkan dengan menggunakan *cronbac's alpha* adalah 0,696 dan dikatakan tervalidasi dan nilai realibilitasnya baik.

G. Pengolahan Data

1. Editing (Penyuntingan)

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan seluruh data sesuai dan lengkap.

2. Coding (Pengkodean)

Memberikan kode atau tanda pada data yang didapatkan untuk menyederhanakan jawaban dari pihak responden dan memudahkan dalam proses analisa data.

3. Tabulasi (tabulating)

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh berdasarkan kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data kuesioner akan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian

data tersebut diolah menggunakan *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis yang menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti yaitu karakteristik responden (tingkat stress, pola makan, dan kejadian sindroma dispepsia).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan variabel dependen (stress dan pola makan) dengan variabel independen (sindroma dispepsia) melalui uji chi square.



I. Alur Penelitian



Bagan 3. Alur Penelitian

J. Etika Penelitian

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin penelitian.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan.
4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar pada bulan Desember 2023. Sampel diperoleh dengan pengisian kuesioner secara langsung pada responden yang bersedia menjadi responden penelitian sejumlah 35 sampel merupakan angkatan 2020, sebanyak 35 sampel angkatan 2021, sebanyak 35 sampel angkatan 2022, dan sebanyak 34 angkatan 2023.

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi dari variabel independen dan variabel dependen. Dari hasil penelitian didapatkan karakteristik sampel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

Kategori	Frekuensi n (%)
Usia	
17	1 (0.7%)
18	23 (16.5%)
19	30 (21.6%)
20	31 (22.3%)
21	40 (28.8%)
22	14 (10.1%)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	25 (18%)

Perempuan	114 (82%)
Angkatan	
2020	35 (25.2%)
2021	35 (25.2%)
2022	35 (25.2%)
2023	34 (24.5%)
Kejadian stress	
Stress	96 (69.1%)
Tidak stress	43 (30.9%)
Tingkat stress	
Tidak stress	43 (30.9%)
Stress ringan	29 (20.9%)
Stress sedang	40 (41.7%)
Stress berat	27 (28.1%)
Pola Makan	
Kurang baik	100 (71.9%)
Baik	39 (28.1%)
Dispepsia	
Dispepsia	103 (74.1%)
Tidak dispepsia	36 (25.9%)
Total	139 (100.0%)

Tabel 4.1 menunjukkan karakteristik sampel dalam penelitian. Mayoritas sampel sebanyak 40 (28.8%) sampel berusia 21 tahun dan 114 (82%) sampel berjenis kelamin perempuan. Mayoritas sampel mengalami stress sebanyak 96 (69.1%) dengan tingkat stress sedang sebanyak 40 (41.7%) sampel dan memiliki pola makan yang kurang baik sebanyak 100 (71.9%) sampel dan sebanyak 103 (74.1%) sampel mengalami sindroma dispepsia.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Stress dengan Kejadian Sindroma Dispepsia

Tabel 4.2 Analisis Hubungan Kejadian Stress dengan Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Kejadian Stress	Sindroma Dispepsia				P-value	Odds Ratio	IK 95%		
	Dispepsia		Tidak dispepsia					Total	
	n	%	n	%				n	%
Stress	81	84.4	15	15.6	96	100.0			
Tidak stress	22	51.2	21	48.8	43	100.0	0,000	2,286-11,622	
Total	103		36		139	100.0			

Tabel 4.2 menunjukkan sebagian besar responden yang mengalami sindroma dispepsia dengan stress sejumlah 81 (84,4%) responden. Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis *chi square test* diperoleh hasil P-value sebesar 0.000, hal ini menunjukkan bahwa p value < 0,005.

Hasil penelitian didapatkan faktor risiko OR didapatkan nilai 5,155 > 1 dan merupakan faktor risiko sehingga odd ratio bermakna. Secara statistik dapat diartikan bahwa responden yang stress mempunyai risiko 5,155 kali untuk mengalami sindroma dispepsia dibandingkan responden yang tidak mengalami stress.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara stress dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. Untuk mengetahui tingkatan stress yang lebih besar risikonya untuk mengalami sindroma dispepsia maka dilakukan uji analisis regresi logistik sederhana.

Tabel 4.3 Analisis Hubungan Tingkat Stress dengan Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Tingkat stress	Sindroma Dispepsia						Odds Ratio	P-value
	Dispepsia		Tidak dispepsia		Total			
	n	%	n	%	n	%		
Ringan	25	86.2	4	13.8	29	100		
Sedang	30	75	10	25	40	100	4,160	0.216
Berat	26	96.3	1	3.7	27	100	8,667	0.046
Total	81		15		96	100		

Pada tabel 4.3 menunjukkan tingkat stress sedang dan mengalami sindroma dispepsia sebanyak 30 (75%), berdasarkan *odds ratio* dapat disimpulkan bahwa stress sedang 4,160 kali lebih beresiko menyebabkan dispepsia dibandingkan dengan stress ringan dan stress berat 8,667 kali lebih beresiko menyebabkan dispepsia dibandingkan dengan stress ringan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

Tabel 4.4 Analisis Hubungan Kejadian Stress dengan Dispepsia berdasarkan Angkatan pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Angkatan	Kejadian Stress	Sindroma Dispepsia						P-value	Odds Ratio
		Dispepsia		Tidak dispepsia		Total			
		n	%	n	%	n	%		
2020	Stress	32	94.1	2	5.9	34	100	0,086	0,059
	Tidak stress	0	0	1	100.0	1	100		
	Total	32		3		35	100		
2021	Stress	12	80.0	3	20.0	15	100	0,660	1
	Tidak stress	16	80.0	4	20.0	20	100		
	Total	28		7		35	100		
2022	Stress	22	81.5	5	18.5	27	100	0,027	7,333
	Tidak stress	3	37.5	5	62.5	8	100		
	Total	25		10		35	100		
2023	Stress	15	75.0	5	25.0	20	100	0,002	11
	Tidak stress	3	21.4	11	78.6	14	100		
	Total	18		16		34	100.0		

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kejadian dispepsia dengan stress terbanyak terdapat pada angkatan 2020 dengan jumlah 32 (94,1%) responden dengan *p value* 0,086, pada angkatan 2021 mayoritas mahasiswa mengalami dispepsia tetapi tidak stress dengan jumlah 16 (80%) responden dengan *p value* 0,660. Pada angkatan 2022 mayoritas mahasiswa mengalami stress dengan dispepsia sebanyak 22 (81,5%) responden dengan *p value* 0,027, dan pada angkatan 2023 yang mengalami dispepsia dan stress sebanyak 15 (75%) responden dengan *p value* 0,002, kesimpulannya hanya pada angkatan 2023 yang terdapat hubungan stress dengan kejadian dispepsia.

b. Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Dispepsia

Tabel 4.5 Analisis Hubungan Pola Makan dengan Dispepsia pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Pola Makan	Sindroma Dispepsia						<i>P-value</i>	<i>Odds Ratio</i>	<i>IK 95%</i>
	Dispepsia		Tidak dispepsia		Total				
	n	%	n	%	n	%			
Kurang baik	76	76	24	24	100	100	0,547	1,407	0,620-3,197
Baik	27	69.2	12	30.8	39	100			
Total	103		36		139	100			

Pada tabel 4.5 menunjukkan sebagian besar responden yang mengalami dispepsia memiliki pola makan yang kurang baik dengan jumlah 76 (76%) responden. Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis *chi square test* diperoleh hasil *P-value* sebesar 0.547 ($p\text{-value} > 0,005$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian sindroma dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter.

Tabel 4.6 Analisis Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Sindroma

Dispepsia berdasarkan Angkatan pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Angka tan	Pola makan	Sindroma Dispepsia						<i>P- value</i>	<i>Odds Ratio</i>
		Dispepsia		Tidak dispepsia		Total			
		n	%	n	%	n	%		
2020	Kurang baik	25	96.2	1	3.8	26	100	0,156	7,143
	Baik	7	77.8	2	22.2	9	100		
	Total	32		3		35	100		
2021	Kurang baik	23	79.3	6	20.7	29	100	0,656	0,767
	Baik	5	83.3	1	16.7	6	100		
	Total	28		7		35	100		
2022	Kurang baik	18	72.0	7	28.0	25	100.0	0,606	1,102
	Baik	7	70.0	3	30.0	10	100.0		
	Total	25		10		35	100.0		
2023	Kurang baik	10	50.0	10	50.0	20	100.0	0,681	0,750
	Baik	8	57.1	6	42.9	14	100.0		
	Total	18		16		34	100.0		

Pada tabel 4.6 pada angkatan 2020 mayoritas memiliki pola makan yang kurang baik dan mengalami dispepsia sebanyak 25 (96,2%) responden, pada angkatan 2021 memiliki pola makan yang kurang baik dan mengalami dispepsia sebanyak 23 (79,3%) responden, pada angkatan 2022 sebanyak 18 (72%) responden dan pada angkatan 2023 yang memiliki pola makan kurang baik dan mengalami dispepsia sama jumlahnya dengan yang memiliki pola makan kurang baik dan tidak mengalami dispepsia sebanyak 10 (50%) responden. Nilai *p value* dari tiap angkatan <0,005.

c. Hubungan Kejadian Stress dengan Pola Makan

Tabel 4.7 Analisis Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Stress pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Kejadian Stress	Pola Makan						P-value	Odds Ratio	IK 95%
	Kurang baik		Baik		Total				
	n	%	n	%	n	%			
Stress	66	68.8	30	31.3	96	100.0	0,295	0,582	0,248-1,365
Tidak stress	34	79.1	9	20.9	43	100.0			
Total	100		39		139	100.0			

Pada tabel 4.7 mayoritas responden mengalami stress dan pola makan yang kurang baik dengan jumlah 66 (68,8%) responden dan jumlah *p value* 0,295, dengan odds ratio 0,582.

d. Hubungan Karakteristik Jenis Kelamin dengan Stress dan Dispepsia

Tabel 4.8 Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Stress pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Jenis kelamin	Kejadian Stress						P-value
	Stress		Tidak stress		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Laki-laki	15	60.0	10	40.0	25	100.0	0,399
Perempuan	81	71.1	33	28.9	114	100.0	
Total	96		43		139	100.0	

Pada tabel 4.8 mayoritas yang mengalami stress adalah perempuan dengan jumlah 81 (71,1%) responden dan pada laki-laki yang mengalami stress sebanyak 15 (60,0%) responden, dengan nilai *p value* 0,399.

Tabel 4.9 Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar

Jenis kelamin	Sindroma Dispepsia						P-value
	Dispepsia		Tidak dispepsia		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Laki-laki	16	64.0	9	36.0	25	100.0	0,307
Perempuan	87	76.3	27	23.7	114	100.0	
Total	103		36		139	100.0	

Pada tabel 4.9 sebagian besar yang mengalami dispepsia dengan jumlah 87 (76,3%) responden dan laki-laki yang mengalami dispepsia sebanyak 16 (64,0%) responden, dengan nilai *p value* 0,307.

B. Pembahasan

1. Hubungan Stress dengan Kejadian Dispepsia pada Mahasiswa Progdi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian didapatkan hasil mayoritas mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar pada tabel 4.1 karakteristik responden mengalami stress dengan jumlah 96 (69,1%) responden. Tabel 4.2 pada pengolahan data dilakukan menggunakan analisis *chi square test* diperoleh hasil *P-value* sebesar 0.000 ($p < 0,005$), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara stress dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melina et al., 2023) dengan metode *case control* yang menjelaskan bahwa adanya hubungan faktor psikologi berupa stress dengan kejadian sindroma dispepsia pada pasien di poliklinik penyakit dalam RSUD Dr. Pirngadi Medan, dari dengan hasil uji statistik chi-square, didapatkan nilai *p value* = 0,002 ($p < 0,05$), artinya dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna

(signifikan) antara stress dengan dispepsia. Nilai OR = 2,46, dalam artian bahwa responden yang mengalami stress memiliki risiko 2,46 kali lebih tinggi untuk mengalami sindroma dispepsia dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami stress.

Pada tabel 4.3 dari 139 responden didapatkan tingkat stress sedang yang paling banyak dialami oleh mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan jumlah 40 (41,7%) responden dari 96 (69,1%) responden yang mengalami stress. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Natu et al., 2022) di Universitas Nusa Cendana Kupang pada mahasiswa pendidikan profesi dokter mendapatkan hasil tingkat stress terbanyak berada pada tingkat stress sedang.

Tabel 4.4 karakteristik yang ditemukan juga yaitu pada angkatan 2020 lebih banyak mengalami stress dibandingkan dengan angkatan yang tingkatannya rendah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wiguna et al., 2022) di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yaitu mahasiswa tingkat 3 lebih banyak mengalami stress tingkat tinggi dibanding dengan mahasiswa tingkat 1.

Salah satu stres akademik yang dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir adalah penyusunan skripsi. Skripsi merupakan suatu makalah ilmiah sebagai salah satu syarat akhir dari program sarjana yang harus dilakukan. Mahasiswa harus mandiri dan disiplin dalam pengerjaannya untuk mencapai target ataupun memenuhi deadline yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian skripsi, terutama pada siswa yang kurang dalam hal kemampuan menulis ataupun keahlian

akademik akan mengalami masalah, misalnya timbul rasa takut menemui dosen pembimbing. Tuntutan yang tinggi dari orang tua, teman dan proses belajar menjadi penyebab meningkatnya stres (Wiguna et al, 2022).

Stress dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu stress ringan, stress sedang dan stress berat. Pada stress ringan merupakan gejala stress yang tidak mengganggu fisiologis dari individu. Gejala ini biasanya hanya berupa gejala ringan yang sering dialami setiap orang misalnya lupa atau tertidur saat beraktivitas. Sedangkan stress sedang merupakan gejala stress yang timbul hingga sampai beberapa jam hingga beberapa hari, dan mengganggu fisiologis dari individu, misalnya kurang konsentrasi, gangguan siklus menstruasi hingga gangguan pencernaan. Stress berat merupakan gejala stress kronis yang timbul dari beberapa hari hingga berbulan-bulan, dan terjadi peningkatan gejala semakin berat daripada sebelumnya. Gejala yang timbul berupa berdebar-debar, berkeringat, mudah panik.

Tingkat stres yang tinggi dalam penelitian ini disebabkan oleh keadaan bahwa responden adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, pada tahun pertama mengalami perubahan lingkungan dan tuntutan akademik yang signifikan dibandingkan dengan saat mereka masih di sekolah menengah, dan transisi ini dapat menyebabkan stress karena mahasiswa harus beradaptasi dengan perubahan kebiasaan belajar, proses pembelajaran, lingkungan belajar yang baru yang ini menyebabkan perubahan kebiasaan tidur dan makan, kurangnya waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan teman dan meningkatnya beban tugas yang dirasakan mahasiswa kedokteran pada tahun pertama, stress yang dirasakan pada mahasiswa

tahun pertama ini memiliki hubungan dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

Mahasiswa tahun kedua memiliki tingkat stress yang lebih rendah dibandingkan angkatan yang lain, karena sudah beradaptasi dengan lingkungan kampus dan proses pembelajaran yang baru, sehingga keadaan psikologisnya merasa tenang dan percaya diri karena telah berhasil beradaptasi dengan tantangan psikologi yang dihadapi (Indra et al., 2023).

Pada penelitian ini, didapatkan adanya hubungan antara stress dengan dispepsia mengarah ke dispepsia fungsional dengan gejala gastrointestinal bagian atas paling persisten tanpa sebab organik atau metabolik yang jelas. Keadaan stres psikologi memainkan peranan penting dalam patofisiologi dispepsia fungsional, meskipun belum ada penjelasan jelas tentang mekanisme tersebut. Stres diasosiasikan sebagai salah satu penyebab dispepsia terutama dispepsia fungsional. Saat stres terjadi, hipotalamus akan mensekresikan corticotrophin releasing factor (CRF) yang akan menstimulasi kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan adrenocorticotrophic hormone (ACTH) dan selanjutnya akan menyebabkan keluarnya kortisol dari kelenjar adrenal. Kortisol yang disekresikan tersebut akan merangsang lambung untuk meningkatkan sekresi asam lambung dan juga menghambat prostaglandin yang merupakan agen proteksi bagi lambung. Terpaparnya lambung secara terus menerus akibat peningkatan asam lambung ini lama kelamaan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada mukosa lambung (Tamimi et al., 2020)

Religiusitas dan tingkat kognitif mahasiswa juga berkorelasi positif dengan tingkat stresnya. Hal ini dapat membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dan percaya bahwa semua masalah ada solusinya, sehingga tidak perlu takut untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan stres signifikan dan menghilangkan stres yang dialaminya (Ingrid Nurimani Ansari, 2023) . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan universitas yang banyak melakukan kegiatan keagamaan. Hal ini mencakup banyak mata kuliah yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, seperti kegiatan *problem based learning* yang selalu mengaitkan kasus dengan ayat Alquran, integrasi keislaman di setiap blok perkuliahan dan membaca ayat Alquran sebelum kelas dimulai.

Konsep ujian dan cobaan ditegaskan pula oleh Allah SWT dalam surah Al-‘Ankabut/29:2

يُقِنُّونَ لَا وَهُمْ ءَامَنَّا يَفُولُوا أَن يُتَرَكَوْا أَن النَّاسُ أَحْسِبَ

Terjemahnya:

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan (hanya dengan) berkata, “Kami telah beriman,” sedangkan mereka tidak diuji?

Dalam tafsir (Kementerian Agama RI, 2011) pada ayat ini, Allah bertanya kepada manusia yang telah mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat bahwa apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa lebih dahulu diuji? Tidak, malah setiap orang beriman harus diuji lebih dahulu, sehingga dapat diketahui sampai di manakah mereka sabar dan tahan menerima ujian tersebut. Ujian yang mesti mereka tempuh itu bermacam-macam. Umpamanya perintah berhijrah (meninggalkan kampung halaman) yang dirasakan

oleh sebagian besar mahasiswa karena diharuskan menuntut ilmu dan jauh dari keluarga serta diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mereka belum kenal sebelumnya. Penyesuaian dengan lingkungan sosial yang baru juga memiliki peran dalam menimbulkan stress pada mahasiswa. Semua cobaan itu dimaksudkan untuk menguji siapakah di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman dengan ikhlas dan siapa pula yang berjiwa munafik. Juga bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu sehingga iman mereka masih rapuh (Kementerian Agama RI, 2011).

Alquran memandang stress sebagai cobaan dan ujian dari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa semakin berat dan semakin tinggi cita-cita yang dicapai, semakin besar pula tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi. Untuk mendapatkan keridloan Allah dan mendapatkan surga, harus melalui perjuangan yang tidak mudah dan penuh rintangan dan cobaan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah SWT akan menguji manusia dari yang ringan hingga yang berat, dan diminta untuk bersabar. Allah berjanji akan memberi kepada mereka pertolongan, keberkahan, dan rahmat (Darwati, 2022).

2. Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Dispepsia pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian pada tabel 4.5 yang dilakukan didapatkan hasil mayoritas mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar memiliki pola makan kurang baik sebanyak 71(51,1%) responden yang mengalami sindrom dispepsia dibandingkan dengan responden yang memiliki pola makan baik yaitu

sebanyak 27 orang, responden dengan pola makan yang kurang baik rata-rata memiliki jadwal makan yang tidak teratur pada sarapan pagi dan makan malam serta memiliki jeda waktu makan yang lama, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahma, 2019) pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar bahwa sebanyak 49,49% responden jarang melakukan sarapan dengan mengatakan merasa tidak memiliki waktu yang cukup dikarenakan perkuliahan mulai di pagi hari.

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis *chi square test* diperoleh hasil P-value sebesar 0,547. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa program studi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irfan, 2019) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan hasil uji statistik chi-square, didapatkan nilai p value = 0,987, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak atau dapat disimpulkan tidak adanya hubungan yang bermakna (signifikan) antara keteraturan makan dengan kejadian sindrom dispepsia.

Pada tabel 4.6 didapatkan mayoritas responden memiliki pola makan yang kurang baik dan mengalami dispepsia pada tiap angkatan dengan *p value* >0,005.

Kriteria pola makan yang baik yaitu berdasarkan frekuensi, jenis, dan jumlah makanan. Frekuensi makan yang teratur tiga kali makan dan dua kali makanan selingan berupa snack dalam satu hari sedangkan untuk jenis dan jumlah

makanan yang dikonsumsi sesuai dengan aturan gizi yaitu mengonsumsi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral (Andreyani et al., 2019).

Pola makan yang sering mengonsumsi makanan dan minuman iritatif juga merupakan faktor resiko dari dispepsia, pada penelitian yang dilakukan (Suzanni, 2020) didapatkan hasil bahwa terdapatnya hubungan antara mengonsumsi makanan dan minuman iritatif dengan kejadian sindrom dispepsia yang dijelaskan bahwa terlalu mengonsumsi banyak makanan dan minuman iritatif dapat merangsang lambung untuk berkontraksi serta mengiritasi dinding lambung sehingga akan menyebabkan timbulnya rasa nyeri pada perut dan rasa terbakar pada ulu hati.

Kebiasaan makan adalah perilaku yang berhubungan dengan makan, tata krama makan, frekuensi makan seseorang, pantangan makanan, distribusi makanan di dalam anggota keluarga, dan cara-cara memilih bahan makanan. Kebiasaan makan akan sangat kuat bertahan terhadap pengaruh yang mungkin dapat mengubahnya. Kebiasaan makan seseorang menggambarkan kebiasaan keluarganya karena individu tersebut mengalami proses belajar selama tinggal bersama keluarga yang kemudian akan menghasilkan kebiasaan makan ini terjadi seumur hidup, sejak anak lahir sampai menjadi dewasa dan masih terus berlangsung selama hidupnya. Mekanisme yang menghubungkan belum diketahui lebih jelas, namun jeda waktu makan yang lama dapat membuat pengosongan lambung lambat, gangguan pada sekresi lambung, gangguan akomodasi lambung serta hormon gastrointestinal. Gaya hidup pada remaja diketahui juga berperan dikarenakan pola makan atau kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, kurang

sayur, minuman bersoda, aktivitas fisik yang kurang dan tingginya kebiasaan tidak bergerak (Darmawansyih et al., 2022).

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya sindrom dispepsia, salah satu contohnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Firman Syah, 2022) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun menyebutkan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan sindrom dispepsia adalah konsumsi obat anti inflamasi non steroid (OAINS), merokok, konsumsi makanan dan minuman iritatif namun tidak dimasukkan ke variabel penelitian ini.

Konsep mengenai pola makan ditegaskan pula oleh Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah/2:168 :

الشَّيْطٰنُ خٰطُوْتٍ تَتَّبِعُوْا وَلَا طَيِّبًا حَلٰلًا اَلْاَرْضِ فِيْ مِمَّا كَلُوْا النَّاسُ يٰٓاِيُّهَا
مُبِيْنٌ عَدُوٌّ لِّكُمْ اِنَّهٗ

Terjemahan :

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dalam tafsir Al-Misbah (Shihab, 2017) dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah SWT atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang thayyib adalah halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain.

Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab memaparkan bahwa makanan yang halal belum tentu baik, karena makanan yang baik bagi satu orang dengan yang lain berbeda. Seperti si A memiliki penyakit gastritis dan jika ia mengonsumsi sayuran kol menyebabkan gangguan pencernaan, berbeda dengan si B, ia mempunyai pencernaan yang baik sehingga jika ia mengonsumsi sayuran kol tidak akan merugikan apapun dalam tubuhnya. Jadi makanan yang baik ialah makanan yang tidak merugikan apapun bagi mengonsumsi makanan tersebut. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan thayyib (Fitriani, 2022).

Hadits ke-47 dari Jamiul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab membahas juga mengenai pola makan:

الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ
 عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ:
 مَا مَلَأَ آدَمِيٍّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِ حَسْبِ بْنِ آدَمَ الْكَلَاتُ يُقْمَنَ صَلْبَهُ فَإِنْ
 كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْتُ لِطَعَامِهِ وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ
 رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّنْسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ
 حَسَنٌ

Terjemahan:

Dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam.. Cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya." (HR. Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan) [HR. Ahmad, 4:132; Tirmidzi, no. 2380; Ibnu Majah, no. 3349. Syaikh Syaib Al-Arnauth mengatakan bahwa perawi hadits ini tsiqqah, terpercaya].

Dari pengertian di atas, maka adab makan adalah sebuah tata cara atau aturan ketika makan, mulai dari awal hingga selesai yang dilakukan oleh seseorang. Rasulullah SAW, telah memberikan contoh bagaimana adab makan yang baik, yaitu membaca do'a sebelum makan, makan dengan posisi duduk, makan menggunakan tangan kanan, makan makanan yang baik menurut kesehatan dan halal menurut Islam, dan menutup makan dengan do'a. Selain itu, dianjurkan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, dilarang makan berlebihan, makan sambil riya' atau pamer, makan sambil berdiri apalagi jalan. Adab makan yang diajarkan agama Islam bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan dan mendapatkan rasa kenyang, tetapi juga mencari keberkahan dan ridho Allah swt. Namun pada zaman sekarang, banyak yang tidak menghiraukan praktik adab makan yang baik dan benar, seperti makan sambil berdiri, makan yang berlebihan, makan makanan dengan tanpa memperdulikan kansasung gizi yang baik untuk tubuh, misalnya dengan level pedas, asam,asin yang tinggi hingga pamer di media sosial.

3. Hubungan Kejadian Stress dan Pola Makan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7 didapatkan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar mengalami stress dan memiliki pola makan kurang baik dengan jumlah 66 (68,8%) responden, dengan *p value* 0,295, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara kejadian stress dengan pola makan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri,

2021) yang meneliti mengenai hubungan stress akademik dengan pola makan pada mahasiswa tingkat akhir dan hasilnya tidak ada hubungan yang signifikan.

Stress memiliki dampak pada pengaturan pola makan dan pemilihan jenis makanan. Saat stress, terjadi peningkatan produksi hormon stress atau kortisol. Kortisol memicu keinginan untuk makan makanan yang asin, manis, dan juga tinggi lemak karena memberikan energi dan kesenangan. Emotional eating merupakan keadaan dimana individu melakukan makan secara berlebihan bukan karena lapar, namun sebagai suatu upaya untuk memperbaiki mood dan meminimalisir ketidaknyamanan akibat dari stress. Emotional eating merupakan *coping strategy* untuk mengatasi stress dan kecemasan, sedangkan pada saat mengalami emotional eating, seseorang cenderung untuk memilih makanan yang tinggi dan energi lemak (Wijayanti et al, 2019).

4. Hubungan Karakteristik Jenis Kelamin dengan Stress dan Dispepsia pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian pada tabel 4.8 didapatkan mayoritas yang mengalami stress dan dispepsia berjenis kelamin perempuan untuk nilai *p value* >0,005 yang berarti tidak ada hubungan bermakna karakteristik jenis kelamin dengan kejadian stress dan dispepsia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Giringan et al, 2021) yang terdapat hubungan signifikan perempuan dengan kejadian dispepsia. Kerja motilitas lambung dan sensitivitas visceral dipengaruhi oleh hormon seks. Hormon wanita diduga mengubah waktu pengosongan lambung

menjadi lebih panjang dan persepsi nyeri visceral mungkin dipengaruhi oleh perubahan siklus pada hormon seks wanita.

Pada tabel 4.9 karakteristik responden yang mengalami dispepsia didapatkan pada penelitian ini yaitu mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 87 (76,3%) responden, karakteristik ini serupa dengan penelitian yang dilakukan (Firman Syah et al., 2022) yaitu mayoritas mahasiswa yang mengalami dispepsia yaitu perempuan, hal ini dikaitkan dengan hormon estrogen dan progesteron yang lebih banyak pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang mana hormon estrogen memengaruhi emosi dan suasana hati.

Karakteristik jenis kelamin tidak berpengaruh dengan kejadian stress dan dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar dengan p value 0,399 dan 0,307 tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian stress dan dispepsia pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti masih menemukan adanya kekurangan antara lain:

1. Variabel pola makan yang diamati dalam penelitian ini terbatas pada frekuensi makan, tidak meneliti terkait jenis makanan dan jumlah makanan yang mungkin berkontribusi terhadap sindrom dispepsia pada penelitian ini.

2. Pengamatan variabel stress dalam penelitian ini tidak meneliti lebih lanjut terkait sumber stressor yang dialami responden.

3. Terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan sindrom dispepsia, seperti gaya hidup, konsumsi obat-obatan dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar didapatkan hasil :

1. Terdapat hubungan antara stress dan sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
2. Tidak terdapat hubungan antara pola makan dan sindroma dispepsia pada mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
3. Frekuensi mahasiswa yang mengalami sindroma dispepsia sebanyak 98 (70,5%) responden dan yang tidak mengalami sindroma dispepsia sebanyak 41 (29,5%) responden.
4. Frekuensi mahasiswa yang mengalami stress sebanyak 96 (69,1%) dengan tingkat stress sedang sebanyak 40 (41,7%) responden dan yang tidak mengalami stress sebanyak 43 (30,9%) responden.
5. Frekuensi mahasiswa yang memiliki pola makan yang kurang baik sebanyak 99 (71,2%) responden dan dengan pola makan yang baik sebanyak 40 (28,8%) responden.
6. Frekuensi mahasiswa yang memiliki tingkat stress lebih tinggi terdapat pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar dibandingkan dengan mahasiswa angkatan dibawahnya.

7. Terdapat hubungan yang bermakna antara stress dengan dispepsia pada mahasiswa angkatan 2023 Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait sindroma dispepsia yang dialami guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

b. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menentukan *coping mechanism* atau strategi mengatasi stress yang tepat.

c. Bagi mahasiswa di tengah padatnya jadwal perkuliahan untuk selalu mengonsumsi makanan dalam jenis, porsi, dan frekuensi yang sesuai dengan pola makan bergizi seimbang .

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk pengembangan penelitian yang lebih baik dengan variabel penelitian yang lebih beragam daripada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreyani, N. L. P. M., Sutajaya, I. M., & Dewi, N. P. S. R. (2019). Pola Konsumsi Yang Tidak Teratur Mengakibatkan Kelelahan Dini Dan Peningkatan Beban Kerja Penenun Di Desa Gelgel Klungkung Bali. *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksha*, 6(3), 112–122. <http://dx.doi.org/10.23887/jjpb.v6i3.21978.g13584%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPB/article/download/21978/13584>
- Barberio, B., Mahadeva, S., Black, C. J., Savarino, E. V., & Ford, A. C. (2020). Systematic review with meta-analysis: global prevalence of uninvestigated dyspepsia according to the Rome criteria. *Alimentary Pharmacology and Therapeutics*, 52(5), 762–773. <https://doi.org/10.1111/apt.16006>
- Black, C. J., Paine, P. A., Agrawal, A., Aziz, I., Eugenicos, M. P., Houghton, L. A., Hungin, P., Overshott, R., Vasant, D. H., Rudd, S., Winning, R. C., Corsetti, M., & Ford, A. C. (2022). British Society of Gastroenterology guidelines on the management of functional dyspepsia. *Gut*, 71(9), 1697–1723. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2022-327737>
- Cahyono, B. D., Handayani, D., & Zuhroidah, I. (2019). Hubungan Antara Pemenuhan Tugas Perkembangan Emosional Dengan Tingkat Stres Pada Remaja. *Jurnal Citra Keperawatan*, 7(2), 64–71. <https://doi.org/10.31964/jck.v7i2.121>
- Darmawansyih, Fradillah, A., & Sitti Rhma, A. (2022). *Gambaran Pola Aktivitas dan Kebiasaan Makan Remaja Selama Pandemi Adolescent ' s Activity Level and Eating Habits During Pandemic COVID-. 4.*
- Darwati, Y. (2022). Coping Stress Dalam Perspektif Al Qur'an. *Spiritualita*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v6i1.295>
- Dhiya'Ulhaq, N. N., Priawantiputri, W., & ... (2022). Studi Literatur Pola Makan Dan Kejadian Sindrom Dispepsia Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan ...*, 2(3), 1004–1019. <https://jurnal.polkesban.ac.id/index.php/jks/article/view/856>

- Djojoningrat. (2017). *Dispepsia fungsional, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*.
- Firman Syah, M. S., Manaf, A. A., & The, F. (2022). Hubungan Faktor Risiko dengan Kejadian Sindrom Dispepsia Fungsional pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun. *Medula*, 10(1), 9. <https://doi.org/10.46496/medula.v10i1.25877>
- Fitriani. (2022). Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah : 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan. *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(1), 55–59.
- Giringan, F., Sudarmo D. Prihanto, E., & Ambar, E. (2021). Karakteristik Penderita Dispepsia di Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Chasan Boesoirie. *Kieraha Medical Journal*, 3(1), 21–27. <https://doi.org/10.33387/kmj.v3i1.3265>
- Habibie, B. Y. (2021). Terapi pada Dispepsia. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(3), 503–510. <https://doi.org/10.37287/jppp.v3i3.517>
- Handayani, N., Sri, T., & Aji, N. (2021). *Kenali Dispepsia & Cerdas dalam Penanganannya (Disertai Resep Olahan Herbal untuk Dispepsia)*.
- Harer, K. N., & Hasler, W. L. (2020). Functional dyspepsia: A review of the symptoms, evaluation, and treatment options. *Gastroenterology and Hepatology*, 16(2), 66–74.
- Hasanuddin, M. B. (2020). *Karakteristik Penderita Dispepsia di beberapa lokasi di wilayah Indonesia Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019*.
- Ho, C. Y., & Lee, A. (2022). Cultivating a Healthy Living Environment for Adolescents in the Post-COVID Era in Hong Kong: Exploring Youth Health Needs. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12). <https://doi.org/10.3390/ijerph19127072>
- Indra, A. A., Rasfayanah, Laddo, N., Nurmadilla, N., & Hapsari, P. (2023). Hubungan Pola Makan, Tingkat Stress, dan Riwayat Penggunaan OAINS

dengan Kejadian Dispepsia pada Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644>

Ingrid Nurimani Ansari. (2023). Hubungan Derajat Stres dengan Kejadian Sindrom Dispepsia Fungsional pada Mahasiswa FK UNISBA. *Jurnal Riset Kedokteran*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jrk.vi.2301>

Irfan, W. (2019). Hubungan Pola Makan Dan Sindrom Dispepsia Pada Mahasiswa Pre Klinik Fakultas Kedokteran Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 . Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 2019. *Fakultas Kedokteran UIN SYarif Hidayatullah Jakarta*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Profil Data Kesehatan Indonesia. *Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011*, 77.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Capai Bonus Demografi, Jangan Abaikan Kesehatan Mental Remaja*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <http://www.depkes.go.id/article/view/19031900001/achieve-demographic-bonuses-don-t-ignore-adolescent-mental-health.html>

Kim, B. J., & Kuo, B. (2019). Gastroparesis and functional dyspepsia: A blurring distinction of pathophysiology and treatment. *Journal of Neurogastroenterology and Motility*, 25(1), 27–35. <https://doi.org/10.5056/jnm18162>

Kwak, Y., Kim, H., & Ahn, J. W. (2022). Impact of Internet usage time on mental health in adolescents: Using the 14th Korea Youth Risk Behavior Web-Based Survey 2018. *PLoS ONE*, 17(3 March), 1–10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264948>

Marcellus Simadibrata. (2014). *Konsensus Nasional Penatalaksanaan Dispepsia dan Infeksi Helicobacter pylori*. Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia (PGI) Kelompok Studi Helicobacter pylori Indonesia (KSHPI).

- Maresa, T. (2020). Hubungan Tingkat Stres Dan Keteraturan Pola Makan Dengan Terjadinya Dispepsia Pada Usia Produktif Dipuskesmas Depok Iii Sleman Yogyakarta. (*Skripsi*). http://digilib.unisayogya.ac.id/4629/1/NASKAH_PUBLIKASI_TRIA_MARESA_1710201223.pdf
- Melina, A., Nababan, D., & ... (2023). Faktor Risiko Terjadinya Sindroma Dispepsia Pada Pasien Di Poli Klinik Penyakit Dalam Rsud Dr. Pirngadi Medan Tahun 2019. *Indonesian Nursing ...*, 3(1), 31–45. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/health/article/view/156%0Ahttps://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/health/article/download/156/128>
- Murni, A. W. (2020). Kadar Kortisol Plasma pada Dispepsia Fungsional dengan Gangguan Psikosomatik. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.382>
- Natu, D. L., Artawan, I. M., Trisno, I., & Rante, S. D. T. (2022). Hubungan Tingkat Stres Dengan Kejadian Sindrom Dispepsia Pada Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang. *Cendana Medical Jurnal*, 23(1), 1–7. <http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/CMJ/article/view/6819>
- Nurwela, T. S., & Israfil. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Pada Remaja ; Literatur Review. *Urnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 10(4), 697–704.
- Octaviana, S. L. , E., Rachman, A., Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, F., Selatan, K., & Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin Kalimantan Selatan, S. (2021). Hubungan Pola Makan dan Stres dengan Kejadian Dispepsia pada Siswa di SMP Negeri 2 Karang Intan. *The Indonesian Journal of Health*, XI(2), 76–81.
- Oswari, H., Alatas, F. S., Hegar, B., Cheng, W., Pramadyani, A., Benninga, M. A., & Rajindrajith, S. (2019). *Functional abdominal pain disorders in adolescents in Indonesia and their association with family related stress*. 1–

9.

Putri, A. N., Maria, I., & Mulyadi, D. (2022). Hubungan Karakteristik Individu, Pola Makan, Dan Stres Dengan Kejadian Dispepsia Pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Jambi Angkatan 2018. *Journal of Medical Studies*, 2(1), 36–47.

Rahma, A. S. (2019). Tingkat Pengetahuan Dan Kebiasaan Sarapan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Uin Alauddin Makassar Tahun 2017. *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 3(2), 13. <https://doi.org/10.24252/alami.v3i2.9795>

Rahmadiyah, I., Rozalina, ;, & Handini, M. (2019). Hubungan Kecemasan Dengan Kejadian Sindrom Dispepsia Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura. *Jurnal Mahasiswa PSPD FK Universitas Tanjungpura*, 5(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfk/article/view/31210/0>

RI, K. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jilid VII.). Widya Cahaya.

RSUD Kota Makassar. (2023). *10 Penyakit Terbanyak*. Kemenkes. <http://36.67.80.18/rsdaya/production/penyakit10.php>

Salsabila, A. (2021). Kecemasan dan Kejadian Dispepsia Fungsional. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 2(2), 57–64. <https://doi.org/10.37287/ijnhs.v2i2.306>

Sandi, D. E. (2020). Hubungan keteraturan pola makan dengan kejadian dispepsia fungsional pada remaja : sistematis review skripsi. *Skripsi*.

Sari, E. K., Fardy, T. R., Karima, U. Q., & Pristya, T. Y. R. (2021). Faktor Resiko Sindrom Dispepsia Pada Remaja Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 9(3), 431–446.

Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al Misbah*. Lentera Hati.

- Shubhanshu Saini. (2021). *Behavioral Intervention in Children with Functional Abdominal Pain Disorders: A Promising Option*. 2021, 443–450. <https://doi.org/10.5152/tjg.2021.20679>
- Suzanni, S. W. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DYSPEPSIA PADA REMAJA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019. *Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MaKMA)*, 3(1), 112–118.
- Syaikh, A. bin M. A. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Tamimi, L. H., Herardi, R., & Wahyuningsih, S. (2020). Hubungan antara Tingkat Stres Akademik dengan Kejadian Dispepsia pada Siswa Kelas XII IPA di SMA Negeri 81 Kota Jakarta Timur Tahun 2019 The Association between Academic-Induced Stress with An Incident of Dyspepsia on Grade XII Natural Science Majors at 8. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(3), 2019.
- Wiguna, F., Budiman, & Nilapsari, R. (2022). Perbedaan Tingkat Stres Berdasarkan PSS pada Mahasiswa Tingkat 1 dengan Tingkat 3 Tahun Ajaran 2020-2021 Fakultas Kedokteran Unisba Selama Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. *Bandung Conference Series: Medical Science*, 2(1), 360–366. <https://doi.org/10.29313/bcsms.v2i1.786>
- Windarwati, H. D., Budiman, A. A., Nova, R., Ati, N. A. L., & Kusumawati, M. W. (2020). The Relationship between Family Harmony with Stress, Anxiety, and Depression in Adolescents. *Jurnal Ners*, 15(2), 185–193. <https://doi.org/10.20473/jn.v15i2.21495>
- Yuni Sara, Y. S., Muhdar, I. N., & Aini, R. N. (2021). Status Gizi dan Aktivitas Fisik dengan Gangguan Lambung pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 3(3), 193–200. <https://doi.org/10.36590/jika.v3i3.163>

LEMBAR KUESIONER

**HUBUNGAN STRESS DAN POLA MAKAN DENGAN SINDROMA
DISPEPSIA PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
DOKTER UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Identitas Responden

Tanggal Pengisian :

Nama :

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan

Tanggal lahir :

Angkatan :

Kontak :



DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scale 21)

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman Anda dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari selama **satu minggu terakhir**. Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:

- 0: Tidak pernah (Tidak pernah mengalami sama sekali)
- 1: Kadang-kadang (Pernah mengalami 1 - 2 kali).
- 2: Sering (Pernah mengalami 3 - 4 kali).
- 3: Sangat Sering (Pernah mengalami lebih dari 4 kali).

Selanjutnya, Anda diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah dengan cara **melingkari ()** pada **salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman Anda** dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari selama **satu minggu terakhir**. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, oleh karena itu isilah sesuai dengan keadaan diri Anda yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran Anda.

No.	PERNYATAAN	0	1	2	3
1.	Saya merasa sulit untuk beristirahat.				
2.	Saya merasa bibir saya sering kering.				
3.	Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif.				
4.	Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya : seringkali terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya).				
5.	Saya merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu				
6.	Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi.				
7.	Saya merasa gemetar (misalnya: pada tangan)				
8.	Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas				
9.	Saya merasa khawatir dengan situasi dimana saya mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri				
10.	Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan				
11.	Saya menemukan diri saya mudah gelisah				
12.	Saya merasa sulit untuk bersantai				

13.	Saya merasa putus asa dan sedih				
14.	Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi saya untuk menyelesaikan hal yang sedang saya lakukan				
15.	Saya merasa saya hampir panik				
16.	Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun				
17.	Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang manusia				
18.	Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung				
19.	Saya menyadari kegiatan jantung, walaupun saya tidak sehabis melakukan aktivitas fisik (misalnya: merasa detak jantung meningkat atau melemah)				
20.	Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas				
21.	Saya merasa bahwa hidup tidak berarti				



KETERATURAN MAKAN

1. Berapa kali anda mengkonsumsi makanan pokok dalam satu hari ?

- a. >3 kali/hari
- b. 3 kali/hari
- c. 2 kali/hari
- d. 1 kali/hari

2. Apakah anda sarapan setiap hari?

- a. Ya, rutin setiap hari
- b. Kadang-kadang
- c. Jika ingin saja
- d. Tidak pernah

3. Apakah anda makan siang setiap hari?
 - a. Ya, rutin setiap hari
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jika ingin saja
 - d. Tidak pernah
4. Apakah anda makan malam setiap hari?
 - a. Ya, rutin setiap hari
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jika ingin saja
 - d. Tidak pernah
5. Berapa lama jeda waktu disetiap makan anda?
 - a. 2-5 jam
 - b. 5-6 jam
 - c. 6-9 jam
 - d. >10 jam



DISPEPSIA

1. Dalam 3 bulan terakhir apakah anda merasakan sakit atau rasa tidak enak di bagian ulu hati (bagian perut atas) selama beberapa kali?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda merasakan adanya rasa panas terbakar atau rasa tidak nyaman di dada selama beberapa kali?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda merasakan kembung setelah makan selama beberapa kali?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda merasakan rasa cepat kenyang dengan porsi yang normal dalam beberapa kali dalam seminggu?

- a. Ya
- b. Tidak

5. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda rasa mual muntah selama beberapa kali dalam seminggu?

- a. Ya
- b. Tidak

6. Dalam 3 bulan terakhir, apakah anda merasakan sering sendawa selama beberapa kali dalam seminggu?

- a. Ya
- b. Tidak



Lampiran

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No 63 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasir Limpo No.36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-6262/Un.06/FKIK/PP.09/12/2023 Gowa, 20 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

Yth. Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
di-
Tempat

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Chairunnisa Azahra Amrin
Nim : 70600120009
Program Studi : Pendidikan Dokter
Judul Penelitian : Hubungan Stress dan Pola Makan dengan Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar
Dosen Pembimbing : 1. dr. Saharuddin, M.Kes
2. dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Isriany Ismail





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 31986/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Rektor UIN Alauddin Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor B-5546/Un.06/LP2M/PP.00.9/12/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : CHAIRUNNISA AZAHRA AMRIN
Nomor Pokok : 70600120009
Program Studi : Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limbo No. 36, Romang Polong-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Hubungan Stress dan Pola Makan dengan Sindroma Dispepsia pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar."

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Desember 2023 s/d 20 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 20 Desember 2023

ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I

Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kept.fbk@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION"

No: E.035/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Chairunnisa Azahra Amrin
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"HUBUNGAN STRESS DAN POLA MAKAN DENGAN SINDROMA DISPEPSIA PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UIN ALAUDDIN MAKASSAR"

"THE ASSOCIATION BETWEEN DIET, STRESS, AND DYSPEPSIA SYNDROME IN UIN ALAUDDIN MAKASSAR MEDICAL EDUCATION STUDY PROGRAM STUDENTS"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefit, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 28, 2023 until December 28, 2024.

December 28, 2023
Professor and Chairperson,
Priyanti Ismail, S.Si., M.Si



Frequency

		Usia			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	17	1	.7	.7	.7
	18	23	16.5	16.5	17.3
	19	30	21.6	21.6	38.8
	20	31	22.3	22.3	61.2
	21	40	28.8	28.8	89.9
	22	14	10.1	10.1	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-laki	25	18.0	18.0	18.0
	Perempuan	114	82.0	82.0	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

		Angkatan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	2020	35	25.2	25.2	25.2
	2021	35	25.2	25.2	50.4
	2022	35	25.2	25.2	75.5
	2023	34	24.5	24.5	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

		Kejadian stress			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Stress	96	69.1	69.1	69.1
	Tidak stress	43	30.9	30.9	100.0


Total	139	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Tingkat stress

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak stress	43	30.9	30.9	30.9
	Ringan	29	20.9	20.9	51.8
	Sedang	40	28.8	28.8	80.6
	Berat	27	19.4	19.4	100.0
	Total	139	100.0	100.0	

Dispepsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dispepsia	103	74.1	74.1	74.1
	Tidak dispepsia	36	25.9	25.9	100.0
	Total	139	100.0	100.0	



Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kejadian stress * Dispepsia	139	100.0%	0	0.0%	139	100.0%

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation

		Dispepsia			
		Dispepsia	Tidak dispepsia	Total	
Kejadian stress	Stress	Count	81	15	96
		% within Kejadian stress	84.4%	15.6%	100.0%
	Tidak stress	Count	22	21	43

	% within Kejadian stress	51.2%	48.8%	100.0%
Total	Count	103	36	139
	% within Kejadian stress	74.1%	25.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	17.069 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	15.382	1	.000		
Likelihood Ratio	16.216	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	16.946	1	.000		
N of Valid Cases	139				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.14.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	95% Confidence Interval		
	Value	Lower	Upper
Odds Ratio for Kejadian stress (Stress / Tidak stress)	5.155	2.286	11.622
For cohort Dispepsia = Dispepsia	1.649	1.216	2.236
For cohort Dispepsia = Tidak dispepsia	.320	.183	.558
N of Valid Cases	139		

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	Tingkat Stress * Dispepsia	96	100.0%	0	0.0%	96

Classification Table



Observed


Predicted

		Dispepsia		Percentage
		Dispepsia	Tidak dispepsia	Correct
Step 1	Dispepsia	81	0	100.0
	Tidak dispepsia	15	0	.0
Overall Percentage				84.4

a. The cut value is .500

Tingkat Stress * Dispepsia Crosstabulation

		Dispepsia		Total	
		Dispepsia	Tidak dispepsia		
Tingkat Stress	Ringan	Count	25	4	29
		% within Tingkat Stress	86.2%	13.8%	100.0%
Sedang	Count	30	10	40	
		% within Tingkat Stress	75.0%	25.0%	100.0%
Berat	Count	26	1	27	
		% within Tingkat Stress	96.3%	3.7%	100.0%
Total	Count	81	15	96	
		% within Tingkat Stress	84.4%	15.6%	100.0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Tingkat Stress			4.564	2	.102	
	Tingkat Stress(1)	1.426	1.153	1.530	1	.216	4.160
	Tingkat Stress(2)	2.159	1.082	3.980	1	.046	8.667
	Constant	-3.258	1.019	10.222	1	.001	.038

a. Variable(s) entered on step 1: Tingkat Stress.

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent	

Kejadian stress * Dispepsia	35	100.0%	0	0.0%	35	100.0%
-----------------------------	----	--------	---	------	----	--------

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation

			Dispepsia		Total
			Dispepsia	Tidak dispepsia	
Kejadian stress	Stress	Count	32	2	34
		% within Kejadian stress	94.1%	5.9%	100.0%
	Tidak stress	Count	0	1	1
		% within Kejadian stress	0.0%	100.0%	100.0%
Total	Count	32	3	35	
	% within Kejadian stress	91.4%	8.6%	100.0%	



Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	10.980 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	2.255	1	.133		
Likelihood Ratio	5.263	1	.022		

Fisher's Exact Test				.086	.086
Linear-by-Linear Association	10.667	1	.001		
N of Valid Cases	35				

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.

b. Computed only for a 2x2 table

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation

		Dispepsia			
		Dispepsia	Tidak dispepsia	Total	
Kejadian stress	Stress	Count	12	3	15
		% within Kejadian stress	80.0%	20.0%	100.0%
	Tidak stress	Count	16	4	20
		% within Kejadian stress	80.0%	20.0%	100.0%
Total		Count	28	7	35
		% within Kejadian stress	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.000 ^a	1	1.000		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test				1.000	.660
Linear-by-Linear Association	.000	1	1.000		
N of Valid Cases	35				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kejadian stress (Stress / Tidak stress)	1.000	.188	5.332
For cohort Dispepsia = Dispepsia	1.000	.716	1.398
For cohort Dispepsia = Tidak dispepsia	1.000	.262	3.815
N of Valid Cases	35		

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation

			Dispepsia		Total
			Dispepsia	Tidak dispepsia	
Kejadian stress	Stress	Count	22	5	27
		% within Kejadian stress	81.5%	18.5%	100.0%
	Tidak stress	Count	3	5	8
		% within Kejadian stress	37.5%	62.5%	100.0%
Total	Count	25	10	35	
	% within Kejadian stress	71.4%	28.6%	100.0%	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kejadian stress (Stress / Tidak stress)	7.333	1.301	41.350
For cohort Dispepsia = Dispepsia	2.173	.872	5.411
For cohort Dispepsia = Tidak dispepsia	.296	.114	.771
N of Valid Cases	35		

Kejadian stress * Dispepsia Crosstabulation

		Dispepsia		Total
		Dispepsia	Tidak dispepsia	

Kejadian stress	Stress	Count	15	5	20
		% within Kejadian stress	75.0%	25.0%	100.0%
	Tidak stress	Count	3	11	14
		% within Kejadian stress	21.4%	78.6%	100.0%
Total		Count	18	16	34
		% within Kejadian stress	52.9%	47.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	9.487 ^a	1	.002		
Continuity Correction ^b	7.458	1	.006		
Likelihood Ratio	9.975	1	.002		
Fisher's Exact Test				.004	.003
Linear-by-Linear Association	9.208	1	.002		
N of Valid Cases	34				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.59.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

95% Confidence Interval

	Value	Lower	Upper
Odds Ratio for Kejadian stress (Stress / Tidak stress)	11.000	2.157	56.094
For cohort Dispepsia = Dispepsia	3.500	1.244	9.848
For cohort Dispepsia = Tidak dispepsia	.318	.142	.713
N of Valid Cases	34		

Case Processing Summary

	Cases	Total
Valid		
Missing		

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pola Makan * Dispepsia	139	100.0%	0	0.0%	139	100.0%

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation

		Dispepsia		Total	
		Dispepsia	Tidak dispepsia		
Pola Makan	Kurang baik	Count	76	24	100
		% within Pola Makan	76.0%	24.0%	100.0%
	Baik	Count	27	12	39
		% within Pola Makan	69.2%	30.8%	100.0%
Total		Count	103	36	139
		% within Pola Makan	74.1%	25.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.670 ^a	1	.413		
Continuity Correction ^b	.364	1	.547		
Likelihood Ratio	.655	1	.418		
Fisher's Exact Test				.518	.270
Linear-by-Linear Association	.665	1	.415		
N of Valid Cases	139				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.10.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pola Makan (Kurang baik / Baik)	1.407	.620	3.197
For cohort Dispepsia = Dispepsia	1.098	.867	1.391
For cohort Dispepsia = Tidak dispepsia	.780	.434	1.401

N of Valid Cases	139	
------------------	-----	--

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pola Makan * Dispepsia	35	100.0%	0	0.0%	35	100.0%

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation

		Dispepsia		
		Dispepsia	Tidak dispepsia	Total
Pola Makan	Kurang baik	Count 25 % within Pola Makan 96.2%	1 3.8%	26 100.0%
	Baik	Count 7 % within Pola Makan 77.8%	2 22.2%	9 100.0%
Total		Count 32 % within Pola Makan 91.4%	3 8.6%	35 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.881 ^a	1	.090		
Continuity Correction ^b	1.013	1	.314		
Likelihood Ratio	2.464	1	.117		
Fisher's Exact Test				.156	.156
Linear-by-Linear Association	2.799	1	.094		
N of Valid Cases	35				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .77.

b. Computed only for a 2x2 table

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation

		Dispepsia		Total	
		Dispepsia	Tidak dispepsia		
Pola Makan	Kurang baik	Count	23	6	29
		% within Pola Makan	79.3%	20.7%	100.0%
	Baik	Count	5	1	6
		% within Pola Makan	83.3%	16.7%	100.0%
Total		Count	28	7	35
		% within Pola Makan	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	.050 ^a	1	.823		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.052	1	.819		
Fisher's Exact Test				1.000	.656
Linear-by-Linear Association	.049	1	.825		
N of Valid Cases	35				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.20.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pola Makan (Kurang baik / Baik)	.767	.075	7.860
For cohort Dispepsia = Dispepsia	.952	.636	1.424
For cohort Dispepsia = Tidak dispepsia	1.241	.181	8.517
N of Valid Cases	35		

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation

Pola Makan		Dispepsia		Total
		Dispepsia	Tidak dispepsia	
Kurang baik	Count	18	7	25
	% within Pola Makan	72.0%	28.0%	100.0%
Baik	Count	7	3	10
	% within Pola Makan	70.0%	30.0%	100.0%
Total	Count	25	10	35
	% within Pola Makan	71.4%	28.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.850 ^a	1	.016		

Continuity Correction ^b	3.893	1	.048		
Likelihood Ratio	5.419	1	.020		
Fisher's Exact Test				.027	.027
Linear-by-Linear Association	5.682	1	.017		
N of Valid Cases	35				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.29.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pola Makan (Kurang baik / Baik)	1.102	.220	5.512
For cohort Dispepsia = Dispepsia	1.029	.640	1.652
For cohort Dispepsia = Tidak dispepsia	.933	.300	2.908
N of Valid Cases	35		

Pola Makan * Dispepsia Crosstabulation

			Dispepsia		Total
			Dispepsia	Tidak dispepsia	
Pola Makan	Kurang baik	Count	10	10	20
		% within Pola Makan	50.0%	50.0%	100.0%
Baik	Count	8	6	14	
	% within Pola Makan	57.1%	42.9%	100.0%	
Total	Count	18	16	34	
	% within Pola Makan	52.9%	47.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.169 ^a	1	.681		
Continuity Correction ^b	.004	1	.951		

Likelihood Ratio	.169	1	.681		
Fisher's Exact Test				.738	.476
Linear-by-Linear Association	.164	1	.686		
N of Valid Cases	34				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.59.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pola Makan (Kurang baik / Baik)	.750	.190	2.964
For cohort Dispepsia = Dispepsia	.875	.466	1.644
For cohort Dispepsia = Tidak dispepsia	1.167	.553	2.462
N of Valid Cases	34		

