

**PENGARUH PENATALAKSANAAN DIARE AKUT PADA BAYI USIA 1-
59 BULAN TERHADAP LUARAN KLINIS DI RSUD HAJI MAKASSAR
TAHUN 2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

AZIFAH UMMU KHALTSUM

NIM: 70600119006

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azifah Ummu Khaltsum
NIM : 70600119006
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 02 Juli 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Borong Raya Lr.2 dalam No.7
Judul : Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut Pada Bayi
Usia 1-59 Bulan Terhadap Luaran Klinis di RSUD
Haji Makassar Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Februari 2024



Azifah Ummu Khaltsum

NIM: 70600119007

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Azifah Ummu Khaltsum, NIM 70600119006, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: “Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut Pada Bayi Usia 1-59 Bulan Terhadap Luaran Klinis di RSUD Haji Makassar Tahun 2022”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 19 Februari 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

dr. Darmawansyih, M.Kes.

Dr. dr. Nadyah, M.Kes, Sp.MK



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut Pada Bayi Usia 1-59 Bulan Terhadap Luaran Klinis di RSUD Haji Makassar Tahun 2022” yang disusun oleh Azifah Ummu Khaltsum, NIM 70600119006, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 Februari 2024, bertepatan dengan 09 Sya’ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 19 Februari 2024
09 Sya’ban 1445 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed | (.....) |
| Pembimbing I | : dr. Darmawansyih, M.Kes | (.....) |
| Pembimbing II | : Dr. dr. Nadyah, M.Kes, Sp.MK | (.....) |
| Penguji I | : dr. Rauly Rahmadhani, M.Kes., Sp.N | (.....) |
| Penguji II | : Dr. Darsul S.Puyu, M.Ag | (.....) |

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.

NIP. 198106212006042005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut Pada Bayi Usia 1-59 Bulan Terhadap Luaran Klinis di RSUD Haji Makassar Tahun 2022”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW sebagai *Rahmatan Lil'alam*in beserta para sahabat Nabi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Muhammad Jufri, SE.MM dan ibunda Nuliati HM, SE dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya.
2. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati., Sp. OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. Ibu dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Ibu dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes selaku pembimbing I dan Ibu Dr.dr. Nadyah, M.Kes, Sp.MK selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu membimbing penulis baik dalam bentuk arahan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Ibu dr. Raully Ramadhani, M.Kes, Sp.N selaku penguji I dan Bapak Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu membimbing penulis baik dalam bentuk arahan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Teman-teman Integrin yang selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta memberikan banyak masukan kepada penulis dalam pembuatan proposal ini.
7. Sahabat-sahabat saya yang sudah seperti keluarga saya, selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat melalui semua tantangan dengan baik.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari segala pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian proposal ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Makassar, 19 Februari 2024




Azifah Ummu Khaltsum

DAFTAR ISI


| | |
|---|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR BAGAN | x |
| ABSTRAK | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Hipotesis..... | 10 |
| D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 10 |
| E. Kajian Pustaka..... | 12 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Kajian Teori..... | 16 |
| B. Integrasi Keislaman..... | 33 |
| C. Kerangka Teori..... | 40 |
| D. Kerangka Konsep | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 42 |
| A. Desain Penelitian..... | 42 |
| B. Lokasi Penelitian | 42 |
| C. Waktu Penelitian | 42 |
| D. Variabel Penelitian | 42 |
| E. Populasi dan Sampel | 43 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 45 |
| G. Instrumen Penelitian..... | 45 |
| H. Pengolahan Data..... | 46 |
| I. Analisis Data | 46 |
| J. Alur Penelitian..... | 47 |
| K. Etika Penelitian | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. Hasil Penelitian | 49 |
| B. Pembahasan | 54 |
| C. Keterbatasan Penelitian | 62 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |

| | |
|---------------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN | 72 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 84 |




DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Definisi operasional | 10 |
| Tabel 2. Kajian Pustaka..... | 12 |
| Tabel 3. Klasifikasi Diare Menurut Derajat Dehidrasi | 21 |
| Tabel 4. Antibiotik berdasarkan penyebabnya..... | 26 |
| Tabel 5. Kriteria Penelitian | 45 |
| Tabel 4.1 1 Distribusi Data Karakteristik | 50 |
| Tabel 4.1 2 Distribusi Tatalaksana Antibiotik | 51 |
| Tabel 4.1 3 Distribusi Luaran Klinis | 51 |
| Tabel 4.2 1 Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut Terhadap Luaran Klinis | 52 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|--------------------------------|----|
| Bagan 1. Kerangka Teori | 40 |
| Bagan 2. Kerangka Konsep..... | 41 |
| Bagan 3. Alur Penelitian | 47 |



ABSTRAK

Nama : Azifah Ummu Khaltsum

Nim : 70600119006

Judul : Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut pada Bayi Usia 1-59 Bulan
Terhadap Luaran Klinis di RSUD Haji Makasaar Tahun 2022

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pencernaan yang menjadi masalah kesehatan di dunia maupun di Indonesia dengan angka kesakitan maupun kematian yang masih tinggi. Hal tersebut sangat berkaitan terhadap penatalaksanaan yang berefek pada luaran klinis dari penderita penyakit tersebut. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penatalaksanaan diare akut terhadap luaran klinis. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling* sehingga terkumpul jumlah sampel sebanyak 185 bayi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi yang mengalami diare akut diberikan penatalaksanaan kombinasi 1 yaitu zink dan probiotik atau zink dan antibiotik dengan luaran klinis sembuh yaitu sebanyak 103 bayi (55.7%). Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1-59 bulan terhadap luaran klinis.

Kata Kunci: Diare Akut, Zink, Probiotik, Antibiotik

ABSTRACT

Name : Azifah Ummu Khaltsum

Nim : 70600119006

Title : *Influence of Acute Diarrhea Management in Infants 1-59 Months of Age on Clinical Outcomes at Makassar Hajj Hospital in 2022*

Diarrheal disease is one of the infectious diseases of the digestive tract that is a health problem in the world and in Indonesia with high morbidity and mortality rates. Which is where the incident is closely related to the management that has an effect on the clinical outcomes of patients with the disease. Therefore, this study aims to determine the effect of acute diarrhea management on clinical outcomes. The type of research used was quantitative research with a cross sectional design. Samples in this study were taken using purposive sampling method so that a total sample size of 185 babies was collected. The results of this study showed that most infants who experienced acute diarrhea were given a combination management 1, namely zinc and probiotics or zinc and antibiotics with a clinical outcome of recovery, namely 103 infants (55.7%). The conclusion in this study is that there is an effect of acute diarrhea management in infants aged 1-59 months on clinical outcomes.

Keywords: Diare Akut, Zink, Probiotik, Antibiotik

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Balita menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah anak usia 0-5 tahun yang berada dalam tahap perkembangan manusia yang disebut masa emas (*golden years/golden Age*). Adapun sumber lain menjelaskan terkait *golden age* tersebut ialah masa yang sangat penting baik bagi pertumbuhan maupun perkembangan individu. Perkembangan yang dimaksud ialah suatu proses bertambahnya fungsi, struktur maupun kemampuan manusia yang lebih kompleks dalam pola teratur yang merupakan hasil dari proses pematangan (Nurmaliza dan Herlina, 2019). Pada masa ini balita rentan terkena masalah kesehatan yang tinggi disebabkan karena balita banyak melakukan aktivitas, mulai aktivitas dalam ruangan (*indoor*) maupun di luar ruangan (*outdoor*) (Alfatihana 2020). Dan juga balita merupakan usia yang rentan menderita suatu infeksi, dimana hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang belum mantang (Cono, Nahak, dan Gatum 2021). Adapun beberapa penyakit infeksi yang dapat menyerang balita seperti ISPA, campak, malaria dan diare (Yulnefia dan Sutia, 2022).

Diare (*diarrheal disease*) berasal dari kata *diarrola* (bahasa Yunani) yang berartikan mengalir terus. Menurut *World Health Organization* (WHO), diare merupakan suatu keadaan pengeluaran feses yang tidak normal yaitu melebihi tiga kali dengan konsistensi yang cair dan dapat disertai darah maupun lendir serta frekuensi yang lebih sering daripada keadaan normal (Apriani, Putri, dan Widiyasari 2022). Penyakit diare merupakan salah satu penyakit infeksi saluran

pencernaan yang menjadi masalah kesehatan di dunia maupun di Indonesia dengan angka kesakitan maupun kematian yang masih tinggi (Qisti et al. 2021). Selain sebagai salah satu penyebab kematian, diare dapat menjadi penyebab utama gizi kurang (malnutrisi) yang dapat menimbulkan kematian serta menimbulkan kejadian luar biasa (Tuang 2021). Penyebab terjadinya diare pada anak saat ini didominasi oleh patogen enterik seperti bakteri, parasit dan virus (Jap dan Widodo, 2021) yang mengakibatkan adanya gangguan sekresi dan reabsorpsi cairan hingga menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit (Utami et al. 2022).

Sekitar 12 juta anak di negara berkembang meninggal sebelum usia 5 tahun, serta 70% kematian disebabkan oleh lima masalah kesehatan termasuk diare (Jap dan Widodo, 2021). Menurut data (*World Health Organization, 2019*) sekitar 1.7 miliar terjadi kasus diare pada setiap tahunnya dengan angka kematian 760.000 anak dibawah 5 tahun. Di negara berkembang, rata-rata anak-anak usia dibawah 3 tahun mengalami 3 episode diare pertahunnya (Apriani et al. 2022).

Menurut profil kesehatan Indonesia pada tahun 2019 data proporsi penyebab kematian pada neonatal (29 hari – 11 bulan), diare merupakan salah satu penyumbang kematian sebagai penyakit infeksi dengan 746 kasus kematian atau 12.1%, sedangkan data proporsi penyebab kematian pada anak balita (12 - 59 bulan) di Indonesia diare merupakan penyumbang utama kematian dengan 314 kasus kematian atau 10.7% pada rentang usia tersebut (Kemenkes R1 2020). Data berdasarkan profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2020 penyebab kematian diakibatkan oleh diare mengalami kenaikan pada rentan usia 29 hari – 11 bulan

sebesar 14.5% kematian, sedangkan pada rentan usia 12 - 59 bulan mengalami penurunan sebesar 4.55% kematian (Kemenkes RI 2021). Dan data berdasarkan tahun berikutnya pada rentan usia 29 hari – 11 bulan sebesar 14.0% kematian, sedangkan pada rentan usia 12- 59 bulan sebesar 10.3 % kematian (Kemenkes RI Ditjen P2P 2022).

Pada tahun 2020 perkiraan kasus diare di Sulawesi Selatan sebanyak 236.099 kasus, namun hanya sebanyak 28.228 (11.96%) kasus diare yang ditangani. Dengan kasus terbesar terjadi di Kota Makassar dengan jumlah yang ditangani sebanyak 2.686 kasus dari 41.220 kasus yang ada atau sekitar 6.52 % dengan jumlah penduduk di Kota Makassar sebanyak 1.484.912 jiwa (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021). Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pada rentan usia tersebut diare menjadi salah satu penyebab kematian yang paling banyak.

Penyakit diare ini sering menyerang balita dan jika tidak dilakukan penanganan yang benar dan lebih lanjut akan menyebabkan dehidrasi yang mengakibatkan kematian. Dimana Penyakit diare ini memiliki banyak faktor yang bisa menyebabkan balita terkena penyakit tersebut, seperti sanitasi jamban, kualitas air minum, kondisi rumah dan *hygiene* perorangan yang buruk dapat menyebabkan terjadinya kasus diare pada balita (Sari et al. 2022). Beberapa penelitian juga menyebutkan faktor penyebab terjadinya diare pada balita ialah pemberian MPASI dini ataupun pemberian susu formula. Balita yang diberikan susu formula lebih rentan terkena diare dibandingkan dengan balita yang diberikan ASI eksklusif (Utami et al. 2022).

Secara garis besar terdapat dua mekanisme dasar yang menyebabkan terjadinya diare, yakni akibat dari peningkatan *intraluminal osmotic pressure* mengakibatkan terjadi penghambatan reabsorpsi air serta elektrolit. Dan juga diakibatkan oleh meningkatnya kapasitas sekresi air dan elektrolit, berimplikasi saat terjadinya dehidrasi diikuti juga dengan gangguan gizi yang dapat terjadi akibat diare yang berlangsung lama. Umumnya, tatalaksana diare meliputi pemberian cairan adekuat dan elektrolit, pemberian nutrisi adekuat, antibiotika selektif, pemberian preparat zink, pemberian probiotik dan edukasi terhadap orangtua atau pengasuh. Selain penatalaksanaan yang penting dalam penanganan diare ialah dengan program pencegahan. Adanya penanganan ataupun penatalaksanaan yang cepat dan tepat serta program pencegahan yang efektif diharapkan angka mortalitas dan morbiditas akibat diare dapat menurun (Indriyani dan Putra, 2020). Pasien didiagnosa lebih sering ditemui dalam derajat dehidrasi ringan. Dimana hal tersebut mengartikan bahwa baiknya tingkat pengetahuan orang tua tentang diare serta akibatnya termasuk dehidrasi, sebab itu mayoritas pasien tersebut datang dalam keadaan telah terhidrasi dari rumah (Putra, Saniathi, dan Suryanditha 2023). Adapun ALOS dalam perawatan akut di Indonesia berkisar antara 4 hingga 5.4 hari (Dahlan, Aminyoto, dan Muhyi 2022). Dan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia target lama rawat pasien diare akut ialah 4 hari atau 96 jam (Anitasari dan Sappe, 2019).

Dari Penjelasan diatas Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dalam sejumlah haditsnya memastikan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika pun ada penyakit yang belum terobati sampai saat ini, mungkin lantaran belum ada ahli yang dapat menemukan obatnya.

حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن الله تعالى (رواه أحمد)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Harun bin Ma'ruf telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb telah bercerita kepada kami 'Amr bin Al Harits dari Hamba robnya Ibnu Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya dan jika kamu mendapatkan obat untuk sebuah penyakit maka penyakit itu lepas dengan ijin Allah Ta'ala"(HR. Ahmad no 14070)

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt. Yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt. Menghendaki agar pengobatan dipelajari oleh ahlinya yang nantinya sesuai dengan penyakit yang akan diobatinya sehingga berefek pada kesembuhan. Akan tetapi, disaat melakukan pengobatan hendaknnya kita berserah diri kepada Allah swt. Karena Allah swt. Yang menyembuhkan, manusia yang berusaha

Adapun potongan ayat di dalam Al-Quran yang memiliki makna yang sama seperti hadits diatas yaitu pada QS. Asy- Syu'ara' ayat 80:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرَ اللَّهُ لِي مِنْ رَبِّي وَأَعْلَىٰ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku,”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Dan Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus tetap mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan tersebut. Imam Jamaluddin al-Qasimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat ini menggambarkan tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya. Sebab penyakit terkadang diakibatkan dari perbuatan manusia itu sendiri, umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan ataupun pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit ialah Allah semata. Bila seorang merasakan sakit yang demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia sembuh dari penyakit tersebut. Kenyataan memang membuktikan dan kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma kesehatan yang berlaku. Melihat penting pembahasan terkait seorang manusia atau umatnya untuk melakukan pengobatan dikala mereka mengalami musibah ataupun penyakit (Shibab.2002).

Menurut tafsir Al- Misbah, Al-qur'an sebagai obat Penawar penyakit. Kata syifa yang diartikan kesembuhan atau obat. Fungsi Al-qur'an sebagai obat dalam arti menghilangkan bukti-bukti yang dipaparkan keraguan atau syubhat serta dalih yang boleh jadi hinggap dihati sementara orang. Hanya saja ulama menggaris bawahi bahwa penyakit tersebut berbeda dengan kemunafikan apalagi kekufuran (Shihab 2014).

Dalam konteks Kesehatan, ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga Kesehatan tubuh, merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim untuk menjaga kehidupan manusia. Seorang muslim patutnya menjaga diri agar tetap sehat karena tersebut merupakan karunia yang diberikan Allah SWT. Salah satu cara bagi dokter adalah dengan memberikan terapi yang sesuai terhadap apa yang dikeluhkan. Sedangkan bagi pasien ialah memastikan kepatuhan terhadap terapi, mengikuti instruksi dokter dan mengkonsumsi obat tepat waktu. Dan dalam penelitian ini orang tua maupun keluarga sangat berperan penting dalam merawat seorang anak.

Dan pada dasarnya kesehatan pada balita sangatlah penting terutama ketika balita tersebut mulai menunjukkan gejala terkenanya penyakit diare akut yang dimana dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditindak lanjuti, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada bayi terkait "*Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut Pada Bayi Usia 1 - 59 Bulan Terhadap Luaran Klinis di RSUD Haji Makassar Tahun 2022*" dengan maksud dan tujuan agar dapat memahami lebih lanjut lagi mengenai adakah pengaruh dari tatalaksana diare akut tersebut terhadap luaran klinis setelah dilakukannya perawatan serta penggunaan tatalaksana apa saja yang biasa diberikan dan yang paling efektif dalam menangani permasalahan diare pada bayi yang dapat menyebabkan kematian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah ada pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1 – 59 bulan terhadap luaran klinis di RSUD Haji Makassar Tahun 2022.

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Penatalaksanaan terapi tidak menunjukkan pengaruh terhadap luaran klinis penderita diare akut pada bayi usia 1 - 59 bulan di RSUD Haji Makassar tahun 2022.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Penatalaksanaan terapi menunjukkan pengaruh terhadap luaran klinis penderita diare akut pada bayi usia 1 - 59 bulan di RSUD Haji Makassar tahun 2022.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

Tabel 1. Definisi operasional

| No. | Variabel | Definisi Operasional | Alat Ukur | Hasil ukur | Skala Data |
|---------------------|------------------------------|---|--|---|------------|
| Variabel Independen | | | | | |
| 1. | Penatalaksanaan Terapi Diare | Kegiatan medikasi lanjutan untuk mengurangi gejala diare, yang terdiri dari pemberian : | Berdasarkan resep dan data rekam medis pasien diare akut | 1. Rehidrasi derajat dehidrasi 2. Pemberian antibiotik 3. Pemberian probiotik 4. Pemberian | Nominal |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---|---|--|---------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Rehidrasi derajat dehidrasi - Antibiotik - Probiotik - Zink - Tatalaksana kombinasi | | <ul style="list-style-type: none"> 5. Pemberian tatalaksana kombinasi (pemberian lebih dari satu tatalaksana yang disebutkan diatas) | |
| Variabel Dependen | | | | | |
| 1. | Diare Akut | Diare adalah peningkatan pengeluaran tinja dengan konsistensi lebih lunak atau lebih cair dari biasanya, dan terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Sementara untuk bayi dan anak-anak, diare didefinisikan sebagai pengeluaran tinja >10 g/kg/24 jam. (Juffrie M, et al. 2020). | Berdasarkan data pada rekam medis pasien diare akut | <ul style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi > 3X sehari 2. Konsistensi lunak/ cair 3. Warna kuning/ kehijauan 4. Disertai baik atau tanpa tanda dehidrasi | Nominal |
| 2. | Luaran Klinis | Tujuan yang akan dicapai dari suatu terapi penggunaan obat | Berdasarkan data pada rekam medis pasien diare akut | <ul style="list-style-type: none"> 1. Sembuh 2. Tidak Sembuh 3. Meninggal | Nominal |

2. Ruang Lingkup Penelitian

Pengaruh penatalaksanaan terapi menunjukkan pengaruh terhadap luaran klinis penderita diare akut pada bayi usia 1-59 bulan.

E. Kajian Pustaka

Tabel 2. Kajian Pustaka

| No. | Peneliti, Tahun | Judul Penelitian | Variabel | Metode | Hasil | Perbedaan |
|-----|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| 1. | (Meila, Nurmutiya, dan V 2020) | Analisa Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Diare di Ruang Rawat Inap Penyakit dalam RSUP Persahabatan | <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen: Pemberian Antibiotik - Variabel Dependen: Pasien Diare. | Penelitian dengan metode deskriptif dengan rancangan potong lintang (<i>cross sectional</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan analisis kuantitatif dengan menggunakan Ciprofloxacin parenteral dan oral - Berdasarkan analisis kualitatif antibiotik. Hasil evaluasinya yakni pemberian antibiotik telah tepat dosis 97.08%, tidak tepat dosis 2.91%, berdasarkan ketepatan lama pemberian yaitu, tepat lama pemberian 46.26%, tidak tepat/terlalu lama 27.35%, tidak tepat/terlalu singkat 26.40%. | Variabel independen hanya meneliti tentang pemberian antibiotik |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2. | (Putri, Hidayati, dan Wardhani 2023) | Rasionalitas Penggunaan Obat Antibiotik Pada Pasien Balita Penderita Diare Di Rumah Sakit Aura Syifa Kabupaten Kediri Tahun 2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen: Rasionalitas Penggunaan Obat Antibiotik - Variabel Dependen: Pasien Balita Penderita Diare | Penelitian non eksperimen pendekatan deskriptif analitis , dengan menggunakan purposive sampling | Pemberian obat antibiotic parenteral yang paling sering digunakana, pemberian indikasi dan pemberian dosis pada RS tersebut sudah tepat dan dalam dosis normal – maksimal, pemberian intravena, dan lama peberian tergantung pada perbaikan klinis dalam dua -3 hari pemberian dan dilanjutkan hingga sembuh | Variabel independen hanya meneliti tentang pemberian antibiotik |
| 3. | (Nugroho, Meila, dan Aprilia 2017) | Hubungan Terapi Kombinasi Terhadap Waktu Penyembuhan Diare Pada Pasien Balita Rawat Inap di RSUD Kota Jakarta Utara Tahun 2016 | <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen: Terapi Kombinasi - Variabel Dependen : Waktu Penyembuhan diare | Penelitian observasional yang bersifat analiti, dengan menggunakan survey cross sectional | Ada perbedaan hubungan antara penggunaan terapi kombinasi dan tunggal. Tetapi tidak hubungan yang signifikan secara statistik antara waktu penyembuhan diare terhadap jenis pengobatan yang diberikan. | Pada penelitian ini membahas terkait hubungan terapi kombinasi terhadap waktu penyembuhan, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan ialah melihat adakah pengaruh tatalaksana terhadap luaran klinis . |

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1 – 59 bulan terhadap luaran klinis di RSUD Haji Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui angka kejadian diare akut pada bayi usia 1 - 59 bulan di RSUD Haji Makassar.
- b. Untuk mengetahui karakteristik pasien diare akut pada bayi usia 1 - 59 bulan di RSUD Haji Makassar.
- c. Untuk mengetahui tatalaksana apa saja yang diberikan pada bayi usia 1 - 59 bulan yang mengalami diare akut di RSUD Haji Makassar.
- d. Untuk mengetahui luaran klinis pasien bayi usia 1 - 59 bulan dengan diare akut yang dirawat inap di RSUD Haji Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan terutama mengenai pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1 – 59 bulan terhadap luaran klinis.

2. Bagi pengetahuan

Dapat dijadikan salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan baik ibu dan anak.

3. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1 – 59 bulan terhadap luaran klinis sehingga orang tua lebih memperhatikan terkait gejala-gejala maupun *outcome* setelah dilakukan perawatan pada anaknya.

4. Bagi Instansi

- a. Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1 – 59 bulan terhadap luaran klinis.
- b. Menambah referensi bacaan terkait ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Kajian Teori*

1. *Diare*

1.1 *Definisi Diare*

Diare adalah peningkatan pengeluaran tinja dengan konsistensi lebih lunak atau lebih cair dari biasanya, dan terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Sementara untuk bayi dan anak-anak, diare didefinisikan sebagai pengeluaran tinja >10 g/kg/24 jam (Juffrie M, et al. 2020). Buang air besar encer tersebut dapat atau tanpa disertai lendir dan darah. Diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 15 hari. Sedangkan menurut *world gastroenterology organisation global guidelines 2005*, diare akut didefinisikan sebagai pasase tinja yang cair atau lembek dengan jumlah lebih banyak dari normal, berlangsung kurang dari 14 hari (IPD Ed6th. 2017).

Menurut *World Health Organization (WHO)* adalah buang air besar yang encer atau cair sebanyak tiga kali per hari atau lebih (atau lebih sering dari biasanya). Diare merupakan gejala yang sering terjadi pada infeksi saluran cerna yang terjadi akibat infeksi bakteri, virus atau parasit (WHO. 2017). Diare ditandai dengan feses yang encer dengan frekuensi yang lebih sering. Feses yang encer terjadi karena usus halus tidak dapat menyerap cairan dengan baik sehingga cairan yang tidak terserap akan keluar bersama feses (Lauralee, Sherwood. 2022).

1.2 Epidemiologi Diare

Sekitar 12 juta anak di negara berkembang meninggal sebelum usia 5 tahun, serta 70% kematian disebabkan oleh lima masalah kesehatan termasuk diare (Jap dan Widodo, 2021). Menurut data (*World Health Organization*, 2019) sekitar 1.7 miliar terjadi kasus diare pada setiap tahunnya dengan angka kematian 760.000 anak di bawah 5 tahun. Di negara berkembang, rata-rata anak-anak usia dibawah 3 tahun mengalami 3 episode diare pertahunnya (Apriani et al. 2022).

Menurut profil kesehatan Indonesia pada tahun 2019 data proporsi penyebab kematian pada neonatal (29 hari – 11 bulan), diare merupakan salah satu penyumbang kematian sebagai penyakit infeksi dengan 746 kasus kematian atau 12.1%, sedangkan data proporsi menyebabkan kematian pada anak balita (12 - 59 bulan) di Indonesia diare merupakan penyumbang utama kematian dengan 314 kasus kematian atau 10.7% pada rentang usia tersebut (Kemenkes RI 2020). Data berdasarkan profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2020 penyebab kematian diakibatkan oleh diare mengalami kenaikan pada rentan usia 29 hari – 11 bulan sebesar 14.5% kematian, sedangkan pada rentan usia 12 - 59 bulan mengalami penurunan sebesar 4.55% kematian (Kemenkes RI 2021). Dan data berdasarkan tahun berikutnya pada rentan usia 29 hari – 11 bulan sebesar 14.0% kematian, sedangkan pada rentan usia 12 - 59 bulan sebesar 10.3% kematian (Kemenkes RI Ditjen P2P 2022).

Pada tahun 2020 perkiraan kasus diare di Sulawesi Selatan sebanyak 236.099 kasus, namun hanya sebanyak 28.228 (11.96%) kasus diare yang ditangani. Dengan kasus terbesar terjadi di Kota Makassar dengan jumlah yang ditangani sebanyak 2.686 kasus dari 41.220 kasus yang ada atau sekitar 6.52% dengan jumlah penduduk di Kota Makassar sebanyak 1.484.912 jiwa (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021).

1.3 Etiologi Diare

Diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan parasit. Rotavirus dan *Escherichia coli* menjadi agen penyebab diare tersering. Diare sering terjadi karena air yang terkontaminasi dengan agen penyebab bakteri dan sanitasi yang kurang bagus (WHO, 2017).

Bakteri menjadi salah satu penyebab diare pada anak walaupun kejadiannya lebih jarang dibandingkan diare akibat virus. *E. coli* merupakan flora normal yang dapat menyebabkan diare yaitu *enterotoxigenic E. coli (ETEC)*, *enterohaemorrhagic E. coli (EHEC)*, *enteroaggregative E. coli (EPEC)*, dan *enteroinvasive E. coli (EIEC)*. Transmisi bakteri ini melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi.

Parasit yang sering menyebabkan diare pada anak adalah *Giardia lamblia*. Transmisi parasit ini melalui makanan dan air yang terkontaminasi atau secara fekal-oral. Diagnosis dapat ditegakan dengan ditemukannya trofozoit dalam pemeriksaan feses cair dan bentuk kista dalam feses padat (Jap dan Widodo, 2021).

1.4 Patofisiologi Diare

Diare dapat disebabkan oleh satu bahkan lebih patofisiologi/patomekanisme dibawah ini:

a. Diare sekretorik

Diare tipe ini disebabkan oleh meningkatnya sekresi air dan elektrolit dari usus, menurunnya absorpsi. Yang khas pada diare ini yaitu secara klinis ditemukan diare dengan volume tinja yang banyak sekali. Diare tipe ini akan tetap berlangsung walaupun dilakukan puasa makan atau minum.

b. Diare osmotik

Diare tipe ini disebabkan meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obat atau zat kimia yang hiperosmotik (antara lain $MgSO_4$, $Mg(OH)_2$), malabsorpsi umum dan defek dalam absorpsi mukosa usus misal pada defisiensi disakaridase, malabsorpsi glukosa galaktosa.

c. Malabsorpsi asam empedu dan lemak

Diare tipe ini didapatkan pada gangguan pembentukan atau produksi micelle empedu dan penyakit-penyakit saluran bilier dan hati.

- d. Defek sistem pertukaran anion/transport elektrolit aktif di enterosit

Diare tipe ini disebabkan adanya hambatan mekanisme transport aktif $\text{Na}^+\text{K}^+\text{ATPase}$ di enterosit dan absorpsi Na^+ dan air yang abnormal.

- e. Motilitas dan waktu transit usus yang abnormal

Diare tipe ini disebabkan hipermotilitas dan iregularitas motilitas usus sehingga menyebabkan absorpsi yang abnormal di usus halus. Penyebabnya antara lain yaitu diabetes melitus, pasca vagotomi, hipertiroid.

- f. Gangguan permeabilitas usus

Diare tipe ini disebabkan permeabilitas usus yang abnormal disebabkan adanya kelainan morfologi membran epitel spesifik pada usus halus.

- g. Diare inflamasi

Proses inflamasi di usus halus dan kolon menyebabkan diare pada beberapa keadaan. Akibat kehilangan sel epitel dan kerusakan *tight junction*, tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah dan limfatik menyebabkan air, elektrolit, mukus protein dan seringkali sel darah merah dan sel darah putih menumpuk dalam lumen. Biasanya diare akibat diare sekretorik.

h. Diare infeksi

Infeksi oleh bakteri merupakan penyebab tersering dari diare. Dari sudut kelainan usus, diare oleh bakteri dibagi atas non-invasif dan invasif (merusak mukosa). Bakteri non-invasif menyebabkan diare karena toksin yang disekresikan oleh bakteri tersebut.

1.5 Klasifikasi Diare

Diare diklasifikasikan berdasarkan lama waktunya menjadi diare akut dan kronik. Diare akut adalah diare yang terjadi kurang dari 15 hari. Menurut *World Gastroenterology Organisation*, diare adalah pengeluaran feses semi padat atau cair yang sering dan tidak normal selama kurang dari 14 hari. Sedangkan diare kronik adalah diare yang terjadi lebih dari 15 hari (IPD Ed6th, 2017).

Berdasarkan mekanisme patofisiologinya, diare dibagi menjadi 2 macam, yaitu diare sekretorik dan diare osmotik (IPD Ed6th, 2018).

Tabel 3. Klasifikasi Diare Menurut Derajat Dehidrasi

| | Tanda dan gejala |
|---|---|
| Dehidrasi berat (kehilangan cairan > 10% berat badan) | Dua atau lebih tanda berikut: kondisi umum lemah, letargis atau tidak sadar ubun-ubun besar, mata sangat cekung, malas minum/tidak dapat minum, cubitan perut kembali sangat lambat (>2 detik). |
| Dehidrasi ringan-sedang/ tidak berat (kehilangan cairan 5 - 10% berat badan) | Dua atau lebih tanda berikut: rewel, gelisah, cengeng, ubun-ubun besar, mata sedikit cekung, tampak kehausan, minum lahap, cubitan perut kembali lambat. |
| Tanpa dehidrasi (kehilangan cairan <5% berat badan) | Tidak ada cukup tanda untuk diklasifikasikan ke dua kriteria di atas. |

Sumber: Kapita selekta kedokteran. Edisi IV. Jilid 1

1.6 Manifestasi Klinis Diare

Infeksi usus menyebabkan timbulnya diare, selain itu dapat disertai muntah dan demam. Kehilangan air dan elektrolit dapat menyebabkan dehidrasi, asidosis metabolik dan hipokalemia. Nyeri perut dan tenesmus terjadi jika terdapat infeksi di kolon (Subagyo, 2015). Dehidrasi terbagi menjadi tiga berdasarkan banyaknya cairan yang keluar. Dehidrasi ringan terjadi kehilangan cairan 2% - 5% berat badan. Gejala yang terjadi yaitu turgor kurang, suara serak, dan mata cekung. Dehidrasi sedang terjadi kehilangan cairan 5% - 8% berat badan. Gejala yang terjadi yaitu turgor buruk, mata cekung, suara serak, presyok atau syok, nadi cepat, serta napas cepat dan dalam. Dehidrasi berat terjadi kehilangan cairan 8% - 10% berat badan. Gejala yang terjadi yaitu turgor buruk, mata cekung, suara serak, presyok atau syok, nadi cepat, napas cepat dan dalam, sianosis, otot kaku, serta kehilangan kesadaran (IPD Ed6th, 2017).

Biasanya bayi yang menderita diare akan gelisah dan sering menangis. Beberapa kasus ditemukan adanya keluhan nafsu makan yang berkurang. Ditemukan lancet pada daerah anus akibat seringnya defekasi (Sumampouw et al., 2017). Gejala yang timbul pada diare akibat rotavirus yaitu diare encer, muntah, rasa tidak nyaman di perut, demam, dan dehidrasi. Gejala yang timbul pada diare akibat bakteri yaitu demam tinggi, diare berdarah dan nyeri perut hebat. Sedangkan gejala yang sering muncul yaitu diare akut, feses tampak berminyak, nyeri perut, dan kembung (Jap dan Widodo, 2021).

1.7 Penegakan Diagnosis Diare

a. Anamnesis

Keluhan diare bisa terjadi selama kurang dari 15 hari. Keluhan khas pada diare infeksi adalah mual, muntah, nyeri abdomen, demam, dan frekuensi buang air besar yang sering. Mual dan muntah bisa terjadi jika pasien mengalami infeksi toksigenik. Dehidrasi dapat timbul jika diare berat dan asupan terbatas. Pasien yang mengalami dehidrasi sering merasa haus, jumlah buang air kecil berkurang, warna urin yang gelap, tidak berkeringat, dan perubahan ortostatik.

b. Pemeriksaan Fisis

Pada pemeriksaan fisis, ditemukan adanya perubahan tekanan darah, tekanan, nadi dan suhu tubuh. Bisaanya ditemukan bising usus meningkat, distensi abdomen dan nyeri tekan perut.

c. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan darah tepi lengkap, kadar elektrolit serum, ureum, dan kreatinin, serta pemeriksaan *Enzyme Linked Immunosorbent Assay* (ELISA). Peningkatan jumlah leukosit terjadi pada diare infeksi bakteri (IPD Ed6th, 2017).

1.8 Penatalaksanaan

Menurut Kemenkes RI (2011), prinsip penatalaksanaan diare pada balita adalah Lima Langkah Tuntaskan Diare (LINTAS) yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan rekomendasi WHO yaitu:

a. Rehidrasi sesuai derajat dehidrasi

Diare tanpa dehidrasi diberikan cairan lebih banyak dari biasanya dan oralit untuk mencegah dehidrasi, berikan makan dan ASI untuk mencegah anak kekurangan gizi dan anak dibawa kembali ke pusat pelayanan kesehatan jika dalam 3 hari keadaan tidak membaik.

Diare dengan dehidrasi tidak berat, cairan rehidrasi oral diberikan dengan pemantauan yang dilakukan di pojok upaya rehidrasi oral selama 4 - 6 jam. Sedangkan untuk diare dengan dehidrasi berat harus diberikan rehidrasi intravena dan rehidrasi oral segera setelah keadaan membaik.

b. Pemberian Zink

Merupakan sebuah mikronutrisi yang dapat ditemukan pada semua jaringan tubuh dan sangat penting bagi pertumbuhan suatu sel, diferensiasi sel dan sintesa DNA, zink juga berfungsi penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh (Dewi, Siregar, dan Aristantia 2021). Lebih dari 300 macam enzim pada tubuh manusia yang dimana memerlukan zink untuk kofaktor pengoptimalan fungsi tubuh pada proses metabolisme (Purnamasari dan Anisa, 2019). Zink diberikan selam 10-14 hari berturut-turut. Mekanisme zink dalam penyembuhan yaitu meningkatkan elektrolit dan absorpsi air dengan cara mengurangi kadar air pada lumen usus yang nantinya dapat memperbaiki konsistensi pada feses (Dewi et al. 2021). Zink juga berperan dalam proses epitelisasi dinding usus yang mengalami

hipersekreasi epitel usus. Zink juga berperan dalam proses epitelisasi dinding usus yang mengalami kerusakan baik secara morfologi dan fungsinya selama terjadi diare. Zink diberikan 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti pada anak. Dapat diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI:

- 1) Umur < 6 bulan: diberi 10 mg (1/2 tablet) per hari.
- 2) Umur > 6 bulan: diberi 20 mg (1 tablet) per hari.

c. Teruskan pemberian ASI dan makanan

Pemberian makanan selama diare dapat membuat anak tetap kuat dan tumbuh dengan baik serta mencegah kehilangan berat badan. Anak yang masih minum ASI harus lebih sering diberi ASI sedangkan anak yang minum susu formula juga diberikan lebih sering dari biasanya. Anak usia 6 bulan atau lebih termasuk bayi yang telah mendapatkan makanan padat harus diberikan makanan yang mudah dicerna dan diberikan lebih sedikit dan lebih sering. Setelah diare berhenti, pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu untuk membantu pemulihan berat badan.

d. Pemberian Antibiotik

Antibiotik pada umumnya tidak diperlukan pada semua penderita diare akut. Namun antibiotik ini dapat diberikan untuk mengobati berbagai macam infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Darmawansyah dan Haruna, 2017). Antibiotik diindikasikan pada pasien diare yang disertai dengan demam, feses berdarah, leukosit pada feses, suspek

kolera dan infeksi berat lainnya. Menurut PERMENKES No. 2406 tahun 2011 mengenai pemakaian antibiotik menyatakan bahwa terapi antibiotik dapat digunakan sebagai terapi empiris dan definitif. Antibiotik sebagai terapi empiris yang digunakan adalah tetrasiklin, doxycyclin, cotrimoxazole dan eritromisin dengan jangka waktu atau lama pemberian antibiotik yang disarankan adalah 2-3 hari. Setelah itu, maka harus segera dievaluasi berdasarkan kondisi klinis dan hasil pemeriksaan seperti lab dan mikrobiologi. Umumnya metronidazole dan ciprofloxacin diberikan pada penderita diare (Darmawansyih dan Haruna, 2017)

Apabila bakteri penyebab diare diketahui maka dapat diberikan antibiotik pada anak sebagai berikut:

Tabel 4. Antibiotik berdasarkan penyebabnya

| Bakteri | Antibiotik |
|------------------------------|---|
| <i>Campylobacters.spp.</i> | Eritromisin/ Azitromicin |
| <i>Clostridium Difficile</i> | Metronidazole/Vancomicin |
| <i>Escherichia Coli</i> | Azitromicin/Ciprofloxacin |
| <i>Salmonella</i> | Ampisilin/kloramfenikol/cefotaxim |
| <i>Shigella spp.</i> | Ciprofloxacin/Ceftriaxone/Azitromicin/Cefixime/Trimethoprim |
| <i>Entamoeba histolytica</i> | Metronidazole/Paromomicin/Iodoquinol |

Sumber: Robert M. Kliegman, dkk. Ilmu Kesehatan Anak Nelson Ed.21 (Kliegman et al. 2020).

- e. Edukasi atau nasihat pada Orang Tua
 - 1) Cara memberikan cairan di rumah
 - a) Kapan harus membawa anak kembali ke petugas kesehatan:

- (1) Bercak cair lebih sering
- (2) Muntah berulang
- (3) Sangat haus
- (4) Makan dan minum sangat sedikit
- (5) Demam
- (6) Berak bedarah
- (7) Tidak membaik dalam 3 hari

f. Pemberian Probiotik

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO) probiotik merupakan sejumlah mikroorganisme yang hidup didalam tubuh host dengan jumlah yang memadai dan dapat memberikan manfaat kesehatan pada host (Dewi et al. 2021). Mekanisme kerja probiotik ialah berkompetisi dalam berikatan pada enterosit usus, sehingga enterosit yang sudah jenuh tidak akan lagi berikatan dengan bakteri lain. Probiotik berperan juga dalam imunitas non-spesifik (makrofag, sel natural killer (NK) ,dan fagositosis) dan spesifik (TNF- α , IL-2, IL-6 dan kadar sIgA). Menurut pedoman *European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition* (ESPGHAN) tahun 2016, *Bifidobacterium sp.*, *Bacillus sp.*, *Lactococcus sp.*, *Lactobacilli sp.*, *Streptococcus sp.*, atau *Saccharomyces sp.*, baik secara Tunggal maupun kombinasi yang merupakan beberapa strain probiotik yang efektif mencegah diare (Hadiyanto dan Wahyudi, 2022).

Manfaat dari probiotik itu sendiri ialah bakteri yang dapat membantu dalam proses absorpsi nutrisi dan menjaga gangguan dalam penyerapan air yang akan berpengaruh pada perbaikan konsistensi feses. Adapun peran probiotik dalam saluran cerna ialah menghasilkan ion hidrogen yang dapat menurunkan pH usus dengan memproduksi asam laktat sehingga suasana asam akan menghambat pertumbuhan bakteri pathogen. Menurut MIMS (*The Monthly Indeks of Medical Spesialite*) Indonesia Edisi 19 pemberian probiotik L-Bio pada anak ≥ 12 tahun 3 sachet/hari, untuk anak usia ≥ 2 tahun 2 - 3 sachet/hari dan ≤ 1 tahun sesuai anjuran dokter (Dewi et al. 2021).

2. Luaran Klinis

Luaran klinis merupakan tujuan yang akan dicapai dari suatu terapi penggunaan obat. Luaran klinis bisa berupa keadaan klinis pasien membaik maupun keadaan klinis pasien memburuk atau tidak terjadi perbaikan klinis hingga menyebabkan kematian (Widiyastuti et al. 2023). Sumber lain mengatakan luaran klinis ialah perbaikan klinis pada pasien setelah diberikan tatalaksana yaitu berkurangnya frekuensi diare menjadi kurang dari tiga kali per hari, konsistensi tinja yang makin padat, dehidrasi teratasi, keadaan umum dan asupan makanan pasien membaik (Cindra Kasih 2021). Adapun setelah dilakukannya pengobatan terjadi komplikasi yang disebabkan infeksi yang berkepanjangan yaitu terdapat penurunan asupan nutrisi, peningkatan katabolisme dan penurunan fungsi absorpsi usus. Terjadinya penurunan

proteksi barrier mukosa usus yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi enteral yang menyebabkan malnutrisi. Dan juga komplikasi yang dapat terjadi ialah gangguan keseimbangan elektrolit dan hipoglikemia (Khalid, Wisnu Wardhana, dan Irawiraman 2022).

3. Pengaruh Tatalaksana Diare Terhadap Luaran Klinis

a. Rehidrasi derajat dehidrasi

Dehidrasi adalah suatu keadaan penurunan total air di dalam tubuh karena hilangnya cairan secara patologis, asupan air tidak adekuat, atau kombinasi keduanya. Dehidrasi terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada jumlah yang masuk, dan kehilangan cairan ini juga disertai dengan hilangnya elektrolit. Dehidrasi sampai saat ini masih menjadi salah satu akibat utama dari penyakit diare. Komplikasi yang dapat terjadi jika pasien dehidrasi akibat diare yaitu renjatan hipovolemik, hipokalemia, hipotoni otot, bradikardi dan perubahan pada pemeriksaan EKG, hipoglikemia, kejang, malnutrisi energi protein. Penyakit diare dapat menyebabkan kematian jika dehidrasi tidak diatasi dengan tepat. Dehidrasi dapat terjadi pada pasien diare karena usus bekerja tidak optimal sehingga sebagian besar air dan zat-zat yang terlarut didalamnya keluar bersama feses sampai akhirnya tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi.

Tatalaksana di rumah maupun di sarana kesehatan sangat mempengaruhi keselamatan jiwa anak yang menderita diare terutama dengan dehidrasi. Pemberian cairan adalah yang utama pada penderita diare karena sebagian besar kasus terutama anak-anak yang dibawa ke rumah sakit sudah terjadi komplikasi berupa dehidrasi sehingga diperlukan cairan rehidrasi yang sesuai untuk mengembalikan cairan dan juga menurunkan volume feces serta menurunkan muntah. Kemenkes RI menyebutkan bahwa penelitian dengan menggunakan oralit pada pasien diare dapat mengurangi tinja 25%, mengurangi mual dan muntah 30% (Ginanjari, Puspitasari, dan Iswari 2022).

b. Pemberian Zink

WHO maupun UNICEF merekomendasikan kebijakan terbaru mengenai penatalaksanaan diare pada anak yaitu dengan menambahkan suplementasi zink (Zn) pada terapi rehidrasi oral. Zink merupakan salah satu mineral esensial yang memiliki fungsi penting didalam tubuh manusia, dimana berfungsi sebagai kofaktor lebih dari 100 metaloenzim untuk sintesis DNA, integritas membran seluler, berperan dalam metabolisme tulang dan hati, untuk proses transkripsi dan regulasi ekspresi gen untuk proliferasi dan diferensiasi jaringan pada saluran pencernaan. Zink dapat digunakan sebagai bahan untuk imunitas, kulit dan resistensi mukosa terhadap infeksi, untuk pertumbuhan dan perkembangan

sistem saraf dan sebagai antioksidan. Kekurangan zink disebabkan oleh asupan makanan yang kurang atau kehilangan zink akibat diare. Anak-anak yang jarang mengonsumsi daging dan sering terpapar oleh patogen saluran cerna memiliki resiko tinggi kekurangan zink.

Diare pada anak di negara berkembang sebagian besar yakni diare infeksi. Zink memiliki efek terhadap beberapa eritrosit dan sel imun yang berinteraksi dengan agen infeksius pada diare. Penggunaan zink akan mempengaruhi fungsi imun atau fungsi maupun struktur intestinal dan proses pemulihan epitel selama diare, sehingga akan mencegah diare lebih lanjut atau mempercepat proses penyembuhan. Zink utamanya bekerja pada jaringan dengan kecepatan turnover yang tinggi seperti halnya pada saluran cerna dan sistem imun dimana zink dibutuhkan untuk sintesa DNA dan protein.

Mekanisme zink dalam tubuh yaitu memperbaiki atau meningkatkan absorpsi air dan elektrolit dengan cara mengurangi kadar air di dalam lumen usus yang menghasilkan perbaikan konsistensi feses. Perbaikan konsistensi feses akan dapat mengurangi frekuensi bab yang timbul sehingga hal tersebut dapat mempersingkat lama diare pada anak (Putri, Rodiani, dan Wahyudo 2019) (Usali, Darmawan, dan Umam 2020).

c. Pemberian Antibiotik

Terapi dengan menggunakan antibiotik sebelum diketahui jenis bakteri yang menginfeksi termasuk dalam pengobatan empiris, yang umum diberikan pada pasien yang diduga mengalami infeksi bakteri invasif, *traveler's diarrhea* atau immunosupresif. Empiris adalah pemberian terapi yang didasarkan pada epidemiologi yaitu pola kuman pada pasien diare pada setiap rumah sakit. Antibiotik spektrum luas efektif digunakan sebagai terapi empiris, karena jangkauan aktifitasnya yang luas baik bakteri gram positif maupun gram negatif. Sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.

Penggunaan antibiotik dalam suatu terapi hendaknya mempertimbangkan segi toksisitas selektif yang tinggi, dimana obat yang digunakan dalam terapi harus bersifat sangat toksik terhadap mikroba dan relatif tidak toksik untuk hospes. Untuk memutuskan penggunaan antibiotik pada suatu infeksi, perlu diperhatikan gejala klinik, jenis serta patogenesis mikroba, dan mekanisme daya tahan tubuh hospes (Meila et al. 2020).

Pemberian dosis antibiotik yang kurang akan mengakibatkan tidak tercapainya efek terapi dari obat tersebut karena tidak tercapainya KHM (Kadar Hambat Minimum) dalam cairan tubuh, hal ini menyebabkan mikroorganisme yang menginfeksi tidak mati, kurangnya dosis akan mengakibatkan

bakteri yang tersisa dalam tubuh menjadi resisten. Penggunaan antibiotika yang melebihi dosis maksimal akan meningkatkan efek samping antibiotika tersebut dan dapat menyebabkan peningkatan efek toksik (Meila et al. 2020).

Lama terapi antibiotik sangat tergantung pada tingkat keparahan dan jenis bakteri yang menginfeksi. Ketidaktepatan lama pemberian adalah lama pemberian antibiotik kurang dari yang ditetapkan oleh standar. Lama pemberian antibiotik yang pendek mengakibatkan munculnya kembali gejala klinis yang telah hilang, bahkan dapat menyebabkan resistensi pasien sehingga akan memperlambat kesembuhan (Putri et al. 2023). Oleh karena itu, luaran klinis pada pasien diare yang diberikan antibiotik sangat tergantung dengan ketepatan pemberian antibiotik (Meila et al. 2020).

B. Integrasi Keislaman

Bayi yang memiliki usia 0 - 59 bulan merupakan masa anak yang memiliki ketahanan tubuh yang belum optimal sehingga mereka masih masuk kedalam kategori lemah dan sangat rentan untuk terserang oleh berbagai jenis penyakit terutama penyakit infeksi, teori ini telah dibuktikan oleh Allah SWT.

Dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait ketahanan tubuh manusia. Allah SWT. Berfirman dalam QS Al-Rum/30: 54:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ.

Terjemahnya:

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha kuasa.”

Menurut Al-Mishabh dalam tafsirannya, Allah-lah yang menciptakan kalian dari air mani, lalu kalian tumbuh dalam keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kalian kuat setelah keadaan lemah itu dengan pertumbuhan kalian sampai dewasa. Setelah itu menjadikan kalian lemah. Kembali setelah keadaan kuat itu, yaitu dengan sampainya kalian pada usia tua dan beruban. Dia menciptakan segala yang dikehendaki-Nya. Dia mengetahui untuk mengiris ciptaan-Nya dan Mahakuasa untuk menjadikan segala yang dikehendaki-Nya (Shihab, 2017).

Kata *dha'fin* yang berarti lemah dan pada ayat ini yang dimaksud lemah ialah pada fase usia bayi hingga anak-anak, serta fase setelah kuat lemah Kembali yaitu pada fase tua atau lansia. Ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa secara umum manusia mengalami tiga fase kehidupan yaitu fase keadaan lemah (usia bayi atau anak-anak), fase keadaan kuat (dewasa) dan fase beruban (tua atau lansia) (Mulyadin 2022). Ayat ini dapat dikaitkan pada penelitian ini dikarenakan pada fase lemah (usia bayi hingga anak-anak) merupakan fase yang sangat rentan

terhadap infeksi, disebabkan oleh sistem imun yang belum matang untuk melawan patogen-patogen penyebab infeksi.

Adapun sumber lain mengatakan bahwa adanya kaitan erat dengan ajuran memiliki anak dalam melakukan pernikahan untuk kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi berikut. Bahkan Islam dalam hal ini menganjurkan untuk memilih pasangan istri yang subur dan kasih sayang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حدثنا حسين وعفان قالا حدثنا خلف بن خليفة حدثني حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبطل نهيا شديدا ويقول تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسند أحمد ١٢١٥٢)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Husain dan Affan berkata: Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah telah bercerita kepadaku Hafs bin Umar dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat."(HR. Ahmad no: 12152)

Kosa kata *al-wadud* (الودود) bermakna menikah dengan wanita yang subur untuk dapat melahirkan keturunan. Adapun kata *al-wadud* (الودود) bermakna kasih sayang. Yakni bahwa seorang Ibu dititipkan rasa kasih sayang kepada anak sehingga ia memiliki tanggung jawab merawat dan menjaga perkembangan serta mendidik anak hingga dewasa. Ayat ini dapat dikaitkan dengan judul ini karena menjelaskan bahwa seorang ibu yang memiliki rasa tanggung jawab pada anaknya, maka ibu tersebut sangat memperhatikan tumbuh kembang anaknya mulai dari pemberian makanan, stimulasi pada anaknya serta sangat menjaga dari

hal-hal yang tidak baik. Kemudian tahapan perawatan yang diperhatikan dalam memberikan asupan makanan kepada anak adalah makanan yang halal dan *thayyibah*. Kaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

Tafsirkan apa yang dimaksud dengan *halal* dan *thayyibah*. *Thayyibah* berarti baik sesuai dengan proporsi perkembangan tubuh dan usia seseorang. Tentunya kalau masih bayi belum boleh disamakan dengan menu orang dewasa. Ayat ini dapat dikaitkan dengan judul ini karena menjelaskan bahwa hendaknya manusia mengonsumsi yang *halalan thayyibah* yaitu halal dan baik, dimana seorang ibu sebaiknya memberikan makanan pada anaknya yang halal dan baik dari bahan hingga cara pengolahan serta cara memperolehnya karena apa yang dikonsumsi itu dapat mempengaruhi anak tersebut. Serta memperhatikan zat yang terkandung didalamnya apakah kandungan bahannya halal atau tidak dan arti *thayyib* yang baik untuk tubuh, bisa diaartikan dengan mengonsumsi obat yang baik bagi kesehatan anak (Lestari dan Riani 2023).

Perintah untuk memakan segala yang diciptakan Allah dan jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana disinyalir oleh Allah Swt dalam QS.al-A'raf : 31

يَبْنِيْ اَدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ؕ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Menurut Ibnu Abbas, dalam ayat ini Allah menghalalkan makan dan minum selama tidak berlebih-lebihan. Makan dan minum yang sesuai kebutuhan adalah yang menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Hal seperti ini dapat menjaga kesehatan jiwa dan indra. Oleh karena itu, syari'at melarang untuk makan secara berlebih-lebihan, karena dapat melemahkan tubuh dan mematikan jiwa serta mengendurkan semangat ibadah. Di dalam Al-quran terdapat banyak sekali kata-kata yang mengandung makna yang harus dipelajari dan dipahami seperti kata berlebih-lebihan atau melampaui atas didalam Al-quran menggunakan beberapa istilah, salah satunya ialah *Israf* yaitu sikap berlebih-lebihan. Kata tersebut diartikan melampaui batas atau menyimpang dari hal yang semestinya (Ahsin 2005). Ayat ini dapat dikaitkan pada dengan penelitian ini karena menjelaskan keterkaitan yaitu sifat yang berlebih, disaat bayi mulai merangkak, berjalan serta aktifitas lainnya maka sangat rentan bayi tersebut terkena infeksi yang dimana bisa disebabkan dari berbagai hal.

Dalam Ajaran Islam terdapat beberapa sunnah Rasulullah SAW Ketika menyabut bayi baru lahir, dan salah satu sunnah yang diajurkan ialah tahnik. Tahnik memiliki hubungan erat dengan kesehatan bayi yang baru lahir sebagai salah satu sunnah yang perlu diperhatikan.


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن بَراد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَنْتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ (رواه مسلم)

Artinya:


Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata: Aku melahirkan seorang anak laki-laki, lalu aku bawa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau menamainya dengan nama 'Ibrahim' dan beliau mengunyahkan kurma untuknya. (HR. Muslim no 3997)

Adapun tata cara tahnik yang dirangkum dari buku Aqiqah karya Ahmad ibn Mahmud ad-Dib dan pesan dari Nabi tentang Anak karya Eva Rianty Lubis ialah: pertama-tama diletakkan sedikit kurma yang sudah dikunyah lalu diletakkan diatas jari orang yang melakukan tahnik. Lalu dimasukkan jari tersebut dalam mulut bayi dan menggerakkan kekanan dan kekiri secara merata dan perlahan-lahan. Orang yang memberikan tahnik juga tidak boleh sembarangan, hanya seseorang yang dianggap ilmunya sudah banyak seperti halnya ustadz ataupun orang tua yang dapat memberikan doa yang baik untuk keberlangsungan hidup bayi itu sendiri, seperti halnya di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selain mendapat doa khusus dari Beliau, bayi-bayi dan orang tuanya diajarkan bentuk pengasuhan yang islami. Yang dimana proses tahnik ini sudah diteliti secara ilmiah bahwa memiliki banyak manfaat dan juga sebagai imunisasi alami. Salah satu sumber menjelaskan bahwa terdapat *stem cell* yang berda disekitar mulut bayi di tempat tumbuhnya gigi dan di langit-langit mulut, yang berfungsi untuk mematangkan sistem imunitas secara alami dan mengendalikan sistem kekebalan tubuh. Dimana *stem cell* ini tidak dapat berfungsi secara alami jika tidak dilakukan *scrubbing* atau menggosok-gosok di langit-langit mulut bayi. Adapun sumber lain menjelaskan, adanya zat bernama *sialic acid*, dimana zat tersebut berupa glikoprotein yang terkandung dalam saliva dimana berfungsi

sebagai penghadang mikroba dan mampu mengikat virus serta bakteri. Pada bayi zat tersebut akan berfungsi dengan baik setelah sepuluh hari bayi baru lahir. Oleh itu, diperlukan stimulus dari luar maka dilakukannya tahnik.




C. *Kerangka Teori*





Bagan 1. Kerangka Teori

D. Kerangka Konsep



Bagan 2. Kerangka Konsep

Keterangan:

-  : Variabel Independen
-  : Variabel Dependen
-  : Variabel yang tidak diteliti
-  : Pengaruh yang diteliti
-  : Pengaruh yang tidak diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional* untuk mengetahui pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1 – 59 bulan terhadap luaran klinis di RSUD Haji Makassar Tahun 2022.

B. *Lokasi Penelitian*

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.

C. *Waktu Penelitian*

Penelitian ini akan berlangsung selama dua bulan yakni di bulan Desember 2023 – Januari 2024.

D. *Variabel Penelitian*

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu variable independent (bebas) dan variable dependen (terikat).

1. *Variabel Independen*

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penatalaksanaan terapi.

2. *Variabel Dependen*

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian diare akut pada bayi usia 1- 59 bulan dan luaran klinis.

E. *Populasi dan Sampel*

1. *Populasi*

Populasi merupakan total dari seluruh elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri yang sama, bertupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, ataupun sesuatu akan diteliti (Ririn, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi usia 1 – 59 bulan yang mengalami diare akut di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2022 sebanyak 346 orang.

2. *Sampel*

Sampel merupakan beberapa bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maupun beberapa bagian kecil dari populasi yang diambil melalui prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto dan Sodik, 2015). Cara pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari total populasi sebanyak 346 sampel, yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebanyak 185 sampel.

Cara penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimal

N = jumlah populasi

e = error margin

Berdasarkan data pengambilan awal di RSUD Haji Makassar didapatkan populasi bayi usia 1 – 59 bulan yang mengalami diare akut yaitu 346 orang, sehingga jumlah sampel bayi usia 1 – 59 bulan yang mengalami diare akut yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

$$n = \frac{346}{1 + (346 \times 0,05^2)}$$

$$n = \frac{346}{1 + (346 \times 0,0025^2)}$$

$$n = \frac{346}{1,865}$$

n = 185,52 bayi, sehingga menjadi 185 bayi.

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah

Tabel 5. Kriteria Penelitian

| Kriteria Inklusi | Kriteria Eksklusi |
|--|---|
| 1. Berusia 1- 59 bulan | 1. Pasien menderita persisten (penderita yang mengalami diare berlangsung lebih dari 14 hari) |
| 2. Pasien balita yang mengalami diare akut | 2. Pasien pindah dari bangsal ke ICU (Intensive Care Unit) |
| 3. Pasien balita memiliki rekam medik yang lengkap (nama pasien, umur, jenis kelamin, gejala, hasil lab dan diagnosis) | 3. Pasien yang didiagnosis keluar dengan menderita infeksi lain. |
| 4. Pasien balita dengan didiagnosis diare akut yang mendapatkan terapi periode (Januari - Desember 2022) | |
| 5. Pasien balita datang dengan dehidrasi ringan – sedang ataupun tanpa dehidrasi | |
| 6. Pasien telah mendapatkan penanganan dehidrasi | |

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data rekam medik pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Tahun 2022.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data rekam medik pasien yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan diambil dari bagian Rekam Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Tahun 2022.

H. Pengolahan Data

1. Seleksi

Melakukan seleksi untuk mengklasifikasikan data sesuai kategori.

2. Editing (Penyuntingan)

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan seluruh data sesuai dan lengkap.

3. Coding (Pengkodean)

Memberikan kode atau tanda pada data yang didapatkan untuk menyederhanakan jawaban dari pihak responden dan memudahkan dalam proses analisa data.


4. Tabulasi (tabulating)

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data.

I. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang diperoleh dari proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS). Data yang diperoleh akan dilakukan analisis univariat untuk menjelaskan karakteristik dari sampel, analisis bivariat dengan uji *Chi-square* untuk mengukur pengaruh antara variabel penatalaksanaan diare terhadap luaran klinis.

J. Alur Penelitian



Bagan 3. Alur Penelitian

K. Etika Penelitian

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke Komite Etik.
2. Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin penelitian.
4. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan.
5. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan mulai Desember 2023 hingga Januari 2024. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 185 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasional* dengan pendekatan *cross sectional*. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1-59 bulan terhadap luaran klinis di lokasi penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social the ciencia (SPSS)*, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat pada tiap variabel penelitian akan menunjukkan hasil distribusi dan persentase dari tiap variabel kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *chi-square* untuk mengetahui pengaruh antara variabel. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Analisis Univariat

Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi frekuensi persentase tiap-tiap variabel tunggal dan karakteristik sampel yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 1 Distribusi Data Karakteristik Balita dengan Riwayat Diare Akut di RSUD Haji Makassar Tahun 2022

| Karakteristik | Jumlah | Persentase |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| Sosiodemografi | n | % |
| Usia | | |
| >28 hari – 1 tahun | 54 | 29.2 |
| >1 tahun – 5 tahun | 131 | 70.8 |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-laki | 114 | 61.6 |
| Perempuan | 71 | 38.4 |
| Derajat Dehidrasi | | |
| Tanpa Dehidrasi | 2 | 1.1 |
| Dehidrasi Ringan - Sedang | 183 | 98.9 |
| Total | 185 | 100 |

Sumber: Rekam Medik RSUD Haji Makassar Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar diperoleh hasil bahwa usia >28 hari - 1 tahun sebanyak 54 bayi (29.2%), sedangkan usia >1 tahun - 5 tahun sebanyak 131 bayi (70.8%). Distribusi jenis kelamin diperoleh hasil bahwa bayi laki-laki sebanyak 114 bayi (61.6%), sedangkan bayi perempuan sebanyak 71 bayi (38.4%). Distribusi frekuensi derajat dehidrasi diperoleh hasil bahwa tanpa dehidrasi sebanyak 2 bayi (1.1%), sedangkan dengan dehidrasi ringan - sedang sebanyak 183 bayi (98.9%).

Tabel 4.1 2 Distribusi Tatalaksana Antibiotik pada Balita di RSUD Haji Makassar Tahun 2022

| Antibiotik | Jumlah | Persentase |
|----------------|--------|------------|
| | n | % |
| Ampisilin | 42 | 61.7 |
| Seftriakson | 8 | 11.7 |
| Kontrimoksazol | 5 | 7.4 |
| Sefiksim | 13 | 19.1 |
| Total | 68 | 100 |

Sumber: Data Sekunder 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pemberian antibiotik pada balita di RSUD Haji Makassar tahun 2022 yaitu ampisilin sebanyak 42 sampel (61.7%), seftriakson sebanyak 8 sampel (11.7%), kontrimoksazol sebanyak 5 sampel (7.4%), sefiksim sebanyak 13 sampel (19.1%).

Tabel 4.1 3 Distribusi Luaran Klinis Balita di RSUD Haji Makassar Tahun 2022

| Luaran Klinis | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------|------------|
| | n | % |
| Sembuh | 171 | 92.4 |
| Tidak Sembuh | 14 | 7.6 |
| Total | 185 | 100.0 |

Sumber: Data Sekunder 2022

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan bayi di RSUD Haji Makassar dengan luaran klinis sembuh sebanyak 171 bayi (92.4%), sedangkan bayi dengan luaran klinis tidak sembuh sebanyak 14 bayi (7.6%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1–59 bulan terhadap luaran klinis bayi. Adapun analisis pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1–59 bulan terhadap luaran klinis bayi dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 1 Analisis Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut pada Bayi Usia 1-59 Bulan Terhadap Luarannya Klinis di RSUD Haji Makassar Tahun 2022

| Tatalaksana Diare Akut | Luaran Klinis | | Total | P-value |
|---|----------------|------------------|-----------------|---------|
| | Sembuh (%) | Tidak Sembuh (%) | | |
| Tunggal: Zink / Probiotik | 6 (3.2%) | 4 (2.2%) | 10 (5.4%) | 0.000 |
| Kombinasi 1: Zink + Probiotik / Zink + Antibiotik | 103 (55.7%) | 5 (2.7%) | 108 (58.4%) | |
| Kombinasi 2: Zink + Probiotik + Antibiotik | 62 (33.5%) | 5 (2.7%) | 67 (36.2%) | |
| Total | 171 (92.4%) | 14 (7.6%) | 185 (100.0%) | |

Sumber: Data Sekunder 2022

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah bayi yang diberikan terapi tunggal zink atau probiotik sebanyak 10 bayi (5.4%) dari total sampel yaitu 185 bayi, dan bayi dengan luaran klinis sembuh sebanyak 6 bayi (3.2%), sedangkan bayi dengan luaran klinis tidak sembuh sebanyak 4 bayi (2.2%) dari total bayi yang diberikan terapi

Tunggal zink atau probiotik. Jumlah bayi yang diberikan terapi kombinasi 1 yaitu zink + probiotik atau zink + antibiotik sebanyak 108 bayi (58.4%) dari total sampel yaitu 185 bayi, dan bayi dengan luaran klinis sembuh sebanyak 103 bayi (55.7%), sedangkan bayi dengan luaran klinis tidak sembuh sebanyak 5 bayi (2.7%) dari total bayi yang diberikan terapi kombinasi 1 yaitu zink + probiotik atau zink + antibiotik. Jumlah bayi yang diberikan terapi kombinasi 2 yaitu zink + probiotik + antibiotik sebanyak 67 bayi (36.2%) dari total sampel yaitu 185 bayi, dan bayi dengan luaran klinis sembuh sebanyak 62 bayi (33.5%), sedangkan bayi dengan luaran klinis tidak sembuh sebanyak 5 bayi (2.7%) dari total bayi yang diberikan terapi kombinasi 2 yaitu zink + probiotik + antibiotik.

Untuk melihat pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1-59 bulan terhadap luaran klinis menggunakan uji statistik *chi-square*, dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan jika *p-value* <0.05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0.000 yang berarti terdapat pengaruh antara penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1 - 59 bulan terhadap luaran klinis di RSUD Haji Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

B. Pembahasan

Hasil pada penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dimana sebagian besar balita penderita diare akut yang dirawat inap berusia >1 tahun – 5 tahun yaitu sebanyak 131 bayi (70.8%). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan I Nyoman Agung Triana Putra, dkk yang menjelaskan bahwa disaat anak yang sudah berusia lebih dari 7 bulan dan mendapatkan makanan pendamping ASI, maka pencernaan anak perlu menyesuaikan terhadap zat dan bentuk makanan yang dimakan setelah sebelumnya hanya diberikan ASI untuk memenuhi nutrisinya . Makanan pendamping ASI yang diberikan juga berpeluang terhadap terkontaminasi dengan bakteri yang menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pencernaan (Putra et al. 2023). Dan pada usia tersebut rentan terkena masalah kesehatan yang tinggi yang disebabkan karena balita banyak melakukan aktivitas, mulai aktivitas dalam ruangan maupun di luar ruangan (Alfatihana 2020). Dan juga balita merupakan usia yang rentan menderita suatu infeksi, dimana hal tersebut disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang belum matang (Cono et al. 2021).

Adapun distribusi jenis kelamin yang dapat kita lihat pada tabel 4.1 dimana sebagian besar balita yang mengalami diare akut pada RSUD Haji Makassar yaitu pada bayi laki-laki sebanyak 114 bayi (61.6%). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan I Dewa Made Satrianjaya, dkk, pada penelitian tersebut jenis kelamin yang dominan pada pasien diare anak adalah laki-laki 96 bayi (56,5%) dari total sampel penderita ialah 170 bayi (Satrianjaya, Nesa, dan Mahalini 2019). Kemungkinan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anak laki-

laki lebih banyak aktif bermain diluar lingkungan rumah, sehingga rentan terhadap paparan agen pemicu diare. Adapun pengaruh jenis kelamin terhadap mekanisme terjadinya diare belum sepenuhnya dipahami sehingga masih perlu untuk diteliti lebih lanjut (Putra et al. 2023).

Pada tabel 4.1 distribusi derajat dehidrasi menunjukkan bahwa mayoritas balita mengalami diare dengan derajat dehidrasi ringan - sedang yaitu berjumlah 183 bayi (98.9%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ekky Wibisono, dkk, yang dimana penderita diare akut dengan derajat dehidrasi ringan - sedang sebanyak 86.7% dari total keseluruhan sampel (Wibisono, Satria Putra, dan Anggraini 2015). Bayi maupun anak-anak lebih rentan mengalami dehidrasi dibanding usia dewasa. Dikarenakan komposisi cairan tubuh yang besar dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan cairan itu sendiri secara bebas. Adapun sebab lain yang dapat menyebabkan terjadi kejadian tersebut ialah kurangnya pengetahuan dalam mengatasi dehidrasi pada lingkup rumah tangga sebelum membawa pasien ke rumah sakit. ASI, larutan gula garam, air putih hingga air sayur bagi balita yang telah mendapatkan MPASI merupakan penatalaksanaan pemberian cairan yang dapat dilakukan di rumah (Zubaidah dan Maria, 2020).

Pada tabel 4.2 distribusi pemberian tatalaksana antibiotik pada penderita diare akut di RSUD Haji Makassar yang paling banyak digunakan ialah antibiotik golongan penicillin yaitu ampicillin sebanyak 42 sampel (61.7%) dari total pemberian antibiotik sebanyak 68 sampel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pipit Sandra, dkk, dimana pada penelitian tersebut pemberian antibiotik yang paling banyak digunakan adalah golongan penicillin (ampicillin) sebanyak

22 sampel dari total keseluruhan pemberian antibiotik tunggal yaitu 43 sampel (Sandra et al. 2017). Menurut teori antibiotik ampisilin merupakan antibiotik golongan beta-laktam yang berfungsi menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri, antibiotik tersebut digolongkan berdasarkan keberadaan cincin beta-laktam. Sifat dari antibiotik ini sangat tergantung pada ikatan cincin beta-laktam dan ikatan gugus asam pada karbon yang terikat oleh nitrogen beta-laktam. Cincin beta-laktam ini berfungsi dalam menghambat sintesis enzim transpeptidase yang berguna untuk pembentukan lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri dan mengaktifkan enzim autolitik dalam dinding sel yang menyebabkan rudapaksa sehingga bakteri mati (Sjahriani dan Pattiyah 2019). Antibiotik ini dapat diberikan dengan dugaan infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen yaitu *Salmonella spp*, dimana bakteri tersebut menghasilkan enterotoksin serta memiliki membran lipopolisakarida yang mengandung antigen Vi. Enterotoksin ini menyebabkan terjadinya inflamasi yang menimbulkan peningkatan sekresi cairan pada usus yang menyebabkan gejala diare (Jap dan Widodo 2021).

Selanjutnya seftriakson dan sefiksिम merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga yang menjadi *drug of choice* untuk pasien diare akut. Antibiotik ini merupakan pilihan dengan dugaan infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen invasif yaitu *Shigella*, *Campylobacter* dan *Treveler's diarrhea*. Cara kerja dari seftriakson dan sefiksिम sama dengan golongan penisilin. Golongan antibiotik ini dapat melakukan penetrasi dalam jaringan, cairan tubuh, cairan serebrospinal dan dapat menghambat bakteri patogen gram negatif dan positif (Herawati 2022) (Meila et al. 2020).

Kontrimoksazol merupakan kombinasi dari sulfametoksazol dan trimethoprim dengan mekanisme kerja ialah sulfonamida mengganggu proses kerja enzim antara Langkah PABA (saat sintesis protein) + DHFA dengan perjalanan persaingan substrat (bahan pangkal), sedangkan trimethoprim ini mengintervensi antara DHFA dan THFA dengan cara merintangi enzim *dihidrofolatreduktase* yang mereduksi *dihydrofolic acid* (DHFA) menjadi *tetrahydrofolic acid* (THFA) sehingga terhentinya sintesa asam folat yang merupakan bahan pangkal untuk sintesa purin dan DNA/RNA yang menyebabkan pembelahan sel bakteri terhenti (Meila et al. 2020).

Pada tabel 4.3 distribusi luaran klinis pasien balita yang mengalami diare yang terjadi di RSUD Haji Makassar mayoritas pasien tersebut sembuh sebanyak 171 bayi (92.4%) dari total keseluruhan sampel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hastuti dan Anna Rosita Khoirunnisa, dimana pada penelitian tersebut pemberian tatalaksana farmakologi yaitu pemberian probiotik, zink maupun antibiotik dapat menurunkan durasi hingga keperahan serta berpengaruh terhadap penyembuhan dari penderita diare (Hastuti dan Khoirunnisa, 2017). Adapun luaran klinis pasien diare pada balita yang tidak sembuh sebanyak 14 bayi (7.6%) dari total keseluruhan di RSUD Haji Makassar dikarenakan adanya keterbatasan biaya oleh keluarga dalam perawatan di rumah sakit dan adanya permintaan dari keluarga yang telah menandatangani persetujuan untuk memulangkan pasien yang sedang dirawat.

Pada tabel 4.4 menunjukkan adanya pemberian terapi tunggal zink ataupun terapi tunggal probiotik dengan luaran klinis sembuh sebanyak 6 bayi (3.2%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniar Kusumawardani dan Rokhaidah yang menunjukkan adanya hubungan antara pemberian tablet zink dengan durasi diare pada balita yang dapat dinilai dari nilai $p\text{-value} = 0.027$ (Yuniar Kusumawardani 2021). Secara teori, tatalaksana diare dengan pemberian zink merupakan terapi standar diare yang direkomendasikan oleh WHO dan pemberian zink termasuk dalam salah satu prinsip dari penatalaksanaan diare pada balita yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan, sehingga terapi tunggal zink masih dipilih sebagai terapi tunggal dalam penanganan diare (Dewi et al. 2021). Adapun pemberian zink dianjurkan selama 10 hari meskipun diare yang diderita sudah sembuh, agar pengoptimalan efek ataupun fungsi dari zink tersebut. Pemberian tablet zink pada usia 1-5 tahun sangat efektif dalam menangani pencegahan diare lebih lanjut. Zink yang berperan dalam metabolisme tubuh sebagai regenerasi jaringan yang berada pada saluran cerna serta perbaikan mekanisme penyerapan cairan dalam lumen usus dan juga dapat mengurangi frekuensi diare serta dapat mempersingkat lama durasi diare yang berefek pada kesembuhan dari pasien yang menderita diare (Yuniar Kusumawardani 2021). Dan jika keadaan klinis dari pasien tersebut telah membaik setelah diberikan pemberian terapi tunggal zink maka tidak perlu lagi diberikan pemberian terapi lainnya.

Probiotik telah digunakan secara luas pada kasus diare akut meskipun terapi tersebut merupakan terapi tambahan. Berdasarkan dari beberapa penelitian pemberian terapi tunggal probiotik lebih spesifik diberikan pada diare akut yang dicurigai disebabkan oleh infeksi. Dikarenakan peran probiotik ini menghasilkan ion hidrogen yang dapat menurunkan pH usus dengan cara memproduksi asam laktat sehingga suasana asam akan menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Dewi et al. 2021). Adapun peran lain dari probiotik itu sendiri ialah meningkatkan koloni bakteri probiotik dalam lumen saluran cerna yang nantinya seluruh epitel mukosa usus telah diduduki oleh bakteri probiotik melalui reseptor dalam sel epitel usus, sehingga bakteri patogen tersebut tidak memiliki tempat untuk melekatkan diri pada sel epitel usus (Yanti, Purwanti, dan Najini 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferry Effendi, dkk, yang dimana *lactobacillus* ialah probiotik yang dapat menghambat terjadinya pertumbuhan mikroorganisme patogen serta mengembalikan fungsi usus normal (Effendi, Riyanti, dan R 2022). Dan memiliki dampak yang menguntungkan pada durasi diare dan tingkat keparahan sakit tersebut (Jayanto, Ningrum, dan Wahyuni 2020). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lee Do Kyung, dkk, pemberian probiotik yang di uji jenis *bifidobacterium longum* memberikan efek penghambatan yang paling tinggi disusul jenis *lactobacillus acidophilus* yang memberikan hasil signifikan dalam memperpendek durasi diare yang tentu saja berefek pada kesembuhan dari penderita diare (Kyung et al. 2015). Itulah mengapa dalam peneltian ini pemberian terapi tunggal zink lebih banyak

diberikan dibandingkan probiotik. Dikarenakan diare akut lebih banyak disebabkan oleh infeksi virus dibandingkan dengan infeksi bakteri maupun jamur.

Jika keadaan klinis pada pasien belum terlalu membaik jika diberikan terapi tunggal maka diperlukan pemberian terapi kombinasi seperti halnya dari hasil penelitian ini yang dimana menunjukkan bahwa pemberian tatalaksana diare akut pada bayi usia 1-59 bulan di RSUD Haji Makassar tahun 2022 paling banyak diberikan pemberian terapi kombinasi 1 yaitu zink dan probiotik ataupun zink dan antibiotik dengan luaran klinis sembuh sebanyak 103 bayi (55.7%). Hal ini dikarenakan pada saluran cerna zink berfungsi sebagai barrier dan berperan memperbaiki absorpsi air dan elektrolit dari usus, meningkatkan respon imun serta regenerasi cepat epitel usus. Sedangkan probiotik berfungsi sebagai perbaikan ekosistem pada saluran cerna, dengan cara menghambat adesi dari bakteri dan juga berguna sebagai kompetitor bagi bakteri patogen. (Yanti et al. 2023). Oleh itu, pemberian zink dan probiotik secara bersamaan dapat memberikan efek yang saling mendukung berupa penurunan waktu lama diare yang berefek pada kesembuhan pasien diare akut. Adapun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanif Abdurrachman Latif, didapatkan hasil bahwa efek pemberian keduanya (zink dan probiotik) dalam beberapa penelitian setelah data diolah secara statistik tidak didapatkan hasil yang signifikan dibanding dengan pemberian secara terpisah (Latif 2015).

Berdasarkan pada mekanisme kerja terhadap bakteri, antibiotik dikelompokkan menjadi inhibitor sintesis dinding sel bakteri (golongan beta laktam seperti penisilin, sefalosporin, monobaktam, karbapenem), inhibitor

sintesis protein bakteri (makrolida, aminoglikosida, tetrasiklin), mengganggu sintesis DNA (metronidasol, novobiosin, kinolon), dan mengubah permeabilitas membran sel (polimiksin, amfoterisin B, gramisidin, nystatin, kolistin). Antibiotik pada umumnya tidak diperlukan pada semua kasus diare akut, dikarenakan sebagian besar diare infeksi disebabkan oleh rotavirus yang bersifat *self limited* (Putri et al. 2023). Pemberian antibiotik tersebut perlu ada indikasi diare spesifik yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan berdasarkan dari hasil penelitian ini pada tabel 4.4 bahwa tatalaksana diare akut pada RSUD Haji Makassar tahun 2022 yaitu melakukan pemberian kombinasi 1 dan 2 yang didalamnya terdapat pemberian antibiotik dengan pemberian antibiotik paling dominan ialah antibiotik ampisilin. Dengan tujuan diberikan antibiotik sebagai terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga sebab terjadinya infeksi (Yanti et al. 2023). Dan pemilihan jenis antibiotik diberikan berdasarkan perkiraan kemungkinan kuman penyebabnya dan juga didasarkan pada pengalaman yang layak ataupun berdasarkan pada pola epidemiologi kuman setempat. Dengan harapan pemberian terapi empiris ini dapat memperkecil resiko komplikasi maupun perkembangan lebih lanjut dari infeksi (Ariastuti dan Kusumawati, 2020).

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di RSUD Haji Makassar pada bulan Desember tahun 2023 – Januari tahun 2024 untuk mengetahui pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1-59 bulan terhadap luaran klinis di RSUD Haji Makassar tahun 2022 memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Pengambilan data sekunder secara mandiri dengan membuka buku rekam medik sehingga validitas data sangat bergantung dengan validitas data yang ada pada rekam medis.
2. Pada variabel luaran klinis yaitu tidak sembuh, dimana tidak sembuh tersebut bukan dikarenakan penatalaksanaan yang tidak efektif namun adanya faktor lain yaitu permintaan dari keluarga yang telah menandatangani persetujuan untuk memulangkan pasien yang sedang dirawat.
3. Peneliti tidak melihat secara lengkap gejala klinis dari pasien.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh penatalaksanaan diare akut pada bayi usia 1-59 bulan terhadap luaran klinis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian tatalaksana diare akut pada bayi usia 1-59 bulan terhadap luaran klinis di RSUD Haji Makassar tahun 2022 dengan nilai *p-value* 0.000.
2. Angka kejadian diare akut pada bayi usia 1-59 bulan di RSUD Haji Makassar tahun 2022 sebanyak 346 kasus.
3. Karakteristik dari pasien diare akut pada bayi usia 1-59 bulan di RSUD Haji Makassar tahun 2022 yaitu pada rentan usia >28 hari - 1 tahun sebanyak 54 bayi (29.2%), sedangkan usia >1 tahun 5 tahun sebanyak 131 bayi (70.89%). Adapun pada frekuensi jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 114 bayi (61.6%), sedangkan perempuan sebanyak 71 bayi (38.4%). Dan frekuensi derajat dehidrasi pada pasien balita yang mengalami diare yaitu tanpa dehidrasi sebanyak 2 bayi (1.1%), sedangkan dengan dehidrasi ringan - sedang sebanyak 183 bayi (98.9%). Dan total diagnosis sebanyak 185 (100%) pasien yang mengalami diare akut.
4. Tatalaksana yang diberikan pada pasien diare akut pada bayi usia 1 - 59 bulan di RSUD Haji Makassar tahun 2022 yaitu pemberian cairan pemberian zink, probiotik, antibiotik dan edukasi pada orang tua.

Tatalaksana farmakologi pada rumah sakit ini biasanya diberikan pemberian tatalaksana tunggal yaitu pemberian zink atau probiotik maupun tatalaksana kombinasi yaitu kombinasi 1 antara zink + probiotik atau zink + antibiotik, kombinasi 2 yaitu zink + probiotik + antibiotik.

5. Luaran klinis pada pasien diare akut pada bayi usia 1 - 59 bulan di RSUD Haji Makassar tahun 2022 yaitu pasien sembuh sebanyak 171 bayi (92.4%) dan tidak sembuh sebanyak 14 bayi (7.6%).

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Saran untuk masyarakat dalam hal ini orangtua dan keluarga dalam pencegahan terkait diare akut. Diharapkan agar para ibu dan keluarga untuk memperhatikan asupan nutrisi pada anak serta kebersihan dari asupan tersebut serta adanya kesadaran diri dalam kebersihan rumah dan lingkungan sekitar agar terhindarnya dari agen-agen penyebab diare. Dan diharapkan pada saat dirumah sakit atau difasilitas kesehatan lainnya yang dimana terdapat pemaparan dalam pencegahan dan penanganan diare akut di rumah dapat disimak dengan baik dan dicatat serta dipahami oleh orangtua serta keluarga lainnya.


2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar dalam penelitian selanjutnya. Mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel yang belum terdapat pada penelitian ini dengan

sampel yang lebih memadai dan metode serta lokasi penelitian yang berbeda.

3. Bagi Petugas Kesehatan

Diharapkan bagi petugas Kesehatan untuk dapat memberikan edukasi secara rutin terutama pada ibu dan meningkatkan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanganan diare akut pada balita maupun anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, w. Al-Hafidz. 2005. *Kamus Ilmu Al-Quran*.
- Alfatihana, Siti Nur. 2020. “Gambaran Pengetahuan Ibu Balita Terhadap Ispa Pada Balita Di Solong, Klatak, Banyuwangi.” *MaKMA* 3(September):288–94.
- Anitasari, Bestfy, dan Jumies Sappe. 2019. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Perawatan Pasien Diare.” *Jurnal Fenomena Kesehatan* 02(01):258–68.
- Apriani, Desak Yenny Gede, Desak Sastra Firsia Made Putri, dan Nyoman Sri Widiyari. 2022. “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Diare Pada Balita Di Kelurahan Baler Bale Agung Kabupaten Jembrana Tahun 2021.” *Journal of Health and Medical Science* 1(3):15–26.
- Ariastuti, Reni, dan Dunung Kusumawati. 2020. “Gambaran Pengobatan Diare Akut Anak di Puskesmas Jiwan Madiun.” *CERATA Jurnal Ilmu Farmasi* 11(1):35–42. doi: 10.61902/cerata.v11i1.110.
- Cindra Kasih, Lestari. 2021. “Evaluasi Pengobatan Diare Akut Pada Pasien Anak Rawat Inap Di RSUD dr. RM Pratomo Bangan siapi-api RIAU Periode Januari – Juni Tahun 2020.” *JIFI (JURNAL ILMIAH FARMASI IMELDA)*.
- Cono, Elisabeth Gladiana, Maria Paula Marla Nahak, dan Angela Muryati Gatum. 2021. “Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Status Gizi pada Balita Usia 12-59 Bulan di Puskesmas Oepoi Kota Kupang.” *Chmk Health Journal* 5(1):16.
- Dahlan, Aegirine Rafilah, Meiliati Aminyoto, dan Annisa Muhyi. 2022. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Rawat Inap Pada Balita Dengan Diare Akut Di Rsud Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda.” *Majalah Kesehatan* 9(4):214–24. doi: 10.21776/majalahkesehatan.2022.009.04.3.
- Darmawansyih, Darmawansyih, dan Nadyah Haruna. 2017. “an Overview About the Use of Antibiotic in Pregnancy and Nursing Mother in Makassar.”

Molucca Medica 10:102–9. doi: 10.30598/molmed.2017.v10.i2.102.

Dewi, Rasmala, Ulica Elidawani Siregar, dan Ovi Aristantia. 2021. “Evaluasi Penggunaan Kombinasi Zink dan Probiotik pada Penanggulangan Pasien Diare Anak Di Instalasi Rawat Inap RSUD H . Abdul Manap Jambi Tahun 2020.” *Pharma Xplore* 6(2):55–63.

Effendi, Ferry, Teny Riyanti, dan Zahra Kesturi R. 2022. “Evaluasi Penggunaan Obat Pada Kasus Diare Anak Di Rawat Inap Rsia Sammarie Basra Jakarta.” *Jurnal Farmamedika (Pharmamedica Journal)* 7(1):13–16. doi: 10.47219/ath.v7i1.133.

Ginangjar, Marwan Riki, Puspitasari, dan Miranti Florencia Iswari. 2022. “Pengaruh Rehidrasi Oral Terhadap Dehidrasi Pada Anak Usia 1-5 Tahun Yang Mengalami Diare.” *Jurnal Mitra Rafflesia* 14(2).

Hadiyanto, Marissa Leviani, dan Sedyo Wahyudi. 2022. “Probiotik sebagai Pencegahan Diare terkait Antibiotik pada Anak.” *Cermin Dunia Kedokteran* 49(4):219–22. doi: 10.55175/cdk.v49i4.223.

Hastuti, Dwi, dan Anna Rosita Khoirunnisa. 2017. “Penatalaksanaan Terapi Diare Pada Pasien Balita (Hastuti & Khoirunnisa) 7.” *akfarindo* 7–12.

Herawati, Windi. 2022. “Evaluasi Terapi Dan Kesesuaian Penggunaan Obat Pada Pasien Diare Akut Anak.” *Jurnal Inovasi Farmasi Indonesia (JAFI)* 3(1):11. doi: 10.30737/jafi.v3i1.2071.

Indriyani, Desa Putu Rendang, dan I. Gusti Ngurah Sanjaya Putra. 2020. “Penanganan terkini diare pada anak: tinjauan pustaka.” *Intisari Sains Medis* 11(2):928–32. doi: 10.15562/ism.v11i2.848.

Jap, Arvin Leonard Sumadi, dan Ariani Dewi Widodo. 2021. “Diare Akut pada Anak yang Disebabkan oleh Infeksi.” *Jurnal Kedokteran Meditek* 27(3):282–88.

Jayanto, Imam, Vitarani Dwi Ananda Ningrum, dan Wahyuni Wahyuni. 2020.

“Gambaran Serta Kesesuaian Terapi Diare Pada Pasien Diare Akut Yang Menjalani Rawat Inap Di Rsud Sleman.” *Jurnal Farmasi Medica/Pharmacy Medical Journal (PMJ)* 3(1):1. doi: 10.35799/pmj.3.1.2020.28957.

Kemenkes R1. 2020. *Profil Kesehatan Indonesia 2019*.

Kemenkes R1. 2021. *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Vol. 48.

Kemenkes RI Ditjen P2P. 2022. *Profil Kesehatan Indonesia*.

Khalid, Natiara, Ahmad Wisnu Wardhana, dan Hadi Irawiraman. 2022. “Hubungan Antara Status Gizi Dan Umur Dengan Kejadian Diare Dengan Komplikasi Pada Balita Di Rsud Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.” *Jurnal Verdure* 4(1):325–31.

Kliegman, Robert M., Joseph W. S. III Geme, Nathan J. Blum, S. Sha. MD MSCE Samir, Robert C. Tasker, dan Karen M. Wilson. 2020. “Nelson. Textbook of Pediatrics.” *Archives of Disease in Childhood* 76(4):385–385. doi: 10.1136/adc.76.4.385d.

Kyung, Le Do, Park Jae Eun, Kim Min Ji, Seo Jae Goo, Lee Ji Hyuk, dan Ha Nam Joo. 2015. “Probiotic bacteria, *B. longum* and *L. acidophilus* inhibit infection by rotavirus in vitro and decrease the duration of diarrhea in pediatric patients.” *Elsevier* 39(2):237–44.

Latif, Hanif Abdurrachman. 2015. “Terapi Suplementasi Zink dan Probiotik pada Pasien Diare Zink and Probiotic Supplementation Therapy in Patients Diarrhea.” *J Agromed Unila* 2(4):1–5.

Lestari, Khairani Ayu, dan Siti Nur Riani. 2023. “Pandangan Islam Tentang Penggunaan Obat Antibiotik Pada Pasien ISPA.” 2(9):130–36.

Meila, Okpri, Nurmutiya, dan Atika V. 2020. “Analisa Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Diare di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam RSUP Persahabatan.” *Jurnal MIDPRO* 12(1):135–45.

Mulyadin, Agung. 2022. “Stilistika Alquran Dalam Kisah Luqman Dan

Implikasinya Terhadap Cara Mendidik Anak.” *Al-Ibanah* 7(1). doi: 10.54801/iba.v7i1.78.

Nugroho, Hadi, Okpri Meila, dan Sisika Aprilia. 2017. “Hubungan Terapi Kombinasi Terhadap Waktu Penyembuhan Diare Pada Pasien Balita Rawat Inap Di RSUUD Kota Jakarta Utara Tahun 2016.” *Social Clinical Pharmacy Indonesia Journal* 1(2):84–94.

Nurmaliza, dan Sara Herlina. 2019. “Hubungan Pengetahuan dan Pendidikan Ibu Terhadap Status Gizi Balita.” *Jurnal Kesmas Asclepius* 1(3):106–15.

Purnamasari, Meivita Dewi, dan Devi Oktavia Anisa. 2019. “Efektifitas Pemberian Suplementasi Zinc dalam Mengatasi Diare pada Anak: Literature Review.” *Journal of Bionursing* 1(2):171–82. doi: 10.20884/1.bion.2019.1.2.22.

Putra, I. Nyoman Agung Triana, Ni Kadek Elmy Saniathi, dan Putu Arya Suryanditha. 2023. “Karakteristik Penderita Diare pada Balita yang Dirawat Inap di RSUD Tabanan.” *AMJ (Aesculapius Medical Journal)* 3(2):188–93.

Putri, Ananda Nur Laksana, Sholihatil Hidayati, dan Firdha Aprilia Wardhani. 2023. “Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Balita Dalam Penanganan Diare Di Rumah Sakit Citra Husada Jember.” *jurnal ilmu kefarmasian* 1–14.

Putri, Rindu Bunga, Rodiani, dan Riyan Wahyudo. 2019. “Manfaat Pemberian Zink dalam Mengatasi Diare pada Anak < 5.” *Jurnal Medula* 8(2):55–58.

Qisti, Dewi Anissa, Elwan Nanda Eka Putri, Hafifah Fitriana, Salsa Putri Irayani, dan Syavira Anastakim Zulian Pitaloka. 2021. “Analisis Aspek Lingkungan Dan Perilaku Terhadap Kejadian Diare Pada Balita Di Tanah Sareal.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(6):1661–68.

Sandra, Pipit, Didik Hasmono, Elisabeth Kasih, dan Ruddy Hartono. 2017. “Profil Terapi Diare Akut pada Pasien Anak Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.” *Jurnal Farmasi Sains dan Terapan (Journal of*

Pharmacy Science and Practice) 4(2):82–87.

Sari, Nadila, Krianto Tri Karjoso, Yesica Devis, Oktavia Dewi, dan Yuyun Priwahyuni. 2022. “Analisis Faktor Perilaku Ibu terhadap Pencegahan Penyakit Diare pada Balita di Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 14:40–55.

Satrianjaya, I. Dewa Made, Ni Nyoman Metriani Nesa, dan Dewi Sutriani Mahalini. 2019. “Karakteristik diare pada anak di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2017.” *Intisari Sains Medis* 10(2):159–67. doi: 10.15562/ism.v10i2.194.

Shibab, M., dan Quraish. 2002. “Tafsir Al-Mishbah.” 2.

Shihab, M. .. 2014. “Tafsiran Al- Mishbah.” 01(14):01–613.

Sjahriani, Tessa, dan Pattiyah. 2019. “Uji Sensitivitas Bakteri Shigella sp. Terhadap Antibiotik Golongan Sulfonamida Beta-Laktam Dan Makrolida Tahun 2017.” *Jurnal Farmasi Malahayati* 2(1):1–11.

Tuang, Agus. 2021. “Analisis Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diare pada Anak.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10(2):534–42. doi: 10.35816/jiskh.v10i2.643.

Usali, Sutrimo R., Endang Darmawan, dan Nurholid K. Umam. 2020. “Survival Analysis of Body Temperature in Patient Diarrhea Which is Given Vitamin D.” *Jurnal Surya Medika* 5(2):139–45.

Utami, Putri, Suprida, Rizki Amalia, dan Satra Yunola. 2022. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Uptd Puskesmas Sukaraya (Oku).” *Jurnal Ilmu Kesehatan UMC* 11(1):34–41.

Wibisono, Ekky, Deddy Satria Putra, dan Dewi Anggraini. 2015. “Korelasi Status Gizi dan Durasi Diare pada Balita dengan Diare Akut di Ruang Rawat Inap Anak RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.” *Jom Fk* 2(2):1–12.

Widiyastuti, Asih, Shirley Kumala, Hesty Utami R, dan Anton Pratama. 2023.

“Hubungan Rasionalitas Penggunaan Antibiotik terhadap Luaran Klinis Pasien Pneumonia Komunitas Rawat Inap.” *Jurnal Kesehatan* 14(1):109. doi: 10.26630/jk.v14i1.3483.

Yanti, Meisya Juwita Richma, Nera Umilia Purwanti, dan Robby Najini. 2023. “Journal Pharmacy Of Tanjungpura Evaluasi Penggunaan Dosis Obat Diare Yang Tepat Pada Balita Di Puskesmas Dara Juanti Sintang.” *Journal Pharmacy OF Tanjungpura* 1(may).

Yulnefia, dan Mega Sutia. 2022. “Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-36 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tambang Kabupaten Kampar.” *JMJ* 10(1):154–63. doi: 10.33860/jbc.v4i1.758.

Yuniar Kusumawardani, Yuniar Kusumawardani. 2021. “Pemberian Tablet Zinc Dengan Durasi Diare Pada Balita.” *Indonesian Journal of Health Development* 3(2):239–44. doi: 10.52021/ijhd.v3i2.87.

Zubaidah, Zubaidah, dan Insana Maria. 2020. “Hubungan Penatalaksanaan Pemberian Cairan Dirumah Dengan Tingkat Dehidrasi Pada Balita Yang Mengalami Diare.” *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)* 5(1):121–26. doi: 10.51143/jksi.v5i1.228.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Master Tabel

TABEL EPNCATATAN REKAM MEDIK

“Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut Pada Bayi Usia 1 - 59 Bulan Terhadap Luaran Klinis di RSUD Haji Makassar Tahun 2022”

Azifah Ummu Khaltsum – 70600119006

| NO. | JENIS KELA MIN | USIA | TANGGAL LAHIR PASIEN | TGL MASUK | TGL KELUAR | DIAGNOSA UTAMA | LUARAN KLINIS | TATALAKSANA | DERAJAT DEHIDRASI |
|-----|----------------|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | P | 3 THN 10 BLN | 22-01-2019 | 16-11-2022 | 18-11-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 2 | L | 3 THN 3 BLN | 01-02-2019 | 27-05-2022 | 30-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 3 | L | 3 THN 10 BLN | 18-12-2018 | 19-10-2022 | 23-10-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 4 | P | 4 THN 2 BLN | 07-09-2018 | 09-11-2022 | 13-11-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 5 | P | 3THN 1 BLN | 18-06-2019 | 31-07-2022 | 02-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 6 | L | 2 THN 10 BLN | 04-04-2019 | 15-02-2022 | 19-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 7 | L | 3 THN 8 BLN | 29-12-2018 | 29-09-2022 | 01-10-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 8 | P | 3THN 8 BLN | 13-04-2018 | 24-08-2022 | 26-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 9 | L | 3THN 8 BLN | 06-09-2019 | 15-05-2022 | 16-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 10 | L | 2 THN 7 BLN | 09-09-2019 | 10-04-2022 | 13-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | TANPA DEHIDRASI |
| 11 | L | 2 THN 11 BLN | 14-07-2019 | 06-08-2022 | 10-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 12 | P | 2 THN 6 BLN | 20-12-2019 | 10-06-2022 | 14-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 13 | L | 2 THN 3 BLN | 26-10-2019 | 11-01-2022 | 14-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 14 | P | 1 THN 8 BLN | 04-11-2020 | 27-02-2022 | 02-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 15 | L | 7 BLN | 07-06-2021 | 22-01-2022 | 24-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 16 | L | 3 THN | 08-02-2019 | 25-02-2022 | 28-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 17 | L | 11 BLN | 25-06-2021 | 09-05-2022 | 12-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 18 | L | 2 THN 6 BLN | 15-11-2019 | 21-05-2022 | 26-05-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 19 | L | 1 THN | 04-01-2021 | 02-01-2022 | 08-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 20 | P | 2 THN 6 BLN | 24-11-2019 | 12-05-2022 | 16-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 21 | P | 1 THN 11 BLN | 17-05-2020 | 24-04-2022 | 27-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 22 | L | 1 THN 1 BLN | 09-12-2020 | 19-01-2022 | 24-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 23 | L | 1 THN 5 BLN | 28-12-2020 | 11-05-2022 | 13-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 24 | P | 1 THN 1 BLN | 08-04-2021 | 17-05-2022 | 19-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 25 | L | 2 THN 6 BLN | 18-11-2019 | 02-05-2022 | 05-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 26 | L | 3 BLN 17 H | 29-07-2022 | 16-11-2022 | 21-11-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 27 | L | 1 THN 1 BLN | 29-09-2021 | 04-08-2022 | 08-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 28 | L | 3 THN 3 BLN | 01-02-2019 | 11-05-2022 | 13-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 29 | L | 2 THN | 16-10-2020 | 24-10-2022 | 27-10-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 30 | L | 2 THN 1 BLN | 30-09-2020 | 25-08-2022 | 29-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 31 | L | 1 THN 3 BLN | 01-10-2020 | 04-01-2022 | 09-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 32 | L | 3 THN 5 BLN | 13-03-2019 | 08-08-2022 | 10-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 33 | L | 8 BLN | 27-09-2021 | 11-05-2022 | 14-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 34 | L | 4 BLN | 09-10-2021 | 09-02-2022 | 12-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 35 | P | 1 BLN 3 HRI | 23-11-2021 | 26-12-2021 | 01-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 36 | L | 1 THN 10 BLN | 13-04-2020 | 24-02-2022 | 27-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 37 | P | 1 THN 11 BLN | 07-12-2020 | 30-12-2021 | 05-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 38 | L | 3 THN 7 BLN | 25-06-2018 | 03-01-2022 | 05-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 39 | L | 2 THN 4 BLN | 15-01-2020 | 16-05-2022 | 23-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 40 | L | 1 THN 5 BLN | 28-06-2021 | 14-11-2022 | 17-11-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 41 | L | 1 THN | 22-02-2022 | 10-02-2022 | 12-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 42 | L | 1 THN 11 BLN | 07-03-2020 | 07-01-2022 | 10-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 43 | L | 2 THN 3 BLN | 07-04-2020 | 10-01-2022 | 17-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 44 | L | 10 BLN | 16-03-2021 | 10-01-2022 | 12-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 45 | L | 1 THN 5 BLN | 16-08-2019 | 14-01-2021 | 18-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 46 | L | 1 THN 1 BLN | 09-02-2021 | 17-01-2022 | 19-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 47 | P | 3 THN 4 BLN | 08-09-2018 | 18-01-2022 | 20-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | TANPA DEHIDRASI |
| 48 | L | 1 THN 3 BLN | 11-08-2021 | 09-11-2022 | 11-11-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 49 | P | 1 THN 10 BLN | 31-03-2020 | 20-01-2022 | 22-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 50 | P | 1 BLN 16 H | 24-12-2021 | 09-02-2022 | 11-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 51 | P | 3 THN | 01-01-2019 | 25-01-2022 | 27-01-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 52 | P | 9 BLN | 25-01-2022 | 24-10-2022 | 27-10-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 53 | P | 1 THN 4 BLN | 17-06-2021 | 25-10-2022 | 26-10-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 54 | L | 11 BLN | 01-07-2021 | 11-06-2022 | 14-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 55 | L | 1 THN 4 BLN | 08-05-2021 | 31-01-2022 | 05-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 56 | P | 1 THN 2 BLN | 13-12-2020 | 01-02-2022 | 07-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 57 | P | 3 THN 9 BLN | 15-05-2018 | 03-02-2022 | 05/02/2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 58 | L | 1 THN 4 BLN | 25-10-2020 | 03-02-2022 | 05-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 59 | L | 10 BLN | 20-04-2021 | 04-02-2022 | 08-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 60 | P | 5 BLN 20 H | 15-08-2021 | 05-02-2022 | 07-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 61 | P | 1 THN 10 BLN | 24-04-2020 | 06-02-2022 | 09-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 62 | L | 1 THN 3 BLN | 07-11-2020 | 10-02-2022 | 15-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 63 | P | 1 THN 10 BLN | 19-04-2020 | 11-02-2022 | 11-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 64 | L | 1 THN 10 BLN | 19-04-2020 | 15-02-2022 | 18-02-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 65 | L | 2 THN 5 BLN | 13-09-2019 | 21-02-2022 | 23-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 66 | L | 7 BLN | 02-07-2021 | 23-02-2022 | 26-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 67 | P | 2 THN 11 BLN | 11-03-2019 | 23-02-2022 | 26-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 68 | L | 1 THN 11 BLN | 24-03-2020 | 24-02-2022 | 28-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 69 | P | 3 THN | 29-10-2019 | 24-10-2022 | 29-10-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 70 | L | 1 THN 8 BLN | 28-06-2020 | 25-02-2022 | 28-02-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 71 | L | 9 BLN | 21-05-2021 | 27-02-2022 | 02-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 72 | P | 1 THN 3 BLN | 05-11-2020 | 27-02-2022 | 02-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 73 | L | 2 THN 10 BLN | 20-05-2019 | 01-03-2022 | 02-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 74 | L | 1 THN 3 BLN | 13-12-2020 | 02-03-2022 | 05-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 75 | P | 9 BLN | 13-06-2021 | 02-03-2022 | 07-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 76 | P | 2 THN 5 BLN | 25-10-2019 | 03-03-2022 | 09-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 77 | L | 1 THN 6 BLN | 25-09-2020 | 08-03-2022 | 08-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 78 | P | 1 THN 1 BLN | 01-02-2021 | 08-03-2022 | 10-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 79 | L | 3 THN 11 BLN | 19-04-2017 | 05-03-2022 | 11-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 80 | P | 1 THN 5 BLN | 19-10-2020 | 11-03-2022 | 11-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 81 | P | 11 BLN | 14-04-2021 | 12-03-2022 | 14-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 82 | P | 3 THN 1 BLN | 19-02-2019 | 15-03-2022 | 18-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 83 | L | 2 THN 11 BLN | 15-06-2019 | 25-05-2022 | 30-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 84 | P | 1 THN 8 BLN | 05-07-2020 | 17-03-2022 | 18-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 85 | L | 2 THN 11 BLN | 02-11-2019 | 16-10-2022 | 18-10-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 86 | L | 1 THN 1 BLN | 17-04-2021 | 25-05-2022 | 27-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 87 | L | 7 BLN | 07-08-2021 | 19-03-2022 | 25-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 88 | L | 8 BLN | 29-07-2021 | 23-03-2022 | 26-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 89 | L | 3 THN 8 BLN | 08-07-2018 | 25-03-2022 | 28-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 90 | L | 2 THN 7 BLN | 02-08-2019 | 25-03-2022 | 29-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 91 | P | 1 THN 18 H | 08-03-2021 | 26-03-2022 | 29-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 92 | L | 1 THN 5 BLN | 05-10-2020 | 28-03-2022 | 31-03-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 93 | L | 3 THN 8 BLN | 29-07-2018 | 30-03-2022 | 01-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 94 | L | 3 THN | 25-10-2019 | 16-10-2022 | 19-10-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 95 | L | 7 BLN | 06-09-2021 | 01-04-2022 | 04-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 96 | P | 4 BLN | 12-11-2021 | 03-04-2022 | 05-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 97 | P | 1 THN 1 BLN | 20-03-2021 | 03-04-2022 | 08-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 98 | P | 2 THN 4 BLN | 26-08-2020 | 04-04-2022 | 06-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 99 | L | 2 THN | 25-04-2020 | 07-04-2022 | 11-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 100 | L | 11 BLN | 14-05-2021 | 08-04-2022 | 10-04-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 101 | L | 1 THN 10 H | 08-05-2021 | 19-05-2022 | 24-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 102 | L | 1 THN 4 BLN | 04-12-2020 | 09-04-2022 | 11-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 103 | P | 9 BLN | 22-07-2021 | 20-04-2022 | 22-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 104 | P | 9 BLN | 31-01-2021 | 21-04-2022 | 22-04-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 105 | P | 1 THN 6 BLN | 24-11-2020 | 01-05-2022 | 04-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 106 | L | 8 BLN | 11-02-2022 | 19-10-2022 | 21-10-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 107 | L | 9 BLN | 17-08-2021 | 07-05-2022 | 09-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 108 | L | 1 THN 1 BLN | 10-04-2021 | 08-05-2022 | 10-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 109 | P | 1 THN 3 H | 10-05-2021 | 13-05-2022 | 16-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 110 | L | 1 THN 10 BLN | 22-07-2020 | 19-05-2022 | 21-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 111 | L | 11 BLN 12 H | 31-05-2021 | 19-05-2022 | 21-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 112 | P | 1 THN 6 BLN | 22-11-2020 | 16-05-2022 | 21-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 113 | L | 1 THN 3 H | 14-05-2021 | 17-05-2022 | 20-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 114 | P | 3 THN 7 BLN | 02-10-2018 | 18-05-2022 | 23-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 115 | P | 2 THN 6 BLN | 24-04-2019 | 01-10-2022 | 03-10-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 116 | L | 6 BLN 17 H | 31-01-2022 | 14-08-2022 | 15-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 117 | P | 3 THN 2 BLN | 15-03-2019 | 22-05-2022 | 24-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 118 | P | 4 BLN 14 H | 09-01-2022 | 23-05-2022 | 28-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 119 | L | 1 THN 6 BLN | 27-11-2020 | 23-05-2022 | 25-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 120 | L | 5 BLN | 05-12-2021 | 26-05-2022 | 28-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 121 | P | 1 THN 9 BLN | 26-08-2020 | 27-05-2022 | 29-05-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 122 | P | 1 BLN | 13-05-2022 | 28-06-2022 | 01-07-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 123 | L | 7 BLN | 14-10-2021 | 28-05-2022 | 01-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 124 | L | 10 BLN | 10-07-2021 | 30-05-2022 | 01-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 125 | P | 1 THN 1 BLN | 15-04-2021 | 30-05-2022 | 02-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 126 | L | 10 BLN | 17-07-2021 | 30-05-2022 | 02-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 127 | L | 2 THN 4 BLN | 23-09-2020 | 30-05-2022 | 01-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 128 | P | 3 THN 3 BLN | 24-03-2019 | 01-06-2022 | 04-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 129 | L | 1 THN 4 BLN | 04-02-2021 | 02-06-2022 | 05-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 130 | L | 9 BLN | 27-09-2021 | 04-06-2022 | 08-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 131 | P | 1 THN 1 BLN | 17-05-2021 | 05-06-2022 | 07-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 132 | P | 4 BLN | 08-02-2022 | 10-06-2022 | 14-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 133 | P | 1 THN 9 BLN | 24-09-2020 | 07-06-2022 | 11-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 134 | L | 11 BLN | 25-07-2021 | 08-06-2022 | 10-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 135 | L | 1 THN 4 BLN | 07-02-2021 | 08-06-2022 | 11/06/2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 136 | L | 2 THN 11 BLN | 27-07-2019 | 08-06-2022 | 11-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 137 | L | 2 THN 10 BLN | 18-08-2019 | 09-06-2022 | 10-06-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 138 | L | 3 BLN 7 H | 02-03-2022 | 09-06-2022 | 13-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 139 | L | 9 BLN | 23-09-2021 | 09-06-2022 | 13-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 140 | L | 11 BLN | 01-07-2021 | 11-06-2022 | 14-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 141 | L | 6 BLN | 28-12-2021 | 12-06-2022 | 18-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 142 | P | 11 BLN | 18-07-2021 | 12-06-2022 | 14-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 143 | P | 3 THN 2 BLN | 24-04-2019 | 14-06-2022 | 17-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 144 | P | 2 THN 3 BLN | 25-03-2020 | 16-06-2022 | 18-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 145 | P | 1 THN 10 BLN | 29-04-2020 | 21-06-2022 | 23-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 146 | L | 11 BLN | 06-07-2021 | 22-06-2022 | 24-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 147 | P | 4 THN 4 BLN | 18-02-2018 | 23-06-2022 | 27-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 148 | L | 5 BLN | 05-01-2022 | 23-06-2022 | 25-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 149 | L | 2 THN 8 BLN | 15-11-2019 | 03-07-2022 | 04-07-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 150 | P | 1 THN 2 BLN | 10-06-2021 | 29-08-2022 | 31-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 151 | L | 1 THN 8 BLN | 23-11-2020 | 05-07-2022 | 07-07-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 152 | P | 4 THN 1 BLN | 10-10-2018 | 24-11-2022 | 28-11-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 153 | P | 1 THN 10 BLN | 29-10-2020 | 23-08-2022 | 25-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 154 | P | 11 BLN | 08-11-2021 | 06-08-2022 | 08-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 155 | L | 1 THN 11 BLN | 22-08-2020 | 31-07-2022 | 02-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 156 | P | 1 THN 3 BLN | 06-05-2021 | 01-08-2022 | 03-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 157 | P | 3 THN 6 BLN | 12-02-2019 | 03-08-2022 | 06-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 158 | L | 1 THN 7 BLN | 30-01-2021 | 03-08-2022 | 06-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 159 | P | 1 THN 5 BLN | 07-03-2021 | 05-08-2022 | 08-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 160 | L | 2 THN 2 BLN | 26-06-2020 | 05-08-2022 | 07-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 161 | L | 7 BLN | 15-01-2022 | 06-08-2022 | 12-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 162 | P | 1 THN 9 BLN | 30-11-2020 | 07-08-2022 | 08-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 163 | L | 3 THN 15 H | 04-08-2019 | 19-08-2022 | 20-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 164 | P | 2 THN 3 BLN | 04-07-2020 | 29-10-2022 | 02-10-2022 | DIARE AKUT | TIDAK SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 165 | L | 2 THN 4 BLN | 21-04-2020 | 12-08-2022 | 14-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 166 | L | 4 THN 2 BLN | 22-06-2018 | 10-08-2022 | 12-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 167 | L | 2 BLN | 29-06-2022 | 11-08-2022 | 13-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 168 | L | 11 BLN | 19-09-2021 | 12-08-2022 | 16-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 169 | L | 10 BLN | 10-10-2021 | 13-08-2022 | 16-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 170 | L | 11 BLN | 29-10-2021 | 17-08-2022 | 23-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 171 | P | 3 THN 3 BLN | 09-05-2019 | 13-08-2022 | 17-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 172 | L | 9 BLN | 08-11-2021 | 16-08-2022 | 20-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 173 | L | 2 THN 9 BLN | 10-11-2019 | 17/08/2022 | 19-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 174 | L | 1 THN 7 BLN | 14-04-2020 | 23-11-2022 | 30-11-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 175 | L | 7 BLN | 01-01-2022 | 18-08-2022 | 21-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 176 | L | 1 THN 10 BLN | 19-10-2020 | 21-08-2022 | 25-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 177 | L | 2 THN 3 BLN | 15-05-2020 | 21-08-2022 | 25-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 178 | P | 1 THN 3 BLN | 14-05-2021 | 22-08-2022 | 24-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 179 | P | 1 THN 10 BLN | 28-10-2020 | 23-08-2022 | 26-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 180 | L | 1 BLN | 27-07-2022 | 27-08-2022 | 29-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 181 | P | 2 THN 5 BLN | 12-03-2020 | 27-08-2022 | 31-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 182 | P | 3 THN 8 BLN | 31-12-2018 | 28-08-2022 | 31-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 183 | L | 2 THN 4 BLN | 04-04-2020 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 184 | L | 3 THN 1 BLN | 27-08-2019 | 02-09-2022 | 06-09-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK + ANTIBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |
| 185 | L | 3 THN 4 BLN | 02-02-2019 | 04-06-2022 | 08-06-2022 | DIARE AKUT | SEMBUH | ZINK + PROBIOTIK | DEHIDRASI RINGAN - SEDANG |

Lampiran 2: Hasil SPSS IBM 23

Analisis Univariat

Frequency Table

Usia Bayi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | >28 hari - 1 tahun | 54 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
| | >1 tahun-5 tahun | 131 | 70.8 | 70.8 | 100.0 |
| | Total | 185 | 100.0 | 100.0 | |

Jenis Kelamin

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Laki-laki | 114 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| | Perempuan | 71 | 38.4 | 38.4 | 100.0 |
| | Total | 185 | 100.0 | 100.0 | |

Derajat Dehidrasi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tanpa Dehidrasi | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | Dehidrasi Ringan-Sedang | 183 | 98.9 | 98.9 | 100.0 |
| | Total | 185 | 100.0 | 100.0 | |

Diagnosis

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Diare Akut | 185 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Antibiotik

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid ampisilin | 42 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| seftriakson | 8 | 11.8 | 11.8 | 73.5 |
| kontrimoksazol | 5 | 7.4 | 7.4 | 80.9 |
| sefiksim | 13 | 19.1 | 19.1 | 100.0 |
| Total | 68 | 100.0 | 100.0 | |

Luaran Klinis

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Sembuh | 171 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |
| Tidak Sembuh | 14 | 7.6 | 7.6 | 100.0 |
| Total | 185 | 100.0 | 100.0 | |

Analisis Bivariat

Crosstabs

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Tatalaksana * Luaran Klinis | 185 | 100.0% | 0 | 0.0% | 185 | 100.0% |

Tatalaksana * Luaran Klinis Crosstabulation

| | | | Luaran Klinis | | Total |
|-------------|------------------------|------------|---------------|--------------|--------|
| | | | Sembuh | Tidak Sembuh | |
| Tatalaksana | Tunggal : Zink / | Count | 6 | 4 | 10 |
| | Probiotik | % of Total | 3.2% | 2.2% | 5.4% |
| | Kombinasi 1 : Zink + | Count | 103 | 5 | 108 |
| | Probiotik / Zink + | % of Total | 55.7% | 2.7% | 58.4% |
| | Antibiotik | | | | |
| | Kombinasi 2 : Zink + | Count | 62 | 5 | 67 |
| | Probiotik + Antibiotik | % of Total | 33.5% | 2.7% | 36.2% |
| Total | | Count | 171 | 14 | 185 |
| | | % of Total | 92.4% | 7.6% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) | Point Probability |
|---------------------------------|---------------------|----|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 16.371 ^a | 2 | .000 | .002 | | |
| Likelihood Ratio | 9.667 | 2 | .008 | .006 | | |
| Fisher's Exact Test | 10.535 | | | .004 | | |
| Linear-by-Linear Association | 2.627 ^b | 1 | .105 | .141 | .083 | .053 |
| N of Valid Cases | 185 | | | | | |

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76.

b. The standardized statistic is -1,621.

Lampiran 3 Etik Penelitian



Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016364, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION"

No: E.036/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Azifah Ummu Khatsum
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"PENGARUH PENATALAKSANAAN DIARE AKUT PADA BAYI USIA 1-59 BULAN
TERHADAP LUARAN KLINIS DI RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2022"**

**"THE IMPACT OF THE ACCUTE DIARRHEA ON CHILDREN 1-59 MONTH REGARDING
THE KLINIS LUARAN AT RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 28, 2023 until December 28, 2024.

December 28, 2023
Professor and Chairperson,

Sriany Ismail, S.Si., M.Si



Lampiran 4 Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

| | | |
|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nomor | : 32133/S.01/PTSP/2023 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : - | Direktur RSUD Haji Makassar |
| Perihal | : <u>Izin penelitian</u> | |

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5581/Un.06/LP2M/PP.00.9/12/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

| | |
|-------------------|--|
| N a m a | : AZIFAH UMMU KHALTSUM |
| Nomor Pokok | : 70600119006 |
| Program Studi | : Pendidikan Dokter |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1) |
| Alamat | : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa |

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Pengaruh Penatalaksanaan Diare Akut Pada Bayi Usia 1 - 59 Bulan Terhadap Luaran Klinis Di RSUD Haji Makassar. "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Desember 2023 s/d 20 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

| | |
|---|--|
|  | ASRUL SANI, S.H., M.Si. Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008 |
|---|--|

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR

Jln. Dg. Ngeppe No. 14 Telp. 856091 – 855894 Fax. (0411) 855934 Makassar 90224

e-mail: rsudhaji.sulselprov@gmail.com

MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 445/1927/RSUDHaji

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Dra. YUSTIATY YUSUF, SE, M.Si
NIP : 19661218 199603 2 001
PANGKAT/GOL. : PEMBINA TK 1/IVb
JABATAN : KABID. DIKLIT DAN INOVASI

Dengan ini menerangkan :

NAMA : AZIFAH UMMU KHALTSUM
NIM : 70600119006
FAKULTAS/PRODI : PENDIDIKAN DOKTER
INSTITUSI/LEMBAGA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Adalah benar telah melakukan Penelitian di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka penyusunan SKRIPSI pada tanggal : 28 Desember 2023 s/d 20 Januari 2024 dengan Judul:

**"PENGARUH PENATALAKSANAAN DIARE AKUT PADA BAYI USIA 1- 59 BULAN TERHADAP LUARAN
KLINIS DI RSUD HAJI MAKASSAR"**



Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Januari 2024

KABID. DIKLIT DAN INOVASI,


Dra. YUSTIATY YUSUF, S.E, M.Si
NIP. 19661218 199603 2 001

Lampiran 6 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Azifah Ummu Khaltsum
2. NIM : 70600119006
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 2 Juli 2000
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Borong Raya Ir.2 dalam no.7
8. Orang Tua :
 - a. Ayah : H. Muh. Jufri, SE.MM
 - b. Ibu : Hj. Nuliati, HM. SE

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Unggulan Toddopuli
2. SMP : SMP Negeri 8 Makassar
3. SMA : SMA Negeri 5 Makassar
4. Tahun 2019 melanjutkan Studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Pendidikan Dokter.