

**HUBUNGAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DENGAN LAMA
PERAWATAN PADA ANAK INFEKSI SALURAN KEMIH DI INSTALASI
RAWAT INAP RSUD HAJI MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

MUTIARA GRANT TUNANI

NIM: 70600120007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Grant Tunani

NIM : 70600120007

Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 07 Januari 2002

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Dg. Ngadde Setapak 4 No.2, Makassar

Judul : Hubungan Penggunaan Antibiotik Dengan Lama Perawatan Pada Anak Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Februari 2024

Penyusun,



Mutiara Grant Tunani


70600120007

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Mutiara Grant Tunani, NIM 70600120007, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: “Hubungan Penggunaan Antibiotik Dengan Lama Perawatan Pada Anak Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 28 Februari 2024

Pembimbing 1



dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp.KFR

Pembimbing 2



dr. Rini Fittiani, M.Kes.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Penggunaan Antibiotik Dengan Lama Perawatan Pada Anak Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar**”. yang disusun oleh Mutiara Grant Tunani, NIM 70600120007, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 Februari 2024, bertepatan dengan 18 Sha’ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 28 Februari 2024

18 Sha’ban 1445 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes (.....)

Sekretaris : dr. Rini Fitriani, M. Kes (.....)

Pembimbing I : dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp. KFR (.....)

Pembimbing II : dr. Rini Fitriani, M. Kes (.....)

Penguji I : dr. Destya Maulani, M. Kes., Sp. A (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, MS. (.....)

Diketahui Oleh,

DEKAN Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.
NIP. 198106212006042005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Hubungan Penggunaan Antibiotik Dengan Lama Perawatan Pada Anak Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw beserta para keluarga dan sahabat yang telah mengantarkan umat manusia dari gelapnya zaman kebodohan menuju zaman yang ber peradaban.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Muis, S.Pd. M.Pd. dan ibunda Hj. Wa Tia, S.Kep. Ns. yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberi bantuan moril maupun materilnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Kemudian penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para wakil dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari., M.Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter, dr. Arlina Wiyata Gama., M.Biomed selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter, dosen pengajar mata kuliah yang telah ikhlas

- memberikan ilmu bermanfaat dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp.KFR dan dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku dosen pembimbing penelitian yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk arahan dan membimbing kepada penulis.
 5. dr. Destya Maulani, M.Kes., Sp.A. selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, MS. selaku dosen penguji integrasi keislaman yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan memberi saran terbaik kepada penulis.
 6. Staf akademik Program Studi Pendidikan Dokter yang telah membantu mengatur dan mengurus administrasi selama perkuliahan.
 7. Pegawai RSUD Haji Makassar yang telah memberikan izin dan membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
 8. Muh. Aksel Tunani dan Chairunnisa Ailing Tunani selaku saudara kandung penulis serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan emosional kepada penulis.
 9. Sahabat-sahabat saya Ancep (Andish, Cica, Lia, Nisa, Lintang, Taty, dan Cece) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan memberikan banyak masukan dalam penelitian ini.
 10. Rekan-rekan PSPD dan khususnya mahasiswa Angkatan 2020 (Aponeurosis) yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam keadaan apapun dan senantiasa memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Akhir kata saya mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan Masyarakat luas dan dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT, Aamin, Sekian dan terimakasih.

Makassar, 28 Februari 2024



Mutiara Grant Tunani

70600120007



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Teori.....	13
B. Kerangka Teori.....	49
C. Kerangka Konsep.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Dan Desain Penelitian	51
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	51
C. Populasi Dan Sampel	51
D. Instrumen Penelitian.....	52
E. Langkah Pengolahan Data.....	52
F. Analisa Data	53
G. Metode Pengumpulan Data	54
H. Etika Penelitian	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55

A. Gambaran Umum Penelitian	55
B. Hasil	55
C. Pembahasan.....	58
D. Keterbatasan penelitian	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional.....	7
Tabel 1. 2 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 2.1 Pemilihan antimikroba oral pada infeksi saluran kemih	24
Tabel 2.2 Pemilihan antimikroba parenteral pada infeksi saluran kemih	25
Tabel 2.3 Antibiotik yang digunakan untuk profilaksis	38
Tabel 4.1 Karakteristik sampel	56
Tabel 4.2 Hubungan Jenis Penggunaan dengan Lama Perawatan	57



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori Penelitian.....	49
Bagan 2. 2 Kerangka Konsep Penelitian	50
Bagan 3. 1 Metode Pengumpulan Data	54



DAFTAR SINGKATAN

AAP	: <i>American Academy of Pediatrics</i>
CFU	: <i>Colony Forming Units</i>
Depkes RI	: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
DMSA	: <i>Dimercapto Succinic Acid</i>
<i>E. coli</i>	: <i>Escherichia coli</i>
HR	: Hadis Riwayat
IQR	: <i>Interquartile Range</i>
ISK	: Infeksi saluran kemih
LOS	: <i>Length of Stay</i>
MRI	: <i>Magnetic Resonance Imaging</i>
MSU	: <i>Miksiosistourethrografi</i>
NICE	: <i>National Institute for Health and Clinical Excellence</i>
NKUDIC	: <i>National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse</i>
PIV	: <i>Pielografi Intravena</i>
QI	: <i>Quality Indicator</i>
QS	: Quran Surah
RSUD	: Rumah sakit umum daerah
RVU	: <i>Reflux Vesico-Ureteral</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPSS	: <i>Package for The Social Sciences</i>
SWT	: <i>subḥānahū wa ta’ālā</i>
TK	: Taman Kanak-Kanak

USG : *Ultrasonografi*

VCUG : *Voiding Cystoureterography*



Hubungan Penggunaan Antibiotik Dengan Lama Perawatan Pada Anak Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar

The Relationship Of Antibiotic Use With The Length Of Treatment In Children With Urinary Tract Infections In The Inpatient Installation Of Haji Hospital Makassar

Mutiara Grant Tunani¹, Rahadi Arie Hartoko², Rini Fitriani³, Destya Maulani⁴, Qadir Gassing⁵

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

^{2,3,4}Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar

⁵Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

*Penulis Korespondensi: Email: grantmutiara2002@gmail.com

Telepon: 085341122360

ABSTRAK

Latar Belakang: Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi pada saluran kemih yang terjadi ketika tumbuh dan berkembang biaknya kuman atau mikroba dalam saluran kemih yang dapat menimbulkan gejala klinis. Terapi utama untuk ISK adalah dengan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang meluas bisa menyebabkan penggunaan yang tidak rasional. Ada dua jenis penggunaan obat antibiotik, yaitu: penggunaan tunggal, yang melibatkan pemberian satu jenis antibiotik, dan penggunaan kombinasi, yang melibatkan pemberian dua atau lebih jenis antibiotik. Durasi perawatan atau *length of stay (LOS)* merupakan akumulasi hari pasien mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit.

Tujuan: Mengetahui hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada pasien anak dengan infeksi saluran kemih.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 82 pasien. Data penelitian ini menggunakan data rekam medik.

Hasil: Didapatkan sebanyak 63 (76.8%) sampel dengan jenis penggunaan antibiotik tunggal dan sebanyak 19 (23.2%) sampel dengan jenis penggunaan antibiotik kombinasi dari 82 (100.0%) sampel. Jumlah sampel dengan lama perawatan ≤ 3 hari dengan jenis penggunaan tunggal sebanyak 39 (76.5%) sampel dan jenis penggunaan kombinasi sebanyak 12 (23.5%) sampel. Sampel dengan lama perawatan 4-7 hari dengan jenis penggunaan tunggal sebanyak 24 (77.4%) sampel dan jenis penggunaan kombinasi sebanyak 7 (22.6%) sampel. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis *Chi Square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 1,000 untuk hubungan jenis penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak ISK di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar.

Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan bermakna antara penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar.

Kata kunci: Infeksi saluran kemih; lama perawatan; penggunaan antibiotik

Hubungan Penggunaan Antibiotik Dengan Lama Perawatan Pada Anak Infeksi Saluran Kemih Di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar

The Relationship Of Antibiotic Use With The Length Of Treatment In Children With Urinary Tract Infections In The Inpatient Installation Of Haji Hospital Makassar

Mutiara Grant Tunani¹, Rahadi Arie Hartoko², Rini Fitriani³, Destya Maulani⁴, Qadir Gassing⁵

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

^{2,3,4}Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar

⁵Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

*Penulis Korespondensi: Email: grantmutiara2002@gmail.com

Telepon: 085341122360

ABSTRACT

Background: Urinary tract infection (UTI) is an infection of the urinary tract that occurs when germs or microbes grow and multiply in the urinary tract which can cause clinical symptoms. The main treatment for UTI is antibiotics. Widespread use of antibiotics can lead to irrational use. There are two types of antibiotic drug use: single use, which involves the administration of a kind of antibiotic, and combination use, which consists of the administration of two or more types of antibiotics. Length of stay (LOS) is the accumulation of days a patient receives inpatient services in a hospital.

Objective: To determine the relationship between antibiotic use and length of stay in pediatric patients with urinary tract infections.

Methods: This study is a quantitative study with an analytic observational research design with a cross-sectional approach. The sampling method in this study used a total sampling technique with a total sample size of 82 patients. This research data uses medical record data.

Results: Showed that 63 (76.8%) samples with single antibiotic use and 19 (23.2%) samples with combined antibiotic use out of 82 (100.0%) samples. The number of samples with a length of treatment ≤ 3 days with a single type of use were 39 (76.5%) samples and a combination type of use was 12 (23.5%) samples. Samples with a length of treatment of 4-7 days with a single use type were 24 (77.4%) samples and a combination use type was 7 (22.6%) samples. From the results of data processing using Chi-Square analysis, the p-value of 1.000 was obtained for the relationship between the type of antibiotic use with the length of treatment in children with UTI in the inpatient installation of the Makassar Haji Hospital.

Conclusion: There is no significant relationship between the use of antibiotics and the length of treatment in children with urinary tract infections in the inpatient installation of the Makassar Haji Hospital.

Keywords: Urinary tract infection; length of stay; antibiotic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem saluran kemih merupakan mekanisme dalam tubuh manusia yang berperan dalam menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Struktur anatomi tubuh manusia yang berperan dalam sistem ini mencakup ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Infeksi saluran kemih (ISK) adalah suatu kondisi dimana terdapat sejumlah besar mikroorganisme dalam urin yang dapat menyerang organ-organ tersebut, menyebabkan masalah kesehatan (Anggraini, Candra *et al.*, 2020).

Menurut *National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse (NKUDIC)*, ISK merupakan penyakit paling umum kedua di negara-negara berkembang setelah infeksi saluran pernafasan. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014, jumlah penderita ISK mencapai 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun. *American Academy of Pediatrics (AAP)* menyatakan bahwa 5-14% kunjungan pediatrik adalah pasien ISK, sedangkan di Indonesia diperkirakan 20% kasus pediatrik adalah pasien ISK dan pyelonephritis kronis. Terdapat 8-10% anak perempuan dan 2-3% anak laki-laki di bawah usia 7 tahun mengalami gejala ISK (Amalia, 2019; Rizki Amalia *et al.*, 2022; Tusino & Widyaningsih, 2018).

Di Indonesia, sekitar 35% dari 200 anak yang dievaluasi pada rentang usia 1 hingga 5 tahun mengalami infeksi saluran kemih, sementara 22% dari anak-anak usia 6 hingga 10 tahun juga mengalami kondisi serupa. Lebih rinci, sekitar 33% pria dan 67% wanita terkena infeksi saluran kemih. Data ini mencerminkan tingginya angka kejadian infeksi saluran kemih di kalangan

anak-anak di Indonesia. Infeksi saluran kemih sering terjadi pada bayi laki-laki yang baru lahir dalam tiga bulan pertama kehidupan, pada anak perempuan sering di tahun pertama kehidupan. Angka kejadian infeksi saluran kemih berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, ras dan Riwayat sirkumsisi (Amalia, 2019; Rizki Amalia *et al.*, 2022; Tusino & Widyaningsih, 2018).

Escherichia coli adalah mikroorganisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Tanda dan gejala klinis infeksi saluran kemih pada anak sulit dikenali, sehingga prevalensinya mungkin diremehkan. Demam, penurunan berat badan, keterlambatan pertumbuhan, kehilangan nafsu makan, mengi, kolik, muntah, diare, sakit kuning, bengkak, dan nyeri pada palpasi ginjal merupakan tanda dan gejala klinis ISK pada bayi dan anak. Beberapa anak juga mengalami infeksi saluran kemih asimtomatik. Faktor predisposisi seperti; stenosis saluran kemih, kelainan struktural, urolitiasis, benda asing, refluks, sembelit kronis dan faktor lainnya dan faktor imun pasien mempengaruhi terjadinya infeksi saluran kemih (Rizki Amalia *et al.*, 2022; Tusino & Widyaningsih, 2018).

Penggunaan antibiotik yang meluas dapat menyebabkan penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Pemberian terapi antibiotik yang tidak rasional dapat menimbulkan risiko seperti reaksi alergi, toksisitas, perubahan fisiologis dan resistensi antibiotik (Utaminigrum *et al.*, 2022).

Lama perawatan atau dapat disebut *length of stay (LOS)* merupakan akumulasi dari hari pertama hingga hari terakhir pasien mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit dan sebagai indikator pelayanan di suatu rumah sakit (Rachoin *et al.*, 2020).

Dalam praktiknya, umat Muslim dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medik yang kompeten, memperoleh obat dari sumber yang terpercaya,

dan memastikan bahwa obat yang digunakan sesuai dengan petunjuk dan dosis yang direkomendasikan. Penting juga untuk memperhatikan aspek kehalalan dan kesucian obat yang digunakan, dengan memastikan bahwa obat tersebut memenuhi persyaratan agama. Dalam Islam, upaya untuk mencari obat yang baik dan berkualitas adalah bagian dari usaha yang dianjurkan dalam menjaga kesehatan dan pemulihan penyakit sebagaimana yang ada dalam QS Al-Isra/17:82.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَرْبُدُّ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian." (QS Al-Isra' /17: 82)

Dari ayat ini terlihat terkait dengan ayat-ayat sebelumnya melalui pemahaman terhadap penggunaan huruf "wauw", yang sering diterjemahkan sebagai "sedangkan". Jika ayat ini diinterpretasikan demikian, maka ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa kebenaran akan tetap kuat dan kebatilan tidak akan hilang. Al-Qur'an telah diturunkan sebagai obat penawar keraguan dan penyakit-penyakit jiwa, serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an tidak akan memberikan keuntungan tambahan bagi orang-orang zalim, selain menambah kerugian akibat kekufuran mereka (Shihab, 2002).

Ayat ini dimasukkan oleh Thabathaba'i sebagai awal kelompok baru, yang terkait dengan uraian surah ini mengenai keistimewaan Al-Qur'an dan fungsinya sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad saw. Kesimpulan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa Al-Qur'an memiliki fungsi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa (Shihab, 2002).

Kata "*syifa'*" dalam ayat, sering diartikan sebagai kesembuhan atau obat, dapat juga dimaknai sebagai kemerdekaan dari kekurangan atau ketiadaan

hambatan dalam memperoleh manfaat. Thabathaba'i mencatat bahwa beberapa ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani, meskipun interpretasi ini dipertanyakan (Shihab, 2002).

Ayat ini menekankan bahwa Al-Qur'an bukan hanya menjadi obat penawar, tetapi juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang mukmin yang mendengarkan dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari bacaan serta pengamalan ayat-ayat suci tersebut. Sementara bagi orang-orang kafir yang zalim terhadap diri mereka sendiri, mendengarkan Al-Qur'an justru semakin menambah kerugian mereka karena mereka mendustakannya. Pendekatan terhadap pengobatan dengan Al-Qur'an dapat diartikan dalam dua cara. Pertama, Al-Qur'an sebagai obat penawar untuk menyembuhkan penyakit hati, menghilangkan kebodohan, dan membuka penutup hati agar dapat memahami mukjizat dan petunjuk-petunjuk Allah. Kedua, Al-Qur'an juga dapat digunakan sebagai sarana pengobatan fisik, seperti dalam ruqyah, perlindungan, dan doa-doa pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw (Az-Zuhaili, 2003; Shihab, 2002).

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri dapat berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan dan sebagai sumber rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam konteks ini, mendapatkan obat yang baik juga dapat merujuk pada pengetahuan dan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an untuk menemukan jalan kesembuhan yang tepat.

Adapun dalam Hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut antara lain;

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya:

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya mencari pengobatan untuk penyakit. Allah SWT dalam rahmat-Nya juga menurunkan obat-obatan yang dapat digunakan dalam proses penyembuhan.

Menurut peneliti, penelitian ini sangat relevan mengingat pentingnya manajemen obat dalam konteks perawatan kesehatan. Di banyak rumah sakit, kebijakan dan praktik penggunaan obat seringkali menjadi fokus perhatian karena berpengaruh langsung pada kualitas perawatan pasien dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi lama perawatan pasien terkait dengan pola penggunaan obat di rumah sakit, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam bagi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan rumah sakit dapat mengimplementasikan perubahan atau strategi yang lebih baik dalam manajemen obat, yang pada gilirannya dapat mengurangi lama perawatan pasien dan meningkatkan efisiensi perawatan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya belum ada pembahasan terkait hubungan jenis pemilihan antibiotik tunggal dan kombinasi dengan lama perawatan pada pasien anak dengan ISK, terkhusus di RSUD Haji Makassar.

Berdasarkan beberapa aspek tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di insalasi rawat inap RSUD Haji Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah ditemukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana

hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar?”

C. Hipotesis

1. Hipotesis nol (H_0)

Tidak ada hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih.

2. Hipotesis alternatif (H_a)

Terdapat hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih.



D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 2. 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen				
Jenis penggunaan	Jenis penggunaan obat terbagi menjadi dua, yaitu:	Melihat data rekam medik pasien	1. Tunggal 2. Kombinasi	Nominal
	a. Tunggal adalah pemberian satu golongan obat antibiotik.			
	b. Kombinasi adalah pemberian dua atau lebih golongan obat antibiotik (Kementerian Kesehatan RI, 2013).			
ISK dengan komplikasi	Infeksi saluran kemih (ISK) yang disertai komplikasi merujuk pada kondisi infeksi yang terkait dengan suatu situasi tertentu, seperti adanya kelainan struktural atau fungsional pada saluran genitourinari atau keberadaan penyakit yang mendasarinya, serta dapat	Melihat data rekam medik pasien	1. ISK dengan komplikasi 2. ISK tanpa komplikasi	Nominal

Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
	meningkatkan risiko penularan infeksi atau kegagalan dalam menjalani terapi, dan atau dengan infeksi lainnya (IDAI, 2021; Wagenlehner & Naber, 2017).			
Variabel Dependen				
Lama perawatan	Lama perawatan atau <i>Length of Stay (LOS)</i> merupakan akumulasi dari hari pertama hingga hari terakhir pasien mendapat pelayanan rawat inap di rumah sakit (Rachoin <i>et al.</i> , 2020)	Melihat data rekam medik pasien	0: ≤ 3 hari 1:4-7 hari	Nominal

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini mencari hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih dengan melihat data rekam medik pasien di RSUD Haji Makassar.

E. Kajian Pustaka

Tabel 2. 2 Kajian Pustaka

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan Penelitian
<p>Anggraini, Wirda Candra, Tiffany Maulida Maimunah, Siti Sugihantoro, Hajar (2020)</p>	<p>Evaluasi Kualitatif Penggunaan Antibiotik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih dengan Metode Gyssens Metode: Cross Sectional</p>	<p>Hasil evaluasi kualitatif menunjukkan, sebesar 20% termasuk kategori 0 (penggunaan antibiotik tepat/bijak); 2,86% kategori I (penggunaan antibiotik tidak tepat waktu); 28,57% kategori II A (penggunaan antibiotik tidak tepat dosis); 34,29% kategori II B (penggunaan antibiotik tidak tepat interval pemberian); 11,42% kategori III B (penggunaan antibiotik terlalu singkat); dan 2,86% kategori IV A (ada antibiotik lain yang lebih efektif).</p>	<p><u>Persaman:</u> Variabel penelitian yaitu penggunaan antibiotik pada pasien ISK. <u>Perbedaan:</u> Variabel penelitian yaitu hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada pasien anak dengan ISK.</p>

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan Penelitian
Suharjo, Muhammad Irfan Darmawan, Endang Kurniawan, Nurcholid Umam (2022)	Perbandingan Efektivitas Sefalosporin Generasi ke-3 dengan Kombinasi Sefalosporin Generasi ke-3 dan Ampisilin pada pasien Infeksi Saluran Kemih di Bangsal Anak RS PKU Muhammadiyah Bantul Metode: <i>Kohort Prospektif</i>	Terdapat efektivitas antara kedua kelompok antibiotik tunggal dan kombinasi menunjukkan perbedaan yang tidak bermakna ($p>0,05$) terhadap penurunan suhu badan, bakteriuria, leukosit esterase dan lama rawat inap. Pada luaran terapi leukosituria terjadi perbedaan bermakna ($p<0,05$).	<u>Persamaan:</u> Variabel penelitian yaitu antibiotik tunggal dan kombinasi. <u>Perbedaan:</u> Variabel penelitian yaitu hubungan pemberian antibiotik tunggal atau kombinasi dengan lama perawatan pasien ISK.
Agus Tusino, Niken Widyaningsih (2018)	Karakteristik Infeksi Saluran Kemih Pada Anak Usia 0-12 Tahun Di Rs X Kebumen Jawa Tengah	Pada penelitian ini didapatkan 36 pasien anak dengan infeksi saluran kemih, 53% laki- laki, 47% perempuan dengan rentang usia	<u>Persamaan:</u> Sampel yang digunaka berupa pasien anak dengan diagnosis ISK. <u>Perbedaan:</u>

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan Penelitian
	Metode: <i>Cross Sectional</i>	terbanyak 5-12 tahun. Sebanyak 26 pasien dengan suhu.	Variabel penelitian yaitu faktor risiko ISK pada anak, gejala klinis, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang dan pengobatan pasien.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan menerapkan ilmu yang didapatkan terkhusus terkait hubungan penggunaan antibiotik pada pasien anak dengan infeksi saluran kemih.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyediaan data tambahan dan bahan masukan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan Kesehatan.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat yaitu sebagai sumber informasi atau pengetahuan tentang penggunaan obat antibiotik dengan lama perawatan pasien infeksi saluran kemih pada anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

a. Definisi

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah infeksi pada saluran kemih, khususnya ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, yang terjadi ketika virulensi meningkat, pertahanan tubuh menurun, serta terdapat infeksi dan invasi bakteri. ISK merupakan jenis infeksi kedua yang paling sering setelah infeksi saluran pernapasan. ISK menunjukkan adanya suatu mikroorganisme seperti bakteri, virus dan jamur dalam urine yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit serius pada usia anak-anak (Inayah Fitri, 2019; Rizki Amalia *et al.*, 2022).

Kehadiran bakteri dalam urin disebut bakteriuria. Bakteriuria dianggap signifikan jika pertumbuhan mikroba murni lebih besar dari 10^5 colony forming units (CFU)/mL urin. Bakteriuria signifikan tanpa gejala klinis ISK disebut bakteriuria asimtomatik, sedangkan bakteriuria signifikan yang disertai gejala klinis ISK disebut bakteriuria asimtomatik (IDAI, 2021; Inayah Fitri, 2019).

b. Epidemiologi

Menurut *National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse* (NKUDIC), Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan penyakit paling umum kedua di negara-negara berkembang setelah infeksi saluran pernafasan. *American Academy of Pediatrics* menyatakan bahwa 5-

14% kunjungan pediatrik adalah pasien ISK. Menurut Stamm & Norrby (2001), setiap tahunnya terdapat sekitar 150 juta pasien mengalami infeksi saluran kemih. Di Amerika Serikat, kejadian ISK tercatat terjadi pada 10,5 juta pasien, termasuk bayi laki-laki, pria lanjut usia, dan wanita segala usia. Pada 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015, Statistik Kementerian Kesehatan Singapura mencatat bahwa terdapat 4.144 pasien dengan ISK yang mendapatkan perawatan dirumah sakit selama 2-4 hari atau hingga 8 hari. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI), memperkirakan bahwa jumlah pasien ISK di Indonesia mencapai 90-100 penderita per 100.000 penduduk per tahun atau setara dengan sekitar 180.000 kasus baru per tahun (Amalia, 2019; Costa *et al.*, 2021; Rizki Amalia *et al.*, 2022).

Infeksi saluran kemih adalah salah satu infeksi bakteri yang paling umum terjadi pada anak-anak, mempengaruhi sekitar 7,8% anak di bawah usia 19 tahun dengan gejala dan/atau dengan demam. Berdasarkan data dari Depkes RI pada tahun 2014, jumlah penderita ISK mencapai 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Insiden ISK pada anak bervariasi berdasarkan usia, ras/etnis, jenis kelamin, dan status sirkumsisi. Prevalensi ISK lebih sering terjadi pada anak laki-laki (3,7%) dibandingkan anak perempuan (2%) pada tahun pertama kehidupannya, dan hal ini mungkin merupakan gejala pertama kelainan kongenital pada ginjal dan saluran kemih (Amalia, 2019; Daniel *et al.*, 2023).

c. Klasifikasi

ISK pada anak dapat diklasifikasikan berdasarkan variasi gejala klinis, lokasi infeksi, dan kelainan pada saluran kemih. Klasifikasi ISK berdasarkan gejala terbagi menjadi ISK asimtomatik, di mana bakteriuria bermakna terjadi tanpa adanya gejala, dan ISK simtomatik, di mana bakteriuria bermakna disertai dengan gejala dan tanda klinik. Dalam hal lokasi infeksi, ISK dapat dibedakan menjadi ISK atas dan ISK bawah. Selain itu, dari perspektif kelainan pada saluran kemih, ISK dapat dibagi menjadi ISK simpleks dan ISK kompleks (IDAI, 2021).

ISK asimtomatik merujuk pada kondisi di mana terdapat bakteriuria bermakna tanpa disertai manifestasi klinis terkait yang mungkin terjadi pada segala usia dan bakteri yang paling umum ditemukan yaitu *E. coli* serta bakteriuria simptomatis. Sementara ISK simtomatik menunjukkan adanya bakteriuria bermakna bersamaan dengan gejala dan tanda klinik. Sekitar 10-20% dari kasus ISK yang sulit diklasifikasikan sebagai pielonefritis atau sistitis, baik berdasarkan gejala klinik maupun pemeriksaan penunjang, disebut sebagai ISK non spesifik (IDAI, 2021; Pardede, 2018).

Membedakan antara ISK atas atau pielonefritis dengan ISK bawah (sistitis dan urethritis) menjadi hal yang sangat penting karena adanya risiko signifikan terkait parut ginjal pada kasus pielonefritis, sementara hal tersebut tidak terjadi pada kasus sistitis. Oleh karena itu, pendekatan dalam tata laksana, termasuk pemeriksaan, pemberian antibiotik, dan durasi terapi, menjadi berbeda (IDAI, 2021).

Untuk keperluan klinis dan manajemen medik, ISK dapat diklasifikasikan menjadi ISK simpleks (*uncomplicated UTI*) dan ISK

kompleks (*complicated UTI*). ISK kompleks merujuk pada ISK yang menyertai kelainan anatomi dan/atau fungsi pada saluran kemih yang dapat menyebabkan stasis atau aliran balik (refluks) urin. Kelainan pada saluran kemih ini bisa berupa *Refluks Vesiko-Ureteral* (RVU), batu saluran kemih, obstruksi, anomali saluran kemih, buli-buli neurogenik, benda asing, dan sebagainya. Sementara ISK simpleks adalah ISK yang tidak disertai kelainan struktural maupun fungsional pada saluran kemih (IDAI, 2021).

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) membedakan antara ISK atipikal dan ISK berulang. Kriteria untuk ISK atipikal melibatkan kondisi pasien yang berat, produksi urin yang sedikit, adanya massa di abdomen atau kandung kemih, peningkatan tingkat kreatinin dalam darah, sepsis, kurang respons terhadap antibiotik dalam 48 jam, dan disebabkan oleh bakteri selain *E. coli*. Sementara ISK berulang merujuk pada terjadinya dua kali atau lebih episode pielonefritis akut atau ISK atas, atau satu episode pielonefritis akut atau ISK atas yang diikuti oleh satu atau lebih episode sistitis atau ISK bawah, atau tiga atau lebih episode sistitis atau ISK bawah (IDAI, 2021).

d. Etiologi

Infeksi saluran kemih sering disebabkan oleh adanya bakteri patogen, salah satu bakteri yang paling sering yaitu *Escherichia coli* (60-80%) pada ISK serangan pertama. Bakteri patogen lain yang sering menyebabkan ISK yaitu *Proteus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, dan *Streptococci grup B*. Bakteri selain *E. coli* juga sering menjadi penyebab ISK, antara lain *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas*

aeruginosa, *Enterobacter aerogenes*, *Morganella morganii*, *Staphylococcus*, dan *Enterococcus* (IDAI, 2021; Inayah Fitri, 2019).

Pada kasus ISK kompleks, bakteri dengan virulensi rendah seperti *Pseudomonas*, kelompok *Streptokokus grup B*, *Staphylococcus aureus* atau epidermidis sering ditemukan. *Haemophilus influenzae* dan *parainfluenza* dilaporkan sebagai penyebab ISK pada anak. Meskipun kuman-kuman ini tidak dapat tumbuh pada media biakan standar, mereka masih dapat menjadi penyebab ISK. Dalam kasus penyebab ISK oleh *Proteus*, perlu dicurigai kemungkinan adanya batu *struvit (magnesium-ammonium-fosfat)*, karena bakteri *proteus* menghasilkan enzim *urease* yang memecah ureum menjadi amonium, menyebabkan peningkatan pH urin menjadi 8-8,5. Pada urin yang bersifat alkalis, beberapa elektrolit seperti kalsium, magnesium, dan fosfat cenderung mengendap (IDAI, 2021).

e. Faktor risiko

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya ISK pada anak antara lain sirkumsisi, konstipasi kronis, status gizi, cara menjaga higienitas genitalia, kelainan anatomi, usia, jenis kelamin dan kebiasaan menahan buang air kecil serta riwayat ISK sebelumnya. Sirkumsisi adalah salah satu faktor risiko yang berhubungan erat dengan insiden ISK pada anak laki-laki, sebab lingkungan pada bawah preputium yang lembab dapat memudahkan bakteri untuk hidup. Sehingga meningkatkan insiden ISK sebanyak 32,1% pada anak laki-laki (Hadiyanto *et al.*, 2023)..

Konstipasi juga dapat meningkatkan terjadinya ISK yang disebabkan karena peregangan rektum menyebabkan dinding buli-buli mengalami penekanan dan obstruksi, sehingga tekanan serta volume sisa

dapat meningkat yang memungkinkan bakteri dapat berkembang menyebabkan ISK. Status gizi kurang dapat menyebabkan penurunan sistem imunitas tubuh yang memungkinkan penyebab infeksi untuk berkembang, selain itu infeksi saluran kemih dapat juga menyebabkan terjadinya penurunan status gizi sehingga penderita dapat mengalami muntah, diare, demam, dan lain-lain (Hadiyanto *et al.*, 2023).

Peningkatan insiden terjadinya ISK juga berkaitan dengan higienitas genitalia. Cara membersihkan genitalia yang benar yaitu dari arah depan kebelakang sehingga dapat mengurangi pajanan bakteri serta jamur penyebab ISK. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih ialah disfungsi buli-buli, obat immunosupresif, urolitiasis, serta diabetes melitus (Daniel *et al.*, 2023; Hadiyanto *et al.*, 2023).

f. Patofisiologi

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan infeksi yang disebabkan dari mikroorganisme yang berkolonisasi didalam saluran kemih. Mikroorganisme ini dapat masuk melalui beberapa cara, yaitu infeksi *ascending*, *hematogen*, *limfogen* dan langsung dari organ yang telah terinfeksi. ISK dapat diidentifikasi sebagai dua jenis, yaitu infeksi yang terfokus pada kandung kemih dan uretra (sistitis dan uretritis), dan infeksi yang menyerang bagian atas saluran kemih, melibatkan ureter, sistem pengumpulan, dan parenkim ginjal (pielonefritis). Proses penyebaran infeksi secara naik dalam saluran kemih melibatkan faktor-faktor kompleks seperti adhesi bakteri, virulensi, kemampuan motilitas, serta pertimbangan terhadap faktor anatomi, humoral, dan genetik pada inang (Alwi, 2014; Zorc *et al.*, 2005).

Biofilm adalah suatu koloni mikroorganisme yang terstruktur dan dibungkus oleh matriks polimernya sendiri, menciptakan pelindung dan melekat pada struktur tubuh, batu, atau benda asing. Biofilm juga melibatkan berbagai patogen yang memiliki tingkat virulensi relatif rendah, tetapi dapat menyebabkan infeksi yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Stasis urin yang disebabkan oleh disfungsi berkemih atau obstruksi memudahkan bakteri untuk menginvasi jaringan dan merangsang respons inang. Benda asing seperti batu dan kateter umumnya terkait dengan pembentukan biofilm (Kranz *et al.*, 2020).

Secara umum infeksi pada ISK disebabkan dari invasi mikroorganisme secara ascending dari uretra ke dalam buli-buli. Penyebaran infeksi mikroorganisme melalui perantaraan darah atau hematogen yang menyebabkan ISK hanya terbatas pada beberapa jenis bakteri yang relatif jarang seperti *Staphylococcus aureus*, *Candida sp.*, *Salmonella* dan *Mycobacterium tuberculosis* yang menginduksi infeksi primer dari bagian tubuh lainnya (Pranawa *et al.*, 2015).

g. Gejala klinik ISK

Infeksi saluran kemih merupakan kondisi patologis dimana gejala klinik ISK terkhusus pada anak sangat beragam. Kondisi ini ditentukan dari intensitas reaksi inflamasi, letak atau lokasi infeksi, dan umur pasien. Gejala umum yang paling sering terjadi adalah demam. Pada kondisi lainnya, gejala yang dapat timbul yaitu nyeri perut, disuria, poliuria dan hematuria (Adhitama *et al.*, 2021; IDAI, 2021).

Pada neonatus dan bayi, gejala klinis ISK juga tidak spesifik seperti demam, kehilangan nafsu makan, mengerang, sakit perut, muntah, diare,

jaundice, distenti abdomen, penurunan berat badan serta pertumbuhan yang buruk. Pada kelompok usia ini, jika terdapat demam tinggi dapat dianggap pielonefritis. Pada anak yang lebih besar atau dewasa, gejala klinis seringkali lebih ringan, termasuk gejala saluran kemih lokal berupa sering miksi, disuria, urgensi, frekuensi, enuresis serta sakit perut, sakit punggung atau demam tinggi. Infeksi saluran kemih mungkin terjadi berulang ada 30-40% pasien, terutama pada pasien dengan kelainan anatomi seperti obstruksi saluran kemih, refluks vesikoureter, dan lain-lain (Pardede, 2018).

h. Diagnosis

Diagnosis ISK ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium yang memerlukan biakan urin. Prosedur pemeriksaan urinalisis dan biakan urin memiliki peranan utama dalam menegakkan diagnosis ISK. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan urin menjadi sangat krusial dalam proses diagnostik ini. Infeksi Saluran Kemih pada serangan pertama umumnya menunjukkan gejala klinis yang lebih jelas dibandingkan dengan episode infeksi berikutnya. Gangguan dalam kemampuan mengontrol kandung kemih, pola buang air kecil, dan aliran urin dapat memberikan petunjuk penting dalam menetapkan diagnosis. Demam seringkali muncul sebagai gejala dan tanda klinis yang umum, bahkan terkadang bisa menjadi satu-satunya gejala ISK pada anak (IDAI, 2021).

Pemeriksaan tanda-tanda vital, termasuk tekanan darah, pengukuran antropometrik, pemeriksaan massa di dalam abdomen, kandung kemih, muara uretra, pemeriksaan neurologis pada ekstremitas bawah, serta pemeriksaan tulang belakang untuk mendeteksi adanya spina bifida, perlu

dilakukan pada pasien ISK. Pemeriksaan genitalia eksterna juga penting untuk mengidentifikasi kelainan seperti fimosis, hipospadia, epispadia pada laki-laki, atau sinekie vagina pada perempuan (IDAI, 2021).

AAP telah memberikan rekomendasi yang menyatakan bahwa pada bayi yang berusia di bawah 2 bulan, setiap kali mengalami demam harus mempertimbangkan kemungkinan ISK dan sebaiknya melakukan pemeriksaan biakan urin. Pada anak yang berusia 2 bulan hingga 2 tahun dengan demam tanpa penyebab yang jelas, perlu mempertimbangkan kemungkinan ISK dan disarankan untuk melakukan biakan urin, dengan penanganan anak diarahkan sebagai pielonefritis. AAP juga memberikan pedoman sederhana untuk anak perempuan berusia 2 bulan hingga 2 tahun, berdasarkan 5 gejala klinis, yaitu: suhu tubuh 39°C atau lebih, demam berlangsung selama dua hari atau lebih, kulit pucat, usia di bawah satu tahun, dan ketidakmungkinan menemukan penyebab demam lainnya. Jika terdapat 2 atau lebih faktor risiko tersebut, sensitivitas untuk kemungkinan ISK dapat mencapai 95%, meskipun dengan spesifisitas 31% (IDAI, 2021).

i. Tatalaksana

Tatalaksana ISK diberikan berdasar pada beberapa faktor seperti usia, lokasi infeksi, gejala klinis, dan keberadaan kelainan lain yang terkait dengan ISK. Keterlambatan penggunaan antibiotik menjadi faktor risiko yang signifikan terhadap jaringan parut pada pielonefritis. Sebelum pemberian antibiotik, penting untuk dilakukan pemeriksaan kultur urin dan resistensi antibiotik (IDAI, 2021).

Hingga saat ini, masih terdapat variasi dalam penanganan ISK pada anak, dan terdapat sejumlah aspek yang masih menimbulkan perdebatan.

Beberapa panduan penanganan ISK telah dikembangkan berdasarkan data dari penelitian berskala besar seperti uji klinis dan meta-analisis. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, panduan ini saling melengkapi satu sama lain. Secara umum, penanganan ISK mencakup tiga aspek utama, yaitu eradikasi infeksi akut, deteksi dan tatalaksan kelainan anatomi dan fungsional ginjal dan saluran kemih serta mendeteksi dan mencegah infeksi berulang (IDAI, 2021).

a. Eradikasi infeksi akut

Eradikasi infeksi akut bertujuan untuk mengatasi keadaan akut, mencegah terjadinya urosepsis dan kerusakan parenkhim ginjal. Apabila terdapat kecurigaan ISK pada seorang anak, pemberian antibiotik yang paling sesuai dapat dilakukan sambil menunggu hasil biakan urin, dan terapi selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil biakan tersebut. Pemilihan antibiotik sebaiknya didasarkan pada pola resistensi kuman yang ada di lingkungan setempat atau regional, dan jika tidak ada informasi tersebut, dapat merujuk pada profil kepekaan kuman yang terdapat dalam literatur. Respons terhadap pengobatan biasanya terlihat dalam 48-72 jam. Jika dalam periode tersebut belum terlihat respon klinis, kemungkinan antibiotik yang digunakan tidak efektif atau kondisi yang dihadapi adalah ISK kompleks, sehingga pertimbangan untuk mengganti antibiotik perlu dilakukan. Selain pemberian antibiotik, dianjurkan untuk meningkatkan asupan cairan (IDAI, 2021).

Hasil penelitian mengenai durasi pemberian antibiotik pada sistitis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil antara memberikan antibiotik dalam jangka pendek dan jangka panjang pada anak-anak. Oleh karena itu, pada kasus sistitis, pemberian antibiotik dilakukan

dalam jangka pendek. Secara umum, untuk mengobati ISK simpleks, antibiotik per oral biasanya diberikan selama 7 hari. Namun, penelitian juga melaporkan bahwa memberikan antibiotik per oral dalam waktu yang lebih singkat, yaitu 3-5 hari, memiliki efektivitas yang setara dengan memberikan selama 7 hari (IDAI, 2021).

NICE menyarankan pendekatan terhadap penanganan fase akut ISK dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Bayi yang berusia di bawah 3 bulan yang diduga mengalami ISK sebaiknya segera dirujuk ke dokter spesialis anak dan mendapatkan pengobatan dengan antibiotik yang diberikan secara parenteral.
- 2) Untuk bayi yang berusia 3 bulan ke atas dengan pielonefritis akut atau ISK bagian atas:
 - a) Pertimbangkan untuk merujuk ke dokter spesialis anak.
 - b) Lakukan terapi dengan antibiotik oral selama 7-10 hari, dengan memilih antibiotik yang memiliki tingkat resistensi yang rendah berdasarkan pola resistensi kuman, seperti sefalosporin atau ko-amoksisiklav.
 - c) Jika tidak memungkinkan penggunaan antibiotik oral, terapikan dengan antibiotik parenteral, seperti sefotaksim atau seftriakson, selama 2-4 hari, diikuti dengan penggunaan antibiotik oral hingga total durasi pengobatan mencapai 10 hari.
- 3) Untuk bayi yang berusia 3 bulan ke atas dengan sistitis atau ISK bagian bawah:
 - a) Berikan antibiotik oral selama 3 hari, berdasarkan pola resistensi kuman setempat. Jika tidak ada informasi mengenai pola

resistensi kuman, pertimbangkan pemberian trimetoprim, sefalosporin, atau amoksisilin.

- b) Jika dalam 24-48 jam tidak terlihat perbaikan klinis, lakukan evaluasi ulang dan periksa kultur urin untuk menilai pertumbuhan bakteri dan kepekaan terhadap obat.

Di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan, terdapat tingkat resistensi yang tinggi pada kuman uropatogen terhadap ampicilin, kotrimoksazol, dan kloramfenikol. Sebaliknya, sebagian besar kuman patogen dalam urin menunjukkan sensitivitas mendekati 96% terhadap gentamisin dan seftriakson. Berbagai jenis antibiotik dapat digunakan untuk mengobati ISK, baik yang diberikan melalui oral maupun secara parenteral, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2 (IDAI, 2021).

Tabel 2.1 Pemilihan antimikroba oral pada ISK (IDAI, 2021).

Jenis antibiotik	Dosis per hari
Amoksisilin	20-40 mg/kgbb/hari dibagi dalam 3 dosis
Sulfonamid:	
- trimetoprim (TMP) – sulfametoksazol (SMX)	6-12 mg TMP dan 30-60 mg SMX /kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis
- Sulfoksazol	120-150 mg/kgbb/hari dibagi dalam 4 dosis
Sefalosporin:	
- Sefksim	8 mg/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis
- Sefpodiksim	10 mg/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis
- Sefprozil	30 mg/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis
- Sefaleksin	50-100 mg/kgbb/hari dibagi dalam 4 dosis
- Lorakarbef	15-30 mg/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis

Tabel 2.2 Pemilihan antimikroba parenteral pada ISK (IDAI, 2021)

Jenis antibiotik	Dosis per hari
Seftriakson	75 mg/kgbb/hari
Sefotaksim	150 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam
Seftazidim	150 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam
Sefazolin	50 mg/kgbb/hari dibagi setiap 8 jam
Gentamisin	7,5 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam
Amikasin	15 mg/kgbb/hari dibagi setiap 12 jam
Tobramisin	5 mg/kgbb/hari dibagi setiap 8 jam
Tikarsilin	300 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam
Ampisilin	100 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam

1) Pengobatan sistitis akut

Anak yang mengalami sistitis dapat diobati dengan antibiotik yang diberikan secara oral, dan umumnya tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Namun, jika gejala klinisnya cukup berat, seperti rasa sakit yang parah, gejala toksik, muntah, dan dehidrasi, anak perlu dirawat di rumah sakit dan diberi pengobatan melalui suntikan sampai gejala klinis membaik. Durasi pengobatan biasanya berkisar antara 5 hingga 7 hari, meskipun ada yang menyarankan 3-5 hari atau 7 hari (IDAI, 2021).

Untuk mengatasi sistitis akut, disarankan penggunaan antibiotik oral seperti trimetoprim-sulfametoksazol, nitrofurantoin, amoksisilin, amoksisilin-klavulanat, sefalekssin, dan sefiksim. Golongan antibiotik sefalosporin sebaiknya dihindari untuk mencegah resistensi kuman dan lebih baik disimpan untuk terapi pielonefritis. Pemberian sefiksim pada kasus sistitis akut dianggap berlebihan.

ISK simpleks umumnya merespons baik terhadap antibiotik seperti amoksisilin, sulfonamid, trimetoprim-sulfametoksazol, atau sefalosporin (IDAI, 2021).

2) Pengobatan pielonefritis

Para pakar sepakat bahwa antibiotik yang digunakan untuk pielonefritis akut harus memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke dalam jaringan karena kondisi ini merupakan nefritis interstitialis. Meskipun belum ada penelitian yang secara khusus membahas durasi pengobatan pada pielonefritis akut, umumnya antibiotik diberikan dalam rentang waktu 7-10 hari, meskipun beberapa literatur mencatat durasi 7-14 hari atau 10-14 hari (IDAI, 2021).

Pemberian antibiotik secara parenteral selama 7-14 hari terbukti sangat efektif dalam mengatasi infeksi pada pielonefritis akut. Meski demikian, lamanya pemberian antibiotik secara parenteral menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam teknik pemberian obat, kebutuhan perawatan intensif, biaya pengobatan yang relatif tinggi, dan ketidaknyamanan bagi pasien dan keluarganya. Oleh karena itu, ada pertimbangan untuk memperpendek pemberian antibiotik secara parenteral dan menggantinya dengan pemberian oral. Secara umum, perbaikan klinis biasanya sudah terlihat dalam 24-48 jam setelah pemberian antibiotik parenteral. Setelah terjadi perbaikan klinis, pengobatan dapat dilanjutkan dengan memberikan antibiotik secara oral selama 7-14 hari (IDAI, 2021).

Secara teoritis, memberikan antibiotik dalam durasi yang lebih singkat pada anak memiliki keuntungan, antara lain, efek samping

obat yang lebih sedikit dan risiko resistensi kuman yang lebih rendah. Pada sebagian besar kasus, pemberian antibiotik secara parenteral dapat diubah menjadi oral setelah 5 hari pengobatan, asalkan respons klinis terlihat nyata dalam waktu tersebut atau setidaknya demam telah turun dalam 48 jam pertama. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa durasi pengobatan selama 14 hari lebih efektif atau dapat mengurangi risiko kekambuhan. Dianjurkan untuk memberikan profilaksis antibiotik setelah fase pengobatan akut sambil menunggu hasil pemeriksaan pencitraan. Jika ternyata kasusnya termasuk dalam kategori ISK kompleks (dengan adanya refluks atau obstruksi), maka pengobatan profilaksis dapat diteruskan untuk jangka waktu yang lebih lama (IDAI, 2021).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membandingkan pemberian antibiotik secara parenteral dengan pemberian antibiotik melalui oral. Hoberman dan tim melakukan penelitian multisenter dalam uji klinik tersamar (*randomized clinical trial*) yang melibatkan 306 anak dengan ISK dan demam. Anak-anak tersebut diterapi dengan sefiksim melalui oral dan dibandingkan dengan sefotaksim selama 3 hari yang kemudian dilanjutkan dengan sefiksim melalui oral selama 14 hari. Hasil pengobatan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam efektivitas antara kedua metode pengobatan tersebut. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa sefiksim melalui oral dapat dianggap sebagai terapi yang aman dan efektif untuk anak-anak yang menderita ISK dengan demam (IDAI, 2021).

Penelitian Montini menunjukkan pada 502 anak dengan diagnosis pielonefritis akut. Anak-anak tersebut diterapi dengan antibiotik ko-amoksiklav melalui oral (dosis 50 mg/kg berat badan/hari dalam 3 dosis) selama 10 hari, dibandingkan dengan seftriakson yang diberikan secara parenteral (dosis 50 mg/kg berat badan/hari dalam satu dosis) selama 3 hari, dan dilanjutkan dengan pemberian ko-amoksiklav melalui oral (dosis 50 mg/kg berat badan/hari dalam 3 dosis) selama 7 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus pielonefritis akut, efektivitas antibiotik yang diberikan secara parenteral selama 10 hari sebanding dengan efektivitas antibiotik parenteral yang dilanjutkan dengan pemberian secara oral (IDAI, 2021).

3) Bakteriuria asimtomati

Dalam beberapa situasi, terdeteksi pertumbuhan bakteri lebih dari 10^5 cfu/mL dalam urin tanpa adanya gejala klinis, baik itu gejala klinis ISK bagian bawah seperti disuria, *urgency*, dan frekuensi, maupun gejala klinis ISK bagian atas seperti demam, menggigil, dan nyeri di sekitar ginjal. Bakteri yang hadir pada bakteriuria asimtomatik umumnya memiliki virulensi rendah dan tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan ketika jumlah bakteri tersebut mencapai ginjal (IDAI, 2021).

Secara umum, terdapat kesepakatan bahwa bakteriuria asimtomatik tidak memerlukan pengobatan antibiotik. Malahan, pemberian antibiotik dapat meningkatkan risiko komplikasi, termasuk peningkatan tingkat rekurensi yang mencapai 80% pada sejumlah kasus. Bakteri komensal dengan virulensi rendah di saluran kemih

dapat bertindak sebagai penghambat invasi bakteri patogen, sehingga dianggap memiliki peran sebagai bentuk profilaksis biologis terhadap kolonisasi oleh bakteri patogen (IDAI, 2021).

4) Pengobatan suportif

Selain melakukan pengobatan yang bersifat kausal terhadap infeksi, penting juga untuk memberikan perawatan suportif dan simptomatik, termasuk penanganan demam dan muntah. Penting untuk memastikan bahwa terapi cairan mencukupi untuk memastikan aliran urin yang normal. Anak yang sudah cukup besar dapat diinstruksikan untuk mengosongkan kandung kemih setiap kali buang air kecil. Higiene perineum, terutama pada anak perempuan, perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk mengatasi disuria, pemberian fenazopiridin HCl (Pyridium) dengan dosis 7 - 10 mg/kgbb/hari dapat dipertimbangkan. Pada kasus penyakit yang lebih parah, seperti demam tinggi, muntah, sakit perut, atau sakit pinggang, perawatan di rumah sakit mungkin diperlukan (IDAI, 2021).

b. Deteksi kelainan anatomi dan fungsional serta tata laksanaanya

Pengidentifikasi kelainan anatomi atau fungsional pada ginjal dan saluran kemih bertujuan untuk mencari faktor predisposisi terjadinya ISK melalui pemeriksaan fisik dan pencitraan. Hanya dengan melakukan pemeriksaan fisik, beberapa temuan dapat ditemukan, seperti sinekia vagina pada anak perempuan, fimosis, hipospadia, atau epispadia pada anak laki-laki. Pada tulang belakang, adanya spina bifida atau dimple dapat menunjukkan adanya neurogenic bladder (IDAI, 2021).

Pentingnya pemeriksaan pencitraan sangat ditekankan untuk mengidentifikasi kelainan anatomi dan fungsional pada ginjal dan saluran kemih, yang menjadi faktor risiko utama untuk terjadinya ISK berulang dan pembentukan parut pada ginjal. Berbagai metode pencitraan yang digunakan meliputi *ultrasonografi (USG)*, *miksio-sistouretrografi (MSU)*, *pielografi intravena (PIV)*, skintigrafi dengan *dimercapto succinic acid (DMSA)*, CT-scan, atau *magnetic resonance imaging (MRI)*. Meskipun PIV sebelumnya sering digunakan, namun belakangan ini tidak lagi menjadi pemeriksaan rutin pada ISK dikarenakan beberapa faktor, seperti risiko radiasi yang berulang, potensi terjadinya syok anafilaktik, risiko nekrosis tubular akut, serta kemampuan melihat jaringan parut yang baru muncul setelah beberapa bulan atau tahun. PIV masih digunakan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ketika gambaran anatomi tidak jelas dengan menggunakan USG dan skintigrafi DMSA, seperti pada kasus ginjal tapal kuda (IDAI, 2021).

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas biaya pemeriksaan (cost-effectiveness), Stark (1997) mengusulkan opsi alternatif untuk pemeriksaan pencitraan sebagai berikut:

- 1) Anak yang diduga menderita pielonefritis akut dan semua bayi yang mengalami infeksi saluran kemih (ISK) perlu menjalani pemeriksaan USG dan MSU. Jika terdeteksi RVU, maka pemeriksaan PIV atau skintigrafi dengan DMSA dapat dipertimbangkan. Jika hasil USG menunjukkan kecurigaan adanya kelainan anatomi, maka PIV lebih direkomendasikan.

- 2) Anak perempuan yang mengalami ISK bagian bawah (sistitis) berulang hingga dua atau tiga kali, atau mengalami ISK pertama dengan riwayat RVU dalam keluarga, diperlakukan sebagaimana opsi pertama.
- 3) Sebagian besar anak perempuan dengan ISK serangan pertama atau ISK bagian bawah saja tidak perlu menjalani pemeriksaan pencitraan. Kelompok ini dapat dipantau setiap 6-12 bulan dan dilakukan kultur urin jika terdapat gejala demam (IDAI, 2021).

Pedoman AAP (1999) merekomendasikan pemeriksaan USG ginjal dan *voiding cystoureterography* (VCUG) atau sistografi radionuklir pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun setelah mengalami ISK pertama. Untuk anak yang lebih tua, belum ada pedoman yang spesifik. Dalam algoritme, disebutkan bahwa jika tidak terlihat respons klinis dalam 48 jam setelah pengobatan, maka diperlukan pemeriksaan ulangan urin dan USG secepatnya. MSU atau sistografi radionuklir dilakukan setelah kondisi klinis memungkinkan. Jika respons klinis positif, baik USG maupun MSU/sistografi radionuklir dapat dilakukan setelah kondisi klinis memungkinkan. AAP tidak merekomendasikan penggunaan PIV dalam manajemen ISK (IDAI, 2021).

Goldman dan rekan-rekan menyarankan bahwa pemeriksaan rutin USG dan MSU harus dilakukan pada bayi laki-laki dengan ISK. Skintigrafi ginjal perlu dipertimbangkan jika ada kecurigaan kelainan ginjal pada USG atau jika MSU menunjukkan refluks derajat III atau lebih. Panduan CHN merekomendasikan pemeriksaan USG untuk semua anak dengan ISK pertama kali, dan VCUG dilakukan 7-10 hari

setelah pengobatan selesai untuk anak dengan ISK febris pertama kali (IDAI, 2021).

Di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, pemeriksaan pencitraan dibagi berdasarkan kelompok usia, yaitu kurang dari 2 tahun, 2-5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Pada kelompok usia kurang dari 2 tahun, dilakukan USG dan MSU, dan jika ditemukan kelainan, dilanjutkan dengan PIV atau DMSA, sedangkan jika tidak ada kelainan, anak diamati saja. Pada kelompok usia 2-5 tahun, dilakukan USG dan jika ditemukan kelainan, dilanjutkan dengan MSU, dan jika MSU menunjukkan kelainan, pemeriksaan dilanjutkan dengan PIV atau DMSA. Pada kelompok usia lebih dari 5 tahun, dilakukan USG dan jika terdapat kelainan, dilanjutkan dengan PIV atau DMSA, kemudian dengan MSU jika hasilnya abnormal (IDAI, 2021).

Menurut Lambert dan Coulthard (2003), dalam konteks pencitraan, anak-anak dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan usia, yaitu 0-1 tahun, 1-4 tahun, dan yang lebih besar, dan mereka tidak merekomendasikan pemeriksaan PIV. Pada kelompok usia 0-1 tahun, dilakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi gambaran anatomi, DMSA untuk mendeteksi jaringan parut, dan MSU untuk mendeteksi *refluks vesiko-ureter* serta melihat gambaran anatomi kandung kemih dan uretra. Untuk kelompok usia 1-4 tahun, tidak ada konsensus pemeriksaan yang jelas. USG dan skintigrafi DMSA sering digunakan. MSU dilakukan jika ada kecurigaan terhadap RVU, seperti riwayat keluarga dengan RVU atau dilatasi ginjal yang terdeteksi pada pemeriksaan antenatal. Pada anak yang lebih besar, disarankan hanya

melakukan USG, sementara skintigrafi DMSA dan MSU dilakukan berdasarkan indikasi (IDAI, 2021).

Sebelum tahun 2006, perkumpulan dokter anak merekomendasikan pemeriksaan *voiding cystoureterography* (VCUG) secara rutin pada semua anak dengan ISK febris pertama kali. Dengan pemeriksaan ini, RVU ditemukan pada 20-40% pasien, dan sebagian besar di antaranya adalah RVU derajat rendah (IDAI, 2021).

Pada tahun 2007, NICE mengidentifikasi anak-anak dengan risiko tinggi, termasuk mereka yang memiliki prokalsitonin tinggi yang menunjukkan sensitivitas terhadap refluks tingkat berat, bayi di bawah 6 bulan dengan demam tinggi, ISK berulang, dan gejala klinis seperti gangguan aliran air kemih atau ginjal yang teraba, infeksi dengan organisme atipikal, bakteremia atau septikemia, manifestasi klinis yang tidak memberikan respon terhadap antibiotik dalam 48-72 jam, serta presentasi klinis yang tidak lazim seperti anak lelaki yang lebih tua atau dengan kelainan saluran kemih yang terdeteksi pada pemeriksaan USG antenatal. Anak-anak dengan risiko tinggi tersebut disarankan untuk menjalani pemeriksaan USG dan VCUG pada episode pertama ISK (IDAI, 2021).

NICE memberikan rekomendasi khusus untuk pemeriksaan pencitraan pada anak-anak dengan ISK, yang dibagi menjadi tiga kelompok usia: di bawah 6 bulan, 6 bulan hingga 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Setiap kelompok usia kemudian dibagi menjadi tiga kondisi: ISK yang merespons baik terhadap antibiotik dalam 48 jam, ISK atipikal, dan ISK berulang/rekuren. Pada semua kelompok usia yang merespons baik terhadap antibiotik dalam 48 jam, tidak diperlukan

pemeriksaan pencitraan kecuali pada kelompok usia di bawah 6 bulan, di mana disarankan pemeriksaan USG dalam waktu 6 minggu. Pada kelompok usia di bawah 6 bulan, pemeriksaan USG, DMSA, dan MSU dilakukan baik pada ISK atipikal maupun ISK berulang. Untuk kelompok usia 6 bulan - 3 tahun, baik pada ISK atipikal maupun ISK berulang, disarankan pemeriksaan USG dan DMSA, dan jika diperlukan, pemeriksaan MSU. Pada kelompok usia lebih dari 3 tahun, pada ISK atipikal, pemeriksaan USG dilakukan, sementara pada ISK berulang, pemeriksaan USG dan DMSA direkomendasikan (IDAI, 2021).

Pertimbangan pemeriksaan pencitraan seharusnya memperhitungkan faktor *cost-effectiveness*, dampak psikologis pada anak dan orangtua akibat pemeriksaan yang bersifat invasif, risiko radiasi, dan sebagainya, dibandingkan dengan manfaatnya untuk pengobatan, pencegahan infeksi berulang, terutama untuk mencegah timbulnya parut ginjal. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan mengenai seberapa jauh pemeriksaan pencitraan perlu dilakukan. Para ahli mengakui bahwa tidak ada satu metode pencitraan pun yang dapat diandalkan secara tunggal untuk mencari faktor predisposisi ISK. Setiap pemeriksaan memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri, sehingga seringkali diperlukan kombinasi beberapa jenis pemeriksaan. Pemilihan metode pencitraan sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan peralatan pencitraan di setiap lokasi atau institusi medik (IDAI, 2021).

c. Deteksi dan mencegah infeksi berulang

Infeksi yang kambuh, terutama dalam bentuk pielonefritis akut, menjadi faktor yang berkontribusi pada terbentuknya parut ginjal.

Diperkirakan bahwa sekitar 40-50% dari kasus ISK yang menunjukkan gejala akan mengalami kekambuhan dalam dua tahun pemantauan, umumnya berupa reinfeksi dan bukan relaps. Pengidentifikasian ISK berulang dapat dilakukan melalui biakan urin secara berkala, seperti setiap bulan, dan kemudian diatur menjadi setiap 3 bulan. Jika terdeteksi adanya ISK berulang, penggunaan antibiotik yang sesuai dengan hasil biakan urin dapat diterapkan. Beberapa faktor, terutama pada anak perempuan, dapat berperan dalam terjadinya ISK berulang, termasuk infestasi parasit seperti cacing benang, penggunaan *bubble bath*, pemakaian pakaian dalam yang terlalu ketat, penggunaan deodoran yang dapat mengiritasi mukosa perineum dan vulva, penggunaan *toilet paper* yang tidak tepat, konstipasi, ketidakmampuan pengosongan kandung kemih secara sempurna akibat gangguan neurologis (*neurogenic bladder*) atau faktor lainnya (*non-neurogenic bladder*), RVU, dan preputium yang belum sirkumsisi (IDAI, 2021).

Mencegah kekambuhan ISK dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kondisi umum pasien, termasuk perbaikan status gizi, memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat, serta mengatasi atau menghilangkan faktor risiko. Asupan cairan yang mencukupi dan kebiasaan berkemih secara teratur bermanfaat dalam mencegah kekambuhan ISK. Pada kasus refluks, disarankan untuk melakukan berkemih berganda (*double micturition* atau *triple micturition*). Koreksi bedah terhadap kelainan struktural seperti obstruksi, refluks tingkat tinggi, urolitiasis, katup uretra posterior, ureterokel, dan ureter dupleks yang disertai obstruksi dapat sangat membantu dalam menangani infeksi yang berulang. Keputusan untuk melakukan tindakan bedah sebaiknya

dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. Risiko terjadinya ISK pada bayi laki-laki yang tidak disunat meningkat sebanyak 3-15 kali dibandingkan dengan bayi laki-laki yang sudah disunat. Tindakan sunat pada anak laki-laki telah terbukti efektif dalam menurunkan insidens ISK (IDAI, 2021).

j. Pemberian profilaksis

Antimikroba profilaksis dosis rendah yang diberikan dalam jangka waktu lama telah secara tradisional diterapkan pada pasien yang rentan mengalami pielonefritis akut atau ISK bawah secara berulang. Terapi profilaksis ini umumnya diberikan kepada anak-anak dengan risiko tinggi, seperti yang memiliki RVU, uropati obstruktif, dan berbagai kondisi risiko tinggi lainnya. Namun, keefektifan antibiotik profilaksis ini sering kali menjadi bahan perdebatan dan masih menuai kontroversi. Tujuan dari pemberian antibiotik profilaksis adalah untuk mencegah terjadinya infeksi berulang dan mencegah pembentukan parut pada ginjal (IDAI, 2021).

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa antibiotik profilaksis efektif dalam menurunkan risiko kejadian ISK berulang pada anak-anak, dengan kurang dari 50% dari mereka mengalami infeksi berulang selama pengamatan 5 tahun. Penggunaan antibiotik profilaksis dimaksudkan untuk mencapai konsentrasi antibiotik yang tinggi dalam urin, namun dengan efek minimal terhadap flora normal tubuh. Berbagai jenis antibiotik dapat digunakan sebagai pilihan terapi profilaksis (IDAI, 2021).

Memberikan profilaksis menjadi suatu masalah karena beberapa alasan, termasuk tingkat kepatuhan yang rendah, peningkatan resistensi kuman, kemungkinan timbulnya reaksi alergi (seperti gangguan saluran

cerna, ruam kulit, kerusakan hati, kelainan hematologi, dan sindrom *Stevens-Johnson*), serta ketidaknyamanan bagi pasien. Beberapa penelitian terkini menyatakan bahwa pada RVU derajat rendah pemberian antibiotik profilaksis tidak dianggap perlu, karena tidak terdapat perbedaan signifikan dalam risiko terjadinya ISK antara kelompok yang menerima antibiotik profilaksis dan kelompok yang tidak diobati (IDAI, 2021).

The International VUR Study of Children melakukan penelitian untuk membandingkan efektivitas pemberian antibiotik profilaksis jangka panjang dengan tindakan operasi pada anak-anak dengan RVU derajat tinggi guna mencegah penurunan fungsi ginjal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut dalam hal terjadinya parut ginjal dan komplikasinya. Oleh karena itu, pemberian antibiotik profilaksis pada RVU derajat tinggi terbukti efektif (IDAI, 2021).

Review oleh Montini dan Hewitt (2009) menyimpulkan bahwa antibiotik profilaksis tidak dianjurkan pada kasus ISK demam pertama kali yang tidak disertai RVU atau hanya memiliki RVU derajat I dan II. Alasannya mencakup temuan bahwa pemberian antibiotik profilaksis tidak memberikan keuntungan signifikan, meningkatkan risiko resistensi bakteri, dan frekuensi reinfeksi yang rendah. Untuk refluks derajat tinggi, meskipun hasil penelitian belum memadai untuk menyimpulkan manfaat antibiotik profilaksis, risiko reinfeksi lebih tinggi pada RVU derajat III dibandingkan dengan derajat 0, I, dan II (IDAI, 2021).

Rekomendasi NICE (2007) menyatakan bahwa antibiotik profilaksis tidak diberikan secara rutin pada bayi dan anak yang mengalami ISK untuk pertama kalinya. Pemberian antibiotik profilaksis dapat dipertimbangkan

pada bayi dan anak dengan ISK berulang. Selain itu, jika pasien yang menerima antibiotik profilaksis mengalami reinfeksi, disarankan untuk mengobati infeksi tersebut dengan antibiotik yang berbeda, bukan dengan peningkatan dosis antibiotik profilaksis.

Belum ada kesepakatan mengenai durasi ideal pemberian antibiotik profilaksis. Ada saran yang menyarankan pemberian antibiotik profilaksis selama RVU masih terdeteksi, sementara yang lain mengusulkan durasi yang lebih singkat. Pada kasus ISK yang kompleks, pemberian profilaksis dapat berlangsung selama 3 - 4 bulan. Jika ternyata kasus yang dihadapi masuk dalam kategori ISK kompleks, misalnya dengan adanya refluks atau obstruksi, maka pemberian profilaksis bisa diteruskan untuk jangka waktu yang lebih lama.

Tabel 2.3 Antibiotik yang digunakan untuk profilaksis (IDAI, 2021):

Jenis antibiotik	Dosis per hari
Trimetoprim	1-2 mg/kgbb/hari
Kotrimoksazol	
- Trimetoprim	1-2 mg/kgbb/hari
- Sulfametoksazol	5-10 mg/kgbb/hari
Sulfisoksazol	5-10 mg/kgbb/hari
Sefaleksin	10-15 mg/kgbb/hari
Nitrofurantoin	1 mg/kgbb/hari
Asam nalidiksat	15-20 mg/kgbb/hari
Sefaklor	15-17 mg/kgbb/hari
Sefiksim	1-2 mg/kgbb/hari
Sefadroksil	3-5 mg/kgbb/hari
Siprofloksasin	1 mg/kgbb/hari

Selain antibiotik, dilaporkan penggunaan probiotik sebagai tindakan pencegahan, seperti *Lactobacillus rhamnosus* dan *Lactobacillus reuteri* (*L. fermentum*), serta penggunaan jus cranberry (IDAI, 2021).

Pemberian terapi antibiotik untuk ISK dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Durasi pengobatan ISK bawah atau sistitis adalah selama 5 – 7 hari dengan pemberian melalui oral (per oral).
- b. Pada ISK atas atau pielonefritis akut, pengobatan dilakukan selama 7-10 hari dengan antibiotik parenteral. Jika dalam 3-4 hari terjadi perbaikan klinis setelah pemberian parenteral, terapi dapat beralih ke antibiotik oral, dan pemberian antibiotik secara keseluruhan (parenteral dan oral) dapat berlangsung selama 7-10 hari (*switch therapy*).
- c. Untuk ISK pada neonatus, durasi pengobatan yang disarankan adalah 10 – 14 hari dengan pemberian parenteral.
- d. Pertimbangan pemberian antibiotik parenteral harus diperhatikan pada anak yang mengalami gejala toksik, muntah, dehidrasi, atau memiliki kelainan pada sistem saluran kemih.
- e. Jika kondisi pasien tidak mengalami perbaikan dalam waktu 48 jam, disarankan untuk melakukan biakan urin tambahan dan segera mempertimbangkan pemeriksaan pencitraan guna mendeteksi kelainan urologi (IDAI, 2021).

f. Indikasi Rawat Inap

ISK yang memerlukan perawatan di rumah sakit meliputi beberapa kondisi, seperti ISK pada neonatus, pielonefritis akut, ISK dengan komplikasi seperti gagal ginjal, hipertensi, ISK yang terkait dengan sepsis

atau syok, serta ISK dengan gejala klinik yang berat, seperti rasa sakit yang hebat, keadaan toksik, kesulitan asupan oral, muntah, dan dehidrasi. Selain itu, ISK yang terkait dengan kelainan urologi yang kompleks, ISK dengan organisme yang resisten terhadap antibiotik oral, atau menghadapi masalah psikologis seperti orangtua yang tidak mampu merawat anak juga termasuk dalam kategori yang memerlukan tindakan rawat inap (IDAI, 2021).

g. Komplikasi

Infeksi saluran kemih dapat menyebabkan gagal ginjal akut, bakteremia, sepsis, dan meningitis. Komplikasi jangka panjang dari infeksi saluran kemih antara lain komplikasi selama kehamilan seperti jaringan parut pada ginjal, tekanan darah tinggi, gagal ginjal, dan preeklampsia. Jaringan parut ginjal terjadi pada 8-40% pasien setelah episode pielonefritis akut. Faktor risiko jaringan parut ginjal antara lain usia muda, keterlambatan pemberian antibiotik dalam pengobatan infeksi saluran kemih, infeksi berulang, RVU, dan obstruksi saluran kemih (IDAI, 2021).

h. Prognosis

Prognosis pada pasien ISK bervariasi, tergantung dari respons terapi, sensitivitas mikroba, ada tidaknya komplikasi, serta ada tidaknya kelainan anatomi. Keberhasilan dalam penanganan yang efektif adalah deteksi dini penyakit melalui diagnosis yang tepat, pemberian antibiotik yang memadai, dan pelaksanaan tindak lanjut yang terencana (Suharjo *et al.*, 2022; IDAI, 2021).

2. Antibiotik

a. Definisi

Antibiotika atau antibiotik merupakan senyawa sintesis ataupun alami yang berfungsi menghentikan atau mengurangi proses biokimia dalam suatu mikroorganisme, terutama dalam kasus infeksi bakteri (Anggraini, Puspitasari *et al.*, 2020).

b. Klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerja

Klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya, dapat di bagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Bekerja menghambat sintesis protein atau merusak dinding sel bakteri seperti antibiotik betalaktam; penisilin, sefalosporin, inhibitor beta-laktamase, monobaktam, kalbapenem, dan lain-lain.
- 2) Bekerja menghambat atau menkonversi sintesis protein, seperti; tetrasiklin, klindamisi, aminoglikosid, kloramfenikol, makrolida (eritromisin, azitromisin, klaritromisin), dan lain-lain.
- 3) Bekerja menghambat esensial enzim yang terdapat dalam metabolisme folat, seperti trimetoprim dan sulfonamid.
- 4) Bekerja mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, seperti kuinolon dan nitrofurantoin.

c. Penggunaan antibiotik kombinasi

Antibiotik kombinasi merupakan penggunaan antibiotik dua atau lebih untuk mengatasi infeksi yang ada. Adapun tujuan dari pemberian antibiotik kombinasi yaitu:

1. Meningkatkan aktivitas antibiotik pada infeksi spesifik atau efek sinergis.
2. Risiko timbulnya bakteri resisten dapat diperlambat ataupun dikurangi.

Indikasi pemberian antibiotik kombinasi, yaitu:

1. Bersifat polibakteri ialah infeksi yang disebabkan oleh lebih dari satu bakteri.
2. Infeksi campuran aerob dan anaerob berupa abses intraabdominal, hepar, otak serta saluran genitalia.
3. Terapi empiris pada infeksi yang lebih berat (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

3. Lama perawatan

Lama perawatan atau dapat disebut *length of stay (LOS)* merupakan akumulasi dari hari pertama hingga hari terakhir pasien mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit dan sebagai indikator pelayanan di suatu rumah sakit. *LOS* dapat dihitung berdasarkan hari keluar dari rumah sakit yang dikurangkan dengan hari masuk rumah sakit (Rachoin *et al.*, 2020). Klasifikasi rawat inap berdasarkan Depkes RI (2020), dibagi menjadi

3, yaitu:

- a. Cepat, yaitu hari pertama sampai hari ke tiga atau 3 hari perawatan.
- b. Sedang, yaitu hari ke empat sampai hari ke tujuh atau 7 hari perawatan.
- c. Lama, yaitu lebih dari 8 hari perawatan.

4. Integrasi Keislaman

Dalam islam, secara umum kebersihan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu kebersihan jasmani atau tubuh manusia, kebersihan rohani dan kebersihan lingkungan masyarakat maupun alam sekitar. Al-Quran sendiri memuat banyak istilah mengenai masalah kebersihan. Pertama, istilah *thahharah* artinya menyucikan, yang berasal dari kata *tahara-yutharu-tuhan wa thahharatan* yang artinya membersihkan dari kotoran baik jasmani maupun rohani. Kedua istilah *nazafah* artinya membersihkan kotoran dari luar saja, yang berasal dari kata *nazufa-yanzufu-nazāfatan*. Yang ketiga memakai istilah *tazkiyah* yang berarti pertumbuhan dan penyucian, artinya menyucikan dari sifat tercela, mensucikan harta dan jiwa dan mengembangkan sifat terpuji. Hal ini sejalan dengan QS Al-Muddatsir/74:1-4.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)

Terjemahnya:

“Wahai orang yang berkemul (berselimut)! Bangunlah, lalu berilah peringatan! dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu.” (QS Al-Muddatsir/74:1-7)

Dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa petunjuk kedua yang diterima oleh Rasulullah saw. dalam melaksanakan tugas tabligh adalah setelah pada petunjuk pertama yang menekankan pentingnya menghususkan pengagungan (takbir) hanya kepada Allah SWT, ayat berikut menyatakan: "dan pakaianmu, bagaimanapun keadaanmu, maka bersihkanlah (Shihab, 2006).

Kata “*tsiydb*” merupakan bentuk jamak dari kata “*tsaub*” yang berarti pakaian. Selain arti tersebut, kata ini juga digunakan sebagai majaz

dengan beberapa makna, termasuk di antaranya hati, jiwa, usaha, badan, budi pekerti keluarga, dan istri (Shihab, 2006).

Kata "*thahhir*" merupakan bentuk perintah dari kata "*thahhara*" yang bermakna membersihkan dari kotoran. Kata ini juga dapat diartikan secara majaz, yaitu menyucikan diri dari dosa atau pelanggaran. Kombinasi kedua kata ini dengan kedua kemungkinan makna, baik hakiki maupun majaz, menyebabkan berbagai pendapat ulama yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. Memahami makna majaz dari kedua kata tersebut, yaitu perintah untuk menyucikan hati, jiwa, usaha, dan budi pekerti dari segala jenis pelanggaran, serta mendidik keluarga agar tidak terjerumus dalam dosa. Selain itu, juga menunjukkan petunjuk untuk memilih istri hanya dari wanita-wanita yang terhormat dan bertakwa.
2. Memahami keduanya dalam konteks hakiki, yaitu membersihkan pakaian dari berbagai jenis kotoran, dan tidak mengenakannya kecuali jika pakaian tersebut benar-benar bersih, nyaman dipakai, dan enak dipandang.
3. Memahami makna majaz dari *tsiyab*/pakaian dan hakiki dari *thahhir*, hal ini dapat diartikan sebagai: "Bersihkanlah jiwa (hati)mu dari segala kotoran."
4. Memahami *tsiyab* (pakaian) dalam konteks hakiki dan *thahhir* dalam makna majaz, hal ini mengacu pada perintah untuk membersihkan pakaian dengan cara memakainya secara halal sesuai dengan ketentuan agama, termasuk menutup aurat, setelah memperolehnya dengan cara-cara yang halal pula. Atau dapat diartikan sebagai "gunakanlah pakaian pendek agar tidak menyentuh tanah yang dapat menyebabkan pakaian

menjadi kotor." Pada masa itu, kebiasaan orang Arab adalah memakai pakaian yang panjang untuk memamerkannya, meskipun hal ini dapat membuat pakaian menjadi kotor karena menyentuh tanah akibat panjangnya (Shihab, 2006).

Penulis lebih cenderung memilih pendapat yang menafsirkan kedua kata tersebut dalam makna hakiki. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kaidah tafsir yang menyatakan bahwa "satu kata tidak dialihkan kepada pengertian kiasan (*majazi*) kecuali jika arti hakiki tidak tepat dan/atau terdapat petunjuk yang kuat untuk mengalihkan kepada makna majaz," tetapi juga karena memperhatikan konteks saat turunnya ayat ini. Konteks tersebut menjelaskan bahwa pada saat turunnya ayat ini, Nabi Muhammad saw. merasa ketakutan melihat Jibril, sehingga beliau bertekuk lutut dan terjatuh ke tanah, yang tentu saja dapat mengakibatkan pakaian beliau menjadi kotor (Shihab, 2006).

Kata "*tsiyab*" muncul delapan kali dalam Al-Qur'an, dan tiga di antaranya membahas tentang pakaian di hari kemudian (QS. Al-Hajj [22]: 19, QS. Al-Kahf [18]: 31, QS. Al-Insan [76]: 21). Dalam konteks ini, digambarkan jenis dan warna pakaian yang dikenakan. Penggunaan kata tersebut memberikan kesan yang kuat bahwa yang dimaksud adalah pakaian dalam arti sandang. Namun, lima kata "*tsiyab*" lainnya, setelah ditelusuri, tidak memiliki arti sebagaimana arti-arti kiasan yang dijelaskan di atas. Meskipun Al-Qur'an menyebut pasangan (istri atau suami) sebagai "pakaian," istilah yang digunakan bukanlah "*tsiyab*," melainkan "*libas*" (baca QS. al-Baqarah [2]: 187) (Shihab, 2006).

Memahami ayat di atas secara hakiki, yang berarti dalam konteks pakaian atau sandang, dapat dijabarkan sehingga secara tersirat mencakup

makna-makna kiasan (majaz) yang telah dijelaskan sebelumnya (Shihab, 2006).

Semua pemeluk agama, termasuk Islam, menyadari bahwa agama pada dasarnya mendorong kebersihan batin seseorang. Menyucikan pakaian tidak akan berarti banyak jika tubuh seseorang kotor; begitu pula, menyucikan pakaian dan tubuh tidak akan bermakna jika jiwa masih tercemar oleh dosa. Terdapat orang yang mencoba mencari jalan pintas dengan mengatakan, "yang penting adalah hati atau jiwa, biarlah tubuh atau pakaian kotor, karena Tuhan tidak memandang penampilan luar." Sikap seperti ini jelas tidak sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam ayat ini, jika dipahami dalam arti hakiki. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pemahaman hakiki tersebut mengharuskan untuk memperhatikan kebersihan tubuh dan jiwa, karena bahkan pakaian pun diperintahkan untuk dibersihkan. Sebagai ilustrasi, jika ada perintah untuk menghormati kakak, maka tentu lebih penting lagi untuk menghormati ayah, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam redaksi perintah tersebut. Dari sisi lain, petunjuk dari ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang bertugas dalam melayani masyarakat dan membimbingnya harus memiliki penampilan yang rapi, termasuk kebersihan pakaian (Shihab, 2006).

Jika dalam panduan awal pada ayat ketiga menekankan pada pembinaan jiwa dan sikap mental, maka pada ayat keempat ini fokusnya adalah pada penampilan fisik, dengan tujuan menarik simpati mereka yang sedang diberi peringatan dan bimbingan (Shihab, 2006).

Sejarah menyebutkan bahwa Rasulullah saw. sangat menyukai dan sering mengenakan pakaian berwarna putih. Hal ini tidak hanya karena warna tersebut efektif menangkal panas, yang merupakan iklim umum di


daerah Mekah dan sekitarnya, tetapi juga mencerminkan kecintaannya terhadap kebersihan, karena noda pada pakaian putih dapat dengan mudah terlihat. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau sudah dikenal sebagai individu yang sangat memperhatikan kebersihan. Tidak semua jenis makanan ia konsumsi, seperti bawang, yang dihindarinya karena aroma yang tidak enak. Bahkan, para sahabatnya dianjurkan untuk tidak mengunjungi masjid setelah makan bawang. Beliau juga aktif membersihkan noda dan kotoran yang mengotori dinding masjid untuk memberikan contoh kebersihan kepada umatnya. Pakaian beliau, meskipun sederhana dan mungkin ada yang sobek, selalu dijahit sendiri dan terlihat rapi serta bersih. Kecenderungan ini telah ada sejak masa kecil dan diperkuat oleh pendidikan dari Al-Qur'an dalam rangka memastikan keberhasilan tugas pembinaan masyarakat. Seorang pemimpin dan pembimbing harus mendapatkan simpati masyarakatnya dan memberikan contoh yang baik. Inilah yang ditekankan oleh ayat di atas kepada Rasulullah saw., dan hal yang sama diharapkan dari setiap orang, terutama yang memiliki tanggung jawab dalam tugas-tugas kemasyarakatan (Shihab, 2006).

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri telah menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan contohnya dengan mencuci pakaian yang kotor, mencuci tangan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan lain-lain. Sejalan dengan makna dari ayat ini kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit, dalam hal ini seseorang akan mudah terkena infeksi apabila tidak menjaga kebersihannya. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara membersihkan diri

maupun lingkungan. Singkatnya, Islam adalah agama kebersihan, yang mendorong umatnya untuk menjalani perilaku hidup bersih.




B. Kerangka Teori




Bagan 2. 1 Kerangka Teori Penelitian


C. Kerangka Konsep



Keterangan:



: Variabel Independen



: Variabel dependen



: Variabel Perancu



: Hubungan yang diteliti



: Hubungan yang tidak diteliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak dengan infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Haji Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien anak dengan riwayat infeksi saluran kemih di RSUD Haji Makassar pada tahun 2022-2023.

2. Sampel

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi

digunakan sebagai sampel. Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Pasien anak rawat inap usia 2 bulan -18 tahun.
- 2) Diagnosis penyakit infeksi saluran kemih berdasarkan rekam medik.
- 3) Mendapatkan terapi antibiotik.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Pasien anak rawat inap dengan data rekam medik yang tidak lengkap atau rusak.

D. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yakni data yang di ambil secara tidak langsung dari objek yang akan di teliti. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari rekam medik anak dengan infeksi saluran kemih yang ada di RSUD Haji Makassar. Rekam medik berisi informasi tentang identitas, riwayat kesehatan, penentuan fisik, laboratorium, diagnosis dan prosedur medik dan perawatan pasien, baik rawat inap atau rawat jalan.

E. Langkah Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara manual dengan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyuntingan data (*editing*), adalah memeriksa rekam medik pada lembar yang diserahkan oleh para pengumpul data.

2. Pengkodean (*coding*), adalah memberikan tanda atau kode untuk mengklasifikasikan isi rekam medik.
3. Memasukkan data (*entry data*), adalah memasukkan data yang sudah diberikan kode untuk menghitung distribusi frekuensi sederhana kedalam *Statistic Program for Social Science (SPSS)*.
4. Tabulasi (*tabulating*), adalah pengolahan data dalam bentuk tabel yang dapat memberikan gambaran statistik agar mudah dianalisis sesuai tujuan penelitian.
5. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, adalah mencari hubungan atau korelasi antar variabel yang telah didapatkan dan menuangkannya dalam bentuk narasi.

F. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis data dalam penelitian ini untuk melihat apakah hipotesis yang didapatkan adalah hipotesis H_0 atau hipotesis H_a . Analisis yang digunakan yaitu metode analisis univariat dan analisis bivariat sebagai berikut:


1. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis yang secara deskriptif menggambarkan karakteristik tiap variabel dalam penelitian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentase data yang diperoleh dalam bentuk tabel.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independent. Dalam penelitian ini uji analisa yang digunakan adalah uji *Chi Square*.

G. Metode Pengumpulan Data



Bagan 3. 1 Metode Pengumpulan Data

H. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023 di RSUD Haji Makassar yang terletak di Jalan Dg. Ngeppe No. 14, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Parang Tambung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar. Sampel yang diambil merupakan sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil dari data rekam medik dan dicatat melalui tabel bantu penelitian. Data tersebut diolah menggunakan *Microsoft Excel 2016* dan *Package for The Social Sciences (SPSS) for Windows 23*.

B. Hasil

1. Analisis Univariat

Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini didapatkan jumlah sampel sebanyak 82 sampel. Karakteristik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Sampel

Kategori	Frekuensi n (%)
Jenis Kelamin	
Perempuan	66 (80.5%)
Laki-Laki	16 (19.5%)
Usia (Bulan)	
2-12 Bulan	2 (2.4%)
13-60 Bulan	16 (19.5%)
61-144 Bulan	26 (31.7%)
145-216 Bulan	38 (46.3%)
Pendidikan	
Belum Sekolah	18 (22.0%)
TK	7 (8.5%)
SD	21 (25.6%)
SMP	13 (15.9%)
SMA	23 (28.0%)
Sumber Pembiayaan	
BPJS/JKN	73 (89.0%)
Mandiri	9 (11.0%)
Lama Perawatan	
≤ 3 Hari	51 (62.2%)
4-7 Hari	31 (37.8%)
Jenis Penggunaan	
Tunggal	63 (76.8%)
Kombinasi	19 (23.2%)
Total	82 (100.0%)

Sumber: Rekam Medik RSUD Haji Makassar, 2023.

Pada tabel 4.1 menunjukkan karakteristik sampel yang diukur dalam penelitian. Sebanyak 66 (80.5%) sampel berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 16 (19.5%) sampel berjenis kelamin laki-laki. Terdapat 2 (2.4%) sampel pada kelompok usia 2-12 bulan, sebanyak 16 (19.5%) sampel pada kelompok usia 13-60 bulan, sebanyak 26 (31.7%) sampel pada kelompok usia 61-144 bulan dan sebanyak 38 (46.3%) sampel pada kelompok 145-216 bulan.

Sebanyak 18 (22.0%) sampel belum sekolah, sebanyak 7 (8.5%) sampel pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak (TK), sebanyak 21

(25.6%) sampel pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD), sebanyak 13 (15.9%) sampel pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sebanyak 23 (28.0%) sampel pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Sebanyak 73 (89.0%) sampel pasien BPJS/JKN dan sebanyak 9 (11.0%) sampel umum atau mandiri sebagai sumber pembiayaan.

Berdasarkan karakteristik lama perawatan didapatkan hasil sebanyak 51 (62.2%) sampel dengan lama perawatan ≤ 3 hari dan sebanyak 31 (37.8%) sampel dengan lama perawatan 4-7 hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas sampel dengan lama perawatan ≤ 3 hari pada anak infeksi saluran kemih sebanyak 51 (62.2%).

Sebanyak 63 (76.8%) sampel dengan jenis penggunaan antibiotik tunggal dan sebanyak 19 (23.2%) sampel dengan jenis penggunaan antibiotik kombinasi. Hasil tersebut menunjukkan jenis penggunaan antibiotik pada anak infeksi saluran kemih mayoritas tunggal 63 (76.8%).

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.2 Hubungan Jenis Penggunaan dengan Lama Perawatan pada Anak ISK Di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar

Lama Perawatan	Jenis Penggunaan			<i>p</i> value
	Tunggal n (%)	Kombinasi n (%)	Total n (%)	
≤ 3 Hari	39 (76.5%)	12 (23.5%)	51 (100.0%)	1.000
4-7 Hari	24 (77.4%)	7 (22.6%)	31 (100.0%)	
Total	63 (76.8%)	19 (23.2%)	82 (100.0%)	

Sumber: Rekam Medik RSUD Haji Makassar, 2023.

Pada tabel 4.2 menunjukkan analisis hubungan jenis penggunaan dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar. Terdapat sampel dengan lama perawatan ≤ 3 hari dengan jenis penggunaan tunggal sebanyak 39 (76.5%) sampel dan jenis penggunaan kombinasi sebanyak 12 (23.5%) sampel.

Sampel dengan lama perawatan 4-7 hari dengan jenis penggunaan tunggal sebanyak 24 (77.4%) sampel dan jenis penggunaan kombinasi sebanyak 7 (22.6%) sampel.

C. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar yang dianalisis menggunakan *Chi Square* diperoleh hasil *p value* sebesar 1.000. Pada penelitian ini diperoleh total sampel sebanyak 89 pasien, namun sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebanyak 82 sampel dengan semua sampel merupakan pasien ISK dengan komplikasi. Terdapat 7 sampel yang dieksklusikan karena data rekam medik yang tidak lengkap atau rusak.

Pada 82 sampel didapatkan mayoritas sampel sebanyak 39 (76.5%) mendapatkan antibiotik jenis tunggal dengan lama perawatan berkisar ≤ 3 hari, dan sebanyak 24 (77.4%) sampel untuk lama perawatan berkisar 4-7 Hari. Sedangkan untuk jenis penggunaan antibiotik kombinasi didapatkan mayoritas sampel sebanyak 12 (23.5%) dengan lama perawatan berkisar ≤ 3 hari, dan sebanyak 7 (22.6%) sampel untuk lama perawatan berkisar 4-7 Hari.

Dalam penelitian ini mayoritas sampel mendapatkan jenis penggunaan antibiotik tunggal 39 (76.5%) dengan lama perawatan ≤ 3 hari dimana

berdasarkan klasifikasi rawat inap menurut Depkes RI (2020), dikategorikan sebagai rawat inap cepat. Lama perawatan dapat dikatakan cepat apabila terhitung dari hari pertama sampai hari ke tiga atau 3 hari perawatan.

Karakteristik subjek pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada tabel 4.1 didapatkan pasien perempuan pada penelitian ini lebih banyak dari pasien laki-laki sebesar 80.5%:19.5%. Hal ini dapat disebabkan oleh uretra perempuan yang lebih pendek dibandingkan dengan uretra laki-laki, sehingga mempermudah bakteri untuk masuk ke saluran kemih dan menyerang organ sekitarnya. Selain itu, lokasi meatus uretra wanita yang berdekatan dengan anus juga menjadi faktor pendukung, sehingga bakteri lebih mudah masuk ke saluran kemih dan menyebabkan infeksi.

Berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pada penelitian ini mayoritas pasien sebanyak 38 (46.3%) sampel pada kelompok 145-216 bulan dan sebanyak 23 (28.0%) sampel pada tingkat pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan infeksi saluran kemih lebih banyak dialami oleh anak usia dewasa yaitu 14 tahun keatas yang berada pada jenjang pendidikan menengah. Keadaan ini dapat timbul dari kebiasaan anak-anak yang sering menahan kencing dan kurangnya pemahaman tentang cara membersihkan alat kelamin dengan benar setelah buang air kecil. Selain itu, pada usia anak 2-12 bulan dapat disebabkan karena kurangnya kebersihan pada bayi khususnya pada orang tua yang sering menggunakan tisu basah untuk membersihkan area kelamin bayi setelah buang air kecil atau besar.

Pada penelitian ini tidak didapatkan hubungan antara jenis penggunaan antibiotik tunggal maupun kombinasi dengan lama perawatan pada pasien anak dengan ISK yang dapat disebabkan oleh beberapa kondisi seperti ISK dengan

komplikasi, gejala klinik yang berat, sepsis atau syok, sensitivitas mikroba, antibiotik lini pertama yang tepat dan respon terapi dari masing-masing pasien yang berbeda.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menilai bahwa penggunaan antibiotik tunggal sebagai lini pertama sudah tepat apabila meliputi tepat dosis, interval, rute pemberian, dan efektivitas antibiotik. Namun apabila diperlukan penggunaan antibiotik secara kombinasi, dapat digunakan jika sesuai dengan indikasi, dosis dan kondisi pasien. Pemakaian antibiotik kombinasi dalam terapi dapat diizinkan untuk meningkatkan efektivitas antibiotik, mencegah resistensi, atau untuk mengobati infeksi yang kompleks.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi lama rawat pada pasien namun tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun kondisi yang dapat mempengaruhi yaitu seperti tingkat keparahan penyakit yang dialami, penyakit penyerta, status immunocompromised, dan cara keluar yang pulang paksa atau diizinkan pulang oleh dokter. Jika pasien mengalami infeksi saluran kemih bersamaan dengan penyakit lain yang dapat memperburuk kondisi infeksi, maka proses penyembuhan dan pemberian antibiotik kemungkinan akan memakan waktu lebih lama.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suharjo *et al.*, (2022) di bangsal anak RS PKU Muhammadiyah Bantul dengan sampel sebanyak 73 sampel dengan hasil penelitian tidak ada hubungan yang signifikan ($p > 0.05$) dalam hal efektivitas antara penggunaan antibiotik tunggal dan kombinasi pada penurunan suhu tubuh, bakteriuria, leukosit esterase, dan lama rawat inap dengan memanfaatkan desain kohort prospektif untuk membandingkan penggunaan antibiotik tunggal dan kombinasi (Suharjo *et al.*, 2022).

Dalam penelitian tersebut pada tabel 6 terkait perbedaan efektivitas antibiotik tunggal sefalosporin generasi ke-3 (n=36) dibanding kombinasi cefotaxime dengan ampisilin (n=37) terhadap lama rawat inap pasien ISK anak di RS PKU Muhammadiyah Bantul. Analisis menggunakan uji *Mann-Whitney* dengan nilai $p > 0,350$ ($p > 0,05$) menunjukkan secara statistik bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara penggunaan antibiotik tunggal sefalosporin generasi ke-3 dan kombinasi cefotaxime dengan ampicillin terkait dengan durasi rawat inap pada pasien anak yang mengalami infeksi saluran kemih di RS PKU Muhammadiyah Bantul (Suharjo *et al.*, 2022).

Dalam penelitian Karen *et al.*, (2012) Penggunaan terapi antibiotik yang tidak sesuai pada ISK sering terjadi dan terkait dengan perpanjangan masa rawat inap. Pada penelitian ini didapatkan usia rata-rata dari 216 pasien adalah 2,46 tahun (*interquartile range [IQR]: 0,27, 8,89*), dan 25% dari mereka merupakan laki-laki. *E. coli* dan *Klebsiella* merupakan organisme penyebab paling umum. Terapi kombinasi terdeteksi pada 10% dari kasus, dan paling sering terjadi pada hasil kultur positif yang mengandung spesies *Klebsiella*, spesies *Enterobacter*, dan organisme campuran. Dalam analisis yang disesuaikan, terapi kombinasi terkait dengan perpanjangan lama rawat inap sebesar 1,8 hari (*95% confidence interval: 1,5, 2,1*), namun tidak memiliki korelasi dengan durasi demam. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor klinis yang berkontribusi pada peningkatan lama rawat inap dan untuk memberikan panduan dalam pemilihan antibiotik empiris pada anak-anak dengan ISK (Karen *et al.*, 2012).

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Spoorenberg *et al.*, (2014) dimana penelitian ini menggunakan metode observasional retrospektif yang melibatkan 1.252 pasien dengan ISK dengan

komplikasi, dilakukan di departemen penyakit dalam dan urologi di 19 rumah sakit di Belanda, baik universitas maupun non-universitas. Data dari rekam medik pasien digunakan untuk menentukan skor kinerja *Quality Indicator (QI)*. Dilakukan analisis model campuran bertingkat untuk mengevaluasi hubungan antara lama rawat inap dan kinerja QI, yang mencakup penggunaan yang tepat atau tidak tepat. Dalam penelitian ini menggunakan panduan rumah sakit lokal dalam meresepkan terapi terkait dengan periode rawat inap yang lebih singkat dengan hasil penelitian terdapat hubungan terbalik antara proporsi penggunaan yang sesuai pada pasien (skor jumlah QI/jumlah QI yang diterapkan) dan lama rawat inap ($p = 0.02$) (Spoorenberg *et al.*, 2014).

Penggunaan antibiotik dengan tepat pada pasien yang mengalami ISK dengan komplikasi dapat mengurangi durasi rawat inap di rumah sakit, yang dapat mendukung hasil akhir pasien dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Secara khusus, tingkat kepatuhan terhadap seluruh set QI menunjukkan hubungan dosis-respons yang signifikan dengan lama rawat inap yang lebih pendek (Spoorenberg *et al.*, 2014).

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa persepsian terapi empiris sesuai dengan pedoman rumah sakit setempat dan penggantian cara pemberian obat secara intravena menjadi oral secara dini, memiliki korelasi dengan lama rawat inap yang lebih singkat pada pasien ISK dengan komplikasi. Selain itu, peningkatan proporsi penggunaan antibiotik yang tepat, sebagaimana diukur oleh indikator kualitas, terkait dengan durasi rawat inap yang lebih singkat (Spoorenberg *et al.*, 2014).

Menurut peneliti, durasi rawat inap pasien dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi salah satunya tingkat keparahan penyakit yang dialami. Jika pasien mengalami infeksi saluran kemih bersamaan dengan penyakit lain yang dapat

memperburuk kondisi infeksi, maka proses penyembuhan dan pemberian antibiotik kemungkinan akan memakan waktu lebih lama. Pemakaian antibiotik kombinasi dalam terapi dapat diizinkan untuk meningkatkan efektivitas antibiotik, mencegah resistensi, atau untuk mengobati infeksi yang kompleks. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menilai bahwa penggunaan antibiotik tunggal maupun kombinasi dapat mempengaruhi lama perawatan apabila sesuai dengan indikasi, dosis dan kondisi pasien.

Dalam islam kesehatan merupakan sebuah nikmat dan karunia dari Allah SWT, yang harus selalu di syukuri dan diperhatikan. Hal ini sejalan dengan potongan ayat dalam QS Al-Baqarah/2:195.

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ حُسْنُكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَتَّقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي تَقْوَا وَأ

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Keberanian muncul ketika seseorang melangkah dengan cermat, meskipun hasil akhirnya belum sepenuhnya pasti. Abu Ustman al-Jahizh (775-867 M), seorang ulama dan pemikir Muslim asal Bashrah, Irak, menyampaikan pesan ini kepada Muhammad Ibn-Abi Daud, Hakim Agung Baghdad pada masa pemerintahan al-Mutawakkil, Khalifah Dinasti Abbasiah X (822-861 M). Ungkapan tersebut juga dapat diartikan sebagai seruan untuk tidak menyia-nyaiakan harta di jalan Allah, karena hal itu dapat membawa kebinasaan. Harta yang tidak didermakan untuk kebaikan tidak hanya akan habis atau diwariskan, tetapi juga dapat menjadi penyebab kebinasaan di akhirat. Oleh karena itu, kebaikan seharusnya tidak hanya terwujud dalam tindakan perang atau kekerasan, melainkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari (Shihab, 2002).

Allah mengamanatkan tindakan ihsan dalam segala hal, sehingga jika Anda terlibat dalam pembunuhan, lakukanlah dengan penuh kebaikan; jika Anda menyembelih binatang, lakukanlah dengan tulus ihsan. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran ini, menjelaskan ihsan sebagai tindakan menyembah Allah seolah-olah Anda dapat melihat-Nya, dan jika itu tidak tercapai, yakinlah bahwa Dia senantiasa melihat Anda. Dengan demikian, perintah untuk berihisan berarti melakukan segala aktivitas positif seolah-olah Anda melihat Allah atau minimal selalu merasa diawasi oleh-Nya. Kesadaran akan pengawasan ini mendorong seseorang untuk selalu berusaha melakukan kebaikan, memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuan terhadap dirinya sendiri, bukan hanya sebatas memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Oleh karena itu, ihsan memiliki kedalaman dan tingkat kelebihan dibandingkan dengan adil, karena adil hanya mencakup memberikan hak atau mengambil hak dengan seimbang, sedangkan ihsan melibatkan pemberian yang lebih banyak dari yang seharusnya diberikan dan pengambilan yang lebih sedikit dari yang seharusnya diambil. Allah memerintahkan ihsan karena itulah cara Allah bersikap terhadap makhluk-Nya, dan karena itu, Allah benar-benar menyukai mereka yang berperilaku dengan ihsan (Shihab, 2002).

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah menganjurkan kita untuk berperilaku positif dengan ihsan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah SWT menyukai segala sesuatu yang sesuai dengan kadar dan ukurannya, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Contoh konkret dari konsep ini dapat diilustrasikan dalam bidang kesehatan, terutama terkait penggunaan antibiotik yang sesuai pada pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK). Salah satu aplikasinya dapat dihubungkan dengan konteks

penggunaan antibiotik pada pasien ISK. Implementasi prinsip-prinsip Maqashid Asy-Syari'ah dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, dengan tujuan memberikan pengobatan yang efektif dan efisien.

D. Keterbatasan penelitian

Penelitian yang dilakukan di RSUD Haji Makassar selama bulan Desember tahun 2023 untuk mengetahui hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih memiliki beberapa keterbatasan yang didapatkan selama penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Data dalam penelitian ini menggunakan data rekam medik konvensional sehingga validitas data sangat bergantung pada validitas data yang tercatat dalam rekam medik.
2. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian ini namun tidak diteliti oleh peneliti seperti penyakit penyerta, cara keluar pasien yang pulang paksa atau diizinkan pulang oleh dokter, dan status immunocompromised.
3. Dalam penelitian ini didapatkan catatan rekam medik yang tidak lengkap atau kesalahan data yang tertulis sehingga data rekam medik tersebut dianggap sebagai *missing case* dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, tidak terdapat hubungan bermakna antara penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar dengan hasil pengolahan data menggunakan *Chi Square* diperoleh *p-value* sebesar 1.000.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain seperti penggunaan antibiotik dengan menilai efektivitas penggunaan antibiotik tunggal dan kombinasi agar memperoleh ruang lingkup studi yang lebih luas dengan menggunakan metode analisis yang berbeda agar diketahui variasi hasil dengan metode tersebut, status immunocompromised, cara keluar pasien, dan lain-lain.
2. Bagi instansi maupun tenaga kesehatan dalam melakukan pencatatan informasi dalam rekam medik lengkap, mudah dipahami dan diagnosis yang jelas. Namun, diperlukan perbaikan khusus pada penulisan resep dokter, terutama terkait dosis obat. Terkadang, kekuatan obat tidak selalu dicantumkan, padahal obat yang diresepkan memiliki variasi dosis yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, W., Puspitasari, I., & Laksanawati, I. S. (2021). Evaluasi Luaran Klinis Terapi Antibiotika pada Pasien Anak Rawat Inap Dengan Infeksi Saluran Kemih di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. *Majalah Farmaseutik*, 17(2), 166. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v17i2.48803>
- Alwi, I. (2014). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II Edisi VI. In *Interna Publishing*.
- Amalia, R. (2019). Pola Peresepan Antibiotik Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2019. *Archives Pharmacia*, 4.
- Angraini, W., Candra, T. M., Maimunah, S., & Sugihantoro, H. (2020). Evaluasi Kualitatif Penggunaan Antibiotik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih dengan Metode Gyssens. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.24123/kesdok.v2i1.2876>
- Angraini, W., Puspitasari, M. R., Atmaja, R. R. dwi, & Sugihantoro, H. (2020). Pengaruh Pemberian Edukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Pasien Rawat Jalan Tentang Penggunaan Antibiotik Di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang The Impact of Eduction Providing on the Level of Knowledge Outpatient Understanding about the Use of Antibiotics i. *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 6(1), 6.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2003). *Tafsir Al-Munir Jilid 8*.
- Costa, E., Maria, P., & Nur, O. (2021). Rasionalitas Penggunaan Antibiotik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (Isk) di Rumah. *CHM-K Pharmaceutical Scientific Journal*, 4(2), 276–281.
- Daniel, M., Szymanik-Grzelak, H., Sierdziński, J., Podsiadły, E., Kowalewska-Młot, M., & Pańczyk-Tomaszewska, M. (2023). Epidemiology and Risk Factors of UTIs in Children—A Single-Center Observation. *Journal of Personalized Medicine*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/jpm13010138>
- Hadiyanto, S. V. P., Izzah, A. Z., & Nurhajjah, S. (2023). Hubungan Faktor Risiko dengan Kejadian Infeksi Saluran Kemih pada Anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 4(2), 115–123. <https://doi.org/10.25077/jikesi.v4i2.1059>
- IDAI. (2021). Konsensus infeksi saluran kemih pada anak. In *Ikatan Dokter Anak Indonesia*.
- Inayah Fitri. (2019). Pengaruh Variasi Lama Penundaan Pemeriksaan Terhadap Enumerasi Bakteri Pada Urin Penderita Infeksi Saluran Kemih (Isk). *Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya (JB&P)*, 6(2), 12–14. <https://doi.org/10.29407/jbp.v6i2.14793>
- Karen E. Jerardi MD XI Katherine A. Auger MD, Samir S. Shah MD, MSCE, Matthew Hall PhD, Paul D.Hain MD, Angela L.Myers MD, MPH, Derek J. Williams MD, MPH, Joel 5. Tieder MD, M. (2012). Discordant antibiotic therapy and length of stay in children hospitalized for urinary tract infection. *Journal of Hospital Medicine*.
- Kementrian Kesehatan RI. (2013). *Pedoman Umum penggunaan Antibiotik*.

- Kranz, J., Wagenlehner, F. M. E., & Schneidewind, L. (2020). Complicated urinary tract infections. *Urologe*, 59(12), 1480–1485. <https://doi.org/10.1007/s00120-020-01343-1>
- Pardede, S. O. (2018). Infeksi pada Ginjal dan Saluran Kemih Anak: Manifestasi Klinis dan Tata Laksana. *Sari Pediatri*, 19(6), 364. <https://doi.org/10.14238/sp19.6.2018.364-74>
- Pranawa, Sutjahjo, A., Nusi, Is. A., Soeroso, J., Hadi, U., Ashariati, A., & Ichawani, J. (2015). *Buku Ajar IPD FK Unair Ed 2.pdf* (pp. 1–815).
- Rachoin, J.-S., Aplin, K. S., Gandhi, S., Kupersmith, E., & Cerceo, E. (2020). Impact of Length of Stay on Readmission in Hospitalized Patients. *Cureus*, 12(9). <https://doi.org/10.7759/cureus.10669>
- Rizki Amalia, V., Sekarwana, N., & Puspa W, H. (2022). Scoping Review: Hubungan Frekuensi dan Durasi Penggunaan Popok Sekali Pakai terhadap Kejadian Infeksi Saluran Kemih Pada Bayi dan Anak. *Bandung Conference Series: Medical Science*, 2(1), 339–346. <https://doi.org/10.29313/bcsms.v2i1.770>
- Shihab, M Quraish. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah. *Tafsir Al-Misba*. 573
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah Jilid-07. *Jakarta : Lentera Hati*, 568.
- Shihab, M. Q. (2006). Tafsir Al-Misbah Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 14. In *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 14). [https://ia803106.us.archive.org/2/items/etaoin/Tafsir Al-Mishbah Jilid 14 - Dr. M. Quraish Shihab.pdf](https://ia803106.us.archive.org/2/items/etaoin/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2014-%20Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab.pdf)
- Spoorenberg, V., Hulscher, M. E. J. L., Akkermans, R. P., Prins, J. M., & Geerlings, S. E. (2014). Appropriate antibiotic use for patients with urinary tract infections reduces length of hospital stay. *Clinical Infectious Diseases*, 58(2), 164–169. <https://doi.org/10.1093/cid/cit688>
- Suharjo, M. I., Darmawan, E., & Kurniawan, N. U. (2022). Perbandingan Efektivitas Sefalosporin Generasi ke-3 dengan Kombinasi Sefalosporin Generasi ke-3 dan Ampisilin pada pasien Infeksi Saluran Kemih di Bangsal Anak RS PKU Muhammadiyah Bantul. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16417–16422.
- Tusino, A., & Widyaningsih, N. (2018). Karakteristik Infeksi Saluran Kemih Pada Anak Usia 0- 12 Tahun Di Rs X Kebumen Jawa Tengah. *Biomedika*, 9(2), 39–46. <https://doi.org/10.23917/biomedika.v9i2.5842>
- Utaminigrum, W., Puspitasari, I., Laksanawati, I. S., & Lukitaningsih, E. (2022). Penggunaan Antibiotika Aminoglikosida pada Pasien Anak di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia)*, 19(1), 98. <https://doi.org/10.30595/pharmacy.v19i1.12223>
- Wagenlehner, F., & Naber, K. (2017). Urinary Tract Infections - Complicated UTIs Due To Urological Disorders. *Antimicrobe*.
- Zorc, J. J., Kiddoo, D. A., & Shaw, K. N. (2005). Diagnosis and management of pediatric urinary tract infections. *Clinical Microbiology Reviews*, 18(2), 417–422. <https://doi.org/10.1128/CMR.18.2.417-422.2005>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Master Tabel

RSUD Haji Makassar
 Jl. Dg Ngeppe No.1
 Laporan Icd 10 Rawat Inap
 Cara Bayar: Semua
 Instalasi: Instalasi Rawat Inap
 Unit: Semua
 Sub Unit: Semua
 Diagnosa: N39.0-Urinary Tract Infection, Site Not Specified
 Periode Tahun 2022-2023

No.	No. RM	Inisial Nama	JK	Usia	Pendidikan	Lama rawat	Cara Bayar	Nama Antibiotik	Kategori (Tunggal/Kombinasi)	Diagnosa
1		N	P	14 Th/ 11 bl	SMP	2	BPJS / JKN	Ceftriaxone 2gr/ 24 Jam/ Iv	Tunggal	N39.0
2		MAKM	L	12 Th/ 8 bl	SD	1	BPJS / JKN	Cefixime syr 1 1/2 cth/12 jam/oral	Tunggal	N39.0
3		FNGM	P	10 Th/ 1 bl	SD	3	BPJS / JKN	Ampicillin 500 mg/6 jam/ iv	Tunggal	N39.0
4		NK	P	17 Th/ 10 bl	SMA	2	BPJS / JKN	Ceftriaxone 2 x 1gr/ 12 Jam/ Iv	Tunggal	N39.0
5		FA	L	10 Th/9 bl	SD	4	BPJS / JKN	Ampicillin 500 mg/ 6 jam/ iv	Tunggal	N39.0
6		RR	L	12 Th/ 2 bl	SD	4	BPJS / JKN	Ceftriaxone 2 gr/ 24 jam/ iv	Tunggal	N39.0
7		KA	P	8 Th/ 2 bl	SD	2	BPJS / JKN	Ampicillin 500 mg/ 6 jam/ iv	Tunggal	N39.0
8		MEBP	L	7 Th/ 2 bl	SD	4	BPJS / JKN	Cefixime 2x 100mg	Tunggal	N39.0
9		LA	P	12 Th/9 bl	SD	3	Tanpa Asuransi / Umum	Ceftriaxone 2 gr/ 24 jam/ iv. (cefixime 2 x 200 gr)	Kombinasi	N39.0
10		PAR	P	6 Th/ 3 bl	TK	3	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1,6 gr/24 jam/iv	Tunggal	N39.0
11		RK	P	6 Th/ 8 bl	TK	4	BPJS / JKN	Cefixime 3/4 cth/ 12 jam/oral	Tunggal	N39.0
12		NLA	P	18 Th/ 8 bl	SMA	2	BPJS / JKN	Urixine 1 Tab, 2x1	Tunggal	N39.0
13		NFF	P	10 Th	SD	5	BPJS / JKN	Ampicillin 400mg/ Iv/ 6 Jam	Tunggal	N39.0
14		YMR	P	3 Th/ 11 bl	-	2	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1,3mg/ 75 Mg Nacl 0,9%/ 24 Jam/ Iv.	Tunggal	N39.0
15		FAS	P	4 Th/ 3 bl	-	2	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1gr/24 Jam/ Iv	Tunggal	N39.0
16		AA	L	7 Th	SD	3	BPJS / JKN	Cefixime Syr 2x1/ 100mg/Oral. Gentamycin Zalf 2x1	Kombinasi	N39.0

17		IP	P	10 Th/ 5 bl	SD	4	BPJS / JKN	Ceftriaxone 2gr/ 24 Jam/ Iv	Tunggal	N39.0
18		UZS	P	9 Th/ 10 bl	SD	4	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1,8 gr/ 24 jam/ iv.	Tunggal	N39.0
19		MZAY	L	2 Th/ 1 bl	-	5	BPJS / JKN	Ampicillin 250 mg/ Iv. Gentamycin 25 mg/Iv/12 Jam. (Cefixime 2 X 50mg)	Kombinasi	N39.0
20		AKY	P	3 Th/ 8 bl	-	4	BPJS / JKN	Ampicillin 500 mg/ 6 jam/ iv	Tunggal	N39.0
21		RA	P	16 Th/ 3 bl	SMA	4	BPJS / JKN	Ceftriaxone inj 1 gr/ 24 jam. Urixin tab 1 x1	Kombinasi	N39.0
22		BA	P	1 Th/ 8 bl	-	3	Tanpa Asuransi / Umum	Ceftriaxone 1 gr/ 24 jam/ iv.	Tunggal	N39.0
23		ARR	P	18 Th/ 4 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Cefixime 200 mg/ Oral, 2x1	Tunggal	N39.0
24		NSZ	P	16 Th/ 4 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1 gr/12 Jam/Iv. (Cefixime 1 Tab/ 2x1/Oral)	Kombinasi	N39.0
25		YNW	P	18 Th/ 8 bl	SMA	2	BPJS / JKN	Ciprofloxacin 500 mg/ 12 jam/oral. Urotractin 400 mg/8 jam/oral	Kombinasi	N39.0
26		KPA	P	14 Th/ 2 bl	SMP	1	Tanpa Asuransi / Umum	Ceftriaxone 2gr/ 24 Jam/Iv	Tunggal	N39.0
27		D	P	18 Th/ 3 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Cefixime 100mg/ 2x1/ Oral	Tunggal	N39.0
28		R	P	14 Th/ 10 bl	SMP	3	BPJS / JKN	Ceftriaxone 2 gr/ 24 jam/ iv.	Tunggal	N39.0
29		ASB	P	16 Th/ 6 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1 gr/24 Jam. Urixin 2x1	Kombinasi	N39.0
30		MK	P	18 Th/ 11 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Cefixime 2 x 100mg	Tunggal	N39.0
31		SK	P	5 Th/ 4 bl	TK	4	BPJS / JKN	Cefixime 2 x 50 Mg/2x1/ Oral.	Tunggal	N39.0
32		ADL	P	15 Th/ 1 bl	SMP	3	BPJS / JKN	Ciprofloxacin 1 Tab/ 2x1/ Oral. Cotrimoksazole 3x1/ Oral	Kombinasi	N39.0
33		MSA	P	4 Th/ 8 bl	SMP	4	BPJS / JKN	Cefotaxim 1gr/ 12 Jam/ Iv.	Tunggal	N39.0
34		MKG	L	2 Th/ 7 bl	-	7	BPJS / JKN	Ampicillin 300 mg/ 6 jam/ iv	Tunggal	N39.0
35		ANI	P	14 Th/ 5 bl	SMP	4	BPJS / JKN	Cefixime 2 x 200 mg/12 jam/oral	Tunggal	N39.0
36		KMS	P	3 Th/ 6 bl	-	4	BPJS / JKN	Ampicillin 400mg/ Iv/ 6 Jam	Tunggal	N39.0
37		AF	P	17 Th/ 5 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Cefixime 1 tab, 2 x 100 mg/ oral	Tunggal	N39.0
38		DNA	P	11 Th/ 11 bl	SD	5	Tanpa Asuransi / Umum	Ceftriaxone 2gr/ 24 Jam/ Iv. Doxyciclin 2x1/ 100mg.	Kombinasi	N39.0
39		APA	P	17 Th/ 7 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1 gr/ 12 jam	Tunggal	N39.0
40		ANAA	P	3 Th/ 1 bl	-	3	BPJS / JKN	Ampicillin Flc 225mg/ 6 Jam/ Iv. Gentamycin Amp 0,5/ 20 Mg/ 12 Jam/Iv.	Kombinasi	N39.0

41		D	P	18 Th	SMA	3	BPJS / JKN	Cefixime 2 x 20gr	Tunggal	N39.0
42		NS	P	2 Th/ 9 bl	-	3	BPJS / JKN	CEFTRIAXONE 1,1gr/ 24 Jam/ 75 Cc Nacl 0,9% (Drips)	Tunggal	N39.0
43		S	P	2 Th/ 6 bl	-	3	BPJS / JKN	Ampicillin 250 Mg/6 Jam/Iv. Cefixime 2x 50gr	Kombinasi	N39.0
44		PSD	P	17 Th/ 10 bl	SMA	4	BPJS / JKN	Cefixime 1 Tab, 2x1	Tunggal	N39.0
45		AAS	P	4 Th/ 3 bl	-	3	Tanpa Asuransi / Umum	Ceftriaxone 1gr/24 Jam/ Iv. Cefixime 2x 1/2gr Cth	Kombinasi	N39.0
46		SM	P	10 Th	SD	2	BPJS / JKN	Cefixime Syr 1 Cth/Oral, 2x1	Tunggal	N39.0
47		BARA	P	6 Th/ 1 bl	TK	3	BPJS / JKN	Cefixime 100mg/ 2x1	Tunggal	N39.0
48		P	P	17 Th/ 1 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Ceftriaxone 2gr/ 24 Jam	Tunggal	N39.0
49		YYM	P	18 Th	SMA	3	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1gr/12 Jam	Tunggal	N39.0
50		NA	P	0 Th/ 8 bl	-	4	BPJS / JKN	Ampicillin 4 x 200mg/ 6 Jam/Iv. Gentamisin 2 x 20mg/Iv. Ceftriaxone 1 x 900mg/ 24 Ja/Iv.	Kombinasi	N39.0
51		NAA	P	3 Th/ 11 bl	-	3	Tanpa Asuransi / Umum	Ampicillin (St) 250mg/ 6 Jam/Iv	Tunggal	N39.0
52		APAU	P	14 Th/ 4 bl	SMP	5	BPJS / JKN	Ampicillin 4 x 500 mg/ 6 jam/ iv	Tunggal	N39.0
53		AC	P	11 Th/ 2 bl	SD	2	BPJS / JKN	Cefixime 2 X 100mg	Tunggal	N39.0
54		MLA	L	14 Th/ 3 bl	SMP	6	BPJS / JKN	Cefixime syr 2 x 1,5 cth/ 12 jam/ oral	Tunggal	N39.0
55		ROE	P	18 Th	SMA	3	BPJS / JKN	Cefixime 2 x 1	Tunggal	N39.0
56		A	P	15 Th/ 5 bl	SMP	2	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1 gr/12 jam/ 1 vial/ iv	Tunggal	N39.0
57		ANOY	P	18 Th/ 8 bl	SMA	2	Tanpa Asuransi / Umum	Ceftriaxone 1 gr/12 jam/ 1 vial/ iv	Tunggal	N39.0
58		AF	P	14 Th/ 10 bl	SMP	4	BPJS / JKN	Cefixime Tab 2 X 200gr/ Oral	Tunggal	N39.0
59		MF	L	4 Th/ 3 bl	-	5	BPJS / JKN	Cefixime 2 x 50mg/ 12 Jam. Cefotaxime 1/2gr / Iv. Gentamisin salp 3x1	Kombinasi	N39.0
60		AHF	L	3 Th	-	1	BPJS / JKN	Cefixime 3 x 25gr	Tunggal	N39.0
61		MNA	L	9 Th/ 10 bl	SD	5	BPJS / JKN	Ceftriaxone inj 2 gr/ 24 jam. (cefixime 2 x 100 mg)	Kombinasi	N39.0
62		NQAA	P	7 Th/ 9 bl	SD	3	BPJS / JKN	Ampicillin 400mg/ Iv/ 6 Jam	Tunggal	N39.0
63		NH	P	5 Th/ 6 bl	TK	2	Tanpa Asuransi / Umum	Ampicillin 4 x 350 mg/6 jam/ iv.	Tunggal	N39.0
64		MIH	L	2 Th/ 2 bl	-	3	BPJS / JKN	Ampicillin 4 x 210mg/ 6 Jam/Iv.	Tunggal	N39.0
65		FN	P	18 Th/ 9 bl	SMA	5	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1gr/ 12 Jam/ Iv	Tunggal	N39.0

66		MM	P	18 Th/ 1 bl	SMA	2	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1 gr/12 jam/iv	Tunggal	N39.0
67		NHM	P	7 Th/ 8 bl	SD	3	BPJS / JKN	Ampicillin 4 x 350 mg/iv. Cefixime 2 x 1/2 cth	Kombinasi	N39.0
68		SHA	P	2 Th/ 11 bl	-	2	BPJS / JKN	Cefixime 2 X 40mg	Tunggal	N39.0
69		AT	P	18 Th/ 6 bl	SMA	2	BPJS / JKN	Cefixime 200 Mg/ 1 Tab/ 2x1/ Oral	Tunggal	N39.0
70		MAAF	L	5 Th/ 8 bl	TK	5	BPJS / JKN	Ampicillin 4 x 300 mg/6 jam/iv	Tunggal	N39.0
71		ASP	P	16 Th/ 9 bl	SMA	1	Tanpa Asuransi / Umum	Cefixime 2x 100mg	Tunggal	N39.0
72		MAA	L	0 Th/ 8 bl	-	4	BPJS / JKN	Ampicillin 4 x 200 mg/iv.	Tunggal	N39.0
73		MZ	L	16 Th/ 6 bl	SMA	2	BPJS / JKN	Ceftriaxone 1gr/12 Jam/Iv. (Cefixime 2x20gr)	Kombinasi	N39.0
74		JDF	P	13 Th/ 6 bl	SMP	2	BPJS / JKN	Cefixime Syr 2x1 Cth/12 Jam	Tunggal	N39.0
75		IFY	L	10 Th/ 8 bl	SD	4	BPJS / JKN	Ampicillin 500 Mg/ 6 Jam/ Iv. Urotractin 1x1 Tab	Kombinasi	N39.0
		SF	P	7 Th/ 3 bl	SD	4	BPJS / JKN	Cefixime 3/4 Cth/ 12 Jam/Oral	TUNGGAL	N39.0
		ASR	P	5 Th/ 6 bl	TK	2	BPJS / JKN	Ampicillin 4 X 400 Mg/iv	TUNGGAL	N39.0
		SR	P	7 Th/ 5 bl	SD	6	BPJS / JKN	Ampicillin 425 Mg/6 jam/ Iv	TUNGGAL	N39.0
		D	P	14 Th/ 4 bl	SMP	6	BPJS / JKN	Cefotaxim 1gr/ 12 Jam/ Iv.	TUNGGAL	N39.0
		NAPH	P	15 Th/ 9 bl	SMP	3	BPJS / JKN	Ceftriaxone 2X1 gr/iv. Cefotaximen 1gr/12 Jam/ Iv.	KOMBINASI	N39.0
		FNAZ	P	7 Th/ 1 bl	SD	4	BPJS / JKN	Ampicillin 400 Mg/6jam/iv	TUNGGAL	N39.0
		DAA	P	17 Th/ 7 bl	SMA	3	BPJS / JKN	Cefixime 2x100 Mg	TUNGGAL	N39.0

Lampiran 2: Hasil SPSS

Frequencies

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia (Bulan)	Pendidikan	Lama Perawatan	Jenis Penggunaan Antibiotik	Sumber Pembiayaan
N	Valid	82	82	82	82	82	82
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	66	80.5	80.5	80.5
	Laki-Laki	16	19.5	19.5	100.0
Total		82	100.0	100.0	

Usia (Bulan)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2-12 Bulan	2	2.4	2.4	2.4
	13-60 Bulan	16	19.5	19.5	22.0
	61-144 Bulan	26	31.7	31.7	53.7
	145-216 Bulan	38	46.3	46.3	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum sekolah	18	22.0	22.0	22.0
	TK	7	8.5	8.5	30.5
	SD	21	25.6	25.6	56.1
	SMP	13	15.9	15.9	72.0
	SMA	23	28.0	28.0	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

Lama Perawatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≤ 3 hari	51	62.2	62.2	62.2
4-7 hari	31	37.8	37.8	100.0
Total	82	100.0	100.0	

Jenis Penggunaan Antibiotik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tunggal	63	76.8	76.8	76.8
Kombinasi	19	23.2	23.2	100.0
Total	82	100.0	100.0	

Sumber Pembiayaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BPJS/JKN	73	89.0	89.0	89.0
Mandiri	9	11.0	11.0	100.0
Total	82	100.0	100.0	

CROSSTABS

/TABLES=D BY E

/FORMAT=AVALUE TABLES

/STATISTICS=CHISQ

/CELLS=COUNT

/COUNT ROUND CELL.



Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Lama Perawatan * Jenis Penggunaan Antibiotik	82	100.0%	0	0.0%	82	100.0%

Lama Perawatan * Jenis Penggunaan Antibiotik Crosstabulation

Count

		Jenis Penggunaan Antibiotik		Total
		Tunggal	Kombinasi	
Lama Perawatan	≤ 3 hari	39	12	51
	4-7 hari	24	7	31
Total		63	19	82

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.010 ^a	1	.921	1.000	.572
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.010	1	.921		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.010	1	.922		
N of Valid Cases	82				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.48.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Lama Perawatan (≤ 3 hari / 4-7 hari) For cohort Jenis Penggunaan Antibiotik = Tunggal	.948	.328	2.741
For cohort Jenis Penggunaan Antibiotik = Kombinasi	.988	.774	1.260
N of Valid Cases	82		

Lampiran 3: Etik Penelitian



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016364, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.030/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Mutiara Grant Tunani
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"HUBUNGAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DENGAN LAMA PERAWATAN PADA ANAK INFEKSI SALURAN KEMIH DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD HAJI MAKASSAR"

"THE RELATIONSHIP OF ANTIBIOTIC USE WITH THE LENGTH OF TREATMENT IN CHILDREN WITH URINARY TRACT INFECTIONS IN THE INPATIENT INSTALLATION OF HAJI HOSPITAL MAKASSAR"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 19, 2023 until December 19, 2024.

December 19, 2023
Chairperson and Chairperson,
Mutia Grant Tunani, S.Si., M.Si., Apt.

Lampiran 4: Balitbangda


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 31462/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSUD Labuang Baji
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5461/Un.06/LP2M/PP.00.9/12/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUTIARA GRANT TUNANI
Nomor Pokok	: 70600120007
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DENGAN LAMA PERAWATAN PADA ANAK INFEKSI SALURAN KEMIH DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD HAJI MAKASSAR. "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Desember 2023 s/d 13 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada posisi ini kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
Pada Tanggal 13 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

	ASRUL SANI, S.H., M.Si. Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR
Jln. Dg. Ngeppe No. 14 Telp. 856091 – 855894 Fax. (0411) 855934 Makassar 90224
e-mail: rsudhajjalautselprov@gmail.com
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 445 / 2137 / RSUDHaji

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Dra. YUSTIATY YUSUF, SE, M.SI
NIP : 19661218 199603 2 001
PANGKAT/GOL. : PEMBINA TK I/IVb
JABATAN : KABID. DIKLIT DAN INOVASI

Dengan ini menerangkan :

NAMA : MUTIARA GRANT TUMANI
NIM : 70600120007
FAKULTAS/PRODI : PENDIDIKAN DOKTER
INSTITUSI/LEMBAGA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Adalah benar telah melakukan Penelitian di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka penyusunan SKRIPSI pada tanggal : 3 Januari 2024 s/d 1 Februari 2024 dengan Judul:

"HUBUNGAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DENGAN LAMA PERAWATAN PADA ANAK INFEKSI SALURAN KEMIH DI INSTALASI RAWAT INAP. RSUD HAJI MAKASSAR"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Februari 2024

KABID. DIKLIT DAN INOVASI,



Dra. YUSTIATY YUSUF, S.E, M.SI
NIP. 19661218 199603 2 001

Lampiran 6: Dokumentasi

