

**ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ASMA PADA ANAK DI RSUD SYEKH
YUSUF KABUPATEN GOWA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

RIFDHA LUTHFIYANTI HISKAH

NIM: 70600120026

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifdha Luthfiyanti Hiskah
NIM : 70600120026
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 18 Juli 2001
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Lingkungan Pasaraya Baru Kabupaten Bulukumba
Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak Di RSUD
Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 22 Juli 2024

Penyusun




Rifdha Luthfiyanti Hiskah
NIM: 70600120026

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KARYA TULIS ILMIAH

Pembimbing penulisan skripsi Rifdha Luthfiyanti Hiskah dengan NIM 70600120026, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 22 Juli 2024

Pembimbing 1



dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes.

Pembimbing 2



dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa" yang disusun oleh Rifdha Luthfiyanti Hiskah, NIM 70600120026, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Juli 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 22 Juli 2024 M

16 Muharram 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed	(.....)
Pembimbing I	: dr. Utami Murti Pratiwi, M. Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed	(.....)
Penguji I	: dr. Rizka Anastasia, Sp. A	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, MS	(.....)

Diketahui Oleh:

Dewan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes

NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa”**.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang merupakan suri tauladan bagi kita sekalian. Skripsi penelitian ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi penelitian ini penulis memperoleh dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis izin mengutarakan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Hisbair dan ibunda Sukiah, adik-adik tersayang Rozan Dzowandik Hiskah dan Rishfah Afifah Hiskah serta keluarga yang selama ini telah memberikan dukungan tak terhingga kepada peneliti dalam menjalankan kehidupan dan menyelesaikan studi di PSPD UIN Alauddin Makassar. Secara khusus juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta para wakil dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar dan dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed. Selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter, dosen pengajar mata kuliah yang telah ikhlas memberikan ilmu bermanfaat dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes. selaku dosen pembimbing I penelitian dan akademik serta dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku dosen pembimbing II penelitian yang telah dengan baik hati mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. dr. Rizka Anastasia, Sp.A selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, M.S serta Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku penguji keagamaan yang telah meluangkan waktu untuk perbaikan skripsi ini baik dalam bentuk arahan, bimbingan, dan pemberian informasi.
6. Staf akademik Program Studi Pendidikan Dokter yang telah membantu mengatur dan mengurus administrasi selama perkuliahan.
7. Pegawai di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin dan membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
8. Sahabat-sahabat peneliti, Resky Liyani Syam, Sri Deviana Kurniawati, Fakhiratunnisa Amini, Andi Sabrina, Elvirazana Kurnia Sari Putri, Andi Sarlin Indriani R, Nurul Shafira, Fiqah Amalia Khaerunnisa, Dwi Alpina dan teman-teman posko 5 Tolo Utara Super Family 100 sebagai sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat melalui semua tantangan dengan baik.
9. Rekan- rekan PSPD dan terkhususnya mahasiswa Angkatan 2020 (APONEUROSI) yang telah memberikan bantuan baik berupa dukungan moral maupun materil.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kemudian tak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi penelitian ini, karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif dari semua pihak, sehingga kelak skripsi ini menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Aamiinn yaa Allahh...

Makassar, 18 Juli 2024



Rifdha Luthfiyanti Hiskah

NIM : 70600120026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	14
G. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Asma.....	16
1. Definisi	16
2. Klasifikasi Asma pada Anak	16
3. Etiologi dan Faktor Risiko.....	19
4. Patofisiologi	22
5. Gejala dan Tanda Asma pada Anak.....	25
6. Langkah Penegakan Diagnosis	26
7. Tatalaksana	29
8. Tindakan Preventif.....	36
9. Komplikasi.....	38
10. Prognosis.....	39
B. Faktor Risiko Kejadian Asma	39
1. Usia.....	39
2. Riwayat Atopi dalam Keluarga	41
3. Riwayat Atopi pada Pasien	42
4. Riwayat Infeksi Saluran Pernapasan Akut.....	43

C. Integrasi Keislaman	45
D. Kerangka Teori	50
E. Kerangka Konsep	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis dan Desain Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel Penelitian	52
D. Teknik Pengambilan Sampel	54
E. Variabel Penelitian	55
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
G. Metode Pengumpulan Data	59
H. Etika Penelitian	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
B. Pembahasan	70
C. Keterbatasan Penelitian	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional.....	7
Tabel 2. Kajian Pustaka.....	9
Tabel 3. Asma tanpa saat serangan.....	17
Tabel 4. Asma saat serangan.....	18
Tabel 5. Jenis Obat Untuk Tatalaksana Asma.....	31
Tabel 6. Kategori Obat Asma.....	31
Tabel 7. Tatalaksana Asma Untuk Dewasa Dan Remaja.....	32
Tabel 8. Tatalaksana Asma Untuk Anak Usia 6-11 Tahun.....	34
Tabel 9. Tatalaksana Asma Untuk Anak Usia 5 Tahun Atau Kurang.....	35
Tabel 10. Pilihan Alat Inhalasi Untuk Anak Usia 5 Tahun Atau Kurang.....	36
Tabel 11. Distribusi berdasarkan Usia.....	61
Tabel 12. Distribusi berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 13. Distribusi berdasarkan Riwayat Atopia pada Pasien.....	63
Tabel 14. Distribusi berdasarkan Riwayat Atopi dalam Keluarga.....	64
Tabel 15. Distribusi Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan.....	65
Tabel 16. Hasil Analisis Bivariat Usia.....	66
Tabel 17. Hasil Analisis Bivariat Riwayat Atopi pada Pasien.....	67
Tabel 18. Hasil Analisis Bivariat Riwayat Atopi dalam Keluarga.....	68
Tabel 19. Hasil Analisis Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Patofisiologi 1.....	22
Gambar 2. Patofisiologi 2.....	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori Penelitian	50
Bagan 2. Kerangka Konsep Penelitian.....	51
Bagan 3. Metode Pengumpulan Data	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISTILAH

APC	: <i>Antigen Presenting Cells</i>
APE	: Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi
DALYs	: <i>Disability Adjusted Life Years</i>
DA	: Dermatitis Atopi
FENO	: <i>Fractional concentration of exhaled nitric oxide</i>
FEV ₁	: <i>Forced Expiratory Volume in one second</i> (volume ekspirasi paksa dalam 1 detik).
HSN	: Hiperaktivitas Saluran Napas
IFN- γ	: Interferon <i>gamma</i>
IL	: Interleukin
ISAAC	: <i>International Study of Asthma and Allergies in Childhood</i>
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
KVP	: Kapasitas Vital Paksa
NSAID	: <i>Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs</i>
PaCO ₂	: <i>Partial pressure of Carbon Dioxide</i>
PAF	: <i>Platelet Activating Factor</i>
PaO ₂	: <i>Partial pressure of Oxygen</i>
PEF	: <i>Peak Expiratory Flow</i> (aliran ekspirasi/saat membuang nafas puncak)
PEFR	: <i>Peak Expiratory Flow Rate</i>
PPOK	: Penyakit Paru Obstruktif Kronis
PTM	: Penyakit Tidak Menular
SABA	: <i>Short-Acting Beta-Agonists</i>
SaO ₂	: <i>Saturation of Oxygen</i>
TTV	: Tanda-Tanda Vital
VEP ₁	: Volume Ekspirasi Paksa detik pertama
Th	: T-helper
WHO	: <i>World Health Organization</i>

Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Rifdha Luthfiyanti Hiskah¹, Utami Murti Pratiwi², Jelita Inayah Sari³, Rizka Anastasia⁴, Qadir Gassing⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁵Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rifdhalh@gmail.com

ABSTRAK

Asma adalah jenis penyakit gangguan pernapasan kronis dan salah satu penyakit tidak menular (PTM) utama yang menyerang anak-anak dan orang dewasa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan desain *case control* dilakukan pada bulan Desember 2023-Maret 2024. Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 86 anak dengan 43 anak sampel kasus dan 43 anak sampel kontrol. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa rekam medik, kemudian dianalisis menggunakan uji *chi-square* dan *odds ratio* (OR). Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil yaitu faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian asma pada anak adalah faktor usia (OR=6,160; 95%CI; 2,393-15,855; p=0,000), riwayat atopi pasien (OR=5,430; 95%CI; 2,145-13,476; p=0,001), riwayat atopi dalam keluarga (OR=78,400; 95%CI; 9,795-627,522; p=0,000), dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan (OR=9,600; 95%CI; 3,586-25,702; p=0,000). Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah usia, riwayat atopi pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan.

Kata Kunci : Asma, Faktor Risiko, Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

***Analysis of Risk Factors for Asthma in Children at Syekh Yusuf Regional Hospital
Gowa Regency***

***Rifdha Luthfiyanti Hiskah¹, Utami Murti Pratiwi², Jelita Inayah Sari³, Rizka
Anastasia⁴, Qadir Gassing⁵***

*^{1,2,3,4}Medical Education Study Program, Faculty of Medicine and Health Sciences,
Alauddin State Islamic University Makassar*

*⁵Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic
University Makassar*

Email: rifdhalh@gmail.com

ABSTRACT

Asthma is a type of chronic respiratory disorder and one of the major non-communicable diseases (NCDs) affecting both children and adults. This study aims to analyze the risk factors for asthma incidence in children at RSUD Syekh Yusuf Hospital, Gowa Regency. The research is an observational analytic study with a case-control design conducted from December 2023 to March 2024. The samples were taken by purposive sampling. The samples consist of 86 children in total comprising with 43 children of experimental sample and 43 children of control sample. Secondary data in the form of medical records were used and analyzed using chi-square tests and odds ratios (OR). The analysis revealed that the risk factors influencing asthma incidence in children are age factors (OR=6.160; 95% CI; 2.393-15.855; p=0.000), the patient atopy history (OR=5.430; 95% CI; 2.145-13.476; p=0.001), family atopy history (OR=78.400; 95% CI; 9.795-627.522; p=0.000), and history of respiratory tract infections (OR=9.600; 95% CI; 3.586-25.702; p=0.000). The study concluded that the patient age, patient atopy history, family atopy history, and history of respiratory tract infections were the risk factors influencing asthma incidence in children at Syekh Yusuf Regional General Hospital, Gowa Regency.

Keywords : Asthma, Risk Factors, Children

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Penyakit asma merupakan suatu jenis penyakit gangguan pernapasan (Dwi & Baitul, 2019). Asma merupakan penyakit tidak menular (PTM) utama, yang menyerang anak-anak dan orang dewasa, serta penyakit kronis yang paling umum terjadi pada anak-anak juga merupakan penyebab kematian dan penurunan kualitas kehidupan, pada orang-orang dari segala usia di seluruh belahan dunia (WHO, 2020).

Menurut data *World Health Organization* (WHO), ada sekitar 262 juta orang di dunia yang menderita asma pada tahun 2019 dan diantaranya terdapat 455.000 kematian (WHO, 2020). Di seluruh negara di dunia, didapatkan bahwa negara dengan prevalensi asma tertinggi yaitu Australia (21.5%), diikuti oleh Swedia (20.2%), Inggris (18.2%), Belanda (15.3%), dan Brazil (13.0%). Sedangkan negara dengan prevalensi asma terendah yaitu, Vietnam (1.0%), Bosnia (1.4%), dan Cina (1.4%) (Enilari & Sinha, 2019).

Secara global, asma menduduki peringkat ke-24 diantara penyebab utama kecacatan selama bertahun-tahun dan peringkat ke-34 diantara penyebab utama beban penyakit, yang diukur dengan *Disability Adjusted Life Years* (DALYs). Sekitar 1000 orang per hari meninggal karena asma. Kematian ini sangat memprihatinkan karena banyak

diantaranya yang sebenarnya dapat dicegah. Meskipun angka kematian akibat asma berdasarkan usia telah menurun di banyak negara selama dekade terakhir, namun jumlah kematian tersebut sudah tersertifikasi karena asma tidak banyak berubah dengan bertambahnya populasi (Asher & Billo, 2022).

Di Indonesia sendiri, rerata kejadian asma sebanyak 2,4%. Dari 16 provinsi tersebut, lima teratas adalah DI Yogyakarta (4,5%), Kalimantan Timur (4,0%), Bali (3,9%), Kalimantan Tengah (3,4%) dan Kalimantan Utara (3,3%). Sedangkan, provinsi dengan kejadian asma terendah berturut-turut adalah Sumatera Utara (1,0%), Sulawesi Barat (1,5%), Nusa Tenggara Timur (1,5%), Lampung (1,6%), dan Jambi (1,7%). Prevalensi pasien asma di Indonesia meningkat sesuai usia. Pada anak-anak sendiri, kasus paling banyak ditemukan pada kelompok usia 5-14 tahun (KEMENKES, 2019).

Di Sulawesi Selatan, jumlah kasus asma di tahun 2018 mencapai 2.5% yaitu sebanyak 50.127 jiwa. Pada anak-anak, prevalensi asma paling tinggi ditemui pada kelompok usia 1-4 tahun sebanyak 2,5%. Di Gowa sendiri prevalensi asma mencapai 2.7%(KEMENKES, 2019).

Ada beberapa faktor risiko dari asma seperti polusi udara, alergen, riwayat atopi, riwayat asma dalam keluarga (genetik), obesitas, kecemasan, infeksi mikroba (biasanya virus) di saluran pernapasan, dan paparan asap rokok (Toskala & Kennedy, 2015). Dalam suatu penelitian oleh Hamdan, menyebutkan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian Asma bronkiale pada anak usia 5-12 tahun diantaranya memelihara binatang peliharaan dalam rumah, paparan asap rokok dan anak yang memiliki riwayat alamiah asma bronkiale pada keluarga

(Hamdan & Musniati, 2020). Pada penelitian Adhar menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kecemasan, kebiasaan merokok, riwayat keluarga, hewan peliharaan dengan kejadian asma di wilayah kerja Puskesmas Singgani Kota Palu (Arifuddin et al., 2019).

Penelitian lain oleh Abiel, menyatakan faktor risiko penyebab asma dari yang tertinggi ke terendah berturut-turut adalah riwayat genetik, riwayat infeksi saluran pernapasan akut, alergen bulu hewan peliharaan, paparan asap rokok, alergen tungau debu, udara dingin dan polusi udara. Dari usia dan jenis kelamin, distribusi terbanyak didapatkan usia 11-15 tahun dan berjenis kelamin laki-laki (A. A. Putri et al., 2022). Penelitian Winta dimana studi kasus Puskesmas Saitnihuta, ditemukan bahwa faktor risiko yang terbukti berpengaruh terhadap kejadian asma bronkial pada anak adalah jenis kelamin laki-laki, kepemilikan binatang piaraan, perubahan cuaca, riwayat penyakit keluarga dan asap rokok (Winta et al., 2020). Pada penelitian oleh Dedi didapatkan bahwa terdapat hubungan faktor predisposisi dan pencetus dengan serangan asma bronkhial Di Puskesmas Glugur Darat Medan Tahun 2021. Faktor tersebut berupa riwayat keluarga, faktor pekerjaan dan faktor alergi (Dedi et al., 2022).

Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am/6:125

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ ۖ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ

الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ ١٢٥

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman”.

Menurut tafsir Ath-Thabari, ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman diberi kelapangan dalam dadanya untuk memeluk Islam, sedangkan orang yang sesat akan dibuat dadanya terasa sesak lagi sempit. Dalam ayat ini terdapat lafazh الحرج yang maknanya adalah kesempitan yang sangat, sehingga tidak ada jalan keluar karena sempitnya jalan tersebut. Lafazh الحرج merupakan bentuk jamak dari حرجة yang artinya pohon yang dililit oleh pohon-pohon lain, sehingga antara pohon itu dengan pohon yang melingkarinya tidak ada celah untuk dimasuki oleh sesuatu lantaran rapatnya lilitan tersebut (Al-Bakri et al., 2007). Pada ayat ini terdapat korelasi yang kongkrit dengan ilmu fisiologi sistem pernapasan. Dimana didalam ilmu fisiologi respirasi, bahwa minimnya tekanan udara dan oksigen terjadi setiap kali bertambah ketinggian seseorang dari permukaan bumi. Keadaan ini menyebabkan kesempitan dan kesulitan pada dada untuk bernapas (sesak napas). Dari kata sesak dan sempit itulah yang merujuk pada arti dari asma itu sendiri (Romlah, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di Rumah sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yaitu analisis faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah usia merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa ?
2. Apakah riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa?
3. Apakah riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa?
4. Apakah riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Usia bukan merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- b. Riwayat atopi pada pasien bukan merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- c. Riwayat atopi dalam keluarga bukan merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- d. Riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan bukan merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Usia merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

- b. Riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- c. Riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- d. Riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.



D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen				
Usia anak	Usia pasien anak sesuai data yang diperoleh	Rekam medik	0.Risiko Tinggi = Usia prasekolah (0-5 tahun) 1.Risiko Rendah = Usia sekolah (6-18 tahun)	Nominal
Riwayat atopi pada pasien	Adanya riwayat pernah mengalami penyakit atopi pada pasien anak seperti penyakit alergi (alergi makanan, minuman dan zat-zat tertentu), dermatitis atopi dan rhinitis alergi .	Rekam medik	0.Risiko Tinggi = ada riwayat atopi pada pasien 1.Risiko Rendah = tidak ada riwayat atopi pada pasien	Nominal
Riwayat atopi dalam keluarga	Adanya anggota keluarga (ayah,ibu, nenek, kakek, saudara) yang memiliki penyakit atopi berupa asma.	Rekam medik	0.Risiko Tinggi = ada riwayat atopi dalam keluarga 1.Risiko Rendah = tidak ada riwayat atopi dalam keluarga	Nominal

Riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan	Adanya riwayat pernah menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada anak seperti flu, faringitis, tonsillitis, bronkitis, pneumonia/bronkopneumoni, dan bronkiolitis.	Rekam medik	0.Risiko Tinggi = ada riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan 1.Risiko Rendah = tidak ada riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan	Nominal
Variable Dependen				
Kejadian asma pada anak	Pasien anak yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan diagnosis asma.	Rekam medik	0.Ya = Menderita asma 1.Tidak = Tidak menderita asma	Nominal

Tabel 1. Definisi Operasional

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang faktor risiko kejadian asma yakni usia, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga, dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan terhadap kejadian asma pada anak. Data yang digunakan meliputi data sekunder dari rekam medis.

E. Kajian Pustaka

No.	Peneliti / Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil	Perbedaan
1	Adhar Arifuddin, Muh. Jusman Rau, Nurnidya, Hardiyanti. (2019).	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asma di Wilayah Kerja Puskesmas Singgani Kota Palu. Usia 12-14 Tahun	Jenis penelitian yang digunakan adalah survey analitik dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> .	148 sampel	Ada hubungan antara tingkat kecemasan, kebiasaan merokok, riwayat keluarga, hewan peliharaan dengan kejadian asma di wilayah kerja Puskesmas Singgani Kota Palu.	Tempat : Puskesmas Singgani Kota Palu Jenis penelitian : survey analitik Desain Penelitian: <i>Cross sectional study</i> Teknik sampel : accidental sampling Variabel yang diteliti : tingkat kecemasan, kebiasaan merokok, riwayat keluarga, hewan peliharaan

2	Hamdan, Nia Musniati (2020).	Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asma Bronkial Pada Anak Usia 5-12 Tahun.	Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>case control</i> .	30 sampel	Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan kejadian Asma bronkiale pada anak usia 5-12 tahun diantaranya; Memelihara binatang peliharaan dalam rumah, Paparan asap rokok dan anak yang memiliki riwayat alamiah asma bronkiale pada keluarga (<i>p-value</i> kurang dari 0.05).	Tempat : Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Salatiga Variabel yang diteliti : Kepemilikan Binatang Peliharaan, paparan asap rokok didalam rumah, Riwayat Penyakit Asma bronkial
3	Winta,	Faktor-Faktor	Jenis penelitian	104 sampel	Jenis kelamin (OR =	Tempat : Puskesmas Saitnihuta

	Fransiska, Nova (2020).	Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Asma Bronkial Anak di Puskesmas Saitnihuta Kabupaten Humpanghasundutan.	yang akan dilakukan merupakan penelitian epidemiologi yang bersifat observasional analitik, dengan desain <i>case control study</i> .		8,25 ; 95% CI ; 1,252 – 54,364 ; p = 0,028). Kepemilikan binatang piaraan (OR = 30,65 ; 95% CI ; 1,538 – 610,7 ; p = 0,025). Perubahan cuaca (OR = 19,27 ; 95% CI ; 2,169 – 71,3 ; p = 0,008. Riwayat penyakit keluarga (OR = 8,27 ; 95% CI ; 1,505 – 45,434 ; p = 0,015). Asap rokok (OR = 23,13; 95% CI ; 4,141 – 129,2 ; p 0,000).	Kabupaten Humpanghasundutan Variabel yang diteliti : Jenis kelamin, Kepemilikan binatang piaraan, Perubahan cuaca, Riwayat penyakit keluarga dan paparan asap rokok.
--	-------------------------	--	---	--	---	---

4	Abiel Amazia Putri, Indah Rahmawati, Hajid Rahmadianto Mardihusodo (2022).	Prevalensi dan Faktor-Faktor Risiko Penyebab Asma pada Anak di Puskesmas Sumbang 1 Periode Januari 2018- Desember 2020.	Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif observasional yang dilakukan di Puskesmas Sumbang 1.	30 sampel	Faktor risiko genetik dan udara dingin merupakan penyebab asma tertinggi di Puskesmas Sumbang 1 periode Januari 2018- Desember 2020 sedangkan faktor risiko terendah penyebab asma di Puskesmas Sumbang 1 periode Januari 2018 -Desember 2020 adalah faktor lainnya yaitu polusi udara.	Tempat : Puskesmas Sumbang 1 Jenis penelitian : deskriptif observasional Variabel yang diteliti : riwayat genetik, riwayat alergen paparan bulu binatang dan tungau debu, paparan asap rokok dan polusi udara, udara dingin serta riwayat infeksi.
5	Dedi, Yuniati,	Faktor	Penelitian ini	51 sampel	Didapatkan bahwa	Tempat : puskesmas Glugur Darat

	Ghina Afifah (2022)	Predisposisi Dan Pencetus Dengan Serangan Asma Bronkhial	menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .		terdapat hubungan faktor predisposisi dan pencetus dengan serangan asma bronkhial Di Puskesmas Glugur Darat Medan Tahun 2021. Faktor tersebut berupa riwayat keluarga, faktor pekerjaan dan faktor alergi.	Medan. Desain Penelitian : <i>cross sectional</i> Variabel yang diteliti: riwayat keluarga, faktor pekerjaan dan faktor alergi.
--	---------------------	--	---	--	--	---

Tabel 2. Kajian Pustaka

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui seberapa besar usia menjadi faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar riwayat atopi pada pasien menjadi faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar riwayat atopi dalam keluarga menjadi faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan menjadi faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman tentang alur penelitian, dan pendidikan terutama dalam bidang kesehatan serta dapat menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terkait faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan asma pada anak.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian tersebut bisa digunakan sebagai referensi bacaan

bagi penelitian selanjutnya terkait kejadian asma pada anak.

3. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan utamanya dalam menghadapi kasus asma pada pasien anak.

4. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang faktor-faktor risiko dengan kejadian asma pada anak. Sehingga orang tua lebih paham dan mengerti tentang faktor penyebab yang berkaitan dengan asma pada anak.

5. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan juga dasar yang memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam menuntaskan kejadian asma pada anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asma

1. Definisi

Asma merupakan penyakit pada saluran pernapasan yang bersifat kronis, dimana hal tersebut ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Asma biasanya muncul pada masa kanak-kanak dan biasanya berhubungan dengan kondisi seperti eksim dan demam (Hashmi et al., 2021). Untuk gejalanya sendiri seperti mengi, sesak napas, sesak di dada, dan batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu, bersama dengan keterbatasan aliran udara ekspirasi yang bervariasi (Reddel et al., 2021).

2. Klasifikasi Asma pada Anak

Berat-ringannya asma ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain gambaran klinik sebelum pengobatan (gejala, eksaserbasi, gejala malam hari, pemberian obat inhalasi B-2 agonis dan uji faal paru) serta obat-obat yang digunakan untuk mengontrol asma (jenis obat, kombinasi obat dan frekuensi pemakaian obat). Tidak ada suatu pemeriksaan tunggal yang dapat menentukan berat-ringannya suatu penyakit. Dengan adanya pemeriksaan klinis termasuk uji faal paru dapat menentukan klasifikasi menurut berat-ringannya asma yang sangat penting dalam penatalaksanaannya (DEPKES, 2009). Asma

diklasifikasikan atas asma saat tanpa serangan dan asma saat serangan (akut) (DEPKES, 2009) :

a. Asma Tanpa Saat Serangan

Parameter klinis, kebutuhan obat dan faal paru asma	Asma episodik jarang	Asma episodik sering	Asma persisten
Frekuensi serangan	<1x/bulan	>1x/bulan	Sering
Lama serangan	<1 minggu	>1 minggu	Hampir sepanjang tahun, tidak ada periode bebas serangan
Intensitas serangan	Biasanya ringan	Biasanya sedang	Biasanya berat
Diantara serangan	Tanpa gejala	Sering ada gejala	Gejala siang dan malam
Tidur dan aktifitas	Tidak terganggu	Sering terganggu	Sangat terganggu
Pemeriksaan fisik diluar serangan	Normal (tidak ditemukan kelainan)	Mungkin terganggu (ditemukan kelainan)	Tidak pernah normal
Obat pengendali (anti-inflamasi)	Tidak perlu	Perlu	Perlu
Uji faal paru (diluar serangan)	PEF atau PEV ₁ >80%	PEF atau PEV ₁ <60-80%	PEF atau PEV ₁ <60%
Variabilitas faal paru (bila ada serangan)	Variabilitas > 15%	Variabilitas >30%	Variabilitas >50%

PEF = *Peak Expiratory Flow* (aliran ekspirasi/saat membuang nafas puncak), FEV₁ = *Forced Expiratory Volume in one second* (volume ekspirasi paksa dalam 1 detik).

Tabel 3. Asma tanpa saat serangan

b. Asma saat Serangan

Parameter klinis, fungsi faal paru, laboratorium	Ringan	Sedang	Berat	Ancaman henti napas
Sesak (<i>breathless</i>)	Berjalan (pada bayi menangis keras)	Berbicara (pada bayi tangis pendek, lemah dan kesulitan menyusu/makan)	Istirahat (pada bayi tidak mau makan/minum)	-
Posisi	Bisa berbaring	Lebih suka duduk	Duduk bertopang lengan	-
Bicara	Kalimat	Penggal kalimat	Kata-kata	-
Kesadaran	Mungkin iritabel	Biasanya iritabel	Biasanya iritabel	Kebingungan
Sianosis	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Nyata
Penggunaan otot bantu respiratorik	Biasanya tidak	Biasanya ya	Ya	Gerakan paradok torako-abdominal
Retraksi	Dangkal, retraksi intercostal	Sedang, ditambah retraksi suprasternal	Dalam, ditambah nafas cuping hidung	Dangkal/hilang
Frekuensi napas	Takipneu	Takipneu	Takipneu	Bradipneu
Frekuensi nadi	Normal	Takikardi	Takikardi	Bradikardi
Pulsus paradoksus (pemeriksaan tidak praktis)	Tidak ada (<10mmHg)	Ada (10-20 mmHg)	Ada (>20 mmHg)	Tidak ada, tanda kelelahan otot respiratorik
PEFR/FEV1 -Pra bronkodilator -Pasca bronkodilator	- >60% - >80%	- 40-60% - 60-80%	- 40% - 60%, respon <2 jam	-

SaO ₂ (<i>Saturation of Oxygen</i>)	>95%	91-95%	<90%	-
PaO ₂ (<i>Partial pressure of Oxygen</i>)	Normal (biasanya tidak perlu diperiksa)	>60 mmHg	<60 mmHg	-
PaCO ₂ (<i>Partial pressure of Carbon Dioxide</i>)	<45 mmHg	<45 mmHg	>45 mmHg	-

Tabel 4. Asma saat serangan

3. Etiologi dan Faktor Risiko

Mekanisme penyebab awal terjadinya inflamasi saluran pernapasan pada penderita asma belum diketahui secara pasti (Soedarto, 2012). Namun, asma saat ini dipandang sebagai penyakit inflamasi saluran napas. Baik asma alergi maupun non-alergi dijumpai adanya inflamasi dan hipereaktivitas saluran napas. Oleh karena itu paling tidak dikenal 2 jalur untuk mencapai kedua keadaan tersebut. Jalur imunologis yang terutama didominasi oleh Ig-E (*Imunoglobulin E*) dan jalur saraf autonom. Pada jalur Ig-E, allergen masuk ke dalam tubuh kemudian diolah oleh APC (*Antigen Presenting Cells* (sel penyaji antigen)), yang selanjutnya hasil olahan allergen akan diteruskan ke sel Th (*T-helper*). Sel *T-helper* akan memberikan instruksi melalui interleukin atau sitokin agar sel-sel plasma membentuk Ig-E, serta sel-sel radang lain seperti mastosit, makrofag, sel epitel, eosinofil, neutrofil, trombosit serta limfosit untuk mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Mediator mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin (PG), leukotrin (LT),

platelet activating factor (PAF), bradikinin, tromboksan (IX) dan lain-lain akan mempengaruhi organ sasaran sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding vaskular edema saluran napas, infiltrasi sel-sel radang sekresi mukus dan fibrosis sub epitel sehingga menimbulkan hiperaktivitas saluran napas (HSN) (Setiati et al., 2014).

Pada jalur non-alergik selain merangsang sel inflamasi juga merangsang sistem saraf autonomy dengan hasil akhir berupa inflamasi dan HSN. Hipereaktivitas saluran napas (HSN) sendiri itulah yang membedakan asma dengan orang normal, dimana sifat saluran napas pasien asma yang sangat peka terhadap berbagai rangsangan seperti iritan (debu), zat kimia (histamin, metakolin) dan fisis (kegiatan jasmani). Pada asma alergik, selain peka terhadap rangsangan tersebut di atas pasien juga sangat peka terhadap alergen yang spesifik. Sebagian HSN diduga didapat sejak lahir, tetapi sebagian lagi didapat. Berbagai keadaan dapat meningkatkan hipereaktivitas saluran napas seseorang yaitu (Setiati et al., 2014).

- **Inflamasi saluran napas**

Sel-sel inflamasi serta mediator kimia yang dikeluarkan terbukti berkaitan erat dengan gejala asma dan HSN. Konsep ini didukung oleh fakta bahwa intervensi pengobatan dengan anti-inflamasi dapat menurunkan derajat HSN dan gejala asma.

- **Kerusakan epitel**

Salah satu konsekuensi inflamasi adalah kerusakan epitel. Pada

asma kerusakan bervariasi dari yang ringan sampai berat. Perubahan struktur ini akan meningkatkan penetrasi alergen, mediator inflamasi serta mengakibatkan iritasi ujung-ujung saraf autonom sering lebih mudah terangsang. Sel-sel epitel bronkus sendiri sebenarnya mengandung mediator yang dapat bersifat sebagai bronkodilator. Kerusakan sel-sel epitel bronkus akan mengakibatkan bronkokonstriksi lebih mudah terjadi.

- Mekanisme neurologis

Pada pasien asma terdapat peningkatan respons saraf parasimpatis.

- Gangguan intrinsik

Otot polos saluran napas dan hipertrofi otot polos pada saluran napas diduga berperan pada HSN

- Obstruksi saluran napas

Meskipun bukan faktor utama, obstruksi saluran napas diduga ikut berperan pada HSN.

Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan asma seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga dan penyakit infeksi terutama pada saluran pernapasan (Masriadi, 2016). Berdasarkan *International*

Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), terdapat beberapa


faktor risiko asma yaitu riwayat atopi anak, keturunan, rendahnya pendidikan ibu, polusi udara, berat lahir, asap rokok, serta ventilasi rumah tidak memadai (N. M. W. J. W. Putri et al., 2022). Menurut

Benyamin sendiri, beberapa penelitian didapatkan peningkatan respon Ig-E terhadap faktor lingkungan seperti tungau debu rumah, alergen hewan, jamur, hewan ternak, telah berkontribusi terhadap sensitisasi asma yang memperburuk gejalanya dan menyebabkan peningkatan reaktivitas saluran napas. Selain itu, obesitas juga bisa menjadi salah satu faktor risiko pada kejadian asma (Sinyor & Perez, 2023).

4. Patofisiologi


a. Obstruksi Saluran Respiratori

Inflamasi saluran respiratori yang ditemukan pada pasien asma diyakini merupakan hal yang mendasari gangguan fungsi. Obstruksi saluran respiratori menyebabkan keterbatasan aliran udara yang dapat kembali baik secara spontan maupun setelah pengobatan. Perubahan fungsional yang terjadi dihubungkan dengan gejala khas pada asma, yaitu batuk sesak, *wheezing* dan hiperreaktivitas saluran respiratori terhadap berbagai rangsangan (Rahajoe et al., 2016).



Gambar 1. Patofisiologi (Rahajoe et al., 2016)

Penyempitan saluran respiratori pada asma dipengaruhi oleh banyak faktor. Penyebab utama penyempitan saluran respiratori adalah kontraksi otot polos bronkus yang diprovokasi oleh pelepasan agonis dari sel-sel inflamasi. Yang termasuk agonis adalah histamin, triptase, prostaglandin D2 dan leukotrien C4 dari sel mast, neuropeptida dari saraf aferen setempat, dan asetilkolin dari saraf eferen postganglionik. Kontraksi otot polos saluran respiratori diperkuat oleh penebalan dinding saluran respiratori akibat edema akut, infiltrasi sel-sel inflamasi dan remodeling, hiperplasia dan hipertrofi kronik otot polos, vaskular, dan sel-sel sekretori, serta deposisi matriks pada dinding saluran respiratori. Selain itu, hambatan saluran respiratori juga bertambah akibat produksi sekret yang banyak, kental, dan lengket oleh sel goblet dan kelenjar submukosa, protein plasma yang keluar melalui mikrovaskular bronkus, dan debris selular (Rahajoe et al., 2016).



Gambar 2. Patofisiologi (Rahajoe et al., 2016)

Pada anak, sebagaimana pada orang dewasa, perubahan patologis pada bronkus (*airway remodeling*) terjadi pada saluran respiratori. Inflamasi dicetuskan oleh berbagai faktor, termasuk alergen, virus, olahraga, dll. Faktor tersebut juga menimbulkan respons hiperreaktivitas pada saluran respiratori penderita asma. Inflamasi dan hiperreaktivitas menyebabkan obstruksi saluran respiratori. Meskipun perubahan patofisiologis yang berkaitan dengan asma pada umumnya reversibel, penyembuhan sebagian/parsial dapat terjadi (Rahajoe et al., 2016).

b. Hiperreaktivitas Saluran Respiratori

Penyempitan saluran respiratori secara berlebihan merupakan patofisiologi yang secara klinis paling relevan pada penyakit asma. Mekanisme yang bertanggung jawab terhadap reaktivitas yang berlebihan atau hiperreaktivitas ini belum diketahui. Akan tetapi, kemungkinan berhubungan dengan perubahan otot polos saluran respiratori (hiperplasia dan hipertrofi) yang terjadi secara sekunder, yang menyebabkan perubahan kontraktilitas. Selain itu, inflamasi dinding saluran respiratori terutama daerah peribronkial dapat memperberat penyempitan saluran respiratori selama kontraksi otot polos (Rahajoe et al., 2016).

c. Hipersekresi Mukosa

Hipersekresi mukosa dikarenakan terjadi hiperplasia kelenjar

submukosa dan sel goblet pada saluran napas penderita asma yang disebabkan oleh aktivasi mediator inflamasi. Penyumbatan saluran napas oleh mukus hampir selalu didapatkan pada asma yang berat. Hipersekresi mukus akan mengurangi gerakan silia, mempengaruhi lama inflamasi, dan menyebabkan kerusakan struktur/ fungsi epitel (Perdani, 2019).

5. Gejala dan Tanda Asma pada Anak

Adapun gejala dan tanda yang dapat dialami seorang anak yang menderita asma, yakni (Liwang et al., 2020) :

a. Gejala

Untuk gejalanya sendiri terdiri dari :

- Batuk berulang, mengi, kesulitan bernapas selama 10 hari saat sedang terkena infeksi saluran napas atas
- Episode 3 kali dalam setahun, atau gejala yang memburuk di malam hari
- Timbul saat ada faktor pencetus:
 - ✓ Iritan : asap rokok, asap bakaran sampah, asap obat nyamuk, suhu dingin, udara kering, makanan minuman dingin, penyedap rasa, pengawet makanan
 - ✓ Alergen: debu, tungau debu rumah, rontokan hewan
 - ✓ Infeksi pernapasan akut karena virus
 - ✓ Aktivitas fisik: berlarian, berteriak, menangis, tertawa berlebihan

- Diantara episode anak mengalami batuk, mengi, atau kesulitan bernapas saat sedang berlari, bermain atau tertawa
- Aktivasinya berkurang (tidak berlari, bermain atau tertawa dengan intensitas yang sama dengan anak lainnya), mudah lelah saat berjalan (ingin digendong)
- Memiliki riwayat atopi
- Memiliki riwayat keluarga asma

b. Tanda

- Mata : *allergic shiners*
- Lidah : *geographic tongue*
- Paru : Mengi (saat sedang bergejala batuk atau sesak)

6. Langkah Penegakan Diagnosis

Sampai saat ini, belum ada satupun alat atau baku emas yang dapat digunakan untuk mendiagnosis asma pada anak dengan pasti. Diagnosis asma mengikuti alur klasik yang ditentukan berdasarkan kombinasi dari adanya gejala yang khas melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, respons terhadap bronkodilator dan telah disingkirkan kemungkinan penyebab yang lain (Rismawati, 2020).

a. Anamnesis (Idris, 2016)

1) Keluhan (Subjektif)

- Lebih dari satu gejala berikut : batuk berulang, sesak napas, rasa berat di dada, napas berbunyi (mengi).

- Gejala sering memburuk malam hari atau menjelang pagi,
- Gejala bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitasnya,
- Ada faktor pencetus.

2) Faktor Risiko

- Faktor genetik : alergi, riwayat asma dalam keluarga
- Faktor lingkungan : alergen, infeksi pernapasan, paparan di tempat kerja, polusi udara
- Usia penderita : Bisa pada semua umur, biasanya anak-anak

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik pada asma merupakan salah satu hal yang penting dalam mendiagnosis asma. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV) frekuensi napas dan denyut nadi dapat normal pada saat stabil (tidak eksaserbasi) atau meningkat pada eksaserbasi akut (Idris, 2016). Pada pemeriksaan respirasi dapat normal, ditemukan *wheezing*/mengi pada auskultasi, bilateral dan lebih terdengar pada fase ekspirasi saat terjadi eksaserbasi akut, serta penggunaan otot-otot bantu napas saat eksaserbasi akut. Pemeriksaan pada saluran napas bagian atas perlu dilakukan untuk melihat apakah adanya kondisi atopik seperti rhinitis atau dermatitis (Pangihutan, 2021).

c. Pemeriksaan Penunjang

1) Uji atopi

Sensitisasi terhadap alergen melalui skin prick test – uji

cukit kulit atau menggunakan Ig-E spesifik. Uji cukit kulit tidak reliabel pada kelompok balita, sebagian besar populasi anak akan menunjukkan reaksi atopi positif saat mencapai usia 3 tahun, dan uji atopi tidak positif tidak menyingkirkan kemungkinan asma pada anak (Sinatra, 2019).

2) *Fractional concentration of Exhaled Nitric Oxide/ FENO*

Dapat dinilai pada anak usia 1 hingga 5 tahun; menilai volume tidal dan dibandingkan dengan nilai normal anak kelompok usia tersebut. Peningkatan FENO selama >4 minggu tanpa infeksi saluran pernapasan atas dengan batuk dan *wheezing* rekuren, dapat membantu klinisi mendiagnosis asma pada usia sekolah. Uji FENO ini tidak luas digunakan (Sinatra, 2019).

3) Pemeriksaan radiologi : foto toraks

Membantu mengeksklusi abnormalitas struktural, infeksi kronis seperti tuberkulosis, benda asing yang tertelan, dan lainnya. Foto toraks pun bisa tampak normal. Diindikasikan untuk mencari komplikasi saat eksaserbasi atau memastikan diagnosis banding lainnya. Membantu mengeksklusi abnormalitas struktural, infeksi kronis seperti tuberkulosis, benda asing yang tertelan, dan lainnya (Sinatra, 2019).

4) Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) menggunakan alat

Peak Expiratory Flow Rate meter (PEFR)

Perubahan (APE meningkat) ≥ 60 l/menit atau $> 20\%$ setelah pemberian bronkodilator (*short acting beta 2 agonis*/SABA, contoh: salbutamol) mengindikasikan terdapat respons bronkodilator atau kemungkinan diagnosis asma (Idris, 2016).

5) Pemeriksaan Spirometri (bila tersedia)

Penilaian obstruksi jalan napas berdasarkan rasio Volume Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1) dan Kapasitas Vital Paksa (VEP1/KVP) yang normal di atas 75%. Di bawah nilai tersebut dinyatakan sebagai obstruksi jalan napas (Idris, 2016).

7. Tatalaksana

Secara umum, terapi asma dapat dibedakan menjadi terapi non medikamentosa dan medikamentosa.

a. Terapi Non-Medika Mentosa

Edukasi seperti berhenti merokok, aktivitas fisik teratur, menghindari paparan, menghindari obat-obatan yang memicu asma (aspirin, *Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs* (NSAID), *non selective beta blockers*), diet sehat, menghindari alergen, menurunkan berat badan pada pasien dengan obesitas, latihan pernapasan, mengatasi stres emosional, menghindari polutan dalam dan luar ruangan, menghindari makanan yang menyebabkan alergi, dan *bronchial thermoplasty* pada asma berat. Vaksinasi influenza dan pneumokokal sangat dianjurkan

pada penyandang asma untuk mencegah eksaserbasi (Koesnoe, 2020).

b. Terapi Medikamentosa

Terdapat tiga kategori medikamentosa dalam tatalaksana asma, yaitu :

- Pengontrol : digunakan untuk mereduksi inflamasi saluran napas, mengontrol gejala, dan mereduksi risiko eksaserbasi dan penurunan fungsi paru.
- Pelega : digunakan sesuai kebutuhan pada untuk meredakan sesak pada saat terjadi eksaserbasi. Terapi ini juga direkomendasikan untuk prevensi jangka pendek terhadap *exercise induced bronchoconstriction*.
- *Add-on therapy*: digunakan pada pasien dengan asma berat, dengan gejala yang persisten dan/atau eksaserbasi meskipun sudah dengan terapi optimal pengontrol dosis tinggi (Koesnoe, 2020).

Pengobatan asma mengikuti pendekatan bertahap dengan beberapa langkah yang dapat disesuaikan untuk mencapai kontrol gejala dan kontrol risiko terbaik. Pada setiap langkah pengobatan, terdapat obat utama (*controller* dan/atau *reliever*) yang direkomendasikan berdasarkan bukti ilmiah yang menunjukkan rasio manfaat-risiko terbaik untuk pengendalian gejala dan

pengurangan risiko (GINA, 2022).

Golongan	Contoh	Efek
SABA (<i>short-acting beta2-agonist</i>)	<i>Salbutamol/Albuterol</i> <i>Terbutaline</i>	Bronkodilator
LABA (<i>long-acting beta2-agonist</i>)	<i>Formoterol</i> <i>Sameterol</i>	Bronkodilator
ICS (<i>inhaled corticosteroid</i>)	<i>Budesonide</i> <i>Fluticasone</i>	Anti-inflamasi
OCS (<i>oral corticosteroid</i>)	<i>Prednisolone</i>	Anti-inflamasi
LAMA (<i>long-acting muscarinic antagonist</i>)	<i>Tiotropium</i> <i>Umeclidinium</i>	Mengurangi sekresi mukus Bronkodilator
SAMA (<i>short acting muscarinic antagonist</i>)	<i>Ipratropium</i>	Bronkodilator Mengurangi sekresi mucus
LTRA (<i>leukotriene receptor antagonist</i>)	<i>Montelukast</i> <i>Zafirlukast</i>	Anti-inflamasi
<i>Methylxanthine</i>	<i>Theophylline</i>	Anti-inflamasi Bronkodilator

Tabel 5. Jenis Obat Untuk Tatalaksana Asma (Lukito, 2023)

	Controller	Reliever	Add-on Therapy
Tujuan	Anti-inflamasi, mengurangi gejala & risiko eksaserbasi/ morbid/mortalitas	Digunakan pada saat terjadi serangan asma untuk meredakan gejala	Digunakan pada kasus asma berat atau untuk mengendalikan faktor risiko lain
Pilihan Obat	<ul style="list-style-type: none"> • ICS • ICS-<i>formoterol</i> (sesuai kebutuhan) saat serangan/ sebelum olahraga pada asma ringan • ICS-LABA • ICS-LTRA 	<ul style="list-style-type: none"> • SABA • ICS-<i>formoterol</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • LAMA • Anti-IgE (<i>omalizumab</i>) • Anti-IL5 (<i>mepolizumab</i>) • dan lain lain

Tabel 6. Kategori Obat Asma (Lukito, 2023)

JALUR 1					
Langkah	1	2	3	4	5
Gejala	Timbul <4-5 hari /minggu	Timbul hampir tiap hari, atau terbangun dengan asma $\geq 1x/minggu$	Timbul hampir tiap hari, atau terbangun dengan asma $\geq 1x/minggu$, dan fungsi paru buruk	-	
Controller	ICS-Formoterol (sesuai kebutuhan)	ICS-Formoterol maintenance (dosis rendah)	ICS-Formoterol maintenance (dosis sedang) Pada pasien asma berat yang tidak terkendali dapat ditambahkan OCS durasi singkat	<ul style="list-style-type: none"> • Add-on LAMA • Rujuk untuk penilaian fenotipe asma • Pertimbangan ICS-formoterol maintenance (dosis tinggi) • \pm Anti-IgE, Anti-IL5/5R, Anti-IL4R, Anti-TSLP 	
Reliever	ICS-Formoterol (sesuai kebutuhan)				
JALUR 2					
Langkah	1	2	3	4	5

Gejala	Timbul <2x/bulan	Timbul <2x/bulan namun <4-5 hari/minggu	Timbul hampir tiap hari, atau terbangun dengan asma $\geq 1x/minggu$	Timbul hampir tiap hari, atau terbangun dengan asma $\geq 1x/minggu$, dan fungsi paru buruk	-
<i>Controller</i>	ICS diberikan saat menggunakan SABA	ICS <i>maintenance</i> (dosis rendah)	ICS-LABA <i>maintenance</i> (dosis rendah)	ICS- <i>Formoterol maintenance</i> (dosis sedang) Pada pasien asma berat yang tidak terkontrol dapat ditambahkan OCS durasi singkat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Add-on</i> LAMA • Rujuk untuk penilaian fenotipe asma • Pertimbangan <i>ICS-formoterol maintenance</i> (dosis tinggi) • \pm Anti-IgE, Anti-IL5/5R, Anti-IL4R, Anti-TSLP
<i>Reliever</i>	SABA (sesuai kebutuhan)				

Tabel 7. Tatalaksana Asma Untuk Dewasa Dan Remaja (Usia 12

Tahun Atau Lebih) (Lukito, 2023)

Tatalaksana Asma Untuk Anak Usia 6-11 Tahun					
Langkah	1	2	3	4	5
Gejala	Timbul <2x/bulan	Timbul $\geq 2x$ /bulan namun tidak setiap hari	Timbul hampir tiap hari, atau terbangun dengan asma $\geq 1x$ /minggu	Timbul hampir tiap hari, atau terbangun dengan asma $\geq 1x$ /minggu, dan fungsi paru buruk	-
<i>Controller</i> (rekomendasi)	ICS (dosis rendah) diberikan saat menggunakan SABA	ICS (dosis rendah) tiap hari	ICS-LABA (dosis rendah), ATAU ICS (dosis medium), ATAU ICS- <i>formoterol</i> (dosis sangat rendah) (sebagai MART)	ICS-LABA (dosis sedang), ATAU ICS- <i>formoterol</i> (dosis rendah) (sebagai MART) Pada pasien asma berat yang tidak terkontrol dapat ditambahkan OCS durasi singkat rujuk ke ahli	Rujuk untuk penilaian fenotipe asma Pertimbangkan ICS- <i>formoterol maintenance</i> (dosis tinggi) \pm ICS-LABA dengan dosis lebih tinggi ATAU <i>Add-on</i> Anti-IgE, Anti-IL4R
<i>Controller</i> (alternatif)	ICS (dosis rendah) tiap hari	LTRA tiap hari, ATAU ICS (dosis rendah) diberikan saat menggunakan	ICS-LTRA (dosis rendah)	Tambahkan <i>tiotropium</i> atau LTRA	<i>Add-on</i> Anti-IL5, ATAU Pertimbangkan <i>add-on</i> OCS dosis rendah,

		kan SABA			namun juga pertimbangan efek sampingnya
<i>Reliever</i>	SABA (sesuai kebutuhan) [atau ICS-formoterol (sebagai MART)]				

Tabel 8. Tatalaksana Asma Untuk Anak Usia 6-11 Tahun (Lukito, 2023)

Tatalaksana Asma Untuk Anak Usia ≤ 5 Tahun				
Langkah	1	2	3	4
Gejala	Mengakibatkan infeksi virus yang jarang dan tanpa/sedikit gejala interval.	Pola gejala tidak konsisten dengan asma namun episode mengi yang butuh SABA terjadi >3x/tahun ATAU Pola gejala konsisten dengan asma dan gejala asam tidak terkendali atau >3 eksaserbasi/tahun	Terdiagnosis asma, dan asma tidak terkendali dengan ICS (dosis rendah).	Asma tidak terkendali dengan Dosis ICS (dosis rendah) yang telah digandakan.
<i>Controller</i> (rekomendasi)	-	ICS (dosis rendah) tiap hari	Gandakan dosis rendah ICS pada langkah sebelumnya, diberikan tiap hari	Lanjutkan <i>controller</i> dan rujuk ke ahli
<i>Controller</i> (alternatif)	ICS intermiten durasi	*LTRA tiap hari, ATAU	*ICS-LTRA (dosis rendah)	*Tambahkan LTRA, ATAU *Tingkatkan

	singkat saat onset infeksi virus	*ICS intermiten durasi singkat saat onset gejala	*Pertimbangan rujuk ke ahli	frekuensi ICS, ATAU *Tambahkan ICS intermiten
<i>Reliever</i>	SABA (sesuai kebutuhan)			

Tabel 9. Tatalaksana Asma Untuk Anak Usia ≤ 5 Tahun Atau Kurang (Lukito, 2023)

Usia	Alat (rekomendasi)	Alat (alternatif)
0-3 tahun	<i>Pressurized metered dose inhaler dan spacer, dengan masker wajah</i>	<i>Nebulizer dengan masker wajah</i>
4-5 tahun	<i>Pressurized metered dose inhaler dan spacer, dengan mouthpiece</i>	<i>Pressurized metered dose inhaler dan spacer, dengan masker wajah</i> ATAU <i>Nebulizer dengan mouthpiece atau masker wajah</i>

Tabel 10. Pilihan Alat Inhalasi Untuk Anak Usia 5 Tahun Atau Kurang (Lukito, 2023)

8. Tindakan Preventif

Upaya pencegahan asma dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (DEPKES, 2009):

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditujukan untuk mencegah sensitisasi pada bayi dengan orang tua penyandang asma dengan cara, yaitu:

- 1) Penghindaran merokok, asap rokok dan polutan lain selama kehamilan dan masa perkembangan bayi/anak

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa merokok

sebelum melahirkan memiliki dampak paling kuat pada anak kecil, sedangkan pada ibu pasca melahirkan merokok tampaknya relevan dengan perkembangan asma pada anak-anak yang lebih besar. Paparan polutan seperti polusi udara dan asap rokok juga bisa meningkatkan faktor resiko mengalami asma (GINA, 2022).

2) Pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan

ASI yang diterima bayi pada 6 bulan pertama kehidupan bukan hanya sebatas investasi terbaik dalam perkembangan bayi, namun juga penyelamat masa depan bayi. Selain itu, pemberian ASI pasca 6 bulan pertama kehidupan juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi perkembangan sebab diikuti oleh banyak proses lainnya yang mendukung perkembangan bayi (Namirah et al., 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ASI eksklusif bisa mengurangi episode mengi di awal kehidupan. Terlepas dari pengaruhnya

ASI eksklusif terhadap perkembangan asma, pemberian ASI harus didorong karena banyak manfaat yang diperoleh dengan ASI eksklusif (GINA, 2022).

3) Perbaiki status gizi selama ibu hamil, salah satunya dengan pemberian vitamin D

Ibu hamil dengan status gizi yang baik akan memberikan pasokan nutrient yang adekuat dalam mendukung proses

pertumbuhan dan perkembangan janin, termasuk pertumbuhan skeletal janin sejak dalam kandungan. Hal ini bisa mencegah mudahnya bayi terserang beberapa penyakit (Amalia et al., 2022). Salah satu cara memperbaiki status gizi adalah dengan konsumsi vitamin D. Asupan vitamin D mungkin melalui makanan, suplemen makanan atau sinar matahari. Beberapa penelitian menyatakan bahwa asupan vitamin D dan vitamin E dari makanan ibu menyebabkan risiko lebih rendah terkena penyakit mengi pada anak-anak (GINA, 2022).

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder ditujukan untuk mencegah inflamasi pada anak yang telah tersensitisasi dengan cara menghindari paparan asap rokok, serta alergen dalam ruangan terutama tungau debu rumah (DEPKES, 2009).

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier ditujukan untuk mencegah manifestasi asma pada anak yang telah menunjukkan manifestasi penyakit dengan menghindari pencetus (DEPKES, 2009).

9. Komplikasi

Asma bisa menimbulkan berbagai komplikasi seperti pneumotoraks, asma resisten terhadap steroid, *atelectasis* dan gagal napas (Idris, 2016). Selain itu asma juga bisa menyebabkan *airway remodelling* akibat inflamasi yang persisten, sehingga terjadi

obstruksi jalan napas yang irreversibel. Obstruksi ini mirip penyakit paru okstuktif kronik (PPOK) dan dapat semakin parah, sehingga menyebabkan keterbatasan aktivitas pasien (Liwang et al., 2020).

10. Prognosis

Sebanyak 5-10% pasien dengan asma yang berat tidak memberikan respon yang baik dengan terapi standar. Angka mortalitas asma mencapai 0,19 kematian dari 100.000 orang (Koesnoe, 2020).

B. Faktor Risiko Kejadian Asma

1. Usia

Asma pada kelompok usia anak 1-4 tahun memiliki angka kekambuhan dalam 12 bulan terakhir tertinggi dibandingkan kelompok-kelompok usia lainnya. Kelompok usia penderita asma sangat beragam, dari bayi hingga dewasa. Pada anak, penyakit asma bersifat kronis dan dapat mengganggu hari-hari sekolah produktif anak, menghambat aktivitas sosial, dan berpotensi untuk mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (KEMENKES, 2019).

Distribusi kelompok usia pasien anak yang dirawat inap di RSUD Abdul Wahab Sjahrani Samarinda dengan rentang usia 2-17 tahun. Kelompok usia anak penderita asma yang paling banyak adalah kelompok usia 2-5 tahun dengan jumlah 25 pasien dengan persentase 51% dari seluruh sampel penelitian, kemudian diikuti dengan kelompok usia 6-11 dengan jumlah 18 pasien dengan persentase

36,8%. Sedangkan kelompok usia anak penderita asma paling sedikit ada pada kelompok usia 12-17 tahun sebanyak 6 anak atau sebesar 12,2% dari seluruh sampel penelitian. Hal tersebut didasari oleh proses pematangan sistem imun anak pada usia 0-4 tahun, terutama sel imun Th1 (*T-helper 1*) dan Th2 (*T-helper 2*) (Zulfikri et al., 2022).

Proses sensitisasi terjadi semenjak masa awal kehidupan dan dipicu oleh berbagai macam rangsangan seperti infeksi virus, alergi makanan, hingga aeroalergen. Pada anak usia 0-3 tahun, pencetus utama yang menjadi pemicu proses sensitisasi adalah infeksi virus. Dampak dari rangsangan tersebut dapat bersifat ringan pada fase awal, hingga anak mengalami infeksi saluran napas berat yang dapat menyebabkan kaskade inflamasi yang kemudian dapat mempengaruhi respons imun tubuh (Zulfikri et al., 2022).

Salah satu organ sistem imun yang dikenal adalah timus. Timus merupakan organ yang terbesar dan paling aktif selama periode neonatal dan pra-remaja. Pada remaja awal, timus mulai mengalami atrofi dan stroma timus sebagian besar digantikan oleh jaringan adiposa (lemak). Timus bertambah besar sejak lahir sebagai respons terhadap stimulasi antigen pascanatal, kemudian pada masa pubertas dan mengalami kemunduran setelahnya. Pada anak-anak, timus terus mengalami perkembangan sehingga proses imun adaptif pun masih dalam proses pematangan. Karena masih dalam proses pematangan, hal inilah yang menyebabkan sistem imun pada anak-anak bekerja lebih aktif terhadap patogen (Arif & Anasagi., 2019). Sistem imun tubuh yang belum matang akan menyebabkan respons hipersensitivitas cenderung ke arah aktivitas sel Th2 yang kemudian

akan berdampak pada penurunan produk IL-2 (interleukin 2) dan IFN- γ (*interferon gamma*). Penurunan produk IFN- γ akan menyebabkan penurunan respons IFN- γ yang akan meningkatkan risiko anak dimasa awal kehidupan untuk tersensitisasi oleh aeroalergen dan menyebabkan asma dibandingkan dengan anak dengan respons IFN- γ yang normal (Zulfikri et al., 2022).

2. Riwayat Atopi dalam Keluarga

Pada penelitian Budiando, menunjukkan bahwa proporsi responden yang mempunyai genetik (keturunan asma) yang anaknya mengalami kejadian asma bronkial sebanyak 31 (67,4%) lebih besar dari ibu yang tidak mempunyai genetik (keturunan asma) yang anaknya mengalami kejadian asma bronkial sebanyak 7 (24,1%). Setelah dilakukan Uji statistik *chi-square* didapat nilai *p.value*. = 0,001, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara Genetik dengan kejadian asma bronkial diketahui bahwa modifikasi epigenetik mengatur ekspresi sion sitokin dan faktor transkripsi yang bertanggung jawab untuk sel T diferensiasi. Selain itu, mekanisme epigenetik (termasuk DNA metilasi) dapat mempengaruhi asma pada masa kanak-kanak melalui regulasi kadar IgE dan gen asma lainnya (ALOX15, CAPN14, dan POSTN) (Budiando, 2019).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak dengan ibu yang memiliki asma akan 6,2 kali lebih besar memiliki kemungkinan terkena asma. Sedangkan, dengan ayah kandung yang memiliki asma, anak akan memiliki kemungkinan sebesar 12,8 kali untuk menjadi asma dari pada anak yang tidak memiliki ayah kandung asma. Riwayat atopi orang tua akan meningkatkan kemungkinan anak untuk

memulai *atopic march* atau rentetan sensitisasi alergi yang dapat berakhir di asma. Dasar teori yang dapat mendukung hasil di atas adalah penelitian oleh Moffat et al. (2010) yang mengungkapkan bahwa gen pada kromosom 17 (ORMDL3) berhubungan dengan onset asma anak. Gen lainnya yang memiliki hubungan dengan asma adalah gen pada kromosom dua (IL1RL1/IL18R1), enam (HLA-DQ) yang berasosiasi dengan kejadian asma onset lanjut, Sembilan (SMAD3), dan 22 (IL2RB) (N. M. W. J. W. Putri et al., 2022).

3. Riwayat Atopi pada Pasien

Riwayat penyakit-penyakit atopi yang tergabung dalam rangkaian penyakit alergi progresif yang disebut *atopic march* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya asma pada anak. Penyakit-penyakit alergi tersebut berdasarkan urutan kejadiannya dalam masa awal kehidupan diantaranya dermatitis atopik, alergi makanan, asma, dan rinitis alergi. Penyakit-penyakit tersebut saling berkorelasi secara positif antara satu dengan yang lain, munculnya salah satu dari keempat penyakit tersebut akan meningkatkan risiko perkembangan ketiga penyakit lainnya. Hal tersebut didasari oleh faktor predisposisi genetik dan lingkungan yang memiliki latar belakang imunologis yang sama, yaitu respons sel Th2 yang spesifik terhadap alergen, produksi IgE spesifik akibat kerja sel-sel efektor tipe 2, aktivasi granulosit, dan sistem imun bawaan lainnya yang dapat memicu produksi mukus serta edema. Dermatitis atopik dan alergi makanan merupakan alergi yang muncul lebih dini dimasa awal kehidupan, kemungkinan kedua penyakit alergi tersebut akan berkembang menjadi penyakit asma dikemudian hari adalah sebesar

30-80% (Zulfikri et al., 2022).

Patogenesis pasti asma dan Dermatitis Atopi (DA) belum sepenuhnya dipahami. Kedua penyakit tersebut berhubungan dengan peradangan kronis. Pada pasien asma, sitokin dan mediator inflamasi lainnya ditemukan pada pencucian bronkus. Kedua penyakit ini dapat dimediasi oleh IgE yang menunjukkan kecenderungan genetik karena atopi mengacu pada kecenderungan keluarga untuk memproduksi IgE. Ketidakseimbangan rasio Th1/Th2 dikaitkan dengan produksi IgE yang lebih tinggi pada pasien atopik. Dengan memproduksi Il-2 dan Il-13, sel Th2 mendorong produksi IgE oleh sel B sebagai respons terhadap pemicu antigen. Hal ini menyebabkan respons hiperreaktif saluran napas pada pasien asma dan peradangan kulit pada pasien DA. Sel mast mempunyai peran besar dalam gangguan alergi dan inflamasi. Banyaknya kesamaan antara DA dan asma dalam hal patogenesis dan ketidakseimbangan imunologi, sering kali mengarahkan kita untuk mempertimbangkan masing-masing penyakit dalam konteks penyakit lainnya. Secara umum, pasien dengan DA awitan dini, parah, dan persisten, serta memiliki riwayat keluarga penderita DA, berisiko lebih tinggi terkena asma. Respon imun Th2, jalur dan mediatornya tidak diragukan lagi merupakan mekanisme pendorong utama pada DA dan asma (Yaneva & Darlenski, 2021).

4. Riwayat Infeksi Saluran Pernapasan

Berdasarkan penelitian Putri (2022), didapatkan bahwa terdapat 16 responden (53,33%) yang memiliki riwayat terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan 14 responden (46,67%) lainnya

tidak memiliki riwayat terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, sinus, bronkus, alveoli, pleura hingga rongga telinga tengah. Gejala yang ditimbulkan berupa batuk, kesulitan bernafas, nyeri pada tenggorokan, nyeri kepala, pilek dan demam (A. A. Putri et al., 2022).

Infeksi saluran pernapasan merupakan faktor presipitasi utama pada serangan asma akut. Influenza dan rhinovirus adalah patogen penyebab utama pada anak-anak maupun dewasa. Infeksi pada saluran pernapasan akan mengakibatkan inflamasi pada saluran trakeobronkial yang akan mengubah mekanisme mukosiliar (A. A. Putri et al., 2022). Perangkat mukosiliar memegang peranan penting pada jalan napas, yaitu sebagai pertahanan mekanis dengan cara menangkap partikel pada permukaan epitel jalan napas dan membersihkannya dari traktus trakeobronkial melalui pergerakan silia. Mekanisme ini disebut transpor mukosiliar. Transpor mukosiliar mengandung komponen penting, yaitu lapisan mukus yang menangkap partikel inhalasi dan mengeluarkannya dari saluran pernapasan dengan adanya pergerakan silia, serta *periciliary layer* (PCL) yang menyediakan lingkungan yang baik bagi silia untuk bergerak. Saat terjadi inflamasi, mediator-mediatornya akan bekerja salah satunya dengan kelenjar sub mukosa dan sel goblet akan menghasilkan mukus yang berlebih. Mukus yang banyak akan mempengaruhi PCL, sehingga kerja silia untuk mengeluarkan partikel asing menurun (Cai, 2012). Hal ini menyebabkan peningkatan pada hiperresponsif pada sistem bronkial, hiperresponsif

ini berlangsung selama 2-8 minggu setelah infeksi pada individu yang asma dan keadaan normal. Faktor riwayat infeksi ISPA memiliki risiko meningkatkan terjadinya asma sebesar 26 kali (A. A. Putri et al., 2022).

C. Integrasi Keislaman

Pada saat bernafas, kita menghirup udara (inspirasi) dan mengembuskan udara (ekspirasi). Saat udara memasuki paru-paru, terjadi pertukaran gas oksigen (O₂) dan karbondioksida (CO₂) yang disebut respirasi eksternal, darah yang mengandung banyak O₂ akan menuju jaringan tubuh. Pertukaran gas yang terjadi antara darah dengan cairan jaringan tersebut respirasi internal. Gas O₂ yang sampai pada sel akan digunakan untuk membuat energi (ATP) yang dinamakan respirasi sel (Romlah, 2015). Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am/6:125

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٥

Terjemahnya :

"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman".

Menurut tafsir Ath-Thabari, ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman diberi kelapangan dalam dadanya untuk memeluk Islam, sedangkan orang yang sesat akan dibuat dadanya terasa sesak lagi sempit. Dalam ayat ini terdapat lafazh الحرج yang maknanya adalah kesempitan yang sangat, sehingga tidak ada jalan keluar karena sempitnya jalan tersebut. Lafazh الحرج merupakan bentuk jamak dari حرجة yang artinya pohon yang dililit oleh pohon-pohon lain, sehingga

antara pohon itu dengan pohon yang melingkarinya tidak ada celah untuk dimasuki oleh sesuatu lantaran rapatnya lilitan tersebut (Al-Bakri et al., 2007).

Munurut tafsir al-misbah, pada kalimat *barang siapa Allah menghendaki untuk memberinya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam* yaitu dengan mencampakkan cahaya iman ke hatinya setelah dia menampakkan keinginan untuk beriman dan melangkahkahi kaki ke arah sana serta mendukung keinginannya untuk percaya dengan jalan mengukuhkan pikiran dan hatinya, sehingga hilang keraguan yang menyelimutinya. Dan Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan-Nya, yakni menetap dalam kesesatannya, karena kebejatan hatinya niscaya dia menolak ajakan iman, sehingga Dia menjadikan dadanya sangat sempit, tidak mampu menampung kebajikan dan kebenaran, bahkan dadanya sesak, sehingga tidak ada kebaikan yang bersedia mendatangnya. Keadaannya ketika itu bagaikan dia sedang memaksakan diri mendaki di langit, yakni di angkasa, atau ke angkasa (Shihab, 2005).

Kata *yasyrah shadrahu*/melapangkan dadanya adalah gambaran dari penerimaan iman dan Islam. Manusia apabila percaya bahwa satu aktivitas mempunyai nilai tambah dan manfaat yang banyak, hatinya akan cenderung kepada penambahan nilai dan manfaat yang banyak itu; sedemikian banyaknya, sehingga ia memerlukan wadah yang luas. Pada kata *haraj* diterjemahkan dengan sesak. Firman-Nya: Dadanya sangat sempit lagi sesak, bagaikan ia sedang mendaki ke langit. Kata sangat dipahami dari kata *yashsha'adu*/yang menggunakan tasydid (penekanan) pada huruf shad, padahal dari segi bahasa dapat juga tanpa

tasydid itu. Penggalan ayat ini dijadikan oleh sementara ulama sebagai salah satu ayat yang mengandung isyarat ilmiah. Bahwa seseorang akan mengalami sesak nafas pada saat mendaki ke langit/angkasa, adalah satu kenyataan ilmiah yang baru dikenal sejak upaya manusia keluar angkasa, akhir abad XX ini (Shihab, 2005).

Dahulu ulama-ulama memahami firman-Nya bagaikan dia sedang mendaki ke langit sebagai gambaran seseorang yang ingin mendaki meraih sesuatu tetapi tak mampu atau selalu gagal. Seorang kafir bila diajak kepada kebajikan akan mengalami kesulitan luar biasa, hatinya akan merasa sangat berat tidak ubahnya seorang yang sedang mendaki, terengah-engah dan mengalami sesak nafas (Shihab, 2005).

Ada yang memahami kata (في) fi dalam firman-Nya : (يصعد في السماء), dalam arti (الي) yakni ke, sehingga dia diterjemahkan "mendaki ke langit", yakni angkasa. Ada juga yang memahaminya sebagaimana maknanya yang populer, yaitu dalam arti di, yakni di langit/ angkasa. Pemilihan kata itu dalam ayat ini bertujuan mengilustrasikan seakan-akan dia telah berada di angkasa, dan berusaha naik dan terus naik, bagaikan seekor binatang yang mendaki satu ketinggian tahap demi tahap, tetapi ketika dia telah hampir sampai ke puncak, dia terjatuh, demikian berulang-ulang (Shihab, 2005).

Pada ayat ini terdapat korelasi yang kongkrit dengan ilmu fisiologi (fungsi-fungsi organ tubuh). Dimana didalam ilmu fisiologi respirasi, bahwa minimnya tekanan udara dan oksigen terjadi setiap kali bertambah ketinggian seseorang dari permukaan bumi. Keadaan ini menyebabkan kesempitan dan kesulitan pada dada untuk bernapas (sesak nafas) (Romlah, 2015). Allah SWT berfirman dalam QS At-

Takwir/ 81:18

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

Terjemahnya :

"Demi subuh apabila (fajar) telah menyingsing,"

Dalam tafsir *Fii Zhilalil Qur'an*, menunjukkan fenomena kehidupan yang jelas dan lebih mengesankan. Subuh itu sebagai sesuatu yang hidup dan bernapas. Napasnya adalah cahaya, kehidupan, dan gerakan yang merambat pada setiap makhluk hidup. Hampir dipastikan bahwa bahasa Arab dengan segala ungkapannya tidak pernah memiliki ungkapan yang sebanding dengan pengungkapan Al-Qur'an tentang waktu subuh ini. Ketika melihat fajar menyingsing. Hati yang terbuka merasakan bahwa secara praktis ia bernapas (Quthb, 2003).


Dari ayat At-Takwir di atas, kata "*tanaffasa*" sendiri berasal dari kata "*nafasa*" secara literatur artinya bernapas. Sehingga pada surah At-takwiir ayat 18 di atas secara literal artinya adalah "dan subuh ketika dia (mulai) bernafas". "*Tanaffasa*" disini bukanlah proses bernapas makhluk hidup dimana menghirup O₂ dan melepaskan CO₂, karena proses bernapas makhluk hidup berlangsung sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam. Bahkan tumbuhan-tumbuhan pun melakukan pernapasan dimana mengambil oksigen untuk bernapas dan melepaskan karbondioksida sepanjang waktu. "*tanaffas*" ini adalah proses penghasilan zat yang dibutuhkan dalam pernapasan itu sendiri yaitu oksigen (Romlah, 2015).

Dari kedua ayat di atas merujuk kata sesak dan bernapas, dimana kedua kata tersebut ada kaitannya dengan asma. Kaitan yang dimaksud ialah asma sendiri merupakan gangguan pada sistem pernapasan,

dimana salah satu manifestasinya adalah sesak napas. Karena adanya gangguan, sehingga fisiologi bernafas tidak berfungsi sebagaimana mestinya, salah satunya akibat adanya obstruksi pada saluran pernapasan.




D. Kerangka Teori



Bagan 1. Kerangka Teori Penelitian

E. Kerangka Konsep



Bagan 2. Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan :

- = Variabel Independen
- ▣ = Variabel Dependen
- ⋯ = Variabel yang tidak diteliti
- ➔ = Dapat menjadi faktor risiko dari

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan pendekatan *case control* untuk mengetahui faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023-Maret 2024.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien anak yang menderita asma di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023.

2. Sampel

Sampel kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien anak yang menderita asma di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023 yang diambil dengan metode pengambilan sampel berupa *purposive sampling* dan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi. Sedangkan sampel control pada penelitian ini adalah

pasien anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023 yang diambil dengan metode pengambilan sampel yang sama serta mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk ukuran sampel ditentukan jumlah sampel dari populasi dengan menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

Keterangan :

- n = jumlah sampel
- d = batas toleransi kesalahan 10% (0,1)
- N : jumlah populasi = 75

Jadi, dalam penelitian ini didapatkan ukuran sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{75}{1 + 75 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{75}{1 + 75 (0,01)}$$

$$n = \frac{75}{1 + 0,75}$$

$$n = \frac{75}{1,75}$$

$$n = 42,85 \text{ (dibulatkan menjadi 43)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin untuk sampel kasus didapatkan jumlah sampel sebanyak 43 sampel. Pada penelitian ini menggunakan perbandingan 1 : 1 (kasus : kontrol) sehingga untuk sampel kontrol sebanyak 43 sampel. Jadi, total sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 86 sampel yang terdiri dari 43 sampel kasus dan 43 sampel kontrol.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian yang berdesain *case control* ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dari sampel kasus dan kontrol yaitu :

1. Sampel Kasus

a. Kriteria Inklusi

- Anak yang menjadi pasien dan dirawat di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2019-2023
- Anak yang terdiagnosis asma
- Anak yang berusia 0-18 tahun
- Data rekam medik yang lengkap

b. Kriteria Eksklusi

- Pasien anak yang menderita penyakit paru lain seperti bronkiolitis, bronkitis, bronkopneumoni/pneumonia, Ca paru, cystic fibrosis dan TB paru.

2. Sampel Kontrol

a. Kriteria Inklusi

- Anak yang menjadi pasien dan dirawat di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2019-2023
- Anak yang terdiagnosis penyakit gangguan pernapasan
- Anak yang berusia 0-18 tahun
- Data rekam medik yang lengkap

b. Kriteria Eksklusi

- Anak yang terdiagnosis asma

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini adalah kejadian asma pada anak.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan terhadap catatan hasil observasi. Peneliti harus memeriksa kelengkapan, kebenaran serta kejelasan data data yang didapatkan.

b. Coding

Tahap *coding* adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah pengolahan data.

c. Tabulating

Langkah *tabulating* adalah tahap untuk mempersiapkan informasi yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel analisis.

d. *Processing*

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk dianalisis. *Processing* dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi ke dalam *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS).

e. *Cleaning*

Pembersihan data atau *cleaning* adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi (SPSS) yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang telah diberikan kode dan disusun serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memudahkan dalam analisis data.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis untuk memberikan gambaran terhadap variabel dan karakteristik dalam penelitian. Analisis univariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan persentase data yang diperoleh terhadap variabel berdasarkan masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat yaitu analisa yang digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel

dependen digunakan uji *Chi-Square* dan uji statistik *Odds Ratio* (OR) untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel independen terhadap sampel kasus dan sampel kontrol dengan menggunakan tabel. Odds Ratio merupakan rasio antara *odd* yang terpapar dengan yang tidak terpapar. $OR = ad/bc$

Faktor Risiko	Kelompok Sampel		Jumlah
	Sampel Kasus (+)	Sampel Kontrol (-)	
	(+)	a	b
(-)	c	d	c+d
Total	a+c	b+d	t

Keterangan :

- a : Jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (+)
- b : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (+)
- c : jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (-)
- d : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (-)
- a+b : jumlah sampel kasus dan kontrol dengan faktor risiko (+)
- c+d : jumlah sampel kasus dan kontrol dengan faktor risiko (-)
- a+c : jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (+) dan (-)
- b+d : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (+) dan (-)
- t : jumlah keseluruhan

Untuk interpretasi dari Odds Ratio :

- $OR > 1$ berarti variabel independen merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam Rahim

- $OR = 1$ berarti variabel independen bukan merupakan faktor risiko asma pada anak
- $OR < 1$ berarti variabel independen merupakan faktor protektif asma pada anak


Untuk uji kemaknaan dari Odds Ratio dilakukan :

- Menentukan nilai dari Confidence Interval (CI) yaitu 95%.
- Menentukan Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL).

Adapun interpretasi kebermaknaannya sebagai berikut :

- Jika didapatkan nilai LL dan UL < 1 atau > 1 , maka OR yang diperoleh memiliki kebermaknaan.
- Jika didapatkan nilai LL dan UL adalah 1, maka OR yang diperoleh tidak memiliki kebermaknaan.

G. Metode Pengumpulan Data



Bagan 3. Metode Pengumpulan Data

H. Etika Penelitian

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat dengan nomor B-189/KEPK/FKIK/XII/2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait

sebagai permohonan izin penelitian.

3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan.
4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang terletak di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 48, Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menganalisis faktor risiko kejadian asma pada anak yaitu usia, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat infeksi saluran pernapasan. Dalam mencapai tujuan penelitian maka peneliti melakukan pengambilan data, kemudian data dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi masing-masing variabel dalam penelitian. Pada penelitian ini jumlah sampel yaitu 86 yang terdiri dari 43 kelompok kasus dan 43 kelompok kontrol. Adapun tabel distribusi yang disertai karakteristik dari sampel penelitian berupa jenis kelamin sebagai berikut :

a. Distribusi Responen berdasarkan Usia

Usia Anak	Kasus		Kontrol		Total	
	N	%	n	%	N	%
Risiko Tinggi	33	76,7	15	34,9	48	55,8
Risiko Rendah	10	23,3	28	65,1	38	44,2
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0

Tabel 11. Distribusi berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan distribusi frekuensi dengan kejadian asma pada anak dengan usia 0-5 tahun berjumlah 33 anak (76,7%) dan yang berusia 6-18 tahun berjumlah 10 anak (23,3%). Sedangkan untuk frekuensi yang bukan kejadian asma pada anak dengan usia 0-5 tahun berjumlah 15 anak (34,9%) dan yang berusia 6-18 tahun berjumlah 28 anak (65,1%). Anak yang berusia 0-5 tahun lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan anak yang berusia 6-18 tahun lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.

b. Distribusi Respoden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Kasus		Kontrol		Total	
	N	%	n	%	N	%
Laki-Laki	27	62,8	27	62,8	54	62,8
Perempuan	16	37,2	16	37,2	32	37,2
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0

Tabel 12. Distribusi berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan distribusi frekuensi dengan kejadian asma pada anak dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 27 anak (62,8%) dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 anak (37,2%). Sedangkan untuk frekuensi yang bukan kejadian asma pada anak dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 27 anak (62,8%) dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 anak (37,2%). Anak yang dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama banyaknya pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Namun pada kedua

kelompok, jumlah anak yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari anak perempuan.

c. Distribusi Respoden berdasarkan Riwayat Atopi pada Pasien

Riwayat Atopi pada Pasien	Kasus		Kontrol		Total	
	N	%	N	%	n	%
Risiko Tinggi	28	65,1	11	25,6	39	45,3
Risiko Rendah	15	34,9	32	74,4	47	54,7
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0

Tabel 13. Distribusi berdasarkan Riwayat Atopi pada Pasien

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan distribusi frekuensi dengan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat atopi berjumlah 28 anak (65,1%) dan yang tidak memiliki riwayat atopi berjumlah 15 anak (34,9%). Sedangkan untuk frekuensi yang bukan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat atopi berjumlah 11 anak (25,6%) dan yang tidak memiliki riwayat atopi berjumlah 32 anak (74,4%). Anak yang memiliki riwayat atopi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan anak yang yang tidak memiliki riwayat atopi lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.

d. Distribusi Respoden berdasarkan Riwayat Atopi dalam Keluarga

Riwayat Atopi dalam Keluarga	Kasus		Kontrol		Total	
	N	%	N	%	N	%
Risiko Tinggi	42	97,7	15	34,9	57	66,3
Risiko Rendah	1	2,3	28	65,1	29	33,7
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0

Tabel 14. Distribusi berdasarkan Riwayat Atopi dalam Keluarga

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan distribusi frekuensi dengan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat atopi dalam keluarga berjumlah 42 anak (97,7%) dan yang tidak memiliki riwayat atopi dalam keluarga berjumlah 1 anak (2,3%). Sedangkan untuk frekuensi yang bukan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat atopi dalam keluarga berjumlah 15 anak (34,9%) dan yang tidak memiliki riwayat atopi dalam keluarga berjumlah 28 anak (65,1%). Anak yang memiliki riwayat atopi dalam keluarga lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan anak yang tidak memiliki riwayat atopi dalam keluarga lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.

e. Distribusi Respoden berdasarkan Riwayat Infeksi Saluran Pernapasan

Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan	Kasus		Kontrol		Total	
	N	%	n	%	N	%
Risiko Tinggi	33	76,7	11	25,6	44	51,2
Risiko Rendah	10	23,3	32	74,4	42	48,8
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0

Tabel 15. Distribusi berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan distribusi frekuensi dengan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan berjumlah 33 anak (76,6%) dan yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan berjumlah 10 anak (23,3%). Sedangkan untuk frekuensi yang bukan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat infeksi saluran pernapasan berjumlah 11 anak (25,6%) dan yang tidak memiliki riwayat infeksi saluran pernapasan berjumlah 32 anak (74,4%). Anak yang memiliki riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan anak yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dalam hal ini usia anak, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan dengan variabel dependen yaitu kejadian asma pada anak dengan menggunakan uji statistik Odds Ratio (OR) untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel independen terhadap sampel kasus dan sampel kontrol.

a. Usia Anak dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak

Usia Anak	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	N	%	N	%	N	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	33	76,7	15	34,9	48	55,8	0,000	6,160	2,393	15,855
Risiko Rendah	10	23,3	28	65,1	38	44,2				
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0				

Tabel 16. Hasil Analisis Bivariat Usia dengan Kejadian Asma pada Anak

Tabel 16 menunjukkan bahwa anak dengan usia risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 33 orang (76,7%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 15 orang (34,9%). Hasil analisis diperoleh $p\text{-value} = 0,000$, yang artinya nilai tersebut dianggap bermakna dapat berpengaruh karena nilai $p\text{-value} < 0,05$. Hasil analisis diperoleh nilai OR sebesar 6,160 pada CI 95% dengan LL sebesar 2,393 dan UL sebesar 15,855. Nilai OR 6,160 yang berarti usia anak

merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan usia pada pasien risiko tinggi memiliki risiko 6,160 kali mengalami kejadian asma pada anak. Nilai LL dan UL dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 2,393 – 15,855) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 6,160 dianggap bermakna secara statistik atau usia anak merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak.

b. Riwayat Atopi pada Pasien dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak

Riwayat Atopi pada Pasien	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	N	%	N	%	N	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	28	65,1	11	25,6	39	45,3	0,001	5,430	2,145	13,746
Risiko Rendah	15	34,9	32	74,4	47	54,7				
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0				

Tabel 17. Hasil Analisis Bivariat Riwayat Atopi pada Pasien dengan Kejadian Asma pada Anak

Tabel 17 menunjukkan bahwa anak dengan riwayat atopi pada pasien risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 28 orang (65,1%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 15 orang (34,9%). Hasil analisis diperoleh $p\text{-value} = 0,001$, yang artinya nilai tersebut dianggap bermakna dapat berpengaruh karena nilai $p\text{-value} < 0,05$. Hasil analisis diperoleh nilai OR sebesar 5,430 pada CI 95%

dengan LL sebesar 2,145 dan UL sebesar 13,746. Nilai OR 5,430 yang berarti riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan riwayat atopi pada pasien risiko tinggi memiliki risiko 5,430 kali mengalami kejadian asma pada anak. Nilai LL dan UL dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 2,145 – 13,746) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 5,430 dianggap bermakna secara statistik atau riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak.

c. Riwayat Atopi dalam Keluarga dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak

Riwayat Atopi dalam Keluarga	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	N	%	N	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	42	97,7	15	34,9	57	66,3	0,000	78,40	9,795	627,5
Risiko Rendah	1	2,3	28	65,1	29	33,7				
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0				

Tabel 18. Hasil Analisis Bivariat Riwayat Atopi dalam Keluarga dengan Kejadian Asma pada Anak

Tabel 18 menunjukkan bahwa anak dengan riwayat atopi dalam keluarga risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 42 orang (97,7%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 orang (2,3%). Hasil analisis diperoleh $p\text{-value} = 0,000$, yang artinya nilai tersebut dianggap

bermakna dapat berpengaruh karena nilai p -value $< 0,05$. Hasil analisis diperoleh nilai OR sebesar 78,400 pada CI 95% dengan LL sebesar 9,795 dan UL sebesar 627,522. Nilai OR 78,400 yang berarti riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan riwayat atopi dalam keluarga risiko tinggi memiliki risiko 78,400 kali mengalami kejadian asma pada anak. Nilai LL dan UL dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 9,795 – 627,522) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 78,400 dianggap bermakna secara statistik atau riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak.

d. Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak

Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan	Kasus		Kontrol		Total		p -value	OR	CI 95%	
	N	%	N	%	n	%			Lower	Upper
Risiko Tinggi	33	76,7	11	25,6	44	51,2	0,000	9,600	3,586	25,702
Risiko Rendah	10	23,3	32	74,4	42	48,8				
Total	43	100,0	43	100,0	86	100,0				

Tabel 19. Hasil Analisis Bivariat Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan dengan Kejadian Asma pada Anak

Tabel 19 menunjukkan bahwa anak dengan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 33 orang (76,7%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 10 orang (23,3%).

Hasil analisis diperoleh $p\text{-value} = 0,000$, yang artinya nilai tersebut dianggap bermakna dapat berpengaruh karena nilai $p\text{-value} < 0,05$. Hasil analisis diperoleh nilai OR sebesar 9,600 pada CI 95% dengan LL sebesar 3,586 dan UL sebesar 25,702. Nilai OR 9,600 yang berarti riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan riwayat atopi dalam keluarga risiko tinggi memiliki risiko 9,600 kali mengalami kejadian asma pada anak. Nilai LL dan UL dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 3,586 -25,702) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 9,600 dianggap bermakna secara statistik atau riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak.

B. Pembahasan

Telah dilakukan penelitian terkait faktor risiko yang menyebabkan kejadian asma pada anak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2019-2023. Dalam penelitian didapatkan sampel sebanyak 43 anak yang menderita asma dengan sampel kontrolnya sebanyak 43 anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian asma pada anak yaitu usia anak, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan.

1. Usia Anak dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai OR sebesar 6,160 pada CI 95% dengan nilai LL 2,393 dan UL sebesar 15,855. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan usia risiko tinggi memiliki risiko 6,160

kali mengalami kejadian asma pada anak dibandingkan dengan usia anak yang risiko rendah. Nilai LL dan UL tidak mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 6,160 dianggap bermakna secara statistik atau usia anak merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Adrianto (2019) dengan judul Prevalensi dan Faktor-Faktor Risiko Asma pada Anak di RSUD DR. Moewardi Surakarta yang menunjukkan bahwa faktor risiko yang mempengaruhi asma pada anak salah satunya adalah usia dengan $p\text{-value} = 0,027$ (Putra, 2019). Penelitian lain yang sejalan adalah penelitian yang dilakukan oleh Made Michel dkk (2021) dengan judul Karakteristik Asma pada Anak di Puskesmas Denpasar Timur tahun 2019-2021 yang menunjukkan bahwa angka tertinggi karakteristik pasien asma pada anak di Puskesmas I Denpasar Timur pada tahun 2019-2021 berada pada rentang umur 0-4 tahun sebanyak 43 orang (58,1%) (Kresnayasa et al., 2021). Penelitian lain oleh Nanda Akmal dkk (2022) dengan judul Karakteristik Penderita Asma pada Anak di Ruang Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kelompok usia anak penderita asma yang paling banyak adalah kelompok usia 2-5 tahun dengan jumlah 25 pasien dengan persentase 51% dari seluruh sampel penelitian (Zulfikri et al., 2022). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Runtuwene dkk (2016) dengan judul Prevalensi dan Faktor-Faktor Risiko yang menyebabkan Asma pada Anak-anak di RSUD GMIM Bethesda Tomohon periode Agustus 2011 – Juli 2016 menunjukkan bahwa kelompok usia anak yang paling banyak

adalah usia anak >5 tahun, sebanyak 50 anak dari 74 sampel yang diteliti (Runtuwene et al., 2016).

Kejadian serangan asma pada usia dibawah 5 tahun sering dikaitkan dengan proses pematangan imunitas yang belum matang dan berkaitan dengan keseimbangan antara Th1/Th2. Proses sensitisasi terjadi dari awal kehidupan dan terbentuk bertahap dari proses rangsangan berupa infeksi virus atau pun berupa alergen makanan sampai dengan rangsangan aeroalergen. Seringkali pada kelompok usia ini, terutama pada umur 0-3 tahun, timbulnya gejala lebih dipicu oleh virus. Gejala yang ditimbulkan sangat minimal pada fase awal, sampai dengan terjadinya infeksi saluran napas yang lebih berat sehingga dapat memicu terjadinya kaskade inflamasi yang signifikan dan berat. Proses tersebut akan mempengaruhi modul respon imun yang akan lebih cenderung ke arah aktivitas Th2. Kecenderungan aktivitas Th2 akan menurunkan produk IL-2 dan IFN- γ oleh Th2. Respon IFN- γ yang rendah pada anak saat awal kehidupan akan lebih berisiko untuk tersensitisasi oleh aeroalergen dan menderita asma (Kresnayasa et al., 2021).

2. Riwayat Atopi pada Pasien dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai OR sebesar 5,430 pada CI 95% dengan nilai LL 2,145 dan UL sebesar 13,746. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan riwayat atopi pada pasien risiko tinggi memiliki risiko 5,430 kali mengalami kejadian asma pada anak dibandingkan dengan riwayat atopi pada pasien dengan risiko rendah. Nilai LL dan UL tidak mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 5,430 dianggap bermakna secara statistik atau

riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi dkk (2022) dengan judul Faktor Predisposisi dan Pencetus dengan Serangan Asma Bronkhial menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara riwayat alergi dengan serangan asma di Puskesmas Glugur Darat Medan 2021 (Dedi et al., 2022). Penelitian lain oleh Indri Runtuwene dkk (2016) dengan judul Prevalensi dan Faktor-Faktor Risiko yang menyebabkan Asma pada Anak di RSUD GMIM Bethesda Tomohon periode Agustus 2011 – Juli 2016 menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap kejadian asma adalah riwayat atopi (Runtuwene et al., 2016). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Akmal dkk (2022) dengan judul Karakteristik Penderita Asma pada Anak di Ruang Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa jumlah anak penderita asma yang tidak memiliki riwayat atopi lebih banyak dibandingkan anak dengan riwayat atopi (Zulfikri et al., 2022).

Riwayat penyakit-penyakit atopi yang tergabung dalam rangkaian penyakit alergi progresif yang disebut *atopic march* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya asma pada anak. Penyakit-penyakit alergi tersebut berdasarkan urutan kejadiannya dalam masa awal kehidupan diantaranya dermatitis atopik, alergi makanan, asma, dan rinitis alergi. Penyakit-penyakit tersebut saling berkorelasi secara positif antara satu dengan yang lain, munculnya salah satu dari keempat penyakit tersebut akan meningkatkan risiko perkembangan ketiga penyakit lainnya. Hal tersebut didasari oleh faktor predisposisi genetik

dan lingkungan yang memiliki latar belakang imunologis yang sama, yaitu respons sel Th2 yang spesifik terhadap alergen, produksi IgE spesifik akibat kerja sel-sel efektor tipe 2, aktivasi granulosit, dan sistem imun bawaan lainnya yang dapat memicu produksi mukus serta edema. Dermatitis atopik dan alergi makanan merupakan alergi yang muncul lebih dini dimasa awal kehidupan, kemungkinan kedua penyakit alergi tersebut akan berkembang menjadi penyakit asma dikemudian hari adalah sebesar 30-80% (Zulfikri et al., 2022).

3. Riwayat Atopi dalam Keluarga dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai OR sebesar 78,400 pada CI 95% dengan nilai LL 9,795 dan UL sebesar 627,522. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan riwayat atopi dalam keluarga risiko tinggi memiliki risiko 78,400 kali mengalami kejadian asma pada anak dibandingkan dengan riwayat atopi dalam keluarga dengan risiko rendah. Nilai LL dan UL tidak mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 78,400 dianggap bermakna secara statistik atau riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhar Arifuddin dkk (2019) dengan judul Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asma di Wilayah Kerja Puskesmas Singgani Kota Palu yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan riwayat keluarga dengan kejadian asma di wilayah kerja Puskesmas Singgani Kota Palu dengan $p\text{-value} = 0,006$ (Arifuddin et al., 2019). Penelitian lain oleh Dedi dkk (2022) dengan judul Faktor Predisposisi

dan Pencetus dengan Serangan Asma Bronkhial menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan serangan asma di Puskesmas Glugur Darat Medan 2021 (Dedi et al., 2022). Penelitian oleh Winta dkk (2020) dengan judul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Asma Bronkial Pada Anak di Puskesmas Saitnihuta Kabupaten Humbanghasundutan menunjukkan bahwa keluarga yang mempunyai riwayat penyakit asma bronkial mempunyai risiko 8,27 kali dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki riwayat penyakit asma bronkiale (Winta et al., 2020).

Angka peningkatan penderita asma dikaitkan dengan adanya faktor risiko yang mendukung seseorang menderita penyakit asma bronkial, misalnya faktor keturunan. Jika seorang ibu atau ayah menderita penyakit asma bronkial maka anak berpeluang besar adanya penderita asma dalam anggota keluarga tersebut. Langkah tepat yang dapat dilakukan untuk menghindari serangan asma bronkial adalah menjauhi faktor-faktor penyebab yang memicu timbulnya serangan asma itu sendiri (Bull & Price, 2007).

Orang tua yang memiliki riwayat alergi pernafasan seperti asma cenderung memiliki anak dengan kondisi alergi pernafasan seperti asma. Hal ini dikarenakan faktor genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak berupa kontrol antibodi Ig-E sebagai respon terhadap alergen. Riwayat asma pada kedua orangtua meningkatkan risiko anak dengan penyakit yang sama sebesar 8,2 kali, tetapi apabila hanya salah satu orang tua maka meningkatkan risiko anak terkena asma sebesar 4,24 kali dibandingkan dengan riwayat orangtua tanpa penyakit asma (Arifuddin et al., 2019).

Modifikasi epigenetik mengatur ekspresi sion sitokin dan faktor transkripsi yang bertanggung jawab untuk sel T diferensiasi. Selain itu, mekanisme epigenetik (termasuk DNA metilasi) dapat mempengaruhi asma pada masa kanak-kanak melalui regulasi kadar IgE dan gen asma lainnya (ALOX15(15-lipoxygenase), CAPN14 (*calpain*-14), dan POSTN (periostin)) yang berperan dalam inflamasi (Budianto, 2019). Gen pada kromosom 17 (ORMDL3) juga berhubungan dengan onset asma anak. Studi menunjukkan bahwa ORMDL3 berperan dalam regulasi fungsi barrier epitel di saluran napas, mengatur respons inflamasi, dan mempengaruhi sensitivitas bronkial (Hsu & Turvey, 2013) .

4. Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai OR sebesar 9,600 pada CI 95% dengan nilai LL 3,586 dan UL sebesar 25,702. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan risiko tinggi memiliki risiko 9,600 kali mengalami kejadian asma pada anak dibandingkan dengan riwayat atopi dalam keluarga penyakit infeksi saluran pernapasan risiko rendah. Nilai LL dan UL tidak mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 9,600 dianggap bermakna secara statistik atau riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Mercy Manese (2021) dengan judul Faktor Resiko yang Berhubungan dengan Riwayat Serangan Pada Penderita Asma di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan nilai *p-value* = 0,011 artinya terdapat hubungan antara

faktor infeksi saluran pernapasan dengan riwayat serangan asma (Manese et al., 2021). Penelitian lain oleh Nanda Akmal dkk (2022) dengan judul Karakteristik Penderita Asma pada Anak di Ruang Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa infeksi saluran pernapasan menjadi faktor pencetus utama dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu sebanyak 45 kasus (91,8%) (Zulfikri et al., 2022). Penelitian oleh Abraham dkk (2007) dengan judul Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Wenang Kota Manado juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat bermakna antara adanya infeksi saluran napas dalam 1 tahun terakhir dengan kejadian asma ($p < 0,001$) (Laisina et al., 2007). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh (2012) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Pemicu Dominan Terjadinya Serangan Asma Pada Pasien Asma yang menunjukkan $p\text{-value} = 0,598$, yang artinya tidak ada hubungan antara paparan infeksi pernapasan dengan terjadinya serangan asma (Ekarini, 2012).

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pernafasan mulai dari hidung, sinus, bronkus, alveoli, pleura hingga rongga telinga tengah. Gejala yang ditimbulkan berupa batuk, kesulitan bernafas, nyeri pada tenggorokan, nyeri kepala, pilek dan demam. Infeksi pada saluran pernafasan akan mengakibatkan inflamasi pada saluran trakeobronkial yang akan mengubah mekanisme mukosilier. Hal ini menyebabkan peningkatan pada hiperresponsif pada sistem bronkial (Djamil et al., 2020).

Orang yang sebelumnya pernah menderita penyakit infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia/bronkopneumonia, bronkitis dan

bronkiolitis dapat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan asma. Penyakit tersebut dapat merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan perubahan pada saluran pernapasan. Ini bisa meningkatkan sensitivitas saluran pernapasan terhadap rangsangan tertentu dan menyebabkan pengembangan asma. Peningkatan terhadap sensitivitas saluran pernapasan akan menyebabkan seseorang mudah tersensitasi oleh aeroalergen ataupun patogen sehingga kemudian bisa menyebabkan inflamasi pada saluran pernapasan (Gillissen & Paparoupa, 2015).

Respon inflamasi saluran napas pada asma merupakan manifestasi interaksi kompleks antara beberapa jenis sel dan mediator molekuler. Stimulus lingkungan pada periode awal kanak-kanak akan mengaktifasi sel epitel saluran napas untuk menginisiasi respons alergi saluran napas dan asma pada anak. Komunikasi antar sel pada epitel saluran napas dan sel mesenkim/submukosa merupakan mekanisme fundamental dari asma. Stimulus lingkungan dapat mengaktifasi sel epitel meliputi oksidan (rokok, polutan kendaraan), aeroalergen, dan infeksi mikrobial terutama virus. Sel epitel saluran napas akan mengekspresikan pola reseptor pengenal multipel untuk mendeteksi dan merespons sinyal berbahaya (Yudhawati & Krisdanti, 2017).

Aktivasi reseptor pengenal pada sel epitel saluran napas akan memicu pelepasan berbagai sitokin, kemokin, *peptide antimicroba*, mediator lipid, *nitric oxide*, dan *reactive oxygen species*. Mediator inflamasi tersebut akan mengakibatkan berbagai konsekuensi meliputi penarikan leukosit ke saluran napas, regulasi tonus dan sekresi saluran napas, serta induksi aktivitas antimikroba dan antiviral. Berbagai sel

inflamasi banyak terlibat pada asma, tetapi peran yang tepat dari setiap jenis sel belum bisa dipastikan. Sel inflamasi yang terlibat pada asma terdiri dari eosinofil, sel mast, limfosit T, makrofag, sel dendritik, neutrofil, dan basophil (Baratawidjaja & Garma, 2009).

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni :

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa rekam medik sehingga informasi yang diperoleh pun terbatas sesuai yang terdapat pada data rekam medik.
2. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, sehingga sampel dengan variabel kasus yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.
3. Lokasi penelitian ini hanya mencakup RSUD Syekh Yusuf kabupaten Gowa, sehingga variabel yang diteliti pun tidak beragam .
4. Variabel penelitian ini hanya mencakup bebarapa faktor risiko kejadian asma pada anak seperti usia, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan, sehingga hasil yang diperoleh pada penelitian ini mungkin tidak mencakup seluruh aspek yang berpengaruh terhadap kejadian asma pada anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian yang dilakukan tentang analisis faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kejadian asma pada anak ($p\text{-value} = 0,000$), sehingga anak dengan usia 0-5 tahun merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan nilai OR = 6,160 kali mengalami kejadian asma dibandingkan dengan anak dengan usia 6-18 tahun.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara anak yang memiliki riwayat atopi dengan kejadian asma pada anak ($p\text{-value} = 0,001$), sehingga anak dengan riwayat atopi merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan nilai OR = 5,430 kali mengalami kejadian asma dibandingkan dengan anak tanpa riwayat atopi.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara anak yang memiliki riwayat atopi dalam keluarga dengan kejadian asma pada anak ($p\text{-value} = 0,000$), sehingga anak dengan riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak di RSUD Syekh

Yusuf Kabupaten Gowa dengan nilai OR = 78,400 kali mengalami kejadian asma dibandingkan dengan anak tanpa riwayat atopi dalam keluarga.

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara anak yang memiliki riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan dengan kejadian asma pada anak (*p-value* = 0,000), sehingga anak dengan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan nilai OR = 9,600 kali mengalami kejadian asma dibandingkan dengan anak tanpa riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a. Memperhatikan faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian asma khususnya pada anak, sehingga dapat melakukan pencegahan lebih awal.
- b. Menambah informasi dan wawasan orangtua serta keluarga agar bersama-sama dapat mengidentifikasi dan dilakukan langkah pencegahan yang tepat.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

- a. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengenali faktor risiko kejadian asma serta melakukan usaha untuk mencegah kejadian tersebut sembari melakukan pemeriksaan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan risiko asma.

- b. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengisi rekam medik secara lengkap, khususnya untuk kasus gangguan pernapasan disertakan anamnesis yang lebih lengkap terkait faktor risiko yang ada pada pasien serta mengisi data rekam medik dengan tulisan yang dapat dibaca dan difahami dengan baik untuk kebutuhan penelitian dan pembelajaran terkait kesehatan kedepannya .
- c. Diharapkan tenaga kesehatan agar menyimpan rekam medik dengan rapi dan aman agar tidak ada data rekam medik yang hilang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan kejadian asma pada anak.
- b. Mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel faktor risiko yang dapat diteliti serta menggunakan data primer agar mendapatkan informasi yang lebih tentang faktor-faktor risiko kejadian asma pada anak.
- c. Melakukan penelitian di rumah sakit ataupun tempat fasilitas kesehatan lainnya yang berhubungan dengan kejadian asma pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakri, A. A., Muhammad, M. A., Khalaf, M. A. L., & Hamid, M. M. A. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Amalia, R., Nurdin, A., Sari, J. I., & Sakinah, A. I. (2022). Hubungan Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Ananda Kota Makassar. *Jurnal Kedokteran*, 6(1), 57–67.
- Arif, S., & Anasagi., T. (2019). *Immunologi*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Arifuddin, A., Rau, M. J., & Hardiyanti, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asma Di Wilayah Kerja Puskesmas Singgani Kota Palu. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 5(1), 13–18.
- Asher, I., & Billo, N. (2022). The Global Asthma Report. *Int J Tiber Lung Dis*, 26(5), 1–102.
- Baratawidjaja, & Garma, K. (2009). *Alergi Dasar* (1st ed.). Interna publishing.
- Budianto, Y. (2019). Hubungan Genetik Dan Polusi Udara Dengan Kejadian Asma Bronkial Pada Anak Usia 1-3 Tahun Di Desa Puser Wilayah Kerja Puskesmas Tanjungagung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang*, 8(1), 24–29.
- Bull, E., & Price, D. (2007). *Simple Guide Asma*. Erlangga.
- Cai, L. (2012). *Structure and Function of Airway Surface Layer of the Human Lungs & Mobility of Probe Particles in Complex Fluids*. University of North Carolina.
- Dedi, Yuniati, & Afifah, G. (2022). Faktor Predisposisi Dan Pencetus Dengan Serangan Asma Bronkial. *Journal Healthy Purpose*, 1(2), 41–50.
- DEPKES, R. (2009). *Pedoman Pengendalian Penyakit Asma*. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menula.
- Djamil, A., Hermawan, N. S. A., Febriani, & Arisandi, W. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Kekambuhan Asma pada Pasien Dewasa. *Wellness and Healthy Magazine*, 1(1), 29–40.
- Dwi, K. A., & Baitul, M. S. (2019). Pengaruh Senam Asma Terhadap Frekuensi Kekambuhan Dan Kapasitas Vital Paru Pada Penderita Asma Di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Semarang. *Ournal of Sport Sciences and Fitness*, 5(2), 106–110.
- Ekarini, N. L. P. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Pemicu Dominan Terjadinya Serangan Asma pada Pasien Asma*. Universitas Indonesia.

- Enilari, O., & Sinha, S. (2019). The Global Impact of Asthma in Adult Populations. *Annals of Global Health*, 85(1), 1–7.
- Gillissen, A., & Paparoupa, M. (2015). Inflammation and Infections in Asthma. *ClinRespir Journal*, 9(3), 257–269.
- GINA. (2022). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*.
- Hamdan, & Musniati, N. (2020). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asma Bronkial Pada Anak Usia 5-12 Tahun. *Jurnal of Public Health Inovation*, 1(1), 26–36.
- Hashmi, M. F., Tariq, M., & Cataletto, M. E. (2021). *Asthma*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430901/#article-17920.s2>
- Hsu, K. J., & Turvey, S. E. (2013). Functional Analysis of The Impact of ORMDL3 Expression on Inflammation and Activation of The Unfolded Protein Response in Human Airway Epithelial Cells. *Asthma & Clinical Immunology*, 9(4), 1-10 page.
- Idris, F. (2016). *Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*. BPJS Kesehatan.
- KEMENKES, R. (2019). *Laporan Nasional RISKESDAS 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Koesnoe, S. (2020). *Naskah Lengkap Penyakit Dalam : Update Tatalaksana Asma*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - RS Cipto Mangunkusumo.
- Kresnayasa, M. M., Nyoman Budi Hartawan, G. L. S., & Wati., D. K. (2021). Karakteristik Asma pada Anak di Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019-2021. *Jurnal Medika Udayana*, 10(8), 13–18.
- Laisina, A. H., Sondakh, D. T., & Wantania. (2007). Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak Sekolah Dasar Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Wenang Kota Manado. *Sari Pediatri*, 8(4), 299–304.
- Liwang, F., Yuswar, P. W., Wijaya, E., & Sanjaya, N. P. (2020). *Kapita Selekta Kedokteran*. (Edisi V). Media Aesculapius.
- Lukito, J. I. (2023). Tata Laksana Farmakologis Asma. *CDK-312*, 50(1), 22–29.
- Manese, M., Bidjuni, H., & Rompas, S. (2021). Faktor Resiko yang Berhubungan dengan Riwayat Serangan pada Penderita Asma di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 33–39.
- Masriadi. (2016). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular* (cetakan 1). Trans Info Media.
- Namirah, A. T. P., Pratiwi, U. M., Tihardimanto, A., Jalaluddin, S., & Sabri, M. S. (2023). Gambaran Perkembangan Motorik Halus Pada Bayi Dengan Asi Eksklusif Di Puskesmas Salo Pinrang Tahun 2021. *Alami Journal*, 7(1), 9–

16.

- Pangihutan, ames A. (2021). Asma Non-Atopik : Faktor Resiko, Diagnosis, dan Managemen. *Jurnal Medika Utama*, 2(4), 1191–1195.
- Perdani, R. R. W. (2019). Asma Bronkial pada Anak. *JK Unila*, 3(1), 154–159.
- Putra, D. A. (2019). *Prevalensi dan Faktor-Faktor Risiko Asma pada Anak di RSUD DR. Moewardi Surakarta*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Putri, A. A., Rahmawati, I., Rahmadianto, H., & Mardihusodo. (2022). Prevalensi Dan Faktor-Faktor Risiko Penyebab Asma Pada Anak Di Puskesmas Sumbang 1 Periode Januari 2018-Desember 2020. *Mandala Of Health*, 15(1), 90–101.
- Putri, N. M. W. J. W., Mayangsari, A. S. M., Sidiartha, G. L., Gusti, I., & Adnyana, A. N. S. (2022). Prevalens Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Asma Pada Anak Usia 13-14 Tahun Di Daerah Rural. *Jurnal Medika Udayana*, 11(3), 46–53.
- Quthb, S. (2003). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an jilid VII* (Cetakan 1). Gema Insani Press.
- Rahajoe, N., Kartasasmita, C., Supriyatno, B., & Setyanto, B. (2016). *Pedoman Nasional Asma Anak* (2nd ed.). UKK Respirologi PP IDAI.
- Reddel, H. K., Boulet, L.-P., Yorgancioglu, A., Decker, R., & Hadfield, R. (2021). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*. Global Initiative for Asthma. <https://ginasthma.org/gina-reports/>
- Rismawati. (2020). Diagnosis dan Tatalaksana Serangan Asma Derajat Ringan dan Sedang pada Anak. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 3(4), 31–37.
- Romlah. (2015). *Kapita Selekta Sains Dalam Al-Qur'an*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Runtuwene, I. K., Wahani, A. M., & Pateda, V. (2016). Prevalensi dan faktor-faktor risiko yang menyebabkan asma pada anak di RSUD GMIM Bethesda Tomohon periode Agustus 2011 – Juli 2016. *Jurnal E-Clinic*, 4(2), 1–4.
- Setiati, S., Alwi, I., & Sudoyo, A. W. (2014). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. In *Interna Publishing* (1st ed.). Interna publishing.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sinatra, T. C. (2019). Diagnosis dan Manajemen Jangka Panjang Asma pada Balita. *CDK Edisi Farmasi*, 46(2), 18–22.
- Sinyor, B., & Perez, L. C. (2023). *Pathophysiology Of Asthma*. StatPearls.
- Soedarto. (2012). *Alergi dan Penyakit Sistem Imun*. Sagung Seto.
- Toskala, E., & Kennedy, D. W. (2015). *Asthma risk factors*. National Library of

Medicine.

WHO. (2020). *Global Health Observatory*.

Winta, Fransiska, & Nova. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Asma Bronkial Pada Anak di Puskesmas Saitnihuta Kabupaten Humbanghasundutan. *Journal of Pharmaceutical and Health Research*, 1(3), 67-71.

Yaneva, M., & Darlenski, R. (2021). The Link Between Atopic Dermatitis And Asthma- Immunological Imbalance And Beyond. *Asthma Res Pract*, 7(16).

Yudhawati, R., & Krisdanti, D. P. A. (2017). Imunopatogenesis Asma. *Jurnal Respirasi*, 3(1), 26-33 page.

Zulfikri, N. A., Sukartini, & Mu'ti, A. (2022). Karakteristik Penderita Asma Pada Anak Di Ruang Rawat Inap Rsud Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Pada Tahun 2018-2020. *Jurnal Verdure*, 4(1), 342-356.





LAMPIRAN

Lampiran 1 = Pengumpulan Data

No.	No. RM	Tahun	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Alamat	Riwayat Atopi Pasien	Riwayat Atopi dalam Keluarga	Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan	Diagnosa
1	460298	2019	KH	4 thn	P	Palinappang	Ada (alergi telur)	Ada (ibu)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
2	483381	2019	D	3 thn	P	Bt. Tene	Ada (alergi udang dan kepiting)	Ada (ayah)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
3	530889	2019	MI	3 thn	L	Sinrangan	Ada (DA)	Ada (ibu)	Tidak Ada	Asma Bronkial
4	517893	2019	MA	1 thn	L	Songkolo	Tidak Ada	Ada (ibu)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
5	531982	2019	A	1 thn	L	Jl. Muh. Tahir Sijaya	Ada (alergi susu)	Ada (ibu)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
6	536890	2019	AK	4 thn	P	Pandang	Ada (alergi debu)	Ada (ibu)	Tidak Ada	Asma Bronkial
7	534340	2019	D	1 thn	L	Tamarung	Tidak Ada	Ada (ibu)	Ada (Pneumonia)	Asma Bronkial
8	543429	2019	MF	4 thn	L	Minasa	Ada (alergi bulu kucing)	ada (ayah)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
9	536973	2020	NZA	1 thn	P	Gassing Tiro	Tidak Ada	Ada (ibu)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
10	503767	2020	AP	1 thn	P	Bonto-Bontoa	Tidak Ada	Ada (ayah)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
11	487507	2020	MG	2 thn	L	Taeng Permai	Tidak Ada	Ada (ibu)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
12	558995	2020	MKM	5 thn	L	Taborong	Ada (alergi kerupuk)	Ada (ayah)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
13	461714	2020	AS	11 thn	L	Parang Ma'lengi	Ada (alergi debu, mie, telur)	Ada (ibu)	Ada (Bronkitis)	Asma Bronkial
14	544202	2020	MF	5 thn	L	Bu'rung-Bu'rung	Ada (RA)	Ada (Ibu)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
15	443397	2020	H	4 thn	L	Jenetalasa	Ada (alergi mie dan telur)	Ada (ayah,nenek)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
16	542375	2020	F	1 thn	P	Pallangga	Tidak Ada	Ada (ibu)	Tidak Ada	Asma Bronkial
17	486834	2020	KA	4 thn	P	Kanjilo	Ada (kacang)	Tidak Ada	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
18	483382	2020	MDF	3 thn	L	Jl. Bate Salapang	Ada (alergi telur)	Ada (ibu)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
19	531753	2021	SS	12 thn	L	Parang Rea	Ada (alergi debu, gorengan)	Ada (ibu)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial

20	560666	2021	MD	5 thn	L	Limbang	Ada (alergi bulu kucing, asap)	Ada (ayah)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
21	579460	2021	MA	4 thn	L	Biring Balang	Ada (alergi asap)	Ada (ibu)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
22	428791	2022	MR	10 thn	L	BTN ANA Gowa	Ada (alergi asap, debu)	Ada (ibu dan ayah)	Ada (Bronkitis, BP)	Asma Bronkial
23	559148	2022	NA	12 thn	P	Jingara	Ada (RA)	Ada (ayah)	Ada (Bronkitis)	Asma Bronkial
24	593957	2022	AZ	7 bln	P	Kampung Beru	Tidak Ada	Ada (ayah)	Tidak Ada	Asma Bronkial
25	596959	2022	MR	8 bln	L	Tamacinna	Tidak Ada	Ada (kakek)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
26	587416	2022	MA	1 thn	L	Motoanging	Tidak Ada	Ada (ibu)	Tidak Ada	Asma Bronkial
27	592030	2023	NA	3 thn	P	BTN Sukma	Ada (DA)	Ada (ayah, nenek)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
28	491741	2023	RA	5 thn	P	Tamarunang	Ada (alergi kerupuk)	Ada (ayah)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
29	619787	2023	AAZ	4 bln	P	Pr.Yusuf Bauty	Ada (alergi susu)	Ada (kakek)	Tidak Ada	Asma Bronkial
30	609155	2023	AS	8 bln	L	JL. Pendidikan	Tidak Ada	Ada (ibu dan kakek)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
31	610279	2023	HR	2 thn	P	dr. Wahidin SH	Tidak Ada	Ada (ayah)	Tidak Ada	Asma Bronkial
32	595382	2023	MN	5 thn	L	Bt. Manai	Ada (alergi mie telur)	Ada (ibu)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
33	490923	2023	H	5 thn	P	Kampili	Tidak Ada	Ada (ayah)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
34	604815	2023	MI	6 bln	L	Taeng	Tidak Ada	Ada (ayah)	Tidak Ada	Asma Bronkial
35	619391	2023	MI	6 bln	L	Buakkang	Tidak Ada	Ada (ibu)	Tidak Ada	Asma Bronkial
36	583020	2023	SR	1 thn	L	Bontomarannu	Tidak Ada	Ada (ibu)	Ada (Bronkopneumoni)	Asma Bronkial
37	353422	2023	MF	13 thn	L	Perum Griya Asri	Ada (alergi debu, asap)	Ada (ibu dan nenek)	Ada (Bronkitis)	Asma Bronkial
38	603106	2023	MAK	7 thn	L	Gentungan	Ada (alergi asap, udang)	Ada (ayah)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
39	514030	2023	NAA	10 thn	P	Baji Areng	Ada (alergi asap, gorengan)	Ada (ayah)	Ada (Bronkitis)	Asma Bronkial
40	500129	2023	BZ	16 thn	L	Borong Kaluku	Ada (alergi debu, telur)	Ada (ayah)	Ada (Pneumonia)	Asma Bronkial
41	454493	2023	JAG	8 thn	L	Passimbungang	Ada (alergi asap,debu)	Ada (ibu dan kakek)	Ada (Pneumonia)	Asma Bronkial
42	615278	2023	AS	6 thn	L	Silangayya	Ada (alergi seafood)	Ada (ibu)	Ada (ISPA)	Asma Bronkial
43	612667	2023	AN	5 thn	P	Tanetea	Ada (RA)	Ada (ayah)	Tidak Ada	Asma Bronkial
44	521588	2019	AC	1 thn	P	Manggarupi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia

45	501476	2019	MA	4 thn	L	Pekanlabbu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
46	522855	2019	H	11 bln	P	Toddoppuli	Tidak Ada	Ada (ibu asma)	Ada (ISPA)	Bronkopneumonia
47	486183	2019	A	2 thn	L	Manggarupi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
48	423979	2019	AA	8 thn	L	Limbung	Tidak Ada	Ada (ayah asma)	Tidak Ada	Pneumonia
49	522266	2019	MF	7 thn	L	Dato Gappa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
50	523616	2019	MA	12 thn	L	Bt Ramba	Ada (alergi seafood)	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
51	459272	2019	R	8 thn	L	Mangngalli	Tidak Ada	Ada (ibu asma)	Ada (Bronkopneumoni)	Bronkopneumonia
52	525613	2020	RA	14 thn	P	Bonto-bontoa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
53	560716	2020	MP	6 thn	L	Manggarupi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkitis
54	475312	2020	MS	6 thn	L	Jl Dato	Ada (alergi asap)	Ada (kakek asma)	Ada (Bronkopneumoni)	Bronkitis
55	557986	2020	NA	7 thn	P	Cambaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Pneumonia
56	514881	2020	RA	6 thn	P	BTN Andi Tonro	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (ISPA)	Bronkopneumonia
57	558114	2020	NK	9 thn	P	Dato Gappa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Pneumonia
58	508368	2020	MG	12 thn	L	Bonto Baddo	Ada (alergi asap)	Ada (ayah asma)	Tidak Ada	Pneumonia
59	541833	2020	MA	9 thn	L	Bt.Utara	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Bronkopneumoni)	Bronkopneumonia
60	556799	2020	R	6 thn	P	Sp.Bau	Ada (alergi mie dan telur)	Ada (ayah asma)	Tidak Ada	Bronkopneumonia
61	557470	2020	MN	8 thn	L	Karampuang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
62	580803	2021	AHH	3 thn	L	Jl Pelita	Ada (alergi udang)	Ada (nenek asma)	Ada (ISPA)	Bronkopneumonia
63	581028	2021	NI	4 thn	P	Pagentungan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
64	581718	2021	AH	8 bln	P	Ritaya	Tidak Ada	Ada (ayah asma)	Tidak Ada	Bronkopneumonia
65	585830	2022	HN	2 thn	P	Bt Manai	Ada (alergi telur)	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
66	585861	2022	MR	7 bln	L	Tanetea	Tidak Ada	Ada (ibu asma)	Tidak Ada	Bronkopneumonia
67	587184	2022	A	8 thn	L	Cambaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkitis
68	597407	2022	AA	5 bln	P	Tamacinna	Ada (DA)	Tidak Ada	Ada (ISPA)	Bronkopneumonia
69	599586	2022	Z	3 thn	P	Komp.Hasanuddin	Tidak Ada	Ada (ayah asma)	Ada (ISPA)	Bronkopneumonia

70	619279	2023	MA	7 thn	L	Likuloe	Tidak Ada	Ada (nenek asma)	Tidak Ada	Bronkopneumonia
71	581804	2023	AN	9 thn	L	Jl. Dr. Wahidin SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
72	609959	2023	H	1 bln	P	Lambengi	Tidak Ada	Ada (ibu asma)	Tidak Ada	Bronkopneumonia
73	586369	2023	AZ	3 thn	L	Bt. Marannu	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (ISPA)	ISPA
74	587184	2023	AAZ	2 thn	P	Sumallu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	ISPA
75	585926	2023	NA	12 thn	P	BTN.Nusa Indah	Tidak Ada	Ada (ibu asma)	Ada (ISPA)	Bronkopneumonia
76	585894	2023	MH	3 thn	L	Jl. Manggarupi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
77	611368	2023	AS	7 thn	L	Jene tallasa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
78	522855	2023	HNQ	7 thn	P	Jl. Toddoppuli	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Pneumonia
79	582336	2023	SA	10 thn	P	Sirajuddin Rani	Ada (alergi kerupuk)	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
80	520626	2023	AP	6 thn	L	Balla Parang	Ada (alergi seafood)	Ada (ayah asma)	Tidak Ada	Bronkopneumonia
81	556442	2023	FS	9 thn	L	Borong Karamasa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Pneumonia
82	511854	2023	MI	10 thn	L	Jl. Manggarupi	Ada (alergi telur)	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
83	614171	2023	MA	6 thn	L	Patingalloang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
84	586975	2023	HA	8 thn	L	Kanjilo	Ada (DA)	Tidak Ada	Ada (ISPA)	Bronkopneumonia
85	612521	2023	MF	8 thn	L	Manyampa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Bronkopneumonia
86	618301	2023	AA	7 thn	L	Somba Opu	Tidak Ada	Ada (ibu asma)	Tidak Ada	Bronkopneumonia

Lampiran 2 = Output Hasil Olah Data SPSS

Analisis Univariat dan Bivariat

Usia Anak

Usia * Diagnosa Crosstabulation

		Diagnosa		Total	
		Asma Bronkial	Bukan Asma		
Usia	Risiko Tinggi = 0-5 Tahun	Count	33	15	48
		% within Diagnosa	76.7%	34.9%	55.8%
	Risiko Rendah = 6-18 Tahun	Count	10	28	38
		% within Diagnosa	23.3%	65.1%	44.2%
Total		Count	43	43	86
		% within Diagnosa	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	15.276 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	13.626	1	.000		
Likelihood Ratio	15.796	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	15.099	1	.000		
N of Valid Cases	86				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia (Risiko Tinggi = 0-5 Tahun / Risiko Rendah = 6-18 Tahun)	6.160	2.393	15.855
For cohort Diagnosa = Asma Bronkial	2.613	1.485	4.597
For cohort Diagnosa = Bukan Asma	.424	.268	.672
N of Valid Cases	86		

Riwayat Atopi pada Pasien

Riwayat Atopi pada Pasien * Diagnosa Crosstabulation

			Diagnosa		Total
			Asma Bronkial	Bukan Asma	
Riwayat Atopi pada Pasien	Risiko Tinggi = Ada	Count	28	11	39
		% within Diagnosa	65.1%	25.6%	45.3%
	Risiko Rendah = Tidak Ada	Count	15	32	47
		% within Diagnosa	34.9%	74.4%	54.7%
Total	Count	43	43	86	
	% within Diagnosa	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	13.559 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	12.011	1	.001		
Likelihood Ratio	13.955	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	13.402	1	.000		
N of Valid Cases	86				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Atopi pada Pasien (Risiko Tinggi = Ada / Risiko Rendah = Tidak Ada)	5.430	2.145	13.746
For cohort Diagnosa = Asma Bronkial	2.250	1.418	3.569
For cohort Diagnosa = Bukan Asma	.414	.242	.709
N of Valid Cases	86		

Riwayat Atopi dalam Keluarga

Riwayat Atopi dalam Keluarga * Diagnosa Crosstabulation

			Diagnosa		Total
			Asma Bronkial	Bukan Asma	
Riwayat Atopi dalam Keluarga	Risiko Tinggi = Ada	Count	42	15	57
		% within Diagnosa	97.7%	34.9%	66.3%
	Risiko Rendah = Tidak Ada	Count	1	28	29
		% within Diagnosa	2.3%	65.1%	33.7%
Total	Count	43	43	86	
	% within Diagnosa	100.0%	100.0%	100.0%	



Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	37.927 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	35.170	1	.000		
Likelihood Ratio	44.820	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	37.486	1	.000		
N of Valid Cases	86				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.50.

b. Computed only for a 2x2 table



Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Atopi dalam Keluarga (Risiko Tinggi = Ada / Risiko Rendah = Tidak Ada)	78.400	9.795	627.522
For cohort Diagnosa = Asma Bronkial	21.368	3.095	147.529
For cohort Diagnosa = Bukan Asma	.273	.176	.423
N of Valid Cases	86		

Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan

Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan * Diagnosa Crosstabulation

			Diagnosa		Total
			Asma Bronkial	Bukan Asma	
Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan	Risiko Tinggi = Ada	Count	33	11	44
		% within Diagnosa	76.7%	25.6%	51.2%
	Risiko Rendah = Tidak Ada	Count	10	32	42
		% within Diagnosa	23.3%	74.4%	48.8%
Total	Count	43	43	86	
	% within Diagnosa	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	22.524 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	20.523	1	.000		
Likelihood Ratio	23.630	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	22.262	1	.000		
N of Valid Cases	86				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.00.

b. Computed only for a 2x2 table


Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (Risiko Tinggi = Ada / Risiko Rendah = Tidak Ada)	9.600	3.586	25.702
For cohort Diagnosa = Asma Bronkial	3.150	1.786	5.555
For cohort Diagnosa = Bukan Asma	.328	.191	.562
N of Valid Cases	86		

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin * Diagnosa Crosstabulation

			Diagnosa		Total
			Asma Bronkial	Bukan Asma	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Count	27	27	54
		% within Diagnosa	62.8%	62.8%	62.8%
	Perempuan	Count	16	16	32
		% within Diagnosa	37.2%	37.2%	37.2%
Total		Count	43	43	86
		% within Diagnosa	100.0%	100.0%	100.0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 3 = Persuratan



ALAUDDIN
MAKASSAR

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepik.etik@iain-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.044/KEPK/FKIK/II/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Rifdha Luthfiyanti Hiskah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ASMA PADA ANAK DI RSUD SYECH
YUSUF"


"EXAMINATION OF ASTHMA RISK FACTORS IN CHILDREN AT SYEKH YUSUF
HOSPITAL"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025.

This declaration of ethics applies during the period February 15, 2024 until February 15, 2025.

February 15, 2024
Professor and Chairperson,

Dr. Istiahy Ismail, S.Si., M.Si., Apt.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 5905/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Rifdha Luthfiyanti Hiskah
 NIM : 70600120026
 Semester/T.A. : VII (Tujuh)/T.A. 2023-2024
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Kedokteran
 Alamat : Bulukumba, Kec. Bontobahari, Kel. Sapolohe, Lingkungan Pasaraya Baru
 No. HP. : 082334949446

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak di RSUD Syekh Yusuf**.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **RSUD Syekh Yusuf Gowa** dari tanggal **Bulan Februari 2024**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal

M A K A S S A R



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 2760/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5892/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RIFDHA LUTHFIYANTI HISKAH
Nomor Pokok	: 70600120026
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo, 36 Gowa



Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak di RSUD Syekh Yusuf . "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Februari s/d 05 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

M A K A S S A R



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmptsp.gowakab.go.id email
 perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/155/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2024
 Lampiran :
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 2760/S.01/PTSP/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **RIFDHA LUTHFIYANTI**
 Tempat/Tanggal Lahir : Gowa / 18 Juli 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 70600120026
 Program Studi : Pendidikan Doktor
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Lingk. Pasaraya Baru

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul:

"ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ASMA PADA ANAK DI RSUD SYEKH YUSUF"

Selama : 5 Februari 2024 s/d 5 Maret 2024
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 6 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. Bupati Gowa
 Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa,



H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip



2/13/24, 8:41 AM

akkio.gowakab.go.id/data/halaman_registrasi_surat_masuk/cetak_disposisi.php?id=226856

1382

Tanggal Terima 6 Februari 2024 00:00:00
 No.Agenda
 Tanggal Surat 6 Februari 2024
 No Surat 503/155/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2024
 Perihal Surat Keterangan Penelitian a.n. RIFDHA LUTHFIYANTI
 Asal Surat DPM-PTSP
 Dari DPM-PTSP
 Pembuat Surat -

Staf Sekretariat RSUD [Staf - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada SUMARNI, SE, MM [Kasubag. Tata Usaha & RT - RSUD Syekh Yusuf]

Diterima 6 Februari 2024 16:06:24

Dibaca 6 Februari 2024 17:48:21

Disposisi

Catatan

SUMARNI, SE, MM [Kasubag. Tata Usaha & RT - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada NURMALA SARI ARSYAD, S.Kep.Ns. [Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian - RSUD Syekh Yusuf]

Diterima 6 Februari 2024 17:48:56

Dibaca 12 Februari 2024 14:39:23

Disposisi MOHON PETUNJUK

Catatan

NURMALA SARI ARSYAD, S.Kep.Ns. [Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada drg. Hj. RAHMAWATI DJALIL, M.Kes [Direktur - RSUD Syekh Yusuf]

Diterima 7 Februari 2024 14:09:56

Dibaca 9 Februari 2024 20:48:24

Disposisi MOHON PETUNJUK

Catatan

drg. Hj. RAHMAWATI DJALIL, M.Kes [Direktur - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada NURMALA SARI ARSYAD, S.Kep.Ns. [Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian - RSUD Syekh Yusuf]

Diterima 9 Februari 2024 20:48:33

Dibaca 12 Februari 2024 14:39:23

Disposisi PRINSIP SETUJU DAN PROSES SESUAI KETENTUAN

Catatan

NURMALA SARI ARSYAD, S.Kep.Ns. [Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada Hj. ELIATI PATURUNGI, S.Kep.Ners, M.Kep [Kabid. Pelayanan Keperawatan - RSUD Syekh Yusuf]

Diterima 13 Februari 2024 08:39:39

Dibaca 00:00

Disposisi DITINDAK LANJUTI

Catatan

NO
IMAGE
AVAILABLE

Hjh. Ka Refkam Medis
di Tempag.

mohon dibantu ybs w
Penelitian dan kerd.

Bgk
Ely 23/02/2024.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Sungguminasa, Telepon 0411 – 866536, Fax.0411 -840892
Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id, email : rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 10/04/Diklat.RSUD-SY

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

N a m a : Rifdha Luthfiyanti
N i m : 70600120026
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul "**Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma Pada Anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa**" pada Tanggal 26 Februari 2024 S/D 01 Maret 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Sungguminasa, 26 April 2024

An. Ketua Diklat

Koordinator Bagian Penelitian



Hj. Eliati Paturungi, S. Kep. Ns. M. Kep
Nip. 19690407 199103 2 008

Lampiran 4 = Dokumentasi

ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

1. Nama : Rifdha Luthfiyanti Hiskah
2. NIM : 70600120026
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
5. Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 18 Juli 2001
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Alamat : Bulukumba
9. Orang Tua : Tn. Hisbair dan Ny. Sukiah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Taruna Karya Tanahberu (2007-2008)
2. SD : SDN 155 Centre Tanah Beru (2008-2014)
3. SMP : SMP Ummul Mukminin Makassar (2014-2017)
4. SMA : SMA Ummul Mukminin Makassar (2017-2020)
5. Sarjana : S1 Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020-2024)