

**HUBUNGAN INTENSITAS AKTIVITAS FISIK DENGAN KEJADIAN NYERI
PUNGGUNG BAWAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER III**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Oleh:
MUHAMMAD AMIN AHMADY
NIM: 70600120033

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Amin Ahmady
NIM : 70600120033
Tempat/Tgl Lahir : Makassar/24 Januari 2003
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Permata Regency Blok H1
Judul : Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Ibu Hamil Trimester III

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Agustus 2024

Penyusun,


Muhammad Amin Ahmady

NIM: 70600120033

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Muhammad Amin Ahmady, NIM 70600120033, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Ibu Hamil Trimester III", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 14 Agustus 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
dr. Rauly Ramadhani, M.Kes., Sp.N


dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Ibu Hamil Trimester III"** yang disusun oleh Muhammad Amin Ahmady, NIM 70600120033, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu 14 Agustus 2024, bertepatan dengan 9 Safar 1446 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 14 Agustus 2024
9 Safar 1446 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed	(.....)
Pembimbing I	: dr. Raully Ramadhani, M. Kes., Sp. N	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed	(.....)
Penguji I	: dr. Ariyanto Arief, M. kes., Sp. OT(K)	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A	(.....)

Diketahui Oleh,

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Ibu Hamil Trimester III”**. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan yang baik, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam, rahmat bagi semesta alam.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 di Jurusan Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta memberikan sumbangsih baik secara moril maupun materil, karena penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Ahmady dan Ibunda Darmawaty. Ucapan terima kasih atas bantuan dan bimbingan dalam penyusunan proposal ini ditujukan penulis kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku rektor beserta dengan jajarannya yang senantiasa memfasilitasi dan mendukung seluruh kegiatan Prodi Pendidikan Dokter.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan

3. dr. Jelita Inayah Sari M.Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama M.Biomed. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta seluruh tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh ilmu di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Raully Ramadhani, M.Kes., Sp.N dan dr. Jelita Inayah Sari M.Biomed selaku dosen pembimbing penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis.
5. dr. Ariyanto Arief, M.kes., Sp. OT(K) dan Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A selaku dosen penguji penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi saran dan kritikan kepada penulis.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.



Melalui karya tulis ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan sebuah kontribusi yang bermanfaat dalam bidang kesehatan. Penelitian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama keluarga, dosen pembimbing, dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan bimbingan, dorongan, serta saran yang membangun. Akhir kata, Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Makassar, Desember 2023

Penyusun

Muhammad Amin Ahmady

70600120033



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Hipotesis	4
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	18
BAB II	19
A. Aktivitas Fisik	19
B. Nyeri Punggung Bawah.....	25
C. Kajian Integrasi Keislaman	40
D. Kerangka Teori.....	45
E. Kerangka Konsep.....	46
BAB III	47
A. Desain Penelitian.....	47
B. Waktu dan Tempat Penelitian	47
C. Variabel Penelitian	47
D. Populasi dan Sampel Penelitian	47

E. Teknik Pengambilan Sampel	49
F. Instrumen Penelitian	49
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
H. Alur Penelitian.....	51
I. Penyajian Data.....	52
J. Etika Penelitian	52
BAB IV	53
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan	57
C. Keterbatasan Penelitian.....	63
BAB V.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional	5
Tabel 2. Kajian Pustaka	8
Tabel 3. Analisis Univariat Karakteristik Responden.....	54
Tabel 4. Distribusi Variabel Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rotasi panggul dan kompensasi otot.....	31
Gambar 2. Ilustrasi perubahan muskuloskeletal selama kehamilan	32

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori.....	45
Bagan 2. Kerangka Konsep.....	46



DAFTAR SINGKATAN

NPB	: Nyeri Punggung Bawah
WHO	: <i>World Health Organization</i>
PGP	: <i>Pelvic Girdle Pain</i>
ACOG	: <i>American College of Obstetricians and Gynecologists</i>
APGAR	: <i>Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration</i>
PAGAC	: <i>Physical Activity Guidelines Advisory Committee</i>
METs	: <i>Metabolic equivalents of Task</i>
FDA	: <i>Food and Drug Administration</i>
NSAID	: <i>Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug</i>
PERDOSSI	: Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia



ABSTRAK

Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Ibu Hamil Trimester III

Muhammad Amin Ahmady¹, Rauly Ramadhani², Jelita Inayah Sari³, Ariyanto Arief⁴ Muhammad Galib⁵

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: amin02ahmady@gmail.com

ABSTRACT

Low back pain experienced by women during pregnancy can reduce their quality of life and productivity in daily life. Meanwhile, data shows the prevalence of low back pain continues to increase. The purpose of this study was to determine the relationship between physical activity intensity and the incidence of low back pain in third trimester pregnant women. This type of research is an observational analytic with a cross sectional design conducted at the Sudiang Health Centre from February to April 2024. The sample in this study amounted to 76 respondents who were taken with purposive sampling technique. The data obtained came from a questionnaire regarding the intensity of physical activity and low back pain, then analysed using univariate analysis and bivariate analysis with chi-square statistical tests. The statistical test results showed a significance value of 0.002 ($p < 0.05$) so that there is a significant relationship between the intensity of physical activity with the incidence of low back pain.

Keywords: Low Back Pain, Physical Activity, Pregnant Women

ABSTRAK

Nyeri punggung bawah yang dialami oleh wanita selama periode kehamilan dapat menurunkan kualitas hidup dan produktifitas dalam kesehariannya. Sementara itu, data menunjukkan prevalensi nyeri punggung bawah terus mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain *cross sectional* yang dilaksanakan di Puskesmas Sudiang pada bulan Februari hingga April 2024. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 76 responden yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh berasal dari kuesioner mengenai intensitas aktivitas fisik dan nyeri punggung bawah, kemudian dianalisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji statistik *chi-square*. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 ($p < 0,05$) sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah.

Kata Kunci : Nyeri Punggung Bawah, Aktivitas Fisik, Ibu Hamil

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Selama kehamilan, seorang ibu akan mengalami perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun psikologis, perubahan ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman bagi ibu hamil. Rasa tidak nyaman yang dirasakan ibu hamil ini biasanya berbeda-beda setiap trimester kehamilan (Marlisa Rahmadayanti et al., 2022). Salah satu diantara rasa tidak nyaman tersebut adalah nyeri punggung bagian bawah atau nyeri punggung bawah (NPB). Nyeri punggung bawah atau *low back pain* adalah nyeri yang dirasakan pada tulang punggung bagian bawah yang dapat dirasakan hingga ke lipatan bokong dan paha. (Kemenkes RI, 2023)

Insiden dan prevalensi NPB terus meningkat. NPB mempengaruhi 619 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2020. Jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 843 juta kasus pada tahun 2050, sebagian besar karena penuaan dan peningkatan populasi (WHO, 2023). Selain itu, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa 33% orang di negara berkembang mengalami nyeri punggung bawah. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018, prevalensi penyakit muskuloskeletal di Indonesia yang pernah di diagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu 11,9% dan berdasarkan gejala yaitu 24,7% (Kemenkes RI, 2018). Menurut Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia (PERDOSSI) tahun 2016 prevalensi NPB sebesar 35,86% (Rahmadhani et al., 2023). NPB menjadi masalah muskuloskeletal yang secara umum dialami selama kehamilan dengan perkiraan prevalensi berkisar antara

30% hingga 78% di Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa wilayah Afrika (Manyozo et al., 2019).

Aktivitas fisik adalah salah satu metode yang direkomendasikan untuk membantu meringankan NPB. Namun demikian, tidak disebutkan terkait jenis dan intensitas yang diperlukan untuk mengatasi NPB di dalam pedoman pelaksanaannya. Berdasarkan studi observasional dan intervensi diketahui bahwa aktivitas fisik memiliki dampak positif terhadap penyakit diabetes, hipertensi, kanker (terutama kanker payudara dan usus besar), osteoporosis, penyakit kardiovaskular, obesitas, dan depresi. Aktivitas fisik dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan sosial, psikologis dan biologis seseorang (Yu et al., 2021).

Salah satu mekanisme penyebab yang paling sering dikemukakan mengenai NPB berhubungan dengan faktor mekanis, akibat penambahan berat badan selama kehamilan, peningkatan diameter sagital perut, dan akibat pergeseran pusat gravitasi tubuh ke anterior sehingga meningkatkan tekanan pada punggung bawah (Katonis et al., 2011). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-quran tepatnya di dalam Q.S. Luqman/31:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي غَمَامِينَ ۖ إِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu” .

Pada ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orangtuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Ini menunjukkan bahwa kesulitan dan pengorbanan yang dialami ibu dalam mengandung, memelihara, dan mendidik anaknya tidak hanya berupa pengorbanan fisik tetapi juga dari segi materi. Istilah (*لِإِ*) (wahnān) yang terdapat dalam kutipan ayat tersebut mengacu pada kemampuan untuk menahan beban saat hamil, menyusui, dan memberikan perawatan kepada anak. Istilah ini menggambarkan kelemahan ibu hingga digambarkan sebagai kelemahan itu sendiri, seolah-olah semua yang berkaitan dengan kelemahan itu telah menyatu pada beban yang harus dilalui ibu. "Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah". Ayat ini menggambarkan kesulitan yang dialami seorang ibu saat mengandung seperti bertambahnya berat badan, kesulitan berjalan dan duduk, serta nyeri punggung. Sangat sulit sejak bulan pertama mengandung, menjadi lebih sulit seiring bertambahnya bulan, dan akhirnya mencapai puncaknya, yaitu saat melahirkan (Aisah, 2021).

Kejadian NPB pada ibu hamil dapat menurunkan kualitas hidup dan produktifitas ibu dalam kesehariannya. Sementara itu, data menunjukkan bahwa prevalensi NPB terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

Tidak ada hubungan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat hubungan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III



D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Aktivitas fisik	Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi	Kuesioner IPAQ-SF	<p>Tinggi= Tingkat aktivitas fisik setara dengan kira-kira satu jam aktivitas per hari atau lebih, setidaknya tingkat aktivitas intensitas sedang</p> <p>Sedang= Tiga hari atau lebih aktivitas intensitas tinggi dan/atau berjalan minimal 30 menit per hari</p> <p>Rendah= Tidak memenuhi salah satu kriteria untuk aktivitas fisik tingkat sedang atau tinggi</p>	Ordinal
Variabel Dependen					

1.	Nyeri punggung bawah	Nyeri punggung bawah mengacu pada nyeri di daerah pinggang, atau daerah vertebra L1-5, dan vertebra sakral, atau S1 ke daerah persimpangan sacrococcygeal.	Kuesioner <i>The Pain and Distress Scale</i>	Berdasarkan kuesioner (William J. K Zung, 1993) 20-44: ringan 45-59: sedang 60-80: berat	Ordinal
----	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------



2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan data primer.



E. Kajian Pustaka

Tabel 2. Kajian Pustaka

No	Penelitian /Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
1.	(Paul et al., 2021)	Hubungan Aktivitas Fisik dengan Nyeri Punggung Bawah saat Pandemi COVID-19 pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran	Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi deskriptif analitik dengan desain <i>cross sectional</i>	109 sampel	Kuesioner	Dari 109 responden, 52,3% mahasiswa memiliki aktivitas fisik sedang dan 27,5% mahasiswa mengalami nyeri punggung bawah. Hasil analisis bivariat menunjukkan hubungan tidak bermakna antara aktivitas fisik dengan keluhan nyeri punggung bawah pada mahasiswa saat pandemi COVID-19 ($p=0,547$)
2.	(Fatima, 2018)	Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Nyeri Punggung Bawah Akut Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran	penelitian analitik dengan desain studi potong lintang dengan kuesioner	631 sampel	Kuesioner	Hasil penelitian ini menunjukkan dari 631 subjek penelitian, terdapat 206 (32,6%) mahasiswa mengalami nyeri punggung bawah. Analisis menggunakan Chi-square didapatkan p value sebesar 0,25 ($p>0,05$) menunjukkan bahwa aktivitas fisik memiliki hubungan yang tidak

		Universitas Sriwijaya Tahun 2018	nyeri punggung bawah dan IPAQ-Long			signifikan (dengan nyeri punggung bawah. Namun, aktivitas fisik yang ringan memiliki risiko 1,33 kali untuk mengalami nyeri punggung bawah dibandingkan dengan aktivitas fisik sedang.
3.	(Pradita, 2022)	Korelasi Fleksibilitas Otot Lumbal Dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah	Penelitian ini merupakan sebuah studi observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	30 sampel	Data primer dengan menggunakan metode Schober	Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara fleksibilitas otot lumbal dan keluhan nyeri punggung bawah pada karyawan. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,382 menunjukkan korelasi datanya lemah. <i>P-value</i> 0,171 > 0,05
4.	(Galmés-Panadés & Vidal-Conti, 2022)	Hubungan antara Kebugaran Jasmani dan Nyeri Punggung Bawah	Desain <i>cross sectional</i>	849 siswa, berusia 10-12 tahun, dari 10 sekolah dasar	Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat VO2Max yang lebih tinggi berhubungan dengan intensitas LBP yang lebih rendah. Selain itu, LBP lebih jarang terjadi pada peserta yang melaporkan lebih banyak aktivitas fisik, dan VO2Max yang lebih tinggi serta tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dikaitkan dengan tidak adanya LBP di tempat tidur.

5	(Bachtiar, 2022)	Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Nyeri Punggung Bawah Pada Pramugari Maskapai X Air	Desain <i>cross-sectional</i> dilakukan tanpa tindak lanjut atau <i>follow up</i>	92 sampel	Kuesioner	Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan Spearman rho didapatkan bahwa nilai $p < 0,05$ sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan nyeri punggung bawah pada pramugari Maskapai X Air
---	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



F. Tujuan Penelitian

Mengetahui hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan selama studi khususnya mengenai aktivitas fisik terkait kejadian nyeri punggung bawah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat mengenai aktivitas fisik dan nyeri punggung bawah.

3. Bagi Instansi

Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan intensitas aktivitas fisik yang diteliti dengan kejadian nyeri punggung bawah. Serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Aktivitas Fisik*

1. Definisi

WHO mendefinisikan aktivitas fisik sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi (WHO, 2022). Aktivitas fisik mengacu pada semua pergerakan termasuk pada waktu senggang, transportasi menuju dan dari suatu tempat, atau sebagai bagian dari pekerjaan seseorang. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang disebabkan oleh kontraksi otot dan rangka, yang menyebabkan tubuh mengkonsumsi lebih banyak kalori atau menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dibutuhkannya saat istirahat. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dengan intensitas yang disarankan sesuai umur dan kemampuan dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan seseorang (Kusumo, 2020).

Dalam aktivitas fisik, intensitas, durasi, dan frekuensi adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Menurut penelitian Knehr, efek paling signifikan dari aktivitas fisik dapat terlihat selama beberapa minggu pertama latihan. Kemudian, jika program dilanjutkan, perubahan dan keuntungan tersebut akan muncul kembali dalam bulan atau tahun berikutnya. Aktivitas fisik yang ringan, seperti berjalan, yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, akan memberikan efek kesehatan yang sebanding dengan berlari atau aktivitas fisik dengan intensitas yang lebih tinggi (Wicaksono, 2021).

2. Intensitas

Berdasarkan *metabolic equivalents of task* (METs) intensitas aktivitas fisik dibagi dalam tiga kategori. METs sendiri merupakan rasio penggunaan

energi seseorang terhadap selama melakukan aktivitas fisik tertentu dengan massa tubuhnya. Seseorang yang duduk terdiam dihitung menghabiskan 1 METs.

Berdasarkan intensitasnya, aktivitas fisik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu :

- a. Intensitas ringan adalah aktivitas fisik dengan tingkat intensitas < 3 MET. Misalnya berjalan kaki, mencuci piring, bersetrika, memasak, memancing, dan memainkan instrumen musik.
- b. Intensitas sedang adalah aktivitas fisik antara $3 - 5,9$ METs. Misalnya berjalan cepat, mencuci mobil, menyapu dan mengepel lantai, kegiatan pertukangan, atau beberapa jenis olahraga seperti: badminton, bola basket, dan tenis meja.
- c. Intensitas berat adalah aktivitas fisik > 6 METs. Contohnya seperti berjalan cepat di jalan menanjak, berlari, mengangkat beban berat, bersepeda, bermain sepak bola, berenang, bermain bola tenis dan bola voli. (Balducci et al., 2010; CDC, 2022)

3. Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Fisik

a. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi diketahui mempengaruhi pola aktivitas fisik di berbagai wilayah Eropa. Kelompok dengan sosial ekonomi rendah memiliki lebih sedikit waktu luang daripada kelompok sosial ekonomi tinggi. Selain itu, kelompok sosial ekonomi rendah memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk melakukan aktivitas fisik yang terprogram dan terukur. Jenis aktivitas fisik juga akan berbeda dari kelompok ke kelompok. Penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam aktifitas fisik di waktu

senggang dan aktivitas aktif berdasarkan indikator posisi sosial ekonomi seperti pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Ketimpangan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengetahuan tentang manfaat aktifitas fisik, sumber daya keuangan untuk melakukan aktifitas fisik di waktu senggang, sosial atau budaya, peluang lingkungan, dan faktor intra-personal (Beenackers et al., 2012).

b. Faktor Lingkungan

Pengaruh aksesibilitas seperti halnya jarak, transportasi, dan fasilitas olahraga dapat mempengaruhi aktivitas fisik seseorang. Jika seseorang tidak dapat pergi ke tempat olahraga, mereka cenderung tidak akan berolahraga. Faktor keamanan dan keselamatan seperti keamanan lingkungan, keamanan jalur penyeberangan, dan keamanan lingkungan olahraga juga dapat mempengaruhi aktivitas fisik seseorang.

c. Faktor Individu

Berbagai faktor, seperti pengetahuan dan persepsi tentang hidup sehat, motivasi, minat berolahraga, dan ekspektasi individu terhadap manfaat berolahraga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas fisik. Individu yang memiliki pengetahuan dan persepsi yang baik tentang hidup sehat akan melakukan aktivitas fisik secara teratur karena mereka yakin aktivitas fisik tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mereka. Faktor lain yang juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas adalah usia, jenis kelamin dan kondisi suhu dan geografis (Wicaksono, 2021).

1. Manfaat

Aktivitas fisik secara teratur telah terbukti memiliki banyak manfaat kesehatan. Beberapa penyakit kronis, termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, hipertensi, obesitas, depresi, dan osteoporosis dapat dicegah dengan melakukan aktivitas fisik. Disebutkan bahwa peningkatan aktivitas fisik sekecil apa pun dapat memberikan dampak yang signifikan pada status kesehatan, terutama bagi individu yang awalnya tidak banyak bergerak (Duclos, 2021).

Ibu yang mengawali kehamilannya dengan gaya hidup sehat, seperti berolahraga, makan makanan yang sehat, dan tidak merokok, harus didorong untuk mempertahankan gaya hidup sehat tersebut setelah kehamilan. Sementara ibu yang tidak melakukan gaya hidup sehat harus menjadikan masa pra-kehamilan dan kehamilan sebagai kesempatan untuk melakukan rutinitas yang lebih sehat (*Physical Activity and Exercise during Pregnancy and the Postpartum Period: ACOG Committee Opinion, Number 804, 2020*).

Selama kehamilan aktivitas fisik menjadi satu hal penting untuk membantu menjaga kebugaran jasmani bagi ibu hamil. Berolahraga secara teratur dapat memberikan manfaat bagi ibu dan bayinya. Peningkatan fungsi kardiovaskular, penurunan risiko diabetes gestasional dan hipertensi, peningkatan kesehatan mental dan suasana hati, serta penurunan risiko penambahan berat badan yang berlebihan adalah beberapa manfaat yang akan didapatkan. Studi juga menunjukkan bahwa berolahraga secara teratur selama kehamilan dikaitkan dengan waktu persalinan yang lebih singkat, serta risiko persalinan sesar yang lebih rendah (Brown, 2002; Cilar Budler & Budler, 2022). Berikut beberapa manfaat berolahraga saat hamil yaitu:

a. Meningkatkan Kebugaran

Selama kehamilan, ibu hamil disarankan untuk tetap berolahraga atau melakukan aktivitas fisik secara rutin agar tubuh tetap sehat dan berenergi. Namun, ibu hamil tetap harus membatasi aktivitasnya agar tidak mengalami *over exercise*. Sepanjang kehamilan terjadi peningkatan bertahap pada volume pernapasan, curah jantung, dan volume darah, sehingga peningkatan kebutuhan oksigen dan substrat pada janin, rahim, plasenta, miokardium, otot pernapasan, dan ginjal dapat terpenuhi. Akibatnya, pada kehamilan trimester ketiga, pengambilan oksigen akan meningkat pesat sehingga terdapat kemungkinan gangguan pasokan nutrisi penting dan oksigen ke janin dapat dicegah. Peningkatan kapasitas pengangkutan oksigen ini dapat bertahan hingga beberapa bulan pasca ibu melahirkan kemungkinan besar hal ini akan mendukung peningkatan kinerja tubuh yang telah ditunjukkan pada bulan-bulan segera setelah kelahiran (Brown, 2002).

b. Mempertahankan Berat Badan Ideal

Aktivitas sehari-hari akan menjadi lebih sulit ketika berat badan ibu hamil meningkat selama kehamilan. Kenaikan berat badan ini sering menimbulkan ketidaknyamanan seperti malas bergerak, mudah lelah, dan nyeri punggung. Ketidaknyamanan ini dapat dikurangi dengan berolahraga secara rutin. Dalam Laporan Ilmiah PAGAC tahun 2018, terdapat 11 tinjauan sistematis memberikan bukti kuat bahwa ibu hamil yang melakukan aktivitas fisik mengalami kenaikan berat badan sekitar 1 kilogram (kg) lebih sedikit selama kehamilan dibandingkan ibu hamil yang tidak melakukan aktivitas fisik (Dipietro et al., 2019).

c. Memudahkan Persalinan

Proses persalinan bergantung pada kondisi fisik ibu. Semakin baik kekuatan fisik ibu tentunya semakin kuat pula tubuh ibu. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ibu yang berolahraga selama masa kehamilannya akan mengalami proses persalinan yang lebih singkat dan tidak terlalu rumit, lebih sedikit tanda-tanda gawat janin, lebih sedikit potensi operasi caesar, pemulihan yang lebih cepat, dan lebih sedikit komplikasi neonatal dibandingkan ibu yang tidak aktif secara fisik. Manfaat aktivitas fisik saat persalinan termasuk rendahnya kejadian trauma kelahiran, kemudahan melewati jalan lahir, oksigenasi yang lebih baik selama persalinan, dan skor APGAR (*Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration*) yang lebih tinggi. Aktivitas fisik yang teratur bermanfaat bagi kehamilan, persalinan dan persalinan, serta mengurangi komplikasi perinatal (Bryndal et al., 2020)

d. Mencegah Komplikasi Selama Kehamilan

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) pada tahun 2015 merekomendasikan wanita dengan kehamilan yang sehat untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan intensitas sedang selama setidaknya dua puluh hingga tiga puluh menit setiap hari, hampir setiap hari dalam seminggu, atau setiap hari selama kehamilan. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh ACOG pada tahun 2017. Rekomendasi tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap komplikasi yang mungkin terjadi selama masa kehamilan. Komplikasi tersebut termasuk diabetes gestasional, hipertensi gestasional, dan gangguan pertumbuhan janin yang berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular pada orang dewasa serta kematian dini pada ibu dan kemungkinan pada keturunannya (Meredith L. Birsner, 2020).

2. Rekomendasi Aktivitas Fisik Bagi Ibu Hamil

Menurut Pedoman Aktivitas Fisik untuk Amerika edisi ke-2, Wanita hamil atau pasca melahirkan harus melakukan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang setidaknya 150 menit (misalnya, 30 menit sehari, lima hari seminggu) per minggu, seperti jalan cepat, selama dan setelah kehamilan. Wanita yang melakukan aktivitas fisik aerobik dengan intensitas tinggi seperti berlari, dapat terus melakukannya selama dan setelah kehamilan dengan kadar yang disesuaikan.

B. Nyeri Punggung Bawah

1. Definisi dan Klasifikasi

Nyeri punggung bawah bukan suatu penyakit melainkan suatu gejala. Gejala ini dapat disebabkan oleh beberapa kelainan atau penyakit yang diketahui atau tidak diketahui. NPB ditentukan berdasarkan lokasi nyeri, biasanya di antara tepi bawah tulang rusuk dan lipatan gluteal. Hal ini biasanya disertai dengan nyeri pada satu atau kedua kaki dan beberapa pasien dengan nyeri pinggang memiliki gejala neurologis terkait pada tungkai bawah. Bagi sebagian besar orang yang mengalami nyeri punggung bawah, sumber nosiseptif spesifiknya tidak dapat diidentifikasi dan mereka yang terkena dampak kemudian diklasifikasikan sebagai menderita nyeri pinggang non-spesifik (Hartvigsen et al., 2018).

Nyeri punggung bawah didefinisikan sebagai rasa nyeri atau kekakuan pada area antara tepi kosta dan lipatan gluteal inferior; rasa sakit ini juga dapat menyebar hingga ke ekstremitas bawah (Chiodo et al., 2020; Hartvigsen et al., 2018; Selkirk & Ruff, 2016). Nyeri punggung bawah mengacu pada nyeri

di daerah pinggang, atau daerah vertebra L1-5, dan vertebra sakral, atau S1 ke daerah persimpangan sacrococcygeal (Urits et al., 2019).

NPB dapat diklasifikasikan menjadi akut atau kronis. Dimana kategori akut dipertimbangkan jika gejala muncul kurang dari 6 minggu, sedangkan kategori subakut dan kronik dipertimbangkan jika nyeri masing-masing berlangsung antara 6 hingga 12 minggu dan lebih dari 12 minggu. Nyeri punggung dapat dikategorikan berdasarkan dugaan etiologi yang mendasarinya. Nyeri punggung mekanis mengacu pada nyeri yang disebabkan oleh ketegangan atau kelainan bentuk konfigurasi anatomi dasar punggung bawah dan tulang belakang. Patofisiologi sebenarnya dari NPB nonspesifik biasanya bersifat mekanis (disebabkan oleh trauma atau kelainan bentuk struktur anatomi) dan kemungkinan besar mencakup penyakit degeneratif pada diskus intervertebralis, yang mengakibatkan penyempitan ruang dan herniasi diskus intervertebralis (Selkirk & Ruff, 2016).

Sementara itu menurut Anthony, nyeri punggung bawah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Nyeri punggung bawah akut: Durasi nyeri punggung < 6 minggu.
- b. Nyeri punggung bawah subakut: Durasi nyeri punggung \geq 6 minggu tetapi < 3 bulan.
- c. Nyeri punggung bawah kronis: Nyeri punggung yang membuat pasien tidak dapat melakukan beberapa aktivitas hidup selama \geq 3 bulan.
- d. Nyeri pinggang berulang: Nyeri punggung bawah akut pada pasien yang pernah mengalami episode nyeri pinggang

sebelumnya di lokasi yang sama, dengan interval asimtomatik antar episode (Chiodo et al., 2020).

2. Epidemiologi

Sekitar 84% individu diperkirakan menderita NPB yang merupakan kondisi yang sangat umum terjadi pada semua generasi. Prevalensi nyeri punggung bawah berkisar antara 30% hingga 78% di Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa wilayah Afrika (Ferreira et al., 2023; Manyozo et al., 2019). Pada tahun 2020, nyeri punggung bawah mempengaruhi 619 juta orang di seluruh dunia dan diperkirakan jumlah kasusnya akan meningkat menjadi 843 juta kasus pada tahun 2050, yang sebagian besar disebabkan oleh perluasan populasi dan penuaan (WHO, 2023). Di antara kondisi muskuloskeletal, nyeri punggung bawah adalah yang paling umum di seluruh dunia dan merupakan penyebab utama kecacatan. NPB dapat dialami oleh siapa saja, bahkan anak-anak. Mayoritas orang mengalami NPB pada suatu titik tertentu dalam hidup mereka (Vlaeyen et al., 2018). Meskipun diperkirakan seseorang akan mengalami NPB pada suatu saat selama kehidupan mereka, hanya sekitar 20% – 30% diantaranya yang akan mencari pengobatan (Selkirk & Ruff, 2016). NPB paling sering terjadi pada usia 50 hingga 55 tahun, dan perempuan lebih sering mengalaminya dibandingkan laki-laki. Pada usia 80 hingga 85 tahun, kasus dan kecacatan NPB lebih sering terjadi dan lebih sering terjadi seiring bertambahnya usia (WHO, 2023). Sebagian besar wanita akan merasakan NPB pertama kali saat sedang dalam masa kehamilan. Tetapi hal ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dan merupakan bagian kehamilan yang tidak dapat dihindari di kalangan wanita.

Prevalensi NPB dan PGP pada wanita hamil selama trimester pertama diperkirakan sekitar 50%; pada trimester kedua berkisar antara 40% dan 70%; dan untuk trimester ketiga, berada di angka 70% dan 80%. Diperkirakan setengah dari wanita yang saat ini tengah mengalami NPB dalam kehamilannya akan berlangsung hingga 1 tahun setelah melahirkan, dan 20% bersifat simtomatis 3 tahun pasca melahirkan. Prevalensi NPB selama kehamilan berkisar dari 20% hingga 90%; kebanyakan studi melaporkan prevalensi yang lebih dari 50%. Prevalensi NPB yang dialami selama kehamilan yaitu 61% (Bryndal et al., 2020).

3. Etiopatomekanisme

NPB dapat berasal dari berbagai sumber anatomi potensial, seperti akar saraf, otot, struktur fascia, tulang, sendi, diskus intervertebralis, dan organ dalam kavitas abdomen. Ketegangan dan spasme otot adalah penyebab paling umum terjadinya NPB. Dalam kasus lain, LBP dapat dikaitkan dengan penyebab nyeri yang berbeda dengan karakteristik spesifik, seperti nyeri radikular, sendi facet, sakro-iliaka, dan diskogenik, serta stenosis tulang belakang (Allegri et al., 2016).

Karena nyeri punggung merupakan suatu gejala, etiologinya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor lokal dan sistemik, seperti kegagalan struktural jaringan musculoskeletal, respons inflamasi dan imunologis, kecenderungan genetic, pembebanan statis atau dinamis yang berlebihan; keadaan emosi, faktor perilaku dan lingkungan, keyakinan dan harapan tentang apa yang mungkin terjadi dengan sakit punggung di masa depan dan apakah hal itu dapat dikendalikan, konsekuensi sosial setelah

ekspresi rasa sakit (meningkatnya empati atau penolakan, dan sistem sosial (Vlaeyen et al., 2018).

Sebagian besar pasien yang datang dengan nyeri punggung menderita NPB “nonspesifik” yang mengacu pada NPB yang tidak dapat digolongkan kedalam patofisiologi dasar yang dapat dideteksi (Hartvigsen et al., 2018). Patofisiologi sebenarnya dari NPB nonspesifik biasanya bersifat mekanis (disebabkan oleh trauma atau kelainan struktur anatomi) dan NPB nonmekanis secara umum mengacu pada massa yang menekan (misalnya tumor dan abses) atau kondisi inflamasi pada struktur anatomi tubuh punggung bawah. NPB dapat juga disebabkan oleh penyakit primer pada sistem organ lain (misalnya endometriosis, prostatitis) yang disebut penyakit NPB visceral (Selkirk & Ruff, 2016).

Patologi yang mendasari nyeri punggung bawah masih belum diketahui pada sebagian besar kasus (Vlaeyen et al., 2018). Penyebab pasti NPB dalam kehamilan masih kurang dipahami, namun seringkali dipertimbangkan bersifat multifaktorial, dan dikaitkan dengan faktor biomekanis, vaskular, dan perubahan hormonal selama kehamilan. Trauma panggul, usia muda, multiparitas, NPB kronis dan riwayat NPB pada kehamilan sebelumnya diindikasikan sebagai faktor risiko paling umum terjadinya NPB pada kehamilan. Namun, pembahasan ini masih kontroversial dan etiologinya masih kurang dipahami. Berbagai penjelasan mengenai patofisiologi yang menyebabkan NPB pada periode antenatal telah dikemukakan, meskipun dasar ilmiah dari hipotesis tersebut masih jauh dari pasti (Katonis et al., 2011).


Perubahan fisiologis dan anatomis yang terjadi pada wanita hamil sebagian besar terjadi segera setelah fertilisasi dan berlanjut selama

kehamilan. Sebagian besar perubahan ini disebabkan oleh respons janin, dan hampir semua perubahan ini akan kembali ke keadaan sebelum hamil setelah proses persalinan dan menyusui selesai (Prawirohardjo, 2008). Untuk sebagian besar wanita, kehamilan merupakan suatu periode kehidupan yang unik. Hampir selalu, perubahan hormonal, fisiologis, dan biomekanik seperti peningkatan volume darah dan detak jantung, penambahan berat badan, dan perpindahan pusat massa tubuh akan berjalan normal (Dipietro et al., 2019). Kehamilan mempunyai efek fisiologis yang besar pada tubuh wanita, tidak hanya mempengaruhi sistem kardiovaskular, endokrin, dan ginjal, tetapi juga sistem muskuloskeletal, khususnya kerangka aksial. Perubahan hormonal yang berbeda disertai dengan peningkatan massa tubuh dan adanya rahim yang hamil menyebabkan pergeseran pusat gravitasi, sehingga memberikan beban statis dan dinamis tambahan pada kerangka aksial (Casagrande et al., 2015).

Salah satu mekanisme yang paling sering dikemukakan berkaitan dengan faktor mekanis, diakibatkan oleh peningkatan berat badan selama kehamilan, hingga peningkatan diameter sagital perut dan akibat pergeseran pusat gravitasi tubuh ke anterior, sehingga meningkatkan tekanan pada punggung bawah. Perubahan postur akan terjadi untuk menyeimbangkan pergeseran anterior ini. Selain itu, proses biomekanik menunjukkan bahwa otot perut wanita hamil meregang untuk mengakomodasi rahim yang membesar, menyebabkan kelelahan otot dan mengakibatkan beban ekstra pada tulang belakang yang bertugas menopang sebagian besar peningkatan berat badan (Baran et al., 2022)(Zhou et al., 2023). Selama kehamilan, peningkatan ukuran uterus akan meregangkan dan melemahkan otot-otot perut, sehingga meningkatkan ketegangan otot lumbal yang mengkompensasi

hilangnya tonus dan kekuatan otot perut. Selanjutnya, panggul akan mengalami rotasi secara sagital di sekitar segmen sakral kedua, yang bertindak sebagai titik tumpu (Gambar 1). Saat pusat gravitasi wanita bergeser ke depan akibat kehamilan, terjadilah hiperlordosis kompensasi. Tindakan tersebut menciptakan momen fleksi tambahan pada tulang belakang lumbal yang berpuncak pada peningkatan beban pada otot yang menyokong struktur ini.

Gambar 1. Rotasi panggul dan kompensasi otot



(Casagrande et al., 2015)

Selain itu, kemiringan panggul anterior meningkat seiring dengan pergeseran pusat gravitasi ke anterior, menyebabkan beban yang lebih besar pada ligamen sakroiliaka saat struktur ini berusaha melawan rotasi panggul ke depan. Seiring dengan perkembangan kehamilan, ligamen sakroiliaka ini menjadi kendur dan memungkinkan peningkatan rotasi panggul ke depan dan

hiperlordosis tulang belakang lumbal, yang kemudian memberikan tekanan lebih besar pada panggul dan punggung bawah (Gambar 1). Pembebanan aksial berlebih pada tulang belakang, yang menyebabkan kompresi diskus intervertebralis, juga dapat menyebabkan NPB; kompresi yang berlebihan dapat menyebabkan keluarnya cairan dari diskus dan penurunan tinggi badan.

Gambar 2. Ilustrasi perubahan muskuloskeletal selama kehamilan



(Casagrande et al., 2015)

Peningkatan kadar hormon relaksin, progesteron, dan estrogen selama kehamilan mengakibatkan kelemahan sendi. Relaksin, suatu hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta, meningkat sejak awal kehamilan, mencapai puncaknya pada akhir trimester pertama, dan kemudian tetap

meningkat secara konsisten hingga akhir kehamilan. Estrogen mempotensiasi sensitivitas reseptor relaksin, sehingga meningkatkan efeknya pada sendi (Casagrande et al., 2015). Relaksin meningkat sepuluh kali lipat selama kehamilan. Namun, hubungan antara kadar hormon relaksin dalam sirkulasi dan NPB pada kehamilan masih diperdebatkan karena banyak penelitian tidak mengkonfirmasi adanya korelasi antara kadar serum relaksin dan tingkat keparahan gejala NPB selama kehamilan (Katonis et al., 2011).

Perubahan dari segi vaskular juga dapat menyebabkan nyeri punggung selama kehamilan. Rahim yang hamil dapat memberikan tekanan yang cukup besar pada aorta dan vena cava ketika seorang wanita dalam posisi terlentang. Teori lain menyatakan bahwa selama kehamilan, nyeri punggung yang dirasakan memberat pada malam hari, mungkin disebabkan oleh perluasan rahim yang memberikan tekanan pada vena cava yang menyebabkan kongesti vena di panggul dan vertebra lumbal (Katonis et al., 2011). Selain potensi risiko tromboemboli vena, stasis vena dan penurunan saturasi oksigen regional dapat menyebabkan hipoksemia yang mengganggu aktivitas metabolisme struktur saraf, sehingga menyebabkan NPB (Casagrande et al., 2015).

Nyeri dimediasi oleh nosiseptor, yaitu neuron sensorik perifer khusus yang peka terhadap potensi rangsangan yang merusak pada kulit dengan mentransduksi rangsangan tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke pusat otak yang lebih tinggi. Nosiseptor adalah neuron somatosensori primer pseudo-unipolar dengan badan sarafnya terletak di *dorsal root ganglion* dan merupakan akson yang bercabang dua dimana cabang perifer menginervasi kulit dan cabang sentral bersinaps pada neuron tingkat kedua di *dorsal horn*

medulla spinalis. Neuron tingkat kedua memproyeksikan ke mesencephalon dan thalamus, yang selanjutnya terhubung ke korteks somatosensori dan korteks cingulate anterior untuk memandu fitur nyeri sensorik-diskriminatif dan afektif-kognitif. *Dorsal horn* tulang belakang adalah tempat utama integrasi informasi somatosensori dan terdiri dari beberapa populasi interneuron yang membentuk jalur penghambatan dan fasilitasi menurun, yang mampu memodulasi transmisi sinyal nosiseptif. Jika stimulus noxious tetap ada, proses sensitisasi perifer dan sentral dapat terjadi, mengubah nyeri dari akut menjadi kronis. Sensitisasi sentral ditandai dengan peningkatan rangsangan neuron dalam sistem saraf pusat (Allegrì et al., 2016).

Perubahan minimal pada postur tubuh dapat dengan mudah menyebabkan peradangan jangka panjang pada sendi, ligamen, dan otot yang mempengaruhi stabilitas punggung bawah, sehingga berkontribusi terhadap sensitisasi perifer dan sentral. Selain itu, sendi, diskus, dan tulang banyak dipersarafi oleh serat delta A sehingga rangsangan terus menerus dapat dengan mudah berkontribusi terhadap sensitisasi sentral (Allegrì et al., 2016).

4. Gejala Klinis

Nyeri punggung bawah yang berhubungan dengan kehamilan biasanya dialami antara krista iliaka posterior dan lipatan gluteal dekat salah satu atau kedua sendi sakroiliaka, kadang-kadang menjalar ke paha posterior. Nyeri ini dapat terjadi bersamaan atau terpisah dari simfisis pubis, dengan kemungkinan menjalar ke paha anterior. Nyeri bersifat intermiten, dapat dipicu oleh postur tubuh yang berkepanjangan, dan biasanya terjadi dalam waktu 30 menit setelah melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, duduk, atau berdiri. NPB terkait kehamilan digambarkan sebagai nyeri di

daerah pinggang, di atas sakrum, dan dapat menjalar ke kaki. Nyeri yang dirasakan seringkali dipersepsikan sebagai nyeri tumpul dan diperburuk dengan gerakan fleksi ke depan. Pergerakan tulang belakang seringkali terbatas pada daerah lumbal, sedangkan palpasi otot erector spinae memperparah gejala yang dirasakan.

5. Tatalaksana

a. Terapi Konservatif

Mayoritas strategi pengobatan berpusat pada pencegahan karena pengobatan pada akhir kehamilan seringkali sulit diterapkan. Ketika pengobatan dicari; Penatalaksanaan konservatif nyeri punggung bawah lebih disukai selama kehamilan karena alasan yang jelas, meskipun pengobatan tersebut biasanya tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Pilihan pengobatan termasuk fisioterapi, stimulasi saraf transkutan, pengobatan farmakologis, pengobatan akupunktur atau chiropraktik, dan sabuk stabilisasi.

Postur tubuh yang benar sangat penting untuk meredakan nyeri pinggang. Olahraga sebelum dan pada awal kehamilan dapat membantu memperkuat otot perut, punggung, dan panggul, sehingga memperbaiki postur tubuh dan memungkinkan peningkatan kemampuan menahan beban. Olahraga dengan intensitas rendah juga dapat mengurangi rasa sakit setelah kehamilan berkembang. *Pelvic tilts* sangat efektif dalam meredakan nyeri pinggang. Peregangan ekstremitas bawah dan panggul serta latihan Kegel juga dapat diterapkan untuk meredakan nyeri pinggang pada ibu hamil (Sabino & Grauer, 2008). Beberapa pilihan pengobatan konservatif adalah fisioterapi, sabuk stabilisasi, stimulasi saraf, pengobatan farmakologis, akupunktur, pijat, relaksasi, dan yoga. Upaya penurunan berat badan dan pencegahan

penambahan berat badan dapat membantu mencegah risiko dan keparahan NPB (Katonis et al., 2011).

Selama kehamilan, berat badan yang ideal dihitung menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum hamil. Hal ini karena IMT saat hamil akan menunjukkan kelebihan berat badan maupun obesitas. *Institute of Medicine* (IOM) merekomendasikan penambahan berat badan yang optimal pada kehamilan untuk mengoptimalkan *outcome* ibu dan bayi. IOM menyarankan total penambahan sebesar 5 hingga 9 kg untuk wanita yang mengalami obesitas dan 6,8 hingga 11,3 kg untuk wanita yang termasuk dalam kategori *overweight* (Kim & Ayabe, 2023).

Terdapat bukti moderat yang menunjukkan efek positif terapi olahraga terhadap nyeri, disabilitas, dan/atau cuti sakit untuk pengobatan nyeri lumbopelvis selama kehamilan. Selain itu, data menunjukkan bahwa pendidikan pasien tampaknya juga merupakan intervensi yang bermanfaat. Terapis fisik dapat menerapkan intervensi berupa edukasi untuk meningkatkan pengobatan terhadap kondisi ini. Enam dari 7 studi mengenai intervensi yang dikombinasikan dengan pendidikan menunjukkan dampak positif terhadap nyeri dan/atau disabilitas atau cuti sakit (Van Benten et al., 2014).

a. Manajemen Farmakologis

Keamanan suatu obat selama kehamilan ditunjukkan oleh kategori yang ditetapkan oleh *Food and Drug Administration* (FDA). Obat-obatan dalam kategori A adalah obat yang tidak menunjukkan efek berbahaya dalam uji

klinik pada ibu hamil trimester pertama. Kategori B adalah obat-obat yang tidak menunjukkan efek berbahaya dalam uji pada hewan coba namun belum ada uji klinik yang dilakukan pada wanita hamil. Kategori C adalah obat-obat yang menunjukkan efek berbahaya dalam uji pada hewan coba namun belum terdapat uji klinik yang dilakukan pada wanita hamil. Kategori D adalah obat-obat yang menunjukkan efek berbahaya namun masih dapat dipergunakan pada ibu hamil jika penggunaannya memberikan manfaat yang lebih besar dari potensi risiko yang ditimbulkan. Kategori X adalah obat-obat yang jelas menunjukkan efek berbahaya pada hewan uji coba dan wanita hamil. Penggunaan obat ini merupakan kontraindikasi pada wanita yang sedang atau mungkin akan hamil (Zulfa & Handayani, 2022).

Asetaminofen dalam bentuk oral atau rektal merupakan obat kategori B yang merupakan analgesik pilihan pertama untuk nyeri punggung ringan karena belum diketahui sifat teratogeniknya (dalam sediaan intravena termasuk kategori C). *Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug* (NSAID), seperti ibuprofen dan naproxen, merupakan obat kategori C pada trimester pertama (0 hingga 14 minggu) dan trimester kedua (14 hingga 28 minggu); pada trimester ketiga (28 hingga 42 minggu), obat ini dianggap sebagai obat kategori D karena telah diketahui adanya risiko terhadap janin. Duktus arteriosus penting untuk sirkulasi normal janin; namun, struktur tersebut dapat menutup sebelum waktunya ketika NSAID digunakan pada atau menjelang aterm dan dapat menyebabkan hipertensi pulmonal. Oleh karena itu, penggunaan NSAID selama kehamilan harus bersifat jangka pendek dan dibatasi pada trimester pertama dan kedua (Casagrande et al., 2015).

Aspirin dosis penuh adalah obat kategori D pada ketiga trimester dan telah dikaitkan dengan peningkatan kematian perinatal, perdarahan neonatal, penurunan berat badan lahir, perpanjangan kehamilan dan persalinan, dan kemungkinan cacat lahir. Aspirin dosis rendah dapat digunakan pada kehamilan dan dipertimbangkan aman sehubungan dengan risiko malformasi janin dan gangguan perkembangan besar. Cyclobenzaprine, suatu obat pelemas otot, adalah obat kategori B yang tersedia dan dapat digunakan pada kehamilan, namun methocarbamol, obat kategori C, harus dihindari sebisa mungkin karena risikonya terhadap janin belum sepenuhnya diketahui. Opioid hanya dapat digunakan untuk mengatasi nyeri hebat. Analgesik opioid tidak boleh diberikan dalam waktu dekat dan dibatasi hanya untuk penggunaan jangka pendek. Penggunaan steroid epidural selama kehamilan masih kontroversial meskipun dosis tunggal tampaknya memiliki risiko rendah terhadap janin (Casagrande et al., 2015).

Peran operasi tulang belakang untuk NPB dan PGP pada kehamilan masih terbatas. Bila diindikasikan, memerlukan koordinasi yang cermat antara dokter bedah ortopedi dan dokter kandungan. Idealnya, nyeri tidak menjadi satu-satunya indikasi untuk pembedahan pada pasien dengan masalah tulang belakang yang berulang. Namun, pembedahan dapat dilakukan selama kehamilan jika nyeri tidak dapat dirasakan atau tidak dapat diatasi dengan tindakan penatalaksanaan konservatif, dan/atau jika gangguan neurologis akan segera terjadi (Casagrande et al., 2015).

6. Prognosis

Secara umum prognosis NPB baik bagi sebagian besar ibu hamil. Namun, wanita dengan nyeri kombinasi menunjukkan tingkat kesembuhan

yang paling rendah. Kombinasi nyeri selama kehamilan merupakan prediktor terjadinya PGP persisten atau nyeri kombinasi pascapersalinan. Salah satu faktor risiko terpenting untuk NPB postpartum adalah NPB terkait kehamilan sebelumnya. Tampaknya intensitas nyeri lebih tinggi pada wanita dengan NPB postpartum yang mengalami NPB selama kehamilan. Secara umum, intensitas nyeri merupakan faktor prognostic. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa NPB postpartum merupakan kelainan sementara dengan prognosis yang baik, terutama pada bulan-bulan pertama setelah melahirkan (Casagrande et al., 2015).

7. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Nyeri Punggung Bawah

Aktivitas juga berhubungan dengan timbulnya nyeri punggung selama kehamilan. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak meningkatkan risiko nyeri punggung dibandingkan dengan pasien yang menjalani gaya hidup lebih aktif. Meskipun demikian, pasien yang memiliki pekerjaan yang digambarkan sebagai “terlalu aktif” dan “menuntut secara fisik” juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami nyeri selama kehamilan (Sabino & Grauer, 2008).

Pentingnya aktivitas fisik dalam penatalaksanaan NPB telah diterima secara umum, dan meningkatkan taraf aktivitas fisik telah menjadi bagian penting dari rekomendasi dalam penatalaksanaan NPB. Aktivitas fisik telah dianggap sebagai faktor risiko dan faktor pencegahan untuk NPB. Hasil dari banyak penelitian menunjukkan hubungan antara setidaknya aktivitas fisik dengan intensitas sedang dan NPB. Terdapat bukti bahwa beban kerja fisik yang tinggi berbahaya bagi punggung. Paparan di tempat kerja, beban kerja yang berat, sering mengangkat, membungkuk dan memutar serta aktivitas olahraga ekstrem merupakan faktor risiko yang diterima untuk NPB. Pada

saat yang sama, ada beberapa dugaan bahwa gaya hidup yang tidak aktif atau kurang bergerak berhubungan dengan keluhan nyeri yang dirasakan (Heneweer et al., 2009).

C. Kajian Integrasi Keislaman

Allah SWT menjelaskan penciptaan manusia didalam Q.S. Al A'raf/7:189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Terjemahnya :

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Saat permulaan dari pertumbuhan janin itu terasa ringan. Pertama-tama terhentinya haid dan selanjutnya benih itu terus berproses, perlahan-lahan. Maka ketika kandungannya mulai berat, ibu-bapak memanjatkan doa kepada Allah agar keduanya dianugerahi anak yang saleh, sempurna jasmani, berbudi luhur, cakap melaksanakan tugas kewajiban sebagai manusia. Kedua, istri itu berjanji akan mewajibkan atas dirinya sendiri untuk bersyukur kepada Allah karena menerima nikmat itu dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan (*Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, 2019*).

Proses yang berlangsung pada tubuh ibu hamil yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kelemahan otot dan persendian sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-quran di dalam Q.S. Luqman/31:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي ۙ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ (١٤)

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Menurut tafsir Al-Misbah kata *Wahnān* (وَهْنًا) berarti kelemahan atau kerapuhan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah berkurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Setelah pembuahan, ibu akan mengemban tanggung jawab atas proses perkembangan anaknya hingga ia lahir. bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi juga berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Karena jasanya tidak dapat digambarkan dengan kata kata, maka anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orangtuanya (Shihab, 2002).

Dalam penggalan ayat “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah” digambarkan bagaimana kesulitan yang dihadapi ketika ibu sedang mengandung, payah bertambah payah. Seiring dengan perkembangan kehamilan, akan terjadi pertambahan ukuran rahim sehingga meregangkan dan melemahkan otot-otot perut, yang kemudian meningkatkan ketegangan otot lumbal sebagai mekanisme kompensasi terhadap hilangnya tonus dan kekuatan otot perut.

Sehubungan dengan uraian diatas, keadaan ibu saat sedang mengandung juga disebutkan dalam Q.S. Al-Ahqaf /46:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

Ayat di atas menguraikan hak orang tua terhadap anaknya. Kewajiban untuk taat kepada Allah dengan kewajiban patuh kepada kedua orang tua seringkali disandingkan dalam Al-Qur'an, Rasulullah juga mengatakan bahwa: “Ridha Allah pada ridha kedua orang tua dan murka-Nya pada murka keduanya” (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain melalui Abdullah Ibn Mas'ud). Ayat di atas juga menunjukkan betapa pentingnya ibu memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya, terutama saat mereka tumbuh dan berkembang secara spiritual. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan saat mereka masih kecil; sebagai contoh, tidak bijaksana membiarkan mereka hidup sendirian dengan ibu bapak kandungnya. Meskipun ada banyak kasih sayang yang dapat diberikan oleh orang lain, kasih sayang kedua orangtua masih sangat penting bagi mereka (Shihab, 2002).

Kata *kurhan* (كُرْهًا) merujuk kepada ketidaknyamanan atau ketidaksenangan terhadap suatu perbuatan atau kewajiban. Jadi, ketika seseorang melakukan sesuatu “*kurhan*,” berarti dia melakukannya dengan rasa terpaksa atau dengan kenggan. Sementara itu didalam kamus *lisan al-‘arab*, kata *wa-ha-na* diartikan sebagai lemah dalam suatu pekerjaan, aktivitas atau perbuatan dan lemah dalam suatu perkara.

Kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orangtuanya disebutkan dalam hadist sebuah hadist:

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu*, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi *shalallaahu ‘alaihi wasallam* menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi *shalallaahu ‘alaihi wasallam* menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam* menjawab, ‘Kemudian ayahmu.” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi *shalallaahu ‘alaihi wasallam* menyebutkan kata ibu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali.. Karena kesulitan dalam menghadapi masa kehamilan, kesulitan saat melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu (Al-Qurthubi, 2007).

Peran dan dukungan suami saat istri hamil sangat penting agar mereka dapat menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi selama kehamilan. Suami yang memahami dan memenuhi kewajibannya dengan baik dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Dengan memenuhi kewajibannya sesuai ajaran Islam, suami dapat menjadi pendamping yang setia dan pendukung bagi istrinya selama masa kehamilan. Beberapa hal yang dapat dilakukan keluarga sebagai dukungan terhadap ibu hamil seperti membacakan doa, memberikan asupan makanan yang sehat dan, memberikan perhatian. Salah satu cara umat Islam meminta pertolongan kepada Allah SWT adalah dengan berdoa. Suami dapat membacakan doa untuk kelancaran kehamilan bagi istrinya sejak trimester pertama. Allah SWT berfirman dalam surah Q.S. Ghafir ayat


وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ء (٦٠)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahannya :


Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.”

D. Kerangka Teori



Bagan 1. Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep



Bagan 2. Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian *cross sectional*, suatu jenis penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek melalui pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu waktu.

B. *Waktu dan Tempat Penelitian*

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari - Maret tahun 2024 di Puskesmas Sudiang.

C. *Variabel Penelitian*

1. Variabel Dependen

Variabel yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam eksperimen disebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat (Syahza, 2021). Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini adalah nyeri punggung bawah.

2. Variabel Independen

Variabel yang dianggap mempengaruhi variabel dependen (terikat) dalam eksperimen disebut variabel independen atau variabel bebas (Syahza, 2021). Variabel independen dalam penelitian ini adalah aktifitas fisik.

D. *Populasi dan Sampel Penelitian*

1. Populasi

Keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian disebut populasi (Syahza, 2021). Populasi dalam

penelitian ini adalah ibu hamil trimester ketiga di Puskesmas Sudiang Tahun 2023.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil melalui teknik pengambilan sampel. Ini adalah bagian yang mewakili populasi, dan pengambilan sampel harus dilakukan dengan cermat agar sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi (Hardani et al., 2020).

Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin :


$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Presentase kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir,
10%

$$n = \frac{309}{1 + 309(0,1)^2}$$

$$n = 75.550 \approx 76$$

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling. *Purposive sampling* yaitu memilih sampel

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. The International Physical Activity Questionnaire – Short Form (IPAQ-SF) terdiri atas 7 poin pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat aktifitas yang dilakukan dalam 1 pekan terakhir. Sementara itu, untuk kejadian nyeri punggung bawah digunakan kuesioner The Pain and Distress Scale oleh William J. K Zung.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan setelah responden mengisi kuesioner yang diberikan akan diperiksa kesesuaian, kelengkapan, serta kebenarannya (Henny Syapitri et al., 2021).

b. Coding

Kode adalah simbol yang digunakan untuk memberikan identitas data. Data yang sebelumnya berbentuk huruf akan diubah menjadi menjadi angka atau bilangan pada tahapan ini. Tahap ini bertujuan agar proses pengolahan data menjadi lebih mudah. (Adiputra et al., 2021)

c. Processing

Processing merupakan tahapan berikutnya setelah semua kuesioner terisi secara lengkap dan benar serta jawaban responden dikodekan ke dalam aplikasi pengolahan data computer, salah satunya yaitu *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) (Henny Syapitri et al., 2021).

d. Cleaning

Pembersihan data atau *cleaning* adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesalahan atau tidak (Henny Syapitri et al., 2021).

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data dari kuesioner dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut diolah menggunakan *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut :

a. Analisis Univariat


Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat memperlakukan semua variabel sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis hubungan antara kedua variabel yang ada (Heryana, 2020).

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang menguji antara korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu variabel independen dengan variabel

dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. Analisis data yang digunakan adalah *chi-square*.

H. Alur Penelitian



Bagan 3. Alur Penelitian

I. Penyajian Data

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

J. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan *ethical clearance* maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti :

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien.
3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian dalam pengambilan data.
4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Sudiang pada bulan Februari hingga April 2024. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 76 responden. Data yang diperoleh dalam penelitian berasal dari kuesioner mengenai intensitas aktivitas fisik dan nyeri punggung bawah. Selanjutnya, data diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan *Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian diuraikan secara lebih rinci dalam tabel dan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk menganalisis setiap variabel secara deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran berupa karakteristik dari setiap variabel.

a. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden

Tabel 3. Analisis Univariat Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah Responden	
	n	%
Usia		
< 25 tahun	26	34,2
25-35 tahun	44	57,9
> 35 tahun	6	7,9
Pekerjaan		
IRT	63	82,9
Wiraswasta	9	11,8
Honorar	1	1,3
Bidan	1	0,7
Guru	2	2,6
Total	76	100

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas distribusi karakteristik sampel penelitian ditunjukkan bahwa sebanyak 26 (34,2%) responden berusia < 25 tahun, sebanyak 44 (57,9%) responden berusia 25-35 tahun, dan sebanyak 6 (7,9%) responden berusia > 35 tahun. Pada kategori pekerjaan, sebanyak 63 (82,9%) responden merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT), sebanyak 9 (11,8%) berprofesi sebagai wiraswasta, sebanyak 1 (1,3%) responden bekerja sebagai

honorar, sebanyak 1 (0,7%) responden bekerja sebagai bidan, dan sebanyak 2 (2,6%) responden bekerja sebagai guru.

b. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel penelitian.

Tabel 4. Distribusi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	n (%)
Aktivitas Fisik	
Rendah	24 (31,6%)
Sedang	48 (63,2%)
Tinggi	4 (5,3%)
Nyeri Punggung Bawah	
Keluhan ringan	43 (56,6%)
Keluhan sedang	26 (34,2%)
Keluhan Berat	7 (9,2%)
Total	76 (100%)

Sumber: Data Primer, 2024

Variabel independen pada penelitian ini adalah aktivitas fisik. Tabel 4 menunjukkan distribusi frekuensi dari 76 responden yang diteliti terdapat 24 (31,6%) responden dengan intensitas aktivitas fisik rendah, sebanyak 48 (63,2%) responden dengan intensitas aktivitas fisik sedang, dan sebanyak 4 (5,3%) responden dengan intensitas tinggi.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Nyeri Punggung Bawah. Pada variabel nyeri punggung bawah ditunjukkan bahwa dari 76 responden yang diteliti, sebanyak 43 (56,6%) responden mengalami nyeri punggung

bawah dengan keluhan ringan, sebanyak 26 (34,2%) responden mengalami keluhan sedang, dan sejumlah 7 (9,2%) responden mengalami keluhan berat.

2. Analisis Bivariat

Tabel 5. Analisis Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah

Aktivitas Fisik	Nyeri Punggung Bawah				Total	p-value
	Keluhan Ringan		Keluhan Berat			
	n	%	n	%	n	
Intensitas Rendah	7	29,2	17	70,8	100,0	0,002
Intensitas Tinggi	36	69,2	16	30,8	100,0	
Total	43	56,6	33	43,3	100,0	

Berdasarkan hasil uji statistik yang ditunjukkan dalam tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 ($p < 0,05$) yang berarti bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara hubungan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah atau hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol ditolak (H_0).

B. Pembahasan

Hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian Nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III

Selama masa kehamilan tubuh wanita akan mengalami banyak perubahan yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri. Nyeri punggung bawah pada ibu hamil ditandai dengan karakteristik nyeri berulang atau terus menerus yang dirasakan pada bagian lumbosakral dan panggul. Hal ini biasanya mulai dirasakan antara bulan kelima dan ketujuh kehamilan. Sementara itu, melakukan aktivitas sehari-hari seperti bergerak, berjalan, dan berdiri dari kursi akan menjadi lebih sulit saat seorang ibu hamil mengalami nyeri punggung bawah (Zhou et al., 2023). Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang disebabkan oleh kontraksi otot dan rangka, yang menyebabkan tubuh mengonsumsi lebih banyak kalori atau menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dibutuhkannya saat istirahat. Aktivitas fisik merupakan salah satu cara yang populer dan mudah dilakukan untuk menjaga kesehatan. Dampak positif aktivitas fisik bagi ibu hamil diantaranya yaitu, penurunan risiko berat badan berlebih, diabetes gestasional, dan pemulihan yang lebih cepat pasca melahirkan (Baran et al., 2022).

Berdasarkan tabel 3, diketahui kelompok usia responden terbanyak berada pada kategori usia 25-35 tahun, yaitu 44 (57,9%) responden. Usia tersebut merupakan usia yang optimal untuk hamil, oleh karena pada rentang usia 20 hingga 35 tahun organ reproduksi calon ibu sudah terbentuk sepenuhnya (Purborini & Rumaropen, 2023). Selain karena organ reproduksi sudah matang sehingga siap dalam menjalankan fungsinya secara

optimal, pada rentang usia tersebut wanita dipertimbangkan secara psikologis sudah cukup dewasa untuk menjalankan peran seorang ibu. Usia ibu menentukan kematangan mereka dalam berpikir dan membuat keputusan, termasuk memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan atau tidak (Dumilah, 2019). Distribusi karakteristik sampel juga menunjukkan sebanyak 26 (34,2%) responden berusia < 25 tahun dan sebanyak 6 (7,9%) responden berusia > 35 tahun. Dalam studi yang dilakukan oleh Patricia (2015) diketahui risiko komplikasi kehamilan meningkat pada ibu hamil dengan usia melebihi 35 tahun. Persalinan pada usia muda (yaitu, ≤ 19 tahun) atau usia ibu lanjut (yaitu, ≥ 35 tahun) dikaitkan dengan peningkatan risiko perinatal, seperti perdarahan postpartum, eklamsia, dan disproporsi sefalopelvik, serta efek samping yang merugikan pada bayi (Cavazos-Rehg et al., 2015).

Pada distribusi karakteristik sampel yang ditunjukkan dalam tabel 3 sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 63 (82,9%) responden. Pekerjaan rumah tangga juga memiliki potensi sebagai aktivitas yang berkaitan dengan timbulnya nyeri punggung, hal ini dikarenakan aktivitas ibu sehari-hari seperti mengangkat benda berat, membersihkan rumah, menggendong anak dengan posisi yang tidak tepat, duduk terlalu lama dengan postur yang tidak ergonomis dapat menyebabkan otot menegang sehingga menimbulkan nyeri (Lestari et al., 2023).

Tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, yaitu sebanyak 48 (63,2%) dari keseluruhan sampel. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang terdapat didalam pedoman aktivitas fisik tahun 2018 oleh Departemen Kesehatan dan Layanan

Kemanusiaan untuk Amerika yang menyarankan ibu hamil untuk setidaknya melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 menit dalam seminggu selama kehamilan dan masa nifas atau periode pascapersalinan. Selain itu, ibu hamil harus mendapatkan pendampingan oleh dokter spesialis kandungan atau penyedia layanan kebidanan lainnya yang dapat memantau perkembangan kehamilan. Ibu hamil dapat berkonsultasi terkait penyesuaian aktivitas fisik selama kehamilan dan pascapersalinan. Beberapa bentuk latihan yang telah dilakukan studi dan ditemukan aman serta bermanfaat yaitu berjalan kaki, sepeda statis, latihan aerobic, menari, dan latihan peregangan. Aktivitas fisik selama kehamilan aman dilakukan dan dipertimbangkan ketika mereseplan modifikasi olahraga pada kehamilan. Jika tidak terdapat komplikasi atau kontraindikasi medis (Meredith L. Birsner, 2020). Selain itu pada tabel 4 diketahui mayoritas responden mengalami keluhan ringan yaitu sebanyak 43 (56,6%) responden. Keluhan nyeri punggung yang dirasakan selama kehamilan seringkali disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah proses biomekanis, perubahan hormonal selama kehamilan, dan perubahan vaskular.

Berdasarkan tabel 5 dapat diamati bahwa kategori keluhan berat paling banyak dialami oleh kelompok dengan intensitas aktivitas fisik rendah. Hal ini dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh Vanessa dkk (2019) tentang "*The influence of gestational trimester, physical activity practice and weight gain on the low back and pelvic pain intensity in low risk pregnant women*" dengan menggunakan analisis statistik regresi Poisson menunjukkan perbedaan yang signifikan ($P=0,02$) dalam intensitas nyeri, dimana ibu hamil yang tidak aktif memiliki 30% peluang yang lebih besar mengalami intensitas nyeri yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang aktif. Selain itu, berdasarkan studi

ini diketahui bahwa peningkatan berat badan, trimester kehamilan, dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi intensitas nyeri yang dirasakan. Aktivitas fisik yang rendah dan peningkatan berat badan memiliki hubungan dengan nyeri punggung. Gaya hidup yang tidak aktif/ kurang bergerak ditambah dengan defisiensi muskuloskeletal serta beban berlebih pada tulang belakang menyebabkan lebih rentan mengalami nyeri punggung bawah dan nyeri panggul. Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur akan meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, daya tahan dan kekuatan otot, sehingga dapat mengurangi intensitas nyeri punggung bawah dan nyeri panggul (de Sousa et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III yang dianalisis menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002, oleh karena nilai yang diperoleh lebih dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini juga didukung oleh Nuria Marín-Jiménez dkk (2019) pada studi terhadap 159 ibu hamil dengan menggunakan instrumen *international fitness scale* dan *visual analogue scale*, yang menyatakan bahwa kebugaran fisik yang lebih baik secara keseluruhan memiliki relasi dengan berkurangnya nyeri yang dirasakan pada tubuh dan nyeri pinggang selama kehamilan (Marín-Jiménez et al., 2019). Hal ini juga disebutkan dalam studi yang dilakukan oleh Longfeng Zhou dkk (2023) "*The correlation between pregnancy-related low back pain and physical fitness evaluated by an index system of maternal physical fitness test*" terhadap 180 partisipan ibu hamil dengan sistem indeks tes kebugaran dan kuesioner

Oswestry Disability Index (ODI) yang menunjukkan bahwa nyeri punggung bawah memiliki korelasi negatif dengan kebugaran jasmani selama kehamilan (Zhou et al., 2023).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Merlia Metsa Riyani (2023) dengan desain *cross-sectional* yang melibatkan sejumlah 107 sampel. Instrumen penelitian yang digunakan adalah *International Physical Activity Questionnaire - Short Form* dan *Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire*. Hasil uji statistik dengan metode *chi-square* menunjukkan *p-value* sebesar 0,002 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III (Riyani, 2023).

Penelitian lain oleh Rika dkk (2022) dengan metode *cross-sectional* yang melibatkan 95 sampel ibu hamil menggunakan kuesioner *Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ)* dan wawancara. Hasil analisis statistik menggunakan *Wilcoxon signed-rank test* menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan nyeri punggung, tetapi individu yang tidak mengalami nyeri punggung cenderung memiliki durasi aktivitas olahraga lebih lama. Studi ini juga menyebutkan bahwa 80% ibu hamil hanya berjalan kaki sebagai aktivitas olahraga. Selain itu disebutkan bahwa aktivitas dalam ruangan cenderung meningkat selama kehamilan karena perubahan pola aktivitas fisik. Latihan aerobik dengan tingkat tertentu yang tidak berlebih selama kehamilan dapat meringankan gejala nyeri punggung yang dirasakan serta memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik dan mental. Pekerjaan rumah tangga serta olahraga ringan

yang tidak memberikan beban berlebih pada punggung merupakan aktivitas fisik yang dianggap sesuai untuk ibu hamil (Kawabe et al., 2022).

Kebugaran fisik dan kebugaran kardiorespirasi yang lebih baik selama kehamilan dilaporkan berhubungan dengan berkurangnya nyeri tubuh, nyeri pinggang dan sciatic, serta berkurangnya disabilitas akibat nyeri (Marín-Jiménez et al., 2019). Olahraga air dapat menjadi alternatif bagi ibu hamil yang mengalami nyeri punggung bawah. Sebuah studi terhadap efek olahraga berbasis air pada wanita hamil selama trimester ketiga menunjukkan selama berendam dalam air, ibu hamil rata-rata mengalami penurunan berat badan rata-rata sebesar 82,9% dari berat badannya. Suatu pengurangan yang menyebabkan beban osteoartikular ibu berkurang karena daya apung (Alberston et al., 2019). Mekanisme terkait bagaimana olahraga atau aktifitas fisik dapat mengurangi nyeri masih belum dapat dijelaskan, akan tetapi melakukan aktivitas fisik direkomendasikan untuk mengimbangi tingkatan perubahan biomekanis yang dialami selama bertambahnya usia kehamilan. Dengan kata lain secara umum berolahraga dapat membantu memulai proses *desensitisasi* nyeri yang mengarah pada peningkatan ambang batas deteksi nyeri (Davenport et al., 2019).

Periode kehamilan merupakan masa yang tepat bagi ibu hamil untuk menerapkan gaya hidup dan perilaku yang sehat seiring dengan meningkatnya motivasi dan interaksi yang lebih sering dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Ibu hamil akan cenderung melakukan aktivitas fisik, menjaga berat badan, dan memperbaiki asupan makanan jika tenaga kesehatan memberi saran dan konseling bagi mereka.

C. Keterbatasan Penelitian

Selama penelitian ini berlangsung, terdapat kekurangan berupa keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian. Keterbatasan tersebut yaitu:

1. Data yang dikumpulkan berupa kuesioner sehingga memerlukan interaksi langsung antara peneliti dan responden di tempat penelitian, sementara kunjungan ibu hamil trimester III ke Puskesmas per hari biasanya hanya berkisar 1-5 orang. Pengumpulan data dengan kondisi tersebut menyebabkan peneliti memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencukupi jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian.
2. Terdapat responden yang memenuhi kriteria sampel tetapi tidak kooperatif setelah mendapatkan penjelasan *informed consent*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III yang dilakukan di Puskesmas Sudiang menggunakan uji statistik *chi-square*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari uji statistik diketahui terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah.
2. Sebagian besar responden melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, yaitu sebanyak 48 responden (63,2%) dan paling sedikit dengan intensitas aktivitas yang tinggi yaitu 4 responden (5,3%). Sementara itu, distribusi responden dengan nyeri punggung bawah mayoritas mengalami keluhan ringan dengan jumlah 43 responden (56,6%) dan paling sedikit mengalami keluhan berat sejumlah 7 responden (9,2%).

B. Saran

1. Bagi ibu hamil dan tenaga kesehatan diharapkan agar masalah terkait nyeri punggung bawah yang dirasakan selama periode kehamilan dapat menjadi perhatian ketika konseling pelayanan antenatal, oleh karena banyak ibu hamil dengan keluhan nyeri punggung bawah yang tidak melaporkan atau mencari pengobatan karena menganggap hal ini sebagai sesuatu yang lazim dialami dalam kehamilan. Selain itu, ibu hamil disarankan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang setidaknya 150 menit dalam sepekan.

2. Bagi lembaga terkait diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat menjadi acuan untuk pengembangan edukasi terkait manfaat aktivitas fisik sebagai salah satu modalitas untuk meringankan nyeri punggung bawah selama masa kehamilan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian terkait nyeri punggung bawah dapat menemukan bentuk aktivitas fisik dan olahraga yang secara spesifik dapat menjadi terapi bagi ibu hamil mengingat penggunaan obat-obatan dapat beresiko selama kehamilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI. (2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Adiputra, M. S., Ni, W. T., & Ni, P. W. O. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–308.
https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_Penelitian_Kesehatan.html?id=DDYtEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Aisah, S. (2021). *STUDI ANALISIS TAFSIR SURAT LUQMAN AYAT 12-19 TENTANG PENDIDIKAN ANAK*.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI*. (2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Qurthubi, I. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi* (M. B. Mukti (Ed.)). Pustaka Azzam.
- Alberton, C. L., Bgeginski, R., Pinto, S. S., Nunes, G. N., Andrade, L. S., Brasil, B., & Domingues, M. R. (2019). Water-based exercises in pregnancy: Apparent weight in immersion and ground reaction force at third trimester. *Clinical Biomechanics (Bristol, Avon)*, 67, 148–152.
<https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2019.05.021>
- Allegri, M., Montella, S., Salici, F., Valente, A., Marchesini, M., Compagnone, C., Baciarello, M., Manferdini, M. E., & Fanelli, G. (2016). Mechanisms of low back pain: A guide for diagnosis and therapy. *F1000Research*, 5, 1–11.
<https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.8105.1>
- Bachtiar, F. (2022). Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Nyeri Punggung Bawah Pada Pramugari Maskapai X Air. *Indonesian Journal of Health Development*, 4(2), 54–59. <https://doi.org/10.52021/ijhd.v4i2.104>
- Balducci, S., Zanuso, S., Nicolucci, A., Fernando, F., Cavallo, S., Cardelli, P., Fallucca, S., Alessi, E., Letizia, C., Jimenez, A., Fallucca, F., & Pugliese, G. (2010). General Physical Activities Defined by Level of Intensity. *Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases : NMCD*, 20(8), 608–617.
- Baran, J., Pop, T., Sieńko, J., Leszczak, J., Ozimek, M., Waraksa, E., Mirek, W., & Herbert, J. (2022). Effect of physical activity on low back pain in pregnant women. *Journal of Kinesiology and Exercise Sciences*, 32(97), 35–44. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8109>
- Beenackers, Carlijn BM., K., Katrina, G., Johannes, B., A.E., K., A., B., & F.J., van L. (2012). Socioeconomic inequalities in occupational, leisure-time, and transport related physical activity among European adults: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 9(116), 1–23.
<http://www.ijbnpa.org/content/9/1/116%5Cnhttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed10&NEWS=N&AN=2012657489>
- Bryndal, A., Majchrzycki, M., Grochulska, A., Glowinski, S., & Seremak-

- mrozikiewicz, A. (2020). Risk factors associated with low back pain among a group of 1510 pregnant women. *Journal of Personalized Medicine*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.3390/jpm10020051>
- Casagrande, D., Gugala, Z., Clark, S. M., & Lindsey, R. W. (2015). Low Back Pain and Pelvic Girdle Pain in Pregnancy. *Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*, 23(9), 539–549. <https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-14-00248>
- Cavazos-Rehg, P. A., Krauss, M. J., Spitznagel, E. L., Bommarito, K., Madden, T., Olsen, M. A., Subramaniam, H., Peipert, J. F., & Bierut, L. J. (2015). Maternal age and risk of labor and delivery complications. *Maternal and Child Health Journal*, 19(6), 1202–1211. <https://doi.org/10.1007/s10995-014-1624-7>
- CDC. (2022). *Measuring Physical Activity Intensity*. <https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/index.html>
- Chiodo, A. E., Bhat, S. N., Harrison, R. Van, Shumer, G. D., Wasserman, R. A., Park, P., & Patel, R. D. (2020). *UMHS Low Back Pain Guideline Update*. November, 1–30.
- Davenport, M. H., Marchand, A.-A., Mottola, M. F., Poitras, V. J., Gray, C. E., Jaramillo Garcia, A., Barrowman, N., Sobierajski, F., James, M., Meah, V. L., Skow, R. J., Riske, L., Nuspl, M., Nagpal, T. S., Courbalay, A., Slater, L. G., Adamo, K. B., Davies, G. A., Barakat, R., & Ruchat, S.-M. (2019). Exercise for the prevention and treatment of low back, pelvic girdle and lumbopelvic pain during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 53(2), 90 LP – 98. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-099400>
- de Sousa, V. P. S., Cury, A., Eufrásio, L. S., de Sousa, S. E. S., Coe, C. B., & de Souza Ramalho Viana, E. (2019). The influence of gestational trimester, physical activity practice and weight gain on the low back and pelvic pain intensity in low risk pregnant women. *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation*, 32(5), 671–676. <https://doi.org/10.3233/BMR-171006>
- Dipietro, L., Evenson, K. R., Bloodgood, B., Sprow, K., Troiano, R. P., Piercy, K. L., Vaux-Bjerke, A., & Powell, K. E. (2019). Benefits of Physical Activity during Pregnancy and Postpartum: An Umbrella Review. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 51(6), 1292–1302. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001941>
- Duclos, M. (2021). The health benefits of physical activity. *Revue de l'Infirmiere*, 70(275), 16–19. <https://doi.org/10.1016/j.revinf.2021.08.006>
- Dumilah, R. (2019). Umur, Interval Kehamilan, Kehamilan yang Diinginkan dan Perilaku Pemeriksaan Kehamilan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10(2), 73–79.
- Fatima, M. M. (2018). *Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Nyeri Punggung Bawah Akut Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2018*.
- Ferreira, M. L., De Luca, K., Haile, L. M., Steinmetz, J. D., Culbreth, G. T., Cross,

- M., Kopec, J. A., Ferreira, P. H., Blyth, F. M., Buchbinder, R., Hartvigsen, J., Wu, A. M., Safiri, S., Woolf, A. D., Collins, G. S., Ong, K. L., Vollset, S. E., Smith, A. E., Cruz, J. A., ... March, L. M. (2023). Global, regional, and national burden of low back pain, 1990–2020, its attributable risk factors, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet Rheumatology*, 5(6), e316–e329. [https://doi.org/10.1016/S2665-9913\(23\)00098-X](https://doi.org/10.1016/S2665-9913(23)00098-X)
- Galmés-Panadés, A. M., & Vidal-Conti, J. (2022). Association between Physical Fitness and Low Back Pain: The Pepe Cross-Sectional Study. *Children*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/children9091350>
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., Istiqomah, R., Sukmana, D., Fardani, R., Auliya, N., & Utami, E. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Hartvigsen, J., Hancock, M. J., Kongsted, A., Louw, Q., Ferreira, M. L., Genevay, S., Hoy, D., Karppinen, J., Pransky, G., Sieper, J., Smeets, R. J., Underwood, M., Buchbinder, R., Cherkin, D., Foster, N. E., Maher, C. G., van Tulder, M., Anema, J. R., Chou, R., ... Woolf, A. (2018). What low back pain is and why we need to pay attention. In *The Lancet* (Vol. 391, Issue 10137, pp. 2356–2367). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30480-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30480-X)
- Heneweer, H., Vanhees, L., & Picavet, H. S. J. (2009). Physical activity and low back pain: A U-shaped relation? *Pain*, 143(1–2), 21–25. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2008.12.033>
- Henny Syapitri, Amila, & Aritonang, J. (2021). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN KESEHATAN*. Ahlimedia Press.
- Heryana, A. (2020). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Penerbit Erlangga, Jakarta, June*, 1–11. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31268.91529>
- Kandru, M., Zallipalli, S. N., Dendukuri, N. K., Linga, S., Jeewa, L., Jeewa, A., & Sunar, S. B. (2023). Effects of Conventional Exercises on Lower Back Pain and/or Pelvic Girdle Pain in Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Cureus*, 15(7). <https://doi.org/10.7759/cureus.42010>
- Katonis, P., Kampouroglou, A., Aggelopoulos, A., Kakavelakis, K., Lykoudis, S., Makrigiannakis, A., & Alpantaki, K. (2011). Pregnancy-related low back pain. *Hippokratia*, 15(3), 205–210.
- Kawabe, R., Yamashiro, C., Morino, S., Ishihara, M., Chen, C. Y., Koshi, M., Kato, N., Hatanaka, H., Umezaki, F., Yamashita, M., Aoyama, T., & Nagai-Tanima, M. (2022). Relationship between Physical Activity and Lumbopelvic Pain during Pregnancy: A Cross-Sectional Study. *CEOG*, 49(9), 209–null.
- Kemendes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kemendagri Kesehatan RI*, 53(9), 1689–1699.
- Kemendes RI. (2023). *Nyeri Punggung Bawah: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2436/nyeri-punggung-bawah-gejala-penyebab-dan-cara-mengatasinya
- Kim, J., & Ayabe, A. (2023). *Obesity in Pregnancy*.
- Kusumo, M. P. (2020). Buku Pemantauan Aktivitas Fisik. In *Yogyakarta: The*

Journal Publishing (Issue April).

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35896/Buku
u pemantauan aktivitas fisik.pdf?sequence=1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35896/Buku%20pantauan%20aktivitas%20fisik.pdf?sequence=1)

- Lestari, D., Widyastuti, D. E., & Apriani, A. (2023). *HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK TERHADAP KETIDAKNYAMANAN NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL DI KLINIK MERYCORP SERANG BANTEN*.
- Manyozo, S. D., Nesto, T., & Muula, A. S. (2019). *Low back pain during pregnancy : Prevalence , risk factors and association with daily activities among pregnant women in urban Blantyre , Malawi*. 31(March), 71–76.
- Marín-Jiménez, N., Acosta-Manzano, P., Borges-Cosic, M., Baena-García, L., Coll-Risco, I., Romero-Gallardo, L., & Aparicio, V. A. (2019). Association of self-reported physical fitness with pain during pregnancy: The GESTAFIT Project. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 29(7), 1022–1030. <https://doi.org/10.1111/sms.13426>
- Marlisa Rahmadayanti, A., Wulandari, R., Abdurahman Palembang, S., & Palembang, P. (2022). Pengaruh Pemberian Accupressure Terhadap Rasa Nyeri Punggung Bawah Pada Ibu Hamil Trimester Iii the Effect of Giving Accupressure on Low Back Pain in Trimester Iii Pregnant Women. *Cendekia Medika : Jurnal STIKES Al-Ma'arif Baturaja*, 7(2), 133–140. <https://books.google.co.id/dengan>
- Meredith L. Birsner, C. G.-B. (2020). Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. *Obstetrics & Gynecology*, 135(4), e178–e188. <https://doi.org/10.1097/AOG.00000000000003772>
- Paul, C. S., Abadinta Barus, J. F., Budiayanti, E., & Suryakusuma, L. (2021). Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Nyeri Punggung Bawah Saat Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa fakultas Kedokteran. *Majalah Kedokteran Neurosains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia*, 39(1), 24–27. <https://doi.org/10.52386/neurona.v39i1.315>
- Pradita, A. (2022). Korelasi Fleksibilitas Otot Lumbal Dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Correlation Of Lumbal Muscle Flexibility With Low Back Pain. *Kieraha Medical Journal*, 4(2), 95–100. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kmj>
- Prawirohardjo, S. (2008). Ilmu Kebidanan Sarwono. In *P.T. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo*.
- Purborini, S. F. A., & Rumaropen, N. S. (2023). Hubungan Usia, Paritas, dan Tingkat Pendidikan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Pasangan Usia Subur di Surabaya. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 207–211. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.207-211>
- Rahmadhani, R., Andi Kurnia Bintang, Andi Weri Sompia, & Rina Masadah. (2023). Kombinasi Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation pada Dorsolateral Prefrontal Cortex kiri dengan Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation Menurunkan Skala Nyeri pada Pasien Nyeri Punggung Bawah Kronik. *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 7(2), 58–66. <https://doi.org/10.24252/alami.v7i2.38868>
- Riyani, M. M. (2023). *Hubungan Aktivitas Fisik dengan Nyeri Punggung Bagian Bawah pada Ibu Hamil Trimester III = Relationship Between Physical*

Activity and Low Back Pain in Third Trimester Pregnant Women.

- Sabino, J., & Grauer, J. N. (2008). Pregnancy and low back pain. *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*, 1(2), 137–141.
<https://doi.org/10.1007/s12178-008-9021-8>
- Selkirk, S. M., & Ruff, R. (2016). Low back pain, radiculopathy. In *Handbook of Clinical Neurology* (1st ed., Vol. 136). Elsevier B.V.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53486-6.00053-3>
- Shihab, M. Q. (2002). *TAFSIR AL-MISBAH, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.*
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian.*
- Urits, I., Burshtein, A., Sharma, M., Testa, L., Gold, P. A., Orhurhu, V., Viswanath, O., Jones, M. R., Sidransky, M. A., Spektor, B., & Kaye, A. D. (2019). Low Back Pain, a Comprehensive Review: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. In *Current Pain and Headache Reports* (Vol. 23, Issue 3). <https://doi.org/10.1007/s11916-019-0757-1>
- Van Benten, E., Pool, J., Mens, J., & Pool-Goudzwaard, A. (2014). Recommendations for physical therapists on the treatment of lumbopelvic pain during pregnancy: A systematic review. *Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy*, 44(7), 464–473.
<https://doi.org/10.2519/jospt.2014.5098>
- Vlaeyen, J. W. S., Maher, C. G., Wiech, K., Van Zundert, J., Meloto, C. B., Diatchenko, L., Battié, M. C., Goossens, M., Koes, B., & Linton, S. J. (2018). Low back pain. *Nature Reviews Disease Primers*, 4(1), 1–18.
<https://doi.org/10.1038/s41572-018-0052-1>
- WHO. (2022). *Physical activity.* <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- WHO. (2023). *Low Back Pain.* <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/low-back-pain>
- Wicaksono, A. (2021). *Buku Aktivitas Fisik dan Kesehatan* (Issue July).
<https://www.researchgate.net/publication/353605384>
- Yu, Y., Wang, Y., Jiang, X., Shi, L., Wang, X., & Wang, Y. (2021). *Research Relating to Low Back Pain and Physical Activity Reported Over the Period of 2000 – 2020. March.*
- Zhou, L., Feng, X., Zheng, R., Wang, Y., Sun, M., & Liu, Y. (2023). The correlation between pregnancy-related low back pain and physical fitness evaluated by an index system of maternal physical fitness test. *PloS One*, 18(12), e0294781. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294781>
- Zulfa, I. M., & Handayani, W. (2022). Keamanan Obat Untuk Ibu Hamil Dan Menyusui. *Jurnal Abdi Masyarakat Kita*, 2(1), 13–25.
<https://doi.org/10.33759/asta.v2i1.205>

Lampiran 1**LEMBAR PERSETUJUAN INFORMED CONSENT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul:

“Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah Pada Ibu Hamil Trimester III”

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Makassar, 2024

Mengetahui,
Penanggung Jawab
Penelitian

Yang Menyatakan,
Responden Penelitian

()

()

Lampiran 2

Kuesioner Penelitian Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah Pada Ibu Hamil Trimester III

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah setiap pertanyaan dan alternatif jawaban dengan seksama
2. Beri tanda ceklis (√) pada jawaban yang ibu/ sdr/i anggap sesuai dengan yang dirasakan
3. Semua pertanyaan harap dijawab, jangan dikosongkan
4. Kuesioner yang telah diisi lengkap tolong dikembalikan pada penulis atau peneliti
5. Terimakasih dan selamat mengisi

KETERANGAN

SL : Selalu

SR : Sering

JR : Jarang

TP : Tidak Pernah

No	Pertanyaan	SL	SR	JR	TP
1	Saya merasakan panas pada daerah punggung bagian bawah				
2	Saya merasakan kaku di punggung bagian bawah				

3	Saya merasakan nyeri tertusuk-tusuk di bagian punggung bawah				
4	Saya merasakan nyeri punggung bawah sebelum melakukan aktifitas pekerjaan				
5	Saya merasakan nyeri pada bagian punggungbawah secara terus menerus saat melakukan pekerjaan				
6	Saya merasakan nyeri pada bagian punggung bawah setelah melakukan aktifitas pekerjaan				
7	Saya merasakan nyeri pada bagian punggung bawah hanya pada saat melakukan pekerjaan				
8	Saya merasakan nyeri punggung bawah pada saat beristirahat				
9	Saya merasa kesulitan pada saat membungkukan				

	badan				
10	Saya tidak bisa berjalan karena nyeri punggung bawah				
11	Saya merasa sulit untuk memutar badan saya ke kiri dan ke kanan				
12	Saya merasa kesemutan pada daerah punggung bawah				
13	Saya tidak merasakan nyeri dari bagian punggung sampai tungkai kaki				
14	Nyeri punggung yang saya rasakan sembuh dengan sendirinya sesaat				
15	Nyeri punggung yang saya rasakan sembuh pada saat beristirahat				
16	Nyeri punggung saya rasakan saat duduk				
17	Saya merasakan baal (mati rasa) dari punggung				

	bawah sampai tungkai kaki				
18	Adanya trauma akibat kecelakaan/bawaan lahir yang mengakibatkan nyeri di daerah punggung bawah				
19	Saya memeriksakan diri/melaporkan rasa sakit ke puskesmas/klinik				
20	Saya pernah melakukan pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit yang saya derita				

KUESIONER AKTIVITAS FISIK

Kuesioner Short-International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-SF)

1. Dalam waktu **7 hari terakhir**, berapa hari anda telah melakukan aktivitas fisik berat, contohnya mengangkat barang berat, berlari, atau bersepeda cepat? _
 hari seminggu
 Tidak ada aktivitas fisik berat → **Lanjut ke nomor 3**
2. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk **melakukan aktivitas fisik berat** pada salah satu hari tersebut?
 ___ jam ___ menit sehari
 Tidak tahu / Tidak pasti
3. Dalam waktu **7 hari terakhir**, berapa hari anda telah **melakukan aktivitas fisik sedang**, contohnya mengangkat barang ringan, menyapu, bersepeda, santai? Ini tidak termasuk jalan kaki.
 ___ hari seminggu
 Tidak ada aktivitas fisik sederhana → **Lanjut ke nomor 5**
4. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk melakukan **aktivitas fisik sedang** pada salah satu hari tersebut?
 ___ jam ___ menit sehari
 Tidak tahu / Tidak pasti
5. Dalam waktu **7 hari terakhir**, berapa hari anda telah **berjalan kaki selama** minimal 10 menit. ___ hari seminggu
 Tidak berjalan kaki → **Lanjut ke nomor 7**
6. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk **berjalan kaki** pada salah satu hari tersebut?

___ jam ___ menit sehari

Tidak tahu / Tidak pasti

7. Dalam waktu **7 hari terakhir**, berapa lama waktu yang anda gunakan untuk **duduk pada saat hari kerja**?

___ jam ___ menit sehari

Tidak tahu / Tidak pasti



Lampiran 3

Output SPSS

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	usia <25	26	34.2	34.2	34.2
	usia 25-35	44	57.9	57.9	92.1
	usia > 35	6	7.9	7.9	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	63	82.9	82.9	82.9
	wiraswasta	9	11.8	11.8	94.7
	honorer	1	1.3	1.3	96.1
	bidan	1	1.3	1.3	97.4
	guru	2	2.6	2.6	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 Intensitas * NyeriPunggungBawah Crosstabulation
 MAKASSAR
 NyeriPunggungBawah

			keluhan ringan	keluhan sedang	Keluhan Berat	Total
Intensitas	rendah	Count	7	13	4	24
		% within Intensitas	29,2%	54,2%	16,7%	100,0%
	sedang	Count	33	12	3	48
		% within Intensitas	68,8%	25,0%	6,3%	100,0%
	tinggi	Count	3	1	0	4
		% within Intensitas	75,0%	25,0%	0,0%	100,0%
Total		Count	43	26	7	76
		% within Intensitas	56,6%	34,2%	9,2%	100,0%

Intensitas aktivitas fisik * nyeri punggung bawah Crosstabulation

				nyeri punggung bawah		Total
				keluhan ringan	keluhan berat	
Intensitas aktivitas fisik	rendah	Count	7	17	24	
		Expected Count	13,6	10,4	24,0	
	tinggi	Count	36	16	52	
		Expected Count	29,4	22,6	52,0	
Total		Count	43	33	76	
		Expected Count	43,0	33,0	76,0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,729 ^a	1	,001		
Continuity Correction ^b	9,160	1	,002		
Likelihood Ratio	10,871	1	<,001		
Fisher's Exact Test				,001	,001
Linear-by-Linear Association	10,588	1	,001		
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,42.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 4

Etik Penelitian



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
J.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210066564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
"ETHICAL EXPEDITED"

No.E.063/KEPK/FKIK/VIII/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Muhammad Amin Ahmady
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"HUBUNGAN INTENSITAS AKTIVITAS FISIK DENGAN KEJADIAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER III"
"THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTEREST OF PHYSICAL ACTIVITY AND THE EVENT LOW BACK PAIN IN PREGNANT WOMEN IN THE THIRD TRIAL"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2061, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2066. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2061 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2066 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025.

This declaration of ethics applies during the period August 7, 2024 until August 7, 2025.


 August 7, 2024
 and Chairperson,
 Dr. Istryany Ismail, S.Si., M.Si.

Lampiran 5

Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **2884/R.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5893/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD AMIN AHMADY**
Nomor Pokok : 70600120033
Program Studi : Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" HUBUNGAN INTENSITAS AKTIVITAS FISIK DENGAN KEJADIAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER III "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Februari s/d 31 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/I312/SKP/SB/DPMPSTP/2/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2884/R.01/PTSP/2024, Tanggal 06 Februari 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 1310/SKP/SB/BKBP/2/2024

Dengan Ini Menegaskan Bahwa :

Nama	:	MUHAMMAD AMIN AHMADY
NIM / Jurusan	:	70600120033 / Pendidikan Dokter
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin Makassar
Alamat	:	Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,-
Waktu Penelitian	:	06 Februari 2024 - 31 Maret 2024
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	" HUBUNGAN INTENSITAS AKTIVITAS FISIK DENGAN KEJADIAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER III "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-02-15 11:22:02


Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**
HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-


Lampiran 6

Surat Keterangan Selesai Meneliti



DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS SUDIANG

Jl. Goa Ria KM 18 Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241
Telp. 0411-4832266, email: puskesmassudiang9@gmail.com



SURAT KETERANGAN
No : 440/PKM-SDG/ 91 /I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama	: dr. Azmira R. Baharuddin
NIP	: 19810702 201001 2 021
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan	: Kepala Puskesmas Sudiang Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: Muhammad Amin Ahmady
NIM	: 70600120033
Universitas	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 06 Februari 2024 – 31 Maret 2024 di Puskesmas Sudiang dengan judul " HUBUNGAN INTENSITAS AKTIVITAS FISIK DENGAN KEJADIAN NYERI PUNGGUNG BAWA PADA IBU HAMIL TRISEMESTER III".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Makassar, 18 Mei 2024
Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Sudiang



dr. Azmira R. Baharuddin
NIP 19810702 201001 2 021

Lampiran 7
Dokumentasi

