

**PROFIL FITOKIMIA DAN GC-MS (GAS CHROMATOGRAPHY - MASS SPECTROMETRY) EKSTRAK ETANOL KASUMBA TURATE
(*Carthamus tinctorius L.*)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi (S.Farm.) Program Studi Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

AZIH SYAKUR INDRIANI UMAT

NIM. 70100115091

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azih Syakur Indriani Umat

NIM : 70100115091

Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 19 Maret 1997

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Cakura, Kec.Pol-Sel, Kab. Takalar

Judul : Profil Fitokimia dan *GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)* Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius L.*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa dia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 25 Januari 2023

Penulis

Azih Syakur Indriani Umat

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Profil Fitokimia dan GC-MS (GAS CHROMATOGRAPHY – MASS SPECTROMETY) Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.)" yang disusun oleh Azih Syakur Indriani Umat, NIM 70100115091; Mahasiswa Jurusan farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari/ tanggal, Rabu, 25 Januari 2023 M yang bertepatan dengan 03 Rajab 1444 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 25 Januari 2023

03 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: apt. Mukhriani, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc.	(.....)
Penguji I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Fam., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Hildawati Almah, S.Ag.,S.S., M.A	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Profil Fitokimia dan GC-MS (*Gas Chromatography-Mass Spectrometry*) Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, para sahabat dan pengikutnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Aamiin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan, hambatan dan juga rintangan yang terus menerus menghampiri, namun penulis meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Penulis juga meyakini bahwa dibalik semua itu Allah SWT telah merencanakan sesuatu yang lebih baik bagi hamba-Nya. Proses penyelesaian skripsi ini juga tak lepas dari do'a, dukungan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya dari orang-orang baik di sekitar penulis.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada orang yang sangat berharga dalam hidup peneliti yakni kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Muh. Ramli Dg. Nawang dan Ibu St. sahawiyah, tante yang telah merawat penulis S. dg. Ngami. Kakek dan nenek H. Dini Dg. Ngani dan Hj. J. Dg. Intang yang sudah di surga. Suami tercinta Aditiya Hidayatullah S.Ikom, yang tak henti-hentinya selalu mengirimkan do'a, memberikan dukungan dan dorongan, serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ucapkan terimakasih banyak kepada mertua Hj. Dumbrah S.Pd dan H. Usman Mahmud serta Penulis juga berterima kasih kepada saudara terkasih Arzy syahidu

winarni umat, Aulia Sri Wahyuni Umat, Al- Mugni Alisya Umat , yang selama ini selalu mendukung dan menjadi salah satu penyemangat penulis agar tidak menyerah dalam menempuh pendidikan., serta keluarga besar penulis yang mungkin tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para Wakil Dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc., selaku Pembimbing Kedua yang dengan senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya memberikan masukan, mengoreksi dan mengarahkan peneliti dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku Penguji kompetensi yang telah memberikan banyak kritikan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu hildawati Almah. S.S.,M.A. selaku Penguji agama yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya serta seluruh Staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti.
9. Kepada Laboran Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Laboratorium Kima Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang dengan senantiasa memberikan arahan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian.
10. Kepada teman-teman seperjuangan “ Pulvis ” terutama Nur Wahida, Hafifah Nurfaidah, Nuramadani, Aulia Ananda Ihwan dan adik-adik “kovalen” yang selalu memberikan do’a, bantuan dan support hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan dengan tulus.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan. Namun, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus dalam bidang farmasi dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Gowa, 25 Januari 2023

Penulis


Azih Syakur Indriani Umat

NIM. 70100115091

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup	3
D. Kajian Pustaka	3
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Teori Umum	6
B. Pengantar Fitokimia	9
C. Golongan Metabolit Sekunder	18
D. Kromatografi Gas-Spektrometer Massa (GC-MS)	22
E. Tinjauan Islam Mengenai Tanaman Obat	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34

C. Instrumen Penelitian	34
E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	49
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis gas pembawa.....	24
Tabel 2. Jenis fase diam dan penggunaannya.....	25
Tabel 3. Hasil ekstraksi kasumba turate (<i>Carthamus tinctorius</i> L.).....	38
Tabel 4. Hasil skrining fitokimia.....	38
Tabel 5. Hasil analisis senyawa pada ekstrak kasumba turate (<i>Carthamus tinctorius</i> L.).....	39



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Tanaman kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*).....7
- Gambar 2. Hasil Kromatogram GC-MS dari ekstrak kasumba turate.....35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan alur penelitian.....	49
Lampiran 2. Skema kerja penyiapan sampel.....	50
Lampiran 3. Skema kerja identifikasi golongan senyawa.....	51
Lampiran 4. Skema kerja identifikasi senyawa aktif ekstrak.....	57
Lampiran 5. Hasil <i>Gas chromatography-mass spectrometry</i> (GC-MS).....	58
Lampiran 6. Gambar pengamatan.....	78
Lampiran 7. Hasil turnitin.....	81



ABSTRAK

Nama : Azih Syakur Indriani Umat
NIM : 70100115091
Judul : Profil Fitokimia Dan *Gc-Ms (Gas Chromatography - Mass Spectrometry)* Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.)

Tanaman kasumba turate yang disebut sebagai ralle oleh masyarakat Sulawesi Selatan, ditemukan diladang kering setelah panen padi atau jagung, bunganya dikumpulkan pada pagi hari dan dikeringkan ditempat yang teduh, kasumba turate biasanya dimanfaatkan sebagai pewarna dan untuk pengobatan, seperti penyumbatan pembuluh darah diotak, sterilitas pada laki-laki, rematik dan bronkhitis serta sebagai teh tonik untuk memperkuat sirkulasi darah dan hati. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa, golongan senyawa, dan deskripsi senyawa volatil dari ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L) dengan menggunakan GC-MS (*gas chromatography-mass spectrometry*).

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah ekstrak kasumba turate mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, fenol dan tannin. Terdapat 39 kemungkinan komponen senyawa pada ekstrak kasumba turate yang teridentifikasi dengan GC-MS. senyawa dengan persentase terbanyak yaitu cis- vaccenic acid (11.89 %), trans-13-octadecenoid acid (6.13%), dan n-hexadecanoid acid (5,48%).

Kata kunci : Kasumba turate (*Chartamus cinctorius* L.), cis-vaccenic acid, alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, fenol, tanin, GC-MS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Azih Syakur Indriani Umat
NIM : 70100115091
Title : Phytochemical Profile and *Gc-Ms* (*Gas Chromatography - Mass Spectrometry*) Ethanol Extract of Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.)

In south Sulawesi, the kasumba turate plant, which is often called ralle, grows in dry areas where rice or corn is harvested. In the morning, the flowers are collected, then dried in the shade. Kasumba turate is often used as a therapy and dye. For example, clogged arteries in the brain, male infertility, rheumatism, and bronchitis, as well as tonic teas to support the blood flow and liver. The aim of the study was to use GC-MS to identify the volatile chemicals present in the ethanol extract of kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.), their composition, class, and description using gas chromatography-mass spectrometry.

The results obtained in this study were kasumba turate extract containing a class of alkaloid compounds, flavonoids, saponins, terpenoids, phenols, and tannins. There are 39 possible compound components in kasumba turate extract which were identified by GC-MS. The compound with the highest percentage is *cis*-vaccenic acid (11.89%), *trans*-13-octadecenoic acid (6.13%), and *n*-hexadecanoic acid (5.48%).

Key word: Kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.), *cis*-vaccenic acid, alkaloids, flavonoids, saponins, terpenoids, phenols, tannin, GC-MS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanaman merupakan suatu kumpulan beberapa jenis bahan yang memiliki efek atau khasiat obat. Kegunaan sebagai bahan obat merupakan peninggalan nenek moyang kita yang sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sudah terbukti dapat digunakan cukup lama dan hampir di seluruh belahan dunia (Dima et al., 2016).

Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan berbagai macam tanaman sebagai bahan obat tradisional memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan (Slikkerveer, 2017). Sebagian masyarakat khususnya masyarakat Indonesia telah mengenal dan menggunakan tanaman sebagai salah satu pengobatan untuk berbagai penyakit atau sebagai bahan kosmetik

Salah satu jenis tanaman yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional adalah kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) atau disebut juga dengan nama *Safflower*. (Juwita et al.,2021).

Tanaman kasumba turate yang disebut sebagai ralle oleh masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan diladang kering setelah panen padi atau jagung, bunganya dikumpulkan pada pag hari dan dikeringkan ditempat yang teduh, kasumba turate basanya dimanfaatkan sebagai pewarna dan untuk pengobatan. (Juwita et al.,2021).

Bunga kasumba turate atau *safflower* dikenal sebagai bahan tambahan kosmetik dan belum digunakan secara luas dalam pengobatan. Di Cina, bunganya digunakan untuk pengobatan pada penyakit seperti penyumbatan pembuluh darah diotak, sterilitas pada laki-laki, rematik dan bronkhitis, dan sebagai teh tonik untuk memperkuat sirkulasi darah dan hati. Pengobatan dengan *safflower* juga

menunjukkan efek yang bermanfaat pada sakit dan pembengkakan karena trauma. Kasumba turate juga biasanya digunakan oleh masyarakat di daerah Sulawesi Selatan sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit campak (morbili) (Van der Vosen, H.A.M., Umali, B.E., 2001).

Salah satu tanaman sering digunakan dalam pengobatan adalah kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.). secara empiris, kasumba turate banyak digunakan oleh masyarakat sebagai obat kolestrol, angina pectoris (nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung), hipertensi, kanker, nyeri datang bulan dan sakit perut setelah melahirkan (Wijayakusuma, 2008). Selain itu kasumba turate juga digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis dan bronchitis kronis. Sementara dalam tradisi Bugis Makassar, kasumba turate digunakan sebagai obat herbal atau obat tradisional untuk mengatasi penyakit cacar air atau sarampa dan telah menjadi obat herbal andalan bagi orang Sulawesi untuk mengatasi penyakit tersebut.

Manfaat bunga kasumba turate diatas telah menggambarkan bahwa tanaman kasumba turate mengandung banyak senyawa kimia yang berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian kandungan kimia tumbuhan obat khususnya senyawa kimia yang terkandung di dalam tanaman kasumba turate dengan menggunakan GC-MS (*Gas Chromatography-Mass spectrometry*)

Metode GC-MS memiliki keunggulan diantaranya tidak membutuhkan standar sampel untuk dianalisis, lebih sensitif, jika ada noise dalam analisis tidak akan menyulitkan dalam membaca hasil analisis (sumarno, 1995), maka dari itu peneliti menggunakan GCMS untuk menganalisis senyawa kimia yang terkandung pada tanaman kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.)

B. Rumusan Masalah

1. Apa kandungan senyawa yang terdapat pada ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) ?
2. Apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.)

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

- a. Uji senyawa GCMS adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda pada sampel.
- b. Kasumba turate adalah tanaman memiliki banyak manfaat.
- c. Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga kasumba turate yang dianalisis menggunakan GCMS. Identifikasi senyawa kimia dari sampel meliputi uji golongan alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, steroid, terpenoid.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Rini Hamsidi et al.,2018) dalam jurnal Profil fitokimia Ekstrak etanol Bunga kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) yang berpotensi sebagai antimalaria. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi yaitu etanol dan metode yang digunakan yaitu metode maserasi. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung didalam ekstrak etanol kasumba turate. Kemudian dilakukan uji fitokimia untuk mendeteksi adanya senyawa aktif

alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, antarkuinin. Pada uji skrining fitokimia didapatkan hasil ekstrak kasumba turate megandung saponin, flavonoid

Pada penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penelitian diatas yaitu menggunakan metode ekstraksi yang sama yaitu metode maserasi dan menggunakan sampel yang sama.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Juwita et al. 2021) dalam jurnal Efektivitas Antioksidan dari Ekstrak Bunga Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.) dan Potensinya Sebagai Antihiperkolesterolemia. Tujuan penelitian yaitu menganalisis kandungan metabolit sekunder dan efektivitas antioksidan dari ekstrak etanol bunga kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.), serta potensinya sebagai antihiperkolesteromia. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi kasumba turate yaitu etanol 70%. Pada uji skrining fitokimia kasumba turate mengandung alkaloid, fenolik, flavonoid, saponin, tannin, dan triterpenoid. Ekstrak bunga kasumba turate memiliki efektivitas antioksidan yang kuat.

Pada penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penelitian diatas yaitu menggunakan pelarut etanol yang sama yaitu etanol 70%.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Mahmiah et.al 2017) dalam jurnal Skrining fitokimia dan analisis GC-MS hasil fraksi heksana kulit batang *Rhizophora mucronata* L. tujuan penelitian untuk mengetahui senyawa yang terdapat pada fraksi heksana ekstrak metanol kulit batang *Rhizophora mucronate* L. maka diuji melalui skrining fitokimia dan analisis Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa. Hasil skrining fitokimia meunjukkan kandungan golongan senyawa yaitu trpenoid. Hasil analisis GC-MS menunjukkan fraksi heksana kulit batang *R.mucronata*

mengandung 11 senyawa golongan asam lemak , terpenoid, alkaloid, dan aromatis.

Pada penelitian yang akan dilakukan terkait penelitian diatas yaitu menggunakan metode yang sama yaitu metode GC-MS

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kandungan senyawa ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) dengan menggunakan GC-MS (*gas chromatography-mass spectrometry*)
- b. Mengetahui golongan senyawa ekstrak kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.)

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menambah pemahaman ilmu pengetahuan tentang senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) yang nantinya dapat memberikan manfaat terhadap pembuatan obat baru.

- b. Secara aplikatif

Secara aplikatif hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam usaha untuk mendapatkan sumber obat baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai wujud pemanfaatan dari sumber daya alam.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Umum

1. Kasumba Turate

Kasumba turate (*Carthamus tinctorius* Linn) merupakan salah satu jenis tanaman endemik Sulawesi selatan khususnya di Kabupaten Bone. (Diana et al., 2019).

a. Daerah tumbuh

Safflower adalah tanaman suhu hangat, yang dibudidayakan pada Sebagian besar daerah yang tropis seperti Asia, Afrika, Rusia dan cina (Machewad, 2012). *Safflower* pada dasarnya merupakan tanaman daerah subtropis yang gersang, akan tetapi telah diperluas seleksi dan pembudidayaan. Didistribusikan antara garis lintang 20°S dan 40°U dan baru saja bahkan budidayanya telah menyebar ke Kanada. Pada daerah tropis banyak tumbuh di ketinggian 1600-2200 m, tetapi skala besar produksi komersial terkonsentrasi di daerah-daerah yang gersang dibawah 1000 m. Biji dan minyak menghasilkan konten jatuh lebih banyak dengan bertambahnya ketinggian. Bibit dapat mentolerir suhu -7°C, beberapa kultivar bahkan hingga suhu -12°C. Mereka menjadi lebih rentan terhadap embun beku kerusakan setelah tahap pembentukan daun. Suhu rata-rata 17-20°C muncul menjadi yang terbaik untuk pertumbuhan vegetatif, sedangkan suhu optimum untuk berbunga adalah 24-32°C. Kelembaban tanah yang memadai mengurangi dampak yang merugikan pada suhu yang lebih tinggi (Vosen, 2001: 53).

b. Nama daerah

Kasumba turate (Makassar), kasumba ugi (Bugis), ralle (Bone), kaise' (Enrekang), kesumba (Melayu), kembang pulu (Jawa), kesombah (Madura). Nama asing *safflower* (Inggris), hong tua (Tionghoa) (Wijayakusuma, 2008: 45).

2. Klasifikasi Tanaman (Sulastri, 2006)



Gambar 1. Tanaman kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Asterales
Famil	: Asteraceae
Genus	: Carthamus
Spesies	: <i>Chartamus tinctorius</i> L.

3. Morfologi

Tegak lurus bercabang banyak, tanaman menahun, tingginya 30-180 cm. sistem akar terbentuk dengan baik, berwarna coklat kehijauan, akar tebal dan gemuk, menusuk sampai 3 meter kedalam tanah, cabang sampingnya tipis mendatar, Sebagian besar terdapat diatas 30 cm. Tangkai berbentuk silinder, padat dengan intisari lunak, berkayu didekat pangkal. Daun tersusun secara spiral dengan ukuran 4-20cm x 1-5 cm. Tepi daun berduri-bergerigi, berwarna hijau gelap mengkilap dan berbentuk herba Ketika masih muda, berubah menjadi keras dan kaku setelah tua. Panjang sekitar 4 cm dan diameter 2,5- 4 cm, hanya mengandung bunga tunggal (*florest*). Memiliki banyak kelopak tersusun spiral.

Dasar bunganya rata sampai berbentuk kerucut, banyak, tegak, berbulu putih dengan Panjang 1-2 cm dan terdapat 20-80 bunga tunggal (*florest*) berkelamin ganda, tubular, aktinomorf, panjangnya sekitar 4 cm labrous, kebanyakan berwarna jingga kemerahan yang menjadi merah gelap saat mekar, kadang-kadang kuning, mahkotanya tersusun oleh 5 lobus, Panjang tubular 18-22 mm, lobus menyebar, benang sari 5 (Vosen, 2001: 51-52).

4. Kandungan Kimia

Safflower (kasumba turate) mengandung 2 kelompok besar pigmen yang larut dalam air, yaitu carthamidin kuning dan dye carthamin, yang orange-merah dan larut dalam larutan alkali. Bunganya mempunyai 0,3-0,6 % chartamin. Flavonoid, glikosida, sterol, dan derivate serotonin telah diidentifikasi dari bunga dan biji. *Safflower* atau kasumba turate memiliki kandungan kimia seperti carthamin, arthamone, neo-carthamin, nanocosane, zat warna kuning *safflower*, saflomin A, dipalmitin, adenosid, beta-sitosterol, polisakarida (Wijayakusuma, 2008: 45-46).

5. Kegunaan

Bunga kasumba turate atau *safflower* dikenal sebagai bahan tambahan kosmetik dan belum digunakan secara luas dalam pengobatan. Di Cina, bunganya digunakan untuk pengobatan penyakit seperti penyumbatan pembuluh darah pada otak, sterilisasi pada laki-laki, rematik dan bronchitis, dan sebagai teh tonik untuk memperkuat sirkulasi darah dan hati. Pengobatan dengan *safflower* juga menunjukkan efek yang bermanfaat pada sakit dan pembengkakan karena trauma. (Vosen, 2001: 52). Kegunaan kasumba turate dapat mengatasi kanker serviks (kanker rahim), esofagus, pankreas, dan leukimia. Selain itu, kasumba turate juga berkhasiat melancarkan haid, sakit pada saat menstruasi, sakit perut pasca melahirkan, kejang jantung, bengkak, anemia, dan neurodermatitis

(Wijayakusuma, 2008: 46). Kasumba turate biasanya digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai obat tradisional untuk mengobati campak (morbili) serta kerap kali digunakan jika terjadi alergi.

B. Pengantar Fitokimia

1. Simplisia

Bahan alami yang digunakan sebagai obat tetapi belum diolah kecuali dinyatakan lain yaitu berupa bahan yang telah dikeringkan merupakan simplisia. Simplisia dibagi menjadi tiga, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia pelikan (mineral). Simplisia yang merupakan tanaman utuh, bagian tanaman ataupun eksudat tanaman disebut simplisia nabati. Simplisia yang merupakan hewan utuh atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni disebut simplisia hewani, contohnya ikan dan madu. Simplisia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni disebut simplisia pelikan atau mineral, contohnya serbuk seng dan serbuk tembaga (Depkes RI, 1980).

2. Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Depkes RI, 2000).

Ekstraksi adalah proses pemisahan zat aktif dari senyawa padat atau cair dengan menggunakan pelarut tertentu. Prinsip proses ekstraksi adalah pelarut dipindahkan dari bulk

Ekstraksi adalah proses pemisahan zat aktif dari senyawa padat atau cair dengan menggunakan pelarut tertentu. Prinsip proses ekstraksi adalah pelarut dipindahkan melalui bulk ke permukaan, kemudian pelarut menembus

kedalamnya atau disebut proses difusi massa pelarut pada permukaan padatan inert kedalam pori padatan. Selanjutnya zat terlarut (solute) yang ada dalam padatan larut kedalam pelarut karena adanya perbedaan konsentrasi. Kemudian campuran zat terlarut dalam pelarut berdifusi keluar dari permukaan padatan inert. Selanjutnya zat terlarut (solute) keluar dari pori-pori padatan dan bercampur dengan pelarut yang berada di luar padatan (Prayudo et al., 2018).

Metode yang diterapkan untuk penelitian obat tradisional adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode yang digunakan berdasarkan sifat bahan dan senyawa yang terkandung didalamnya. Target Tindakan perlu dilakukan sebelum memilih metode. Beberapa Tindakan tersebut antara lain : 1. Senyawa yang merupakan senyawa bioaktif yang tidak diketahui sumbernya. 2. Senyawa yang diketahui bersumber pada suatu organisme tertentu. 3. Sekelompok senyawa di dalam suatu organisme yang memiliki hubungan secara struktural (Mukhriani,2014).

Proses pemisahan senyawa dari matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai disebut ekstraksi. Tahap awal hingga akhir dalam analisis fitokimia menggunakan proses ekstraksi, termasuk fraksinasi dan pemurnian. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam ekstraksi antara lain ekstraktan (yakni, pelarut yang digunakan untuk ekstraksi), rafinat (yakni, larutan senyawa atau bahan yang akan diekstraksi) dan linarut (yakni, senyawa atau zat yang diinginkan terlarut dalam rafinat). Metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada jenis, sifat fisik, dan sifat kimia kandungan senyawa yang akan diekstraksi (Hanani, 2015: 10).

Hasil dari proses ekstraksi dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai yang berupa sediaan pekat, kemudian semua pelarut atau hampir semua pelarut diuapkan dan serbuk yang tersisa diperlakukan

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 2014: 42).

Untuk memisahkan produk yang diinginkan dari bahan baku maka dilakukan ekstraksi. Ekstraksi dilakukan sesuai prinsip ekstraksi yaitu ekstraksi pelarut, metode distilasi, menekan dan sublimasi. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode ekstraksi. Metode ini terdiri dari beberapa tahap yaitu : (1) pelarut menembus ke dalam padatan matriks; (2) zat terlarut larut dalam pelarut; (3) zat terlarut tersebar keluar dari matriks padat; (4) yang diekstraksi zat terlarut dikumpulkan. Tahapan tersebut dapat meningkatkan difusivitas dan kelarutan dalam proses ekstraksi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi seperti sifat-sifat pelarut ekstraksi, partikel ukuran bahan baku, rasio pelarut-ke-padat, suhu ekstraksi, durasi ekstraksi dan pemilihan pelarut. Selektivitas, kelarutan, biaya dan keamanan seharusnya dipertimbangkan dalam pemilihan pelarut. Berdasarkan hukum Indonesia kesamaan dan *intermiscibility* (seperti larut seperti), pelarut dengan nilai polaritas dekat dengan polaritas zat terlarut cenderung berkinerja lebih baik dan sebaliknya. Alkohol (EtOH dan MeOH) adalah pelarut universal dalam pelarut ekstraksi untuk investigasi fitokimia (Zhang et.al., 2018: 1).

Etanol merupakan penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78 °C), mudah terbakar, serta larut dalam air dan semua pelarut organik. Bobot jenis etanol tidak lebih dari 0,7964. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif dibandingkan air. Selain itu, kapang dan mikroba sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Etanol juga memiliki beberapa keuntungan lain yaitu

tidak beracun, netral, absorbs baik, dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dapat memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas yang tinggi untuk pemekatan (Dirjen POM, 1995).

Etanol biasanya dicampur dengan pelarut lain sebagai cairan pengestraksi, terutama etanol dicampur dengan air. Etanol 96% adalah etanol yang paling baik untuk menghasilkan senyawa aktif yang optimal (Voight, 1995: 969).

3. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah menarik atau memisahkan senyawa dari campurannya atau simplisia. Ada berbagai cara ekstraksi yang telah diketahui, masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan metode dilakukan dengan memperhatikan antara lain sifat senyawa, pelarut yang digunakan, dan alat yang tersedia. Struktur untuk setiap senyawa, suhu dan tekanan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekstraksi. Alkohol merupakan salah satu pelarut yang paling banyak dipakai untuk menyari secara total. Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan antara lain maserasi, perkolasi, refluks, soxhletasi, infusa, dekok, destilasi (Hanani, 2015: 11).

Tujuan dari ekstraksi ini adalah untuk menarik serta memisahkan senyawa murni pada suatu tumbuhan yang memiliki kelarutan berbeda sesuai dengan komponen pelarut pada bahan alam dari yang dimiliki oleh hewan, tumbuhan atau biota laut dengan menggunakan pelarut berbahan organik (Departemen Kesehatan RI, 2000).

4. Mekanisme Ekstraksi

Ekstraksi terjadi berdasarkan adanya kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif.

Zat aktif tersebut akan larut karena terjadinya difusi karena adanya perbedaan konsentrasi antara di luar dan di dalam sel. Sehingga zat aktif ke luar sel. Proses ini terjadi secara terus menerus hingga diperoleh keseimbangan konsentrasi di luar dan di dalam sel (Harborne, 1987: 6).

5. Jenis-jenis Ekstraksi

Berikut ini adalah jenis-jenis metode ekstraksi, yaitu:

a. Maserasi

Maserasi adalah metode ekstraksi yang digunakan untuk mengekstraksi sampel atau komponen yang bersifat termolabil. Maserasi dilakukan dengan merendam sampel. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, kerugiannya adalah waktu ekstraksi yang lama dan efisiensi ekstraksi yang rendah (Zhang et al., 2018: 2).

Maserasi merupakan suatu proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan beberapa pelarut melalui pengocokan atau pengadukan berulang ulang pada suhu kamar (Departemen Kesehatan RI,2000). Namun metode ekstraksi menggunakan suhu kamar ini terdapat suatu kelemahan yaitu proses ekstraksinya yang kurang sempurna sehingga mengakibatkan hasil dari senyawa proses pelarutnya kurang sempurna. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan suhu tertentu untuk menentukan penilaian suhu yang optimal selama proses ekstraksi. Ekstraksi dengan menggunakan metode ini memiliki kelebihan yaitu menjamin zat aktif yang akan diekstraksi tidak akan mengalami kerusakan (Chairunnisa et al., 2019).

b. Perkolasi

Perkolasi merupakan suatu proses ekstraksi yang setiap pengujiannya menggunakan pelarutan terbaru untuk menghasilkan ekstrak yang sempurna, umumnya dilakukan pada suhu kamar (Departemen Kesehatan RI,2000). Metode

perkolasi ini merupakan jenis ekstraksi suhu dingin yang menggunakan suatu alat khusus yang disebut percolator. Kelebihan dari proses perkolasi adalah mampu mengekstrak ekstrak yang lebih sempurna dibandingkan dengan proses maserasi tetapi memiliki kekurangan yaitu membutuhkan bahan pelarut yang cukup banyak dan membutuhkan waktu yang lebih lama (Verawati qqt al., 2017).

Perkolasi merupakan sebuah proses ekstraksi dimana pelarut akan dialirkan melalui suatu kolom perkolator dan di isi dengan beberapa bahan serbuk atau sampel, kemudian ekstraknya akan dikeluarkan secara perlahan melalui saluran keran. Parameter penghentian penambahan bahan pelarut apabila perkolat tidak lagi mengandung komponen yang akan di ekstraksi. Caranya adalah dengan mengambil bahan tersebut kemudian dibasahi dengan jenis pelarut yang cocok dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah perkolator, diberi saringan berpori dibagian bawah wadah untuk menampung bedak. Pelarut cair akan dialirkan dari atas menuju ke bawah melalui suatu serbuk. Pelarut akan melarutkan sebuah zat aktif dalam sel yang dilaluinya hingga jenuh (Atun,2014).

Perkolasi lebih efisien daripada maserasi karena itu adalah proses kontinu dimana pelarut jenuh adalah terus-menerus digantikan oleh pelarut segar (Zhang et al., 2018: 14).

c. Dekokta

Dekok adalah ekstraksi yang memanfaatkan pelarut air pada temperature 90°C dalam kurung waktu 30 menit (Hasriani et at., 2016).

Proses ekstraksi dekoksi hampir mirip dengan ekstraksi infus, yang membedakan adalah waktu infus lebih Panjang (≥ 30 menit) dan temperatur pelarut yang sama dengan titik didih air. Caranya ambil sampel dan tambahkan air menggunakan perbandingan 1;10, lalu panaskan dalam wadah panci *stainless steel* atau panic enamel dengan waktu 30 menit. Aduk sesekali, dilakukan penyaringan

dalam keadaan panas menggunakan kain flanel kemudian dicukupkan dengan air panas melalui ampas untuk mendapatkan volume yang diinginkan (Atun, 2014).

Ekstrak dari rebusan mengandung sejumlah besar pengotor yang larut dalam air. Rebusan tidak dapat digunakan untuk ekstraksi komponen termolabil atau volatil (Zhang et al., 2018: 14).

d. Refluks

Refluks merupakan salah satu metode ekstraksi menggunakan pelarut pada suhu dan titik didih yang telah ditentukan. Durasi waktu yang telah ditetapkan serta menggunakan jumlah pelarut terbatas relative konstan karena adanya proses pendinginan balik. Proses pada residu biasanya dilakukan 3-5 kali pada residu pertama, sehingga dapat dianggap sebagai proses ekstraksi yang lengkap (Departemen Kesehatan RI, 2000).

Ekstraksi refluks lebih efisien daripada perkolasi atau maserasi dan membutuhkan lebih sedikit waktu ekstraksi dan pelarut. Ini tidak dapat digunakan untuk ekstraksi alami termolabil produk. Metode refluks ditemukan lebih baik daripada metode rebusan dan hasil tertinggi dari baicalin dan puerarin diperoleh dari metode refluks dengan 60% etanol sebagai pelarut ekstraksi (Zhang et al., 2018: 16).

Metode ekstraksi dengan menggunakan jumlah pelarut terbatas dan dalam waktu tertentu dengan temperatur titik didihnya yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 2000).

Dalam jurnal “*Rancang Bangun Menara Refluks Pada Destilator Bioethanol Kapasitas 5 Liter/Jam Berskala UMKM*”, dikutip dari M. Hasanah dalam “*Perbandingan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kersen (Muntingia calabura L.) Hasil Ekstraksi Maserasi Dan Refluks*” 2016, dalam

proses pelaksanaannya, metode ekstraksi dengan menggunakan sistem refluks ini sangatlah sederhana, sehingga mempercepat kerja yang dilakukan, suhu yang digunakan sesuai dengan pelarut yang digunakan dan sangat cocok digunakan untuk mengekstraksi sampel yang mempunyai tekstur keras dan komponen kimianya tahan terhadap pemanasan, serta dengan menggunakan metode ini maka proses ekstraksi dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Adanya pengaruh perlakuan panas pada refluks dapat meningkatkan kemampuan pelarut untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang tidak larut di dalam kondisi suhu kamar, sehingga aktivitas penarikan senyawa lebih maksimal atau memberikan peningkatan rendamen (Harborne, 1987).

Cara kerjanya adalah uap panas alkohol dan air yang naik akan menyentuh *reflux coil*. Karena *reflux coil* lebih dingin (akibat aliran air) daripada uap alkohol-air, maka uap akan terkondensasi atau menjadi cair lagi dan jatuh ke *packing*. Dalam perjalanan jatuhnya cairan tersebut di dalam kolom akan bertemu dengan uap panas dari bawah yang naik sehingga cairan menjadi panas kembali dan alkohol menguap dalam kandungan yang lebih kaya karena alkohol bertitik didih lebih rendah daripada air, sementara itu air akan terus turun sampai mendapatkan panas yang cukup untuk menguap lagi. Proses ini terjadi berulang-ulang di dalam kolom sampai akhirnya sebagian uap berhasil lolos menuju kondensator. Uap yang lolos ini sudah berkadar alkohol tinggi karena sudah beberapa kali mengalami proses naik-turun atau proses destilasi berulang kali di dalam kolom (Ihsan, 2017).

e. Soxhlet

Soxhlet merupakan proses ekstraksi menggunakan prinsip pemanasan serta penggunaan pelarut yang lebih efisien karena terdapat proses perputaran pelarut

yang setiap saat membasahi sampel. Senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas sangat cocok menggunakan metode Soxhlet (Hasrianti et al., 2016).

Metode ini menggunakan alat khusus serta menggunakan pelarut yang selalu baru dikarenakan terjadi proses ekstraksi terus menerus dan pelarut yang digunakan relative konsisten karena terjadi proses *back cooling* (Departemen Kesehatan RI, 2000). Soxhlet adalah salah satu metode ekstraksi panas yang tidak cocok untuk sampel tanaman yang mengandung campuran termolabil dan memerlukan alat khusus yaitu Soxhlet (Verawati et al, 2017).

Metode ekstraksi soxhlet mengintegrasikan keuntungan ekstraksi refluks dan perkolasi, yang memanfaatkan prinsip refuks dan menyedot untuk terus menerus ekstrak ramuan itu dengan pelarut segar. Ekstraksi soxhlet adalah metode ekstraksi kontinu otomatis dengan efisiensi ekstraksi tinggi yang membutuhkan lebih sedikit waktu dan pelarut konsumsi dari maserasi atau perkolasi. Suhu tinggi dan waktu ekstraksi yang lama di soxhlet ekstraksi akan meningkatkan kemungkinan termal degradasi (Zhang et al., 2018).

f. Digesti

Digesti adalah proses maserasi kinetik (pengadukan terus menerus) dengan suhu lebih tinggi dari suhu kamar, umumnya dikerjakan pada suhu 40°C-50°C (Departemen Kesehatan RI, 2000).

g. Infus

Infus merupakan metode ekstraksi menggunakan air sebagai pelarut dengan suhu *water bath* (bejana infus direndam dalam *water bath* mendidih, suhu terukur 90°C) selama 15-20 menit (Hasriani et al., 2016).

Infus adalah metode ekstraksi menggunakan air sebagai pelarut. Selama proses infudasi, suhu pelarut air harus berada dititik 90°C dalam waktu 15 menit. Perbandingan ukuran antara sampel dan pelarut adalah 1;10 yang dimana jika berat sampel 100 gram, maka berat volume pelarut adalah 1000 ml. Prosesnya adalah panaskan sampel tersebut dalam wadah panci dengan air seperlunya dengan waktu 15 menit hingga suhu berada dititik 90°C sambil diaduk. Saring selagi panas menggunakan kain flanel, lalu ditambahkan air secukupnya melalui

ampas untuk mendapatkan volume yang diinginkan. Jika bahannya memiliki minyak esensial, disaring setelah didinginkan (atun,2014).

C. Golongan Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder tergolong senyawa yang tidak esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan organisme yang dapat ditemukan dalam bentuk satuan atau berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Setiap organisme akan menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda, bahkan biasanya satu jenis senyawa hanya terdapat pada satu spesies dalam satu kingdom. Tidak semua senyawa dapat diproduksi, hanya pada saat dibutuhkan atau pada fase tertentu. Metabolit sekunder berfungsi sebagai pertahanan diri dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama dan penyakit, molekul sinyal dan untuk menarik penyerbuk. Metabolit sekunder digunakan oleh organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya (Reo et al., 2017).

Metabolit sekunder merupakan senyawa alam yang keberadaannya tidak terlalu bermanfaat bagi tubuh tetapi dapat berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Sebagian besar tumbuhan penghasil metabolit sekunder menggunakan senyawa tersebut untuk pertahanan diri dan bersaing dengan makhluk hidup lain di sekitarnya (Stanton et al., 2007).

Diketahui bahwa metabolit sekunder pada tumbuhan dapat memberikan efek farmakologis yaitu antivirus, sitotoksik, dan antioksidan. Salah satu metabolit sekunder yang penting pada tumbuhan adalah flavonoid (Alfaridz & Amalia, 2018).

Isolasi senyawa kimia dari bahan alam adalah sebuah usaha bagaimana cara memisahkan senyawa yang telah bercampur sehingga kita dapat menghasilkan senyawa tunggal yang murni. Isolasi bahan alam dilakukan

bedasarkan sifat dari bahan alam tersebut, dan dapat digolongkan menjadi isolasi cara fisis dan cara kimia.

a. isolasi cara fisis

isolasi cara ini berdasarkan sifat fisik bahan alam, seperti kelarutan dan tekanan uap, isolasi berdasarkan perbedaan kelarutan bahan alam tertentu dapat dilakukan dengan pelarut dingin atau panas. Isolasi dengan pelarut dingin digunakan untuk mengisolasi bahan alam yang dapat larut dalam keadaan dingin. Isolasi dengan berdasarkan penurunan tekanan uap dilakukan dengan cara destilasi uap. Cara ini digunakan untuk senyawa yang tidak larut dalam air, bertitik didih tinggi, mudah terurai sebelum titik didihnya, dan mudah menguap.

b. Isolasi secara kimia

Isolasi ini berdasarkan sifat kimia atau keaktifan bahan alam terhadap pereaksi tertentu. Bahan alam diisolasi melalui reaksi kimia dan dipisahkan dari senyawa lain yang tidak bereaksi. Sebelum melakukan suatu isolasi senyawa kimia biasanya terlebih dahulu dilakukan preparasi sampel dan ekstraksi. Biasanya dilakukan ekstraksi pemisahan berdasarkan tingkat kepolaran dari non-polar, semi polar, sampai polar setelah itu dilakukan fraksinasi dan pemilihan teknik kromatografi.

Fraksinasi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari kandungan golongan utama yang lainnya. Fraksinasi merupakan prosedur pemisahan komponen-komponen berdasarkan perbedaan kepolaran tergantung dari jenis senyawa yang terkandung dalam tumbuhan.

Metode yang umumnya diujikan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa yang tersimpan dalam tanaman adalah skrining fitokimia. Skrining fitokimia merupakan uji pendahuluan yang digunakan untuk memperoleh gambaran

kandungan senyawa yang terdapat pada tumbuhan. Hasil penapisan fitokimia akan digambarkan dengan terjadinya perubahan warna visual (Dewatisari, 2020).

Pengujian fitokimia pada tumbuhan sangat diperlukan, untuk mengamati metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman yang tidak digunakan atau dapat dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Tetapi memiliki efek yang berguna untuk kesehatan atau memiliki peran penting untuk pencegahan penyakit (Novitasari & Putri, 2016).

Kelebihan metode penapisan fitokimia ini adalah cepat, sederhana, efektif dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok senyawa serta dapat menentukan keberadaan senyawa aktif biologis yang terdistribusi dalam jaringan (Puspitasari et al., 2013). Berikut beberapa golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan, yaitu:

1. Flavonoid

Golongan metabolit sekunder yang paling banyak terdapat pada tumbuhan adalah flavonoid. Flavonoid termasuk dalam keluarga polifenol yang dikelompokkan menurut struktur kimia dan biosintesisnya. Flavonoid memiliki struktur dasar yang terdiri dari dua gugus aromatik yang dihubungkan oleh perantara karbon. Flavonoid memiliki pembagian golongan berdasarkan perbandingan struktur terutama pada substitusi karbon pada gugus aromatik pusat dengan keragaman aktivitas farmakologi yang ditimbulkan (Alfaridz & Amalia, 2018).

Flavonoid memiliki peranan penting bagi tanaman yang akan memberikan warna, rasa pada biji, bunga dan buah serta aroma yang akan melindungi tanaman dari dampak lingkungan, proteksi dari paparan sinar UV dan antimikroba. (Alfaridz & Amalia, 2018).

Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang berasal dari tumbuhan dan termasuk dalam kelompok besar polifenol. Senyawa flavonoid dapat ditemukan di semua bagian tumbuhan termasuk kulit kayu, kembang kol, daun, akar, buah, biji, bunga, serbuk sari dan nektar. Flavonoid berfungsi sebagai penangkal radikal bebas dan dapat mencegah oksidasi lipid (Zuraida et al., 2017).

2. Alkaloid

Alkaloid adalah metabolit sekunder yang dapat ditemukan pada tumbuhan, dapat ditemui pada ranting, daun, kulit kayu dan biji. Alkaloid memiliki manfaat kesehatan berupa memacu sistem saraf, analgesik, meningkatkan tekanan darah, penyakit kardiovaskular, obat penenang dan antimikroba (Aksara et al., 2013).

Secara umum senyawa alkaloid bersumber dari tumbuhan terutama spesies angiospermae yang dimana lebih dari 20% spesies Angiosperma mengandung alkaloid. Alkaloid dapat ditemui dalam jumlah kecil dan senyawa kompleks harus dipisahkan dari jaringan tanaman. Alkaloid berfungsi sebagai toksin yang akan melindunginya dari hama, senyawa penyimpan yang dapat mensuplai nitrogen. Faktor pengatur pertumbuhan dan elemen lainnya (Ningrum et al., 2017).

3. Saponin

Saponin merupakan senyawa yang aktif terdapat pada permukaan dan menghasilkan buih bila dikocok dalam air. Saponin adalah bentuk glikosida dari saponin sehingga bersifat polar. Terbentuknya buih yang dilakukan pada uji saponin menandakan adanya kandungan glikosida yang mempunyai kemampuan membentuk sebuah buih yang terkandung didalam air yang akan dihidrolisis menjadi glukosa atau senyawa lainnya. Senyawa saponin secara umum akan tertarik oleh pelarut semi polar (Astarina, N. W. G., Astuti, K. W., Warditiani, 2012).

4. Fenol

Fenol merupakan metabolit non esensial yang diproduksi oleh tanaman sebagai respons terhadap kondisi lingkungan sekitar. Senyawa fenol berfungsi sebagai proteksi terhadap sinar UV-B dan kematian sel serta melindungi DNA dari beberapa kerusakan. Serta memiliki fungsi sebagai agen pencegahan terhadap beberapa gangguan penyakit seperti kanker, penumpukan kolesterol pada dinding arteri, diabetes melitus dan Gangguan fungsi otak. Pada umumnya setiap tumbuhan mengandung satu atau lebih metabolit sekunder golongan flavonoid (Hanin & Pratiwi, 2017).

5. Tanin

Tanin merupakan senyawa aktif metabolit yang diketahui mempunyai beberapa astringen, anti diare, anti bakteridan anti oksidan. Tanin merupakan komponen zat organik yang kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut (Desmiaty et al., 2008).

Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tannin terhidrolisis dan tannin terkondensasi. Tannin memiliki peranan biologis yang kompleks mulai dari pengendap protein hingga pengkhelet logam. Tannin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis (Hagerman, 2002).

6. Terpenoid

Terpenoid atau isoprenoid merupakan senyawa alami yang terdiri dari lima unit karbon isoprene. Beberapa senyawa terpenoid yang terkandung dalam family baselaseae, yaitu triterpenoid, asam oleanolat, dan steroid (Cindyana et al, 2022).

D. Kromatografi Gas-Spektrometer Massa (GC-MS)

Kromatografi gas merupakan teknik yang digunakan dalam proses pemisahan suatu senyawa kimia yang memiliki sifat yang mudah menguap (volatil)

tanpa mengalami dekomposisi. Spektroskopi massa adalah salah satu metode untuk mengetahui berat molekul suatu senyawa dengan mencari perbandingan massa terhadap muatan dari ion muatannya. Teknik analisis ini sering digunakan dalam analisis pada bidang toksikologi, forensik, ilmu pangan, dan penelitian lingkungan. Kromatografi Gas-Spektrometer Massa tidak hanya dapat memisahkan komponen volatil dari campuran kompleks, tetapi dapat juga mendeteksi spektrum massa dari masing-masing komponen. Instrumen ini dapat memberikan dua dimensi informasi yang terpisah tentang komponen-komponen dalam sampel yaitu waktu retensi GC dan spektrum massa ionisasi elektron (EI). Waktu retensi GC terkait dengan sifat kimia spesifik dari molekul yang dimaksud (mis. volatilitas, polaritas, keberadaan gugus fungsi spesifik) sementara berat molekul (berasal dari spektrum massa) merupakan indikasi komposisi atom (Clement dan Taguchi, 1989).

Prinsip kerja dari GC-MS adalah sampel yang sudah berupa cairan diinjeksikan kedalam injektor, kemudian diuapkan. Sampel yang sudah menjadi uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terjadi pemisahan, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron, sehingga menyebabkan terjadinya ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan akan menghasilkan spektrum massa (Cazes, 2001). *Gas chromatography* (kromatografi gas) adalah teknik pemisahan di mana cairan yang menguap berpindah melalui kolom yang mengandung fasa diam. Solut akan terelusi berdasarkan peningkatan titik didih tertentu, namun pengecualian apabila terdapat interaksi khusus antara solut dengan fasa diamnya. Fase gerak yang digunakan dalam kromatografi gas adalah gas dan zat terlarut terpisah sebagai uap (Gandjar dan Rohman, 2007).

Komponen-komponen yang terdapat pada kromatografi gas-spektrometer massa (GC-MS) terdiri atas beberapa bagian, seperti:

1. Gas Pembawa (*Carrier Gas*)

Gas yang digunakan pada dasarnya bersifat inert. Kondisi ini dibutuhkan karena gas pembawa dapat bereaksi dan mempengaruhi gas atau sampel yang akan diidentifikasi. Gas pembawa digunakan untuk membawa sampel melalui kolom hingga ke detektor. Adapun fase gerak yang sering digunakan, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis gas pembawa

Jenis Gas	Mr (g/mol)	Konduktivitas Termal	Viskositas
Ar	39,95	5,087	270,2
CO ₂	44,01	5,06	197,2
He	4,00	39,85	234,1
H ₂	2,02	49,94	104,6
N ₂	28,01	7,18	212,0
O ₂	32,00	7,43	248,5

2. Tempat Injeksi (*Injection Port*)

Fungsi dari sistem injektor adalah menerima sampel dan membawa sampel dalam bentuk uap ke dalam kolom. Sistem injektor harus dapat dipanaskan agar sampel yang bukan gas dapat diubah menjadi uap dan volume yang dimasukkan harus kecil.

3. Oven

Oven berfungsi untuk memanaskan kolom pada suhu tertentu agar mempermudah proses pemisahan komponen pada sampel. Suhu jangkauan oven mulai 30°C - 320°C.

4. Kolom

Kolom merupakan komponen utama dari kromatografi gas. Ada beberapa bentuk kolom, diantaranya lurus, bengkok, dan kumparan/spiral. Secara umum

kolom terdiri atas 2 jenis yaitu: *packed column* (kolom yang dikapak) umumnya terbuat dari *glass* atau *stainless steel coil* dengan panjang 1-5 m dengan diameter ± 5 mm. Sedangkan *capillary column* (kolom kapiler terbuka) umumnya terbuat dari *purified silicate glass* sehingga tidak mudah patah, panjang kolom ini biasanya 10-100 m dengan diameter kurang dari 1 mm (berkisar antara 0,3-0,5 mm).

5. Fase Diam (*Stationary Phase*)

Fase diam yang digunakan pada kromatografi gas memiliki beberapa syarat seperti: tidak mudah menguap, tahan panas, dapat digunakan berulang, inert terhadap sampel, dan memiliki nilai K yang sedang. Fase diam yang digunakan untuk analisis suatu golongan senyawa serta kepolarannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis fase diam dan penggunaannya

Fase Diam	Golongan Sampel	Polaritas	Suhu Maksimum ($^{\circ}\text{C}$)
Squelen	Hidrokarbon	Non polar	125
Apiezon L	Hidrokarbon, ester, eter	Non polar	300
Metil silicon	Steroid, pestisida, alkaloid, ester	Non polar	300
Dionil ptalat	Semua jenis	Semi polar	175
Dietilen glikosuksinat	Ester	Polar	200
Carbowax 20M	Alkohol, amina aromatik, keton	polar	250

Kromatografi Gas-Spektrometer Massa (GC-MS) terdiri atas dua komponen utama yaitu kromatografi gas (GC) dan spektrometer massa (MS). Kromatografi gas memiliki fasa gerak (*mobile phase*) yang merupakan sebuah operator gas yang akan membawa sampel ke dalam kolom. Fasa gerak pada GC adalah gas inert dan tidak reaktif pada senyawa lain, misalnya argon, helium, nitrogen, dan hidrogen. Fasa diam (*stationary*) merupakan lapisan cair atau

polimer yang mendukung gas pembawa yang berada pada kolom. Spektrometer massa menghasilkan berkas ion dengan memilah ion menjadi spektrum yang sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatannya (Karasek dan Clement, 1989).

Spektrometer massa merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi masing-masing molekul komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. Spektrometer massa menghasilkan berkas ion dari suatu zat uji dan memilah ion tersebut menjadi spektrum sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan (m/z) dan merekam kelimpahan relatif tiap jenis ion yang ada. Spektrometer massa dapat digunakan untuk mengukur perbandingan massa ion terhadap muatan, untuk menetapkan kelimpahan ion dan untuk mempelajari proses ionisasi (Agusta, 2000).

E. Tinjauan Islam Mengenai Tanaman Obat

1. Pandangan Islam tentang Kesehatan

Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan. Karena kesehatan merupakan unsur penunjang utama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah *subhanahu wata'ala* dan bekerja serta aktivitas lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kesehatan sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia sebagaimana Firman Allah *subhanahu wata'ala*. Dalam Q. S. Asy-Syu'ara/26: 80.

وَإِذَا مَرَضْتُمْ فَهُوَ يَشْفِيكُمْ ۚ ٨٠

Terjemahnya :

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.” (Kementerian Agama RI, 2014: 370)

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk terus berusaha meski Allah *subhanahu wata'ala*. yang menentukan hasilnya. Seperti di dalam dunia

kesehatan, jika terserang penyakit dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu pengobatan tradisional maupun obat sintesis karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk memperoleh kesembuhan.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam ayat ini, Sakit dinisbatkan (disandarkan) kepada diri Ibrahim, sekalipun pada kenyataannya berasal dari takdir Allah dan ketetapan-Nya, juga sebagai ciptaan-Nya, tetapi sengaja disandarkan pada Nabi Ibrahim sebagai etika sopan santun terhadap Allah *subhanahu wata'ala*.

Begitupun dalam Tafsir Al-Mishbah Volume 9 dijelaskan bahwa berbicara tentang nikmat, secara tegas Nabi Ibrahim as. menyatakan bahwa sumbernya adalah Allah *subhanahu wata'ala*. berbeda dengan ketika berbicara tentang penyakit. Ini karena penganugerahan nikmat adalah sesuatu yang terpuji sehingga wajar disandarkan kepada Allah, sedang penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak wajar dinyatakan bersumber dari Allah *subhanahu wata'ala*. Demikian Nabi Ibrahim as. mengajarkan bahwa segala yang terpuji dan indah bersumber dari-Nya. Adapun yang tercela dan negatif, hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya dari diri sendiri (Shihab, 2009: 27).

Perlu dicatat juga bahwa penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim as. ini, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim itu hanya bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah Allah *subhanahu wata'ala*.

Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan muslim di era kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan

campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek dan toko obat (Sudewi, 2017: 58).

Sekelompok orang yang menjadi tenaga ahli pengobatan sudah ada semenjak masa kenabian, juga sebelum itu dan sesudahnya. Salah satu bidang pengobatan yang sudah ada sejak itu adalah ilmu obat alam atau disebut dengan farmakognosi. Para ahli dalam bidang ini mengetahui formula obat-obatan, karakteristik dan cara pengobatannya. Diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja. Dan Allah-lah yang menjadikan penyebab itu semua. Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan ini dan berobatlah dengannya (Sudewi, 2017: 59).

Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang terkait dengan pengobatan tradisional dapat dilihat dalam QS. An-Nahl (16) : 69.

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

Terjemahnya :

”Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhan-Mu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan.” (Kementerian Agama RI, 2014: 274)

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan banyaknya penyakit yang muncul di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk menggunakan akal pikirannya yang juga merupakan pemberian dari sang khalik sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali-‘Imran/3: 190-191.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۗ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

١٩١

Terjemahnya :

190. “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal”

191. “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Kementerian Agama RI, 2014: 75)

As-Suyuthi dalam kitabnya menyebutkan mengenai asbabun nuzul surah Ali-Imran ayat 190 dengan mengutip hadits riwayat ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, ‘Apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian?’ Orang-orang Yahudi itu menjawab, ‘Tongkat dan tangan putih bagi orang-orang yang melihatnya,’ Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, Lalu bertanya kepada mereka, ‘Apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa?’ Mereka menjawab, ‘Dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta dan menghidupkan orang mati’ Lalu mereka mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Lalu mereka berkata kepada beliau, “Berdo’alah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Shafa dan Marwah menjadi emas untuk kami”, Lalu beliau berdo’a, maka turunlah firman Allah *subhanahu wata’ala*.

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.”(As-Suyuthi, 2008: 148-149).

Ditegaskan pada ayat ini, dan salah satu bukti kebenaran adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena *Sesungguhnya dalam penciptaannya*

langit dan bumi terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi Ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal yang murni (Shihab, 2009: 370).

Dalam penciptaan langit dan bumi, manusia diminta untuk berpikir, salah satunya dengan memanfaatkan apa yang telah Allah *subhanahu wa ta'ala* ciptakan di bumi berupa tumbuhan, salah satunya kasumba turate. Agar dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan yang berguna bagi manusia.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kepada umatnya untuk memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menasehati seseorang:

اعْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Artinya:

“Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu (HR. Al-Hakim. Beliau dan Syaikh Al-Albani menshahihkannya).”

Dari hadits di atas, bahwa pentingnya untuk menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Diantaranya menjaga nikmat masa muda sebelum datangnya masa tua, menjaga nikmat sehat sebelum datangnya sakit, menjaga nikmat kaya sebelum datang masa kefakiran, menjaga nikmat masa luang sebelumnya datangnya masa sibuk, dan menjaga nikmat hidup sebelum datangnya kematian. Yaitu dengan beriman dan bertaqwa hanya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Adapun bentuk ikhtiarnya adalah dengan menjaga pola makan, memanfaatkan masa muda dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian untuk mengobati sakit agar tubuh kembali sehat, Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menurunkan tumbuhan untuk dijadikan sebagai obat. Manusia tinggal mengolahnya.

Adapun maksud dari hadits di atas adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk menjaga salah satu nikmat yaitu nikmat kesehatan yang telah Allah *subhanahu wa ta’ala* berikan kepada kita agar menjaga kesehatan yaitu menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, atau dengan mengikuti pola hidup Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang sehat.

2. Penyakit dan Obatnya

Dalam Islam sejak masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* sudah ada berbagai penyakit. Sakit adalah merupakan salah satu ujian dari Allah swt kepada makhluk-Nya dan Allah swt. telah menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu diriwayatkan dalam Hadits Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Abu Ahmad Az Zubairi] telah menceritakan kepada kami [‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [‘Atha bin Abu Rabah] dari [Abu Hurairah] radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga.” (HR. Bukhari no. 5246)

Hadist ini diriwayatkan oleh beberapa orang rawi, yakni:

1. Abu Hurairah sebagai : Rawi pertama
2. ‘Atha bin Abu Rabah sebagai : Rawi kedua
3. ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain sebagai : Rawi ketiga
4. Abu Ahmad Az Zubairi sebagai : Rawi keempat
5. Muhammad bin Al Mutsanna sebagai : Rawi kelima

6. Imam Bukhari sebagai : Rawi keenam/ Rawi terakhir

Dengan demikian, maka urutan-urutan sanad dari Hadits di atas sebagai berikut:

1. Muhammad bin Al Mutsanna sebagai : Sanad pertama/Awal Sanad
2. Abu Ahmad Az Zubairi sebagai : Sanad kedua
3. ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain sebagai : Sanad ketiga
4. ‘Atha bin Abu Rabah sebagai : Sanad keempat
5. Abu Hurairah sebagai : Sanad kelima/ Akhir Sanad

Hadist ini menjadi gambaran pentingnya berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Hadist ini bersifat umum mencakup setiap penyakit dan obatnya. Hadist ini menetapkan sebab akibat dan bahwa pengobatan tidak menafikkan tawakkal bagi siapa yang berkeyakinan bahwa kesembuhan itu hanya dengan izin Allah dan takdir-Nya (Al Asqalani & Al Hafizh, 2016).

3. Pengobatan oleh Ahli

Islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir atau pengobatan yang mengarah kemusyrikan. Sebaliknya Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan, penelitian eksperimen ilmiah dan hukum sebab akibat. Setiap apa yang diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta’ala* kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Firman Allah *subhanahu wa ta’ala* dalam QS. Al-Baqarah (2): 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي أَلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْرَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.

Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Kementerian Agama RI, 2014: 4)

4. Tidak Ada Sesuatu yang Diciptakan Sia-sia

Di dalam Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Asy-Syu'araa (26): 7.

أَوْ مَّ يَرَوْا إِلَىٰ آلِ الْأَرْضِ كَمْ أَن بُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementerian Agama RI, 2014: 367)

Dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an, Allah kemudian mengajak manusia untuk belajar dari seluruh alam, agar manusia tahu bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah. Dan apakah manusia tidak memperhatikan apa yang mereka lihat di hamparan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai tumbuh-tumbuhan yang baik yang membawa banyak manfaat bagi manusia. Bukankah itu pertanda atas kekuasaan Allah *subhanahu wa ta'ala* dan anugerah-Nya yang tak terhingga kepada manusia. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang mampu menghidupkan tanah yang gersang, menciptakan berbagai ragam tanaman, dan tumbuh-tumbuhan yang baik agar dapat dimanfaatkan yaitu salah satunya dimanfaatkan sebagai obat-obatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental kualitatif yang dilakukan di laboratorium.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan September-November 2022.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mendekati ke arah penelitian kualitatif dengan metode eksperimental laboratorium.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang antara lain.

1. Alat yang Digunakan

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pengaduk Iwaki®, beker gelas Pyrex®, bejana maserasi, corong, GC-MS Thermo scientific®, gelas arloji, *hairdryer*, mangkok kaca, timbangan digital AND®, pipet tetes, rak tabung, *vacum rotary evaporator* IKA®, spatula, tabung reaksi Iwaki®, dan vial.

2. Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aluminium foil, asam asetat anhidrat, aquadest, etanol 70 %, FeCl_3 , H_2SO_4 , HCl , kasumba turate, kertas saring, label, N-heksan, pereaksi dragendrof dan mayer, pita logam (Mg), dan tisu.

E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan

1. Teknik Pengolahan

Sampel kasumba turate yang diperoleh dari distributor telah dalam keadaan bersih dan kering. Simplisia kasumba turate dihaluskan dengan blender, kemudian disimpan dalam wadah toples kaca yang selanjutnya akan dilakukan maserasi.

2. Ekstraksi Sampel

Sampel simplisia kasumba turate yang telah kering ditimbang 200 g kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi dan dibasahi dengan pelarut etanol 70 % sebanyak 1 liter, diaduk kemudian dicukupkan hingga sampel terendam seluruhnya dan ditutup rapat, dibiarkan selama 1x24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung 35annin di aduk sekali. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya, kemudian di maserasi dengan etanol yang baru. Maserasi dilakukan tiga kali dalam masa penyimpanan 3x24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dengan menggunakan *rotary evaporator* pada suhu 50°C hingga diperoleh ekstrak kental.

3. Identifikasi Golongan Kimia

a. Uji alkaloid

Ekstrak ditimbang 0,5 gram, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dilarutkan dengan HCl , kemudian ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Dragendrof

(larutan potassium bismuth iodide), jika terdapat endapan merah maka positif adanya alkaloid. Kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes pereaksi Mayer (larutan potassium merkuri iodide) menghasilkan endapan kuning maka positif mengandung senyawa alkaloid (Julianto, 2019).

b. Uji flavonoid

Ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan etanol 70% kemudian ditambahkan 5-6 tetes HCl pekat dan ditambahkan 3-4 pita logam Mg jika membentuk warna merah menunjukkan adanya flavonoid dan pembentukan warna orange menandakan adanya senyawa flavon (Endarini, 2016).

c. Uji saponin

Ditimbang 0,5 gram ekstrak, lalu ditambahkan dengan air panas sampai semua bagian ekstrak terendam kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa, busa didiamkan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl 1% jika busa tetap bertahan maka positif mengandung saponin (Julianto, 2019).

d. Uji tannin

Ekstrak sebanyak 0,5 gram ditambahkan 5 ml air hangat, ditetesi dengan FeCl_3 1%, jika berwarna biru tinta positif (Endarini, 2016).

e. Uji terpenoid


Sebanyak 0,5 gram ekstrak ditimbang dan dilarutkan dalam 1 ml n-heksan, kemudian ditambah dengan 0,5 ml asam asetat anhidrat. Campuran tersebut ditetesi dengan 2 ml H_2SO_4 pekat melalui dinding tabung. Adanya senyawa golongan terpenoid akan ditandai dengan adanya warna merah (Endarini, 2016).

f. Uji fenol

Sebanyak 0,5 gram ekstrak ditimbang dan dilarutkan dengan air kemudian ditetesi dengan besi (III) klorida 2-3 tetes jika hasil positif ditunjukkan dengan warna biru atau hijau (Julianto, 2019).

4. Identifikasi Senyawa Aktif Ekstrak

Senyawa-senyawa aktif pada ekstrak kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) dianalisis menggunakan instrument GC-MS. Preparasi ekstrak kasumba turate dilakukan dengan menggunakan etanol sebanak 5 ml. Sampel diinjeksikan sebanyak 1 μ L dalam GC-MS. Gas pembawa yang digunakan adalah helium dengan laju alir 1,5 ml/menit, suhu injector diatur 250°C dan suhu awal oven 70°C. Laju kenaikan suhu 6°C/menit untuk masing-masing sampel ekstrak. Identifikasi senyawa dilakukan dengan bantuan perangkat lunak PC.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius L.*)

Hasil ekstraksi dari simplisia kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*) sebanyak 300 g dengan menggunakan metode maserasi di ekstraksi menggunakan pelarut etanol 70% ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil ekstraksi kasumba turate (*Carthamus tinctorius L.*)

Jenis Ekstrak	Berat Simplisia	Berat Ekstrak	% Rendamen
Ekstrak kental	300 g	67,55 g	22,516%

2. Skrining Fitokimia


Tabel 4. Hasil skrining fitokimia

Golongan Senyawa	Hasil
Alkaloid	+
Fenol	+
Flavonoid	+
Saponin	+
Terpenoid	+
Tanin	+

Ket : (+) Mengandung Senyawa

(-) Tidak Mengandung senyawa



3. Hasil Gc-MS



Gambar 2. Hasil kromatogram GC-MS dari ekstrak kasumba turate

Tabel 5. Data 10 mayoritas senyawa pada ekstrak kasumba turate (*Carthamus tinctorius* L.) dengan GC-MS

No.	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Peak Area %	Rumus Struktur	Aktivitas Farmakologis
1.	1.282	Etanol, 2-(trimethylsilyl)	14.04		-
2.	22.522, 22.907, 22.624, 22.757, 22.583, dan 22.158	Cis-Vaccenic acid	11.89, 7.77, 6.13, 2.64, 2.41, 0.32		Anti kanker, anti bakteri, efek hipolipidemik, anti oksidan, anti inflamasi (Dawwam et al., 2022; Khanday S & Sharma GD, 2021; Rangunath et al., 2020)

3.	22.624	Trans-13-octadecenoic acid	6.13		Anti inflamasi, anti adrogenik, anti leukotriene-D4, penghambat 5- α reductase, aktivitas dermatitigenik dan anemiagenik (A. D. Astuti et al., 2021).
4.	20.284	n-Hexadecanoic acid	5.48		Anti oksidan, 5-Alpha reductase-inhibitor, Anti fibrinolitik, Hemolitik, Nematisida dan Anti alopecic (Guerrero et al., 2017).
5.	22.039	Trans-13-octadecenoic acid, methyl ester	5.30		Anti oksidan, Anti inflamasi, vasodilator, pelepasan stimulasi insulin, antidiabetes (Melappa, 2014)
6.	10.285 dan 9.812	2,4-decadienal	5.18 dan 3.51		-
7.	22.447	10(E),12(Z)-conjugated linoleic acid	3.51		Anti obesitas, hipogikemia, demensia Alzheimer
8.	19.798	Hexadecanoic acid, metil ester	2.02		Anti inflamasi, vasodilator, pelepasan stimulasi insulin, antidiabetes (Melappa, 2014).
9.	21.954	9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)	0.74		Anti oksidan, anti virus, anti kanker (Reza et al., 2021)

10.	11.445	Cis-13-octadecenoic acid	0.11		Anti inflamasi, hipokolesterolemia, anti histamin, anti jerawat, anti kanker, anti oksidan dan anti arthritis (A. D. Astuti et al., 2021)
-----	--------	--------------------------	------	--	---

B. Pembahasan

Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah kasumba turate (*Carthamus tinctorius*). Tanaman ini tersebar dipulau Sulawesi. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini dari pengepul yang diperoleh dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Sampel yang akan digunakan diekstraksi dengan metode maserasi. Metode ini menggunakan alat yang sederhana, mudah, murah, dan tidak melalui suatu proses pemanasan yang dapat merusak susunan senyawa kimia di dalamnya. Prinsip dari metode maserasi adalah *like dissolve like*, artinya proses pelarut polar akan melarutkan sebuah senyawa polar yang terkandung dalam simplisia (Dewatisari, 2020). Proses ekstraksi menggunakan pelarut etanol 70%. Sampel akan direndam selama 3x24 jam dimana setiap 1x24 jam cairan filter akan diganti dengan pelarut baru sehingga ekstraksi senyawa lebih optimal.

Rendamen ekstrak merupakan rasio berat akhir ekstrak dengan berat awal ekstrak dalam persen (Sani et al., 2014). Nilai suatu rendamen yang kadarnya tinggi menunjukkan banyaknya suatu komponen bioaktif yang terkandung di dalamnya (Dewatisari et al., 2018). Serbuk simplisia kasumba yang telah dimaserasi disaring kemudian dipekatkan menggunakan alat *vaccum rotary evaporator* sampai memperoleh ekstrak kental. Ekstrak etanol kasumba turate yang diperoleh pada penelitian ini yakni 67,55g dengan nilai rendamen 22,516%.

Penilaian fitokimia dilakukan secara kualitatif berdasarkan sifat kelarutan senyawanya. Skrining fitokimia merupakan tahap awal untuk menentukan jenis golongan metabolit sekunder yang terkandung dalam sampel. Hasil penapisan fitokimia pada golongan senyawa yang terkandung dalam sampel akan digambarkan dengan perubahan warna visual (Dewatisari, 2020). Pada penelitian ini diidentifikasi enam jenis senyawa fitokimia yang terdiri dari uji alkaloid, flavonoid, fenol, terpenoid, tanin dan saponin (Tabel 3).

Kasumba turate mengandung beberapa senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, tanin, dan saponin. Hasil uji positif flavonoid ditunjukkan dengan perubahan warna berwarna merah, dan terdapat endapan berwarna kuning. Hasil positif alkaloid ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna menjadi gelap. Hasil uji positif terpenoid ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna merah. Hasil uji positif tanin ditunjukkan dengan perubahan warna biru/hijau tinta. Hasil positif saponin ditunjukkan dengan terbentuknya sebuah buih setinggi 1 hingga 10 cm <10 menit. Hasil pengujian fenol pada kasumba turate positif yang artinya mengandung senyawa fenol.

Dilakukan identifikasi senyawa pada ekstrak kasumba turate menggunakan instrumen GC-MS dengan gas pembawa helium. Gas helium biasanya paling umum digunakan sebagai gas pembawa karena bersifat tidak reaktif dan murni serta mampu memberikan hasil efisiensi kromatografi yang lebih baik. Hasil identifikasi ekstrak kasumba turate dengan GC-MS dapat dilihat pada Tabel 5 yang menunjukkan bahwa pada ekstrak kasumba turate terdapat 39 *peak* dan 117 kemungkinan komponen senyawa yang berhasil diekstraksi dari pelarut etanol dengan *Similarity Index* (SI) yang berbeda.

Pada tabel 5 terlihat ada beberapa komponen senyawa dengan persentase terbanyak berturut-turut pada ekstrak kasumba turate yaitu *cis vaccenid acid*

(11.89%, 7.77%, 6.13%, 2.64%, 2.41% dan 0.32%), Trans-13-octadecanoic acid (6.13%), n-hexadecanoic acid (5.48%), Trans-13-octadecanoic acid, methyl ester (5.30%), 2,4 decadienal (5.18% dan 3.51%), 10(E),12(Z)-conjugated linoleic acid (3.51%), hexadecanoic acid -methyl ester (2.02%), 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E) (0,74%), dan Cis-13-octadecanoic acid (0.11%).

Senyawa dengan persentase terbesar yaitu senyawa cis-vaccenic acid termasuk senyawa asam lemak tak jenuh yang memiliki aktivitas anti oksidan (Khan et al., 2022).

Penelitian ini mengingatkan kita betapa besar kekuasaan Allah swt dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an banyak yang menyebutkan bahwa tumbuhan memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai obat bagi manusia. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 11 yang berbunyi:

يُنۢبِتۢ لَكُمۢ بِهِ الزَّرۢعَ وَالزَّيۢتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالۢأَعۢنَابَ وَمِنۢ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِيۢ ذَٰلِكَ لَآيَاتٍۭ لِّقَوۢمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

“Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah swt) bagi kaum yang berpikir“ (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015).

Dari ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam bentuk, sifat khusus, rasa, bau dan warna. Tumbuhan ini dapat memberikan manfaat bagi hewan dan manusia. Allah SWT menciptakan sesuatu hal yang tidak dilakukan dengan sia-sia, akan tetapi memiliki kegunaan dan manfaat tersendiri (Rossidy, 2012). Abu Na'im dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الحديث (قدره تقدروا لن فإنكم هلا، في تفكروا وال هلا خلق في كروا تف

Artinya:

“Renungkanlah ciptaan Allah, jangan renungkan Dzat-Nya, karena sesungguhnya kamu tak akan mampu mengukur kekuasaan-Nya”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa tafakkur pada awalnya adalah merupakan perenungan atas segala ciptaan Allah, baik yang buruk maupun yang bagus. Kenapa Allah menciptakan jenis makhluk yang jika diamati secara sekilas seperti tidak ada manfaatnya? Kenapa Allah menciptakan keburukan dan kebagusan? Kenapa Allah menciptakan kejahatan dan kebaikan? Sesungguhnya, saat Allah menciptakan keburukan dan kejahatan – Allah ingin menampakkan 37 sifat “jalal”-Nya, dan ketika Allah menciptakan kebagusan dan kebaikan – Allah ingin menampakkan sifat “jamal”-Nya. Maka hendaknya kita manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna, yang memiliki akal pikiran. Sehingga kita di harapkan dapat membedakan tentang kebaikan dan keburukan yang ada di muka bumi ini, dan dapat mempelajari semua tentang ciptaanNya. Bahwasanya segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sia-sia. dengan predikat taqwim (sebaik-baiknya ciptaan) yang ada pada manusia di bandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Menggunakan akal pikiran yang telah di berikan , dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini (hewan, tumbuhan dan zat lainya) untuk di pergunakan dengan semestinya agar dapat memberi manfaat yang baik dalam kehidupan. Sehingga dapat melestarikan alam semesta ini dan memperbaiki hidup untuk setiap makhluk ciptaanNya.

M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ekstrak kasumba turate mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, fenol dan tanin.
2. Terdapat 39 kemungkinan komponen senyawa pada ekstrak kasumba turate yang teridentifikasi dengan GC-MS. Senyawa dengan persentase terbanyak yaitu cis- vaccenic acid (11.89 %), trans-13-octadecenoic acid (6.13%), dan n-hexadecanoic acid, (5.48 %).

B. Saran

Disarankan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait manfaat dari tanaman kasumba turate.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdel-Hady, H., El-Wakil, E. A., & Abdel-Gawad, M. *GC-MS Analysis, Antioxidant and Cytotoxic Activities of Mentha spicata. European Journal of Medicinal Plants*, 26(1), 1–12. 2018
- Agusta, A., *Aromaterapi, Cara sehat dengan wewangian alami*, Penebar Swadaya, Jakarta. 2000
- Aksara R., Musa W.J.A., Alio L., *Identifikasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Mangga (Mangifera indica L.)*. *Jurnal Entropi* 8(1):514-519.2013
- Al-Gara'awi, N. I., Abu-Serag, N. A., Alee Shaheed, K. A., & Bahadly, Z. K. Al. *Analysis of bioactive phytochemical compound of (Cyperus alternifolius L.) by using gas chromatography-mass spectrometry*. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 571(1). 2019
- Al Asqalani, I. H., & Al Hafizh, A. I. (2016). *FATHUL BAARI Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 28* (28th ed.). Pustaka Azzam.
- Cazes, Jack. *Encyclopedia of Chromatography*. New York : Marcell Dakker Inc. 2001
- Clement, R.E., dan Taguchi V.Y., , *Techniques For The Gas Chromatography Mass Spectrometry Identification Of Organic Compounds In Effluents*, Queen's Printer for Ontario. 1989
- Darusman, K, Latifah., et al. *Domestikasi Buah Merah (M. A. Sari (ed.))*. PT Penerbit IPB Press. 2019
- Dawwam, G., Saber, I., Yassin, M., & Ibrahim, H. *Analysis of Different Bioactive Compounds Conferring Antimicrobial Activity from Lactobacillus plantarum and Lactobacillus acidophilus with Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)*. *Egyptian Academic Journal of Biological Sciences, G. Microbiology*, 14(1), 1–1. 2022
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Edisi 1. Jakarta : Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan; 2000.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Farmakope Herbal Indonesia*. Edisi 1. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2008. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Farmakope Indonesia edisi V*. Jakarta: DEPKES RI; 2014.

- Gandjar, I. G., dan A. Rohman. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007
- Ganesh, M., & Mohankumar, M. *Extraction and identification of bioactive components in Sida cordata (Burm.f.) using gas chromatography–mass spectrometry*. Journal of Food Science and Technology. 2017
- Guerrero, R. V., Vargas, R. A., & Petricevich, V. L. *Chemical Compounds and Biological Activity of an Extract From Bougainvillea X Buttiana (Var. Rose) Holttum and Standl*. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 9(3), 42. 2017
- Hanani E. Analisis Fitokimia. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG; 2014.
- Harborne JB. *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, Edisi 2. Terjemahan: Padmawinata K dan Soediro I. Bandung: Penerbit ITB, 1987.
- Hussein, H. M., Hameed, I. H., & Ibraheem, O. A. *Antimicrobial activity and spectral chemical analysis of methanolic leaves extract of adiantum capillus-veneris using GC-MS and FT-IR spectroscopy*. International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 8(3), 369–385. 2016
- Juwita , lidya Irma momuat, & Julius pontoh. *Efektivitas Antioksidan dari Ekstrak Bunga Kasumba Turate (Carthamus tinctorius L.) dan Potensinya Sebagai Antihiperkolesterolemia*. Universita Sam ratulangi. Manado. 2021
- Kemenkes, R. *Farmakope Indonesia (VI)*. Kementrian Kesehatan RI. 2020
- Kemenag. (2014). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Khan, S. A., Khan, H., Ahmad, S., Rehman, F. U., Khan, A. A., & Khan, M. A. *GCMS characterization and biological potential of the seeds and aerial part of Galium tricorne Stokes*. Brazilian Journal of Biology. 2022
- Khanday S, & Sharma GD. *GC-MS analysis and antifeedant activity of Azaridiachta indica-leaf extract*. Stechnolock Plant Biology and Research. 2021
- Melappa, G. *In vitro antidiabetic activity of three fractions of methanol extracts of Loranthus micranthus, identification of phytoconstituents by GCMS and possible mechanism identified by GEMDOCK method*. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 2014
- Rini Hamsidi, Aty Widyawaruyanti, Achmad Fuad Hafid, Wiwied Ekasari, Muhammad Hajrul Mala, Henny Kasmawati, Nu Hillyin Akib, Wahyuni,Sabaruddin. *Profil Fitokimia Ekstrak Etanol Bunga Kasumba Turate (Carthamus tinctorius L.) yang Berpotensi Sebagai Antimalaria*. Universitas Airlangga. 2018


- Shihab, Q. *Tafsir AL-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. 2009
- Suri Antika, et al. *Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development*. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development, 9(1), 159–163. 2021
- Van Der Vossen, H.A.A.M., dan Wessel, M. *Plant Resources of South East Asia*. The Netherlands: Backhuys Publisher. 2001
- Voight, R., *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*, diterjemahkan oleh Soendari Noerono, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 566- 567.1995
- Wijayakusuma, H. M. *Ramuan Lengkap Herbal Sembuhkan Penyakit*. Pustaka Bunda. Jakarta. 2008
- Zhang, Mm, Chen, X., Hayat, K., Duhoranimana, E.,Zhang, X., Xia, S., Yu, J., Xing, F., *Characterization of odor-active compounds of chicken broth and improved flavor by thermal modulation in electrical stewpots*. Food Research International. 109:72-81. 2018

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan alur penelitian



Lampiran 2. Skema kerja penyiapan sampel




Lampiran 3. Skema kerja identifikasi golongan senyawa

a. Uji Alkaloid




b. Uji Flavonoid




c. Uji Saponin




d. Uji Tanin




e. Uji Terpenoid



f. Uji Fenol




Lampiran 4. Skema kerja identifikasi senyawa aktif ekstrak



Lampiran 5. Hasil gas chromatography- mass spectrometry (GC-MS)

Instrument:GCMS_UIN Sequence:Analysis GCMS 15112022

Page 1 of 20




Ret. Time: 1.439

Hit# 1
 Component: 2-Myristinoyl pantetheine
 SI: 688
 RSI: 704
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: Deoxyspergualin
 SI: 686
 RSI: 703
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: Tetraacetyl-d-xylopic nitrile
 SI: 678
 RSI: 751
 Library: mainlib




Ret. Time: 2.602

Hit# 1
 Component: D-Fructose, diethyl mercaptal, pentaacetate
 SI: 653
 RSI: 683
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: d-Mannose
 SI: 650
 RSI: 696
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: Adenosine, 4'-de(hydroxymethyl)-4'-[N-ethylaminoformyl]-
 SI: 620
 RSI: 636
 Library: mainlib



Ret. Time: 9.146

Hit# 1


Component: 12-Methyl-E,E-2,13-octadecadien-1-ol
 SI: 697
 RSI: 739
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: Undec-10-ynoic acid, undecyl ester
 SI: 672
 RSI: 723
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: Undec-10-ynoic acid, dodecyl ester
 SI: 665
 RSI: 712
 Library: mainlib



Ret. Time: 9.812

Hit# 1


Component: 2,4-Decadienal, (E,E)-
 SI: 884
 RSI: 912
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: 2,4-Decadienal, (E,Z)-
 SI: 881
 RSI: 942
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: 2,4-Decadienal
 SI: 848
 RSI: 923
 Library: mainlib




Ret. Time: 10.285

Hit# 1
Component: 2,4-Decadienal, (E,Z)-
SI: 897
RSI: 927
Library: mainlib

Hit# 2
Component: 2,4-Decadienal, (E,E)-
SI: 893
RSI: 900
Library: mainlib

Hit# 3
Component: 2,4-Decadienal
SI: 880
RSI: 918
Library: mainlib




Ret. Time: 10.863

Hit# 1
Component: Cholestan-3-ol, 2-methylene-, (3 β ,5 α)-
SI: 692
RSI: 744
Library: mainlib

Hit# 2
Component: Z,Z-4,16-Octadecadien-1-ol acetate
SI: 692
RSI: 711
Library: mainlib

Hit# 3
Component: 2-Pentadecyn-1-ol
SI: 690
RSI: 880
Library: mainlib




Ret. Time: 11.139

Hit# 1
 Component: 2-Undecenal
 SI: 764
 RSI: 870
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 2-Undecenal, E-
 SI: 760
 RSI: 864
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: (E)-Hexadec-2-enal
 SI: 746
 RSI: 840
 Library: mainlib




Ret. Time: 11.455

Hit# 1
 Component: Z,Z-4,16-Octadecadien-1-ol acetate
 SI: 685
 RSI: 700
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 12-Methyl-E,E-2,13-octadecadien-1-ol
 SI: 676
 RSI: 719
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: trans-Traumatic acid
 SI: 676
 RSI: 712
 Library: mainlib




Ret. Time: 13.472

Hit# 1
 Component: Limonen-6-ol, pivalate
 SI: 689
 RSI: 732
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 2-Oxazoline, 4,5-dihydro-5-(phenoxyethyl)-N-[(phenylamino)carbonyl]-
 SI: 637
 RSI: 672
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: 1-Hexadecanol, 2-methyl-
 SI: 636
 RSI: 653
 Library: mainlib




Ret. Time: 16.193

Hit# 1
 Component: 13-Heptadecyn-1-ol
 SI: 746
 RSI: 766
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: [1,1'-Bicyclopropyl]-2-octanoic acid, 2'-hexyl-, methyl ester
 SI: 734
 RSI: 785
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: Ethanol, 2-(9,12-octadecadienyloxy)-, (Z,Z)-
 SI: 719
 RSI: 727
 Library: mainlib




Ret. Time: 16.302

Hit# 1
 Component: 1-Hexadecanol, 2-methyl-
 SI: 741
 RSI: 755
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 7-Heptadecene, 17-chloro-
 SI: 727
 RSI: 756
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: Hexadecane, 1,1-bis(dodecyloxy)-
 SI: 726
 RSI: 731
 Library: mainlib




Ret. Time: 18.376

Hit# 1
 Component: 10-Heptadecen-8-ynoic acid, methyl ester, (E)-
 SI: 741
 RSI: 782
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 2-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)hexa-1,3,5-trienyl]
 SI: 719
 RSI: 726
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
 SI: 711
 RSI: 732
 Library: mainlib



Ret. Time: 19.798

Hit# 1


Component: Hexadecanoic acid, methyl ester
 SI: 842
 RSI: 867
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: Pentadecanoic acid, 14-methyl-, methyl ester
 SI: 806
 RSI: 858
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: Pentadecanoic acid, 13-methyl-, methyl ester
 SI: 769
 RSI: 782
 Library: mainlib



Ret. Time: 20.158

Hit# 1


Component: 6,9,12,15-Docosatetraenoic acid, methyl ester
 SI: 742
 RSI: 773
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: 10-Heptadecen-8-ynoic acid, methyl ester, (E)-
 SI: 740
 RSI: 792
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
 SI: 731
 RSI: 756
 Library: mainlib




Ret. Time: 20.284

Hit# 1
 Component: n-Hexadecanoic acid
 SI: 859
 RSI: 884
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: L-(+)-Ascorbic acid 2,6-dihexadecanoate
 SI: 809
 RSI: 811
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: Isopropyl palmitate
 SI: 766
 RSI: 771
 Library: mainlib




Ret. Time: 20.410

Hit# 1
 Component: Ethyl 9-hexadecenoate
 SI: 833
 RSI: 836
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: E-11-Hexadecenoic acid, ethyl ester
 SI: 814
 RSI: 879
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: 9-Hexadecenoic acid
 SI: 798
 RSI: 810
 Library: mainlib



Ret. Time: 20.682

Hit# 1


Component: Hexadecanoic acid, ethyl ester
 SI: 906
 RSI: 910
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: Pentadecanoic acid, ethyl ester
 SI: 807
 RSI: 869
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: Hexadecanoic acid, 2-methyl-, methyl ester
 SI: 800
 RSI: 835
 Library: mainlib



Ret. Time: 21.342

Hit# 1


Component: 1-Heptatriacotanol
 SI: 754
 RSI: 778
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: Ethyl iso-allocholate
 SI: 754
 RSI: 756
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: 9,10-Secochoila-5,7,10(19)-trien-24-al, 3-hydroxy-, (3S,5Z,7E)-
 SI: 694
 RSI: 776
 Library: mainlib




Ret. Time: 21.475

Hit# 1
 Component: 1,25-Dihydroxyvitamin D3, TMS derivative
 SI: 725
 RSI: 776
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: Hexadecanoic acid, 1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanedyl ester
 SI: 675
 RSI: 679
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: 9-Octadecenoic acid (Z)-, oxiranylmethyl ester
 SI: 665
 RSI: 711
 Library: mainlib




Ret. Time: 21.954

Hit# 1
 Component: 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)-
 SI: 789
 RSI: 822
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 7,10-Octadecadienoic acid, methyl ester
 SI: 788
 RSI: 835
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: 8,11-Octadecadienoic acid, methyl ester
 SI: 788
 RSI: 811
 Library: mainlib



Ret. Time: 22.039

Hit# 1


Component: trans-13-Octadecenoic acid, methyl ester
 SI: 909
 RSI: 914
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester
 SI: 903
 RSI: 907
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: cis-13-Octadecenoic acid, methyl ester
 SI: 900
 RSI: 904
 Library: mainlib



Ret. Time: 22.158

Hit# 1


Component: cis-Vaccenic acid
 SI: 736
 RSI: 771
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: 11-Octadecenoic acid, methyl ester
 SI: 736
 RSI: 767
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: trans-13-Octadecenoic acid
 SI: 734
 RSI: 771
 Library: mainlib



Ret. Time: 22.356

Hit# 1


Component: Heptadecanoic acid, 9-methyl-, methyl ester
 SI: 734
 RSI: 784
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: Heptadecanoic acid, 16-methyl-, methyl ester
 SI: 733
 RSI: 813
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: Cyclopropanepentanoic acid, 2-undecyl-, methyl ester, trans-
 SI: 721
 RSI: 743
 Library: mainlib



Ret. Time: 22.447

Hit# 1


Component: 10(E),12(Z)-Conjugated linoleic acid
 SI: 819
 RSI: 846
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: 9(E),11(E)-Conjugated linoleic acid
 SI: 816
 RSI: 849
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-
 SI: 811
 RSI: 823
 Library: mainlib




Ret. Time: 22.522

Hit# 1
 Component: cis-Vaccenic acid
 SI: 881
 RSI: 889
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: trans-13-Octadecenoic acid
 SI: 879
 RSI: 888
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: cis-13-Octadecenoic acid
 SI: 878
 RSI: 887
 Library: mainlib




Ret. Time: 22.583

Hit# 1
 Component: cis-Vaccenic acid
 SI: 840
 RSI: 857
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: trans-13-Octadecenoic acid
 SI: 839
 RSI: 856
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: cis-13-Octadecenoic acid
 SI: 833
 RSI: 851
 Library: mainlib




Ret. Time: 22.624

Hit# 1
 Component: trans-13-Octadecenoic acid
 SI: 816
 RSI: 836
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: cis-Vaccenic acid
 SI: 815
 RSI: 834
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: cis-13-Octadecenoic acid
 SI: 807
 RSI: 827
 Library: mainlib




Ret. Time: 22.757

Hit# 1
 Component: cis-Vaccenic acid
 SI: 794
 RSI: 818
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
 SI: 788
 RSI: 812
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: [1,1'-Bicyclopropyl]-2-octanoic acid, 2'-hexyl-, methyl ester
 SI: 787
 RSI: 855
 Library: mainlib



Ret. Time: 22.835

Hit# 1


Component: (E)-9-Octadecenoic acid ethyl ester
 SI: 883
 RSI: 914
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: Ethyl Oleate
 SI: 849
 RSI: 859
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: cis-9-Octadecenoic acid, propyl ester
 SI: 843
 RSI: 857
 Library: mainlib



Ret. Time: 22.907

Hit# 1


Component: cis-Vaccenic acid
 SI: 828
 RSI: 845
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: trans-13-Octadecenoic acid
 SI: 827
 RSI: 846
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: cis-13-Octadecenoic acid
 SI: 827
 RSI: 846
 Library: mainlib



Ret. Time: 23.145

Hit# 1


Component: (E)-9-Octadecenoic acid ethyl ester
 SI: 711
 RSI: 791
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: Ethyl 14-methyl-hexadecanoate
 SI: 710
 RSI: 792
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: Ethyl 9-hexadecenoate
 SI: 700
 RSI: 723
 Library: mainlib



Ret. Time: 23.825

Hit# 1


Component: Hexadecanoic acid, 1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl ester
 SI: 750
 RSI: 752
 Library: mainlib

Hit# 2

Component: 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,24,25-triol (3R,5Z,7E)-
 SI: 726
 RSI: 762
 Library: mainlib

Hit# 3

Component: Z-(13,14-Epoxy)tetradec-11-en-1-ol acetate
 SI: 726
 RSI: 760
 Library: mainlib




Ret. Time: 24.352

Hit# 1
 Component: Ethyl iso-allocholate
 SI: 751
 RSI: 753
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 1-Heptatriacotanol
 SI: 741
 RSI: 766
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: Hexadecanoic acid, 1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl ester
 SI: 732
 RSI: 735
 Library: mainlib




Ret. Time: 25.124

Hit# 1
 Component: 9-Octadecenoic acid (Z)-, oxiranylmethyl ester
 SI: 694
 RSI: 741
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 12-Methyl-E,E-2,13-octadecadien-1-ol
 SI: 688
 RSI: 773
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: Glycidyl (Z)-9-Heptadecenoate
 SI: 685
 RSI: 729
 Library: mainlib




Ret. Time: 25.855

Hit# 1
 Component: Ethyl iso-allocholate
 SI: 751
 RSI: 754
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
 SI: 745
 RSI: 791
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: 1-Heptatriacotanol
 SI: 739
 RSI: 770
 Library: mainlib




Ret. Time: 26.433

Hit# 1
 Component: Ethyl iso-allocholate
 SI: 767
 RSI: 773
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 1-Heptatriacotanol
 SI: 734
 RSI: 776
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: 6,9,12,15-Docosatetraenoic acid, methyl ester
 SI: 721
 RSI: 783
 Library: mainlib




Ret. Time: 26.498

Hit# 1
 Component: Ethyl iso-allocholate
 SI: 763
 RSI: 767
 Library: mainlib

Hit# 2
 Component: 9-Octadecenoic acid (Z)-, oxiranylmethyl ester
 SI: 749
 RSI: 796
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: 1-Heptatriacotanol
 SI: 741
 RSI: 779
 Library: mainlib




Ret. Time: 27.039

Hit# 1
 Component: Ethyl iso-allocholate
 SI: 768
 RSI: 775
 Library: mainlib


Hit# 2
 Component: 1-Heptatriacotanol
 SI: 726
 RSI: 771
 Library: mainlib

Hit# 3
 Component: 9-Octadecenoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, (E,E,E)-
 SI: 692
 RSI: 708
 Library: mainlib



Lampiran 6. Gambar pengamatan

a. Ekstraksi Sampel



Keterangan:

- (a) simplisia kasumba turate
- (b) sampel dimaserasi
- (c) penyaringan sampel
- (e) sampel dirotav
- (d) pengeringan ekstrak sampel
- (f) penimbangan ekstrak

b. Identifikasi Golongan Senyawa



(a)

(b)

(c)

(d)



(e)

(f)

(g)

Keterangan:

(a) ekstrak kental ditimbang

(b) hasil uji alkaloid

(c) hasil uji flavonoid

(d) hasil uji saponin

(e) hasil uji tanin

(f) hasil uji terpenoid

(g) hasil uji fenol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LAUDDIN
MAKASSAR

c. Identifikasi Senyawa Aktif Ekstrak



(a)




(b)



(c)



(d)



(e)

Keterangan:

- (a) sampel dipreparasi
- (b) pengaktifan perangkat Gc-MS
- (c) sampel diinjeksikan
- (d) sampel diidentifikasi
- (e) hasil data sampel

Lampiran 7. Hasil turnitin

Skripsi Azih syakur

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	7%
2	digilib.unhas.ac.id Internet Source	2%
3	adoc.pub Internet Source	1%
4	docobook.com Internet Source	1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
6	dspace.hangtuah.ac.id:8080 Internet Source	1%
7	fr.slideserve.com Internet Source	<1%
8	Juwita Wita Yasir, Lidya Irma Momuat, Julius Pontoh. "Efektivitas Antioksidan dari Ekstrak Bunga Kasumba Turate (<i>Carthamus tinctorius</i> L.) dan Potensinya Sebagai	<1%

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Azih syakur Indriani Umat atau biasa dipanggil Azih, lahir di Takalar pada tanggal 19 maret 1997. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Muh. Ramli dg. Nawang dan ibu St. Sahawiyah. Pada tahun 2003 penulis mulai memasuki jenjang sekolah dasar yaitu di SDN No. 22 Cakura selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan kesekolah menengah pertama yaitu di SMPN 5 takalar selesai tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang menengah atas di SMAN 02 Takalar, selesai pada tahun 2015. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama menempuh pendidikan strata I di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis pernah aktif dalam lembaga intra yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) Black panther.

Prinsip hidup dan menjadi salah satu motivasi bagi penulis adalah “yakin dan percaya sesulit apapun keadaanmu hari ini pasti akan terlewati karena Allah SWT. tidak akan memberikan ujian melampaui batas kemampuan umatnya”.