

**Analisis Efektifitas Penggunaan Antibiotik terhadap Perbaikan Klinis
Pasien Demam Tifoid Anak pada Rawat Inap di RSUD Syekh Yusuf**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

NURUL MUTHIA MURSALIM

NIM : 70100120017



**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Muthia Mursalim

Nim : 70100120017

Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 27 April 2002

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jln. Barawaja 1 No. 1

Judul : Analisis Efektifitas Penggunaan Antibiotik terhadap Perbaikan Klinis Pasien Demam Tifoid Anak pada Rawat Inap di RSUD Syekh Yusuf

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 2 Juli 2024

Peneliti,

Nurul Muthia Mursalim

NIM. 70100120017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Efektifitas Penggunaan Antibiotik terhadap Perbaikan Klinis Pasien Demam Tifoid Anak di RSUD Syekh Yusuf"** yang disusun oleh Nurul Muthia Mursalim NIM. 70100120017, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi (munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 31 Juli 2024** yang bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

GOWA, 31 JULI 2024
25 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI

Nomor SK: B.3423/Un.06.1/FKIK/PP.00.9/07/2024

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M Kes.

Sekretaris : Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M. Si

DEWAN PENGUJI

Dr. Wahyuddin G, M.Ag.

apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si

apt. Khaerani, S.Farm, M.Farm.Klin

apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, shalawat menyertai salam tak henti-hentinya penulis curahkan pada Nabi Muhammad saw.

Judul skripsi yang penulis jadikan penelitian yaitu "Analisis Efektifitas Penggunaan Antibiotik terhadap Perbaikan Klinis Pasien Demam Tifoid Anak di RSUD Syekh Yusuf". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

Selama menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan, motivasi, arahan, saran dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sangat tulus, penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mursalim dan Ibunda Nirwana, serta kakak-kakakku atas dukungan, motivasi dan doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Pada penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku wakil rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Dr. H. Andi , Aderus, Lc., M.Ag. selaku wakil rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

4. Prof. Dr. H. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd selaku wakil rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Prof. H. Muhammad Amry, Lc., M.Ag selaku wakil rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Fais Sutranegara SKM., Mars, Selaku Wakil Dekan II dan ibu Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. apt. Muh. Rusdi, S.Si.,M.Si selaku ketua jurusan farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
9. apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm. Klin. selaku Sekretaris jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku Pembimbing I serta Pembimbing Akademik, terima kasih atas dedikasi dan bimbingan yang tulus yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga atas motivasi dan waktu yang telah Bapak luangkan dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
10. apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm selaku Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, dukungan, saran, dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini.
11. apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si. selaku Penguji Kompetensi terima kasih atas masukan, saran, dan kritik yang telah diberikan demi membantu penulis mencapai kesempurnaan dalam skripsi ini

12. Bapak/Ibu dosen Jurusan Farmasi yang terhormat, terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan yang Bapak/Ibu berikan dalam penyusunan skripsi ini
13. Saudara (i) angkatan 2020 (XENON), terima kasih karena terus membersamai, memberikan semangat serta terus melangkah bersama-sama hingga akhir.
14. SUPPOGIRLS teman-teman dekat saya yang telah memberikan banyak pelajaran, dukungan, serta tetap berada di sisi penulis dalam situasi apapun. Terima kasih atas waktunya selama ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterbatasan penulis, oleh karena itu, penulis menerima dengan senang hati segala saran, kritik, dan masukan yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang farmasi dan bernilai disisi Allah swt. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 2 Juli 2024


Penulis

Nurul Muthia Mursalim

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Demam Tifoid	10
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Demam Tifoid.....	16
C. Tanda dan Gejala	18
D. Pemeriksaan Laboratorium	20
E. Tata Laksana Terapi.....	24
F. Tinjauan Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Instrumen Penelitian	41
G. Variabel Penelitian.....	41
H. Alur Penelitian.....	42
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
J. Skema Alur Penelitian	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekomendasi Antibiotik Untuk Demam Tifoid Oleh The National Institute For Communicable Diseases (NICD, 2022).....	27
Tabel 2. Rekomendasi Terapi Untuk Demam Tifoid Dengan Risiko Rendah Terhadap Resistensi Fluorokuinolon (WHO, 2022).	28
Tabel 3. Rekomendasi Terapi Untuk Demam Tifoid Anak Dengan Risiko Yang Tinggi Terhadap Resistensi Fluorokuinolon (WHO, 2022).	28
Tabel 4. Guideline Tatalaksana Terapi Oleh British Infection Association Guidelines Tahun 2022 (Nabarro Et Al., 2022).....	28
Tabel 5. Pilihan Antibiotik Untuk Terapi Demam Tifoid Anak (Peraturan Menteri Kesehatan Ri, 2021).....	29
Tabel 6. Pilihan Antibiotik Untuk Demam Tifoid Anak (Dyson Et Al., 2019)...	30
Tabel 7. Karakteristik Pasien (World Health Organization, 2018).	45
Tabel 8. Gambaran Gejala Klinis Pasien	46
Tabel 9. Persentase Pemberian Antibiotik Pada Pasien Anak Demam Tifoid Di RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	47
Tabel 10. Hasil Uji Paired Sample T-Test Untuk Gejala Klinis Pasien.	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Salinan Rekam Medik.....	67
Lampiran 2. Lembar Penilaian Perbaikan Klinis Pasien.....	68
Lampiran 3. Hasil Uji Paired Sample T-Test.....	69
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Provinsi Sulawesi Selatan	71
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Kab. Gowa.....	72
Lampiran 6. Kode Etik.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Patofisiologi Demam Tifoid.....15



ABSTRAK

Nama : Nurul Muthia Mursalim
NIM : 70100120017
Judul : Analisis Efektifitas Penggunaan Antibiotik terhadap Perbaikan Klinis Pasien Demam Tifoid Anak pada Rawat Inap di RSUD Syeikh Yusuf

Demam tifoid merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* dan menginfeksi sistem pencernaan hingga sistemik dengan tanda dan gejala seperti demam, sakit kepala, mual, dan gejala toksisitas lainnya. Dalam pengobatannya, demam tifoid menjadikan antibiotik sebagai terapi utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik pada pasien anak demam tifoid dan pengaruh pemberian antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien yang dirawat di instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf. Penelitian ini menggunakan data retrospektif kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Data yang digunakan adalah data rekam medik pasien demam tifoid anak periode Januari 2023-Desember 2023 tanpa adanya penyakit infeksi lainnya dan mendapatkan terapi antibiotik. Sampel yang digunakan sebanyak 74 data pasien yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian ini menunjukkan antibiotik yang paling banyak digunakan dalam tatalaksana demam tifoid anak di RSUD Syekh Yusuf adalah Seftriakson (73%) kemudian diikuti oleh Sefotaksim (15%), Sefiksim (9%), dan Kloramfenikol (3%). Penggunaan antibiotik memberikan perubahan yang signifikan ($p < 0,05$) terhadap perbaikan klinis pasien termasuk di dalamnya suhu, laju pernapasan, gangguan pencernaan, serta mual dan muntah

Kata Kunci : demam, tifoid, anak, antibiotik, perbaikan klinis



ABSTRACT

Name : Nurul Muthia Mursalim
NIM : 70100120017
Title : *Analysis of the Effectiveness of Antibiotic Use on Clinical Improvement of Typhoid Fever Patients in Hospitalization at RSUD Syeikh Yusuf*

Typhoid fever is a disease caused by Salmonella typhi bacteria and infects the digestive system to the systemic with signs and symptoms such as fever, headache, nausea, and other symptoms of toxicity. In its treatment, typhoid fever makes antibiotics the main therapy. The purpose of this study was to determine the description of antibiotic use in typhoid fever pediatric patients and the effect of antibiotic administration on the clinical improvement of patients treated at the inpatient installation of Sheikh Yusuf Hospital. This study used retrospective data and then analyzed using SPSS. The data used were medical record data of pediatric typhoid fever patients for the period January 2023-December 2023 without other infectious diseases and received antibiotic therapy. The sample used was 74 patient data that met the criteria. The results of this study showed that the most widely used antibiotic in the management of pediatric typhoid fever at Sheikh Yusuf Hospital was Ceftriaxone (73%) followed by Cefotaxime (15%), Cefixime (9%), and Chloramphenicol (3%). The use of antibiotics gave significant changes to the clinical improvement of patients ($p < 0,05$) including temperature, respiratory rate, indigestion, and nausea and vomiting

Keywords: *typhoid, fever, child, antibiotics, improvement clinical*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara beriklim tropis sehingga penyakit tropis sangat mudah berkembang yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Salah satu jenis penyakit yaitu demam tifoid atau *typhoid fever* (Mustofa, Rafie, & Megamelina, 2020). Demam tifoid atau dikenal dengan istilah tifus ialah penyakit yang ditandai dengan demam yang berlangsung lama karena adanya infeksi bakteri *Salmonella typhi*, bakteri ini menyebabkan infeksi sistemik dengan tanda dan gejala lain seperti adanya bakteremia disertai inflamasi yang dapat merusak usus dan organ-organ hati (Ardiaria, 2019).

WHO menyatakan bahwa demam tifoid ini adalah salah satu penyakit yang paling tinggi tingkat mortalitas dan morbiditasnya yaitu terdapat sekitar 11-21 juta kasus dengan 161.000 kasus kematian dalam setiap tahunnya yang sebagian besar terjadi di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Sub-Sahara (World Health Organization, 2018). WHO juga mencatat bahwa di tahun 2019 diperkirakan terdapat 9 juta kasus demam tifoid yang terjadi dan terdapat 110.000 orang yang meninggal serta risiko terjadinya paling tinggi pada anak-anak (World Health Organization, 2023).

Demam tifoid di Indonesia termasuk penyakit yang bersifat endemik dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Berdasarkan hasil data di rumah sakit besar yang ada di Indonesia, kasus tifoid ini menunjukkan kecenderungan naik di setiap tahunnya dengan angka rata-rata 500/100.000 penduduk dan angka kematian sekitar 0,6-5%. Masalah ini tentunya harus mendapat perhatian lebih karena permasalahannya yang semakin kompleks dan membuat upaya pengobatan dan pencegahannya semakin sulit

(Kemenkes, 2018). Adapun berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi penyakit demam tifoid di Indonesia mencapai 1,7%. Penyakit ini menyerang semua jenis usia dan distribusi prevalensi tertingginya adalah pada anak-anak usia 5-14 tahun dengan angka 1,9%, usia 1-4 tahun dengan angka 1,6%, usia 15-24 tahun dengan angka 1,5% dan usia <1 tahun dengan angka 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak merupakan populasi penderita tifoid tertinggi di Indonesia (Gunawan et al., 2022).

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 1.049 kasus anak terjangkit demam tifoid kemudian di tahun 2018 menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Selatan mencatat terdapat 1.172 kasus anak yang menderita demam tifoid. Selanjutnya di tahun 2019 penyakit demam tifoid bertambah dimana tercatat sebanyak 23.271 orang terkena penyakit ini, diantaranya yaitu laki-laki sebanyak 11.723 orang dan Perempuan sebanyak 11.548 orang dan yang bergejala (suspek demam tifoid) sebanyak 16.743 penderita yaitu laki-laki sebanyak 7.925 dan Perempuan sebanyak 8.818 orang. Berdasarkan data di lapangan penyakit demam tifoid meningkat dalam setiap tahun khususnya di 5 tahun terakhir. Demam tifoid sendiri disebabkan karena faktor lingkungan seperti perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (Husna, 2020).

Gejala klinis dari demam tifoid dapat berupa demam yang terjadi di sore hari atau malam hari, dimana tipe demam dari tifoid adalah demam yang kenaikan suhunya lambat atau bertahap (*step ladder*), malaise, nyeri perut dan konstipasi. Untuk data laboratorium dari pasien demam tifoid akan ditemukan jumlah leukositnya rendah atau leukopenia, ada juga laporan yang mengatakan jika leukositnya normal ditemukan eosinophilia dan monositosis pada hitung

jenis leukosit, menurunnya kadar hemoglobin dan trombositopenia ringan (Khairunnisa et al., 2020).

Terapi awal sebagai langkah penanganan demam tifoid dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Di daerah endemik seperti Indonesia 60 sampai 90 % kasus demam tifoid dapat ditangani dengan pemberian antibiotik dan istirahat di rumah (Levani & Prastya, 2020). Demam tifoid dapat diterapi menggunakan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional memberikan dampak yang efektif dari segi biaya dengan peningkatan efek terapeutik klinis, meminimalkan toksisitas obat dan meminimalkan terjadinya resistensi (Kemenkes RI, 2021).

Namun, penatalaksanaan demam tifoid menggunakan antibiotik semakin kompleks karena adanya resistensi bakteri terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik sendiri adalah keadaan ketika mikroorganisme sudah mampu bertahan terhadap efek pemberian antibiotik, dengan cara mendapatkan gen resisten melalui mutasi atau transfer gen antar bakteri yang spesiesnya sama (Sukertiasih et al., 2021).

Resistensi antibiotik disebabkan oleh banyaknya pasien yang seringkali mengobati diri sendiri dengan antibiotik yang tidak rasional karena pasien gampang mendapatkan antibiotik bahkan tanpa adanya resep dari dokter. Selain itu, ada juga pasien yang telah meminum resep sesuai resep dokter tapi tidak menghabiskan antibiotik yang diberikan oleh dokter sehingga banyak kasus pasien tidak sembuh bahkan setelah meminum antibiotik (Sukma et al., 2023).

Strain *Salmonella typhi* yang resisten terhadap beberapa antibiotik menjadi ancaman baru dalam keberhasilan terapi demam tifoid. Resistensi *Salmonella typhi* terhadap antibiotik dapat berdampak pada pemburukan

kondisi klinis pasien yang berkepanjangan, terjadinya pembesaran limfa dan hati, serta peningkatan angka mortalitas (Sanjaya et al., 2022). Terdapat beberapa kasus resistensi antibiotik yang terjadi pada pasien demam tifoid di Kota Makassar sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ismail di tahun 2019 ditemukan ada lebih dari 50% pasien demam tifoid resisten dengan jenis antibiotik sulfametoksazol dan terdapat beberapa lainnya yang resisten dengan antibiotik amoksisilin, tetrasiklin, dan Kloramfenikol sensitifitasnya di atas 50% (Rahman, 2019).

Menurut laporan dari pihak rekam medik RSUD Syekh Yusuf demam tifoid termasuk penyakit infeksi yang tinggi angka kejadiannya yaitu pada urutan kedua. Oleh karena itu peneliti melakukan evaluasi efektifitas penggunaan antibiotik terhadap perbaikan klinis pada pasien anak dengan demam tifoid yang berada di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan melihat penggunaan jenis antibiotik yang diberikan kepada pasien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran penggunaan antibiotik pada pasien tifoid anak yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa?
2. Bagaimana efektifitas antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien tifoid anak yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional
 - a. Efektifitas adalah keberhasilan pemberian antibiotik terhadap perbaikan gejala klinis pasien anak RSUD Syekh Yusuf Gowa

- b. Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* yang menyerang bagian pencernaan
- c. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi*
- d. Perbaikan Klinis adalah perbaikan suhu, laju pernapasan, GCS (*Glow Coma Scale*), gangguan pencernaan, dan gejala mual muntah.
- e. Pasien anak adalah pasien rawat inap yang terkena demam tifoid yang berumur 0 -18 tahun di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- f. Rawat Inap adalah pasien yang mendapatkan perawatan opname atau diinapkan di rumah sakit RSUD Syekh Yusuf Gowa

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental dengan melakukan pengambilan data dari rekam medik pasien secara deskriptif.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian dengan judul “Profil Pemberian antibiotik dan Perbaikan Klinis Demam pada Pasien Anak dengan demam Tifoid di RSUP Sanglah Denpasar” yang dilakukan oleh Putu Bihan et al pada tahun 2020 dengan menggunakan jenis penelitian analitik potong lintang atau analitik *cross-sectional*, peneliti mencari hubungan antara variabel terkait dengan melakukan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali pada sampel. Sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh pasien infeksi demam tifoid anak yang dirawat di RSUP Sanglah Denpasar periode 1 Maret 2015- 29 Februari 2016 yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah 46 orang. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perbaikan klinis dari pasien yakni turunnya suhu badan pasien yang menggunakan

antibiotik kloramfenikol perlu waktu 6 ± 1 hari, rerata lama perbaikan klinis demam menggunakan antibiotik seftriakson adalah 5 ± 1 hari, rerata lama perbaikan klinis demam menggunakan antibiotik ampisilin adalah 6 ± 1 hari dan rerata lama perbaikan klinis demam menggunakan antibiotik *Sefiksim* adalah 5 ± 2 hari (Kinanta et al., 2020). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan keefektifitasan antibiotik terhadap demam tifoid yaitu dengan perbaikan klinis pasien seperti demam.

2. Penelitian dengan judul “Evaluasi Pemberian Antibiotik pada Pasien Demam Tifoid di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Azra Kota Bogor” yang dilakukan oleh Dewi Oktavia et al tahun 2020 dengan penelitian observasional non eksperimental yang bersifat deskriptif dengan pendekatan retrospektif dengan menilai efektifitas antibiotik yang digunakan pasien. Sampel penelitian ini adalah semua pasien yang terdiagnosis tifoid dan menjalani pengobatan dengan antibiotik di Instalasi rawat inap Rumah Sakit Azra Kota Bogor tahun 2018 yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel sebanyak 80 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penggunaan antibiotik terdapat perbaikan klinis yakni pasien yang suhu tubuhnya normal ada 7% dan setelahnya berubah menjadi 94%, kemudian untuk kesadaran pada sebelum terapi pasien yang tingkat kesadarannya normal terdapat 69% yang kemudian berubah menjadi 100% setelah terapi, selanjutnya pasien dengan gejala mual muntah sebelum terapi terdapat 2% yang normal dan setelah terapi didapatkan 100% (Oktavia et al., 2020). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa indikator keefektifan penggunaan antibiotik memberikan perbaikan klinis pada

pasien demam tifoid seperti perbaikan kesadaran, suhu tubuh dan hilangnya gejala mual dan muntah.

3. Penelitian dengan judul “Profil Penggunaan Antibiotik pada Pasien Demam Tifoid di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB” yang dilakukan oleh Pradiningsih et al pada tahun 2021 dengan jenis penelitian observasional deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif dengan populasi sampel adalah semua pasien demam tifoid pada periode Mei-Juni 2019. Sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi peneliti. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perbaikan klinis pasien khususnya untuk suhu badan terjadi perbaikan dengan lama perawatan 2 dan 3 hari merupakan persentase perawatan paling banyak (23,4%). Lama perawatan 1 hari merupakan lama perawatan yang paling cepat (10,3%) dan lama perawatan 7 hari merupakan lama perawatan yang paling lama (10,0%). Antibiotik yang digunakan selama terapi ini adalah levofloksasin dan setfriakson (Pradiningsih et al., 2021). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasien tifoid setelah diberikan antibiotik dapat dilihat dari perbaikan klinis khususnya pada suhu badan dengan rentang waktu yang berbeda.
4. Penelitian dengan judul “Perbandingan Efektivitas Antibiotik Golongan Sefalosporin Generasi Ketiga pada Pasien Demam Tifoid di Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017” yang dilakukan Sunaryani et al pada tahun 2019 dengan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan secara retrospektif yang dinilai dari penggunaan antibiotik, lama rawat inap dan kondisi pasien saat keluar rumah sakit. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien demam tifoid yang menjalani rawat inap di RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017 dengan

sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi peneliti. Hasil penelitian menunjukkan dari 77 rekam medik pasien diperoleh rentang suhu tubuh pada saat awal masuk pasien yaitu 36°C-40,5°C. Untuk pasien yang menggunakan Sefoperazon memiliki rata-rata suhu *baseline* sebesar 37,86°C, rata-rata suhu turun sebesar 36,69°C dan rata-rata suhu hilang demam sebesar 36,50°C. Untuk pasien yang menggunakan sefotaksim memiliki rata-rata suhu *baseline* sebesar 37,97°C rata-rata suhu turun sebesar 36,63°C dan rata-rata suhu hilang demam sebesar 36,42°C. Untuk pasien yang menggunakan seftriakson memiliki rata-rata suhu *tubuh baseline* sebesar 37,75°C dan rata-rata suhu turun sebesar 36,52°C dan rata-rata suhu hilang demam sebesar 36,92°C (Sunaryani et al., 2019). Dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa indikator keefektifan penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid dapat dilihat dari perbaikan klinis pasien seperti suhu badan saat masuk rumah sakit yang semakin membaik (*baseline*) dibandingkan ketika setelah menerima terapi antibiotik.

5. Penelitian dengan judul “efektifitas Antibiotik Pasien Demam Tifoid RSUP Dr. M Djamil Padang” yang dilakukan oleh Rahmawati et al pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi atau pengumpulan data, adapun jenis data yang diambil adalah data pasien retrospektif berupa rekam medik. Populasi adalah seluruh pasien demam tifoid pada tahun 2012 dan data pasien selama 4 bulan ketika dilakukan penelitian. Sampel yang digunakan adalah pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian antibiotik dapat menurunkan suhu demam pasien yang awalnya dengan rata-rata 38,8°C menjadi 36,4°C (Rahmawati et al.,

2019). Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbaikan klinis pasien seperti perbaikan suhu dapat dijadikan acuan sebagai keefektifitasan penggunaan antibiotik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid anak yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa
2. Untuk mengetahui efektifitas antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien demam tifoid anak yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait gambaran penggunaan antibiotik yang efektif untuk pasien anak dengan demam tifoid.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait efektifitas penggunaan obat yang telah terlaksana di RSUD Syekh Yusuf serta sebagai kajian untuk memperhatikan penggunaan obat antibiotik khususnya untuk pasien anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demam Tifoid

1. Definisi

Demam tifoid atau demam enterik adalah yang paling parah dibandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh bakteri jenis *Salmonellosis* lainnya. Sedangkan, sindrom yang kurang parah dikenal sebagai demam paratifoid, disebabkan oleh *S. paratyphi* A dan C. Demam tifoid merupakan penyakit serius, ditandai dengan gejala klinis demam, lemah, sakit kepala, dan manifestasi gastrointestinal yang meliputi nyeri perut difus dan konstipasi atau diare (Joegijantoro, 2019).

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi yang menyerang sistem pencernaan tepatnya pada usus halus (*Peyer's patch*) dimana penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* (Levani & Prastya, 2020). Penularannya dapat melalui fekal dan oral yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, timbulnya penyakit ini juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti sanitasi dan *hygiene* yang buruk (Mustofa, Rafie, & Salsabilla, 2020).

Demam tifoid, juga dikenal sebagai tifus, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi*. Penyakit ini umumnya terkait dengan kontaminasi air dan makanan yang terinfeksi. Demam tifoid memiliki ciri-ciri seperti demam tinggi, sakit kepala, mual, dan gangguan pencernaan (WHO, 2023).

Demam tifoid adalah suatu penyakit infeksi sistemik bersifat akut yang disebabkan oleh *Salmonella typhi*. Penyakit ini ditandai oleh panas berkepanjangan, ditopang dengan bakteremia tanpa keterlibatan struktur

endotelial atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit mononuklear dari hati, limpa, kelenjar limfe usus dan *Peyer's patch* (IDAI, 2013)

Demam tifoid merupakan penyakit demam akut akibat infeksi oleh *Salmonella typhi*. *Salmonella typhi* disebarkan melalui rute fakte-oral dan menyerang usus. Penularannya dapat dari berbagai cara seperti makanan, jari tangan atau kuku, muntah, lalat dan tinja (Prehamukti, 2018).

2. Epidemiologi

Demam tifoid adalah infeksi yang disebabkan oleh *Salmonella typhi* yang terjadi di daerah endemik dan menyerang di segala usia khususnya anak-anak. WHO memperkirakan terdapat sekitar 11-20 juta kasus yang terjadi di seluruh dunia dan mengakibatkan kematian sekitar 128.000-161.000 di setiap tahun khususnya di daerah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara (World Health Organization, 2018).

Demam tifoid yang disebabkan oleh *Salmonella typhi* ini termasuk tinggi prevalensinya dimana diperkirakan terdapat 17 juta kasus penyakit demam tifoid terjadi secara global khususnya di daerah endemik seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika sub-Sahara, dengan beban dan insiden terbesar yang terjadi di Asia Selatan dengan kasus kematian sekitar 178.000 di tahun 2015 (Ardiaria, 2019).

Di Indonesia demam tifoid sendiri banyak ditemukan di kota-kota besar. Kasus demam tifoid di Indonesia berkisar 350-810 kasus per 1.000 penduduk dan berada pada urutan ke-5 sebagai penyakit menular yang paling banyak terjadi di kalangan semua umur dengan prevalensi sebesar 6% selain itu juga menjadi penyebab kematian di semua umur di Indonesia urutan ke-15 dengan prevalensi 1,6%. Sebagian besar kejadian ini terjadi pada anak-anak

akibat buruknya sanitasi dan *hygiene* di lingkungannya (Khairunnisa et al., 2020).

Prevalensi nasional Tifoid (berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keluhan responden adalah 1,60%. Sebanyak 14 provinsi mempunyai prevalensi Tifoid di atas prevalensi nasional, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat dan Papua (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

3. Etiologi

Demam tifoid disebabkan oleh *Salmonella typhi*. Bakteri ini adalah jenis gram negatif, memiliki flagela, bersifat anaerobik fakultatif, tidak berspora, mampu menginvasi, hidup, dan mampu berkembang biak di dalam sel kariotik. Selain itu, bakteri ini memiliki beberapa antigen, termasuk antigen O, antigen H, antigen Vi, dan Outer Membran Protein terutama porin OMP. Antigen O adalah bagian somatik yang terletak di lapisan luar tubuh bakteri dengan struktur kimia berupa lipopolisakarida. Antigen ini memiliki ketahanan terhadap pemanasan pada suhu 100°C selama 2-5 jam, alkohol, dan asam encer (Marzalina, 2019).

Demam tifoid adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Salmonella typhi* penularannya dapat terjadi melalui air liur atau makanan yang terkontaminasi urin dan feses penderita tifoid, seperti air yang digunakan untuk memasak dan mencuci tangan. Demam tifoid juga erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan khususnya sanitasi dan higienitas perorangan, higienitas makanan, lingkungan yang kotor, tempat umum yang tidak

mendukung hidup sehat. Contohnya personal *hygiene* yaitu dapat terkontaminasi melalui tangan (Masyrofah et al., 2023).

Salmonella typhi sama dengan *Salmonella* yang lain adalah bakteri Gram-negatif, mempunyai flagela, tidak berkapsul, tidak membentuk spora, fakultatif anaerob. Mempunyai antigen somatik (O) yang terdiri dari oligosakarida, flagelar antigen (H) yang terdiri dari protein dan emeispe antigen (K) yang terdiri dari polisakarida. Mempunyai makromolekular popolisakarida kompleks yang membentuk lapis luar dari dinding sel dan dinamakan enditoksin, *Salmonella typhi* juga dapat memperoleh plasmid faktor-R yang berkaitan dengan resistensi terhadap multipel antibiotik (IDAI, 2013).

4. Patofisiologi

Demam tifoid disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* atau *Salmonella paratyphi*. *Salmonella typhi* adalah basil gram negatif anaerobik fakultatif. Bakteri *Salmonella* masuk ke dalam tubuh melalui mulut bersama makanan atau minuman yang terkontaminasi. Beberapa bakteri dihancurkan di lambung oleh asam lambung. Beberapa bakteri *Salmonella* yang lolos segera masuk ke usus halus, terutama ileum dan jejunum, untuk berkembang biak. Ketika sistem imun humoral mukosa (IgA) tidak lagi merespon dengan baik, bakteri menyerang sel epitel usus kecil (terutama sel M) dan Lamina propria. Di lamina propria, makrofag memfagosit bakteri. Bakteri yang lolos dapat berkembang biak di makrofag dan memasuki aliran darah (Levani & Prastya, 2020).


(Bakteremia I). Masa inkubasi bakteremia I diperkirakan 7-14 hari. Bakteri *Salmonella* juga dapat menyerang bagian usus yang disebut pembawa plak. Setelah menyerang plak hati, bakteri dapat bermigrasi ke kelenjar getah

bening usus dan aliran getah bening mesenterika, dan beberapa bakteri melewati sistem retikuloendotelial hati dan limpa. Pada tahap ini, bakteri juga melewati hati dan limpa. Di hati dan limpa, bakteri meninggalkan makrofag, yang kemudian berkembang biak di sinusoid hati. Setelah keluar dari hati, bakteri masuk ke aliran darah untuk kedua kalinya (bakteremia II) (Levani & Prasty, 2020).

Selama bakteremia II terjadi, makrofag mengalami hiperaktivasi, dan ketika makrofag memfagosit bakteri, mediator inflamasi dilepaskan, salah satunya adalah sitokin. Pelepasan sitokin inilah yang menyebabkan demam, malaise, nyeri otot, sakit kepala dan gejala toksisitas. (Levani & Prasty, 2020).

Secara singkat, penyakit demam tifoid dimulai ketika *Salmonella typhi* masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Beberapa bakteri dihancurkan oleh asam lambung dan beberapa masuk ke usus kecil, mencapai jaringan limfoid pada patch *Peyer* di ileum terminal hipertrofik. *Salmonella typhi* mempunyai fimbriae khusus yang dapat menempel pada lapisan epitel *patch Peyer*, memungkinkan bakteri untuk difagositosis. Setelah menempel, bakteri menghasilkan protein yang mengganggu batas sikat usus dan memaksa sel-sel usus membentuk lipatan membran yang menutupi bakteri dalam vesikel. Bakteri dalam vesikel melewati sitoplasma sel usus dan dipresentasikan ke makrofag. Setelah mencapai kelenjar getah bening mesenterika, bakteri memasuki aliran darah melalui saluran toraks, menyebabkan bakteremia asimtomatik pertama. *Salmonella typhi* juga bersarang di sistem retikuloendotelial, terutama di hati dan kelenjar getah bening, tempat bakteri keluar dari sel fagosit, berkembang biak, dan masuk kembali ke aliran darah, menghasilkan bakteremia lain dengan gejala sistemik. *Salmonella typhi* menimbulkan gejala endotoksin yang

berperan dalam peradangan jaringan lokal tempat bakteri berkembang biak, merangsang pelepasan pirogen dan leukosit jaringan, sehingga menimbulkan demam dan gejala sistemik lainnya (Marzalina, 2019).



Gambar 1. Patofisiologi Demam Tifoid

Dikutip : Swart, David A., Genta R. M., Bennet, D.P., Pomerants R.J., 2008

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Demam Tifoid

1. Sanitasi *Hygiene*

Sanitasi *hygiene* ini termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya demam tifoid, buruknya sanitasi *hygiene* ini misalnya seperti sarana air bersih, sarana jamban dan pembuangan tinja yang buruk. Air yang tidak bersih tentunya banyak sekali mengandung bakteri penyebab penyakit dan ketika digunakan maka secara tidak langsung kuman akan berpindah ke tangan. Maka dari itu, disebutkan bahwa penyakit demam tifoid ini kebanyakan ditularkan melalui fase oral karena hal yang seperti inilah yang dapat menghantarkan kuman ke dalam tubuh (Prehamukti, 2018). Sumber air bersih yang tidak memenuhi kualitas dapat berdampak sebagai sarana penyebaran berbagai penyakit khususnya untuk air yang digunakan sebagai keperluan hidup harus memenuhi beberapa syarat fisik dan bakteriologis. Selain itu ada juga hal yang perlu diperhatikan yakni jarak antara sumber air bersih dan tempat pencemar seperti pembuangan tinja (Rahmayani et al., 2023).

Buruknya sarana jamban dan pembuangan tinja bisa menjadi faktor pemicu terjadinya demam tifoid. Pembuatan jamban sendiri adalah salah satu upaya manusia untuk memelihara dan menjaga kesehatan lingkungannya agar tetap bersih dan sehat sebagaimana yang dikatakan bahwa dalam pembuatan jamban sendiri perlu dikonstruksikan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap serta berjarak dari sumber air bersih. Apabila sarana pembuangan tinja ini tidak memenuhi syarat dapat menjadi sumber penularan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat (Rahmayani et al., 2023).

2. *Hygiene* Perorangan

Hygiene perorangan adalah salah satu faktor penyebab demam tifoid salah satu contohnya yaitu kebiasaan dalam mencuci tangan khususnya ketika setelah dan sebelum BAB. Bakteri *Salmonella typhi* ini bisa saja ditularkan melalui sela-sela kuku jari tangan. Ketika kuku tidak dalam keadaan bersih maka bakteri dapat masuk ke tubuh entah itu melalui makanan atau aktivitas lain akibatnya orang tersebut akan sakit. Sebagai bentuk pencegahan cuci tangan sebelum dan setelah BAB adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya demam tifoid, cuci tangan disini harus dengan cuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun (Susantiningsih et al., 2019).

Kebiasaan mencuci bahan makanan/makanan mentah juga termasuk sebagai faktor penyebab dari terjadinya demam tifoid. Terdapat kemungkinan adanya bakteri atau kuman patogen yang menempel pada bahan-bahan makanan, kuman inilah yang menyebabkan kontaminasi pada makanan yang terjadi saat tahap pengelolaan, penyiapan atau penyajian. Biasanya ditemukan di sayuran dan buah (Gunawan et al., 2022)

Kebiasaan memakan makanan mentah seperti daging dan sayuran disebutkan juga sebagai faktor timbulnya demam tifoid. Hal ini berpengaruh dikarenakan kebersihan dan keamanan dari makanan tidak terjamin dan dikonsumsi secara langsung tanpa mengetahui kebersihan dari makanan itu sendiri. Kebiasaan ini sering kali ditemukan saat seseorang memakan sayur seperti kemangi atau selada dan bisa saja dengan mengonsumsi daging mentah (Cahayani, Suci et al., 2023).

C. Tanda dan Gejala

1. Masa Inkubasi

Masa inkubasi biasanya berlangsung sekitar 7-14 hari atau sekitar 1-3 minggu kadang juga dalam waktu singkat yakni 3 hari. Waktu inkubasi ini tergantung pada banyaknya bakteri dan host factor serta karakteristik strain bakteri yang menjadi sebab infeksi. Dosis infektif rata-rata manusia dapat terkena infeksi klinik atau sub klinik adalah cukup dengan 10^6 organisme (Imara, 2020).

2. Gejala Klinis

Gambaran klinis yang terjadi pada pasien demam tifoid dapat dikategorisasikan sesuai dengan gejala yang terjadi di minggu pertama, kedua, ketiga bahkan keempat, yaitu sebagai berikut:

a. Minggu Pertama

Pada minggu pertama dapat ditemukan gejala yaitu demam menetap (kontinu), demam akan bertambah di sore/malam hari, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, myalgia, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare hingga rasa tidak nyaman di perut dan batuk (Hartanto, 2021). Efek umum inflamasi dapat bersifat lokal atau sistemik. Manifestasi lain dari fase akut antara lain peningkatan denyut nadi dan tekanan darah, laju pernapasan, keringat berkurang, terutama karena pengalihan aliran darah dari kulit ke pembuluh darah yang lebih dalam, untuk meminimalkan kehilangan panas melalui kulit, menggigil, anoreksia, somnolen dan malaise yang mungkin terjadi karena aksi sitokin pada otak (Joegijantoro, 2019).

b. Minggu Kedua

Gejala pada minggu kedua lebih jelas berupa bradikardia relatif, lidah berselaput (kotor di bagian tengah dan tepi, kemerahan pada ujung dan

tremor), hepatomegali, splenomegali, meteorismus, hingga perubahan status mental (somnia, sopor, koma, delirium, psikosis). Rose spot (ruam makulopapular, salmon-colored, dan pucat) dapat muncul terutama di bagian dada pada akhir minggu pertama dan hilang setelah 2 - 5 hari (Hartanto, 2021).

Selama minggu pertama, suhu tubuh meningkat secara bertahap setiap hari, biasanya turun pada pagi hari dan kemudian meningkat pada sore atau malam hari. Oleh karena itu, pada minggu kedua, suhu tubuh pasien masih tinggi (demam). Suhu tubuh tinggi dengan sedikit penurunan di pagi hari. Detak jantung pasien melambat secara proporsional. Meskipun detak jantung seharusnya meningkat seiring dengan kenaikan suhu, namun detak jantung saat ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan suhu tubuh. Gejala toksikosis menjadi semakin parah dan pasien ditandai dengan delirium. Kehilangan pendengaran adalah hal biasa. Lidah tampak kering, berwarna merah cerah. Denyut jantung meningkat seiring dengan menurunnya tekanan darah. Sedangkan diarenya semakin sering, kadang berwarna gelap disertai pendarahan terjadi pembesaran hati dan limpa, perut bengkak dan bunyi berulang, penurunan kesadaran, mengantuk terus-menerus, bingung saat berkomunikasi dan lain-lain (Mustofa, Rafie, & Salsabilla, 2020).

c. Minggu Ketiga

Pada minggu ketiga penderita suhu tubuhnya akan berangsur membaik dan normal. Hal ini apabila tidak terjadi komplikasi pada penderita dan terapinya berhasil (Mustofa, Rafie, & Salsabilla, 2020). Sebaliknya, bila keadaannya memburuk, toksemia akan bertambah parah dengan gejala khas delirium atau pingsan, gerakan otot konstan, inkontinensia dan inkontinensia urine. Perut kembung dan timpani masih terjadi, dan tekanan perut meningkat

secara signifikan, diikuti nyeri perut. Jika denyut nadi meningkat secara signifikan dengan peritonitis lokal atau umum, menandakan perforasi usus, keringat dingin, gelisah, sulit bernapas dan kolapsnya denyut nadi yang teraba menandakan perdarahan. Penyebabnya adalah degenerasi toksik pada otot jantung penderita demam tifoid biasanya meninggal pada minggu ketiga (Inawati, 2008).

d. Minggu Keempat

Pada minggu keempat pasien yang keadaannya membaik akan membaik atau dengan kata lain dalam tahap penyembuhan. Biasanya dalam keadaan ini dapat ditemukan pneumonia lobaris atau tromboflebitis (Mustofa, Rafie, & Salsabilla, 2020).

D. Pemeriksaan Laboratorium

Terdapat beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk menunjang diagnosis demam tifoid diantaranya yaitu :

1. Pemeriksaan Darah Tepi

Pemeriksaan darah tepi pada pasien biasanya menunjukkan adanya anemia, leukositosis, leukopenia, trombositosis, trombositopenia, limfositosis, eosinopenia, dan eosinophilia (Marzalina, 2019).

- a. Anemia, yakni dapat berupa gambaran leukosit dengan jumlah yang menurun. Anemia terjadi karena rendahnya kadar besi yang disebabkan oleh adanya inflamasi yang membuat penyerapan zat besi terhambat atau bisa juga dikarenakan karena pengaruh dari berbagai sitokin dan mediator inflamasi yang menyebabkan tekanan pada sumsum tulang, sehingga terjadi pematangan sel darah merah dan rusaknya eritrosit (Daradjat et al., 2022).

- b. Leukopenia, adalah keadaan jumlah leukosit lebih rendah dibawah nilai normal dimana jumlah leukosit normal pada anak yaitu 4.500-13,500 sel/mm³ dan orang dewasa bisa bervariasi antara 5000-10.500/mm³ (Widat et al., 2022).
- c. Leukositosis, adalah keadaan dimana leukosit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah leukosit normal (Widat et al., 2022).
- d. Trombositosis, adalah keadaan dimana jumlah trombosit melebihi batas normal. Dikatakan trombositosis ketika jumlah trombosit > 450.000 x 10³/μL (Devita et al., 2023).
- e. Trombositopenia, keadaan trombosit dalam tubuh kurang dimana keadaan ini sering terjadi pada pasien anak dan menjadi salah satu penyebab terjadinya fase pemulihan semakin lama (Daradjat et al., 2022).
- f. Limfositosis, yakni keadaan ketika terjadi peningkatan jumlah limfosit
- g. Eosinopenia, adalah keadaan dimana kadar eosinofil lebih rendah dari nilai normal. Eosinopenia biasanya berkaitan dengan adanya infeksi bakteri akut dan adanya demam, penurunan eosinofil biasanya disebabkan karena terjadi pelepasan sitokin untuk meningkatkan sirkulasi marginasi eosinofil (Daradjat et al., 2022).
- h. Eosinophilia, yakni kondisi ketika eosinofil dalam darah lebih tinggi dari batas normal (Daradjat et al., 2022)

2. Uji Serologis

Uji serologis adalah salah satu cara untuk menegakkan diagnosis bahwa seseorang terkena demam typhoid dengan cara mendeteksi antibodi spesifik terhadap komponen antigenik *Salmonella typhi* maupun antigen itu sendiri. Uji serologis ini terbagi lagi diantaranya:

a. Tes Widal

Tes widal pada demam tifoid berfungsi untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan karena adanya antigen *Salmonella typhi*. Antibodi antigen O akan dijumpai pada penderita demam tifoid di hari ke 6-8 dan antigen H dijumpai di hari ke 10-12 setelah terjadinya infeksi (Saputra, 2021). Pada uji Widal terjadi reaksi aglutinasi antara antigen kuman dan antibodi yang disebut aglutinin. Uji Widal berdasarkan terdapatnya aglutinin di serum terhadap antigen H (flagel) dan antigen O (tubuh kuman) *Salmonella typhi*. Antigen O juga terdapat pada *Salmonella paratyphi* A dan B. Aglutinin O meningkat pada hari ke-6 – 8 dan dapat bertahan hingga 4 – 6 bulan. Aglutinin H meningkat pada hari ke-10 -12 dan dapat bertahan hingga 9 – 12 bulan. Belum ada kesamaan pendapat mengenai titer aglutinin yang bermakna untuk diagnostik demam tifoid (Hartanto, 2021).

b. Tes Tubex

Tes Tubex merupakan salah satu uji serologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya demam tifoid. Uji Tubex merupakan uji serologis aglutinasi kompetitif semi kuantitatif yang mendeteksi adanya antibodi IgM terhadap antigen lipopolisakarida O-9 (LPS) *Salmonella typhi*, tanpa mendeteksi IgG. Tubex merupakan tes cepat in vitro menggunakan metode *magnetically coupled immunosorbent assay* (IMBI) yang dapat mendeteksi IgM spesifik untuk antigen O9 *Salmonella Enterica Serovar Typhi* terdeteksi dalam serum pasien. Penafsiran hasil percobaan ini sifatnya semi-kuantitatif. Ini berarti membandingkan warna yang dihasilkan oleh hasil reaksi pemeriksaan dengan warna standar yang memiliki skor yang terdapat pada kit Tubex (Sofia et al., 2023).

c. Uji Baku Emas (*Gold Standart*)

Uji baku emas atau kultur bakteri (*gall culture*) dilakukan untuk mendiagnosis penyakit demam tifoid menggunakan spesimen darah, urin, feses, atau sumsum tulang. Namun, spesimen yang paling sering digunakan adalah darah, kultur darah dilakukan sebaiknya di minggu pertama hingga awal minggu kedua karena tingkat sensitivitasnya paling baik dimana dapat memberikan hasil positif hingga 40-60% hal ini terjadi karena pada minggu pertama hingga kedua masih terjadi bakterimia (Istiqomah et al., 2023).

d. *Dot Enzyme Immunoassay* (EIA)

Uji EIA atau disebut juga uji typhidot mendeteksi antibodi IgM dan IgG spesifik terhadap membran protein luar *Salmonella typhi*. Hasil positif dapat ditemukan 2 -3 hari setelah infeksi. IgG dapat bertahan hingga 2 tahun dan deteksi IgG tidak dapat membedakan infeksi akut dan konvalesen. Uji typhidot-M hanya mendeteksi antibodi IgM sehingga lebih spesifik (Hartanto, 2021). Terdeteksinya IgM menunjukkan fase awal terjadinya infeksi pada demam tifoid fase akut, sedangkan ketika terdeteksi adanya IgM dan IgG menunjukkan infeksi telah berapa pada fase pertengahan infeksi (Marzalina, 2019).

e. Uji IgM Dipstick

Uji dipstick mendeteksi antibodi IgM spesifik *Salmonella typhi* di serum atau *whole blood*. Uji ini menggunakan strip mengandung antigen lipopolisakarida *Salmonella typhi* dan anti-IgM sebagai kontrol. Uji dipstick mungkin bermanfaat untuk serodiagnosis pasien kultur negatif dengan tanda dan gejala yang konsisten dengan demam tifoid. Pemeriksaan ini hanya membutuhkan sedikit volume darah serum dan tidak membutuhkan peralatan laboratorium khusus (Hartanto, 2021).

Pengujian ini dapat mendeteksi antibodi IgM spesifik terhadap antigen LPS *Salmonella typhi* menggunakan membran nitroselulosa yang mengandung antigen *Salmonella typhi* sebagai pita pendeteksi dan antibodi IgM anti-human immobilized sebagai reagen kontrol (Marzalina, 2019).

E. Tata Laksana Terapi

Penatalaksanaan demam tifoid bervariasi tergantung dari gejala, status pasien dan sensitivitas antimikroba. Pengobatan demam tifoid khususnya untuk anak ini terdiri dari dua bagian diantaranya tatalaksana yang sifatnya umum dan bersifat suportif serta tatalaksana khusus berupa pemberian antibiotik sebagai langkah awal untuk mengatasi terjadinya infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* ini (Ardiaria, 2019).

1. Tatalaksana Umum

Tatalaksana umum atau suportif adalah hal yang penting dalam mengobati demam tifoid seperti pemberian rehidrasi oral atau parenteral, pemberian antipiretik, serta nutrisi yang adekuat dimana hal ini dapat memperbaiki kualitas hidup anak penderita demam tifoid. Pada kasus demam tifoid sebenarnya pada pasien anak gejalanya lebih ringan dibandingkan pada orang dewasa. Maka dari itu biasanya dengan istirahat yang cukup sudah dapat memperbaiki kondisi anak menjadi lebih baik (Masyrofah et al., 2023).

2. Tatalaksana Khusus (Antibiotik)

Dalam penatalaksanaan demam tifoid pengobatan yang diberikan berupa antibiotik terdapat beberapa jenis antibiotik yang saat ini sering digunakan yaitu, Kloramfenikol, tiamfenikol, kotrimoksazol, ampisilin dan amoksisilin, sefalosporin generasi ketiga, flukuinolon dan azitromisin (Rahimi et al., 2021). Tujuan pemberian antibiotik ini yaitu untuk membunuh bakteri penyebab terjadinya demam tifoid, dimana penggunaannya dapat mengurangi

komplikasi, mempercepat penyembuhan, memperbaiki gambaran klinis seperti penurunan suhu badan sehingga dapat mengurangi angka kematian (Kinanta et al., 2020).

a. Kloramfenikol

Kloramfenikol merupakan obat pilihan utama pada pasien demam tifoid. Kloramfenikol bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat secara terbalik ke subunit 50S ribosom sehingga menghambat pembentukan ikatan peptida. Kloramfenikol merupakan antibiotik broad-spectrum yang berkhasiat bakteristatik terhadap gram positif aerob maupun anaerob dan bakteri gram negatif. Kloramfenikol dapat bersifat bakterisid terhadap *H. influenzae*, *Neisseria meningitides*, dan beberapa jenis *Bacteroides*. Salah satu risiko dalam penggunaan kloramfenikol adalah anemia aplastik, sehingga pada tahun 1970-an di negara Barat jarang digunakan peroral untuk terapi pada manusia. Kloramfenikol dianjurkan untuk infeksi tifus (*Salmonella typhi*) dan meningitis (*H. influenzae*) (Oong dan Tadi, 2023).

b. Azitromisin

Azitromisin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dari sel mikroba. Efikasi dan keamanan dari obat ini hampir sama dengan obat golongan kuinolon. Namun, dalam penggunaan azitromisin ini digunakan sebagai alternatif saja karena memiliki kontraindikasi dengan anak-anak, Wanita hamil, dan yang resistan dengan kuinolon. Penggunaan obat ini jika lebih dari 7 hari tidak diperbolehkan karena penetrasi jaringan lebih kuat dan terakumulasi di kantung empedu. Azitromisin jika digunakan selama 5 hari ekuivalen dengan penggunaan antibiotik lain selama 10 hari penggunaan 7

harinya lebih optimal hasilnya dibanding penggunaan antibiotik lain selama 14 hari (Rahmasari & Lestari, 2018).

c. Amoksisilin

Dalam hal kemampuan menurunkan demam, efektivitas ampisilin dan amoksisilin lebih kecil dibandingkan dengan kloramfenikol. Amoksisilin bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel mikroba. Indikasi mutlak penggunaannya adalah pasien demam tifoid dengan leukopenia. Dosis yang dianjurkan berkisar antara 75-150 mg/kg BB sehari, digunakan sampai 7 hari bebas demam. Dengan penggunaan Amoksisilin dan Ampisilin, demam rata-rata turun 7-9 hari.

d. Sefiksim

Sefiksim adalah antibiotik sefalosporin generasi ketiga yang dapat digunakan untuk pengobatan berbagai infeksi pada anak-anak, antibiotik ini tidak aktif terhadap *S.aureus*, enterokokus pada mukokus yang resisten terhadap *penicillin pneumoniae*, *L.monocytogenes* dan *Acinetobacter*. Sefiksim mempunyai mekanisme menghambat sintesis dinding sel mikroba. Sefiksim termasuk sefalosporin generasi ketiga yang telah banyak digunakan pada anak-anak dalam berbagai daerah geografis (Rahmasari & Lestari, 2018).

e. Seftriakson

Pemberian Seftriakson pada pasien demam tifoid dapat diberikan karena seftriakson merupakan antibiotik spektrum luas, yang dimana antibiotik ini memiliki efek terhadap bakteri gram positif maupun negatif, termasuk *Salmonella typhi*. Seftriakson sendiri bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan berikatan dengan satu atau lebih ikatan protein-penisilin (*Penicilin-binding protein/ PBPs*) yang selanjutnya akan menghambat sintesis peptidoglikan dinding sel bakteri

sehingga menghambat biosintesis dinding sel. Akibatnya, bakteri mengalami lisis karena adanya aktivitas enzim autolitik (autolisin dan murein hidrolase) saat dinding sel bakteri terhambat. Pemberian Seftriakson juga lebih dianjurkan dibandingkan Kloramfenikol karena dapat mengurangi lama pengobatan secara signifikan (Hazimah et al., 2018). Sifat obat ini menguntungkan karena dapat merusak spektrum kuman atau bakteri dan tidak mengganggu sel manusia, penetrasi jaringan cukup baik, dan resistensinya terhadap kuman masih tergolong rendah (Rahmasari & Lestari, 2018).

Tabel 1. Rekomendasi Antibiotik untuk Demam Tifoid oleh *The National Institute for Communicable Diseases* (NICD, 2022).

Keefektifan	Antibiotik	Dosis	Waktu
Efektif dengan Siprofloksasin	Siprofloksasin	20 mg/kg/hari po dibagi dalam dua dosis (setiap 12 jam)	7 hari
Tidak efektif dengan Siprofloksasin	<u>Neonatus</u> Sefotaksim	40-80 mg/kg/hari IV dibagi dalam dua dosis (setiap 12 jam)	10-14 hari
	<u>Anak Umur 1 bulan keatas</u> Seftriakson	50 - 75 mg/kg/day IV dibagi dalam dua dosis harian (setiap 12 jam)	
	atau		
	Azitromisin	20 mg/kg PO dalam sehari	7 hari
Reaksi obat secara luas	Azitromisin	20 mg/kg PO dalam sehari	7 hari

Tabel 2. Rekomendasi terapi untuk demam tifoid anak dengan risiko rendah terhadap resistensi Fluorokuinolon (WHO, 2022).

Antibiotik	Rute Pemberian	Range Berat Badan	Dosis mg/kg
Siprofloksasin 15 mg/kg/ 12 jam	Oral	3-<6 kg	50 mg/ 12 jam
	Oral	6-<10 kg	100 mg/ 12 jam
	Oral	10-<15 kg	150 mg/ 12 jam
	Oral	15-<20 kg	200 mg/ 12 jam
	Oral	20-<30 kg	300 mg/ 12 jam
	Oral	≥ 30 kg	500 mg/12 jam

Tabel 3. Rekomendasi terapi untuk demam tifoid anak dengan risiko yang tinggi terhadap resistensi Fluorokuinolon (WHO, 2022).

Antibiotik	Dosis	Rute Pemberian	Hari
Azitromisin	20 mg/kg/ 24 jam	Oral	7
Seftriakson	80 mg/kg/ 24 jam	IV	10

Tabel 4. Guideline Tatalaksana Terapi oleh *British Infection Association Guidelines* tahun 2022 (Nabarro et al., 2022).

Obat	Dosis Anak	Kontraindikasi
<u>Pengobatan untuk Infeksi Akut</u> Seftriakson	80 mg/kg (max. 2 g) IV sekali sehari x 7-10 hari	Alergi parah terhadap beta-laktam, Riwayat batu ginjal dan hiperkalsiuria.
Azitromisin	15-20 mg/kg (max 500 mg) PO sekali sehari x 7 hari	Alergi
Siprofloksasin	20 mg/kg (max 500 mg) PO sekali sehari x 7 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Alergi atau reaksi merugikan yang parah sebelumnya • Riwayat gangguan tendon berhubungan

Meropenem	10 mg/kg IV 3x1	dengan penggunaan kuinolon. <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan steroid secara bersamaan meningkatkan risiko kerusakan tendon. • Perhatian pada Usia > 60 tahun, gangguan ginjal, transplantasi organ padat, penyakit katup jantung. • kelainan jaringan ikat dan faktor risiko regurgitasi katup jantung. Alergi terhadap agen beta-laktam
<u>Kemungkinan Pilihan Pengobatan untuk penyakit pembawa kronis</u>		
Siprofloksasin	20 mg/kg (max 750 mg) PO dua kali sehari untuk 28 hari	Seperti di atas
Amoksisilin	30 mg/kg PO 3x1 sehari (max 1 g) untuk 28 hari	Alergi terhadap golongan obat beta laktam
Azitromisin	10 mg/kg sekali sehari (max 500 mg) untuk 28 hari	Seperti yang di atas

Tabel 5. Pilihan Antibiotik untuk Terapi Demam Tifoid Anak (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2021).

Antibiotik	Dosis	Keterangan
Kloramfenikol	25 mg/kg BB PO setiap 6 jam (maksimal 2 gram/hari)	<ul style="list-style-type: none"> • Lama pengobatan sampai dengan 5 hari bebas demam, maksimal 15 hari
Kotrimoksazol	4 mg (trimetoprin)/kg BB PO setiap 12 jam	

Amoksisilin	15-30 mg/kg BB setiap 8 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Perhatian untuk penggunaan kloramfenikol : waspada efek samping • Kloramfenikol : supresi sumsum tulang • Penggunaan >7 hari harus diikuti dengan pemeriksaan morfologi sediaan apus darah tepi
Ampisilin	50-75 mg/kg BB IV setiap 6 jam	Tidak dianjurkan untuk pasien dengan jumlah leukosit <2000/UI
Seftriakson	25-50 mg/kg BB setiap 12 jam	

Tabel 6. Pilihan Antibiotik untuk Demam Tifoid Anak (Dyson et al., 2019).

Antibiotik	Dosis (Rute)	Keterangan
Siprofloksasin	30 mg/ kg/hari dalam 2 dosis terbagi (PO)	Tidak direkomendasikan pada anak-anak usia dibawah 15 tahun
Sefksim	Anak-anak (> 3 bulan) 20 mg/kg/hari dalam 2 dosis terbagi (PO)	Bisa digunakan sebagai alternatif dari Siprofloksasin bagi anak-anak dibawah 15 tahun
Amoksisilin	75-100 mg/kg/hari dalam 3 dosis terbagi (PO)	Jika tidak adanya resistan
Kloramfenikol	Anak-anak 1-12 tahun: 100 mg/kg/hari dalam 3 dosis terbagi dan anak > 13 tahun : 3 g/hari dalam 3 dosis terbagi	Jika tidak adanya resistan (pilihan utama)
Tiamfenikol	75mg/kg BB/hari (PO)	
Azitromisin	20 mg/kg BB/hari (PO)	Aman diberikan pada anak-anak tanpa komplikasi
Seftriakson	75mg/kg BB sehari sekali (IV)	Salmonella typhi cepat berkembang resisten terhadap kuinolon. Jika terjadi digunakan Seftriakson.

3. Resistensi Antibiotik

Resistensi antibiotik adalah kemampuan sebuah mikroorganisme untuk menghambat aksi dari agen anti mikroba sehingga tidak lagi efektif

dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Kondisi ini akan terjadi Ketika mikroorganisme atau bakteri beradaptasi atau berubah fungsi tubuhnya dengan beberapa cara seperti menetralkan antibiotik dan mengubah struktur bakteri yang awalnya sensitif terhadap anti mikroba menjadi resisten terhadap penggunaan antibiotik (Ayobami et al., 2022).

F. Tinjauan Islam

Demam tifoid merupakan gangguan kesehatan yang disebabkan adanya infeksi dan menyerang sistem pencernaan tepatnya pada usus halus. Penulara penyakit ini dapat melalau fecal atau oral yang masuk ke tubuh biasanya berasal dari makanan, jari tangan, kuku, lalat ataupun tinja. Dalam pengobatan demam tifoid atau tipes perlu mendapatkan pengobatan yang tepat yakni penggunaan antibiotik yang tepat baik jenis maupun dosisnya.

Di dalam Islam telah dijelaskan tentang pengobatan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yunus/10:57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin

Dalam tafsir Al- Mishbah jilid 6 pada halaman 102-103 dijelaskan bahwa Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah obat bagi apa yang terdapat dalam dada. Penyebutan kata dada yang diartikan dengan hati, menunjukkan bahwa wahyu-wahyu Ilahi itu berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit rohani seperti ragu, dengki, takabur dan semacamnya.

Sementara ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Mereka merujuk kepada sekian

Riwayat yang diperselisihkan nilai dan maknanya, antara lain yang diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih melalui sahabat Nabi, Ibn Mas'ud ra. yang memberitakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi saw yang mengeluhkan dadanya. Hal ini dapat diartikan bahwa Allah swt telah memberikan atau menghadirkan suatu penyakit beserta penawarnya.

Pada ayat lain juga disebutkan sebagaimana Allah berfirman pada Q.S Al-Isra/17: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.

Dalam tafsir Al-Mishbah jilid 7 halaman 82 menjelaskan bahwa Kata (شِفَاءٌ) syifa' biasa diartikan kesembuhan atau obat. Maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya Al-Qur'an bisa digunakan sebagai obat untuk segala penyakit baik itu penyakit Rohani dan jasmani. Hal ini dibuktikan dengan salah satu kisah saat Abu Bakar dan Rasulullah kabur ke dalam Gua Tsur menghindari kaum Quraisy. Saat itu Rasulullah sedang terlelap di pahanya Ketika sedang bergantian menjaga jika saja tiba-tiba kaum Quraisy mendapati mereka. Gua itu begitu dingin dan kurang akan penerangan, tiba-tiba saja seekor ular mendesis- desis perlahan menghampiri kaki Abu Bakar yang terlentang. Abu Bakar ingin sekali menghindari gigitan dari ular itu hanya saja Rasulullah Tengah berada dalam tidurnya yang lelap akibat kelelahan sehingga ia tidak tega menggerakkan kakinya karena takut membangunkan Rasulullah. Abu Bakar meringis ketika merasakan gigitan di pergelangan kakinya tapi kakinya tetap saja tidak bergerak sama sekali dalam diam Abu Bakar menangis merasakan rasa sakit dan panas menjalar ke seluruh tubuhnya akibat bisa ular

itu. Tidak sadar air mata Abu Bakar menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring dan membangunkannya.

Rasulullah pun menatap Abu Bakar dengan rasa ingin tahu dan bertanya apa yang terjadi. Singkat cerita setelah mendengarkan penjelasan Abu Bakar tentang apa yang terjadi Rasulullah ikut menangis melihat perjuangan sahabatnya itu dengan lembut Nabi meraih kaki Abu Bakar dan mengagungkan nama Allah swt lalu mengusap luka itu dengan ludahnya, seketika Abu Bakar merasa lega. Dari kisah ini dapat dibuktikan bahwasanya Al-Qur'an tidak hanya dapat digunakan sebagai obat penyakit hati tapi juga penyakit fisik atau jasmani.

Kemudian, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis shahih oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf) dan (Abu Ath Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu Ibnu Al Harits dari ('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla. (HR. Muslim, No. 4084)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap penyakit bahwa penyakit yang Allah turunkan ke muka bumi ini pasti memiliki penawar atau obat atas izin Allah swt. kecuali satu penyakit yaitu tua. Dalam Hadis tersebut juga dijelaskan bahwa suatu penyakit dapat disembuhkan apabila diobati dengan

obat yang sesuai. Dihubungkan dengan pengobatan bahwa setiap penyakit memiliki obat yang berbeda, sehingga pemberian obat sangat perlu untuk diperhatikan. Pemberian obat yang tidak sesuai seperti dosis yang berlebih justru akan membahayakan pasien dan menyebabkan terjadinya overdosis serta apabila dosis kurang maka obat yang diberikan tidak akan memberikan efek sama sekali dan dapat menimbulkan penyakit yang baru.

Berdasarkan penyakit yang diangkat yakni demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi*. Bakteri ini dapat masuk melalui oral. Oleh karena itu, kebersihan sangat perlu diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:222 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Dalam ayat di atas Allah swt menegaskan bahwa Dia menyukai orang-orang senantiasa menjaga kebersihannya. Dengan kata lain Allah sangat mencintai kebersihan. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian lebih bagi umat Islam untuk terus memperhatikan kebersihan diri maupun lingkungannya. Kenyataannya seseorang biasa menerapkan kebersihan ketika ingin melaksanakan Shalat atau ibadah dikarenakan menjadi salah satu syarat sahnya diterima Shalat padahal kebersihan juga dimaksudkan untuk tetap berperilaku hidup bersih demi terciptanya umat yang sehat, baik itu sehat jasmani maupun lingkungannya. Kemudian, salah satu penyebab terbesar timbulnya suatu penyakit adalah hal yang kotor dan najis, inilah alasan mengapa Islam memerintahkan manusia agar terus menjaga

kebersihan dan menghindari hal-hal yang kotor dan najis apalagi sampai mengonsumsinya.

Hal ini sesuai dengan penyakit yang sedang diteliti dimana dilihat dari penyebab utama dari timbulnya penyakit ini adalah kurangnya perilaku hidup sehat oleh individu khususnya sanitasi *hygiene* seperti tidak adanya sarana air bersih, sarana jamban atau pembuangan tinja yang buruk, tidak mencuci tangan setelah buang hajat sehingga kuman-kuman tadi akan berpindah ke tangan dan saat makan/minum akan terbawa masuk ke dalam tubuh. Adapun ayat lain yang membahas terkait kebersihan yaitu Q.S Al-Maidah/ 5:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

Berdasarkan ayat tersebut Allah telah memberitahukan untuk manusia selalu dalam keadaan bersih baik itu ketika ingin beribadah atau dalam keadaan sehari-hari. Allah juga memerintahkan untuk tetap bersuci setelah membuang hajat. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang telah dilakukan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya demam

tifoid adalah *hygiene* personal atau bagaimana seseorang merawat dirinya untuk memelihara kesehatan mereka (Sunaryani et al., 2019).

Dengan ini penyakit demam tifoid berkaitan erat dengan lingkungan yang kurang baik dan tentu saja penyebabnya adalah individu itu sendiri. Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat di atas dapat diartikan bahwa segala bentuk kerusakan atau keburukan yang terjadi di bumi adalah akibat dari manusia itu sendiri, ini dapat dikaitkan bahwa lingkungan yang buruk itu tergantung dari individu yang tinggal di dalamnya. Jadi, lingkungan yang bersih harus diperhatikan untuk kemaslahatan individu itu sendiri agar kesehatannya tetap terjaga.

Islam sangat menekankan hidup sehat dan untuk meraihnya diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Hal ini juga disebut dalam sebuah Hadits arba'in diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah saw bersabda:

الطهور شطر الإيمان

Artinya:

Kesucian itu separuh dari iman, (HR. Muslim No.233)

Berdasarkan hadits di atas dikatakan bahwa "Kesucian atau kebersihan adalah bagian dari iman". Hal ini menunjukkan betapa pentingnya

sebuah kesucian atau kebersihan dari diri seseorang sehingga dikatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari sebuah iman yang artinya orang-orang yang beriman akan peduli akan kebersihannya atau kesuciannya karena kesucian itu menghapus dosa-dosa kecil, sedangkan keimanan menghapus dosa-dosa besar maka separuh keimanan didasarkan pada pertimbangan ini, tidak hanya kebersihan diri dan lingkungan yang perlu diperhatikan tapi kebersihan dan kesucian hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita seperti makanan atau minuman.

Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah segala jenis penyakit yang ada di muka bumi ini semuanya datangnya dari Allah swt begitu pun dengan obatnya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Asy-Syu'ara'/26:80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ


Terjemahnya:

Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 menyebutkan bahwa arti "penyakit" disandarkan kepada dirinya (penderita), sekalipun hal itu merupakan qadar, qada dan ciptaan Allah swt. Akan tetapi, ia sandarkan hal itu kepada dirinya sebagai sikap beradab. Maka hal itu berarti, jika aku menderita sakit, maka tidak seorang pun yang kuasa menyembuhkanku selain-Nya sesuai takdir-Nya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini penjelasan di atas bermaksud bahwa segala penyakit itu hanya bisa disembuhkan atas izin-Nya, manusia hanya bisa berikhtiar dan berusaha untuk bisa sembuh tapi apabila Allah tidak berkehendak maka tidaklah berguna, dengan kata lain obat adalah

perantara bagi manusia untuk sembuh. Oleh karena itu, selain mendapatkan terapi yang tepat manusia juga perlu berdoa dan meminta kepada Allah swt atas kesembuhannya dan tetap berbaik sangka atas apa yang diberikan oleh-Nya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah non-eksperimental dengan jenis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena dengan menggunakan data berupa angka atau statistik. Dalam pengumpulan data dilakukan secara retrospektif yaitu pengumpulan data yang telah lampau melalui lembaran rekam medis dari data resep pasien anak demam tifoid dari dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf periode Januari 2023 – Desember 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas penggunaan antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien anak demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di RSUD Syekh Yusuf Gowa, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024 – Maret 2024 dengan data pasien di bulan Januari 2023- Desember 2023.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh pasien anak demam tifoid pada instalasi rawat inap di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode Januari 2023 – Desember 2023.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pasien anak demam tifoid pada instalasi rawat inap di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode Januari 2023 – Desember 2023 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Kriteria Sampel

1) Kriteria Inklusi

- a) Pasien anak demam tifoid dengan rentan umur 0 – 18 tahun.
- b) Pasien rawat inap
- c) Pasien yang mendapatkan terapi antibiotik

2) Kriteria Eksklusi

- a) Rekam medik yang tidak lengkap
- b) Pasien anak dengan penyakit infeksi lainnya

3. Penentuan Besar Sampel

Dalam penelitian ini penentuan besaran sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance),

digunakan e = 5 % (Rifkhan, 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{92}{1+92(5\%)^2}$$

$$n = \frac{92}{1,23}$$

$$n = 74$$

Jadi, dari 92 data rekam medik yang diperoleh diambil 74 data sebagai sampel untuk digunakan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan secara retrospektif yang dilakukan penelusuran terkait data lampau berupa data sekunder melalui rekam medik pasien anak demam tifoid yang diperoleh dari bagian rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa. Data yang diperoleh di skrining untuk memilih data sesuai kriteria eksklusi dan inklusi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik pasien anak demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf Gowa periode Januari 2023 – Desember 2023 yang mendapatkan pengobatan antibiotik dan lembar penilaian yang memuat perbaikan klinis pasien, terapi antibiotik yang didapatkan serta waktu perbaikan klinis pasien.

G. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependent

Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah perbaikan klinis.

2. Variabel Independent

Variabel independent atau variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab ataupun mempengaruhi timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel independent dalam penelitian ini adalah penggunaan antibiotik.

H. Alur Penelitian

1. Tahap Awal

Tahap ini dilakukan persiapan, dalam hal ini permohonan izin penelitian di tingkat Provinsi Selatan kemudian surat izin oleh pemerintah Kabupaten Gowa.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mengenai pasien anak demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Populasi yang diperoleh dari data yang dikumpulkan berupa rekam medik pasien, sehingga akan didapatkan sampel menggunakan Teknik sampling acak berupa undian dan pencatatan data sesuai dengan kriteria inklusi.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan proses akhir yang terdiri dari tahap pengelolaan data dan penyelesaian laporan hasil penelitian.


I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan


Dalam penelitian yang dilakukan ini digunakan penelitian retrospektif dengan menelusuri data lampau yakni berupa data sekunder dari rekam medik pasien anak dengan penyakit demam tifoid. Data ini diperoleh dari bagian rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, sehingga dari rekam medis tersebut diambil data berupa usia, gejala klinis, jenis antibiotik yang diberikan, perbaikan klinis yang terjadi, serta lama pasien di rawat inap.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan secara analisis deskriptif menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) dengan interval kepercayaan (IK) sebesar 95% ($\alpha=5\%$). Penilaian perbaikan klinis pasien dengan Teknik *Paired Sample t-Test* untuk membandingkan perbaikan klinis pasien sebelum dan sesudah mendapatkan terapi adapun pengelolaan data berupa penyajian melalui tabel.



J. Skema Alur Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini dikumpulkan data retrospektif pasien anak dengan diagnosis demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada Tahun 2023. Jumlah rekam medik pasien yang digunakan adalah sebanyak 74 rekam medik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melihat perbaikan klinis pasien selama menjalani perawatan rawat inap dan setelah diberikan terapi antibiotik.

1. Karakteristik Pasien

Tabel 7. Karakteristik Pasien (World Health Organization, 2018).

NO	Karakteristik Pasien	Keterangan	N (%)
1.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	44 (59,4%)
		Perempuan	30 (40,6%)
2.	Usia	< 2 Tahun	8 (10,8%)
		2-7 Tahun	29 (39,2%)
		8-11 Tahun	22 (30%)
		12-18 Tahun	15 (20%)

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RSUD Syekh Yusuf

Ket: N = Jumlah

Tabel 7. Menunjukkan bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki dengan angka 44 pasien (59,4%) di rentang usia 2-7 tahun dengan angka 29 pasien tahun (39,2%)

2. Gejala Klinis Pasien

Tabel 8. Gambaran Gejala Klinis Pasien

No	Gejala Klinis		Normal N (%)	Tidak Normal N (%)
1	Suhu	Sebelum	48 (65%)	26 (35%)
		Sesudah	74 (100%)	0 (0%)
2	Laju Pernapasan	Sebelum	38 (51%)	36 (49%)
		Sesudah	59 (80%)	15 (20%)
3	Kesadaran	Sebelum	74 (100%)	0 (0%)
		Sesudah	74 (100%)	0 (0%)
4	Pencernaan	Sebelum	35 (47%)	39 (53%)
		Sesudah	74 (100%)	0 (0%)
5	Mual & Muntah	Sebelum	44 (60 %)	30 (40%)
		Sesudah	74 (100%)	0 (0%)

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RSUD Syekh Yusuf

Ket: N= Jumlah

Berdasarkan tabel 8. Gejala klinis pasien anak setelah pemberian antibiotik turun hingga 0% (N=0) khususnya pada gejala suhu, gangguan kesadaran, gangguan pencernaan dan gejala mual & muntah dan untuk laju pernapasan turun hingga 20% (N=15).

3. Profil Penggunaan Terapi Antibiotik

Tabel 9. Persentase Pemberian Antibiotik pada Pasien Anak Demam Tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa

No.	Jenis Antibiotik	Rute Pemberian	Dosis (24 jam)	Durasi Penggunaan	Jumlah N (%)
1	Seftriakson	IV	1,4 g-2 g	3-6 hari	54 (73%)
2	Sefiksim	Oral	40-400 mg	3-7 hari	7 (9%)
3	Sefotaksim	IV	0,8 g -2 g	3-9 hari	11 (15%)
4	Kloramfenikol	Oral	3 g	4-7 hari	2 (3%)

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RSUD Syekh Yusuf

Ket: N= Jumlah

Berdasarkan tabel 9. Pemberian antibiotik yang paling banyak adalah antibiotik jenis Seftriakson dengan persentase 73% (N=54).

4. Hasil Uji Paired Sample t-Test

Tabel 10. Hasil Uji Paired Sample t-Test untuk Gejala Klinis Pasien.

Variabel	Sig. (2-tailed)
Suhu Sebelum-Suhu Sesudah	0,000
RR Sebelum-RR Sesudah	0,000
GCS Sebelum- GCS Sesudah	-
Pencernaan Sebelum-Pencernaan Sesudah	0,000
MM Sebelum-MM Sesudah	0,000

Sumber: Hasil Uji SPSS Data Rekam Medik Pasien

Ket: N= Jumlah

RR = Respiratory rate/ Laju pernapasan

GCS = Glow coma Score / Kesadaran

MM = Mual dan Muntah

Berdasarkan tabel 10. Uji *Paired sample t-test* menunjukkan hasil positif dengan *p-value* 0,000 ($p < 0,05$) pada perbaikan suhu, laju pernapasan, GCS, pencernaan, dan mual muntah.

B. Pembahasan

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella thypi*. Penyakit ini kebanyakan diderita oleh anak-anak > 5 tahun ditandai dengan gejala demam yang berlangsung lama disertai dengan adanya bakteri dalam darah tanpa melibatkan struktur endotelial atau endokardial serta invasi dan multiplikasi bakteri di dalam sel fagosit mononuklear di hati, limpa, kelenjar getah bening, usus dan *Peyers's patch* (Soemasto et al., 2016).

Faktor risiko dari penyakit ini biasanya berasal dari sanitasi *hygiene* atau *hygiene* perorangan. Buruknya sanitasi *hygiene* seperti tidak adanya air bersih, sarana pembuangan yang buruk dan bagaimana kebiasaan individu yang kurang memperhatikan kebersihan contohnya tidak mencuci tangan setelah BAB, atau bisa saja makan makanan yang tidak terjamin kebersihannya (Cahayani, Suci et al., 2023).

Dalam pengobatannya, demam tifoid ini dapat diatasi dengan pemenuhan kebutuhan cairan, nutrisi serta pemberian antibiotik, kemudian pada kasus-kasus yang dinilai serius biasanya akan dilalukan perawatan di rumah sakit agar pemenuhan cairan, elektrolit serta nutrisi dapat diobservasi dan diliat perkembangannya. Pengobatan utama untuk demam tifoid sendiri adalah pemberian antibiotik karena pada dasarnya penyakit ini didasari oleh adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella thypi* (Oktavia et al., 2020).

Penelitian ini terkait analisis efektivitas pengobatan antibiotik yang diberikan kepada pasien anak yang didiagnosis demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tahun 2023 dengan melihat perkembangan perbaikan gejala klinis yang dialami oleh pasien setelah pemberian antibiotik. Jumlah sampel yang digunakan dan memenuhi kriteria inklusi sebanyak 74.

Berdasarkan tabel 7. Analisis karakteristik dasar untuk jenis kelamin dan usia dilakukan untuk mengetahui persentase dari pasien dengan diagnosis demam tifoid pada laki-laki dan perempuan serta pada rentan usia berapa. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasien paling banyak terkena demam tifoid terjadi pada jenis kelamin laki-laki dengan persentase 59,4% (n=44) dan perempuan 40,6 % (n=30). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Melarosa Resika et al. (2019) di RSUP Sanglah Denpasar dimana didapatkan hasil bahwa yang paling banyak terkena demam tifoid adalah pasien berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 65,5 % (n=36) dan perempuan 34,5 % (n=19) hal ini dapat disebabkan dengan kebiasaan atau gaya hidup dari laki-laki yang berisiko lebih tinggi terkena demam tifoid dibandingkan perempuan. Kemudian penelitian lain oleh Nurpleli dan Nuzulul (2023) dimana jumlah kasus demam tifoid sebanyak 120 kasus dengan persentase berdasarkan jenis kelamin didapatkan laki-laki dengan presentase 63,3% atau sebanyak 76 kasus sedangkan perempuan dengan persentase 36,7% atau sebanyak 44 kasus dan didapatkan melalui hasil uji *odds ratio* nilai OR 0,75 yang berarti pasien dengan jenis kelamin laki-laki berisiko mempunyai peluang 0,75 kali lebih besar dibandingkan pasien dengan jenis kelamin perempuan. Kejadian ini dapat berpengaruh karena biasanya laki-laki lebih sering beraktivitas dan aktif diluar rumah juga kurang dalam *hygiene* perorangan (Nurpleli & Rahmi, 2023).

Demam tifoid adalah penyakit yang dapat menyerang semua kalangan usia dimana menurut hasil Riset kesehatan Dasar penyakit demam tifoid di Indonesia didominasi oleh anak-anak. Berdasarkan tabel 7 hasil penelitian yang telah dilakukan terkait rentang usia anak-anak yang menderita demam tifoid paling banyak adalah pada usia rentang 2-7 tahun dengan jumlah 29 (39,2%) pasien, usia 8-11 tahun dengan jumlah 22 (30%) pasien, usia 12-18 tahun dengan jumlah 15 (20%) pasien, dan yang paling kecil pada usia < 2 tahun dengan jumlah 8 (10,8%) pasien. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil Riset Kesehatan dasar pada tahun 2018 dengan rentang usia 5-14 tahun paling tinggi prevalensinya dengan persentase 1,9%. Penelitian sejenis ini juga dilakukan pada tahun 2020 di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung. Didapatkan hasil bahwa penderita yang paling banyak adalah pada rentang 5-11 tahun dengan persentase 57,1%. Hal ini tentu saja bisa terjadi dikarenakan anak pada rentang usia seperti ini adalah anak-anak yang sedang aktif menjalani aktivitas di luar rumah, seperti jajan di area sekolah atau di pinggir jalan yang tidak terjamin kebersihannya, buruknya sanitasi dan *hygiene* serta imunitas atau daya tahan tubuh yang belum terlalu baik. Sebagaimana yang diketahui bahwa penyebaran penyakit ini dapat terjadi melalui kontaminasi makanan atau minuman melalui fakte-oral sehingga berisiko terinfeksi bakteri *Salmonella typhi* (Mustofa et al., 2020).

Dalam penatalaksanaannya antibiotik adalah terapi utama yang diberikan, karena pada dasarnya patogenesis infeksi *Salmonella typhi* berhubungan dengan keadaan bakterimia. Tujuan pemberian antibiotik sendiri adalah untuk membunuh bakteri penyebab terjadinya demam tifoid dimana penggunaan antibiotik ini dapat mengurangi komplikasi, mempercepat penyembuhan, dan memperbaiki gambaran klinis penderita

(Kinanta et al., 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021 terdapat beberapa jenis antibiotik yang diberikan diantaranya Kloramfenikol, Kotrimoksazol, Amoksisilin, Ampisilin dan Seftriakson. Adapun menurut Guideline tatalaksana terapi oleh British Infection Association Guidelines tahun 2022 jenis antibiotik yang diberikan berupa Seftriakson, Azitromisin, Siprofloksasin, Meropenem dan Amoksisilin.

Berdasarkan tabel 9 terkait profil penggunaan terapi antibiotik untuk kasus demam Tifoid anak di RSUD Syekh Yusuf di tahun 2023 didapatkan hasil yakni penggunaan antibiotik Seftriakson dengan jumlah 54 (73%) pasien, Sefiksिम dengan jumlah 7 (9%) pasien, Sefotaksim dengan jumlah 11 (15%) pasien, dan kloramfenikol 2 (3%) pasien. Jika dilihat dari penggunaannya yang paling banyak adalah Seftriakson dengan 54 pasien. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Idrus et al. (2023) di RSUD I Lagaligo Luwu Timur didapatkan hasil bahwa pasien yang menerima perawatan dengan antibiotik Seftriakson sebanyak 43 (53,8%) pasien.

Penggunaan Seftriakson digunakan paling banyak dibanding antibiotik lain tentunya memiliki alasan tertentu apalagi jika dilihat Seftriakson sendiri adalah antibiotik yang masuk pada ke lini dua untuk penatalaksanaan terapi demam tifoid. Seftriakson bekerja dengan cara mengikat Pencilin-Binding proteins (PBPs) yang menghambat akhir dari transpeptidase sintesis peptidoglikan pada pembentukan dinding sel bakteri juga dapat menghambat biosintesis dinding sel bakteri dan akhirnya sel bakteri akan mati. Seftriakson dalam penggunaannya dapat membuat darah steril dengan waktu yang lebih singkat pada kasus pemberian intravena karena anti mikroba yang bekerja pada dinding sel bakteri biasanya akan membunuh bakteri lebih cepat dibanding anti mikroba yang bekerja pada ribosom (Idrus et al., 2023).

Penggunaan antibiotik Seftriakson juga ternyata memberikan efek yang lebih cepat jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, untuk antibiotik Seftriakson perlu waktu sekitar 3-6 hari untuk memperbaiki gejala pada pasien demam tifoid kemudian diikuti oleh Sefiksim dengan waktu 3-7 hari, Sefotaksim 3-9 hari dan terakhir ada Kloramfenikol dengan waktu 4-7 hari dalam penggunaannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dasopang et al. (2019) terkait perbandingan efektivitas Kloramfenikol dengan Seftriakson untuk penatalaksanaan demam tifoid anak didapatkan hasil bahwa penggunaan Seftriakson lebih efektif untuk pengobatan demam tifoid jangka pendek. Seftriakson adalah antibiotik yang masuk ke dalam golongan beta laktam dan memiliki spektrum yang luas sehingga dapat dikonsumsi 1 sampai 2 kali dalam sehari, dapat merusak struktur kuman secara selektif sehingga dapat membunuh bakteri *Salmonella typhi*, keunggulan lainnya ialah Seftriakson mempunyai spektrum luas, tidak mengganggu sel tubuh manusia, daya tahan kuman terbatas dan tidak ada efek samping berbahaya bila diberikan pada anak serta kurangnya kasus resistensi terhadap antibiotik ini (Dasopang et al., 2019).

Jika dilihat dari hasil penelitian yang paling banyak digunakan adalah Seftriakson dan disusul oleh Sefotaksim yang merupakan antibiotik lini kedua untuk demam tifoid dibandingkan dengan Kloramfenikol yang masuk pada lini pertama, penggunaannya paling rendah. Ini disebabkan seringnya ditemukan kasus-kasus pasien resistensi terhadap obat jenis ini serta adanya pertimbangan dari segi efek samping yaitu Kloramfenikol dapat menyebabkan penghambatan pembentukan sel darah merah dan anemia aplastik sehingga perlu monitoring untuk penggunaan jangka panjang (Hartanto, 2021).

Disebutkan juga bahwa kasus resistensi di negara Asia termasuk didalamnya Kloramfenikol, Tetrasiklin, Streptomisin mencapai angka 3,6% lebih tinggi daripada angka resistensi Ampisilin yang hanya mencapai angka 1,8% (Dyson et al., 2019). Sehingga sebagai bentuk penanganannya Seftriakson dipilih berdasarkan pertimbangan dari hasil positif yang menunjukkan penurunan suhu tubuh, administrasi jangka pendek, dan aman digunakan untuk anak-anak hingga dewasa (Hartanto, 2021).

Adapun penggunaan Sefiksimeftriakson sering digunakan dikarenakan memiliki kelebihan yaitu cepat menurunkan suhu, bisa diberikan dengan dosis tunggal serta dapat mengendalikan kekebalan antibiotik pada pasien. Penggunaan antibiotik jenis ini sering kali juga digunakan di negara Amerika Serikat bagi yang mengalami kasus resistensi terhadap lini pertama (Mustofa, Rafie, & Salsabilla, 2020). Sefiksimeftriakson masuk ke dalam generasi ketiga dari sefalosporin dan bekerja dengan cara melakukan inhibitor di dinding sel mikroba akibatnya enzim transpeptidase akan terhambat sehingga pada tahap ketiga mikroba tidak dapat melakukan pembentukan dinding sel, selain itu Sefalosporin memiliki spektrum yang luas sehingga dapat melemahkan bakteri gram positif maupun negatif, juga tahan dengan enzim beta laktamase (Fatonah et al, 2021).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penatalaksanaan farmakologi utama demam tifoid adalah antibiotik dikarenakan demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* yang menginfeksi organ pencernaan manusia. Maka dari itu, dalam pemberian antibiotik sendiri juga diperlukan kehati-hatian karena dengan pemberian antibiotik yang tepat akan mempersingkat lamanya penyakit dan mengurangi terjadinya komplikasi pada penderita demam tifoid

serta mengurangi angka kematian dan risiko morbiditas (Masuet-Aumatell & Atouguia, 2021).

Penggunaan antibiotik yang kurang tepat dapat memberikan efek yang tidak diinginkan, banyaknya kasus resistensi antibiotik adalah salah satu contohnya. Resistensi antibiotik sendiri adalah keadaan dimana mikroorganisme atau bakteri kehilangan sensitivitasnya terhadap antibiotik dalam kata lain antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh mikroorganisme yang menginfeksi tubuh (Ayobami et al., 2022).

Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya resistensi bakteri diantaranya yaitu meningkatnya penggunaan antibiotik, penggunaan jangka panjang, ke tidak tepatan dosis, penggunaan yang tidak terkontrol serta terjadinya perubahan pada bakteri sendiri yang disebabkan genetik, fisiologis, ekologis, atau medis sebagai contoh pada pasien di ICU akan menggunakan antibiotik yang selektif pada empat hari pertama perawatan sebagai antibiotik profilaksis untuk mencegah dan mengeradikasi bakteri patogen. Kemudian saat ini bakteri memiliki plasmid yang dan sifat yang berbeda dibandingkan antibiotik modern sekarang yang sudah banyak resistan terhadap antibiotik (Rugină, 2018).

Penderita demam tifoid memiliki gejala tertentu, seperti di fase invasi penderita akan mengalami demam yang naik secara bertahap dan di malam hari suhunya akan meningkat dibanding di pagi hari. Gejala lain seperti nyeri kepala, rasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, batuk, lemas, dan konstipasi. pada akhir minggu pertama demam akan mencapai suhu tertinggi dan akan konstan selama minggu kedua tanda lain yang dapat terjadi adalah bradikardia relative, pulsasi dikrotik, hepatomegali splenomegali, lidah tifoid, diare, dan konstipasi (Soemasto et al., 2016).

Berdasarkan data dari tabel 8 terkait gambaran gejala klinis pasien dengan penggolongan beberapa jenis gejala didapatkan hasil dari 74 pasien yang mengalami demam sebanyak 48 (65%) pasien, dan setelah diberikan terapi antibiotik pasien yang mengalami demam berkurang hingga 0 (0%), kemudian pasien dengan laju pernapasan tidak normal sebanyak 36 (49%) pasien dan setelah pemberian antibiotik pasien dengan laju pernapasan yang tidak normal turun hingga 15 (20%) pasien. Adapun yang mengalami gangguan kesadaran (GCS) tidak ada sama sekali atau persentase 0% baik itu sebelum dan sesudah pemberian terapi antibiotik, selanjutnya yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 39 (57%) pasien dan setelah pemberian antibiotik menurun hingga 0 (0%) pasien dan yang terakhir adalah pasien dengan gejala mual dan muntah sebanyak 30 (40%) pasien kemudian setelah diberikan antibiotik turun hingga 0 (0%) pasien. Dilihat dari data diatas gejala utama yang paling tinggi adalah demam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khalizah et al. (2023) didapatkan hasil bahwa 71,4% (N=30) mengalami demam dan yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 28,6% (N=12) dan tidak ada sama sekali yang mengalami gangguan kesadaran. Kemudian pada penelitian yang dilakukan di RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran pada Tahun 2021 didapatkan hasil terdapat 91% (n=91) yang mengalami demam, 9% (N=9) diare, 76% (N=76) mual, 50% (N=50) muntah dan yang mengalami konstipasi sebanyak 6% (N=6) (Rahimi et al., 2021).

Gejala yang terjadi pada kasus demam tifoid adalah hal yang sering kali terjadi dikarenakan adanya infeksi. Demam dapat terjadi karena masuknya bakteri *Salmonella typhi* ke dalam tubuh dan bakteri ini akan menempel pada jaringan limfa di usus halus atau disebut *peyer patches*. Sistem kekebalan

tubuh kemudian mengenali antigen bakteri sehingga memfagosit bakteri tersebut dan meneruskannya ke makrofag. *Salmonella typhi* mampu bermultiplikasi atau jumlahnya akan terus bertambah di makrofag, dan dapat masuk ke aliran darah. Ketika makrofag telah memfagosit bakteri mediator inflamasi akan dilepaskan, salah satunya adalah sitokin. Akibatnya, akan terjadi gejala seperti demam, nyeri otot, sakit kepala atau gejala toksisitas yang lainnya (Soemasto et al., 2016). kemudian gejala lainnya seperti mual, muntah, nyeri perut, diare dan konstipasi terjadi dikarenakan adanya infeksi pada usus. Bakteri *Salmonella typhi* ini akan menyebar melalui sistem pencernaan dan menempel pada dinding usus dan dapat menyebabkan terjadinya peradangan serta kerusakan pada dinding usus akibatnya proses pencernaan terganggu (Levani & Prastya, 2020).

Sebagaimana yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien anak yang menderita demam tifoid dengan melihat adakah perubahan sebelum mendapatkan terapi antibiotik dan setelah mendapatkan antibiotik. Dalam hal ini ada beberapa tanda dan gejala yang akan dilihat diantaranya adalah suhu atau temperatur tubuh pasien, kesadaran (GCS), laju pernapasan, gangguan pencernaan seperti diare atau konstipasi serta gejala mual dan muntah.

Sarana yang digunakan untuk melihat apakah ada perubahan signifikan terhadap pemberian antibiotik adalah dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan metode Uji *Paired Sample t-Test*. Data yang dimasukkan adalah hasil skoring dari masing-masing jenis gejala pasien baik sebelum mendapatkan terapi antibiotik dan setelah mendapatkan terapi antibiotik. Pada tabel 10 terkait perbaikan suhu pasien didapatkan hasil *p-value* 0,000 dikatakan hasilnya positif jika didapatkan *p-value* $\alpha = 0,05$ ($p < 0,05$) yang artinya terjadi

perubahan yang signifikan pada perbaikan suhu pasien. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khalizah et al. (2023) didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan perawatan antibiotik khususnya di rawat inap didapatkan hasil positif bahwa antibiotik dapat menurunkan suhu pasien secara signifikan dengan kurun waktu < 7 hari.

Jika dilihat dari masa inkubasi bakteri *Salmonella typhi* yang berkisar 7-14 hari ini menunjukkan hasil yang baik karena dengan pemberian antibiotik yang tepat akan mengurangi masa inkubasi bakteri dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan mempercepat proses penyembuhan (Fadrian, 2023). Hal ini sesuai dengan patomekanisme terjadinya demam tifoid yaitu infeksi yang terjadi akibat *Salmonella typhi* di usus akan memberikan gejala demam sehingga ketika bakteri dapat dilemahkan dengan anti mikroba maka gejalanyapun akan hilang (Khalizah et al., 2023).

Pada tabel 10 terkait laju pernapasan dari pasien demam tifoid anak didapatkan hasil *p-value* 0,000. Terjadinya demam tifoid berpotensi mempengaruhi laju pernapasan karena pada fase bakterimia sekunder *Salmonella typhi* akan melepaskan endotoksin ke dalam darah dan menyebabkan hiperaktivitas vaskular dan pelepasan katekolamin yang menyebabkan nekrosis fokal serta lipopolisakarida bakteri akan menginduksi terjadinya reaksi yang mirip syok (Bhandari et al., 2024). Hasil ini menunjukkan hasil yang positif karena *p-value* $\alpha = 0,05$ ($p < 0,05$) artinya Laju pernapasan pasien sebelum mendapatkan terapi berubah secara signifikan menjadi normal setelah mendapatkan terapi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan pada pasien rawat inap yang terkena pneumonia di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang mendapatkan terapi antibiotik. Dari penelitiannya didapatkan hasil *p-value* 0,001 yang artinya setelah diberikan antibiotik terjadi

perubahan yang signifikan dengan pengaruh sebesar 5,376 kali terhadap perbaikan laju pernapasan (Damayanti et al., 2022).

Tabel 10 terkait tingkat kesadaran pasien, sebagaimana yang tertera pada tabel bahwa hasil *p-value* tidak ada, ini dikarenakan GCS pada pasien anak demam tifoid semuanya memiliki GCS normal dengan angka 15 begitu pun setelah pemberian antibiotik tidak ada yang berubah semuanya tetap batubatas normal dengan GCS 15 sehingga tidak ada perubahan. Tabel 10 menunjukkan hasil untuk gejala gangguan pencernaan pada pasien demam tifoid, dari hasil uji Paired Sample t-Test didapatkan *p-value* 0,000 dikatakan hasilnya positif karena *p-value* < 0,05 sehingga dapat disimpulkan terjadinya perubahan yang signifikan setelah pemberian antibiotik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di RSUD Bekasi Periode tahun 2019 dimana pada penelitian ini didapatkan pasien yang mengalami gejala pencernaan 28,3 % (n=30) kemudian setelah pemberian antibiotik pasien mengalami perbaikan klinis yang signifikan dalam kurun waktu 4 hari sebanyak 85% (Marvellini & Sagala, 2020). Penggunaan antibiotik tentunya memiliki efek dalam perbaikan gejala pasien khususnya untuk gangguan pencernaan dikarenakan awal mula terjadinya demam tifoid adalah infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan.

Tabel 10 berkaitan dengan gejala mual dan muntah yang dialami oleh penderita demam tifoid. Jika dilihat dari hasil uji paired sample t-Test didapatkan *p-value* sebesar 0,000 sehingga dapat dikatakan setelah pemberian antibiotik terjadi perubahan yang signifikan karena nilai *p-value* < 0,05 yang artinya pasien dengan gejala mual dan muntah membaik setelah diberikan terapi. Mual dan muntah merupakan salah satu gejala yang sering muncul pada

penderita demam tifoid dan ini sejalan dengan apa yang ditemukan pada penelitian ini yakni sekitar 60% pasien merasakan gejala ini.

Penelitian efektifitas penggunaan antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien anak demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa menunjukkan bahwa terjadi perbaikan yang signifikan terhadap perbaikan klinis pasien diantaranya pada perbaikan suhu, laju pernapasan, kesadaran, gangguan pencernaan, dan gejala mual muntah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Seftriakson dengan persentase 73% (N=54) kemudian Sefotaksim 15% (N=11), Sefiksim 9% (N=7), dan terakhir Kloramfenikol 3% (N=2).
2. Terdapat perbaikan klinis yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian antibiotik dengan *p-value* 0,000 ($p < 0,05$) pada suhu, laju pernapasan, GCS, pencernaan dan gejala mual muntah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan adanya penelitian lanjutan yang dapat menganalisis dan menilai rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien anak demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Sehingga, kita dapat melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tatalaksana pengobatannya. Kemudian, diberikan saran terhadap rumah sakit untuk pendataan rekam medik yang lebih lengkap agar memudahkan dilakukannya evaluasi dan pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- (NICD), C. for E. diseases T. N. I. for C. D. (2022, June). Enteric fever (typhoid and paratyphoid fever): Recommendations for Diagnosis , Management and Public Health Response. *Enteric Fever Guideline, June*, 1–25.
- Ardiaria, M. (2019). Epidemiologi, Manifestasi Klinis, Dan Penatalaksanaan Demam Tifoid. *JNH (Journal of Nutrition and Health)*, 7(2), 1.
- Ayobami, O., Brinkwirth, S., Eckmanns, T., & Markwart, R. (2022). Antibiotic resistance in hospital-acquired ESKAPE-E infections in low- and lower-middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Emerging Microbes and Infections*, 11(1), 443–451. <https://doi.org/10.1080/22221751.2022.2030196>
- Bhandari, J., Thada, P. K., Hashmi, M. F., & DeVos, E. (2024). *Typhoid Fever*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557513/>
- Cahayani, Suci, Dode, H., & Saparina, T. (2023). Faktor Risiko Pemicu Demam Tifoid Pasien Rawat Jalan (Studi di Rumah Sakit Dr. R. Ismoyo). *Jurnal Healthy Mandala Waluya*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54883/jhmw.v2i2.268>
- Damayanti, M., Olivianto, E., & Yunita, E. P. (2022). Effects of Rational Use of Antibiotics on Clinical Improvement of Pediatric Inpatients with Pneumonia. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 11(2), 129–144. <https://doi.org/10.15416/ijcp.2022.11.2.129>
- Daradjat, M. Y., Saputra, O., & Sidharti, L. (2022). Karakteristik Hasil Pemeriksaan Darah Tepi Pasien Typhoid Fever pada Anak. *Agromedicine*, 9, 136–139.
- Dasopang, E. S., Hasanah, F., Bakri, T. K., & Isma, M. (2019). Comparative Effectiveness Study of Chloramphenicol and Ceftriaxone in the Treatment of Typhoid Fever in Children Admitted to Putri Hijau Kesdam I / Bb Hospital Medan. *Herbal Medicine in Pharmaceutical and Clinical Sciences*, 7(22), 3847–3851. <https://doi.org/https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.517>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Riset Kesehatan Dasar 2007. *Laporan Nasional 2007*, 1–384. <http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Riskesdas2007Nasional.pdf>
- Devita, N., Riski, M. S., Marufi, R., & Habibah, U. A. (2023). Profil Manifestasi klinis dan Laboratorium Pasien Demam Tifoid di Rumah Sakit PKU Bantul. *Jurnal Kedokteran Universitas Palangka Raya*, 11(2), 36–42. <https://doi.org/10.37304/jkupr.v11i2.10753>

- Dyson, Z. A., Klemm, E. J., Palmer, S., & Dougan, G. (2019). Antibiotic resistance and typhoid. *Clinical Infectious Diseases*, 68(Suppl 2), S165–S170. <https://doi.org/10.1093/cid/ciy1111>
- Fadrian. (2023). *Antibiotik, Infeksi dan Resistensi (Pertama)*. Andalas University Press.
- Gunawan, A., Rahman, I. A., Nurapandi, A., & Maulana, N. C. (2022). Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Demam Typhoid pada Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Imbanagara Kabupaten Ciamis. *Healthcare Nursing Journal*, 4, 404–412.
- Hartanto, D. (2021a). Diagnosis dan Tatalaksana Demam Tifoid pada Dewasa. *Cermin Dunia Kedokteran*, 48(1), 5. <https://doi.org/10.55175/cdk.v48i1.1255>
- Hartanto, D. (2021b). Diagnosis dan Tatalaksana Demam Tifoid pada Dewasa. *Cermin Dunia Kedokteran*, 48, 5–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.55175/cdk.v48i1.19>
- Hazimah, K. W., Priastomo, M., & Rusli, R. (2018). *Studi Penggunaan Antibiotik pada Pasien Demam Tifoid di RS SMC Periode 2017*. 57–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.25026/mpc.v7i1.290>
- PENDAHULUAN
- Husna, S. dkk. (2020). Hubungan Perilaku Hidup Sehat dengan Kejadian Demam Thypoid pada Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Mappadising*, 2(2), 139–151. <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/mappadising>
- IDAI, I. D. A. I. (2013). Buku Ajar Infeksi dan Pediatri Tropis. In S. S. P. Soedarmo, H. Garna, S. R. S. Hadinegoro, & . Hindra Irawan Satari (Eds.), *Ikatan Dokter Anak Indonesia (Edisi Kedu)*. Badan Penerbit IDAI.
- Idrus, H. H., Utami, N., Rahmawati, R., Daeng Kanang, I. L., Musa, I. M., & Rasfayanah, R. (2023). Analisis Penggunaan Antibiotik Pasien Demam Tifoid dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi yang Dirawat di Rumah Sakit. *UMI Medical Journal*, 8(1), 46–52. <https://doi.org/10.33096/umj.v8i1.242>
- Imara, F. (2020). Salmonella typhi Bakteri Penyebab Demam Tifoid. *Prosiding Seminar Nasional Biologi Di Era Pandemi COVID-19*, 6(1), 1–5. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb/>
- Inawati. (2008). Demam Tifoid. *Jurnal Ilmiah Kedokteran*, 60, 1–2. <http://dx.doi.org/10.30742/jikw.v0i0.67>
- Istiqomah, N., Agustina, N., & Putri, S. B. (2023). Deteksi Bakteri Salmonella sp . dengan Kultur Darah Pada Pasien Widal Positif di Laboratorium Klinik X. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research (JSSCR)*, 5, 338–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.37311/jsscr.v5i2.21497>

- Joegijantoro, R. (2019). *Penyakit Infeksi (Pertama)*. Intimedia.
- Kemendes, 2006. (2018). Pedoman Pengendalian Demam Tifoid. In *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364* (p. 41).
- Kemendes RI. (2021). *Pedoman Penggunaan Antibiotik*.
- Khairunnisa, S., Hidayat, E. M., & Herardi, R. (2020). Hubungan Jumlah Leukosit dan Persentase Limfosit terhadap Tingkat Demam pada Pasien Anak dengan Demam Tifoid di RSUD Budhi Asih Tahun 2018 – Oktober 2019. *Seminar Nasional Riset Kedokteran (SENSORIK)*, 60–69.
- Khalizah, K. N., Dahliah, Idrus, H. H., Kanang, I. L. D., & Karim, A. M. A. A. (2023). Karakteristik Penderita Demam Tifoid di UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap Tahun 2022. *Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 2(5), 53–61.
- Kinanta, P. B. S., Santhi, D. G. D. D., & Subawa, A. A. N. (2020). Profil pemberian antibiotik dan perbaikan klinis demam pada pasien anak dengan demam tifoid di RSUP Sanglah Denpasar. *Jurnal Medika Udayana*, 9(3), 10–14. <https://doi.org/10.24843.MU.2020.V9.i3.P03>
- Levani, Y., & Prastya, A. D. (2020). Demam Tifoid: Manifestasi Klinis, Pilihan Terapi Dan Pandangan Dalam Islam. *Al-Iqra Medical Journal: Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.26618/aimj.v3i1.4038>
- Marvellini, R. Y., & Sagala, F. T. B. R. (2020). Gambaran Efektivitas Seftriakson Dan Sefotaksim Pada Pasien Demam Tifoid Usia 5 – 19 Tahun Di Rsd Bekasi Periode Januari 2019 -Desember 2019. *Jurnal Kedokteran Universitas Palangka Raya*, 8(2), 1020–1024. <https://doi.org/10.37304/jkupr.v8i2.2036>
- Marzalina, C. (2019). Pemeriksaan Laboratorium untuk Penunjang Diagnostik Demam Tifoid. *Jurnal Kesehatan Ceadum*, 1(3), 61–68.
- Masuet-Aumatell, C., & Atouguia, J. (2021). Typhoid fever infection – Antibiotic resistance and vaccination strategies: A narrative review. *Travel Medicine and Infectious Disease*, 40(November 2019), 101946. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101946>
- Masyrofah, D., Hilmi, I. L., & Salman. (2023). Review : Relationship of Age With Typhoid Fever. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(1), 215–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i1>
- Mustofa, F. L., Rafie, R., & Megamelina, B. (2020). Hubungan Faktor Determinan dengan Kejadian Demam Tifoid pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2018. *Jurnal Medika Malahayati*, 4(4), 274–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jmm.v4i4.2555>
- Mustofa, F. L., Rafie, R., & Salsabilla, G. (2020). Karakteristik Pasien Demam

Tifoid pada Anak dan Remaja di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(2), 625–633. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i2.372>

- Nabarro, L. E., Mccann, N., Herdman, M. T., Dugan, C., Ladhani, S., Patel, D., Morris-jones, S., Balasegaram, S., Heyderman, R. S., Brown, M., Parry, C. M., & Godbole, G. (2022). British infection association guidelines for the diagnosis and management of enteric fever in England. *Journal of Infection*, 84(4), 469–489. <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2022.01.014>
- Nurleli, & Rahmi, N. (2023). Pengaruh Umur dan Jenis Kelamin Terhadap Kejadian Demam Tifoid Pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tingkat II Iskandar Muda Kota Banda Aceh. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 9(2), 1140–1147. <https://doi.org/https://doi.org/10.33143/jhtm.v9i2.3367>
- Oktavia, D., Indriani, L., & Dewi, M. (2020). Evaluasi Pemberian Antibiotik Pada Pasien Demam Tifoid Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Azra Kota Bogor. *FITOFARMAKA: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 10(1), 54–64. <https://doi.org/10.33751/jf.v10i1.1938>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik*.
- Pradiningsih, A., Nopitasari, B. L., & Sari, M. (2021). Profil Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Demam Tifoid Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. *Lambung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 2(2), 125. <https://doi.org/10.31764/lf.v2i2.5495>
- Prehamukti, A. P. P. (2018). Higeia Journal of Public Health. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 625–634. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higeia.v2i4.24275>
- Rahimi, A., Tarigan, A. I., & Lubis, A. (2021). Penatalaksanaan Pasien Demam Tifoid Rawat Inap di RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, 3(1), 39–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jkpi.v3i1.1778>
- Rahman, I. (2019). Resistensi Antibiotik Terhadap Salmonella typhi pada Penyakit Demam Tifoid di Kota Makassar. *Kieraha Medical Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.33387/kmj.v1i2.1699>
- Rahmasari, V., & Lestari, K. (2018). Review: Manajemen Terapi Demam Tifoid: Kajian Terapi Farmakologis Dan Non Farmakologis. *Farmaka*, 16(1), 184–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jf.v16i1.17445>
- Rahmawati, A., Muchtar, H., & Nasif, H. (2019). Efektifitas Antibiotik Pasien Demam Tifoid RSUP Dr. M. Djamil Padang. *JOPS (Journal Of Pharmacy and Science)*, 2(2), 13–28. <https://doi.org/10.36341/jops.v2i2.844>

- Rahmayani, Rosita, S., Za, R. N., & Salamah, U. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Demam Tifoid di Wilayah Kerja Puskesmas Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Factors influencing the incidence of typhoid fever in the working area of Rikit Ghaib Community Health Center , Gayo Lues Regency. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 9(2), 1627–1635.
- Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner* (Abdul (ed.); Cetakan Pe). Penerbit Adab.
- Rugină, S. (2018). Resistance to Antimicrobians – A Global Problem with Sectoral Resolution. *The Journal of Critical Care Medicine*, 4(2), 47–49. <https://doi.org/10.2478/jccm-2018-0010>
- Sanjaya, D. A., Meriyani, H., Juanita, R. A., & Siada, N. B. (2022). Kajian Literatur: Profil Resistensi Salmonella typhi dan Pemilihan Antibiotik Pada Demam Tifoid. *JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 7(2), 107. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v7i2.56656>
- Saputra, D. A. (2021). Terapi pada Demam Tifoid Tanpa Komplikasi. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(1), 213–222. <https://doi.org/10.37287/jppp.v3i1.392>
- Soemasto, A. S., Amelz, H., Junadi, P., Mansyur, M., Saleh, C. A., Muslim, R., Roosyana, Thabrany, H., Subekti, I., Purwoto, G., & Purwadianto, A. (2016). *Kapita Selekta Kedokteran* (C. Tanto, F. Liwang, S. Hanifati, & E. A. Pradipta (eds.); Edisi Keem). Media Aesculapius.
- Sofia, R., Sahputri, J., & Venanda, N. (2023). Korelasi Tubex Tf Dengan Angka Leukosit Pada Penderita Demam Tifoid Di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara. *Jurnal Medika Malahayati*, 7(2), 607–613. <https://doi.org/10.33024/jmm.v7i2.9865>
- Sukertiasih, N. K., Megawati, F., Meriyani, H., & Sanjaya, D. A. (2021). Studi Retrospektif Gambaran Resistensi Bakteri terhadap Antibiotik. *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 7(2), 108–111. <https://doi.org/10.36733/medicamento.v7i2.2177>
- Sukma, R., Indriputri, C., & Salam, J. (2023). Uji Resistensi Salmonella typhi dari Penderita Demam Tifoid terhadap Beberapa Antibiotik. *Cokroaminoto Journal of Biological Science*, 5(1), 1–7.
- Sunaryani, R., Mukaddas, A., & Tandah, M. R. (2019). Perbandingan Efektivitas Antibiotik Golongan Sefalosporin Generasi Ketiga Pada Pasien Demam Tifoid Di Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017. *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 5(1), 58–62. <https://doi.org/10.36733/medicamento.v5i1.852>
- Susantiningih, T., Yuliyanti, R., Simanjuntak, K., & Arfiyanti, A. (2019). Pkm Pelatihan Mencuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Masyarakat Rt 007/Rw 007 Desa Pangkalan Jati,

Kecamatan Cinere Kota Depok. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(2), 75-84. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i2.2889>

WHO. (2022). The WHO The WHO A AWa WaRe Re ((Access Access, Watch Watch, Reserve Reserve)) antibiotic book antibiotic book. In *Primary Health Care* (Vol. 160). <http://apps.who.int/bookorders>.

Widat, Z., Jumadewi, A., & Hadijah, S. (2022). Gambaran Jumlah Leukosit Pada Penderita Demam Tifoid. *HEALTHY: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(3), 142-147. <https://doi.org/10.51878/healthy.v1i3.1461>

World Health Organization. (2018). Typhoid and other invasive salmonellosis. *Online*, 1-13. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_21_Typhoid_R2.pdf?ua=1



LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Salinan Rekam Medik

LEMBAR SALINAN DATA REKAM MEDIK PASIEN

Inisial Nama : ABR (615788)	Umur : 7 TAHUN
TERAPI	
Jenis Antibiotik	Rute dan Dosis
CEFTRIAZONE	IV 2X1 GR /12JAM

TANDA-TANDA VITAL PASIEN

Suhu (°C)	37,3 36,8 36,7 37
Respiratory Rate	28 24 24 24
Kesadaran (GCS)	15
Pencernaan	- -
Mual & Muntah	MUAL + MUNTAH+ Mual + muntah + Mual- muntah - -

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM LAIN

WIDAL O = 1/320 H = 1/320 N 120 121 116 114
--

Lampiran 3. Hasil uji Paired Sample t-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Suhu_sebelum	3.24	74	2.403	.279
	Suhu_sesudah	.00	74	.000	.000
Pair 2	RR_sebelum	2.43	74	2.516	.292
	RR_sesudah	1.01	74	2.024	.235
Pair 3	GCS_sebelum	.00 ^a	74	.000	.000
	GCS_sesudah	.00 ^a	74	.000	.000
Pair 4	Pencernaan_Sebelum	2.64	74	2.513	.292
	Pencernaan_sesudah	.00	74	.000	.000
Pair 5	MM_sebelum	4.19	74	4.222	.491
	MM_sesudah	.00	74	.000	.000

a. The correlation and t cannot be computed because the standard error of the difference is 0.

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Suhu_sebelum & Suhu_sesudah	74	.	.
Pair 2	RR_sebelum & RR_sesudah	74	.384	.001
Pair 4	Pencernaan_Sebelum & Pencernaan_sesudah	74	.	.
Pair 5	MM_sebelum & MM_sesudah	74	.	.

Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
Pair 1 Suhu_sebelum - Suhu_sesudah	3.243	2.403	.279	2.686	3.800	11.609	73	.000	
Pair 2 RR_sebelum - RR_sesudah	1.419	2.554	.297	.827	2.011	4.780	73	.000	
Pair 4 Pencernaan_Sebelum - Pencernaan_sesudah	2.635	2.513	.292	2.053	3.217	9.019	73	.000	
Pair 5 MM_sebelum - MM_sesudah	4.189	4.222	.491	3.211	5.167	8.535	73	.000	



Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 4952/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-6079/Un.06/LP2M/PP.00.9/2/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURUL MUTHIA MURSALIM
Nomor Pokok	: 70100120017
Program Studi	: Farmasi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK TERHADAP PERBAIKAN KLINIS PASIEN DEMAM TIFOID ANAK PADA RAWAT INAP DI RSUD SYEKH YUSUF "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Februari s/d 10 April 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Kab. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmptsp.gowakab.go.id email: perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/261/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2024
Lampiran :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.
RSUD Syekh Yusuf Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 4952/S.01/PTSP/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL MUTHIA MURSALIM**
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Makassar / 27 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 70100120017
Program Studi : Farmasi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jalan Barawaja 1 No.3,Kec.Tallo Kota Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK TERHADAP PERBAIKAN KLINIS PASIEN DEMAM TIFOID ANAK PADA RAWAT INAP DI RSUD SYEKH YUSUF"

Selama : 29 Februari 2024 s/d 10 April 2024
Pengikut :


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan penundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 8 Maret 2024

Dibandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
Kepala DPMPPTSP Kabupaten Gowa,



H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Np. : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar
3. Arsip



Lampiran 6. Kode Etik



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210066564, E-mail: kepik.fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.A.100/KEPK/FKIK/VI/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nurul Muthia Mursalim
Principal in Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK TERHADAP PERBAIKAN
 KLINIS PASIEN DEMAM TIFOID ANAK PADA RAWAT INAP
 DI RSUD SYEKH YUSUF"**

**"ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC USE ON CLINICAL
 IMPROVEMENT OF TYPHOID FEVER PATIENTS IN HOSPITALIZATION
 AT RSUD SYEIKH YUSUF"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2061, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2066. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2061 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2066 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025.

This declaration of ethics applies during the period July 10, 2024 until July 10, 2025.



Chairperson,
 Dr. Isriany Ismail, S.St., M.St.

RIWAYAT HIDUP



Nurul Muthia Mursalim akrab dipanggil Numu, lahir di Makassar pada tanggal 27 April 2002, anak bungsu dari 5 bersaudara. Penulis memulai pendidikannya di TK Hidayatullah Paniai pada tahun 2006. Kemudian, melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri Enarotali dan pada kelas 4 SD pindah ke SD Inpres Rappokalling II Makassar, pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Aman dan lulus di tahun 2020. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar dan lulus pada jalur UMPTKIN pada Jurusan Farmasi. Selama masa kuliah penulis aktif di beberapa organisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta di Tim Bantuan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R