

SKRINING LC-MS DAN UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK AKAR

PARANG ROMANG (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

SECARA IN SILICO



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi

Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

OLEH:

RAHMI FITRI LESTARI JAMAL

NIM : 70100119085

ALAUDDIN

M A K A S S A R

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmi Fitri Lestari Jamal
Nim : 70100119085
Tempat/Tgl. Lahir : Kolaka, 17 Desember 2001
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Pao-pao Permai Blok B6/4
Judul : Skrining LC-MS dan Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak
Akar Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)
Secara In Silico

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa,
Peneliti,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR
Rahmi Fitri Lestari Jamal
NIM.70100119085

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Skrining LC-MS dan Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Akar Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) Secara In Silico**" yang disusun oleh Rahmi Fitri Lestari Jamal NIM. 70100119085, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi (munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari Selasa, 16 Januari 2024 yang bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

GOWA, 16 Januari 2024
4 Rajab 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG., M Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. apt. Mukhriani, S.Si, M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Muh. Ikhlas Arsul, S,Farm., M.Sc	(.....)
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG., M. Kes.
NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman dan nikmat Kesehatan serta Rahmat-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul “ **Skrining LC-MS dan Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Akar Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) Secara In Silico**” dapat diselesaikan. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Rosulullah Muhammad saw beserta keluarga yang suci, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana farmasi (S.Farm) pada Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

Tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta bapak Jamaluddin (alm) dan ibu Jumriah yang telah merawat dan mendidik penulis hingga saat ini, memberikan limpahan kasih sayang, dorongan semangat, dukungan moril maupun materil, dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada kakak kami Rachmat Jariah Jamal dan Achmad Rivai Jamal yang telah membantu memberikan masukan yang bermanfaat serta menyemangati dan mendoakan kelancaran skripsi penulis.

Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan serta motivasi yang telah

penulis peroleh selama proses pembuatan skripsi ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhanis MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. H. Muhammad Amry, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp.OG., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Isriyani Ismail, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Fais Satrianegara, SKM., Mars, selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Patimah, S.kep., Ns., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi dan Ibu apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Bapak apt. Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Sc selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan arahan, bantuan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan, bantuan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan arahnya dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
12. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc. MA selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan kontribusi berupa saran dan arahnya dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
13. Ibu Dr. Haeria Doloking, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dan membimbing selama proses perkuliahan penulis.
14. Bapak dan Ibu dosen, serta jajaran pegawai di Prodi Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.
15. Kepada teman-teman Angkatan 2019 "INTERFERON" yang senantiasa memberikan dukungan, semangat doa dan kebersamaan selama ini.

Semoga Allah swt senantiasa menghujani kita dengan Rahmat-Nya segala amal kebaikan kita. Akhir kata, kami berharap semoga skripsi ini dapat membantu memajukan penelitian, khususnya ilmu kefarmasian. Skripsi ini dapat diperbaiki dengan saran dan kritik yang bijak.


Gowa, 2024
Penulis

Rahmi Fitri Lestari J

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Uraian Tanaman parang romang.....	8
B. Diabetes.....	9
C. Ekstraksi.....	14
D. Skrining Senyawa Antidiabetes.....	16
E. Studi <i>In Silico</i>	18
F. Enzim DPP-4.....	19
G. Enzim α -glukosidase.....	21
H. Sulfonilurea (SUR1).....	21
I. Tinjauan Islami.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27

C. Sampel Penelitian.....	27
D. Instrumen penelitian	27
E. Prosedur Kerja.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Akar Parang Romang.....	32
Tabel 2. Hasil Skrining LC-MS Ekstrak Akar Parang Romang.....	33
Tabel 3. Parameter docking dan ukuran gridbox reseptor α -glukosidase (5NN8), reseptor DPP-IV (3F8S), reseptor sulfonilurea SUR1 (2FF7).....	35
Tabel 4. Hasil <i>docking</i> molekuler ligan uji, native ligan dan kontrol positif terhadap reseptor α -glukosidase (5NN8).....	36
Tabel 5. Hasil <i>docking</i> molekuler ligan uji, native ligan dan kontrol positif terhadap reseptor DPP-4 (3F8S)	37
Tabel 6. Hasil <i>docking</i> molekuler ligan uji, native ligan dan kontrol positif terhadap reseptor Sulfonilurea (SUR1) (2FF7)	37
Tabel 7. Hasil visualisasi <i>docking native</i> ligan dan ligan uji pada reseptor α -glukosidase.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tumbuhan parang romang dan akar parang romang	8
Gambar 2. Hasil skrining LC-MS ekstrak akar parang romang	32
Gambar 3. Struktur kompleks reseptor α -glukosidase (5NN8), enzim DPP-4 (3F8S) dan Sulfonilurea (SUR1) (2FF7)	35
Gambar 4. Visualisasi 3D dan 2D interaksi intermolekuler antara reseptor α -glukosidase (5NN8) dengan native ligan hasil validasi docking (AutodockTools)	38
Gambar 5. Visualisasi 3D dan 2D interaksi intermolekuler antara reseptor sulfonilurea (SUR1) (2FF7) dengan native ligan hasil validasi docking (AutodockTools)	39
Gambar 6. Visualisasi 3D dan 2D interaksi intermolekuler antara reseptor DPP-IV) (3F8S) dengan native ligan hasil validasi docking (AutodockTools)	40
Gambar 7. Visualisasi 3D dan 2D senyawa Catechin dengan reseptor α -glukosidase (5NN8)	41
Gambar 8. Visualisasi 3D dan 2D senyawa DL-Malic acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8)	42
Gambar 9. Visualisasi 3D dan 2D senyawa (15Z)-9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8)	43
Gambar 10. Visualisasi 3D dan 2D senyawa 16-Hydroxyhexadecanoic acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8)	44
Gambar 11. Visualisasi 3D dan 2D senyawa Fumaric acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8)	45

Gambar 12. Visualisasi 3D dan 2D senyawa Methylmalonic acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8).....	46
Gambar 13. Visualisasi 3D dan 2D senyawa azelaic acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8).....	47
Gambar 14. Visualisasi 3D dan 2D senyawa D-(-)-Quinic acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8).....	48
Gambar 15. Visualisasi 3D dan 2D senyawa citric acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8).....	49
Gambar 16. Visualisasi 3D dan 2D senyawa 2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8)	50
Gambar 17. Visualisasi 3D dan 2D senyawa 5-Methoxysalicylic acid dengan reseptor α -glukosidase (5NN8).....	51
Gambar 18. Visualisasi 3D dan 2D senyawa 4-Oxoproline dengan reseptor α -glukosidase (5NN8).....	52
Gambar 19. Visualisasi 3D dan 2D senyawa esculin dengan reseptor α -glukosidase (5NN8)	53
Gambar 20. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa N-Acetyl-L-phenylalanine dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Proses ekstraksi sampel.....	71
Lampiran 2. Skema kerja skrining dan uji aktivitas ekstrak akar parang romang.....	72
Lampiran 3. Penyiapan ekstrak.....	73
Lampiran 4. Preparasi reseptor.....	74
Lampiran 5. Preparasi ligan.....	74
Lampiran 6. Proses docking molekuler.....	75
Lampiran 7. Visualisasi.....	76



ABSTRAK

Nama : RAHMI FITRI LESTARI JAMAL

NIM : 70100119085

**Judul : SKRINING LC-MS DAN UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK
AKAR PARANG ROMANG (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)
SECARA IN SILICO**

Diabetes merupakan salah satu penyakit degeneratif yang terjadi akibat perubahan pengaruh gaya hidup dan pola hidup. Salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antidiabetes adalah akar parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa biokimia yang terkandung dalam akar parang romang serta aktivitasnya terhadap antidiabetes secara *in silico*.

Penelitian ini dimulai dengan mengekstraksi akar parang romang dengan metode refluks. Ekstrak yang diperoleh kemudian dianalisis kandungan biokimianya menggunakan LC-MS. Senyawa biokimia yang terdeteksi kemudian diuji aktivitas antidiabetes secara *in silico* menggunakan *docking molekuler*.

Terdapat 100 senyawa yang terkandung dalam ekstrak akar parang romang diantaranya 8 senyawa golongan karboksilat, 2 golongan senyawa asam lemak, golongan senyawa flavonoid, asam salisilat, pirrolidon, dan kumarin masing-masing sebanyak 1 senyawa; golongan metabolit primer sebanyak 3 senyawa, dan 52 senyawa diantaranya tidak terdeteksi.

Senyawa yang terkandung dalam ekstrak akar parang romang yang dapat diinterpretasikan sebagai antidiabetes secara *in silico* diantaranya adalah Catechin, DL-Malic acid, (15Z)-9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid, 16-Hydroxyhexadecanoic acid, fumaric acid, methymalonic acid, azelaic acid, D-(-)-Quinic acid, citric acid, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid, 5-Methoxysalicylic acid, 4-Oxoproline, esculin, N-Acetyl-L-phenylalanine dengan protein target α -glukosidase memiliki ikatan yang lebih stabil dibandingkan *native* ligan dengan protein target α -glukosidase.

Kata kunci: skrining LC-MS, antidiabetes, akar parang romang, docking molekuler.

ABSTRACT

Name : RAHMI FITRI LESTARI JAMAL

Reg. Number: 70100119085

Title : LC-MS SCREENING AND ANTIDIABETIC ACTIVITY TEST OF PARANG ROMANG ROOT EXTRACT (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) SECARA IN SILICO

Diabetes is a degenerative disease that occurs due to changes in lifestyle and lifestyle. One plant with antidiabetic activity is parang romang root (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill). This study aims to determine the biochemical compounds contained in parang romang roots and their activity against antidiabetes in silico.

This research was conducted by extracting parang romang root using the reflux method. The extract obtained was then analyzed for biochemical content using LC-MS. The detected biochemical compounds were then tested for antidiabetic activity in silico using molecular docking.

There are 100 compounds contained in parang romang root extract, including 8 compounds of carboxylic group, 2 groups of fatty acid compounds, flavonoid compounds, salicylic acid, pyrrolidone, and coumarin each as much as 1 compound; primary metabolite group as much as 3 compounds, and 52 compounds were undetected.

The compounds contained in parang romang root extract that can be interpreted as antidiabetic in silico include Catechin, DL-Malic acid, (15Z)-9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid, 16-Hydroxyhexadecanoic acid, fumaric acid, methymalonic acid, azelaic acid, D-(-)-Quinic acid, citric acid, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid, 5-Methoxysalicylic acid, 4-Oxoproline, esculin, N-Acetyl-L-phenylalanine with α -glucosidase target protein has a more stable bond than native ligand with α -glucosidase target protein.

Keywords: LC-MS screening, antidiabetic, parang romang root, molecular docking.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan dunia mendorong perubahan gaya dan pola hidup pada individu. Satu diantara dari kemajuan tersebut ialah dengan mengonsumsi makanan tidak sehat, misalnya makanan cepat saji, minum-minuman bersoda dan jenis makanan lainnya yang dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam tubuh. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan penyakit degeneratif salah satunya adalah diabetes melitus (Zamaa & Sainudin, 2019). Diabetes termasuk salah satu penyakit dimana jumlah penderitanya terus meningkat (Wulandari, 2009). Jumlah penderita diabetes melitus secara umum terus meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 jumlah penderitanya sebanyak 463 juta orang dan diprediksi meningkat pada tahun 2030 menjadi 578,4 juta dan akan bertambah menjadi 700,2 juta orang pada tahun 2045 (Richardo dkk., 2021). Indonesia menempati peringkat empat setelah Amerika Serikat, China dan India sebagai negara yang memiliki jumlah penyandang diabetes terbanyak (Leonita & Muliani, 2015).

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit yang dikenal dengan meningkatnya kadar glukosa darah (atau gula darah) dimana tubuh tidak mampu menghasilkan insulin atau tidak mampu dalam penggunaan insulin secara efektif. Diabetes melitus dapat dibedakan sebagai diabetes melitus tipe 1 (DM-1) atau insulin-independent diabetes melitus (IDDM) yang ditandai dengan berkurangnya produksi insulin dan diabetes melitus tipe 2

(DM-2) atau non-insulin-dependent diabetes melitus (NIDDM) yang ditandai dengan peningkatan resistensi insulin (Tse dkk., 2016).

Mengontrol pola makan bersama dengan ahli gizi untuk menentukan jenis makanan yang boleh dimakan merupakan pengobatan utama penyakit diabetes melitus. Jika terapi makanan tidak berhasil, pengobatan diabetes melitus dapat dilakukan dengan memberikan obat hipoglikemik oral (OHO) golongan glinide, sulfonilurea, thiazolidindione, biguanide, acarbose, dan insulin yang masing-masing mempunyai kemampuan meningkatkan sekresi insulin oleh sel β -pankreas, menurunkan produksi glukosa hati, meningkatkan penyerapan glukosa di jaringan perifer, mengurangi resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, menurunkan retensi glukosa di usus halus, serta menekan pelepasan glukagon (Primada Hari Anugrahini & Sri Wahyuni, 2021). Meskipun pengobatan diabetes telah tersedia, umumnya obat sintesis hanya ditujukan untuk satu target dan bereaksi pada reseptor tertentu, penggunaan jenis obat tersebut juga sering dikaitkan dengan munculnya efek samping yang tidak diinginkan serta biaya yang sangat mahal bagi pasien, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan kegagalan dalam terapi (Siregar, 2021).

Saat ini banyak orang yang lebih suka memanfaatkan tanaman obat dibandingkan obat-obatan sebagai pengobatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya keuntungan dari tanaman obat, diantaranya tidak sulit diperoleh, mudah ditanam, dapat ditangani sendiri dan terbilang sederhana (Simanjuntak, 2018). Tanaman tradisional merupakan obat yang terdiri dari berbagai komponen dan mengandung senyawa yang bekerja pada berbagai sasaran serta memberikan pengobatan secara luas sehingga lebih bermanfaat secara farmakologis (Primada Hari Anugrahini & Sri Wahyuni, 2021).

Terdapat lebih dari 30.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi di Indonesia, dan dari jumlah tersebut, 7000 diantaranya telah diketahui khasiatnya, dan hanya 300 yang secara konsisten ditanam sebagai bahan baku industri obat. Pada tahun 2008, Asosiasi Kesejahteraan Dunia (WHO) mengatakan bahwa 86% dari total populasi sebenarnya bergantung pada sistem penyembuhan secara tradisional yang memanfaatkan tanaman untuk menyembuhkan penyakit (Rahmiani, 2019).

Salah satu anugrah Allah swt yang diberikan kepada umat manusia ialah diciptakannya berbagai macam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (الشعراء: ٧)

Artinya: dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik? (QS. Asy-syu'ara' 26:7).

Ayat tersebut menekankan pada kalimat "مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ" dimana memiliki makna tumbuh-tumbuhan yang baik. Kalimat tersebut mengandung makna salah satu tumbuhan yang luar biasa adalah tumbuhan yang mampu memberikan manfaat bagi manusia, salah satunya adalah tumbuhan yang mempunyai khasiat menyembuhkan. Genus *Boehmeria* merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat yang sedang diteliti saat ini. Genus *Boehmeria* adalah genus yang mempunyai spesies yang lumayan banyak. Jumlah spesies yang ada pada genus sebanyak 65 spesies. Banyaknya jumlah spesies mempertimbangkan tingginya kemiripan antara karakter-karakter yang ada, terutama morfologi, anatomi dan penampilannya secara umum. Bagaimana pun, tanaman satu dan tanaman lainnya tidak semuanya memiliki

zat sintetik yang serupa, harusnya ada satu atau beberapa campuran yang berbeda untuk setiap tanaman. Tanaman parang romang termasuk dalam famili urticaceae dan merupakan bagian dari genus boehmeria (Rusdi & Paramitha, 2018)

Pengujian *in silico* merupakan istilah untuk pengujian yang dikerjakan dengan melakukan simulasi komputer (Hardjono, 2013). Kemampuan pengujian *in silico* adalah untuk menemukan senyawa baru, memprediksi, peningkatan efisiensi dalam aktivasi senyawa induk serta dapat memberikan hipotesis (Nurhikmah, 2021). Salah satu strategi yang sering digunakan adalah *docking molecular*, sebuah metodologi yang digunakan untuk memperkirakan kerja sama antara dua molekul dan mendapatkan model yang mengikat (Makatita dkk., 2020). Keuntungan metode ini adalah menghemat biaya percobaan dan mengurangi penggunaan alat (Dona dkk., 2019).

Oleh sebab itu, pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui senyawa aktif yang terdapat pada tumbuhan parang romang menggunakan pendekatan *in silico*.

B. Rumusan Masalah

1. Senyawa biokimia apa saja yang terkandung dalam tumbuhan parang romang?
2. Senyawa biokimia apa saja yang dapat memberikan aktivitas antidiabetes secara *in silico*?

C. Definisi Oprasional

Berikut penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan ini agar pembaca tidak melewatkan satu pun poin yang disampaikan dalam judul:

1. Skrining

Skrining merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui senyawa yang aktif sebagai antidiabetes pada tumbuhan parang romang.

2. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses penarikan zat aktif yang ada pada simplisia akar parang romang dengan pelarut etanol 96%.

3. Ekstrak

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang dihasilkan melalui proses ekstraksi tanaman akar parang romang dengan etanol 96% sebagai pelarut.

4. Antidiabetes

Antidiabetes merupakan obat yang berasal dari tanaman parang romang yang digunakan untuk mengurangi kadar gula darah yang berlebihan dalam tubuh.

5. *In silico*

Uji *in silico* adalah jenis pengujian aktivitas yang menggunakan perangkat komputer untuk mengetahui aktivitas pada tumbuhan akar parang romang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah identifikasi senyawa biokimia dan uji aktivitas senyawa aktif antidiabetes pada ekstrak akar parang romang. Ekstraksi dilakukan dengan metode refluks, identifikasi senyawa biokimia dengan metode LCMS, dan uji aktivitas menggunakan metode *in silico*.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi (2018) dengan judul “pengujian strategi ekstraksi pada kandungan flavonoid total dan aksi penguatan sel batang *Boehmeria virgata*” menunjukkan bahwa kandungan flavonoid total ekstrak batang parang romang dipisahkan menggunakan strategi refluks (2.554 mgEK/g) lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan teknik maserasi (2.058 mgEK/g) dengan nilai berturut-turut. Mengingat penelitian ini, eksplorasi ini mencakup teknik ekstraksi yang digunakan untuk menghasilkan rendemen yang unggul.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Baso Arwan (2017) yang berjudul “ Uji keracunan ekstrak etanol 70% akar parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) pada larva udang (*artemia salina* Leach) dengan menggunakan metode BSLT. Dan hasil yang didapat adalah bagian B mempunyai tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan bagian lainnya dengan nilai LC50 sebesar 16,21 µg/ml. Senyawa alkaloid dan terpena ditemukan pada fraksi B1 pada hasil identifikasi

Penelitian yang dilakukan oleh (Rusdi dkk., 2017) yang berjudul “ uji toksisitas akut ekstrak partisi akar parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) terhadap larva (*artemia salina* leach) dengan metode BSLT menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan dan etil asetat akar parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) senyawa dari golongan terpenoid dan alkaloid dapat ditemukan dan pelarut etanol 70% yang dipisahkan mengandung campuran fenolik, flavonoid dan alkaloid.

Karna mengandung banyak senyawa yang berpotensi untuk mengobati berbagai penyakit degeneratif termasuk diabetes melitus, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyaring aktivitas antidiabetes

dari ekstrak akar parang romang secara *in silico* berdasarkan temuan penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui senyawa biokimia yang terkandung dalam tumbuhan parang romang.
2. Untuk mengetahui senyawa biokimia yang dapat memberikan aktivitas antidiabetes secara *in silico*.

G. Manfaat penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan pemahaman yang lebih luas pada masyarakat mengenai manfaat parang romang sebagai antidiabetes. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber data yang mendukung penelitian selanjutnya dalam upaya pengembangan serta pemahaman mengenai aktivitas antidiabetes pada ekstrak parang romang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Parang Romang

1. Klasifikasi Tanaman (No. 074/UN36.1.4/Lab.Biologi/VI/2021)

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Rosales
Famili : Urticaceae
Genus : *Boehmeria*
Spesies : *Boehmeria virgata* (Forst.) Guill



a



b

Gambar 1. a. Tumbuhan parang romang b. Akar parang romang (Sumber Primer, 2022).

2. Morfologi

Daun memiliki bentuk menyerupai jantung (*cordatus*) dan tepinya bergerigi halus (*serratus*), dengan panjang sekitar 10-20 cm dan lebar sekitar 5-15 cm. Daunnya berwarna hijau muda sampai hijau tua, mengkilat di bagian atas, putih keperakan di bagian belakang serta berbulu halus.

Bunganya merupakan jenis bunga majemuk dengan biji yang kecil-kecil. Bunga pada varietas tertentu berwarna putih kehijauan, sementara ada pula yang berwarna hijau kekuningan dan menjadi warna coklat jika sudah matang. Bunganya diikat berkelompok di antara daun pada bagian bawah batang (Brands, 2007).

3. Kandungan Kimia

Akar parang romang memiliki kandungan senyawa golongan alkaloid, terpenoid, fenolik, dan flavonoid (Rusdi, 2014).

4. Efek farmakologi

Boehmeria virgata (Forst.) Guill bersifat spesifik sebagai antikanker dan dapat berpotensi untuk dikembangkan sebagai antikanker (Lukman dkk., 2014). Akar parang romang memiliki potensi toksisitas akut (Rusdi, 2014).

B. Diabetes

Diabetes melitus (DM) merupakan sekelompok masalah metabolisme yang terjadi akibat tingginya kadar glukosa (hiperglikemia) dan gangguan pencernaan pati, lemak, dan protein (Di piro dkk., 2015). Penyakit diabetes melitus disebabkan oleh adanya gangguan metabolisme pada organ pankreas, hal ini ditandai dengan peningkatan glukosa atau biasa disebut dengan hiperglikemia karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Diabetes melitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi baik pada tingkat pembuluh darah besar (makrovaskuler) maupun pada tingkat pembuluh darah kecil (mikrovaskuler). Diabetes melitus dapat menimbulkan masalah kardiovaskular yang cukup serius, meningkatkan resiko terkena penyakit hipertensi, bahkan dapat menyebabkan infark jantung apabila tidak dilakukan penanganan secepatnya (Lestari dkk., 2021).

Diabetes tipe 1 disebabkan oleh reaksi autoimun pada protein sel pulau pankreas. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin dan faktor lingkungan seperti obesitas dan konsumsi makanan berlebih, olahraga, stress dan penuaan. Berolahraga atau melakukan aktivitas fisik memiliki kendali terhadap kadar glukosa dan menurunkan berat badan bagi penderita diabetes melitus. Manfaat olahraga bagi penderita diabetes melitus adalah dapat menurunkan kadar glukosa darah, menurunkan berat badan, membantu mengatasi terjadinya komplikasi, serta mengatasi gangguan lipid darah dan meningkatkan tekanan darah (Lestari dkk., 2021).

Etiologi penyakit diabetes adalah faktor keturunan dan lingkungan. Diabetes juga dapat disebabkan oleh gangguan sekresi atau aktivitas insulin, kelainan metabolisme yang menghambat pelepasan insulin, kelainan mitokondria, dan berbagai kondisi lain yang memperlambat ketahanan glukosa. Diabetes melitus bisa timbul akibat penyakit eksokrin pankreas, khususnya bila terjadi kerusakan pada sebagian besar pulau pankreas. Selain itu, hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin juga dapat menyebabkan diabetes (Lestari dkk., 2021).

Kelainan mendasar yang dapat dibedakan pada diabetes tipe 1 adalah resistensi insulin pada otot. Resistensi insulin dapat disebabkan oleh: obesitas, glukokortikoid berlebihan (sindrom Cushing atau terapi steroid), hormon pertumbuhan berlebihan (akromegali), kehamilan, diabetes gestasional, penyakit ovarium polikistik, lipodistrofi (didapat atau genetik, berhubungan dengan penumpukan lipid di hati), autoantibodi terhadap reseptor insulin, mutasi reseptor insulin, dan mutasi PPAR yang menyebabkan obesitas genetik (misalnya: perubahan reseptor melanokortin),

dan hemochromatosis (penyakit bawaan yang menyebabkan pengumpulan besi jaringan) (Lestari dkk., 2021).

Pada diabetes tipe I, sel beta pankreas rusak karena proses sistem kekebalan tubuh, sehingga produksi insulin terhenti. Hiperglikemia saat puasa terjadi karena produksi glukosa yang tidak dapat diukur oleh hati. Meskipun glukosa yang diperoleh dari makanan tetap mengalir dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia postprandial (setelah makan), hati tidak dapat menyimpan glukosa. Apabila kadar glukosa dalam darah mencapai tingkat yang cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang telah disaring. Akibatnya, glukosa yang berlebihan dikeluarkan melalui urin. Ketika terjadi peningkatan pelepasan glukosa dalam urin, limbah ini juga disertai dengan kotoran dan elektrolit yang lebih banyak dari biasanya, keadaan ini dikenal sebagai diuresis osmotik. Kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan kekambuhan buang air kecil (poliuria) dan rasa haus yang terus-menerus (polidipsia) (Lestari dkk., 2021).

Kurangnya insulin dapat menekan proses pencernaan protein dan lemak, sehingga dapat menyebabkan penurunan berat badan. Jika kekurangan insulin, kelebihan protein yang mengalir dalam darah tidak dapat disimpan di jaringan. Semua proses metabolisme lemak meningkat tanpa insulin. Keadaan ini biasanya terjadi di antara waktu makan, ketika pelepasan insulin sedikit, namun ketika mendekati jam pelepasan insulin, pencernaan lemak pada DM akan meningkat secara signifikan. Jadi untuk mengatasi penyumbatan insulin dan juga mencegah produksi glukosa dalam darah, penting untuk menentukan berapa banyak insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Sekresi insulin yang berlebihan dapat menyebabkan melemahnya ketahanan glukosa pada penderita, dan kadar glukosa tetap

berada pada batas normal atau sedikit meningkat. Namun diabetes tipe II dapat berkembang jika sel beta tidak mampu memenuhi kebutuhannya (Lestari dkk., 2021).

Diabetes melitus sering kali terjadi karena faktor keturunan serta cara berperilaku atau cara hidup seseorang, dan juga dapat terjadi karena faktor sosial, ekologi, dan akses terhadap layanan. Diabetes dapat mempengaruhi berbagai sistem organ dalam tubuh manusia selama jangka waktu tertentu, yang sering disebut sebagai komplikasi. Komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu mikrovaskular dan makrovaskular. Seluk-beluk mikrovaskuler meliputi kerusakan pada sistem sensorik (neuropati), kerusakan pada sistem ginjal (nefropati), dan kerusakan mata (retinopati) (Lestari dkk., 2021).

Faktor risiko diabetes melitus tipe 2 adalah usia, pekerjaan fisik, kebiasaan merokok, indeks berat badan (BMI), tekanan darah, stres, gaya hidup, keturunan keluarga, kolesterol HDL, minyak lemak, DM kehamilan, riwayat kelainan glukosa dan ketidaknormalan lainnya (Lestari dkk., 2021).

Berikut tanda-tanda penyakit diabetes melitus:

1. Poliuri (sering buang air kecil)

Frekuensi buang air kecil yang meningkat dari biasanya, terutama pada malam hari (poliuria), hal ini disebabkan oleh kadar glukosa yang melebihi batas ginjal ($>180\text{mg/dl}$), sehingga pada kondisi ini gula akan dikeluarkan melalui urine. Untuk mengurangi berkumpunya urine yang dikeluarkan, tubuh akan menahan air sebanyak mungkin ke dalam urine sehingga dapat mengeluarkan urine sebanyak-banyaknya dan buang air kecil secara teratur. Dalam keadaan biasa, urine yang dikeluarkan datangnya berkali-kali lipat dari jumlah ini. Kondisi ini ditandai dengan sering merasa haus dan ingin

minum air sebanyak-banyaknya (poliploidi). Dengan keluarnya urine, tubuh akan menimbulkan sensasi haus sehingga korban umumnya membutuhkan cairan, terutama air dingin, manis, air baru dan banyak air.

2. Polifagi (cepat merasa lapar)

Terjadi peningkatan nafsu makan (polifagia) dan rasa lelah pada penderita DM yang disebabkan oleh gangguan kemampuan insulin. Hal ini menyebabkan tidak adanya bagian glukosa ke dalam sel-sel tubuh. Mayoritas orang yang menderita kondisi ini melaporkan merasa lelah. Selain itu, glukosa dalam tubuh juga berkurang sehingga berdampak pada persepsi otak bahwa kekurangan energi disebabkan oleh rasa lapar, sehingga tubuh menambah asupan makanan dengan memicu peringatan nafsu makan.

3. Berat badan menurun

Ketika tubuh tidak dapat memperoleh energi yang cukup dari glukosa karena kekurangan insulin, tubuh dengan cepat memproses lemak dan protein yang tersedia dalam tubuh menjadi energi. Penderita diabetes yang tidak terkontrol dapat kehilangan glukosa sebanyak 500 gram per 24 jam melalui ekskresi urin, yang setara dengan kehilangan 2000 kalori per hari dari dalam tubuh. Gejala umum terkait komplikasi lainnya termasuk kesemutan pada kaki, gatal, atau luka yang tidak kunjung sembuh. Pruritus vulva (gatal pada selangkangan pada wanita) dan balanitis (nyeri pada penis pada pria) keduanya berhubungan dengan komplikasi (Lestari dkk., 2021).

Interaksi penilaian diabetes melitus yang dapat dilakukan meliputi: pemeriksaan glukosa sewaktu (GDS), pemeriksaan glukosa puasa (GDP), pemeriksaan glukosa prandial 2 jam (GD2PP), penilaian hB_{1c}, penilaian ketahanan glukosa oral (TTGO)(Lestari dkk., 2021).

C. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dapat dihentikan apabila telah tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa pada pelarut dengan konsentrasi pada sel tanaman (Mukhriani, 2014)

Terdapat beberapa metode pada ekstraksi, diantaranya yaitu:

1. Maserasi

Teknik maserisasi adalah strategi sederhana yang paling sering digunakan. Siklus ini digunakan dalam skala terbatas dan lebih jauh lagi dalam skala industri. simplisia dan pelarut yang sesuai disimpan pada suhu kamar dalam wadah inert dan tertutup rapat. Ekstraksi dihentikan ketika keseimbangan telah tercapai antara konsentrasi senyawa dalam zat terlarut dan konsentrasi sel pada tumbuhan. Setelah ekstraksi selesai, pelarut dipisahkan dari sampel melalui proses penyaringan. Kekurangan utama dari strategi maserasi ini adalah bahwa hal ini memerlukan sejumlah besar investasi, sejumlah besar pelarut yang digunakan, dan jika dipertimbangkan, beberapa senyawa akan hilang. Selain itu, mungkin ada beberapa campuran yang sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, manfaat dari strategi maserasi adalah dapat menghindari rusaknya senyawa yang mempunyai sifat termolabil (Mukhriani, 2014).

2. Perkolasi

Dalam strategi perkolasi, simplisia dibasahi selangkah demi selangkah dalam perkolator (tempat berbentuk bulat dan berongga yang dilengkapi dengan keran di bagian dasarnya). Kemudian ditambahkan pelarut ke titik tertinggi kemudian dibiarkan menetes sedikit demi sedikit ke dasar. Kelebihan dari teknik ini adalah sampel selalu diisi dengan pelarut baru,

sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut sulit menjangkau seluruh seluruh wilayah. Selain itu, strategi ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan waktu yang cukup lama (Mukhriani, 2014).

3. Sokletasi

Teknik sokhletasi ini diselesaikan dengan memasukkan simplisia ke dalam sarung selulosa (dapat menggunakan kertas saring) dalam wadah yang diletakkan di atas labu dan di bawah kondensor. Kemudian pelarut yang sesuai dimasukkan kedalam labu lalu suhu diatur di bawah suhu refluks. Keuntungan dari strategi ini adalah proses ekstraksi terjadi tanpa henti, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak diperlukan banyak pelarut dan tidak memerlukan banyak waktu. Kelemahan dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat rusak karena konsentrat yang diperoleh selalu berada pada titik didih (Mukhriani, 2014)

4. Reflux

Metode refluks adalah metode yang menggunakan proses pemanasan. Sistem pemanasan dapat meningkatkan efektivitas ekstraksi, dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan pelarut. prinsip teknik refluks ini adalah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, maka uap dari pelarut yang terkonsolidasi pada dinding kondensor akan mengalir turun Kembali ke wadah. Selanjutnya hasil ekstraksi yang diperoleh disaring dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator (Susanti dkk, 2016).

Keuntungan teknik refluks adalah waktu yang singkat dan penggunaan pelarut yang sedikit. Selain manfaat tersebut, kelemahan dari teknik ini adalah sampel yang digunakan harus tahan terhadap suhu panas (Kiswandono, 2017).

5. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction

Teknik ekstraksi ini merupakan strategi yang diubah dengan menambahkan ultrasound (sinyal frekuensi tinggi, 20 kHz). Dengan tambahan ultrasound, tekanan mekanis diterapkan pada sel-sel dalam simplisia untuk menciptakan ruang di antara sel-sel tersebut dan memudahkan memperoleh senyawa kimia. Teknik ekstraksi ini diterapkan dengan menyematkan kompartemen berisi contoh ke dalam wadah ultrasound. Hasil ekstraksi dan kelarutan campuran dalam pelarut akan meningkat dengan asumsi kerusakan terjadi pada sel (Mukhriani, 2014).

D. Skrining Senyawa Antidiabetes

Untuk mengetahui senyawa pada ekstrak akar parang romang, dilakukan analisis senyawa dengan kromatografi cair spektrofotometri massa

Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS) merupakan proses analisis gabungan antara pemisahan kromatografi cair kinerja tinggi dengan detektor spektrometri massa (Parasuraman dkk., 2014). Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran zat kimia yang didasari oleh perbedaan pergerakan pada setiap komponen campuran yang telah dipisah pada fase diam dalam pengaruh fase gerak. Kelebihan dari kromatografi cair kinerja tinggi ialah ketepatan analisis pada proses pemisahan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan (Parasuraman dkk., 2014). Spektrometer massa sering digunakan untuk menentukan massa dari suatu molekul, rumus molekul ditentukan menggunakan spektrum massa beresolusi tinggi, serta mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pola fragmentasinya (Dachriyanus, 2004).

Kromatografi cair digunakan untuk memisahkan komponen yang terkandung pada sampel, kemudian ion bermuatan terdeteksi oleh

spektrometer massa. Hasil LC-MS dapat memberikan informasi tentang berat molekul, struktur, identitas dan kuantitas komponen tertentu (Agilent, 1998)

Identifikasi, karakterisasi dan kuantifikasi senyawa kimia dapat dilakukan dengan menggunakan LC-MS berdasarkan massa dan fragmentasi molekul. LC-MS dapat digunakan untuk menganalisis sebagian besar senyawa organik dan senyawa polar, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi metabolit dan bioanalisis suatu obat (Vogesser & Parhofer, 2007).

Keunggulan dari LC-MS adalah mampu menganalisis lebih luas komponen-komponen yang terkandung, seperti senyawa termolabil, senyawa yang memiliki polaritas tinggi atau bermassa molekul tinggi, juga protein. Senyawa dipisahkan berdasarkan interaksi relatif dengan lapisan kimia partikel-partikel (fase diam) dan pelarut yang mengalir (fase gerak). Komponen elusi dari kolom kromatografi kemudian dialirkan ke spektrometer massa melalui antarmuka yang dirancang khusus (Gates, 2005). Prinsip dari LC-MS adalah proses pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya, adapun alatnya berupa kolom (Sebagai fase diam) dan larutan tertentu sebagai fase geraknya, pada proses ini menggunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan mengalami pemisahan berdasarkan tingkat kepolaran dan kecepatannya untuk mencapai detektor (waktu resistensi), hal ini akan terlihat pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Pompa fase gerak digunakan untuk membantu mengalirkan pelarut melalui kolom ke detektor. Sampel disuntikkan kedalam aliran fase gerak, kemudian didalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen campuran yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan interaksi antara larutan terhadap fase diam. Larutan yang memiliki interaksi lemah dengan kolom (fase diam) akan keluar lebih dulu. Sebaliknya, larutan yang

kuat berinteraksi dengan fase diam maka larutan tersebut akan keluar dari kolom. Selanjutnya, detektor mendeteksi larutan, kemudian direkam dalam bentuk kromatogram (Mangurana dkk., 2019).

Hasil dari proses analisis LC-MS adalah kromatogram berupa *peak* (puncak) dan bobot molekul dari suatu senyawa sehingga dari proses tersebut dapat diketahui jenis senyawa yang analisis (Mangurana dkk., 2019).

E. Studi *In Silico*

Pengujian *in silico* adalah istilah untuk uji coba atau pengujian yang dilakukan melalui simulasi komputer (Hardjono, 2013). Tujuan dari pengujian *in silico* adalah untuk menemukan campuran baru, membangun ekspektasi, meningkatkan efektivitas dalam menggerakkan senyawa pelindung, dan mampu memberikan spekulasi (Nurhikmah, 2021).

Biasanya penelitian *in silico* lebih diutamakan dibandingkan teknik lain, misalnya *in vivo* dan *in vitro* untuk membantu mengantisipasi dan memberikan spekulasi mengenai pergerakan suatu senyawa atau ligan, hal ini karena proses *in vivo* dan *in vitro* terkadang sulit untuk dipahami hanya sehubungan dengan sistem ligan dan target. dan membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak biaya (Noori & Spanagel, 2013).

Kelebihan *in silico* adalah cenderung diciptakan dalam berbagai bidang ilmu yang terkait dengan pemanfaatan senyawa-senyawa kimia, misalnya agrobisnis hingga biomedis, khususnya di bidang obat-obatan dengan tujuan akhir menemukan obat-obatan baru. Pemanfaatan dasar dari penelitian ini adalah untuk penemuan pengobatan baru. Pemanfaatan langsung dari konsentrasi ini dalam upaya pengembangan obat mencakup pengurangan jumlah makhluk uji yang diperlukan dalam pengujian, membayangkan sistem

obat untuk mencapai tujuannya, dan meningkatkan jenis campuran yang digunakan sebagai obat (Noori & Spanagel, 2013).

Prinsip pada pengujian *in silico* ialah untuk menghasilkan nilai energi ikatan atau *binding affinity*. Energi ikatan memperlihatkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk suatu ikatan antara reseptor dengan ligan. Apabila energi ikatan semakin rendah maka ikatan tersebut semakin stabil. Semakin stabil ikatan ligan dengan reseptor maka bisa diprediksikan bahwa aktivitas dari ligan dan reseptor juga semakin besar (Nurhikmah, 2021). Kelebihan dari metode *in silico* yaitu penggunaan biaya yang lebih terjangkau dibanding dengan pengujian lainnya serta penggunaan waktu yang lebih singkat. Upaya besar telah difokuskan pada pengembangan pendekatan komputasi untuk penelitian ilmiah, salah satunya prediksi toksisitas (Makatita dkk., 2020).

Metode *in silico* yang digunakan pada penelitian ini adalah *Docking Moleculer*. *Docking Moleculer* merupakan suatu prosedur komputasi yang mencoba untuk memprediksi struktur antarmolekul yang kompleks terbentuk antar dua atau lebih konstituen molekul. *Docking* juga menggambarkan proses yang dilakukan oleh dua molekul yang berinteraksi bersamaan dalam ruangan tiga dimensi (Nurhikmah, 2021)

F. Enzim DPP-4

Dipeptidyl peptidase-4 adalah bahan kimia serin protease yang tersebar luas di tubuh. lucagon mengisolasi dua asam amino dari sedikit lucago yang mengandung alanin atau prolin di urutan kedua peptide N-terminus (Group, 2007). Ekspresi dipeptidyl peptidase-4 tidak diatur pada berbagai kondisi penyakit, salah satunya diabetes melitus. Hormon 20lucagon adalah substrat dasar DPP-4 yang mengarahkan pelepasan insulin setelah konsumsi makanan.

Inhibitor DPP-4 menyebabkan bioavailabilitas protein ini lebih menonjol dan akan menunda jangka waktu aktivitas hormon 20lucagon. Dampak mendasar yang terlihat dari pengobatan inhibitor DPP-4 umumnya disebabkan oleh peningkatan kadar GLP-1 (Röhrborn et al., 2015).

Beberapa 20lucago fungsional yang membantu tempat pengikatan dan 20lucago bengkok yang menunjukkan dua rantai enzim terhubung dalam bentuk bioaktifnya ditemukan dalam struktur kompleks DPP-4. Konstruksi ini dicirikan sebagai rantai A dengan endapan asam amino 40-767 dan rantai B dengan penumpukan asam amino 40-767. Tiga situs pengikatan dengan residu asam amino berbeda pada setiap rantai A dan B diidentifikasi dari penelitian Dinamika Struktural DPP-4 dan Pengaruhnya terhadap Proyeksi Ligan Bioaktif. Disarankan desain struktural yang sebanding dengan 16 molekul yang ditemukan melalui pencarian situs pengikatan dengan FTSite. terlebih lagi, FTMap untuk mendapatkan pesaing inhibitor DPP-4 yang mahir (Pantaleão et al., 2018)

Cara pengobatan diabetes melitus tipe 2 berpusat pada bahan kimia glukagon-like peptida (GLP-1), yaitu bahan kimia yang dibuang ke sistem peredaran darah dan masuk ke dalam tubuh setelah makan. GLP-1 dapat merangsang pelepasan insulin, menghambat pengiriman glukagon dan meningkatkan massa sel β -lucagon. Meskipun demikian, bahan kimia ini dengan mudah dinonaktifkan oleh senyawa DPP4. Inhibitor DPP4 bertujuan untuk meningkatkan kadar GLP-1 dengan meningkatkan waktu fungsi senyawa GLP-1 yang akan memperbaiki sel lucagon β , meningkatkan pelepasan insulin dan mengontrol kadar glukosa darah (Sutton et al., 2012). Obat penghambat DPP4 yang saat ini tersedia untuk digunakan adalah sitagliptin, vildagliptin, dan saxagliptin. Sitagliptin diedarkan oleh Organisasi

Makanan dan Obat-obatan AS (FDA) untuk pengobatan diabetes melitus tipe 2. Sistem aktivitas sitagliptin termasuk menghambat penurunan nilai GLP-1 dan GIP, dengan cara ini meningkatkan tingkat hormon lucagon. Dampaknya adalah glukosa dan 21lucagon menurun sementara insulin meningkat (Meece, 2007).

G. Enzim α -Glukosidase

Senyawa α -glukosidase merupakan bahan kimia yang bertanggung jawab mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Enzim akan mengolah karbohidrat menjadi gula yang lebih mudah dimulut dan saluran pencernaan, yang selanjutnya akan dikonsumsi tubuh sehingga kadar glukosa meningkat. Selama waktu yang dihabiskan untuk pencernaan karbohidrat, pankreas terlibat dengan mengantarkan protein α -glukosidase ke dalam sistem pencernaan yang akan mengubah disakarida menjadi monosakarida, misalnya sukrase adalah enzim yang memisahkan sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa dengan dikembalikan pada batas normal (Bosenberg, 2008).

Inhibitor α -glukosidase dapat membatasi kadar glukosa dengan mengurangi atau menunda hidrolisis dan absorpsi karbohidrat. Kemampuan penghambat protein ini untuk pemberian perbaikan diabetes tipe 2 (Holidah dkk., 2018)

H. Sulfonilurea (SUR1)

Reseptor SUR1 dianggap sebagai target dalam pengembangan obat antidiabetes, karena penghambatannya mampu meningkatkan produksi insulin sehingga mampu menurunkan glukosa darah pada penderita diabetes melitus (Suharjono dkk., 2021)

Subunit SUR1 memiliki lima domain termasuk 3 domain transmembran (TMD) dan 2 domain pengikat nukleotida (NDB). Pada setiap NDB terdapat

situs pengikatan untuk ATP atau ADP. Ada situs pengikatan tambahan antara dua TMD, yaitu untuk sulfonilurea. Saluran KATP akan menutup ketika molekul ATP berikatan dengan SUR1 reseptor, dan aktif saat molekul ADP berikatan dengan binding site (Sun, 2021)

Sulfonilurea adalah penghambat reseptor SUR1. Ini mengikat secara nonkompetitif ke SUR1 pada situs alosterik dan menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor yang mengakibatkan KATP saluran diblokir. Membran yang terdepolarisasi memungkinkan Ca^{2+} memasuki sel β , dan mendorong sekresi insulin. Mekanisme ini memungkinkan sulfonilurea menjadi obat untuk mengobati diabetes tipe 2 (Sun, 2021)

I. Tinjauan Islam mengenai tanaman obat

Anugerah terbaik dibandingkan kenikmatan lain yang Allah swt berikan kepada para hamba-Nya adalah kesehatan. Maka hendaknya kita menjaga dan memelihara kesehatan ini sebagai anugerah bagi para hamba-Nya, karena dengan tubuh yang sehat akan mudah bagi manusia untuk menunaikan rasa cinta kepada Allah swt dan melakukan segala aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, agar terhindar dari penyakit dan menjaga kondisi tubuh kita, manusia harus bisa menjaga kesehatannya. Karena tidak seorang pun akan merasakan pentingnya karunia kesejahteraan, hingga mereka mengalami penyakit, seperti kata pepatah “kesehatan bagaikan sebuah mahkota di atas kepala orang yang sehat dan tidak ada yang bisa melihatnya, melainkan orang yang sakit” (Islami, 2022).

Sakit merupakan ujian yang diberikan Allah swt kepada hamba-Nya. Maka dari itu, manusia harus berikhtiar untuk mencari solusi dari hal tersebut. Salah satunya dengan upaya mencari pengobatan (Islami, 2022).

Saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk berobat, satu diantaranya adalah dengan memanfaatkan tanaman, karena selain memiliki harga yang terjangkau, efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Dalam Al-Qur'an juga banyak katakana tentang potensi suatu tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berbagai macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat yang merupakan suatu anugerah, sehingga inilah yang harus manusia manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya QS Thaha/20: 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahannya:

“ (Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kemenag,2019)

Ayat ini menjelaskan bahwa *Dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hamparan* adalah sebuah isyarat bahwa kehidupan manusia dipentas bumi adalah bagian dari hidayah Allah. Firman-Nya: *menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan*, adalah isyarat mengenai perjalanan manusia di bumi guna mendapatkan tujuannya, juga merupakan bagian dari hidayah-Nya. kemudian firman-Nya : *Dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang agar memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana juga terdapat isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit untuk menurunkan hujan, dan hidayahnya buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2009:317)

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa Allah swt menjadikan suatu tumbuhan bukan tanpa penjelasan melainkan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sesuatu yang patut disyukuri, agar dapat berkembang dengan baik dan selanjutnya bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya tanaman bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan pelindung makanan (produk organiknya), Daun-daun dan beberapa bagian lainnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyembuhan. Berbagai macam manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya, yang pada umumnya tumbuh di muka bumi hanya sekedar untuk kelangsungan hidup para khalifah di muka bumi, sedangkan tumbuhan merupakan makhluk yang tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk lain.

Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit, baik itu sakit ringan ataupun yang berat. Apabila merasa sakit, badan tidak nyaman bahkan perlu menahan rasa sakit. Terkadang mereka yang sakit dapat melakukan aktivitas dan tetap bekerja seperti biasanya. Tetapi, dalam keadaan tertentu, mereka tidak mampu melakukan aktivitas, sehingga perlu istirahat total untuk melakukan pengobatan secara intensif.

Ketika mendapatkan anugrah sakit tak selamanya harus disesali, karena terkadang ketika sakit kerap kali mendatangkan beberapa hikmah. Allah menciptakan sakit agar kita dapat merasakan nikmat sehat, makan dengan leluasa serta mampu melakukan aktivitas dan beribadah dengan baik. Insya Allah sakit dapat menghapus dosa, menutupi kesalahan serta mengangkat derajat. Hal ini sesuai dengan hadis muslim nomor 2537:

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

Artinya:

“Abu Said dan Abu Hurairah radiyallahu ‘anhuma meriwayatkan secara marfu’ : tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya” (HR Muslim).

Sehat dan sakit adalah sebuah karunia dari Allah, tak ada kekuatan yang dapat menghalanginya. Jika seseorang merasakan sakit, maka seorang muslim harus sabar sambil tetap menyakini bahwa Allah swt menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nomor 5246:


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

“ dari (Abu Hurairah) radiallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga” (HR Bukhari).

Sehubungan dengan hadis tersebut, diketahui Allah swt tidak akan menurunkan penyakit tanpa menurunkan obatnya. Setiap sembuhnya seseorang dari suatu penyakit pada dasarnya Allah swt yang memberikan kesembuhan, Allah swt berkehendak guna umatnya mempelajari pengobatan sesuai ahlinya, sehingga sesuai dengan penyakit yang akan diobati, untuk mendapatkan obat yang sesuai, juga untuk penyakit tersebut diperlukan kerja keras dalam melakukan percobaan atau penelitian sehingga dapat diketahui dampak minimal dan manfaat yang optimal. Sesungguhnya bumi beserta isinya diciptakan oleh Allah swt mempunyai manfaat, salah satunya tumbuh-tumbuhan, satu diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan,

pemanfaatan tumbuhan yaitu mengembangkannya menjadi sebuah obat. Tujuan dilakukan pengujian obat ialah untuk mencari solusi berbagai penyakit pada umat manusia. Sehingga, pengujian obat merupakan perintah dari Allah swt.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui senyawa aktif antidiabetes ekstrak akar parang romang.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Laboratorium Fitokimia Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan di Unit Laboratorium Riset Unggulan IPB Dramaga Bogor.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental yang dilakukan dengan 3 tahap yaitu ekstraksi, skrining dan uji aktivitas. Tahap ekstraksi dilakukan dengan metode refluks, skrining senyawa biokimia secara kromatografi LC-MS dan uji aktivitas dilakukan secara *in silico* menggunakan metode *Docking Moleculer*.

C. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah akar parang romang.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan antara lain seperangkat alat refluks, blender, timbangan analitik (Kern ABS-N), rotary evaporator (Heidolph), instrument LC-MS (Thermo Scientific™), perangkat keras berupa laptop, perangkat lunak berupa *Chemdraw*, *Discovery Studio*, *Autodocktools*, dan *Notepad++*.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aquades, etanol 96%, akar parang romang, dan struktur tiga dimensi makromolekul (enzim DPP-4 (3F8S), α -glukosidase (5NN8), sulfonilurea SUR1 (2FF7)) yang diperoleh dari web protein data bank (www.rscb.org).

E. Prosedur Kerja

1. Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari tumbuhan parang romang, bagian tanaman yang diambil adalah akar, sampel diperoleh di daerah Malino, Sulawesi Selatan.

2. Pengolahan sampel

Akar parang romang dibersihkan dengan air mengalir lalu disortasi basah agar terpisah dari kotoran atau bahan asing dan bagian tanaman lain yang tidak diperlukan. Kemudian akar dikeringkan dengan lemari pengering. Akar yang telah kering lalu disortasi untuk memisahkan bagian yang rusak/layu akibat pengeringan.

Sampel yang dikeringkan kemudian dijadikan simplisia dengan cara diserbukkan lalu dimasukkan kedalam wadah tertutup rapat.

3. Ekstraksi sampel

Simplisia ditimbang lalu masukkan ke dalam labu alas bulat lalu ditambahkan pelarut etanol 96%. Labu alas bulat kemudian disambung ke seperangkat alat refluks. Proses ekstraksi dilakukan selama 2 jam terhitung pelarut mendidih. Setiap 2 jam pelarut diganti dengan pelarut baru. Ekstrak yang diperoleh kemudian disaring lalu dipekatkan dengan rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental.

4. Skrining senyawa menggunakan LC-MS

Analisis senyawa yang berpotensi sebagai antidiabetes dilakukan menggunakan LC-MS. Analisis LC-MS dilakukan pada ekstrak akar parang

romang. Ekstrak bebas pelarut 5 mg dilarutkan menggunakan metanol pro analisa 1 mL lalu di filter dengan membran Nylon 0.2 μm . Sampel yang telah dipreparasi diinjeksikan ke dalam instrumen LC-MS sebanyak 2 μL menggunakan *microsyringe* dengan kolom (C18) sebagai fase diam. Jenis ionisasi menggunakan mode ESI negatif. Kemudian dilakukan pemisahan menggunakan kromatografi cair, secara bergantian masing-masing komponen masuk ke detektor spektrometer massa, kemudian komponen-komponen terionisasi di sumber ion, sehingga dihasilkan ion yang bermuatan tertentu dan nomor massa yang berbeda-beda. Masing-masing ion dipisahkan dengan penganalisis massa berdasarkan rasio massa ke muatan yang berbeda (m/z). Hasil analisis LC-MS berupa kromatogram dari setiap analit yang digunakan, kromatogram yang dihasilkan terpisah sesuai dengan rasio m/z dari senyawa tersebut. Pada proses ini menggunakan pelarut $\text{H}_2\text{O} + 0.1\%$ asam format (A) dan asetonitril + 0.1% asam format (B) dengan rasio (50:50).

5. Uji aktivitas *in silico*

Pengujian *in silico* dengan metode *Docking Moleculer* dilakukan dengan bantuan perangkat keras berupa laptop dan beberapa perangkat lunak seperti *Autodocktools*, *Discovery studio* dan *Notepad++*.

1. Preparasi makromolekul

Preparasi struktur 3D protein yang diperoleh dari situs protein data bank (www.pdb.com), struktur protein diunduh dengan format .pdb.

Simulasi pemisahan protein yang terikat dengan ligan dan molekul air menggunakan perangkat lunak *discovery studio* yaitu dengan cara menghilangkan residu-residu dan molekul air, kemudian dilakukan pemisahan ligan alami yang terdapat pada protein. Struktur makromolekul hasil preparasi disimpan dalam format .pdb.

2. Optimalisasi dan Pengaturan *Grid Box*

Hasil pemisahan struktur makromolekul selanjutnya dioptimalisasi dengan menambahkan atom hidrogen didalam *software Autodock Tools* kemudian disimpan dengan format *.pdbqt*. Setelah itu mengatur parameter *grid box*. Pengaturan *grid box* dilakukan untuk menentukan ruang tambat ligan. Ruang tambat ligan ditentukan dengan merujuk pada ligan yang telah ditambatkan dengan makromolekul ketika diunduh, yaitu native ligan. Pengaturan parameter *Grid Box* disimpan dengan format *.gpf*.

3. Preparasi ligan

Ligan yang digunakan merupakan senyawa yang terkandung dalam ekstrak akar parang romang yang telah dianalisis menggunakan LC-MS. Struktur ligan diperoleh dari web (pubchem.com) dan aplikasi *chemdwar* kemudian disimpan dengan format file *.pdb*.

4. Pengoptimalan *number of active torsion*

Ligan selanjutnya dioptimasi menggunakan *autodock tools* meliputi *number of active torsion*. Hasil optimasi disimpan dengan format *.pdbqt*.

5. Validasi dan running penambatan molekul dengan *autodock tools*

Proses docking pertama kali dilakukan menggunakan *software autodock* dengan menjalankan 100 running. Nilai *Root Mean Square Deviation (RSMD)* Hasil docking lebih kecil dari 2 Å. Fungsi dari nilai RSMD adalah sebagai validasi dari metode docking yang akan diterapkan. Proses docking senyawa atau ligan yang terdapat pada ekstrak akar parang romang dengan protein target dapat dilakukan apabila syarat ini terpenuhi.

6. Analisis dan visualisasi interaksi

Hasil *Docking Moleculer* adalah *binding site* juga energi ikatan antara ligan dan residu asam amino yang terlibat dalam interaksi dari protein reseptor.

Pada pengujian ini energi ikatan digunakan untuk mengetahui kekuatan ikatan antara protein dengan ligan. Apabila nilai energi ikatan semakin rendah, maka semakin kuat dan stabil ikatan yang terbentuk. Jenis ikatan yang terbentuk hasil *Docking Molecular* dilihat melalui output *notepad++* pada format *dlg*. Hasil docking divisualisasikan dan diamati interaksi ikatan yang terjadi dengan menggunakan *Discovery studio visualizer*. Interaksi yang terjadi berupa ikatan hidrogen serta ikatan phi yang bisa dibedakan berdasarkan warna dari ikatan yang terbentuk. Jika energi ikatan yang dihasilkan antara ligan dengan protein semakin kecil, maka ikatan yang terjadi semakin stabil (Syahri dkk., 2017).

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa diinterpretasikan senyawa yang dapat memberikan aktivitas antidiabetes secara *in silico*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Sampel Akar Parang Romang


650 gram simplisia akar parang romang diekstraksi dengan pelarut etanol 96% dan dari proses tersebut dihasilkan berat ekstrak sebanyak 15,665 gram.

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Akar Parang Romang

Bobot Sampel	Bobot Ekstrak	(%) Rendemen
650 gr	15,665 gr	2,41 %

2. Hasil Skrining LC-MS Ekstrak Akar Parang Romang

Sampel



Gambar 2. Hasil skrining LC-MS ekstrak akar parang romang


Tabel 2. Hasil skrining LC-MS ekstrak akar parang romang


No	Senyawa	Formula	Golongan senyawa	RT (min)	MZC (%)
1	Catechin	C ₁₅ H ₁₄ O ₆	flavonoid	7,31	93,7
2	DL - Malic acid	C ₄ H ₆ O ₅	Asam karboksilat	1,176	99
3	(15Z)- 9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid	C ₁₈ H ₃₄ O ₅	Asam lemak	13,219	92,1
4	N-Acetyl-L-phenylalanine	C ₁₁ H ₁₃ NO ₃	Asam amino	7,466	80
5	16-Hydroxyhexadecanoic acid	C ₁₆ H ₃₂ O ₃	Asam lemak	24,053	89,8
6	Fumaric acid	C ₄ H ₄ O ₄	Asam karboksilat	1,599	87,4
7	3-Hydroxy -3,5,5- trimethyl-4-(3-oxo-1-buten -1-ylidene) cyclohexyl β-D-glucopyranoside	C ₁₉ H ₃₀ O ₈	Glukosida	7,112	95,9
8	Methylmalonic acid	C ₄ H ₆ O ₄	Asam karboksilat	1,634	96,5
9	D-(+)-Galactose	C ₆ H ₁₂ O ₆	Monosakarida	1,148	96,2
10	Azelaic acid	C ₉ H ₁₆ O ₄	Asam karboksilat	9,51	95,2
11	D-(-)-Quinic acid	C ₇ H ₁₂ O ₆	Asam karboksilat	1,137	88,4
12	Citric acid	C ₆ H ₈ O ₇	Asam karboksilat	1,182	86,9
13	2,3 -Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid	C ₉ H ₈ O ₃	Asam karboksilat	8,156	95,7
14	Gluconic acid	C ₆ H ₁₂ O ₇	Asam karboksilat	1,16	88,2
15	5-Methoxysalicylic acid	C ₈ H ₈ O ₄	Asam salisilat	8,205	92,6
16	4-Oxoproline	C ₅ H ₇ NO ₃	pirrolidon	1,199	94,3
17	L-(-)-Arabitol	C ₅ H ₁₂ O ₅	alditol	1,159	90,6
18	α,α-Trehalose	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	disakarida	1,152	94,6
19	Esculin	C ₁₅ H ₁₆ O ₉	kumarin	5,651	94

*RT: retention time, MZC: MZCloud best match.

M A K A S S A R

3. Hasil Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Akar Parang Romang secara *in silico*





Gambar 3. Struktur kompleks reseptor α -glukosidase (5NN8), enzim DPP-4 (3F8S), Sulfonilurea SUR1 (2FF7).

Tabel 3. Parameter docking dan ukuran gridbox reseptor α -glukosidase (5NN8), reseptor DPP-IV (3F8S), reseptor sulfonilurea SUR1 (2FF7).

Reseptor	Grid box	RMSD (Å)
α -glukosidase (5NN8)	x: 0.952 y: -6.775 z: 82.681	0.864
DPP-IV (3F8S)	x: 17.845 y: 17.684 z: 33.657	0.385
Sulfonilurea SUR1 (2FF7)	x: 159.858 y: 65.704 z: -68.379	1.826

Tabel 4. Hasil *docking molekuler* ligan uji, native ligan dan kontrol positif terhadap reseptor α -glukosidase (5NN8).


No	Nama Senyawa	Konstanta Inhibisi	Binding energy(kcal/mol)
1	Native ligan α -glukosidase	13.00 mM	-2.57
2	catechin	20.63 μ M	-6.39
3	DL-Malic acid	10.95 mM	-2.67
4	(15Z)-9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid	2.31 mM	-3.60
5	N-Acetyl-L-phenylalanine	44.08 μ M	-5.94
6	16-Hydroxyhexadecanoic acid	2.51 mM	-3.55
7	Fumaric acid	5.02 mM	-3.14
8	Methylmalonic acid	4.58 mM	-3.19
9	Azelaic acid	3.50 mM	-3.35
10	D-(-)-Quinic acid	1.15 mM	-4.01
11	Citric acid	10.87 mM	-2.68
12	2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid	187.78 μ M	-5.08
13	Gluconic acid	15.33 mM	-2.48
14	5-Methoxysalicylic acid	274.49 μ M	-4.86
15	4-Oxoproline	597.69 μ M	-4.42
16	Esculin	39.28 μ M	-6.01

Tabel.5 Hasil *docking molekuler* ligan uji, native ligan dan kontrol positif terhadap reseptor DPP-IV (3F8S).


No	Nama Senyawa	Konstanta Inhibisi	Binding Energy (kcal/mol)
1	Native ligan DPP-IV	347.74 nM	-8.81
2	catechin	205.57 uM	-5.03
3	DL-Malic acid	944.38 mM	-0.03
4	(15Z)-9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid	516.23 uM	-4.48
5	N-Acetyl-L-phenylalanine	1.04 mM	-4.07
6	16-Hydroxyhexadecanoic acid	13.19 mM	-2.56
7	Fumaric acid	305.10 mM	-0.70
8	Methylmalonic acid	353.89 mM	-0.62
9	Azelaic acid	99.83 mM	-1.37
10	D-(-)-Quinic acid	5.91 mM	-3.04
11	Citric acid		0.74
12	2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid	1.96 mM	-3.69
13	Gluconic acid	46.24 mM	-1.82
14	5-Methoxysalicylic acid	14.21 mM	-2.78
15	4-Oxoproline	2.22 mM	-3.62
16	Esculin	226.58 uM	-4.97

Tabel.6 Hasil *docking molekuler* ligan uji, native ligan dan kontrol positif terhadap reseptor sulfonilurea SUR1 (2FF7).


No	Nama Senyawa	Konstanta Inhibisi	Binding Energy (kcal/mol)
1	Native ligan DPP-IV	591.98 nM	-8.50
2	catechin	63.34 uM	-5.73
3	DL-Malic acid	32.90 uM	-6.12
4	(15Z)-9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid	184.44 uM	-5.09
5	N-Acetyl-L-phenylalanine	8.75 uM	-6.90
6	16-Hydroxyhexadecanoic acid	60.55 uM	-5.75
7	Fumaric acid	20.05 uM	-6.41
8	Methylmalonic acid	14.90 uM	-6.58
9	Azelaic acid	9.67 uM	-6.84
10	D-(-)-Quinic acid	28.47 uM	-6.20
11	Citric acid	8.98 uM	-6.88
12	2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid	13.76 uM	-6.63
13	Gluconic acid	167.12 uM	-5.15
14	5-Methoxysalicylic acid	33.65 uM	-6.10
15	4-Oxoproline	177.32 uM	-5.12
16	Esculin	37.75 uM	-6.03




Gambar 4. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) interaksi intermolekuler antara reseptor α -glukosidase (5NN8) dengan native ligan hasil validasi *docking* (AutodockTools).




Gambar 5. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) interaksi intermolekuler antara reseptor sulfonilurea (2FF7) dengan *native* ligan hasil validasi *docking* (*AutodockTools*).




Gambar 6. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) interaksi intermolekuler antara reseptor DPP-IV (3F8S) dengan *native* ligan hasil validasi *docking* (AutodockTools).




Gambar 7. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa catechin dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 8. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa DL-Malic acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 9. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa (15Z)-9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 10. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa 16-Hydroxyhexadecanoic acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 11. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa Fumaric acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 12. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa Methylmalonic acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 13. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa azelaic acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 14. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa D-(-)-Quinic acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 15. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa Citric acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).




Gambar 16. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa 2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).



Gambar 17. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa 5-Methoxysalicylic acid dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).



Gambar 18. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa 4-Oxoproline dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).



Gambar 19. Visualisasi 3D (a) dan 2D (b) senyawa Esculin dengan reseptor α -glukosidase (5nn8).

Tabel 7. Hasil visualisasi *docking native* ligan dan ligan uji pada reseptor α -glukosidase

No	Senyawa	Ikatan hidrogen	Interaksi		
			Hidrofobik	Unfavorable	Van der waals
1	Native Ligan (5NN8)	Asn925		Lys903	Asp936 Ile937 Val923 Val939 Phe926 Gln902
2	Catechin	Ser864 Asp860 Leu868	His717	Arg594	Phe858 Leu865 Glu866 Glu869
3	DL-Malic acid	Met363 Val867 Ser864			Leu865 Glu866 Arg594 His717 Phe362
4	(15Z)-9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid	Arg594 His717 Arg608		Glu866	Ser864 Leu865 Glu869 Leu868 His714 Phe858 Asp860
5	16-Hydroxyhexadecanoic acid	Arg608 Glu869			Phe362 His584 Glu866
6	Fumaric acid	Ser864 Met363 Glu866 Val867 Leu868			Pro364 Leu865 Arg594 Phe362 His717
7	Methylmalonic acid	Val867 Ser864 Glu866 Leu868			His717 Arg594 Leu865 Glu869
8	Azelaic acid	Glu869 Met363			Leu868 Glu866 Phe362 Pro364 His717 Leu865 Ser864
9	D-(-)-Quinic acid	Glu869 Glu866			Leu868 Leu865

		Val867 Ser864 Met363			Arg594 Phe362
10	Citric acid	Met363 Glu866 Ser864			Glu869 Leu868 Val867 Leu865 Arg594 Phe362
11	2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid	Ser864		Arg594	Leu865 Glu866 His717 His714 Phe858 Asp860
12	5-Methoxysalicylic acid	Leu868 Val867 Glu866			His717 Ser864 Leu865 Met363
13	4-Oxoproline	Glu866 Arg594 Asp860 Ser864			Val867 Phe858 Met363 His714 His717 Leu868 Leu865
14	esculin	Asp860 Arg594 Ser864	Leu868		Phe858 Met363 Val867 Leu865 Glu866 His717
15	N-Acetyl-L-phenylalanine	Val867 Ser864 Glu866			Phe858 Asp860 His714 His717 Leu865 Arg594 Phe362

B. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa yang terkandung pada ekstrak akar parang romang juga untuk mengetahui senyawa yang berpotensi sebagai aktivitas antidiabetes dengan menggunakan metode *in silico*.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah akar parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill). Sampel yang digunakan diperoleh dari daerah Malino, Sulawesi Selatan. Setelah akar parang romang diambil, terlebih dahulu akar parang romang dicuci menggunakan air bersih. Proses ini dilakukan agar kotoran-kotoran yang menempel pada sampel keluar. Setelah itu, sampel di angin-anginkan kemudian di keringkan di lemari pengering. Tujuan dari pengeringan sampel adalah untuk mengurangi kadar air pada sampel, karena kelembapan yang berlebihan membuat simplisia cepat rusak dan untuk mencegah berkembangnya mikroorganisme disimplisia. Kemudian sampel dijadikan simplisia dengan cara diserbukkan menggunakan blender lalu disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat.

Penarikan zat aktif pada akar parang romang dilakukan dengan metode refluks menggunakan eluen etanol 96%. Alasan pelarut tersebut digunakan adalah karena memiliki kemampuan dapat melarutkan sebagian besar senyawa yang terkandung. Adapun pertimbangan dalam pemilihan pelarut diantaranya adalah selektivitas, kemudahan bekerja, ekonomis, ramah lingkungan serta keamanan (Departemen Kesehatan RI, 2000). Etanol 96% dipilih karena merupakan pelarut universal yang dapat menyari hampir semua zat aktif yang terdapat dalam simplisia, juga lebih efisien dalam degradasi dinding sel sehingga polifenol akan tersari lebih banyak dan

termasuk kedalam pelarut polar yang dapat menarik senyawa tanin, saponin, dan flavonoid dengan jumlah yang lebih banyak (Handarni & Putri, 2020). Metode ekstraksi refluks digunakan dengan alasan waktu yang digunakan lebih singkat dibandingkan dengan metode lain, karena ekstraksi dilakukan pada titik didih eluen. Waktu proses ekstraksi ialah selama 2 jam, lalu ekstrak disaring dan dipisahkan ampasnya. Ampas yang telah dipisahkan di ekstraksi ulang sebanyak 3 kali dengan metode yang sama. Ekstrak yang dihasilkan kemudian di pekatkan menggunakan rotary evaporator (rotavapor).

Hasil dari proses ekstraksi adalah ekstrak, ekstrak merupakan sediaan kental yang didapatkan dari proses ekstraksi senyawa aktif yang terkandung pada simplisia dengan pelarut yang sesuai, lalu diuapkan seluruh atau sebagian bepelarut (Departemen Kesehatan RI, 2000). Ekstrak kental yang didapatkan dihitung hasil rendamennya untuk mengetahui jumlah ekstrak yang dapatkan. Rendemennya dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rendamen total (\%)} = \frac{\text{bobot ekstrak kental}}{\text{bobot simplisia yang diekstraksi}} \times 100$$

Didapatkan persentase rendamen ekstrak 2,41 dari 650 gr simplisia akar parang romang (Tabel 1).

Kemudian dilakukan skrining senyawa pada ekstrak yang telah dihasilkan menggunakan LC-MS. Hasil analisis pemisahan berupa kromatogram (Gambar 2). Senyawa yang lebih dahulu muncul pada kromatogram adalah senyawa yang bersifat polar setelah itu diikuti senyawa yang sifat kepolarannya lebih rendah. Menurut Hidayat (2020) adsorpsi senyawa non polar akan lebih kuat dibandingkan dengan fase diam sehingga senyawa non polar membutuhkan waktu yang lama untuk melewati kolom. Sebaliknya, adsorpsi senyawa polar akan lebih lemah dengan fase diam sehingga senyawa

tersebut akan terelusi oleh fase gerak yang memiliki sifat relatif polar dan dibutuhkan waktu yang lebih cepat untuk melewati kolom.

Proses pemisahan dapat dikatakan baik karena pemilihan kolom dan fase gerak yang sesuai untuk dilakukan proses pemisahan. Fase gerak yang digunakan adalah campuran H₂O + 0.1% asam format (A) dan asetonitril + 0.1% asam format (B). Fase diam yang digunakan adalah kolom (C18) yang bersifat non polar, sehingga senyawa yang memiliki waktu retensi tertinggi adalah senyawa yang memiliki sifat non polar. Hasil kromatogram menunjukkan beberapa puncak dengan waktu retensi yang berbeda-beda. Senyawa membutuhkan waktu retensi untuk bergerak melalui kolom ke detektor. Kepolaran dari senyawa berhubungan dengan waktu retensi karena terdapat interaksi antara senyawa dalam sampel dengan fase diam.

Sampel dalam bentuk cairan akan diionisasi terlebih dahulu menggunakan metode ESI negatif menghasilkan ion yang akan dibaca oleh detektor MS. Kromatogram diolah dengan *Software Masslynx 4.1* dengan demikian diketahui dan dapat diprediksi senyawa dari tiap puncak dari kromatogram (Ridhwan, 2022). Setiap puncak yang berada pada kromatogram menggambarkan suatu senyawa. Mengacu pada nilai *measured mass* dan *calculated mass* pada spektrum diketahui prediksi rumus molekul dari spektrum tersebut.

Analisis hasil LC-MS mengidentifikasi adanya 100 senyawa pada ekstrak akar parang romang diantaranya 8 senyawa golongan karboksilat, 2 golongan senyawa asam lemak, golongan senyawa flavonoid, asam salisilat, pirrolidon dan kumarin masing-masing sebanyak 1 senyawa; golongan metabolit primer sebanyak 3 senyawa, dan 52 senyawa diantaranya tidak terdeteksi yang ditunjukkan pada (Gambar 2) juga ditunjukkan pada (Tabel 2). Senyawa

prediksi diidentifikasi menggunakan *online library* berdasarkan penelitian yang dilaporkan sebelumnya.

Pencarian jenis senyawa berdasarkan rumus molekul yang telah diketahui dari *software Masslynx* dapat diakses melalui website *Massbank* dengan menambah 1 atom H pada rumus molekul yang dicari karna pada proses analisis LC-MS menggunakan metode ESI negatif yaitu ionisasi dengan pelepasan sebuah proton atau deprotonasi. Dalam masing-masing peak dipilih rumus molekul dengan *fit confidence score* (fit conf %) tertinggi, nilai ini menandakan konsistensi yang tinggi dengan nilai teoritis sehingga dapat diketahui nama dari senyawa tersebut.

Docking moleculer pada penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa aplikasi, yaitu : *discovery studio, chemdraw, autodocktools, dan notepad++*. Langkah awal yang dilakukan ialah melakukan preparasi protein dan ligan. Penelitian ini menggunakan protein dengan kode 5NN8,3F8S dan 2FF7 yang didapatkan dari *Protein Data Bank* (PDB). Protein ini digunakan sebagai reseptor terhadap ligan.

Kemudian dilakukan preparasi menggunakan perangkat lunak *Discovery Studio Visualizer*, struktur protein diambil dari PDB (www.rscb.org). Struktur yang dipilih merupakan struktur kristal α -glukosidase, DPP-IV dan Sulfonilurea Reseptor 1 dengan identitas protein 5NN8, 3F8S, dan 2FF7 (Gambar 3). setelah berhasil terunduh, struktur makromolekul tersebut masih terikat dengan native ligan dan molekul air. *Native* ligan dan molekul tersebut harus dipisahkan karena tidak diperlukan dari struktur makromolekul protein sehingga dapat mengganggu proses penambatan. Molekul air yang ada pada makromolekul atau reseptor harus dihilangkan karena dapat menyebabkan pembentukan kompleks antar reseptor yang

digunakan dengan molekul air sehingga dapat menyebabkan proses *docking* yang kurang optimal. Ketidak optimalan tersebut dikarenakan pada tahap protonasi terdapat penambahan atom hidrogen yang bertujuan untuk menstabilkan ligan serta menyesuaikan pH biologis tubuh menjadi pH 7,4 (Ridhwan, 2022). Begitu juga dengan *native* ligan yang terikat pada sisi aktif makromolekul akan menghalangi interaksi penambatan dengan ligan uji. Pemisahan *native* ligan dan molekul air pada makromolekul dihilangkan menggunakan *Discovery Studio Visualizer*, dengan demikian didapatkan struktur makromolekul yang siap untuk tahap selanjutnya. Struktur tersebut disimpan dengan format.pdb.

Selain optimalisasi pada tahap protonasi, optimalisasi juga dilakukan pada pengaturan *grid box parameter*. Optimalisasi tersebut dilakukan menggunakan *software Autodocktools*. Pengaturan *grid box* dilakukan untuk menentukan ruang tambat ligan. Ruang tambat ligan ditentukan merujuk kepada ligan yang sudah ditambatkan dengan makromolekul protein pada saat diunduh, yaitu *native ligan*. Parameter pengaturan *grid box* tersebut terdiri dari center x, center y, center z untuk mengatur letak *parameter box* pada makromolekul protein, kemudian size x, size y, size z dan *spacing angstrom* untuk menentukan besar kecilnya ukuran *grid box* untuk penambatan ligan yang akan ditambatkan. Hasil pengaturan yang diperoleh ditunjukkan pada (Tabel 3). setelah reseptor selesai dipreparasi dan dioptimasi dengan *AutodockTools*, file disimpan dalam format .pdbqt.

Kemudian dilakukan preparasi pada ligan, ligan yang akan ditambatkan merupakan senyawa yang diperoleh dari hasil analisis LC-MS ekstrak akar parang romang. Struktur ligan yang diperoleh digambar menggunakan *software chemdraw*, sehingga diperoleh struktur senyawa 3D, kemudian di

simpan dengan format pdb. Agar dapat dibaca dengan program *AutodockTools* untuk dilakukan preparasi kembali dan penambatan molekul.

Setelah melewati tahap preparasi menggunakan *software chemdraw*, dilakukan preparasi kembali menggunakan *software AutodockTools* untuk dilakukan optimalisasi. Dalam pengoptimalisasian ligan, dilakukan penambahan muatan *gasteiger* dan pengaturan *number of active torsion* dengan menggunakan *AutodockTools*. Muatan *gasteiger* ini secara otomatis akan ditambahkan pada ligan ketika dibuka dengan *AutodockTools*. Penambahan muatan *gasteiger* adalah penambahan atom hidrogen pada ligan, pengaturan ini bertujuan untuk menentukan ikatan-ikatan aktif yang dapat diatur selama proses penambatan berlangsung, sehingga dapat mengurangi kinerja dan juga waktu yang diperlukan. Ligan hasil pengoptimalan ini di simpan dalam format .pdbqt (Lampiran 6).

Selanjutnya proses validasi penambatan molekul dilakukan dengan menggunakan *software AutodockTools*. Validasi metode docking dilakukan untuk mengetahui apakah PDB yang kita gunakan memenuhi persyaratan digunakan dalam *molecular docking* selanjutnya (Ananto dkk., 2020) Parameter hasil penambatan molekul dapat dilihat dari nilai energi bebas atau energi ikatan dan konstanta inhibisi. Semakin rendah nilai energi ikatannya, maka ikatan kompleks senyawa dengan reseptor akan semakin kuat karna terjadi kestabilan dan kekuatan interaksi non-kovalen pada senyawa reseptor. Tahapan pertama yang dilakukan adalah *redocking*, metode *redocking* dikatakan valid apabila nilai *Root Mean Square Deviation (RMSD)* $\leq 2\text{\AA}$, adapun nilai RSMD dari ketiga native ligan adalah 0.864 (5NN8), 0.385 (3F8S), 1.826 (2FF7). Artinya reseptor tersebut memenuhi syarat karena nilai $\text{RSMD} < 2\text{\AA}$ (Tabel 3).

RMSD merupakan penyimpangan jarak antara posisi ikatan native ligan dengan protein setelah dilakukan *docking* dengan posisi *native ligand* yang sebenarnya. perbandingan jarak atom tersebut merupakan perubahan jarak dan konformasi ligan awal dengan jarak dan konformasi ligan terbaik hasil simulasi. Nilai RMSD dikatakan baik jika $\leq 2\text{\AA}$. Semakin kecil nilai penyimpangan, maka semakin kecil pula kesalahan prediksi interaksi ligan dengan protein (Ridhwan, 2022).

Nilai RMSD yang diperoleh dari penambatan antara makromolekul α -glukosidase (5NN8) *native ligan* adalah 0.86\AA , sulfonilurea SUR1 (2FF7) dengan *native ligan* adalah 1.82\AA dan DPP-IV (3F8S) dengan *native* adalah 0.38\AA . Hasil validasi tersebut dapat diartikan bahwa proses *docking* ligan dapat dilakukan kepada ligan uji yang diperoleh dari hasil interpretasi senyawa ekstrak akar parang romang. Penambatan ulang molekul juga menghasilkan ikatan hidrogen yang terbentuk antara *native* ligan dengan residu asam amino Asn925 yang ada pada reseptor α -glukosidase (Gambar 4).

Selanjutnya dilakukan simulasi *molecular docking* atau penambatan molekul dilakukan dengan menambatkan ligan yang diperoleh dari hasil analisis LC-MS ekstrak akar parang romang terhadap makromolekul target (reseptor) yaitu α -glukosidase, dpp-4 dan sulfonilurea SUR1 dengan menggunakan *software AutodockTools* yang sudah tervalidasi.

Analisis hasil penambatan molekul pada penelitian ini mencakup nilai energi bebas, konstanta inhibisi juga interaksi ligan dan protein. Nilai energi bebas yang rendah menggambarkan stabilnya konformasi yang terbentuk, sebaliknya, nilai energi bebas yang tinggi menggambarkan kompleks yang terbentuk kurang stabil. Hasil penambatan molekul dari masing masing ligan

terlihat pada (Tabel 4) untuk reseptor α -glukosidase, (Tabel 5) untuk DPP-4 dan (Tabel 6) untuk sulfonilurea SUR1.

Nilai energi bebas memiliki perbandingan nilai yang sama dengan nilai konstanta inhibisi (K_i). Konstanta inhibisi menunjukkan nilai konsentrasi yang diperlukan dalam menghambat reseptor. Menurut Nurfitriyana (2010) semakin rendah nilai konstanta inhibisi maka semakin baik dalam berikatan antara ligan dan reseptor. Pada (Tabel 4) hasil docking senyawa terdapat 15 senyawa yang memiliki nilai konstanta inhibisi yang rendah dibandingkan dengan native ligan reseptor α -glukosidase (13.00 mM). Yang artinya senyawa tersebut memiliki nilai konstanta inhibisi lebih baik dari *native* ligan. Hasil dari energi bebas dan konstanta inhibisi (K_i) ligan uji menunjukkan nilai yang baik dari ligan pembanding, hal ini menunjukkan bahwa ligan-ligan yang terkandung pada ekstrak akar parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) memiliki ikatan yang kuat dan konsentrasi inhibisi yang lebih baik untuk menghambat α -glukosidase dan berpotensi sebagai antidiabetes.

Setelah dilakukan simulasi penambatan molekul, hasil penambatan molekul dapat dilakukan visualisasi. Visualisasi penambatan molekul dapat melihat ikatan atau interaksi yang terbentuk antara senyawa ligan uji dengan sisi aktif reseptor. Pada (Tabel 7) menunjukkan residu-residu enzim yang bereaksi dengan ligan uji terhadap reseptor target α -glukosidase. Residu asam amino yang membentuk ikatan ataupun berinteraksi dengan reseptor dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bentuk ikatan dan interaksinya. Yaitu ikatan hidrogen yang ditandai dengan warna hijau, interaksi hidrofobik ditandai dengan warna merah muda, interaksi elektrostatik ditandai dengan warna jingga, interaksi *unfavorable* yang ditandai dengan warna merah, dan

interaksi Van Der Waals ditandai dengan warna hijau muda. Ikatan dan interaksi tersebut dapat mempengaruhi nilai afinitas ligan dengan reseptor.

Pada (Tabel 7) dapat dilakukan analisis ikatan dan interaksi yang terjadi. Analisis berfokus pada ikatan hidrogen yang terbentuk antara asam amino dengan ligan uji karena ikatan hidrogen lebih kuat dari interaksi Van Der Waals (aromatik dan hidrofobik). Interaksi atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan atom elektronegatif seperti flour (F), nitrogen (N), oksigen (O) terlibat dalam ikatan hidrogen (Ridhwan, 2022). Hasil visualisasi dua dimensi dan tiga dimensi terlihat pada (Gambar 7 hingga Gambar 20).

Interaksi yang terbentuk pada ligan dan residu asam amino melibatkan beberapa residu yang penting pada interaksi ligan dan makromolekul enzim. Ikatan hidrogen yang terbentuk dari ligan uji tersebut lebih banyak dibandingkan dengan *Native* ligan.

Hasil visualisasi dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) pada area penambatan ligan dan reseptor dapat menunjukkan ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi elektrostastik. Interaksi elektrostatik juga berperan dalam stabilitas ligan terhadap reseptor. Interaksi elektrostatik merupakan interaksi antara atom yang disebabkan perbedaan kepolarnya (Ridhwan, 2022). Interaksi ini memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan konformasi protein apabila jumlahnya banyak. Interaksi elektrostatik berupa jembatan garam (*salt bridge*). Jembatan garam merupakan ikatan garam yang terbentuk antara gugus yang memiliki perbedaan muatan pada rantai sampin asam amino dengan gugus ligan. Sedangkan interaksi Van Der Waals merupakan gaya tarik menarik listrik yang relatif lemah akibat kepolaran molekul yang permanen atau terinduksi. Interaksi Van Der Waals merupakan bagian non polar dari interaksi yang

tidak berhubungan dengan interaksi elektrostatik yang disebabkan muatan atom (Ridhwan, 2022).

Hasil visualisasi senyawa tersebut tiga diantaranya memiliki interaksi yang tidak menguntungkan (*unfavorable*). Interaksi ini dapat berupa efek sterik, tolakan ikatan donor-donor antara dua atom, serta tumbukan ikatan akseptor-akseptor antara dua atom. Interaksi pada senyawa tersebut masing-masing membentuk interaksi dengan asam amino yang berbeda. Jarak dari interaksi ini juga dapat mempengaruhi nilai energi bebas dan cenderung membuat ketidakstabilan. Perbedaan energi bebas diprediksi karena terdapat perbedaan banyaknya ikatan hidrogen yang terbentuk, jarak ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, interaksi Van Der Waals, interaksi elektrostatik serta interaksi *unfavorable*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Didapatkan 100 senyawa yang terkandung pada ekstrak akar parang romang diantaranya 8 senyawa golongan karboksilat, 2 golongan senyawa asam lemak, golongan senyawa flavonoid, asam salisilat, pirrolidon, dan kumarin masing-masing sebanyak 1 senyawa; golongan metabolit primer sebanyak 3 senyawa, dan 52 senyawa diantaranya tidak terdeteksi.
2. Senyawa yang terkandung pada ekstrak akar parang romang yang dapat diinterpretasikan sebagai antidiabetes secara *in silico* diantaranya adalah Catechin, DL - Malic acid, (15Z) -9,12,13-Trihydroxy-15-octadecenoic acid, 16-Hydroxyhexadecanoic acid, fumaric acid, methymalonic acid, azelaic acid, D-(-)-Quinic acid, citric acid, 2,3 -Dihydro-1- benzofuran-2-carboxylic acid, 5-Methoxysalicylic acid, 4-Oxoproline, esculin, N-Acetyl-L-phenylalanine dengan protein target α -glukosidase memiliki ikatan yang lebih stabil dibandingkan *native* ligan dengan protein target α -glukosidase.

B. Saran

Pada penelitian ini, selanjutnya diperlukan adanya penelitian mengenai efek farmakologi, farmakokinetik serta toksisitas dari senyawa metabolit sekunder terhadap target reseptor α -glukosidase.

DAFTAR PUSTAKA

- Agilent. 1998. *Basic of LC/MS*.
- Ananto, A. D., Muliastuti, H., & Hamdin, C. D. (2020). *Studi In Silico Bioaktivitas Antikanker Senyawa Aktif Dalam Minyak Biji Buah Wali [Brucea javanica (L.) Merr]*. 1(2), 0-3.
- Brands. (2007). *Systema Naturae 2000 The Taxonomicon Universal Taxonomic Services*.
- Bösenberg, L.H. (2008). The mechanism of action of oral antidiabetic drugs: a review of recent literature. *The Journal of Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa*: 80-88.
- Dachriyanus. (2004). *Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi*.
- Departemen Kesehatan RI. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tanaman Obat. In *Departemen Kesehatan RI* (Vol. 1, hal. 5-9).
- Di piro, Joseph T., Wells, B. G., Schwinghammer, T. L., & Di Piro, C. V. (2015). Satellite sensors zero in on resource and disaster planning. In *Laser Focus World* (Vol. 44, Nomor 8).
- Dona, R., Frimayanti, N., Ikhtiarudin, I., Iskandar, B., Maulana, F., & Silalahi, N. T. (2019). Studi In Silico, Sintesis, dan Uji Sitotoksik Senyawa P-Metoksi Kalkon terhadap Sel Kanker Payudara MCF-7. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 6(3), 243. <https://doi.org/10.25077/jsfk.6.3.243-249.2019>
- Handarni, D., & Putri, S. H. (2020). *Skrining Kualitatif Fitokimia Senyawa Antibakteri pada Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava L .)*. 8(2), 182-188.
- Hardjono, S. (2013). Sintesis Dan Uji Aktivitas Antikanker Senyawa 1-(2-Klorobenzoiloksi)Urea Dan 1-(4-Klorobenzoiloksi)Urea. *Berkala Ilmiah Kimia Farmasi*, 2(1), 16-21.
- Holidah, D., Yasmin, Y., & Christianty, F. M. (2018). Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Teh Hitam dan Teh Hijau secara In Vitro Menggunakan Metode Inhibisi Enzim α -Glukosidase. *Pustaka Kesehatan*, 6(2), 235. <https://doi.org/10.19184/pk.v6i2.7573>
- Islami, M. L. B. (2022). *Hadis-hadis tentang Pengobatan Herbal: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Tinjauan Kesehatan*. 2(3), 503-526. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i3.14453>
- Kiswandono, A. A. (2017). SKRINING SENYAWA KIMIA DAN PENGARUH METODE MASERASI DAN REFLUKS PADA BIJI KELOR (*Moringa oleifera*, Lamk) TERHADAP RENDEMEN EKSTRAK YANG DIHASILKAN. *Jurnal Sains Natural*, 1(2), 126. <https://doi.org/10.31938/jsn.v1i2.21>
- Leonita, E., & Muliani, A. (2015). Penggunaan Obat Tradisional oleh Penderita Diabetes Mellitus dan Faktor-faktor yang Berhubungan di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Pekanbaru Tahun 2015. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 3(1), 47-52. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol3.iss1.101>
- Lestari, Zulkarnain, & Sijid, S. A. (2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan. *UIN Alauddin Makassar, November*, 237-241. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb>

- Lukman, M., Wahyudin, E., Manggau, M. A., & Subehan. (2014). *efek sitotoksik empat tanaman obat makassar terhadap sel leher rahim manusia garis dan selektivitasnya*. 6(10), 851–855.
- Makatita, F. A., Wardhani, R., & Nuraini. (2020). Riset in silico dalam pengembangan sains di bidang pendidikan, studi kasus: analisis potensi cendana sebagai agen anti-aging. *Jurnal ABDI*, 2(1), 59–67.
- Mangurana, W. O. I., Yusnaini, Y., & Sahidin, S. (2019). ANALISIS LC-MS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry) DAN METABOLIT SEKUNDER SERTA POTENSI ANTIBAKTERI EKSTRAK n-HEKSANA SPONGS *Callyspongia aerizusa* YANG DIAMBIL PADA KONDISI TUTUPAN TERUMBU KARANG YANG BERBEDA DI PERAIRAN TELUK STARING. *Jurnal Biologi Tropis*, 19(2), 131–141. <https://doi.org/10.29303/jbt.v19i2.1126>
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Agripet*, 8(2), 76. <https://doi.org/10.17969/agripet.v16i2.4142>
- Noori, H. R., & Spanagel, R. (2013). In silico pharmacology: drug design and discovery's gate to the future. *In Silico Pharmacology*, 1(1), 2012–2013. <https://doi.org/10.1186/2193-9616-1-1>
- Nurhikmah. (2021). Hexadecanamide Dan Hyphoxanthine Sebagai Senyawa Antibiotik Asal Bakteri Endosimbion Cacing Tanah Sebagai Alternatif Antibiotik Melalui Uji in Silico. *Borneo Journal of Science And Mathematics Education*, 1341(2), 127–135.
- Parasuraman, S., Rao, A., Balamurugan, S., Muralidharan, S., Jayaraj Kumar, K., & Vijayan, V. (2014). An Overview of Liquid Chromatography-Mass Spectroscopy Instrumentation. *Pharmaceutical Methods*, 5(2), 47–55. <https://doi.org/10.5530/phm.2014.2.2>
- Primada Hari Anugrahini, C., & Sri Wahyuni, A. (2021). Narrative Review : Aktivitas Antidiabetes Tanaman Tradisional Di Pulau Jawa. *Jurnal Farmasi Indonesia. Edisi Khusus (Rakerda-Seminar IAI Jateng)*, 120–131. <http://journals.ums.ac.id/index.php/pharmacon>
- Rahmiani, D. (2019). Penetapan Parameter Non Spesifik Ekstrak Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill.). *Skripsi*, 8(5), 55.
- Richardo, B., Pengemanan, D., & Mayulu, N. (2021). Kejadian Diabetes Mellitus Tipe II pada Lanjut Usia di Indonesia (Analisis Riskesdas 2018). *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 17(1), 9–20. <https://doi.org/10.24853/jkk.17.1.9-20>
- Ridhwan, M. (2022). Aktivitas Antidiabetes In Vitro dan In Silico Ekstrak Daun Kedondong (*Spondias Dolcis*) Terhadap Penghambatan alfa-glukosidase. *Skripsi*, 46–50.
- Rusdi, M. (2014). Skrining Fitokimia dan Uji toksisitas Ekstrak Akar Parang Romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) Terhadap Larva Udang *Artemia salina* Leach. *Jurnal Farmasi dan Bahan Alam*, 2(2), 68–71.
- Rusdi, M., Ayu, K., Noer, S. F., & Bariun, H. (2017). Uji Toksisitas Akut Ekstrak Partisi Akar Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) Terhadap Larva *Artemia salina* Leach Dengan Metode Brine Shrimps Lethality Test. *Jurnal Farmasi FKI UINAM*, 5(3), 169–173.
- Rusdi, M., & Paramitha, A. T. (2018). *UJI PENURUNAN KOLESTEROL PADA*


MENCIT (Mus musculus) SECARA IN-VIVO MENGGUNAKAN EKSTRAK ETANOL AKAR PARANG ROMANG (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) M. Rusdi, Mukhriani, Andi Tenri Paramitha. 6(1).

- Simanjuntak, H. A. (2018). Pemanfaatan Tumbuhan Obat Diabetes Mellitus Di Masyarakat Etnis Simalungun Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. *BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan)*, 5(1), 59–70. <https://doi.org/10.31289/biolink.v5i1.1663>
- Siregar, S. F. (2021). Saffron Sebagai Terapi Adjuvant pada Komplikasi Vaskular Diabetes Melitus. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(1), 153–158.
- Sun, C. (2021). *Molecular Docking of Sulfonylureas to the SUR1 Receptor. December.*
- Susanti, N. M. P., Budiman, I. N. ., & Warditiani, N. K. (2016). Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 90 % Daun Katuk (*Sauropus androgynus (L .) Merr .*). *Repository Universitas Udayana*, 83–86.
- Syahri, J., Yuanita, E., Nurohmah, B. A., Armunanto, R., & Purwono, B. (2017). Chalcone analogue as potent anti-malarial compounds against *Plasmodium falciparum*: Synthesis, biological evaluation, and docking simulation study. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 7(8), 675–679. <https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2017.07.004>
- Tse, G., Tsz, E., Lai, H., Tse, V., & Yeo, M. (2016). *Mekanisme Molekuler dan Elektrofisiologi yang Mendasari Aritmogenesis Jantung pada Diabetes Mellitus. 2016.*
- Vogeser, M., & Parhofer, K. G. (2007). Liquid chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS) - Technique and applications in endocrinology. *Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes*, 115(9), 559–570. <https://doi.org/10.1055/s-2007-981458>
- Wulandari, A. (2009). *Penderita Diabetes Mellitus Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Tahun 2008. 1–22.*
- Zamaa, M. S., & Sainudin. (2019). Hubungan Kepatuhan Pengobatan Dengan Kadar Gula Darah Sewaktu Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(1), 2013–2015.

ALAUDDIN
M A K A S S A R


LAMPIRAN

Lampiran 1. Proses ekstraksi sampel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2. Skema kerja skrining dan uji aktivitas ekstrak akar parang romang




Lampiran 3. Penyiapan ekstrak




Lampiran 4. Preparasi reseptor





Lampiran 5. Preparasi ligan



Lampiran 6. Proses docking molekuler



Lampiran 7. Visualisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rahmi Fitri Lestari Jamal akrab dipanggil rahmi, lahir di Kolaka pada Tanggal 17 Desember 2001, anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak dari Ayahanda (alm) H. Jamaluddin dan Ibunda Hj. Jumriah. Penulis memulai Pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 2 Laloeha kolaka Tahun 2008 dan selesai pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Mts Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka dan selesai pada tahun 2016, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kolaka, penulis mengambil Jurusan IPA dan selesai Pada Tahun 2019. Penulis Kembali melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih Jurusan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R