

**ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA BPJS TERAPI ANTIDIABETES PADA PASIEN
DIABETES DI RUMAH SAKIT HIKMAH KOTA MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

MUH. FADHIL RAHMADANA T.

NIM : 70100120091

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Fadhil Rahmadana T.

Nim : 70100120091

Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 13 Februari 2002

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Samata

Judul : Analisis Efektivitas Biaya BPJS Terapi Antidiabetes
Pasien Diabetes di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 13 Juli 2024

Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Muh. Fadhil Rahmadana T.
NIM. 70100120091

MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Biaya BPJS Terapi Antidiabetes Pada Pasien Diabetes di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar", yang disusun oleh Muh. Fadhil Rahmadana T. NIM: 70100120091, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi (munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari **Senin 19 Agustus 2024**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 19 Agustus 2024
26 Rabiul Awal 1446 H

DEWAN PENGUJI

Nomor SK: B-3911/FKIK/PP.00.9/8/2024

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Indah, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Khaerani, S, Farm., M.Farm. Klin.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Muhammad Shuhufi, S.Ag., M.Ag	(.....)

Disetujui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.
NID. 198106212006042005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, shalawat menyertai salam tak henti-hentinya penulis curahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Judul skripsi yang penulis jadikan penelitian yaitu "Analisis Efektivitas Biaya BPJS Terapi Antidiabetes Pasien Diabetes di Rumah Sakit Hikmah Makassar". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

Selama menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan, motivasi, arahan, saran dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sangat tulus, penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ir. Abdurrahman Ali dan Ibunda Hamdana, atas dukungan dan doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT, memberikan rahmat dan melindungi mereka di dunia dan juga di akhirat, serta menjadikan mereka golongan orang-orang beriman.

Pada penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku wakil rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Bapak Dr. H. Andi, Aderus, Lc., M.Ag. selaku wakil rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd selaku wakil rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Bapak Prof. H. Muhammad Amry, Lc., M.Ag selaku wakil rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Ibu Dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si selaku Wakil Dekan I dan juga selaku Pembimbing Akademik, Bapak Dr. H. Fais Sutranegara SKM., Mars, Selaku Wakil Dekan II dan ibu Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak apt. Muh. Rusdi, S.Si.,M.Si selaku ketua jurusan farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
9. Ibu Dr. apt. Mukhriani, S.Si, M.Si selaku Pembimbing I, terima kasih atas dedikasi dan bimbingan yang tulus, dukungan, motivasi, saran, dan waktu selama ini yang telah ibu berikan dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Ibu apt. Indah, S.Si, M.Si selaku Pembimbing II, terima kasih atas dedikasi dan bimbingan yang tulus, motivasi, saran dan waktu yang telah ibu berikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu apt. Khaerani, S.Farm, M.klin. Selaku Penguji Kompetensi dan juga sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih atas masukan, saran, dan kritik yang telah diberikan demi membantu penulis mencapai kesempurnaan dalam skripsi ini
12. Bapak Prof. Dr. Muhammad Shuhufi, S.Ag, M.A.g. selaku Penguji Agama terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, tuntunan, dan arahan yang Bapak berikan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini
13. Bapak/Ibu dosen Jurusan Farmasi yang terhormat, terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan yang Bapak/Ibu berikan selama penulis berada di kampus, tanpa Bapak/Ibu dosen penulis tidak memiliki ilmu tentang farmasi begitupun dalam penyusunan skripsi ini
14. Keluarga yang menjadi wali saya dalam hal ini Ayahanda Ir. Abdurrahman Ali dan Ibunda Hamdana yang telah menjadi tiang yang kokoh dalam kehidupan penulis, terima kasih atas bantuan, didikan, dukungan, arahan serta doa yang selalu diberikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik
15. Keluarga kedua saya yaitu Xenon dan X-Man, yang telah kebersamai selama ini. Terima kasih atas solidaritas dan

kekeluargaannya, saya harap kita akan tetap menjadi keluarga baik didalam ataupun diluar kampus nantinya

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterbatasan penulis, oleh karena itu, penulis menerima dengan senang hati segala saran, kritik, dan masukan yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang farmasi dan bernilai disisi Allah swt. Aamiin Ya Rabbal Alamin. Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 13 Juli 2024

Penulis


Muh. Fadhil Rahmadana T.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Rumah Sakit.....	11
B. Farmakoekonomi.....	13
C. Diabetes Melitus	17
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	40
E. Tinjauan Islam	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
D. Populasi dan Sampel	48
E. Penentuan Besar Sampel.....	49
F. Metode Pengumpulan Data.....	50
G. Instrumen Penelitian	51
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
I. Tahap Penelitian	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54

A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77
RIWAYAT HIDUP	89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metode Kajian Farmakoekonomi (Kemenkes RI, 2013)	16
Tabel 2. Dosis Noninsulin	28
Tabel 3. Jenis Insulin (Asociación Americana de diabetes, 2023).	30
Tabel 4. Karakteristik Pasien	54
Tabel 5. Penggunaan Obat Antidiabetes	55
Tabel 6. Hasil Pemeriksaan GDS Pasien	56
Tabel 7. Hasil Pemeriksaan GDP Pasien	56
Tabel 8. Hasil Pemeriksaan HbA1c Pasien	57
Tabel 9. Hasil Pemeriksaan GDS dan GDP Pasien	57
Tabel 10. Hasil Pemeriksaan GDS dan HbA1c Pasien	58
Tabel 11. Hasil Pemeriksaan GDP dan HbA1c Pasien	58
Tabel 12. Hasil Pemeriksaan GDS, GDP dan HbA1c Pasien	59
Tabel 13. Tarif di RS Hikmah Makassar	60
Tabel 14. Klaim BPJS Pasien Diabetes Melitus	61
Tabel 15. Perhitungan Efektivitas Biaya	62
Tabel 16. Perhitungan Biaya Medik Langsung	62
Tabel 17. Perhitungan Nilai ACER	63
Tabel 18. Grid Efektivitas Biaya	63
Tabel 19. Perhitungan Nilai ICER	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Algoritma Pengobatan DM Tipe 2	39
Gambar 2. Rumus Perhitungan Efektivitas Terapi	51
Gambar 3. Rumus Perhitungan Nilai ACER.....	52
Gambar 4. Rumus Perhitungan Nilai ICER.....	52
Gambar 5. Pemeriksaan Laboratorium Pasien Diabetes Melitus.....	60
Gambar 6. Klaim BPJS Pasien DM di RS Hikmah.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	77
Lampiran 2. Perhitungan	78
Lampiran 3. Kode Etik Penelitian.....	79
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian	81
Lampiran 6. Data Resep Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Hikmah	82
Lampiran 7. Tabel Biaya BPJS dan Biaya Rumah Sakit.....	85
Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan.....	88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Muh. Fadhil Rahmadana T.

NIM : 70100120091

Judul : Analisis Efektivitas Biaya BPJS Terapi Antidiabetes Pada Pasien Diabetes di Rumah Sakit Hikmah Makassar

Diabetes melitus (DM) adalah suatu kondisi kronis dan genetik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi baik pada tingkat mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Dampaknya menciptakan beban yang sangat besar pada masyarakat dalam bentuk biaya medis. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk untuk meringankan beban ekonomi yang cukup besar bagi penderita diabetes melitus, agar penderita diabetes melitus bisa mengeluarkan biaya yang efektif secara farmakoekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar persentase efektivitas terapi obat antidiabetes dan terapi mana yang paling efektif dengan biaya rendah pada pasien DM di RS Hikmah Makassar. Metode penelitian ini dilakukan secara retrospektif berupa data sekunder melalui data rekam medik pasien. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil perhitungan nilai *Average Cost Effectiveness Ratio* (ACER) menunjukkan bahwa pilihan terapi dengan efektivitas biaya yang paling baik yaitu terapi tunggal Metformin. Dan perhitungan nilai *Incremental Cost Effectiveness Ratio* (ICER) menunjukkan pilihan alternatif terapi lain yang dapat digunakan yaitu terapi kombinasi Metformin dan Glimepiride. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terapi antidiabetes dengan efektivitas biaya yang paling baik yaitu terapi tunggal Metformin.

Kata Kunci: Diabetes Melitus, BPJS, ACER, ICER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Muh. Fadhil Rahmadana T.

NIM : 70100120091

Title : *Cost Effectiveness Analysis of BPJS Antidiabetes Therapy for Diabetes Patients at Hikmah Hospital Makassar*

Diabetes melitus (DM) is a chronic and genetic condition that can increase the risk of complications at both the microvascular and macrovascular levels. The impact creates a huge burden on society in the form of medical costs. The Social Security Organizing Agency (BPJS) was formed to ease the considerable economic burden for people with diabetes melitus, so that people with diabetes melitus can spend pharmacoeconomically effective costs. This study aims to determine the percentage of effectiveness of antidiabetic drug therapy and which therapy is most effective at low cost in DM patients at Hikmah Hospital Makassar. This research method was conducted retrospectively in the form of secondary data through patient medical record data. Based on the results of the research that has been done, the results of the calculation of the Average Cost Effectiveness Ratio (ACER) value show that the choice of therapy with the best cost effectiveness is Metformin single therapy. And the calculation of the Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) value shows other alternative therapy options that can be used, namely Metformin and Glimpiride combination therapy. Therefore, it can be concluded that antidiabetic therapy with the best cost effectiveness is Metformin monotherapy.

Keywords: Diabetes Melitus, BPJS, ACER, ICER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit tidak menular atau PTM merupakan kondisi kesehatan yang umum terjadi di seluruh dunia. Selain dikenal sebagai penyakit kronis, PTM juga merupakan penyebab utama kematian. WHO melaporkan bahwa setiap tahun, 41 juta orang meninggal dunia akibat penyakit tidak menular, menyumbang sekitar 74% dari total kematian global. Dalam statistik ini, terdapat 2,0 juta kematian yang dapat dikaitkan dengan penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes (Hamzah, Akbar, 2021).

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 1 Januari 2017 hingga 2022 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, tercatat sebanyak 8,07 juta kasus kematian, dimana 7,03 juta di antaranya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Data tersebut menggambarkan bahwa Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab utama kematian di Indonesia pada tahun 2016. PTM bertanggung jawab atas 73% kematian di negara ini, dengan penyakit kardiovaskular (35%), kanker (12%), penyakit pernapasan kronis (6%), diabetes (6%), dan risiko kematian dini lebih dari 20% sebagai kontributor utama. Hal ini menyoroti urgensi untuk memberikan perhatian khusus terhadap kejadian Penyakit Tidak Menular (Hamzah, Akbar, 2021).

Indonesia berada di peringkat keenam tertinggi di dunia dalam jumlah penderita diabetes melitus (DM) pada usia 20–79 tahun pada tahun 2017, mencapai 10,3 juta orang, dan diperkirakan akan meningkat sebanyak 62% menjadi 16,7 juta pada tahun 2035 (Frianto et al., 2023). Ada dua jenis utama

diabetes yang dikenal selama ini, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 biasanya muncul pada usia muda di bawah 40 tahun, tetapi dapat juga terjadi pada berbagai usia. Penanganannya adalah dengan pemberian suntikan insulin dan pengaturan pola makan. Sedangkan Diabetes tipe 2 biasanya muncul pada orang-orang yang berusia di atas 40 tahun. Penderita dapat saja tidak merasa mengalami diabetes selama bertahun-tahun dan merasa sehat. Diabetes pada orang berusia lanjut sering ditemukan secara tidak sengaja dan biasanya akan menjadi lebih baik dengan mengatur pola makan atau meminum obat. Namun, dengan berjalannya waktu, sebagian besar penderita akan memerlukan terapi insulin (Fox, 2007). Mayoritas kasus diabetes adalah diabetes melitus tipe 2 (DMT2), yang mencakup 90,9% dari semua kasus yang terdiagnosis. Diabetes merupakan penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang guna mengurangi risiko komplikasi. Federasi Diabetes Internasional (IDF) memperkirakan bahwa sekitar 436 juta orang di seluruh dunia, berusia 20-79 tahun, menderita diabetes pada tahun 2019, setara dengan prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada rentang usia yang sama. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan peningkatan diagnosis diabetes melitus di Indonesia sebesar 2% berdasarkan informasi dari dokter pada usia 15 tahun. Namun, prevalensi diabetes melitus berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018 (Frianto et al., 2023).

Melihat tingginya angka prevalensi kasus dan komplikasi yang dihasilkan, maka studi terkait diabetes perlu terus dikembangkan agar didapat pengelolaan yang terbaik secara multidisiplin dengan mencakup terapi non-obat dan terapi obat. Meskipun bersifat kronis, jika DM ini tidak dikelola

dengan baik maka akan menimbulkan situasi kritis seperti Hiperosmolar Hiperglikemik dan Ketoasidosis Diabetik yang merupakan komplikasi akut akibat dari pengontrolan yang kurang baik. Oleh karena itu, kunci penting dalam pengelolaan DM ini adalah pengontrolan glukosa darah. Pengelolaan DM tidak hanya ditujukan untuk menormalkan kadar glukosa darah tetapi juga mengendalikan faktor risiko lainnya yang sering dijumpai pada penderita dengan DM (Nurhamsyah et al., 2023).

Pembiayaan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama terkait dengan penanganan penyakit diabetes melitus tipe 2. Diabetes melitus (DM) adalah suatu kondisi kronis dan genetik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi baik pada tingkat mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Dampaknya menciptakan beban yang sangat besar pada masyarakat, baik dalam bentuk biaya medis, penurunan produktivitas, kematian dini, maupun pengeluaran tak langsung dalam bentuk penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan analisis efektivitas biaya untuk memandu keputusan pemilihan obat yang memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang optimal (Frianto et al., 2023).

Akses kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diterapkan sistem *Universal Health Coverage* yang memastikan bahwa semua individu memiliki kemampuan untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa mengalami kendala pembayaran. Di Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Rofiq, 2023).

Pemerintah secara konsisten berusaha meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat melalui sistem jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diselenggarakan oleh negara dengan tujuan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia di kalangan masyarakat. Awalnya, program ini mencakup Jamkesmas, Jamkesda, Askes, dan yang terbaru, Administrasi Jamsostek. Seiring dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola secara sentral oleh BPJS Kesehatan, pembatasan di bawah manajemen cabang dapat menghambat keterlibatan anggota parlemen di wilayah tersebut, terutama jika terjadi keterlambatan. Tantangan terbesar juga muncul dalam kurangnya regulasi masyarakat, seperti yang terungkap dalam Instruksi Presiden 2017 untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peran pemerintah daerah dalam mendukung mereka yang kurang beruntung dalam hal ini terbatas pada alokasi anggaran partisipasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk JKN-KIS (Agustin et al., 2023).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti hendak melakukan evaluasi ekonomi yang bertujuan mengetahui efektivitas biaya terapi pada pasien diabetes melitus sehingga pasien mendapatkan pengobatan sesuai kebutuhan berupa efektivitas terapi dan biaya, dimana suatu pengobatan yang baik dan benar akan sangat menguntungkan pasien berupa kesembuhan penyakit, biaya yang dikeluarkan bagi pasien yang mengkonsumsi obat dalam jangka lama atau seumur hidup seperti penyakit DM. Sehingga peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis biaya BPJS terapi antidiabetes pada pasien diabetes melitus di Rumah Sakit Hikmah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar persentase efektivitas terapi dari penggunaan obat antidiabetes pada pasien Diabetes Melitus di Rumah Sakit Hikmah?
2. Antidiabetes manakah yang paling efektif dengan biaya yang rendah pada pasien Diabetes Melitus rawat jalan berdasarkan *Average Cost Effectiveness Ratio* (ACER) dan *Incremental Cost Effectiveness Ratio* (ICER)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Analisis Efektivitas Biaya

Analisis efektivitas biaya adalah analisis perbandingan antara biaya medik langsung dengan biaya non medik langsung perbulan dengan efektivitas terapi

b. Terapi Antidiabetes

Terapi antidiabetes merupakan obat yang digunakan atau dikonsumsi oleh pasien Diabetes untuk menurunkan kadar gula darah dengan tujuan mencapai target terapi. Terapi yang digunakan berupa Antidiabetik oral dan insulin.

c. Diabetes

Diabetes adalah penyakit metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat kerusakan sekresi insulin, kinerja insulin, atau keduanya.

d. Rumah sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

e. BPJS

BPJS adalah badan yang dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas biaya BPJS terapi pada pasien diabetes melitus sehingga pasien mendapatkan pengobatan sesuai kebutuhan berupa efektivitas terapi dan biaya di Rumah Sakit Hikmah.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, lalu dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dedy Frianto, Iin Suherti, Meika Hestina Putri, Nanda Selvia, Salsa Shapa Azzahra, dan Salwa Suka Ismanita dengan judul "*Analisis Efektivitas Biaya Terapi Kombinasi Insulin dan Obat Hipoglikemia Oral pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Rawat Jalan di Rumah*

Sakit". Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Biaya Terapi Kombinasi Insulin dan Obat Hipoglikemia Oral pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Rawat Jalan di Rumah Sakit. Efektivitas pengobatan diukur berdasarkan penurunan gula darah sewaktu (GDS) yang mencapai target sedangkan efektivitas biaya dilihat berdasarkan nilai ACER dan ICER. Hasil penelitian menunjukkan persentase efektivitas terapi obat A (metformin glimepiride) sebesar 98% sedangkan obat B (metformin acarbose) sebesar 94%. Rata-rata total biaya antidiabetes obat A (metformin glimepiride) Rp. 4.676.823,- dan obat B Rp. 5.302.005,-. Kelompok obat A (metformin glimepiride) lebih *cost-effective* dengan nilai ACER sebesar Rp. 47.722,- dibandingkan obat B (metformin acarbose) sebesar Rp. 56.404,- pada pasien diabetes melitus tipe 2 rawat inap di RSUD Kota Madiun. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kelompok terapi A (metformin glimepiride) memiliki efektivitas terapi yang paling tinggi dengan biaya lebih rendah. Harapannya rumah sakit dapat mempertahankan anggaran obat untuk penyakit diabetes melitus tipe 2 secara efektif dan efisien.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Richa Yuswantina, dan Niken Dyahariesti dengan judul "*Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antidiabetes Oral Tunggal Dan Kombinasi Pada Pasien BPJS Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Rumah Sakit X*". Penelitian ini bertujuan untuk mencari obat antidiabetes oral tunggal maupun kombinasi dengan biaya yang paling efektif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian noneksperimental dengan rancangan deskriptif melalui studi retrospektif dari rekam medis pasien rawat jalan dan administrasi. Sampel diambil secara *non-random* sampling dengan metode *purposive sampling*. Analisis efektivitas biaya dilakukan dengan menghitung

biaya medik langsung dan efektivitas terapi. Efektivitas terapi diukur berdasarkan hasil kadar gula darah mencapai target selama 2 bulan. Total biaya terendah berada pada antidiabetik oral (ADO) tunggal adalah biguanid (Rp.509.169,87) sedangkan untuk efektivitas yang paling besar pada biguanid (59,26 %). Dengan nilai ACER biguanid Rp. 8.592,13. Pada penggunaan ADO kombinasi total biaya terendah pada glimepiride + metformin sebesar Rp.274.185,24 dan efektivitas terbesar pada glimepiride + metformin (100 %), dengan nilai ACER Rp. 2.741,85. Terapi antidiabetik oral tunggal paling efektif adalah biguanida, dan terapi antidiabetik oral kombinasi paling *cost efektif* adalah glimepirid dan metformin.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Madania, Asnia Bangol, dan Ana Diantika dengan judul "*Analisis Efektifitas Biaya Terapi Pada Pasien Hipertensi Dan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Toto Kabila*". Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan rancangan analisis deskriptif, pengambilan data bersifat retrospektif dengan melakukan penelusuran dokumen terdahulu yaitu dari rekam medis pasien hipertensi dan DM tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Toto Kabila periode Oktober sampai Desember 2020, sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, data yang diperoleh dianalisis dengan cara dilakukan perhitungan biaya medik langsung dan menganalisis data efektivitas obat. Analisis data penelitian ini menggunakan *Cost Effectiveness Analysis* (CEA) dan dilanjutkan dalam bentuk rasio yaitu dalam bentuk *Average Cost Effectiveness Ratio* (ACER) atau dalam bentuk *Incremental Cost Effectiveness Ratio* (ICER). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi hipertensi yang digunakan adalah Amlodipin (47,8%) dan Candesartan (52,2%) dan terapi Diabetes Melitus tipe 2 yaitu

kombinasi Metformin dan Glimepirid (68,9%) dan kombinasi Insulin Aspart dan Insulin Detemir (31,1%). Biaya medik langsung terapi hipertensi yaitu Amlodipin sebesar Rp 184.921, dan Candesartan sebesar Rp 158.159, untuk terapi DM kombinasi Metformin-Glimepiride sebesar Rp.168.253,226, dan kombinasi Insulin Aspart-Insulin Detemir sebesar Rp 1.077.259. Hasil perhitungan efektifitas biaya yaitu Candesartan lebih *cost effective* dibanding amlodipin, sedangkan kombinasi Metformin-Glimepirid lebih *cost effective* dibanding kombinasi Insulin Aspart dan Insulin Detemir.

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ema Nillafita Putri Kusuma dengan judul "*Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pasien Nefropati Diabetes Di Rumah Sakit Umum Pusat (Rsup) Fatmawati*". Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan terapi antidiabetika yang lebih *cost effective* untuk pasien nefropati diabetik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non eksperimental dengan menggunakan data rekam medis pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan perhitungan secara ACER penggunaan Glimepiride lebih *cost effective*, namun secara ICER penggunaan Gliquidone lebih *cost effective* dibandingkan dengan pilihan terapi yang lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terapi yang lebih *cost effective* pada proses terapi pasien nefropati diabetik adalah penggunaan Gliquidone. Hal ini terlihat dari hasil ICER yang menunjukkan hasil paling rendah dibandingkan dengan antidiabetika oral yang lain. Meskipun pada perhitungan ACER, didapatkan bahwa penggunaan Glimepiride juga *cost effective*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui berapa besar persentase efektivitas terapi dari penggunaan obat antidiabetes pada pasien Diabetes Melitus di Rumah Sakit Hikmah
2. Untuk mengetahui antidiabetes yang paling efektif dengan biaya yang rendah pada pasien Diabetes Melitus rawat jalan berdasarkan *Average Cost Effectiveness Ratio* (ACER) dan *Incremental Cost Effectiveness Ratio* (ICER)?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dalam bidang pendidikan dan menjadi dasar untuk penelitian yang serupa yang dapat dilakukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas layanan, serta dapat menjadi tambahan basis pengetahuan dalam analisis biaya untuk perbaikan layanan di masa depan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menyediakan informasi yang relevan dan memberikan gambaran umum tentang analisis biaya, manfaat, penggunaan, pengadaan, dan pemahaman mengenai rencana pengobatan untuk diabetes melitus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumah Sakit

1. Definisi

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020).

Rumah sakit menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu suatu bagian secara menyeluruh (integral) dari organisasi sosial dan medis, yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna baik kuratif maupun preventif kepada Masyarakat (Putri & Sonia, 2021).

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Putri & Sonia, 2021).

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang melibatkan aspek bio, psiko, sosial, dan spiritual merupakan kebutuhan dasar manusia. Terus dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan optimal.

Rumah Sakit Umum Hikmah Makassar secara berkelanjutan berusaha meningkatkan dan menciptakan pelayanan kesehatan yang unggul, mendukung setiap program peningkatan sumber daya kesehatan yang

terampil dan profesional. Pendirian rumah sakit ini merupakan prakarsa dari H.M. Daeng Patompo, Haji Andi Azisah, dr. Chairuddin Rasjad, Sp.B, Sp.BO, dan Diana Chairuddin Rasjad melalui pembentukan Yayasan Klinik Hikmah pada tanggal 24 Desember 1979.

Dengan dasar tersebut, dimulailah kegiatan pelayanan kesehatan di rumah (Alm) H.M. Daeng Patompo, Jalan Yosef Latumahina No. 1 (sebelumnya Jalan Kenari), yang mencakup layanan kesehatan umum, bedah, bedah tulang dan sendi, serta didukung oleh pelayanan rawat inap dan kamar operasi.

Rumah Sakit Hikmah memiliki 34 Dokter Spesialis yang berkompeten diberbagai bidang, seperti Spesialis Penyakit Dalam, Anak, Bedah, Obgyn, Anastesi, Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Radiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mata, THT-KL, Saraf, Neurologi, Jantung dan Pembuluh Darah, Dermatologi dan Venereologi, Kedokteran Jiwa, Orthopedi dan Traumatologi, Urologi, Gigi (Periodontis), Gizi, dan Bedah Onkologi.

2. Tugas dan Fungsi

Menurut Undang - Undang No.44 tahun 2009 pasal 4 tentang tugas rumah sakit yang berbunyi “Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan secara paripurna”.

Menurut Undang - Undang No.44 Tahun 2009 Pasal 5 tentang fungsi rumah sakit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 rumah sakit mempunyai fungsi, diantaranya:

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan (Putri & Sonia, 2021).

B. Farmakoekonomi

Farmakoekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan penentuan, pengukuran, perbandingan biaya, risiko, dan manfaat dari layanan atau rencana pengobatan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi berbagai alternatif terapi dengan mempertimbangkan output optimal dalam hal biaya yang dikeluarkan, sehingga memungkinkan pemilihan pilihan terapi yang paling efektif secara ekonomis (Frianto et al., 2023).

Analisis efektivitas biaya adalah suatu metode evaluasi yang digunakan untuk membandingkan hasil kesehatan dan biaya suatu perawatan, terutama dari perspektif rumah sakit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi alternatif pengobatan dengan mempertimbangkan keefektifan terapi dalam kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan oleh pasien, dengan fokus pada persentase keberhasilan terapi. *Cost Effective Analysis (CEA)*, atau analisis biaya, adalah pendekatan ekonomi komprehensif yang mencakup definisi, penilaian, dan perbandingan sumber daya yang digunakan (*input*)

dengan konsekuensi pelayanan (*output*) antara dua atau lebih alternatif (Frianto et al., 2023).

1. Perspektif Penilaian

Perspektif penilaian merupakan hal penting dalam Kajian Farmakoekonomi, karena perspektif yang dipilih menentukan komponen biaya yang harus disertakan. Seperti yang telah disampaikan, penilaian dalam kajian ini dapat dilakukan dari tiga perspektif yang berbeda, yaitu:

a) Perspektif masyarakat (*societal*)

Sebagai contoh Kajian Farmakoekonomi yang mengambil perspektif masyarakat luas adalah penghitungan biaya intervensi kesehatan, seperti program penurunan konsumsi rokok, untuk memperkirakan potensi peningkatan produktivitas ekonomi (PDB, produk domestik bruto) atau penghematan biaya pelayanan kesehatan secara nasional dari intervensi kesehatan tersebut (Kemenkes RI, 2013).

b) Perspektif kelembagaan (*institutional*)

Contoh kajian farmakoekonomi yang terkait kelembagaan antara lain penghitungan efektivitas-biaya pengobatan untuk penyusunan Formularium Rumah Sakit. Contoh lain ditingkat pusat, penghitungan AEB untuk penyusunan DOEN dan Formularium Nasional (Kemenkes RI, 2013).

c) Perspektif individu (*individual perspective*)

Salah satu contoh kajian farmakoekonomi dari perspektif individu adalah penghitungan biaya perawatan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu sehingga pasien dapat menilai suatu intervensi kesehatan cukup bernilai atau tidak dibanding kebutuhan lainnya (termasuk hiburan) (Kemenkes RI, 2013).

2. Hasil Pengobatan (*Outcome*)

Kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya (*cost*) dan hasil pengobatan (*outcome*). Kenyataannya, dalam kajian yang mengupas sisi ekonomi dari suatu obat/pengobatan ini, faktor biaya (*cost*) selalu dikaitkan dengan efektivitas (*effectiveness*), utilitas (*utility*) atau manfaat (*benefit*) dari pengobatan (pelayanan) yang diberikan (Kemenkes RI, 2013).

Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu obat dalam memberikan peningkatan kesehatan (*outcomes*) kepada pasien dalam praktik klinik rutin (penggunaan sehari-hari di dunia nyata, bukan di bawah kondisi optimal penelitian). Dengan mengaitkan pada aspek ekonomi, yaitu biaya, kajian farmakoekonomi dapat memberikan besaran efektivitas-biaya (*cost effectiveness*) yang menunjukkan unit moneter (jumlah rupiah yang harus dibelanjakan) untuk setiap unit indikator kesehatan baik klinis maupun nonklinik (misalnya, dalam mg/dL penurunan kadar LDL dan/atau kolesterol total dalam darah) yang terjadi karena penggunaan suatu obat. Semakin kecil unit moneter yang harus dibayar untuk mendapatkan unit indikator kesehatan (klinik maupun non-klinik) yang diinginkan, semakin tinggi nilai efektivitas-biaya suatu obat (Kemenkes RI, 2013).

3. Biaya

Dalam bidang farmakoekonomi, pertimbangan biaya selalu menjadi faktor penting karena adanya keterbatasan sumber daya, khususnya dana. Dalam konteks kajian ekonomi, biaya (atau biaya peluang/*opportunity cost*) diartikan sebagai nilai dari peluang yang hilang akibat penggunaan sumber daya dalam suatu aktivitas. Penting untuk dicatat bahwa biaya tidak selalu

terkait dengan pertukaran uang. Dalam perspektif farmakoekonomi, biaya kesehatan mencakup lebih dari sekadar biaya layanan kesehatan, melibatkan juga biaya-biaya lainnya, termasuk yang harus dikeluarkan oleh pasien sendiri (Kemenkes RI, 2013).

4. Metode Kajian Farmakoekonomi

Dalam kajian farmakoekonomi, terdapat empat metode analisis yang dapat dilihat dalam tabel 1. Keempat metode analisis ini tidak hanya mempertimbangkan efektivitas, keamanan, dan kualitas obat yang dibandingkan, tetapi juga memperhitungkan aspek ekonomi. Karena aspek ekonomi atau unit moneter menjadi prinsip dasar dalam kajian farmakoekonomi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menentukan penggunaan sumber daya kesehatan yang terbatas secara paling efisien (Kemenkes RI, 2013).

Tabel 1. Metode Kajian Farmakoekonomi (Kemenkes RI, 2013)

Metode Analisis	Karakteristik Analisis
Analisis minimalisasi biaya (AMiB)	Efek dua intervensi sama (atau setara), valuasi/biaya dalam rupiah.
Analisis efektivitas biaya (AEB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan diukur dalam unit alamiah/indikator kesehatan, valuasi/biaya dalam rupiah.
Analisis utilitas-biaya (AUB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dalam <i>quality-adjusted life years (QALY)</i> , valuasi/ biaya dalam rupiah.

Analisis manfaat-biaya (AMB)	Efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dinyatakan dalam rupiah, valuasi/biaya dalam rupiah.
---------------------------------	---

5. Analisis Efektivitas Biaya (AEB)

Analisis efektivitas biaya (AEB) merupakan metode yang cukup sederhana dan umumnya digunakan dalam kajian farmakoekonomi untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang menghasilkan efek yang berbeda. Melalui analisis ini, yang mengukur baik biaya maupun hasil intervensi, individu dapat menentukan jenis intervensi kesehatan yang paling efisien, yaitu yang memberikan hasil pengobatan yang diinginkan dengan biaya paling rendah (Kemenkes RI, 2013).

Dalam penerapan metode AEB, perlu dilakukan perhitungan rasio biaya rerata dan rasio inkremental efektivitas-biaya (RIEB atau ICER). Dengan menggunakan RIEB, kita dapat menentukan biaya tambahan yang diperlukan untuk mencapai satu unit perubahan dalam efektivitas-biaya. Selain itu, untuk memudahkan penarikan kesimpulan mengenai alternatif mana yang memberikan efektivitas-biaya terbaik, kajian yang menggunakan metode AEB dapat memanfaatkan tabel efektivitas-biaya (Kemenkes RI, 2013).

C. *Diabetes Melitus*

Diabetes melitus, atau lebih sederhana disebut diabetes, adalah kondisi serius dan jangka panjang (atau "kronis") yang terjadi ketika kadar glukosa darah meningkat karena tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkannya dengan efektif (IDF, 2021).

Diabetes tipe 1 disebabkan oleh proses autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta yang memproduksi insulin dalam pankreas. Akibatnya, tubuh menghasilkan sangat sedikit atau tidak ada insulin (IDF, 2021). Sedangkan Diabetes Melitus Tipe 2 terjadi karena adanya resistensi terhadap insulin atau produksi insulin yang tidak mencukupi dalam tubuh, sehingga tidak mampu menjaga kadar glukosa darah pada tingkat normal. Penyakit ini seringkali terkait dengan faktor gaya hidup seperti obesitas, kurang aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak sehat (Sugandh et al., 2023).

1. Etiologi dan Patofisiologi

Etiologi dari penyakit diabetes yaitu gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. Diabetes melitus dapat muncul akibat penyakit eksokrin pankreas ketika terjadi kerusakan pada mayoritas islet dari pankreas. Hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin juga dapat menyebabkan diabetes (Lestari et al., 2021).

Resistensi insulin pada otot adalah kelainan yang paling awal terdeteksi dari diabetes tipe 1. Adapun penyebab dari resistensi insulin yaitu: obesitas/kelebihan berat badan, glukokortikoid berlebih (sindrom cushing atau terapi steroid), hormon pertumbuhan berlebih (akromegali), kehamilan, diabetes gestasional, penyakit ovarium polikistik, lipodistrofi (didapat atau genetik, terkait dengan akumulasi lipid di hati), autoantibodi pada reseptor insulin, mutasi reseptor insulin, mutasi reseptor aktivator proliferasi

peroksisom (PPAR γ), mutasi yang menyebabkan obesitas genetik (misalnya: mutasi reseptor melanokortin), dan hemochromatosis (penyakit keturunan yang menyebabkan akumulasi besi jaringan) (Lestari et al., 2021).

Pada diabetes tipe I, sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun, sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Hiperglikemia puasa terjadi karena produksi glukosa yang tidak dapat diukur oleh hati. Meskipun glukosa dalam makanan tetap berada di dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia postprandial (setelah makan), glukosa tidak dapat disimpan di hati. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak akan dapat menyerap kembali semua glukosa yang telah disaring. Oleh karena itu ginjal tidak dapat menyerap semua glukosa yang disaring. Akibatnya, muncul dalam urine (kencing manis). Saat glukosa berlebih diekskresikan dalam urine, limbah ini akan disertai dengan ekskreta dan elektrolit yang berlebihan. Kondisi ini disebut diuresis osmotik. Kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan buang air kecil (poliuria) dan haus (polidipsia) (Lestari et al., 2021).

Kekurangan insulin juga dapat mengganggu metabolisme protein dan lemak, yang menyebabkan penurunan berat badan. Jika terjadi kekurangan insulin, kelebihan protein dalam darah yang bersirkulasi tidak akan disimpan di jaringan. Dengan tidak adanya insulin, semua aspek metabolisme lemak akan meningkat pesat. Biasanya hal ini terjadi di antara waktu makan, saat sekresi insulin minimal, namun saat sekresi insulin mendekati, metabolisme lemak pada DM akan meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah pembentukan glukosa dalam darah, diperlukan peningkatan jumlah insulin yang disekresikan oleh sel beta pankreas. Pada

penderita gangguan toleransi glukosa, kondisi ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan, dan kadar glukosa akan tetap pada level normal atau sedikit meningkat. Namun, jika sel beta tidak dapat memenuhi permintaan insulin yang meningkat, maka kadar glukosa akan meningkat dan diabetes tipe II akan berkembang (Lestari et al., 2021).

2. Diagnosis

Diagnosis diabetes melitus (DM) ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah dan HbA1c. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah menggunakan metode enzimatik dengan menggunakan plasma darah vena. Pemantauan respons terhadap pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan glukometer. Penting untuk diingat bahwa diagnosis DM tidak dapat diandalkan hanya berdasarkan adanya glukosuria. Pasien dengan DM dapat mengalami berbagai keluhan. Kecurigaan terhadap adanya DM perlu dipertimbangkan jika pasien mengalami keluhan seperti:

- a. Keluhan klasik DM, seperti poliuria (sering buang air kecil), polidipsia (haus berlebihan), polifagia (nafsu makan meningkat), dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan.
- b. Keluhan lain termasuk lemah badan, sensasi kesemutan, gatal-gatal, gangguan penglihatan, disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada Wanita (Soelistijo, 2021).

3. Gejala

- a. Poliuri (Sering Buang Air Kecil)

Buang air kecil lebih sering dari biasanya terutama pada malam hari (poliuria), hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang ginjal (>180mg/dl), sehingga gula akan dikeluarkan melalui urine. Guna

menurunkan konsentrasi urine yang dikeluarkan, tubuh akan menyerap air sebanyak mungkin ke dalam urine sehingga urine dalam jumlah besar dapat dikeluarkan dan sering buang air kecil. Dalam keadaan normal, keluaran urine harian sekitar 1,5 liter, tetapi pada pasien DM yang tidak terkontrol, keluaran urine lima kali lipat dari jumlah ini. Sering merasa haus dan ingin minum air putih sebanyak mungkin (poliploidi). Dengan adanya ekskresi urine, tubuh akan mengalami dehidrasi atau dehidrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut maka tubuh akan menghasilkan rasa haus sehingga penderita selalu ingin minum air terutama air dingin, manis, segar dan air dalam jumlah banyak (Lestari et al., 2021).

b. Polifagi (Cepat Merasa Lapar)

Nafsu makan meningkat (polifagi) dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah pada penderita DM sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Ini adalah penyebab mengapa penderita merasa kurang tenaga. Selain itu, sel juga menjadi miskin gula sehingga otak juga berfikir bahwa kurang energi itu karena kurang makan, maka tubuh kemudian berusaha meningkatkan asupan makanan dengan menimbulkan alarm rasa lapar (Lestari et al., 2021).

c. Berat Badan Menurun

Ketika tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Dalam sistem pembuangan urine, penderita DM yang tidak terkontrol bisa kehilangan sebanyak 500 gr glukosa dalam urine per 24 jam (setara dengan 2000 kalori perhari hilang dari tubuh). Kemudian gejala lain atau gejala tambahan yang

dapat timbul yang umumnya ditunjukkan karena komplikasi adalah kaki kesemutan, gatal-gatal, atau luka yang tidak kunjung sembuh, pada wanita kadang disertai gatal di daerah selangkangan (pruritus vulva) dan pada pria ujung penis terasa sakit (balanitis) (Lestari et al., 2021).

4. Klasifikasi

a. Diabetes tipe 1 (akibat penghancuran sel B autoimun, biasanya menyebabkan defisiensi insulin absolut, termasuk diabetes autoimun laten di masa dewasa)

b. Diabetes tipe 2 (akibat hilangnya sekresi insulin sel b yang adekuat secara progresif non-autoimun, sering kali disebabkan oleh resistensi insulin dan sindrom metabolik)

c. Jenis diabetes tertentu yang disebabkan oleh penyebab lain, misalnya sindrom diabetes monogenik (seperti diabetes neonatal dan diabetes usia muda), penyakit eksokrin pankreas (seperti fibrosis kistik dan pankreatitis), dan penyakit akibat obat atau bahan kimia. diabetes yang diinduksi (seperti dengan penggunaan glukokortikoid, dalam pengobatan HIV/AIDS, atau setelah transplantasi organ)

d. Diabetes melitus gestasional (diabetes yang terdiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan yang tidak secara jelas merupakan diabetes sebelum kehamilan) (Asociación Americana de diabetes, 2023).

5. Faktor Risiko

a. Umur

Usia merupakan faktor risiko utama diabetes. Pengujian sebaiknya dimulai selambat-lambatnya pada usia 35 tahun untuk semua orang. Skrining harus dipertimbangkan pada orang dewasa segala usia dengan kelebihan berat

badan atau obesitas dan satu atau lebih faktor risiko diabetes (Asociación Americana de diabetes, 2023).

b. BMI dan Etnis

Secara umum, BMI 25 kg/m² merupakan faktor risiko untuk diabetes. Namun, data menunjukkan bahwa titik pemotongan BMI harus lebih rendah untuk populasi Amerika keturunan Asia. Titik pemotongan BMI turun secara konsisten antara 23 dan 24 kg/m² (sensitivitas 80%) untuk hampir semua subkelompok Asia-Amerika (dengan tingkat yang sedikit lebih rendah untuk individu Jepang-Amerika). Hal ini membuat titik potong bulat sebesar 23 kg/m² menjadi praktis. Sebuah argumen dapat dibuat untuk mendorong titik potong BMI menjadi lebih rendah dari 23 kg/m² demi peningkatan sensitivitas; namun, hal ini akan menghasilkan spesifisitas yang sangat rendah (13,1%). Data dari Organisasi Kesehatan Dunia juga menunjukkan bahwa BMI sebesar 23 kg/m² harus digunakan untuk menentukan peningkatan risiko pada individu Asia-Amerika. Temuan bahwa sepertiga hingga setengah penderita diabetes pada orang Asia-Amerika tidak terdiagnosis menunjukkan bahwa pengujian tidak dilakukan pada ambang batas BMI yang lebih rendah (Asociación Americana de diabetes, 2023).

c. HIV

Orang dengan HIV mempunyai risiko lebih tinggi terkena pradiabetes dan diabetes yang memakai terapi antiretroviral (ARV); oleh karena itu protokol skrining direkomendasikan. Pada penderita pradiabetes, penurunan berat badan melalui nutrisi sehat dan aktivitas fisik dapat mengurangi perkembangan diabetes. Di antara orang dengan HIV dan diabetes, layanan kesehatan preventif yang menggunakan pendekatan yang digunakan pada

orang tanpa HIV sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler. Risiko diabetes meningkat dengan Protase Inhibitor (PI) dan *Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors* (NRTI) tertentu. Diabetes baru diperkirakan terjadi pada lebih dari 5% orang yang terinfeksi HIV yang menggunakan PI, sedangkan lebih dari 15% mungkin menderita prediabetes (Asociación Americana de diabetes, 2023).

6. Penatalaksanaan

Tujuan umum dari manajemen diabetes adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan ini mencakup:

- a. Tujuan jangka pendek: Mengatasi keluhan diabetes melitus (DM), meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut.
- b. Tujuan jangka panjang: Mencegah dan menghambat perkembangan komplikasi mikroangiopati dan makroangiopati.
- c. Tujuan akhir manajemen: Mengurangi morbiditas dan mortalitas terkait DM (Soelistijo, 2021).

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pengendalian kadar glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid melalui manajemen pasien secara komprehensif.

1) Langkah-langkah penatalaksanaan umum melibatkan evaluasi pemeriksaan fisik dan deteksi komplikasi dipelayanan kesehatan primer. Jika fasilitas tersebut tidak tersedia, pasien dapat dirujuk ke pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier (Soelistijo, 2021).

2) Langkah-langkah penatalaksanaan khusus dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat, termasuk terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik, bersamaan dengan intervensi farmakologis menggunakan obat

antihyperglykemia baik secara oral maupun melalui suntikan. Obat antihyperglykemia oral dapat diberikan sebagai terapi tunggal atau dalam kombinasi. Pada keadaan darurat, seperti ketoasidosis, stres berat, penurunan berat badan yang cepat, atau adanya ketonuria, sebaiknya pasien segera dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lebih tinggi (sekunder atau tersier) (Soelistijo, 2021).

a) Edukasi

Edukasi yang bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat selalu perlu dilakukan sebagai bagian integral dari upaya pencegahan dan merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen diabetes melitus (DM) secara holistik. Materi pendidikan mencakup dua tingkatan, yaitu pendidikan tingkat awal dan pendidikan tingkat lanjutan (Soelistijo, 2021).

b) Terapi Nutrisi Medis

Terapi nutrisi medis merupakan elemen krusial dalam manajemen DM secara menyeluruh. Keterlibatan penuh dari tim perawatan (dokter, ahli gizi, tenaga kesehatan lainnya, serta pasien dan keluarganya) menjadi kunci keberhasilan. Terapi nutrisi medis harus disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap pasien DM untuk mencapai target yang ditetapkan (Soelistijo, 2021).

Prinsip pengaturan pola makan pada pasien DM mirip dengan panduan diet umum, yaitu menerapkan pola makan seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori dan nutrisi masing-masing individu. Pasien DM perlu diberikan informasi tentang pentingnya menjaga jadwal makan, jenis dan jumlah kalori yang dikonsumsi, terutama bagi mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau menjalani terapi insulin (Soelistijo, 2021).

c) Kebutuhan Energi

Terdapat beberapa metode untuk menghitung kebutuhan kalori pasien DM, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan kalori basal sekitar 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal. Jumlah kebutuhan ini dapat disesuaikan berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat aktivitas, berat badan, dan lainnya (Soelistijo, 2021).

d) Latihan Fisik

Latihan fisik menjadi salah satu elemen kunci dalam manajemen DM tipe 2. Program latihan fisik yang direkomendasikan dilakukan secara teratur, 3-5 kali seminggu, selama 30-45 menit per sesi, dengan total waktu latihan mencapai 150 menit per minggu, dengan jeda antara sesi tidak melebihi 2 hari berturut-turut. Aktivitas sehari-hari tidak dianggap sebagai latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya membantu menjaga kebugaran, tetapi juga dapat membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga berkontribusi pada kontrol glukosa darah (Soelistijo, 2021).

Pasien diabetes yang masih muda dan dalam keadaan bugar dapat melakukan latihan aerobik berat selama 90 menit per minggu dengan intensitas lebih dari 70% dari denyut jantung maksimal. Sebaiknya, pemeriksaan glukosa darah dilakukan sebelum latihan fisik. Pasien dengan kadar glukosa darah kurang dari 100 mg/dL sebaiknya mengonsumsi karbohidrat sebelum latihan, sedangkan mereka yang memiliki kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dL disarankan untuk menunda latihan fisik. Pasien diabetes yang tidak mengalami gejala khusus tidak memerlukan pemeriksaan medis khusus sebelum memulai aktivitas fisik intensitas ringan hingga sedang, seperti berjalan cepat. Namun, subjek yang akan menjalani latihan intensitas

tinggi atau memiliki risiko tinggi sebaiknya melakukan pemeriksaan medis dan uji latih sebelum memulai latihan fisik (Soelistijo, 2021).

e) Terapi Farmakologis

Terapi farmakologis diberikan bersamaan dengan regulasi pola makan dan latihan fisik dalam konteks gaya hidup sehat. Terapi ini melibatkan penggunaan obat oral atau suntikan (Soelistijo, 2021).

7. Cara Pemeriksaan, Pengobatan, dan Pencegahan

Macam pemeriksaan diabetes melitus yang dapat dilakukan yaitu: pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS), pemeriksaan gula darah puasa (GDP), pemeriksaan gula darah 2 jam prandial (GD2PP), pemeriksaan hBa1c, pemeriksaan toleransi glukosa oral (TTGO) berupa tes ksaan penyaring. Menurut Widodo (2014), bahwa dari anamnesis sering didapatkan keluhan khas diabetes berupa poliuria, polidipsi, polifagia dan penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Keluhan lain yang sering disampaikan adalah lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi dan pruritus vulvae (Lestari et al., 2021).

Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan kadar gula darah sebagai berikut:

- a) Gula darah puasa > 126 mg/dl
- b) Gula darah 2 jam > 200 mg/dl
- c) Gula darah acak > 200 mg/dl.

Acuan ini berlaku di seluruh dunia, dan di Indonesia, Departemen Kesehatan RI juga menyarankan untuk mengacu pada ketentuan tersebut. Kemudian cara diagnosis yang lain adalah dengan mengukur HbA1c > 6,5% 6. Pra-diabetes adalah penderita dengan kadar glukosa darah puasa antara 100

mg/dl sampai dengan 125 mg/dl (IFG); atau 2 jam puasa antara 140 mg/dl sampai dengan 199 mg/dl (IGT), atau kadar A1C antara 5,7– 6,4% 6,7” (Lestari et al., 2021).

Penatalaksanaan DM dimulai dengan pola hidup sehat, pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid, melalui pengelolaan pasien secara komprehensif. Tatalaksana dengan intervensi farmakologis dapat diberikan obat antihiperqlikemia secara oral dan/atau suntikan. Obat antihiperqlikemia oral dapat diberikan sebagai terapi tunggal atau kombinasi (Kemenkes RI, 2020).

8. Treatment dan Dosis

Berikut Dosis harian maksimum obat penurun glukosa noninsulin yang disetujui di A.S menurut *American Diabetes Association (ADA) 2023*:

Tabel 2. Dosis Noninsulin (Asociación Americana de diabetes, 2023).

Golongan	Senyawa	Dosis Maksimum
<i>Biguanides</i>	Metformin	2,500 mg
		2,000 mg
		2,000 mg
<i>Sulfonylureas (2nd generation)</i>	Glimepiride	8 mg
	Glipizide	40 mg
		20 mg
	Glyburide	12 mg
		20 mg
<i>Thiazolidinedione</i>	Pioglitazone	45 mg
	Acarbose	300 mg

<i>α-Glucosidase inhibitors</i>	Miglitol	300 mg
<i>Meglitinides</i>	Nateglinide	360 mg
	Repaglinide	16 mg
<i>DPP-4 inhibitors</i>	Alogliptin	25 mg
	Saxagliptin	5 mg
	Linagliptin	5 mg
	Sitagliptin	100 mg
<i>SGLT2 inhibitors</i>	Ertugliflozin	15 mg
	Dapagliflozin	10 mg
	Canagliflozin	300 mg
	Empagliflozin	25 mg
<i>GLP-1 RAs</i>	Exenatide (extended release)	2 mg**
	Exenatide	20 μ
	Dulaglutide	4.5 mg**
	Semaglutide	2 mg**
		14 mg
	Liraglutide	1.8 mg
Lixisenatide	20 μg	
<i>GLP-1/GIP dual agonist</i>	Tirzepatide	15 mg**
<i>Bile acid sequestrant</i>	Colesevelam	3.75 g
<i>Dopamine-2 agonist</i>	Bromocriptine	4.8 mg

Berikut Tabel Jenis produk insulin beserta Unit Dosis di AS menurut American Diabetes Association (ADA) 2023:

Tabel 3. Jenis Insulin (Asociación Americana de diabetes, 2023).

Insulin	Senyawa	Bentuk sediaan/produk
<i>Rapid-acting</i>	<i>Lispro follow-on product</i>	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i>
	Lispro	U-100 vial U-100 cartridge U-100 <i>prefilled pen</i> U-200 <i>prefilled pen</i>
	Lispro-aabc	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i> U-200 <i>prefilled pen</i>
	Glulisine U-100 vial	U-100 <i>prefilled pen</i>
	Aspart U-100 vial	U-100 cartridge U-100 <i>prefilled pen</i>

	Aspart (" <i>faster acting product</i> ")	U-100 vial U-100 cartridge U-100 <i>prefilled pen</i>
	Inhaled insulin	<i>Inhalation cartridges</i>
<i>Short-acting</i>	Human regular	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i>
<i>Intermediate-acting</i>	Human NPH	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i>
<i>Concentrated human regular insulin</i>	<i>U-500 human regular insulin</i>	U-500 vial U-500 <i>prefilled pen</i>
<i>Long-acting</i>	<i>Glargine follow-on products</i>	U-100 <i>prefilled pen</i> U-100 vial
	Glargine	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i> U-300 <i>prefilled pen</i>
	Detemir	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i>

	Degludec	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i> U-200 <i>prefilled pen</i>
<i>Premixed insulin products</i>	NPH/regular 70/30	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i>
	Lispro 50/50	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i>
	Lispro 75/25	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i>
	Aspart 70/30	U-100 vial U-100 <i>prefilled pen</i>
<i>Premixed insulin/GLP-1 RA products</i>	Glargine/Lixisenatide	100/33 mg <i>prefilled pen</i>
	Degludec/Liraglutide	100/3.6 mg <i>prefilled pen</i>

a. Obat Antihiperqlikemia Oral berdasarkan mekanismenya, obat antihiperqlikemia oral dapat dikelompokkan menjadi enam kategori:

1) Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue)

a) Sulfonilurea

Obat dalam kelompok ini utamanya meningkatkan produksi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping utamanya meliputi risiko hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Penggunaan sulfonilurea perlu dilakukan dengan hati-hati pada pasien dengan risiko tinggi mengalami hipoglikemia, seperti orang tua, serta mereka yang memiliki gangguan fungsi hati dan ginjal. Contoh obat dalam kelompok ini meliputi glibenclamide, glipizide, glimepiride, gliquidone, dan gliclazide (Soelistijo, 2021).

b) Glinid

Glinid memiliki cara kerja serupa dengan sulfonilurea, walaupun dengan lokasi reseptor yang berbeda, dan hasil akhirnya adalah penekanan terhadap peningkatan sekresi insulin fase pertama. Kelompok ini terdiri dari dua jenis obat, yaitu Repaglinide (turunan asam benzoat) dan Nateglinide (turunan fenilalanin). Obat ini cepat diserap setelah diberikan secara oral dan cepat diekskresi melalui hati. Glinid dapat mengatasi hiperglikemia pasca makan. Meskipun begitu, obat golongan glinid tidak lagi tersedia di Indonesia (Soelistijo, 2021).

2) Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin (Insulin Sensitizers)

a) Metformin

Metformin utamanya mengurangi produksi glukosa oleh hati (glukoneogenesis) dan meningkatkan penyerapan glukosa oleh jaringan perifer. Metformin merupakan pilihan pertama untuk sebagian besar kasus diabetes tipe 2. Dosis metformin perlu disesuaikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal (LFG 30 - 60 ml/menit/1,73 m²). Penggunaan

metformin tidak disarankan pada kondisi tertentu, seperti LFG < 30 mL/menit/1,73 m², gangguan hati berat, serta pada pasien dengan kecenderungan hipoksemia (seperti pada penyakit serebrovaskular, sepsis, renjatan, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) yang memerlukan perhatian khusus dari *New York Heart Association* (NYHA) fungsional kelas III-IV). Efek samping yang mungkin timbul termasuk gangguan saluran pencernaan seperti dispepsia, diare, dan lainnya (Soelistijo, 2021).

b) Tiazolidinedion (TZD)

Tiazolidinedion adalah agonis dari *Peroxisome proliferator Activated Receptor Gamma* (PPAR-gamma), suatu reseptor yang terdapat di sel otot, lemak, dan hati. Kelompok ini memiliki efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan penyerapan glukosa oleh jaringan perifer. Tiazolidinedion dapat menyebabkan retensi cairan tubuh dan kontraindikasi pada pasien dengan gagal jantung (NYHA fungsional kelas III-IV) karena dapat memperburuk edema atau retensi cairan. Tiazolidinedion perlu digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati, dan pemantauan rutin fungsi hati perlu dilakukan selama pengobatan. Salah satu obat dalam kelompok ini adalah pioglitazone (Soelistijo, 2021).

3) Penghambat Alfa Glukosidase

Obat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan, sehingga menghambat penyerapan glukosa oleh usus halus. Penghambat alfa glukosidase tidak dianjurkan pada kondisi dengan LFG \leq 30 ml/min/1,73 m², gangguan fungsi hati berat, dan sindrom usus iritabel *Irritable Bowel Syndrome* (IBS). Efek samping yang

mungkin terjadi melibatkan kembung (penumpukan gas dalam usus), dan untuk mengurangi efek samping, dosis awal dapat diberikan dalam jumlah kecil. Contoh obat dalam kelompok ini adalah acarbose (Soelistijo, 2021).

4) Penghambat enzim Dipeptidil Peptidase-4

Dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) adalah suatu serin protease, yang didistribusikan secara luas dalam tubuh. Enzim ini memecah dua asam amino dari peptida yang mengandung alanin atau prolin di posisi kedua peptida N-terminal. Enzim DPP-4 terekspresikan di berbagai organ tubuh, termasuk di usus dan membran brush border ginjal, di hepatosit, endotelium vaskuler dari kapiler villi, dan dalam bentuk larut dalam plasma. Penghambat DPP-4 akan menghambat lokasi pengikatan pada DPP-4 sehingga akan mencegah inaktivasi dari *glucagon-like peptide* (GLP)-1. Proses inhibisi ini akan mempertahankan kadar GLP-1 dan *glucose-dependent insulintropic polypeptide* (GIP) dalam bentuk aktif di sirkulasi darah, sehingga dapat memperbaiki toleransi glukosa, meningkatkan respons insulin, dan mengurangi sekresi glucagon (Soelistijo, 2021).

Penghambat DPP-4 merupakan agen oral, dan yang termasuk dalam golongan ini adalah vildagliptin, linagliptin, sitagliptin, saxagliptin dan alogliptin (Soelistijo, 2021).

5) Penghambat enzim *Sodium Glucose co-Transporter 2*

Obat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Obat golongan ini mempunyai manfaat untuk menurunkan berat badan dan tekanan darah. Efek samping yang dapat terjadi akibat pemberian obat ini adalah infeksi saluran kencing dan genital. Pada pasien DM dengan gangguan fungsi

ginjal perlu dilakukan penyesuaian dosis, dan tidak diperkenankan menggunakan obat ini bila LFG kurang dari 45 ml/menit. Hati-hati karena obat ini juga dapat mencetuskan ketoasidosis (Soelistijo, 2021).

a. Obat Antihiperglikemia Suntik Termasuk anti hiperglikemia suntik, yaitu insulin, GLP-1 RA dan kombinasi insulin dan GLP-1 RA.

1) Insulin

Insulin digunakan pada keadaan:

- a) HbA1c saat diperiksa $\geq 7.5\%$ dan sudah menggunakan satu atau dua obat antidiabetes
- b) HbA1c saat diperiksa $> 9\%$
- c) Penurunan berat badan yang cepat
- d) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis
- e) Krisis hiperglikemia
- f) Gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal
- g) Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark miokard akut, stroke)
- h) Kehamilan dengan DM/diabetes melitus gestasional yang tidak terkontrol dengan perencanaan makan
- i) Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat
- j) Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO
- k) Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi

(Soelistijo, 2021)

2) Penggunaan GLP-1 RA pada Diabetes

GLP-1 RA adalah obat yang disuntikkan secara subkutan untuk menurunkan kadar glukosa darah, dengan cara meningkatkan jumlah GLP-1 dalam darah. Berdasarkan cara kerjanya golongan obat ini dibagi menjadi 2

yakni kerja pendek dan kerja panjang. GLP-1 RA kerja pendek memiliki waktu paruh kurang dari 24 jam yang diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, contohnya adalah exenatide, sedangkan GLP-1 RA kerja panjang diberikan 1 kali dalam sehari, contohnya adalah liraglutide dan lixisenatide, serta ada sediaan yang diberikan 1 kali dalam seminggu yaitu exenatide LAR, dulaglutide dan semaglutide (Soelistijo, 2021).

Dosis berbeda untuk masing-masing terapi, dengan dosis minimal, dosis tengah, dan dosis maksimal. Penggunaan golongan obat ini dititrasi perminggu hingga mencapai dosis optimal tanpa efek samping dan dipertahankan (Soelistijo, 2021).

Golongan obat ini dapat dikombinasi dengan semua jenis oral anti diabetik kecuali penghambat DPP-4, dan dapat dikombinasi dengan insulin. Pemakaian GLP-1 RA dibatasi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang berat, yaitu LFG kurang dari 30 ml per menit per 1,73 m' (Soelistijo, 2021).

3) Terapi Kombinasi

Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan hal yang utama dalam penatalaksanaan DM, namun bila diperlukan dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian obat antihiperglikemia oral tunggal atau kombinasi sejak dini. Pemberian obat antihiperglikemia oral maupun insulin selalu dimulai dengan dosis rendah, untuk kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respon kadar glukosa darah. Terapi kombinasi obat antihiperglikemia oral, baik secara terpisah ataupun *fixed dose combination*, harus menggunakan dua macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu apabila sasaran kadar glukosa darah belum tercapai dengan kombinasi dua macam obat, dapat diberikan kombinasi dua obat

antihyperglykemia dengan insulin. Pada pasien yang disertai dengan alasan klinis dan insulin tidak memungkinkan untuk dipakai, maka dapat diberikan kombinasi tiga obat oral. Terapi dapat diberikan kombinasi tiga obat anti-hyperglykemia oral. Kombinasi obat antihyperglykemia oral dengan insulin dimulai dengan pemberian insulin basal (insulin kerja menengah atau insulin kerja panjang) (Soelistijo, 2021).

Insulin kerja menengah harus diberikan menjelang tidur, sedangkan insulin kerja panjang dapat diberikan sejak sore sampai sebelum tidur, atau diberikan pada pagi hari sesuai dengan kenyamanan pasien. Pendekatan terapi tersebut pada umumnya dapat mencapai kendali glukosa darah yang baik dengan dosis insulin yang cukup kecil. Dosis awal insulin basal untuk kombinasi adalah 0,1 - 0,2 unit/kg/bb. kemudian dilakukan evaluasi dengan mengukur kadar glukosa darah puasa keesokan harinya (Soelistijo, 2021).

Dosis insulin dinaikkan secara perlahan (pada umumnya 2 unit) apabila kadar glukosa darah puasa belum mencapai target. Pada keadaan kadar glukosa darah sepanjang hari masih tidak terkontrol meskipun sudah diberikan insulin basal, maka perlu diberikan terapi kombinasi insulin basal dan prandial, pemberian obat antihyperglykemia oral terutama golongan Sulfonilurea sebaiknya dihentikan dengan hati-hati (Soelistijo, 2021).

4) Kombinasi Insulin Basal dengan GLP-1 RA

Manfaat insulin basal terutama adalah menurunkan glukosa darah puasa, sedangkan GLP-1 RA akan menurunkan glukosa darah setelah makan, dengan target akhir adalah penurunan HbA1c. Manfaat lain dari kombinasi insulin basal dengan GLP-1 RA adalah rendahnya risiko hipoglykemia dan mengurangi potensi peningkatan berat badan (Soelistijo, 2021).

Keuntungan pemberian secara terpisah adalah pengaturan dosis yang fleksibel dan terhindar dari kemungkinan interaksi obat, namun pasien kurang nyaman karena harus menyuntikkan 2 obat sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan pasien. Ko-formulasi rasio tetap insulin dan GLP-1 RA yang tersedia saat ini adalah IdegLira, ko-formulasi antara insulin degludeg dengan liraglutide dan IGlaxLixi, ko-formulasi antara insulin glargine dan lixisenitide (Soelistijo, 2021).

9. Algoritma Terapi



Gambar 1. Algoritma Pengobatan DM Tipe 2

a. Penjelasan untuk algoritma pengobatan DM tipe 2 (Gambar 1)

1) Untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa < 7,5% maka pengobatan dimulai dengan modifikasi gaya hidup sehat dan monoterapi oral.

2) Untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa $\geq 7,5\%$, atau pasien yang sudah mendapatkan monoterapi dalam waktu 3 bulan namun tidak bisa mencapai target HbA1c < 7%, maka dimulai terapi kombinasi 2 macam obat yang terdiri dari metformin ditambah dengan obat lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Bila terdapat intoleransi terhadap

metformin, maka diberikan obat lain seperti tabel lini pertama dan ditambah dengan obat lain yang mempunyai mekanisme kerja yang berbeda.

3) Kombinasi 3 obat perlu diberikan bila sesudah terapi 2 macam obat selama 3 bulan tidak mencapai target HbA1c < 7%

4) Untuk pasien dengan HbA1c saat diperiksa > 9% namun tanpa disertai dengan gejala dekompensasi metabolik atau penurunan berat badan yang cepat, maka dapat diberikan terapi kombinasi 2 atau 3 obat, yang terdiri dari metformin (atau obat lain pada lini pertama bila ada intoleransi terhadap metformin) ditambah obat dari lini ke 2.

5) Untuk pasien dengan HbA1c saat diperiksa > 9% dengan disertai gejala dekompensasi metabolik maka diberikan terapi kombinasi insulin dan obat hipoglikemik lainnya.

6) Pasien yang telah mendapat terapi kombinasi 3 obat dengan atau tanpa insulin, namun tidak mencapai target HbA1c < 7% selama minimal 3 bulan pengobatan, maka harus segera dilanjutkan dengan terapi intensifikasi insulin.

7) Jika pemeriksaan HbA1c tidak dapat dilakukan, maka keputusan pemberian terapi dapat menggunakan pemeriksaan glukosa darah (Soelistijo, 2021).

D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

1. Definisi

BPJS adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat dan didasarkan pada prinsip gotong royong, nirlaba, transparansi, kejelian, akuntabilitas, portabilitas, partisipasi wajib, keuangan dan kinerja dana. BPJS memiliki

dewan Pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS (Romero et al., 2023).

2. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

a. Fungsi

BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam melaksanakan fungsinya BPJS bertugas untuk:

b. Tugas

Dalam melaksanakan fungsinya BPJS Kesehatan bertugas untuk:

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- 2) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- 3) Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- 4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- 6) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

c. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS Kesehatan berwenang untuk:

- 1) Menagih pembayaran Iuran;
- 2) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

- 3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- 4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- 6) Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 7) Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 8) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

(Kemenkes, 2014).

d. Hak

Dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS Kesehatan berhak untuk:

- 1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

e. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS Kesehatan berkewajiban untuk:

- 1) Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

- 2) Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;
- 3) Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- 4) Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 5) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 6) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
- 7) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- 8) Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (Kemenkes, 2014).

E. Tinjauan Islam

Islam merupakan agama yang sangat mulia dan tinggi martabatnya. Salah satu bukti keunggulannya adalah kemampuannya yang sangat baik dalam mengatur kehidupan manusia dari berbagai segi. Islam menunjukkan ketelitiannya yang luar biasa dalam menyelaraskan setiap aspek kehidupan manusia. Keistimewaan lainnya adalah elastisitas Islam, terutama ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan modern. Oleh karena itu, Islam

mampu dan bahkan berhasil menangani berbagai tantangan dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam berbagai situasi dan kondisi.

Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan kenaikan glukosa darah. Obesitas merupakan salah satu penyebab penyakit diabetes. Terdapat ayat Alquran yang melarang manusia dalam berlebihan termasuk pada makanan. Allah berfirman di QS. Al-A'raf /7:31:

يٰۤاِبْنٰٓىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ □

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (QS. Al-A'raf: 31).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa ayat ini mengandung makna makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta minumlah apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apa pun (Quraish, 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang harus mengatur pola makan mereka agar kesehatan selalu terjaga setiap saat, dikarenakan penyakit bersumber dari perut yang dipenuhi makanan yang berlebihan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٌ يُقِمِّنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلْتُ لِطَعَامِهِ، وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ، وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ"

Artinya:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya" (HR. Ahmad).

Hadits ini menjelaskan tentang tidak dianjurkan makan secara berlebihan atau sangat kekenyangan karena hal tersebut memiliki dampak negatif bagi tubuh. Hal ini sejalan dengan persepsi medis sebaiknya batasi porsi makan secukupnya saja, jangan terlalu kenyang (cukup untuk aktivitas dan tidak sepenuh volume perut). Karena kapasitas lambung harus terbagi dalam tiga bagian, yakni sepertiga untuk makanan (padat), minuman (cair) dan udara (gas). Hikmah yang bisa dipetik dalam anjuran ini ialah agar menghindarkan diri kita dari berbagai penyakit akibat makan dengan porsi yang melebihi kebutuhan tubuh kita, termasuk diabetes. Sebaliknya, porsi yang melebihi kapasitasnya akan menyebabkan makanan keluar dari lambung sehingga menyebabkan gangguan pada organ tubuh lainnya (Budiyanto, 2022).

Pentingnya menjaga proporsi dalam makan dan minum juga ditekankan, karena konsumsi berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Terlalu banyak makan dan minum dapat menyebabkan penyerapan kalori berlebihan dan berpotensi menyebabkan kenaikan berat badan serta risiko penyakit. Di sisi lain, mengonsumsi makanan dan minuman secara

kurang juga tidak dianjurkan, karena dapat menyebabkan kekurangan energi dan gizi, serta meningkatkan risiko penyakit.

Di era modern ini, dalam pengobatan memerlukan pengeluaran biaya dalam prosesnya. Namun dalam mengeluarkan biaya pengobatan harus diperhatikan. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa kita harus cerdas dalam melakukan pengeluaran biaya, dengan pandangan Islam dalam Alquran, disebutkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan harus dilakukan dengan baik dan adil yakni jangan pula kelebihan ataupun kekurangan. Perilaku mubadzir ialah merupakan suatu sikap yang tidak baik dan adil, sehingga perilaku mubadzir ini adalah perilaku yang buruk dan dilarang oleh agama Islam dan perilaku mubadzir ini di kategorikan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Isra'/17:27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 27).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa ayat ini mengandung makna janganlah menghamburkan hartamu secara boros yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Sesungguhnya para pemboros yakni yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya adalah saudara-saudara yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat setan-setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah sangat ingkar (Quraish, 2002).

Kata tabdzir/pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seseorang menafkahkan/ membelanjakan

semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka ia bukanlah seorang pemboros. Sayyidinā Abū Bakar ra. menyerahkan semua hartanya kepada Nabi saw. dalam rangka berjihad di jalan Allah. Sayyidina 'Utsmān ra., membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima Rasulullah saw. dan beliau tidak menilai mereka sebagai para pemboros.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang bersikap boros mereka rentan terhadap godaan saat setan-setan memperdaya mereka untuk terjerumus dalam perilaku yang merugikan dan menghabiskan harta secara tidak benar. Sifat dasar setan adalah ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhan, dan teman-teman mereka cenderung memiliki sifat yang serupa (Quraish, 2002).

Dalam konteks penelitian ini, Islam memberikan pedoman tentang pengobatan dimana ketika seseorang memiliki penyakit diabetes akibat pola makan yang tidak teratur atau berlebihan, namun juga menyarankan agar perlu memperhatikan aspek biaya dalam proses pengobatan sebab sifat boros adalah hal yang tidak baik. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dalam upaya pengobatan, disarankan untuk memilih metode yang efektif dan sekaligus mempertimbangkan biaya agar tidak terlalu mahal. Sebab, tidak selamanya yang mahal itu baik jika ada yang lebih murah namun berkualitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian non eksperimental dengan desain penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Dengan pengambilan data secara retrospektif dari rekam medik pasien Diabetes Melitus periode 2024

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan untuk menganalisis pengobatan dengan biaya yang rendah terhadap pasien BPJS diagnosa Diabetes Melitus

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Hikmah, berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024 – Juni 2024

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien yang menggunakan BPJS di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar pada bulan Januari 2024 – Mei 2024 berjumlah 125 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu pasien BPJS yang didiagnosa Diabetes Melitus Rawat Jalan di Rumah Sakit Hikmah pada bulan Januari 2024 – Mei 2024 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

b. Kriteria Sampel

Kriteria Sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1) Kriteria Inklusi

Adapun yang menjadi kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

a) Pasien BPJS yang menderita diabetes melitus

- (1) laki-laki
- (2) Perempuan
- (3) Tanpa batasan umur

b) Data rekam medis lengkap tahun 2024.

2) Kriteria Eksklusi

Adapun yang menjadi kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:

b) Pasien BPJS diabetes melitus yang meninggal selama proses pengobatan

c) Pasien dengan Diabetes melitus pada ibu hamil

E. Penentuan Besar Sampel

Penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*, menurut (Nalendra., 2021) rumus *slovin* adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal yang mewakili seluruh populasi penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi (125)

e= Tingkat Kesalahan (5%=0,05)

Maka jumlah sampel yang dibutuhkan yaitu:

$$\begin{aligned} n &= \frac{125}{1 + 125 \cdot 0,05^2} \\ &= \frac{125}{1 + (125 \times 0,0025)} \\ &= \frac{125}{1 + 0,3} \\ &= \frac{125}{1,3} \\ &= 96,15 \end{aligned}$$

(Nalendra., 2021)

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan secara retrospektif yang dilakukan penelusuran terkait data lampau berupa data sekunder melalui data rekam medik pasien Diabetes Melitus di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Sehingga dari data tersebut dikumpulkan data berupa usia, jenis kelamin, jenis obat, diagnosis, harga obat, biaya laboratorium dan biaya klaim BPJS.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data rekam medik pasien BPJS Diabetes Melitus Rawat Jalan di Rumah Sakit Hikmah Makassar bulan Januari 2024-Mei 2024.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Data primer didapatkan menggunakan *Excel* untuk memperoleh persentase efektivitas biaya terapi pasien

Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui bagian rekam medis, instalasi farmasi, dan registrasi. Informasi yang tercatat dalam formulir pendataan mencakup nomor rekam medis, identitas pasien (termasuk usia dan jenis kelamin), riwayat kesehatan, diagnosa, tekanan darah, kadar gula darah, pemeriksaan lainnya, serta metode pengobatan.

2. Perhitungan Efektivitas Terapi

Perhitungan efektivitas terapi dihitung berdasarkan banyaknya pasien yang mencapai target gula darah dibagi dengan total pasien yang mendapatkan terapi yang sama ditulis dengan rumus:

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Total pasien yang mencapai target terapi}}{\text{Total pasien dengan terapi yang sama}} \times 100$$

Gambar 2. Rumus Perhitungan Efektivitas Terapi (Kemenkes RI, 2014).

3. Perhitungan Nilai ACER

ACER diperhitungkan untuk setiap terapi peluang dan perbandingan telah diperoleh dari variasi relatif antara obat baru dan obat pembanding. Hasil tersebut ditafsirkan sebagai nilai bersama sesuai dengan satuan

efektivitas atau harga umum yang diperlukan untuk menuai tujuan penyembuhan (penurunan kadar gula darah). Perhitungan ini digunakan rumus:

$$\text{ACER} = \frac{\text{Rata-rata total biaya medik}}{\text{Efektivitas (\%)}}$$

Gambar 3. Rumus Perhitungan Nilai ACER (Nalang, 2018)

4. Perhitungan Nilai ICER

ICER didefinisikan karena perbedaan antara harga dari dua terapi dan perbedaan efektivitas antara alternatif. Hasil ICER menunjukkan biaya yang diperlukan untuk memperoleh ledakan untuk satu unit hasil relatif (penurunan kadar gula darah) untuk evaluasi, yaitu terapi peluang dengan biaya ACER terendah. Perhitungan ini digunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{ICER} &= \frac{\Delta \text{ biaya}}{\Delta \text{ efektivitas}} \\ &= \frac{\text{biaya terapi yang dibandingkan} - \text{biaya terapi pembanding}}{\text{efektivitas terapi yang dibandingkan} - \text{efektivitas terapi pembanding}} \end{aligned}$$

Gambar 4. Rumus Perhitungan Nilai ICER (Nalang, 2018)

I. Tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

i. Tahap Awal

Tahap ini dilakukan persiapan dalam hal ini pembuatan dan penyerahan permohonan izin penelitian.

ii. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data diperoleh dari pemilihan pasien yang masuk ke dalam kriteria inklusi yaitu terkumpulnya data pasien Diabetes Melitus yang menggunakan BPJS di instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar pada bulan Januari 2024 - Mei 2024. Populasi yang diperoleh dari data yang dikumpulkan berupa rekam medik pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi.

iii. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini terdiri dari tahap pengolahan data dan penyelesaian laporan hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data rekam medik pasien yang didiagnosis Diabetes Melitus yang diperoleh dari Instalasi Rekam Medik Rumah Sakit Hikmah Makassar. Dari data rekam medik yang diperoleh dari instalasi Rumah Sakit Hikmah Makassar dan memenuhi kriteria inklusi yaitu sebanyak 96 kasus.

2. Karakteristik Pasien

Karakteristik pasien yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut, meliputi:

Tabel 4. Karakteristik Pasien

No	Karakteristik Pasien	Jumlah Pasien	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin a. Laki-laki b. Perempuan	39 57	41 59
2.	Usia (<i>American Diabetes Association, 2023</i>) a. <45 Tahun b. >45 Tahun	12 84	13 87
3.	Diagnosis a. Diabetes tanpa penyakit penyerta b. Diabetes dengan penyakit penyerta	35 61	36 64

4.	Penyakit Penyerta		
	a. Hipertensi	35	36
	b. Neuropati DM	15	16
	c. Ulkus DM	4	4
	d. Dislipidemia	1	1
	e. <i>Osteoarthritis Genu</i>	1	1
	f. <i>Cardiomyopathy</i>	1	1
	g. <i>Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)</i>	1	1
	h. GERD	1	1
	i. Gastropati Diabetik	1	1
	j. Anemia	1	1

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

a. Profil Penggunaan Terapi Antidiabetes

Tabel 5. Penggunaan Obat Antidiabetes pada Pasien Diabetes Melitus di RS Hikmah Makassar

No	Golongan Obat	Jenis Obat	Jumlah Pasien	Persentase (%)
1	Biguanid	Metformin	33	34
2	Sulfonilurea	Glimepiride	8	8
		Gliclazide	4	4
3	Inhibitor Alfa-Glukosidase	Acarbose	3	3
4	Kombinasi	Metformin (Biguanid) + Glimepiride (Sulfonilurea)	36	38
		Metformin (Biguanid) + Gliclazide (Sulfonilurea)	12	13
Jumlah			96	100

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Berdasarkan tabel 5, dari 96 jumlah pasien DM di RS Hikmah Makassar, terdapat jenis obat yang paling banyak digunakan yaitu kombinasi Metformin (Biguanid) + Glimepiride (Sulfonilurea) dengan jumlah 36 (38%) pasien,

sedangkan terapi jenis obat yang terendah yaitu golongan *Inhibitor Alfa-Glukosidase* jenis obat Acarbose dengan jumlah 3 (3%) pasien.

3. Hasil Laboratorium Pasien

Hasil Laboratorium pasien Diabetes Melitus di RS Hikmah Makassar dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Pemeriksaan GDS Pasien

No	Pasien	Hasil Laboratorium		Nilai Rujukan
		Jenis Pemeriksaan	Hasil	
1	X3	GDS	418 mg/dl	<140 mg/dl
2	X8	GDS	175 mg/dl	<140 mg/dl
3	X11	GDS	208 mg/dl	<140 mg/dl
4	X16	GDS	116 mg/dl	<140 mg/dl
5	X37	GDS	313 mg/dl	<140 mg/dl
6	X39	GDS	137 mg/dl	<140 mg/dl
7	X40	GDS	214 mg/dl	<140 mg/dl
8	X42	GDS	371 mg/dl	<140 mg/dl
9	X44	GDS	274 mg/dl	<140 mg/dl
10	X47	GDS	226 mg/dl	<140 mg/dl
11	X51	GDS	376 mg/dl	<140 mg/dl
12	X55	GDS	211 mg/dl	<140 mg/dl
13	X66	GDS	211 mg/dl	<140 mg/dl
14	X80	GDS	319 mg/dl	<140 mg/dl
15	X81	GDS	95 mg/dl	<140 mg/dl
16	X92	GDS	153 mg/dl	<140 mg/dl

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Tabel 7. Hasil Pemeriksaan GDP Pasien

No	Pasien	Hasil Laboratorium		Nilai Rujukan
		Jenis Pemeriksaan	Hasil	
1	X2	GDP	91 mg/dl	<110 mg/dl
2	X7	GDP	213 mg/dl	<110 mg/dl
3	X22	GDP	97 mg/dl	<110 mg/dl
4	X25	GDP	121 mg/dl	<110 mg/dl
5	X29	GDP	232 mg/dl	<110 mg/dl
6	X34	GDP	119 mg/dl	<110 mg/dl
7	X35	GDP	114 mg/dl	<110 mg/dl

8	X51	GDP	176 mg/dl	<110 mg/dl
9	X57	GDP	224 mg/dl	<110 mg/dl
			115 mg/dl	<110 mg/dl
10	X65	GDP	262 mg/dl	<110 mg/dl
		GDP	174 mg/dl	<110 mg/dl
11	X72	GDP	134 mg/dl	<110 mg/dl
12	X73	GDP	93 mg/dl	<110 mg/dl
13	X76	GDP	87 mg/dl	<110 mg/dl
14	X77	GDP	315 mg/dl	<110 mg/dl
15	X41	GDP	93 mg/dl	<110 mg/dl
			105 mg/dl	<110 mg/dl
16	X96	GDP	95 mg/dl	<110 mg/dl
17	X94	GDP	196 mg/dl	<110 mg/dl
			178 mg/dl	<110 mg/dl
			195 mg/dl	<110 mg/dl

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Tabel 8. Hasil Pemeriksaan HbA1c Pasien

No	Pasien	Hasil Laboratorium		Nilai Rujukan
		Jenis Pemeriksaan	Hasil	
1	X18	HbA1c	11.61 %	<6.5 %
2	X19	HbA1c	13.15 %	<6.5 %
3	X26	HbA1c	7.07 %	<6.5 %

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Tabel 9. Hasil Pemeriksaan GDS dan GDP Pasien

No	Pasien	Hasil Laboratorium		Nilai Rujukan
		Jenis Pemeriksaan	Hasil	
1	X5	GDS	113 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	161 mg/dl	<110 mg/dl
2	X45	GDS	215 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	124 mg/dl	<110 mg/dl
3	X62	GDS	157 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	148 mg/dl	<110 mg/dl
4	X95	GDS	331 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	101 mg/dl	<110 mg/dl

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Tabel 10. Hasil Pemeriksaan GDS dan HbA1c Pasien

No	Pasien	Hasil Laboratorium		Nilai Rujukan
		Jenis Pemeriksaan	Hasil	
1	X24	GDS	344 mg/dl	<140 mg/dl
		HbA1c	10.32 %	<6.5 %
2	X82	GDS	198 mg/dl	<140 mg/dl
		HbA1c	6.2 %	<6.5 %

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Tabel 11. Hasil Pemeriksaan GDP dan HbA1c Pasien

No	Pasien	Hasil Laboratorium		Nilai Rujukan
		Jenis Pemeriksaan	Hasil	
1	X10	GDP	135 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	10.3 %	<6.5 %
2	X13	GDP	373 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	11.92 %	<6.5 %
3	X30	GDP	95 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	6.71 %	<6.5 %
4	X31	GDP	149 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	4.85 %	<6.5 %
5	X38	GDP	317 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	13.34 %	<6.5 %
6	X53	GDP	102 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	7.24 %	<6.5 %
7	X59	GDP	134 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	8.2 %	<6.5 %
8	X68	GDP	225 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	8.13 %	<6.5 %
9	X70	GDP	204 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	9.03 %	<6.5 %
10	X74	GDP	320 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	12.55 %	<6.5 %
11	X64	GDP	256 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	12.44 %	<6.5 %
12	X12	GDP	146 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	6.33 %	<6.5 %

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah


Tabel 12. Hasil Pemeriksaan GDS, GDP dan HbA1c Pasien

No	Pasien	Hasil Laboratorium		Nilai Rujukan
		Jenis Pemeriksaan	Hasil	
1	X93	GDS	116 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	284 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	11.87 %	<6.5 %
2	X14	GDS	409 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	103 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	11.91 %	<6.5 %
3	X17	GDS	331 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	252 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	10.89 %	<6.5 %
4	X27	GDS	85 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	147 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	8.27 %	<6.5 %
5	X52	GDS	97 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	81 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	5.98 %	<6.5 %
6	X71	GDS	491 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	171 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	11.09	<6.5 %
7	X78	GDS	256 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	286 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	11.28 %	<6.5 %
8	X85	GDS	366 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	210 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	12.03 %	<6.5 %
9	X86	GDS	160 mg/dl	<140 mg/dl
		GDP	133 mg/dl	<110 mg/dl
		HbA1c	5.5 %	<6.5 %

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Berdasarkan tabel 6 sampai dengan tabel 12, dari 96 jumlah pasien DM di RS Hikmah Makassar, terdapat 63 pasien yang melakukan pemeriksaan laboratorium. Diantaranya pemeriksaan GDS berjumlah 16 pasien, pemeriksaan GDP berjumlah 17 pasien, pemeriksaan HbA1c berjumlah 3 pasien, pemeriksaan GDS dan GDP berjumlah 4 pasien, pemeriksaan GDS dan

HbA1c berjumlah 2 pasien, pemeriksaan GDP dan HbA1c berjumlah 12 pasien dan pemeriksaan GDS, GDP dan HbA1c berjumlah 9 pasien. Yang dapat disajikan pada diagram pie berikut:



Gambar 5. Pemeriksaan Laboratorium Pasien Diabetes Melitus

Tabel 13. Tarif di RS Hikmah Makassar

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	GDP	Rp 10.000
2	GDS	Rp 10.000
3	HbA1c	Rp 100.000
4	Radiologi	Rp 30.000
5	Konsultasi	20%

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Berdasarkan tabel 13, menunjukkan tarif di RS Hikmah berbeda, mulai dari GDP dan GDS memiliki tarif yang sama yaitu Rp. 10.000, HbA1c dengan tarif Rp. 100.000, tarif pemeriksaan Radiologi Rp. 30.000, dan tarif konsultasi 20% dari klaim BPJS.

4. Klaim BPJS Pasien Diabetes Melitus


Klaim BPJS pasien diabetes melitus di RS Hikmah Makassar yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut, meliputi:

Tabel 14. Klaim BPJS Pasien Diabetes Melitus

No	Nama	Klaim BPJS	Biaya Rumah Sakit						Selisih	
			Konsultasi	Resep	Radiologi	Laboratorium				Total
						GDP	GDS	HbA1c		
1	X1	Rp 213.100	Rp 42.620	Rp 15.896	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 68.516	Rp 144.584
2	X2	Rp 319.400	Rp 63.880	Rp 27.831	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 101.711	Rp 217.689
3	X3	Rp 159.900	Rp 31.980	Rp 14.693	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 46.673	Rp 113.227
4	X4	Rp 159.900	Rp 31.980	Rp 36.763	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 68.743	Rp 91.157
5	X5	Rp 213.100	Rp 42.620	Rp 55.912	Rp 20.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 118.532	Rp 94.568
6	Y81	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 3.899	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 165.479	Rp 41.521

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RS Hikmah

Berdasarkan tabel 14 dari jumlah 96 Pasien BPJS dengan penyakit DM di RS Hikmah, terdapat 5 pasien yang memiliki Klaim BPJS yang berbeda. Sedangkan 91 pasien lainnya memiliki klaim BPJS yang sama yaitu sebesar Rp. 207.900. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada diagram pie berikut:



Gambar 6. Klaim BPJS Pasien DM di RS Hikmah

5. Perhitungan

Perhitungan biaya pasien yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut, meliputi:

Tabel 15. Perhitungan Efektivitas Biaya

No	Pola Terapi	Jumlah Pasien (N)	Jumlah pasien yang mencapai target terapi (n)	Efektivitas (%)
1	Metformin	33	14	42
2	Glimepiride	8	3	12,5
	Gliclazide	4	0	0
3	Acarbose	3	0	0
4	Metformin (Biguanid) + Glimepiride (Sulfonilurea)	36	8	22
	Metformin (Biguanid) + Gliclazide (Sulfonilurea)	12	3	25

Tabel 16. Perhitungan Biaya Medik Langsung

No	Pola Terapi	Jumlah Pasien (N)	Rata-rata Biaya Medik
1	Metformin	33	Rp. 26.122
2	Glimepiride	8	Rp. 18.470
	Gliclazide	4	Rp. 20.427
3	Acarbose	3	Rp. 27.876
4	Metformin (Biguanid) + Glimepiride (Sulfonilurea)	36	Rp. 39.039
	Metformin (Biguanid) + Gliclazide (Sulfonilurea)	12	Rp. 35.637

Tabel 17. Perhitungan Nilai ACER

No	Pola Terapi	Rata-rata Biaya Medik	Efektivitas (%)	Nilai ACER
1	Metformin	Rp. 26.122	42	Rp. 622
2	Glimepiride	Rp. 18.470	12,5	Rp. 1.478
	Gliclazide	Rp. 20.427	0	Rp. 20.427
3	Acarbose	Rp. 27.876	0	Rp. 27.876
4	Metformin (Biguanid) + Glimepiride (Sulfonilurea)	Rp. 39.039	22	Rp. 1.774
	Metformin (Biguanid) + Gliclazide (Sulfonilurea)	Rp. 35.637	25	Rp. 1.425

Tabel 18. Grid Efektivitas Biaya

Efektivitas Biaya	Biaya Lebih Rendah	Biaya Sama	Biaya Lebih Tinggi
Efektivitas Lebih Rendah	A Glimepiride (Perhitungan ICER)	B	C Didominasi
Efektivitas Sama	D	E	F
Efektivitas Lebih Tinggi	G Dominasi	H	I Metformin & Glimepiride (Perhitungan ICER)

Tabel 19. Perhitungan Nilai ICER

No	Pola Terapi	Rata-rata Biaya Medik	Efektivitas (%)	Δ Biaya	Δ Efektivitas	Nilai ICER
1	Obat pembanding (Glimepiride)	Rp. 18.470	12.5%	Rp. 18.470	12.5%	Rp. 1.478
2	Obat yang dibandingkan (Metformin)	Rp. 26.122	42%	Rp. 7.652	29.5%	Rp. 259
3	Obat yang dibandingkan (Gliclazide)	Rp. 20.427	0%	Rp. 1.957	-12.5%	Rp. -156
4	Obat yang dibandingkan (Acarbose)	Rp. 27.826	0%	Rp. 9.356	-12.5%	Rp. -748
5	Obat yang dibandingkan Metformin+ Glimepiride	Rp. 39.039	22%	Rp. 20.569	0.95%	Rp. 21.651
6	Obat yang dibandingkan (Metformin+ Gliclazide)	Rp. 35.637	25%	Rp. 17.167	1.25%	Rp. 13.733

B. Pembahasan

Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. DM ditandai dengan pemeriksaan kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal, untuk Gula Darah Sewaktu (GDS)/tanpa puasa >200 mg/dl, sedangkan Gula Darah Puasa (GDP) >126 mg/dl (Kemenkes RI, 2020).

Dalam penelitian ini terkait analisis efektivitas biaya BPJS pasien DM di Rumah Sakit Hikmah Makassar selama bulan Januari 2024 – Mei 2024. Jumlah keseluruhan sampel yang dibutuhkan yaitu sebanyak 96 sesuai dengan kriteria inklusi. Pada penelitian ini didapatkan pasien yang lebih banyak mengalami

DM adalah perempuan berjumlah 57 (59%) pasien, sedangkan laki-laki berjumlah 39 (41%) pasien. Perempuan cenderung sering mengalami DM yang disebabkan oleh faktor sindrom siklus bulanan (*premenstrual syndrome*) dan pasca menopause. Hal tersebut mengakibatkan mudah terakumulasinya distribusi lemak di tubuh karena proses hormonal, wanita yang mengalami menopause mempunyai kecenderungan tidak terlalu “sensitif” terhadap hormon insulin. Selain itu juga terjadi penimbunan lemak yang lebih besar dibandingkan laki laki (Rif'at dkk, 2023).

Usia dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, di mana usia dewasa <45 tahun dan pertengahan hingga lanjut usia >45 tahun. *American Diabetes Association* (2023) menyatakan bahwa usia 45 tahun ke atas memiliki faktor risiko diabetes melitus (ADA, 2023). Pertambahan usia berpengaruh terhadap perubahan metabolisme karbohidrat dan pelepasan insulin. Perubahan pelepasan insulin mengakibatkan terhambatnya pelepasan glukosa yang masuk ke dalam sel manusia mengalami penurunan fungsi fisik secara cepat setelah berusia 40 tahun, terutama pada usia lebih dari 45 tahun akan terjadi penurunan regenerasi pada tubuh (Rif'at dkk, 2023).

Kadar glukosa darah yang tidak terkontrol pada pasien DM akan menyebabkan berbagai komplikasi. Dari penelitian ini terdapat 61 (64%) kasus yang terdiagnosis DM dengan penyakit penyerta, dan DM tanpa penyakit penyerta sebanyak 35 (36%) kasus. Dan dari 61 kasus DM ditemukan 9 jenis penyakit penyerta, dengan komplikasi terbanyak yaitu penyakit Hipertensi sebanyak 35 (36%) kasus, dan komplikasi kedua terbanyak yaitu Neuropati DM sebanyak 15 (16%) kasus. Berdasarkan penelitian ini didapatkan pasien DM dengan penyakit penyerta terbanyak adalah hipertensi, dalam hal ini

hipertensi pada DM merupakan faktor risiko mayor untuk terjadinya komplikasi makro dan mikrovaskular (Kemenkes RI, 2020).

Hiperglikemia merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi, salah satu komplikasi makroangiopati diabetes yang disebabkan oleh perubahan kadar gula darah. Gula darah tinggi akan menempel pada dinding pembuluh darah. Setelah itu terjadi proses oksidasi, di mana gula darah bereaksi dengan protein pada dinding pembuluh darah, menghasilkan AGEs (*Advanced Glycosylated Endproducts*). AGEs adalah senyawa yang terbentuk dari kombinasi gula berlebih dan protein. Kondisi ini merusak lapisan dalam pembuluh darah dan menarik lemak jenuh atau kolesterol, menyebabkan reaksi inflamasi. Sel-sel darah putih (leukosit), trombosit, dan bahan lain kemudian bergabung membentuk plak, yang menyebabkan dinding pembuluh darah mengeras dan menjadi kaku. Akhirnya, timbul penyumbatan yang mengakibatkan perubahan tekanan darah yang dikenal sebagai hipertensi (Julianti, 2021).

Hipertensi terjadi apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90. Pemeriksaan tekanan darah harus dilakukan setiap kali kunjungan pasien ke poliklinik. Diagnosis hipertensi ditegakkan bila dalam beberapa kali pemeriksaan dan pada hari berbeda terdapat peningkatan tekanan darah >140/90 mmHg. Semua pasien DM tipe 2 dengan hipertensi harus melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin di rumahnya (Kemenkes RI, 2020).

Golongan obat yang digunakan pasien yang menjalani perawatan di instalasi rawat jalan RS Hikmah pada bulan Januari 2024 – Mei 2024 meliputi Golongan Biguanid, golongan Sulfonilurea, Golongan Inhibitor Alfa-Glukosidase, dan Kombinasi dari obat tersebut. Setiap pasien memiliki kondisi klinis yang tidak sama dengan pasien lainnya dan memberikan efek berbeda

beda pada setiap pasien yang menerima terapi tersebut. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dengan jumlah tertinggi yang diresepkan kepada pasien yaitu terapi kombinasi obat golongan Biguanid (Metformin) dengan obat golongan Sulfonilurea (Glimepiride) sebanyak 36 (38%) pasien, golongan Biguanid (Metformin) sebanyak 33 (34%) pasien, kombinasi Biguanid (Metformin) dengan Sulfonilurea (Gliclazide) sebanyak 12 (13%) pasien, golongan Sulfonilurea (Glimepiride) berjumlah 8 (8%) pasien, golongan Sulfonilurea (Gliclazide) berjumlah 4 (4%) pasien, dan yang terendah yaitu golongan *Inhibitor Alfa-Glukosidase* (Acarbose) berjumlah 3 (3%) pasien yang dapat dilihat pada tabel 8. Menurut (*American Assosiation Diabetic 2023*) diabetes merupakan penyakit progresif pada banyak individu, sehingga untuk pemeliharaan target glikemik diperlukan terapi kombinasi. Rekomendasi konvensional adalah menggunakan penambahan obat Metformin secara bertahap untuk mempertahankan A1C pada target, rekomendasi tersebut mencakup kadar glukosa darah yang tampaknya berkorelasi dengan pencapaian A1C <7% (53 mmol) (ADA, 2023).

Untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa <6,5% maka pengobatan dimulai dengan modifikasi gaya hidup sehat dan monoterapi oral. Terapi oral yang diberikan kepada pasien yang memiliki HbA1c <6.5% yaitu Metformin, untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa $\geq 7,5\%$, atau pasien yang sudah mendapatkan monoterapi dalam waktu 3 bulan namun tidak bisa mencapai target HbA1c < 7%, maka dimulai terapi kombinasi 2 macam obat yang terdiri dari metformin ditambah dengan obat lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Bila terdapat intoleransi terhadap metformin, maka diberikan obat lain seperti lini pertama yang ditambah dengan obat lain dengan mekanisme kerja yang berbeda. Metformin

dianjurkan sebagai obat pilihan pertama pada sebagian besar pasien DM tipe 2. Pemilihan ini dengan alasan atau pertimbangan karena, efektivitasnya relatif baik, efek samping hipoglikemianya rendah, netral terhadap peningkatan berat badan, memperbaiki luaran kardiovaskular dan harganya murah. Jika karena sesuatu hal, metformin tidak bisa diberikan, misalnya karena alergi, atau efek samping gastrointestinal yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien, maka dipilih obat lainnya sesuai dengan keadaan pasien dan ketersediaan. Sulfonilurea dapat dipilih sebagai obat pertama jika ada keterbatasan biaya (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan di RS Hikmah terkait DM dengan HbA1c <6.5 % sudah rasional. Karena Metformin mempunyai efek menurunkan glukosa darah dengan cara memperbaiki resistensi insulin, namun tanpa mempengaruhi sekresi insulin. Cara kerja metformin adalah mengurangi produksi glukosa hati (*glukoneogenesis*), dan memperbaiki ambilan glukosa perifer. Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 2, metformin dapat dilanjutkan dan ditambahkan dengan obat hipoglikemik oral lainnya maupun insulin, selama dapat ditoleransi dan tidak ada kontraindikasi. Metformin terbukti efektif, aman, murah, dan dapat menurunkan risiko kejadian kardiovaskular dan kematian. Sediaan metformin dapat berupa sediaan *immediate-release* yang diberikan dua kali sehari ataupun sediaan lepas lambat (*extended release*) yang diberikan hanya sekali sehari. Penurunan HbA1c pada pemberian metformin juga cukup efektif, yaitu sekitar 1-1,3% (Kemenkes RI, 2020).

Pada penelitian ini, Pasien DM di Rumah Sakit Hikmah memiliki klaim BPJS berbeda. Setiap pasien DM yang menjalani rawat jalan mendapatkan klaim BPJS rata-rata sebesar Rp. 207.900. Dari 96 jumlah pasien, 91 pasien

mendapatkan klaim BPJS yang sama, sedangkan 5 Pasien lainnya mendapatkan klaim BPJS yang berbeda. Untuk klaim BPJS pasien dapat dilihat pada tabel 17. Dalam hal ini tidak semua pasien mendapatkan resep yang sama, sehingga harga resep setiap pasien DM berbeda. Peningkatan biaya Rumah Sakit juga didasarkan dengan adanya pemeriksaan Laboratorium untuk pasien DM Rawat Jalan, dimana pemeriksaannya terdiri dari pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS), Gula Darah Puasa (GDP), HbA1c, dan Radiologi. Untuk biaya pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) dan Gula Darah Puasa (GDP) sama dengan harga normal Rp. 10.000, pemeriksaan HbA1c dengan harga Rp. 100.000, dan Radiologi dengan harga Rp. 30.000. Selain tarif biaya tersebut, terdapat juga biaya konsultasi dengan tarif 20% dari klaim BPJS, dapat dilihat pada tabel 16.

Pada penelitian ini, pasien yang melakukan Tes Laboratorium berjumlah 63 (66%) pasien dibagi antara lain: Pasien DM yang melakukan pemeriksaan GDS berjumlah 16 (26%) pasien, pemeriksaan GDP berjumlah 17 (27%) pasien, pemeriksaan GDS dengan GDP berjumlah 4 (6%) pasien, pemeriksaan HbA1c berjumlah 3 pasien (5%), pemeriksaan GDS dengan HbA1c berjumlah 2 (3%) pasien, pemeriksaan GDP dengan HbA1c berjumlah 12 (19%) pasien, pemeriksaan GDS, GDP dengan HbA1c berjumlah 9 (14%) pasien, dan pasien yang melakukan pemeriksaan Radiologi berjumlah 3 pasien, dapat dilihat pada gambar 10. Hal ini menunjukkan efektivitas biaya pemeriksaan laboratorium dan radiologi memberikan kontribusi terhadap peningkatan biaya Rumah Sakit.

Biaya medik merupakan hasil dari penjumlahan seluruh total biaya yang digunakan pasien dalam menjalankan terapi pengobatan DM yang di golongkan berdasarkan jenis terapi yang diberikan, dikarenakan merupakan

tanggung BPJS yang dibayar berdasarkan jenis terapi. Untuk biaya medik pasien dapat dilihat pada Tabel 19. Pasien dengan terapi tunggal metformin mengeluarkan biaya medik sebesar Rp. 26.122, pasien dengan terapi tunggal glimepiride sebesar Rp. 18.470, pasien dengan terapi tunggal gliclazide sebesar Rp. 20.427, pasien dengan terapi tunggal acarbose sebesar Rp. 27.876, pasien dengan terapi kombinasi metformin dan glimepiride sebesar Rp. 39.039, dan pasien dengan terapi kombinasi metformin dan gliclazide sebesar Rp. 35.637. Dengan hasil tersebut jenis terapi yang membutuhkan biaya rendah yaitu terapi tunggal glimepiride dan yang paling tinggi yaitu terapi kombinasi metformin dan glimepiride.

Terkait dengan efektivitas terapi, data yang diambil merupakan data sekunder dari data rekam medik pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian. Dimana yang menjadi parameter efektivitas suatu alternatif terapi dilihat berdasarkan hasil tes Gula Darah Sewatu (GDS), Gula Darah Puasa (GDP) dan HbA1c pasien dimana pegukurannya dilakukan sebulan sekali. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 18 bahwa efektivitas dari terapi tunggal Metformin yaitu dari total 33 orang pasien yang mengalami penurunan gula darah sesuai target yaitu sebanyak 14 orang dengan persentase sebesar 42%, terapi tunggal Glimepirid memiliki total pasien sebanyak 8 orang dengan jumlah pasien yang mencapai target yaitu 3 orang dengan persentase sebesar 12,5%, terapi tunggal Gliclazide memiliki total pasien sebanyak 4 orang dengan jumlah pasien yang mencapai target yaitu 0 pasien dengan persentase 0%, begitupun dengan terapi tunggal Acarbose memiliki total pasien 3 orang dengan jumlah pasien mencapai target 0 orang dengan persentase 0%, untuk terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan jumlah pasien sebanyak 36 orang dengan jumlah pasien

yang mencapai target terapi yaitu sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 22%, dan untuk terapi kombinasi Metformin dan Gliclazide dengan jumlah total pasien 12 orang dengan jumlah pasien yang mencapai target terapi 3 orang dengan persentase 25%. Dengan hasil tersebut, alternatif terapi paling efektif yaitu terapi tunggal Metformin dan untuk terapi yang kurang efektif yaitu terapi tunggal Acarbose dan terapi tunggal Gliclazide.

Perhitungan nilai ACER didapatkan dengan cara membagi jumlah biaya medik dengan efektivitas terapi. Pada Tabel 20 didapatkan hasil perhitungan tiap alternatif terapi yaitu, untuk terapi tunggal metformin didapatkan hasil Rp. 622, terapi tunggal Glimepirid sebesar Rp. 1.478, terapi tunggal Gliclazide sebesar Rp. 20.427, terapi tunggal Acarbose sebesar Rp. 27.876, untuk terapi kombinasi Metformin dan Glimepiride sebesar Rp. 1.774, dan untuk terapi kombinasi Metformin & Gliclazide yaitu sebesar Rp. 1.425. Dengan hasil tersebut terapi yang paling efektif untuk pasien DM dengan BPJS berdasarkan perhitungan ACER yaitu terapi tunggal Metformin dengan nilai ACER Rp. 622, hal tersebut dikarenakan terapi tersebut paling *cost effective* dari semua jenis alternatif terapi yang diberikan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Frianto. 2023) bahwa Hasil efektivitas dinyatakan dalam ACER (*Average Cost Effectiveness Ratio*) bertujuan untuk membandingkan antara biaya obat antidiabetik yang digunakan selama terapi dengan penurunan gula darah pasien. Hasil perhitungan ACER menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sebuah pengobatan mencapai hasil yang efektif atau mencapai target terapi.

Setelah hasil perhitungan nilai ACER ditentukan, maka alternatif dengan nilai ACER paling rendah ditetapkan sebagai terapi standar yang ditetapkan dalam penanganan penyakit DM pada pasien BPJS di RS Hikmah

Kota Makassar. Dengan adanya beberapa pilihan alternatif terapi, maka dapat digambarkan menggunakan tabel Grid Efektivitas Biaya/*Cost-effectiveness Grid* dan *Cost-effectiveness plane*. Berdasarkan Tabel 21 Hasil perbandingan dari terapi tunggal Glimpiride dengan terapi lainnya didapatkan dua hasil perbandingan. Hasil perbandingan terapi tunggal Glimpiride dan terapi kombinasi Metformin dengan Glimpiride, dimana alternatif terapi Glimpiride tersebut memiliki efektivitas lebih rendah dan biaya lebih rendah dibanding terapi standar sehingga masuk ke dalam sel A. Hasil perbandingan kedua antara terapi tunggal dengan terapi kombinasi Metformin & Glimpiride, dimana alternatif terapi tersebut memiliki efektivitas lebih tinggi dan biaya lebih tinggi dibanding terapi standar sehingga masuk ke dalam sel I. Apabila alternatif terapi yang dibandingkan masuk ke dalam sel A dan sel I pada Grid Efektivitas Biaya maka diperlukan perhitungan nilai ICER.

Perhitungan ICER merupakan hasil perhitungan yang penting dalam analisis efektivitas biaya. Saat menggunakan metode AEB, perlu dihitung rasio biaya rata-rata dan rasio manfaat biaya tambahan (RIEB = rasio manfaat biaya tambahan/ICER). Dengan adanya perhitungan ICER, dapat dilihat bahwa setiap kali unit hemat biaya diubah, akan ada biaya tambahan. Selain itu, agar lebih mudah menarik kesimpulan tentang alternatif mana yang memberikan efektivitas biaya terbaik (Kemenkes-RI, 2013). Pada tabel 22 dapat dilihat hasil dari perbandingan alternatif terapi, dimana alternatif yang memiliki nilai ICER paling rendah berdasarkan penentuan menggunakan Grid Efektivitas Biaya dan *Costeffectiveness Plane* yaitu terapi tunggal Metformin sebesar Rp. 259.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Terapi yang digunakan pasien Diabetes Melitus dengan BPJS di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar meliputi terapi tunggal Metformin dengan persentase penggunaan 34% memiliki efektivitas sebesar 42%, terapi tunggal Glimepirid dengan persentase penggunaan 8% memiliki efektivitas sebesar 12,5%, terapi tunggal Gliclazide dengan persentase penggunaan 4% memiliki efektivitas 0%, begitupun dengan terapi tunggal Acarbose dengan persentase penggunaan 3% memiliki efektivitas 0%, untuk terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan persentase penggunaan 38% memiliki efektivitas 22%, dan untuk terapi kombinasi Metformin dan Gliclazide dengan persentase penggunaan 13% memiliki efektivitas 25%.

2. Terapi antidiabetes yang paling efektif dengan biaya rendah pada pasien Diabetes Melitus yang menggunakan BPJS di Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar berdasarkan *Average Cost Effectiveness Ratio* (ACER) dan *Incremental Cost Effectiveness Ratio* (ICER) yaitu terapi tunggal Metformin.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut beberapa aspek farmakoekonomi lainnya terkait terapi antidiabetes di rumah sakit lain. Hal tersebut dikarenakan peninjauan pemberian terapi melalui perspektif farmakoekonomi sangat dibutuhkan demi peningkatan pelayanan

kefarmasian kepada masyarakat sebab, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E. N., Madani, J. F., Azzahra, K. A., & Istanti, N. D. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*. 1(3).
- Asociación Americana De Diabetes. (2023). Estandares Para El Cuidado De La Diabetes-2023. *Diabetes Journals*, 46(1), 1–298.
- Budiyanto, Syaiful Bahri. (2022). Etika Mengonsumsi Makanan Yang Tertuang Dalam Hadits Sunan At-Tirmidzi No. Indeks 2302. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo. *Journal of Islamic Studies and History* Volume 1, No.1. e-ISSN: 2963-9395
- Charles Fox, Anne Kilvert (2007). *Berkenalan Dengan Diabetes Tipe 1*. Class Publishing London. UK.
- Frianto, D., Suherti, I., Putri, M. H., Selvia, N., Azzahra, S. S., & Ismanita, S. S. (2023). Analisis Efektivitas Biaya Terapi Kombinasi Insulin Dan Obat Hipoglikemia Oral Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Rawat Jalan. *Journal Of Social Science Research*, 3, 8982–8988.
- Hamzah, Akbar, S. (2021). Pencegahan Penyakit Tidak Menular. *Abdimas Universal*, 3(1), 1.
- Ivan Dzaki Rif'at1, Yesi Hasneli N2, Ganis Indriati. (2023). Gambaran Komplikasi Diabetes Melitus Pada Penderita Diabetes Melitus. Universitas Riau. *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)* Vol. 11, No. 1.
- Julianti Ira Maulidah Dwi. (2021). Hubungan Antara Kadar Gula Darah Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe Ii. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. *Jurnal Penelitian Kedokteran*.
- Kemendes RI. (2013). *Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi* (Vol. 4, Issue 3). Kemendes RI.
- Kemendes RI. (2014). Pedoman Pelaksanaan Program JKN. *Implementation Science*, 39(1), 1–15.
- Kemendes RI. (2020). Permenkes No. HK. 01.07/603 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa*.
- Kemendes RI. (2020). Permenkes No 3 Tahun 2020 *Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit*, 3.

- Lestari, Zulkarnain, & Sijid, S. A. (2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan Dan Cara Pencegahan. *UIN Alauddin Makassar, November*, 237-241.
- Nalang Amelia, Gayatri Citraningtyas, Widya Astuty Lolo. (2018). Analisis Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness Analysis) Pengobatan Pneumonia Menggunakan Antibiotik Seftriakson Dan Sefotaksim Di Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT Vol. 7 No. 3*
- Nalendra Aloysius Rangga Aditya, Yanti Rosalinah, Agus, Priadi, Ibnu Subroto, Retno Rahayuningsih, Rina Lestar, Suwantica Kusamandari, Ria Yuliasari, Dewi Astuti, Jeffry, Latumahina, Martinus Wahyu Purnomo, Vina Aisyah, Zede. (2021). Statistika Seri Dasar Dengan Spss. *Media Sains Indonesia*, Kota Bandung - Jawa Barat.
- Nurhamsyah, D., Wahyuningsih, Y. T., Sutisnu, A. A., Kirana, A. D., Putri, A. D., Saufika, G., & Azizah, P. N. (2023). Monitoring Glukosa Secara Berkelanjutan Terhadap Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe-1 Dan Tipe-2. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*, 6(2), 124.
- PERKENI. (2021). Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa Di Indonesia. *PB PERKENI*
- Putri, A. K., & Sonia, D. (2021). Efektivitas Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap Dalam Menjunjang Kualitas Laporan Di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung. *Agustus*, 2(3), 909-916.
- Rofiq, H. N. (2023). Deteksi Inefisiensi Pada Klaim BPJS Kesehatan Dengan Menggunakan Machine Learning. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 3(1), 83-98.
- Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS Dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan Dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31-36.
- Soelistijo, S. (2021). Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa Di Indonesia 2021. *Global Initiative For Asthma*, 46. [Www.Ginasthma.Org](http://www.Ginasthma.Org).
- Sugandh, F., Chandio, M., Raveena, F., Kumar, L., Karishma, F., Khuwaja, S., Memon, U. A., Bai, K., Kashif, M., Varrassi, G., Khatri, M., & Kumar, S. (2023). Advances In The Management Of Diabetes Melitus: A Focus On Personalized Medicine. *Cureus*, 15(8).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja



Lampiran 2. Perhitungan

a. Perhitungan Efektivitas Terapi

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{14}{33} \times 100 = 42\%$$

b. Perhitungan Nilai ACER

$$\text{ACER} = \frac{26.122}{42\%} = 622$$

c. Perhitungan Nilai ICER

$$= \frac{26.122 - 18.470}{42 - 12.5}$$

$$= \frac{7.652}{29.5}$$

$$\text{ICER} = \frac{7.652}{29.5} = 259$$

Lampiran 3. Kode Etik Penelitian



Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210066564, E-mail: kepk_fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.A.106/KEPK/FKIK/VII/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Muh. Fadhil Rahmadana T.
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA BPJS TERAPI ANDIABETES PADA PASIEN
DIABETES DI RUMAH SAKIT HIKMAH KOTA MAKASSAR"

" COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF BPJS ANDIABETIC THERAPY IN
DIABETIC PATIENTS AT HIKMAH HOSPITAL MAKASSAR CITY"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2061, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2066. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2061 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2066 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025.

This declaration of ethics applies during the period July 19, 2024 until July 19, 2025.

19, 2024
and Chairperson,
Dr. Sriany Ismail, S.Si., M.Si.

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 6086/Un.06/LP2M/PP.00.9/2/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Muh. Fadhil Rahmadana. T
 NIM : 70100120091
 Semester/T.A. : VIII (Delapan)/T.A. 2023-2024
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Farmasi
 Alamat : Samata
 No. HP. : 085237175669

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Analisis Efektivitas Biaya BPJS Terapi Antidiabetes Pasien Diabetes di Rumah Sakit Hikmah.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Rumah Sakit Hikmah** dari tanggal **Maret 2024 - selesai.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal

Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian



RUMAH SAKIT UMUM HIKMAH MAKASSAR

Jl. Yosef Latumahina No. 1 Makassar 90112
Telp. 0411 (835201-835202), Fax. 0411 (871403-870964)
Email : rshikmah@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 522/RSH.XLIII/C/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Andi Any Muliany M. M. Kes
NIK : 21.06.772
Jabatan : Direktur

Menerangkan :

Nama : MUH. FADHIL RAHMADANA. T
Nomor Pokok : 70100120091
Program Studi : Farmasi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo N0.36 Gowa

Telah melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Hikmah Makassar dari tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul :

**"ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA BPJS TERAPI ANTI DIABETES
PADA PASIEN DIABETES DI RUMAH SAKIT HIKMAH "**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Juli 2024

Direktur,



dr. Andi Any Muliany M. M. Kes
NIK : 21.06.772

cc. Pertiagal

Lampiran 6. Data Resep Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Hikmah

No	Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat	Hasil Laboratorium	Nilai Rujukan	Tanggal		
1	X1	P	58	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 101.192	-	-		
2	X2	L	57	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 90.199	Gdp	91 mg/dl	<110 mg/dl	11/01/2024
3	X3	L	52	Diabetes + Ulkus DM	Glimepiride 2	Biaya Resep RP. 36.498	Gds	418 mg/dl	<140 mg/dl	02/02/2024
4	X4	P	54	Diabetes + Neuropati	Metformin 500	Biaya Resep RP. 15.372	-	-	-	-
5	X5	L	54	Diabetes	Metformin 500 Gliclazid 80 mg	Biaya Resep RP. 73.592	Gds	113 mg/dl	<140 mg/dl	06/02/2024
							Gdp	161 mg/dl	<110 mg/dl	01/02/2024
6	X6	L	64	Diabetes	Metformin 500	Biaya Resep RP. 4.880	-	-	-	-
7	X7	L	55	DM Tipe 2	Metformin 500	Biaya Resep RP. 21.739	Gdp	213 mg/dl	<110 mg/dl	18/02/2024
8	X8	P	59	DM Tipe 2 + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 4 mg	Biaya Resep RP. 7.609	Gds	175 mg/dl	<140 mg/dl	05/02/2024
9	X9	P	44	DM Tipe 2 + Neuropati DM	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 28.519	-	-	-	-
10	X10	P	64	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500 Gliclazid 80 mg	Biaya Resep RP. 11.192	Gdp	135 mg/dl	<110 mg/dl	23/01/2024
							HbA1c	10.3 %	6.5 %	23/01/2024
11	X11	L	60	Diabetes + Ulkus DM	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 15.896	Gds	208 mg/dl	<140 mg/dl	21/01/2024
12	X12	P	69	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 15.701	Gdp	146 mg/dl	<110 mg/dl	18/02/2024
							HbA1c	6.33 %	<6.5 %	18/02/2024
13	X13	P	54	Diabetes + Neuropati DM	Glimepiride 4 mg	Biaya Resep RP. 27.831	Gdp HbA1c	373 mg/dl 11.92 %	<110 mg/dl <6.5 %	08/03/2024 08/03/2024
14	X14	L	56	DM Tipe 2	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 10.990	Gds Gdp HbA1c	409 mg/dl 103 mg/dl 11.91 %	<140 mg/dl <110 mg/dl <6.5 %	02/02/2024 07/02/2024 07/02/2024
15	X15	L	51	Diabetes + Neuropati DM	Acarbose 50	Biaya Resep RP. 14.693	-	-	-	-
16	X16	L	50	Diabetes + Neuropati	Metformin 500	Biaya Resep RP. 29.255	Gds	116 mg/dl	<140 mg/dl	03/01/2024
17	X17	L	60	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 12.012	Gds Gdp HbA1c	331 mg/dl 252 mg/dl 10.89 %	<140 mg/dl <110 mg/dl <6.5 %	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024
18	X18	L	50	Diabetes + Neuropati DM	Metformin 500	Biaya Resep RP. 26.264	HbA1c	11.61 %	<6.5 %	25/02/2024
19	X19	P	61	DM Tipe 2	Metformin 500 Gliclazid 80 mg	Biaya Resep RP. 19.948	HbA1c	13.15 %	<6.5 %	30/04/2024
20	X20	P	44	DM Tipe 2 + Ulkus DM	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 29.015	-	-	-	-
21	X21	P	79	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 36.763	-	-	-	-
22	X22	P	62	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 40.890	Gdp	97 mg/dl	<110 mg/dl	22/04/2024
23	X23	L	60	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 22.358	-	-	-	-
24	X24	P	54	DM Tipe 2 + Neuropati DM	Acarbose 100 mg	Biaya Resep RP. 19.300	Gds HbA1c	344 mg/dl 10.32 %	<140 mg/dl <6.5 %	22/03/2024 20/03/2024
25	X25	P	78	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 9.051	Gdp	121 mg/dl	<110 mg/dl	09/01/2024
26	X26	L	53	DM Tipe 2	Gliclazid 80 mg Metformin 500	Biaya Resep RP. 24.646	HbA1c	7.07 %	<6.5 %	09/03/2024
27	X27	P	47	Diabetes	Metformin 500	Biaya Resep RP. 27.800	Gds Gdp HbA1c	85 mg/dl 147 mg/dl 8.27 %	<140 mg/dl <110 mg/dl <6.5 %	02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024
28	X28	P	53	DM Tipe 2 + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 2	Biaya Resep RP. 24.521	-	-	-	-
29	X29	P	45	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 37.714	Gdp	232 mg/dl	<110 mg/dl	08/03/2024
30	X30	P	53	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 17.235	Gdp HbA1c	95 mg/dl 6.71 %	<110 mg/dl <6.5 %	26/01/2024 26/01/2024
31	X31	P	43	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 18.724	Gdp HbA1c	149 mg/dl 4.85 %	<110 mg/dl <6.5 %	02/05/2024 02/05/2024
32	X32	L	53	DM Tipe 2 + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 3 mg	Biaya Resep RP. 19.285	-	-	-	-
33	X33	P	65	Diabetes + Neuropati DM	Metformin 500	Biaya Resep RP. 44.194	-	-	-	-

34	X34	P	62	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 10.563	Gdp	119 mg/dl	<110 mg/dl	23/04/2024
35	X35	L	40	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 33.781	Gdp	114 mg/dl	<110 mg/dl	03/01/2024
36	X36	P	75	Diabetes + Hipertensi	Gliclazid 80 mg	Biaya Resep RP. 17.334	-	-	-	-
37	X37	P	51	Diabetes + Neuropati DM	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 36.084	Gds	313 mg/dl	<140 mg/dl	11/01/2024
38	X38	P	58	DM Tipe 2 + Neuropati DM	Metformin 500 Glimepiride 4 mg	Biaya Resep RP. 27.139	Gdp HbA1c	317 mg/dl 13.34%	<110 mg/dl <6.5 %	06/02/2024 06/02/2024
39	X39	L	61	DM Tipe 2 + Cardiomyopathy	Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 5.551	Gds	137 mg/dl	<140 mg/dl	02/02/2024
40	X40	P	67	Diabetes + Dislipidemia	Metformin 500	Biaya Resep RP. 29.190	Gds	214 mg/dl	<140 mg/dl	22/04/2024
41	X41	L	80	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 7.294	Gdp Gdp	93 mg/dl 105 mg/dl	<110 mg/dl <110 mg/dl	22/03/2024 23/03/2024
42	X42	L	71	DM Tipe 2	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 205.290	Gds	371 mg/dl	<140 mg/dl	05/01/2024
43	X43	L	43	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 36.722	-	-	-	-
44	X44	L	57	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 3.899	Gds	274 mg/dl	<140 mg/dl	22/01/2024
45	X45	L	42	Diabetes	Metformin 500 Gliclazid 80 mg	Biaya Resep RP. 22.273	Gds Gdp	215 mg/dl 124 mg/dl	<140 mg/dl <110 mg/dl	02/03/2024 08/03/2024
46	X46	P	58	DM Tipe 2 + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 42.212	-	-	-	-
47	X47	L	68	DM Tipe 2 + Neuropati DM	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 35.238	Gds	226 mg/dl	<140 mg/dl	16/04/2024
48	X48	L	53	DM tipe 2 + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 130.560	Gdp	176 mg/dl	<110 mg/dl	02/01/2024
49	X49	L	55	Diabetes + Neuropati DM	Acarbose 50	Biaya Resep RP. 14.441	-	-	-	-
50	X50	P	53	Diabetes	Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 19.060	-	-	-	-
51	X51	L	57	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 26.333	Gds	376 mg/dl	<140 mg/dl	05/01/2024
52	X52	L	58	DM + Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 7.035	Gds Gdp HbA1c	97 mg/dl 81 mg/dl 5.98 %	<140 mg/dl <110 mg/dl <6.5 %	05/02/2024 10/02/2024 10/02/2024
53	X53	P	65	DM Tipe 2 + Osteoarthritis Genu	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 34.804	Gdp HbA1c	102 mg/dl 7.24 %	<110 mg/dl <6.5 %	06/02/2024 06/02/2024
54	X54	P	65	Diabetes + GERD	Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 24.203	-	-	-	-
55	X55	P	81	DM Tipe 2	Metformin 500	Biaya Resep RP. 19.040	Gds	211 mg/dl	<140 mg/dl	09/03/2024
56	X56	P	54	Diabetes	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 9.947	Gdp HbA1c Gdp	253 mg/dl 11.76 % 72 mg/dl	<110 mg/dl <6.5 % <110 mg/d	06/03/2024 06/03/2024 20/03/2024
57	X57	P	51	Diabetes	Metformin 500 Gliclazid 80 mg	Biaya Resep RP. 55.912	Gdp Gdp	224 mg/dl 115 mg/dl	<110 mg/dl <110 mg/dl	19/03/2024 20/03/2024
58	X58	L	35	Diabetes	Metformin 500	Biaya Resep RP. 60.837	-	-	-	-
59	X59	P	65	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 24.934	Gdp HbA1c	134 mg/dl 8.2 %	<110 mg/dl <6.5 %	04/01/2024 04/01/2024
60	X60	P	57	DM Tipe 2 + Neuropati DM	Gliclazid 80 mg	Biaya Resep RP. 36.477	-	-	-	-
61	X61	P	63	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 22.328	-	-	-	-
62	X62	P	53	DM Tipe 2 + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 3.248	Gds Gdp	157 mg/dl 148 mg/dl	<140 mg/dl <110 mg/dl	03/01/2024 03/01/2024
63	X63	P	58	Diabetes + Neuropati DM	Metformin 500	Biaya Resep RP. 8.533	-	-	-	-
64	X64	P	68	DM 2 + Hipertensi	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 11.603	Gdp HbA1c Gdp	256 mg/dl 12.44 % 144 mg/dl	<110 mg/dl <6.5 % <110 mg/dl	05/03/2024 05/03/2024 13/03/2024
65	X65	L	60	Diabetes	Metformin 500 Glimepiride 2 mg	Biaya Resep RP. 27.475	Gdp Gdp	262 mg/dl 174 mg/dl	<110 mg/dl <110 mg/dl	21/03/2024 27/03/2024
66	X66	P	58	DM Tipe 2	Gliclazid 80 mg	Biaya Resep RP. 14.610	Gds	211 mg/dl	<140 mg/dl	05/01/2024
67	X67	P	71	DM Tipe 2	Metformin 500	Biaya Resep RP. 19.061	-	-	-	-
68	X68	P	49	Diabetes + Hipertensi	Metformin 500	Biaya Resep RP. 18.921	Gdp HbA1c	225 mg/dl 8.13%	<110 mg/dl <6.5 %	12/01/2024 12/01/2024

Lampiran 7. Tabel Biaya BPJS dan Biaya Rumah Sakit

No	Nama	Klaim BPJS	Biaya Rumah Sakit						Selisih	
			Konsultasi	Resep	Radiologi	Laboratorium				Total
						GDP	GDS	HbA1c		
1	Y1	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp101.192	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 142.772	Rp 65.128
2	Y2	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 90.199	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 141.779	Rp 66.121
3	Y3	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 36.498	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 88.078	Rp 119.822
4	Y4	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 15.372	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 56.952	Rp 150.948
5	Y5	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 73.595	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 125.175	Rp 82.725
6	Y6	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 4.880	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 46.460	Rp 161.440
7	Y7	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 21.739	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 73.319	Rp 134.581
8	Y8	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 7.609	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 59.189	Rp 148.711
9	Y9	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 28.519	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 70.099	Rp 137.801
10	Y10	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 11.192	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 162.772	Rp 45.128
11	X1	Rp 213.100	Rp 42.620	Rp 15.896	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 68.516	Rp 144.584
12	Y11	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 15.071	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp -	Rp 76.651	Rp 131.249
13	X2	Rp 319.400	Rp 63.880	Rp 27.831	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 201.711	Rp 117.689
14	Y12	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 10.990	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 172.570	Rp 35.330
15	X3	Rp 159.900	Rp 31.980	Rp 14.693	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 46.673	Rp 113.227
16	Y13	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 29.255	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 80.835	Rp 127.065
17	Y14	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 12.012	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 173.592	Rp 34.308
18	Y15	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 26.264	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000	Rp 167.844	Rp 40.056
19	Y16	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 19.948	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000	Rp 161.528	Rp 46.372
20	Y17	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 29.015	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 70.595	Rp 137.305
21	X4	Rp 159.900	Rp 31.980	Rp 36.763	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 68.743	Rp 91.157
22	Y18	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 40.890	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 92.470	Rp 115.430
23	Y19	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 22.358	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 63.938	Rp 143.962
24	Y20	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 19.300	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 170.880	Rp 37.020
25	Y21	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 9.051	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 60.631	Rp 147.269
26	Y22	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 24.646	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000	Rp 166.226	Rp 41.674
27	Y23	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 27.800	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 189.380	Rp 18.520
28	Y24	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 24.521	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 66.101	Rp 141.799
29	Y25	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 37.714	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 119.294	Rp 88.606
30	Y26	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 17.235	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 168.815	Rp 39.085
31	Y27	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 18.724	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 170.304	Rp 37.596

32	Y28	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 19.285	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60.865	Rp 147.035
33	Y29	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 44.194	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 85.774	Rp 122.126
34	Y30	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 10.563	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 62.143	Rp 145.757
35	Y31	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 33.781	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 85.361	Rp 122.539
36	Y32	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 17.334	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 58.914	Rp 148.986
37	Y33	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 36.084	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 87.664	Rp 120.236
38	Y34	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 27.139	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 178.719	Rp 29.181
39	Y35	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 5.551	Rp 30.000	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 87.131	Rp 120.769
40	Y36	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 29.190	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 80.770	Rp 127.130
41	Y37	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 7.294	Rp -	Rp 20.000	Rp -	Rp -	Rp 68.874	Rp 139.026
42	Y38	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 205.290	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 256.870	-Rp 48.970
43	Y39	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 36.722	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 78.302	Rp 129.598
44	Y40	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 3.899	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 55.479	Rp 152.421
45	Y41	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 22.273	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 73.853	Rp 134.047
46	Y42	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 42.212	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83.792	Rp 124.108
47	Y43	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 35.238	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 86.818	Rp 121.082
48	Y44	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 130.560	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 182.140	Rp 25.760
49	Y45	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 14.441	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 56.021	Rp 151.879
50	Y46	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 19.060	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60.640	Rp 147.260
51	Y47	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 26.333	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 77.913	Rp 129.987
52	Y48	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 7.035	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 168.615	Rp 39.285
53	Y49	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 34.804	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 76.384	Rp 131.516
54	Y50	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 24.203	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 65.783	Rp 142.117
55	Y51	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 19.040	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 70.620	Rp 137.280
56	Y52	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 9.947	Rp -	Rp 20.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 171.527	Rp 36.373
57	X5	Rp 213.100	Rp 42.620	Rp 55.912	Rp -	Rp 20.000	Rp -	Rp -	Rp 118.532	Rp 94.568
58	Y53	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 60.837	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 102.417	Rp 105.483
59	Y54	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 24.934	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 176.514	Rp 31.386
60	Y55	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 36.477	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 78.057	Rp 129.843
61	Y56	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 22.328	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 63.908	Rp 143.992
62	Y57	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 3.248	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp -	Rp 64.828	Rp 143.072
63	Y58	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 8.553	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.133	Rp 157.767
64	Y59	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 11.603	Rp -	Rp 20.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 173.183	Rp 34.717
65	Y60	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 27.475	Rp -	Rp 20.000	Rp -	Rp -	Rp 89.055	Rp 118.845
66	Y61	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 14.610	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 66.190	Rp 141.710
67	Y62	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 19.061	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60.641	Rp 147.259
68	Y63	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 18.921	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 70.501	Rp 137.399
69	Y64	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 17.388	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 58.968	Rp 148.932
70	Y65	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 7.356	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 158.936	Rp 48.964
71	Y66	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 16.331	Rp -	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 187.911	Rp 19.989

72	Y67	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 21.728	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 73.308	Rp 134.592
73	Y68	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 71.670	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 123.250	Rp 84.650
74	Y69	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 17.647	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 169.227	Rp 38.673
75	Y70	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 22.008	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 63.588	Rp 144.312
76	Y71	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 42.921	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 94.501	Rp 113.399
77	Y72	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 85.080	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 126.660	Rp 81.240
78	Y73	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 24.052	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 185.632	Rp 22.268
79	Y74	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 25.830	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 67.410	Rp 140.490
80	Y75	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 26.264	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 77.844	Rp 130.056
81	Y76	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 48.782	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp 100.362	Rp 107.538
82	Y77	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 5.000	Rp -	Rp -	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 156.580	Rp 51.320
83	Y78	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 18.620	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60.200	Rp 147.700
84	Y79	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 5.160	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 46.740	Rp 161.160
85	Y80	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 38.164	Rp -	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 100.000	Rp 209.744	-Rp 1.844
86	Y81	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 3.899	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 165.479	Rp 41.521
87	Y82	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 40.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 82.080	Rp 125.820
88	Y83	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 7.710	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 49.290	Rp 158.610
89	Y84	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 56.238	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 97.818	Rp 110.082
90	Y85	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 41.526	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83.106	Rp 124.794
91	Y86	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 13.290	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 54.870	Rp 153.030
92	Y87	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 39.566	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 81.146	Rp 126.754
93	Y88	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 43.620	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 205.200	Rp 2.700
94	Y89	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 34.082	Rp -	Rp 30.000	Rp -	Rp -	Rp 105.662	Rp 102.238
95	Y90	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 87.346	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp -	Rp 148.926	Rp 58.974
96	Y91	Rp 207.900	Rp 41.580	Rp 31.563	Rp -	Rp 10.000	Rp -	Rp -	Rp 83.143	Rp 124.757
Total										Rp 9.806.996

Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan

RIWAYAT HIDUP



Muh. Fadhil Rahmadana T. biasa dipanggil Fadhil, lahir di Pinrang pada tanggal 13 Februari 2002, sebagai anak Pertama dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Ir. Abdurrahman Ali dan Ibu Hj. Hamdana. Penulis telah memulai pendidikannya mulai dari TK Cokroaminoto (2006), Sekolah Dasar (SD) di SDN Inpres Bertingkat Pinrang (2013), Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pinrang (2016), Sekolah Menengah Atas (SMA) di Boarding School SMAN 11 Unggulan Pinrang (2020). Dan melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Penulis pernah menjadi Putra Farmasi dan Putra Putri Farmasi (PPF) terfavorit UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR